
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books


<https://books.google.com>



Tax.
C 16.1
pr



3 2044 107 265 985



*Monsieur Eugène Cordonnier
De la part de l'auteur*

PRODROMI

SYSTEMATIS NATURALIS VEGETABILIJM

HISTORIA, NUMERI, CONCLUSIO

AUCTORE

ALPHONSO DE CANDOLLE

(Seorsim e typis voluminis ultimi, nempe XVIIⁱ)

PARISIIS

SUMPTIBUS G. MASSON

BIBLIOPOLÆ APUD MEDICINÆ ACADEMIAM

17, Foro dicto de l'École de Médecine, 17

M DCCC LXXIII

PRODROMI

SYSTEMATIS NATURALIS VEGETABILUM

HISTORIA, NUMERI, CONCLUSIO

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR :

Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive Enumeratio contracta ordinum, generum specierumque plantarum huc usque cognitrum, par MM. de CANDOLLE, avec le concours de divers collaborateurs.

Dix-sept tomes, parus en 20 volumes in-8°. Prix de l'ouvrage complet.. 280 fr.

| | |
|--|-------|
| Tome I à VII, chacun..... | 13 fr |
| Chacun des volumes depuis le tome VIII, se vend..... | 16 » |
| Le tome XI ¹ I a une deuxième partie vendue..... | 12 » |
| Le tome XV, 1 ^{re} partie, 1864. 1 vol. in-8°..... | 12 » |
| Le tome XV, 2 ^e partie. 1 vol. de près de 1300 pages. Paris 1866..... | 34 » |
| Tome XVI, 1 ^{re} partie..... | 12 » |
| Le tome XVI, 2 ^e partie..... | 16 » |
| Tome XVII et dernier..... | 14 » |

Des tables du *Prodromus* ont été publiées par le Dr Buek, sous le titre :

Genera, species et synonyma candolleana seu Index generalis et specialis ad Prodromum, in-8°. *Pars I* (continens tomos candoll. quatuor priores) Berolini 1842. — *Pars II* (continens tomos 5, 6 et 7, sect. 1), Berolini, 1840. — *Pars III* (continens t. 7, sect. 2, t. 8-13), Hamburgi, 1858. — *Pars IV* (de tom. 14-17), Hamburgi, 1874, apud Maucke.

Géographie botanique raisonnée, par M. A. de CANDOLLE. Paris, 1855. 1 tome grand in-8° de 1300 pages, divisé en 2 volumes compactes, avec 2 cartes coloriées, chez Masson..... 25 fr.

Lois de la nomenclature botanique adoptées par le congrès international de botanique tenu à Paris en août 1867, suivies d'une 2^e édition de l'*Introduction historique et du commentaire qui accompagnaient la rédaction préparatoire présentée au congrès*. In-8°, 64 pages, 1867. Genève, chez Georg

Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, suivie d'autres études sur des sujets scientifiques, en particulier sur la *Sélection dans l'espèce humaine*. 1 vol. in-8°. Genève, chez Georg, 1873.

PRODROMI

SYSTEMATIS NATURALIS VEGETABILIIUM

HISTORIA, NUMERI, CONCLUSIO

AUCTORE

ALPHONSO DE CANDOLLE

(Seorsim e typis voluminis ultimi, nempē XVIIⁱ)

PARISIIS

SUMPTIBUS G. MASSON

BIBLIOPOLÆ APUD MEDICINÆ ACADEMIAM

17, Foro dicto de l'École de Médecine, 17

M DCCC LXXIII

PRODROMI

HISTORIA, NUMERI, CONCLUSIO

Monographias omnium regni vegetabilis ordinum ex autopsia plantarum in præcipuis herbariis repositarum et secundum artes, tunc male cognitas, methodi naturalis, anno MDCCCXVI scribere suscepit *Augustinus Pyramus de Candolle*. Opus ingens, quod merito « periculorum et alea plenum, sed utilissimum, » vocavit (1). Etiamsi ardore fere juvenili incensus undecim tantum ordines, quorum euidem duo majores (*Ranunculaceæ* et *Cruciferæ*), per spatium quinque annorum perficere potuit. Annis enim MDCCCXVIII et XXI volumina duo, *Regni vegetabilis systema naturale* dicta, in lucem prodierunt, quibus approbatio imo laudes botanicorum non defuerunt.

Experientia tunc doctus formam *Prodromi*, in vol. I et II valde abbreviatam, selegit; quæ, sine incommodo ubi *Systema prius divulgatum adjuvabat*, alibi nimis truncata omnibus apparuit. Ergo, in sequentibus voluminibus, cuique speciei pauca adjunxit; nec tacendum quantopere ex anno in annum synonymia magis intricata, loci natales numerosiores, characteres investigandi difficiliores et generum atque specierum numeri admodum crescentes, textum fusiorem necessarie trahebant. Simili fere passu ac in vol. III et IV continuavit cl. auctor usque ad finem *Compositarum* (vol. VII), raro genera vel minores ordines aliis botanicis, nempe cl. Seringe, de Gingins, Ott, Dunal, Choisy, Berlandier et Frœlich committens. Mox tamen ætate et morbo gravissimo debilitatus, commilitones frequentius juxta se ipsum et alio quæsivit, inter quos filius Alphonsus, atque clarissimi Bentham, Dunal, Decaisne, Meissner, Moquin-Tandon, Grisebach, Duby, Nees ab Esenbeck, fragmenta non parva, imo interdum valde extensa, polliciti fuerunt et serius tradiderunt.

Hisce dignissimis amicis nisus, *Alphonsus de Candolle*, patre defuncto (1841), opus, non sine cura et impensis, continuavit. Formam magis evolutam et in quibusdam perfectiorum a vol. VIII proposuit, ita ut *Prodromus* non amplius

(1) *Systema 1*, p. 11.

recensio contracta esset, sed vere series monographiarum a pristina *Systematis* parum diversa. Auctores his supra enumera-tis adjunxit, nempe cl. Boissier, Schlechtendal, Schauer, Reuter, Hooker fil., Miquel, Andersson, Weddell, Müller (Argov.), Eichler, Duchartre, Bureau, Baillon, Wesmael, Par-latore, Regel, comitem a Solms-Laubach, J. E. Panchon, et filium Casimir de Candolle, ad struendum commune patris et avi ædificium promptum.

Uno verbo primus de Candolle septem volumina, quorum initio fere solus auctor, per annos viginti (1822-41) scripsit; secundus, cum auxilio plurium botanicorum, per triginta et duo annos volumina decem (VIII-XVII) addidit.

Mirandum primo adspectu videtur quod acreto numero auctorum non citius properaverit opus. Causas exponere aliis botanicis in futurum utile forsan erit. Increscent difficultates cum numero specierum, specimenum, characterum et synony-morum quibus attendere debent monographi. Præterea rari sunt loci ubi herbaria et simul omnes libri ad manum, sine impedimento vel mora, extant. Frequenter bibliothecæ a plantis sejunctæ vel recentioribus operibus orbatae laborem diffici-lem efficiunt. Hic adest interdum botanophilus scientiæ devo-tissimus, qui libris aut plantis caret; illic omnia acervantur, sed deficit botanicis aut ardor aut methodus aut tempus extra officia publica laborandi. Nec desunt auctores qui monogra-phiam suscipiunt et postea tempore debito non tradunt vel etiam deserunt. E quadraginta auctoriibus qui lubenter manu-scripta nobis promiserunt, quinque ultra moram anni et qua-tuor ultra spatium duorum annorum scripta retinuerunt, septem denique post dilatationes varie extensas renuntiaverunt. Inde tempus amissum, inde volumina in sectiones divisa, ordines transpositi, ordo unus (*Artocarpeæ*) ultima die relictus, et tandem necessitas Prodromum ultra Dicotyledoneas non pergere et opus concludere, ne tertiam botanicorum genera-tionem occideret!

Verumtamen, e centro nostro genevensi, contra inopiam librorum vel herbariorum apud quosdam et diffusionem docu-mentorum in libris et diariis, strenue luctavimus. Herbarii ditissimi specimina singulo auctori tradidimus, cum nolulis de novis generibus, speciebus aut iconibus quas per sexaginta annos in bibliotheca nostra sedulo collegimus. Faverunt præ-terea numerosissimi scientiæ amici, viatores nempe plagas remotas peragrantes et quorum nomina ubicunque in textu citantur, herbariorum possessores atque herbariis publicis præpositi. Inter omnes memorare juvat, propter dona speci-minum pretiosissima et numerosissima: peregrinatores vel botanicos Acerbi, Andersson, Bertero, Boissier, Bojer, Bolander, Bouton, R. Brown, Burchell, Bunge, Castagne, A. Cunningham, d'Urville, Engelmann, F. Fischer (petropolit.), Claud.

Gay, Heuffel, Hooker (sir William) et Hooker (Jos.), de la Pylaie, Leschenault, Manso (da Silva), a Martius, Moris, Mueller (Ferd.), de la Ossa, d'Orbigny, Philippi, Requier, Royle, Sagra (Ramon de la), Turczaninow, Wallich, Webb, Wight, Wikström; generosissimos scientiae fautores Delessert, comitem a Sternberg, Lenormand; nec non Musæa botanica parisiense, taurinense, florentinum, monacense, berolinense, petropolitanum, hafniense, holmiense, lugduno-batavum, societatis horticolæ londinensis, horti kewensis, horti calcuttensis, amplissimi cœtus Indiæ orientalis et societatis naturæ curiosorum mosquensis. Ad usum, frequenter et maxima cum benevolentia, communicaverunt herbariorum partes amicissimi Lindley et Boissier, cl. comes a Franqueville, atque Berolini, Vindobonæ, Monachii, Hafniæ, Holmiæ, Sancti Petropolis, aliarumque interdum civitatum Musæa regia vel imperialia; ita ut, adjunctis herbariorum vel collectionum speciminibus centum millia superantibus ære comparatis, materies amplissimas adhibere et auctoribus tradere potuerimus. Ex illa miro modo varia origine speciminum, ex usu linguae latinæ et concursu auctorum omnium fere gentium, fuit *Prodromus* noster opus vere europæum, quod e sequenti tabula clarius apparebit.

PARS CUJUSVE AUCTORIS IN PRODROMO.

| NOMEN. | DOMICILIUM. | PATRIA. | PAGINÆ scriptæ (1). |
|---|-------------------|-----------------|------------------------|
| DE CANDOLLE (August. Pyramus). — (Alphonsus) | Geneva | Helvetia | 4303 $\frac{1}{2}$ |
| MULLER (J.), argov..... | Geneva | Helvetia | 1387 |
| BENTHAM (G.)..... | Geneva | Helvetia | 1144 $\frac{1}{2}$ |
| MEISSNER (C.-F.) | Londinum..... | Britannia | 1133 |
| DUNAL | Basilea | Helvetia..... | 835 |
| NEES AB ESENBECK (C.-G.)..... | Monspelium..... | Gallia..... | 732 $\frac{1}{2}$ |
| MOQUIN-TANDON..... | Vratislavia | Germania..... | 485 |
| WEDDELL (H.-A.) | Tolosa..... | Gallia..... | 428 |
| SFRINGE | Pictavium..... | Britannia..... | 319 |
| BOISSIER (Edm.) | Geneva | Gallia..... | 282 |
| DE CANDOLLE (Casimir)..... | Geneva | Helvetia | 273 $\frac{1}{2}$ |
| CHOISY | Geneva | Helvetia | 259 $\frac{1}{2}$ |
| DECaisne..... | Parisii..... | Helvetia | 234 |
| | | Gallia..... | 221 |

(1) Exclusis indicibus, quorum fastidiosa præparatio rectoribus operis, Aug. Pyr. et Alph. de Candolle, fere in integrum tribuenda, ut et operosissima plagarum typographicarum expurgatio.

| NOMEN. | DOMICILIUM. | PATRIA. | PAGINÆ scriptæ. |
|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| SCHAUER (J.-C.)..... | Eldena..... | Germania..... | 181 |
| PARLATORI (Phil.)..... | Florentia..... | Italia..... | 175 $\frac{1}{2}$ |
| ANDERSSON (N.-J.)..... | Holmia..... | Suecia..... | 134 $\frac{1}{2}$ |
| GRISEBACH (A.-H.-R.)..... | Göttingen..... | Germania..... | 104 |
| DUCHARTRE (P.)..... | Parisi..... | Gallia..... | 78 |
| BUREAU (Ed.)..... | Parisi..... | Gallia..... | 78 |
| PLANCHON (J.-E.)..... | Monspelium..... | Gallia..... | 60 |
| REUTER | Geneva | Helvetia | 49 |
| DUBY | Geneva | Helvetia | 42 |
| FREELICH | Ellwangen | Germania | 38 $\frac{1}{2}$ |
| EICHLER (Dr.) | Kiel | Germania | 34 |
| GINGINS (DE) | Geneva | Helvetia | 30 |
| REGEL | S. Petropolis | Germania | 29 |
| HOOKER fil. (Jos.) | Kew | Britannia | 27 |
| BAILLON | Parisi..... | Gallia..... | 20 |
| OTT | Berna | Helvetia | 19 |
| SOLMS (Comes a) | Laubach | Germania | 17 |
| MIQUEL | Lugd. bat..... | Batavia | 13 |
| SCHLECHTENDAL | Halle | Germania | 11 |
| WESMAEL | Mons | Belgium | 8 $\frac{1}{2}$ |
| BERLANDIER | Geneva | Gallia | 7 |

13194 $\frac{1}{2}$

Dupli modo nomina citata componere licet, nempe :

| | Paginæ. |
|---|---------------------|
| DE CANDOLLE (Aug. Pyr.), ejus filius (Alph.) et filii filius (Casimir). | 5950 |
| Herbarii candolleani custodes (Müller, Seringe, Reuter)..... | 1475 $\frac{1}{2}$ |
| Alii auctores, numero vigenti novem..... | 5769 |
| | 13194 $\frac{1}{2}$ |

Aut e gente :

| | Numerus auctorum. | Paginæ. |
|----------------|----------------------|---------------------|
| Helveti..... | 11 | 8577 |
| Galli..... | 9 | 1907 |
| Britanni | 3 | 1479 |
| Germani | 8 | 900 |
| Italus..... | 1 | 175 $\frac{1}{2}$ |
| Suecus..... | 1 | 134 $\frac{1}{2}$ |
| Batavus..... | 1 | 13 |
| Belgus..... | 1 | 8 $\frac{1}{2}$ |
| | 35 | 13194 $\frac{1}{2}$ |

Numeri ordinum, generum et specierum in Prodromo descriptarum sequenti modo accurate traduntur.

TABULA NUMERICA

GENERUM SPECIERUMQUE CUJUSVE ORDINIS IN PRODROMO.

| DICOTYLEDONEÆ. | VOLUMEN PRODROMI. | NUMERI (a) | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | GENERUM. | SPECIE-RUM. |
| A. ANGIOSPERMÆ. | | | |
| 1. Thalamifloræ. | | | |
| 1. Ranunculaceæ | I. | 29 | 544 |
| Dilleniaceæ | " | 16 | 100 |
| Magnoliaceæ | " | 9 | 40 |
| Anonaceæ | " | 9 | 121 |
| Menispermaceæ | " | 12 | 92 |
| Berberideæ | " | 6 | 47 |
| Podophyllaceæ | " | 5 | 6 |
| Nymphæaceæ | " | 4 | 32 |
| Sarraceniaceæ | XVII. | 3 | 10 |
| 10. Papaveraceæ | I. | 9 | 54 |
| Fumariaceæ | " | 6 | 53 |
| Resedaceæ | XVI, s. II. | 6 | 66 |
| Cruciferæ | I. | 100 | 988 |
| Capparideæ | " | 17 | 231 |
| Flacourtiææ | " | 9 | 26 |
| Bixineæ | " | 6 | 22 |
| Lacistemaceæ | XVI, s. II. | 1 | 16 |
| Cistineæ | I. | 4 | 161 |
| Violarieæ | " | 18 | 181 |
| 20. Droseraceæ | " | 8 | 45 |
| Polygalaceæ | " | 11 | 265 |
| Tremandreae | " | 2 | 7 |
| Pittosporæ | " | 4 | 26 |
| Frankeniacæ | " | 3 | 19 |
| Caryophylleæ | " | 29 | 768 |
| Linææ | " | 2 | 55 |
| Malvaceæ | " | 23 | 559 |
| Bombaceæ | " | 15 | 52 |
| Byttneriææ | " | 35 | 221 |
| 30. Tiliaceæ (exclusa Vatica) | " | 22 | 148 |
| Elæocarpeæ | " | 7 | 20 |
| Chlenaceæ | " | 5 | 11 |
| Ancistrocladæ | XVI, s. II. | 1 | 7 |
| Dipterocarpeæ | " | 14 | 128 |
| Lophiraceæ | " | 1 | 1 |
| Ternstroemiææ | I. | 13 | 54 |
| Camellieæ | " | 2 | 8 |
| Olaclineæ | I et XVII, p. 7. | 16 | 49 |
| Aurantiaceæ | I. | 12 | 44 |
| 40. Hypericinæ | " | 8 | 158 |
| Guttiferæ | " | 21 | 60 |

(a) Differunt interdum numeri hic citati ab iis in diversis auctoribus, ex. gr. in *Hinds Ann. of nat. hist.*, 9, p. 415 (de IV primis vol.), sed ubi discrepantias vidi numeros iterum supputavi, et præterea moneo errores in numeris generum et sæpius specierum in *Prodromo* adesse, quos correxvi. Species absque phrasi aut charactere ullo non enumeravi. — Genera omissa, in *Prod. XVII*, p. 289, memorata, non includuntur, præter *Belloniæam*.

| | VOL. PRODROMI. | NUMERI |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| | GENERUM. | SPECIE-RUM. |
| 42. Marcgraviaceæ..... | I. | 4 9 |
| Hippocrateaceæ..... | " | 7 50 |
| Erythroxyleæ..... | " | 2 26 |
| Malpighiaceæ..... | " | 17 180 |
| Acerineæ..... | " | 2 32 |
| Hippocastaneæ..... | " | 2 9 |
| Rhizoboleæ..... | " | 1 6 |
| Sapindaceæ..... | " | 29 193 |
| 50. Meliaceæ..... | " | 16 65 |
| Ampelideæ..... | " | 5 115 |
| Geraniaceæ..... | " | 5 490 |
| Tropæoleæ..... | " | 2 14 |
| Balsamineæ..... | " | 2 31 |
| Oxalideæ..... | " | 4 159 |
| Zygophylleæ..... | " | 10 52 |
| Rutaceæ..... | " | 30 236 |
| Simarubææ..... | " | 4 13 |
| Ochnaceæ..... | " | 5 40 |
| 60. Coriarieæ..... | " | 1 7 |
| <i>2. Calycifloræ.</i> | | |
| Celastrineæ..... | II. | 19 175 |
| Rhamneæ..... | " | 17 241 |
| Bruniaceæ..... | " | 3 28 |
| Samydeæ..... | " | 3 48 |
| Homalineæ..... | " | 9 19 |
| Chaillietiaceæ..... | " | 3 7 |
| Aquilarineæ (v. Thymelæacæ)..... | " | |
| Terebinthaceæ..... | " | 55 242 |
| Leguminosaæ (a)..... | " | 283 3853 |
| Rosaceæ..... | " | 62 798 |
| 70. Calycantheæ..... | III. | 2 4 |
| Monimiaceæ..... | XVI, s. II. | 15 135 |
| Granateæ..... | III. | 1 2 |
| Memecyleæ..... | " | 3 22 |
| Combretaceæ..... | " | 18 107 |
| Vochysieæ..... | " | 9 38 |
| Rhizophoreæ..... | " | 4 23 |
| Onagrarieæ..... | " | 16 248 |
| Halorageæ..... | III et XVI, s. II, 596. | 9 54 |
| Ceratophylleæ..... | III. | 1 2 |
| 80. Lythrarieæ..... | III. | 27 178 |
| Crypteroniaceæ..... | XVI, s. II, p. 677. | 1 8 |
| Tamariscineæ..... | III. | 2 23 |
| Melastomaceæ..... | " | 69 722 |
| Alangieæ..... | III et IV, p. 267. | 2 4 |
| Philadelphææ..... | III. | 2 12 |
| Myrtaceæ..... | " | 47 711 |
| Cucurbitaceæ..... | " | 25 196 |
| Passifloreæ..... | " | 11 178 |
| Loaseæ..... | " | 6 31 |
| 90. Turneraceæ..... | " | 2 31 |

(a) Error adest in p. 521 quoad numeros generum.

| | VOL. PRODROMI. | NUMERI | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | GENERUM. | SPECIE-RUM. |
| 91. | Fouquieriacæ..... | III. | 2 |
| | Portulaceæ..... | " | 14 |
| | Paronychieæ..... | " | 22 |
| | Crassulaceæ..... | " | 19 |
| | Ficoideæ..... | " | 9 |
| | Cacteæ..... | " | 7 |
| | Grossularieæ..... | " | 1 |
| | Saxifragaceæ..... | IV. | 33 |
| | Umbelliferæ..... | " | 160 |
| 100. | Araliacæ..... | " | 13 |
| | Hamamelideæ..... | " | 4 |
| | Corneæ..... | " | 5 |
| | Helwingiacæ..... | XVI. s. II. | 1 |
| | Loranthaceæ..... | IV et XIV. p. 622. | 4 |
| | Caprifoliaceæ..... | IV. | 12 |
| | Rubiaceæ..... | " | 225 |
| | Valerianeæ..... | " | 11 |
| | Dipsaceæ..... | " | 6 |
| | Calycereæ..... | V. | 4 |
| 110. | Compositæ (a)..... | V, VI, VII. | 911 |
| | Styliacæ..... | VII. | 3 |
| | Lobeliacæ..... | " | 27 |
| | Campanulaceæ..... | " | 24 |
| | Cyphiacæ..... | " | 1 |
| | Good-novieæ..... | " | 10 |
| | Roussæaceæ..... | " | 1 |
| | Gesneriacæ..... | VII et XVII. p. 290. | 18 |
| | Sphenocleaceæ..... | VII. | 1 |
| | Columelliaceæ..... | " | 1 |
| 120. | Napoleoneæ..... | " | 2 |
| | Vaccinieæ..... | " | 14 |
| | Ericaceæ..... | " | 52 |
| | Epacrideæ..... | " | 30 |
| | Pyrolaceæ..... | " | 4 |
| | Francoaceæ..... | " | 2 |
| | Monotropeæ..... | " | 4 |
| <i>3. Corollifloræ.</i> | | | |
| | Lentibularieæ..... | VIII. | 4 |
| | Primulaceæ..... | " | 25 |
| | Myrsineacæ..... | VIII. | 21 |
| 130. | Ægiceracæ..... | " | 1 |
| | Theophrastaceæ..... | " | 6 |
| | Sapotaceæ..... | " | 21 |
| | Ebenaceæ..... | " | 8 |
| | Styracaceæ..... | " | 6 |
| | Oleaceæ..... | " | 21 |
| | Salvadoraceæ..... | XVII. p. 27. | 4 |
| | Jasmineæ..... | VIII. | 6 |
| | Apocynaceæ..... | " | 98 |
| | Asclepiadæ..... | " | 134 |
| | | | 1013 |

(a) De numero generum confer ad XVII, p. 319.

| | VOL. PRODROMI. | NUMERI | |
|------|------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | GENERUM. | SPECIE-RUM. |
| | | | |
| 140. | <i>Leoniaceæ (a)</i> | VIII. | 1 3 |
| | <i>Loganiaceæ</i> | IX. | 26 179 |
| | <i>Gentianaceæ</i> | " | 57 465 |
| | <i>Bignoniaceæ</i> | " | 50 526 |
| | <i>Sesameæ</i> | " | 12 29 |
| | <i>Cyrtandraceæ</i> | " | 30 136 |
| | <i>Hydrophyllaceæ</i> | " | 9 46 |
| | <i>Polemoniaceæ</i> | IX et XIII. s. I, p. 691. | 11 107 |
| | <i>Convolvulaceæ</i> | IX. | 41 721 |
| | <i>Erycibeæ</i> | " | 1 7 |
| | <i>Borragineæ</i> | IX et X. | 70 1173 |
| 150. | <i>Hydroleaceæ</i> | X. | 8 34 |
| | <i>Solanaceæ</i> | XIII, s. I. | 65 1725 |
| | <i>Scrophulariaceæ</i> | X et XIII, s. I, p. 676. | 176 1879 |
| | <i>Orobanchaceæ</i> | XI. | 12 166 |
| | <i>Acanthaceæ</i> | " | 154 1481 |
| | <i>Phrymaceæ</i> | " | 1 1 |
| | <i>Verbenaceæ</i> | " | 42 664 |
| | <i>Myoporaceæ</i> | " | 12 57 |
| | <i>Selagineæ</i> | XII. | 9 125 |
| | <i>Labiatae</i> | " | 122 2401 |
| 160. | <i>Stilbaceæ</i> | " | 4 8 |
| | <i>Globulariaceæ</i> | " | 2 10 |
| | <i>Brunoniaceæ</i> | " | 1 2 |
| | <i>Plumbagineæ</i> | " | 11 232 |
| | <i>Plantaginaceæ</i> | XIII, s. I. | 3 208 |
| | | | |
| | 4. Monochlamydeæ. | | |
| | | | |
| 170. | <i>Phytolaccaceæ</i> | XIII, s. II. | 20 84 |
| | <i>Salsolaceæ</i> | XIII, s. II; XVII, p. 32. | 72 512 |
| | <i>Basellaceæ</i> | XIII, s. II. | 6 21 |
| | <i>Amarantaceæ</i> | " | 46 490 |
| | <i>Nyctaginaceæ</i> | " | 18 119 |
| | <i>Polygonaceæ</i> | XIV. | 23 699 |
| | <i>Lauraceæ</i> | XV, s. I. | 54 981 |
| | <i>Myristicaceæ</i> | XIV. | 1 91 |
| | <i>Proteaceæ</i> | XIV. | 46 1080 |
| | <i>Penæaceæ</i> | " | 6 23 |
| | <i>Geissolomaceæ</i> | " | 1 1 |
| | <i>Thymelæaceæ (b)</i> | " | 39 378 |
| | <i>Elæagnææ</i> | " | 6 34 |
| | <i>Grubbiaceæ</i> | " | 1 3 |
| | <i>Santalaceæ (c)</i> | " | 20 225 |
| 180. | <i>Hernandiaceæ</i> | XV, s. I. | 4 10 |
| | <i>Begoniaceæ</i> | " | 3 381 |
| | <i>Datiscaceæ</i> | " | 4 6 |
| | <i>Papayaceæ</i> | " | 3 23 |
| | <i>Aristolochiaceæ</i> | " | 5 195 |
| | <i>Nepenthaceæ</i> | XVII. | 1 33 |
| | <i>Stackhousiaceæ</i> | XV, s. I. | 1 11 |

(a) Ordo vix admissus, in Prodromo absque numero.

(b) Inclusis Aquilarineis.

(c) Non inclusis 2 sp. generis Schœpfiae Loranthacearum.

| | VOL. PRODROMI. | NUMERI | |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | GENERUM. | SPECIE-RUM. |
| 190. | Euphorbiaceæ..... | XV, s. II. | 191 |
| | Daphniphyllaceæ..... | XVI, s. I. | 1 |
| | Buxaceæ..... | " " | 5 |
| | Batidaceæ..... | XVII. | 1 |
| | Empetraceæ..... | XVI, s. I. | 3 |
| | Cannabineæ..... | " " | 2 |
| | Ulmaceæ..... | XVII. | 11 |
| | Moraceæ..... | " " | 26 |
| | Artocarpeæ (desunt)..... | " " | 91 |
| | Urticaceæ..... | XVI, s. I. | 43 |
| 200. | Piperaceæ..... | " " | 10 |
| | Chloranthaceæ..... | " " | 3 |
| | Garryaceæ..... | " " | 1 |
| | Cupuliferæ..... | XVI, s. II. | 4 |
| | Corylaceæ..... | " " | 4 |
| | Juglandeæ..... | " " | 5 |
| | Myricaceæ..... | XVI, s. II, p. 147, 590. | 3 |
| | Platanaceæ (et Liquidambar)..... | XVI, s. II. | 2 |
| | Betulaceæ..... | " " | 2 |
| | Salicineæ..... | " " | 2 |
| 210. | Casuarineæ..... | " " | 1 |
| | B. GYMNOSPERMÆ. | | 26 |
| | Gnetaceæ..... | XVI, s. II. | 3 |
| | Coniferæ..... | " " | 33 |
| 210. | Cycadaceæ..... | " " | 10 |
| | C. INCERTÆ SEDIS. | | 68 |
| 214 (a). | Lenniaceæ..... | XVII. | 3 |
| | Podostemaceæ..... | " " | 25 |
| | Cytinaceæ..... | " " | 7 |
| | Balanophoraceæ..... | " " | 14 |
| | Tota (b)..... | | 58975 |

Numeri secundum divisiones Dicotyledonearum sunt :

| | ORDINES. | GENERA. | SPECIES. |
|--------------------|--------------------|---------|----------|
| Angiospermæ | Thalamifloræ..... | 60 | 671 |
| | Calycifloræ..... | 66 | 2383 |
| | Corollifloræ..... | 38 | 1285 |
| | Monochlamydeæ..... | 43 | 700 |
| Gymnospermæ..... | 3 | 46 | 429 |
| Incertæ sedis..... | 4 | 49 | 170 |
| Tota..... | 214 | 5134 | 58975 |

(a) Numeri ordinum ab iis Prodromi differunt, propter ordines tarde divisos vel tarde quoad locum proprium cognitos et errores typogr. in numeris.

(b) Artocarpeæ desunt. Hisce inclusus numeri Dicotyledonearum fuissent: genera 5163, species circiter 60000.

14 PRODROMI HISTORIA, CONCLUSIO.

Ordines ubi majores numeri generum sunt :

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|----------|
| Compositæ | 911 gen. | Umbelliferæ | 160 gen. |
| Leguminosæ..... | 283 | Acanthaceæ | 154 |
| Rubiaceæ | 225 | Asclepiadæ | 134 |
| Euphorbiaceæ | 191 | Labiatae | 122 |
| Scrophulariaceæ | 176 | Cruciferæ | 100 |

Ubi majores numeri specierum :

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|----------|
| Compositæ | 8561 sp. | Scrophulariaceæ | 1879 sp. |
| Leguminosæ..... | 3853 | Solanaceæ | 1725 |
| Euphorbiaceæ | 3272 | Acanthaceæ | 1481 |
| Labiatae | 2401 | Boragineæ | 1173 |
| Rubiaceæ | 1888 | Umbelliferæ | 1016 |

Ascendent in secunda serie erga primam ordines magis naturales, formis præcipuis ideo parum diversis.

Ordines 27 unicum genus præbent. Ex hisce quidam sat numerosis speciebus gaudent (*Grossularieæ*, *Myristicaceæ*, *Cyphiaceæ*, *Casuarineæ*, *Nepenthaceæ*); quinque vero unica specie in unico genere (*Lophiraceæ*, *Roussæaceæ*, *Sphenocleaceæ*, *Phrymaceæ*, *Batidaceæ*).

Genera quoad numerum sectionum insignia sunt :

| | | |
|----------------------|---------------|---------|
| <i>Begonia</i> , ubi | 61 sectiones, | 354 sp. |
| <i>Erica</i> , | 49 sectiones, | 429 sp. |
| <i>Phyllanthus</i> , | 44 sectiones, | 438 sp. |
| <i>Centaurea</i> , | 31 sectiones, | 236 sp. |

Contra, *Astragalus*, *Acacia*, *Mesembryanthemum*, *Senecio*, genera non minus naturalia et speciebus numerosissimis, nullam divisionem in sectiones sive subgenera præbent, id est, alio sensu, e sectione unica constant. Cæterum frequentia generum absque divisione sectionalii imperfectum statum scientiæ ostendit. Opere nostro progrediente numerosiores fuerunt sectiones, et inde eo rariora genera characteribus futilebus proposita atque nomina inutiliter mutata.

Quoad numerum specierum maxima genera in Prodromo sunt :

| | | | |
|------------------------|---------|--------------------------|---------|
| <i>Solanum</i> | 915 sp. | <i>Phyllanthus</i> | 447 sp. |
| <i>Euphorbia</i> | 751 | <i>Erica</i> | 429 |
| <i>Senecio</i> | 601 | <i>Salvia</i> | 410 |
| <i>Croton</i> | 461 | <i>Peperomia</i> | 389 |

Monotypa sat frequenter occurunt.

Varietates, in speciebus exoticis, propter inopiam specimenum raro traduntur; et in europæis, melius cognitis, a pluribus auctoribus infauste negliguntur. Numerosiores esse quam species, absque dubio asserendum, quippe species linnæana nil sit nisi consociatio formarum. Species sine varietatibus, adeo frequentes in libris, vacuum scientiæ vel

negligentiam auctorum indicant. Passim in serie Prodromi Aug. Pyr. de Candolle, Seringe, Alph. de Candolle, Joh. Müller, aliique, magno cum labore, species e varietatibus attente observatis constituerunt. Tunc numerus varietatum non despiciendus interdum appareat, ut e theoria præsentitur. *Aconitum Napellus* L. 29 varietates ex Seringe exhibit; *Sebastiania corniculata* (*Euphorbiaceae americana*) 23, ex Müller; *Quercus Robur* L. 28, ex observationibus meis, formas plures inter duas vulgo species dictas, olim ab ingeniosissimo sueco conjunctas, præbentibus.

Quod supra de sectionibus dixi de varietatibus æquo jure dicendum. Species frequenter e varietatibus ut genera e sectionibus constant. Hisce neglectis nimiae species nimiaque genera proponuntur, quod in se ipso falsum et præterea nomenclaturam botanicam ad chaos propellit.

Prodromus genera nonnulla et species numerosissimas introduxit, sed officium forsan utilius habuit tradendo ad synonymiam genera male constituta et turbam specierum sub aliis nominibus cognitarum aut e formis secundariis propositarum. Quanta fuit reductio specierum, sæpius ex autopsia specimenum authenticorum, in *Indicibus specificis* cl. Buek videntur. Hic vero genera nova et species novas quoad numeros tradit (1).

| PRODROMI. | | GENERA. | | | | SPECIES. | | | |
|------------|------------------|--------------|-------------------|-------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|----------------------------|
| Volumina. | Divulgata annis. | In integrum. | NEMPE | | Proportio novar. ad vetera | In integrum. | NEMPE | | Proportio novar. ad vetera |
| | | | Ve- ter- a. | Nova. | | | Ve- ter- es. | Nova. | |
| I-IV..... | 1824-1830 | 1893 | 1702 | 191 | 11% | 20086 | 17347 | 2739 | 16% |
| V-VII.... | 1836-1839 | 1108 | 888 | 220 | 25 | 11030 | 7765 | 3265 | 42 |
| VIII-X ... | 1844-1846 | 905 | 775 | 130 | 17 | 8495 | 6859 | 1636 | 24 |
| XI-XIII .. | 1847-1852 | 537 | 472 | 65 | 14 | 8308 | 6525 | 1783 | 27 |
| XIV-XVII.. | 1856-1873 | 691 | 640 | 51 | 8 | 11056 | 8689 | 2367 | 27 |
| | 1824-1873 | 5134 | 4477 | 657 | 15 | 58975 | 47185 | 11790 | 25 |

(1) Nova dico non ea sub novis nominibus, sed quæ prima vice, descriptione vel phrasí, tanquam genus aut species constituta fuerunt. Interdum auctor, nunciandi causa, novitates suas, paulo ante Prodromi volumen, in diariis aut seorsim, edidit. Hasce tanquam in Prodromo divulgatas accepi, quia ex eodem marte originem ducunt.

16 PRODROMI HISTORIA, CONCLUSIO..

Volumen I, a pagina 1^a ad 236^{am}, pauca nova includit, quum pleraque antea in *Systemate naturali* divulgata fuissent. In hoc opere 32 genera nova et 425 species novas video. Novitatis Prodromi adjuncta, proportiones novorum generum, in vol. I-IV, erga vetustiora, 13 %, et novarum specierum 18 % efficiunt.

Passus botanicæ systematicæ ex hisce numeris metiendi sunt.

Initio sæculi præsentis latebant in herbariis nonnulla nova genera et species, quæ indefessus auctor *Systematis* et priorum voluminum *Prodromi*, Parisios et Londonum visitans, detexit et ad lucem prodiit. Deinde, circa annos 1828-30, celeberrimi viatores e plagis remotis thesauros botanicos afferentes, inundationem, ut dicam, novarum formarum effecerunt. Fortunato casu tamen, ill. a Martius, Burchell, Wallich, Bertero, Bojer aliisque, scientiæ devotissimi, manus aperuerunt et Prodromum divitiis suis auxeront, unde, ut ex collectionibus aliorum pretio paratis, stupenda novitatem proportioni voluminum III-VII, præsertim in Melastomaceis, Myrtaceis, Rubiaceis et Compositis. Postea, descriptionibus ubicunque divulgatis, Prodromus regiones magis exploratas regni vegetabilis adiit. Nova genera, ex tabula nostra, gradatim minuuntur. Inde fere omnia quæ in natura extant, fine sæculi xixⁱ cognita erunt, ut hodie omnes ordines. Novarum tamen specierum flumen eodem modo ac prius fluit. Nondum decrescit, quia cuiusve speciei area geographicæ multo minor est area generum et exploratio terrarum adhuc minime perfecta.

De omnibus hisce et aliis aliquid, lingua vernacula, verisimiliter scripturus ad conclusionem festino.

Liceat tantum, laborem totius fere vitæ actuosæ relinquens et opus absolutum uno intuitu spectans, pauca verba, non sine affectu, addere.

Utilitas Prodromi maxima fuit, sensu omnium, sed humeris unius et præsertim meipsius pondus erat nimis grave. Sine auxilio prorsus defecisset. Jamdudum sensi, et ideo, hac ultima hora, omnibus fautoribus in opere semiseculari fidelibus, amicis valentissimis atque filio carissimo qui mecum onus tulerunt, et tandem sacræ Patris memorie menti meæ semper præsenti et vires impatiens, ex imo corde et humilime gratias ago.

Genevæ, M DCCC LXXIII.

ALPH. DE CANDOLLE.

ALCIDE D'ORBIGNY

PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE

•••

DESCRIPTION DES FOSSILES DE LA FRANCE

CONTINUÉE PAR UNE RÉUNION DE PALÉONTOLOGISTES

SOUS LA DIRECTION D'UN COMITÉ SPÉCIAL

MEMBRES : M. DESHAYES, président;

MM. HÉBERT, ALPH. MILNE-EDWARDS, G. COTTEAU, DESLONGCHAMPS, DE FROMENTEL,
TH. EBRAY, E. PIETTE, FISCHER, G. DE SAPORTA, DANGLURE, secrétaire

VOLUMES TERMINÉS

1^e SÉRIE. — ANIMAUX FOSSILES

TERRAIN CRÉTACÉ :

| | |
|---|---------|
| Céphalopodes, par ALC. D'ORBIGNY. 1 v. de texte, avec atlas de 150 pl. | 48 fr. |
| Gastéropodes, par ALC. D'ORBIGNY. 1 vol. de texte, avec atlas de 91 pl. | 30 fr. |
| Lamellibranches, par ALC. D'ORBIGNY. 1 v. de texte, avec atlas de 267 pl. | 80 fr. |
| Brachiopodes, par ALC. D'ORBIGNY. 1 vol. de texte, avec atlas de 111 pl. | 35 fr. |
| Bryozoaires, par ALC. D'ORBIGNY. 1 vol. de texte, avec atlas de 202 pl. | 65 fr. |
| Echinides irréguliers, par ALC. D'ORBIGNY. 1 vol. de texte, avec atlas de 207 pl. | 67 fr. |
| Echinides irréguliers, par M. COTTEAU. 1 v. de texte, av. atl. de 200 pl. | 102 fr. |

ENSEMBLE : 7 volumes de texte et 7 atlas comprenant 1,225 planches. 427 fr.

TERRAIN JURASSIQUE :

| | |
|--|---------|
| Céphalopodes, p. r. ALC. D'ORBIGNY. 1 vol. de texte, avec atlas de 254 pl. | 75 fr. |
| Gastéropodes, par ALC. D'ORBIGNY. 1 vol. de texte, avec atlas de 198 pl. | 65 fr. |
| ENSEMBLE : 2 volumes de texte et 2 atlas de 432 planches | 140 fr. |

2^e SÉRIE. — VÉGÉTAUX FOSSILES

TERRAIN JURASSIQUE :

| | |
|--|--------|
| Algues, Equisétacées, Characées, Fougeres, par le comte G. DE SAPORTA. 1 vol. d. : texte, avec atlas de 72 pl., tirées à 2 teintes.. . | 60 fr. |
|--|--------|

VOLUMES EN COURS DE PUBLICATION

1^e SÉRIE. — ANIMAUX FOSSILES

Paraissant par livraisons de 12 planches, avec le texte correspondant

TERRAIN CRÉTACÉ :

Zoophytes, par M. DE FROMENTEL. 9 livraisons parues.

TERRAIN JURASSIQUE :

Brachiopodes, par M. DESLONGCHAMPS. 6 livraisons parues.

Gastéropodes, par M. PIETTE. 4 livraisons parues.

Zoophytes, par MM. DE FROMENTEL et FERRY. 5 livraisons parues.

Echinodermes, par M. COTTEAU. 8 livraisons parues.

2^e SÉRIE. — VÉGÉTAUX FOSSILES

Paraissant par livraisons de 8 planches tirées à 2 teintes, avec le texte correspondant

Cycadées, par M. le comte G. de SAPORTA. 2 livraisons parues.

Le prix de chaque livraison (1^e et 2^e série) est de 6 fr.

Il paraît de 4 à 10 livraisons chaque année

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.



Digitized by Google

