



Digitized by the Internet Archive
in 2013

<http://archive.org/details/indexkewensispla22hook>

INDEX KEWENSIS

INDEX KEWENSIS

AN ENUMERATION OF THE GENERA AND SPECIES OF FLOWERING PLANTS

FROM THE TIME OF LINNAEUS TO THE YEAR 1885 INCLUSIVE
TOGETHER WITH THEIR AUTHORS' NAMES, THE WORKS IN
WHICH THEY WERE FIRST PUBLISHED, THEIR NATIVE COUNTRIES
AND THEIR SYNONYMS

COMPILED AT THE EXPENSE OF
THE LATE CHARLES ROBERT DARWIN
UNDER THE DIRECTION OF JOSEPH D. HOOKER

BY
B. DAYDON JACKSON

PART IV

OXFORD
AT THE CLARENDON PRESS

M DCCC XCV

INDEX KEWENSIS
PLANTARUM PHANEROGAMARUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

A LINNAEO USQUE AD ANNUM MDCCCLXXXV

COMPLECTENS

NOMINE RECEPTO AUCTORE PATRIA

UNICUIQUE PLANTAE SUBJECTIS

SUMPTIBUS BEATI CAROLI ROBERTI DARWIN

DUCTU ET CONSILIO JOSEPHI D. HOOKER

CONFECIT B. DAYDON JACKSON

FASCICULUS IV

OXONII

E PRELO CLARENDONIANO

M DCCC XCV

London

HENRY FROWDE

OXFORD UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE
AMEN CORNER, E.C.



New York

MACMILLAN & CO., 66 FIFTH AVENUE

PTEROTUM, Lour. Fl. Cochinch. 292 (1790). *INC. SEDIS*.
procumbens, Lour. l. c. 293.—Cochinch.

PTERYGIUM, Endl. Gen. 1013 (1841) = **PTERIGIUM**,
Correa = **Dipterocarpus**, Gaertn.

PTERYGOCALYX, Maxim. Prim. Fl. Amur. 198, t. 9
(1858) = **Crawfordia**, Wall. (Gentian.).
volubilis, Maxim. l. c.—Reg. Amur.

PTERYGOCARPUS, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 78
= **Dregea**, E. Mey. (Asclep.).
abyssinicus, Hochst. l. c. (= *Hoya africana*).—Afr.
trop.

PTERYGODIUM, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.
xxi. (1800) 217. t. 3. *ORCHIDEAE*, Benth. &
Hook. f. iii. 632.

OMMATODIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 365 (1838).
acutifolium, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 366.—Afr.
austr.

alatum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800)
218.—Afr. austr.

atratum, Sw. l. c. = *Ceratandra chloroleuca*.

caffrum, Sw. l. c.—Afr. austr.

carosum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 367.—Afr. austr.
catholicum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi.
(1800) 218.—Afr. austr.

cruciferum, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 109.—
Afr. austr.

inversum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800)
218.—Afr. austr.

magnum, Reichb. f. in Flora, l. (1867) 117.—Afr.
austr.

platypetalum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 366.—Afr.
austr.

rubiginosum, Sond. ex Drège, in Linnaea, xx. (1847)
220, nomen; *Bolus*, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884)
486.—Afr. austr.

sulcata, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 452 =
Zeuxine sulcata.

venosum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 367.—Afr. austr.
Volueris, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800)
218.—Afr. austr.

PTERYGOLEPIS, Reichb. Nom. 236 (1841) = **PTERO-**
LEPIS, Schrad. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

PTERYGOLOMA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 211
= **Alloplectus**, Mart. (Gesner.).
cristatum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 464.—Ind. occ.
pubescens, Griseb. l. c.—Ind. occ.
repens, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 211 = *A. repens*.

PTERYGOPAPPUS, Hook. f. in Hook. Lond.
Journ. Bot. vi. (1847) 120. *COMPOSITAE*, Benth.
& Hook. f. ii. 303.

Maja, Wedd. Chlor. And. i. 228, t. 27 D (1855).
Lawrencii, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi.
(1847) 120.—Tasman.

PTERYGOSTACHYUM, Nees, ex Steud. Syn. Pl.
Gram. 413 (1855) = **Dimeria**, R. Br. (Gramin.).
Lehmanni, Nees, l. c.—Zeylan.

PTERYGOTA, Schott & Endl. Melet. 32 (1832) =
Stereulia, Linn.

alata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 234 = *S. alata*.

alata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 29 = *S. Thwaitesii*.

brasiliensis, F. Allem. in Trab. Comm. Sc. Expl. Bot.
i. (1862) 7.—Bras.

Roxburghii, Schott & Endl. Melet. 32 = *S. alata*.

PTERYPODIUM, Reichb. f. in Flora, l. (1867) 117,
sphalm. = **Pterygodium**, Sw. (Orchid.).

PTERYXIA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 624
(1840) = **Cymopterus**, Rafin. (Umbell.).
albiflora, Nutt. l. c. 625 = *C. terebinthinus*.
foeniculacea, Nutt. l. c. 624 = *C. terebinthinus*.
terebinthacea, Nutt. l. c. = *C. terebinthinus*.
thapsoides, Nutt. l. c. 625 = *C. terebinthinus*.

PTICHOCHILUS, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii.
(1881) 341 = **PTYCHOCILUS**, Schau. = **Tro-**
pidia, Lindl. (Orchid.).

VOL. II.

PTILAGROSTIS, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 447
(1853) = **Stipa**, Linn. (Gramin.).
mongolica, Griseb. l. c. = *S. mongolica*.

PTILANTHELIUM, Steud. Syn. Pl. Cyp. 166 (1855) =
Mesomelaena, Nees (Cyperac.).
Chauvinii, Steud. l. c. 167 = *M. deusta*.

PTILEPIDA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 =
Cephalophora, Cav. (Compos.).

PTILERIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 =
Erechtites, Rafin. (Compos.).
hieracifolius, Rafin. l. c. = *E. praealta*.

PTILIMNIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819)
192 = **Discopleura**, DC. (Umbell.).
capillaceum, Rafin. l. c. = *D. capillacea*.
costatum, Rafin. Neogenyt. 2 = *D. capillacea*.
junceum, Rafin. l. c. = *D. Nuttallii*.

PTILINA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 479
(1840) = **Didiplis**, Rafin. (Lythrar.).
aquatica, Nutt. ex Torr. & Gray, l. c. 480 = *D.*
linearis.

PTILIUM, Pers. Syn. i. 359, in syn. (1805) = **PETILIUM**,
Linn. = **Fritillaria**, Tourn. (Liliac.).

PTILOCALYX, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii.
170 (1855) = **Coldenia**, Linn. (Borag.).
Greggii, Torr. & Gray, l. c. = *C. Greggii*.

PTILOCHAETA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 147. t. 8
(1842) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).
diodon, Nees, l. c. 148 = *R. lunata*.

PTILOCHAETA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.
xvi. (1843) 52. *MALPIGHIACEAE*, Benth. &
Hook. f. i. 258.
bahiensis, Turcz. l. c.—Bras.
nudipes, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 66.—
Reg. Argent.

PTILOCNEMA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 33 (1825) =
Pholidota, Lindl. (Orchid.).
bracteata, D. Don, l. c. = *Pholidota imbricata*.

PTILOMERIS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.
(1841) 381 = **Baeria**, Fisch. & Mey. (Compos.).
affinis, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847)
174 = *B. affinis*.

anthemoides, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.
(1841) 382 = *B. anthemoides*.
aristata, Nutt. l. c. = *B. coronaria*.
coronaria, Nutt. l. c. = *B. coronaria*.
mutica, Nutt. l. c. = *B. mutica*.
tenella, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847)
173 = *B. tenella*.

PTILONEILEMA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229,
nomen; Syn. Pl. Gram. 201 (1855) = **Melano-**
cenchris, Nees (Gramin.).
plumosum, Steud. ll. cc. = *M. plumosa*.

PTILONELLA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.
vii. (1841) 385 = **Blepharipappus**, Hook. (Com-
pos.).
scabra, Nutt. l. c. 386 = *B. scaber*.

PTILOPHORA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv.
(1849) (Pl. Fendl.) 112 = **Microseris**, D. Don
(Compos.).
major, A. Gray, l. c. 113 = *M. major*.
nutans, A. Gray, l. c. = *M. nutans*.

PTILORIA, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832) = **Stephano-**
meria, Nutt. (1841) (Compos.).
pauciflora, Rafin. l. c. = *S. runcinata*.
tenuifolia, Rafin. l. c. = *S. minor*.

PTILOSCIADIUM, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 (1855) =
Rynchospora, Vahl (Cyperac.).
Lindenii, Steud. l. c. 150 = *R. hirta*.

PTILOSIA, Tausch, in Flora, xi. (1828) i. Erg. 78, in
nota = **Pieris**, Linn. (Compos.).
apargioides, Tausch, l. c. = *P. sulphurea*.

PTILOSTEMON, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816)
200 = **Cnicus**, Linn. (Compos.).
appendiculatum, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 59 =
C. fruticosus.
muticum, Cass. l. c. = *C. Chamaepece*.

PTILOSTEMUM, Stend. Nom. ed. II. ii. 415 (1841) =
praec.

PTILOSTEPHIUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv.
253. tt. 387, 388 (1820) = **Tridax**, Linn. (Compos.).
balbisioides, Spreng. Syst. iii. 570 = *T. balbisioides*.
coronopifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 255.
t. 387 = *T. coronopifolia*.
trifidum, H. B. & K. l. c. 255. t. 388 = *T. trifida*.

PTILOTTRICHUM, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 64
(1831) = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).
Candolleianum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii.
13 = *A. macrocarpum*.

canescens, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 66 =
A. canescens.

cappadocicum, Boiss. Fl. Orient. i. 288.—As. Min.

cretaceum, Ledeb. Fl. Ross. i. 143 = *A. cretaceum*.

cyclocarpum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii.
(1842) 159 (= *Koniga scardica*).—Macedon.; As.
Min.

elongatum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 66 =
A. canescens.

emarginatum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii.
(1842) 160 (= *Koniga emarginata*).—Graecia.

glabrescens, Boiss. Fl. Orient. i. 289.—Cappadoc.

longicaule, Boiss. Elench. 13 = *A. longicaule*.

Peyroussianum, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl.
Hisp. iii. 825 = *A. Lapeyroussianum*.

purpureum, Boiss. Elench. 12 = *A. Lagascae*.

pyrenaicum, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.
iii. 835 = *A. pyrenaicum*.

rupestre, Boiss. Fl. Orient. i. 288, in obs. = *A.*
rupestre.

saxigenum, Jord. & Fonrr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 13 =
A. macrocarpum.

spinosum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 46 = *A.*
spinosum.

strigulosum, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 683 =
A. maritimum.

tenuifolium, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 67, in
obs. = *A. tenuifolium*.

tortuosum, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 234 =
A. Lapeyroussianum.

PTILOTUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 313 (1867) =
Dryas, Linn. (Rosac.).
octopetalum, Dulac, l. c. = *D. octopetala*.

PTILOTUS, R. Br. Prod. 415 (1810). *AMARANTA-*
CEAE, Benth. & Hook. f. iii. 32.

aeroides, F. Muell. Fragm. vi. 231 = *Trichinium*
aeroides.

alopecuroideus, F. Muell. l. c. 227 = *Trichinium alope-*
curoidenm.

amabilis, Span. in Linnaea, xv. (1841) 345 = *corym-*
bosus?

arthrolasius, F. Muell. Fragm. vi. 232 = *Trichinium*
arthrolasium.

astrolasius, F. Muell. l. c. 233 = *Trichinium astro-*
lasium.

auriculifolius, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium*
auriculae-folium.

axillaris, F. Muell. l. c. = *Trichinium axillare*.

Beckeri, F. Muell. Fragm. vi. 233 = *Trichinium*
Beckerianum.

brachyanthus, F. Mnell. Census, 29 = *Trichinium*
brachyanthum.

caespitosus, F. Muell. Fragm. vi. 232 = *Trichinium*
caespitosum.

calostachyus, F. Muell. l. c. 231 = *Trichinium calo-*
stachyum.

conicus, R. Br. Prod. 415.—Austral.

corymbosus, R. Br. l. c.—Austral.

declinatus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 631 =
Trichinium declinatum.

dissitiflorus, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium dissiti-*
florum.

distans, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium*
distans.

divaricatus, F. Muell. Fragm. vi. 229 = *Trichinium*
divaricatum.

PTILOLOTUS :—

- Drummondii*, F. Muell. Fragm. vi. 229 = *Trichinium Drummondii*.
erubescens, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 575 = *Trichinium erubescens*.
esquamatus, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium esquamatum*.
exaltatus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 630 = *Trichinium exaltatum*.
floribundus, F. Muell. Fragm. vi. 233 = *Trichinium sericostachyum*.
Forrestii, F. Muell. Pl. N. W. Austral. v. (1870) 240. —Austral.
Fraseri, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium Fraseri*.
fusiformis, Poir. Encyc. Suppl. iv. 619 = *Trichinium fusiforme*.
gomphrenoides, F. Muell. Fragm. vi. 233, nomen; et ex Benth. Fl. Austral. v. 244. —Austral.
gracilis, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium gracile*.
grandiflorus, F. Muell. Fragm. i. 237. —Austral.
helichrysoides, F. Muell. l. c. vi. 231 = *Trichinium helichrysoides*.
helipteroideis, F. Muell. l. c. = *Trichinium helipteroideis*.
hemisteirus, F. Muell. l. c. iv. 90 = *Trichinium corymbosum*.
holosericeus, F. Muell. l. c. vi. 229 = *Trichinium holosericeum*.
Hoodii, F. Muell. l. c. viii. 232. —Austral.
humilis, F. Muell. l. c. vi. 229. —Austral.
incanus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium incanum*.
lanatus, A. Cunn. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 281 = *Trichinium Cunninghamii*.
latifolius, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 88. —Austral.
laxus, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium laxum*.
lepidus, F. Muell. Fragm. iv. 89 = *grandiflorus*.
leucocomum, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium leucocomum*.
Lindleyi, F. Muell. Fragm. vi. 233 = *Trichinium obovatum*.
macrocephalus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium macrocephalum*.
macrotrichus, F. Muell. Fragm. iv. 90. —Austral.
Manglesi, F. Muell. l. c. vi. 230 = *Trichinium Manglesi*.
Murrayi, F. Muell. l. c. iii. 145. —Austral.
nobilis, F. Muell. l. c. vi. 227 = *Trichinium nobile*, exaltatum, semilatum.
obovatus, F. Muell. l. c. 228 = *Trichinium obovatum*.
ovatus, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 281 = *Psilotrichum calceolatum*.
pachycephalus, F. Muell. Fragm. vi. 228 = *Trichinium macrocephalum*.
parviflorus, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium parviflorum*.
parvifolius, F. Muell. Fragm. vi. 229 = *Trichinium parvifolium*.
Polakii, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, ii. (1882) 274. —Austral.
polystachyus, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium polystachyum*, Stirlingii, roseum, laxum.
psilotrichoides, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium corymbosum*.
pyramidatus, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium pyramidatum*.
Roei, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium Roei*.
roseus, F. Muell. l. c. 28 = *Trichinium roseum*.
rotundifolius, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium rotundifolium*.
sandwicensis, A. Gray, ex H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 200. —Ins. Sandvic.
sericostachyus, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium sericostachyum*.
Sewelliae, F. Muell. 'in Vict. Naturalist (Jan. 1885)' (nobis latet). —Austral.
spathulatus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium spathulatum*.
spicatus, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. v. 243. —Austral.
Stirlingii, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium Stirlingii*.
striatus, F. Muell. l. c. = *Trichinium striatum*.
trichotoma, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 1037 = *Psilotrichum trichotomum*.
villosiflorus, F. Muell. Fragm. iii. 125. —Austral.

PTILURUS, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 218 = **Leuceria**, Lag. (Compos.).
daucifolius, D. Don, l. c. 219. —Peruv.

PTOSIMOPAPPUS, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 739 (1845) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
arboreus, Walp. Ann. ii. 930 = *C. arborea*.
argutus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 60 = *C. arguta*.
bracteatus, Boiss. l. c. Ser. I. x. 104 = *C. bracteata*.
canariensis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 740 = *C. canariensis*.
intybaceus, Boiss. l. c. = *C. intybacea*.
sempervirens, Boiss. l. c. = *C. sempervirens*.
uliginosus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 60 = *C. uliginosa*.
Webbianus, Boiss. l. c. 61 = *C. Webbiana*.

PTYAS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 76 (1866) = **Aloë**, Tourn. (Liliac.).
disticha, Salisb. l. c. = *A. disticha*.

PTYCANTHERA, Decne. in DC. Prod. viii. 606 (1844). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 768.
Berterii, Decne. l. c. —Ins. S. Doming.

PTYCHANDRA, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 140. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 893.
glauca, Scheff. l. c. 160. —Ins. Batjan.
Musschenbroekiana, Becc. Malesia, i. (1877) 100, in obs. —Ins. Ternate.

PTYCHOCARPA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 402 (1841) = **Grevillea**, R. Br. (Proteac.).

PTYCHOCARVA, R. Br. in Wall. Cat. n. 3538 (1830) = **Scirpodendron**, Zipp. (Cyperac.).
macrocarpa, R. Br. ex Stend. Nom. ed. II. ii. 416 = *S. costatum*.

PTYCHOCENTRUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 113 = **Rhynchosia**, Lour. (Legumin.).

PTYCHOCHILUS, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) (Pl. Meyen.) 431. t. 12. B = **Tropidia**, Lindl. (Orchid.).
septemnervis, Schan. l. c. = *T. cnrculigoides*.

PTYCHOCOCCUS, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 90. **PALMAE**.
arecinus, Becc. l. c. 99. —N. Guin.
paradoxus, Becc. l. c. 96. —N. Guin.

PTYCHODEA, Willd. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 168 = **Sipanea**, Aubl. (Rubiace.).
pedunculata, Willd. ex Cham. & Schlecht. l. c. = *S. dichotoma*.
sessiliflora, Willd. ex Cham. & Schlecht. l. c. = *S. glomerata*.

PTYCHODON, Klotzsch, ex Reichb. Nom. 172 (1841) = **Lafoensia**, Vand. (Lythrac.).
nummularifolius, Klotzsch, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 347 = *L. nummularifolia*.

PTYCHOLEPIS, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58 (1857) = **Blepharodon**, Decne. (Asclep.).
ditassoides, Griseb. l. c. —Peruv.

PTYCHOMERIA, Benth. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 14 = **Gymnosiphon**, Blume (Burm.).
capitata, Benth. l. c. 15. —Bras.
cornuta, Benth. l. c. 16 = *G. cornutum*.
cymosa, Benth. l. c. 15 = *G. cymosum*.
divaricata, Benth. l. c. 16 = *G. divaricatum*.
fimbriata, Benth. l. c. 14. —Bras.
mutica, Benth. l. c. 16. —Bras.
nivea, Griseb. Cat. Pl. Cub. 257. —Cuba.
tenella, Benth. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 17. —Bras.

PTYCHOPETALUM, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 376. **OLACINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 346.

ATHESIANDRA, Miers, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 346 (1862).
anceps, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 347. —Afr. trop.
olacoides, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 377. —Guian.
petiolatum, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 347. —Afr. trop.

PTYCHOPYXIS, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 402 (1860). **INC. SEDIS**. —Cf. Benth. & Hook. f. Gen. i. 217.
costata, Miq. l. c. —Sumatra.

PTYCHORAPHIS, Becc. in Ann. Jard. Bot. Buitenz. ii. (1885) 90. **PALMAE**.
augusta, Becc. l. c. —Ins. Nicobar.
philippinensis, Becc. l. c. —Ins. Philipp.
singaporensis, Becc. l. c. —Malaya.

PTYCHOSEMA, Benth. in Lindl. Swan River App. 16 (1839). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 496.
anomalum, F. Muell. Fragm. ix. 62. —Anstral.
pusillum, Benth. in Lindl. Swan River App. 16. —Austral.
trifoliolatum, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, ii. (1882) 72. —Anstral.

PTYCHOSPERMA, Labill. in Mém. Inst. Par. ix. 1808 (1809), 252. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 891.

NORMANBYA, F. Muell. Fragm. xi. 57, in obs. (1878); Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 91.
PSYCHOSPERMA, Dum. Anal. Fam. 56 (1829).

SEAFORTHIA, R. Br. Prod. 267 (1810).
alba, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 26 = *Dictyosperma album*.

Alexandrae, F. Muell. Fragm. v. 47 = *Archontophoenix Alexandrae*.

angustifolia, Blume, Rumphia, ii. 122 = *Coleospadix oninensis*.

appendiculata, Blume, l. c. = *Drymophloeus appendiculatus*.

arecina, Becc. Malesia, i. (1877) 58 = *Ptychococcus arecinus*.

arfakiana, Becc. l. c. 57 = *Rhopaloblaste hexandra*.
Beatriceae, F. Muell. in Melb. Chemist (Feb. 1882). —Austral.

caesia, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 20 = *Pinanga caesia*.
calapparia, Miq. l. c. = *Actinorhytis calapparia*.
Capitis-Yorkii, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 217. —Austral.

caudata, Becc. Malesia, i. (1877) 55 = *Pinanga caudata* (in Addend.).

coccinea, Hort. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 69 = *Cyrtostachys Renda*.

cochinchinensis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 23 = *Pinanga cochinchinensis*.

communis, Miq. l. c. 31 = *Coleospadix oninensis*.

coronata, Miq. l. c. 24 = *Pinanga coronata*.

costata, Miq. l. c. 25 = *Pinanga Kuhlil*.

Cunninghamiana, H. Wendl. in Bot. Zeit. xvi. (1858) 346 = *Archontophoenix Cunninghamii*.

Dicksoni, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 23 = *Pinanga Dicksonii*.

disticha, Miq. l. c. 28 = *Pinanga disticha*.

Drudei, H. Wendl. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 892. —Austral.

elegans, Blume, Rumphia, ii. 118. —Austral.

elegans, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1870) 419 = *Archontophoenix Cunninghamii*.

filifera, H. Wendl. in Bonplandia, x. (1862) 195 = *Vitiphoenix filifera*.

furfuracea, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 26 = *Pinanga furfuracea*.

gracilis, Labill. in Mém. Inst. Par. ix. 1808 (1809), 253. —Nov. Hibernia.

inaequalis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 27 = *Pinanga inaequalis*.

Junghuhnii, Miq. l. c. 28 = *Pinanga Junghuhnii*.

Kuhlil, Miq. l. c. 21 = *Pinanga Kuhlil*.

Laccospadix, Benth. Fl. Austral. vii. 140 = *Calyptracalyx australasicus*.

lacerata, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1868) 1317. —Am. centr.

latisecta, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 20 = *Pinanga latisecta*.

litigiosa, Becc. Malesia, i. (1877) 50 = *Coleospadix litigiosa*.

Macarthurii, H. Wendl. ex Kew Report, 1882 (1884), 55. —Austral.

maculata, Seem. in Gard. Chron. (1870) 697 = *Pinanga maculata*.

malaiana, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 25 = *Pinanga malaiana*.

micrantha, Becc. Malesia, i. (1877) 52 = *Rhopaloblaste micrantha*.

minor, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 23 = *Pinanga minor*.

Musschenbroekiana, Becc. Malesia, i. (1877) 53 = *Ptychandra Musschenbroekiana*.

PTYCHOSPERMA:—

- Nenga*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 69 = *Nenga Wendlandiana*.
nobilis, *Seem. in Gard. Chron.* (1870) 697.—Hab. ?
Normanbyi, F. Muell. Fragm. xi. 56 = *Areca Normanbyi*.
noxa, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 23 = *Pinanga noxa*.
paniculata, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 3 = *Mischophloeus paniculatus*.
paradoxa, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 83 = *Ptychococcus paradoxus*.
patula, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 26 = *Pinanga patula*.
pauciflora, H. Wendl. in *Bonplandia*, x. (1862) 193.—Ins. Fiji.
perbrevis, H. Wendl. l. c. 193 = *Balaka perbrevis*.
Pikeringii, H. Wendl. l. c. 194.—Ins. Fiji.
polystachya, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 590 = *Areca triandra*.
punicea, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 31 = *Pinanga ternatensis*.
Rumphii, Blume, Rumphia, ii. 119 = *Drymophloeus olivaeformis*.
rupicola, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 328 = *Loxococcus rupicola*.
salicifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 28 = *Pinanga salicifolia*.
saxatilis, Blume, Rumphia, ii. 121 = *Drymophloeus saxatilis*.
Seafortii, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 21 = *elegans*, *Archontophoenix Cunninghamii*.
Seemannii, H. Wendl. in *Bonplandia*, ix. (1861) 261; x. (1862) 192 = *Balaka Seemannii*.
simplicifrons, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 590 = *Pinanga disticha*.
singaporensis, Becc. Malesia, i. (1877) 61 = *Ptychographis singaporensis*.
sylvestris, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 22 = *Pinanga javana*.
tahitensis, H. Wendl. in *Bonplandia*, x. (1862) 196.—Ins. Tahiti.
tenella, H. Wendl. in *Bot. Zeit.* xvii. (1859) 63.—Borneo.
Veitchii, H. Wendl. in *Linnaea*, xxxix. (1875) 213 = *Archontophoenix Veitchii*.
vestiaria, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 31 = *Areca vestiaria*.
vitiensis, H. Wendl. in *Bonplandia*, ix. (1861) 260; x. (1862) 195.—Ins. Fiji.
- PTYCHOSTIGMA, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) 23 = *Galiniera*, Delile (Rubiaceae).
saxifragum, Hochst. l. c. = *G. coffeoides*.
- PTYCHOTIS, Koch, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 124 = *Carum*, Rupp. (Umbell.).
achilleifolia, DC. Prod. iv. 109 = *Pimpinella achilleifolia*.
Ajowan, DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. iv. (1828) 497 = *C. copticum*.
amoides, Koch, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 125 = *C. ammoides*.
anethifolia, DC. Prod. iv. 108 = *C. anethifolium*.
arabica, T. Anders. in *Jonm. Linn. Soc. v. Suppl. i.* (1860) 21.—Aden.
aspera, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 139 = *C. ammoides*.
atlantica, Coss. & Dur. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 296.—Alger.
barbata, DC. Prod. iv. 109 = *Pimpinella barbata*.
Bunius, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 474 = *C. Bunius*.
carvifolia, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 537 = *C. carvifolium*.
coptica, DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. iv. (1828) 496 = *C. copticum*.
dichotoma, Coss. ex Ball, in *Jonm. Linn. Soc.* xvi. (1878) 469 = *C. dichotomum*.
didyma, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 538 = *C. didymum*.
foeniculifolia, Stend. *Nom. ed. II.* ii. 572, in syn. = *C. copticum*.
heterophylla, Koch, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 125 = *C. Bunius*.
hispidula, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 537 = *C. hispidum*.
involuta, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 229 = *C. Roxburghiana*.
Meisneri, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 536 = *Apium hamile*.
puberula, DC. Prod. iv. 109 = *Pimpinella puberula*.
rigens, *Harv. Gen. S. Afr. Pl.* 134 (= *Bunium rigens*).—Afr. austr.
Roxburghiana, DC. Prod. iv. 109 = *C. Roxburghiana*.

PTYCHOTIS:—

- sylvestris*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 228, 229 = *Carum sylvestre*.
tenuis, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 537. Afr. austr.
Thorei, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 735 = *C. inundatum*.
Timbali, Jord. Cat. Gr. Réc. Grenoble (1850), 15.—Gallia.
trachysperma, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 731 = *ammoides*.
Vargasiana, DC. Prod. iv. 109.—Venezuela.
verticillata, Duby, *Bot. Gall. ed. II.* i. 235 = *C. ammoides*.
- PTYSSIGLOTTIS, T. Anders. in *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 235 (1860). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1117.
radicosa, T. Anders. l. c.—Zeylan.
- PTYXOSTOMA, Vahl, in *Danske Nat. Selsk. Skriv. vi.* (1810) 95 = *Lonchostoma*, Wikstr. (1818) (Bruniac.).
monogyna, Vahl, l. c.—Afr. austr.
myrtoides, Vahl, l. c. 97 = *L. acutiflorum*.
- PUBETA, Linn. *Diss. Pl. Snrin.* 16 (1775); *Amoen. Acad.* viii. 264 (1785) = *Duroia*, Linn. f. (Rubiaceae).
- PUBILARIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27 (1836) = *Sime-this*, Kunth (1843) (Liliac.).
bicolor, Rafin. l. c. = *S. bicolor*.
- PUCCINELLIA, Parl. Fl. Ital. i. 366 (1848) = *Glyceria*, R. Br. (Gramin.).
convoluta, Fonrr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 184 = *G. distans*.
distans, Parl. Fl. Ital. i. 367 = *G. distans*.
festucaeformis, Parl. l. c. 368 = *G. distans*.
Gussonii, Parl. l. c. 369 = *G. distans*.
maritima, Parl. l. c. 370 = *G. maritima*.
permixta, Parl. l. c. = *G. Borrieri*.
- PUCEDANUM, Hill, *Hort. Kew.* 94 (1768), err. typ. = *Peucedanum*, Tourn. (Umbell.).
- PUERARIA, DC. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 97. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 537.
NEUSTANTHUS, Benth. in *Miq. Pl. Jungh.* i. 234 (1852).
anabaptis, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) ii. 253 = *Shuteria hirsuta*.
brachycarpa, Kurz, l. c. xlii. (1873) ii. 232.—Burma.
Candollii, Wall. *Cat. n.* 5355.—Ind. or.
composita, R. Grah. in *Wall. l. c.* 5570 = *Wallichii*.
ferruginea, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 232 = *Shuteria ferruginea*.
hirsuta, Kurz, l. c. 254.—Pegu.
javanica, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 125 = *phaseoloides*.
peduncularis, R. Grah. in *Wall. Cat. n.* 5354.—Reg. Himal.
phaseoloides, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 125.—Ind. or.; Malaya; China.
Stracheyi, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 198.—Ind. or.
stricta, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 254.—Burma.
subspicata, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 125 = *phaseoloides*.
Thomsoni, Benth. l. c. 122.—Reg. Himal.
Thunbergiana, Benth. l. c.—China; Japon.
tuberosa, DC. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 97.—Reg. Himal.
Wallichii, DC. l. c.—Reg. Himal.
- PUGIONELLA, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 128 (1866) = *Strumaria*, Jacq. (Amaryll.).
angustifolia, Salisb. l. c. = *S. angustifolia*.
- PUGIONUM, Gaertn. *Fruct.* ii. 291, t. 142 (1791).
CRUCIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 96.
cornutum, Gaertn. l. c.—Oriens.
dolabratum, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvi. (1880) 426.—Mongolia.
- PUGIOPAPPUS, A. Gray, in *Pacif. Rail. Rep.* iv. 104 (1857) = *Leptosyne*, DC. (Compos.).
Bigelovii, A. Gray, l. c. = *L. Bigelovii*.
Breweri, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 660 = *L. Bigelovii*.
calliopsidea, A. Gray, l. c. 660 = *L. calliopsidea*.

PUJA, Molina, *Sagg. Chile*, ed. II. 153 (1810) = *Puya*, Molina (Orchid.).

PUKANTHUS, Rafin. *Sylva Tellur.* 53 (1838) = *Grabowskia*, Schlecht. (Solan.).
odoratus, Rafin. l. c. = *G. boerhaaviaefolia*.

PUKATERIA, Raoul, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 120 = *Griselinia*, Forst. (Cornac.).
littoralis, Raoul, l. c. = *G. lucida*.

PULCHERIA, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Kadsura*, Kaempf. (Magnol.).

PULCHIA, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 416 (1841), sphalm. = *PLUCHIA*, Vell. = *Diclidanthera*, Mart. (Styrac.).

PULEGIIUM, Ray, ex Mill. *Gard. Dict. ed. VI* (1752) = *Mentha*, Tourn. (Labiata.).

aromaticum, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 367 = *M. Pulegium*.

cervinum, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 3 = *Preslia cervina*.

erectum, Mill. l. c. n. 2 = *M. Pulegium*.
heterophyllum, Opiz, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 174 = *M. Pulegium*.

micranthum, Claus, in *Beitr. Pfl. Russ. Reich.* viii. 244 = *M. Pulegium*.

pubescens, Opiz, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 174 = *M. Pulegium*.

tomentella, Presl, *Fl. Sic. p.* xxxvi = *M. Pulegium*.
vulgare, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 1 = *M. Pulegium*.

PULICARIA, Gaertn. *Fruct.* ii. 461, t. 173 (1719).

COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 335.

DUCHESNIA, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1817) 153.
FRANCOEURIA, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xxxviii. 374 (1825).

FRANKOERIA, Steud. *Nom. ed. II.* i. 646 (1840).
KILIANA, Sch. Bip. ex Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 26, nomen.

PLATYCHAETA, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xi. 5 (1849).
PLATZCHAETE, Sch. Bip. in *F. Schultz, Arch. Fl.* 131 (1855).

POLOA, DC. in *Guill. Arch. Bot.* ii. (1833) 514.
PTEROCHAETA, Boiss. *Diagn. Ser. I.* vi. 76 (1845).

STRABONIA, DC. *Prod. v.* 481 (1836).
TUBILIUM, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1817) 153.

adenophora, *Franch. in Réveil, Çomali*, 37.—Afr. trop.

angustifolia, DC. *Prod. v.* 479.—Ind. or.
annua, Gaertn. *Fruct.* ii. 462 = *Erigeron annuus*.

arabica, Bourg. ex Nym. *Consp.* 394 = *hispanica*.
arabica, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xlv. 94.—Oriens.

argyrophylla, *Franch. in Réveil, Çomali*, 38.—Afr. trop.

armena, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iii. 204.—Armenia.

aromatica, R. Br. in *Salt, Abyss. App.* p. 65 = *undulata*.

aspera, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 35 = *longifolia*.
Aucherii, *Faub. & Spach, Illustr.* iv. 73, t. 346.—Persia.

bellidiflora, Wallr. *Sched. Crit.* 483 = *Erigeron annuus*.
Boissieri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 300.—Ind. or.

calycina, Presl, *Delic. Prag.* 96 = *Inula montana*.
canariensis, C. Bolle, in *Bonplandia*, vii. (1859) 295.—Ins. Canar.

capensis, DC. *Prod. v.* 479.—Afr. anstr.

chrysopsidoides, Sch. Bip. in *Schweinf. Beitr. Fl.* Aethiop. 153, nomen = *petiolaris*.

Clausonii, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 36 = *vulgaris*.
congesta, C. Koch, in *Linnaea*, xxiii. (1850) 711 = *odora*.

crispa, Sch. Bip. in *Webb & Berth. Phyt. Canar.* ii. 223, in syn.; Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 336.—Afr. bor. et trop.; Arab.; Ind. or.

demissa, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 205.—Afghan.

dentata, DC. *Prod. v.* 480 = *dysenterica*.
dentata, Guss. *Fl. Sic. Syn.* ii. 502 = *vulgaris*.

desertorum, DC. ex Decne. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* ii. (1834) 263.—Arab.

diversifolia, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 840.—Ins. Socotra.

dumetorum, Salzm. ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 501 = *odora*.

dysenterica, Gaertn. *Fruct.* ii. 462.—Europ.

PULICARIA :—

elata, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 6 = dysenterica.
erigeroides, DC. Prod. v. 480 = capensis.
fetida, Rafin. Fl. Tellur. ii. 48.—Hab.?
filaginoides, Pomel. Nouv. Mat. Fl. Atl. 36.—Alger.
foliolosa, DC. Prod. v. 480.—Ind. or.
germanica, J. & C. Presl, Fl. Čech. 178 = vulgaris.
glaucescens, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 79. t. 349.—
 Ind. or.; Persia.
glutinosa, Jaub. & Spach, l. c. 77. t. 348.—Arab.
gnaphalodes, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 76.—Persia;
 Turkestan; Afghan.
gracilis, Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, l. (1885)
 56.—Persia.
gracilis, Nym. Syll. 19.—Lusit.
gracca, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 394 = vulgaris.
grandidentata, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 71. t. 345.—
 Arab.
Grantii, Oliver & Hiern, ex Oliver, in Trans. Linn.
 Soc. xxix. (1873) 96.—Afr. trop.
graveolens, Nym. Syll. 19 = Inula graveolens.
Hildebrandtii, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv.
 (1875) 326.—Afr. trop.
hirta, J. & C. Presl, Fl. Čech. 178 = Inula hirta.
hispanica, Boiss. Fl. Orient. iii. 205, in obs.—Lusit.;
 Hispan.
hydrabadensis, Lindl. ex DC. Prod. v. 480 = Wightiana.
incisa, DC. l. c. 479 = undulata.
indica, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 67. t. 343 = angustifolia.
indica, Rafin. Fl. Tellur. ii. 48 (Quid?).—Hab.?
inuloides, DC. Prod. v. 480.—Afr. bor.
inuloides, Schweinf. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi.
 (1878) 501 = longifolia.
involuta, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65, nomen
 = Ruppellii.
Kotschyi, Sch. Bip. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 202 =
 dysenterica.
Kurtziana, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875)
 327.—Afr. trop.
longifolia, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 16.—Afr. bor.
mauritanica, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875)
 61, nomen.—Maroc.
monocephala, Franch. in Réveil, Çomali, 36.—Afr.
 trop.
odora, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 239.—Europ. austr.
orientalis, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 65. t. 342.—
 Arab.
paludosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 416.—Lusit.
paludosa, Welw. ex Nym. Consp. 394 = hispanica.
palustris, Hoffm. & Link, Fl. Portug. ii. 293.—
 Lusit.
persica, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 75. t. 347 =
 Aucheri.
petiolaris, Jaub. & Spach, l. c. 69. t. 344.—Arab.
planifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 416.—Lusit.
pratensis, Scheele, in Linnaea, xviii. (1844) 460 =
 vulgaris.
prostrata, Aschers. Fl. Brandenb. 304 = vulgaris.
Renschiana, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii.
 (1877) 197.—Afr. trop.
revoluta, Nym. Syll. 19.—Lusit.
rufescens, Nym. l. c.—Lusit.
Ruppellii, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i.
 401.—Afr. trop.
sakhiana, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) i.
 87.—Reg. Himal.
salicina, J. & C. Presl, Fl. Čech. 178 = Inula salicina.
salviaefolia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii.
 (1851) 331.—As. centr.
saxicola, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853)
 174 = angustifolia.
Schimperii, DC. Prod. vii. 285.—Arab.
scicula, Moris, Fl. Sard. ii. 363.—Europ. austr.
stephanocarpa, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi.
 (1882) 840.—Ins. Socotra.
Stevani, Nym. Syll. 19 = dysenterica.
Stockii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 16 = angustifolia.
Stockii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 300.—Ind. or.
trichocephala, DC. Prod. v. 478 = arabica.
uliginosa, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 463 =
 vulgaris.
uliginosa, Hoffm. & Link, Fl. Portug. ii. 294.—
 Lusit.
uliginosa, Stev. ex DC. Prod. v. 478 = dysenterica.
undulata, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 660; DC.
 Prod. v. 479.—Aegypt.; Arab.
undulata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 79 = vulgaris.

PULICARIA :—

vieraoides, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882)
 840.—Ins. Socotra.
villosa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 336 = arabica.
viscida, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxx = Felicia
 abyssinica.
viscosa, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 361; ed. II. 395 =
 Inula viscosa.
vulgaris, Gaertn. Fruct. ii. 461. t. 173.—Geront. temp.
 Wightiana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 128.—Ind. or.

PULMONARIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735);

Gen. ed. I. 37 (1737). *BORAGINEAE*, Benth. &
 Hook. f. ii. 857.
affinis, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 13 = saccharata.
alpestris, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. ii. 535 =
 officinalis.
alpina, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = officinalis.
alpina, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 224 =
 Mertensia alpina.
amoena, Stev. ex Lehm. Asperif. 296 = Mertensia
 dahurica.
angustata, Schrad. ex Roem. & Schult. iv. 54 =
 angustifolia.
angustifolia, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 150 = mollis.
angustifolia, Linn. Sp. Pl. 135.—Europ.
armena, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)
 99 = Mertensia dahurica.
azurea, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 150 = angustifolia.
bracteata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 747 =
 Mertensia sibirica.
ciliata, James, ex Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828)
 224 = Mertensia sibirica.
Clusii, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 123 = angustifolia.
cordato-folia, Gilib. Fl. Lituan. i. 23 = officinalis.
daurica, Cat. Hort. Viln. (1824); ex Roem. & Schult.
 Syst. iv. 57 = seq.?
daurica, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)
 103 = seq.
daurica, Sims, Bot. Mag. t. 1743 = Mertensia
 dahurica.
denticulata, Roem. & Schult. Syst. iv. 746 = Mertensia
 sibirica.
digenea ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873)
 180.—Austria.
elegans, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 745 =
 Mertensia paniculata.
elliptica, Rafin. New Fl. Am. iv. 17 (Mertensiae sp.?).
 —Am. bor.
Gallorum, Gueldenst. Reisen, ii. 262 = officinalis.
glabra, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 282 = Mertensia pul-
 monarioides.
gracilis, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 747 =
 Mertensia dahurica.
grandiflora, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 135 =
 saccharata.
hirta, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1667 = Hyoscyamus phy-
 saloides.
hybrida ×, Kern. Monog. Pulmonar. 31.—Europ.
Kochii, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 181
 = oblongata.
lanceolata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 729 = Mertensia
 lanceolata.
longifolia, Bast. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 460
 = angustifolia.
maculata, F. G. Dietr. Vollst. Lexic. Gaertn. v. 657 =
 officinalis.
maculata, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 278 = angustifolia.
maculosa, Georgi, Reise, i. 2 = mollis.
maculosa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 338, in syn. =
 officinalis.
marginata, Nutt. Gen. Am. i. 115 = Mertensia lanceo-
 lata.
maritima, Linn. Sp. Pl. 136 = Mertensia maritima.
media, Host, Fl. Austr. i. 235 = angustifolia.
mollis, Guép. Fl. Maine-et-Loire, ed. III. 162, partim
 = ovalis.
mollis, Tenore, Syll. Fl. Neap. 84 = officinalis.
mollis, Wolff, ex Heller, Fl. Wirceb. Suppl. 13.—
 Europ. centr.
mollissima, Kern. Monog. Pulmonar. 47 = mollis.
montana, Lej. Fl. Spa, i. 98 = mollis.
montana, Wulf. ex Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix.
 (1818) 98 = angustifolia.
notha ×, Kern. Monog. Pulmonar. 32.—Europ.
oblongata, Schrad. in Roem. & Schult. Syst. iv. 744
 (farrago spp.).—Europ.

PULMONARIA :—

oblongifolia, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834)
 43 = Mertensia oblongifolia.
obscura, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iv. (1865) 341 =
 officinalis.
obscura, Rehm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii.
 (1868) 495 = mollis.
officinalis, Linn. Sp. Pl. 135.—Europ.
officinalis, Oed. in Fl. Dan. t. 482 = saccharata.
orientalis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = Nonnea
 rosea.
ovalis ×, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 44.—
 Europ.
paniculata, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 181 = Mertensia
 paniculata.
parviflora, Knapp, in Flora, xlv. (1862) 273 = angusti-
 folia.
parviflora, Michx. Fl. Bor. Am. i. 131 = Mertensia
 maritima.
parviflora, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)
 103 = Mertensia paniculata.
parviflora, Schur, Enum. Pl. Transs. 472 = mollissima.
pauciflora, Gilib. Fl. Lituan. i. 23 = officinalis.
pilosa, Cham. in Linnaea, iv. (1829) 449 = Mertensia
 paniculata.
procumbens, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 281 = Mertensia
 maritima.
pubescens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 744 =
 Mertensia paniculata.
pumila, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)
 101 = Mertensia paniculata.
rubra, Schott, in Bot. Zeit. ix. (1851) 395 = mollis.
saccharata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3.—Europ.
sibirica, Linn. Sp. Pl. 135 = Mertensia sibirica.
simplicissima, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812)
 518 = Mertensia simplicissima.
stiriaca, Kern. Monog. Pulmonar. 36 = angustifolia.
stylosa, Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 62
 = Mertensia stylosa.
suffruticosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1667 = Lithospermum
 graminifolium.
tenella, Salisb. Prod. 113 = Mertensia pulmonarioides.
transsilvanica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.
 iii. (1852) 88 = mollis.
tuberosa, Mart. Fl. Tam. i. 487, partim = ovalis.
tuberosa, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)
 97 = angustifolia.
undulata, Lamy, Vég. Orig. 12 (sp. obs.).—Hab.?
Vallarsae, Kern. Monog. Pulmonar. 33. t. 11 = officinalis.
variabilis, Godr. Fl. Lorr. ii. 122 = angustifolia.
villosula, Roem. & Schult. Syst. iv. 745 = Mertensia
 villosula.
virginica, Linn. Sp. Pl. 135 = Mertensia pulmona-
 rioides.
vulgaris, Holand, Fl. Moselle, i. 90 = officinalis.
vulgaris, Mérit, Fl. Par. ed. I. 70; II. ii. 164 (farrago
 spp.).—Europ.

PULSATILLA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735);

Gen. ed. I. 163 (1737) = *Anemone*, Tourn.
 (Ranunc.).
affinis, Lasch, in Linnaea, iii. (1828) 166 = A.
 pratensis.
africana, Spreng. Syst. ii. 664 = A. capensis.
ajanensis, Regel & Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat.
 Mosc. xi. (1859) 28 = A. vernalis.
alba, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 732 = A. alpina.
albana, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 22;
 Spreng. Syst. ii. 663 = A. albana.
alpina, G. Laws. in Proc. & Trans. Nova Scotian Inst.
 Nat. Sc. (1870) 23 = A. occidentalis.
alpina, Schrank, Baier. Fl. ii. 81 = A. alpina.
ambigua, Turcz. ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 601 =
 A. albana.
amoena, Jord. Diagn. i. 54 = A. Pulsatilla.
angustifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiii.
 (1840) 61.—Sibir.
aperta, Schur, Enum. Pl. Transs. 4 = A. Pulsatilla.
apiifolia, Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. t. 51 = A. alpina.
apiifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 3 = A. alpina.
baldensis, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 553 = A. baldensis.
Bauhini, Tausch, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841)
 580 = A. patens.
Bogenhardiana, Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. 18 =
 A. Bogenhardiana.
Breyneii, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii.
 (1854) 218.—Rossia.

PULSATILLA:—

- Bungeana*, C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 371 = *Anemone Bungeana*.
Burseriana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 732 = *A. alpina*.
caffra, Eckl. & Zeyh. Enum. Pl. Afr. Austr. 1 = *A. caffra*.
campanella, Fisch. ex Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1861) ii. 31 = *A. albana*.
capensis, Steud. Nom. ed. II. i. 379, in syn. = *A. capensis*.
cernua, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 22; Spreng. Syst. ii. 664 = *A. cernua*.
chinensis, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 8 = *A. chinensis*.
coronaria, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 420 = *A. coronaria*.
daurica, Spreng. Syst. ii. 663 = *A. dahurica*.
georgica, Rupr. Fl. Cauc. 9, in textu = violacea?
grandiflora, Reichb. ex Walp. Rep. i. 19 = *A. alpina*.
grandis, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1830) 257 = *A. Pulsatilla*.
Hackelii, Pohl, ex Maly, Fl. Styr. 2; Ledeb. Fl. Ross. i. 20 = *A. Pulsatilla*.
Hackelii, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 733 = *A. Halleri*.
Halleri, Willd. Enum. Hort. Berol. 580 = *A. Halleri*.
hybrida, Mikan & Presl, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = *A. Halleri*.
intermedia, Fisch. ex Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 221 (Quid?) = Sibir.
intermedia, Hoppe & Hornsch. Reise, 183 = *A. montana*.
intermedia, Lasch, in Linnaea, iii. (1828) 164 = *patens*.
intermedia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. Pulsatilla*.
Jankae, Nym. Syll. Suppl. 28 = *A. pratensis*.
Jankae, Schur, Enum. Pl. Transs. 4 = *A. Jankae*.
latifolia, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii. (1854) 218. — Russia.
lutea, Reichb. ex Walp. Rep. i. 19 = *A. alpina*.
media, Bogenh. in Flora, xxiii. (1840) 74 = *A. Pulsatilla*.
micrantha, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. alpina*.
millefoliata, Ser. ex Nym. Consp. 2 = *A. alpina*.
montana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 733 = *A. montana*.
narcissiflora, Schrank, Baier. Fl. ii. 85 = *A. narcissiflora*.
memorosa, Schrank, l. c. 82 = *A. memorosa*.
Nigella, Jord. Diagn. i. 55 = *A. montana*.
nigricans, Stoerck, ex DC. Syst. i. 193 = *A. pratensis*.
nuda, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) ii. 19. — Sibir.
Nuttalliana, Spreng. Syst. ii. 663 = *A. patens*.
obsoleta, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. pratensis*.
patens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *A. patens*.
pratensis, Mill. l. c. n. 2 = *A. pratensis*.
propera, Jord. Diagn. i. 54 = *A. Pulsatilla*.
propinqua, Lasch, in Linnaea, iii. (1828) 165 = *A. vernalis*.
Pseudo-patens, Schur, Enum. Pl. Transs. 4 = *A. patens*.
ranunculoides, Schrank, Baier. Fl. ii. 84 = *A. ranunculoides*.
recta, Gilib. Fl. Lituan. ii. 278 = *A. Pulsatilla*.
reflexa, Gilib. l. c. = *A. pratensis*.
rubra, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 553 = *A. pratensis*.
slavica, Reuss, Květ. Slov. (1853) 5 = *A. slavica*.
sulphurea, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. vernalis*.
tenuifolia, Spreng. Syst. ii. 664 = *A. tenuifolia*.
transsilvanica, Schur, Enum. Pl. Transs. 5 = *A. Pulsatilla*.
vernalis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *A. vernalis*.
versicolor, Andr. ex Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii. (1854) 217 = *A. stellata*?
violacea, Rupr. Fl. Cauc. 6 = *A. albana*.
vulgaris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *A. Pulsatilla*.
Wolfgangiana, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii. (1854) 218 = *A. Wolfgangiana*.
Zichyi, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 317 = *A. pratensis*.

PULTENAEA, Sm. Bot. Nov. Holl. 35. t. 12 (1793).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 470.
BARTLINGIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1848) 373.

PULTENAEA:—

- EUCHILUS*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 17 (1811).
SPADOSTYLES, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 80.
URODON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 17.
acerosa, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. ii. 131. — Austral.
aciphylla, Benth. Enum. Pl. Hueg. 35; et in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81 = *reticulata*.
adunca, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 279. — Austral.
altissima, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. ii. 123. — Austral.
amoena, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = *linophylla*.
argentea, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 347 = *dentata*.
aristata, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112. — Austral.
aspalathoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 73. — Austral.
aspera, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = *Phyllota phyllicoides*.
Ausfeldi, Regel, Gartenfl. (1865) 193. t. 475. f. 1-11. — Austral.
baeckevoides, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *Gunnii*.
Benthami, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 38. — Austral.
biloba, R. Br. in Bot. Mag. t. 2091 = *scabra*.
brachyphylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 279 = *verruculosa*.
brachytopis, Benth. ex Lindl. in Bot. Reg. (1841) Misc. 40. — Austral.
bracteata, Schrad. Sert. Hannov. t. 18 = *linophylla*.
Brunonis, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81 = *Latroba Brunonis*.
calycina, Benth. Fl. Austral. ii. 121. — Austral.
caraliculata, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 119. — Austral.
candida, Lodd. Bot. Cab. t. 1236 = *tenuifolia*.
canescens, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 346 = *plumosa*.
caniculata, Walp. Ann. vii. 662, sphalm. = *canaliculata*.
capitellata, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112 = *stricta*.
clutiaefolia, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 108. — Hab.?
comosa, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = *Phyllota phyllicoides*.
conferta, Benth. Fl. Austral. ii. 118. — Austral.
cordata, R. Grah. in Hook. Bot. Mag. t. 3443 = *juniperina*.
cordifolia, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82 = *praec.*
crassifolia, Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit. 164, nomen. — Austral.
cuneata, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *microphylla*.
daphnoides, Wendl. Bot. Beobacht. 49. — Austral.
deltoides, Sieber, ex DC. Prod. ii. 110 = *scabra*.
densifolia, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 119. — Austral.
dentata, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 103. t. 131. — Austral.
diemenica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 277 = *pedunculata*.
diffusa, Hook. Fl. Tasm. i. 91. t. 14. — Tasman.
Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 221. — Austral.
echinata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 173, sphalm. = *seq.*
echinula, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112. — Austral.
elliptica, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 246. — Austral.
empetrifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 76. — Austral.
epacridea, F. Muell. Fragm. iv. 21 = *staphylloides*.
ericaefolia, Benth. in Lindl. Swan River App. 13. — Austral.
ericoides, Vent. Jard. Malm. t. 35 = *Aotus villosa*.
eriphora, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418. — Austral.
euchila, DC. Prod. ii. 112. — Austral.
fasciculata, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82. — Austral.
ferruginea, Rudge, in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 300. t. 23 = *villosa*.

PULTENAEA:—

- filifolia*, F. Muell. Fragm. i. 9 = *tenuifolia*.
flexilis, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 502. — Austral.
foliolosa, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83. — Austral.
fuscata, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 119 = *vestita*.
genistoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 73 = *Latroba genistoides*.
glabra, Benth. Fl. Austral. ii. 125. — Austral.
glaucescens, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112 = *linophylla*.
graveolens, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. vii. (1885) 63. — Austral.
Gunnii, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82. — Austral.
Hartmanni, F. Muell. Fragm. viii. 166. — Austral.
hibbertioides, Hook. f. Fl. Tasman. i. 89. — Austral.
hispidula, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. ii. 133. — Austral.
humilis, Benth. in Hook. f. Fl. Tasman. i. 91. — Austral.
hypolampra, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111 = *elliptica*.
ilicifolia, Andr. Bot. Rep. t. 320 = *Oxylobium trilobatum*.
incarnata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 108 (Quid?). — Austral.
incurvata, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 346. — Austral.
involuta, Benth. Fl. Austral. ii. 138. — Austral.
juncea, Willd. Sp. Pl. ii. 506 = *Viminaria denudata*.
juniperina, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 103. t. 130. — Austral.
lanata, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *villosa*.
largiflorens, Benth. Fl. Austral. ii. 134. — Austral.
laxa, Kunze, Pugill. Pl. Nov. 11. — Austral.
laxiflora, Benth. Fl. Austral. ii. 133. — Austral.
Lindleyana, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 39. — Austral.
linophylla, Schrad. Sert. Hannov. 28. — Austral.
microphylla, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112. — Austral.
mollis, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 260. — Austral.
montana, Lindl. l. c. 178 = *scabra*.
mucronata, Lodd. Bot. Cab. t. 1711 = *polifolia*.
mucronata, F. Muell. Fragm. i. 8. — Austral.
Muelleri, Benth. Fl. Austral. ii. 138. — Austral.
myrtoides, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81. — Austral.
nana, Andr. Bot. Rep. t. 434 = *Chorizema ilicifolium*.
neurocalyx, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 281. — Austral.
obcordata, Andr. Bot. Rep. t. 574 = *daphnoides*.
obcordata, Benth. Fl. Austral. ii. 120. — Austral.
obovata, Benth. l. c. 123. — Austral.
ochreate, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 75. — Austral.
Otonis, Regel, Gartenfl. (1857) 343. — Austral.
oxalidifolia, A. Cunn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = *ternata*.
paleacea, Willd. Sp. Pl. ii. 506. — Austral.
parviflora, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111. — Austral.
peduncularis, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *seq.*
pedunculata, Hook. Bot. Mag. t. 2859. — Austral.
petiolaris, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82. — Austral.
phyllicoides, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = *Phyllota phyllicoides*.
pimeleoides, Hook. f. Fl. Tasman. i. 88 = *dentata*.
pinifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 220. — Austral.
plumosa, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111. — Austral.
polifolia, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 346. — Austral.
polygalifolia, Rudge, in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 303. t. 25 = *villosa*.
procumbens, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 347. — Austral.
prostrata, Benth. in Hook. f. Fl. Tasman. i. 89. — Austral.
protaeoides, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112 = *stipularis*.
psoraleoides, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = *stipularis*.
pteronioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 280 = *strobilifera*.
pycnocephala, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. ii. 114. — Austral.

PULTENAEA :—

- racemulosa*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111 = villosa ?
reticulata, Benth. *Fl. Austral.* ii. 118.—Austral.
retorta, Wendl. Hort. Herrenh. ii. 13. t. 9 = Dillwynia
ericifolia.
retusa, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 502 =
linophylla.
rigida, R. Br. ex Benth. *Fl. Austral.* ii. 130.—
Austral.
rosea, F. Muell. *Fragm.* ii. 15.—Austral.
rosmarinacea, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 =
Aotus villosa.
rosmarinifolia, Lindl. Bot. Reg. t. 1584 = polifolia.
rosmarinifolia, Sieber, ex DC. Prod. ii. 108 = *Aotus*
villosa.
rotundifolia, Benth. *Fl. Austral.* ii. 121.—Austral.
rubiaefolia, Andr. Bot. Rep. t. 351 = *Mirbelia reti-*
culata.
rupestris, Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 619,
nomen (Quid ?).—Austral.
scabra, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 18.—
Austral.
selaginoides, Hook. f. *Fl. Tasman.* i. 87.—Tasman.
setigera, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii.
(1838) 82 = *procumbens*.
setulosa, Benth. *Fl. Austral.* ii. 132.—Austral.
Skinneri, F. Muell. *Fragm.* viii. 166.—Austral.
spinulosa, Benth. *Fl. Austral.* ii. 121.—Austral.
squarrosa, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = *Phyllota*
phylicoides.
staphyleoides, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 124.
—Austral.
stenophylla, A. Cunn. ex G. Don, l. c. = *microphylla*.
stipularis, Sm. Bot. Nov. Holl. 35. t. 12; et in Trans.
Linn. Soc. ix. (1808) 245.—Austral.
stricta, Sims, Bot. Mag. t. 1588.—Austral.
strobilifera, Meisn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 76.—
Austral.
styphelioides, Steud. Nom. ed. II. ii. 418, sphalm. =
staphyleoides.
subspicata, Benth. *Fl. Austral.* ii. 137.—Austral.
subumbellata, Hook. Bot. Mag. t. 1584.—Austral.
Sweetii, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 150 =
flexilis.
syvatica, Sieber, ex DC. Prod. ii. 104 = *Oxylobium*
Pultenaeae.
tenella, Benth. *Fl. Austral.* ii. 122.—Austral.
tenuifolia, R. Br. in Bot. Mag. t. 2086.—Austral.
ternata, F. Muell. *Fragm.* i. 8.—Austral.
thymifolia, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111. = *elliptica*.
tuberculata, Pers. Syn. i. 454 = *elliptica*.
uncinata, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii.
(1838) 83 = *microphylla*.
Urodon, Benth. *Fl. Austral.* ii. 124.—Austral.
verruculosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi.
(1853) i. 278.—Austral.
verticillata, Turcz. l. c. 279 = *empetrifolia*.
vestita, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 19.—
Austral.
villifera, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111.—Austral.
villosa, Andr. Bot. Rep. t. 309 = *Aotus villosa*.
villosa, Willd. Sp. Pl. ii. 507.—Austral.
virgata, Sieber, ex DC. Prod. ii. 108 = *Aotus villosa*.
viscidula, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. vii.
(1885) 69.—Austral.
viscosa, R. Br. ex Benth. *Fl. Austral.* ii. 127.—
Austral.

PULTENEYA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 191 (1824) =
praec.

PULTNAEA, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan.
1836) 195, sphalm. = *praec.*

PULVINARIA, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 214
(1885). *ASCLEPIADEAE*.
Lhotzkyana, Fourn. l. c. 215.—Bras.

PUMILEA, P. Br. Hist. Jamaic. 188 (1756) = **Turnera**,
Plum

PUMILO, Schlecht. in Linnaea, xxi. (1848) 448 =
Rutidosia, DC. (Compos.).
argyrolepis, Schlecht. l. c. = *R. Pumilo*.
Preissii, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 487 = *R.*
Pumilo.

PUNDUANA, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot.
345 (1863) = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
volkameriaefolia, Steetz, l. c. 346 = *V. volkameriae-*
folia.
vulgaris, Steetz, l. c. = *V. volkameriaefolia*.

PUNEERIA, Stocks, in Journ. As. Soc. Bombay, iii.
(1849) 55 = **Withania**, Pauq. (Solanac.).
coagulans, Stocks, l. c. 56 = *W. coagulans*.

PUNGAMIA, Lam. Illustr. t. 603 (1792 ?) = **Pongamia**,
Vent. (Legumin.).

PUNICA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *LY-*
THRARIEAE, Benth. & Hook. f. i. 784.
GRANATUM, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii.
(1880) 132.

RHOEA, St. Lag. l. c. 133 (1880).
florida, Salisb. Prod. 354 = *P. Granatum*.
Granatum, Linn. Sp. Pl. 472.—Europ. austr.; Maurit.
grandiflora, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 669 =
P. Granatum.
nana, Linn. Sp. Pl. ed. II. 676 = *P. Granatum*.
protopunica, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi.
(1882) 512.—Ins. Socotra.
spinosa, Lam. Fl. Fr. iii. 483 = *P. Granatum*.

PUNICELLA, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad.
Petersb. x. (1852) 333 = **Balaustion**, Hook.
(Myrtac.).
carinata, Turcz. l. c. = *B. pulcherrimum*.

PUPAL, Adans. Fam. ii. 268 (1763) = seq.

PUPALIA, Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 132.
AMARANTACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 31.
CODIVALIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1836).
DESMOCHAETA, DC. Cat. Hort. Monsp. 101 (1813).
KOMMIA, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
181 (1867).

SYAMA, Jones, in As. Res. iv. (1795) 261.
Alopecurus, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 328
= *Cyathula cylindrica*.
atropurpurea, Moq. l. c. 331.—As. et Afr. trop.
densiflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. tt. 156, 158 =
Cyathula achyranthoides.
distantiiflora, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 217.—
Abyss.
echinata, Juss. ex Steud. Nom. ed. I. 269, 669 =
lappacea.
Figarei, Tod. Ind. Sem. Hort. Panorum. (1866) 34.—
Aegypt.

globosa, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841)
i. Intell. 22, nomen = *Cyathula globulifera*.
holosericea, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 329,
333 = *Cyathula globulifera*.
lappacea, Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 132;
Moq. l. c. 331.—As. et Afr. trop.
mollis, Moq. l. c. 333.—Afr. trop.
natalensis, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 97 =
Cyathula natalensis.
orbiculata, Wight, Ic. v. t. 1783.—Ind. or.
ortacantha, Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
181.—Abyss.
patula, Juss. ex Steud. Nom. ed. I. 269, 669 =
lappacea.
prostrata, Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 321
= *Cyathula geniculata*.
remotiflora, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 333.—Afr.
austr.
Schimperiaana, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell.
22, nomen = *Cyathula cylindrica*.
sordida, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 333.—Reg.
Argent.
styractifolia, Juss. ex Steud. Nom. ed. I. 269, 669 =
lappacea.
subfusca, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 332.—Afr. trop.
Thonningii, Moq. l. c. 333.—Afr. trop.
velutina, Moq. l. c. 332 = *lappacea*.

PURARIA, Wall. Cat. n. 5352–55, 5570 (1831 ?) =
Pueraria, DC. (Legumin.).

PURCHIA, Dum. Anal. Fam. 24 (1829) = **PURSHIA**,
Spreng. = **Onosmodium**, Michx. (Borag.).

PURDIAEA, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot.
v. (1846) 250. t. 9. *CYRILLEAE* [Benth. & Hook. f.
ii. 1226].

COSTAEA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 75 (1853).
angustifolia, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 53 =
stenopetala.
monodynamia, Griseb. l. c.—Cuba.
nutans, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846)
251. t. 9.—N. Granat.
stenopetala, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 45.—
Cuba.

PURGOSEA, Haw. in Phil. Mag. iii. (1828) 184 =
Crassula, Linn.

alooides, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. alooides*.
alpestris, G. Don, Gen. Syst. iii. 104 = *C. alpestris*.
barbata, G. Don, l. c. = *C. barbata*.
capitellata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. capitella*.
cephalophora, G. Don, Gen. Syst. iii. 103 = *C. cephalo-*
phora.
ciliata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. ciliata*.
concinna, Sweet, l. c. = *C. concinna*.
concinella, Sweet, l. c. = *C. concinnella*.
conspicua, Sweet, l. c. = *C. conspicua* (in Addend.).
corymbosula, Loud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 421 =
seq.
corymbulosa, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C.*
corymbulosa.
Cotyledonis, Sweet, l. c. = *C. Cotyledonis*.
crenulata, G. Don, Gen. Syst. iii. 103 = *C. crenulata*.
debilis, G. Don, l. c. 104 = *C. debilis*.
dentata, G. Don, l. c. = *C. dentata*.
hemisphaerica, G. Don, l. c. = *C. hemisphaerica*.
hirta, G. Don, l. c. 103 = *C. hirta*.
ligulifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. liguli-*
folia.

linguaeifolia, Sweet, l. c. = *C. linguaeifolia*.
minima, G. Don, Gen. Syst. iii. 105 = *C. minima*.
montana, G. Don, l. c. 104 = *C. montana*.
obovata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. obovata*.
pertusa, Sweet, l. c. = *C. corymbulosa*.
perusula, Haw. in Phil. Mag. iii. (1828) 184.—Afr.
austr.
punctata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. punctata*.
pyramidalis, G. Don, Gen. Syst. iii. 104 = *C. pyrami-*
dalis.
ramuliflora, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. ramuli-*
flora.
rupestris, G. Don, Gen. Syst. iii. 105 = *C. rupestris*.
sediflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 421 = *C. sediflora*.
spicata, G. Don, Gen. Syst. iii. 105 = *C. spicata*.
tecta, G. Don, l. c. = *C. tecta*.
thyrsiflora, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = *C. thyrsi-*
flora.
tomentosa, Sweet, l. c. = *C. tomentosa*.
turrita, Sweet, l. c. = *C. turrita*.

PURGOSIA, G. Don, Gen. Syst. iii. 103 (1834) =
praec.

PURKINJIA, Presl, Symb. Bot. ii. 17. t. 64 (1833) =
Ardisia, Sw. (Myrsin.).
nodosa, Presl, l. c. = *Mexic.*

PURPURELLA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii.
(1849) 301 = **Tibouchina**, Aubl. (Melastom.).
albiflora, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 35
= *T. hospita*.
grossa, Triana, l. c. = *T. grossa*.
Itatiaiae, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882)
38 = *T. Itatiaiae*.
muricata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1850)
301 = *T. grossa*.
reticulata, Naud. l. c. 302 = *T. reticulata*.

PURSHIA, DC. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 157.
ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 617.
KUNZIA, Spreng. Anleit. ii. II. 869 (1818).
TIGAREA, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 333. t. 15 (1814).
glandulosa, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. n. III.
(1885) 153.—Calif.
tridentata, DC. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 158.—
Am. bor. occ.

PURSHIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 35 (1818) =
Centranthera, R. Br. (Scrophul.).
ciliata, Dennst. l. c. = *C. procumbens*.

PURSHIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 191, sub n. 33 = BURSHIA, Rafin. = *Myriophyllum*, Ponted. (Halorag.).

PURSHIA, Spreng. Anleit. ii. i. 450 (1817) = *Onosmodium*, Michx. (Borag.).
hispidula, Lehm. Asperif. ii. 382 = *O. hispidum*.
mollis, Lehm. l. c. 383 = *O. molle*.

PURUMA, Janme St. Hil. Expos. ii. 313 (1805) = *Pourouma*, Aubl. (Urtic.).

PUSCHKINIA, Adams, in Nov. Act. Acad. Petrop. xiv. (1805) 164. t. B. LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 813.

ADAMIA, Willd. in Ges. Natnrf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 16.

dubia, Kunth, Enum. Pl. iv. 338 = *Hyacinthus spicatus*.
hyacinthoides, Baker, in Linn. Soc. Journ. xi. (1871) 435. — Kurdistan.

libanotica, Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iii. (1837-43) 238 = *scilloides*.

scilloides, Adams, in Nov. Act. Acad. Petrop. xiv. (1805) 164. — As. Min.; Syria.

scilloides, Sieber, Reise Kreta, ii. 319 = *Chionodoxa nana*.

sicula, Van Houtte, in Fl. des Serres, xxi. (1875) 117 = *scilloides*.

PUTORIA, Pers. Syn. i. 524 (1805). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 136.

balearica, Stend. Nom. ed. II. ii. 67, in syn. = *calabrica*.

brevifolia, Coss. & Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 224, nomen. — Alger.

calabrica, Pers. Syn. i. 524. — Reg. Mediterr.

cymosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 80 = *calabrica*.

hispanica, Boiss. & Rent. Diagn. Ser. II. ii. 108 = *calabrica*.

indica, DC. Prod. iv. 577 = *Anotis Leschenanltiana*?

microphylla, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 79 = *brevifolia*.

tenella, Pomel, l. c. 71 = *brevifolia*.

PUTRANJIVA, Wall. Tent. Fl. Nap. 61 (1826). EUPHORBIAEAE, Benth. & Hook. f. iii. 277.

NAGEIA, Roxb. Hort. Beng. 71 (1814); Fl. Ind. iii. 766 (1832).

PALENGA, Thw. in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 270. t. 7.

amblyocarpa, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 444 = *Roxburghii*.

Roxburghii, Wall. Tent. Fl. Nap. 61. — Ind. or.; Burma.

sphaerocarpa, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 443 = *Roxburghii*.

zeylanica, Muell. Arg. l. c. 444. — Zeylan.

PUTTERLICKIA, Endl. Gen. 1086 (1840). CELASTRINEAE, Benth. & Hook. f. i. 366.

pyracantha, Endl. l. c. — Afr. austr.

PUTZEYSIA, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 134 = *Begonia*, Linn.

gemmipara, Klotzsch, l. c. 135 = *B. gemmipara*.

PUTZEYSIA, Planch. & Linden, in Linden, Cat. n. 22 (1857) 3 = *Aesculus*, Linn. (Sapind.).

rosea, Planch. & Linden, l. c.; et in Belg. Hort. vii. (1857) 198 (= *Billia columbiana*). — N. Granat.

PUYA, Molina, Sagg. Chile, 160, 351 (1782). BROMELIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 666.

POURRETIA, Ruiz & Pav. Prod. 46. t. 7 (1794).

PUJA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 153 (1810).

alpestris, C. Gay, Fl. Chil. vi. 12 = *Pitcairnia caerulea*.

Altensteinii, Link, Klotzsch & Otto, Ic. Sel. i. 1. t. 1 = *Pitcairnia Altensteinii*.

Bonplandiana, Schult. f. Syst. vii. 1236. — N. Granat.

caerulea, Auct. = *coerulea*.

carnea, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 117 = *Pitcairnia carnea*?

chilensis, Molina, Sagg. Chile, 160, 351. — Chili.

coarctata, Fisch. Sert. Petrop. t. 19 = *chilensis*.

coerulea, Miers, in Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 11 = *Pitcairnia caerulea*.

PUYA :—

edulis, E. Morr. in Belg. Hort. xxviii. (1878) 354. — Bras.

floccosa, E. Morr. l. c. xxxv. (1885) 81. — Venezuela.

gigantea, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 246 = *chilensis*.

Gigas, E. Andr. in Rev. Hort. (1881) 314. — N. Granat.

grandiflora, Hook. Bot. Mag. t. 5234 = *Pitcairnia ferruginea*.

guyanensis, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Gui. 1068, nomen. — Guian.

heterophylla, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 71 = *Pitcairnia heterophylla*.

lanata, Schult. f. Syst. vii. 1233. — Peruv.

lanuginosa, Schult. f. l. c. 1234. — Peruv.

longifolia, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) 483. t. 101 = *Pitcairnia heterophylla*.

macrostachya, A. Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848) 141, 146. — Guian.

maidifolia, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, v. (1849) 453. t. 289 = *Pitcairnia maidifolia*.

maydifolia, Decne. in Rev. Hort. Sér. III. v. (1851) 347 = *maidifolia*.

meridensis, E. Morr. in Belg. Hort. xxxv. (1885) 81 = *floccosa*.

paniculata, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 247 (*Pitcairnia* sp.). — Chili.

pyramidata, Schult. f. Syst. vii. 1235. — Peruv.

recurvata, Schiedw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 275 = *Pitcairnia recurvata*.

Rozli, E. Morr. in Belg. Hort. xxxv. (1885) 80 (*Pitcairnia* sp.). — Peruv.

rubricaulis, Stend. Nom. ed. II. ii. 419 = *Pitcairnia caerulea*?

saxatilis, Mart. Reise Bras. ii. 757 (= *Encholirium spectabile*). — Bras.

suberosa, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 153 = *chilensis*.

sulphurea, Hook. Bot. Mag. t. 4696 = *Pitcairnia Wendlandi*.

virescens, Hook. l. c. t. 4991 (*Caraguata* sp.). — Peruv.

Warszewiczii, H. Wendl. l. c. t. 5225 = *Pitcairnia atrorubens*.

Whytei, Hook. f. l. c. t. 5732 = *Pitcairnia caerulea*.

PYCHNANTHEMUM, G. Don, Gen. Syst. iv. 667 (1837), sphalm. = *Pycnanthemum*, Michx. (Labi.).

PYCHNOSTACHYS, G. Don, Gen. Syst. iv. 686 (1837), sphalm. = *Pycnostachys*, Hook. (Labi.).

PYCNANDRA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 658 (1876). SAPOTACEAE, Benth. & Hook. f. l. c.

PYCNANTHEMUM, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 7. t. 33 (1803). LABIATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1184.

BRACHYSTEMUM, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 5. tt. 31, 32 (1803).

KOELLIA, Moench, Meth. 407 (1794).

TULLIA, Leavenw. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xx. (1830) 343. t. 5.

alatum, Rafin. Fl. Ludov. 40 (Quid?). — Am. bor.

albescens, Torr. & Gray, ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii. (1842) 45. — Am. bor.

aristatum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 8. t. 33. — Am. bor.

arkansanum, Fresen. in Flora, xxv. (1842) 325 = *muticum*.

californicum, Torr. ex Dur. in Journ. Acad. Philad. Ser. II. iii. (1855) 99. — Calif.

clinopodioides, Torr. & Gray, ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii. (1842) 45. — Am. bor.

dubium, A. Gray, l. c. = P. Tullia.

elongatum, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 333 = *Hyptis spicigera*.

hyssopifolium, Benth. Lab. Gen. et Sp. 329 = *aristatum*.

incanum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 7. — Am. bor.

lanceolatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 410. — Am. bor.

leptodon, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 355. — Am. bor.

linifolium, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 409. — Am. bor.

Loomisii, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 100 = *incanum*.

Monardella, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 8. t. 34 = *Monarda clinopodia*.

montana, Michx. l. c. 8. — Am. bor.

muticum, Pers. Syn. ii. 128. — Am. bor.

nudum, Nutt. Gen. Am. ii. 34. — Am. bor.

ovatum, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xii. 188 = *muticum*.

PYCNANTHEMUM :—

pilosum, Nutt. Gen. Am. ii. 33 = *muticum*.

rosmarinoides, Rafin. Fl. Ludov. 40 (Quid?). — Am. bor.

setosum, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 100 = *aristatum*.

subulatum, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 333 = *Hyptis brevipes*.

tenuifolium, Schrad. Hort. Gotting. 10 = *linifolium*.

Torrei, Benth. Lab. Gen. et Sp. 329. — Am. bor.

Tullia, Benth. l. c. 328. — Am. bor.

verticillatum, Pers. Syn. ii. 128 = *lanceolatum*.

verticillatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 410 = *aristatum*.

virginicum, Nutt. Gen. Am. ii. 33 = *Torrei*.

virginicum, Pers. Syn. ii. 128 = *lanceolatum*.

PYCNANTHES, Rafin. New Fl. Am. iv. 95 (1836) = *Pycnanthemum*? Michx. (Labi.).

ciliata, Rafin. l. c. — Am. bor.

parvifolia, Rafin. l. c. — Am. bor.

saxatilis, Rafin. l. c. — Am. bor.

PYCNARRHENA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 44. MENISPERMACEAE, Benth. & Hook. f. i. 38.

longifolia, Becc. Malesia, i. (1877) 160. — Ins. Timor.

lucida, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 87. — Java.

mecistophylla, Miers, in Ann. Nat. Hist. Ser. III. xx. (1867) 12; Contrib. iii. 353 (an gen.?). — Reg. Himal.

novoguineensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 87. — N. Guin.

planiflora, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. 206, sphalm. = *pleniflora*.

planifolius, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 44, sphalm. = seq.

pleniflora, Miers, l. c. Ser. III. xx. (1867) 12; Contrib. iii. 353. t. 141. — Reg. Himal.

tumefacta, Miers, l. c. 12; 353. — Borneo.

PYCNBOTRYA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 715 (1876). APOCYNACEAE, Benth. & Hook. f. l. c.

nitida, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1183. — Afr. trop.

PYCNOCEPHALUM, DC. Prod. v. 83 (1836) = *Eremanthus*, Less. (Compos.).

plantaginifolium, DC. l. c. = *E. plantaginifolius*.

scapigerum, DC. l. c. = *E. scapigerus*.

spathulaefolium, DC. l. c. = *E. plantaginifolius*.

PYCNOCOMA, Benth. in Hook. Niger Fl. 508 (1849). EUPHORBIAEAE, Benth. & Hook. f. iii. 326.

cornuta, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 483. — Afr. trop.

gigantea, Baill. Etud. Gén. Euph. 411. — Ins. Comor.

macrophylla, Benth. in Hook. Niger Fl. 508. — Afr. trop.

minor, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 483. — Afr. trop.

reticulata, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 259. — Madag.

rigidifolia, Baill. Etud. Gén. Euph. 411. — Madag.

trewioides, Baill. l. c. — Ins. Comor.

PYCNOCOMON, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 93. t. 88 (1820) = *Scabiosa*, Tourn.; et *Cephalaria*, Schrad. (Dipsac.).

albescens, Wallr. Sched. Crit. 46, in nota = *C. leucantha*.

alpina, Wallr. l. c. = *C. alpina*.

attenuata, Wallr. l. c. = *C. scappennata*.

boetica, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 738 = *C. lenantha*.

centauroides, Wallr. Sched. Crit. 46, in nota = *C. corniculata*.

corniculata, Wallr. l. c. = *C. corniculata*.

cretacea, Wallr. l. c. = *C. cretacea*.

leucantha, Wallr. l. c. = *C. leucantha*.

rigida, Wallr. l. c. = *C. rigida*.

rutaefolia, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 94. t. 88 = *Scabiosa rutaefolia*.

scabra, Wallr. Sched. Crit. 46, in nota = *C. scabra*.

syriaca, Wallr. l. c. = *C. syriaca*.

tatarica, Wallr. l. c. = *C. tatarica*.

transsylvanica, Wallr. l. c. = *C. transsylvanica*.

uralensis, Wallr. l. c. = *C. corniculata*.

ustulata, Wallr. l. c. = *C. ustulata*.

PYCNOCOMON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132 = PIGNOMON, Adans. = **Cnicus**, Linn. (Compos.).

PYCNOCOMUS, Hill, Veg. Syst. iv. 38 (1762) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
sonchifolius, Hill, Hort. Kew. 67 = **C. sonchifolia**.

PYCNOCYCLA, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 232. t. 51 (1834). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 881.

DICYCLOPHORA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 89.

abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 333 = **glauca**.

Aucheriana, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 88. — Persia; Beluchist.

cespitosa, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 953. — Persia.

flabellifolia, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 105. — Persia.

glauca, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 232. t. 51. — Ind. or.; Abyss.

macrocarpa, Decne. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 75 = **Cachrys eriantha**.

nodiflora, Decne. ex Boiss. l. c. 88. — Persia.

spinosa, Decne. l. c. Sér. II. iii. (1835) 259. — Persia; Afghan.

tomentosa, Decne. l. c. 258. — Arab.

PYCNOLACHNE, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 215 = **Lachnostachys**, Hook. (Verben.).

ledifolia, Turcz. l. c. = **L. Walcottii**.

PYCNONEURUM, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 340. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 761.

junciforme, Decne. l. c. — Madag.

sessiliflorum, Decne. l. c. 341 (sessiliflorum). — Madag.

PYCNOPHYLLUM, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 355. t. 20. **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 153.

STICHOPHYLLUM, Phil. Fl. Atac. 19. t. 1 D (1860).

bryoides, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 662. — Chili.

convexum, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 75. — Reg. Argent.

Lechlerianum, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 664. — Peruv.

molle, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 355. t. 20. f. 2–8. — N. Granat.

sulcatum, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 75. — Am. austr.

tetrastichum, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 356. t. 20. f. 1. — Bolivia.

PYCNORHACHIS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 776 (1876). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. i. c.

Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 63. — Malacca.

PYCNOSANDRA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 191 (1856) = **Cyclostemon**, Blume (Euphorb.).

serrata, Blume, l. c. 192 = **C. serratus**.

timorensis, Blume, l. c. = **C. Teysmanni**.

PYCNOSORUS, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 63 (1837) = **Craspedia**, Forst. (Compos.).

chrysanthus, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 492 = **C. chrysantha**.

globosus, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 63 = **C. globosa**.

globosus, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 353 = **C. chrysantha**.

PYCNOSPORA, R. Br. ex Wight & Arn. Prod. 197 (1834). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 521.

hedysaroides, R. Br. l. c. — Austral.

neriosa, Wight & Arn. l. c. = **hedysaroides**.

PYCNOSTACHYS, Hook. Exot. Fl. iii. t. 202 (1827). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1177.

ECHINOSTACHYS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 243 (1837).

abyssinica, Fresen. in Flora, ii. (1838) 608. — Abyss.

coerulea, Hook. Exot. Fl. iii. t. 202. — Madag.

reticulata, Benth. in DC. Prod. xii. 83. — Afr. austr.

urticifolia, Hook. Bot. Mag. t. 5365. — Afr. trop.

PYCNOSTELMA, Bunge, ex Decne. in DC. Prod. viii. 512 (1844). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 759.

chinensis, Bunge, ex Decne. l. c. — China; Japon.

PYCREUS, Beauv. Fl. Owar. ii. 48. t. 86 (1807). **CYPERACEAE** [Benth. & Hook. f. iii. 1044].

DISTIMUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 105.

albo-marginatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 9. — Amphig. trop.

angulatus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283. — Amphig. calid.

Baccha, Nees, l. c. — Ind. or.

Bachu, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867–68) 473, in syn. = **praece**.

capillaris, Nees, l. c. = **globosus**.

densiflorus, Steud. Nom. ed. II. ii. 419, sphalm. = **seq.**

densifolius, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283, nomen. — Hab. ?

Elliottianus, Nees, l. c. = **polystachyos**.

flavescens, Beauv. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72. — Cosmop.

globosus, Reichb. l. c. 140¹⁰. — Cosmop.

infirmus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 8 = **propinquus**.

inundatus, Nees, l. c. 10, in obs. = **P. Baccha**.

laevigatus, Nees, in Linnaea, x. (1836) 130 = **Cyperus laevigatus**.

lateralis, Nees, l. c. ix. (1834) 283 = **Cyperus laevigatus**.

Linnaeanus, Nees, l. c., nomen. — Hab. ?

Maximiliani, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 7 = **propinquus**.

megapotaemicus, Nees, l. c. 6. — Bras.

Monti, Beauv. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72 = **Cyperus Monti**.

mucronatus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283 = **Cyperus laevigatus**.

Mundtii, Nees, l. c. — Afr. trop.; Madag.

nitens, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 53. — Geront. trop.

Olfersianus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 8 = **polystachyos**.

paniculatus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283 = **polystachyos**.

pannonicus, Beauv. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72 = **Cyperus pannonicus**.

paraensis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 8 = **flavescens**.

polystachyos, Beauv. Fl. Owar. ii. 48. t. 86. — Cosmop.

propinquus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 7. — Am. trop.

pulvinatus, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 472; ii. 419 = **nitens**.

pumilus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283. — Ind. or.

punctulatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 10, in obs. = **P. Baccha**.

pygmaeus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283 = **Cyperus pygmaeus**.

retusus, Nees, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 71. — Ins. Maurit.

sabulosus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 10. — Bras.

sanguinolentus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283. — Geront. trop.

squarrosus, Nees, l. c. = **Cyperus squarrosus**.

umbrosus, Nees, l. c. x. (1835–36) 130. — Afr. austr.

PYGEUM, Gaertn. Fruct. i. 218. t. 46 (1788).

ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 610.

DIGASTER, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 329 (1860).

GERMARIA, Presl, Epim. Bot. 221 (1850).

POLYDONTIA, Blume, Bijdr. 1104 (1826).

POLYSTORTHIA, Blume, Fl. Jav. Praef. viii (1828).

acuminatum, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 360. t. 18. — Reg. Himal.

acuminatum, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 319 = **glaberrimum**.

acuminatum, Wight, Ic. t. 993 = **Gardneri**.

africanum, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 191. — Afr. trop.

Andersoni, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 320. — Ind. or.

arborescens, Endl. ex Kurz, For. Fl. Brit. Burma, i. 435. — Burma.

arborescens, Endl. Gen. 1250 = **parviflorum**.

Blumei, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 252 = **parviflorum**.

brevifolium, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 321. — Malacca.

capitellatum, Hook. f. l. c. — Burma.

PYGEUM:—

celebicum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 212. — Ins. Celebes.

ceylanicum, Auct. = **zeylanicum**.

ceylanicum, Bedd. Fl. Sylv. t. 59 = **Wightianum**.

confusum, Blume, Mèl. Bot. (1855); et in Flora, xli. (1858) 256. — Java.

denudatum, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 7190 = **acuminatum**.

Gardneri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 321. — Ind. or.

glaberrimum, Hook. f. l. c. 319. — Reg. Himal.

Griffithii, Hook. f. l. c. 322. — Malacca.

griseum, Blume, Mèl. Bot. (1855); et in Flora, xli. (1858) 256. — Java.

lampongum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 212. — Sumatra.

lanceolatum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 319. — Singapore.

latifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 361. — Sumatra.

Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 319. — Malacca.

montanum, Hook. f. l. c. 321. — Reg. Himal.

ovatum, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 252. — Java.

oxycarpum, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 242 = **Prunus macrophylla**.

parviflorum, Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 412. — Java.

parvifolium, Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 103 = **Wightianum**.

persimile, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 306. — Burma.

phaeostictum, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 72 = **Prunus punctata**.

polystachyum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 320. — Malacca.

sumatranum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 619. — Sumatra.

Walkerii, Blume, Mèl. Bot. (1855); et in Flora, xli. (1858) 256 = **zeylanicum**.

Wightianum, Blume, l. c. — Ind. or.

zeylanicum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 89 = **Gardneri**.

zeylanicum, Gaertn. Fruct. i. 218. t. 46. — Zeylan.

PYGMAEA, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 217 (1864) = **Veronica**, Tourn. (Scrophul.).

ciliolata, Hook. f. l. c. — N. Zel.

pulvinaris, Hook. f. l. c. — N. Zel.

Thomsoni, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 353. — N. Zel.

PYGMEA, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 353, err. typ. = **praece**.

PYRACANTHA, M. Roem. Syn. fasc. iii. (Rosifl.) 104, 219 (1847) = **Crataegus**, Tourn. (Rosac.).

chinensis, M. Roem. l. c. 220 = **C. Pyracantha**.

coccinea, M. Roem. l. c. 219 = **C. Pyracantha**.

crenulata, M. Roem. l. c. 220 = **C. crenulata**.

pauciflora, M. Roem. l. c. 220 = **C. Pyracantha**.

PYRAGMA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = **Uvaria**, Linn. (Anonac.).

PYRAMIA, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 458. **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 737.

ACIPETALUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1848) i. 577, partim.

Lychnitis, Klotzsch, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 29 = **Trembleya Lychnitis**.

pityrophylla, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 459. — Bras.

salviaefolia, Cham. l. c. — Bras.

striatella, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 60. — Bras.

PYRAMIDANTHE, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 39 (1865–66) = **Melodorum**, Hook. f. & Thoms. (Aunac.).

rufa, Miq. l. c. = **M. prismaticum**.

PYRAMIDIUM, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 47 (1853). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 97.

Griffithianum, Boiss. l. c. — Afghan.

PYRAMIDOCARPUS, Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 171. **SAMYDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 798.

Blackii, Oliver, l. c. — Afr. trop.

PYRAMIDOPTERA, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 106 (1836). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 903.
cabulica, Boiss. l. c.—Afghan.

PYRAMIDOSTYLUM, Mart. ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 155 (1878) = **Salacia**, Linn. (Celastr.).
Bacupari, Mart. ex Peyr. l. c. 160 = *S. crassifolia*.
banisterioides, Mart. ex Peyr. l. c. 155 = *S. paniculata*.
ciliatum, Mart. ex Peyr. l. c. 156 = *S. undulata*.
fimbriatum, Mart. ex Peyr. l. c. = *S. undulata*.
grandifolium, Mart. ex Peyr. l. c. = *S. grandifolia*.
parviflorum, Mart. ex Peyr. l. c. 160 = *S. glomerata*.

PYRARDA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xli. 120 (1836) = **Grangea**, Adans. (Compos.).
ceruanoides, Cass. l. c. 121 = *G. maderaspatana*.

PYRECINIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 3 (Quid?).

PYRENACANTHA, Wight, in Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 107. *OLACINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 345; iii. 220.

ADELANTHUS, Endl. Gen. 1327. n. 6839; Suppl. ii. 30 (1841).

CAVANILLA, Thunb. Nov. Gen. 105 (1792).
MOLDENHAUERA, Spreng. Syst. i. 373 (1825).
SADRUM, Soland. ex Baill. in DC. Prod. xvii. 18 (1873).

chlorantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 331.—Madag.

grandiflora, Baill. *Adansonia*, x. (1872) 270.—Afr. austr.

kamassana, Baill. l. c. 272.—Afr. trop.

Kirkii, Baill. l. c.—Afr. trop.

scandens, Planch. ex Harv. Thes. Cap. i. 14. t. 23.—Afr. austr.

Vogeliana, Baill. *Adansonia*, x. (1872) 271.—Afr. trop.

volubilis, Wight, in Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 107.—Ind. or.

PYRENARIA, Blume, Bijdr. 1119 (1826). *TERN-STROEMIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 185.

EUSYNAXIS, Griff. Notul. iv. 560 (1854).
acuminata, Planch. ex Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 174.—Malaya.

attenuata, Seem. in Bonplandia, vii. (1859) 49.—Burma.

barringtoniaefolia, Seem. l. c.—Ind. or.
camelliaeflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) ii. 46.—Burma.

diospyricarpa, Kurz, l. c. xlii. (1873) ii. 60.—Burma.
lanceolata, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 40.—Java.

lasiocarpa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 147.—Java.

masocarpa, Korth. l. c.—Borneo.

oidocarpa, Korth. l. c.—Java.

serrata, Blume, Bijdr. 1120.—Java.

villosula, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 484.—Sumatra.

PYRENIA, [Clairv.] Man. Herb. 161 (1811) = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

Amelanchier, [Clairv.] l. c. 162 = *Amelanchier vulgaris*.

Aria, [Clairv.] l. c. = *Pyrus Aria*.

Aucuparia, [Clairv.] l. c. = *Pyrus Aucuparia*.

Chamaemespylus, [Clairv.] l. c. = *Pyrus Chamaemespylus*.

Malus, [Clairv.] l. c. = *Pyrus Malus*.

Pyrus, [Clairv.] l. c. 161 = *Pyrus communis*.

Sorbus, [Clairv.] l. c. 162 = *Pyrus Sorbus*.

torminalis, [Clairv.] l. c. = *Pyrus torminalis*.

PYRENOGLYPHIS, Karst. Fl. Columb. ii. 141. t. 174 (1869) = **Bactris**, Jacq. (Palm.).

balanoidea, Karst. l. c. 142, in obs. = *B. balanoides*.
Cruegeriana, Karst. l. c., in obs. = *B. Cruegeriana*.

major, Karst. l. c. 141. t. 174 = *B. major*.

ovata, Karst. l. c. 142, in obs. = *B. ovata*.

PYRETHRARIA, Pers. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 420 (1841) = **Cotula**, Tourn. (Compos.).

dichotoma, Pers. ex Steud. l. c. = *C. Pyrethraria*.

PYRETHRON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.

VOL. II.

PYRETHRUM, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 720 (1742) = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

abrotanifolium, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 549.—Sibir. altaic.

abrotanifolium, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 86 = *Anthemis montana*.

Achilleae, DC. Prod. vi. 57 = *C. Achilleae*.

Achilleae, Wendl. in Flora, xii. (1829) i. Erg. 29 = *C. macrophyllum*.

achilleifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 327 = *C. achilleaeifolium*.

adauctum, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = *C. pinnatifidum*.

alpestre, [Clairv.] Man. Herb. 247 = *C. coronopifolium*.

alpinum, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 108 = *Anthemis carpathica*.

alpinum, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 215 = *C. alpinum*.

ambiguum, Ledeb. Fl. Alt. iv. 118 = *C. montanum*.

anethifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. 904 = *C. anethifolium*.

anomalum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861) 75 = *C. oppositifolium*.

argenteum, Adam, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 552 = *C. praealtum*.

argenteum, Boiss. Fl. Orient. iii. 354 = *C. argenteum*.

argyranthemoides, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 343 = *Tanacetum argyranthemoides*.

armenum, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 47 = *C. millefoliatum*.

arundanum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 317.—Hispan.

arvense, Salzmann, ex DC. Prod. vi. 54 = *C. tingitanum*; *Matricaria glabra*.

Athanasia, Boiss. Fl. Orient. iii. 353 = *Tanacetum fruticosum*.

atratum, Less. Syn. Comp. 254 = *C. atratum*.

Aucheri, Heimerl, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 112.—Caria.

Aucherianum, DC. Prod. vii. 297 = *Tanacetum Aucherianum*.

auriculatum, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 327 = *C. auriculatum*.

balsaminatum, M. Ward, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1860) 532, sphalm. = seq.

Balsamita, Willd. Sp. Pl. iii. 2153 = *C. Balsamita*.

Barrelieri, Dufour, ex DC. Prod. vi. 55 = *C. coronopifolium*.

Baumanni, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 283.—Tauria.

bipinnatifidum, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = *C. anethifolium*.

bipinnatum, Willd. Sp. Pl. iii. 2160 = *C. bipinnatum*.

Bocconi, Willd. l. c. 2159 = *C. Bocconi*.

Bonplandianum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 300 = *Xanthocephalum centauroides*.

Bourgaei, Boiss. Fl. Orient. iii. 356.—Armenia.

breviradiatum, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 577 = *C. coronarium*.

breviradiatum, Schweinitz, ex Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 397 = *Matricaria discoidea*.

Broussonetii, Choisy, in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = *C. Broussonetii*.

cadmeum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 10.—Mesopot.

canescens, Boiss. Fl. Orient. iii. 353 = *Tanacetum canescens*.

cappadocicum, DC. Prod. vii. 297 = *Tanacetum cappadocicum*.

carneum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 325 = *C. coronopifolium*, Willd.

carniolicum, Dollin, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 342 = *C. corymbosum*.

cassium, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 23.—Syria.

Catananche, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 61 = *C. Catananche*.

caucasicum, Willd. Sp. Pl. iii. 2156 = *C. caucasicum*.

cedrorum, Schott & Kotschy, in Boiss. Fl. Orient. iii. 347 = *cappadocicum*.

ceratophylloides, Tenore, Fl. Nap. ii. 233 = *C. coronopifolium*.

chiliophyllum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 26, in syn.—Persia.

chiliophyllum, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 59 = *C. millefoliatum*.

chrysanthemifolium, Hort. Angl. ex DC. Prod. vi. 7 = *Anthemis parthenioides*.

cilicium, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 28.—Syria.

PYRETHRUM :—

cinerarifolium, Trev. Ind. Sem. Hort. Vratisl. App. ii. (1820) 2; et in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 204 = *Chrysanthemum cinerariaefolium*.

cinereum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 202.—Balkan.

Clausonis, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 340 = *C. paludosum*.

Clusii, Fisch. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 232; et ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 379 = *C. corymbosum*.

conicum, Less. in Linnaea, ix. (1834) 189.—Rossia.

coronopifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. 904 = *C. grandiflorum*.

corymbiferum, S. G. Gmel. Reise durch Russl. i. 115 = *C. corymbosum*?

corymbiferum, Schrank, Baier. Fl. ii. 405 = *C. corymbiferum*.

corymbosum, Kral. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 509 = *C. Webbianum*.

corymbosum, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = *C. anethifolium*.

corymbosum, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 148; Moench, Meth. 597 = *C. corymbosum*.

Cota, Eichw. Skizze, 149 = *Anthemis Cota*?

crassipes, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 172.—Soongar.

crithmifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. 903 = *C. anethifolium*.

daucifolium, Ledeb. Fl. Ross. ii. 549 = *C. daucifolium*.

Decaisneanum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 426.—Japon.

decipiens, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 48 = *Matricaria decipiens*.

defloratum, Hort. ex A. Br. in Bot. Zeit. x. (1852) 650 = *Matricaria discoidea*.

delicatulum, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 31 = *Matricaria oreades*.

densum, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. iii. 12. t. 8 = *C. densum*.

discoideum, Bess. ex DC. Prod. vi. 131 = *C. argenteum*.

discoideum, Ledeb. Ic. Fl. Ross. t. 153 = *Tanacetum Ledebourii*.

diversifolium, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—Jul. 1826) 174; et in Hook. Exot. Fl. iii. t. 215 = *Brachycome diversifolia*.

duderanum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 26 = *myriophyllum*.

dumosum, Boiss. Fl. Orient. iii. 349 = *Tanacetum dumosum*.

elegans, Pollini, in Brugnati. Giorn. Fis. ix. (1816) 101 = *C. maritimum*.

elongatum, Duch. in Journ. Soc. Hortic. (1858) 658 = *C. cinerariaefolium*.

elongatum, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 56 = *Matricaria oreades*.

elongatum, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = *C. Broussonetii*.

exaltatum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 201 = *C. trichophyllum*.

ferulaceum, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 281 = *Tanacetum ferulaceum*.

filipendulinum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 24 = *Tanacetum polycephalum*.

Fischeri, Willd. ex Nym. Consp. 372 = *C. corymbosum*.

flabellifolium, Boiss. Fl. Orient. iii. 355 = *Tanacetum flabellifolium*.

flaveolum, Hoffmgg. & Link. Fl. Port. ii. 341. t. 104.—Hispan.

flavo-virens, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 25.—Persia.

foeniculaceum, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = seq.?

foeniculaceum, Willd. Enum. Hort. Berol. 903 = *C. anethifolium*.

frutescens, Willd. Sp. Pl. iii. 2150 = *C. frutescens*.

fruticosum, Spreng. ex DC. Prod. vi. 45 = *C. praealtum*.

fruticulosum, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 338.—As. Min.

fruticulosum, Spreng. Cent. 37; Fl. Hal. Mant. 51 = *C. praealtum*.

fuscatum, Willd. Sp. Pl. iii. 2156 = *Matricaria fuscata*.

Gayanum, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 15; xxii. (1875) 61 = *C. Mawii*.

glabratum, Less. Syn. Comp. 254 = *Matricaria glabrata*.

glabrum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 48 = seq.?

glabrum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 30 = *C. paludosum*.

4 Q

PYRETHRUM:—

- graminifolium*, Guss. Pl. Rar. 349 = *Chrysanthemum graminifolium*.
grandiflorum, Holl. & Reichb. in Flora, xiii. (1830) 382 = *C. pinnatifidum*.
grandiflorum, Willd. Enum. Hort. Berol. 904 = *C. grandiflorum*.
Halleri, Willd. Sp. Pl. iii. 2152 = *C. coronopifolium*.
Heldreichianum, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 273 = *fruticulosum*, Fenzl.
heterophyllum, Baumg. ex Fuss, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 104 = *C. heterophyllum*.
hirtum, Less. Syn. Comp. 254 = *Matricaria hirta*.
hispanicum, Salzm. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 316 = *Matricaria Chamomilla*.
hispanicum, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 98 = *C. pulverulentum*.
hispidum, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 149 = *C. frutescens*.
hybridum, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. App. 9 = *C. macrophyllum*.
incanum, Ledeb. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 620 = *Tanacetum Meyerianum*.
indicum, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 149 = *C. indicum*.
indicum, Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 436 = *C. coronarium*.
inodorum, Moench, Meth. 597 = *Matricaria inodora*.
jacobaeeforme, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 331 = *C. palustre*.
Kirilowii, Turcz. in DC. Prod. vi. 61.—Sibir. baical.
Kittaryanum, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. vii. (1850) 4.—Rossia.
Kotschy, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 88.—Persia.
lanatum, Spreng. ex DC. Prod. vi. 42 = *Egletes bellidiflora*.
larvatum, Nym. Consp. 371, in syn. = *C. coronopifolium*.
latifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. 904 = *C. lacustre*.
lavandulaefolium, Fisch. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871-72) 181.—Mongol.
leptophyllum, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 580 = *Tanacetum leptophyllum*.
leucanthemiflorum, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 28 = *Tanacetum Aucherianum*.
leucanthemoides, Tausch, in Flora, xii. (1829) i. Erg. 61 = *C. atratum*.
Leucanthemum, Franch. Fl. Cher-et-Loir, 307 = *C. Leucanthemum*.
leucophyllum, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. iii. 355.—Syria.
lingulatum, Boiss. l. c. 357.—Persia.
macrocarpum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 61, nomen.—Algeria.
macrocephalum, Coss. & Dur. ex Coss. l. c. 48 = *C. trifurcatum*.
macrophyllum, Willd. Sp. Pl. iii. 2154 = *C. macrophyllum*.
macrothum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 61 = *C. macrothum*.
Mandianum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 353.—Ins. Maurit.
Maresii, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 16 = *C. Maresii*.
marginatum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 85 = *Tanacetum marginatum*.
maritimum, Sm. Fl. Brit. ii. 901 = *C. maritimum*.
matricarioides, Paxt. ex Vilhm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 264 = *C. indicum*.
maximum, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 189 = *C. laeustre*.
microcephalum, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 101.—Japan.
millefoliatum, Ledeb. Fl. Alt. iv. 120 = *Tanacetum Meyerianum*.
millefoliatum, Willd. Sp. Pl. iii. 2160 = *C. millefoliatum*.
minimum, DC. Fl. Fr. iv. 924 = *C. tomentosum*.
modestum, Heimerl, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 59.—Persia.
montanum, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 89 = *C. montanum* ?
mucronatum, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 619.—Turkestan.
mucronulatum, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 337.—Lusit.
multicaule, Willd. Sp. Pl. iii. 2158 = *C. multicaule*.

PYRETHRUM:—

- multifidum*, DC. Prod. vi. 63 = *Chrysanthemum multifidum*.
Myconis, Moench, Meth. Suppl. 247 = *C. Myconis*.
myriophyllum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 74 = *Tanacetum myriophyllum*.
nitens, Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II. iii. 30.—Armenia.
nivale, Adam, ex Spreng. Syst. iii. 585 = *Anthemis iberica*.
nivale, Sch. Bip. in Boiss. Fl. Orient. iii. 339 = *Tanacetum nivale*.
niveum, Lag. Elench. Hort. Madr. (1805); Gen. et Sp. Nov. 30 = *C. praealtum*.
oligocephalum, DC. Prod. vii. 297 = *C. millefoliatum*.
oppositifolium, Spreng. Syst. iii. 585 = *C. oppositifolium*.
orientale, Willd. Sp. Pl. iii. 2159 = *Anthemis Biebersteiniana*.
Pallasianum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 423.—As. bor.
palmatifidum, DC. Prod. vi. 54 = *Tanacetum palmatifidum*.
palustre, Willd. Sp. Pl. iii. 2154 = *C. palustre*.
parthenifolium, Willd. l. c. 2156 = *C. praealtum*.
Parthenium, Sm. Fl. Brit. ii. 900 = *C. Parthenium*.
parviflorum, Willd. Sp. Pl. iii. 2158 = *Matricaria inodora*.
paucifolium, C. A. Mey. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 340 = *C. coccineum*.
pectinatum, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xix. (1846) 180 = *Tanacetum pulchellum*.
pectinatum, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. t. 103 = *C. pectinatum*.
persicum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 89.—Persia.
pinnatifidum, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 149 = *C. grandiflorum*.
pinnatifidum, Willd. Sp. Pl. iii. 2154 = *C. multifidum*.
pinnatum, Boiss. Fl. Orient. iii. 355 = *Tanacetum pinnatum*.
platyrachis, Boiss. l. c. 356.—Persia.
polycephalum, Sch. Bip. ex Boiss. l. c. 351.—Mesopot.
polyphyllum, Boiss. l. c. = *Tanacetum millefoliatum*.
poterifolium, Ledeb. ex Nordm. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. ii. (1837) 312 = *C. corymbosum*.
Pourretii, Timb. ex Nym. Consp. 372 = *C. corymbosum*.
praecox, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 324 = *Matricaria praecox*.
procumbens, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 691 = *C. indicum*.
Pseud-anthemis, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 28 = *Tanacetum Aucherianum*.
Pseudo-parthenium, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iii. 28 = *Tanacetum nivale*.
ptarmicaeflorum, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 282.—Ins. Canar.
ptarmicaefolium, Willd. Sp. Pl. iii. 2151 = *Achillea grandiflora*.
pulchellum, Turcz. ex DC. Prod. vi. 55 = *Tanacetum pulchellum*.
pulchrum, Ledeb. l. c. Pl. Alt. i. 20. t. 84 = *Tanacetum pulchrum*.
Pulicaria, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 589 = *Lidbeckia americana*.
pulverulentum, Lag. in Varied. Cienc. ii. iv. (1805) 40 = *C. pulverulentum*.
pulverulentum, Willd. Enum. Hort. Berol. 906 = *C. praealtum*.
pumilum, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 40 = *Matricaria praecox*.
pusillum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 587 = *Matricaria praecox*.
radicans, Cav. Desc. 199 = *C. radicans*.
roseum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 324 = *C. coccineum*.
roseum, Lindl. Bot. Reg. t. 1084 = *C. coronopifolium*.
Roylei, DC. Prod. vi. 56 = *C. tibeticum*.
santolinoides, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 264 = *Tanacetum sinaicum*.
saxatile, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 382 = *C. millefoliatum*.
saxatile, Lodd. Bot. Cab. t. 126 = *C. alpinum*.
scariosum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 61.—Algeria.
segetum, Moench, Meth. 597 = *C. segetum*.
sericeum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 323 = *C. argenteum*.

PYRETHRUM:—

- serotinum*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1878) ii. 492 = *Chrysanthemum uliginosum*.
serotinum, Willd. Sp. Pl. iii. 2151 = *C. serotinum*.
setaceum, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 44.—Kokan.
seticuspe, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 423.—Japan.
setifolium, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1876) 36, nomen.—Hab. ?
silaiifolium, Stev. in DC. Prod. vi. 57 = *Matricaria grandiflora*.
simplicifolium, Willd. Sp. Pl. iii. 2151 = *Egletes domingensis*.
sinense, DC. Prod. vi. 62 = *C. sinense*.
sorbifolium, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 343.—Armenia.
spathulaefolium, J. Gay, ex Nym. Consp. 373.—Oriens.
speciosum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 60 = *C. grandiflorum*.
subcorymbosum, Schur, Bot. Rundreise (1853), 80; et in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1859) 146 = *C. subcorymbosum*.
sulphureum, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 17 = *Tanacetum sulphureum*.
syriacum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 24 = *C. densum*.
Szowitsii, Boiss. l. c. 25 = *Tanacetum myriophyllum*.
tabrisianum, Boiss. Fl. Orient. iii. 356.—Persia.
tanacetifolium, Boiss. l. c. 341 = *Tanacetum Aucherianum*.
tanacetoides, DC. Prod. vi. 59 = *Tanacetum Meyerianum*.
Tanacetum, DC. l. c. 63 = *C. Balsamita*.
Tchihatshewii, Hort. ex Clémenc. in Rev. Hortic. (1869) 380.—Oriens ?
tenuifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. 906 = *C. corymbosum*.
tenuilobum, Boiss. Fl. Orient. iii. 352 = *Tanacetum Aucheri*.
tenuisectum, Boiss. l. c. 338.—Persia.
tenuissimum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 392.—Turkest.
tibeticum, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 147 = *C. tibeticum*.
tingitanum, DC. Prod. vi. 54 = *C. tingitanum*.
tomentellum, Boiss. Fl. Orient. iii. 354 = *Tanacetum tomentellum*.
tomentosum, [Clairv]. Man. Herb. 247 = *C. alpinum*.
tomentosum, DC. Fl. Fr. Suppl. 477 = *C. tomentosum*.
transiliense, Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 618.—Turkestan.
trichophyllum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 201 = *C. trichophyllum* ?
trifurcatum, Willd. Sp. Pl. iii. 2158 = *C. trifurcatum*.
Turreyanum, Less. Syn. Comp. 254 = *C. cinerariaefolium*.
uliginosum, Waldst. & Kit. in Willd. Sp. Pl. iii. 2152 = *C. uliginosum*.
umbelliferum, Boiss. Fl. Orient. iii. 352 = *Tanacetum umbelliferum*.
umbrosum, Boiss. l. c. 357 = *C. umbrosum*.
uniflorum, Fisch. & Mey. in DC. Prod. vi. 60 = *Tanacetum uniflorum*.
Vahlil, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 29 = *Tanacetum Vahlil*.
velutinum, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1865) i. 419 = *C. bipinnatum*.
versicolor, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 98 = *C. pulverulentum*.
vulgare, Boiss. Fl. Orient. iii. 352 = *Tanacetum vulgare*.
Waldsteinii, Janka, in Just. Jahresb. iv. (1878) 1062 = *C. rotundifolium*.
Webbianum, Coss. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 509 = *C. Webbianum*.
Willemoti, Dueh. in Journ. Soc. Hortic. (1859) 210 = *C. cinerariaefolium*.
Willkommii, Sch. Bip. ex Nym. Syll. 11 = *Tanacetum Vahlil*.
Zawadskii, Nym. l. c. = *C. Zawadskii*.

PYRETHRUM, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. iii. (1775) 237. t. 18 = *Spilanthes*, Jacq. (Compos.).
Acnella, Medic. l. c. 243. t. 19 = *S. Acnella*.
bidens, Medic. l. c. 241. t. 18 = seq. ?
Spilanthes, Medic. l. c. 242 = *S. oleracea*.

PYRGOSEA, Eckl. & Zeyh. Enum. 298 (1837) = **PURGOSEA**, Haw. = **Crassula**, Linn.

PYRGUS, Lour. Fl. Cochinch. 120 (1790) = **Ardisia**, Sw. (Myrsin).
racemosa, Lour. l. c. 121 = **A. Pyrgus**.

PYROLA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 123 (1737). **ERICACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 602.

ACTINOCYCLUS, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1857) 14.
AMELIA, Alefeld, in Linnaea, xxviii. (1856) 25.
ERXLEBENIA, Opiz, Seznam, 41 (1852).
RAMISCHIA, Opiz, l. c. 82 (1852).
THELAIA, Alefeld, in Linnaea, xxviii. (1856) 33.
americana, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. II. 341 = **rotundifolia**.
angustifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 283. — Mexic.

aphylla, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 7. — Am. bor.
asarifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 251 = **rotundifolia**.
asarifolia, Radius, Diss. 23. t. 4 = **chlorantha**.
bracteata, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 47 = **rotundifolia**.
chlorantha, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1810) 190. t. 5. — Europ.; Am. bor.
conferta, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 930 = **minor**.
conferta, Willd. ex DC. Prod. vii. 773 = **rotundifolia**.
convoluta, Barton, Fl. Philad. Prod. 50 = **chlorantha**.
corymbosa, Bertol. Misc. Bot. iii. 12 = **Chimaphila umbellata**.

declinata, Moench, Meth. 71 = **rotundifolia**.
dentata, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 6 = **picta**.
Durandi, Rafin. Atl. Journ. 119 (Quid?). — Am. bor.
elata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 270 = **rotundifolia**.

elliptica, Nutt. Gen. Am. i. 273. — Am. bor.
flexuosa, Rafin. Atl. Journ. 151 (Quid?). — Am. bor.
frutescens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 195 = **Chimaphila umbellata**.
fruticosa, Eschsch. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 924 = **Cladanthamnus pyrolaeiflorus**.

grandiflora, Radius, Diss. 27. t. 3. f. 2 = **rotundifolia**.
greenlandica, Hornem. in Fl. Dan. t. 1817 = **rotundifolia**.

Halleri, Steud. Nom. ed. II. ii. 422 = **Moneses grandiflora**.

hybrida, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 588 = **secunda**.
incarnata, Fisch. ex DC. Prod. vii. 773 = **rotundifolia**.
intermedia, Schlecht. Cat. ed. III. 23 = **minor**.
Liebmannii, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867) 113. t. 1. — Mexic.

maculata, Linn. Sp. Pl. 396 = **Chimaphila maculata**.
magna, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 928 = **rotundifolia**.

major, Lam. Fl. Fr. ii. 530 = **rotundifolia**.
maritima, Kenyon, in Phytol. ii. (1847) 727 = **rotundifolia**.

media, Hayne, Arzneigew. iv. 22 = **chlorantha**.
media, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1804) 257. — Europ.; Reg. Caucas.

Menziesii, R. Br. ex D. Don, in Mem. Wern. Soc. v. (1824) 245 = **Chimaphila Menziesii**.

minor, Gilib. ex DC. Prod. vii. 773 = **rotundifolia**.
minor, Linn. Sp. Pl. 396. — Reg. bor. temp.
minor, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 299 = **chlorantha**.
noveboracensis, Colden, ex Torr. Fl. N. U. St. i. 432 = **rotundifolia**.

obovata, Bertol. Misc. Bot. iii. 11 = **rotundifolia**.
occidentalis, R. Br. ex D. Don, in Mem. Wern. Soc. v. (1824) 282 = **chlorantha**.

ovalifolia, Schur, Enum. Pl. Transs. 449 = **rotundifolia**.
oxypetala, C. F. Austin, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 302. — Am. bor.

picta, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 8. — Am. bor.
pumila, Hornem. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 514 = **rotundifolia**.

renifolia, Maxim. Prim. Fl. Amur. 190. — Manchuria.
reticulata, Rafin. ex DC. Prod. vii. 773 = **elliptica**.

rosea, Sm. Engl. Bot. t. 2543 = **minor**.
rotundifolia, Benth. Pl. Hartw. 66 = **angustifolia**.
rotundifolia, Linn. Sp. Pl. 396. — Reg. bor. temp.

rotundifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 251, partim = **elliptica**.

rotundifolia, Oed. in Fl. Dan. t. 110 = **media**.
rotundifolia, Pall. ex DC. Prod. vii. 774 = **minor**.
rotundifolia, Sturm, Deutschl. Fl. Heft 13 = **chlorantha**.

PYROLA :—

Sartori, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 283. — Mexic.

secunda, Linn. Sp. Pl. 396. — Reg. bor. temp.
serotina, Melicocq, in Ann. Pas-de-Calais (1848-49), 223. — Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. i. (1854) 162 = **rotundifolia**.

subaphylla, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xi. (1867) 433. — Japon.

uliginosa, Torr. & Gray, ex Torr. Fl. N. York, i. 453 = **rotundifolia**.

umbellata, Linn. Sp. Pl. 396 = **Chimaphila umbellata**.
uniflora, Linn. l. c. 397 = **Moneses grandiflora**.

urceolata, Poir. Encyc. v. 743 = **Galax aphylla**.
verticillata, Schurr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 88 = **Moneses grandiflora**.

virens, Schweig. & Koerte, Fl. Erlang. Add. 154 = **chlorantha**.

PYROLIRION, Herb. App. [Bot. Reg.] 37 (1821) = **Zephyranthes**, Herb. (Amaryll.).

albicans, Herb. Amaryll. 184. — Peruv.
aurantiacum, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) t. 377. Misc. 27. — Peruv.

aureum, Herb. App. [Bot. Reg.] 37 = **Z. aurea**.
flammeum, Herb. l. c. — Peruv.
flavum, Herb. l. c. — Peruv.

tubiflorum, M. Roem. Syn. Ens. 127 = **Z. aurea**.

PYROPHORUM, DC. Prod. ii. 633 (1825) = **PIROPHORUM**, Neck. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

PYROPSIS, Hort. ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 22 (1840) = **Madia**, Molina (Compos.).

elegans, Hort. ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. l. c. = **M. elegans**.

PYROSPERMUM, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 402 (1860) = **Kurrimia**, Wall. (Celastr.).

calophyllum, Miq. l. c. = **K. paniculata**.

PYROSTEGIA, Presl, (Bot. Bemerk. 93 (1844)); in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 523 = **Bignonia**, Tourn.

acuminata, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 188, nomen. — Bras.
amabilis, Miers, l. c. — Guian.

dichotoma, Miers, l. c. = **B. dichotoma**, Vell.
ignea, Presl, Bot. Bemerk. 93 = **B. ignea**.

intaminata, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 188, nomen. — Bras.
lauta, Miers, l. c. — Bras.

longiflora, Miers, l. c. = **B. longiflora**.
ornata, Miers, l. c. = **B. ornata**.

pallida, Miers, l. c. = **B. pallida**.
parvifolia, Miers, l. c. — Bras.
puberula, Miers, l. c. — Bras.

reticulata, Miers, l. c. — Paraguay.
venusta, Miers, l. c. = **B. venusta**.

PYROSTOMA, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 219 (1818) = **Vitex**, Linn. (Verbenac.).

ternatum, G. F. W. Mey. l. c. 220 = **V. triflora**.

PYROSTRIA, Comm. ex Juss. Gen. 206 (1789). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 111.

Commerzonii, f. F. Gmel. Syst. 246. — Ins. Maurit.
comorensis, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 146 = **Plectronia bibracteata**.

cordifolia, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 216 = **macrophylla**.

fasciculata, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 148. — Ins. Mascar.
lancifolia, Boj. ex Baker, l. c. 149. — Ins. Mascar.

macrophylla, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 217. — Ins. Maurit.
obliqua, Boj. & Baker, Fl. Maurit. 149 = **fasciculata**.

oleoides, Boj. Hort. Maurit. 170 = **seq. ?**
oleoides, Lam. Illustr. i. 289 = **Commerzonii**.
orbicularis, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 216 = **macrophylla**.

polymorpha, A. Rich. l. c. 217. — Ins. Maurit.
salicifolia, Willd. Sp. Pl. i. 614; Pers. Syn. i. 131 = **Commerzonii**.

spinosa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 313 = **Vangueria spinosa**.
trilocularis, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 14. — Ins. Rodrig.
umbellata, Boj. Hort. Maurit. 170 = **Plectronia umbellata**.

PYROSTRIA, Roxb. Hort. Beng. 83 (1814); Fl. Ind. i. 403 (1832) = **Timonius**, Rumph. (Rubiace.).

hexasperma, Roxb. ll. cc. = **T. Rumphii**?

PYROTHECA, Steud. Nom. ed. II. ii. 422 (1841), sphalm. = **GYROTHECA**, Salisb. = **Lachnanthes**, Ell. (Haemod.).

tinctoria, Steud. l. c. = **L. tinctoria**.

PYRRANTHUS, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 615, in syn. (1854) = **seq.**

PYRRHANTHUS, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 57 = **Lumnitzera**, Willd. (Combret.).

albus, Wall. Cat. n. 4019 = **L. racemosa**.
littoreus, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 57 = **L. coccinea**.

PYRRHEIMA, Hassk. in Flora, lii. (1869) 366 = **Tradescantia**, Linn. (Commel.).

Loddigesii, Hassk. l. c. 367 = **T. fuscata**.
minus, Hassk. l. c. 368 = **T. fuscata**.

PYRRHOCOMA, Walp. Rep. ii. 593 (1843) = **PYRRHOCOMA**, Hook. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

PYRRHOPAPPUS, DC. Prod. vii. 144 (1838). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 523.

SITILIAS, Rafin. New Fl. Am. iv. 85 (1836).
carolinianus, DC. Prod. vii. 144. — Am. bor.

grandiflorus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 430 = **scaposus**.

multicaulis, Curtiss, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 441 = **carolinianus**.

multicaulis, DC. Prod. vii. 144. — Texas; Mexic.
pauciflorus, DC. l. c. — Mexic.

Rothrockii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 80. — Arizona.
scaposus, DC. Prod. vii. 144. — Am. bor. occ.

Sessaeanus, DC. l. c. — Mexic.
taraxacoides, DC. l. c. 145 (al. gen.). — Afr. austr.

PYRRHOPAPPUS, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 463 (1847) = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).

Hochstetteri, A. Rich. l. c. = **L. capensis**.
humilis, A. Rich. l. c. = **L. humilis**.

PYRRHOSA, Endl. Gen. 830 (1839) = **Myristica**, Linn.

Horsfieldii, Wight, Ic. t. 1857 = **M. Horsfieldia**.

PYRRHOTRICHIA, Wight & Arn. Prod. 238 (1834) = **Eriosema**, DC. (Legumin.).

tuberosa, Wight & Arn. l. c. = **E. chinense**.

PYRROCOMA, Hook. Fl. Bor. Am. i. 306. t. 107 (1833) = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

angustifolia, DC. Prod. v. 351. — Chili.
arguta, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 244 = **A. racemosus**.

aurea, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 733. — Chili.
Bezanillana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 65. — Chili.

canescens, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 730. — Chili.
carthamoides, Hook. Fl. Bor. Am. i. 307 = **A. carthamoides**.

Cerberoana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 66. — Chili.
denticulata, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 730. — Chili.

foliosa, Phil. l. c. 732. — Chili.
foliosa, Torr. & Gray, ex Duch. Rev. Bot. i. (1845-46) 81 = **A. Fremonti**.

glomerata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 244 = **A. racemosus**.
grindelioides, DC. Prod. v. 350 = **A. squarrosus**.

ilicifolia, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 67 = **A. Remyanus**.
linifolia, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 730. — Chili.

longipes, Phil. l. c. 733. — Chili.
Macraeana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 64. — Chili.

Menziesii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 351 = **Bigelovia veneta**.
Nuttallii, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 67 = **A. pinnatifidus**.

PYRROCOMA:—

- paniculata*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 244 = *Aplopappus racemosus*.
parvifolia, DC. Prod. v. 351.—Chili.
pinca, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 731.—Chili.
pristiphylla, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 65.—Chili.
racemosa, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 244 = *A. racemosus*.
radiata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 333 = *A. carthamoides*.
reticulata, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 731.—Chili.
rigida, Phil. l. c. 732.—Chili.
saxatilis, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 64.—Chili.
setigera, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 733.—Chili.

PYRROTRICHIA, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 219 (1876) = *praece*.

PYRULARIA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 231 (1803).

- SANTALACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 223.
 CALINUX, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352.
 HAMILTONIA, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 1114 (1805).
 SPHAEROCARYA, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 371 (1824).
ceylanica, A. DC. in DC. Prod. xiv. 629 = *Scleropyrum Wallichianum*.
edulis, A. DC. l. c. 628.—Reg. Himal.
moschifera, A. DC. l. c. 629.—Java.
oleifera, A. Gray, ex Champ. Fl. S. U. St. 396 = *seq.*
pubera, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 231.—Am. bor.
Wallichiana, A. DC. in DC. Prod. xiv. 629 = *Scleropyrum Wallichianum*.

PYRUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). ROSA-

- CEAE, Benth. & Hook. f. i. 626.
 APIOPHORUM, Neck. Elem. ii. 72 (1790).
 ARIA, M. Roem. Fam. Rosif. iii. 101, 124 (1847).
 AZAROLUS, Borchh. Handb. Forstb. ii. 1224 (1803).
 CHAENOMELES, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 97.
 CHAMAEMESPIBUS, Medic. Phil. Bot. i. 138, 135 (1789).
 CYDONIA, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752).
 ERIOLOBUS, M. Roem. Fam. Rosif. iii. 104, 216 (1847).
 HAHNIA, Medic. Gesch. 81 (1793).
 LAZAROLUS, Medic. Phil. Bot. i. 15 (1789).
 MALUS, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 145, in syn. (1737); Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).
 MESILOPHORA, Neck. Elem. ii. 73 (1790).
 MESPIBUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. (1735).
 MICROMELES, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. (1874) 168.
 PIROPHORUM, Neck. Elem. ii. 72 (1790).
 PYRENIA, [Clairv.] Man. Herb. 161 (1811).
 SORBUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
 TORMINALIS, Medic. Phil. Bot. i. 134, 155 (1789).
 TORMINARIA, M. Roem. Fam. Rosif. iii. 101, 130 (1847).

- acerba*, DC. Prod. ii. 635 = *P. Malus*.
Achras, Gaertn. Fruct. ii. 44. t. 87 = *communis*.
aestivalis, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 279 = *communis*.
albicans, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 583 = *slavonica*.
alnifolia, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 350.—Japan.
alnifolia, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1821) 98 = *Amelanchier alnifolia*.
alpina, Willd. Enum. Hort. Berol. 527 = *P. Chamaemespilus*?
Amelanchier, Du Roi, Harbk. Baumz. ii. 219; Lam. Fl. Fr. iii. 492; Linn. f. Suppl. 256 = *Amelanchier vulgaris*.
Amelanchier, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 181 = *Amelanchier canadensis*.
americana, Cooper, in Am. Natural. iii. (1870) 406 = *sambucifolia*.
americana, DC. Prod. ii. 637; Spreng. Syst. ii. 511.—Am. bor.
amygdaliformis, Vill. Cat. Hort. Argent. 323.—Europ. austr.; As. Min.
amygdaloides, Link, Handb. ii. 80, sphalm. = *praece*.
angulata, Kit. ex Rochel, Bot. Reise Banat. 73; et in Linnaea, xxxii. (1863) 583.—Europ.

PYRUS:—

- angustifolia*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 176.—Am. bor.
angustifolia, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 359 = *Bovei*.
anthyllidifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 29 = *Osteomeles anthyllidifolia*.
apetala, Munchh. Hausv. v. 247 = *P. Malus*.
apiosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = *P. Malus*.
arbutifolia, Linn. f. Suppl. 256.—Am. bor.
arctica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = *P. Aria*.
arguta, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 490 = *intermedia*.
Aria, Brandis, For. Fl. 206 = *lanata*.
Aria, Ehrh. Beitr. iv. 20.—Europ.; As. bor.
Aria, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 375 = *vestita*.
Aria, Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) ii. 21 = *sudetica*.
armeniacaefolia, Dochn. Obst. i. 16 = *P. Malus*.
astracantha, DC. Prod. ii. 635 = *P. Malus*.
atrovirens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 194 = *rotundifolia*.
Aucuparia, Ehrh. Plantag. 20; ex ej. Beitr. vi. 94; Gaertn. Fruct. ii. 45. t. 87.—Europ.; As. bor.
Aucuparia, E. Mey. Pl. Labrad. 81 = *americana*, *sambucifolia*.
auricularis, Knoop, Pomol. ii. 38. t. 4 = *P. Pollveria*.
auriculata, DC. Prod. ii. 636 = *pinnatifida*?
Azarolus, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 347 = *Crataegus Azarolus*.
baccata, Hort. ex Hoffm. Verz. Pfl. 104 = *rubicunda*.
baccata, Linn. Mant. i. 75.—Reg. Himal.; As. bor.
badensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = *P. Aria*.
Balsanae, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 6 = *communis*.
barauyensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 582 (Quid?).—Europ. austr.
Bartramiana, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 715 = *Amelanchier canadensis*.
betulaefolia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 101.—China.
Boissieriana, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 87 = *cordata*.
Bollwylleriana, DC. Fl. Fr. Suppl. 530 = *P. Pollveria*.
Botryapium, Linn. f. Suppl. 255 = *Amelanchier canadensis*.
Bourgaeana, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 2 = *communis*.
Boveana, Decne. l. c. t. 10 = *Bovei*.
Bovei, Steud. Nom. ed. II. ii. 423.—Syria.
brachypoda, Kern. ex Wenzig, in Linnaea, xxxviii. (1874) 17 = *communis*.
Calleryana, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. sub t. 8.—Japan.
canadensis, Billb. in Linneska Samfund, i. 1832 (1833) 24 = *arbutifolia*, *Amelanchier canadensis*.
canescens, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 129 = *communis*.
canoplia, Guss. ex Decne. Jard. Fruit. Mus. i. sub t. 13 = *amygdaliformis*.
capitata, Hort. ex Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 232 = *arbutifolia*.
castanea, Steud. Nom. ed. I. 670, sphalm. = *cestiana*.
castaneifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 379.—Reg. Himal.
Caucasi, Gueldenst. Reisen, i. 423 (Quid?).—Reg. Cauc.
cavillea, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = *P. Malus*.
cerasifera, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 714.—Sibir.
ceratocarpa, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1830) 254 = *prunifolia*.
cestiana, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670, in syn. = *P. Malus*.
Chamaemespilus, Ehrh. Beitr. iv. 19.—Europ.
chinensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670, in syn. = *communis*.
chinensis, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 511 = *sinensis*, Lindl.
chinensis, Spreng. Syst. ii. 510 = *sinensis*, Poir.
ciliata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 582 (Quid?).—Europ. austr.
communis, Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 31, partim = *cordata*.
communis, Gouan, Hort. Monsp. 242 = *amygdaliformis*.
communis, Linn. Sp. Pl. 479.—Europ.; As. bor.; Reg. Himal.
communis, Thunb. Fl. Jap. 207 = *sinensis*, Lindl.

PYRUS:—

- cordata*, Desv. Obs. Pl. Anj. 152.—Gallia; Persia.
coronaria, Linn. Sp. Pl. 480.—Am. bor.
coronaria, Wangenh. Nord-Am. Holzart. 61. t. 21. f. 47 = *angustifolia*.
corymbosus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 234 = *communis*.
Cotoneaster, Moench, Meth. 681 = *Cotoneaster integerrima*.
crataegifolia, Targ.-Tozz. ex Savi, Tratt. Alb. Tosc. ed. II. i. 169.—Ital.
crenata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 237 = *communis*?
crenata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = *P. Aria*.
crenata, Lindl. Bot. Reg. t. 1655 = *vestita*.
cretica, Hort. ex C. Koch, l. c. = *P. Aria*.
cretica, Willd. Sp. Pl. ii. 1015 = *Amelanchier vulgaris*.
csikloveusis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 583 (Quid?).—Europ. austr.
cuneifolia, Guss. Pl. Rar. 202 = *amygdaliformis*.
cuspidata, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iv. (1864) 311.—Reg. Himal.
Cydonia, Linn. Sp. Pl. 480.—Reg. Mediterr. et Cauc.
dasyphylla, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 604; Borchh. Handb. Forstb. ii. 1269 = *P. Malus*.
decipiens, Bechst. Forstb. ed. V. (1843) 152 = *rotundifolia*.
densiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 423.—Hab.?
denticulata, Hort. Angl. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 435.—China.
depressa, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 230 = *arbutifolia*.
dioica, Moench, Verz. 87 = *P. Malus*.
discolor, Maxim. Prim. Fl. Amur. 103 = *P. Aucuparia*.
diversifolia, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 183 = *rivularis*.
divisa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 38 = *P. Malus*.
domestica, Ehrh. Plantag. p. 20; ex ej. Beitr. vi. 95 = *P. Sorbus*.
domestica, Medic. Gesch. 87; Borchh. in Roem. Arch. i. iii. 90 = *communis*.
edulis, Willd. Enum. Hort. Berol. 527; Wats. Dendrol. Brit. i. 52 = *P. Aria*.
elaeagnifolia, Steud. Nom. ed. I. 670 = *seq.*
elaeagnifolia, Pall. in Nov. Act. Petrop. vii. (1789) 355. t. 10.—As. Min.
epirotica, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = *P. Malus*.
eriopileura, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 630 = *amygdaliformis*.
eriostyla, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 154 = *P. Malus*.
falerna, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = *communis*.
favonia, Hort. ex Steud. l. c. = *communis*.
fennica, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 111 = *pinnatifida*.
ferruginea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 379.—Reg. Himal.
florentina, Targ.-Tozz. in Mem. Soc. Mod. xx. II. (1829) 302. t. 5 = *crataegifolia*.
floribunda, Lindl. Bot. Reg. t. 1006 = *arbutifolia*.
foliolosa, Wall. Cat. n. 677, partim = *Wallichii*.
foliolosa, Wall. Pl. As. Rar. ii. 81. t. 189.—Reg. Himal.
Fontanesiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 423 = *P. Malus*.
fraxinifolia, Cooper, in Am. Natural. iii. (1870) 406 = *sambucifolia*?
fusca, Rafin. Med. Fl. ii. 254 = *rivularis*.
germanica, Hook. f. Stud. Fl. ed. I. 127.—Europ. or.; Oriens.
glabra, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 53.—Persia.
glandulosa, Moench, Meth. 680 = *Crataegus coccinea*.
glutinosa, Madiot, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 423 (Quid?).—Hab.?
gracilis, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 131 = *sambucifolia*.
graeca, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 423 = *P. Aria*.
grandifolia, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 233; Bot. Reg. t. 1154 = *arbutifolia*.
granulosa, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iv. (1864) 312.—Reg. Himal.
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 377.—Reg. Himal.
hadiensis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 212.—Arabia.
heterophylla, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 581.—Turkestan.
heterophylla, Steud. Nom. ed. II. ii. 423.—Hab.?
Hoggii, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 349 = *Tschonoskii*.

PYRUS:—

- hortensis*, Mill. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 339, nomen = communis?
Hostii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = P. Aria.
hyberna, Pall. Reise in Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 349 (Quid?).—Rossia.
hybrida, Moench, Verz. 90. t. 6 = spuria.
hybrida, Sm. Fl. Brit. ii. 534 = pinnatifida.
hybrida, Steud. Nom. ed. I. 670 = prunifolia.
hyemalis, Hort. ex C. Koch, Hort. Dendrol. 183, in adnot.—Hab.?
incana, C. Koch, Dendrol. i. 217.—Armenia.
indica, Coleb. in Wall. Pl. As. Rar. ii. 56 = Docynia indica.
indica, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 511 = seq.
insignis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 377.—Reg. Himal.
integerrima, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 237 = Photinia integrifolia.
intermedia, Bechst. Diana. iv. 110 = rotundifolia.
intermedia, Ehrh. Beitr. iv. 20.—Europ.
intermedia, Soyer-Willem. ex Nym. Consp. 242 = latifolia.
intermedia, Tenore, Fl. Nap. iv. 279 = Crataegus tomentosa?
irregularis, DuRoi, Harbk. Baumz. ii. 216 = P. Pollveria.
Jacquemontiana, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 8.—Reg. Himal.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 207.—Japon.
Kaido, Siebold, ex C. Koch, Dendrol. i. 209 = spectabilis.
kamounensis, Wall. Cat. n. 678 = lanata.
karensium, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 306 = granulosa.
khasiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 378.—Reg. Himal.
Kotschyana, Boiss. ex Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 18 = elaeagrifolia.
kumaonensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 375, sphalm. = kamounensis.
Kumaoni, Decne. Jard. Fruit. Mus. sub t. 7.—Reg. Himal.
lanata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 237.—Reg. Himal.
lanuginosa, DC. Prod. ii. 637.—Hungar.
latifolia, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 424 = intermedia.
latifolia, Syme, in Bot. Exch. Club Rep. 1872-4 (1875) 19 = rotundifolia.
liquescens, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = communis.
lobata, C. Koch, Hort. Dendrol. i. 182 = Docynia indica.
longipes, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 310.—Alger.
Ludoviciana, Rafin. Fl. Ludov. 158 (Quid?).—Am. bor.
lusitanica, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Cydonia.
malifolia, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 131 = P. Cydonia.
maliformis, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Cydonia.
Malus, Linn. Sp. Pl. 479.—Europ.; As. bor.; Reg. Himal.
marginata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 582 = ciliata.
matrensis, Kit. l. c. (Quid?).—Hungar.
Maulei, Mast. in Gard. Chron. i. (1874) 756 = japonica.
melanocarpa, Willd. Enum. Hort. Berol. 525 = arbutifolia.
Mengo, Siebold, ex C. Koch, Dendrol. i. 213 = Sieboldi.
meridionalis, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 11. 831 = P. Aria.
Michauxii, Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 452 = amygdaliformis.
Michauxii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 216 = communis.
micrantha, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 351.—Japon.
microcarpa, DC. Prod. ii. 636; Spreng. Syst. ii. 511 = americana.
microcarpa, Wendl. ex C. Koch, Dendrol. i. 211 = baccata.
microphylla, Wall. Cat. n. 676.—Reg. Himal.
mitis, Syme, Engl. Bot. ed. III. iii. 256 = P. Malus.
montana, Hort. ex C. Koch, Hort. Dendrol. 183, in adnot.—Hab.?
Montis-Sinai, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = amygdaliformis.

PYRUS:—

- nebrodensis*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 569 = Cotoneaster nebrodensis.
nepalensis, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 374 = P. Pashia.
nepalensis, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 202 = P. Aria.
Neumanniana, Tausch, in Flora, xxi. (1838) i. Beibl. 76 = Amelanchier canadensis?
nivalis, Jacq. Fl. Austr. ii. 4 = communis.
nivalis, Lindl. Bot. Reg. t. 1484 = amygdaliformis.
nivalis, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 1014 = elaeagrifolia.
Nussia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 237 = Stranvaesia glaucescens.
oblonga, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Cydonia.
oblongifolia, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 128 = amygdaliformis.
obtusata, Steud. Nom. ed. II. ii. 424.—Hab.?
odorata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = P. Aria.
oleaeifolia, Hort. l. c. 216 = communis.
olivaefolia, Hort. l. c. = communis.
orientalis, Hort. ex Nois. Cat. (1812); ex Thouin, in Mém. Mus. Par. i. (1815) 171 = amygdaliformis.
orientalis, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. ii. 88, 188, 222, 236, 453 (Quid?).—Rossia.
ovalis, Willd. Berl. Baumz. ed. I. 259 = Amelanchier canadensis.
paradisica, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Malus.
parasomila, Hort. l. c. 671 = P. Malus.
parviflora, Desf. in Ann. Mus. Par. xii. (1808) 52 = amygdaliformis.
Pashia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 236.—Reg. Himal.
pensylvanica, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 671 (Quid?).—Am. bor.
pensylvanica, Hort. ex Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 231 = arbutifolia.
persica, Pers. Syn. ii. 40 = elaeagrifolia.
pinnatifida, Ehrh. Plantag. p. 22; ex ej. Beitr. vi. 93.—Europ. bor.
pinnatifida, Sm. Engl. Bot. t. 2331, partim = P. Aria.
Piraster, Borkh. Handb. Forstbot. ii. 1287 = communis.
pohuashanensis, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 132 = P. Aucuparia.
Pollveria, Lej. Fl. Spa. ii. 311; Rev. Fl. Spa. 94 = P. Malus.
Pollveria, Linn. Mant. ii. 244.—Europ.
Pollwilleriana, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1251 = praec.
Pollweriana, Rev. Hort. (1885) 416. f. 76, 78 = praec.
Pollwilleriana, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 31 = praec.
Pollwylleriana, Link, Handb. ii. 80; Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 205 = praec.
polonica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = prunifolia.
polycarpa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 378.—Reg. Himal.
pompejana, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = communis.
praecox, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1484 = amygdaliformis.
praecox, Pall. Fl. Ross. i. 22 = P. Malus.
praemorsa, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 560 = P. Aucuparia.
prasomila, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670, in syn. = P. Malus.
prunifolia, Hort. ex Steud. l. c. ed. II. ii. 424 = arbutifolia.
prunifolia, Willd. Phyt. 8.—Sibir.
pubens, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 232 = arbutifolia.
pulverulenta, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = P. Malus.
pumila, Hort. l. c. 203 = P. Malus.
pumila, Neum. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) i. Beibl. 77 = arbutifolia.
pyraina, Rafin. ex Decne. Jard. Fruit. Mus. i. sub t. 13 = amygdaliformis.
pyramidalis, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = communis.
Pyraster, Medic. Gesch. 87; Borkh. in Roem. Arch. i. III. (1798) 90 = communis.
quinqueflora, Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 647.—Ind. or.

PYRUS:—

- ramnoides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 377.—Reg. Himal.
Ringo, Wenzig, in Linnaea, xxxviii. (1874) 37.—Japon.
Riversii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 209 = spectabilis.
rivularis, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 203. t. 68.—Am. bor. occ.
rotundifolia, Auct. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = Amelanchier vulgaris.
rotundifolia, Moench, Meth. 680; Bechst. Forstbot. ed. V. 152.—Europ.
rubelliana, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = P. Malus.
rubicunda, Hoffm. Verz. Pfl. 192.—Sibir.
rufescens, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = communis.
rupicola, Syme, Engl. Bot. ed. III. iii. 244 = P. Aria.
salicifolia, Balb. in Mém. Acad. Turin, 1805-8 (1809), 216; Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 344 (1809) = amygdaliformis.
salicifolia, Habl. Taur. 107; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 390 = elaeagrifolia.
salicifolia, Pall. Reise, iii. 734.—Reg. Caucas.
salviaefolia, Petter, Bot. Wegw. Spalato, 103 = amygdaliformis.
salvifolia, DC. Prod. ii. 634.—Gallia.
sambucifolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 36.—As. bor. or.; Am. bor.
sanguinea, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 340 = Amelanchier alnifolia, canadensis.
sanguisorbifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 120 = Amelanchier vulgaris.
saracenia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 219 = persica.
sativa, C. Koch, l. c. 215 = communis.
sativa, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 23 (Quid?).—Java.
saxatilis, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 97 = Sieversii.
scabiosa, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 23 = Pygeum parviflorum?
scandica, Aschers. Fl. Brandenb. 207 = intermedia.
scandica, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 111 = rotundifolia.
semilobata, Bechst. Forstbot. ed. V. 152 = rotundifolia.
semipinnata, Bechst. l. c. 153 = intermedia.
semipinnata, Roth, Enum. Pl. Phan. Germ. ii. 438.—Europ.
sempervirens, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 35 = angustifolia.
septiloba, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 121 = torminalis.
sibirica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = prunifolia.
sicula, Tineo, Cat. Hort. Panorm. (1827) 208 = amygdaliformis.
Sieboldi, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 51.—Japon.
Sieversii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = prunifolia.
Sieversii, Ledeb. Fl. Alt. ii. 222.—Sibir. altaic.; Reg. Himal.
sikkimensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 373.—Reg. Himal.
sikkimensis, Hook. f. l. c. 377, 378, in syn. = granulosa, Griffithii.
Simonii, Carr. in Rev. Hort. (1872) 28.—China.
Sinai, Desf. Hist. Arb. ii. 144 = amygdaliformis.
sinaica, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 435; Thouin, in Mém. Mus. Par. i. (1815) 170. t. 9 = amygdaliformis.
sinensis, Dum.-Cours. l. c. 428 = spectabilis.
sinensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 215 = communis.
sinensis, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 396.—China.
sinensis, Poir. Encyc. Suppl. iv. 452 (sp. div.).—China.
sinica, Royle, Illustr. Bot. Himal. 206 = sinensis, Lindl.
slavonica, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 583.—Europ. austr.
sorbifolia, Bosc, ex Wats. Dendrol. i. t. 53 = pinnatifida.
sorbifolia, Cham. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 343.—Kamtschat.
Sorbus, Gaertn. Fruct. ii. 45. t. 87.—Europ.; Afr. bor.

PYRUS :—

- spectabilis, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 175.—China.
sphaerocarpa, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. (1835).
 —Cf. Linnaea, xi. (1837) Litt. 92 = baccata.
spinosa, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 211.—Anatolia.
spuria, DC. *Prod.* ii. 637.—Hab.?
stipulacea, Hort. ex Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 662 (Quid?).—Reg. Himal.
suaveolens, Wender. in Linnaea, v. (1830) Litt. 55 = coronaria.
subcordata, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 95 = rivularis.
sudetica, Tausch, in *Flora*, xvii. (1834) 76.—Suecia.
subfusca, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* i. (1870) 126.—Rossia.
suecica, Roehl. ex Steud. *Nom.* ed. I. 671; Garcke, *Fl. Deutschl.* ed. IX. 140 = intermedia.
Sumboschia, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 196 = P. Cydonia.
sylvestris, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 562 = P. Malus.
sylvestris, Moench, *Meth.* 679 = communis.
syriaca, Boiss. *Diagn.* Ser. I. x. 1.—As. Min.; Syria.
syriensis, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 581.—Europ. austr.
Tardewieta, Lamotte, *Prod. Fl. Centr. Fr.* i. 280 = communis.
tenuifolia, Stokes, *Bot. Mat. Med.* iii. 120 = Amelanchier canadensis.
Thomsoni, King, ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 379.—Reg. Himal.
thuringiaca, Ilse, ex Nym. *Consp.* 241 = pinnatifida.
tianschanica, Franch. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* VI. xvi. (1883) 287.—Turkestan.
Tinei, Todaro, ex Decne. *Jard. Fruit. Mus.* i. sub t. 13 = amygdaliformis.
tomentosa, DC. *Prod.* ii. 637.—Sibir.
tomentosa, Moench, *Meth.* 680 = P. Pollveria.
tomentosa, Roxb. *Fl. Ind.* ii. 512.—Persia.
Toringo, Siebold, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 41 = Sieboldi.
torminalis, Ehrh. *Beitr.* vi. 92.—Europ.
trilobata, DC. *Prod.* ii. 636.—Syria.
Tschonoskii, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xix. (1874) 169.—Japon.
turkestanica, Franch. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* VI. xvi. (1883) 288.—Turkestan.
umbellata, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II. v. 429.—China.
upsaliensis, Hort. Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 201 = P. Malus.
ursina, Herb. Strach. & Winterb. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 376 = P. Aucuparia.
ursina, Wall. *Cat. n.* 675 = foliolosa.
ussuriensis, Maxim. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* xv. (1856) 132, 237; et in *Prim. Fl. Amur.* 102 = sinensis, Lindl.
Valerna, Hort. ex Steud. *Nom.* ed. I. 671 = communis.
variolosa, Wall. *Cat. n.* 680 = P. Pashia.
verruculosa, Bertol. in *Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser.* II. iv. (1864) 312 = P. Pashia.
vestita, Wall. *Cat. n.* 679.—Reg. Himal.
Wallichii, Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 376.—Reg. Himal.
Wangenheimiana, Tausch, in *Flora*, xxi. (1838) 714 = Amelanchier canadensis.
- PYTHAGOREA**, Lour. *Fl. Cochinch.* 243 (1790) = **Homalium**, Jacq. (Samyd.).
africana, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 214 = H. africanum.
cochinchinensis, Lour. *Fl. Cochinch.* 243 = H. fagifolium.
rufescens, E. Mey. ex Presl, *Bot. Bemerk.* 42 = H. rufescens.
- PYTHAGOREA**, Rafin. in *Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 96 = **Lythrum**, Linn.
alata, Rafin. l. c. = L. alatum.
linearis, Rafin. l. c. = L. lineare.
virgata, Rafin. l. c. = L. virgatum.
- PYTHION**, Mart. in *Flora*, xiv. (1831) 459 = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).
campanulatum, Mart. l. c. = A. campanulatus.
- PYTHIUS**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 116 (1836) = **Euphorbia**, Linn.
dulcis, Rafin. l. c. = E. dulcis.
epithymoides, Rafin. l. c. = E. epithymoides.
fusca, Rafin. l. c. = E. Pithyum.
obtusata, Rafin. l. c. = E. obtusata.

PYTHONIUM, Schott, Melet. i. 17 (1832) = **Thomsonia**, Wall. (Aroid.).
bulbiferum, Schott, l. c. 18 = Amorphophallus bulbifer.
guineense, G. Don, in Sweet, *Hort. Brit.* ed. III. 631, nomen.—Afr. trop.
Hookeri, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 31 = Anchomanes Hookeri.
sylvaticum, Wight, Ic. t. 802 = Synantherias sylvatica.
Wallichianum, Schott, Melet. i. 17 = T. napalensis.

PYXA, Noronha, in *Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = **Costus**, Linn. (Scitam.).

PYXIDANTHERA, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 152. t. 17 (1803). **DIAPENSIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 619.
barbulata, Michx. l. c.—Am. bor.
granulata, Pritz. Ic. Ind. i. 913, sphalm. = praec.
spatulata, Muhl. *Cat.* 25 = Lepuropetalum spatulatum.

PYXIDANTHUS, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. xviii. (1852) 150. t. 6 = **Blakea**, P. Br. (Melastom.).
latifolius, Naud. l. c. 152 = B. Pyxidanthus.
Lindenianus, Naud. l. c. 151 = B. Lindeniana.
Schlimii, Naud. l. c. = B. Schlimii.

PYXIDIUM, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 262 (1849) (vox fructus desc. lapsu pro genere habita) = **Amaranthus**, Tourn.
gangeticum, Moq. l. c. 261 = A. gangeticus.
gracicans, Moq. l. c. 263 = A. Blitum.
melancholicum, Moq. l. c. 262 = A. gangeticus.
oleraceum, Moq. l. c. 273 = A. oleraceus, lividus.
viride, Moq. l. c. 274 = A. viridis.

PYXIPOMA, Fenzl, in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1839) 293 = **Sesuvium**, Linn. (Ficoid.).
polyandrum, Fenzl, l. c. = S. Portulacastrum.

Q

QUADRANIA, Noronha, in *Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 (Quid?).

QUADRELLA, J. S. Presl, *Rostl.* ii. 260 (1825) = **Capparis**, Tourn.
Breynia, J. S. Presl, l. c. 261 = C. Breynia.
crotonoides, J. S. Presl, l. c. 260 = C. crotonoides.
furfuracea, J. S. Presl, l. c. = C. furfuracea.
intermedia, J. S. Presl, l. c. 261 = C. odoratissima.
jamaicensis, J. S. Presl, l. c. = C. jamaicensis.
sidaefolia, J. S. Presl, l. c. 260 = C. crotonoides.
torulosa, J. S. Presl, l. c. 261 = C. jamaicensis.

QUADRIA, Ruiz & Pav. *Prod.* 16. t. 33 (1794) = **Gevuina**, Molina (Proteac.).
Avellana, Gaertn. *f. Fruct.* iii. 220 = G. Avellana.
heterophylla, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 63. t. 99 = G. Avellana.

QUADRIALA, Sieb. & Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* iv. ii. (1843) 194 (Fam. Nat. Fl. Jap. i. 86. t. 2) = **Buckleya**, Torr. (Santal.).
lanceolata, Sieb. & Zucc. ll. cc. 195 (87) = B. lanceolata (in Addend.).

QUADRICOSTA, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 329 (1867) = **Ludwigia**, Linn. (Onagrar.).
palustris, Dulac, l. c. = L. palustris.

QUADRIFARIA, Manetti, ex Gord. *Pinet. Suppl.* 14 (1862) = **Araucaria**, Juss. (Conif.).
imbricata, Manetti, ex Gord. l. c. = A. imbricata.

QUAIACUM, Scop. *Introd.* 212 (1777), sphalm. = **Guaiaicum**, Plum. (Zygophyll.).

QUALEA, Aubl. *Pl. Gui.* i. 5. t. 1, 2 (1775). **VOCHYSIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 976.

AGARDHIA, Spreng. *Syst.* i. 4 (1825).
AMPHILOCHIA, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* i. 127. t. 77 (1824).
LOZANIA, Mutis, ex Caldas, in *Seman. Nuev. Gran.* (1810) III. 20.
SCHUECHIA, Endl. *Gen.* 1178 (1840).
acuminata, Spruce, ex Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 40.—Bras.
albiflora, Warm. l. c. 36.—Am. trop.
calcarata, Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 24 = Erisma violaceum.
cassiquiarensis, Spruce, ex Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 34.—Bras.
coerulea, Aubl. *Pl. Gui.* i. 7. t. 2.—Guian.
cordata, Spreng. *Syst.* i. 17.—Bras.
cryptantha, Spreng. ex Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 53.—Bras.
densiflora, Warm. l. c. 50.—Am. trop.
dichotoma, Warm. ex Wille, in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1882) 181.—Am. trop.
disticha, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 10 = Callisthene major.
ecalcarata, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 130. t. 78.—Bras.
elongata, Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 48.—Am. trop.
fasciculata, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 10 = Callisthene fasciculata.
Gardneriana, Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 35.—Am. trop.
Gestasiana, A. St. Hil. in *Mém. Mus. Par.* vi. (1820) 254.—Bras.
glauca, Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 49.—Am. trop.
Glaziovii, Warm. l. c. 53.—Am. trop.
grandiflora, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 133. t. 79.—Bras.
ingens, Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 40.—Bras.
intermedia, Warm. l. c. 50.—Am. trop.
Jundiahy, Warm. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1867) 31.—Bras.
laurifolia, Spruce, ex Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 109 = Erisma laurifolium.
Lundii, Warm. l. c. 47.—Am. trop.
lutea, Desf. ex Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 24 = Erisma nitidum.
macroptala, Spruce, ex Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 41.—Bras.
macroptera, Link, ex A. Dietr. *Sp. Pl.* i. 101.—Bras.
maliformis, Link, ex Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 24 = Callisthene fasciculata.
marginata, Warm. l. c. 52.—Am. trop.
microphylla, Warm. l. c. 37.—Am. trop.
minor, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 10 = Callisthene minor.
Muelleriana, Schomb. *Reise in Brit. Guian.* iii. (1848) 1099.—Guian.
multiflora, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* i. 134. t. 80.—Bras.
parviflora, Mart. l. c. 135. t. 81.—Bras.
Perrini, Spreng. *Syst.* i. 17.—Guian.
pilosa, Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 45.—Am. trop.
psidiifolia, Spruce, ex Warm. l. c. 46.—Am. trop.
pulcherrima, Spruce, ex Warm. l. c. 37.—Am. trop.
retusa, Spruce, ex Warm. l. c. 34.—Bras.
rosea, Aubl. *Pl. Gui.* i. 5. t. 1.—Guian.
Schomburgkiana, Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 39.—Guian.
Selloi, Warm. l. c. 49.—Am. trop.
Sprucei, Warm. l. c. 38.—Am. trop.
subvillosa, Link, ex A. Dietr. *Sp. Pl.* i. 101.—Bras.
trichanthera, Spruce, ex Warm. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 35.—Bras.
verticillata, Spreng. *Syst.* i. 17 = Vochysia verticillata.
violacea, Mart. & Zucc. ex Schult. *Mant.* i. Add. II. 99 = rosea.

QUAMASSIA, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1818) 265 = **Camassia**, Lindl. (Liliac.).
esculenta, Rafin. l. c. = C. esculenta.
scilloides, Rafin. *Cat.* 15 = C. esculenta.

QUAMASSIA, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 25 (1836) = praec.

QUAMOCLIDION, Choisy, in DC. Prod. xiii. II. 429 (1849) = *Mirabilis*, Riv. (Nyctag.)
angulatum, Choisy, l. c. — Mexic.
multiflorum, Torr. ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 321 = *M. multiflora*.
nyctagineum, Choisy, in DC. Prod. xiii. II. 429 = *M. triflora*.
oxybaphoides, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 320 = *Oxybaphus* Wrightii.

QUAMOCLIT, Tourn. ex Moench, Meth. 453 (1794) = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.).
acuta, Gard. Chron. (1880) 1. 588, sphalm. = *Quercus acuta*.
acutangula, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. coccinea*.
angulata, Boj. Hort. Maurit. 224 = *I. angulata*.
cholutensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. coccinea*.
coccinea, Moench, Meth. 453 = *I. coccinea*.
dichotoma, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. coccinea*.
digitata, G. Don, l. c. 260 = *I. digitata*, Linn.
eustachiana, G. Don, l. c. 259 = *I. triloba*.
globosa, Benth. Pl. Hartw. 89 = *I. Hartwegi*.
globosa, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. peduncularis*.
grandiflora, G. Don, l. c. = *I. Funis*.
hastigera, G. Don, l. c. = *I. hederifolia*.
hederifolia, G. Don, l. c. = *I. hederifolia*.
Kerberi, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. (1883) 187. — Mexic.
leucantha, G. Don, Gen. Syst. iv. 258 = *I. leucantha*.
longiflora, G. Don, l. c. 259 = *I. Bona-nox*.
luteola, G. Don, l. c. 258 = *I. coccinea*.
Mina, G. Don, l. c. 259 = *I. versicolor*.
mutica, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. serotina*.
Nationis, Hook. Bot. Mag. t. 5432 = *I. Nationis*.
pallidescens, Ann. Flor. & Pom. (1839) 85 = *I. hederifolia*.
pedata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 270 = *I. armata*.
pennata, Voigt, Hort. Subnrb. Calc. 353 = *I. Quamoclit*.
phoenicea, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 433 = *I. coccinea*.
phoenicea, Wight, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 218 = *I. hederifolia*.
pinnata, Boj. Hort. Maurit. 224 = *I. Quamoclit*.
Ruiziana, G. Don, Gen. Syst. iv. 258 = *I. coccinea*.
ruselliaeflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 271 = *I. hederifolia*.
sagittataefolia, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. sagittataefolia*.
sanguinea, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. hederifolia*.
serotina, G. Don, l. c. = *I. serotina*.
solanifolia, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. solanifolia*.
triloba, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. triloba*.
tubulosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 270 = *I. tubulosa*.
vitifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. peduncularis*.
vulgaris, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 434 = *I. Quamoclit*.

QUAMOCLITA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 74 (1836) = QUAMOCLIT, Tourn. = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.).
bipinnata, Rafin. l. c. (Quid ?). — Hab. ?
coccinea, Rafin. l. c. = *I. coccinea*.
cordata, Rafin. l. c. (Quid ?). — Hab. ?
denticulata, Rafin. l. c. = *I. denticulata*.
hybrida, Rafin. l. c. (Quid ?). — Hab. ?
lacunosa, Rafin. l. c. = *I. lacunosa*.
littoralis, Rafin. l. c. = *I. littoralis*.
multifida, Rafin. New Fl. Am. iv. 57 (Quid ?). — Am. bor.
rubra, Rafin. Fl. Tellur. iv. 74 = *Gilia coronopifolia*.
solanifolia, Rafin. l. c. = *I. solanifolia*.

QUAMOCLITIA, Lowe, Man. Fl. Mad. ii. 51 (1868) = QUAMOCLIT, Tourn. = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.).

QUAPIRA, Auct. ex Pfeiff. Nom. ii. 900 (1874) = *Guapira*, Aubl. (Inc. Sed.).

QUAPOJA, Batsch, Tab. Aff. 89 (1800) = seq.

QUAPOYA, Aubl. Pl. Gui. ii. 897 (1775) = *Clusia*, Linn. (Guttif.).
acuminata, Walp. Rep. i. 393 = *C. acuminata*, Spreng.
comans, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 239 = *Renggeria comata*.
laxiflora, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 11 = *C. laxiflora*.
littoralis, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 239 = *Renggeria littoralis*.
Pana-panari, Aubl. Pl. Gui. ii. 900. t. 344 = *C. macrocarpa*.
Pana-Pary, Steud. Nom. ed. II. ii. 425 = *præc.*
scandens, Aubl. Pl. Gui. ii. 898 = *C. microcarpa*.
sulphurea, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 12 = *C. sulphurea*.
surinamensis, Miq. Stirp. Surin. Sel. 92 = *C. macrocarpa*.

QUAQUA, N. E. Br. in Gard. Chron. (1879) II. 8. ASCLEPIADEAE.
hottentotum, N. E. Br. l. c. — Afr. austr.

QUARARIBEA, Aubl. Pl. Gni. ii. 691. t. 278 (1775). MALVACEAE, Benth. & Hook. f. i. 212.
GERBERIA, Scop. Introd. 286 (1777).
guianensis, Aubl. Pl. Gui. ii. 692. t. 278. — Bras. ; Guian.
Martini, Baill. *Adansonia*, x. (1872) 180. — Guian.
pterocalyx, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 4. — Panama.
turbinata, Poir. *Encyc. Suppl.* iv. 636. — Bras.

QUARENA, Rafin. Sylva Tellur. 39 (1838) = *Cordia*, Linn. (Borag.).
indica, Rafin. l. c. = *C. Myxa*.
sinensis, Rafin. l. c. = *C. sinensis*.
spinescens, Rafin. l. c. = *C. spinescens*.

QUARTINIA, Endl. Gen. Suppl. ii. 94 (1842). LYTHRARIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 777.
RHYACOPHILA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 659.
repens, Endl. ex Walp. Rep. v. 673. — Abyss.
turfosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 277. t. 51 = *repens*.

QUARTINIA, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 259 = *Pterolobium*, R. Br. (Legumin.).
abyssinica, A. Rich. l. c. 260 = *P. lacerans*.

QUASSIA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 553 (1762). SIMARUBEAE, Benth. & Hook. f. i. 308.
aficana, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 89. — Afr. trop.
alatifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 491 = *amara*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 553. — Guian.
Aruba, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba Aruba*.
Cedron, Baill. Hist. Pl. ii. 406 = *Simaba Cedron*.
crocea, Vahl, Ecl. Am. iii. 12 = *amara*.
dioica, O. Berg, Mat. Med. 355 = *Simaruba glauca*.
excelsa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 67 = *Simaruba excelsa*.
ferruginea, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba ferruginea*.
floribunda, D. Dietr. l. c. = *Simaba floribunda*.
glauca, Spreng. Syst. ii. 319 = *Simaruba glauca*.
guianensis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *amara*.
officinalis, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 108. — Guian.
orinocensis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba orinocensis*.
pentandra, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 489 = *Simaruba excelsa*.
polygama, Lindsay, in Trans. Roy. Soc. Edinb. iii. (1794) 205. t. [6] = *Simaruba excelsa*.
Simaruba, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 247 = *Cupania glabrata*.
Simaruba, Linn. f. Suppl. 234 = *Simaruba amara*.
suaveolens, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba suaveolens*.
tricarpa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 351 = *Cupania pleuropteris*.
trichilioides, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba trichilioides*.
undulata, D. Dietr. l. c. = *Zingera undulata*.
versicolor, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 163 = *Simaruba versicolor*.

QUATERNELLA, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789) = *Ceras-tium*, Dill. (Caryoph.).

QUEBITEA, Aubl. Pl. Gui. ii. 888. t. 327 (1775) = *Piper*, Linn.
guianensis, Aubl. l. c. (Quid ?). — Guian.

QUEBRACHIA, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 51. 114 ; xxiv. (1879) 95. ANACARDIACEAE.
Lorentzii, Griseb. l. c. — Reg. Argent.

QUEKETTIA, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 3. ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 569.
microscopica, Lindl. l. c. — Bras.

QUILTIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 351 = *Narcissus*, Tourn. (Amaryll.).
alba, Haw. Suppl. Pl. Succ. 127 = *N. incomparabilis*.
ampla, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 351 = *N. incomparabilis*.
apodantha, Kunth, Enum. Pl. v. 856 = *N. juncifolius*.
Assoana, Kunth, l. c. 730 = *N. juncifolius*.
aurantia, Haw. Suppl. Pl. Succ. 123 = *N. incomparabilis*.
aurantiaca, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 100, sphalm. = *præc.*
Bernardi, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 164 = *N. Macleayi*.
biterneus, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 100 = *N. incomparabilis*.
capax, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 353 = *N. capax*.
cernua, M. Roem. Syn. Ens. 203 = *N. cernuus*.
concolor, Haw. Suppl. Pl. Succ. 126 = *N. incomparabilis*.
Coornei, M. Roem. Syn. Ens. 204 = *N. triandrus*.
coronata, M. Roem. l. c. 203 = *N. triandrus*.
foetida, Herb. Amaryll. 311 = *N. incomparabilis*.
galanthifolia, Haw. Suppl. Pl. Succ. 128 = *N. galanthifolius*.
Gouani, Haw. Monog. Narciss. 5. n. 2 = *N. incomparabilis*.
incomparabilis, Haw. Suppl. Pl. Succ. 125 = *N. incomparabilis*.
Jonquilla, Herb. Amaryll. 315. t. 38. f. 24 = *N. Jonquilla*.
juncifolia, Herb. l. c. 314. t. 43. f. 1 = *N. juncifolius*.
Macleayi, M. Roem. Syn. Ens. 204 = *N. Macleayi*.
Macleana, Herb. Amaryll. 310. t. 39. f. 1 = *N. Macleayi*.
montana, Herb. l. c. f. 4 = *N. poculiformis*.
montana, Rafin. Fl. Tellur. iv. 123 = *præc.* ?
nivea, Haw. Monog. Narciss. 6. n. 7 = *N. incomparabilis*.
odora, Herb. Amaryll. 313 = *N. odoratus*.
orientalis, Herb. l. c. 312. t. 38. f. 28 = *N. Tazetta*.
pallida, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 100 = *N. Tazetta*.
Parkinsonii, M. Roem. Syn. Ens. 205 = *N. Macleayi*.
poculiformis, Haw. Suppl. Pl. Succ. 127 = *N. poculiformis*.
poculigera, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 352 = *N. poculiformis*.
pumila, Herb. Amaryll. 316. t. 41. f. 26 = *N. pumilus*.
pusilla, Herb. l. c. 315. t. 43. f. 2 = *N. juncifolius*.
Sabini, M. Roem. Syn. Ens. 205 = *N. Macleayi*.
semipartita, Haw. Suppl. Pl. Succ. 126 = *N. incomparabilis*.
triandra, M. Roem. Syn. Ens. 203 = *N. triandrus*.

QUELUSIA, Vand. Fl. Lusit. 23. t. 10. f. 10 (1788) ; et in Roem. Script. Hisp. Lusit. 101 (1796) = *Fuchsia*, Linn. (Onagrar.).
regia, Vand. ex Vell. Fl. Flum. 149 (1825) ; et iv. t. 6 (1827) (Quid ?). — Bras.

QUERCUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). CUPULIFERAE, Benth. & Hook. f. iii. 407.
ARCAULA, Rafin. Alsog. Am. 30 (1838).
BALANAULAX, Rafin. l. c. 28 (1838).
BALANOPLIS, Rafin. l. c. 29 (1838).
CERRIS, Rafin. l. c. (1838).
CYCLOBALANOPSIS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 77.
CYCLOBALANUS, Oerst. l. c. (1866) 80.
DRYOPSILA, Rafin. Alsog. Am. 25 (1838).
ERIODRYS, Rafin. l. c. 30 (1838).
LITHOCARPUS, Blume, Bijdr. 526 (1825).
PASANIA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 81.
PERYTIS, Rafin. Alsog. Am. 29 (1838).
SCODRYS, Rafin. l. c. (1838).
SYNAEDRYS, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 441 (1836).

QUERCUS:—

Abelicea, Lam. Encyc. i. 725 = *Zelkova cretica*.
abietum, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 8 = *Q. Robur*.
acerifolia, Hort. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 652 = *rubra*.
acroglandis, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 23 = *agrifolia*.
acuminata, Hort. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 28 = *annulata*.
acuminata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 217 = *calophylla*.
acuminata, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 636. —Ind. or.
acuminatissima, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 102 = *Junghuhnii*.
acuta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3735 = *Castanopsis tribuloides*.
acuta, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid?). —Am. bor.
acuta, Siebold, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 290 = *thalassica*.
acuta, Thunb. Fl. Jap. 175. —Japon.
acutidens, Torr. Bot. Mex. Bound. 207 = *dumosa*.
acutifolia, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 267. —Mexic.
acutiglans, Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) 146 = *agrifolia*.
acutissima, Carruth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 33. —China.
aegilopifolia, Boiss. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 25 = *lusitanica*.
Aegilops, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 44 = *macedonica*.
Aegilops, Linn. Sp. Pl. 996. —Europ. austr.; Oriens.
Aegilops, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *lanuginosa*.
Aegilops, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 241 = *Q. Cerris*.
aegilopifolia, Boiss. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 17 = *lusitanica*.
aegilopifolia, Pers. Syn. ii. 570 = *Q. Pseudo-suber*.
Aesculus, Boiss. Fl. Orient. iv. 1164 = *Q. Robur*.
aestivalis, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) 1. 385, in textu = *Q. Robur*.
Afares, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 391 = *castaneaefolia*.
affinis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 222 = *obtusata*.
affinis, [Scheidw.] in Hort. Belg. iv. (1837) 321. t. 17 = *nitens*.
afghanistanensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 33 = *Q. Robur*.
africana, Barrow, Trav. S. Afr. i. 83 = *Ocotea bullata*.
agnostifolia, Hort. ex C. Koch, l. c. 62 = *nigra*.
agrifolia, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 271. —Calif.
ajudaghensis, Stev. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 614. —Rossia.
Alams, Benth. Pl. Hartw. 55 = *calophylla*.
alba, Linn. Sp. Pl. 996. —Am. bor.
aliena, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 298. —China; Japon.
almaguerensis, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 157. t. 131. —N. Granat.
alnifolia, Poech, Enum. Pl. Ins. Cyp. 12. —Ins. Cyprus.
alpestris, Boiss. Elench. 83 = *lusitanica*.
alpina, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 25, sphalm. = *Alzina*.
altissima, Hort. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 634 = *Q. Robur*.
Alzina, Lapeyr. Hist. Arbr. Pl. Pyr. ii. 584 = *Q. Ilex*.
ambigua, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 51. t. 93 = *obtusata*.
ambigua, Kit. ex Rochel, Pl. Banat. Rar. 26, nomen; et in *Linnaea*, xxxii. (1863) 354. —Europ.
ambigua, Michx. f. Hist. Arb. Am. ii. 120. t. 24 = *rubra*.
Amherstiana, Wall. Cat. n. 2783. —Burma.
amplifolia, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 607 = *Q. Robur*.
anceps, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 204 = *spicata*.
Andersoni, Hook. f. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 127 = *pachyphylla*.
angulizans, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid?). —Am. bor.
angustata, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 212; Fl. Jav. Cup. 15. t. 72. t. 7 = *Q. Pseudo-molucca*.
Annenkowi, Kauffm. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 168. —Rossia.
annulata, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861) 445 = *Durandii*.

QUERCUS:—

annulata, Hook. f. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 99 = *semiserrata*.
annulata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 213 = *Teysmannii*.
annulata, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 22 = *glaucula*.
apennina, Lam. Encyc. i. 725 = *Q. Robur*.
aprica, Rafin. Alsog. Am. 26 (Quid?). —Am. bor.
aquatica, Walt. Fl. Carol. 234. —Am. bor.
aquifolia, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 108 = *coccifera*.
Arcaula, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = *spicata*.
arcoglandis, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 23, sphalm. = *acroglandis*.
Arcola, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 159. n. 2781 = *Arcaula*.
arcuata, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 56 = *coccifera*.
argentata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 215. t. 47. f. 1-17. —Sumatra.
argyrophylla, Wall. Cat. n. 2788 = *Castanopsis argentea*.
aristata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 444. —Mexic.
armata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = *Castanopsis tribuloides*.
armata, Roxb. Hort. Beng. 104; Pl. Corom. iii. 92. t. 296; Fl. Ind. iii. 640 = *Castanopsis armata*.
armeniaca, Kotschy, Eichen, t. 25. —Armenia.
aspera, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 328 = *Q. Robur*.
asperata, Pers. Syn. ii. 571 = *Q. Robur*.
asplenifolia, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 42 = *Q. Cerris*.
atropurpurea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 28 = *Q. Robur*.
atrosanguinea, Hort. l. c. = *Q. Robur*.
atro-virens, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 74 = *Q. Robur*.
Aucherii, Jaub. & Spach, Illustr. i. 113. t. 58. —Archip. Graec.
aurea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 28 = *Q. Robur*.
aurea, Kit. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xii. 8; Wierzb. ex Kotschy, Eichen, t. 4 = *Q. Robur*.
aurea, Rafin. Alsog. Am. 20 (Quid?). —Am. bor.
australis, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 233 = *Q. Robur*.
australis, Link, Handb. ii. 466 = *lusitanica*.
austriaca, Willd. Sp. Pl. iv. 454 = *Q. Cerris*.
Auzandri, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 119 = *Q. Pseudo-coccifera*.
Auzin, Secondat, ex Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 320 = *Q. Robur*.
avellanaeformis, Colm. & Boutelet. Exém. Arb. Pen. 9. —Hispan.
axillaris, Schur, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 18 = *Q. Robur*.
baetica, Buek, in DC. Ind. Prod. iv. 322 = *lusitanica*.
Ballota, Desf. in Mém. Acad. Sc. Par. 1790 (1797) 395. t. 6; Fl. Atlant. ii. 350 = *Q. Ilex*.
Baloo, Griff. Itin. Notes, 328 = *Q. Ilex*.
bambusaefolia, Fortune, in Gard. Chron. (1860) 170. —China.
bambusaefolia, Hance, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 116. —China.
bancana, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 485 = *poly-stachya*.
bancana, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 361; et in Flora, liii. (1870) 251. —Ins. Banca.
Banga, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = *lanuginosa*.
Banisteri, Michx. Hist. Chênes Am. t. 27 = *ilicifolia*.
Banja, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 27 = *Q. Banga*.
barbinervis, Benth. Pl. Hartw. 56. —Mexic.
Beccariana, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1315. —Penang; Borneo.
Bennettii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 857. —Malaya.
Benthami, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 29. —Mexic.
berberidifolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 172 = *dumosa*.
bicolor, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 396. —Am. bor.
Bivoniana, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 604 = *Q. Ilex*.
Blancoi, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 97. —Ins. Philipp.
Blumeana, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 208. t. 44. —Malaya.

QUERCUS:—

Boissieri, Reut. in Boiss. Diagn. Scr. I. xii. 119 = *lusitanica*.
Bombyx, Hort. Leroy, ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 72 = *serrata*.
Bonplandiana, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 370 = *obtusata*.
borealis, Michx. f. N. Am. Sylv. i. 98. t. 26 = *coccinea*.
Bourgaei, Oerst. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 168. —Mexic.
brachybalanos, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 54 = *coccifera*.
brachycarpa, Guss. ex Parl. Fl. Ital. iv. 180 = *Q. Robur*.
brachycarpa, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 18 = *lusitanica*.
brachyphylla, Kotschy, Eichen, t. 9 = *Q. Robur*.
brachystachys, Benth. Pl. Hartw. 91. —Mexic.
Brandisiana, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 108. —Burma.
Brantii, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 41. —Kurdistan.
brevifolia, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 11 = *Q. Robur*.
brevipes, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 232 = *Q. Robur*.
brevipetiolata, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 359 = *lamponga*.
Breweri, Engelm. in Bot. Calif. ii. 96 = *Garryana*.
Brossa, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 319 = *Q. Toza*.
brutia, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 20 = *Q. Robur*.
Budayana, Haberle, ex Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 195 = *lanuginosa*.
Buergerii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 299. —Japon.
bumelioides, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 188. —Am. centr.
Bungeana, F. B. Forbes, in Journ. Bot. xxii. (1884) 83, 85. —China.
calicina, Poir. Encyc. Suppl. ii. 216 = *Q. Ilex*.
californica, Cooper, in Smithson. Rep. (1858) 261 = *Kelloggii*.
callicarpifolia, Griff. Itin. Notes, ii. 87, partim = *fenestrata*.
calliprinos, Webb, Iter Hisp. 15 = *coccifera*.
callosa, Benth. Pl. Hartw. 91 = *tomentosa*.
callosa, Mart. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 28 = *laxa*.
calophylla, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 79. —Mexic.
camata, Hort. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 628 = *Q. Toza*.
cana, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 426 = *Q. Cerris*.
canariensis, Willd. Enum. Hort. Berol. 975 = *lusitanica*.
candicans, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 277. —Hispan.
candida, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 426, nomen. —Am. bor.
canescens, Blume, Mus. Bot. Lugd.-Bat. i. 296. —Japon.
caraballoana, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 209. —Ins. Philipp.
carduchorum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 320. —Kurdistan.
carduchorum, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 49 = *Libani*.
carpatia, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 353. —Hungaria.
carpineae, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 108. —Syria.
carpinifolia, Rafin. Alsog. Am. 21 (Quid?). —Am. bor.
Cassura, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = *semecarpifolia*.
castaneaefolia, Pantoč. Adnot. Fl. Hercegov. 31 = *macedonica*.
Castanea, Emerson, Trees Massach. ed. I. 137. t. 5 = *Q. Prinus*.
Castanea, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 396 = *prinoides*.
Castanea, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 276. —Mexic.
castaneaefolia, Coss. ex J. Gay, in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 421 = *Q. Pseudo-suber*.

QUERCUS:—

castaneaefolia, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 44.—Reg. Caucas.
castanicaarpa, Roxb. *Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* ii. 640 = *Castanopsis castanicaarpa*.
castellana, Bosc, ex Pers. *Syn.* ii. 571 = Q. Toza.
castellana, Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 226 = Q. Ilex.
Catesbaei, Michx. *Hist. Chênes Am.* tt. 29, 30.—Am. bor.
Catungea, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 56 = *Castanopsis armata*.
caudata, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 2787 = *Castanopsis tribuloides*?
cedrorum, Kotschy, *Eichen*, t. 37 = Q. Robur.
celebica, *Alg. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 110.—Ins. Celebes.
cenomanensis, Desp. ex Endl. *Gen. Suppl.* iv. ii. 24 = Q. Toza.
cerrioides, Willk. & Costa, in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 123 = Q. Robur.
Cerris, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 727 = *Castanopsis javanica*.
Cerris, DC. *Fl. Fr.* iii. 311 = Q. Toza.
Cerris, Linn. *Sp. Pl.* 997.—Europ.; Oriens.
Cerris, Pall. *Fl. Ross.* ii. 4 = Q. Robur.
chainolepis, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 55 = coccifera.
Championi, Benth. in *Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 113.—China.
chinantlensis, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 179 = cuneifolia.
Chincapin, Rafin. *Alsog. Am.* 23 = Q. Prinus.
chinensis, Abel, *Narr. Journ. China*, 165, cum ic. 363.—China.
chinensis, Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* 61 = Bungeana.
Chinquapin, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 634 = Q. Prinus.
chrysolepis, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 173.—Calif.
chrysophylla, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 42. t. 87.—Mexic.
cinerea, Michx. *Hist. Chênes Am.* t. 14.—Am. bor.
cinerea, Rafin. *Alsog. Am.* 27 (an praec.?).—Am. bor.
cintrana, Welw. ex Nym. *Consp.* 662 = occidentalis.
circinata, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 272.—Mexic.
citrifolia, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 187.—Costa Rica.
classinervia, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 87, sphalm. = crassinervia.
Clivia, Dehn. ex Pasq. *Cat. Orto Bot. Nap.* (1867) 87.—Ital.
coccifera, Linn. *Sp. Pl.* 995.—Reg. Mediterr.
coccinea, Wangenh. *Beitr. Anpfl. Holz.* 44. f. 9.—Am. bor.
collina, Schleich. ex Endl. *Gen. Suppl.* iv. ii. 24 = Q. Robur.
commutata, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 177 = nitens.
Companoana, Vidal, *Sinops.* 41. t. 92. f. D.—Ins. Philipp.
comptoniaefolia, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. ii. 27 = Q. Robur.
concentrica, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 502 = Llanosii.
concentrica, Lour. *Fl. Cochinch.* 572.—Cochinch.
Concordia, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. ii. 28 = Q. Robur.
condensata, Schur, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 18 = Q. Robur.
conferta, Kit. in *Schult. Oesterr. Fl. ed.* II. i. 619 = Q. Farnetto.
confertifolia, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 53. t. 94.—Mexic.
confertifolia, Torr. *Bot. Mex. Bound.* 207 = hypoleuca.
congesta, Presl, *Delic. Prag.* 32 = Q. Robur.
conglomerata, Pers. *Syn.* ii. 570 = Q. Robur.
conocarpa, Naves, ex Villar, in *Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. Nov. App. 207 = Reinwardtii.
conocarpa, Oudem. in *Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch.* xii. (1861) 206.—Malaya.
consobrina, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 54 = coccifera.
conspecta, Benth. *Pl. Hartw.* 91 = acutifolia.
Cookii, Loud. *Arb. Brit.* iii. 1926 = lusitanica.
cooperta, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 503.—Ins. Philipp.
cordata, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 211.—Mexic.

VOL. II.

QUERCUS:—

coriacea, Bechst. *Forstbot.* ed. V. 211 = Q. Robur.
cornea, Lour. *Fl. Cochinch.* 572.—China.
coronensis, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 607 = Q. Robur.
corrugata, Hook. *lc. Pl.* t. 403.—Guatemala.
Cortesii, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 175.—Mexic.
corticosa, Rafin. *Alsog. Am.* 24 (Quid?).—Am. bor.
corymbifolia, Ehrenb. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1167 = lusitanica.
costaricensis, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 184.—Costa Rica.
costata, Blume, *Bijdr.* 522.—Malaya.
costata, Naves, ex Villar, in *Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. Nov. App. 207 = sundaica.
crassifolia, Benth. *Pl. Hartw.* 56 = splendens.
crassifolia, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 49. t. 91.—Mexic.
crassinervia, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 292.—Java.
crassipes, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 37. t. 83.—Mexic.
crassipocula, Torr. in *Pacif. Rail. Rep.* iv. 137; v. 365 = chrysolepis.
crenata, Lam. *Encyc.* i. 724 = Q. Pseudo-suber.
cretensis, Lam. ex Steud. *Nom. ed.* I. 673 = Zelkova cretica.
cretica, Raulin, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 54 = coccifera.
crinita, Lam. *Encyc.* i. 718 = Q. Cerris.
crispa, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. ii. 56 = Q. Ilex.
crispa, Hort. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 426 = Q. Cerris.
crispa, Vukot. in *Rad Jugos. Akad. Zagreb.* ii. (1880) 18 = Q. Robur.
crispata, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) 1. 386 = Q. Robur.
crispula, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 298.—Japan.
crispula, Vukot. in *Rad Jugos. Akad. Zagreb.* xxii. 1872 (1873) 14 (Quid?).—Europ.
cubana, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 230 = virginiana.
cuneata, Roxb. ex Wall. *Cat. n.* 3732 = lucida.
cuneata, Wangenh. *Beitr. Deutsch. Holzg. Forstw.* Nordam. Holz. 78. t. 5 = falcata.
cuneifolia, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 182.—Mexic.
cuneifolia, Rafin. *Alsog. Am.* 27 (Quid?).—Am. bor.
Cupaniana, Guss. *Fl. Sic. Syn.* ii. 606 = Q. Robur.
cuprea, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. ii. 28 = Q. Robur.
cupressoides, Hort. l. c. 29 = Q. Robur.
cupulatus, Gilib. *Exercit.* ii. 398 = Q. Robur.
cuspidata, Thunb. *Fl. Jap.* 176.—Japan.
cyclophora, Endl. *Gen. Suppl.* iv. ii. 28.—Malaya.
cyclophylla, Welw. ex Nym. *Consp.* 662 = Q. Ilex.
cyllindracea, Guss. ex Parl. *Fl. Ital.* iv. 178 = Q. Robur.
Cypri, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 19 = lusitanica.
Cypria, Jaub. & Spach. *Illustr.* i. 110 = alnifolia.
cyrtopoda, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. i. 869 (sp. dub.).—Sumatra.
cyrtorhyncha, Miq. *l. c. Suppl.* 350.—Malaya.
Daimio, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. ii. 45 = dentata.
Dalbertisii, F. Muell. in *Vict. Natural.* (Dec. 1884) 124.—N. Guin.
Dalechampi, Tenore, *Ind. Sem. Hort. Neap.* (1830) 15; et ej. *Syll.* 469 = Q. Robur.
daphnoidea, Blume, *Fl. Jav. Cupul.* 28. t. 16.—Java; Sumatra.
dasystachya, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 221.—Bornéo.
dchorochensis, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1165, sphalm. = dshorochensis.
dealbata, Hook. f. & Thoms. ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 107.—Reg. Himal.
dealbata, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 346, in nota = dilatata.
dealbata, Wall. *Cat. n.* 2769 = incana.
decipiens, Bechst. *Forstbot.* ed. V. 211 = Q. Robur.
decipiens, Mart. ex Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 214 = reticulata.
densiflora, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 391.—Calif.
densifolia, Abel, *Narr. Journ. China*, 165, 363.—China.

QUERCUS:—

dentata, Bartr. *Trav.* ed. II. (1794) 28 = aquatica.
dentata, Thunb. *Fl. Jap.* 177.—Japan.
dentata, Wats. *Dendrol.* t. 93 = Q. Cerris.
dentosa, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 2775 = glanca.
depressa, Blume, in *Verh. Batav. Gen. ix.* (1825) 209 = spicata.
depressa, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 50. t. 92.—Mexic.
depressa, Roxb. *Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind.* iii. 640 = cyclophora.
Diepenhorstii, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 349.—Sumatra.
dilatata, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvi. (1876) 188 = Q. Robur.
dilatata, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 2785.—Reg. Himal.
dilatata, Rafin. *Alsog. Am.* 24 (Quid?).—Am. bor.
dipsacina, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 55 = coccifera.
discocarpa, Hance, in *Journ. Bot.* xii. (1874) 242.—Malaya.
discolor, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. iii. 358.—Am. bor.
dispar, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 55 = coccifera.
dispar, Rafin. *Alsog. Am.* 19 (Quid?).—Am. bor.
dissecta, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. ii. 27 = Q. Robur.
divaricata, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 2790 (sp. dub.).—Burma.
diversifolia, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 270 = tomentosa.
Douglasii, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 391.—Calif.
Drummondii, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 170.—Texas.
dshorochensis, Kotschy, *Eichen*, t. 39 = seq.
dshorochensis, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 328 = Q. Robur.
dubia, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 2786 = *Castanopsis indica*.
dubia, Linn. *Pl. Surin.* n. 127; *Amoen. Acad.* viii. 263 (Quid?).—Guian.
dumosa, Nutt. *N. Am. Sylva*, i. 18.—Calif.
Dunnii, Kellogg, in *Pacif. Rural Press* (June 1879); ex Curran, in *Bull. Calif. Acad.* i. n. III. (1885) 147 = Palmeri.
Durandii, Buckl. in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1860 (1861) 445.—Am. bor.
Durinus, Rafin. *Alsog. Am.* 19 (Quid?).—Am. bor.
dysophylla, Benth. *Pl. Hartw.* 55.—Mexic.
echinacea, Torr. in *Pacif. Rail. Rep.* iv. 137 = densiflora.
echinata, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 683, sphalm. = echinacea.
echinata, Kotschy, ex A. DC. l. c. 55 = coccifera.
echinata, Lam. *Fl. Fr.* ii. 207 = Q. Aegilops.
echinata, Salisb. *Prod.* 393 = Q. Cerris.
echinoides, R. Br. *Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV.* vii. (1871) 251 = densiflora.
Ehrenbergii, Kotschy, *Eichen*, t. 15.—Cilicia; Syria.
elegans, Blume, in *Verh. Batav. Gen. ix.* (1825) 208 = spicata.
elephantum, Hance, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 365.—Cambodia.
elliptica, Liebm. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 31 = glaucoides.
elliptica, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 278.—Mexic.
elongata, Willd. *Sp. Pl.* 444 = falcata.
Emoryi, Porter & Coulter, *Fl. Colorado*, 127 = undulata?
Emoryi, Torr. in *Emory, Not. Mil. Reconnoiss.* 151. t. 9.—Am. bor. occ.
encleisacarpa, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 209. t. 45.—Malaya.
erucaefolia, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) 1. 388 = Q. Robur.
esculenta, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. ii. 80 = lusitanica.
Esculus, Linn. *Mant.* ii. 496 = Q. Cerris.
Esculus, Linn. *Sp. Pl.* 996 = Q. Robur.
Esculus, Pollini, *Fl. Veron.* iii. 125 = Q. Farnetto.
eugeniaefolia, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 185.—Guatemala.
eumorpha, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) 11. 107.—Burma.
Ewyckii, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 212. t. 46.—Malaya.

4 R

QUERCUS:—

excelsa, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 174.—Mexic.
exoniensis ×, Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 225 = seq.
exoniensis ×, Lodd. ex Sweet, *Hort. Brit. ed. I.* 370; et ex Webb, *Iter Hisp.* 13.
expansa, Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 216 = Q. Ilex.
extensa, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 609 = Q. Robur.
Eyrei, *Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 114.—Ins. Hongkong.
Fabri, Hance, in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 202.—China.
fagifolia, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii.* 11. 56 = Q. Ilex.
fagiformis, Jungh. in *Bonplandia*, vi. (1858) 83 = Junghuhnii.
faginea, Lam. *Encyc. i.* 725 = lusitanica.
faginea, Tenore, *Syll. Fl. Neap.* 469 = Q. Robur.
falcata, Michx. *Hist. Chênes Am. t.* 28.—Am. bor.
Falconeri, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 197.—Burma.
falkenbergensis, Booth, ex Loud. *Arb. Brit. iii.* 1926 = Q. Robur.
farinulenta, *Hance, in Journ. Bot. xiii.* (1875) 365.—Cambodia.
Farnetto, Tenore, Syll. Fl. Neap. 470.—Europ. austr.
fastigiata, Lam. *Encyc. i.* 725; *DC. Fl. Fr. Suppl.* 351 = Q. Robur.
Fendleri, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 170.—Am. bor. occ.
fenestrata, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind. iii.* 633.—Reg. Himal.
fenestrata, Wall. *Cat. n.* 2784, partim = lanceaefolia.
Fennesi, Hort. ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 6 = Q. Robur.
Fenzlii, Kotschy, *Eichen, t.* 24 = coccifera.
Fernandezii, Vidal, Sinops. 41. t. 92. f. E.—Ins. Philipp.
ferox, *Roxb. Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind. iii.* 639 = *Castanopsis tribuloides*.
ferruginea, Michx. f. *Hist. Arb. Am. ii.* 92. t. 18 = nigra.
filicifolia, Hort. ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 6 = Q. Robur.
filiformis, Muhl. ex A. DC. l. c. 21 = bicolor.
filipendula, Vukot. in *Flora*, li. (1868) 330 = Q. Robur.
fissa, *Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 114.—Ins. Hongkong.
flava, Née, ex Spreng. *Syst. iii.* 857 = magnoliaefolia.
flavida, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 178.—Mexic.
floccosa, Liebm. l. c.—Mexic.
floribunda, Wall. *Cat. n.* 2773 = dilatata.
floridana, Shuttlew. ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 22 = obtusiloba.
foeminea, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 2 = Q. Robur.
Fontanesii, Guss. *Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825); ex ej. *Fl. Sic. Syn. ii.* 605 = Q. Pseudo-suber.
Fordii, Carr. in *Rev. Hort.* (1861) 114. ff. 24, 25 = Q. Ilex.
Frainetto, Tenore, *Cat. Hort. Nap.* (1819) 65, sphalm. = Q. Farnetto.
frondosa, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 426 = Q. Cerris.
fructipendula, Schrank, *Baier. Fl. i.* 660 = Q. Robur.
fruticosa, Brot. *Fl. Lusit. ii.* 31 = humilis.
fulhamensis ×, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 426.
fulva, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 183.—Mexic.
fulvescens, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad. ed. II.* i. (1873) 70 = chrysolepis.
furfuracea, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 189 = acutifolia.
fusca, Rafin. *Alsog. Am.* 19 (Quid?).—Am. bor.
Galeotti, Martens, in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 220.—Mexic.
Gambelii, Nutt. in *Journ. Acad. Philad. N. S. i.* (1847) 179 = undulata.
Gambelii, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 169 = Douglasii.
Garryana, Dougl. ex Hook. *Fl. Bor. Am. ii.* 159.—Am. bor. occ.
geltowiensis, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii.* 11. 32 = Q. Robur.
gemelliflora, Blume, in *Verh. Batav. Gen. ix.* (1825) 222.—Java.

QUERCUS:—

gemelliflora, Herb. Buerger, ex Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 299 = Buergerii.
Genabii, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii.* 11. 62 = nigra.
georgiana, M. A. Curt. in *Am. Journ. Sc. Ser. II.* vii. (1849) 408.—Am. bor.
germana, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 78.—Mexic.
germanica, Lasch, in *Bot. Zeit.* xv. (1857) 413 = Q. Robur.
Ghiesbreghtii, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux. x.* 11. (1843) 212.—Mexic.
gibraltaria, C. Koch, *Dendrol. ii.* 11. 81 = lusitanica.
gilva, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 306.—Japon.
glaberrima, Blume, in *Verh. Batav. Gen. ix.* (1825) 210 = spicata.
glabra, Blanco, *Fl. Filip. ed. I.* 727 = ovalis.
glabra, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 3731 = acuminata.
glabra, Buerger, ex Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 290, 304 = thalassica, marginata.
glabra, Thunb. *Fl. Jap.* 175.—Japon.
glabrescens, Benth. *Pl. Hartw.* 56, 348.—Mexic.
glabrescens, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi.* (1876) 230 = Kernerii.
glabrescens, Seem. *Bot. Voy. Herald*, 252 = Warszewiczii.
glandulifera, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 295.—Japon.
glauca, Bosc, *Mém. Chênes*, 26; ex Loisel. in *Duham. Arb. cd. Nov.* vii. 161 = humilis.
glauca, Buerger, ex Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 290 = thalassica.
glauca, Mart. & Timb. in *Bull. Soc. Bot. Fr. xi.* (1864) p. xvi = Q. Ilex.
glauca, Thunb. *Fl. Jap.* 175.—Reg. Himal.; Japon.
glaucescens, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 29. t. 78.—Mexic.
glaucoides, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux. x.* 11. (1843) 209.—Mexic.
glomerata, *Roxb. Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind. iii.* 640.—Ins. Penang.
glomerata, Wall. *Cat. n.* 2791 = *Castanopsis sumatrana*.
glutinosa, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 304.—Java.
Goedelii, Balansa & Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 46 = Q. Aegilops.
gonoloba, Rafin. *Alsog. Am.* 25 (Quid?).—Am. bor.
gracilipes, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 347 = spicata.
gracilis, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 207.—Borneo.
gracilis, Lange, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 36 = Q. Ilex.
graeeca, Kotschy, *Eichen, t.* 30 = Q. Aegilops.
Grahami, Benth. *Pl. Hartw.* 57.—Mexic.
Grahami, Hort. Hafn. ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 66 = acutifolia.
gramuntia, Linn. *Sp. Pl.* 995 = Q. Ilex.
grandifolia, D. Don, in *Lamb. Gen. Pin. ii.* 27. t. 8 = spicata.
grandis, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 183.—Guatemala.
granulata, Liebm. l. c. 186.—Costa Rica.
granulata, Rafin. *Alsog. Am.* 21 (Quid?).—Am. bor.
Griffithii, Hook. f. & Thoms. ex *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 104.—Reg. Himal.
grisea, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 171.—Am. bor. occ.
grosseserrata, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 306.—Japon.
guatemalensis, A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 78.—Guatemala.
Gulliveri, F. Muell. in *Vict. Natural. i.* (1885) 167.—N. Guin.
Guppyi, F. Muell. l. c. (Dec. 1884) 123, in textu.—Ins. Salomon.
Haas, Kotschy, *Eichen, t.* 2 = Q. Robur.
haliphlaeos, Lam. *Encyc. i.* 718 = Q. Cerris.
haliphleas, Guss. *Fl. Sic. Syn. ii.* 605 = Q. Pseudo-suber.
Hancei, Benth. *Fl. Hongk.* 322.—China.
Harlandi, Hance, ex Walp. *Ann. iii.* 382.—China.
Hartwegi, Benth. *Pl. Hartw.* 56 = obtusata.
Hartweissiana, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx.* (1857) i. 387 = Q. Robur.
Hasseltii, Korth. ex Miq. *Fl. Ind. Bat. i.* 1. 861 = omalokos.
hastata, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 171 = Emoryi.

QUERCUS:—

Haynaldiana, Simk. in *Magyar Növényt. Lapok*, vii. (1883) 63. t. 3.—Hungar.
Helferiana, A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 101.—Burma.
hemisphaerica, Bartr. *Trav.* 320 = nigra.
hemisphaerica, Hort. ex Endl. *Gen. Suppl. iv.* 11. 25 = virginiana.
Hentzei, Petz. *Arb. Muscav.* 627 = Q. Robur.
heteroloba, Rafin. *Alsog. Am.* 25 (Quid?).—Am. bor.
heterophylla, Rafin. l. c. 24 (Quid?).—Am. bor.
heterophylla, Hort. Parment. ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 42 = Q. Cerris.
heterophylla, Michx. f. *Hist. Arbr. Am. ii.* 87.—Am. bor.
Hindsii, Benth. *Bot. Voy. Sulph.* 55 = lobata.
hirsuta, Lindl. in *Wall. Cat. n.* 3734 = lappacea.
hirsutula, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 298 = aliena.
hispanica, Lam. *Encyc. i.* 723 = Q. Pseudo-suber.
hispanica, Willk. in *Flora*, xxxv. (1852) 315 = Q. Robur.
Hodginsii, Lodd. *Cat.* (1836) ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 427 = Q. Robur.
holosericea, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 298 = aliena.
Horsfieldii, Miq. *Fl. Ind. Bat. i.* 1. 856 = semiserrata.
Humboldtii, Bonpl. in *Humb. & Bonpl. Pl. Aequin.* ii. 155. t. 130.—N. Granat.
Humboldtii, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 32 = Lindeni.
humilis, DC. *Fl. Fr. iii.* 312 = Q. Toza.
humilis, Lam. *Encyc. i.* 719.—Reg. Mediterr. occ.
humilis, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 4 = Q. Robur?
humilis, Walt. *Fl. Carol.* 234 = cinerea.
humosa, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 298 = aliena.
hungarica, Hubeny, ex Rochel, *Bot. Reise Banat.* 73; Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 353 = Q. Farnetto.
hybrida, Bechst. *Forstbot. ed. V.* 211 = Q. Robur.
hybrida, Brot. *Fl. Lusit. ii.* 31 = lusitanica.
hyemalis, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx.* (1857) i. 385, in textu = Q. Robur.
hypochrysa, Stev. l. c. 388 = Q. Robur.
hypoleuca, Engelm. in *Trans. Acad. Sc. St. Louis*, iii. (1875) 384.—N. Mexic.
hypoleuca, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 45 = lusitanica.
hypoleuca, Miq. *Fl. Ind. Bat. i.* 1. 869 = Korthalsii.
hypophlaeos, Petz. *Arb. Muscav.* 656 = falcata.
Hystrix, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 201.—Malaya.
iberica, Bieb. *Fl. Taur. Cauc. ii.* 402 = Q. Robur.
Ibicus, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 9 = Q. Robur.
Ijam-ahoso, Siebold, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii.* 93 = *Meliosma myriantha*.
Ilex, Linn. *Sp. Pl.* 995.—Reg. Mediterr.; Oriens.
Ilex, Lour. *Fl. Cochinch.* 571 = Helferiana.
ilexoides, Rafin. *Alsog. Am.* 23. (Quid?).—Am. bor.
ilicifolia, Salisb. *Prod.* 392 = Q. Ilex.
ilicifolia, Wangerh. *Forstw.* 79. f. 17.—Am. centr.
imbricaria, A. Gray, ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 63 = Q. Phellos.
imbricaria, Michx. *Hist. Chênes Am.* tt. 15, 16.—Am. bor.
imbricata, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 57 = lamellosa.
incana, *Roxb. Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind. iii.* 642.—Reg. Himal.
incisa, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 427 = Q. Cerris.
induta, Blume, in *Verh. Batav. Gen. ix.* (1825) 220.—Java.
inermis, Ehrenb. ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 18; et ex Unger & Kotschy, *Insel Cypem*, 216 = lusitanica.
infectoria, Oliv. *Voy. Atlas*, tt. 14, 15 = lusitanica.
inops, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod. xvi.* 11. 54 = coccifera.
insignis, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux. x.* 11. (1843) 219.—Mexic.
integrifolia, Hort. ex Steud. *Nom. ed. I.* 673 = Q. Ilex.
intermedia, Boenn. ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 177; D. Don, ex Leighton, *Fl. Shrop.* 473 = Q. Robur.
intermedia, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux. x.* 11. (1843) 223 = calophylla.
inversa, Lindl. & Paxt. *Flow. Gard. i.* (1850–51) 58. f. 36 = thalassica.

QUERCUS:—

- Irwinii, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 229.—Ins. Hongkong.
 iteaphylla, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 229.—Ins. Hongkong.
 ithaburensis, Decne. l. c. Sér. II. iv. (1835) 348 = *Q. Aegilops*.
 Jacobi, R. Br. Campst. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV.* vii. (1871) 255 = Garryana.
 Jama-buwa, Siebold, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 93 = *Meliosma pungens*.
 javensis, Miq. l. c. i. 117.—Java.
 Jenkinsii, Benth. in *Hook. Ic. Pl.* t. 1312-13.—Reg. Himal.
 Jordanae, Villanueva, *Apuntes Un Nuev. Roble*, (1875) 7.—Ins. Philipp.
 Juergenseni, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 188.—Mexic.
 Junghuhnii, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 853.—Java.
 Kajan, Miq. in *Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 87 = *Q. Hystrix*.
 Kamroopii, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 57 = *lineata*?
 Kelloggii, Newberry, in *Pacif. Rail. Rep.* vi. *Bot.* 28, 89. f. 6.—Calif.
 Kernerii x, Simk. in *Magyar Növényt. Lapok.* vii. (1883) 69.—Europ.
 Korthalsii, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 292.—Java.
 Korthalsii, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 28 = *Teysmannii*.
 Kurzii, Hance, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 328 = *lanceaefolia*.
 lacera, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 306.—Japon.
 lacinata, Vukot. in *Rad Jugos. Akad. Zagreb.* xxii. 1872 (1873) 19.—Europ.
 laciniosa, Bor. *Fl. Centr. Fr. ed. III.* ii. 588, in obs. = *Q. Robur*.
 laeta, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 179.—Mexic.
 laevigata, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 304.—Japon.
 laevis, Walt. *Fl. Carol.* 234 = *Catesbaei*?
 lamellata, Roxb. *Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind.* iii. 641 = *lamellosa*.
 lamellosa, Sm. in *Rees, Cycl.* xxix. n. 23.—Reg. Himal.
 lamponga, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 348.—Malaya.
 lampophyllos, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 327 = *Q. Robur*.
 lanata, Sm. in *Rees, Cycl.* xxix. n. 27 = *incana*.
 lanceaefolia, Roxb. *Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 634.—Reg. Himal.
 lanceolata, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 34. t. 81.—Mexic.
 lanceolata, Mart. & Gal. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 79 = *oajacana*.
 lancifolia, Benth. *Pl. Hartw.* 55 = *nitens*.
 lancifolia, Liebm. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 72 = *leiophylla*.
 lancifolia, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 78.—Mexic.
 lanigera, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 215.—Mexic.
 lanuginosa, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 57.—Reg. Himal.
 lanuginosa, Thuill. *Fl. Par. ed. II.* 502 = *Q. Robur*.
 lappacea, Roxb. *Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 637.—Reg. Himal.; Malaya.
 Lasistan, Kotschy, ex A. DC. *Prod.* xvi. II. 5 = *Q. Robur*.
 latifolia, Hort. ex Stend. *Nom. ed. II.* ii. 427 = *imbri-caria*.
 laurifolia, Michx. *Hist. Chênes Am.* t. 17.—Am. bor.
 laurifolia, Miq. *Pl. Jungh.* 11 = *Teysmannii*.
 laurina, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 32. t. 80.—Mexic.
 laurina, Liebm. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 70 = *lanceolata*.
 laurina, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 210 = *depressa*.
 laxa, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 181.—Mexic.
 laxiflora, Lindl. ex Wall. *Cat. n.* 2774 = *glauca*.
 Leana, Nutt. *N. Am. Sylv.* i. 25. t. 5 bis.—Am. bor.
 leiophylla, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 71.—Mexic.
 leptobalana, Guss. *Fl. Sic. Syn.* ii. 608 = *Q. Toza*.
 leptocarpa, Vukot.—*Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 163.—Europ.
 leptocarpos, Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1167 = *lusitanica*.

QUERCUS:—

- leptogyne, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 206 (sp. dub.).—Borneo.
 Lezermiana, Bosc, ex Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 226.—Europ. austr.
 Libani, Oliv. *Voy. Atlas.* t. 32.—Syria.
 Lindenii, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 32.—N. Granat.
 Lindleyana, Wall. *Cat. n.* 2782.—Burma.
 lineata, Blume, *Bijdr.* 523.—Reg. Himal.; Java.
 lineata, Miq. *Pl. Jungh.* 10 = *Junghuhnii*.
 linguaefolia, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 180.—Mexic.
 litoralis, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 303 (sp. dub.).—Java.
 litseifolia, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 228.—China.
 Llanosii, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 97.—Ins. Philipp.
 lobata, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 277.—Calif.
 lobulata, Soland. ex Sm. in *Abbot, Insects Georgia*, i. 93. t. 47 = *obtusiloba*.
 longaeva, Salisb. *Prod.* 392 = *Q. Robur*.
 longepedunculata, Willk. *Forstl. Fl.* 864 (Index) = *longipetiolata*.
 longifolia, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 327 = *Q. Robur*.
 longifolia, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 185 = *acutifolia*.
 longifolia, Rafin. *Alsog. Am.* 21 (Quid?).—Am. bor.
 longiglandia, Torr. & Frém. in *Frém. Geol. Mem.* Upper Calif. 15, 17 = *lobata*.
 longipes, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) 1. 387 = *Q. Robur*.
 longipetiolata, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 607 = *Q. Robur*.
 Look, Kotschy, *Eichen*, t. 21.—Syria.
 Lorentii, Hochst. in *Lorent, Wanderung.* 327.—As. Min.
 Louveirii, Hance, in *Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 201 = *Castanopsis tribuloides*.
 lucida, Roxb. *Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind.* iii. 635.—Malaya.
 Lucombeana x, Sweet, *Hort. Brit. ed. I.* 370.
 lusitanica, Lam. *Encyc.* i. 719.—Reg. Mediterr.; Oriens.
 lusitanica, Salzm. ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 666 = *humilis*.
 lutea, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 269.—Mexic.
 lutescens, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 219.—Mexic.
 lyrata, Spreng. *Syst.* iii. 864, partim = *lobata*.
 lyrata, Walt. *Fl. Carol.* 235.—Am. bor.
 McCormickii, Carruth. in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 32.—China.
 macedonica, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 50.—Macedon.
 Mackiana, Hook. *Ic. Pl.* t. 224 = *lappacea*.
 macranthera, Fisch. & Mey. ex Hohen. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) II. 259 = *castaneaefolia*.
 macrocarpa, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 24, sphalm. = *microphylla*.
 macrocarpa, Michx. *Hist. Chênes Am.* tt. 2, 3.—Am. bor.
 macrolepis, Kotschy, *Eichen*, t. 16 = *Q. Aegilops*.
 macrophylla, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 351 = *sundaica*.
 macrophylla, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 274 = *magnoliaefolia*.
 macrostipulata, Guss. ex Parl. *Fl. Ital.* iv. 178 = *Q. Robur*.
 magnoliaefolia, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 268.—Mexic.
 Maingayi, Benth. in *Hook. Ic. Pl.* t. 1314.—Ins. Penang.
 malacophylla, Schur, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* x. (1860) 181 = *Q. Robur*.
 mannifera, Lindl. *Bot. Reg.* (1840) Misc. 40 = *Q. Robur*.
 mappacea, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 202 = *sundaica*.
 marginata, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 304.—Japon.
 maritima, Rafin. *Alsog. Am.* 27 (Quid?).—Am. bor.
 maritima, Willd. *Sp. Pl.* iv. 424 = *aquatica*.
 marylandica, Du Roi, Harbk. *Paumz.* ii. 274 = *nigra*.

QUERCUS:—

- Matasii, Siebold, in *Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 26 = *glauca*.
 menesiensis, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 353.—Hungar.
 Merkusii, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 28 = *lineata*.
 mespilifolia, Wall. *Cat. n.* 2766.—Burma.
 mespilifolia, Wallr. *Sched. Crit.* 494 = *Q. Robur*.
 Mesto, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 579. t. 166 = *coccifera*.
 mexicana, Benth. *Pl. Hartw.* 56 = *crassipes*.
 mexicana, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 35. t. 82 = *Q. Castanea*.
 Michauxii, Nutt. *Gen. Am.* ii. 215.—Am. bor.
 microbalanos, Bor. *Fl. Centr. Fr. ed. III.* ii. 588, in obs. = *Q. Robur*.
 microcalyx, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 204 = *spicata*.
 microcarpa, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* 582 = *Q. Robur*.
 microcarpa, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 184 = *elliptica*.
 microphylla, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 264.—Mexic.
 Miqueliana, Scheff. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 360 = *Bennettii*.
 Mirbeckii, Dur. in *Duch. Rev. Bot.* ii. (1846) 426 = *lusitanica*.
 mitis, Banks, ex Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 15 (sp. dub.).—Ins. Mader.
 mixta, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 83 = *spicata*.
 mollis, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 216.—Mexic.
 mollis, Nutt. *Gen. Am.* ii. 215 = *bicolor*.
 molucca, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 726 = *Llanosii*.
 molucca, Linn. *Sp. Pl.* 1199.—Ins. Molucc.
 mongolica, Fisch. ex Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 101, nomen; xxvii. (1854) 1. 409.—As. or.
 montana, Willd. *Sp. Pl.* iv. 440 = *Q. Prinus*.
 monticola, Petz. & Kirchn. *Arb. Muscav.* 644 = *prae?*
 Morehus, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 36 = *Wislizeni*.
 Morisii, Borzi, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xiii. (1881) 10. t. 1.—Ins. Sardoia.
 Moulei, Hance, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 363.—China.
 mucronata, Willd. *Sp. Pl.* iv. 436 = *Q. Castanea*.
 Muehlenbergii, Engelm. in *Trans. Acad. Sc. St. Louis*, iii. (1878) 391 = *Q. Prinus*.
 muricata, Palau, *Pract. Bot.* vii. 172; ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* i. 240 = *lusitanica*.
 muricata, Roxb. *Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind.* iii. 635 = *sundaica*.
 myrsinaefolia, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 305.—Japon.
 myrtifolia, Willd. *Sp. Pl.* iv. 424 = *aquatica*.
 naiadarum, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 227.—China.
 nana, Willd. *Sp. Pl.* iv. 443 = *aquatica*.
 Nara, Hort. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 14 = *aliena*.
 Neaei, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 173 = *Garryana*.
 nectandriifolia, Liebm. l. c. 175.—Mexic.
 nepaulensis, Desf. *Cat. Hort. Par. ed. III.* 414 = *incana*.
 neurophylla, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 351 = *sundaica*?
 nigra, Linn. *Sp. Pl.* 995.—Am. bor.
 nigra, Marsh. *Arbust.* 120 = *discolor*.
 nigra, Rugel, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 60 = *rubra*.
 nigra, Thore, *Chlor. Land.* 381 = *Q. Toza*.
 nigrescens, Rafin. *Alsog. Am.* 19 (Quid?).—Am. bor.
 nigricans, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. II. 28 = *Q. Robur*.
 nitens, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 217.—Mexic.
 nitida, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 294 (sp. dub.).—Sumatra.
 nitida, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 210 = *acutifolia*.
 nitida, Rafin. *Alsog. Am.* 20 (Quid?).—Am. bor.
 nobilis, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. II. 65 = *falcata*.
 nobilis, Hort. Ottoland. ex Mast. in *Gard. Chron.* (1875) II. 816 = *nigra*.

QUERCUS:—

- Noii-Orleani*, Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 656 = aquatica.
- nudineris*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 182 = obtusata.
- oajacana*, Liebm. l. c. 178.—Mexic.
- oblonga*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 56 = Q. Ilex.
- oblongata*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = incana?
- oblongifolia*, R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 252 = chrysoplepis?
- oblongifolia*, Torr. in Sitgreaves, Rep. 173. t. 19.—Calif.; N. Mexic.
- obovata*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 62.—China.
- obtecta*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 182.—China.
- obtusa*, Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) 152, in syn. = laurifolia.
- obtusata*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 26. t. 76.—Mexic.
- obtusifolia*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = semecarpifolia.
- obtusiloba*, Michx. Hist. Chênes Am. t. 1.—Am. bor.
- occidentalis*, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 243.—Europ. austr.
- ocoteaefolia*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 176 = nitens.
- ocrea*, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 937 (= *Lepidadenia sumatrana*).—Sumatra.
- Oerstediana*, R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 250 = Garryana.
- oidocarpa*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 216. t. 47. f. 18.—Malaya.
- oleoides*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 79 = virginiana.
- oligodes*, Rafin. Alsog. Am. 28 (Quid?).—Am. bor.
- oligoneura*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 203 (sp. dub.).—Sumatra.
- olivaeformis*, Michx. f. Hist. Arb. Am. ii. 32. t. 2 = macrocarpa.
- olla*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 197 (sp. dub.).—Assam.
- omalokos*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 214.—Malaya.
- omissa*, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 28.—Mexic.
- ocarpa*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 184 = Warszewiczii.
- oogyne*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 351.—Sumatra.
- oophora*, Kotschy, Eichen, t. 26 = Brantii.
- Ouizabae*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 189.—Mexic.
- ovalifolia*, Bosc, ex Pers. Syn. ii. 570 = lusitanica.
- ovalis*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 502.—Ins. Philipp.
- oxyadenia*, Torr. in Sitgreaves, Rep. 172. t. 17 = agri-folia.
- oxycarpa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxii. 1872 (1873) 13.—Europ.
- oxyodon*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 114 = lineata.
- oxyrhyncha*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 347 = lineata.
- pachyphylla*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 197.—Reg. Himal.
- Pagoda*, Rafin. Alsog. Am. 23 (Quid?).—Am. bor.
- palaestina*, Kotschy, Eichen, t. 19 = coccifera.
- paleacea*, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 48 = Q. Robur.
- pallida*, Blume, Bijdr. 524.—Java.
- pallida*, Heuff. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 28; et in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien (1858), 195 = Q. Robur.
- palmata*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxii. (1872) 11.—Europ.
- Palmeri*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 393.—Calif.
- paludosa*, Hort. ex Petz. Arb. Muscav. 646 = bicolor.
- palustris*, Du Roi, Harbk. Baumz. ii. 263. t. 5. f. 4.—Am. bor.
- palustris*, Rugel, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 62 = coccinea.
- palustris*, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 175 = rubra.
- pandurata*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 28 = obtusata.
- pandurata*, Rafin. Alsog. Am. 21.—Am. bor.
- pannonica*, Hort. ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 24 = Q. Farnetto.
- pannosa*, Bosc, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 21 = bicolor.
- Parmenteria*, Hort. Soulang. ex Mutel, Fl. Fr. iii. 204 = Q. Robur.

QUERCUS:—

- paucilamellosa*, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 101 = lamellosa.
- pectinata*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 27 = Q. Robur.
- pedemontana*, Colla, Herb. Pedem. v. 185 = Q. Robur.
- peduncularis*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 270 = tomentosa.
- pedunculata*, Ehrh. Beitr. v. 161 = Q. Robur.
- pedunculata*, Née, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 33 = tomentosa.
- pedunculiflora*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 324 = Q. Robur.
- penangensis*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 859 = cyclophora.
- pendula*, Lodd. Cat. (1836) ex Loud. Arboret. iii. 1732 = Q. Robur.
- pendulina*, Kit. in Schult. Oester. Fl. ed. II. i. 620 = Q. Robur.
- perseaeefolia*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 188 = elliptica.
- persica*, Faub. & Spach, Illustr. i. 109. t. 55.—Persia.
- petiolaris*, Benth. Fl. Hartw. 55 = polymorpha.
- petiolaris*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. xii. 120 = lusitanica.
- petiolata*, Schur, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 18 = Q. Robur.
- Pfaffingeri*, Kotschy, Eichen, t. 23 = lusitanica.
- phellodrys*, Link, ex Steud. Nom. ed. I. 674; II. ii. 427, nomen.—Hab.?
- Phellos*, Linn. Sp. Pl. 994.—Am. bor.
- philippinensis*, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 97 = lineata?
- phillyraeoides*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858–59) 406.—Japan.
- Phyllata*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = glauca.
- Pinanga*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 303 (sp. dub.).—Java.
- pinnatifida*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 497.—Japan.
- pinnatifida*, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 673 = Q. Robur.
- pinnatifida*, Vukot. in Rad Jugos. Acad. Zagreb. xxii. 1872 (1873) 12 = Q. Robur?
- pinnatifida*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 326 = Q. Robur.
- placentaria*, Blume, Pijdr. 518 = spicata.
- placentaria*, Wall. Cat. n. 2779 = cyclophora.
- platycarpa*, Blume, Fl. Jav. Cupulif. 27. t. 15.—Java.
- plumbea*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 293 (sp. dub.).—Sumatra.
- polyantha*, Lindl. in Wall. Cat. n. 2771 = serrata.
- polycarpa*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 174 = Q. Robur.
- polycarpus*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 18 = lusitanica.
- polymorpha*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 78.—Mexic.
- polyneura*, Miq. Pl. Jungh. 11 = lineata.
- polystachya*, Wall. Cat. n. 2789.—Burma.
- pontica*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 319.—As. Min.
- prasina*, Bosc, ex Endl. Suppl. iv. 11. 25 = humilis.
- prasina*, Pers. Syn. ii. 568 = Q. Ilex.
- prinodes*, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 277 = Castanopsis indica.
- prinoides*, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid?).—Am. bor.
- prinoides*, Willd. Sp. Pl. iv. 440 = Q. Prinus.
- Prinus*, M. A. Curt. in Rep. Geol. Surv. N. Carol. (1880) 33, partim = Michauxii.
- Prinus*, Linn. Sp. Pl. 995.—Am. bor.
- pruinosa*, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 217.—Java.
- pruinosa*, Mor. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 86 = Q. Pseudo-molucca.
- Pseudo-ilex*, Chatin, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 22.—Europ.
- Pseudo-aegilops*, Petz. Arb. Muscav. 627 = Q. Robur.
- Pseudo-annulata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 299 = Teysmannii.
- Pseudo-cerris*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 118 = Q. Cerris.
- Pseudo-coccifera*, Desf. Fl. Atlant. ii. 349.—Reg. Mediterr.
- Pseudo-coccifera*, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. v. 9. t. 6 = coccifera.
- Pseudo-dchorochensis*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1165 = Q. Robur.
- Pseudo-molucca*, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 214.—Java.

QUERCUS:—

- Pseudo-molucca*, Mor. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 85 = spicata.
- Pseudo-peduncula*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xlv. (1878) 209 = Q. Robur.
- Pseudo-sessilis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 608 = Q. Robur.
- Pseudo-suber*, Santi, Viag. Tosc. i. 156. t. 3; Desf. Fl. Atlant. ii. 348.—Europ.
- Pseudo-tscharakensis*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 8 = Q. Robur.
- pubescens*, Brot. Fl. Lusit. ii. 31 = Q. Toza.
- pubescens*, Szovits, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 13 = castaneaefolia.
- pubescens*, Willd. Berl. Baumz. 279 = Q. Robur.
- pubinervis*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 211.—Mexic.
- pulchella*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 44. t. 88.—Mexic.
- pulverulenta*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 28 = Q. Robur.
- pumila*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 196 = Q. Prinus.
- pumila*, Walt. Fl. Carol. 234 = Q. Phellos.
- pungens*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 171 = grisea.
- purpurea*, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1735 = Q. Robur.
- Pyrami*, Kotschy, Eichen, t. 3 = Q. Aegilops.
- pyramidalis*, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 699 = Q. Robur.
- pyrenaica*, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 70 = Q. Robur.
- pyrenaica*, Willd. Sp. Pl. iv. 451 = Q. Toza.
- pyrifolia*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 304 = spicata.
- Quexigo*, Cook, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 240 = lusitanica.
- quinqueloba*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 542 = nigra.
- racemosa*, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 86 = spicata.
- racemosa*, Lam. Encyc. i. 715 = Q. Robur.
- Ragnal*, Lodd. Cat. ex Loud. Arboret. iii. 1849 = Q. Cerris.
- Raineri*, Bérang. Guir. Forest. t. 1; ex Pritz. Ic. Ind. ii. 238.—Hab.?
- Rajah*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 198.—Malaya.
- Ransomi*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 23 = lobata.
- Rassa*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 350.—Malaya.
- Ravenscroftiana*, A. Murr. in Gard. Chron. (1866) 1018 (sp. dub.).—Am. austr.
- Raynal*, C. Koch, Dendrol. ii. 11. 77 = Q. Cerris.
- recurvans*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 56 = coccifera.
- regalis*, Burnet, ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 24 = Q. Robur.
- regia*, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 41 = Libani.
- Reinwardtii*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 211.—Sumatra.
- repanda*, Benth. Pl. Hartw. 55 = microphylla.
- repanda*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 31. t. 79.—Mexic.
- repanda*, Michx. Hist. Chênes Am. t. 5 = alba.
- resinosa*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 182 = magnoliaefolia.
- reticulata*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 40. t. 86.—Am. bor. occ.
- retusa*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 187 = virginiana.
- retusa*, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid?).—Am. bor.
- reversa*, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 112 = thalassica.
- rhamnifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 853 = Castanopsis rhamnifolia.
- rhioënsis*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 198 = spicata.
- Richardii*, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 326.—Hispan.
- rigida*, C. Koch, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 18 = lusitanica.
- rigida*, Willd. Sp. Pl. iv. 434 = coccifera.
- Robur*, Asso, Syn. Stirp. Arag. 136 = Q. Toza.
- Robur*, Linn. Sp. Pl. 996.—Europ.; As. occ.
- Robur*, Pall. Fl. Ross. ii. 3 = mongolica.
- rosacea*, Bechst. Forstbot. ed. V. 210 = Q. Robur.
- rostrata*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. li. 1880) 17 (Quid?).—Europ.

QUERCUS:—

- rotundata, Blume, in *Verh. Batav. Gen.* ix. (1825) 219.—Java.
rotundifolia, Lam. *Encyc.* i. 723 = Q. Ilex.
Roxburghii, Endl. *Gen. Suppl.* iv. ii. 28 = serrata.
rubens, Petz. & Kirch. *Arb. Muscav.* 629 = Q. Robur.
rubra, Benth. *Pl. Hartw.* 337 = Kelloggii.
rubra, Linn. *Sp. Pl.* 996.—Am. bor.
rubra, Regel, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 63 = nigra.
Rudkini x, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, ix. (1882) tt. 10–12.—Am. bor.
rugosa, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 275 = crassifolia.
rugulosa, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 209.—Mexic.
rumelica, Griseb. & Schenk, in *Wieg. Archiv*, xviii. (1852) 353, in obs. = Q. Robur.
runcinata, Engelm. in *Trans. Acad. Sc. St. Louis*, iii. (1878) 542 = rubra.
Sada, [Mast. in] *Gard. Chron.* (1875) ii. 685 = rubra?
Sadleriana, R. Br. *Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. vii. (1871) 249.—Am. bor. occ.
salicifolia, Benth. *Pl. Hartw.* 56 = tlapuxahuensis.
salicifolia, Hort. ex Steud. *Nom. ed.* ii. ii. 428 = Q. Robur.
salicifolia, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 265.—Mexic.
salicina, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 305.—Japon.
Salzmanniana, Webb, *Iter Hisp.* 12 = lusitanica.
San-Sabeana, Buckley, in *Young, Bot. Texas*, 507; ex Sargent, *Rep. For. N. Am.* (U. St. 10th Census, ix.) 145 = Durandii.
sapotaeifolia, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 185.—Guatemala.
Sartorii, Botteri, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 66 = acutifolia.
Sartorii, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 185.—Guatemala.

QUERCUS:—

- sinuata*, Martr. & Timb. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) p. xi = Q. Ilex.
sinuata, Walt. *Fl. Carol.* 235 = alba?
Sirokasi, Siebold, in *Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 26.—Japon.
Skinneri, Benth. *Pl. Hartw.* 90.—Mexic.
Smilax, Linn. *Sp. Pl.* 994 = Q. Ilex.
sonchifolia, Booth, ex Petz. & Kirch. *Arb. Muscav.* 658 (Quid ?)—Hab.?
sonomensis, Benth. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 62 = Kelloggii.
sororia, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 175.—Mexic.
sphacelata, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 304 (sp. dub.)—Java.
sphaerocarpa, Vukot. in *Schloss. & Vukot. Bilinar*, 472 = Q. Robur.
spicata, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 46. t. 89 = reticulata.
spicata, Sm. in *Rees, Cycl.* xxix. n. 12.—Reg. Himal.; Malaya.
spinulosa, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 218 = crassifolia.
splendens, Née, in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 275.—Mexic.
squamata, Roxb. *Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 638 = spicata.
squarrosa, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 108.—Syria.
stellata, Wangenh. *Forstw.* 78. t. 6. f. 15 = obtusiloba.
stipularis, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 47. t. 90 = splendens.
stolonifera, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* 582 = Q. Toza.
Streimeri, Heuff. ex Freyn, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xxvii. (1878) 422 = Q. Robur.
striata, Siebold, ex André, in *Illustr. Hort.* xvii. (1870) 242. t. 44.—Japon.
striosa, Wierz. ex Rachel. *Bot. Reise Repert.* 72 (C-12)

QUERCUS:—

- Thirkeana*, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 14 = lusitanica.
Thomasii, Tenore, *Ind. Sem. Hort. Neap.* (1825) 11. n. 21 = Q. Robur.
Thomsoni, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 109.—Reg. Himal.
Thomsoniana, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 98 = lineata.
tinctoria, Bartr. *Trav. ed.* ii. (1794) 37; Michx. *Hist. Chênes Am.* tt. 24, 25 = discolor.
tlapuxahuensis, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 29.—Mexic.
tolimensis, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 153. t. 129.—N. Granat.
tomentella, Engelm. in *Trans. Acad. Sc. St. Louis*, iii. (1878) 393.—Calif.
tomentosa, Ehrh. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 6 = Q. Robur.
tomentosa, Willd. *Sp. Pl.* iv. 437.—Mexic.
Tommasini, Kotschy, ex Vis. *Fl. Dalm. Suppl.* 45 = Q. Robur.
torulosa, Vukot. in *Rad Jugos. Akad. Zagreb.* li. (1880) 14 (Quid ?)—Europ.
Tosa, Loisel. in *Duham. Arb. ed.* Nov. vii. 179 = Q. Toza.
totutlensis, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 62.—Mexic.
Tournefortii, Willd. *Sp. Pl.* iv. 453 = Q. Cerris.
Toza, Gillet, ex Bosc, in *Lam. Journ. Hist. Nat.* ii. (1792) 115. t. 2. f. 3.—Europ. austr.
Toza, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 337 = Q. Robur.
tribuloides, Sm. in *Rees, Cycl.* xxix. n. 13 = Castanopsi tribuloides.
tricolor, Hort. ex Petz. & Kirch. *Arb. Muscav.* 624 = Q. Robur.
tridens, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 35. t. 82 = Q. Castanea.
tridentata, Engelm. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 64 = nigra.
tridentata, Michx. in *st. Chênes Am.* t. 26 = falcata.
tridentata, Michx. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* Castanea.
tridentata, Michx. ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 46

Mr. Hillier

You can safely retain the
distinctive name of Q. Ruber
for the cork-oak

Koch Dendrologie
reduces it

W.R.H.
27.10.03

- serrata*, Thunb. *Fl. Jap.* 176.—Reg. Himal.; China; Japon.
serratifolia, Benth. ex Petz. & Kirch. *Arb. Muscav.* 632 = Libani?
sessiliflora, Salisb. *Prod.* 392 = Q. Robur.
sessilifolia, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 305 (sessilifolia).—Japon.
sessilis, Ehrh. *Beitr.* v. 161 = Q. Robur.
setifera, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1874) i. 726; et ex T. Moore, in *Flor. & Pomol.* (1875) 199. f. 8.—Japon.
Shumardii, Buckl. in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1860 (1861) 444 = discolor?
Sibthorpii, Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1169 = coccifera.
sideroxylla, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 39. t. 85.—Mexic.
Sieboldiana, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 290 = thalassica.
silvicularum, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 229.—China.

- tardiflora*, Czern. ex Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) i. 385 = Q. Robur.
tauricola, Kotschy, Eichen, t. 10 = lusitanica.
Tauza, Desf. *Tabl. ed.* ii. 245 = Q. Toza.
Tausin, Pers. *Syn.* ii. 571 = Q. Toza.
Tchihatcheffii, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 48 = seq.
Tchihatchewi, Kotschy, in *Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 468 = Libani.
Tema, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 3733 = lanceaefolia.
Tennesi, Hort. ex Wesmael, in *Bull. Congr. Bot. Brux.* (1864) 275 = Q. Robur.
tenuicola, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1167, in syn. sphalm. = tauricola.
texana, Buckl. in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1860 (1861) 444 = rubra.
Teysmannii, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 300 (Tysmannii).—Java; Sumatra.
thalassica, Hance, in *Hook. Kew Journ.* i. (1849) 176.—China.
thelecarpa, Miq. *Pl. Jungh* 9 = Q. Pseudo-molucca.

- Loud. *Gard. Mag.* xv. (1839) 590;
Illustr. i. t. 57 A = Q. Aegilops.
in Overs. Danske Vidensk. Selsk.
= polymorpha.
Bijdr. 523 = lineata.
Linnaea, xxxii. (1863) 353 =
in Overs. Danske Vidensk. Selsk.
= guatemalensis.
ort. Beng. 68; *Fl. Ind.* iii. 636 =
DC. in DC. Prod. xvi. ii. 43 =
m. Hort. Berol. 975 = lusitanica.
fus. Bot. Lugd. Bat. i. 300, sphalm.
Forstw. 80. t. 6 = nigra.
n Journ. Bot. xii. (1874) 241 =
Suppl. iv. ii. 26 = calophylla.
Hartw. 81 = Benthami.
in Trans. Acad. Sc. St. Louis,
iii. (1878) 392, partim = Durandii.
undulata, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 354 (Reliq. Kitaib. 110) = Q. Robur.
undulata, C. Koch, l. c. xix. (1847) 14 = lusitanica.
undulata, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 248. t. 4.—Am. bor. occ.
Ungeri, Kotschy, Eichen, t. 13 = Q. Aegilops.
urceolaris, Jack, in *Malay. Misc.* ii. (1822) vii. 87.—Sumatra.
urticaefolia, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 296.—China; Japon.
uvariifolia, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 227.—China.
vaccinifolia, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* ed. II. i. (1873) 106 = chrysoplepis.
valentina, Cav. *l. c.* ii. 25 = lusitanica.
valentina, Lam. ex Steud. *Nom. ed.* i. 675 = discolor.
valida, Kotschy, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. ii. 55 = coccifera.
Vallonea, A. DC. l. c. 45 = Q. Aegilops.
Vallonea, Kotschy, Eichen, t. 7 = Q. Cerris.
variabilis, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 297.—Japon.

QUERCUS:—

- Novi-Orleani*, Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 656 = aquatica.
nudineris, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 182 = obtusata.
oajacana, Liebm. l. c. 178.—Mexic.
oblonga, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 56 = Q. Ilex.
oblongata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = incana?
oblongifolia, R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 252 = chrysoplepis?
oblongifolia, Torr. in Sitgreaves, Rep. 173. t. 19.—Calif.; N. Mexic.
obovata, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 62.—China.
obtecta, Poir. Encyc. Suppl. ii. 182.—China.
obtusa, Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) 152, in syn. = laurifolia.
obtusata, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 26. t. 76.—Mexic.
obtusifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = semecarpifolia.
obtusiloba, Michx. Hist. Chênes Am. t. 1.—Am. bor.
occidentalis, F. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 243.—Europ. austr.
ocoteaefolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 176 = nitens.
ocrea, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 937 (= *Lepidadenia sumatrana*).—Sumatra.
Oerstediana, R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 250 = Garryana.
oidocarpa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 216. t. 47. f. 18.—Malaya.
oleoides, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 79 = virginiana.
oligodes, Rafin. Alsog. Am. 28 (Quid?).—Am. bor.
oligoneura, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 203 (sp. dub.).—Sumatra.
olivaeformis, Michx. f. Hist. Arb. Am. ii. 32. t. 2 = macrocarpa.
olla, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 197 (sp. dub.).—Assam.
omalokos, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 216. t. 47. f. 18.—Malaya.
omissa, A. DC. in DC. Prod. xvi. 1.
ocarpa, Liebm. in Overs. Dansl. Forh. (1854) 184 = Warszewiczii.
oogyne, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.
oophora, Kotschy, Eichen, t. 26 = I.
Orizabae, Liebm. in Overs. Dan. Forh. (1854) 189.—Mexic.
ovalifolia, Bosc, ex Pers. Syn. ii. 5.
ovalis, Blanco, Fl. Filip. ed. 11. 5.
oxyadenia, Torr. in Sitgreaves, Rep. 173. t. 19.—Calif.; N. Mexic.
oxycarpa, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxii. (1872) 11.—Europ.
oxyodon, Miq. Ann. Mus. Bot. I. lineata.
oxyrhyncha, Miq. Fl. Ind. Bat. Su. pachyphylla, Kurz, in Journ. A. (1875) 11. 197.—Reg. Himal.
Pagoda, Rafin. Alsog. Am. 23 (Q).
palaestina, Kotschy, Eichen, t. 19.
paleacea, Desv. Journ. Bot. i. (181).
pallida, Blume, Bijdr. 524.—Java.
pallida, Heuff. in Oestr. Bot. 2. 28; et in Verh. Zool.-Bot. Ges. Q. Robur.
palmata, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxii. (1872) 11.—Europ.
Palmeri, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 393.—Calif.
paludosa, Hort. ex Petz. Arb. Muscav. 646 = bicolor.
palustris, Du Roi, Harbk. Baumz. ii. 268. t. 5. f. 4.—Am. bor.
palustris, Rugel, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 62 = coccinea.
palustris, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 175 = rubra.
pandurata, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 28 = obtusata.
pandurata, Rafin. Alsog. Am. 21.—Am. bor.
pannonica, Hort. ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 24 = Q. Farnetto.
pannosa, Bosc, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 21 = bicolor.
Parmenteria, Hort. Soulang. ex Mutel, Fl. Fr. iii. 204 = Q. Robur.

QUERCUS:—

- paucilamellosa*, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 101 = lamellosa.
pectinata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 27 = Q. Robur.
pedemontana, Colla, Herb. Pedem. v. 185 = Q. Robur.
peduncularis, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 270 = tomentosa.
pedunculata, Ehrh. Beitr. v. 161 = Q. Robur.
pedunculata, Née, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 33 = tomentosa.
pedunculiflora, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 324 = Q. Robur.
penangensis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 859 = cyclophora.
pendula, Lodd. Cat. (1836) ex Loud. Arboret. iii. 1732 = Q. Robur.
pendulina, Kit. in Schult. Oester. Fl. ed. 11. i. 620 = Q. Robur.
persaeefolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 188 = elliptica.
persica, Faub. & Spach, Illustr. i. 109. t. 55.—Persia.
petiolaris, Benth. Fl. Hartw. 55 = polymorpha.
petiolaris, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. xii. 120 = lusitanica.
petiolata, Schur, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 18 = Q. Robur.
Pfaeffingeri, Kotschy, Eichen, t. 23 = lusitanica.
phellodrys, Link, ex Steud. Nom. ed. I. 674; II. ii. 427, nomen.—Hab.?
Phellos, Linn. Sp. Pl. 994.—Am. bor.
philippinensis, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 97 = lineata?
phillyraeoides, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858–59) 406.—Japon.
Phyllata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = glauca.
Pinanga, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 303 (sp. dub.).—Java.
pinnatifida, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 497.—Japon.
pinnatifida, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 673 = Q. Robur.
- (1880) 33, partim = Michauxii.
Prinus, Linn. Sp. Pl. 995.—Am. bor.
pruinosa, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 217.—Java.
pruinosa, Mor. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 86 = Q. Pseudo-molucca.
Pseud-ilex, Chatin, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 22.—Europ.
Pseudo-aegilops, Petz. Arb. Muscav. 627 = Q. Robur.
Pseudo-annulata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 299 = Teysmannii.
Pseudo-cerris, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 118 = Q. Cerris.
Pseudo-coccifera, Desf. Fl. Atlant. ii. 349.—Reg. Mediterr.
Pseudo-coccifera, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. v. 9. t. 6 = coccifera.
Pseudo-dchorochensis, Boiss. Fl. Orient. iv. 1165 = Q. Robur.
Pseudo-molucca, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 214.—Java.

QUERCUS:—

- Pseudo-molucca*, Mor. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 85 = spicata.
Pseudo-peduncula, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xlv. (1878) 209 = Q. Robur.
Pseudo-sessilis, Schur, Enum. Pl. Transs. 608 = Q. Robur.
Pseudo-suber, Santi, Viag. Tosc. i. 156. t. 3; Desf. Fl. Atlant. ii. 348.—Europ.
Pseudo-tscharakensis, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 8 = Q. Robur.
pubescens, Brot. Fl. Lusit. ii. 31 = Q. Toza.
pubescens, Szovits, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 13 = castaneaefolia.
pubescens, Willd. Berl. Baumz. 279 = Q. Robur.
pubinervis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 211.—Mexic.
pulchella, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 44. t. 88.—Mexic.
pulverulenta, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 28 = Q. Robur.
pumila, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 196 = Q. Prinus.
pumila, Walt. Fl. Carol. 234 = Q. Phellos.
pungens, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 171 = grisea.
purpurea, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1735 = Q. Robur.
Pyrami, Kotschy, Eichen, t. 3 = Q. Aegilops.
pyramidalis, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 699 = Q. Robur.
pyrenaica, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 70 = Q. Robur.
pyrenaica, Willd. Sp. Pl. iv. 451 = Q. Toza.
pyrifolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 304 = spicata.
Quexigo, Cook, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 240 = lusitanica.
quinguloba, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 542 = nigra.
racemosa, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 86 = spicata.
racemosa, Lam. Encyc. i. 715 = O. Robur.
- Am. bor. occ.
retusa, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 187 = virginiana.
retusa, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid?).—Am. bor.
reversa, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 112 = thalassica.
rhamnifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 853 = Castanopsis rhamnifolia.
rhioensis, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 198 = spicata.
Richardii, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 326.—Hispan.
rigida, C. Koch, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 18 = lusitanica.
rigida, Willd. Sp. Pl. iv. 434 = coccifera.
Robur, Asso, Syn. Stirp. Arag. 136 = Q. Toza.
Robur, Linn. Sp. Pl. 996.—Europ.; As. occ.
Robur, Pall. Fl. Ross. ii. 3 = mongolica.
rosacea, Bechst. Forstbot. ed. V. 210 = Q. Robur.
rostrata, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. li. 1880) 17 (Quid?).—Europ.

QUERCUS:—

- rotundata, *Blume, in Verh. Batav. Gen.* ix. (1825) 219.—Java.
- rotundifolia*, Lam. *Encyc.* i. 723 = *Q. Ilex*.
- Roxburghii*, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 28 = *serrata*.
- rubens*, Petz. & Kirchn. *Arb. Muscav.* 629 = *Q. Robur*.
- rubra*, Benth. *Pl. Hartw.* 337 = Kelloggii.
- rubra*, Linn. *Sp. Pl.* 996.—Am. bor.
- rubra*, Rugel, ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 63 = *nigra*.
- Rudkini* ×, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) tt. 10–12.—Am. bor.
- rugosa*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 275 = *crassifolia*.
- rugulosa*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 209.—Mexic.
- rumelica*, Griseb. & Schenk, in Wieg. *Archiv.* xviii. (1852) 353, in obs. = *Q. Robur*.
- runcinata*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 542 = *rubra*.
- Sada*, [Mast. in] *Gard. Chron.* (1875) II. 685 = *rubra*?
- Sadleriana, *R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. vii. (1871) 249.—Am. bor. occ.
- salicifolia*, Benth. *Pl. Hartw.* 56 = *tlapuxahuensis*.
- salicifolia*, Hort. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 428 = *Q. Robur*.
- salicifolia*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 265.—Mexic.
- salicina*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 305.—Japan.
- Salzmanniana*, Webb, *Iter Hisp.* 12 = *lusitanica*.
- San-Sabeana*, Buckley, in Young, *Bot. Texas*, 507; ex Sargent, *Rep. For. N. Am.* (U. St. 10th Census, ix.) 145 = *Durandii*.
- sapotaeifolia*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 185.—Guatemala.
- Sartorii*, Botteri, ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 66 = *acutifolia*.
- Sartorii*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 177.—Mexic.
- sclerophylla*, Lindl. & Paxt. *Flow. Gard.* i. (1850–51) 59. t. 37.—China.
- scolopendrifolia*, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. II. 28 = *Q. Robur*.
- scyphigera*, Hance, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 199.—Ins. Banca.
- scytophylla*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 180.—Mexic.
- Secondati*, Steud. *Nom. ed.* I. 674 = *Q. Cerris*.
- Seemannii*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 188.—Am. austr.
- segoviensis*, Liebm. l. c. 186.—Nicaragua.
- semecarpifolia*, Sm. in *Rees, Cycl.* xxix. n. 20.—Reg. Himal.
- semiserrata*, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 641.—Reg. Himal.
- sempervirens*, Mill. *Gard. Dict. ed.* VIII. n. 3 = *Q. Ilex*.
- sempervirens*, Walt. *Fl. Carol.* 234 = *virginiana*.
- sericea*, Scheff. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 361.—Ins. Banca.
- sericea*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 424 = *Q. Phellos*.
- Serra*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 174.—Mexic.
- serrata*, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 641 = *Castanopsis indica*.
- serrata*, *Thunb. Fl. Jap.* 176.—Reg. Himal.; China; Japan.
- serratifolia*, Benth. ex Petz. & Kirch. *Arb. Muscav.* 632 = *Libani*?
- sessiliflora*, Salisb. *Prod.* 392 = *Q. Robur*.
- sessilifolia*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 305 (sessifolia).—Japan.
- sessilis*, Ehrh. *Beitr.* v. 161 = *Q. Robur*.
- setifera*, Hort.—*Cf. Gard. Chron.* (1874) I. 726; et ex *T. Moore, in Flor. & Pomol.* (1875) 199. f. 8.—Japan.
- Shumardii*, Buckl. in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1860 (1861) 444 = *discolor*?
- Sibthorpii*, Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1169 = *coccifera*.
- sideroxyla*, *Humb. & Bonpl. Pl. Aequin.* ii. 39. t. 85.—Mexic.
- Sieboldiana*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 290 = *thalassica*.
- silvicularum*, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 229.—China.

QUERCUS:—

- sinuata*, Martr. & Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. xi = *Q. Ilex*.
- sinuata*, Walt. *Fl. Carol.* 235 = *alba*?
- Sirokasi*, Siebold, in *Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 26.—Japan.
- Skinneri*, Benth. *Pl. Hartw.* 90.—Mexic.
- Smilax*, Linn. *Sp. Pl.* 994 = *Q. Ilex*.
- sonchifolia*, Booth, ex Petz. & Kirch. *Arb. Muscav.* 658 (Quid?).—Hab.?
- sonomensis*, Benth. ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 62 = Kelloggii.
- sororia*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 175.—Mexic.
- sphacelata*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 304 (sp. dub.).—Java.
- sphaerocarpa*, Vukot. in Schloss. & Vukot. *Bilinear*, 472 = *Q. Robur*.
- spicata*, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 46. t. 89 = *reticulata*.
- spicata*, Sm. in *Rees, Cycl.* xxix. n. 12.—Reg. Himal.; Malaya.
- spinulosa*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 218 = *crassifolia*.
- splendens*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 275.—Mexic.
- squamata*, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 638 = *spicata*.
- squarrosa*, Kotschy, ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 108.—Syria.
- stellata*, Wangenh. *Forstw.* 78. t. 6. f. 15 = *obtusiloba*.
- stipularis*, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 47. t. 90 = *splendens*.
- stolonifera*, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* 582 = *Q. Toza*.
- Streimeri*, Heuff. ex Freyn, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xxvii. (1878) 422 = *Q. Robur*.
- striata*, Siebold, ex André, in *Illustr. Hort.* xvii. (1870) 242. t. 44.—Japan.
- strigosa*, Wierz. ex Rochel, *Bot. Reise Banat.* 73 (Quid?).—Europ.
- strombocarpa*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 176.—Mexic.
- subalpina*, Kotschy, ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 9 = *Q. Robur*.
- Suber*, Kotschy, Eichen, t. 33 = *Q. Pseudo-suber*.
- Suber*, Linn. *Sp. Pl.* 995 = *Q. Ilex*.
- subera*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = *præc.*
- suberoides*, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 360.—Sicilia.
- suberosa*, Salisb. *Prod.* 392 = *Q. Ilex*.
- sublobata*, Kit. in Schult. *Oester. Fl. ed.* II. i. 619 = *Q. Robur*.
- subvelutina*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 606 = *Q. Robur*.
- sundaica*, *Blume, in Verh. Batav. Gen.* ix. (1825) 216.—Malaya.
- sundaica*, Villar, in Blanco, *Fl. Philipp.* ed. III. Nov. App. 207 (excl. syn. Naves) = *Companoana*.
- susedana*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. li. (1880) 15 = *lanuginosa*.
- synbalanos*, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 228.—Ins. Hongkong.
- syriaca*, Kotschy, Eichen, t. 1 = *lusitanica*.
- sypsiensis*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 328 = *Q. Robur*.
- tardiflora*, Czern. ex Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) I. 385 = *Q. Robur*.
- tauricola*, Kotschy, Eichen, t. 10 = *lusitanica*.
- Tauza*, Desf. *Tabl. ed.* II. 245 = *Q. Toza*.
- Tauzin*, Pers. *Syn.* ii. 571 = *Q. Toza*.
- Tchihatcheffii*, Kotschy, ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 48 = *seq.*
- Tchihatchewi*, Kotschy, in Tchihat. *Asie Min. Bot.* ii. 468 = *Libani*.
- Tema*, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 3733 = *lanceae-folia*.
- Tennesi*, Hort. ex Wesmael, in Bull. Congr. Bot. Brux. (1864) 275 = *Q. Robur*.
- tenuicola*, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1167, in syn. *sphalm.* = *tauricola*.
- texana*, Buckl. in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1860 (1861) 444 = *rubra*.
- Teysmannii*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 300 (Tysmannii).—Java; Sumatra.
- thalassica*, Hance, in *Hook. Kew Journ.* i. (1849) 176.—China.
- thelecarpa*, Miq. *Pl. Jungh* 9 = *Q. Pseudo-molucca*.

QUERCUS:—

- Thirkeana*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 14 = *lusitanica*.
- Thomasii*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 21 = *Q. Robur*.
- Thomsoni*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 109.—Reg. Himal.
- Thomsoniana*, A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 98 = *lineata*.
- tinctoria*, Bartr. *Trav. ed.* II. (1794) 37; Michx. *Hist. Chênes Am.* tt. 24, 25 = *discolor*.
- tlapuxahuensis*, A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 29.—Mexic.
- tolimensis*, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 153. t. 129.—N. Granat.
- tomentella*, Engelm. in *Trans. Acad. Sc. St. Louis*, iii. (1878) 393.—Calif.
- tomentosa*, Ehrh. ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 6 = *Q. Robur*.
- tomentosa*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 437.—Mexic.
- Tommasini*, Kotschy, ex Vis. *Fl. Dalm. Suppl.* 45 = *Q. Robur*.
- torulosa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. li. (1880) 14 (Quid?).—Europ.
- Tosa*, Loisel. in Duham. *Arb. ed.* Nov. vii. 179 = *Q. Toza*.
- totutlensis*, A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 62.—Mexic.
- Tournefortii*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 453 = *Q. Cerris*.
- Toza*, Gillet, ex Bosc, in *Lam. Journ. Hist. Nat.* ii. (1792) 115. t. 2. f. 3.—Europ. austr.
- Toza*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 337 = *Q. Robur*.
- tribuloides*, Sm. in *Rees, Cycl.* xxix. n. 13 = *Castanopsi tribuloides*.
- tricolor*, Hort. ex Petz. & Kirch. *Arb. Muscav.* 624 = *Q. Robur*.
- tridens*, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 35. t. 82 = *Q. Castanea*.
- tridentata*, Engelm. ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 64 = *nigra*.
- triloba*, Michx. *Hist. Chênes Am.* t. 26 = *falcata*.
- tristis*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 174 = *Q. Castanea*.
- trojana*, Kotschy, ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 46 = *seq.*?
- trojana*, Webb, in Loud. *Gard. Mag.* xv. (1839) 590; et Jaub. & Spach, *Illustr.* i. t. 57 A = *Q. Aegilops*.
- tuberculata*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 181 = *polymorpha*.
- turbinata*, *Blume, Bijdr.* 523 = *lineata*.
- turbinata*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 353 = *Q. Robur*.
- turbinata*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 186 = *guatemalensis*.
- turbinata*, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 636 = *Thomsoni*.
- Turneri*, Hort. ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 43 = *Q. Pseudo-suber*.
- Turneri*, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 975 = *lusitanica*.
- Tysmannii*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 300, *sphalm.* = *Teysmannii*.
- uliginosa*, Wangenh. *Forstw.* 80. t. 6 = *nigra*.
- umbonata*, Hance, in *Journ. Bot.* xii. (1874) 241 = *cyclophora*.
- umbrosa*, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 26 = *calophylla*.
- undulata*, Benth. *Pl. Hartw.* 81 = *Benthami*.
- undulata*, Engelm. in *Trans. Acad. Sc. St. Louis*, iii. (1878) 392, *partim* = *Durandii*.
- undulata*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 354 (Reliq. Kitaib. 110) = *Q. Robur*.
- undulata*, C. Koch, l. c. xix. (1847) 14 = *lusitanica*.
- undulata*, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 248. t. 4.—Am. bor. occ.
- Ungeri*, Kotschy, Eichen, t. 13 = *Q. Aegilops*.
- urceolaris*, Jack, in *Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 87.—Sumatra.
- urticaefolia*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 296.—China; Japan.
- uvatifolia*, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 227.—China.
- vaccinifolia*, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* ed. II. i. (1873) 106 = *chrysolepis*.
- valentina*, Cav. l. c. ii. 25 = *lusitanica*.
- valentina*, Lam. ex Steud. *Nom. ed.* I. 675 = *discolor*.
- valida*, Kotschy, ex A. DC. in DC. *Prod.* xvi. II. 55 = *coccifera*.
- Vallonea*, A. DC. l. c. 45 = *Q. Aegilops*.
- Vallonea*, Kotschy, Eichen, t. 7 = *Q. Cerris*.
- variabilis*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 297.—Japan.

QUERCUS:—

- varians*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 214 = polymorpha.
variegata, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 428 = *Q. Cerris*.
variifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 465 = *Q. Ilex*.
varingaefolia, Miq. Pl. Jungh. 12 = *javensis*.
Vaseyana, Buckl. in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 91. — Texas.
velutina, Lam. Encyc. i. 721 = *discolor*?
velutina, L'Hérit. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 21 = *bicolor*.
velutina, Lindl. in Wall. Pl. As. Rar. ii. 41. t. 150. — Burma.
verrucosa, Rafin. Alsog. Am. 26 (Quid?). — Am. bor.
versicolor, Rafin. l. c. 20 (Quid?). — Am. bor.
vertensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 354, nomen. — Hungar.
vesca, Kotschy, Eichen, t. 36 = Libani.
Vibrayana, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 498. — Japon.
Vidalii, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 209. — Ins. Philipp.
villosa, Walt. Fl. Carol. 235 = *obtusiloba*?
viminalis, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 316 = *Q. Robur*.
virens, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 356 = *virginiana*.
virgata, Mart. Fl. Tam. 641 = *Q. Robur*.
Virgiliana, Tenore, Fl. Nap. v. 262 = *Q. Robur*.
virginiana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 16. — Am. bor.
vulcanica, Boiss. ex Kotschy, Eichen, t. 18 = *Q. Robur*.
Wallichiana, Lindl. in Wall. Cat. n. 2778. — Malaya.
Warszewiczii, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 187. — Guatemala.
Welandii, Simk. in Magyar Növényt. Lapok, vii. (1883) 67 = *Q. Robur*.
Wislizeni, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 67. — Calif.
Woodii, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 240. — Ins. Philipp.
xalapensis, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 24. t. 75. — Mexic.
xylina, [Scheidw.] Hort. Belge, iv. (1837) 321. t. 18 = *reticulata*.
xylocarpa, Kuræ, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) II. 196. — Assam; Burma.

QUERIA, Loefl. It. Hisp. 48 (1752). *CARYO-*

- PHYLLAE*, Benth. & Hook. f. i. 152.
argyrocoma, Eaton, N. Am. Bot. ed. VII.; ex Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 343 = *Paronychia argyrocoma*.
canadensis, Linn. Sp. Pl. 90 = *Anychia dichotoma*.
capillacea, Nutt. Gen. Am. i. 159 = *Anychia dichotoma*.
chilensis, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 428 = *Donatia fascicularis*?
dichotoma, Maxim. ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 405 = *trichotoma*.
dichotoma, Moench, Meth. 351 = *Anychia dichotoma*.
hispanica, Linn. Sp. Pl. 90. — Reg. Mediterr. & Caucas.
multiflora, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 675 = *Anychia dichotoma*.
sessiliflora, Eaton, N. Am. Bot. ed. VII.; ex Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 343 = *Paronychia sessiliflora*.
trichotoma, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 329 = *Wikstroemia japonica*.

QUESNELIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 54 (1844-49). *BROMELIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 665.

- GUESMELIA*, Walp. Ann. i. 841 (1849).
LIEVENA, Regel, Gartenfl. (1880) 289.
Augustocoburgi, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 150. — Bras.
centralis, Wawra, l. c. = *lateralis*.
lateralis, Wawra, l. c. 149. — Bras.
roseo-marginata, Carr. in Rev. Hort. (1880) 70; et ex E. Morr. in Belg. Hort. xxxi. (1881) 82. t. 4 = *rufa*, Gaudich.
rufa, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 54. — Bras.
rufa, E. Morr. in Belg. Hort. xxxii. (1882) 115. t. 4-6. — Guian.
Skinneri, Hort. ex E. Morr. l. c. xxxi. (1881) 82 = *rufa*, Gaudich.
strobilospica, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 149. — Bras.

QUESNELIA:—

- Van Houttei, E. Morr. in Belg. Hort. xxxi. (1881) 163, 350. t. 18. — Bras.

QUETELETIA, Blume, Orch. Archip. Ind. 117. t. 37 (1858) = **Physurus**, Rich. (Orchid.).
plantaginifolia, Blume, l. c. 118 (= *Orchipedum plantaginifolium*). — Java.

QUINA, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 19. t. 379 (1775).

- GUTTIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 176.
GUINA, Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 115.
ROBINSONIA, Scop. Introd. 218 (1777).
TOUROULIA, Aubl. Pl. Gui. 492. t. 194 (1775).
crenata, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 163. — Guian.
Cruegeriana, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 106. — Ins. Trinit.
Decaisneana, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 315. — Guian.
florida, Tul. l. c. Sér. III. xi. (1849) 167. — Bras.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 19. — Guian.
guianensis, Crueg. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 106 = *Cruegeriana*.
jamaicensis, Griseb. l. c. 105. — Jamaic.
leptoclada, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 159. — Guian.
longifolia, Spruce, ex Planch. & Triana, l. c. Sér. IV. xv. (1861) 314. — Bras.
macrophylla, Tul. l. c. Sér. III. xi. (1849) 164. — Venezuela.
macrostachya, Tul. l. c. 162. — Peruv.
micrantha, Tul. l. c. 160. — Bras.
obovata, Tul. l. c. 157. — Guian.
Poeppigiana, Tul. l. c. 161. — Bras.
rhytidopus, Tul. l. c. 166. — Bras.
sessilis, Choisy, Planch. & Triana, l. c. Sér. IV. xv. (1861) 312. — Guian.
ternatiflora, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 9. — Cuba.
tinifolia, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 311. — Bras.

QUILAMUM, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 851 (1837) = **Crypteronia**, Blume (Lythrac.).
luteum, Blanco, l. c. = *C. pubescens*.

QUILESIA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 176 (1837) = **Chailetia**, DC.

sericea, Blanco, l. c. 177 = *C. Griffithii*.

QUILIUSA, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 460, sphalm. = **QUELUSIA**, Vand. = **Fuchsia**, Linn. (Onagrar.).

QUILLAIA, Molina = seq.

QUILLAJA, Molina, Sagg. Chile, 354 (1782). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 614.

CULLAY, Molina, ex Steud. Nom. ed. II. i. 452 (1840).

Fontenellea, A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 141. t. 7.

Smegmadermos, Ruiz & Pav. Prod. 133. t. 31 (1794).

brasiliensis, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 127. — Bras.
lanceolata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1616 = seq.
lancifolia, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan.-March 1831) 231. — Bras.

Molinae, DC. Prod. ii. 547 = *Q. Saponaria*.
petiolaris, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.-Dec. 1831) 110 = *Azara Gilliesii*.

Poeppigii, Walp. Rep. ii. 52. — Chili.
Saponaria, Molina, Sagg. Chile, 175, 354. — Chili.

Saponaria, Poir. Encyc. vi. 33 = *Q. Smegmadermos*.
Sellowiana, Walp. Rep. ii. 52. — Bras.

smegmadermis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.

Smegmadermos, DC. Prod. ii. 547. — Chili.
Smegmadermos, Poepp. ex Walp. Rep. ii. 52 = *Poeppigii*.

QUINARIA, Lour. Fl. Cochinch. 272 (1790) = **Clausena**, Burm. f. (Rutac.).

Lansium, Lour. l. c. = *C. Wampi*.

QUINARIA, Rafin. Med. Fl. ii. 122 (1830) = **Vitis**, Tourn. (Ampel.).

hederacea, Rafin. l. c. = *V. hederacea*.
hirsuta, Rafin. l. c. = *V. hederacea*.

japonica, Rafin. Sylva Tellur. 87 = *V. heterophylla*.

QUINASIS, Rafin. Sylva Tellur. 150 (1838) = **Poly-Iepis**, Ruiz & Pav. (Rosac.).
villosa, Rafin. l. c. = *villosa*.

QUINCHAMALA, Willd. Sp. Pl. i. 1217 (1797) = seq.

QUINCHAMALIUM, Molina, Sagg. Chile, ed. I. 151 (1782). *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 220.

andium, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.
Berteroanum, Phil. l. c. 748. — Chili.

bracteosum, Phil. l. c. 747. — Chili.
breviflorum, Presl, Epim. Bot. 246 = *majus*.

carnosum, Phil. Fl. Atac. 48. — Chili.
chilense, Lam. Illustr. ii. 125. t. 142 = *procumbens*.

chilense, Molina, Sagg. Chile, 151. — Chili.
chilense, Phil. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 625 = *majus*.

chilense, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 412 = *gracile*.

chilense, Willd. Sp. Pl. i. 1217 = *linifolium*.
Dombeyi, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 52 = *procumbens*.

elegans, Presl, Epim. Bot. 246. — Chili.
ericoides, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 52 = *gracile*.

excrescens, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 748. — Chili.
fruticosum, Steud. Nom. ed. II. ii. 429. — Cf. Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 138. — Chili.

gracile, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 231. t. 52. — Chili.

linarioides, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 746. — Chili.
linifolium, Meyen, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 412 = *procumbens*.

linifolium, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 135. — Chili.

litorale, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 234. — Chili.

majus, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 229. t. 51. — Chili.

minutum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 233 = *gracile*.

parviflorum, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.

patagonicum, Phil. f. in Anal. Soc. Cient. Argent. x. (1880) 143. — Patagon.

patagonicum, Spreng. Syst. i. 537 = *Arjona tuberosa*.
pratense, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.

procumbens, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 1. — Peruv.
purpureum, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.

rugosum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 233 = *majus*.

tenue, Steud. Nom. ed. II. ii. 429 = *gracile*.
thesioides, Phil. Fl. Atac. 48. — Chili.

QUINCULA, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832) = **Physalis**, Linn. (Solanac.).

lobata, Rafin. l. c. = *P. lobata*.

QUINETIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. ix. 590 (1830). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 316.

Urvillei, Cass. l. c. 591. — Austral.

QUINIO, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1854) 732 = **Cocculus**, DC. (Menisp.).

cocculoides, Schlecht. l. c. = *C. macrocarpus*.

QUINQUEDULA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = **Litsea**, Lam. (Laurin.).

QUINQUEFOLIUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 295 (1763) = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

QUINQUELOBUS, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 316. *'GENUS SPURIUM.'* — Cf. Benth. & Hook. f. ii. 987.

BENJAMINIA, Mart. Fl. Bras. x. 255 (1847).
glaber, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 316 = *Limnophila gratioides*.

minor, Benj. l. c. 317. — Asia.
splendens, Benj. l. c. 316. — Asia.

utriculariaeformis, Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 255 = seq.

utriculariaeoides, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 316. — Bras.

QUINQUELOCULARIA, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 630 = **Campanula**, Tourn.

crispa, C. Koch, l. c. 631 = *C. crispa*.

QUINQUINA, Condam. in 'Act. Acad. Par. (1738) 226' = *Cinchona*, Linn. (Rubiaceae).

QUINSONIA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 178 = *Pittosporum*, Banks.
coccinea, Montr. l. c. 179.—N. Caled.

QUINTILIA, Endl. Gen. 1408 (1841) = *Stauranthera*, Benth. (Gesner.).
coerulea, DC. Prod. ix. 278 = *S. ecalcarata*.

QUINTINIA, A. DC. Monog. Camp. 92, in adnot. (1830). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 645.
elliptica, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 78.—N. Zel.
Fawkenri, *F. Muell. Fragm.* vi. 92.—Austral.
serrata, A. Cunn. in *Ann. Nat. Hist.* Ser. I. ii. (1839) 356.—N. Zel.
Sieber, *A. DC. Monog. Camp.* 92, in adnot.—Austral.
Verdonii, *F. Muell. Fragm.* ii. 125.—Austral.

QUIRINA, Rafin. Sylva Tellur. 102 (1838) = *Cuphea*, P. Br. (Lythrac.).
microphylla, Rafin. l. c. = *C. microphylla*.

QUIRIVELIA, Poir. Encyc. vi. 42 (1804) = *Ichnocarpus*, R. Br. (1809) (Apocyn.).
zeylanica, Poir. l. c. = *I. frutescens*.

QUIROSIA, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 398 (1845) = *Crotalaria*, Dill. (Legumin.).
anceps, Blanco, l. c. = *C. verrucosa*.
secunda, Blanco, l. c. = *C. linifolia*.

QUISQUALIS, Linn. Sp. Pl. ed. II. 556 (1762) = *COMBRETACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 689.
KLEINIA, Crantz, Inst. ii. 488 (1766).
SPHALANTHUS, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 55 (1822).

bibracteata, Regel, *Cat. Pl. Hort. Aksakov.* 118, nomen.—Hab. ?

densiflora, Wall. *Cat. n.* 4011.—Burma; Malaya.
ebracteata, Beauv. *Fl. Owar.* i. 57. t. 5 = *indica*.
glabra, Burm. f. *Fl. Ind.* 104. t. 28. f. 2 = *indica*.
grandiflora, Miq. in *Journ. Bot. Néerl.* i. (1861) 119 = *indica*.

indica, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 361 = *malabarica*.
indica, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 556.—As. trop.
longiflora, Presl, *Epim. Bot.* 216 = *indica*.
Louveiri, G. Don, *Gen. Syst.* ii. 667 = *indica*.
madagascariensis, Boj. *Hort. Maurit.* 134, nomen.—Madag.

malabarica, Bedd. *l. c. Pl. Ind. Or.* i. 33. t. 155.—Ind. or.

obovata, Schum. & Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* 218 = *indica*.

parviflora, Gerr. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 512.—Afr. austr.

pubescens, Burm. f. *Fl. Ind.* 104. t. 35. f. 2 = *indica*.
sinensis, Lindl. *Bot. Reg.* (1844) t. 15 = *indica*.
spinosa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 254 = *malabarica*.
spinosa, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 81 = *indica*.

villosa, Roxb. *Hort. Beng.* [90]; Fl. Ind. ii. 426 = *indica*.

QUIVISIA, Comm. ex Juss. Gen. 264 (1789). *MELIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 330.

CALODRYUM, Desv. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* ix. (1826) 401. t. 57.

GILBERTIA, J. F. Gmel. *Syst.* 682 (1791).

GINNANIA, M. Roem. *Syn. Hesper.* 79, 90 (1846).

PAYERIA, Baill. *Adansonia*, i. (1860–61) 50. t. 3.

anomala, O. Hoffm. *Sert. Madag.* 10.—Madag.

chilosantha, Boj. *Hort. Maurit.* 58.—Ins. Maurit.

decandra, Cav. *Diss.* vii. 367. t. 211.—Ins. Mascar.

filipes, Baker, Fl. Maurit. 46 = *trichopoda*?

fruticosa, J. F. Gmel. *Syst.* 633 = *oppositifolia*?

heterophylla, Cav. *Diss.* vii. 368. t. 213.—Ins. Mascar.

heterophylla, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 272 = *ovata*.

laciniata, Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 12; et in *Baker, Fl. Maurit.* 46.—Ins. Rodrig.

laciniata, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 431, sphalm. = *praece*.

lanceolata, C. DC. l. c. 433.—Madag.

mauritiana, Baker, Fl. Maurit. 45 = *ovata*, heterophylla, *decandra*, *oppositifolia*.

QUIVISIA :—

oppositifolia, Cav. *Diss.* vii. 368. t. 214.—Ins. Borbon.
ovata, Cav. l. c. 368. t. 212.—Ins. Borbon.
racemosa, Pers. *Syn.* i. 468 = *decandra*.
rigida, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 433 = *chilosantha*.

Sieber, *C. DC. l. c.* 430.—Ins. Maurit.
tetramera, *C. DC. l. c.* 432.—Madag.
trichopoda, Baill. *Adansonia*, xi. (1874) 255.—Ins. Maurit.

QUOYA, Gaudich. in Freyc. *Voy. Bot.* 453. t. 66 (1826) = *Pityrodia*, R. Br. (Verben.).

atriplicina, F. Muell. *Fragm.* i. 235 = *P. atriplicina*.

cuneata, Gaudich. in Freyc. *Voy. Bot.* 454 = *P. cuneata*.

dilatata, F. Muell. *Fragm.* vi. 157 = *P. dilatata*.

hemigenioides, F. Muell. l. c. 156 = *P. hemigenioides*.

loxocarpa, F. Muell. l. c. iv. 80 = *P. Drummondii*.

Oldfieldii, F. Muell. l. c. = *P. Oldfieldii*.

paniculata, F. Muell. l. c. = *P. paniculata*.

racemosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 194 = *P. racemosa*.

stachyodes, F. Muell. *Fragm.* v. 50; vi. 158 = *P. racemosa*.

verbascina, F. Muell. l. c. iv. 80 = *P. verbascina*.

R

RABDOCHLOA, Beauv. *Agrost.* 84 (1812) = *Leptochloa*, Beauv. (Gramin.).

cruciata, Beauv. l. c. = *Chloris cruciata*.

domingensis, Beauv. l. c. = *L. domingensis*.

monostachya, Beauv. l. c. = *L. monostachya*.

mucronata, Beauv. l. c. = *Eleusine aegyptiaca*.

virgata, Beauv. l. c. = *Chloris virgata*.

Vulpiastrum, De Not. *Ind. Sem. Hort. Genuens.* (1852) 26; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xix. (1853) 372.—Nubia.

RABDOSIA, Hassk. in *Flora*, xxv. (1842) ii. Beibl. 25 = *Plectranthus*, L'Hérit. (Labiata.).

javanica, Hassk. l. c. = *P. javanicus*.

RABELAISIA, Planch. in Hook. *Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 519. t. 18 = *Lunasia*, Blanco (Rutac.).

parvifolia, Planch. l. c. = *L. parvifolia*.

philippinensis, Planch. l. c. = *L. amara*.

RABENHORSTIA, Reichb. *Nom.* 159 (1841) = *Berzefia*, Brongn. (Bruniac.).

RACAPA, M. Roem. *Syn. Hesper.* 123 (1846) = *Carapa*, Aubl. (Meliac.).

procera, M. Roem. l. c. = *C. procera*.

RACARIA, Aubl. *Pl. Gui. Suppl.* 24. t. 382 (1775).

Gen. dub. *SAPINDACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. i. 392.

sylvatica, Aubl. l. c. —Guian.

sylvestris, Miers, in *Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 342, sphalm. = *praece*.

RACHIA, Klotzsch, in *Monatsb. Berl. Akad.* (Maerz, 1854) 124; et in *Abh. Akad. Berl.* (1855) 68. t. 6 B = *Begonia*, Linn.

auriformis, Klotzsch, in *Monatsb. Berl. Akad.* (Maerz, 1854) 124 = *B. incana*.

incana, Klotzsch, in *Abh. Akad. Berl.* (1855) 69 = *B. incana*.

Meyeri, Klotzsch, l. c. = *B. tomentosa*.

peltata, Klotzsch, in *Monatsb. Berl. Akad.* (Maerz, 1854) 124 = *B. incana*.

polygonata, Klotzsch, ex A. DC. in DC. *Prod.* xv. i. 327 = *B. polygonata*.

RACHICALLIS, DC. *Prod.* iv. 433 (1830). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 49.

RHACHICALLIS, Spach, *Hist. Vég. Phan.* viii. 374 (1839).

capitata, Benth. *Pl. Hartw.* 195 = *Hedyotis* Hartwegiana.

RACHICALLIS :—

caracasana, DC. *Prod.* iv. 434 = *Mallostoma caracasana*.
nitida, DC. l. c. 433 = *Mallostoma nitidum*.
rupestris, DC. l. c. 434.—Ind. occ.
setosa, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 429 = *Mallostoma setosum*.

RACKA, J. F. Gmel. *Syst.* 245 (1791) = *Avicennia*, Linn. (Verben.).

ovata, Roem. & Schult. *Syst.* iii. 207 = *A. officinalis*.

torrida, J. F. Gmel. *Syst.* 245 = *A. officinalis*.

RACLATHRIS, Rafin. *Sylva Tellur.* 167 (1838) = *Rochelia*, Reichb. (Borag.).

cerinthoides, Rafin. l. c. = *Rochelia stellulata*.

RACLETIA, Adans. *Fam.* ii. 449 (1763) (Quid?).

RACOMA, Willd. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 429 (1841), sphalm. = *ROCAMA*, Forsk. = *Trianthema*, Sauv. (Ficoid.).

RACOUBEA, Aubl. *Pl. Gui.* i. 589. t. 236 (1775) = *Homalium*, Jacq. (Samyd.).

guianensis, Aubl. l. c. = *H. Racoubea*.

RACUA, J. F. Gmel. *Syst.* 1612 (Index) = *RACKA*, J. F. Gmel. = *Avicennia*, Linn. (Verben.).

RADACKIA, Cham. & Endl. in *Ann. Wien. Mus.* i. (1836) 186. Genus indesc. *LEGUMINOSARUM*.

Cf. Benth. & Hook. f. i. 465.

amicorum, Cham. & Endl. l. c.—Ins. Pacif.

RADAMAEA, Benth. in DC. *Prod.* x. 509 (1846).

SCROPHULARINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 973.

montana, Benth. in DC. *Prod.* x. 509.—Madag.

prostrata, Benth. l. c. = *Ins. Galea*.

RADDIA, Bertol. in *Bologn. Opusc. Sc.* iii. (1819) 410 = *Olyra*, Linn. (Gramin.).

brasiliensis, Bertol. l. c. = *O. floribunda*.

RADDIA, Fl. Corc. in *Ionios Anthol.* ii. (1834) 448 = *Crypsis*, Ait. (Gramin.).

aculeata, Fl. Corc. l. c. 450 = *C. aculeata*.

RADDIA, Spreng. *Syst.* i. 177, in syn. (1825); Miers, in *Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 388 = *Salacia*, Linn. (Celastrin.).

arborescens, Miers, l. c. 389 = *S. undulata*.

calypsoidea, Miers, l. c. 396 = *S. calypsoidea*.

conferta, Miers, l. c. 394 = *S. conferta*.

crassifolia, Miers, l. c. 396 = *S. crassifolia*.

elliptica, Miers, l. c. 395 = *S. elliptica*.

fasciculata, Miers, l. c. 391.—Bras.

firmifolia, Miers, l. c. 393 = *S. elliptica*.

glomerata, Miers, l. c. 397 = *S. glomerata*.

grandiflora, Miers, l. c. 391 = *S. grandiflora*, Peyr.

impressifolia, Miers, l. c. 392 = *S. grandiflora*, Peyr.

lacunosa, Miers, l. c. = *S. lacunosa*.

oblongifolia, Miers, l. c. 393 = *S. elliptica*.

pachyphylla, Miers, l. c. 396 = *S. pachyphylla*.

verrucosa, Miers, l. c. 395 = *S. verrucosa*, Wright.

RADDISIA, Leandro Sacram. in *Denkschr. Akad. Muench.* vii. (1821) 237. t. 15 = *Salacia*, Linn. (Celastrin.).

arborescens, Schult. *Mant.* i. 347 = *S. undulata*.

RADEMACHIA, Steud. *Nom. ed. I.* 676 (1821) err. typ. = *seq.*

RADERMACHIA, Thunb. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1776) 251 = *Artocarpus*, Forst. (Urtic.).

arborescens, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 429, sphalm. = *Raddisia arborescens*.

incisa, Thunb. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1776) 253 = *A. incisa*.

integra, Thunb. l. c. 254 = *A. integrifolia*.

RADERMACHIA, Zoll. & Mor. in *Zoll. Syst. Verz.* Ind. Archip. 53 (1854) = *Stereospermum*, Cham. (Bignon.).

amoena, Seem. in *Journ. Bot.* viii. (1870) 146 = *S. hypostictum*.

Banaibana, Bur. in Baill. *Adansonia*, ii. (1861–62) 194 = *S. Banaibana*.

- gigantea*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 250 = *S. hypostictum*.
glandulosa, Miq. l. c. = *S. glandulosum*.
Lobbii, Miq. l. c. = *S. hypostictum*.
pinnata, Seem. in Journ. Bot. viii. (1870) 147 = *S. pinnatum*.
quadripinna, Seem. l. c. = *S. Seemannii*.
stricta, Zoll. & Mor. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 53 = *S. glandulosum*.
- RADIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Mimusops*, Linn. (Sapot.).
- RADIA, A. Rich. in Kunth, Syn. Pl. i. 300 (1822) = *Barbacenia*, Vand. (Amaryll.).
tubiflora, A. Rich. l. c. = *B. tubiflora* (in Addend.).
- RADIANA, Rafin. Specch. i. 88 (1814); ex DC. Prod. iii. 353 = *Cypsolea*, Turp. (Ficoid.).
petiolata, Rafin. l. c. = *C. humifusa*.
- RADIATA, Medic. Phil. Bot. i. 208 (1789) = *Medicago*, Tourn. (Legumin.).
- RADICULA, Dill. ex Moench, Meth. 262 (1794) = *Nasturtium*, Linn. (Crucif.).
lancifolia, Moench, l. c. = *N. amphibium*.
palustris, Moench, l. c. 263 = *N. palustre*.
pinnata, Moench, l. c. = *N. sylvestre*.
pyrenaica, Cav. Desc. 423 = *N. pyrenaicum*.
- RADIOLA, [Dill.] Roth, Tent. Fl. Germ. i. 71 (1788).
LINEAE, Benth. & Hook. f. i. 242.
LINOIDES, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 91 (1745).
MILLEGRANA, Adans. Fam. ii. 269 (1763).
dichotoma, Moench, Meth. 288 = *R. Linoides*.
filiformis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 226 = *R. Linoides*.
linoides, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 183 = seq.
Linoides, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 71.—Europ.
Millegrana, Sm. Engl. Bot. t. 895 = *R. Linoides*.
multiflora, Aschers. Fl. Brandenb. 106 = *R. Linoides*.
tetrapetala, Steud. Nom. ed. II. ii. 429, sphalm. = *R. Linoides*.
- RADIUSIA, Reichb. Consp. 148 (1828) = *Sophora*, Linn. (Legumin.).
alopeuroides, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 429 = *S. alopeuroides*.
chinensis, Heynh. Nom. ii. 582 = *S. chinensis*.
flavescens, Endl. ex Heynh. l. c. = *S. flavescens*.
galegoides, Heynh. l. c. = *S. flavescens*.
sericea, Heynh. l. c. = *S. sericea*.
- RADOJITSKYA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 176 = *Lachnaea*, Linn. (Thymel.).
capensis, Turcz. l. c. 177 = *L. axillaris*.
- RAFFENALDIA, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 413. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 101.
COSSONIA, Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xx. (1853) 82. t. 6.
primuloides, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 413.—Alger.
- RAFFLESIA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1821) 201. *CYTINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 119.
Arnoldi, R. Br. l. c. 207.—Sumatra.
Cumingii, R. Br. l. c. xix. (1844) 243 = *manillana*.
Hasseltii, Suring. in Veth, Midden-Sumatra, iv. II. Flora, 26, cum ic.—Sumatra.
Horsfieldii, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xix. (1844) 242.—Java.
Lagascas, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 595 = *R. Patma*.
manillana, Tschern. in Bost. Journ. Nat. Hist. iv. (1844) 63, 65, t. 6.—Ins. Philipp.
Patma, Blume, Korte Besch. Patma (1825), 21.—Java.
philippensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 565 = *manillana*.
Rochussenii, Teysm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. (1850) 425.—Java.
Schadenbergiana, Goepf. ex Hieron. in Gartenfl. xxxiv. (1885) 3. t. 1177.—Ins. Philipp.
Titan, Jack, Desc. Malay. Plants, iii. [1823?] 1 = *Arnoldi*.
Tuan-Mudae, Becc. in Atti Soc. Ital. Sc. Nat. xi. (1868) 197.—Borneo.

RAFINESQUIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 429. *COMPOSITAE* [Benth. & Hook. f. ii. 533].
californica, Nutt. l. c.—Calif.
neo-mexicana, A. Gray, Pl. Wright. ii. 103.—Am. bor. occ.

RAFINESQUIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 96 (1836) = **Hosackia**, Dougl. (Legumin.).
comosa, Rafin. l. c. = *H. bicolor*.
obovata, Rafin. l. c. (Quid. ?)—Am. bor.

RAFINESQUIA, Rafin. New Fl. Am. iii. 51 (1836) = **Calamintha**, Tourn. (Labiata).
angustifolia, Rafin. l. c. 52 = *C. Nuttallii*?
coccinea, Rafin. Fl. Tellur. iii. 83 = *C. coccinea*.

RAFINESQUIA, Rafin. Sylva Tellur. 79 (1838) = **Jacaranda**, Juss. (Eignon.).
caerulea, Rafin. l. c. = *J. caerulea*.

RAFANIA, Thunb. Nov. Gen. 144 (1800); Prod. Pl. Cap. 123 (1800). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 475.
HYBOTROPIS, E. Mey. ex Steud. Nom. ed. II. i. 780 (1840).
OEDMANNA, Thunb. Nov. Gen. 136 (1800).
PELECYNTHIS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 13 (1835).

VASCOA, DC. Mém. Leg. 186 (1825); Prod. ii. 119 (1825).
affinis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 36.—Afr. austr.

alpina, Eckl. & Zeyh. Enum. 160 = *triflora*.
amplexicaulis, Thunb. Nov. Gen. 144.—Afr. austr.

angulata, Thunb. l. c. 147.—Afr. austr.

angustifolia, Thunb. l. c. = *angulata*.

axillaris, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 468 = *affinis*.

axillaris, Eckl. & Zeyh. Enum. 161 = *crassifolia*.

axillaris, Thunb. Nov. Gen. 146.—Afr. austr.

axillaris, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 505 = *Euchlora serpens*.

cordata, Eckl. & Zeyh. Enum. 159 = *ovata*.
cordata, Mart. in Denkschr. Akad. Muench. vi. 1816—1817 (1820) 189.—Afr. austr.

corymbosa, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 464 = *cuneifolia*.

crassifolia, Harv. Thes. Cap. i. 45. t. 71.—Afr. austr.

cuneifolia, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12 = *elliptica*.

cuneifolia, Thunb. Nov. Gen. 145.—Afr. austr.

dichotoma, Eckl. & Zeyh. Enum. 161.—Afr. austr.

diffusa, Eckl. & Zeyh. l. c. 160 = *triflora*.

diffusa, Thunb. Nov. Gen. 149.—Afr. austr.

Ecklonis, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 13.—Afr. austr.

elliptica, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 44 = *myrtifolia*.

elliptica, Thunb. Nov. Gen. 145.—Afr. austr.

erecta, Eckl. & Zeyh. Enum. 160 = *elliptica*.

erecta, Thunb. Nov. Gen. 149.—Afr. austr.

fastigiata, Eckl. & Zeyh. Enum. 160.—Afr. austr.

filifolia, Eckl. ex Walp. Ann. i. 208 = *Aspalathus corymbosa*.

filifolia, Thunb. Nov. Gen. 148 = *angulata*.

humilis, Eckl. & Zeyh. Enum. 162.—Afr. austr.

intermedia, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 463 = *elliptica*.

lancea, DC. Prod. ii. 119.—Afr. austr.

lancea, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12 = *lancifolia*.

lancifolia, Presl, Bot. Bemerk. 44.—Afr. austr.

Meyeriana, Presl, l. c. = *elliptica*.

myrtifolia, Presl, l. c.—Afr. austr.

opposita, Thunb. Nov. Gen. 146.—Afr. austr.

ovata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12.—Afr. austr.

pauciflora, Eckl. & Zeyh. Enum. 162 = *opposita*.

perfoliata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12.—Afr. austr.

perfoliata, Willd. Sp. Pl. iii. 949 = *Baptisia perfoliata*.

racemosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 161.—Afr. austr.

reflexa, Walp. Rep. ii. 833, in syn. = *elliptica*.

retroflexa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 469 = *diffusa*.

retroflexa, Eckl. & Zeyh. Enum. 160 = *elliptica*.

retroflexa, Thunb. Nov. Gen. 148.—Afr. austr.

retusa, Vent. Jard. Malm. 53 = *Templetonia retusa*.

RAFANIA:—

rhomboidea, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 464 = *cuneifolia*.

spicata, Thunb. Nov. Gen. 147.—Afr. austr.

Thunbergii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 36.—Afr. austr.

triflora, Thunb. Nov. Gen. 145.—Afr. austr.

virens, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 11.—Afr. austr.

RAILLARDELLA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 442 (1876). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

argentea, A. Gray, in Bot. Calif. i. 417.—Calif.

Eiseni, Kellogg, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 380 = *scaposa*.

Muirii, A. Gray, in Bot. Calif. i. 618.—Calif.

Pringlei, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 17.—Calif.

scaposa, A. Gray, in Bot. Calif. i. 417.—Calif.

RAIANIA, Scop. Introd. 460 (1838) = **Rajania**, Linn. (Diosc.).

RAILLARDA, Endl. Gen. 460 (1838) = seq.

RAILLARDIA, Spreng. Gen. ii. 796 (1831) = seq.

RAILLIARDA, DC. Prod. vi. 440 (1837) = seq.

RAILLIARDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 469. t. 83 (1826). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 442.

arborea, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 134.—Ins. Sandvic.

argentea, A. Gray, l. c. vi. (1865) 550 = *Raillardella argentea*.

ciliolata, DC. Prod. vi. 441.—Ins. Sandvic.

Hillebrandii, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 175.—Ins. Sandvic.

latifolia, A. Gray, l. c. v. (1861) 132.—Ins. Sandvic.

laxiflora, DC. Prod. vi. 441.—Ins. Sandvic.

linearis, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 469. t. 83.—Ins. Sandvic.

Menziesii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 133.—Ins. Sandvic.

montana, H. Mann, l. c. vii. (1867) 176.—Ins. Sandvic.

platyphylla, A. Gray, l. c. v. (1861) 134.—Ins. Sandvic.

scabra, DC. Prod. vi. 441.—Ins. Sandvic.

scaposa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 551 = *Raillardella scaposa*.

struthioloides, A. Gray, l. c. (1861) 134.—Ins. Sandvic.

RAJANIA, Linn. Gen. ed. I. 306 (1737) = **DIO-SCOREACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 744.

JANRAIA, Adans. Fam. ii. 76 (1763).

angustifolia, Griseb. ex Kunth, Enum. Pl. v. 446 = *cubensis*.

angustifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 59.—Ins. S. Doming.

brasiliensis, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 48.—Bras.

cirrhatata, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 111.—Costa Rica.

cordata, Linn. Sp. Pl. 1032.—Ind. occ.

cubensis, Kunth, Enum. Pl. v. 446.—Cuba.

flexuosa, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii. (1883) 124 = *hastata*?

flexuosa, Poir. Encyc. vi. 59 = *Dioscorea Bridgesii*.

hastata, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 47, excl. syn. = *Dioscorea trachyandra*.

hastata, Linn. Sp. Pl. 1032.—Ind. occ.

hastata, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. v. 452 = *microphylla*.

hexaphylla, Thunb. Fl. Jap. 149 = *Stauntonia hexaphylla*.

lobata, Poir. Encyc. vi. 58.—Peruv.

microphylla, Kunth, Enum. Pl. v. 451.—Cuba.

mucronata, Willd. Sp. Pl. iv. 787.—Ins. S. Doming.

ovata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 59.—Ind. occ.

pleioneura, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 588.—Ind. occ.

quinata, Thunb. Fl. Jap. 148 = *Akebia quinata*.

quinquefolia, Linn. Sp. Pl. 1032.—Ind. occ.

verticillata, Vell. Fl. Flum. x. t. 115 = *Herteria Salsaparilha*.

RAJANIA, Walt. Fl. Carol. 53, 247 (1788) = **Brun-nichia**, Banks (Polygon).
caroliniana, J. F. Gmel. Syst. 581 = seq.
ovata, Walt. Fl. Carol. 247 = *B. cirrhosa*.

RALEIGHIA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 97 = **Abatia**, Ruiz & Pav. (Samyd.).
americana, Gardn. l. c. 98 = *A. americana*.

RAMATUELA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 253. t. 656 (1825). **COMBRETACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 686.

argentea, H. B. & K. l. c. 254.—Am. trop.
virens, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 100.—Bras.

RAMATUELLA, Poir. in Dict. Sc. Nat. xlv. 426 (1826) = praec.

RAMELIA, Baill. Adansonia, xi. (1874) 132. **EU-PHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 326.
codonostylis, Baill. l. c.—N. Caled.

RAMEYA, Baill. Adansonia, ix. (1870) 315. **MENI-SPERMACEAE**.
caloicrossia, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 458.—Madag.
capitata, Baill. Adansonia, ix. (1870) 315.—Ins. Comor.
loucoubensis, Baill. l. c. = *Triclisia loucoubensis*.
macrocarpa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 458.—Madag.

RAMIREZIA, A. Rich. Fl. Cub. t. 39 (1855) = **Poep-pigia**, Presl (Legumin.).
cubensis, A. Rich. l. c. = *P. excelsa*.

RAMISCHIA, Opiz, Seznam, 82 (1852) = **Pyrola**, Tourn. (Ericac.).
secunda, Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 222 = *P. secunda*.
secundiflora, Opiz, Seznam, 82 = *P. secunda*.

RAMONDIA, Rich. in Pers. Syn. i. 216 (Ramonda) (1805); Jaume St. Hil. Expos. i. 280 (1805). **GES-NERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1024.
CHAIXIA, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 38 (1818).
JANCAEA, Boiss. Pl. Or. Nov. Dec. i. 4 (1875).
JANKAEA, Boiss. Fl. Orient. iv. 82 (1879).
LOBIKOTA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 430 (1867).
MYCONIA, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 115 (1813).
Heldreichii, Janka, ex Boiss. Pl. Or. Nov. Dec. i. 5.—Thessalia.
Myconi, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 388 = *pyrenaica*.
Nathaliae, Panč. & Petrov. Fl. Agr. Nyssani, 574; ex Just, Bot. Jahresb. xi. 850 = *serbica*.
pyrenaica, Rich. in Pers. Syn. i. 216.—Mont. Pyren.
scapiflora, Jaume St. Hil. Expos. i. 280 = *pyrenaica*.
scapigera, DC. Fl. Fr. Suppl. 417, sphalm. = praec.
serbica, Panč. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 168.—Servia.

RAMOTHA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 15 (1836) = **Xyris**, (Gronov.).
africana, Rafin. l. c. (Quid ?).—Afr.
floridana, Rafin. l. c. = *X. flexuosa* ?
operculata, Rafin. l. c. = *X. operculata*.
pubescens, Rafin. l. c. = *X. pubescens*.
vera, Rafin. l. c. = *X. indica* ?

RAMPHICARPA, Reichb. Nom. 119 (1841) = **Rham-phicarpa**, Benth. (Scrophul.).

RAMPHIDIA, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 730 (1858) = **RHAMPHIDIA**, Lindl. = **Hetaeria**, Blume (Orchid.).

RAMPHOCARPUS, Neck. Elem. ii. 438 (1790) = **Erodium** ? L'Hérit. (Geran.).

RAMPHOSPERMUM, Andr. ex Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. p. lvii (1827) = **RHAMPHO-SPERMUM**, Reichb. = **Brassica**, Tourn. (Crucif.).

RAMPINIA, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 129 = **Herpetospermum**, Wall. (Cucurb.).
herpetospermoides, C. B. Clarke, l. c. 130 = *H. caudi-gerum*.

RAMSPEKIA, Scop. Introd. 145 (1777) = **Posoqueria**, Aubl. (Rubi.).

RAMTILLA, DC. in Wight, Contrib. 18 (1834) = **Guizotia**, Cass. (Compos.).
oleifera, DC. l. c. = *G. abyssinica*.

RAMUSIA, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 215 (1843) = **Asystasia**, Blume (Acanth.).
nyctaginea, E. Mey. l. c.; et ex Nees, in DC. Prod. xi. 167 = *A. coromandeliana*.

RAMUSIA, Nees, in DC. Prod. xi. 309 (1847) = **Peri-strophe**, Nees (Acanth.).
tridentata, Nees, l. c.—Afr. austr.

RANAPALUS, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. vii. (1877) 113 = **Herpestis**, Gaertn. f. (Scrophul.).
Eisenii, Kellogg, l. c. = *H. rotundifolia*.

RANARIA, Cham. in Linnaea, viii. (1825) 30 = **Her-pestis**, Gaertn. f. (Scrophul.).
monnieroides, Cham. l. c. 31 = *H. Ranaria*.

RANCAGUA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 15. tt. 24, 25 (1835) = **Lasthenia**, Cass. (Compos.).
Bridgesii, Poepp. & Endl. l. c. t. 25 = *L. obtusifolia*.
Fevillei, Poepp. & Endl. l. c. t. 24 = *L. obtusifolia*.
glaberrima, Endl. ex Walp. Rep. vi. 180 = *L. glabrata*.

RANDALIA, Beauv. ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828) 47. t. 5 = **Eriocaulon**, Linn.
decanthulata, Beauv. l. c. = *E. decanthalare*.
densa, Beauv. l. c. = *E. deustum*.
depressa, Beauv. l. c. = *E. depressum*.
fistulosa, Beauv. l. c. = *E. fistulosum*.
scariosa, Beauv. l. c. = *E. scariosum*.

RANDIA, Houst. ex Linn. Gen. ed. I. 376 (1737). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 88.
CANTHIOPSIS, Seem. Fl. Vit. 166. t. 46 (1866).
CATU-NAREGAM, Adans. Fam. ii. 85 (1763).
CERISCUS, Gaertn. f. Fruct. iii. 140. t. 28 (1797).
CUPI, Adans. Fam. ii. 158 (1763).
CUPIA, DC. Prod. iv. 393 (1830).
FOSCARENIA, Vell. ex Vand. Fl. Lusit. 7 (1788); et in Roem. Script. 78 (1796).
GRIFFITHIA, Wight & Arn. Prod. 399 (1834).
GYNOPACHIS, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 48 (1823).
LACHNOSIPHONIUM, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 236.
NAREGA, Rafin. Sylva Tellur. 98 (1838).
OXYCEROS, Lour. Fl. Cochinch. 150 (1790).
PSEUDIXORA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 209 (1856).
STYLOCORYNA, Cav. Ic. iv. 45. t. 368 (1797).
TALANGRENIA, Chapel. ex DC. Prod. iv. 389 (1830).
THIOLLIERA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 217.

XEROMPHIS, Rafin. Sylva Tellur. 21 (1838).
accedens, Hance, in Ann. Sc. Nat. Ser. V. v. (1866) 218.—China.

aculeata, Linn. Sp. Pl. 1192.—Ind. occ.
acuminata, Benth. in Hook. Niger Fl. 385.—Afr. trop.
africana, G. Don, Gen. Syst. iii. 502 (Quid ?).—Afr. trop.
angataensis, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 108.—Ins. Philipp.
anisophylla, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 114.—Malaya.
armata, DC. Prod. iv. 387 = *Basanacantha armata*.
auriculata, Steud. Nom. ed. II. ii. 430 = *Anomanthodia auriculata*.
Beccariana, Baill. Adansonia, xii. (1879) 246.—Borneo.

Benthiana, F. Muell. Fragm. ix. 180.—Austral.
Bojeriana, Baill. Adansonia, xii. (1879) 245.—Madag.
Powiciana, A. Cunn. ex Hook. Bot. Mag. t. 3409 = *macrantha*.

Brandzeana, Baill. Adansonia, xii. (1879) 244.—N. Caled.

Buchananii, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1356.—Afr. trop.

calophylla, Griseb. Cat. Pl. Cub. 123 = *Casasia calophylla*.

calycina, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 246 (= *Basana-canthea* sp.).—Bras.

Candolleana, Wight & Arn. Prod. 399.—Ind. or.

RANDIA:—

canthioides, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 194.—China.

capitata, DC. Prod. iv. 387.—Mexic.

caudata, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 96.—Afr. trop.

chartacea, F. Muell. Fragm. ix. 180, in obs.—Austral.
chinensis, DC. Prod. iv. 388, in syn. = *sinensis*.
ciliolata, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 60.—Cuba.

clusiaefolia, Chapm. Fl. S. U. St. 179 = *Genipa clusiifolia*.

coriacea, Benth. in Hook. Niger Fl. 387 = *Tricalysia coriacea*.

corymbosa, Wight & Arn. Prod. 399 = *Candolleana Cumingiana*, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 179.—Ins. Philipp.

Cupia, Steud. Nom. ed. II. ii. 430 = *longiflora*.

deccanensis, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 57 = *Candolleana decussata*, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 381 = *Hedyotis macrophylla*.

densiflora, Benth. Fl. Hongk. 155.—As. et Austral. trop.

Devoniana, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89.—Afr. trop.

dilleniacea, Baill. Adansonia, xii. (1879) 245.—Borneo.

dioica, Karst. in Linnaea, xxx. (1859–60) 153 = *Basanacantha dioica*.

Doniana, Benth. in Hook. Niger Fl. 385 = *Sherbournia foliosa*.

drupacea, DC. Prod. iv. 389.—Java.

dumetorum, Lam. Illustr. ii. 227.—Geront. trop.

echinocarpa, [Moq. & Sessé] ex DC. Prod. iv. 385.—Mexic.

edulis, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 579.—Cochinch.

exaltata, Griff. Notul. iv. 262.—Burma.

fasciculata, DC. Prod. iv. 386.—Reg. Himal.; Burma.

ferox, DC. l. c. 387.—Mexic.

Fitzalani, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 411.—Austral.

floribunda, DC. Prod. iv. 386 = *dumetorum*.

foliolosa, Wight & Arn. Prod. 398 = *aculeata*.

gambica, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 96.—Afr. trop.

Gardneri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 112.—Zeylan.

genipaeiflora, DC. Prod. iv. 389.—Afr. trop.

glomerata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 103.—Ecuador.

Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 112.—Reg. Himal.

hebecarpa, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 213 = *Basanacantha hebecarpa*.

heterophylla, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 14; et in Baker, Fl. Mauriti. 111.—Ins. Rodrig.

hirta, F. Muell. Census, 74 = *Gardenia hirta*.

hondensis, Karst. in Linnaea, xxx. (1859–60) 154.—N. Granat.

horrida, Roem. & Schult. Syst. v. 248.—Cochinch.

Humboldtiana, DC. Prod. iv. 387 = *Basanacantha Humboldtiana*.

hygrophylla, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 115.—Burma.

Karstenii, Polak. in Linnaea, xli. (1877) 568.—Costa Rica.

Kraussii, Harv. Thes. Cap. i. 22 = *dumetorum*.

Lachnosiphonium, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 237.—Afr. austr.

latifolia, Lam. Encyc. iii. 24 = *aculeata*.

laurifolia, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 88 = *Gardneri*.

leucocarpa, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 194.—Ins. Hongkong.

longiflora, Lam. Encyc. iii. 26.—Reg. Himal.; Malaya.

longispina, Salisb. Parad. Lond. t. 93 = *macrantha*.

longistyla, DC. l. c. 388 = *Macrosphyra longistyla*.

Macarthurii, F. Muell. Papuan Pl. i. 68.—N. Guin.

macrantha, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 234.—Java.

macrantha, DC. Prod. iv. 383.—Afr. trop.

macrocarpa, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 97.—Afr. trop.

macrophylla, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89; et ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 114.—Malaya.

maculata, DC. Prod. iv. 388.—Afr. trop.

maculata, Span. in Linnaea, xv. (1841) 315.—Ins. Timor.

madagascariensis, DC. Prod. iv. 389.—Madag.

malabarica, Lam. Encyc. iii. 25.—Ind. or.

RANDIA:—

- malabarica*, Wall. Cat. n. 8255 = fasciculata, dumetorum.
malleifera, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89.—Afr. trop.
malleiflora, Walp. Ann. ii. 795, sphalm. = praec.
mitis, Linn. Sp. Pl. 1192 = aculeata.
monantha, Benth. Pl. Hartw. 84 = Basanacantha monantha.
 Moorei, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 411.—Austral.
 Munsa, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 99.—Afr. trop.
 Mussaenda, DC. Prod. iv. 388.—Am. austr.
 nigrescens, Griseb. Cat. Pl. Cub. 123.—Cuba.
 nitida, DC. Prod. iv. 387.—N. Granat.
 nutans, DC. l. c. 386 = dumetorum.
 obovata, H. B. & K. Nov. Bot. Lugd. Bat. iv. 235.—N. Granat.
 obovata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 68 = pubescens.
 obscura, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 108 = Gardenia obscura.
 octomera, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89.—Afr. trop.
 ovata, Duchass. ex Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 8.—Panama.
 oxypetala, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 63.—Reg. Himal.
 pallens, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 96.—Afr. trop.
 parviflora, Lam. Encyc. iii. 25.—Ind. or.
 parvifolia, Harv. Thes. Cap. i. 23.—Afr. austr.
 parvifolia, Lam. Encyc. iii. 25 = Catesbaea parvifolia.
 patula, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 235.—Java.
 polysperma, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 527 = Petunga Roxburghii.
 propinqua, G. Don, Gen. Syst. iii. 502 = Gardenia propinqua.
 pubescens, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. t. 220. f. b.—Peruv.
 racemosa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1884) 167.—Ins. Philipp.; Archip. Luchu.
 racemosa, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 525 = Petunga Roxburghii.
 reticulata, Benth. in Hook. Niger Fl. 386 = Tricalysia reticulata.
 rigida, DC. Prod. iv. 386 = fasciculata.
 Rottleri, Wight & Arn. Prod. 397 = dumetorum.
 rotundifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 68.—Peruv.
 rubens, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 95.—Afr. trop.
 rudis, E. Mey. ex Harv. Thes. Cap. i. 22.—Afr. austr.
 rugulosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 113.—Ind. or.
 Ruiziana, DC. Prod. iv. 388.—Peruv.
 Sagraeana, Griseb. Cat. Pl. Cub. 122 = Scolosanthus crucifer.
 scandens, DC. Prod. iv. 387 = longiflora.
 scandens, Lam. Encyc. iii. 26 = Gardenia scandens.
 sessilis, F. Muell. Fragm. vii. 47.—Austral.
 Sherborniae, Hook. Niger Fl. 385 = Sherbournia foliosa.
 sikkimensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 114.—Reg. Himal.
 sinensis, Roem. & Schult. Syst. v. 248.—China.
 speciosa, Bedd. Forest Man. Bot. 133.—Ind. or.
 speciosa, DC. Prod. iv. 388.—Guian.
 speciosa, Hook. Ic. Pl. t. 824 = Gardenia speciosa.
 spinosa, Karst. Fl. Columb. ii. 128, adnot. = Basanacantha armata.
 spinosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 829; Blume, Bijdr. 981 = dumetorum.
 Stanleyana, Walp. Ann. ii. 794.—Afr. trop.
 stipularis, F. Muell. Papuan Pl. i. 69 = stipulosa.
 stipulosa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 228 = dumetorum.
 stipulosa, Moore & F. Muell. ex F. Muell. Fragm. vii. 47.—Austral.
 stricta, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 526 = Hyptianthera stricta.
 sumatrana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 235.—Sumatra.
 tahitensis, Nadeaud, Enum. Pl. Tahiti, 54.—Ins. Tahiti.
 Talanginia, DC. Prod. iv. 389.—Madag.
 tetracantha, DC. l. c. 387 = Basanacantha tetracantha.
 tetrandra, DC. l. c.—N. Granat.
 tetrasperma, Benth. & Hook. f. ex Brand. For. Fl. 272.—Reg. Himal.
 tomentosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 110.—Burma; Malaya.

RANDIA:—

- tomentosa*, Wight & Arn. Prod. 398 = dumetorum.
 triflora, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 138.—Nepal.
 uliginosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 829; DC. Prod. iv. 386.—Ind. or.; Burma.
 urcelliformis, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 104 = Gardenia urcelliformis.
 venulosa, Wall. Cat. n. 8301 = Petunga venulosa.
 Vieillardii, Baill. Adansonia, xii. (1879) 295.—N. Caled.
 virosa, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 165.—Ind. or.
 Wallichii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 113.—Reg. Himal.; Burma.
 Wrightiana, Griseb. Cat. Pl. Cub. 122 = Scolosanthus Wrightii.
 xalapensis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 1. (1844) 239.—Mexic.
 Zollingeri, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxix. (1866) 248.—Ins. Sunda.
 Zollingeriana, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 384 = praec.

RANDONIA, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 391. **RESEDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 111. africana, Coss. l. c. 392.—Alger.

RANGIA, Griseb. Cat. Pl. Cub. 122 (1866), err. typ. = **Randia**, Houst. (Rubiace.).

RANGIUM, Juss. in Dict. Sc. Nat. xxiv. 200 (1822) = **Forsythia**, Vahl (Oleac.).

RANISIA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 143 (1866) = **Gladolus**, Linn. (Irid.).

- concolor*, Salisb. l. c. = G. tristis.
gracilis, Salisb. l. c. = G. gracilis.
hirsuta, Salisb. l. c. = G. hirsutus.
recurva, Salisb. l. c. = G. recurvus.
trichonemifolia, Salisb. l. c. = G. trichonemifolius.
tristis, Salisb. l. c. = G. tristis.
versicolor, Salisb. l. c. = G. grandis.

RANULA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324 = **Ranunculus**, Tourn.

- aconitifolia*, Fourr. l. c. = Ranunc. aconitifolius.
platanifolia, Fourr. l. c. = Ranunc. aconitifolius.

RANUNCULASTRUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324 = **Ranunculus**, Tourn.

- acre*, Fourr. l. c. = Ranunculus acris.
albinaevum, Fourr. l. c. xvii. (1869) 194 = Ranunculus bulbosus.
auricomum, Fourr. l. c. xvi. (1868) 324 = Ranunculus auricomus.
Boraceanum, Fourr. l. c. = Ranunculus acris.
bulbiferum, Fourr. l. c. xvii. (1869) 194 = Ranunculus bulbosus.
bulbosum, Fourr. l. c. xvi. (1868) 324 = Ranunculus bulbosus.
gracile, Fourr. l. c. = Ranunculus montanus.
lanuginosum, Fourr. l. c. = Ranunculus lanuginosus.
mixtum, Fourr. l. c. = Ranunculus nemorosus.
nemorivagum, Fourr. l. c. = Ranunculus acris.
nemorosum, Fourr. l. c. = Ranunculus nemorosus.
radicescens, Fourr. l. c. = Ranunculus nemorosus.
repens, Fourr. l. c. = Ranunculus repens.
reptabundum, Fourr. l. c. = Ranunculus repens.
sparsipilum, Fourr. l. c. = Ranunculus bulbosus.
valdepubens, Fourr. l. c. xvii. (1869) 194 = Ranunculus bulbosus.
vulgatum, Fourr. l. c. xvi. (1868) 324 = Ranunculus acris.

RANUNCULUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).

- RANUNCULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 5.
 APHANOSTEMMA, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 12 (1825).
 BATRACHIUM, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 720 (1821).
 CASALEA, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 8. t. 1 (1825).
 CERATOCEPHALA, Moench, Meth. 218 (1794).
 CYNOMORBIUM, Opiz, Fl. Caslav. Cent. iii. 261, 255 (1804).—Cf. Lotos, iv. (1854) 43.
 CYPRIANTHE, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 220 (1839).

RANUNCULUS:—

- CYRTORHYNCHA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 26 (1838).
 FICARIA, [Dill.] Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 321 (1742).
 FLAMMULA, Dod. ex Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324.
 GAMPSOCERAS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) i. 541, in textu.
 GLOSSOPHYLLUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325.
 HECATONIA, Lour. Fl. Cochinch. 302 (1790); DC. Syst. i. 227 (1818).
 HERICINIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325.
 IONOSMANTHUS, Jord. & Fourr. Ic. Pl. Europ. ii. 13 (1870).
 KRAPPFA, DC. Syst. i. 228 (1818).
 LEUCONOË, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 323.
 NOTOPHILUS, Fourr. l. c. 325 (1868).
 PACHYLOMA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 194 (1839).
 PFUNDIA, Opiz, Seznam, 73 (1852).
 RANULA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324.
 RANUNCULASTRUM, Fourr. l. c. 324 (1868).
 SCOTANUM, Adans. Fam. ii. 459 (1763).
 STYLURUS, Rafin. Fl. Ludov. 27 (1817).
 THORA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325.
 XERODERA, Fourr. l. c. 324 (1868).
 XIPHOCOMA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) ii. 270, in textu; et xxv. (1852) i. 537.
 abnormis, Cutanda & Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 83.—Hispan.
 abortivus, Linn. Sp. Pl. 551.—Am. bor.
 abrotanifolius, Auct. ex Steud. Nom. ed. I. 676; ed. II. ii. 431 = divaricatus.
 acaulis, Banks & Soland. in DC. Syst. i. 270.—N. Zel.
 accessivus, Jord. Diagn. i. 70 = Villarsii.
 acetosellaefolius, Boiss. Elench. 5.—Hispan.
 aconitifolius, Linn. Sp. Pl. 551.—Europ.
 acris, Linn. l. c. 554.—Europ.; As. bor.
 acris, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 935 = nemorosus.
 acutidentatus, Rupr. Fl. Cauc. 286 = seq.
 acutilobus, Ledeb. Fl. Ross. i. 40; Rupr. l. c. 22.—Reg. Caucas.
 adoneus, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864) 56.—Am. bor.
 adscendens, Brot. Fl. Lusit. ii. 370.—Hispan.; Lusit.
 adscendens, Brot. Phyt. Lusit. ii. 229 = Broteri.
 aduncus, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 32 = Villarsii.
 affinis, R. Br. in Parry, 1st. Voy. App. 265.—Reg. arct.
 affinis, F. Schultz, in Flora, xxiv. (1841) 558 = trichophyllus.
 afghanicus, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 148.—Afghan.
 Agerii, Bertol. in Opusc. Sc. Bologn. iii. (1819) 182. t. 6 = chaerophyllos.
 agrarius, All. Auct. Pedem. 27; Poir. Encyc. vi. 117 = sardous.
 alatus, Poir. l. c. 127 = Soliva sessilis.
 Alberti, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 223.—Turkest.
 albicans, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 10 = monspeliacus.
 albinaevus, Jord. Diagn. i. 81 = bulbosus.
 Aleae, Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 84.—Hispan.
 aleuticus, Mert. in Linnaea, v. (1830) 65, nomen.—Ins. Aleut.
 algidus ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 78.—Europ.
 alismaefolius, Geyer, ex Benth. Pl. Hartw. 295.—Am. bor. occ.
 alismoides, Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. iii. (1820) 13 = angustifolius.
 alpestris, Linn. Sp. Pl. 553.—Europ.
 alpestris, Pall. Reise, ii. 568 = nivalis.
 alpicola, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 177 = nemorosus.
 alpicola, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868), Sess. Extr. p. xc = Villarsii.
 altaicus, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xviii. (1774) 533 = nivalis.

RANUNCULUS:—

Amanii, Jord. Diagn. i. 79 = nemorosus.
Amarillo, Bertol. Fl. Guatimal. 24.—Guatemala.
ambiguus, S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 16 = obtusiusculus.
ambiguus, Jord. Diagn. i. 76 = polyanthemus.
ambiguus, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 252 = cassubicus.
amblyolobus, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 5.—Persia.
Ammanni, Gunn. Fl. Norveg. ii. 103 = hyperboreus.
ammoides, Pall. ex DC. Prod. i. 42 = trilobus.
amoenus, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 241 = adoneus?
amoenus, Ledeb. Fl. Alt. ii. 320 = affinis.
amphibius, James, in Long, Exped. Rocky Mount. ii. 342 = mnlifidus.
amphitricha, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 237.—N. Zel.
amplexicaulis, Linn. Sp. Pl. 549.—Europ. austr.
amurensis, Maxim. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 41, nomen.—Reg. Amur.
Andersonii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 327.—Am. bor. occ.
andinus, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 2.—Chili.
anemoneaeifolius, DC. ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 663.—Tnrcia.
anemonefolius, DC. Syst. i. 282.—As. Min.
anemoneus, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 97.—Austral.
anemonoides, Sievers, ex Steud. Nom. ed. I. 677, 679 = Callianthemum rutaefolium.
anemonoides, Zahlbr. in Flora, vi. (1823) 220.—Styria.
angulatus, Presl, Delic. Prag. 7 = sardous.
angustifolius, DC. Rapp. Voy. i. 78; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 636.—Mont. Pyren.
apiifolius, Desf. in Pict. Hort. Par. 37. t. 73; ex DC. Syst. i. 260 = monspeliacus.
apiifolius, Pers. Syn. ii. 105.—Reg. Argent.
apiifolius, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = sceleratus.
aquaticus, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 242; Lam. Fl. Fr. iii. 184 = aquatilis.
aquatilis, Linn. Sp. Pl. 556, partim.—Reg. temp.
aquatilis, Linn. l. c., partim = peltatus.
arachnoides, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 201.—Reg. Caucas.
arcticus, Richards, in Frankl. 1st Journ. ed. I. App. 741 = affinis.
argemonifolius, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 70.—Reg. Argent.
argyreus, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 352.—As. Min.
armeniacus, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 9 = anemonefolius.
arvensis, Linn. Sp. Pl. 555.—Enrop.; As. bor.
ascendens, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = adscendens.
Aschenbornianus, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 719.—Mexic.
Ascheronii, Freyn, in Bot. Centralb. vi. (1881) Beil. [iii.] 13.—Afr. bor.
asiaticus, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 35 = chaerophyllos.
asiaticus, Gueldenst. Reisen, i. 193 = ophioglossifolius.
asiaticus, Lepech. Reisen, iii. 40 = Trollius asiaticus.
asiaticus, Linn. Sp. Pl. 552.—Oriens.
asiaticus, Thunb. Fl. Jap. 241 = acris.
astrantiaefolius, Boiss. ex Rupr. Fl. Cauc. 25 = caucasicus.
astrantiaefolius, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 29 = nemorosus.
atlanticus, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 296 = acris.
atlanticus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 248 = aquatilis.
attenuatus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = hirtellus.
Aucher, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 351.—Persia.
Aucher, Clem. ex Boiss. Fl. Orient. i. 43 = Sibthorpii.
ancklandicus, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 8.—Ins. Auckland.
aurasiacus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 379.—Alger.
aureus, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = nemorosus.
auricomus, Linn. Sp. Pl. 551.—Reg. bor. temp.

RANUNCULUS:—

auricomus, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 577 = cassubicus.
Bachii, Wirtg. in Verhandl. Preuss. Rheinl. ii. (1846) 22.—Europ.
Baerianus, Bogusl. in Erman, Archiv, vi. (1848) 60 = pygmaeus.
Baidarae, Rupr. Fl. Cauc. 22.—Reg. Caucas.
Balbisi, Moris, Fl. Sard. i. 40 = bulbosus.
balearicus, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 158 = palustris.
Barthii, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 41 = acris.
batrachioides, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 249.—Alger.
Baudotii, Godr. in Mém. Soc. Roy. Nancy, 1839 (1840), 21.—Europ. occ.; Maroc.
Bauhini, Tansch, in Flora, xvii. (1834) 525 = aquatilis.
Baurii, Mac Owan, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 390.—Afr. austr.
Beckii, G. Don, Gen. Syst. i. 39 = multifidus.
belgicus, Dum. Comm. Bot. 52, in nota.—Belgium.
Belvisii, DC. Syst. i. 291 = repens.
Berardi, Vill. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = rutaefolius.
Berteroanus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 661.—Chili.
Berteroanus, Presl, Bot. Bemerk. 7 = saxifragaefolius.
Berteronianus, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = trisepalus.
Bertolonii, Hausm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 378, in textu = bilobus.
bilobus, Bertol. Misc. Bot. xix. 5.—Europ. austr.
binatus, Kit. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 723 = auricomus.
bipartitus, Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 41, nomen.—Rossia.
bitematus, Sm. in Rees, Cyclop. xxix. n. 48.—Reg. Magell.
blepharicarpus, Boiss. Elench. 5 = spicatus.
blepharicarpus, Hack. & Winkl. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 921 = suborbiculatus.
blepharicarpus, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 57 = escurialensis.
Bloomeri, S. Wats. in Bot. Calif. ii. 426.—Calif.
Blumei, Stend. Nom. ed. II. ii. 432 = diffusus.
bonariensis, Poir. Encyc. vi. 102.—Reg. Argent.
Bonplandianus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 46.—N. Granat.
Boraeianus, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 19 = acris.
borealis, Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiii. (1860) 1. 72 = acris.
Bongaei, Boiss. Fl. Orient. i. 43.—Armenia.
brachiatius, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = bulbosus.
brachylobus, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 6.—As. Min.; Persia.
brachyphyllus, Tenore, Fl. Nap. t. 149 = brevifolius.
bracteatus, Schleich. ex DC. Prod. i. 41 = bulbosus.
brevicaulis, Hook. Fl. Bor. Am. i. 13 = ovalis.
brevifolius, Tenore, Prod. Fl. Nap. 68.—Ital.; Graec.
brevipes, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 14.—N. Granat.
brevirostris, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 28 = laetus.
breviscapus, DC. Syst. i. 253.—Pernv.
Breyneii, J. F. Gmel. Syst. 880 = seq.
Breyneius, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 91; ed. II. 115 = nemorosus.
Broteri, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 930.—Hispan.
brutius, Tenore, Prod. Fl. Nap. 61.—Ital.; Graec.; As. Min.
Buchanani, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 5.—N. Zel.
Buergeri, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 5.—Japan.
Buhsei, Boiss. Fl. Orient. i. 45.—Persia.
bulbifer, Jord. Diagn. i. 80 = bulbosus.
bulbilliferus, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 3.—Persia.
bulbosus, Costa, Fl. Catal. 7 = Aleae.
bulbosus, Linn. Sp. Pl. 554.—Europ.; Persia.
bulbosus, Plan. Fl. Gallega, 58 = occidentalis, Freyn.
bulbosus, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 932 = castellanus.
bullatus, Linn. Sp. Pl. 550.—Reg. Mediterr.
Bungei, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = aquatilis.

RANUNCULUS:—

bupleurifolius, DC. Syst. i. 243, in syn. = pyrenaicus.
bupleuroides, Brot. Fl. Lusit. ii. 365.—Lusitan.
bupleuroides, Lapeyr. ex Nym. Consp. 10 = pyrenaicus.
cabulicus, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 9 = muricatus.
cadmicus, Boiss. l. c. Ser. I. i. 65.—Caria; Cyprus.
caespititius, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 359 = R. Flammula.
caespitosus, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 279 = divaricatus.
caespitosus, Wall. Cat. n. 4701 = affinis.
Calcarae, Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 889.—Sicilia.
Caleyanus, G. Don, Gen. Syst. i. 37 (Quid?).—Anglia.
californicus, Benth. Pl. Hartw. 295.—Am. bor. occ.
calthaeifolius, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 2 = R. Ficaria.
Calvertii, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 8 = anemonefolius.
Camissonis, Auct. vide Chamissonis.
cammarifolius, Arv. Ess. Pl. Dauph. 21 = acris.
Camozzianus, Clem. in Mem. Acc. Sc. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 242 = Sibthorpii.
camtschaticus, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = kamchaticus.
canadensis, Jacq. Misc. ii. 343 = pensylvanicus.
cantonensis, DC. Prod. i. 43 = pensylvanicus.
canus, Benth. Pl. Hartw. 294 = occidentalis, Nutt.
canus, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 62 = californicus.
Canuti, Coss. ex Ardoino, Fl. Alp. Marit. 16.—Liguria.
capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 94.—Afr. austr.
capillaceus, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 278 = aquatilis.
capillaris, Gater. Pl. Montaub. 102 = aquatilis.
Capillus-naidis, Arv. Ess. Pl. Dauph. 18 = lutulentus.
cappadocius, Willd. Sp. Pl. ii. 1326.—Cappadoc.
cardiophyllus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 14 = affinis.
carinatus, Freyn, in Kern. Sched. Fl. Exsicc. i. 21 = confusus.
carinthiacus, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = montanus.
carnosus, Wall. Cat. n. 4699 = sceleratus.
carolinianus, DC. Syst. i. 292 = repens.
carolinianus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 23 = palmatus.
carpathicus, Herbach, Sel. Pl. Rar. Gallic. 15 = montanus.
carpathicus, Wahlenb. ex Nym. Consp. 9 = R. Thora.
carpetanus, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 3.—Hispan.
carpetanus, Bourg. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 921 = suborbiculatus.
cassius, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 354.—As. Min.; Syria.
cassubicus, Linn. Sp. Pl. 551.—Europ.; Sibir.
castellanus, Boiss. & Reut. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 932.—Hispan.
caucasicus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 27.—Reg. Caucas.
caucasicus, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 5 = Buhsei.
cervicornis, Kittel, Taschenb. ed. II. 773 = auricomus.
Cesatianus, Caldes. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xi. (1879) 324.—Ital.
Cesatii ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii–xxiv. (1880) 79.—Europ.
chaerophylloides, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 5 = chaerophyllos.
chaerophyllos, Linn. Sp. Pl. 555.—Reg. Mediterr.; Oriens.
Chamissoi, Spreng. Syst. ii. 650 = seq.
Chamissonis, Schlecht. Animad. Ran. i. 12. t. 1 (Chamissonis) = glacialis.
chilensis, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 28.—Peruv.
chilensis, DC. Syst. i. 286.—Chili.
chinensis, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 3 = pensylvanicus.
chionophilus, Boiss. Fl. Orient. i. 38.—Syria.
Chius, DC. Syst. i. 299.—Europ. austr.; As. Min.
chondrodes, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 251 = chaerophyllos.
choorensis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = hirtellus.
chordorhizos, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 723.—N. Zel.
chrysanthus ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii–xxiv. (1880) 80.—Europ.
cibiniensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 22 = bulbosus.

RANUNCULUS:—

cicutarius, Schlecht. *Animad. Ran.* i. 25. t. 4. f. 2.—Reg. Casp.
 circinatus, Sibth. *Fl. Oxon.* 175.—Europ.
 circinnatoides, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 18 = divaricatus.
 circinnatus, Winkler, ex Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 912 = fucoides.
 claviformis, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 221 = R. Ficaria.
 Clintonii, Beck, Bot. N. & M. St. 9 = repens.
 cochlearifolius, Hornem. *Hort. Hafn.* ii. 529 = ophioglossifolius.
 cochlearifolius, Ruiz & Pav. ex DC. *Prod.* i. 29 = macropetalus.
 coenosus, Godr. in Gren. & Godr. *Fl. Fr.* i. 19 = Lenormandi.
 coenosus, Guss. *Suppl. Fl. Sic. Prod.* 187 = omiophyllus.
 colliguensis, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 404.—Chili.
 collinus, R. Br. ex DC. *Syst.* i. 271 = parviflorus.
 colocensis, Menyh. *Kalocsa Videk. Növényt.* 26.—Europ.
 colonorum, Endl. in *Enum. Pl. Hueg.* 1 = lappaceus.
 Columnae, All. *Fl. Pedem.* ii. 50 = Segueri.
 comatus, Link, ex Schlecht. *Animad. Ran.* i. 24, in obs. = chaerophyllos.
 Commersonii, DC. ex Poir. *Encyc. Suppl.* iv. 662 = biternatus.
 commutatus, Badaro, in *Brugnat. Giorn. Fis.* II. ix. (1826) 81.—Ital.
 complicatus, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 485.—Hungar.
 concinnatus, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 182 = montanus.
 confervoides, Fries, *Summa Veg. Scand.* 139 = omiophyllus.
 confusus, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* i. 22.—Europ.
 confusus, Torrependo, ex Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 909 = dubius.
 constantinopolitanus, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélop.* 34, in syn. = velutinus.
 constantinopolitanus, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 17 = acris.
 constantinopolitanus, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1856) i. 281 = palustris.
 constantinopolitanus, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 317.—Turc.; As. Min.
 cordatus, [Clairv.] *Man. Herb.* 177 = parnassifolius.
 cordifolius, Bast. *Fl. Maine-et-Loire*, 207 = ophioglossifolius.
 cordifolius, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 218.—Reg. Argent.
 cordiformis, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 219 = parnassifolius.
 cordigerus, Viv. *Fl. Cors. Sp. Nov.* 8.—Ins. Corsica.
 cornutus, Boiss. *Diagn. Ser.* II. v. 10 = Pinardi.
 cornutus, DC. *Syst.* i. 300.—Syria.
 coronatus, Ehrenb. ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 56 = muricatus.
 corsicus, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 637 = palustris.
 cortusaeifolius, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 588.—Ins. Fortunat.
 Crantzii, Hedw. in *Roem. Coll. Bot.* 38 (Cranzii) = nemorosus.
 crassicaulis, Hort. Chels. ex G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 231, nomen.—Europ.
 crassipes, Hook. f. *Fl. Antarct.* 224.—Ins. Kerguel.
 crenatus, Bertol. *Fl. Ital.* v. 514, excl. syn. = bilobus.
 crenatus, Waldest. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* i. 9. t. 10.—Europ. austr.
 creticus, Linn. *Sp. Pl.* 550.—Ins. Creta.
 creticus, Sieber, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 432 = nemorosus.
 crithmifolius, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 6.—N. Zel.
 crithmifolius, Nym. *Consp.* 10 = glacialis.
 croaticus, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 182 = Gouani.
 crymophilus, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser.* I. viii. 6.—Persia.
 Csatoi, Schur, in *Verh. Naturf. Ver. Bruenn*, xv. ii. (1877) 46 = acris.
 cubensis, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 1.—Cuba.
 cuneatus, Boiss. *Diagn. Ser.* I. viii. 2.—As. Min.; Syria.
 cuneatus, Hook. *Journ. Bot.* i. (1834) 242 = lappaceus.
 cuneatus, Sommerf. in *Mag. Naturvid.* II. i. (1832) 238 = nivalis.

RANUNCULUS:—

cuneifolius, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxiii. (1877) 306.—Mongolia.
 cuneilobus, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 7. t. 3 = distrius.
 cupreus, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser.* I. viii. 3.—Ins. Creta.
 curvirostratus, Bertol. in *Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser.* II. iv. (1864) 313 = arvensis.
 curvirostris, Freyn, in *Bot. Centralb.* vi. (1881) Beil. [iii.] 15.—Chili.
 cyclophyllus, Jord. ex Bor. *Fl. Centr. Fr. ed.* III. ii. 19 = monspeliacus.
 cylindricus, Jord. *Diagn.* i. 61 = monspeliacus.
 Cymbalaria, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 392.—Reg. bor. temp.
 cymbalarifolius, Balb. ex Moris, *Stirp. Sard. Elench.* 2 = bulbosus.
 dahuricus, Turcz. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 732 = affinis.
 damascenus, Boiss. & Gaill. *Diagn. Ser.* II. vi. 5.—Syria.
 dasycarpus, Boiss. *Fl. Orient.* i. 28.—Persia.
 daucifolius, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) ii. 270 = cicutarius.
 dealbatus, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* 315 = aconitifolius.
 debilis, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 359.—Pensylvan.
 decipiens, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 381 = palustris.
 declinatus, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 270 = R. Flammula.
 decumbens, Bertol. in *Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser.* II. v. (1865) 375 = diffusus.
 Delacouri, Gaudefr. & Mabilie, *Note sur Renonc.* (1874) 7; ex *Bull. Soc. Dauph. fasc.* iii. (1876) 69 = nemorosus.
 delphinifolius, Fries, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 432 = polyanthemus.
 delphinifolius, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 48.—Mexic.
 delphinifolius, Torr. in *Eaton, Man. Bot. ed.* IV. 424 = multifidus.
 delphinifolius, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 659 = californicus.
 demissus, DC. *Syst.* i. 275.—Hispan.; Oriens.
 demissus, Orphan. ex Nym. *Consp.* 11 = Villarsii.
 depressus, Fisch. ex Steud. *Nom. ed.* I. 678, nomen = praec.?
 depressus, Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. iv. 1070 = ophioglossifolius.
 depressus, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xii. (1880) 393.—N. Zel.
 dertropodius, Steud. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 5 = tembensis.
 dichotomiflorus, Lag. ex Freyn, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 927.—Hispan.
 dichotomus, Moç. & Sessé, ex DC. *Syst.* i. 288 = orthorhynchus?
 diffusus, DC. *Prod.* i. 38.—Ind. or.; Malaya.
 digitatus, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 266 = sceleratus.
 digitatus, Hook. *Kew Journ.* iii. (1851) 124. t. 4.—Am. bor.
 digitatus, Willd. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 30 = pedatus.
 dimorphorhizus, Brot. *Phyt. Lusit.* ii. 227 = chaerophyllos.
 discolor, Steud. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 263 = lepaceus.
 dissectifolius, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* i. 11.—Austral.
 dissectus, Auch. ex Tchihat. *Asie Min. Bot.* i. 378 = Sibthorpii.
 dissectus, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 25.—Tauria.
 dissectus, Hook. & Am. Bot. Beech. *Voy.* 316 = californicus.
 dissectus, Portenschl. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 433 = alpestris.
 distans, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 53 = laetus.
 distrius, Steud. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 7.—Abyss.
 divaricatus, A. Gray, *Pl. Wright.* ii. 8 = aquatilis.
 divaricatus, Koch, *Syn. Fl. Germ. ed.* I. 12 = circinatus.
 divaricatus, Schrank, *Baier. Fl.* ii. 103; Moench, *Meth.* 214.—Europ.
 divergens, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vi. (1847) 14 = Sprunerianus.
 diversifolius, Boiss. & Kotschy, in *Boiss. Fl. Orient.* i. 45.—Armenia.

RANUNCULUS:—

diversifolius, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 262 = aquatilis.
 dodecapetalus, Steph. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 47 = Oxygraphis glacialis.
 dolosus, Fisch. & Mey. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 384.—Reg. Casp.
 Donianus, Fritz. in *Walp. Rep.* ii. 740.—Mexic.
 Drouetii, F. Schultz, *Arch. Fl. Fr. et Allem.* 10 = trichophyllus.
 dubius, Freyn, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 909.—Hispan.
 echinatus, Crantz, *Stirp. Austr. ed.* I. fasc. ii. 95; ed. II. 118 = arvensis.
 echinatus, Vent. *Jard. Cels.* 73 = muricatus.
 edulis, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser.* I. viii. 4.—As. Min.; Persia.
 Eisenii, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* vii. (1877) 115 = Nelsonii?
 elatus, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 405.—Chili.
 elbrusensis, Boiss. *Fl. Orient.* i. 34.—Persia.
 elegans, C. Koch, in *Linnaea*, xv. (1841) 248 = anemonefolius.
 eleophilus, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 19 (Quid?).—Gallia.
 elongatus, F. Schultz, in *Billotia*, i. (1869) 113.—Europ.
 Enysii, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xii. (1880) 394.—N. Zel.
 ericetorum, Pourr. ex Freyn, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 922 = escurialensis.
 erinifolius, Tenore, *Syll. Fl. Neap.* 273.—Ital.
 eriocalyx, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 301.—Helvet.
 eriocarpus, Boiss. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. xvi. (1841) 351.—Cappadoc.
 eriophyllus, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 46 = palustris.
 eriorrhizus, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 5.—Persia.
 eriotorus, Jord. *Diagn.* i. 69 = Villarsii.
 erodifolius, C. Gay, *Fl. Chil.* i. 45.—Chili.
 Eschscholtzii, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser.* II. xxxiii. (1862) 241, partim = affinis.
 Eschscholtzii, Schlecht. *Animad. Ran.* ii. 16. t. 1 = nivalis.
 escurialensis, Boiss. & Reut. ex Freyn, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 922.—Hispan.
 eustrigulosus, Schur, in *Verh. Naturf. Ver. Bruenn*, xv. ii. (1877) 44 = acris.
 exiguus, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 615 = biternatus.
 exilis, Phil. *Fl. Atac.* 7.—Chili.
 extorris, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér.* V. v. (1866) 204 = ternatus.
 falcatus, Linn. *Sp. Pl.* 556.—Europ.; Reg. Himal.
 fallax, Schur, in *Verh. Naturf. Ver. Bruenn*, xv. ii. (1877) 37 = cassubicus.
 fascicularis, Barton, *Comp. Fl. Philad.* ii. 25 = repens.
 fascicularis, Muhl. ex Bigel. *Fl. Bost.* ed. I. 137.—Am. bor.
 fascicularis, Spreng. *Neue Entdeck.* i. 228 = recurvatus.
 fascicularis, S. Wats. *Bot. King's Exp.* 9 = californicus.
 feniculaceus, Gilib. *Exercit.* i. 370 = aquatilis.
 Fenzlii, Boiss. *Fl. Orient.* i. 44.—Cilicia.
 fibrillosus, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 47.—Bithynia.
 fibrosus, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 251 = chaerophyllos.
 fibrosus, Wall. *Cat. n.* 4706 = pensylvanicus.
 Ficaria, Linn. *Sp. Pl.* 550.—Europ.; Reg. Cauc.
 Ficaria, Walt. *Fl. Carol.* 159 = Caltha palustris.
 ficariaeformis, F. Schultz, *Arch. Fl.* 123 = R. Ficaria.
 ficarioides, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélop.* 34.—Graecia.
 filamentosus, Wedd. *Chlor. And.* ii. 301.—Bolivia.
 filiformis, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 320 = R. Flammula.
 fistulosus, Brign. *Fasc. Pl. Forojul.* 25 = ophioglossifolius.
 fistulosus, Pursh, ex Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 163 = multifidus.
 flabellaris, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1818) 344 = multifidus.
 flabellatus, Bivona, *Sic. Pl. Cent.* i. 68 = bulbosus.
 flabellatus, Desf. *Fl. Atlant.* i. 438. t. 114 = chaerophyllos.
 flabellatus, Heuff. ex Kittel, *Taschenb. ed.* II. 773 = auricomus.

RANUNCULUS:—

flabellifolius, Heuff. ex Reichh. Fl. Germ. Excurs. 723 = *cassabicus*.
flaccidus, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 224 = *biteratus*.
flaccidus, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 38.—Reg. Himal.
flaccidus, Pers. in Usteri, Ann. Bot. xiv. (1795) 39 = *aquatilis*.
flagelliformis, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 13.—Am. anstr.
Flamma, Gren. in Mém. Soc. Emul. Douhs, Sér. IV. ix. (1875) 389 = R. *Flammula*.
flammeus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 719 = R. *Flammula*.
Flammula, D. Don, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = *pncheilus*.
Flammula, Linn. Sp. Pl. 548.—Reg. hor. temp.
Flammula, Michx. Fl. Bor. Am. i. 321 = *ohlongifolius*.
Flammula, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 391 = *obtusiusculus*.
Flammula, Walt. Fl. Carol. 159 = *pusillus*.
Flammulae, Krock. Fl. Siles. ii. i. 248 = R. *Flammula*.
flammuloides, Rafin. ex DC. Prod. i. 32 = R. *Flammula*.
floribundus, Bah. in Trans. Bot. Soc. Edinh. v. (1858) 77 = *peltatus*.
fluitans, Lam. Fl. Fr. iii. 184.—Europ.
fluviatilis, Bigel. Fl. Bost. ed. I. 139 = *multifidus*.
fluviatilis, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 395 = *aquatilis*.
fluviatilis, [Weher, ex] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 42 = *fluitans*.
fluviatilis, Willd. Sp. Pl. ii. 1333 = *pencedanifolius*.
foeniculaceus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 261 = *divaricatus*.
fontanus, Presl, Delic. Prag. 6.—Sicilia.
Forskoeilii, DC. Syst. i. 303.—Arab.
Franchetianus, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 8 = *acris*.
fraternus, Schrenk, Enum. Pl. Nov. (1841) 103.—Soongaria.
Friesianus, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 17 = *acris*.
Friesii, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 34.—Gallia.
frigidus, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 57 = *lacerus*.
frigidus, Willd. Sp. Pl. ii. 1312; DC. Prod. i. 35 = *nivalis*.
fucoides, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 912.—Hispan.
fumariaefolius, Desf. ex DC. Syst. i. 256 = *millefolius*.
furcatus, Berger. Fl. Bass. Pyr. ii. 409 = *Gouani*.
Galeottii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 276.—Mexic.
gallecius, Freyn, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. Balear. i. 100.—Hispan.
garganicus, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13 = *millefolius*.
gelidus, Hoffmgg. ex Reichh. Fl. Germ. Excurs. 720 = *glacialis*.
gelidus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 133.—As. centr.
gelidus, Schur, Enum. Pl. Transs. 18 = *montanus*.
geoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 47.—Mexic.
geoides, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 201 = *ophioglossifolius*.
geraniifolius, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 9.—N. Zel.
geraniifolius, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 326 = *montanus*.
geranioides, Blume, Bijdr. 2 = *diffusus*.
geranioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 44.—N. Granat.
gigantens, Wedd. Chlor. And. ii. 304.—Peruv.
Gilliesii, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 404.—Chili.
glabellus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = *hirtellus*.
glaberrimus, Hook. f. Fl. Bor. Am. i. 12.—Am. hor. occ.
glaberratus, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 18 = *hirtellus*.
glabrifolius, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 243 = *rivularis*.
glabriusculus, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 19.—Terr. Samoyed.
glacialis, Linn. Sp. Pl. 553.—Reg. hor. et arct.
glandulifer, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 28.—Chili.
Gmelini, DC. Syst. i. 303.—Sibir.
Gmelini, Schlecht. Animad. Ranunc. ii. 35 = *multifidus*.
Godleyanus, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 723.—N. Zel.

RANUNCULUS:—

Goldei, Meinsh. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 44, nomen.—Rossia.
Gonnetii, Jord. Diagn. i. 65 = *monspeliacus*.
Gouani, Hegetschw. Fl. Schw. i. 402 = *Villarsii*.
Gouani, Lecoq. & Lamotte, Cat. Pl. Vasc. Fr. 52 = *nemorosus*.
Gouani, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 41 = *montanus*.
Gouani, Willd. Sp. Pl. ii. 1322.—Mont. Pyren.
gracilipes, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 8.—N. Zel.
gracilis, Bory & Chauh. Nouv. Fl. Pélop. 35 = *chaerophyllos*.
gracilis, Clarke, Trav. iii. 336; DC. Syst. i. 256.—Ins. Cos.
gracilis, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = *montanus*.
graculus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 314 = *muricatus*.
gramineus, Habl. Phys. Besch. Taur. 149 = *illyricus*.
gramineus, Linn. Sp. Pl. 549.—Europ.; Maroc.
gramineus, Spreng. Syst. ii. 648 = *longicanlis*.
graminifolius, Salish. Prod. 372 = *gramineus*.
granatensis, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 8 = *acris*.
grandiflorus, Linn. Sp. Pl. 555.—Reg. Caucas.; Cappadoc.
grandiflorus, Payot, Fl. Mont-Blanc, 13 (Quid?).—Europ.
grandifolius, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 330.—Shir. altaic.
grandifolius, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 38 = *megaphyllus*.
granulatus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 306; Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 380 = *chaerophyllos*.
gregarius, Brot. Fl. Lusit. ii. 369 = *chaerophyllos*.
Grenieranus, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 304 = *Villarsii*.
gruinalis, Schott, in Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 33 = *Gouani*.
Guilemi-Jordani, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxi. (1880) 64.—Aegypt.
Gunae, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 666.—Abyss.
Gunnianus, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 244. t. 133.—Austral.
Guzmanni, Humb. Tabl. 69; ex DC. Syst. i. 263.—Reg. Andin.
Haarbachii, De Not. ex Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1838) 347.—Ital.
Haastii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 6.—N. Zel.
Halleri x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. ii. xxiii–xxiv. (1880) 78.—Europ.
halophilus, Schlecht. Animad. Ran. i. 23. t. 4. f. 1 = R. *Cymbalaria*.
hastatus, Walker, ex Wight, Illustr. i. 5 = *sagittifolius*.
hawaiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 10.—Ins. Sandvic.
Haynaldi, Menyh. Kalocsa Videk. Növényt. 28.—Europ.
hebecarpus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 316.—Am. bor. occ.
hederaceus, Bourg. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 908 = *ololencos*.
hederaceus, Linn. Sp. Pl. 556.—Europ. occ.
hederaceus, Pall. Reise, i. 511 = *hyperhoreus*.
hederaceus, Salish. Prod. 373 = *hederaceus*.
Hegetschweileri, Ducommun, Taschenb. 18.—Helvet.
Heldreichanus, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 14 = *Sprunerianus*.
hemignostus, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 404.—Peruv.
Henriquesii, Freyn, in Bot. Centralb. vi. (1881) Beil. [iii.] 21.—Europ.
heterophyllus, Lapeyr. Hist. Ahr. Pl. Pyr. 316 = *aconitifolius*.
heterophyllus, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 12 = *bonariensis*.
heterophyllus, [Weher, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 42 = *aquatilis*.
heterorrhizus, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 6.—Phrygia.
heucheraefolius, Presl, Fl. Sicul. 15 = *palustris*.
hierosolymitanus, Boiss. Fl. Orient. i. 36.—Syria.
Hilarii, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 209.—Reg. Argent.
hirsutus, Curt. Fl. Lond. Fasc. ii. t. 40 = *sardous*.
hirtellus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53.—Reg. Himal.
hirtus, Banks & Soland. ex DC. Syst. i. 289 = *pleheius*.

RANUNCULUS:—

hirtus, Hook. f. Fl. Tasman. i. 6 = *lappaceus*.
hirtus, Muhl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 433 = *recurvatus*.
hispidus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 19, partim = *occidentalis*, Nutt.
hispidus, Michx. l. c. 321 = *repens*.
hispidus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 395 = *pensylvanicus*.
Hohenackeri, Presl, Bot. Bemerk. 7, nomen.—Reg. Cauc.
Hollianus, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 130.—Lusitania.
hololeucus Auct. = *ololencos*.
holophyllus, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 220 = *sceleratus*.
homoeophyllus, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 906 = *omiophyllus*.
Hookeri, Regel, Fl. Ost-Sibir. i. 47.—As. hor. or.; Am. bor. occ.
Hookeri, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 610 = *repens*?
Hornemanni, Schlecht. Animad. Ran. ii. 36.—Am. bor.
Hornschuchii, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = *Villarsii*.
hortensis, Pers. Syn. ii. 104 = *asiaticus*.
hortensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 21 = *repens*.
Huetii, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 7.—Armenia.
humilis, Collie, ex Hook. Bot. Beech. Voy. 4. t. 2 = *obtusatus*.
humilis, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. i. 34 = *Donianus*.
humilis, Huet, ex Nym. Consp. 14, in obs. = *parviflorus*?
humilis, Pers. Syn. ii. 102 = *pusillus*.
hybridus, Biria, Hist. Nat. Renoncul. 38.—Europ. austr.
hybridus x, Payot, Fl. Mont-Blanc, 12.—Europ.
hydrocharis, Spenn. Fl. Friburg. iii. 1007 = *aquatilis*.
hydrocharoides, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 306.—Mexic.
Hydrocotyle, Domb. ex DC. Syst. i. 251 = *flagelliformis*.
hydrocotyloides, Wall. Cat. n. 4703 = *diffusus*.
hydrophilus, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 2 = *aquatilis*.
hydrophilus, Gaudich. ex Mirb. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 105.—Ins. Falkland.
hyperhoreus, Rottb. in Skrift. Kjöeb. Selsk. x. (1770) 458.—Reg. hor. et arct.
hypotrichus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 275 [bis].—Rumel.
hystriculus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 328 = *Kumlienla hystricula*.
illyricus, Gouan, Fl. Monsp. 269 = *monspeliacus*.
illyricus, Linn. Sp. Pl. 552.—Europ. austr.; Reg. Caucas.
illyricus, Poir. Encyc. vi. 121 = *chaerophyllos*.
incisifolius, Reichb. ex Kittel, Taschenb. ed. II. 773 = *auricomus*.
incisus, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 10 = *rivularis*.
incomparabilis, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 174.—Thracia.
inconspicuus, Hook. f. Fl. Tasman. i. 9. t. 2 = *rivularis*.
incrassatus, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 50 = *chins*.
indicus, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 671 = *sceleratus*.
infestus, Salish. Prod. 373 = *repens*.
inops, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 183 = *Villarsii*.
insignis, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 8. t. 2.—N. Zel.
insubricus, Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1838) 346.—Ital.
insularis, Viviani, Fl. Cors. Prod. App. i. 2 = *chaerophyllos*.
intermedius, Eaton, Man. Bot. ed. III. 424 = *repens*.
intermedius, Knaf, in Flora, xxix. (1846) 289 = *peltatus*.
intermedius, Poir. Encyc. vi. 116 = *sardous*.
intermedius, Schur, Enum. Pl. Transs. 14 = R. *Ficaria*.
inundatus, R. Br. ex DC. Syst. i. 239 = *rivularis*.
involutus, Lapeyr. Hist. Ahr. Pl. Pyr. 318 = *Gouani*.
isopyroides, DC. Syst. i. 238 = *Callianthemum rutae-folium*.
isthmicus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 4.—Graecia.
Jacquini, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 1020 = *nivalis*.
japonicus, Langsd. ex DC. Prod. i. 38 = *Langsdorfii*.

RANUNCULUS :—

- japonicus*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 337 = acris.
- javanicus*, Blume, *Bijdr.* 3.—Java.
- kamchaticus*, DC. Syst. i. 302 = *Oxygraphis glacialis*.
- Kaufmanni, Clerc, ex Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 45, nomen.—Ross.
- Kayserii*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 43 = acris.
- Kladnii*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 42 = acris.
- Kochii*, Beurl. in Bot. Notiser (1852), 156 = seq.?
- Kochii*, Ledeb. Fl. Ross. i. 731.—Reg. Caucas.
- Kotschy, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vi. 5.—Persia.
- Krapfia, DC. in Deless. *Sc. Sel. Pl.* i. 9. t. 35.—Chili.
- Kunthii, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 12.—N. Granat.
- lacerus*, Bell. in *Mém. Acad. Turin*, v. (1790–91) 233. t. 8.—Gallia.
- lacerus*, Mutel, Fl. Fr. i. 18 = pyrenaicus.
- laciniatus*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 131 = sardous.
- laciniatus*, [Clairv.] Man. Herb. 177 = lacerus.
- lacustris*, Beck & Tracy, in Trans. Albany Inst. i. (1830) 148; Bot. N. & Mid. St. 9 = multifidus.
- laetus*, Salisb. Prod. 373 = bulbosus.
- laetus*, Wall. Cat. n. 4702.—Reg. Himal.
- Lagascanus, DC. Prod. i. 43.—Hispan.
- Lambertianus, D. Dietr. *Syn. Pl.* iii. 316.—Mexic.
- lanceolatus*, [Clairv.] Man. Herb. 177 = pyrenaicus.
- lanceolatus*, Pall. ex DC. Prod. i. 32 = R. Flammula.
- lancifolius*, Bertol. in *Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II.* iii. (1863) 423 = R. Cymbalaria.
- lancipetalus*, Griseb. in Goett. *Abh.* xix. (1874) 69.—Reg. Argent.
- Langsdorffii*, DC. Prod. i. 34 = multifidus.
- Langsdorffii*, Spreng. *Syst.* ii. 652.—Japon.
- lanuginosaeformis*, Selin. ex Fellm. Pl. Lapp. Or. 3 = acris.
- lanuginosus*, Amo, Fl. Iber. vi. 720 = nemorosus.
- lanuginosus*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 6 = constantinopolitanus.
- lanuginosus*, Costa, *Introd. Fl. Catal.* 6 = sardous.
- lanuginosus*, Ledeb. Fl. Ross. i. 42 = acris.
- lanuginosus*, Linn. *Sp. Pl.* 554.—Europ.; Reg. Caucas.
- lanuginosus*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 394 = repens.
- lanuginosus*, Walt. Fl. Carol. 159 = recurvatus.
- lappaceus*, Sm. in Rees, *Cyclop.* xxix. n. 61.—Austral.
- lapponicus*, Linn. *Sp. Pl.* 553.—Reg. bor. et arct.
- lapponicus*, Oed. Fl. Dan. t. 144 = nivalis.
- lapponicus*, Soleir. ex Nym. *Consp.* 10 = demissus.
- lapponicus*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 743 = Villarsii.
- lasiocarpus*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 323.—Sibir. altaic.
- lasiolemon*, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 15 = Fenzlii.
- lateriflorus*, DC. *Syst.* i. 251.—Europ. austr.; Oriens.
- latilobus*, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 485 = complicatus.
- laxicaulis*, Darby, Bot. S. St. 204 = obtusiusculus.
- Lechleri, Schlecht. in *Linnaea*, xxvii. (1854) 557.—Peruv.
- Lecokii*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 17 = nemorosus.
- leiodiscus*, Boiss. & Huet, ex Boiss. Fl. Orient. i. 55 = marginatus.
- Lemmoni, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* x. (1874) 68.—Am. bor. occ.
- Lenormandi, F. Schultz, in *Flora*, xx. (1837) 726.—Europ.
- leontinensis*, Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 910.—Hispan.
- leptaleus*, DC. *Syst.* i. 258.—Ins. Cyprus.
- leptocaulis*, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 244 = parviflorus.
- leptopetalus*, Rafin. Fl. Ludov. 83 = recurvatus.
- Lerchenfeldianus*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 14 = montanus.
- leucothrix*, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 296 = chaerophyllos.
- Limosella*, F. Muell. ex T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 177.—N. Zel.
- limoselloides*, F. Muell. ex Hook. f. *Sc. Pl.* t. 1081.—N. Zel.
- limoselloides*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 275 [bis].—Venezuela.
- limosus*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 20 = multifidus.
- linearilobus*, Bunge, in *Arb. Naturf. Ver. Riga*, i. (1847) 122.—Turkestan.

RANUNCULUS :—

- Lingua*, Linn. *Sp. Pl.* 549.—Europ.; Sibir.
- Lingua*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 391 = obtusiusculus.
- litoralis*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 663.—Chili.
- litoralis*, Schlecht. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 54, nomen.—Chili.
- Llavanus*, Schlecht. in *Linnaea*, x. (1836) 233.—Mexic.
- lobatus*, [Clairv.] Herb. Man. 177 = aconitifolius.
- lobatus*, Jacquem. *Voy. Bot.* 4.—Reg. Himal.
- lobatus*, Moench, Meth. 214 = muricatus.
- lomatocarpus*, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. (1835) 36.—Oriens.
- longepedunculatus*, Scheidw. in *Hortic. Belge*, v. (1838) 163. t. 9.—Mexic.
- longicaulis*, Ledeb. ex Spreng. f. *Tent. Suppl. Syst.* 15.—Europ. austr.
- longicaulis*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 308 = pulchellus.
- longifolius*, Lam. Fl. Fr. iii. 189 = R. Lingua.
- longipes*, Lange, ex Cut. Fl. Madr. 103 = pedunculatus.
- longirostris*, Godr. in *Mém. Soc. Roy. Nancy*, 1839 (1840) 39.—Am. bor.
- Lorentii*, Hochst. in Lorent, *Wanderungen*, 338 = lomatocarpus.
- lucidus*, Poir. *Encyc.* vi. 113 = repens.
- lugdunensis*, Jord. *Diagn.* i. 63 = monspeliacus.
- lusitanicus*, Freyn, in *Flora*, lxiii. (1880) 24.—Lusitan.
- lutulentus*, Sonceon & Perrier, in *Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem.* 181.—Europ.
- luzulaefolius*, Amo, Fl. Iber. vi. 714 = gramineus.
- Lyallii*, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 4.—N. Zel.
- lycoctonifolius*, Hegetschw. Fl. Schw. 544 = montanus.
- Macauleyi*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 45.—Am. bor.
- maclovianus*, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (18 6) 615.—Ins. Falkland.
- macranthus*, Scheele, in *Linnaea*, xxi. (1848) 585.—Texas; Mexic.
- macrocarpus*, Pritz. *Sc. Ind.* ii. 239, sphalm. = macrocarpus, Boiss. & Buhse.
- macropterus*, DC. *Prod.* i. 29.—Peruv.
- macrophyllus*, Desf. Fl. Atlant. i. 437 = palustris.
- macrophyllus*, Ledeb. Fl. Ross. i. 42 = grandiflorus.
- macrophyllus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 17 = acris.
- macroptus*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 5.—Persia.
- macropus*, Hook. f. in Hook. *Sc. Pl.* t. 634.—N. Zel.
- macrorhizus*, Schnizl. *Sc. t.* 178. f. 1.—Hab.?
- macrorrhynchus*, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vi. 5.—Mesopot.
- madagascariensis*, Freyn, in *Bremen, Abh.* vii. (1880) 7.—Madag.
- magellanicus*, Comm. ex DC. *Syst.* i. 294 = petiolaris.
- magellensis*, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* 69 = crenatus.
- major*, Dum. Fl. Belg. Prod. 128 = acris.
- Malabailae*, Boiss. Fl. Orient. i. 37.—Cilicia.
- malacophyllus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 16 = acris.
- Mandonianus*, Wedd. *Chlor. And.* ii. 299.—Bolivia.
- marginatus*, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 318.—Graec.
- marilandicus*, Poir. *Encyc.* vi. 126 = repens.
- marinus*, Fries, *Summa Veg. Scand.* 141 = Baudotii.
- maritimus*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 663.—Chili.
- Marschlinii*, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 434 = demissus.
- mariscus*, Guss. & Tenore, in Fl. Neap. Syll. App. iv. p. ix = auricomus.
- Martini*, Lamotte, *Prod. Fl. Centr. Fr.* i. 43 = trichophyllus.
- marylandicus*, Poir. *Encyc.* vi. 126 = repens.
- mauiensis*, A. Gray, Bot. U. St. *Expl. Exped.* i. 11.—Ins. Sandvic.
- mauritanicus*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 249 = omiophyllus.
- mediterraneus*, Griseb. ex Schur, Enum. Pl. Transs. 22 = sardous.
- medius*, Bernh. Cat. Pl. Hort. Erfurt.; ex Schlecht. *Animad.* Ran. i. 14 = aconitifolius.
- meganthus*, Rafin. Fl. Ludov. 82 (Quid?).—Am. bor.
- megaphyllus*, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 434.—Ins. Mader.
- meifolius*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 380 = millefoliatus.
- Meinshauseni*, Schrenk, in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* iii. (1845) 309.—Soongar.
- membranaceus*, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 270 = pinnatus.

RANUNCULUS :—

- membranaceus*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 53 = pulchellus.
- Meyeri, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 7.—Afr. austr.
- Meyerianus, Rupr. *Fl. Cauc.* 25.—Reg. Caucas.
- micranthus*, Bruegg. in *Zeitschr. Ferdinand. Tirol.* III. ix. (1860) 7.—Europ.
- micranthus*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 18 = abortivus.
- microcarpus*, Bertol. *Misc. Bot.* xxii. 17. t. 6 = muricatus.
- microcarpus*, Presl, *Rel. Haenk.* ii. 70.—Chili.
- Millani, F. Muell. in *Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 358.—Austral.
- millefoliatus*, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 63.—Reg. Mediterr.
- millefolius*, [Soland. in] *Russ. Aleppo*, ed. II. ii. 254 = myriophyllus.
- Millii, Boiss. & Heldr. ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 35.—Graec.
- minimus*, Hort. ex Schlecht. *Animad. Ran.* i. 19 = ophioglossifolius.
- minutiflorus*, Bert. ex Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 661.—Chili.
- minutus*, C. Gay, Fl. Chil. i. 38.—Chili.
- minutus*, Leyb. in *Flora*, xxxvii. (1854) 369 = montanus.
- miser*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 662.—Chili.
- mitis*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 268 = auricomus.
- mixtus*, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 1 = nemorosus.
- Moellendorffii*, Hance, in *Journ. Bot.* xvii. (1879) 7.—China.
- mollis*, Wall. Cat. n. 4704 = diffusus.
- monanthos*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 662.—Chili.
- Monroi, Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 323.—N. Zel.
- monspeliacus*, Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. iv. 1067 = illyricus.
- monspeliacus*, Linn. *Sp. Pl.* 553.—Reg. Mediterr.
- monspeliacus*, Winkl. ex Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 922 = Winkleri.
- monspessulanus*, Jord. *Diagn.* i. 64 = monspeliacus.
- montanus*, Orsini, ex Tenore, Syll. 270 = Villarsii.
- montanus*, Presl, ex Nym. *Consp.* 12 = acris.
- montanus*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 359 = Sibthorpii.
- montanus*, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1321.—Europ.
- monteanus*, Phil. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 185.—Chili.
- Moorcroftianus*, D. Don, in Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 53 = pulchellus.
- moschatus*, Uspensky, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* vii. (1834) 375, nomen.—Rossia.
- Moseleyi*, Hook. f. in *Phil. Trans.* clxviii. (1879) 10.—Ins. Kerguel.
- mucronatus*, Bertol. in *Nov. Comm. Acad. Bonon.* vi. (1843) 224. t. 8. f. 2 = oxyspermus.
- Muelleri, Benth. *Fl. Austral.* i. 13.—Austral.
- mugellensis*, Steud. *Nom.* ed. I. 679, sphalm. = *magellensis*.
- multicaulis*, D. Don, ex G. Don, *Gen. Syst.* i. 34.—Mexic.
- multifidus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 102 = Forskoeilii.
- multifidus*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 736.—Am. bor.
- multiflorus*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 218 = aconitifolius.
- multiflorus*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 263 = polyanthemus.
- multiscapus*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 9. t. 5 = lappaceus.
- muricatus*, Linn. *Sp. Pl.* 555.—Europ.; Oriens.
- muricatus*, Moench, Meth. 215 = parviflorus.
- myosuroides*, Boiss. & Kotschy, *Diagn.* Ser. II. v. 6.—Syria.
- Myosurus*, Afzel. in *Liljeb. Svensk Fl.* 230 = *Myosurus minimus*.
- myriophyllus*, DC. *Syst.* i. 257.—As. Min.; Mesopot.
- nanus*, Fisch. ex DC. Prod. i. 33 = R. Cymbalaria.
- nanus*, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 242 = lappaceus.
- napaulensis*, DC. Prod. i. 39 = diffusus.
- napellifolius*, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. I. fasc. ii. 90; ed. II. 114 = acris, nemorosus, polyanthemus.
- napellifolius*, DC. *Syst.* i. 282.—Graec.
- natans*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 315 = hyperboreus.
- natans*, Nees, ex G. Don, *Gen. Syst.* i. 31.—Mexic.
- neapolitanus*, Bourg. ex Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 930, 931 = Broteri, Aleae.

RANUNCULUS:—

neapolitanus, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 22 = bulbosus.
neapolitanus, Tod. ex Freyn, Kenn. Ranunc. 20 = palustris.
Nelsonii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 374. —Am. bor. occ.
memorivagus, Jord. Diagn. i. 74 = acris.
memorosus, DC. Syst. i. 280. —Europ. austr.
Nendtwichii, Frivald. in *Flora*, xix. (1836) 437 = lateriflorus.
nepalensis, Spreng. Syst. ii. 655 = diffusus.
nepalinus, Jacquem. ex Aitch. in *Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 30 = hirtellus.
nephelogenes, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 28 = pulchellus.
nervosus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = hirtellus.
nevadensis, Willk. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 85. —Hispan.
nidulans, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 252 = chaerophyllos.
nigrescens, Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 921. —Hispan.
nitidus, Muhl. Cat. ed. II. 56 = repens.
nitidus, Walt. Fl. Carol. 159 = abortivus?
nivalis, Lag. in *Anal. Cienc. Nat.* v. (1804) 280 = demissus.
nivalis, Lerchew. ex Schur, in *Verh. Siebenb. Ver.* Naturw. iv. (1853) 14 = montanus.
nivalis, Linn. *Sp. Pl.* 553. —Reg. bor. et arct.
nivalis, Pall. Reise, iii. 653 = polyrhizos.
nivalis, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 382 = Sibthorpii.
nivicola, Hook. Ic. Pl. t. 571. —N. Zel.
nodiflorus, Linn. *Sp. Pl.* 549. —Europ.
nubigenus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 42. —Peruv.
Nuttallii, A. Gray, in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 56. —Am. bor. occ.
obesus, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 275. —Reg. Caucas.
oblongifolius, Ell. Sketch, ii. 58. —Am. bor. occ.
obtectus, Wall. Cat. n. 4705 = diffusus.
obtusatus, Poepp. *Fragm. Syn. Pl. Chil.* 28. —Chili.
obtusifolius, Hornem. *Hort. Hafn.* ii. 528. —Hispan.
obtusiusculus, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 359; et in *Desv. Journ. Bot.* i. (1808) 225. —Am. bor.
occidentalis, Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 929. —Hispan.
occidentalis, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 22, excl. syn. —Am. bor. occ.
occidentalis, Torr. & Gray, l. c., partim = Nelsonii.
oenanthefolius, Tenore & Guss. in *Atti Acc. Nap.* v. I. (1843) 318 = repens.
Olgae, Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 1. —Turkestan.
oligocarpus, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 5. —Abyss.
oligocarpus, Bruegg. in *Zeitschr. Ferdinand. Tirol.* III. ix. (1860) 7. —Europ.
ololeucos, Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3. —Europ.
ollyssiponensis, Pers. Syn. ii. 106 = spicatus.
omiophyllus, Tenore, Fl. Nap. iv. 338. —Europ.
ophioglossifolius, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 731. —Europ. occ.; Reg. Mediterr.
ophioglossoides, Willd. Sp. Pl. ii. 1310 = ophioglossifolius.
oppositifolius, Kanitz, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xiii. (1863) 513. —Hungar.
orbicularis, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 406. —Chili.
oreophilus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 383 = Villarsii.
oreophilus, Walp. Ann. iii. 811, sphalm. = seq.
oreophytus, Delile, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xx. (1843) 89. —Afr. trop.
orientalis, Linn. *Sp. Pl.* 555. —Afr. bor.; Oriens.
ornithopodioides, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 30 = pedatus.
ornithorhynchus, Walp. Rep. i. 43, sphalm. = orthorhynchus.
orthophytus, Walp. l. c. v. 5, sphalm. = oreophytus.
orthorhynchus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 21. t. 9. —Am. bor. occ.
oryztorum, Bunge, Enim. Pl. Chin. Bor. 2 = sceletatus.
ovalifolius, Lamb. ex G. Don, Gen. Syst. i. 33 = rhomboides.
ovalis, Rafin. in *Desv. Journ. Bot.* iv. (1814) 268. —Am. bor.

RANUNCULUS:—

ovatifolius, Steud. Nom. ed. II. i. 434 = praec.
ovatus, DC. Syst. i. 247, in syn. = R. Flammula.
oxynotus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* x. (1874) 68. —Calif.
oxyrhynchus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 312 = Sprunerianus.
oxyspermus, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1328. —Ross.; As. Min.
Pacheri, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 53. —Europ.
pachyrrhizus, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 8. —N. Zel.
palaestinus, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 4 = constantinopolitanus.
palensis, Berger. Fl. Bass. Pyr. ii. 405 = sardous.
palimbifolius, Wedd. *Chlor. And.* ii. 303. —Ecuador; Peruv.
Pallasii, Schlecht. *Animad. Ran.* i. 15. t. 2. —Reg. arct.
pallidior, [Chaix, in] Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 335; iii. 751 = sardous.
pallidus, [Soland. in] Rnss. Aleppo, ed. II. ii. 254 = sardous.
palmatus, [Clairv.] Man. Herb. 177 = aconitifolius.
palmatus, Ell. Sketch, ii. 61. —Am. bor.
paludosus, Poir. *Voy. Barb.* ii. 184. —Afr. bor.
paludosus, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 924 = chaerophyllos.
palustris, Amo, Fl. Iber. vi. 720 = Broteri.
palustris, Hegetschw. ex Kittel, Taschenb. ed. II. 773 = auricomus.
palustris, Lange, ex Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 930 = adscendens.
palustris, Linn. ex Sm. in *Rees, Cyclop.* xxix. n. 52. —Reg. Mediterr.; Oriens.
palustris, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 931 = Aleae.
pangiensis, Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 377. —Reg. Himal.
panormitanus, Tod. in *Atti Acc. Sc. Palermo*, N. S. i. (1845) 15 = bulbosus.
pantothrix, Brot. Fl. Lusit. ii. 375 = trichophyllus.
pantothrix, Ell. Sketch, ii. 56 = aquatilis.
papillaris, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 218 = hederaceus.
paradoxus, Weihe, in *Linnaea*, x. (1835–36) 418. t. 2 = acris.
Pardalianches, Steud. Nom. ed. I. 680 = R. Thora.
parnassifolius, Linn. *Sp. Pl.* 549. —Europ.
parviflorus, Gouan, Fl. Monsp. 270 = sardous.
parviflorus, Linn. Syst. ed. X. 1087. —Reg. Mediterr.
parviflorus, Steud. Nom. ed. II. ii. 434 = parnassifolius.
parvulus, [Clairv.] Man. Herb. 179 = Villarsii.
parvulus, J. F. Gmel. Syst. 879 = falcatus.
parvulus, Linn. Mant. i. 79 = sardous.
pascuiculus, Jord. Diagn. i. 73 = acris.
patagonicus, Poepp. *Fragm. Syn. Pl. Chil.* 29. —Chili.
paucicarpus, Arv. Ess. Pl. Dauph. 17 = ololeucos.
paucidentatus, Schrenk, in *Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb.* iii. (1845) 309. —Soongar.
pauciflorus, Spreng. Syst. ii. 657 = parviflorus.
paucistamineus, Tausch, in *Flora*, xvii. (1834) 525 = trichophyllus.
pectinatus, Dubois, Method. 454 = aquatilis.
pedatifidus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 18 = Hookeri.
pedatifidus, Schlecht. *Animad. Ran.* ii. 18 = affinis.
pedatifidus, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxix. n. 72. —Dahuria.
pedatus, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 112. t. 108. —Hungar.
peduncularis, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxix. n. 49. —Reg. Magellan.
peduncularis, Viv. ex Nym. Consp. 8 = chaerophyllos.
peduncularis, Lange, Desc. Pl. Nov. Hisp. i. 4. —Hispan.
pedunculatus, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 8 = sardous.
peloponnesiacus, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 63 = chaerophyllos.
peltatus, Moench, Meth. 214 = aquatilis.
peltatus, Schrank, Baier. Fl. ii. 103. —Reg. temp. bor.
pensylvanicus, Linn. f. *Suppl.* 272. —Am. bor.
pensylvanicus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 393 = repens.
persicus, DC. Syst. i. 288. —Persia.
Perustianus, Jeanb. & Timb. in *Bull. Soc. Phys. Nat. Toulouse*, iii. (1875–76) 330 = nemorosus.
peruvianus, Pers. Syn. ii. 103. —Peruv.
petiolaris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 45. —Mexic.

RANUNCULUS:—

Petiveri, Amo, Fl. Iber. vi. 702 = Baudotii.
Petiveri, Coss. & Germ. Fl. Par. i. 10 = ololeucos.
Petiveri, Koch, in *Sturm, Deutschl. Fl.* Heft 82; et Syn. Fl. Germ. ed. II. 13 = confusus.
petroselinus, Bria, Hist. Nat. Renoncul. 43. t. 2. —Ins. Borbon.
peucedanifolius, All. Fl. Pedem. ii. 53. —Reg. bor. temp.
peucedanifolius, Gilib. Exercit. i. 369 = fluitans.
peucedanoides, Desf. Fl. Atlant. i. 444 = peucedanifolius.
Peyrouisianus, Freyn, in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 936 = tuberosus.
philonotis, Ehrh. in *Hannov. Mag.* (1783) 17tes St. 270 = sardous.
philonotis, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 393 = repens.
phrygius, Boiss. Fl. Orient. i. 29. —Phrygia.
Phthora, Steud. Nom. ed. II. ii. 435 = R. Pthora.
phyteumaeifolius, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 218 = bonariensis.
pilosus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 220 = Gouani.
pilosus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 45. —Am. austr.
pilosus, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 21, sphalm. = setoso-pilosus.
pilulifer, Hook. Ic. Pl. t. 600 = parviflorus.
pimpinellifolius, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 243 = lappaceus.
pimpinelloides, D. Don, in *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 53 = Callianthemum cachemirianum.
Pinardi, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 10. —Syria.
pinguis, Hook. f. Fl. Antarct. 3. t. 1. —Ins. Auckland.
pinnatus, Poir. *Encyc.* vi. 126. —Afr. trop.
pinnatus, Wight, Illustr. i. 6 = Wallichianus.
plantagineus, All. Fl. Pedem. ii. 48 = pyrenaeus.
plantagineus, Pers. Syn. ii. 102 = bupleuroides.
plantaginifolius, Murr. in *Comm. Gotting.* viii. (1777) 39. t. 2. —Sibir.
plantaginifolius, Salisb. *Prod.* 372 = amplexicaulis.
plantaginifolius, Linn. Mant. i. 79 = aconitifolius.
platensis, Spreng. Syst. v. 586 (Index). —Reg. Argent.
platyspermus, Fisch. *Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 48. —Reg. Khirgis; Turkestan.
plebeius, R. Br. ex DC. Syst. i. 288. —Austral.; N. Zel.
pleurocarpus, Maxim. *Prim. Fl. Amur.* 21. —Reg. Amur.
polianthos, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 240 = polyanthemus.
polyanthemoides, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 16 = nemorosus.
polyanthemoides, Schur, Enum. Pl. Transs. 20 = polyanthemus.
polyanthemus, Linn. *Sp. Pl.* 554. —Europ.; Reg. Caucas.
polymorphus, All. Fl. Pedem. ii. 49 = auricomus.
polymorphus, Rochel, Pl. Banat. Rar. in *Index, nomen*; Bot. Reise Banat. 74 = montanus.
polypetalus, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 134 = peduncularis.
polypetalus, Rafin. Fl. Ludov. 83 (Quid?). —Am. bor.
polypetalus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 54. t. 11. f. 2 = Oxygraphis polypetala.
polyphyllus, Waldst. & Kit. ex Willd. *Sp. Pl.* ii. 1331. —Hungar.
polyrhizos, Steph. ex Willd. *Sp. Pl.* ii. 1324. —Ross.; Sibir.
polyrhizus, Soleir. ex Nym. Consp. 10 = demissus.
poncticus, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 46 = Sibthorpii.
poncticus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = nemorosus.
pozoaefolius, C. Gay, Fl. Chil. i. 34. —Chili.
praecox, Salisb. *Prod.* 372 = R. Ficaria.
praemorsus, H. B. & K. ex DC. Syst. i. 292. —Am. austr.
pratensis, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 2 = erodiifolius.
pratensis, Presl, Delic. Prag. 9 = palustris.
Preslii, Weihe, ex Opiz, *Natural.* xi. (1826) 346. —Europ.
procerus, Moris, Fl. Sard. i. 45 = palustris.
procumbens, Boiss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvi. (1841) 355. —Persia.
prolifer, Reinw. ex De Vriese, in *Miq. Pl. Jungh.* 77. —Java.
propinquus, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 332 = acris.

RANUNCULUS:—

prostratus, Poir. Encyc. vi. 113 = repens.
protensus, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 484.—Hungar.
protractus, Steud. Nom. ed. II. ii. 435; et in *Flora*, xxxix. (1856) 406.—Chili.
Pseudo-bulbosus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 84 = sardous.
Pseudo-cassubicus, Schur, Enum. Pl. Transs. 23 = auricomus.
Pseudo-fluitans, Newbould, ex Syme, Engl. Bot. ed. III. i. 20 = aquatilis.
Pseudo-hirsutus, Schur, Enum. Pl. Transs. 22 = sardous.
Pseudo-montanus, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 42 = montanus.
Pseudo-philonotis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 69.—Reg. Argent.
Pseudopsis, Jord. Diagn. i. 68 = demissus.
Pseudo-thora, Host, Fl. Austr. ii. 108 = hybridus.
Pseudo-Villarsii, Schur, Enum. Pl. Transs. 19 = Villarsii.
psilostachys, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 304.—Macedon.
psychrophilus, Wedd. Chlor. And. ii. 300.—Bolivia.
Pthora, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 98; ed. II. 119 = hybridus.
pubescens, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 435 = protractus.
pubescens, Lag. Gen. et Sp. Nov. 19 = Lagascanus.
pubescens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 94.—Afr. austr.
pulchellus, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 333.—Sibir.; Reg. Himal.
Pumilio, R. Br. ex DC. Syst. i. 271 = parviflorus.
pumilus, Poir. Encyc. vi. 133 = divaricatus.
pumilus, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 277 = sardous.
Purshii, Richards. in Frankl. 1st Journ. ed. II. App. 23 = multifidus.
pusillus, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 546 = multifidus.
pusillus, Poir. Encyc. vi. 99.—Am. bor.
pusillus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 249 = batrachioideus.
pygmaeus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 27 = falcatus.
pygmaeus, Wahlenb. Fl. Lapp. 157. t. 8. f. 1.—Reg. bor. et arct.
pyrenaicus, Gouan, Illustr. 33 = Gouani.
pyrenaicus, Linn. Mant. ii. 248.—Europ. austr.
Questieri, Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem. 122 = nemorosus.
Raddeanus, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 39.—Reg. Caucas.
radicans, Revel, in Act. Linn. Soc. Bord. xix. (1853) 120 = trichophyllus.
radicans, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 316 = multifidus.
radicescens, Jord. Pugill. Pl. Nov. 2 = nemorosus.
Raimondii, Wedd. Chlor. And. ii. 305.—Peruv.
rectirostris, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 303.—Alger.
rectus, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 15 = acris.
rectus, Déségl.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. (1878) Bibl. 107 = praec.?
rectus, Ravin, in Bull. Soc. Sc. L'Yonne, xiv. II. (1860) 92 (Quid?).—Gallia.
recurvatus, Bong. Veg. Sitch. 5 = Nelsonii.
recurvatus, Poir. Encyc. vi. 125.—As. et Am. bor.
renifolius, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = R. Thora.
reniformis, Gilib. Fl. Lituan. ii. 269 = cassubicus.
reniformis, Kittel, Taschenb. ed. II. 773 = auricomus.
reniformis, Wall. Cat. n. 4709.—Ind. or.
repens, Linn. Sp. Pl. 554.—Reg. bor. temp.
reptabundus, Jord. Diagn. i. 83 = repens.
reptabundus, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 10 = scleratus?
reptans, Linn. Sp. Pl. 549 = R. Flammula.
reticulatus, Regel & Schmitz, ex Seub. in *Flora*, xxviii. (1845) 334 = arvensis.
Reuterianus, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 65.—As. Min.
Revellieri, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, i. (1857) 85; iv. (1858) 117 = pedunculatus.
rhaeadifolius, Poir. Encyc. Suppl. iv. 664 = trilobus?
rhiphiophyllus, Bast. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 11 = aquatilis.
rhaeadifolius, DC. Syst. i. 284 = trilobus.
rhombifolius, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 1 = bullatus.

RANUNCULUS:—

rhomboides, Goldie, in Edinb. Phil. Journ. vi. (April 1822) 329. t. 11. f. 1 = ovalis.
rhynchocharpus, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 355 = lomatocharpus.
rigescens, Turcz. ex Osten-Sack. & Rupr. Sert. Tiansch. 37.—Turkestan.
rigidus, Godr. in Mém. Soc. Roy. Nancy, 1839 (1840) 41.—Afr. austr.
rigidus, Pers. in Usteri, Ann. Bot. xiv. (1795) 39 = divaricatus.
Rionii, Lager, in *Flora*, xxxi. (1848) 49.—Helvet.
riparius, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 28 = pensylvanicus.
rivularis, Banks & Soland. ex DC. Syst. i. 270.—Austral.; N. Zel.
Robertsoni, Benth. Fl. Austral. i. 10.—Austral.
Robini, Rafin. Fl. Ludov. 82 = obtusiusculus.
robustus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 250 = chaerophyllos.
Rosani, Tenore, Prod. Fl. Neap. p. xxxii = trilobus.
roseus, Hegetschw. Fl. Schw. 540 = glacialis.
rotundifolius, Jord. Diagn. i. 66 = monspeliacus.
rufosepalus, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 217.—Turkestan.
rufulus, Brot. Fl. Lusit. ii. 367 = chaerophyllos.
rumelicus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 305.—Graec.
rupestris, Guss. Ind. Sem. Boccad. (1826) 8.—Cf. Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 981.—Hispan.
rutaefolius, Linn. Sp. Pl. 552.—Europ.; Sibir.
ruteifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = millefoliatus.
Rutenbergii, Freyn, in Bremen, Abh. vii. (1880) 9.—Madag.
ruthenicus, Jacq. Hort. Vindob. iii. 19 = plantaginifolius.
Sabinii, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 264 = pygmaeus.
sagittifolius, Hook. Ic. Pl. t. 173.—Zeylan.
sahendicus, Boiss. & Buhse, in Novw. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 6.—Persia.
salicifolius, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 259 = R. Lingua.
salsugineus, Link, Handb. ii. 392, sphalm. = salsuginosus, Pall.
salsuginosus, DC. Prod. i. 33 = plantaginifolius.
salsuginosus, D. Don, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = lobatus.
salsuginosus, Georgi, Bemerk. Russ. Reich. i. 222 (Quid?).—Rossia.
salsuginosus, Pall. Reise, iii. 213 = R. Cymbalaria.
salsuginosus, Wall. Cat. n. 4708 = pulchellus.
salsus, Pall. Reise Prov. Russ. Reich. iii. 318.—Sibir. or.
samojedorum, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 18.—Ross. arct.
sanguineus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10 = asiaticus.
saniculaefolius, Schur, Enum. Pl. Transs. 21 = nemorosus.
saniculaefolius, Viv. Fl. Lib. Spec. 29. t. 11. f. 2.—Afr. bor.
saniculaeformis, Muhl. ex DC. Prod. i. 40 = recurvatus.
sardonicus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 47 = ophioglossifolius.
sardous, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 84; ed. II. 111.—Europ.; Afr. bor.; As. Min.
sarmentoso-repens, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 403.—Peruv.
sarmentosus, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. ix. (1834) 244 = R. Cymbalaria.
sarmentosus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 13.—Reg. Argent.
Sartorianus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 8 = Villarsii.
saxatilis, Balb. Misc. Bot. i. 27 = monspeliacus.
saxatilis, Vill. Prosp. 50 = praec.?
saxifragaeifolius, Steph. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 435 = R. Cymbalaria.
saxifragaeifolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 435; et in *Flora*, xxxix. (1856) 406.—Chili.
scaber, Presl, Fl. Sicul. i. 13.—Sicilia.
scandens, Bogusl. in Erman, Archiv. vi. (1848) 60.—Ross.
scapigerus, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 244 = lappaceus.
scleratus, Linn. Sp. Pl. 551.—Reg. bor. temp.

RANUNCULUS:—

Schimperianus, Hochst. & A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 4 = simensis.
Schlechtendalii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 21. t. 11 = repens.
Schmidtii, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 34, in obs. = R. Lingua.
Schottii, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 54.—Europ.
Schowii, Tin. in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 889.—Sicil.
Schraderianus, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 44 = chius.
Schrenkianus, Fisch. & Mey. ex Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiii. (1860) i. 64.—Soongar.
Schurii, Fuss, ex Schur, Enum. Pl. Transs. 16 = montanus.
scutatus, Schott, ex Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 54 = Schottii.
scutatus, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 205 = R. Thora.
sedunensis, Rion, ex Wolf, in Bull. Soc. Murith. vii. viii. (1879) 28 = Rionii.
segetalis, Kit. ex Uechtr. in *Flora*, iv. (1821) 40 = arvensis.
Seguieri, Vill. Prosp. 50; Hist. Pl. Dauph. iii. 737.—Europ.
semicalvus, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 2, in textu = bulbatus.
semidecurrens, Opiz, in *Flora*, vii. (1824) i. Beil. 84 = repens.
semiverticillatus, Phil. in Anal. Univ. Chil. i. (1861) 60.—Chili.
septentrionalis, De Bray, ex Fleisch. & Lindem. Fl. Deutsch. Ostseeprovinz. 195.—Prov. Balt.
septentrionalis, Poir. Encyc. vi. 125 = repens?
serbicus, Vis. Cat. Sem. Hort. Patav. Suppl. (1858); et in Mem. Ist. Venet. ix. (1860) 168.—Banat.
sericans, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 405.—Chili.
sericeus, Poir. Encyc. vi. 109.—Ins. Manrit.
sericeus, Willd. Enum. Hort. Berol. 589 = illyricus.
sericocephalus, Hook. f. Fl. Antarct. 225.—Ins. Falkland.
sericophyllus, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 6.—N. Zel.
sessiliflorus, R. Br. ex DC. Syst. i. 302 = parviflorus.
sessiliflorus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 219 = platensis.
sessiliflorus, Wedd. ex Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 13 = Hilarii.
setoso-pilosus, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 404.—Peruv.
Sewerzowi, Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 221.—Turkestan.
sibbaldioides, H. B. & K. ex DC. Syst. i. 293.—Am. austr.
sibiricus, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 246 = nivalis.
sibiricus, Spreng. Syst. ii. 652 = multifidus.
sibiricus, Schraub, ex Schlecht. Animad. Ran. ii. 38, nomen (Quid?).—Hab.?
Sibthorpii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 7.—Graec.
siculus, Presl, Delic. Prag. 8 = acris.
Sieboldi, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 5.—Japon.
silvaticus, Vill. Prosp. 51 = acris?
simensis, Fresen, in Mus. Senckenb. ii. (1837) 269.—Abyss.
Sinclairii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 6.—N. Zel.
songaricus, Schrenk. in Fisch. & Mey. Enum. Pl. Nov. Schrenk. ii. 67.—Soongar; Turkest.
sparsipilus, Jord. Diagn. i. 80 = bulbosus.
speciosus, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 722 = bulbosus.
sphaerospermus, Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II. v. 6 = aquatilis.
spicatus, Desf. Fl. Atlant. i. 438.—Afr. bor.
spicatus, Plan. Fl. Gallega, 54 = nigrescens.
spicatus, Presl, Fl. Sicul. 14 = rupestris.
Spreitzenhoferi, Heldr. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 50.—Ins. Ionian.
spretus, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 17 = nemorosus.
Sprunerianus, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 64 (Sprunerianus).—Graec.; Syria.
squamosus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 218 = R. Thora.
squarrosus, Laest. ex Nym. Consp. 12 = acris?
squarrosus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 381 = orientalis.

RANUNCULUS:—

stagnalis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 5 = *simensis*.
stagnatilis, Wallr. Sched. Crit. 285 = *aquaticus*.
stenocarpus Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 6. — Abyss.
stenopetalus, Hook. Ic. Pl. t. 677. — Chili.
Steveni, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 22 = *acris*.
stipatus, Jord. Diagn. i. 72 = *acris*.
stoloniferus, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 17. — Mexic.
striatus, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 28, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 8 = *pinnatus*.
strigillosus, Boiss. et Huet, Diagn. Ser. II. v. 7. — As. Min.; Persia.
strigosus, Schur, Enum. Pl. Transs. 17 = *acris*.
suavetius, Rupr. Fl. Cauc. 21. — Reg. Caucas.
subacri-bulbosus, Wesm. in Bull. Acad. Brux. (1862) 14. t. 298. — Armenia.
subalpinus, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 40, in textu = *acris*.
subapetalus, Vict. Aug. in Ann. Linn. Soc. i. 193; ex Duby, Bot. Gall. i. 13 = *parviflorus*.
submersus, Godr. ex Carion, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 498 = *aquaticus*.
suborbiculatus, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 921. — Hispan.
subpinnatus, Wight & Arn. Prod. 4 = *diffusus*.
subscaposus, Hook. f. Fl. Antarct. 5. — N. Zel.
subtilis, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 41 = *acris*.
subtilis, Trautv. in Bull. Acad. Petersb. x. (1866) 393. — Reg. Cauc.
subtrifolius, Schur, Enum. Pl. Transs. 22 = *sardous*.
subtuberosus, Gilib. Fl. Litan. ii. 262 = *acris*.
sulphureus, [Soland. in] Phipps, Voy. 202 = *nivalis*.
supranudus, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 1 = *bullatus*.
sylvaticus, Gren. et Godr. Fl. Fr. i. 33 = *nemorosus*.
sylvaticus, Thuill. Fl. Par. ed. II. 276 = *acris*.
Szovitzianus, Boiss. Fl. Orient. i. 42. — Persia.
szurulensis, Lerch. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 14 = *montanus*.
Tachireoi, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 267. — Japon.
Tappeineri, Bamberg. in Flora, xxxv. (1852) 625 = *pygmaeus*.
tauricus, Pall. Tabl. Taur. 52 = *ophioglossifolius*.
tauriensis, All. ex Steud. Nom. i. 681 = *pyrenaeus*.
telonensis, Robert, ex Biria, Hist. Nat. Renoncul. 37 = R. Flammula.
tembensis, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 271. — Abyss.
tenellus, Marschl. in Flora, xvii. (1834) ii. Beibl. 84 = *demissus*.
tenellus, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 23 = *Nelsonii*.
tenellus, Viv. Pl. Aegypt. Dec. iv. 6. — Aegypt.
Teneriffa, Pers. Syn. ii. 103 = *curtusaeifolius*.
Tenorii, Jord. Diagn. i. 62 = *illyricus*.
tenuicaulis, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 235. — N. Zel.
tenuifolius, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 28 = *montanus*.
tenuirostris, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 250. — Alger.
tenuirostris, Steud. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 97 = *oreophytus*.
ternatus, DC. Syst. i. 242 = *acris*.
ternatus, Thunb. Fl. Jap. 241. — China; Japon.
testiculatus, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 97; ex II. 119; Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 386 = *falcatus*.
texensis, Engelm. ex Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1847) 210 = *oblongifolius*.
Thomasii, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1827) 25 = *millefoliatus*.
Thomasii, Tenore, Prod. Fl. Nap. 69. — Italia.
Thora, Linn. Sp. Pl. 550. — Europ. austr.
Thora, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 380 = *brevifolius*.
Thora, Sturm, Deutschl. Fl. Heft 19 = *hybridus*.
Thora, Weigel. ex Steud. Nom. ed. I. 681 = *auricomus*.
Timbali, Mabile & Gaudf. Not. sur Renonc. (1874). — Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) Bibl. 216 = *nemorosus*.
tomentosus, Moench, Meth. 212 = *illyricus*.
tomentosus, Poir. Encyc. vi. 127 = *repens*.
Tommasinii, Reichb. ex Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 116 = *velutinus*.

VOL. II.

RANUNCULUS:—

tomophyllus, Jord. Diagn. i. 71 = *acris*.
trachycarpus, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 46. — Oriens.
trachyspermus, Ell. Sketch, ii. 65 = *parviflorus*.
trachyspermus, Engelm. ex Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1847) 211. — Am. bor. occ.
trachyticus, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 41 = *acris*.
transsilvanicus, Schur, l. c. 46 = *acris*.
Traunfellneri, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = *alpestris*.
Traunfellneri, Schott, Skizz. Ranunc. Alloph. 8 = *praec.*?
Traversii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 4. — N. Zel.
trichocarpus, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. i. 47. — Armen.; Persia.
trichophyllos, Losc. Ser. Inconf. Pl. Arag. 2 = *confusus*.
trichophyllus, Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 335. — Europ.; Oriens.
tricroenatus, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reichs, ii. 19. — Reg. Samoied.
tridentatus, H. B. & K. ex DC. Syst. i. 252 = R. Cymbalaria.
trifoliatus, Muhl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 436 = *fascicularis*.
trifolius, Moench, Meth. Suppl. 70 = *pensylvanicus*.
trigonocarpus, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 2. — As. Min.
trilobatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 194 = *diffusus*.
trilobatus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 547. — N. Zel.
trilobatus, Kit. ex Schlecht. Animad. Ran. ii. 21 = *montanus*.
trilobus, Desf. Fl. Atlant. i. 437. t. 113. — Reg. Mediterr.
tripartitus, DC. Ic. Gall. Rar. i. 15. — Gall. occ.
tripartitus, Dubourg, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 436 = *Lenormandi*.
tripartitus, Nolte, Novit. Fl. Holsat. 51 = *aquaticus*.
triphyllos, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 214; et in Linnaea, xiv. (1840) 584 = *confusus*.
triseptus, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 133. — Am. austr.
triternatus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 662, in syn. = *biteratus*.
trullifolius, Hook. f. Fl. Antarct. 226. — Ins. Falkland.
Tschuktschorum, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 19, in textu. — Terr. Tschuktsch.
tuberculatus, DC. Syst. i. 297 = *arvensis*.
tuberculatus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 202 = *lomatocarpus*.
tuberosus, Hornem. Hort. Hafn. ii. 527 = *Hornemanni*.
tuberosus, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 320 = *nemorosus*.
tuberosus, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xi. (1861) 82 = *montanus*.
tuberosus, Stur, ex Nym. Consp. 12 = *acris*.
turkestanicus, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 217. — Turkestan.
udus, Freyn, in Bremen, Abh. vii. (1880) 10. — Madag.
uliginosus, Willd. Enum. Hort. Berol. 586 = *ophioglossifolius*.
umbellatus, Roxb. ex Willd. l. c. 588 = *sceleratus*.
umbrosus, Tenore & Guss. Fl. Neap. Syll. App. v. 15 = *lanuginosus*.
unalaschensis, Bess. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 32 = R. Flammula.
uncinatus, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. i. 35. — Mexic.
vaginalis, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 13. — N. Granat.
vaginalis, Portenschl. ex Freyn, Kennt. Ranunc. 26 = *palustris*.
vaginatus, Sommerauer, in Flora, xvi. (1833) 182 = *crenatus*.
valdepubens, Jord. Diagn. i. 82 = *bulbosus*.
valesiacus, Suter, Fl. Helvet. i. 825 = *lacerus*.
varifolius, Salisb. Prod. 373 = *auricomus*.
velutinus, Schur, Enum. Pl. Transs. 19 = *lanuginosus*.
velutinus, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 23. — Europ. austr.
ventricosus, Vent. Jard. Cels, sub. t. 73 = *muricatus*.
vernus, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 1018 = *auricomus*, *cassubicus*.
Vernyi, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 8. — Japon.
verrucosulus, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 436 = *sardous*, *trilobus*.

RANUNCULUS:—

verrucosus, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 61, nomen (Quid?). — Europ.
vestitus, Wall. Cat. n. 4707. — Burma.
Villarsii, DC. Fl. Fr. iv. 896. — Europ. austr.; Reg. Caucas.
villiferus, Jord. Diagn. i. 82 = *bulbosus*.
villosus, DC. Syst. i. 283 = *constantinopolitanus*.
villosus, St. Amans, Fl. Agen. 227. t. 5 = *nemorosus*.
villosus, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 306 = *palustris*.
vitifolius, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = *diffusus*.
vulgatus, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 15 = *acris*.
Wallichianus, Wight & Arn. Prod. 4. — Ind. or.
Warionii, Freyn, in Flora, lxiii. (1880) 25 = *spicatus*.
Weyleri, Marès, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 232, in textu; et ex Willk. in Linnaea, xl. (1876) 131. — Ins. Balear.
Winkleri, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 922. — Hispan.
xantholeucos, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 67 = *batrachoides*.
Xatardi, Lapeyr. Suppl. Hist. Pl. Pyr. 77 = *parviflorus*.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 5. — China.
Zuccarinii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 5 = *ternatus*.

RAOULIA, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 134. tt. 36, 37 (1846). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 307.
apice-nigra, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xi. (1879) 464. — N. Zel.
australis, Hook. f. ex Raoul, Choix Pl. Nouv. Zél. 20. t. 15. — N. Zel.
bryoides, Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 322. — N. Zel.
catipes, Hook. f. Fl. Tasman. i. 206. — Austral.
eximia, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 149. — N. Zel.
glabra, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 135. — N. Zel.
Goyeni, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 373. — N. Zel.
grandiflora, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 136. t. 37 A. — N. Zel.
Haastii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 148. — N. Zel.
Hectori, Hook. f. l. c. — N. Zel.
M'Kayi, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 354. t. 34. f. 3. — N. Zel.
mammillaria, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 150. — N. Zel.
Munroi, Hook. f. l. c. 148. — N. Zel.
Parkii, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 355. — N. Zel.
Petriensis, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 549. — N. Zel.
Planchoni, Hook. f. ex Benth. Fl. Austral. iii. 651. — Tasman.
rubra, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 349. — N. Zel.
subsericea, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 136. — N. Zel.
subulata, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 149. — N. Zel.
tasmanica, Hook. f. Fl. Tasman. t. 58 = *catipes*.
tenuicaulis, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 135. — N. Zel.

RAPA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = **Brassica**, Tourn. (Crucif.).
Napus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = B. campestris.
oblonga, Mill. l. c. n. 2 = B. campestris.
rotunda, Mill. l. c. n. 1 = B. oleracea.

RAPANEA, Aubl. Pl. Gui. i. 121. t. 46 (1775) = **Myrsine**, Linn.
guianensis, Aubl. l. c. = M. floribunda.
oblonga, Pohl, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. x. 308 = M. floribunda.
oblongifolia, Pohl, l. c. 310 = M. leuconeura.
villosissima, Miq. l. c. 322 (Index) = M. villosissima.

RAPATEA, Aubl. Pl. Gui. i. 305. t. 118 (1775). **RAPATEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 858.
MNIUM, Schreb. Gen. 214 (1789).
angustifolia, Spruce, ex Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 469. — Venezuela.
arthrophylla, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 132 = *Schoenocepalum arthrophyllum*.
flava, Kunth, Enum. Pl. iii. 367 (= *Monotrema flavum*). — Venezuela.

RAPATEA :—

- Friderici-Augusti, *Rob. Schomb. Rapat. Frid.-Aug. & Saxo-Frid.* 11. t. 1.—Guian.
gracilis, Poepp. & Endl. ex Endl. Gen. 131 = Cephalostemon *gracilis*.
gracilis, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 128 = Cephalostemon Riedelianus.
longipes, Spruce, ex Koern. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 472.—Bras.
Martiana, Nees, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 130 = Schoenocephalum *Martianum*.
paludosa, Aubl. Pl. Gui. i. 305. t. 118.—Am. trop.
pandanoides, Linden & André, *Illustr. Hort.* xx. (1873) 213. t. 153-4.—Bras.
parviflora, Nees, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 132 = Schoenocephalum *arthrophyllum*.
pycnocepala, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 128.—Bras.
sphaerocephala, Schult. f. Syst. vii. 1149 = Thurnia *sphaerocephala*.
Spruceana, Koern. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 470.—Venezuela.
squarrosa, Kunth, Enum. Pl. iii. 337 = Cephalostemon *squarrosus*.
squarrosa, Spruce, ex Koern. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 447 = Cephalostemon *affinis*.
unilateralis, Schult. f. Syst. vii. 1149 = Spathanthus *unilateralis*.

RAPHANIS, Dod. ex Moench, Meth. 267 (1794) = **Cochlearia**, Tourn. (Crucif.).
magna, Moench, l. c. = **C. Armoracia**.

RAPHANISTRUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 424 (1763) = **Raphanus**, Tourn. (Crucif.).

- arvense*, Wallr. Sched. Crit. 336 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
fugax, Nym. Consp. 29 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
Gayanum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 44 = **Raphanus** *sativus*.
innocuum, Moench, Meth. 217; Medic. in Usteri, Ann. Bot. viii. (1794) 39 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
Lampasana, Gaertn. Fruct. ii. 300. t. 143 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
Landra, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 656 = **Raphanus** *Landra*.
maritimum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 688 = **Raphanus** *maritimum*.
odessanum, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 82 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
pterocarpum, Juss. ex DC. Syst. ii. 661 = **Enarthrocarpus** *pterocarpus*.
recurvatum, Juss. l. c. = **Enarthrocarpus** *lyratus*.
rostratum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 22 = **Raphanus** *rostratus*.
segetum, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 280 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
silvestre, Aschers. Fl. Brandenb. 65 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
vulgare, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 687 = **Raphanus** *Raphanistrum*.

RAPHANOCARPUS, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1084 (1871). **CUCURBITACEAE**.

- Kirkii*, Hook. f. l. c.—Afr. trop.
Welwitschii, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 541.—Afr. trop.

RAPHANOPSIS, Welw. Apont. 547, nomen (1858) (Quid?).

RAPHANUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 196 (1737). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 101.

- DONDISIA*, Scop. Introd. 316 (1777).
DURANDEA, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 365 (1800).
ORMYCARPUS, Neck. Elem. iii. 82 (1790).
RAPHANISTRUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 424 (1763).
aegyptius, L'Hérit. ex DC. Syst. ii. 661 = **Enarthrocarpus** *pterocarpus*.
albiflorus, Presl, Fl. Sic. i. 109.—Sicilia.
albus, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 656 = **Raphanus** *Raphanistrum*.
amplexicaulis, Viv. Fl. Lib. Spec. 37 = **Brassica** *cyrenaica*.
arcuatus, Willd. Sp. Pl. iii. 562 = **Chorispora** *tenella*.

RAPHANUS :—

- articulatus*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 482 = **R. Raphanistrum**.
arvense, Wallr. ex Aschers. Fl. Brandenb. 65 = **R. Raphanistrum**.
Aucherii, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 45.—Syria; Persia.
biarticulatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 46.—China.
Blaisii, Godr. & Gren. in Godr. Migr. Vég. ed. II. 37; et in Mém. Acad. Stanislas, Sér. III. [xvii.] 1853 (1854) 361 = **Rapistrum** *Blaisii*.
caikiloides, DC. Syst. ii. 669 = **Erucaria** *Oliverii*.
caspicus, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 215 = **Goldbachia** *laevigata*.
caudatus, Linn. Mant. i. 95 = *sativus*.
cheiranthifolius, Willd. Hort. Berol. i. 19 = **Brassica** *Cheiranthos*.
chinensis, Mill. Gard. Dict. cd. VIII. n. 5 = *sativus*.
cornutus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 57 = **R. Raphanistrum**.
Erucaria, J. F. Gmel. Syst. 991 = **Brassica** *adpressa*.
Erucastrium, Crantz, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = **Brassica** *Erucastrium*.
erucoides, Linn. f. Suppl. 299 = **Brassica** *oleracea*.
fugax, Presl, Fl. Sic. i. 109.—Sicilia.
Gayanus, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 44 = *sativus*.
ibericus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 129 = **Chorispora** *iberica*.
infestus, Salisb. Prod. 273 = **R. Raphanistrum**.
laevigatus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 129 = **Goldbachia** *laevigata*.
lanceolatus, Willd. Sp. Pl. iii. 562 = **Brassica** *junceae*.
Landra, Moretti, ex DC. Syst. ii. 668.—Italia.
longistylus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 65, 133 = **R. Raphanistrum**.
lyratus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 119 = **Enarthrocarpus** *lyratus*.
maritimus, Sm. Engl. Bot. t. 1643.—Europ. occ.
microcarpus, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 750.—Hispan.
niger, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *sativus*.
odessanus, Spreng. Syst. ii. 855 = **R. Raphanistrum**.
oleifer, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = *sativus*.
orbicularis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *sativus*.
orientalis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = **Erysimum** *brachycarpum*.
pilosus, Willd. Sp. Pl. iii. 562 = **Wormskoldia** *heterophylla*.
pinnatus, Viv. Fl. Lib. Spec. 37. t. 16. f. 4 = **Rapistrum** *bipinnatum*.
primuloides, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 413 = **Raffenaldia** *primuloides*.
pterocarpus, Pers. Syn. ii. 209 = **Enarthrocarpus** *pterocarpus*.
pugioniformis, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 46.—Syria.
Radicula, Pers. Syn. ii. 208 = *sativus*.
Raphanistrum, Cav. Desc. 425 = **microcarpus**.
Raphanistrum, Linn. Sp. Pl. 669.—Europ.
recurvatus, Pers. Syn. ii. 209 = **Enarthrocarpus** *lyratus*.
rostratus, DC. Syst. ii. 666.—Reg. Casp.
rotundifolius, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 130 = **Erysimum** *brachycarpum*.
rotundus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *sativus*.
sativus, Linn. Sp. Pl. 669.—Europ.
segetum, Clavaud, in Act. Linn. Soc. Bord. xxxv. (1881) 288 = **R. Raphanistrum**.
sibiricus, Linn. Sp. Pl. 669 = **Chorispora** *sibirica*.
sinensis, Thunb. ex Pritz. Ic. Ind. ii. 239 = *sativus*?
strictus, Fisch. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 452 = **Diptychocarpus** *strictus*.
stylosus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 194 = **R. Raphanistrum**.
sylvestris, Lam. Fl. Fr. ii. 495 = **R. Raphanistrum**.
tataricus, Falk, Beitr. ii. 218. t. 13 = **Chorispora** *tenella*.
tauricus, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 62 = **Erysimum** *brachycarpum*.
tauricus, Hoffm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = **Sobolewska** *lithophila*.
tenellus, Pall. Reise, iii. 741 = **Chorispora** *tenella*.
turgidus, Pers. Syn. ii. 209 (= *Sinapis turgida*).—Aegypt.

RAPHELINGIA, Dum. Anal. Fam. 60 (1829) = **Ornithogalum**?, Tourn. (Liliac.).

RAPHIA, Beauv. Fl. Owar. i. 75 (1804). **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 935.

- METROXYLON**, Spreng. Gen. 283 (1830).
Gaertneri, G. Mann & H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 437.—Afr. trop.
Hookeri, G. Mann & H. Wendl. l. c. 438.—Afr. trop.
longiflora, G. Mann & H. Wendl. l. c.—Afr. trop.
lycosa, Comm. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 217 = **pedunculata**.
nicaraguensis, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 52, in obs. = *vinifera*.
pedunculata, Beauv. Fl. Owar. i. 78.—Madag.
polymita, Comm. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 217 = **pedunculata**.
Ruffia, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 217 = **pedunculata**.
taedigera, Mart. l. c. 216 = *vinifera*.
textilis, Welw. Apont. 584. n. 2.—Afr. trop.
vinifera, Beauv. Fl. Owar. i. 77.—Afr. trop.
Welwitschii, H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 439. t. 42.—Afr. trop.

RAPHIDIOCYSTIS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 828. **CUCURBITACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
brachypoda, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 113.—Madag.
Mannii, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 828.—Afr. trop.
Welwitschii, Hook. f. l. c.—Afr. trop.

RAPHIDOPHORA, Hassk. in Hov. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 168 = **RHAPHIDOPHORA**, Schott.

RAPHIDOPHYLLUM, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 666 = **Sopubia**, Buch.-Ham. (Scrophul.).
ramosum, Hochst. l. c. 668 = **S. ramosa**.
simplex, Hochst. l. c. 667 = **S. Dregeana**.

RAPHIDOSPORA, Reichb. Handb. 190 (1837) = **RHAPHIDOSPORA**, Nees = **Justicia**, Linn. (Acanth.).

RAPHIODON, Benth. in DC. Prod. xii. 96 (1848) = **RHAPHIODON**, Schau. = **Hyptis**, Jacq. (Labiata.).

RAPHIOLEPIS, Lindl. in Bot. Reg. t. 468 (1820). **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 627.

- OPA*, Lour. Fl. Cochinch. 308 (1790), partim.
RHAPHIOLEPIS, Poir. in Dict. Sc. Nat. xv. 314 (1827).
crataegoides, M. Roem. Syn. Rosif. 113 = *indica*.
indica, Lindl. in Bot. Reg. t. 468.—China.
integerrima, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 263 = *japonica*.
japonica, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 162.—Japon.
laevis, Lodd. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 602 = **Photinia** *laevis*.
latifolia, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 202, nomen (Quid?).—China.
Loureirii, Spreng. Syst. ii. 508 = *indica*?
Mertensii, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 164 = *japonica*.
ovata, Briot, in Rev. Hort. (1870-71) 348.—Japon.
Pheostemon, Lindl. Coll. Bot. sub t. 3 = *indica*.
pheostemonia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = *praec.*
rubra, Lindl. Coll. Bot. t. 3 = *indica*.
salicifolia, Lindl. l. c. sub t. 3 = *indica*.
Sieboldii, Hassk. in Hov. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 146 = *japonica*.
sinensis, M. Roem. Syn. Rosif. 114 = *indica*.
spiralis, G. Don, Gen. Syst. ii. 602 = *indica*.

RAPHIONACME, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 22. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 745.

- APOXYANTHERA**, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 18.
RHAPHIONACME, Walp. Rep. vi. 480 (1847).
ZUCHELLIA, Decne. in DC. Prod. viii. 492 (1844).
divaricata, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 23.—Afr. austr.
obovata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 1. 250.—Afr. austr.
pubescens, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 827.—Afr. austr.
purpurea, Harv. Thes. Cap. i. 41. t. 66.—Afr. austr.
Zeyheri, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 23.—Afr. austr.

RAPHIONE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 89 (1866) = **Allium**, Tourn. (Liliac.).
carinata, Salisb. l. c. = *A. carinatum*.
oleracea, Salisb. l. c. = *A. oleraceum*.
pallens, Salisb. l. c. = *A. paniculatum*.
paniculata, Salisb. l. c. = *A. paniculatum*.

RAPHIOSTYLES, Benth. & Hook. f. Gen. i. 351 (1862) = RHAPHIOSTYLIS, Planch. = **Apodytes**, E. Mey. (Olacin.).

RAPHIS, Beauv. Agrost. 120 (1812) = RHAPHIS, Lour. = **Chrysopogon**, Trin. (Gramin.).

RAPHISANTHE, Lilja, in Linnaea, xv. (1841) 263 = **Blumenbachia**, Schreb. (Loasac.).
lateritia, Lilja, l. c. = *Loasa lateritia*?

RAPHISTEMMA, Wall. Pl. As. Rar. ii. 50. t. 163 (1831). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 758.
ciliatum, Hook. f. Bot. Mag. t. 5704 = *Daemia extensa*.
Hooperianum, Decne. in DC. Prod. viii. 516.—Siam; Java.
pulchellum, Wall. Pl. As. Rar. ii. 50. t. 163.—Reg. Himal. ; Burma.

RAPINIA, Lour. Fl. Cochinch. 127 (1790) = **Sphenoclea**, Gaertn. (Campan.).
herbacea, Lour. l. c. = *S. zeylanica*.

RAPINIA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 243. **VERBENACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1152.
collina, Montr. l. c. = *N. Caled.*

RAPISTRELLA, Pomel, Mat. Fl. Atl. 11 (1860) = **Rapistrum**, Tourn. (Crucif.).
ramosissima, Pomel, l. c. = *Afr. bor.*

RAPISTRUM, Tourn. ex Medic. Phil. Bot. i. 190 (1789). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 99.
ARTHROLOBUS, Andr. ex DC. Syst. ii. 430 (1821).
CORDYLOCARPUS, Desf. Fl. Atlant. ii. 79. t. 152 (1800).
DIDESMUS, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 160. t. 25.
OTOCARPUS, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1847) 435.
RAPISTRELLA, Pomel, Mat. Fl. Atl. 11 (1860).
SCHRANKIA, Medic. Pflanzeng. 42 (1792).
SPHAERULARIA, Heist. Syst. 9 (1748).
aegyptiacum, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 74 = *Ochthodium aegyptiacum*.
aegyptium, Baill. Hist. Pl. iii. 197; *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 46.—*Afr. bor.*
arvense, All. Fl. Pedem. i. 258 = *Raphanus Raphanistrum*.
bipinnatum, *Coss. & Kral. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 395.—*Alger.*
Blaisii, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. III. ii. (1858) 404.—*Hab. ?*
bursaefolium, Berger. Phyt. iii. 165; ex DC. Syst. ii. 649 = *Calepina Corvini*.
Cakile, Berger. l. c. 163; ex DC. l. c. 429 = *Cakile maritima*.
clavatum, DC. l. c. 433 = *rugosum*.
confusum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 356 = *rugosum*.
conoideum, Pomel, l. c. 356.—*Alger.*
Cordyllocarpus, Pomel, l. c. = *Moricaria Cordyllocarpus*.
costatum, DC. Syst. ii. 434.—*Syria.*
diffusum, Crantz, Class. Crucif. 105 = *perenne*.
filiforme, Moench, Meth. Suppl. 69 = *Crambe filiformis*.
glabrum, Host, Fl. Austr. ii. 220.—*Austr.*
glandulosum, Berger. Phyt. iii. 163; ex DC. Syst. ii. 672 = *Bunias orientalis*.
hirsutum, Host, Fl. Austr. ii. 220 = *rugosum*.
hirtum, Host, l. c. = *rugosum*.
hispanicum, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 6 = *Linnaeanum*.
hispanicum, Medic. Pflanzeng. 19 = *Crambe hispanica*.
hispidum, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 416.—*Hab. ?*
hypogaeum, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 54 = *Morisia hypogaea*.
Linnaeanum, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 5.—*Europ. austr.*
maritimum, Berger. Phyt. iii. 173; ex DC. Syst. ii. 428 = *Cakile maritima*.

RAPISTRUM :—

microcarpum, Jord. ex Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 93 = *Linnaeanum*.
orientale, DC. Syst. ii. 443.—*Graecia.*
paniculatum, Gaertn. Fruct. ii. 285 = *Neslia paniculata*.
perenne, All. Fl. Pedem. i. 258.—*Europ.*
perfoliatum, Berger. Phyt. iii. t. 167; ex DC. Syst. ii. 575 = *Myagrum perfoliatum*.
Raphanistrum, Crantz, Class. Crucif. 107 = *Raphanus Raphanistrum*.
rugosum, All. Fl. Pedem. i. 257.—*Europ.*; *Oriens.*
scabrum, Moench, Meth. 211 = *Crambe hispanica*.
strictissimum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 356 = *rugosum*.
venosum, Nym. Consp. 29 = *Linnaeanum*.
virgatum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 357.—*Alger.*

RAPOLOCARPUS, Boj. Hort. Maur. 44 (1837) err. typ. = **Ropalocarpus**, Boj. (Tiliac.).

RAPOUREA, Reichb. Consp. 118 (1828), sphalm. = **Ropourea**, Aubl. (Verben. ?).

RAPUNCULUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 111 = **Campanula**, Tourn.
patulus, Fourr. l. c. = *C. patula*.
persicaefolius, Fourr. l. c. = *C. persicifolia*.
verus, Fourr. l. c. = *C. Rapunculus*.

RAPUNCULUS, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752) = **Phyteuma**, Linn. (Campan.).
comosus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *P. comosum*.
esculentus, Fl. Dan. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = *Campanula rotundifolia*.
hemisphaericus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *P. hemisphaericum*.
orbicularis, Mill. l. c. n. 5 = *P. orbiculare*.
pauciflorus, Mill. l. c. n. 4 = *P. pauciflorum*.
spicatus, Mill. l. c. n. 1 = *P. spicatum*.

RAPUNTIIUM, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VIII. (1768) = **Lobelia**, Linn. (Campan.).
acuminatum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 24 = *L. acuminata*.
acutangulum, Presl, l. c. 16 = *L. triquetra*.
affine, Presl, l. c. 13 = *L. affinis*.
affine, Presl, l. c. 25 = *L. Cliffortiana*.
alatum, Presl, l. c. 14 = *L. anceps*.
alsinoides, Presl, l. c. 22 = *L. alsinoides*.
amoenum, Presl, l. c. 23 = *L. amoena*.
amygdalinum, Presl, l. c. 27 = *L. amygdalina*.
anceps, Presl, l. c. 14 = *L. anceps*.
angulatum, Presl, l. c. 30 = *Pratia angulata*.
aquaticum, Presl, l. c. 21 = *L. aquatica*.
arabideum, Presl, l. c. 18 = *Laurentia arabidea*.
arenarioides, Presl, l. c. 17 = *L. trigona*.
bellidifolium, Presl, l. c. 15 = *L. Erinus*.
Besserianum, Presl, l. c. 28 = *L. polyphylla*.
bicolor, Presl, 17 = *L. Erinus*.
bifidum, Presl, l. c. 30 = *Laurentia Dregeana*.
blandum, Presl, l. c. 27 (= *Tupa blanda*).—*Chili.*
Boryanum, l. c. 24 = *L. serpens*.
bracteosum, Presl, l. c. 29 = *L. polyphylla*.
brevifolium, Presl, l. c. 23 = *L. brevifolia*.
Breyonii, Presl, l. c. 19 = *L. Breyonii*.
Bridgesii, Presl, l. c. 28 = *L. Bridgesii*.
Brownianum, Presl, l. c. 8 = *L. gibbosa*.
Burmannianum, Presl, l. c. 31 = *L. Burmanniana*.
caeruleum, Presl, l. c. 20 = *L. coronopifolia*.
caespitosum, Presl, l. c. 13 = *L. radicans*.
campanuloides, Presl, l. c. 14 = *L. radicans*.
camporum, Presl, l. c. 15 = *L. camporum*.
capillifolium, Presl, l. c. 19 = *L. capillifolia*.
capitatum, Presl, l. c. 11 = *L. lutea*.
cardinale, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *L. cardinalis*.
Cavanillesianum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 27 = *L. laxiflora*.
ceratophyllum, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 399 = *L. tomentosa*.
chamaedrifolium, Presl, Prod. Monog. Lobel. 21 = *L. chamaedrifolia*.
Chamaepitys, Presl, l. c. 20 = *L. tomentosa*.
cheiranthifolium, Presl, l. c. 18 = *L. serpens*.
chenopodifolium, Presl, l. c. 31 = *L. Cliffortiana*.
chinense, Presl, l. c. 13 = *L. chinensis*.

RAPUNTIIUM :—

cinereum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 30 = *Lightfootia albicaulis*.
circaeoides, Presl, l. c. 25 = *Lobelia circaeoides*.
cirsiiifolium, Presl, l. c. 27 = *L. cirsiiifolia*.
Claytonianum, Presl, l. c. 23 = *L. spicata*.
Cliffortianum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *L. Cliffortiana*.
coccineum, Moench, Meth. Suppl. 277 = *L. cardinalis*.
coeruleum, Auct. = *caeruleum*.
collinum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 23 = *L. collina*.
coloratum, Presl, l. c. 24 = *L. colorata*.
coloratum, Presl, l. c. 30 = *L. amoena*.
cordatum, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 285 = *L. Preslii*.
cordifolium, Moench, Meth. Suppl. 277 = *L. Cliffortiana*.
cordigerum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 26 = *L. cordigera*.
coronopifolium, Presl, l. c. 20 = *L. coronopifolia*.
corymbosum, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 287 = *L. corymbosa*.
cuneiforme, Presl, Prod. Monog. Lobel. 14 = *L. anceps*.
decurrens, Presl, l. c. 24 = *L. decurrens*.
dentatum, Presl, l. c. 21 = *L. dentata*.
Dortmanna, Presl, l. c. 18 = *L. Dortmanna*.
Dregeanum, Presl, l. c. 22 = *L. Dregeana*.
Ecklonianum, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 396 = *L. Eckloniana*.
ericoides, Presl, Prod. Monog. Lobel. 12 = *L. ericoides*.
erinoides, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *Laurentia repens*.
Erinus, Mill. l. c. n. 8 = *L. Erinus*.
euphrasioides, Presl, Prod. Monog. Lobel. 12 = *L. euphrasioides*.
exaltatum, Presl, l. c. 24 = *Haynaldia exaltata*.
excelsum, Presl, l. c. 29 = *L. salicifolia*.
fastigiatum, Presl, l. c. 15 = *L. fastigiata*.
fenestrale, Presl, l. c. 13 = *L. fenestralis*.
fervens, Presl, l. c. 30 = *L. fervens*.
filiforme, Presl, l. c. 18 = *L. serpens*.
flaccidum, Presl, l. c. 13 = *L. Erinus*.
flavum, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 394 = *L. flava*.
flexuosum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 16 = *L. natalensis*.
flexuosum, Presl, l. c. 23 = *L. flexuosa*.
fluviatilis, Presl, l. c. 30 = *Isotoma fluviatilis*.
foliosum, Presl, l. c. 24 = *L. decurrens*.
fulgens, Presl, l. c. 30 = *L. fulgens*.
genistoides, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 285 = *L. linearis*.
gibbosum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 13 = *L. gibbosa*.
glabrifolium, Presl, l. c. 12 = *L. leptocarpa*.
glandulosum, Presl, l. c. 21 = *L. glandulosa*.
gracile, Presl, l. c. = *L. gracilis*, *Andr.*
gramineum, Presl, l. c. 26 = *L. graminea*.
gruinum, Presl, l. c. 25 = *L. gruinum*.
Haenkeanum, Presl, l. c. 26 = *L. Haenkeana*.
heteromallum, Presl, l. c. 15 = *L. triquetra*.
heterophyllum, Presl, l. c. 13 = *L. heterophylla*.
hirsutum, Moench, Meth. 656 = *L. hirsuta*.
hirtum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *L. hirsuta*.
hyssopifolium, Presl, Prod. Monog. Lobel. 29 = *L. hyssopifolia*.
incisum, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 397 = *L. pubescens*.
inflatum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *L. inflata*.
inundatum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 30 = *Isotoma fluviatilis*.
irriguum, Presl, l. c. = *Pratia irrigua*.
Kalmii, Presl, l. c. 23 = *L. Kalmii*.
kamtschaticum, Presl, l. c. 24 = *L. sessilifolia*.
Kohautianum, Presl, l. c. 15 = *L. senegalensis*.
Kraussii, Presl, l. c. 27 = *L. Kraussii*.
Krebsianum, Presl, l. c. 15 = *L. Erinus*.
Kunthianum, Presl, l. c. 27 = *L. laxiflora*.
laciniatum, Presl, l. c. = *Siphocampylus Lamarckii*.
lasianthum, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 288 = *L. lasiantha*.
laxiflorum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 26 = *L. laxiflora*.
Leschenaultianum, Presl, l. c. 24 = *L. excelsa*.
linarioides, Presl, l. c. 22 = *L. linarioides*.
longiflorum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *Isotoma longiflora*.
longifolium, Presl, Prod. Monog. Lobel. 26 = *L. longifolia*.

RAPUNTIIUM:—

- Lucaeanum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 27 = *Lobelia Lucaeana*.
luteum, Presl, l. c. 11 = *L. lutca*.
maculare, Presl, l. c. 20 = *L. coronopifolia*.
membranaceum, Presl, l. c. 30 = *L. membranacea*.
Michauxii, Presl, l. c. 25 = *L. Cliffortiana*?
micranthum, Presl, l. c. = *L. micrantha*.
microdon, Presl, l. c. 15 = *L. Frinus*.
molle, Presl, l. c. 30 = *L. mollis*.
monticolum, Presl, l. c. 25 = *L. monticola*.
mucronatum, Presl, l. c. 25 = *L. mucronata*, Cav.
multicaule, Presl, l. c. 31 = *L. multicaule*.
Mundianum, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 395 = *L. leptocarpa*.
muscoides, Presl, Prod. Monog. Lobel. 22 = *L. muscoides*.
natum, Presl, l. c. = *L. nana*.
nicotianaeifolium, Presl, l. c. 24 = *L. nicotianaeifolia*.
nummularioides, Presl, l. c. 21 = *L. nummularioides*.
nummularium, Presl, l. c. 30 = *Pratia begonifolia*.
Nuttallianum, Presl, l. c. 23 = *L. Nuttallii*.
obovatum, Presl, l. c. 25 = *L. incana*.
Ottonianum, l. c. 14 = *L. Ottoniana*.
ovatum, Presl, l. c. 16 = *L. pubescens*.
ovatum, Presl, l. c. 29 (= *Tupa ovata*, G. Don).—Peruv.
paludosum, Presl, l. c. 18 = *L. paludosa*.
parvifolium, Presl, l. c. 31 = *L. parvifolium*.
patulum, Presl, l. c. 30 = *L. patula*.
paucidentatum, Presl, l. c. 20 = *L. tomentosa*.
pauciflorum, Presl, l. c. 15 = *L. pauciflora*.
pedunculare, Presl, l. c. 19 = *L. hirsuta*.
pedunculatum, Presl, l. c. 30 = *Pratia pedunculata*.
persicifolium, Presl, l. c. 27 = *L. persicaefolia*.
pinifolium, Presl, l. c. 19 = *L. pinifolia*.
platycaulum, Presl, l. c. 14 = *L. madagascariensis*.
Poeppigianum, Presl, l. c. 29 = *L. polyphylla*.
polyphyllum, Presl, l. c. 28 = *L. polyphylla*.
procumbens, Presl, l. c. 17 = *L. procumbens*.
pteropodium, Presl, l. c. 21 = *L. patula*.
puberulum, Presl, l. c. 23 = *L. puberula*.
pubescens, Presl, l. c. 17 = *P. pubescens*.
purpurascens, Presl, l. c. = *L. purpurascens*.
purpureum, Presl, l. c. 29 = *L. purpurea*, Lindl.
pusillum, Presl, l. c. 22 = *L. pusilla*.
pygmaeum, Presl, l. c. 22 = *Laurentia micrantha*.
pyramidale, Presl, l. c. 23 = *L. pyramidalis*.
quadrangulare, Presl, l. c. 16 = *L. quadrangularis*.
racemosum, Presl, l. c. 25 = *L. racemosa*, Sims.
radicans, Presl, l. c. 14 = *L. radicans*.
rapunculooides, Presl, l. c. 23 = *L. rapunculooides*.
Reinwardtianum, Presl, l. c. 14 = *L. trigona*.
reniforme, Presl, l. c. 15 = *L. reniformis*.
Richardianum, Presl, l. c. 27 = *L. decumbens*.
rigidulum, Presl, l. c. 26 = *L. laxiflora*.
roseum, Presl, l. c. 24 = *L. rosea*.
rugulosum, Presl, l. c. 30 = *Pratia angulata*.
rupestre, Presl, l. c. 15 = *L. rupestris*.
scabripes, Presl, l. c. 17 = *L. Erinus*.
secundum, Presl, l. c. 29 = *L. secunda*.
serpens, Presl, l. c. 15 = *L. serpens*.
serrulatum, Presl, l. c. 14 = *L. urens*.
setaceum, Presl, l. c. 19 = *L. setacea*.
simplex, Presl, l. c. 17 = *L. debilis*.
simplicicaule, Presl, l. c. 30 = *L. gibbosa*.
Simsii, Presl, l. c. 20 = *L. Simsii*.
siphiliticum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *L. siphilitica*.
sonchifolium, Presl, Prod. Monog. Lobel. 27 = *L. sonchifolia*.
spartioides, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 395 = *L. spartioides*.
speciosum, Presl, Prod. Monog. Lobel. 19 = *L. syphilitica*.
spicatum, Presl, l. c. 31 = *L. spicata*, Ruiz & Pav.
splendens, Presl, l. c. 26 = *L. fulgens*.
strictum, Presl, l. c. 27 = *L. stricta*.
subdentatum, Presl, l. c. 28 = *L. polyphylla*.
subtile, Presl, l. c. 25 = *L. trigona*.
succulentum, Presl, l. c. 13 = *L. succulenta*.
syphiliticum, Moench, Meth. 655 = *L. syphilitica*.
telephoides, Presl, Prod. Monog. Lobel. 18 = *L. serpens*.
tenerum, Presl, l. c. 15 = *L. tenera*.
tenuifolium, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 395 = *L. ericetorum*.
tenuius, Presl, Prod. Monog. Lobel. 30 = *L. tenuior*.
thapsodeum, Presl, l. c. 24 = *Haynaldia thapsodea*.
thermale, Presl, l. c. 12 = *L. leptocarpa*.

RAPUNTIIUM:—

- Thunbergii*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 20 = *Lobelia coronopifolia*.
tomentosum, Presl, l. c. 19 = *L. tomentosa*.
trialatum, Presl, l. c. 13 = *L. trigona*.
triquetrum, Presl, l. c. 16 = *L. triquetra*.
Tupa, Presl, l. c. 28 = *L. Tupa*.
umbellatum, Presl, l. c. 31 = *L. umbellata*.
uranocomum, Presl, l. c. 24 = *Haynaldia uranocoma*.
urens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *L. urens*.
variifolium, Presl, Prod. Monog. Lobel. 12 = *L. variifolia*.
veronicaefolium, Presl, l. c. 23 = *L. veronicaefolia*.
Wallichianum, Presl, l. c. 24 = *L. pyramidalis*.
xalapense, Presl, l. c. 25 = *L. Cliffortiana*.
zeylanicum, Presl, l. c. 13 = *L. zeylanica*.

RAPUTIA, Aubl. Pl. Gui. ii. 670. t. 272 (1775).

- RUTACEAE*, [Benth. & Hook. f. i. 285].
PHOLIDANDRA, Neck. Elem. i. 348 (1790).
SCIURIS, Schreb. Gen. 24 (1789).
alba, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 102.—Bras.
aromatica, Aubl. Pl. Gui. ii. 671. t. 272.—Guian.
Conchocarpus, Schult. Mant. i. 126 = *Cusparia macrophylla*.
heterophylla, DC. in Mém. Mus. Par. ix. (1822) 153.—Porto Rico.
magnifica, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 102.—Bras.
Ossana, Engl. l. c. 104.—Cuba.
trifoliata, Engl. l. c. 103.—Bras.

RARAM, Adans. Fam. ii. 35 (1763) = *Cenehrus*, Linn. (Gramin.).RASPAILIA, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 238. t. 40 (1830) = *Polypogon*, Desf. (Gramin.).

- agrostoides*, J. & C. Presl, l. c. 239 = *P. elongatus*.
RASPALIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 377. t. 37. *BRUNACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 672.
angulata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 215 = *Erica modesta*.
aspera, E. Mey. l. c., nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 321.—Afr. austr.
capitella, Presl, Bot. Bemerk. 39 = *Brunia staavioides*.
microphylla, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 378.—Afr. austr.
passerinoides, Presl, Bot. Bemerk. 39.—Afr. austr.
phylicoides, Presl, l. c.—Afr. austr.
struthioloides, Presl, l. c. 40.—Afr. austr.
teres, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 215 = *microphylla*.
villosa, Presl, Bot. Bemerk. 39 = *Brunia villosa*.

RASSIA, Neck. Elem. ii. 12 (1790) = *Gentiana*, Linn.RATABIDA, Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 665 (1839), sphalm. = *RATIBIDA*, Rafin. = *Lepachys*, Rafin. (Compos.).RATHEA, Karst. Fl. Columb. i. 77. t. 38 (1859?) = *Tacsonia*, Juss. (Passif.).

- floribunda*, Karst. l. c. = *T. floribunda*.
RATHEA, Karst. in C. Koch & Fint. Wochenschr. i. (1858) 377 = *Synechanthus*, H. Wendl. (Palm.).
fibrosa, Karst. l. c. = *S. fibrosus*.

RATHKEA, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 355 (1827) = *Ormocarpum*, Beauv. (Legumin.).

- glabra*, Schum. & Thonn. l. c. = *O. sennoides*.
pubescens, Walp. Ann. i. 1105 = *O. bibracteatum*.
RATIBIDA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 = *Lepachys*, Rafin. (Compos.).
columnaris, Rafin. l. c.; D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 361 = *L. columnaris*.
pulcherrima, Steud. Nom. ed. II. ii. 439 = *L. columnaris*.
sulcata, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 100 = *L. columnaris*.

RATONIA, DC. Prod. i. 618 (1824). *SAPIN-DACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 399.

- ARYTERA*, Blume, Rumphia, iii. 170 (1847).
EPHIELIS, Schreb. Gen. 253 (1789).
ERNSTINGIA, Scop. Introd. 322 (1777).
GELONTUM, Gaertn. Fruct. ii. 271. t. 139 (1791).

RATONIA:—

- LACHNOPETALUM*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 571.
LEPIDOPETALUM, Blume, Rumphia, iii. 171 (1847).
MATAYBA, Aubl. Pl. Gui. i. 331. t. 128 (1775), nomen prius.
MISCHOCARPUS, Blume, Bijdr. 238 (1825); Rumphia, iii. 166 (1847).
PEDICELLIA, Lour. Fl. Cochinch. 655 (1790).
SARCOTOECHIA, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 501, 659.
TINA, Roem. & Schult. Syst. v. 414 (1819).
ZYGOLEPIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 574.
Alphandi, F. Muell. Fragm. iv. 158 = *Castanospora Alphandi*.
anodonta, Benth. & Hook. f. Gen. i. 400; Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.
apetala, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 126.—Ind. occ.
apetala, Seem. Fl. Vit. 47 = *Elattostachys apetala*.
Cordierii, F. Muell. Fragm. ix. 93 = *Synima Cordierii*.
Daemelianana, F. Muell. l. c. 96 = *Toechima Daemelianana*.
diphylostegia, F. Muell. l. c. v. 145 = *Diploglottis Cunninghamii*.
distylis, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 462.—Austral.
domingensis, DC. Prod. i. 618.—Ins. S. Doming.
exangulata, F. Muell. Fragm. iv. 156.—Austral.
falcata, Seem. Fl. Vit. 47.—Ins. Fiji.
grandissima, F. Muell. Fragm. iv. 156.—Austral.
Hornei, Seem. Fl. Vit. 47.—N. Caled.
lachnocarpa, F. Muell. Fragm. iv. 157.—Austral.
lachnopetala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 586.—Ins. Philipp.
Lessertiana, Benth. & Hook. f. Gen. i. 400 = *Cupania Lessertiana*.
Martyana, F. Muell. Fragm. v. 6 = *Sarcopteryx Martyana*.
O'Shanesiana, F. Muell. Fragm. ix. 96.—Austral.
pyriformis, Benth. & Hook. f. Gen. i. 400; Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.
spatulata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 45.—Cuba.
stipitata, Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.
Storckii, Seem. Fl. Vit. 47 = *Cupaniopsis Storckii*.
tenax, Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.
Zygolepis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 586.—Ins. Philipp.
RATOPITYS, Carr. Conif. ed. II. 227 (1867) = *RAXO-PITYS*, Nelson = *Cunninghamia*, R. Br. (Conif.).
RATZEBURGIA, Kunth, Rév. Gram. ii. 487. t. 158 (1830). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1130.
AIKINIA, Wall. Pl. As. Rar. iii. 46. t. 273 (1832).
pulcherrima, Kunth, Rév. Gram. ii. 487.—Ind. or.
Schimperi, Steud. Nom. ed. II. ii. 439 = *Elionurus Royleanus*.
RAUIA, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 151, 167. *RUTACEAE*, [Benth. & Hook. f. i. 285].
racemosa, Nees & Mart. l. c. 169 = *Cusparia Fontanesiana*.
resinosa, Nees & Mart. l. c.—Bras.
RAUKANA, Seem. in Journ. Bot. iv. (1866) 352 = *Panax*, Linn. (Araliac.).
Edgerleyi, Seem. l. c. = *P. Edgerleyi*.
RAUVOLFIA, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 62 (1737) = *Rauwolfia*, Plum. (Apocyn.).
RAUWENHOFFIA, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 21. *ANONACEAE*.
siamensis, Scheff. l. c. 23.—Siam.
uvarioides, Scheff. l. c.—Ins. Arn.
RAUWOLFIA, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 62 (1737) (*Rauwolfia*). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 697.
CYRTOSIPHONIA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 401 (1856).
DISSOLAENA, Lour. Fl. Cochinch. 137 (1790).
HEURCKIA, Muell. Arg. in Flora, liii. (1870) 168.
OPHIOXYLON, Linn. Fl. Zeyl. 239 (1747).
affinis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 34.—Bras.
Alphonsiana, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 394.—Ind. occ.

RAUWOLFIA :—

- amsoniaefolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 338.—Ins. Philipp.
angustifolia, Salisb. *Prod.* 146 = nitida.
 bahiensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 339.—Bras.
 Beddomei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 634.—Ind. or.
 bauriculata, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxx. (1859–60) 396.—Ind. occ.
 Blanchetii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 340.—Bras.
 brasiliensis, *Spreng. Syst.* i. 834.—Bras.
 caffra, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 77.—Afr. austr.
 canescens, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 303.—Ind. occ.
 cubana, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 339.—Cuba.
 decurva, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 633.—Ind. or.
 densiflora, *Benth. ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
 glabra, *Cav. Ic.* iii. 50 = *Vallesia dichotoma*.
 grandiflora, *Mart. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 341.—Bras.
 heterophylla, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 805.—Am. austr.
 hirsuta, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 14 = canescens.
 laevigata, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 805 = *Malouetia jasminoides*.
 Lamarkii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 337.—Am. trop.
 lanceolata, *A. DC. l. c.*—Porto Rico.
 lanceolata, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 408, in syn. = *Lamarkii*.
 latifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 339 = *Lamarkii*.
 ligustrina, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 805 = *ternifolia*.
 longifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 338.—Mexic.
 lycioides, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* v. (1802) 69.—Hab.?
 micrantha, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 633.—Ind. or.
 microcarpa, *Hook. f. l. c.*—Burma.
 Moricandii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 340.—Bras.
 natalensis, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 78.—Afr. austr.
 nitida, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 14; *Select. Am.* 47.—Ind. occ.
 nitida, *Lam. Illustr.* ii. 304 = *Lamarkii*.
 nitidissima, *Steud. Nom. ed. I.* 682 = nitida.
 obtusiflora, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 341.—Ins. Nossibé.
 odontophora, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 150.—Ecuador.
 oppositifolia, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 33 = *Tabernaemontana Berterii*?
 parvifolia, *Bert. ex Spreng. Syst.* i. 834 = *ternifolia*.
 panicifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 340.—Bras.
 peguana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 632.—Burma.
 polyphylla, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 241.—Guian.
 psychotrioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 231.—Am. austr.
 Pulparia, *Roxb. ex Sm. in Rees, Cycl.* xxix. n. 5.—Hort. Calcutt.
 reflexa, *Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1855) 405.—Java.
 salicifolia, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1863) 519.—Cuba.
 sandwicensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 339.—Ins. Sandvic.
 Sellowii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 33.—Bras.
 Senegambiae, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 340.—Afr. trop.
 serpentina, *Benth. ex Kurz, For. Fl. Brit. Burma*, ii. 171.—Ind. or.; Java.
 Sprucei, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 34.—Bras.
 strempelioides, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 170.—Cuba.
 striata, *Poir. Encyc.* vi. 83 = *Ochrosia borbonica*.
 subpubescens, *Linn. Mant.* ii. 345 = canescens.
 sumatrana, *Jack, in Malay. Misc.* i. (1820) v. 22.—Sumatra.
 ternifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 232.—Am. trop.
 tetraphylla, *Linn. Sp. Pl.* 208 = nitida, canescens.
 tomentosa, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 14 = canescens.
 viridis, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 805 = *psychotrioides*.
 vomitoria, *Afzel. Stirp. Guin. Med. Sp. Nov.* 1.—Afr. trop.
 Weddeliana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 32.—Bras.

- RAUWOLFIA, Ruiz & Pav. *Fl. Per. et Chil.* ii. 26. t. 152 (1799) = *Citharexylum*, Mill. (Verben.).
dentata, Tafalla, ex D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.–Mar. 1831) 237 = *C. dentatum*.
flexuosa, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 16 = *C. spinosum*.
macrophylla, Ruiz & Pav. l. c. = *C. spinosum*.
pubescens, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 805 = *C. molle*.
spinosa, Cav. *Ic.* vi. 16.—Peruv.

- RAVENALA**, Adans. *Fam.* ii. 67 (1763). *SCITAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 656.
 PHENAKOSPERUM, Endl. *Prod. Fl. Norf.* 35, in nota (1833).
 URANIA, Schreb. *Gen.* 212 (1789).
 guyanensis, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 439.—Guian.
 madagascariensis, *J. F. Gmel. Syst.* 567; *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 656; *Lam. Illustr.* ii. 371.—Madag.

- RAVENEA, H. Wendl. ex Bouché, in *Monatschr. Ver. Beoord. Gartenb.* (1878) 197, 323, 324. Gen. dub.
 PALMARUM.—Cf. Benth. & Hook. f. iii. 883.
 Hildebrandti, H. Wendl. ex Bouché, l. c.—Ins. Comor.

- RAVENIA, Benth. & Hook. f. *Gen.* iii. 883 (1883), sphalm. = praec.

- RAVENIA**, Vell. *Fl. Flum.* 20 (1825); i. t. 49 (1827). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 286.
 LEMONIA, Lindl. *Bot. Reg.* (1840) t. 59.
 infelix, *Vell. Fl. Flum.* 21; i. t. 49.—Bras.
 spectabilis, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 126.—Cuba; Bras.

- RAVENSARA**, Sonner. *Voy. Ind. Or.* iii. 248. t. 127 (1782). *LAURINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 151.
 AGATHOPHYLLUM, Juss. *Gen.* 431 (1789).
 EVODIA, Gaertn. *Fruct.* ii. 100 [t. 103] (1791).
 acuminata, *Baill. Adansonia*, ix. (1868–70) 303.—Madag.
 aromatica, *J. F. Gmel. Syst.* 754.—Madag.
 floribunda, *Baill. Adansonia*, ix. (1868–70) 304.—Madag.
 Lastellii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 447.—Madag.
 retusa, *Baill. Adansonia*, ix. (1868–70) 303.—Madag.
 Topak, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 448.—Madag.

- RAVIA, Schult. *Addit.* ii, ad *Mant.* ii. 215, in syn. (1824), err. typ. = *Rauia*, Nees & Mart. (*Rutac.*).

- RAVNIA**, Oerst. in Kjoeb. *Vidensk. Meddel.* (1852) 49 (Centr. Am. Rub.). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 40.
 triflora, *Oerst. l. c.* 50.—Costa Rica.

- RAWSONIA**, Harv. & Sond. *Fl. Cap.* i. 67 (1859). *BIXINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 127.
 lucida, *Harv. & Sond. l. c.*—Afr. austr.

- RAXAMARIS, Rafin. *Fl. Tellur.* iii. 54 (1836) = *Ornithogalum*, Tourn. (*Liliac.*).
 parviflora, *Rafin. l. c.* 55 = *O. exscapum*.

- RAXOPITYS, [Nelson], *Senilis*, Pinaceae, 97 (1866) = *Cunninghamia*, R. Br. (*Conif.*).
 Cunninghamii, [Nelson], l. c. = *C. sinensis*.

- RAYANIA, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 185 (1856) = *RAJANIA*, Walt. = *Brunnichia*, Banks (*Polygon.*).

- RAYERIA, Gaudich. *Bot. Voy. Bonite*, t. 108 (1844–52) = *Alona*, Lindl. (*Convolv.*).
 teretifolia, Gaudich. l. c.—Hab. ?

- RAZISEA**, Oerst. in Kjoeb. *Vidensk. Meddel.* (1854) 142. *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1106.
 spicata, *Oerst. l. c.*—Costa Rica.

- RAZOUMOWSKIA, Hoffm. *Hort. Mosq.* (1808); ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* iii. 629 (1819) = *Arceuthobium*, Bieb. (*Loranth.*).
capensis, Hoffm. l. c.; ex J. S. Presl, *Rostlin.* ii. 28 = *Viscum capense*.
caucasica, Hoffm. l. c. *Introd.* n. 1. f. 1; ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* iii. 629 = *A. Oxycedri*.
jamaicensis, Hoffm. l. c.; ex J. S. Presl, *Rostlin.* ii. 28 = *Dendrophthora opuntoides*.
mexicana, Hoffm. l. c.; ex J. S. Presl, l. c. = *A. vaginatum*.
Oxycedri, F. Schultz, ex Nym. *Consp.* 320 = *A. Oxycedri*.

- RAZUMOVIA, Spreng. ex Juss. in *Dict. Sc. Nat.* xlv. 526 (1826) = *Humea*, Sm. (*Compos.*).
 paniculata, Spreng. ex *DC. Prod.* vi. 158 = *H. elegans*.

- RAZUMOVIA, Spreng. *Fl. Hal. Mant.* 45 (1807) = *Centranthera*, R. Br. (*Scrophul.*).
 tranquebarica, Spreng. l. c. = *C. humifusa*.

- REA, Bert. ex Decne. in *Guill. Arch. Bot.* i. (1833) 513. tt. 9, 10 = *Dendroseris*, D. Don (*Compos.*).
 Berteriana, Decne. l. c. 515 = *D. Berteriana*.
 lacerata, Phil. in *Bot. Zeit.* xxviii. (1870) 499 = *D. lacerata*.
 leucantha, Bert. ex *DC. Prod.* vii. 243 = *D. neriifolia*.
 macrantha, Bert. ex Decne. in *Guill. Arch. Bot.* i. (1833) 514. t. 9 = *D. macrophylla*.
 marginata, Bert. ex Decne. l. c. 518. t. 9 = *D. macrophylla*.
 micrantha, Bert. ex Decne. l. c. 517 = *D. micrantha*.
 mollis, Bert. ex Decne. l. c. 519 = *D. micrantha*.
 neriifolia, Decne. l. c. 517 = *D. neriifolia*.
 pinnata, Bert. ex Decne. l. c. 516 = *D. Berteriana*.

- REANA, Brign. *Ind. Sem. Hort. Moden.* (1849).—Cf. *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xii. (1849) 365 = *Euchlaena*, Schrad. (*Gramin.*).
 Giovannini, Brign. *Il. cc.* = *E. mexicana*.
 luxurians, Dnr. in *Bull. Soc. Acclim. Sér. II.* ix. (1872) 581 = *E. mexicana*.
 luxurians, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1875) II. 174; (1876) I. 566 = *Tripsacum dactyloides*.

- REAUMUREA, Steud. *Nom. ed. I.* 682 (1821) = seq.

- REAUMURIA**, Linn. *Syst. ed. X.* 1081 (1759). *TAMARISCINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 161.
 EICHWALDIA, Ledeb. in *Eichw. Pl. Casp.* 38. t. 34 (1831).
 Billardieri, *Faub. & Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* viii. (1847) 381.—Syria.
 cistoides, Adam, in *Weber & Mohr, Beitr.* i. 61 = *hypericoides*.
 filifolia, *Faub. & Spach, Illustr.* iii. 54, 58.—Persia.
 floribunda, *Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov.* 118.—Hab.?
 Floyeri, S. Moore, in *Journ. Bot.* xv. (1877) 289.—Beluchist.
 fruticosa, *Boiss. Fl. Orient.* i. 759.—Persia.
 hirtella, *Faub. & Spach, Illustr.* iii. 54, 55.—Egypt.; Arab.
 hypericoides, *Willd. Sp. Pl.* ii. 1250.—Reg. Caucas.; Persia.
 hyrcanica, *Jaub. & Spach, Illustr.* iii. 55, 60 = *hypericoides*.
 kashgarica, *Rupr. Sert. Tiansch.* 42.—Turkestan.
 linifolia, *Salisb. Parad. Lond.* t. 18 = *hypericoides*.
 mucronata, *Faub. & Spach, Illustr.* iii. 54, 57.—Egypt.
 oxiana, *Boiss. Fl. Orient.* i. 759.—Reg. Casp.; Persia.
 palaestina, *Boiss. Diagn. Ser. I.* x. 10.—Palaestin.
 persica, *Boiss. Fl. Orient.* i. 761 = *filifolia*.
 squarrosa, *Faub. & Spach, Illustr.* iii. 59.—Persia; Afghan.
 stenophylla, *Jaub. & Spach, l. c.* 54 = *mucronata*.
 Stocksii, *Boiss. Fl. Orient.* i. 761.—Beluchist.
 tatarica, *Jaub. & Spach, Illustr.* iii. 55 = *hypericoides*.
 trigyna, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 425.—Mongol.
 vermiculata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 17 = *hypericoides*.
 vermiculata, *Linn. Syst. ed. X.* 1081.—Ital.; Afr. bor.
 vermiculata, *Linn. l. c.*, partim = *hirtella*.

REBENTISCHIA, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 104 = **Trisetum**, Pers. (Gramin.).
flavescens, Opiz, l. c. = *T. flavescens*.

REBIS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 26 = **Ribes**, Linn. (Saxifr.).
alpinoides, Steud. Nom. ed. II. ii. 439 = *Ribes alpinoides*.
discolor, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 28 = *Ribes albifolium*.
ebrectolata, Spach, l. c. 31 = *Ribes alpinoides*.
frigida, Spach, l. c. 29 = *Ribes hirtum*.
Gayana, Spach, l. c. = *Ribes Gayanum*.
macrobotrys, Spach, l. c. 27 = *Ribes macrobotrys*.
punctata, Spach, l. c. 30 = *Ribes punctata*.

REBOUDIA, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 704 = **Erucaria**, Gaertn. (Crucif.).
erucarioides, Coss. & Kralik, l. c. 705 = *E. erucarioides*.

REBOULEA, Kunth, Rév. Gram. 341. t. 84 (1830) = **Eatonia**, Rafin. (Gramin.).
gracilis, Kunth, l. c. = *E. obtusata*.
obtusata, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 591 = *E. obtusata*.
peninsylvanica, A. Gray, l. c. = *E. purpurascens*.
truncata, Torr. ex Munro, in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 43 = *E. obtusata*.

RECCHIA, Moç. & Sesse, ex DC. Syst. i. 411 (1818) = **Rigiostachys**, Planch. (Simarub.).
maxicana, Moç. & Sesse, l. c. = *Rigiostachys bracteata*.

RECEVEURA, Vell. Fl. Flum. 237 (1825); v. tt. 119, 120 (1827) = **Hypericum**, Linn.
cordata, Vell. Fl. Flum. 237; v. t. 119.—Bras.
graveolens, Vell. l. c. 237; v. t. 120 = *H. brasiliense*.

RECHSTEINERIA, Regel, in Flora, xxi. (1848) 247 = **Gesneria**, Linn.
allagophylla, Regel, l. c. = *G. allagophylla*.
spicata, Kumm. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 357 = *G. tribracteata*.
stricta, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 214. t. 1. f. 19 = *G. stricta*.
tribracteata, Klotzsch, ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 356 = *G. tribracteata*.

RECTOMITRA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 6 (1849) = **Kibessia**, DC. (Melastom.).
cordata, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 153 = *K. cordata*.
galeata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 6.—Borneo.
tuberculata, Blume, l. c. 7 = *K. tuberculata*.

REDIA, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 51 (1842) = **Cleidion**, Blume (Euphorb.).
triccoca, Casar. l. c. 52 = *C. tricocum*.

REDOUTEA, Vent. Jard. Cels, t. 11 (1800) = **Fugosia**, Juss. (Malvac.).
heterophylla, Vent. l. c. = *F. heterophylla*.
tripartita, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 293 = *F. tripartita*.

REDOWSKIA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 33. t. 2. **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 92.
sophiaefolia, Cham. & Schlecht. l. c.—As. bor.

REDUTEA, Pers. Syn. ii. 254 (1807) = **REDOUTEA**, Vent. = **Fugosia**, Juss. (Malvac.).

REEDIA, F. Muell. Fragm. i. 239. t. 10 (1859). **CYPERACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1067.
spathacea, F. Muell. l. c. i. 240. t. 10; ii. 182.—Austral.

REEVESIA, Lindl. in Brande, Journ. [II. ii.] (1827) 109, 112; Bot. Reg. t. 1236 (1829). **STERCULIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 219.
pubescens, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 364.—Reg. Himal.
thyrsoides, Lindl. in Brande, Journ. [II. ii.] (1827) 112; Bot. Reg. t. 1236.—China.
Wallichii, R. Br. in Benth. Pl. Fav. Rar. 231, in adnot.—Reg. Himal.

REGELIA, Hort. ex H. Wendl. in Illustr. Hort. xii. (1865) Misc. 6 = **Verschaffeltia**, H. Wendl. (Palm.).
magnifica, Hort. ex H. Wendl. l. c. = *V. splendida*.
majestica, Hort. ex Gard. Chron. (1865) 292 = *V. splendida*.
Princeps, Hort. ex Balf. f. in Baker, Fl. Maurit. 388 = *V. splendida*.

REGELIA, Lem. Illustr. Hort. vii. (1860) sub t. 245, in nota = **Karatas**, Adans. (Bromel.).
caeruleum, Lem. l. c. (= *Nidularium caeruleum*).—Hab.?
cruentum, Lem. l. c. = *K. cruenta*.
Innocentii, Lem. l. c. = *K. Innocentii*.
Meyendorffii, Lem. l. c. = *K. Carolinae*.

REGELIA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 243. **MYRTACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 706.
adpressa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 25 = *Beaufortia micrantha*.
ciliata, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 244.—Austral.
gibbosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 168 = inops.
globosa, Benth. Fl. Austral. iii. 171, sphalm. = praec.
grandiflora, Benth. l. c. 170.—Austral.
inops, Schau. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 224.—Austral.

REGIA, Loud. ex C. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 136 (1864) = **Juglans**, Linn.
maxima, Loud. l. c. = *J. regia*.

REGMUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 328 (1867) = **Circaea**, Tourn. (Onagrar.).
alpinus, Dulac, l. c. = *C. alpina*.
lutetianus, Dulac, l. c. = *C. lutetiana*.

REGNOLDIA, Baill. Adansonia, i. (1860–61) 187 = **Chaetocarpus**, Thw. (Euphorb.).
cluytioides, Baill. l. c. 188 = *C. castanocarpus*.

REGNELLIA, Rodrig. Orch. Nov. i. 81 (1877) = **ORCHIDEAE**.
purpurea, Rodrig. l. c. 79.—Bras.

REHMANNIA, Libosch. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 36 (1835). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 960.
SPARMANNIA, Buchhoz, Pl. Nouv. Découv. t. 1 (1779), nomen prius.
chinensis, Libosch. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 36.—China.
glutinosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 440 = *chinensis*.
lutea, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 538.—Japon.
Piasezkii, Maxim. l. c. xxvi. (1880) 502.—China.

REICHARDIA, Dennst. Schlusss. Hort. Malab. 32 (1818) = **Tabernaemontana**, Linn. (Apocyn.).
grandiflora, Dennst. l. c.—Ind. or.
jasmynoides, Dennst. l. c.—Ind. or.

REICHARDIA, Roth, Bot. Abh. 35 (1787) = **Picridium**, Desf. (1799) (Compos.).
integrifolia, Moench, Meth. 546 = *P. vulgare*.
picroides, Roth, Bot. Abh. 35 = *P. vulgare*.
runcinata, Moench, Meth. 546 = *P. tingitanum*.
tingitana, Roth, Bot. Abh. 35 = *P. tingitanum*.

REICHARDIA, Roth, Catalect. ii. 64 (1800) = **Maurandia**, Orteg. (Scrophul.).
scandens, Roth, l. c. 65 = *M. semperflorens*.

REICHARDIA, Roth, Nov. Pl. Sp. 210 (1821) = **Pterolobium**, R. Br. (Legumin.).
decapetala, Roth, l. c. 212 = *Caesalpinia sepiaria*.
decapetala, Wight, ex Steud. Nom. cd. II. ii. 440 = *P. lacerans*.
hexapetala, Roth, Nov. Pl. Sp. 210 = *P. indicum*.
pentapetala, Blanco, Fl. Filip. cd. II. 233 = *P. indicum*.

REICHELEA, A. W. Benn. in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 271, sphalm. = seq.

REICHELIA, Schreb. Gen. 200 (1789) = **Hydrolea**, Linn. (Hydroph.).
angustifolia, J. F. Gmel. Syst. 1613, sphalm. = *Phyllanthus angustifolius*.

REICHELIA:—

guianensis, Spreng. Syst. i. 940 = *Hydrolea caroliniana*.
montevidensis, Spreng. l. c. = *H. montevidensis*.
palustris, Bilb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 141 = *H. spinosa*.
palustris, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 220 = *Sphenoclea zeylanica*.
palustris, J. F. Gmel. Syst. 499 = *H. caroliniana*.

REICHEMBACHANTHUS, Rodrig. Orch. Nov. ii. 164 (1881). **ORCHIDEAE**.
modestus, Rodrig. l. c. 165.—Bras.

REICHENBACHIA, Spreng. in Bull. Soc. Philom. (1823) 54. t. 1. **NYCTAGINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 8.
caniflora, Mart. in Flora, xx. (1837) ii. Beibl. 90 = *Leucaster caniflorus*.
hirsuta, Spreng. in Bull. Soc. Philom. (1823) 54. t. 1.—Bras.

REICHENHEIMIA, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 54. t. 4A = **Begonia**, Tourn.
Stelzneri, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiv. (1856) 204.—Hab.?
subpeltata, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 55 = *B. subpeltata*.
Thwaitesii, Klotzsch, l. c. = *B. tenera*.
zeylanica, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiv. (1856) 204 = *B. zeylanica* (in Addend.).

REICHERTIA, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 397 = **Schultesia**, Mart. (Gentian.).
gracilis, Karst. Fl. Columb. i. 60, in obs. = *S. gracilis*?
linarifolia, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 397; Fl. Columb. i. 59 = *S. stenophylla*.
rosea, Karst. ll. cc. = *S. stenophylla*.

REIDIA, Wight, Ic. v. 27. tt. 1903, 1904 (1852) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).
fimbriata, Wight, l. c. t. 1904 = *P. fimbriatus*.
floribunda, Wight, l. c. t. 1903 = *P. Wightianus*.
glabrescens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 374 = *P. glabrescens*.
glaucescens, Miq. l. c. = *P. pulcher*.
gracilipes, Miq. l. c. = *P. gracilipes*.
gracilis, Miq. l. c. 373 = *P. gracilis*.
latifolia, Wight, Ic. t. 1904 = *P. macrocalyx*.
ovalifolia, Wight, l. c. = *P. longiflorus*?
polyphylla, Wight, l. c. = *P. anabaptizatus*.
singalensis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 449 = *P. singalensis*.

REIFFERSCHIEDIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 74. t. 62 (1836). **DILLENIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 13.
speciosa, Presl, l. c.—Am. austr.

REIFFERSCHIEDIA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 413 (1839), sphalm. = praec.

REIGERA, Opiz, Seznam, 83 (1852) = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).
maritima, Opiz, l. c. = *S. maritimus*.

REILIA, Stend. Syn. Pl. Cyp. 311 (1855) = **Eryngium**?, Tourn. (Umbell.).—Cf. Benth. & Hook. iii. 863.
eryngioides, Steud. l. c.—Reg. Argent.

REIMARIA, Fluegge, Gram. Monog. 213 (1810), partim. **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1097.
aberrans, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. ii. 38.—Am. trop.
acuta, Fluegge, Gram. Monog. 217.—Am. trop.
brasiliensis, Schlecht. in Bot. Zeit. x. (1852) 17.—Am. trop.
conferta, Nees, Agrost. Bras. 15; et in Mart. Fl. Bras. ii. ii. 37 = *acuta*.
diffusa, Spreng. Neue Entdeck. iii. 14 = *Zizania miliacea*.
elegans, Fluegge, Gram. Monog. 216 = *Paspalum pulchellum*.
fascicularis, Link, Hort. Berol. ii. 203 = *Panicum Schraderi*.
laxa, Reichb. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 2 = *Panicum lanatum*.

REIMARIA :—

oligostachya, *Munro*, ex *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 34.—Cuba; Florida.
puberula, Link, Hort. Berol. ii. 203 = *Paspalum ischnocaulon*.
purpurascens, Link, l. c. 203 = *Panicum violascens*?

REINECKIA, Karst. in C. Koch, Wochenschr. i. (1858) 349 = **Synechanthus**, H. Wendl. (Palm.).
triandra, Karst. l. c. = S. Warszewiczianus.

REINECKIA, Kunth, in Abh. Akad. Berl. 1842 (1844) 29. **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 771.
LIRIOPE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 74 (1866).
SANSEVIELLA, Reichb. Consp. 44 (1828), nomen prius.
carnea, Kunth, in Abh. Akad. Berl. 1842 (1844) 29.—China; Japon.

REINERA, Dennst. Schlüss. Hort. Malab. 33 (1818) = **Curinila**, Roem. & Schult. (Asclep.?).
baypinensis, Dennst. l. c. = C. Rheedi.

REINERIA, Moench, Meth. Suppl. 44 (1802) = **Te-phrosia**, Pers. (Legumin.).
reflexa, Moench, l. c. 45 = T. reflexa.

REINHARDTIA, Liebm. in Overs. Vidensk. Selsk. Forh. 1845 (1846) 9. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 906.
elegans, Liebm. l. c.; et ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 311.—Mexico.

REINIA, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. (1876) 314 = **Itea**, Gronov. (Saxifrag.).
racemosa, Franch. & Sav. l. c. = I. japonica.

REINWARDTIA, Blume, ex Nees, in Syll. Ratisb. i. (1824) 196 = **Saurauja**, Willd. (Ternstr.).
javanica, Blume, l. c. = S. Blumia.

REINWARDTIA, Dum. Comm. Bot. 19 (1822). **LINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 243.
KITTELOCHARIS, Alef. in Bot. Zeit. xxi. (1863) 282.
MACROLINUM, Reichb. Handb. 306 (1827).
indica, Dum. Comm. Bot. 19 = trigyna.
repens, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 523 = trigyna.
tetragyna, Planch. l. c.—Ind. or.
trigyna, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 16 = tetragyna.
trigyna, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 522.—Ind. or.

REINWARDTIA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 101. t. 12 (1840?) = **Ternstroemia**, Mutis.
elongata, Korth. l. c. 103 = T. micrantha.
patens, Korth. l. c. 102. t. 12 = T. micrantha.

REINWARDTIA, Spreng. Syst. i. 527 (1825) = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).
ferruginea, Steud. Nom. ed. II. ii. 440 = B. ferruginea.
glabra, Spreng. Syst. i. 863.—N. Granat.
heterantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 440.—Bras.
sericea, Spreng. Syst. i. 863.—N. Granat.
umbellata, Steud. Nom. ed. II. ii. 440.—Bras.

REISSEKIA, Endl. Gen. 1103 (1840). **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 386.
cordifolia, Endl. l. c.; A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 285.—Bras.
smilacina, Endl. l. c. = cordifolia.

REISSIPA, Steud. ex Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 230 (1847) = **Monotaxis**, Brongn. (Euphorb.).
pleurandroides, Steud. ex Klotzsch, l. c. = M. grandiflora.

REJOUA, Gaudich. in Frey. Voy. Bot. 450. t. 61 (1826) = **Tabernaemontana**, Plum. (Asclep.).
aurantiaca, Gaudich. l. c. 451. t. 61 = T. aurantiaca.
scandens, Seem. in Bonplandia, x. (1862) 296 = *Carruthersia scandens*.

RELBUNIUM, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 149 (1873). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
Aschenbornii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 62.—Mexico.
ciliatum, Hemsl. l. c.—Mexico.
hypocarpium, Hemsl. l. c. 63.—Mexico.
laevigatum, Hemsl. l. c.—Mexico.
microphyllum, Hemsl. l. c.—Mexico.
polyplocum, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 53. = Mexico.
tuberculosum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42.—Peruv.

RELCHELA, Steud. Syn. Pl. Gram. 101 (1855) = **Deyeuxia**, Clar. (Gramin.).
panicoides, Steud. l. c.—Chili.

RELHAMIA, J. F. Gmel. Syst. 247 (1791) = **Curtisia**, Ait. (Cornac.).
faginea, J. F. Gmel. l. c. = C. faginea.

RELHANIA, L'Hérit. Sert. Angl. 22. t. 29 (1788). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 326.
ECLOPES, Gaertn. Fruct. ii. 440. t. 169 (1791).
MICHAUXIA, Neck. Elem. i. 12 (1790).
RHYNCHOCARFUS, Less. Syn. Comp. 382 (1832).
RHYNCHOPSIDIUM, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. vii. ii. (1836) 283, 286.
acicularis, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 440 = pungens.
affinis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 300.—Afr. austr.
apiculata, Harv. l. c. 303 = quinquenervis.
Bellidiastrum, L'Hérit. Sert. Angl. 24.—Afr. austr.
Bellidiastrum, Poir. ex DC. Prod. vi. 291 = Osmites Bellidiastrum.

calycina, L'Hérit. Sert. Angl. 24 = Peyrousea calycina.
centauroides, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 301.—Afr. austr.
cuneata, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.
decussata, L'Hérit. l. c. 24 = cuneata.
dichotoma, Willd. ex Less. Syn. Comp. 372 = Nestlera humilis.
dumosa, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 284 = Nestlera conferta.
ericoides, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 30.—Afr. austr.
faginea, Steud. Nom. ed. II. ii. 440, sphalm. = Curtisia faginea.
genistaefolia, L'Hérit. Sert. Angl. 22.—Afr. austr.
lateriflora, L'Hérit. l. c. 23 = sessiliflora.
lateriflora, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 340 = quinquenervis.

laxa, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.
linifolia, Willd. ex Less. Syn. Comp. 371 = Nestlera humilis.
microphylla, L'Hérit. Sert. Angl. 22.—Afr. austr.
multipunctata, DC. Prod. vi. 286.—Afr. austr.
paleacea, L'Hérit. Sert. Angl. 24 = ericoides.
passerinooides, L'Hérit. l. c. 23 = Geigeria passerinoides.
pedunculata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 302.—Afr. austr.
pedunculata, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.
pinnata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146 = Ursinia filiformis.

pumila, Thunb. l. c. = pedunculata, L'Hérit.
pungens, L'Hérit. Sert. Angl. 24.—Afr. austr.
quinquenervis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146.—Afr. austr.
recurva, DC. Prod. vi. 286 = squarrosa.
recurva, Less. Syn. Comp. 376.—Afr. austr.
reflexa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146 = Nestlera biennis.
rotundifolia, Less. Syn. Comp. 375.—Afr. austr.
santolinoides, L'Hérit. Sert. Angl. 24 = ericoides.
sedifolia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 301.—Afr. austr.
sessiliflora, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146.—Afr. austr.
speciosa, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 302.—Afr. austr.
squarrosa, L'Hérit. Sert. Angl. 22.—Afr. austr.
stypelioides, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 303.—Afr. austr.
tomentosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146 = Amphiglossa tomentosa.
triflora, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 285 = Nestlera tricephala.
trinervis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146.—Afr. austr.
virgata, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.
viscosa, L'Hérit. l. c. 22.—Afr. austr.

RELLESTA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 337 = **Swertia**, Linn. (Gentian.).
cyanea, Turcz. l. c. = S. tetrapetala.

REMACLEA, C. Morr. Belg. Hort. iii. (1853) 1. t. 1 = **Trimezia**, Salisb. (Irid.).
funeris, C. Morr. l. c. 3. f. 1 = T. lurida.

REMBERTIA, Adans. Fam. ii. 226 (1763) = **Diapensia**, Linn.

REME, Adans. Fam. ii. 245 (1763) = **Trianthema**, Sauv. (Ficoid.).

REMIJIA, DC. in Bibl. Univ. Genève. (1829) ii. 185. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 33.
MACROCNEUMUM, Vand. Fl. Lusit. et Bras. 14 (1788).
angatensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 115 = Randia angatensis.
Bergeniana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 13.—Bras.
cujabensis, Wedd. l. c.—Bras.
densiflora, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 215.—Guian.
ferruginea, DC. Prod. iv. 357.—Bras.
firma, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 13.—Bras.
Hilarii, DC. Prod. iv. 357.—Bras.
lacunosa, Spruce, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 12.—Bras.
Lambertiana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 13 = Cascarilla Lambertiana.
Macrocnemia, Wedd. l. c.—Bras.
macrophylla, Benth. & Hook. f. ex Flueck. Chinarind. 16.—N. Granat.
obscura, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 116 (obscura) = Gardenia obscura.
odorata, Blanco, l. c. 115 (odorata) = Randia densiflora.
paniculata, DC. Prod. iv. 357.—Bras.
pedunculata, Flueck. Chinarind. 17. t. 6.—N. Granat.
prismatostylis, Benth. & Hook. f. ex Flueck. l. c. 16.—N. Granat.
Purdiana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1849) 272.—N. Granat.
Riveroana, Flueck. Chinarind. 17 = Cascarilla Riveroana.
tenuiflora, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 214.—Guian.
Vellozii, DC. Prod. iv. 357.—Bras.

REMIREA, Aubl. Pl. Gui. i. 44. t. 16 (1775). **CYPERACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1058.
MEGIA, Schreb. Gen. 786 (1791).
diffusa, Sieber, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 194 = Arundo occidentalis.
distichophylla, Boeck. in Flora, xli. (1858) 410 = maritima.
maritima, Aubl. Pl. Gui. i. 45. t. 16.—Reg. trop.
pedunculata, R. Br. Prod. 236 = maritima.
rigidissima, Steud. Syn. Pl. Cyp. 317 = maritima.
Wightiana, Nees, in Wight, Contrib. 92 = maritima.

REMUSATIA, Schott, Melet. i. 18 (1832). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 974.
Hookeriana, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. viii. (1858) 133.—Reg. Himal.
vivipara, Schott, Melet. i. 18.—Ind. or.; Burma.

REMYA, Hillebr. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. pars 1^{ma}, Add. 536 (1873); 1231 (1876). **COMPOSITAE**.
mauiensis, Hillebr. (in Herb. Kew.).—Ins. Sandvic.

RENANTHERA, Lour. Fl. Cochinch. 521 (1790). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 577.
NEPHRANTHERA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 44 (1844).
amabilis, Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 241 (Quid?).—Ins. Philipp.
Arachnites, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 217 = Arachnanthe moschifera.
bilinguis, Reichb. f. Xenia Orch. i. 7. t. 4 = Arachnantheilinguis.
coccinea, Lour. Fl. Cochinch. 521.—China.
elongata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 218.—Malaya.
Flosaëvis, Reichb. f. Xenia Orch. i. 88 = Arachnanthe moschifera.

RENANTHERA :—

hisionica, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) II. 74.—Malaya.
 Hookeriana, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 42.—Borneo.
 labrosa, *Reichb. f. l. c. i. 88* = *Arachnanthe bilinguis*.
 Lowei, *Reichb. f. l. c. 89*.—Borneo.
 matutina, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) t. 41 = elongata.
 matutina, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 218; *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 61.—Java.
 micrantha, *Blume, Rumphia*, iv. 54; *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 60 = elongata.
 moluccana, *Blume, Rumphia*, iv. 54.—Ins. Amboin.
 Rohaniana, *Reichb. f. Xenia Orch.* i. 89 = Hookeriana.
 Storiei, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1880) II. 296.—Ins. Philipp.
 Sulingi, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 217.—Java.

RENARDA, Regel, in *Trautv. Regel, Maxim. & Winkl. Decas Pl. Nov.* 5 (1882); et in *Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 277. *UMBELLIFERAE*.
 siifolia, *Regel, Il. cc.* 6; 278.—Turkestan.

RENARDIA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 466 = *Trimeria*, *Harv. (Bixin.)*.
 leiocarpa, *Turcz. l. c.*—Afr. austr.

RENEALMIA, R. Br. *Prod. Add.* [591] (1810) = *Libertia*, *Spreng. (Irid.)*.
 grandiflora, R. Br. l. c. [592] = *L. grandiflora*.
 ixioides, *Ker-Gawl. Gen. Irid.* 27 = *L. ixioides*.
 paniculata, R. Br. *Prod. Add.* [592] = *L. paniculata*.
 pulchella, R. Br. l. c. = *L. pulchella*.

RENEALMIA, Houtt. *Handleid.* viii. 335. t. 47. f. i. (1777) = *Villarsia*, *Vent. (Gentian.)*.
 capensis, *Houtt. l. c.* = *V. ovata*.

RENEALMIA, *Linn. Gen. ed. I.* 340 (1737) = *Tillandsia*, *Linn. (Bromel.)*.
 disticha, *Linn. Syst. ed. X.* 974 = *T. heliconioides*.
 monostachia, *Linn. Sp. Pl.* 287 = *T. tenuifolia*.
 paniculata, *Linn. l. c.* 286 = *T. paniculata*.
 pendula, *Gaertn. f. Fruct.* iii. 13 t. 102 = *T. pendula*.
 polystachia, *Linn. Sp. Pl.* 286 = *T. polystachia*.
 recurvata, *Linn. l. c.* 287 = *T. recurvata*.
 usneoides, *Linn. l. c.* = *T. usneoides*.

RENEALMIA, *Linn. f. Suppl.* 7 (1781). *SCITAMINEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 648.

ETHANUM, *Salisb. in Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 281, 282.

GETHYRA, *Salisb. l. c.* (1812).

PEPERIDIUM, *Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II.* 446 (1836).

SIPHOTRIA, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 50 (1836).
 africana, *Benth. in Hook. Ic. Pl.* t. 1430.—Afr. trop.
 amoena, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 254.—Cuba.
 aromatica, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 601 = dominicensis.

bracteosa, *Griseb. l. c.*—Ind. occ.
 breviscapa, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 135.—Peruv.

calcarata, *Andr. Bot. Rep.* t. 421 = *Alpinia calcarata*.
Cardamomum-medium, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 493, nomen = *Amomum costatum*.

caribaea, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 601 = racemosa.
 concolor, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia concolor*.

domingensis, *Horan. Prod. Scitam.* 32 = occidentalis.
 erecta, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia erecta*.
 exaltata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 1 = *Alpinia gracilis*.

exaltata, *Linn. f. Suppl.* 7.—Ind. occ.
 fasciculata, *Rosc. Scit.* 14. t. 109 = fasciculatum.

geniculata, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia geniculata*.

gracilis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 1 = *Alpinia gracilis*.
 jamaicensis, *Horan. Prod. Scitam.* 32 = occidentalis.
 macrantha, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 134.—Peruv.

marantaefolia, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia marantaefolia*.

minor, [Desf.] *Hort. Par. ex Roem. & Schult. Syst.* i. 32 = *Alpinia calcarata*.

monosperma, *Miq. in Linnaea*, xxii. (1849) 80.—Guian.

RENEALMIA :—

mutica, *Salisb. in Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 280 = *Alpinia mutica*.

nutans, *Andr. Bot. Rep.* t. 360 = *Alpinia nutans*.
 occidentalis, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 493; *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 274.—Ind. occ.

Paco-Secora, *Horan. Prod. Scitam.* 32.—Ins. S. Vincent.

pauciflora, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 256, in syn. = amoena.

polystachia, *Jacq. Select. Am.* 93.—Cuba.

punicea, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 493.—Ind. or.

racemosa, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 26 = breviscapa.

racemosa, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 254; *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 601.—Am. trop.

Ruiziana, *Horan. Prod. Scitam.* 33 = breviscapa.

strobilifera, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 135.—Peruv.

sylvestris, *Horan. Prod. Scitam.* 32.—Ind. occ.

thyrsoides, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 134.—Peruv.

tuberosa, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 14 = *Calathea tuberosa*.

ventricosa, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 256.—Cuba.

RENGGERIA, *Meissn. Gen.* 42; *Comm.* 31 (1837).

GUTTIFERAE, *Benth. & Hook. f.* i. 171.

SCHWEIGGERIA, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 166. t. 297 (1829).

acuminata, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 88 = *Clusia acuminata*.

comata, *Meissn. ex Walp. Rep.* i. 393.—Bras.

guianensis, *Splitz. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 104.—Guian.

littoralis, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 11.—Bras.

montana, *Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Gui.* 1093, nomen.—Guian.

RENGIFA, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 12. t. 210 (1842). *GUTTIFERAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 171.

acuminata, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xiv. (1860) 243.—Guian.

peruviana, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 12.—Peruv.

scandens, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xiv. (1860) 241.—Guian.

RENIA, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. IV. 3 = *Inocarpus*, *Forst. (Legumin.)*.

RENNELLIA, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1851) 255. *RUBIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 118.

elliptica, *Korth. l. c.* 257.—Sumatra.

ovalis, *Korth. l. c.*—Sumatra.

speciosa, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 118.—Burma.

RENSCHIA, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 94 = *Tinnea*, *Kotschy & Peyr. (Labi.)*.

heterotypica, *Vatke, l. c.* = *T. heterotypica*.

RENSSELAERIA, *Beck, Bot. N. Mid. St.* 382 (1833) = *Peltandra*, *Rafin. (Aroid.)*.

virginica, *Beck, l. c.* = *P. virginica*.

REPANDRA, *Lindl. Orch. Scel.* 12 (1826) = *Disa*, *Berg. (Orchid.)*.

REPHESES, *Rafin. Sylva Tellur.* 59 (1838) = *Ficus*, *Tourn. (Urtic.)*.

calyptrata, *Rafin. l. c.* = *F. calyptrata*.

ovata, *Rafin. l. c.* = *F. ovata*.

REPTONIA, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 153 (1844).

MYRSINEAE, *Benth. & Hook. f.* ii. 648.

EDGEWORTHIA, *Falc. in Proc. Linn. Soc. i.* (1842) 129.

MONOTHECA, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 152 (1844).

buxifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 153.—Ind. or.

laurina, *Benth. Fl. Hongk.* 208 = *Sarcosperma laurina*.

REQUIENIA, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 91 = *Tephrosia*, *Pers. (Legumin.)*.

obcordata, *DC. l. c.*; *Lég. Mém.* vi. t. 37 = *T. obcordata*.

sphaerosperma, *DC. ll. cc.* 91; . 38 = *T. sphaerosperma*.

RESEDA, *Tourn. ex Linn. Syst. ed. I* (1735). *RESE-*

DACEAE, *Benth. & Hook. f. i.* 112.

ARKOPODA, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 73 (1836).

ERESEDA, *Spach, Hist. Vég. Phan.* vii. 101 (1839).

HEXASTYLIS, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 73 (1836).

PECTANISIA, *Rafin. l. c.* 72 (1836).

TEREIANTHES, *Rafin. l. c.* (1836).

abyssinica, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 106 = *Caylusea abyssinica*.

affinis, *Kotschy, ex Muell. Arg. Monog. Resed.* 124 = arabica.

alba, *Delile, Fl. Aegypt.* 15 = decursiva.

alba, *Linn. Sp. Pl.* 449.—Europ.; Oriens.

alba, *St. Amand, Fl. Agen.* 187 = *Jacquini*.

alba, *Ruiz, ex Muell. Arg. Monog. Resed.* 107 = bipinnata.

alopecuros, *Boiss. Diagn. Ser. I.* viii. 55.—Palaestina.

Alphonsi, *Muell. Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 35.—Algeria.

amblyocarpa, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 108.—Abyssin.

anomala, *J. Gay, ex Muell. Arg. Monog. Resed.* 124 = arabica.

arabica, *Boiss. Diagn. Ser. I.* i. 6.—Aegypt.; Arab.

aragonensis, *Loscós & Pardo, Ser. Imperf.* 51 = *R. Phyteuma*.

arborea, *Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre*, ed. II. 722 = odorata.

armena, *Boiss. Diagn. Ser. I.* i. 5.—Armenia.

atriplicifolia, *J. Gay, ex Muell. Arg. Monog. Resed.* 146 = *Aucheri*.

attenuata, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 338.—Marocc.

Aucheri, *Boiss. Diagn. Ser. I.* i. 5.—Mcsopot.; Persia.

baetica, *J. Gay, ex Muell. Monog. Resed.* 109 = bipinnata.

Balansae, *Muell. Arg. l. c.* 119.—Cilicia.

Barrelieri, *Bertol. Fl. Ital.* v. 32.—Ital.; Hispan.

bipinnata, *Loscós & Pardo, Ser. Imperf.* 51 = macrostachya.

bipinnata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* i. 499.—Hispan.

Boissieri, *Muell. Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 37.—Aegypt.

bracteata, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vi. 22 = pruinosa.

Buhseana, *Muell. Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 36.—Beluchist.

Bungei, *Boiss. Fl. Orient.* i. 433.—Persia.

cahirana, *Muell. Arg. Monog. Resed.* 176 = Boissieri.

calicinalis, *Lam. Fl. Fr.* iii. 204 = *R. Phyteuma*.

canescens, *Linn. Sp. Pl.* 448 = *Astrocarpus scsamoides*.

canescens, *A. St. Hil. in Ann. Sc. Nat. Sér.* II. vii. (1837) 375.—Arab.

capensis, *Burm. ex Muell. Arg. Monog. Resed.* 222 = *Astrocarpus Clusii*.

capensis, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 13 = *Oligomeris capensis*.

capensis, *Willd. ex Muell. Arg. Monog. Resed.* 214 = *Oligomeris glaucescens*.

caudata, *DC. ex Muell. Arg. l. c.* 154 = pruinosa.

chinensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 299.—China.

clausa, *Reichb. ex Muell. Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 39 = lutea.

Clusii, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 41 = *Astrocarpus sesamoides*.

cochinchinensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 299.—Cochinch.

collina, *J. Gay, in Expl. Sc. Algér.* t. 71. f. 2 = *R. Phyteuma*.

complicata, *Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys.* iii. (1820) 13.—Hispan.

confusa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 224 = *R. Phyteuma*.

constricta, *Lange, Pl. Nov. Hisp. fasc. i.* 6. t. 8 = lanceolata.

crispa, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. n. 2 = lutea.

crispa, *Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 892 = alba.

crispata, *Bertol. Fl. Ital.* v. 26.—Sicil.

crispata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 8 = *R. Luteola*.

crystallina, *Webb & Berth. Phytog. Canar.* i. 102. t. 9.—Ins. Canar.

decursiva, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 67.—Arab.

difformis, *Moench, Meth. Suppl.* 22 = *Caylusea canescens*.

diffusa, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 339.—Marocc.

dipetala, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 132 = *Oligomeris capensis*.

dipetala, *Drège, ex Presl, Bot. Bemerk.* 8 = *Oligomeris Dregeana*.

RESEDA:—

Dregeana, Presl, Bot. Bemerk. 8—Oligomeris Dregeana. Duriaana, J. Gay, in *Expl. Sc. Algér.* t. 71. f. 1; et ex Muell. Arg. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 38.—Afr. bor. elata, Coss. & Bal. ex Muell. Arg. in *DC. Prod.* xvi. ii. 578; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 242.—Marocc.

erecta, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17 = stricta.

eremophila, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 54 = decursiva.

filiformis, Pourr. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 200 = virgata.

fruticosa, Ehrenb. ex Muell. Arg. l. c. 229 = Caylusea canescens.

fruticulosa, Linn. Syst. ed. X. 1046 = alba.

Gayana, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 76. t. 21 = alba.

gigantea, Pourr. ex Willk. & Lange, in *Prod. Fl. Hisp.* iii. 890 = suffruticosa.

glauca, Brot. Fl. Lusit. ii. 307 = virgata.

glauca, Eichw. Casp. Cauc. 24 = R. Luteola.

glauca, Linn. Sp. Pl. 449.—Hispan.

glauca, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274 = Oligomeris capensis.

globulosa, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 45.—Reg. Caucas.

gracilis, Tenore, Syll. 232 = lutea.

gredensis, Muell. Arg. in *DC. Prod.* xvi. ii. 582; *Cutanda*, Apend. Fl. Matrit. 743.—Hispan.

Gussoni, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. i. 49 = R. Luteola.

Hausknechtii, Muell. Arg. in *DC. Prod.* xvi. ii. 574.—Persia.

hexagyna, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 92 = canescens.

Hookeri, Guss. Enum. Pl. Inar. 28 = alba.

incisa, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxviii = alba.

inflata, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 189 = lutea.

inodora, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 22. t. 99 f. 4445.—Europ. occ.

Jacquini, Reichb. l. c.—Europ. austr.

kahirina, Boiss. Fl. Orient. i. 430 = Boissieri.

kurdica, Boiss. & Noé, in Boiss. l. c. 426.—Kurdist.

laciniata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 183 = R. Phyteuma.

laevigata, G. Don, Gen. Syst. i. 289.—Aegypt.

Lamottei, Jord. ex Nym. Consp. 69 = lutea.

lanceolata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17.—Hispan.

Lancerotae, Webb, ex Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1836) 27 = crystallina.

leucantha, Hegelm. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 892.—Hispan.

linifolia, Hornem. Hort. Hafn. ii. 501.—Europ. austr.; Aegypt.

litorea, J. Gay, ex Nym. Consp. 69 = Jacquini.

littoralis, Muell. Arg. Monog. Resed. 141 = Jacquini.

longicalycina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1850) 133 = R. Phyteuma.

lurida, Muell. Arg. Monog. Resed. 152.—Afr. or.

lusitanica, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 897 = alba.

lutea, Linn. Sp. Pl. 449.—Europ.; Oriens.

Luteola, Linn. l. c. 448.—Europ.; Oriens.

macrobotrys, Boiss. Fl. Orient. i. 433.—Persia.

macrocarpa, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 156 = stenostachya.

macroserma, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 130 = media.

macrostachya, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 890.—Hispan.

media, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17.—Lusitan.

mediterranea, Bess. ex Boiss. Fl. Orient. i. 428 = inodora.

mediterranea, Jacq. Coll. i. 147 = Jacquini.

mediterranea, Linn. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 227 = Caylusea canescens.

mediterranea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 564.—Afr. bor.

mediterranea, Sadler, Verz. 71 = inodora.

mediterranea, Schoen, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 124 = arabica.

mediterranea, Willd. ex Muell. Arg. l. c. 136 = R. Phyteuma.

microcarpa, Muell. Arg. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 35.—Persia.

microphylla, Presl, Bot. Bemerk. 8 = Oligomeris capensis.

mucronata, Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. (1827) 280 = lutea.

mucronulata, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 147 = lutea.

muricata, Presl, Bot. Bemerk. 8.—Palaest.; Arab.

myriophylla, Tenore, Fl. Neap. App. i. 28 = alba.

neglecta, Muell. Arg. Monog. Resed. 178 = lutea.

VOL. II.

RESEDA:—

nilgherrensis, Muell. Arg. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 34 = odorata.

ochracea, Moench, Meth. 58 = alba.

Ochradeni, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 49.—Persia.

odorata, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 236 = R. Phyteuma.

odorata, Linn. Syst. ed. X. 1046.—Afr. bor.?

oligandra, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. vii. (1838) ii. 764 = Oligomeris glaucescens.

orientalis, Boiss. Fl. Orient. i. 427.—Syria.

orthostyla, C. Koch, in Linnaea, xv. (1845) 705 = lutea.

papillosa, Muell. Arg. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 38 = Duriaana.

parviflora, DC. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 114 = alba.

pedunculata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = Caylusea abyssinica.

Phyteuma, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 210 = lutea.

Phyteuma, Brot. Fl. Lusit. ii. 305 = media.

Phyteuma, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvii = pruinosa.

Phyteuma, Linn. Sp. Pl. 449.—Reg. Mediterr.; As. Min.

Phyteuma, Kralik, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 232 = arabica.

pilosa, Link, ex Muell. Arg. l. c. 135 = media.

podocarpos, Viv. Pl. Aegypt. Dec. 7 = Caylusea canescens.

podolica, Rehm. Notiz. Veg. Schwarz. Meer. 55.—Podolia.

praetervisa, Muell. Arg. Monog. Resed. 232 = arabica.

propinqua, R. Br. in Denh. & Clapp. Trav. App. 227 = decursiva.

pruinosa, Bové, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 156 = stenostachya.

pruinosa, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 63.—Aegypt.

pruinosa, Schimp. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 159 = muricata.

Pseudo-phyteuma, Brot. ex Nym. Consp. 68 = R. Phyteuma.

Pseudo-virens, Frivald. in Flora, xx. (1837) 232 = R. Luteola.

purpurascens, Linn. Sp. Pl. 449 = Astrocarpus Clusii.

pygmaea, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 426 = Astrocarpus sesamoides.

quadrargyna, Walp. Rep. ii. 464 = tetragyna.

Quartiniana, Buching. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 152 = lurida.

Quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 13 = pruinosa.

ramosissima, G. Don, ex Kunze, in Linnaea, xxiv. (1851) 163 = stricta.

ramosissima, Pourr. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 499; Spreng. Syst. ii. 464.—Hispan.

Reuteriana, Muell. Arg. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 37.—Alger.

rotundifolia, Kotschy, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 147 = Ancheri.

salicifolia, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 666 = R. Luteola.

saxatilis, Bal. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 165 = Reuteriana.

saxatilis, Pourr. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 500 = stricta.

Schimperi, Presl, Bot. Bemerk. 8 = Oligomeris glaucescens.

Schraderi, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 49.—Persia.

scoparia, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. i. 499.—Ins. Mader.

sesamoides, Linn. Sp. Pl. 449 = Astrocarpus sesamoides.

sesamoides, Sieber, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 221 = Astrocarpus sesamoides.

spartioides, Sieber, ex Muell. Arg. l. c. 94 = Ochradenus baccatus.

spathulata, E. Mey. ex Muell. Arg. l. c. 211 = Oligomeris spathulata.

spicata, Humb. ex Muell. Arg. l. c. 136 = R. Phyteuma.

stellata, Lam. Fl. Fr. iii. 204 = Astrocarpus sesamoides.

stenostachya, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 5.—Anatolia.

stipulacea, DC. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 200 = virgata.

stricta, Kralik, ex Muell. Arg. l. c. 187 = lutea.

stricta, Pers. Syn. ii. 10.—Algeria.

subulata, Delile, Fl. Aegypt. 15 = Oligomeris glaucescens.

suffruticosa, Loeft. It. ed. Germ. 79; ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 890 = alba.

suffruticulosa, Link, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 189 = lutea.

suffruticulosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 645 = alba.

RESEDA:—

tenuifolia, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 204; et in Linnaea, xiv. (1840) 574 = lutea.

tetragyna, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 92 = arabica.

tinctoria, Salisb. Prod. 345 = R. Luteola.

tomentosa, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 4.—Cappadoc.

tomentosa, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 392 = villosa.

Tournefortii, Schult. Obs. Bot. 89 = R. Phyteuma.

tricuspsis, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 241.—Marocc.

tridens, Viv. Pl. Aegypt. Dec. 6 = Oligomeris glaucescens.

tripartita, Buhse, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 161 = Buhseana.

truncata, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 45.—Macedon.; Anatol.

truncula, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 191 = lutea.

undata, Amo, Fl. Iber. vi. 322 = suffruticosa.

undata, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 75. t. 20 = Barrelieri.

undata, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 109 = decursiva.

undata, Habl. Phys. Desc. Taur. 146 = lutea.

undata, Linn. Syst. ed. X. 1046 = alba.

undulata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 210 = R. Luteola.

undulata, Link, Handb. ii. 518, sphalm. = undata.

urnigera, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 25.—Afr. bor.

villosa, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 392.—Algeria.

virescens, Hornem. Hort. Hafn. ii. 501.—Hispan.

virgata, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 6.—Lusitan.

viridis, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 501.—Ins. Socotr.

vulgaris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = lutea.

Yannezii, Cutanda, Fl. Comp. Madr. 151 = lutea.

RESEDELLA, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 106 (1836) = Oligomeris, Cambess. (Resed.).

dipetala, Webb & Berth. l. c. 107 = O. glaucescens.

Dregeana, Muell. Arg. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 39 = O. Dregeana.

subulata, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 107. t. 11 = O. glaucescens.

RESINARIA, Comm. ex Lam. Encyc. i. 349 (1784) = **Terminalia**, Linn. (Combret.).

RESTIARIA, Lour. Fl. Cochinch. 639 (1790). **INC. SEDI.**

cordata, Lour. l. c.—China.

RESTIO, Linn. Syst. ed. XII. 725 (1767). **RESTIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1031.

BALOSKION, Rafin. Fl. Tellur. iv. 32 (1836).

CHONDROPETALON, Rafin. l. c. 33 (1836).

CRASPEDOLEPIS, Steud. Syn. Pl. Cyp. 264 (1855).

ISCHYROLEPIS, Steud. in Flora, xxiii. (1850) 229, nomen; Syn. Pl. Cyp. 249 (1855).

LEIENA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 33 (1836).

MEGALOTHECA, F. Muell. Fragm. viii. 98 (1873).

RHODOCOMA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 450 (1836).

abortivus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 60.—Austral.

acuminatus, Thunb. Diss. Rest. 13 = Cannamois simplex.

alboaristatus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 635 = Hypodiscus duplicatus.

amblycoleus, F. Muell. Fragm. viii. 65.—Austral.

ameles, Steud. Syn. Pl. Cyp. 252 = ferruginosus.

anceps, Burch. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 267 = Hypolaena anceps.

applanatus, Spreng. Syst. i. 185.—Austral.

arcuatus, Mast. in DC. Monog. Phan. i. 247.—Afr. austr.

argenteus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 656 = Ceratocaryum argenteum.

argenteus, Thunb. Diss. Rest. 14 = Thamnochortus argenteus.

aristatus, Thunb. l. c. 10. f. 4 = Hypodiscus aristatus.

articulatus, Retz. Obs. iv. 14 = Lepironia mucronata.

asperiflorus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 656 = Elegia asperiflora.

australis, R. Br. Prod. 245.—Austral.

bifarius, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 278.—Afr. austr.

4 U

RESTIO:—

bifidus, Auct. ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 280 = *Garnotianus*.
bifidus, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 7.—Afr. austr.
bifurcus, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 247, partim = *furcatus*.
bifurcus, Nees, ex Mast. l. c.—Afr. austr.
bigeminus, Nees, ex Mast. l. c. 246.—Afr. austr.
caricinus, Mast. ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 327 = *Thamnochortus caricinus*.
casuarinaeformis, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 227 = *subverticillatus*.
Cephalotes, Kunth, Enum. Pl. iii. 448, sphalm. = *Cannomois Cephalotes*.
cernuus, Linn. f. Suppl. 425; Thunb. Diss. Rest. 10. f. 2 = *Thamnochortus cernuus*.
chasmatocheus, F. Muell. Fragm. viii. 71 = *laxus*.
chaunocoleus, F. Muell. l. c. 64.—Austral.
Chondropetalum, Nees, in Linnaea, v. (1830) 652 = *Elegia deusta*.
cincinnatus, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 240.—Afr. austr.
cinerascens, R. Br. Prod. 246.—Austral.
cinerascens, Nees, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 335 = *Leptocarpus tenax*.
clavatus, R. Br. 246 = *Hypolaena fastigiata*.
clavatus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 58 = *Hypolaena exsulca*.
complanatus, R. Br. Prod. 245.—Austral.
compressus, R. Br. l. c. = *applanatus*.
compressus, Rottb. Desc. et Ic. 6. t. 2 f. 4.—Afr. austr.
concolor, Steud. Syn. Pl. Cyp. 251.—Afr. austr.
confertospicatus, Steud. l. c. 256.—Austral.
confinis, Steud. l. c. = *ornatus*.
crinalis, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 229.—Afr. austr.
crispatus, R. Br. Prod. 246.—Austral.
crispatus, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 421 = *Caustis flexuosa*.
crispatus, Nees, ex Benth. l. c. 238 = *Hypolaena lateriflora*.
curviramis, Kunth, Enum. Pl. iii. 395.—Afr. austr.
curvulus, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 50.—Austral.
cuspidatus, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. 8.—Afr. austr.
debilis, Nees, in Linnaea, v. (1830) 641.—Afr. austr.
deformis, R. Br. Prod. 245.—Austral.
deformis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 255 = *leptocarpoides*.
depauperatus, Kunth, Enum. Pl. iii. 405.—Afr. austr.
dichotomus, Gaertn. Fruct. ii. 12 = *Willdenowia teres*.
dichotomus, Linn. Syst. ed. XII. 735 = *Thamnochortus fruticosus*.
dichotomus, Rottb. Desc. 2; Progr. 10 = *Thamnochortus dichotomus*.
dichotomus, Thunb. Diss. Rest. 21 = *triflorus*, *triticeus*.
dichotomus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 406 = *perplexus*.
diffusus, Spreng. Syst. i. 185 = *Leptocarpus tenax*.
digitatus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 638 = *obtusissimus*.
digitatus, Thunb. Diss. Rest. 18.—Afr. austr.
digitatus, Thunb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 417 = *Cannomois Cephalotes*.
digitatus, Zeyh. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 456 = *Willdenowia striata*.
digynus, Link, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 250 = *Mastersi*.
dimorphus, R. Br. Prod. 246.—Austral.
dispar, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 246.—Afr. austr.
distachyos, Rottb. Desc. 8; Progr. 11 = *Thamnochortus umbellatus*.
distichus, Rottb. ll. cc. 6; 11 = *Thamnochortus distichus*.
divaricatus, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 236 = *macer*.
dubius, Klotzsch, ex Mast. l. c. 250 = *Mastersi*.
echinatus, Kunth, Enum. Pl. iii. 384 = *squarrosus*.
Ecklonii, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 236.—Afr. austr.
egregius, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 337.—Afr. austr.

RESTIO:—

elatus, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 226.—Afr. austr.
elegans, Poir. Encyc. vi. 171 = *Cannomois Cephalotes*.
Elegia, Murr. Syst. ed. XIII. 738 = *Elegia juncea*.
Eleocharis, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 238.—Afr. austr.
elongatus, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 7 = *Thamnochortus elongatus*.
equisetaceus, Reichb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 250 = *Dovea macrocarpa*.
erectus, Nees, ex Mast. l. c. 243 = *Elegia juncea*.
erectus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 655 = *Elegia propinqua*.
erectus, Thunb. Diss. Rest. 14 = *Thamnochortus erectus*.
eriphorus, Reichb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 229 = *Thamnochortus fruticosus*.
fasciculatus, R. Br. Prod. 247 = *Hypolaena fasciculata*.
fastigiatus, R. Br. Prod. 246.—Austral.
fastigiatus, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 250 = *Mastersi*.
ferruginosus, Kunth, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 248 = *subverticillatus*.
ferruginosus, Link, ex Kunth, Enum. Pl. iii. 393.—Afr. austr.
festucaeformis, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 248.—Afr. austr.
filiformis, Poir. Encyc. vi. 173.—Afr. austr.
flexuosus, R. Br. Prod. 247 = *Hypolaena flexuosa*.
fraternus, Kunth, Enum. Pl. iii. 386.—Afr. austr.
fruticosus, Thunb. Diss. Rest. 16 = *Leptocarpus paniculatus*.
fruticosus, Thunb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 417 = *Leptocarpus modestus*.
fuirenoideus, Kunth, Enum. Pl. iii. 386 = *setiger*.
furcatus, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 242.—Afr. austr.
fuscus, Nees, ex Mast. l. c. x. (1869) 250 = *Dovea macrocarpa*.
Garnotianus, Kunth, Enum. Pl. iii. 392.—Afr. austr.
Gaudichaudianus, Kunth, l. c. 387.—Afr. austr.
glauus, Behr, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 301.—Hab?
glomeratus, Thunb. Diss. Rest. 18.—Afr. austr.
glumaceus, Klotzsch, ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 339 = *triticeus*.
gracilior, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 226.—Austral.
gracilis, R. Br. Prod. 245.—Austral.
gracilis, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 233 = *Leptocarpus tenax*.
graminifolius, Kunth, Enum. Pl. iii. 407.—Afr. austr.
grandis, Spreng. ex Nees, in Linnaea, v. (1830) 660 = *Lamprocaulos grandis*.
Harveii, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 253. t. 15.—Afr. austr.
Helenae, Mast. l. c. 233.—Afr. austr.
hirtellus, Kunth, Enum. Pl. iii. 426 = *Leptocarpus peronatus*.
Hystrix, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 276.—Afr. austr.
imbricatus, Thunb. Diss. Rest. 9 = *Thamnochortus imbricatus*.
impolitus, Kunth, Enum. Pl. iii. 404 = *Hypolaena impolita*.
incurvatus, Thunb. Diss. Rest. 18 = *Leptocarpus incurvatus*.
intermedius, Kunth, Enum. Pl. iii. 388.—Afr. austr.
intermedius, Steud. in Flora, xii. (1829) 132 = *Elegia juncea*.
ischaemoides, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 248 = *festucaeformis*.
junceus, Zeyh. & Nees, ex Nees, in Linnaea, v. (1830) 658 = *Elegia juncea*.
Kunthii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 251 = *triflorus*.
laniger, Kunth, Enum. Pl. iii. 386.—Afr. austr.
lateriflorus, R. Br. Prod. 247 = *Hypolaena lateriflora*, *elongata*.
lateriflorus, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 222 = *fastigiatus*.
laxus, R. Br. Prod. 245. n. 3.—Austral.
laxus, R. Br. l. c. 246. n. 12 = *Leptocarpus tenax*.
Lehmanni, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 225 = *ocreatus*.
leptocarpoides, Benth. Fl. Austral. vii. 229.—Austral.
leptoclados, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 241.—Afr. austr.

RESTIO:—

leptostachyus, Kunth, Enum. Pl. iii. 407.—Afr. austr.
limbatus, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 235 = *macer*.
Loxocarya, Mast. in DC. Monog. Phan. i. 272 = *Loxocarya cinerea*.
lucaeana, Kunth, Enum. Pl. iii. 385 = *cuspidatus*.
lucens, Poir. Encyc. vi. 169.—Afr. austr.
Ludwigii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 254.—Afr. austr.
macer, Kunth, Enum. Pl. iii. 390.—Afr. austr.
macrogyneus, Nees, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 288 = *egregius*.
Mastersi, F. Muell. Fragm. viii. 68, in textu.—Afr. austr.
Megalotheca, Benth. Fl. Austr. viii. 222 = *seq.*
megalothecus, F. Muell. l. c. 99.—Austral.
membranaceus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 657 = *Elegia juncea*.
micans, Nees, l. c. 649 = *Thamnochortus micans*.
microstachys, R. Br. Prod. 246 = *Leptocarpus tenax*.
microstachys, Nees, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 247 = *Gaudichaudianus*.
miser, Kunth, Enum. Pl. iii. 392.—Afr. austr.
monanthos, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 238.—Afr. austr.
monocephalus, R. Br. Prod. 245.—Austral.
monostachyus, Steud. in Flora, xii. (1829) 133 = *bifidus*.
mucronatus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 660 = *Dovea mucronata*.
multiflorus, Spreng. Syst. i. 187.—Afr. austr.
Neesii, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 232.—Afr. austr.
neglectus, Klotzsch, ex Hochst. in Flora, xxviii (1845) 338 = *Leptocarpus neglectus*.
nitens, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 59.—Austral.
nudus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 651 = *Elegia nuda*.
nutans, R. Br. Prod. 245 = *Leptocarpus aristatus*.
nutans, Steud. in Flora, xii. (1829) 104 = *Ludwigii*.
nutans, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 7 = *Thamnochortus elongatus*.
oblongus, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 229.—Afr. austr.
obtusissimus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 252.—Afr. austr.
ocreatus, Kunth, Enum. Pl. iii. 385.—Afr. austr.
oligocephalus, F. Muell. Fragm. viii. 68 = *monocephalus*.
oligostachyus, Kunth, Enum. Pl. iii. 399 = *bifidus*.
ornatus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 256.—Austral.
oxylepis, Kunth, Enum. Pl. iii. 427 = *Leptocarpus oxylepis*.
pachystachyus, Kunth, l. c. 399.—Afr. austr.
paleaceus, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 225, 227, 230 = *Leptocarpus modestus*, *Thamnochortus elongatus*, *dichotomus*.
pallens, R. Br. Prod. 245 = *gracilis*.
pallens, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 233 = *Leptocarpus tenax*.
paniculatus, Link, Handb. i. 134 = *multiflorus*.
paniculatus, Rottb. Desc. 4; Progr. 10 = *Leptocarpus paniculatus*.
pannosus, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 244.—Afr. austr.
parviflorus, Thunb. Diss. Rest. 13 = *Elegia parviflora*.
pauciflorus, Poir. Encyc. vi. 168.—Afr. austr.
pedicellatus, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 252.—Afr. austr.
peronatus, Kunth, Enum. Pl. iii. 426 = *ocreatus*.
perplexus, Kunth, Enum. Pl. iii. 406.—Afr. austr.
pilisepalus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 256 (Cyperacea).—Ins. Waigiou.
polystachyus, Kunth, Enum. Pl. iii. 402 = *Mastersi*.
propinquus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 653 = *Elegia propinqua*.
Pseudoleptocarpus, Kunth, Enum. Pl. iii. 399 = *bifidus*.
pubescens, R. Br. Prod. 247 = *Hypolaena pubescens*.
punctulatus, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 242 = *Thamnochortus distichus*.
purpurascens, Nees, ex Mast. l. c. 249.—Afr. austr.
pyncostachyus, Mast. l. c. 232.—Afr. austr.
quadratus, Mast. l. c. x. (1869) 277.—Afr. austr.
quinquefarius, Nees, in Linnaea, v. (1830) 639.—Afr. austr.
racemosus, Lam. Illustr. iii. 400 = *Dovea tectorum*.
ramiflorus, Nees, in Linnaea, v. (1830) 644 = *Leptocarpus paniculatus*.
Rhodocoma, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 275.—Afr. austr.
rottbllellioides, Kunth, Enum. Pl. iii. 394.—Afr. austr.

RESTIO—

saroclados, *Mast. in DC. Monog. Phan.* i. 291.—Afr. austr.
scariosus, Sieber, ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 430 = *Thamnochortus dichotomus*.
scariosus, Thunb. *Diss. Rest.* 15 = *Thamnochortus fruticosus*.
schoenoides, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 391.—Afr. austr.
Scopa, Thunb. *Diss. Rest.* 19 = *Cannomois Cephalotes scoparius*, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 390.—Afr. austr.
setiger, Kunth, l. c. 385.—Afr. austr.
setuligerus, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* ii. 58 = *Leptocarpus tenax*.
Sieberi, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 287.—Afr. austr.
simplex, Forst. ex Steud. in *Flora*, xii. (1829) 134 = *Thamnochortus elongatus*.
simplex, Linn. ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 231 = *Thamnochortus imbricatus*.
simplex, Murr. *Syst. ed. XIII.* 738 = *Leptocarpus simplex*.
simplex, Thunb. *Diss. Rest.* 16.—Afr. austr.
Sonderianus, *Mast. in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 252.—Afr. austr.
sphacelatus, R. Br. *Prod.* 246.—Austral.
spicifer, Lam. *Illustr.* iii. 399 = *Thamnochortus cernuus*.
spicigerus, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 440, sphalm. = *Thamnochortus cernuus*.
spicigerus, Thunb. *Diss. Rest.* 11 = *Thamnochortus spicigerus*.
spinulosus, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 402.—Afr. austr.
Sprengelii, Mast. in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 224 = *cuspidatus*.
squamosus, Thunb. in *Hoffm. Phytog. Blatter*, i. (1803) 8.—Afr. austr.
squarrosus, Poir. in *Lam. Encyc.* vi. 174.—Afr. austr.
squarrosus, Spreng. *Syst.* i. 186 = *cuspidatus*.
Stuedelii, F. Muell. *Fragm.* viii. 70 = *ornatus*.
stipularis, Banks, ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 588 = *Elegia stipularis*.
strobilifer, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 398.—Afr. austr.
subfalcatus, Nees, ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 231.—Afr. austr.
subtilis, Nees, ex Mast. l. c. 251.—Afr. austr.
subulatus, Mast. l. c. 248.—Afr. austr.
subverticillatus, Mast. l. c. 227.—Afr. austr.
sulcatus, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 404 = *Hypodiscus Willdenovia*.
synchroolepis, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 250 = *Hypodiscus synchroolepis*.
tectorum, Linn. f. *Suppl.* 425 = *Dovea tectorum*.
tectorum, Sieber, ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 462 = *Elegia nuda*.
tectorum, Thunb. *Fl. Cap.* i. 85; Steud. in *Flora*, xii. (1829) 132 = *Elegia deusta*.
tenellus, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* ii. 57 = *Leptocarpus aristatus*.
tenuis, Burch. ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 265 = *Hypolaena tenuis*.
tenuis, Krauss, in *Flora*, xxviii. (1845) 337 = *curviramis*.
tenuissimus, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 394.—Afr. austr.
tetragonus, Thunb. *Diss. Rest.* 17.—Afr. austr.
triflorus, Rottb. *Desc.* 7; *Progr.* 11.—Afr. austr.
triflorus, Sieber, ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 235 = *Sieberi*.
triflorus, Steud. in *Flora*, xii. (1829) 133 = *bifidus*.
trisepalus, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* ii. 58.—Austral.
triticeus, Rottb. *Desc.* 7; *Progr.* 11.—Afr. austr.
triticeus, Thunb. ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 417 = *pannosus*.
tropicus, R. Br. *Prod.* 246.—Austral.
umbellatus, Thunb. *Diss. Rest.* 11 = *Thamnochortus umbellatus*.
umbellatus, Thunb. ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 415 = *Thamnochortus cernuus*, imbricatus.
uncinatus, Nees, ex Benth. *Fl. Austral.* vii. 421 = *Causis recurvata*.
vacillans, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 255 = *Hypolaena fastigiata*.

RESTIO—

vaginatus, Thunb. *Diss. Rest.* 10 = *Thamnochortus imbricatus*.
vaginatus, Willd. *Sp. Pl.* iv. 719 = *bifidus*.
venustus, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 388.—Afr. austr.
verticillaris, Linn. f. *Suppl.* 425; Thunb. *Diss. Rest.* 19 = *Elegia verticillaris*.
verticillatus, Spreng. *Syst.* i. 186 = *Elegia verticillaris*.
villus, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 389.—Afr. austr.
vimineus, Murr. *Syst. ed. XIII.* 738; Linn. *Herb.* ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 231 = *Thamnochortus dichotomus*.
vimineus, Rottb. *Desc.* et *Ec.* 4. t. 2. f. 1 = *Leptocarpus incurvatus*.
vimineus, Thunb. ex Mast. in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 420 = *perplexus*.
virgatus, Rottb. *Desc.* 5; *Progr.* 10 = *Cannomois Cephalotes*.
Wallichii, Mast. in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 234.—Afr. austr.
xyridioides, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 397 = *quinquefarius*.

RESTREPIA, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 366. t. 94 (1815). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 491.
antennifera, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 367. t. 9.—N. Granat.
antennifera, Lindl. *Fol. Orch. Restrep.* 1, partim = *maculata*.
aspiensium, Reichb. f. in *Bonplandia*, iii. (1855) 70.—Venezuela.
biflora, Regel, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* vi. (1856) 373 = *Pleurothallis hemirhoda*.
cueullata, Lindl. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xv. (1845) 108.—N. Granat.
Dayana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1875) ii. 257.—Costa Rica.
elegans, Karst. in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xv. (1847) 202; *Ausw. Neuer Gew. Venez.* 8. t. 2.—Venezuela.
erythroxantha, Reichb. f. in *Linnaea*, xxii. (1849) 817.—N. Granat.
Falkenbergii, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1880) i. 232.—N. Granat.
Gardneri, Benth. in *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 491.—Bras.
guttulata, Lindl. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 357.—Ecuador.
hypolepta, Reichb. f. in *Walp. Ann.* vi. 204.—Bras.
Kegeli, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 133.—Guian.
Lansbergii, Hook. *Bot. Mag.* t. 5257 = *xanthophthalma*.
Lansbergii, Reichb. f. & *Wagen.* in *Bonplandia*, ii. (1854) 23.—Venezuela.
lonchophylla, Rodrig. *Orch. Nov.* i. 35.—Bras.
maculata, Lindl. *Orchid. Linden.* 4.—N. Granat.
microphylla, Rodrig. *Rev. de Engenh.* iii. (1881) 110; *ex ej. Orch. Nov.* ii. 115.—Bras.
Miersii, Reichb. f. in *Wawra, Bot. Ergeb. Maxim. Bras.* 150.—Bras.
muscifera, Reichb. f. ex Lindl. *Fol. Orchid. Restrep.* 2.—Guatemala.
nuda, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xx. (1852) 275 = *Pleurothallis hemirhoda*.
ophiocephala, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 88.—Mexic.
parvifolia, Lindl. *Orchid. Linden.* 4 = *Brachionidium parvifolium*.
proreper, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) i. 810.—Costa Rica.
punctulata, Lindl. *Fol. Orchid. Restrep.* 2 = *elegans*.
Reichenbachiana, Endres, in *Gard. Chron.* (1875) ii. 356.—Costa Rica.
rhynaeantha, Reichb. f. & *Warsz.* in *Bonplandia*, ii. (1854) 114.—Peruv.
Schlimii, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 45.—N. Granat.
tentaculata, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* i. 34. t. 59.—Peruv.
ujarensis, Reichb. f. in *Bonplandia*, iii. (1855) 225.—Costa Rica.
varicosa, Lindl. *Fol. Orchid. Restrep.* 3.—Peruv.
vittata, Lindl. in *Journ. Hort. Soc.* iii. (1848) 314 = *Pleurothallis hemirhoda*.
Wagneri, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 23.—Venezuela.
xanthophthalma, Reichb. f. in *Hamb. Gartenz.* xxi. (1865) 300.—Guatemala.

RESUPINARIA, Rafin. *Sylva Tellur.* 115 (1838) = **Sesbania**, Scop. (Legumin.).
grandiflora, Rafin. l. c. 116 = *S. grandiflora*.

RETAMA, Rafin. *Sylva Tellur.* 22 (1838); Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 143 (1839) = **Genista**, Tourn. (Legumin.).
albiflora, Rafin. l. c. 22 = *Cytisus albus*.
angulata, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 5.—Europ. austr.
atlantica, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 172 = *G. atlantica*.
Bovei, Webb, *Otia Hisp.* 24 = *G. monosperma*.
dasyarpa, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 57, nomen = *G. dasyarpa*.
Duriaei, Webb, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xx. (1843) 279 = *G. Duriaei*.
Gussonei, Webb, l. c. 280 = *G. monosperma*.
hipponensis, Webb, *Otia Hisp.* 25.—Hispan.
lutea, Rafin. *Sylva Tellur.* 22 = *G. sphaerocarpa*?
microcarpa, Webb, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xx. (1843) 280.—Ins. Canar.
monosperma, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 144 = *G. monosperma*.
parviflora, Webb, *Otia Hisp.* 23 = *G. parviflora*?
Raetam, Webb & Berth. *Phyt. Canar.* ii. 56 = *G. Raetam*.
rhodorhizoides, Webb & Berth. l. c. 54 = *G. rhodorhizoides*.
Spachii, Webb, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xx. (1843) 281 = *G. rhodorhizoides*.
sphaerocarpa, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 144 = *G. sphaerocarpa*.
Webbii, Webb, *Otia Hisp.* 24; Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 57 = *G. monosperma*.

RETAMILIA, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* v. (1860) 483; *Contrib. i.* 285 = **Retanilla**, Brongn. (Rhamn.).

RETANILLA, Brongn. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* x. (1827) 364. t. 2. **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 384.
MOLINAEAE, Comm. ex Brongn. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* x. (1827) 364.
RETAMILIA, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* v. (1860) 483.
affinis, C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 26 = *stricta*.
articulata, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* v. (1860) 486.—Chili.
crassa, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 38.—Chili.
Ephedra, Brongn. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* x. (1827) 365.—Peruv.
glauca, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 37.—Chili.
obcordata, Brongn. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* x. (1827) 365.—Peruv.
spinifer, C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 27.—Chili.
stricta, Hook. & Arn. in *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 173.—Chili.
trinervia, Hook. & Arn. l. c. 174 = *Trevoa trinervis*.

RETINARIA, Gaertn. *Fruct.* ii. 187. t. 120. f. 4 (1791) = **Gouania**, Linn. (Rhamn.).
scandens, Gaertn. l. c. = *G. tiliaefolia*.
volubilis, Gaertn. l. c. t. 120. f. 4 = *G. tiliaefolia*.

RETINIPHYLLUM, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* i. 86. t. 25 (1808). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 98.
AMMIANTHUS, Spruce, ex Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 98 (1873).
COMMANTHUS, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 223.
concolor, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 8.—Bras.
discolor, Muell. *Arg. l. c.* 11.—Bras.
Martianum, Muell. *Arg. l. c.* 9.—Bras.
pallidum, Muell. *Arg. l. c.* 12.—Bras.
pilosum, Muell. *Arg. l. c.* 7.—Bras.
rhabdocalyx, Muell. *Arg. l. c.* 10.—Bras.
scabrum, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 222.—Venezuela.
Schomburgkii, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 12.—Bras.
secundiflorum, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* i. 86. t. 25.—Venezuela.
speciosum, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 10.—Bras.
truncatum, Muell. *Arg. l. c.* 11.—Bras.

- RETINISPORA, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 36. tt. 121–123 (1842) = *Thuya*, Linn. (Conif.).
andelyensis, Carr. in Rev. Hortic. (1880) 178 = *Cupressus thuyoides* (cf. Addend.).
decurvata, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 141 = *T. orientalis*.
decussata, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 364 = *T. orientalis*.
Devriesiana, Hort. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 495 = *T. occidentalis*.
dubia, Carr. Conif. ed. II. 141 = *T. occidentalis*.
Ellwangeriana, Carr. in Rev. Hortic. (1869) 349 = *T. occidentalis*.
ericoides, Zucc. ex Gord. Pinet. Suppl. 91 = *T. orientalis*, occidentalis.
filioides, Hort. Syme, in Gard. Chron. (1876) i. 235. f. 40 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).
flifera, Fowler, in Gard. Chron. (1872) 1490; Stand. ex Gord. Pinet. ed. II. 364 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).
Fusinoki, Zucc. ex Gord. Pinet. Suppl. 95 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).
glauca, Hort. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 495 (Quid?).—Hab.?
japonica, Hort. l. c. (Quid?).—Hab.?
juniperoides, Carr. Conif. ed. II. 140 = *T. orientalis*.
leptoclada, Zucc. ex Gord. Pinet. Suppl. 91 = *Cupressus thuyoides* (cf. Addend.).
lycopodioides, Gord. l. c. 92 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).
meldensis, Carr. Conif. ed. II. 103 = *T. occidentalis*.
monstrosa, Hort. ex Carr. l. c. 132 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).
obtusa, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 38. t. 121 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).
pisifera, Sieb. & Zucc. l. c. 39. t. 122 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).
plumosa, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 791; Veitch, ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 170 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).
Pseudo-squarrosa, Carr. Conif. ed. II. 140 = *Cupressus thuyoides* (cf. Addend.).
recurvata, Hort. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 495 = *T. orientalis*.
rigida, Carr. Conif. ed. II. 141 = *T. orientalis*.
squarrosa, Hort. ex Carr. l. c. 140, 141 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).
squarrosa, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 40. t. 123 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).
stricta, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 428 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).
tetragona, Barron, ex Gord. l. c. 429 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).
- RETINODENDRON, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 55. t. 8 (1839) = *Vatica*, Linn. (Dipteroc.).
lanceaeifolium, Korth. l. c. 56 = *V. lanceaeifolia*.
pauciflorum, Korth. l. c. 58 = *V. pauciflora*.
Rassak, Korth. l. c. 56. t. 8 = *V. Rassak*.
- RETINOPHLEUM, Benth. & Hook. f. Gen. i. 570 (1865), sphalm. = RHETINOPHLOEUM, Karst. = *Cercidium*, Tul. (Legumin.).
- RETINOSPORA, Carr. Conif. ed. I. 132 (1855) = RETINISPORA, Sieb. & Zucc. = *Thuya*, Linn. (Conif.).
- RETTBERGIA, Raddi, Agrost. Bras. 17 (1823) = *Chusquea*, Kunth (Gramin.).
bambusaoides, Raddi, l. c. = *C. Gaudichaudii*.
capitata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 489 = *C. capitata*.
- RETZIA, Thunb. in Phys. Sällsk. Handl. Stockh. i. (1776) i. 55. t. 1. SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 905.
 SOLENOTIGMA, Klotzsch, ex Walp. Rep. iii. 125 (1844–45).
campanuloides, Spreng. Syst. i. 589.—Afr. austr.
capensis, Thunb. in Phys. Sällsk. Handl. Stockh. i. (1776) i. 55. t. 1.—Afr. austr.
pilosa, Rottl. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 403 = *Convolvulus Rottlerianus*.
roelloides, Spreng. Syst. i. 589.—Afr. austr.
spicata, J. F. Gmel. Syst. 333 = *capensis*.
- REUSSIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 33 (1818) = *Paederia*, Linn. (Rubiace.).
sarmentosa, Dennst. l. c. = *P. tomentosa*.

- REUSSIA, Endl. Gen. 139 (1836). PONTEDERIA-CEAE.
subovata, Solms, in DC. Monog. Phan. iv. 534.—Am. austr.
triflora, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 96.—Bras.
- REUTERA, Boiss. Elench. 46 (1838) = *Pimpinella*, Riv. (Umbell.).
acuminata, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 52 = *P. acuminata*.
albiflora, Costa, Supl. Fl. Catal. 304.—Hispan.
aurea, Boiss. Fl. Orient. ii. 863 = *P. aurea*.
catalaunica, Costa, ex Nym. Consp. 309 = *gracilis*.
cervariaefolia, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 134 = *P. aurea*?
deverroides, Boiss. l. c. 135 = *P. deverroides*.
dichotoma, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 863.—Persia.
flabellifolia, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 135.—Cappadoc.
flava, Boiss. l. c. 135 = *P. aurea*.
Fontanesii, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 244 = *P. lutea*.
gracilis, Boiss. Elench. 46.—Hispan.
papillaris, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 76.—Afghan.
pastinacaeifolia, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 134.—Persia.
procumbens, Boiss. Elench. 47.—Hispan.
puberula, Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Arag. 44 = *gracilis*.
rigidula, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. ii. 77 = *P. chrysantha*.
tenuis, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 862.—Cataonia.
tragiodes, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 135.—Persia.
- REVEESIA, Walp. Ann. i. 105 (1848–49), sphalm. = *Reevesia*, Lindl. (Stercul.).
- REVERCHONIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 107. EUPHORBIAEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1222.
arenaria, A. Gray, l. c.—Texas.
- REYESIA, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 418. t. 52 (1849). SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 909.
 PTEROGLOSSIS, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. v. (1850) 32.
chilensis, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 419.—Chili.
- REYNANDIA, Kunth, Rév. Gram. 195. t. 9 (1830). GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1120.
filiformis, Kunth, l. c.—Ins. S. Doming.
- REYNOLDSIA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 723. t. 92, 93 (1854) = *Trevesia*, Vis. (Araliac.).
pleiosperma, A. Gray, l. c. 725. t. 93.—Ins. Samoa.
sandwicensis, A. Gray, l. c. 724. t. 92.—Ins. Sandvic.
tahitensis, Nadeaud, Enum. Pl. Tahiti, 63.—Ins. Tahiti.
verrucosa, Seem. in Journ. Bot. ii. (1864) 245.—Ins. Tahiti.
- REYNOSIA, Griseb. Cat. Pl. Cub. 33 (1866). RHAMNEAE.
latifolia, Griseb. l. c. 34.—Cuba.
mucronata, Griseb. l. c. 34, 283.—Cuba.
retusa, Griseb. l. c. 34.—Cuba.
- REYNOUTHRIA, Steud. Nom. ed. I. 684 (1821) = seq.
- REYNOUTRIA, Houtt. Handleid. viii. 639. t. 51 (1777). INC. SEDIS.
japonica, Houtt. l. c. 640.—Japan.
- RHABBARBARUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 277 (1763) = *Rheum*, Linn. (Polygon.).
palmatum, Moench, Meth. 628 = *Rheum palmatum*.
Rhaponticum, Moench, l. c. = *Rheum Rhaponticum*.
Ribes, Moench, l. c. = *Rheum Ribes*.
- RHABDADENIA, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 173. t. 52 (1860). APOCYNACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 727.
barbata, Miers, Apocyn. S. Am. 123.—Ind. occ.
Berteri, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 435.—Ins. S. Doming.
biflora, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 175.—Am. austr.

- RHABDADENIA :—
campestris, Miers, Apocyn. S. Am. 121.—Bras.
cordata, Miers, l. c. 122.—Mexic.
cubensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 435.—Ind. occ.
Ehrenbergii, Muell. Arg. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 415 = *Echites paludosa*.
Iaxiflora, Miers, Apocyn. S. Am. 120.—Ind. occ.
Lindeniana, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 437.—Cuba.
lucida, Miers, Apocyn. S. Am. 123.—Venezuela.
macrostoma, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 435.—Guian.
madida, Miers, Apocyn. S. Am. 121.—Bras.
nervosa, Miers, l. c. 122.—Ind. occ.
paludosa, Miers, l. c. 119.—Bras.
Pohlui, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 174.—Bras.
Sagraei, Muell. Arg. in Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 415 = *Echites Sagraei*.
Wrighteana, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 435 = *Mandevilla Wrighteana* (in Addend.).
- RHABDIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 136. t. 195 (1827). BORAGINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 842.
 ROTULA, Lour. Fl. Cochinch. 121 (1790).
crebrifolia, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. ii. (1868) 435; Contrib. ii. 222. t. 84 = *lycioides*.
fluviialis, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 175 = *lycioides*.
lycioides, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 136. t. 195.—As. Afr. et Am. trop.
sericea, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 176 = *lycioides*.
viminea, Dalz. ex Hook. Ic. Pl. t. 823 = *lycioides*.
- RHABDOCALYX, Lindl. Veg. Kingd. 629 (1847) = *Cordia*, Linn. (Borag.).
- RHABDOCHLOA, Kunth, in Mém. Mus. Par. ii. (1815) 73 = RABDOCHLOA, Beauv. = *Leptochloa*, Beauv. (Gramin.).
- RHABDOCRINUM, Reichb. Consp. 65 (1828) = *Lloydia*, Salisb. (Liliac.).
gracum, Reichb. l. c. = *L. graeca*.
serotinum, Reichb. l. c. = *L. alpina*.
- RHABDOSCIADIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 68. UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 898.
Aucherii, Boiss. l. c. 69.—Persia.
petiolare, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 899.—Persia.
stenophyllum, Boiss. & Haussk. l. c. 898.—Persia.
- RHABDOSTIGMA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 109 (1873). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. l. c.
Kirkii, Hook. f. l. c.—Afr. trop.
- RHABDOTHAMNUS, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 460. GESNERACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1011.
negriana, F. Muell. Fragm. vii. 152 = *Negria rhabdOTHAMNUS*.
scabrosus, Steud. Nom. ed. II. ii. 443 = seq.
Solandri, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 460.—N. Zel.
- RHABDOTHECA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 424 (1827) = *Launaea*, Cass. (Compos.).
angustifolia, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia arabica*).—Alger.
asplenifolia, Webb, in Hook. Niger Fl. 146 = *L. asplenifolia*.
Brunnera, Webb, l. c. 147 = *Sonchus Brunneri*.
Candolleana, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia Candolleana*).—Alger.
Cassiniana, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 286 (= *Zollikoferia Cassiniana*).—Abyss.
chondrilloides, Webb, in Hook. Niger Fl. 146 = *L. nudicaulis*.
divaricata, Webb, l. c. = *L. nudicaulis*.
longiloba, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia longituba*).—Alger.
nudicaulis, Pomel, l. c. 262 = *L. nudicaulis*.
picridioides, Webb, in Hook. Niger Fl. 146.—Ins. Cap. Virid.
prenanthoides, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 286 = *Sonchus prenanthoides*.

RHABDOTHECA:—

- pumila*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia pumila*).—Alger.
quercifolia, Pomel, l. c. (= *Zollikoferia quercifolia*).—Alger.
resedifolia, Pomel, l. c. = *Launaea nudicaplis*.
Rueppellii, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 286.—Afr. trop.
sonchoides, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 425 = *L. nudicaulis*.
spinosa, Webb, in Hook. Niger Fl. 147 = *L. spinosa*.
squarrosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia arabica*).—Alger.
tenuiloba, Pomel, l. c. (= *Zollikoferia tenuiloba*).—Alger.

RHACHICALLIS, Spach, Hist. Veg. Phan. viii. 374 (1839) = *Rachicallis*, DC. (Rubiace.).

RHACOMA, Adans. Fam. ii. 117 (1763) = *Leuzea*, DC. (Compos.).

RHACOMA, Linn. Syst. ed. X. 896 (1759) = *Myginda*, Linn. (Celastr.).
Crossoptalum, Linn. l. c. = *M. Rhacoma*.
Uragoga, Baill. Hist. Pl. vi. 27 = *M. Uragoga*.

RHADAMANTHUS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 37 (1866). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 808. convallarioides, *Salisb. l. c.*—Afr. austr.

RHADINOCARPUS, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 108 = *Chaetocalyx*, DC. (Legumin.).
acutifolius, Vog. l. c. 111 = *C. acutifolia* (cf. Addend.).
brasiliensis, Vog. l. c. 110 = *C. brasiliensis*.
multiflorus, Vog. l. c. 108.—N. Granat.

RHADIOLA, Savi, in Giorn. Tosc. Sc. Med. Fis. Nat. i. (1840) 194, err. typ. = *Radiola*, Dill. (Lineae).

RHAEO, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 316 (1881), err. typ. = *Rhoeo*, Hance (Commel.).

RHAGADIOLUS, Tourn. ex Scop. Introd. 122 (1777). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 510. GARHADOLUS, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 119. tt. 284, 285 (1849).

HEDYNOIS, Schreb. Gen. 552 (1791).
arenarius, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 510.—Marocc.
creticus, All. Fl. Pedem. i. 226 = *R. Hedynois*.
edulis, Gaertn. Fruct. ii. 354.—Reg. Mediterr.; Oriens.
Hedynois, All. Fl. Pedem. i. 226 = Reg. Mediterr.
Hedynois, Fisch. & Mey. ex Fisch. Mey. & Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 46.—Armenia; Persia.
intermedius, Tenore, Fl. Med. ii. 25 = *edulis*.
Koelpinia, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. (1795) 265 = *Koelpinia linearis*.
Kolpinia, Lam. Illustr. iii. 234 = *praeac.*
lampsanaefolius, Mirb. Hist. Nat. Pl. xi. [1805] 328 = *edulis*.
lampsanoides, Desf. Fl. Atlant. ii. 234 = *edulis*.
lyratus, Lam. Illustr. iii. 234 = *edulis*.
pendulus, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 510.—Reg. Mediterr.
radiatus, All. Fl. Pedem. i. 227 = *Hyoseris radiata*.
rigidus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 17 = *edulis*.
scaber, All. Fl. Pedem. i. 226 = *Hyoseris scabra*.
stellatus, DC. Prod. vii. 80, in syn. = *Hyoseris radiata*.
stellatus, Gaertn. Fruct. ii. 354 = *edulis*.
taraxacoides, All. Fl. Pedem. i. 227 = *Leontodon hirtus*, hispidus.
Zacintha, All. l. c. = *Zacintha verrucosa*.

RHAGANUS, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 216 (1843) = *Bersama*, Fresen. (Sapind.).
lucidus, E. Mey. l. c.; et in Flora, xxxii. (1849) 67.—Afr. austr.

RHAGODIA, R. Br. Prod. 408 (1810). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 49.
baccata, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 50 = *Billardieri*.
Billardieri, R. Br. Prod. 408.—Austral.
Candolleana, Moq. Chenop. Enum. 10 = *Billardieri*.
chenopodioides, Moq. l. c. 11 = *Billardieri*?
congesta, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 51 = *Billardieri*.
crassifolia, R. Br. Prod. 408.—Austral.
dioica, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 636.—Austral.
Drummondii, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 52 = *crassifolia*.
Eschscholtziana, Fenzl, in Denkschr. Akad. Wien, (Math.-Nat.) i. (1850) 257.—Ins. Sandvic.

RHAGODIA:—

- Gaudichaudiana*, Moq. Chenop. Enum. 11.—Austral.
hastata, R. Br. Prod. 408.—Austral.
linifolia, R. Br. l. c. 408.—Austral.
linifolia, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 637 = *Preissii*.
nitrariacea, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 73 = *Chenopodium nitrariaceum*.
nutans, R. Br. Prod. 408.—Austral.
obovata, Moq. Chenop. Enum. 10.—Austral.
parabolica, R. Br. Prod. 408.—Austral.
parvifolia, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 52 = *crassifolia*.
Preissii, Moq. l. c. 49.—Austral.
prostrata, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. v. 156 = *spinescens*.
radiata, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 637 = *Billardieri*.
reclinata, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. v. 153 = *parabolica*.
spinescens, R. Br. Prod. 408.—Austral.

RHAMINDIUM, Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) 39 (1884), err. typ. = *Rhamnidium*, Reiss. (Rhamn.).

RHAMNELLA, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 30 (1867) = *Microrhamnus*, A. Gray (Rhamn.).
japonica, Miq. l. c. = *M. franguloides*.

RHAMNIDIUM, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 94. t. 31 (1861). *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. i. 378.
cognatum, Reiss. l. c. 95.—Bras.
elaecarpum, Reiss. l. c. 94.—Bras.
glabrum, Reiss. l. c. 95.—Bras.
molle, Reiss. l. c.—Bras.
reticulatum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 33.—Cuba.
retusum, Griseb. l. c. 32.—Cuba.
revolutum, Chapm. Fl. S. St. Suppl. 612 = *Reynosia latifolia*.
revolutum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 32.—Cuba.

RHAMNOIDES, Tourn. ex Moench, Meth. 343 (1794) = *Hippophaë*, Linn. (Elaeagn.).
Hippophaë, Moench, l. c. = *H. Rhamnoides*.

RHAMNOPSIS, Reichb. Consp. 188 (1828) = *Flacourtia*, Comm. (Bixin.).
sepiaria, Reichb. l. c. = *F. sepiaria*.

RHAMNOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.

RHAMNUS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 58 (1737). *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. i. 377.

ALATERNUS, Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).
 AMPELOPLIS, Rafin. Sylva Tellur. 33 (1835).
 ATADINUS, Rafin. l. c. 30 (1838).
 ATULANDRA, Rafin. l. c. 31 (1838).
 CERVISIPIN, [Dill.] Moench, Meth. 686 (1794).
 ENDOTROPIS, Rafin. Sylva Tellur. 31 (1838).
 FORGEROUXA, Neck. Elem. ii. 124 (1790).
 FRANGULA, Tourn. ex Hall. Enum. Helv. i. 164 (1742); et Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).
 GIRTANNERIA, Neck. Elem. ii. 121 (1790).
 HETTLINGERIA, Neck. l. c. 124 (1790).
 LITHOPLIS, Rafin. Sylva Tellur. 32 (1838).
 MARCORELLA, Neck. Elem. ii. 122 (1790).
 PALIURUS, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).
 PERFONON, Rafin. Sylva Tellur. 29 (1838).
 SARCOMPHALUS, Rafin. l. c. (1838).
 SCIADOPHILA, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 618.
 VERLANGIA, Neck. Elem. ii. 125 (1790).
acuminata, Colebr. in Roxb. Fl. Ind. i. 615 = *Colubrina asiatica*.
adriatica, Jord. ex Nym. Consp. 145 = *intermedia*.
agrestis, Lour. Fl. Cochinch. 197 = *Zizyphus agrestis*.
affinis, Blume, Bijdr. 1140.—Java.
africana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *Noltea africana*.
Alaternus, Linn. Sp. Pl. 193.—Reg. Mediterr.; As. Min.
alnifolia, L'Hérit. Sert. Angl. 5.—Am. bor.
alnifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 166 = *Purshiana*.
alnoides, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 621 = *R. Frangula*.

RHAMNUS:—

alpina, Linn. Sp. Pl. 193.—Europ.; Afr. bor.
alpina, Pall. Fl. Ross. ii. 23 = *grandifolia*.
alpina, Richards, in Frankl. Journ. App. 734 = *alnifolia*.
alpina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 158 = *fallax*.
amygdalina, Desf. Fl. Atlant. i. 198 = *oleoides*.
amygdalina, Moris, Stirp. Sard. Elench. fasc. i. 11 = *persicaefolia*.
angulata, Pers. Syn. i. 240 = *Zizyphus angulata*.
angustifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 17 = *R. Alaternus*.
aphylla, Gmel. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 443 = *Noaea spinosissima*.
aragonensis, [Asso.] Syn. Arag. 27 = *lycioides*.
arenicola, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 76 = *Scutia arenicola*.
arguta, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. x. (1866) n. XI. 6.—China.
Arnottiana, Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 74.—Zeylan.
asiatica, Lam. Encyc. iv. 474 = *Colubrina asiatica*.
asplenifolia, Carr. in Rev. Hort. (1872) 195 = *incana*, Carr.?
australis, Pers. Syn. i. 241 = *Paliurus aculeatus*.
balearica, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 443 = *R. Alaternus*.
balearica, Hort. Par. ex Link, Handb. ii. 121 = *R. Frangula*?
balearica, Willk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 112.—Hispan.
baptica, Decne. ex Rondot, Vert de Chine, 58, nomen (Quid?).—China.
biflora, D. Dietr. Syn. Pl. i. 807, sphalm. = seq.
biniflora, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 26 = *Karwinskia Humboldtiana*.
Boissieri, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 18 = *prunifolia*.
brasiliensis, Spreng. Syst. i. 768 = *Ilex pubiflora*.
Buergeri, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 31.—Japan.
burgundiaca, Desf. Tabl. ed. II. 202 = *hybrida*.
buxifolia, Poir. Voy. Barb. ii. 127.—Afr. bor.
californica, Eschsch. in Mém. Acad. Pétersb. x. (1823) 285.—Calif.; Mexic.
canadensis, Hort. ex Koch, Dendrol. i. 610 = *caroliniana*.
capensis, Spreng. Syst. i. 767 = *Elaeodendron croceum*.
capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 44 = *Scutia Commersonii*.
capillaris, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 483 = *lycioides*.
capreaefolia, Schlecht. in Linnaea, xx. (1841) 464.—Mexic.
cardiocarpa, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 276 = *tinctoria*.
cardiosperma, Willd. ex DC. Prod. i. 24 = *tinctoria*.
carniolica, Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xv. (1870) 282 = *saxatilis*.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 101.—Am. bor.
carpinifolia, Pall. Fl. Ross. i. ii. 24. t. 10 = *Zelkova crenata*.
cassinoides, Lam. Encyc. iv. 474.—Ins. S. Doming.
castaneifolia, Hort. ex Lebas, in Rev. Hort. (1867) 306.—Hab.?
cathartica, Linn. Sp. Pl. 193.—Europ. As. et Afr. bor.
cathartica, Pall. Reise, iii. 423 = *dahurica*.
celtifolia, Thunb. Prod. Pl. Cap. 44.—Afr. austr.
Chacaye, Domb. ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 366 = *Discaria serratifolia*.
chlorophora, Decne. in Compt. Rend. Par. xlv. (1857) 1141 = *tinctoria*.
cinerascens, Blume, Bijdr. 1141.—Java.
circumcissa, Linn. f. Suppl. 152 = *Scutia Commersonii*.
circumcissa, Russ. ex Wall. Cat. n. 4245 C = *Zizyphus Jujuba*.
Clusii, Willd. Enum. Hort. Berol. 250 = *R. Alaternus*.
collina, Salisb. Prod. 139 = *R. Alaternus*.
colubrina, Jacq. Enum. Pl. Carib. 16; Linn. Sp. Pl. ed. II. 280 = *Colubrina ferruginosa*.
coriacea, Brouss. in Roem. & Schult. Syst. v. 291; Nees, Hor. Phys. Berol. 114. t. 22 = *integrifolia*.
coriacea, Buch. in Abh. Berl. Akad. 1816–17 (1819), 382 = *racemosa*.
coriacea, Willd. ex Spreng. Syst. i. 768 (= *Mespilodaphne glauca*).—Bras.

RHAMNUS:—

cornifolia, Boiss. & Hohen. *Diagn.* Ser. I. ix. 1.—Kurdist.; Persia.
 corymbosa, Vahl, ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 294 = Sageretia corymbosa.
 costata, Maxim. in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VII. x. (1866) n. xi. 17.—Japon.
 crenata, Baker & S. Moore, in *Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 380 = parvifolia.
 crenata, Sieb. & Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* iv. ii. (1843) 146.—Japon.
 crenulata, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. i. 263.—Ins. Teneriff.
 Crini, Orph. ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 20 = fallax.
 crocea, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 261.—Am. bor. occ.
 cubensis, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 16 = Ceanothus cubensis.
 cubensis, Pers. *Syn.* i. 240 = Rhus lineatifolia.
 cumanensis, Loefl. *It. Hisp.* 182.—Venezuela.
 cuneata, Dougl. in *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 124 = Ceanothus cuneatus.
 cuneifolia, Poir. *Encyc. Suppl.* iv. 89 = oleoides.
 dahurica, Pall. *Reise*, iii. 721 (dahurica).—Ind. or.; As. bor.
 Dalanta, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 121 = Zizyphus Dalanta.
 diffusa, Clos, in *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 18.—Chili.
 divaricata, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 204 = Zizyphus Spina-Christi.
 domingensis, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 17 = Ceanothus reclinator.
 Drummondii, Young, *Fl. Texas*, 204 = Colubrina texensis.
 elegans, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 53 = Sageretia elegans.
 elliptica, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 50 = Ceanothus reclinator.
 Ephedra, Domb. ex DC. *Prod.* ii. 29 = Retanilla Ephedra.
 erythroxylla, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 133 = R. Erythroxyllum.
 Erythroxyllum, Georgi, *Beschr. Russ. Reich. Nachtr.* 262; Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 168 = Pallasii.
 Erythroxyllum, Pall. *Reise*, iii. 722.—Sibir.
 fallax, Boiss. *Diagn.* Ser. II. v. 73.—Graecia.
 ferrea, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 41 = Scutia ferrea.
 ferruginea, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 90 = Colubrina ferruginosa.
 filiformis, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 153 = Sageretia oppositifolia.
 Frangula, Linn. *Sp. Pl.* 193.—Europ.; As. et Afr. bor.
 franguloides, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 153 = alnifolia.
 franguloides, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 295 = californica.
 glabrata, Heyne, in *Wall. Cat. n.* 7479 = Zizyphus rugosa.
 glandulosa, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. i. 265.—Ins. Canar.
 globosa, Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* 14 = tinctoria.
 globosa, Sieb. & Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* iv. ii. (1843) 146 = japonica.
 glomerata, Hook. ex Benth. *Pl. Hartw.* 9 = Colubrina glomerata.
 Goudotiana, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 379.—N. Granat.
 graeca, Boiss. & Reut. *Diagn.* Ser. II. v. 74.—Graecia.
 graeca, Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 14 = punctata.
 grandifolia, Fisch. & Mey. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 504.—Reg. Caucas.
 guayaquilensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 54.—Ecuador.
 Guicciardii, Heldr. & Sart. ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 20 = Sibthorpiana.
 hederacea, Delort. ex Nym. *Consp.* 145 = R. Alaternus.
 Helderichii, Boiss. *Diagn.* Ser. II. i. 120.—As. Min.
 heterogenea, Burm. f. *Fl. Ind.* 61 = Zizyphus Spina-Christi.
 hirsuta, Wight & Arn. *Prod.* 165 = dahurica.
 hirtella, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 15.—As. Min.
 hispanica, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* i. 617 = R. Alaternus.
 horrida, Salisb. *Prod.* 139 = Paliurus aculeatus.
 Humboldtiana, Roem. & Schult. *Syst.* v. 295 = californica.
 humifusa, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 142 = saxatilis.
 hybrida, L'Hérit. *Sert. Angl.* 5.

RHAMNUS:—

hydiensis, Hacq. *Pl. Alp.* t. 2 = pumila.
 iguanaea, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 16; Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 282 = Celtis aculeata.
 iguanaea, Vell. *Fl. Flum.* 96; ii. t. 147.—Bras.
 ilicifolia, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 37 = crocea.
 illyrica, Griseb. ex Pant. in *Verh. Ver. Nat.-Heilk.* Presb. ii. (1871-72) 110 = graeca.
 incana, Carr. in *Rev. Hort.* Sér. IV. vii. (1858) 657.—Gall. austr.
 incana, Roxb. *Hort. Beng.* 17; *Fl. Ind.* i. 603.—Ins. Molucc.
 inebrians, R. Br. in *Salt, Abyss. App.* 64 = R. Staddo?
 inermis, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 133 = alpina.
 infectoria, Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I. 148 = intermedia.
 infectoria, Linn. *Mant.* i. 40.—Europ. austr.
 infectoria, Tchihat. *Asie Min. Bot. Atl.* t. 9 = petiolaris.
 infusionum, Delile, in *Ferr. & Galin. Voy. Abyss.* iii. 111 = R. Staddo.
 insularis, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 20 (insulus) = crocea.
 integrifolia, DC. *Cat. Hort. Monsp.* 136.—Ins. Canar.
 integrifolia, Spreng. ex Meissn. in *DC. Prod.* xv. i. 97 (= Mespilodaphne glauca).—Bras.
 intermedia, Steud. & Hochst. in *Flora*, x. (1827) 74.—Europ.
 japonica, Maxim. in *Mem. Acad. Pétersb.* Sér. VII. x. (1806) n. xi. 11.—Japon.
 javanica, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 647.—Java.
 Jujuba, Linn. *Sp. Pl.* 194 = Zizyphus Jujuba.
 kurdica, Boiss. & Hohen. *Diagn.* Ser. I. ii. 3.—Mesopot.; Persia.
 laevigata, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 41 = Reynosia latifolia.
 lanceolata, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 166.—Am. bor.
 Lando, Llanos, *Fragm.* 57 (Quid?).—Ins. Philipp.
 latifolia, L'Hérit. *Sert. Angl.* 5. t. 8.—Ins. Azor.
 laurifolia, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 260 = californica.
 leprosa, Blume, *Bijdr.* 1139.—Java.
 libanotica, Boiss. *Diagn.* Ser. II. i. 119.—As. Min.; Syria.
 Lindeniana, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 379.—N. Granat.
 linearis, Clos, in *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 19.—Chili.
 linearis, Sessé & Moc. ex Brongn. in *Ann. Sc. Nat.* Sér. I. x. (1827) 367 = Adolphia infesta.
 lineata, Linn. *Cent. Pl.* ii. 11; *Amoen. Acad.* iv. 308 = Berchemia lineata.
 lineata, Lour. *Fl. Cochinch.* 159 = Berchemia Loureiriana.
 lineatifolia, Roem. & Schult. *Syst.* v. 294 = Rhus lineatifolia.
 littoralis, Siebold, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 30 = Paliurus ramosissimus.
 longifolia, [Desf.] *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. II. vi. 260.—Am. bor.
 longifolia, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 3 = saxatilis.
 Lotus, Linn. *Sp. Pl.* 194 = Zizyphus Lotus.
 lucida, Roxb. *Hort. Beng.* 86; *Fl. Ind.* i. 605 = Scutia Commersonii.
 lucida, Salisb. *Prod.* 139 = Zizyphus sativa.
 lycioides, Brot. *Fl. Lusit.* i. 300 = oleoides.
 lycioides, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 279.—Reg. Mediterr. occ.
 lycioides, Pall. *Fl. Ross.* ii. 26 = Pallasii.
 Lycium, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 163 = infectoria, saxatilis.
 macrophylla, Carr. in *Rev. Hort.* (1876) 159.—China.
 madagascariensis, Pourr. ex Baill. *Adansonia*, i. (1860-61) 252 = Gelonium adenophorum.
 major, Carr. in *Rev. Hort.* (1874) 355 = californica?
 mauritiana, Soyer-Willem. in *Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 20 = Zizyphus Jujuba.
 micrantha, Linn. *Syst.* ed. X. 937 = Trema micrantha.
 microcarpa, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 20.—Reg. Caucas.
 microphylla, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 295.—Mexic.
 microphylla, Roxb. *Fl. Ind.* i. 613 = Zizyphus rotundifolia.
 minor, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 2 = infectoria.
 minutiflora, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 154 = Sageretia Michauxii.
 montana, Rosten. in *Feuill. Jeunes Nat.* x. (1879-80) 132, nomen = alpina?

RHAMNUS:—

mucronata, Schlecht. in *Linnaea*, xv. (1841) 465.—Mexic.
 myrtifolia, Willk. in *Linnaea*, xxv. (1852) 18.—Hispan.
 myrtina, Burm. f. *Fl. Ind.* 60 = Scutia Commersonii.
 mystacina, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. i. 266 = Helinus mystacinus.
 Nabeca, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 204 = Zizyphus Spina-Christi.
 nana, Carr. in *Rev. Hort.* (1874) 355 = californica.
 Napeca, Linn. *Sp. Pl.* 194 = Zizyphus Napeca.
 neapolitana, Link. *Handb.* ii. 120 (Quid?).—Italia.
 nemoralis, Salisb. *Prod.* 139 = R. Frangula.
 Nerija, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 86 = Elaeodendron glaucum.
 nipalensis, M. Laws. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 640.—Reg. Himal.
 nummularia, Burm. f. *Fl. Ind.* 61 = Zizyphus rotundifolia.
 obscura, Schrank, in *Syll. Ratisb.* i. (1824) 202.—Ind. occ.
 obtusifolia, Hook. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 685 = Zizyphus obtusifolia.
 Oenoplia, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 279 = seq.
 Oenoplia, Linn. l. c. ed. I. 194 = Zizyphus Oenoplia.
 oleifolia, Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 123. t. 44 = californica.
 oleoides, Lam. *Fl. Fr.* ii. 545 = infectoria.
 oleoides, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 279.—Reg. Mediterr.
 oppositifolia, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 26 = Luvunga eleutherandra.
 oreigenes, Hance, in *Journ. Bot.* vii. (1869) 114; viii. (1870) 312 = crenata.
 palaestina, Boiss. *Diagn.* Ser. II. i. 119.—Syria; Arab.
 Paliurus, Linn. *Sp. Pl.* 194 = Paliurus aculeatus.
 Pallasii, Fisch. & Mey. in *Ind. Sem. Hort.* iv. 46.—Reg. Caucas.
 paniculata, Thonn. ex DC. *Prod.* ii. 30 = Chaillertia toxicaria?
 parviflora, Klein & Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 295 = Sageretia oppositifolia.
 parvifolia, Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* 14.—China.
 parvifolia, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 262 = lanceolata.
 parvifolia, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. vii. 150 = dahurica.
 pauciflora, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 137.—Abyss.
 pentapetala, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 131 = R. Frangula.
 pentaphylla, Jacq. *Obs. Bot.* ii. 17 = Rhus pentaphylla.
 persica, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 4.—Persia; Reg. Himal.
 persicaefolia, Moris, *Stirp. Sard. Elench.* fasc. ii. 2.—Ins. Sardo.
 peruviana, Hort. ex Lam. *Encyc.* iii. 320 = Maytenus octogona.
 petiolaris, Boiss. & Bal. *Diagn.* Ser. II. v. 75.—As. Min.; Syria.
 picensis, Duval-Jouve, in *Mém. Acad. Montp.* ix. (1878), reimpr. 12.—Gallia.
 polifolia, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 41 = Phyllica ramosissima.
 polygama, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 17.—Ind. occ.
 polymorpha, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 713 = dahurica.
 pontica, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 21.—As. Min.
 prinifolia, Salisb. *Prod.* 139 = prinoides.
 prinoides, L'Hérit. *Sert. Angl.* vi. t. 9.—Afr. austr.
 procumbens, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 43.—Reg. Himal.
 prunifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 157.—Graecia.
 prunifolia, Sieber, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 444 = oleoides.
 pubescens, Poir. *Encyc.* iv. 464 = infectoria.
 pubescens, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* iii. 33 = Sibthorpiana.
 pubescens, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 379 = Ceanothus pubescens.
 pumila, Linn. *Mant.* i. 49.—Europ.
 pumila, Wulf. in *Jacq. Coll.* ii. 141. t. 11 = rupestris.
 punctata, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 4.—Syria; Cilicia.
 purpurea, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 44.—Reg. Himal.
 Purshiana, DC. *Prod.* ii. 25.—Am. bor.
 pusilla, Tenore, *Prod. Fl. Neap.* 16 = pumila.

RHAMNUS:—

- quitensis, *Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst.* v. 295.—Ecuador.
quitensis, Spreng. *Syst.* i. 769 = *Ilex paraguensis*.
racemosa, *Duham. Arb. ed. Nov.* iii. 48.—Hab. ?
ramiflora, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792) 107.—Guian.
ramosissima, Auct. ex Steud. *Nom. ed. I.* 686; ed. II. ii. 444 = *Paliurus ramosissimus*.
recta, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 204 = *Zizyphus Spina-Christi*.
repens, Page, *Prod. Southampt. Bot. Gard.* 23; Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* i. 614 = *pumila*.
Retamilla, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* v. (1860) 483 = seq.
Retanilla, Domb. ex DC. *Prod.* ii. 29 = *Retanilla obcordata*.
robusta, Hort.—*Cf. Rev. Hort.* (1879) 100.—Hab. ?
rotundifolia, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. II.* iv. 260 = *R. Alaternus*.
rotundifolia, Pers. *Syn.* i. 240 = *Zizyphus Xylopyrus*.
ruffa, *Vell. Fl. Flum.* 96; ii. t. 148.—Bras.
rumeliacea, Frivald. in *Flora*, xviii. (1835) 332 = *rupestris*.
rupestris, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 133 = *microcarpa*.
rupestris, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 169, nomen = *procumbens*.
rupestris, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 164. t. 5.—Europ. or.
rupestris, Vill. *Hist. Pl. Dauph.* ii. 538 = *pumila*.
sanguinea, Pers. *Syn.* i. 239 = seq.
Sanguino, Orteg. *Hort. Matr.* Dec. 87 = *R. Frangula*.
Saqui, Domb. ex Brongn. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I. x.* (1827) 366 = *Discaria serratifolia*.
Sarcomphalus, Linn. *Syst. ed. X.* 937 = *Sarcomphalus laurinus*.
saxatilis, Host, *Syn.* 119 = *infectoria*.
saxatilis, Jacq. *Enum. Stirp. Vindob.* 39, 212.—Europ. austr.
saxatilis, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 158 = *graeca*.
scandens, Hill, *Hort. Kew.* 453 = *Berchemia volubilis*.
scandens, Spreng. *Syst.* i. 768 = *Tralliana scandens*.
septicpetala, Mart. *Herb. Fl. Bras. n.* 1085.—Bras.
sempervirens, Hort. ex Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. II.* iv. 258 = *hybrida*.
senticosa, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 54.—Peruv.
serrata, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 295.—Mexic.
serrulata, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 51. t. 617 = *praec.*
Shortii, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 91 = *lanceolata*.
Sibthorpiana, Roem. & Schult. *Syst.* v. 286.—Graecia.
sicula, Linn. *Syst. ed. XII.* iii. App. 229 = *Argania Sideroxylon*.
sinensis, Ser. ex Rondot, *Vert de Chine*, 53 = *dahurica*.
Sladdo, Walp. *Ann.* ii. 267, sphalm. = *R. Staddo*.
soporifera, Lour. *Fl. Cochinch.* 158 = *Zizyphus sativa*.
Spartium, Domb. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 512 = *Discaria serratifolia*.
spatulacifolia, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 46.—Reg. Caucas.
sphaerosperma, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 50.—Ind. occ.
spiciflora, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 138.—Abyss.
Spina-Christi, Linn. *Sp. Pl.* 195 = *Zizyphus Spina-Christi*.
spinosa, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 132 = *cathartica*.
spinosa, Hensl. *Diagn. Pl. Nov.* 6.—Panama.
splendens, Blume, *Bijdr.* 1140.—Java.
Staddo, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 138.—Abyss.
subsempervirens, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* i. 614 = *pumila*.
surinamensis, Scop. *Delic. Pl. Insubr.* iii. 10. t. 5.—Guian.
sylvaticus, Serres, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 436 = *cathartica*.
Talanai, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 170.—Ins. Philipp.
Teidis, Brouss. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 291, in obs. = *integrifolia*.
terminalis, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 190 = *Sageretia oppositifolia*.
terniflora, [Moc. & Sesse] ex DC. *Prod.* ii. 26.—Mexic.
tetragona, Linn. f. *Suppl.* 153; Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 42 = *Cassine scandens*.

RHAMNUS:—

- texensis*, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 263 = *Colubrina texensis*.
Thea, Osbeck, *It.* 232 = *Sageretia theezans*.
theezans, Linn. *Mant.* ii. 207 = *Sageretia theezans*.
tinctoria, Mutel, *Fl. Fr.* i. 218 = *infectoria*.
tinctoria, Waldst. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* iii. 283. t. 255.—Europ. or.; As. Min.
tomentella, Benth. *Pl. Hartw.* 303 = *californica*.
transsilvanica, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 21 = *tinctoria*.
trigyna, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 190 = *Sageretia oppositifolia*.
trinervis, Cav. *Ik.* vi. 3 = *Zizyphus exserta*.
tripartita, Ucria, in *Roem. Arch.* i. i. (1796) 68 = *Rhus albid.*
triquetra, Wall. in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 376.—Reg. Himal.
ulmoides, Gueldenst. ex Ledeb. *Fl. Ross* iii. 645 = *Zelkova crenata*.
umbellata, Cav. *Ik.* vi. 2. t. 504 = *californica*.
uninervis, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 333 = *oleoides*.
utilis, Decne. in *Compt. Rend. Par.* xlv. (1857) 1141 = *dahurica*.
valentina, Willd. *Sp. Pl.* i. 1096 = *pumila*.
velutina, Boiss. *Elench. Pl. Nov. Hisp.* 29 = *lycioides*.
venosa, Lam. ex Poir. *Encyc.* iv. 474 = *Ceanothus reclinatus*.
Villarsii, Link, *Handb.* ii. 120 = *pumila*.
Villarsii, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 18 = *infectoria*.
virgata, Maxim. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII.* x. (1866) n. xi. 13 = *parvifolia*.
virgata, Roxb. *Hort. Beng.* 17; *Fl. Ind.* i. 604 = *dahurica*.
virginicus, Page, *Prod. Bot. Southamp. Gard.* 23 (Quid ?).—Am. bor.
vitiensis, Benth. *Fl. Austral.* i. 413 = *Dallachya vitiensis*.
Vitis-idea, Burm. f. *Fl. Ind.* 61 = *Breynia rhamnoides*.
volubilis, Linn. f. *Suppl.* 132 = *Berchemia volubilis*.
vulgaris, Pers. *Syn.* i. 240 = *Zizyphus sativa*.
Wichellii, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* i. 604 = *cathartica*.
Wicklia, Hort. ex C. Koch, l. c. = *cathartica*.
Wightii, Wight & Arn. *Prod.* 164.—Ind. or.
Wihhor, Luce, in *Ind. Hort. Dorpat.* (1824) 6; et in *Topog. Nachr. Oesel*, 62 = *cathartica*.
Willdenowiana, Roem. & Schult. *Syst.* v. 295 = *longifolia*.
Wulfeni, [Hoppe, in] *Flora*, vi. (1823) 173 = *rupestris*.
Wulfenii, Roth, *Enum. Pl. Phan. Germ.* i. 745 = *pumila*.
xanthocarpa, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* i. 605 = *cathartica*.
xylopyra, Retz. *Obs.* ii. 11 = *Zizyphus Xylopyrus*.
Zeyheri, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 477.—Afr. austr.
Zeyheri, Spreng. ex Sond. l. c. 230, Add. 20 = *Elaeodendron croceum*.
zizyphoides, Spreng. *Fl. Hal. Mant.* 37 = *Alphitonia excelsa*.
Zizyphus, Linn. *Pl. Pl.* 194 = *Zizyphus sativa*.
zonulata, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 172 = *Zizyphus Xylopyrus*.
- RHAMPHICARPA**, Penth. in Hook. *Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 368. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 969.
MACROSIPHON, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) 373.
Camerouniana, Oliver, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1876) 95.—Afr. trop.
curviflora, Benth. in Hook. *Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 368.—Madag.
fistulosa, Benth. in DC. *Prod.* x. 504 = *longiflora*.
Herzfeldiana, Vatke, in *Linnaea*, xliii. (1880–82) 311.—Afr. trop.
Heuglinii, Hochst. ex Schweinf. *Beitr. Fl. Aethiop.* 100.—Afr. trop.
humilis, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) 101 = *Cycnium humifusum*.
longiflora, Benth. in Hook. *Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 368.—Ind. or.; Austral.
recurva, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 122.—Afr. trop.
serrata, Klotzsch, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 228.—Afr. trop.
tubulosa, Benth. in Hook. *Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 368.—Afr. austr.
veronicaefolia, Vatke, in *Linnaea*, xliii. (1880–82) 312.—Afr. trop.

- RHAMPHIDIA**, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 181 = *Hetaeria*, Blume (Orchid.).
alsinefolia, Lindl. l. c. 182 = *Myrmechis gracilis*.
discoidea, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 59.—N. Caled.
elongata, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 181 = *H. elongata*.
Gardneri, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 313 = *H. Gardneri*.
grandiflora, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 182 = *Myrmechis glabra*.
Mannii, Reichb. f. *Otia Bot. Hamb.* 109.—Afr. trop.
ovalifolia, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 181 = *H. ovalifolia*.
rubens, Lindl. l. c. 182 = *H. rubens*.
rubicunda, Reichb. f. in *Seem. Fl. Vit.* 294 = *Goodyera rubicunda*.
scripta, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 59.—N. Caled.
tenuis, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 182 = *H. tenuis*.
Vieillardii, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 58.—N. Caled.

- RHAMPHOSPERMUM**, Andr. ex Bess. *Enum. Pl. Volh.* 83 (1822) = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).
album, Andr. ex Reichb. in *Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1186 = *B. alba*.
arvense, Andr. ex Bess. *Enum. Pl. Volh.* 83 = *B. Sinapis*.
orientale, Andr. l. c. = *B. Sinapis*.
volgense, Andr. ex Rupr. *Fl. Ingr.* 97 = *B. juncea*.

- RHANTERIUM**, Desf. *Fl. Atlant.* ii. 291. t. 240 (1799). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 338.
adpressum, Coss. & Dur. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 252.—Alger.
epapposum, Oliver, in Hook. *Ik. Pl.* t. 1367.—Beluchist.
intermedium, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 37 = *adpressum*.
suaveolens, Desf. *Fl. Atlant.* ii. 291. t. 240.—Afr. bor.

- RHAPHANOS**, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 65, 133 = *Raphanus*, Tourn. (Crucif.).
landrus, St. Lag. l. c. 133 = *Raphanus Landra*.

- RHAPHEDOSPERA**, Wight, *Ik.* t. 1554 (1850), sphalm. = **RHAPHIDOSPORA**, Nees = *Justicia*, Houst. (Acanth.).

- RHAPHIA**, Auct. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 445 (1841) = *Raphia*, Beauv. (Palm.).

- RHAPHIDIOCYSTIS**, Hook. f. in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* ii. 553 (1871) = *Raphidiocystis*, Hook. f. (Cucurb.).

- RHAPHIDOPHORA**, Hassk. in *Flora*, xxv. (1842) ii. Beibl. 11, partim; Schott, *Gen. Aroid.* t. 77 (1858). *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 992.
RHAPHIDOPHORA, Hassk. in Hoev. & De Vriese, *Tijdschr.* ix. (1842) 168.
affinis, Schott, *Prod. Aroid.* 385.—Reg. Himal.
amplissima, Schott, in Miq. *Ann. Mus. Lugd. Bat.* i. 129 = *Epipremnum amplissimum*.
angulata, Schott, *Prod. Aroid.* 379 = *montana*.
angustata, Engl. in DC. *Monog. Phan.* ii. 241 = *montana*.
angustata, Schott, in Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 128.—Sumatra.
angustifolia, Schott, in *Bonplandia*, v. (1857) 45.—Malaya; N. Guin.
Beccarii, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 181.—Borneo.
Calophyllum, Schott, *Prod. Aroid.* 380 = *R. Peepla*.
caudata, Schott, l. c. 382 = *Epipremnum mirabile*.
conica, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 181.—N. Guin.
Cunninghamii, Schott, in *Bonplandia*, ix. (1861) 367 = *Epipremnum mirabile*.
decursiva, Schott, l. c. v. (1857) 45.—Ind. or.
dilacerata, Koch, in Regel, *Gartenfl.* (1864) 5. t. 423 = *decursiva*.
eximia, Schott, in *Bonplandia*, v. (1857) 45; *Prod. Aroid.* 387.—Reg. Himal.
fallax, Schott, in Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 128 = *montana*.
glaucua, Schott, in *Bonplandia*, v. (1857) 45.—Reg. Himal.
grandis, Schott, in Oestr. *Bot. Zeitschr.* viii. (1855) 349 = *eximia*.

RHAPHIDOPHORA :—

- honkongensis*, Schott, Prod. Aroid. 378 = *angustifolia*. Hookeri, Schott, l. c. 381.—Reg. Himal.
Huegelii, Schott, l. c. 384 = *Epipremnum medium*.
insignis, Schott, Gen. Aroid. t. 77 = *eximia*?
Korthalsiana, Herb. Lugd. Bat. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 250 = *Epipremnum medium*.
Korthalsii, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 129.—Malaya.
lacera, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 11 = *Epipremnum mirabile*.
lanceifolia, Schott, Prod. Aroid. 380.—Reg. Himal.
lingulata, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.—Java.
Lobbii, Schott, Prod. Aroid. 379.—Malaya.
maxima, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 269.—Borneo.
megastigma, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 180.—Sumatra.
montana, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 128.—Java.
oblongifolia, Schott, l. c. 123 = *spathacea*.
Peepia, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.—Ind. or.; Malaya.
Peepia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 336 = *pertusa*.
pertusa, Schott, Prod. Aroid. 382.—As. trop. [Austral.; Ins. Pacif.].
pinnata, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45 = *Epipremnum mirabile*.
pinnatifida, Schott, l. c. = *Epipremnum mirabile*?
pteropoda, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 268.—N. Guin.
puberula, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 180.—Sumatra.
spathacea, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 129.—Java.
Storckiana, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 346.—Ins. Fiji.
sylvestris, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 239 = *angustifolia*.
tenuis, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 181.—Borneo.
vitiensis, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 367 = *Epipremnum mirabile*.
Wallichii, Schott, Prod. Aroid. 383 = *Epipremnum mirabile*.
Zippeliana, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lug. Bat. i. 129 = *Epipremnum asperatum*.

RHAPHIDOPHYLLUM, Benth. in DC. Prod. x. 521 (1846) = **RAPHIDOPHYLLUM**, Hochst. = **Sopubia**, Buch.-Ham. (Scrophul.).

RHAPHIDOSPERMA, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 559 (1839), sphalm. = seq.

RHAPHIDOSPORA, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 115 (1832) = **Justicia**, Houst. (Acanth.).
abyssinica, Nees, in DC. Prod. xi. 500 = *J. glabra*.
ciliata, Nees, l. c. = *J. pubigera*.
cordata, Nees, l. c. 499 = *J. cordata*.
dichotoma, Nees, l. c. 500 = *Dianthera dichotoma*.
glabra, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 115 = *J. glabra*.
leptantha, Nees, in DC. Prod. xi. 501 = *J. leptantha*.
membranifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 850.—Java.
tenella, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 515 = *Dianthera collina*.
tenella, Nees, in DC. Prod. xi. 501.—Java.
vestita, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 559 = *Nelsonia campestris*.

RHAPHIODON, Schau. in Flora, xxvii. (1844) 345 = **Hyptis**, Jacq. (Labi.).
Echinus, Schau. l. c. = *H. Sideritis*.

RHAPHIOLEPIS, Poir. in Dict. Sc. Nat. xv. 314 (1827) = **Raphiolepis**, Lindl. (Rosac.).

RHAPHIONACME, C. Muell. in Walp. Rep. vi. 480 (1846–47) sphalm. = **Raphionacme**, Harv. (Asclep.).

RHAPHIOPHALLUS, Schott, Gen. Aroid. t. 27 (1858). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 972. Hohenackeri, Schott, l. c.—Ind. or.

RHAPHIOSTYLIS, Planch. ex Benth. in Hook. Niger Fl. 259 (1849) = **Apodytes**, E. Mey. (Olc.).
beninensis, Planch. ex Benth. l. c. 259 = *A. beninensis*.
Heudelotii, Planch. ex Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. ix. (1852) 391 = *A. beninensis*.

RHAPHIS, Lour. Fl. Cochinch. 552 (1790) = **Chrysopogon**, Trin. (Gramin.).

- acicularis*, Desv. Opusc. 69 = *C. aciculatus*.
arguta, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 391 = *C. argutus*.
arundinacea, Desv. Opusc. 69 = *Sorghum halepense*.
arundinacea, Llanos, in Mem. Acad. Cienc. Madr. ii. (1859) 499.—Ins. Philipp.
ciliolata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = *C. serrulatus*.
coerulescens, Desv. Opusc. 69 = *C. violascens*.
coeruleus, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417, nomen; et ex Steud. Syn. Pl. Gram. 395 = *C. serrulatus*.
echinulata, Nees, l. c. 417; 397 = *C. Gryllus*.
glaucia, Nees, ex Steud. l. c. = *C. montanus*.
Gryllus, Desv. Opusc. 69 = *C. Gryllus*.
javanica, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = *C. aciculatus*.
microstachya, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417; et ex Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = *C. violascens*.
muricata, Nees, l. c. 416; 394 = *Andropogon squarrosus*.
orientalis, Desv. Opusc. 69 = *C. Wightianus*.
repens, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = *C. montanus*.
Royleana, Nees, l. c. = *C. Gryllus*.
stricta, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 99 = *Andropogon intermedius*.
trivalvis, Kunth, Enum. Pl. i. 505, sphalm. = seq.
trivalvis, Lour. Fl. Cochinch. 553 = *C. aciculatus*.
villosula, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = *C. violascens*.
Wightiana, Nees, ex Steud. l. c. 395 = *C. Wightianus*.
zeylanica, Nees, ex Steud. l. c. 397 = *C. Arnottianus*.

RHAPHIS, Walp. Ann. iii. 471 (1852), sphalm. = **Rhapis**, Linn. f. (Palm.).

RHAPHISPERMUM, Benth. in DC. Prod. x. 509 (1848). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 973.
gerardioides, Benth. in DC. Prod. x. 509.—Madag.

RHAPHISTEMMA, Meissn. Gen. 268 (1840) = **Raphistemma**, Walt. (Asclep.).

RHAPHISTEMUM, Walp. Ann. i. 506 (1848–49) sphalm. = *praeac.*

RHAPHITAMNUS, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1870) 95. t. 26. **VERBENACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1149.
POEPPIGIA, Bert. ex Bull. Férussac, xxiii. (1830) 109.

- amoenus*, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1870) 97.—Chili.
buxifolius, Miers, l. c. 98.—Chili.
cyanocephalus, Miers, l. c. 96. t. 26.—Chili.
longiflorus, Miers, l. c. 98.—Chili.
parvifolius, Miers, l. c. 99.—Chili.
serratifolius, Miers, l. c. 99.—Chili.

RHAPIDOPHYLLUM, H. Wendl. & Drude, in Bot. Zeit. xxxiv. (1876) 803. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 925.
Hystrix, H. Wendl. & Drude, l. c.—Florida.

RHAPIDOSPORA, Reichb. Nom. 110 (1841), sphalm. = **RHAPHIDOSPORA**, Nees = **Justicia**, Houst. (Acanth.).

RHAPIS, Linn. f. in Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 473 (1789). **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 930.
RHAPHIS, Walp. Ann. iii. 471 (1852), sphalm.
acaulis, Willd. Sp. Pl. iv. 1093 = *Sabal Adansonii*.
arundinacea, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 474; ed. II. v. 474 = *Rhapidophyllum Hystrix*.
aspera, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 624 (Quid?).—Hab.?
caroliniana, Hort. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 246 = *Rhapidophyllum Hystrix*.
cochinchinensis, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 254.—Cochinch.
cordata, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 624 (Quid?).—Hab.?
flabelliformis, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 473.—China; Japon.

RHAPIA :—

- humilis*, Blume, Rumphia, ii. 54.—China.
javanica, Blume, l. c. 56.—Java.
Kwanwortsik, H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 34 = *flabelliformis*.
major, Blume, Rumphia, ii. 55.—China.
Sirotsik, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 255 = *humilis*.

RHAPONTICA, Hill, Veg. Syst. iv. 47 (1762) = seq.

RHAPONTICUM, [Vaill.] Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 687 (1742) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
acaule, DC. Prod. vi. 664 = *C. Chamaerhapticum*.
argentatum, Moench, Meth. 562 = *C. glastifolia*.
atriplicifolium, DC. Prod. vi. 663 = *Serratula atriplicifolia*.
Behen, Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl. ii. 606 = *C. Behen*.
Calcitrapa, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 136 = *C. Calcitrapa*.
canariense, DC. Prod. vi. 664 = *C. cynaroides*.
caspium, Karel. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 751 = *nitidum*.
caulescens, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 251; xxii. (1875) 62 = *C. Cossoniana*.
centauroides, G. Don, ex Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1440 = *C. centauroides*.
ciliatum, Lam. Fl. Fr. ii. 39 = *C. nigra*.
cynaroides, Less. Syn. Comp. 6 = *Cnicus cynaroides*.
dahuricum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1838) 96 = *C. monantha*.
davuricum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 751 = *praeac.*
deltoidum, G. Don, ex Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1440 = *Serratula atriplicifolia*.
doronicifolium, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 287.—Sibir.
eriphorum, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 135 = *C. eriphora*.
heleniifolium, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 239 = *C. Rhaponticum*.
Jacea, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 136 = *C. Jacea*.
karatavicum, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 320.—Turkestan.
lyratum, Nym. Consp. 416 = *C. Rhaponticum*.
nitidum, Fisch. in DC. Prod. vi. 664.—Reg. Casp.
Pallasii, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 360, nomen = *C. Rhaponticum*.
paniculatum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 136 = *C. paniculata*.
pulchrum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 36 = *C. pulchra*.
pungens, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 415 = *Serratula atriplicifolia*.
pusillum, Boiss. Fl. Orient. iii. 592 = *C. pygmaea*.
pygmaeum, DC. Prod. vi. 665 = *C. pygmaea*.
salinum, Less. in Linnaea, ix. (1835) 179 = *C. salina*.
scariosum, Lam. Fl. Fr. ii. 38 = *C. Rhaponticum*.
uniflorum, DC. Diss. Comp. 33 = *C. monantha*.

RHAPTOCARPUS, Miers, Apocyn. S. Am. 151 (1878) = **Echites**, P. Br. (Apocyn.).
apiculatus, Miers, l. c. 153 = *E. coalita*.
coalitus, Miers, l. c. 152 = *E. coalita*.
didymus, Miers, l. c. = *E. didyma*.
Martii, Miers, l. c. = *E. Martii*.
odoriferus, Miers, l. c. 151 = *E. odorifera*.

RHAPTOMERIS, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 41 = **Cyclea**, Am. (Menisp.).
Burmanni, Miers, l. c. = *C. Burmannii*, peltata.

RHAPTONEMA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xx. (1867) 261. **MENISPERMACEAE**.
cancellata, Miers, l. c. 262.—Madag.

RHAPTOPETALUM, Oliver, in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 159. t. 12. **OLACINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 995.
coriaceum, Oliver, l. c. 160.—Afr. trop.
Soyauxii, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1405.—Afr. trop.

RHAPTOSTYLUM, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 139. t. 125 (1809) = **Heisteria**, Jacq. (Olc.).
acuminatum, Humb. & Bonpl. l. c.—N. Granat.
pentandrum, Benth. ex Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 77 = *H. pentandra*.

RHAZYA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 80. *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 703.
orientalis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 386.—Graecia.
stricta, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 80.
—Arabia; Afghan.

RHEA, Endl. Ench. 241, in syn. (1841) = *REA*, Bert. = *Dendroseris*, D. Don (Compos.).

RHEEDEA, Linn. Gen. ed. I. 364 (1737) = seq.

RHEEDIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 1193 (1753). *GUTTI-FERAE*, Benth. & Hook. f. i. 175.
CHLOROMYRON, Pers. Syn. ii. 73 (1807).
LAMPROPHYLLUM, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1853) 249. t. 26.
VERTICILLARIA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 81. t. 15 (1794).

acuminata, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv.* (1860) 314.—Peruv.

americana, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 446 = lateriflora.

aristata, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 38.—Ind. occ.

Benthiana, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv.* (1860) 320 = macrophylla.

brasilensis, *Planch. & Triana, l. c.* 310.—Bras.

calyptata, *Planch. & Triana, l. c.* 311.—Bras.

Commersonii, *Planch. & Triana, l. c.* 312.—Madag.

Cupi, *Planch. & Triana, l. c.* 323.—Am. austr.

edulis, *Planch. & Triana, l. c.* 310.—Panama.

elliptica, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 9.—Cuba.

floribunda, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv.* (1860) 319.—Bras.

fruticosa, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 38.—Cuba.

Gardneriana, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv.* (1860) 321.—Bras.

javanica, *Burm. f. Fl. Ind.* 118 (Quid?).—Java.

lateriflora, Bert. ex DC. Prod. i. 516 = Sloanea Berteriana.

lateriflora, *Linn. Sp. Pl.* 1193.—Am. trop.

longifolia, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv.* (1860) 322.—Bras.

macrophylla, *Planch. & Triana, l. c.* 309.—Bras.

Madruno, *Planch. & Triana, l. c.* 315.—N. Granat.

parviflora, *Planch. & Triana, l. c.* 323.—Guian.

Pervillei, *Planch. & Triana, l. c.* 312.—Madag.

pulvinata, *Planch. & Triana, l. c.* 320.—N. Granat.

ruscifolia, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1861) 167.—Ind. occ.

Sieberi, *Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève.* xii. (1851) 427.—Ins. Trinit.

Smeathmanii, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv.* (1860) 312.—Afr. trop.

virens, *Planch. & Triana, l. c.* 317.—Guian.

RHEITHROPHYLLUM, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 123 (1844) = seq.

RHEITROPHYLLUM, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 56 = *Aeschynanthus*, Jack (Gesner.).
subverticillatum, Hassk. l. c. = *A. angustifolia*.

RHEKTOPHYLLUM, N. E. Br. in Journ. Bot. xx. (1882) 194. t. 230. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 981.
mirabile, *N. E. Br. l. c.* 195.—Afr. trop.

RHESA, Walp. Rep. i. 538 (1842), sphalm. = *BHESA*, Buch.-Ham. = *Kurrimia*, Wall. (Celastr.).

RHETINODENDRON, Meissn. Gen. 216; Comm. 136 (1839). *COMPOSITAE* [Benth. & Hook. f. ii. 442].
BALBISIA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 333.
INGENHOUIA, Bert. ex DC. Prod. vi. 447 (1837).
VENDREDIA, Baill. Hist. Pl. viii. 264 (1882).
Berteroi, *Hemsl. Bot. Voy. Challenger*, i. III. 39.—Ins. J. Fernand.

RHETINOLEPIS, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 707 = *Anthemis*, Mich. (Compos.).
lonadioides, Coss. l. c. 708.—Alger.

RHETINOPHLOEUM, Karst. Fl. Columb. ii. 25. t. 113 (1862?) = *Cercidium*, Tul. (Legumin.).
viride, Karst. l. c.—N. Granat.

VOL. II.

RHEUM, Linn. Syst. ed. I (1735). *POLYGONACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 100.

acuminatum, *Hook. f. & Thoms. in Bot. Mag.* t. 4877.—Reg. Himal.

aplostachyum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 442 = rhizostachyum.

australe, D. Don, Prod. Fl. Nep. 75 = Emodi.

austricum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 161, nomen (Quid?).—Europ.

caspicum, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 382 = tataricum.

Collinianum, Baill. in Rev. Hort. (1883) 420.—China.

compactum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 442 = R. Rhaponticum.

compactum, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 531.—Mongol.

cordatum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 446 (Quid?).—Hab.?

crassinervium, *Fisch. ex Lindl. Med. Fl.* 950.—Hab.?

crispum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 161, nomen = Rumex crispus?

cruentum, *Siev. in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 294.—Sibir. altaic.

cuneatum, *Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvii. (1864) I. 387, nomen.—Turkestan.

dentatum, Mart. Ind. Sem. Hort. Monac. (1839).—Cf. Linnaea, xiv. (1840) Litt. 135 = hybridum.

digynum, Wahlenb. Fl. Lapp. 101. t. 9. f. 2 = Oxyria digyna.

Emodi, *Wall. Cat. n.* 1727.—Reg. Himal.

Emodi, *Wall. l. c.* 1727 C = Webbiana.

Emodium, *Wall. ex Nees & Eberm. Med.-Pharm.* Bot. ii. 455 = Emodi.

esculentum, *Salisb. Prod.* 257 = R. Rhaponticum.

Fedtschenkoi, *Maxim. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch.* 77.—Turkestan.

fenestratum, *Loud. Hort. Brit.* 161 (Quid?).—Hab.?

Franzenbachii, *Muent. in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 212.—As. temp.

hybridum, *Murr. in Nov. Comm. Gotting.* ii. v. 1774 (1775) 50. t. 11.—Mongolia.

leucorrhizum, *Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop.* x. (1797) 381.—Sibir.

macropterum, *Mart. Ind. Sem. Hort. Monac.* (1848); ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 33.—Hab.?

microcarpum, *Meissn. l. c.*—Hab.?

Moorcroftianum, *Meissn. l. c.* 36 = spiciforme.

Moorcroftianum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 315, 318.—Reg. Himal.

muricatum, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 327 = undulatum.

nanum, *Sievers, ex Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop.* x. (1797) 381 = leucorrhizum.

nobile, *Hook. f. & Thoms. Illustr. Himal. Pl.* t. 19.—Reg. Himal.

nutans, *Pall. Fl. Ross.* ii. I. (Index) = compactum.

officinale, *Baill. Adansonia*, x. (1871-72) 246; xi. (1873-76) 229.—Tibet.

palmatum, *Linn. Syst. ed. X.* 1010.—Mongol.

pumilum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvi. (1880) 503.—China.

racemiferum, *Maxim. l. c.*—Mongol.

Rhabarbarum, *Linn. Sp. Pl.* 372 = undulatum.

Rhaponticum, *Delarb. Fl. Auv.* ed. II. 527 = Rumex alpinus.

Rhaponticum, *S. G. Gmel. ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 497 = tataricum.

Rhaponticum, *Linn. Sp. Pl.* 371.—Sibir.

rhizostachyum, *Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Pétersb.* x. (1842) 254.—Soongaria.

Ribes, *Linn. Sp. Pl.* 372.—Syria; Persia; Afghan.

rotundatum, *Stokes, Bot. Mat. Med.* ii. 429 = R. Rhaponticum.

rotundifolium, *Fisch. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 440 (Quid?).—Hab.?

rugosum, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 389.—Hab.?

sanguineum, *Hort. Halens. ex Meissn. in DC. Prod.* xiv. 33 = macropterum.

sibiricum, *Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 264; Fl. Ross. ii. I. (Index) = R. Rhaponticum.

songaricum, *Schrenk. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* ii. (1844) 114.—Soongaria.

spiciforme, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 318. t. 78.—Reg. Himal.

tataricum, *Linn. f. Suppl.* 229.—Tartaria.

tetragonopus, *Mart. Ind. Sem. Hort. Monac.* (1839).—Cf. Linnaea, xiv. (1840) Litt. 135.—Hab.?

undulatum, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 531.—As. med.

RHEUM :—

undulatum, *Pall. Reise*, iii. 317, 322 = R. Rhaponticum.

uninerve, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvi. (1880) 503.—Mongol.

Webbiana, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 318. t. 78 A.—Reg. Himal.

RHEXIA, Linn. Coroll. Gen. 6. (1737). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 747.

acerosa, *Schrank & Mart. ex DC. Prod.* iii. 125 = Marcetia acerosa.

Acisanthera, *Linn. Syst. ed. X.* 998 = Acisanthera quadrata.

Acisanthera, *Willd. Sp. Pl.* ii. 303 = Acisanthera recurva.

acuminata, *Schrank, ex DC. Prod.* iii. 139 = Pyramia pityrophylla.

adamantium, *A. St. Hil. ex Humb. & Bonpl. Rhex.* 157. t. 60 = Cambessedesia Hilariana.

agrestis, *Mart. & Schrank, ex DC. Prod.* iii. 126 = Microlicia agrestis.

Agrostemma, *Mart. & Schrank, l. c.* 133 = Tibouchina gracilis.

alata, *Raddi, in Mem. Soc. Ital. Mod.* xviii. Fis. (1820) 387 = Tibouchina granulosa.

alba, *Mart. & Schrank, ex DC. Prod.* iii. 104 = Lavoisiera alba.

Alifanus, *Walt. Fl. Carol.* 130 = glabella.

alpestris, *Mart. ex DC. Prod.* iii. 140 = Pterolepis alpestris.

alsinefolia, *Schrank & Mart. l. c.* 118 = Acisanthera alsinaefolia.

alternans, *Schrank & Mart. l. c.* 120 = Microlicia serpyllifolia.

amazonum, *Schrank, ex DC. l. c.* 123 (= Pachyloma coriaceum).—Bras.

angustifolia, *Nutt. Gen. Am. i.* 244 = lanccolata.

angusturensis, *Humb. & Bonpl. Rhex.* 77. t. 29 = Pterolepis glomerata.

anomala, *Schrank & Mart. ex DC. Prod.* iii. 109 = Macairea rufescens.

aquatica, *Sw. Fl. Ind. Occ.* ii. 650; *Humb. & Bonpl. Rhex.* 104. t. 40 = Nepsera aquatica.

arcuata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 502 (Index), lapsu = armata.

arenaria, *Schrank & Mart. ex DC. Prod.* iii. 114 = Siphantaria arenaria.

arenariaefolia, *Mart. & Schrank, l. c.* 120 = Microlicia arenariaefolia.

armata, *Spreng. Syst.* ii. 308 = Chaetostoma diosmoides.

aspera, *Voigt, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 55 (sp. dub.).—Hab.?

aspera, *Willd. Sp. Pl.* ii. 304 = Tibouchina aspera.

aurea, *Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ.* 35 = lutea.

avicularis, *Schrank & Mart. ex DC. Prod.* iii. 119 = Microlicia cinerea.

axillaris, *Pav. ex DC. l. c.* 101 = Meriana prunifolia.

baccharoides, *Schrank & Mart. ex DC. l. c.* 119 = Microlicia baccharoides.

balsamifera, *Mart. & Schrank, l. c.* 110 = Microlicia balsamifera.

berberifolia, *Humb. & Bonpl. Rhex.* 110. t. 42 = Comolia berberifolia.

bicolor, *Andr. ex D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1822) 301 = Aciotis discolor.

bicornis, *Roland. ex Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn.* i. (1778) 278 = Acisanthera recurva.

bicuspis, *Schrank, ex DC. Prod.* iii. 123 (= Pachyloma coriaceum).—Bras.

bidentata, *Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. I. (1824) 53 = Cambessedesia Hilariana.

bilocularis, *Schrank & Mart. ex DC. Prod.* iii. 114 = Piptanthera paludosa.

bivalvis, *Vahl, Eclog. Am. i.* 38 = Acisanthera brevifolia.

blepharocentra, *Mart. ex DC. Prod.* iii. 103 = Lavoisiera imbricata.

Bonplandii, *Humb. & Bonpl. Rhex.* 159 (Index) = Monochaetum Bonplandii.

bracteolaris, *Schrank & Mart. in DC. Prod.* iii. 141 = Marcetia bracteolaris.

brasiliensis, *Vand. Fl. Lusit.* 23.—Bras.

brasiliensis, *Hoffgg. Verz. Pf.* 75 = Luehea speciosa.

brevifolia, *Rich. ex DC. Prod.* iii. 117 = Acisanthera trivalvis.

RHEXIA:—

- Bucardia*, Schrank, ex DC. Prod. iii. 110 = *Cambessedesia latevenosa*.
calcarata, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 431 = *Monochaetum Candolleianum*.
campanularis, Humb. & Bonpl. Rhex. 35. t. 14 = *Brachyotum campanulare*.
Candolleana, Mart. ex DC. Prod. iii. 129 = *Tibouchina Candolleana*.
canescens, Humb. & Bonpl. Rhex. 14. t. 6 = *Brachyotum canescens*.
canescens, Humb. & Bonpl. l. c. 47. t. 18 = *Monochaetum Bonplandii*.
capitata, Rich. in Humb. & Bonpl. l. c. 84. t. 32 = *Pterolepis glomerata*.
cardinalis, Humb. & Bonpl. l. c. 96. t. 37 = *Tibouchina cardinalis*.
cataphracta, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 102 = *Lavoisiera imbricata*.
caudata, Schrank & Mart. l. c. 186 = *Miconia urophylla*.
cerastifolia, Schrank & Mart. l. c. 137 = *Tibouchina cerastifolia*.
cernua, Humb. & Bonpl. Rhex. 32. t. 13 = *Brachyotum cernuum*.
Chamaecistus, Sieber, ex DC. Prod. iii. 134 (= *Pleroma Chamaecistus*).—Bras.
chamaedrifolia, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 111 = *Cambessedesia Espora*.
Christophoriana, Schrank & Mart. l. c. 107 = *Rhynchanthera dichotoma*.
ciliata, Mart. l. c. 103 = *Lavoisiera imbricata*.
ciliosa, Michx. Fl. Bor. Am. i. 221.—Am. bor.
cinerea, Mart. ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia cinerea*.
circaeifolia, Humb. & Bonpl. Rhex. 101. t. 39 = *Aciotis circaeifolia*.
Cochobambae, Schrank & Mart. ex DC. iii. 120 = *Microlicia oligantha*.
cognata, Weinm. in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 20.—Hab.?
collina, Salzm. ex Triana, in *Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1873) 43 = *Tibouchina Lhotzkyana*.
compta, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 103 = *Lavoisiera imbricata*.
condylocarpa, Beurl. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1856) 124 = *Pterogastera cupheoides*.
conferta, Humb. & Bonpl. Rhex. 53. t. 20 = *Brachyotum confertum*.
cordata, Spreng. Neue Entdeck. i. 301 = *Microlicia cordata*.
cordigera, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia cordigera*.
corymbosa, Mart. & Schrank, l. c. 110 = *Cambessedesia corymbosa*.
corymbosa, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Sc. Moden.* xx. (1829) 124. t. 2. f. 1 = *Tibouchina corymbosa*.
crassifolia, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera crassifolia*.
crenulata, Mart. & Schrank, l. c. 111 = *Microlicia crenulata*.
cubensis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 104 = *mariana*.
dasystaminea, Schrank, ex DC. Prod. iii. 130 = *Tibouchina granulosa*.
decipiens, Salzm. ex Triana, in *Trans. Linn. Soc.* xxviii (1873) 44 = *Tibouchina setulosa*.
decumbens, Poir. Encyc. Suppl. iv. 628 = *Dissotis decumbens*.
decussata, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia decussata*.
Deppeana, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 566 (= *Arthrostema Schiedeana*).
dichotoma, Sieber, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 267 = *Pterolepis glomerata*.
dichrananthera, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 84 = *Monochaetum dicranantherum*.
diffusa, Spreng. Syst. ii. 307 = *Ossaea microphylla*, Triana.
divaricata, Humb. & Bonpl. Rhex. 59. t. 22 = *Pterogastera divaricata*.
diversifolia, Humb. & Bonpl. l. c. 119. t. 45 = *Arthrostemma ciliatum*.
Drummondii, Hort. Angl. ex Heynh. Nom. i. 683 (Quid?).—Am. bor.
echinata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 85 (= *Pleroma echinata*).—Peruv.
elachistophylla, Schrank & Mart. in DC. Prod. iii. 120 = *Microlicia variolosa*.
elegans, Bonpl. ex Spach, Hist. Vég. Phan. Atl. 16. t. 30.—Hab.?
elegans, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 432.—Mexic.

RHEXIA:—

- elliptica*, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Sc. Moden.* xx. (1829) 116. t. 1. f. 1 = *Tibouchina Fothergillae*.
enervia, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia euphorbioides*.
ericoides, Spreng. Neue Entdeck. i. 302 = *Marcetia carinata*.
Espora, A. St. Hil. ex Humb. & Bonpl. Rhex. 152. t. 58 = *Cambessedesia Espora*.
estrellensis, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xviii. Fis. (1820) 388 = *Tibouchina estrellensis*.
euphorbioides, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia euphorbioides*.
excelsa, Humb. & Bonpl. Rhex. 90. t. 34 = *Centronia excelsa*.
excoriata, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia excoriata*.
Exul, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 119 = *Microlicia graveolens*, variolosa.
fasciculata, Schrank & Mart. l. c. = *Microlicia fasciculata*.
fasciculata, Spreng. Neue Entdeck. iii. 62 = *Cambessedesia Hilariana*.
Fasikan, Siebold, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 25 = *Bredia hirsuta*.
firma, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera firma*.
fissinervia, Mart. & Schrank, l. c. = *Tibouchina fissinervia*.
flexuosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 85. t. 320 = *Tibouchina longifolia*.
floribunda, Mart. ex DC. Prod. iii. 103 = *Lavoisiera imbricata*.
floribunda, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 431 = *Monochaetum rivulare*.
Fontanesii, Humb. & Bonpl. Rhex. 93. t. 36 = *Tibouchina granulosa*.
formosissima, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xx. (1829) 121 = *Tibouchina granulosa*.
Fothergillae, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 108 = *Tibouchina Fothergillae*.
fragilis, Bertol. Fl. Guatimal. 16.—Guatemala.
frigidula, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 127 = *Tibouchina frigidula*.
fulva, Spreng. Neue Entdeck. i. 301; Syst. ii. 308 = *Microlicia serpyllifolia*.
galioides, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 111 = *Cambessedesia Hilariana*.
gentianoides, Mart. & Schrank, l. c. 104 = *Lavoisiera gentianoides*.
glabella, Michx. Fl. Bor. Am. i. 222.—Am. bor.
glandulosa, Bertol. Fl. Guatimal. 15.—Guatemala.
glandulosa, Bonpl. Desc. Pl. Malm. 70. t. 27 (= *Pleroma glandulosa*).—Guian.
glomerata, Rottb. in *Act. Lit. Univ. Hafn.* i. (1778) 276 = *Pterolepis glomerata*.
glutinosa, Linn. f. Suppl. 216 = *Bucquetia glutinosa*.
gracilis, Humb. & Bonpl. Rhex. 138. t. 52 = *Tibouchina gracilis*.
grandiflora, Vahl, Symb. Bot. iii. [106] Corrig.; Humb. & Bonpl. l. c. 25. t. 11 = *Rhynchanthera grandiflora*.
grandifolia, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 429.—Mexic.
graveolens, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia graveolens*.
helvola, Spreng. Syst. ii. 309 = *Microlicia hypericoides*.
herbacea, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xviii. Fis. (1820) 389 = *Aciotis paludosa*.
herbacea, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 137 = *Tibouchina herbacea*.
heteranthera, Humb. & Bonpl. Rhex. 87. t. 33 = *Melastoma repens*.
heterophylla, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 316 = *Chaetolepis heterophylla*.
heterostemon, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya parviflora*.
hexandra, Schrank, l. c. 115 = *Aciotis paludosa*.
hieracioides, Mart. & Schrank, l. c. 133 = *Tibouchina hieracioides*.
Hilariana, Humb. & Bonpl. Rhex. 147. t. 56 = *Cambessedesia Hilariana*.
hirsuta, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia graveolens*, variolosa.
hirsuta, Salisb. Prod. 365 = *virginica*.
hispida, Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 108 = *Pterolepis pumila*.
holosericea, Humb. & Bonpl. Rhex. 29. t. 12 = *Tibouchina holosericea*.

RHEXIA:—

- hospita*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 129 = *Tibouchina hospita*.
hygrophila, Mart. ex DC. l. c. 128 = *Tibouchina hygrophila*.
hypericoides, Willd. Sp. Pl. ii. 303 = *Desmoscelis villosa*.
ilicifolia, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 111 = *Cambessedesia ilicifolia*.
imbricata, Thunb. Pl. Bras. Dec. i. 10. t. 2. f. 2 = *Lavoisiera imbricata*.
inaequalifolia, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. iii. 122 = *Arthrostema ciliatum*.
inaequilateralis, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 567 = *Centradenia inaequilateralis*.
incana, Spreng. Syst. ii. 309 = *Monochaetum Bonplandii*.
inconstans, Vahl, Eclog. Am. i. 37 = *Tibouchina ornata*.
indecora, Humb. & Bonpl. Rhex. 131. t. 49 = *Aciotis indecora*.
inundata, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 117 = *Acisanthera inundata*.
isophylla, Schrank & Mart. l. c. 120 = *Microlicia isophylla*.
itambana, Mart. & Schrank, l. c. 104 = *Lavoisiera itambana*.
jucunda, Schrank & Mart. l. c. 139 = *Miconia staminea*.
jungermannioides, Mart. & Schrank, l. c. 119 = *Microlicia jungermannioides*.
juniperina, Humb. & Bonpl. ex Spreng. Syst. ii. 310 = *Marcetia juniperina*.
jussiaeoides, Linn. f. Suppl. 215.—Guian.
ladanoides, Rich. in Humb. & Bonpl. Rhex. 72. t. 27 = *Pterolepis pumila*.
lanceaeiflora, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 118 = *Comolia lanceaeiflora*.
lanceolata, Humb. & Bonpl. Rhex. 56. t. 21 = *Tibouchina longifolia*.
lanceolata, Walt. Fl. Carol. 129.—Am. bor.
Langsdorffiana, Humb. & Bonpl. Rhex. 135. t. 51 = *Tibouchina Langsdorffiana*.
Langsdorffiana, Kunth, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia taxifolia*.
lasiandra, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 127 = *Tibouchina Martinsiana*.
latevenosa, Mart. l. c. 110 = *Cambessedesia latevenosa*.
latifolia, Aubl. Pl. Gui. i. 336. t. 129. f. 2 = *Comolia Aubletii*.
lepidota, Humb. & Bonpl. Rhex. 38. t. 15 = *Tibouchina lepidota*.
leptophylla, Humb. & Bonpl. l. c. 64. t. 24 = *Comolia leptophylla*.
leucantha, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 61 = *Meriania leucantha*.
Leuzeana, Humb. & Bonpl. Rhex. 144. tt. 54, 55 = *Bertolonia Leuzeana*.
limnobios, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 117 = *Acisanthera limnobios*.
limosa, Mart. ex DC. l. c. 108 = *Rhynchanthera limosa*.
linearifolia, Poir. Encyc. vi. 2 = *lutea*.
linearifolia, Poir. ex DC. Prod. iii. 122 = *Ludwigia alternifolia*.
linifolia, Mart. ex DC. l. c. 105 = *Microlicia linifolia*.
longifolia, Vahl, Eclog. Am. i. 39 = *Tibouchina longifolia*.
ludoviciana, Rafin. Fl. Ludov. 92 = *mariana*.
lutea, Walt. Fl. Carol. 130.—Am. bor.
lutescens, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 84 = *Brachyotum lutescens*.
Lychnitis, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya Lychnitis*.
lychnitoides, Schrank & Mart. l. c. 132 = *Desmoscelis villosa*.
macrochiton, Mart. l. c. 129 = *Tibouchina macrochiton*.
mariana, Linn. Sp. Pl. 346.—Am. bor.
Martiusiana, Ser. in DC. Prod. iii. 137 = *Tibouchina sebastianopolitana*.
microphylla, Humb. & Bonpl. Rhex. 4. t. 2 = *Chaetolepis microphylla*.
mollis, Humb. & Bonpl. l. c. 50. t. 19 = *Tibouchina mollis*.
Moricandiana, Mart. ex DC. Prod. iii. 128 = *Tibouchina Moricandiana*.
mucorifera, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 103 = *Lavoisiera mucorifera*.

RHEXIA:—

- multiflora*, Humb. & Bonpl. Rhex. 41. t. 16 = *Monochaetum multiflorum*.
muricata, Humb. & Bonpl. l. c. 1. t. 1 = *Tibouchina grossa*.
myrtoidea, Humb. & Bonpl. l. c. 7. t. 3 = *Monochaetum myrtoideum*.
napaulensis, Ser. ex DC. Prod. iii. 142 = *Osbeckia chinensis*.
Nianga, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 163 = *Oxymeris Nianga*.
nummularioides, Humb. & Bonpl. Rhex. 62. t. 23 = *Comolia nummularioides*.
nymphaeifolia, Humb. & Bonpl. l. c. t. 53 = *Bertolonia nymphaeaeifolia*.
obtusata, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354, nomen (Quid?).—Am. bor.
obvallata, Sieber, ex Oken, Isis (1822) 453; Miq. Comm. Phyt. 79 = *Pterolepis glomerata*.
ochypetalata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 86. t. 321. f. a = *Tibouchina ochypetalata*.
oleaeifolia, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 139 = *Microlepis oleaeifolia*.
ornata, Rich. in Humb. & Bonpl. Rhex. 69. t. 26 = *Tibouchina ornata*.
oxypetalata, Spreng. Syst. ii. 306 = *Tibouchina oxypetalata*.
Pachyloma, Mart. ex DC. Prod. iii. 123 (= *Pachyloma coriaceum*).—Bras.
paludosa, Salzm. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 269 = *Acisanthera brevifolia*.
paniculata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 222 = *Oxyspora paniculata*.
paniculata, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 137 = *Tibouchina sebastianopolitana*.
parnassifolia, Mart. & Schrank, l. c. 140 = *Pterolepis parnassiaefolia*.
parvifolia, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 428 = *Centradenia inaequilateralis*.
pendulifolia, Bonpl. Desc. Pl. Malm. 68. t. 26 = *Aciotis pendulifolia*.
pentanthera, Ser. ex DC. Prod. iii. 108 = *Rhynchanthera Schrankiana*.
petiolata, Walt. Fl. Carol. 130 = *ciliolata*?
phlogiformis, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya phlogiformis*.
piloselloides, Humb. & Bonpl. Rhex. 12. t. 5 = *Castratella piloselloides*.
pityrophylla, Mart. ex DC. Prod. iii. 139 = *Pyramia pityrophylla*.
polygonoides, Mart. l. c. 137 = *Pterolepis polygonoides*.
polystachya, Humb. & Bonpl. Rhex. 98. t. 38 = *Aciotis polystachya*.
pratensis, Roland. ex Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 276 = *Pterolepis glomerata*.
Princeps, Humb. & Bonpl. Rhex. 122. t. 46 = *Dissotis eximia*.
proteaeformis, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 130 = *Tibouchina holosericea*.
psammophila, Mart. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 37 = *Comolia denudata*.
pulcherrima, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera pulcherrima*.
pumila, Humb. & Bonpl. Rhex. t. 35 = *Pterolepis pumila*.
punctata, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera punctata*.
punctatissima, Mart. & Schrank, l. c. 118 = *Acisanthera punctatissima*.
pungens, Mart. & Schrank, l. c. 112 = *Chaetostoma pungens*.
purpurata, Schrank & Mart. l. c. 110 = *Cambessedesia purpurata*.
purpurea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 64 = *Meriania purpurea*.
Purshii, Spreng. Syst. v. 590 (Index) = *virginica*.
quadrangularis, Salzm. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 42 = *Tibouchina urceolaris*.
quadriavalvis, Mart. ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia taxifolia*.
quaternifolia, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 140 = *Microlepis quaternifolia*.
quinquenerve, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 83 = *Brachyotum quinquenerve*.
Raddiana, Moric. ex DC. Prod. iii. 129 = *Tibouchina Raddiana*.
Radula, Humb. & Bonpl. Rhex. 107. t. 41 = *Macairea Radula*.
recurva, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 108 = *Acisanthera recurva*.

RHEXIA:—

- regalis*, Roland. ex Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 277 = *Pterolepis pumila*.
repanda, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 141 = *Pterolepis repanda*.
reptans, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 447 = *Tibouchina clinopodifolia*.
resinosa, Schrank, ex DC. Prod. iii. 111 = *Microlicia sincorensis*.
reticulata, Humb. & Bonpl. Rhex. 21. t. 9 = *Tibouchina reticulata*.
rosea, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354, nomen (Quid?).—Am. bor.
rosmarinifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 84 = *Brachyotum rosmarinifolium*.
rosmarinoides, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya rosmarinoides*.
rostrata, Schrank & Mart. l. c. 108 = *Rhynchanthera rostrata*.
rotundifolia, Humb. & Bonpl. Rhex. 66. t. 25 = *Grafenriedia rotundifolia*.
rufipilis, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 430 (= *Pleroma rufipile*).—Mexic.
sarmentosa, Humb. & Bonpl. Rhex. 23. t. 10 (= *Pleroma laxum*).—Peruv.
scabriuscula, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 431 (= *Pleroma scabriusculum*).—Mexic.
scandens, Rich. ex DC. Prod. iii. 127 = *Adelobotrys scandens*.
Schiedeana, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 565 (= *Pleroma rufipile*).—Mexic.
Schrankiana, Mart. ex DC. Prod. iii. 107 = *Rhynchanthera Schrankiana*.
scoparia, Mart. ex DC. Prod. iii. 112 = *Marcetia carinata*.
scoparia, A. St. Hil. ex Humb. & Bonpl. Rhex. 154. t. 59 = *Microlicia scoparia*.
sebastianopolitana, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xx. (1829) 126. t. 2 = *Tibouchina sebastianopolitana*.
semiadnata, Schrank, ex DC. Prod. iii. 140 = *Pterolepis alpestris*.
semidecandra, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 129 = *Tibouchina semidecandra*.
semiserrata, Schrank & Mart. l. c. 167 = *Huberia semiserrata*.
septemnervia, Walt. Fl. Carol. 130 = *virginica*.
Seringeana, Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia graveolens*.
serrulata, Nutt. Gen. Am. i. 243.—Am. bor.
serrulata, Rich. ex Humb. & Bonpl. Rhex. 74. t. 28 = *Rhynchanthera serrulata*.
Sertularia, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 125 = *Comolia Sertularia*.
setosa, Schrank & Mart. l. c. 119 = *Microlicia subsetosa*.
setosa, Spreng. Neue Entdeck. i. 301 = *Microlicia setosa*.
sheardioides, Schrank, ex DC. Prod. iii. 133 = *Pterolepis glomerata*.
sileniflora, Humb. & Bonpl. Rhex. 129. t. 48 = *Aciotis sileniflora*.
sincorensis, Mart. ex DC. Prod. iii. 111 = *Microlicia sincorensis*.
sipaneoides, Mart. l. c. 141 = *Pterolepis sipaneoides*.
speciosa, Bert. ex DC. Prod. iii. 101 = *Meriania leucantha*.
speciosa, Humb. & Bonpl. Rhex. 9. t. 4 = *Meriania speciosa*.
spicata, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 15 = *Ossaea brachystachya*.
stachyoides, Humb. & Bonpl. Rhex. 113. t. 43 = *Desmoscelis villosa*.
stachyoides, Schrank & Mart. ex DC. iii. 108 = *Rhynchanthera rostrata*.
stenocarpa, Schrank & Mart. l. c. 130 = *Tibouchina stenocarpa*.
stricta, Humb. & Bonpl. Rhex. 19. t. 8 = *Brachyotum strigosum*.
stricta, Pursh, Fl. Bor. Am. i. 258.—Am. bor.
strigillosa, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 133 = *Tibouchina gracilis*.
strigosa, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 108 = *Tibouchina ornata*.
strigosa, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 309 = *Pterolepis pumila*.
striphnocalyx, Mart. ex DC. Prod. iii. 140 = *Pterolepis striphnocalyx*.
suberosa, Spreng. Neue Entdeck. i. 302 = *Cambessedesia Hilariana*.

RHEXIA:—

- subtripplinervia*, Hort. Berol. ex Heynh. Nom. i. 683 (Quid?).—Hab.?
superba, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xx. (1829) 118. t. 1. f. 4 = *Tibouchina Raddiana*.
tamariscina, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 125 = *Marcetia tamariscina*.
taxifolia, A. St. Hil. in Humb. & Bonpl. Rhex. 150. t. 57 = *Marcetia taxifolia*.
tenella, Humb. & Bonpl. l. c. 79. t. 30 = *Ernestia tenella*.
tenuifolia, Mart. ex DC. Prod. iii. 125 = *Marcetia tenuifolia*.
tetragona, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 103 = *Lavoisiera tetragona*.
tetraptera, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 35 = *virginica*.
tetrasticha, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 112 = *Marcetia tetrasticha*.
thymifolia, Herb. Monac. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 26 = *Microlicia serpyllifolia*.
thymifolia, Humb. & Bonpl. Rhex. 133. t. 50 = *Appendicularia thymifolia*.
thymifolia, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia variolosa, serpyllifolia*.
tibouchinoides, Schrank & Mart. l. c. 129 = *Tibouchina trichopoda*.
tortuosa, Humb. & Bonpl. Rhex. 17. t. 7 (= *Pleroma mexicanum*).—Mexic.
trichocalycina, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 120 = *Microlicia trichocalycina*.
trichotoma, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 277 = *Pterolepis glomerata*.
trichotoma, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 272 = *Pterolepis glomerata*.
triflora, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya parviflora*.
triflora, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xx. (1829) 122. t. 1. f. 2 = *Tibouchina Moricandiana*.
trifolia, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 127 = *Tibouchina frigidula*.
trivalvis, Vahl, Eclog. Am. i. 39 = *Acisanthera trivalvis*.
uda, Mart. ex DC. Prod. iii. 136 = *Pterolepis pumila*.
uncata, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 120 = *Microlicia uncata*.
uniflora, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xviii. Fis. (1820) 388 = *Tibouchina Raddiana*.
uniflora, Vahl, Symb. Bot. ii. 48 = *Acisanthera recurva*.
urceolaris, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 139 = *Tibouchina urceolaris*.
variabilis, Mart. & Schrank, l. c. 118 = *Acisanthera variabilis*.
variolosa, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 120 = *Microlicia variolosa, cordata*.
venusta, Schrank, & Mart. l. c. 119 = *Microlicia serpyllifolia*.
veronicaefolia, Schrank & Mart. l. c. 121 = *Siphanchera cordata*.
versicolor, Lindl. Bot. Reg. t. 1066 = *Tibouchina versicolor*.
vestita, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia vestita*.
villosa, Aubl. Pl. Gu. i. 334. t. 129. f. 1 = *Comolia villosa*.
villosissima, Rich. in Humb. & Bonpl. Rhex. 81. t. 31 = *Desmoscelis villosa*.
viminalis, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 103 = *Microlicia viminalis*.
viminea, D. Don, in Bot. Reg. t. 664 = *Tibouchina viminea*.
violacea, Mart. ex DC. Prod. iii. 118 = *Comolia violacea*.
virginica, Linn. Sp. Pl. 346.—Am. bor.
virgulata, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia serpyllifolia*.
viscidula, Mart. ex Cham. in Linnaea, ix. (1834) 385 = *Comolia sessilis*.
viscidula, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 118 = *Comolia violacea*.
zeylanica, Link, Enum. Hort. Berol. i. 380 = *Tibouchina holosericea*.

RHIGIOCARYA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 100 = **Chasmanthera**, Hochst. (Menisp.).
racemifera, Miers, l. c. 101.—Afr. trop.

RHIGIOPHYLLUM, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 282. *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 559.
squarrosus, Hochst. l. c.—Afr. austr.

RHIGIOTHAMNUS, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 9 (1841) = **Dicoma**, Cass. (Compos.).

RHIGOSPIRA, Miers, Apocyn. S. Am. 67 (1878) = **Tabernaemontana**, Linn. (Apocyn.).
paucifolia, Miers, l. c. 69 = *T. paucifolia*.
quadrangularis, Miers, l. c. 68 = *Ambellania quadrangularis*.
reticulata, Miers, l. c. 69 = *T. reticulata*.
sinuosa, Miers, l. c. 70 = *T. Sprucei*.
Sprucei, Miers, l. c. = *T. Sprucei*.
ternstroemiacea, Miers, l. c. 71 = *T. ternstroemiacea*.
venulosa, Miers, l. c. 68 = *Ambellania macrophylla*.

RHIGOZUM, Burch. Trav. i. 299 (1822). *BIGNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1048.

RHIZOGUM, Reichb. Consp. 125 (1828).
brachiatum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 264 = *trichotomum*.
obovatum, Burch. Trav. i. 389.—Afr. austr.
trichotomum, Burch. l. c. 299.—Afr. austr.

RHINACANTHUS, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 76 (1832). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1112.

calcaratus, Nees, in DC. Prod. xi. 444.—Ind. or.
communis, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 109.—Ind. or.; Malaya.
gracilis, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 506 = *Hypoestes gracilis*.
gracilis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 218.—Afr. trop.
macilentus, Presl, Bot. Bemerk. 95 = *communis*.
Nasuta, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 79 = *communis*.
oblongus, Nees, in DC. Prod. xi. 444.—Afr. trop.
osmospermus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1863) 51; ix. (1868) 522 = *communis*.
osmospermus, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 443.—Madag.
Rottlerianus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 109 = *communis*.
scoparius, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 88.—Ins. Socotra.
tubulosus, Presl, Bot. Bemerk. 95 = *Justicia tubulosa*.

RHINACTINA, Less. in Linnaea, vi. (1831) 119 = **Aster**, Tourn. (Compos.).

limonifolia, Less. l. c. = *A. obovatus*.
uniflora, Bunge, ex DC. Prod. v. 279 = *A. eremophilus*.

RHINACTINA, Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 139 = **Jungia**, Linn. f. (Compos.).
cinerarioides, Willd. ex DC. Prod. vii. 55 = *Jungia ferruginea*.
purpurea, Willd. ex Steud. Nom. ed. I. 687 = *Leuceria purpurea*.

RHINANTHERA, Blume, Bijdr. 1121 (1826) = **Sceloparia**, Schreb. (Bixin.).
Blumei, Steud. Nom. ed. II. ii. 448.—Java.
odoratissima, Blume, Bijdr. 1121.—Java.

RHINANTHUS, Linn. Sp. Pl. ed. I. 603 (1753), partim; Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 68 (1808) = **Rhynchocorys**, Griseb. (Scrophul.).
Columnae, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 138 = *Rhynch. Elephas*.
Elephas, Linn. Sp. Pl. 603 = *Rhynch. Elephas*.
orientalis, Frivald, ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 12 = *Rhynch. Elephas*.
orientalis, Linn. Sp. Pl. 603 = *Rhynch. orientalis*.
strictus, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 684 = *Rhynch. Elephas*.

RHINANTHUS, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 184 (1737). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 979.

Alectorolophus, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 623 (1742); Moench, Meth. 440 (1794).
Crista-galli, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 240 (1745).
Elephas, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 211 (1763).
PROBOSCIPHORA, Neck. Elcm. i. 336 (1790).

RHINANTHUS :—

acuminatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 624 = *Castilleja pallida*.
adulterinus, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 226 (Quid ?).—Europ.
Alectorolophus, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 177 = major.
alpestris, Steud. Nom. ed. II. ii. 448 = major.
alpinus, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 194 = major.
alpinus, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 627 = *angustifolius*.
alpinus, Lam. Fl. Fr. ii. 354 = *Bartsia alpina*.
angustifolius, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 669.—Europ.
aristatus, Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 132 = *angustifolius*.
bicolor, Poir. Encyc. Suppl. v. 623 = *Bartsia Trixago*.
bifidus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 94 = *Pedicularis carnosus*.
buccalis, Wallr. in Flora, xxv. (1842) 504 = major.
capensis, Linn. Syst. ed. XII. 405; Thunb. Prod. Pl. Cap. 98 = *Bartsia Trixago*.
coccineus, Lam. Encyc. ii. 60 = *Castilleja coccinea*.
creticus, F. G. Dietr. Vollst. Gaertn. Lexik. viii. 137 = *Bartsia Trixago*.
Crista-galli, Linn. Sp. Pl. 603 = major, minor.
Crista-galli, Vill. Fl. Delph. 62 = major.
cristatus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 378 = major.
glaber, Lam. Fl. Fr. ii. 352 = minor.
glacialis, Personn. in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 745 = major ?
glauca, Poir. Encyc. Suppl. ii. 309 = *Lagotis glauca*.
grandiflorus, Bluff, Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 61 = major ?
hirsutus, Lam. Fl. Fr. ii. 353 = major.
indicus, Linn. Sp. Pl. 603 = *Geniosporum elongatum*.
inflatus, Salisb. Prod. 96 = major, minor.
major, Ehrh. Beitr. vi. 144.—Europ.
maritimus, Lam. Fl. Fr. ii. 353 = *Bartsia Trixago*.
maximus, Lam. Encyc. ii. 61 = *Bartsia viscosa*.
maximus, Willd. Sp. Pl. iii. 189 = *Bartsia Trixago*.
minor, Ehrh. Beitr. vi. 144.—Europ.
montanus, Sauter, in Flora, xl. (1857) 361 = *Bartsia alpina*.
nigricans, Meinh. Fl. Ingr. 259 = minor ?
obscurus, Steph. Nom. Pl. Agric. Mosq. (1804) 35 (Quid ?).—Rossia.
pallens, Wibel, Prim. Fl. Werth. 142 = seq. ?
pallidus, Lam. Encyc. ii. 60 = *Castilleja pallida*.
parviflorus, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 61 = minor.
pratensis, Vill. Fl. Delph. 62 = minor.
pubescens, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 479 = major.
pulcher, Schummel, ex Opiz, Natural. xi. (1826) 449 = *Bartsia alpina*.
ramosus, Schur, Enum. Pl. Transs. 511 = minor.
Reichenbachii, Benth. in DC. Prod. x. 558 = major.
riphaeus, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 160 = major, minor.
scaber, Thunb. Prod. Pl. Cap. 98 = *Alectra melampyroides*.
spicatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 623 = *Bartsia aspera*.
stenophyllus, Schur, Enum. Pl. Transs. 512 = minor.
tenuifolius, Poir. Encyc. Suppl. v. 624 = *Orthocarpus tenuifolius*.
Tournefortii, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 137. t. 393.—Oriens.
trifidus, Vahl, Symb. Bot. i. 44 = *Bungea trifida*.
Trixago, Linn. Syst. ed. XII. 1107; Gouan, Hort. Monsp. 296 = *Bartsia Trixago*.
Trixago, Thuill. Fl. Par. ed. II. 304 = minor.
versicolor, Lam. Encyc. ii. 61 = *Bartsia Trixago*.
villosus, Pers. Syn. ii. 151 = major.
virginicus, Linn. Herb. ex Benth. in DC. Prod. x. 558 = *Lamoureauxia serratifolia*.
virginicus, Linn. Sp. Pl. 603 = *Gerardia quercifolia*.
viscosus, Lam. Fl. Fr. ii. 354; Brot. Fl. Lusit. i. 187 = *Bartsia viscosa*.
vulgaris, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 266 = major, minor.

RHINANTUS, Gilib. Exercit. i. 132 (1792) = praec.

RHINCHOGLOSSUM, Blume, Bijdr. 741 (1826) = **Rhynchoglossum**, Blume (Gesnerac.).

RHINCHOSIA, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 78 = **Rhynchosia**, Lour. (Legumin.).

RHINCOSPORA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 415 (1826) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).

RHINIACHNE, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 360, in syn. (1855) = **Thelepogon**, Roth (Gramin.).
Princeps, Hochst. ex Steud. l. c. = *T. elegans*.

RHINIUM, Schreb. Gen. 701 (1791) = **Doliocarpus**, Roland. (Dillen.).

RHINOCARPUS, Bert. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. viii. 5. t. 601 (1825) = **Anacardium**, Linn.
excelsa, Bert. ex H. B. & K. l. c. = *A. Rhinocarpus*.

RHINOGLOSSUM, Pritz. Ic. Ind. i. 933 (1855), sphalm. = **Rhynchoglossum**, Blume (Gesner.).

RHINOLOBIUM, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 420 = **Schizoglossum**, E. Mey. (Asclep.).
lineare, Decne. in DC. Prod. viii. 556, in syn. (= *Lagarinthus gracilis*).—Afr. austr.
tenuis, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 421.—Afr. austr.

RHINOPETALUM, Fisch. ex Alex. in Edinb. N. Phil. Journ. [viii]. (Oct.-Dec. 1829) 19 = **Fritillaria**, Tourn. (Liliac.).

Boissieri, Klatt, in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 439 = *F. gibbosa*.
Carelini, Steud. Nom. ed. II. ii. 448, sphalm. = seq.
Karelini, Fisch. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 283 = *F. gibbosa*.
stenantherum, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1875) 294.—Turkestan.
triste, Eversm. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 149 = *F. gibbosa*.

RHINOSTEGIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 56 = **Thesium**, Linn. (Santal.).
brevifolia, Turcz. l. c. 57 = *T. leptocaulis*.
longifolia, Turcz. l. c. = *T. Turczaninowii*.

RHINOSTIGMA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 495 (1860) = **Garcinia**, Linn. (Guttif.).
macrophyllum, Miq. l. c. = *G. macrophylla*.
parvifolium, Miq. l. c. = *G. dioica* ?

RHIPIDODENDRON, Spreng. Anleit. ii. i. 243 (1817) = seq.

RHIPIDODENDRUM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 164 = **Aloë**, Tourn. (Liliac.).
dichotomum, Willd. l. c. 166 = *A. dichotoma*.
distichum, Willd. l. c. 165 = *A. plicatilis*.
plicatile, Haw. Rev. Pl. Succ. 45 = *A. plicatilis*.

RHIPIDOSTIGMA, Hassk. Retzia, 103 (1855) = **Maba**, Forst. (Ebenac.).
Teijsmanni, Hassk. l. c. 106 = *M. Teijsmanni*.
Zollingeri, Hassk. l. c. 104 = *M. hermaphrodita*.

RHIPOGONUM, Forst. Char. Gen. 49. t. 25 (1776) (*Ripogonum*). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 764.

album, R. Br. Prod. 293.—Austral.
album, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. v. 161 = *Smilax glycyphylla*.
discolor, F. Muell. Fragm. vii. 78.—Austral.
dubium, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 30.—Ins. Norfolk.
Elseyanum, F. Muell. Fragm. i. 44.—Austral.
Fawcettianum, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 9.—Austral.
Moorianum, F. Muell. Fragm. i. 44 = *album*.
parviflorum, R. Br. Prod. 293 = *scandens*.
scandens, Forst. Char. Gen. 50.—N. Zel.

RHIPSALIS, Gaertn. Fruct. i. 137. t. 28 (1788).

CACTEAE, Benth. & Hook. f. i. 850.
CASSYTHA, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. (1768).
HARIOA, Adans. Fam. ii. 243 (1763).
LEPISMIUM, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 315, 380.
PFEIFFERA, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 40 (1845).
aethiopica, Welw. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 152, nomen.—Afr. trop.
alata, Steud. Nom. ed. II. i. 333 = *pachyptera*.
alternata, Lem. Cact. 80, nomen.—Am. trop.
brachiata, Hook. Bot. Mag. t. 4039 = *R. Saglionia*.

RHIPSALIS:—

- calamiformis*, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 135 = *funalis*.
Cassutha, Gaertn. Fruct. i. 137. t. 28 (Cassutha).—Am. trop.
cassuthoides, G. Don, Gen. Syst. iii. 176.—Mexic.
cereiformis, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 454.—Hab.?
cereuscula, Haw. ex Phil. Mag. (1830) 112 = R. Saglionis.
conferta, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 229.—Hab.?
coriacea, Polak. in Linnaea, xli. (1877) 562.—Costa Rica.
cribrata, Pfersd. ex N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) 1. 716 = *penduliflora*.
crispa, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 450 = *crispata*.
crispata, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 130.—Hab.?
cylindrica, Steud. Nom. ed. II. ii. 448.—Bras.
dichotoma, G. Don, Gen. Syst. iii. 176.—N. Granat.
echinata, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 136 = *mesembryanthoides*.
fasciculata, Haw. Suppl. Pl. Succ. 83.—Ind. occ.
floccosa, Salm-Dyck, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 134.—Hab.?
funalis, Salm-Dyck, ex DC. Prod. iii. 476.—Am. austr.
grandiflora, Haw. Suppl. Pl. Succ. 83 = *funalis*.
Hookeriana, G. Don, Gen. Syst. iii. 176 = R. Cassutha.
horrida, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 347.—Madag.
Honilletiana, Lem. Illustr. Hortic. v. (1858) Misc. 64.—Bras.
Houlletii, Hook. f. Bot. Mag. t. 6089 = *praec.*
Knightii, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 456.—Bras.
Lorentziana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 139.—Reg. Argent.
lumbicoides, Lem. in Salm-Dyck, Hort. Dyck. ed. (1841) 1842; et Rev. Hortic. (1865) 219 = *sarmentacea*.
macrocarpa, Miq. in Bull. Sc. Nat. Phys. Néerl. (1838) 49.—Hab.?
mesembryanthemoides, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *seq.*
mesembryanthoides, Haw. Rev. Pl. Succ. 71.—Am. austr.
micrantha, DC. Prod. iii. 476.—Ecuador.
Miquelii, Lem. Cact. 80, nomen.—Am. trop.
Mittleri, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 455.—Bras.
monacantha, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 140.—Reg. Argent.
Myosurus, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 455.—Bras.
pachyptera, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 132.—Ind. occ.
paradoxa, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 39; ed. II. 59, 228.—Bras.
parasitica, DC. Prod. iii. 476 = *nnulata*.
parasitica, Haw. Syn. Pl. Succ. 187 = *fasciculata*.
pendula, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 133 = R. Cassutha.
penduliflora, N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) 1. 716.—Bras.?
pentagona, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 453 = *seq.*
pentaptera, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iv. (1836) 105.—Bras.
platycarpa, Lem. in Rev. Hortic. Sér. IV. ix. (1860) 502 = *robusta*.
platycarpa, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 131.—Bras.
pteroaulis, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 453 = *paradoxa*.
ramulosa, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 130.—Hab.?
rhombea, Pfeiff. l. c.—Hab.?
Riedeliana, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 49.—Bras.
robusta, Lem. in Rev. Hortic. Sér. IV. ix. (1860) 502.—Bras.?
rugulosa, Lem. Illustr. Hortic. viii. (1861) sub t. 293.—Ind. occ.
Saglionis, Otto, ex Walp. Rep. ii. 936.—Reg. Argent.
salicornioides, Haw. Suppl. Pl. Succ. 83.—Bras.
sarmentacea, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 98.—Reg. Argent.
spatulata, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 288.—Hab.?
Swartziana, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 131.—Ind. occ.
teres, Steud. Nom. ed. II. ii. 449.—Bras.
trigona, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 133.—Bras.
Trinpinii, Lem. Cact. 80, nomen.—Am. trop.
nnulata, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 136.—Ind. occ.

RHIZAERIS, Rafin. Sylva Tellur. 90 (1838) = **Laguncularia**, Gaertn. (Combret.).
alba, Rafin. l. c. = L. racemosa.

RHIZEMYS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 (1836) = **Tes-tudinaria**, Salisb. (Dioscor.).
elephantipes, Rafin. l. c. = T. elephantipes.
montana, Rafin. l. c.—Hab.?

RHIZIRIDEUM, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. (1869) 160 = **Allium**, Tourn. (Liliac.).
acutangulum, Fourn. l. c. = A. senescens.
fallax, Fourn. l. c. = A. senescens.

RHIZIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 243 (1867) = **Ela-tine**, Linn.
curvum, Dulac, l. c. = E. Hydropiper.
verticillatum, Dulac, l. c. = E. Alsinastrum.

RHIZOBOLUS, Gaertn. ex Schreb. Gen. 369 (1789); et Fruct. ii. 93. t. 98 (1791) = **Caryocar**, Linn. (Ternstr.).
butyrosus, J. F. Gmel. Syst. 840 = C. butyrosus.
glaber, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = C. glabrum.
Pekia, Gaertn. Fruct. ii. 93. t. 98. f. 1 = C. tomentosum.
Saouvari, Correa, in Ann. Mns. Par. viii. (1806) 394. t. 5. f. 2 = C. glabrum.
Souari, Steud. Nom. ed. I. 688, sphalm. = *praec.*
tuberosum, J. F. Gmel. Syst. 840 = C. tomentosum.

RHIZOBOTRYA, Tausch, in Flora, xix. (1836) 33 = **Cochlearia**, Tourn. (Crucif.).
alpina, Tausch, l. c. 34 = C. brevicaulis.

RHIZOCEPHALUM, Wedd. Chlor. And. ii. 11. t. 46 (1857). **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 549.
Candollei, Wedd. l. c. 12. t. 46.—N. Granat.
pumilum, Wedd. l. c. 13.—Bolivia.
snbulatum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 549.—Ecuador.

RHIZOCEPHALUS, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 68 (1844); xiii. 43 (1853) = **Heleochoa**, Host (Gramin.).
orientalis, Boiss. l. c. 69.—Mesopot.

RHIZOCORALLON, Hall. in Rupp. Fl. Jen. 301 (1745) = **Coralorhiza**, Hall. (Orchid.).

RHIZOGUM, Reichb. Consp. 125 (1828) = **Rhigozum**, Burch. (Bignon.).

RHIZOPHORA, Linn. Gen. ed. I. 137 (1737).
RHIZOPHOREAE, Benth. & Hook. f. i. 679.
AZOPHORA, Neck. Elem. ii. 361 (1790).
MANGIUM, Rumph. ex Scop. Intro. 218 (1777).
MANGLE, Adans. Fam. ii. 445 (1763).
MANGLES, Plum. ex DC. Prod. iii. 32 (1828).
Aegiceras, Gaertn. f. Fruct. iii. t. 45. f. 1 = *Aegiceras minus*.
Aegiceras, J. F. Gmel. Syst. 747 = *Aegiceras majus*.
americana, Nutt. N. Am. Sylv. i. 112. t. 24 = R. Mangle.
apiculata, Blume, Fl. Jav. i. 91 = *Bruguiera gymnorhiza*.
australis, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *Bruguiera Rheedii*.
Candel, Linn. Sp. Pl. 443 = *Kandelia Rheedii*.
Candelaria, DC. Prod. i. 32 = *Bruguiera gymnorhiza*.
Candelaria, Macrae, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 137 = *Bruguiera caryophylloides*, malabarica.
Candelaria, Wall. Cat. n. 4878 = *mnconata*.
caryophylloides, Burm. f. Fl. Ind. 109.—As. trop.
caryophylloides, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 34 = *Bruguiera caryophylloides*.
caseolaris, Linn. Amoen. Acad. iv. 123 = *Sonneratia acida*.
ceratophylloides, Rausch. Nom. ed. III. 136, sphalm. = *caryophylloides*.
confugata, Linn. Sp. Pl. 443 = *Bruguiera gymnorhiza*.
corniculata, Linn. Amoen. Acad. iv. 123 = *Aegiceras majus*.
cylindrica, Linn. Sp. Pl. 443 = *Bruguiera caryophylloides*.
decandra, Roxb. Hort. Beng. [36], nomen = *Ceriops Roxburghiana*.

RHIZOPHORA:—

- eripetala*, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *Bruguiera eripetala*.
glomerulata, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 143 = *Ceriops Zippeliana*.
gymnorhiza, Linn. Sp. Pl. 443 = *Bruguiera gymnorhiza*.
Lamarckii, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 201.—N. Caled.
latifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 324.—Sumatra.
macrorhiza, Griff. Notul. iv. 664 (*macrohiza*) = *mucronata*.
Mangle, Linn. Sp. Pl. 443.—Littora trop.
Mangle, Roxb. Hort. Beng. [36]; Fl. Ind. ii. [459] = *mucronata*.
mucronata, Lam. Encyc. vi. 169.—Geront. trop.
mucronata, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. t. 135 = *Bruguiera gymnorhiza*.
obtusata, Dennst. Schlusss. Hort. Malab. 15, 32 (= *Problastes cuneifolia*).—Java.
pachypoda, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 309.—N. Caled.
Palun, DC. Prod. iii. 33.—Ins. Molucc.
parviflora, Roxb. Fl. Ind. ii. 461 = *Bruguiera parviflora*.
pauciflora, Griff. Notul. iv. 664, sphalm. ? = *praec.*
polandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 396 = *Bruguiera eripetala*.
racemosa, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 185 = R. Mangle.
Rheedii, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *Bruguiera gymnorhiza*.
rugens, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 233 = *mucronata*.
sexangula, Lour. Fl. Cochinch. 297.—Cochinch.
stylosa, Griff. Notul. iv. 665 = *Kandelia Rheedii*.
Tagal, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 138 (Quid?).—Guian.
timoriensis, DC. Prod. iii. 32 = *Ceriops Candolleana*.
tinctoria, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 394 = *Bruguiera gymnorhiza*.

RHODACTINEA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 449 = **Barnadesia**, Mutis (Compos.).
rosea, Gardn. l. c. 450 = B. rosea.

RHODACTINIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 484 (1873), sphalm. = *praec.*

RHODALSINE, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iv. (1845) 25, in adnot. = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).
procumbens, J. Gay, l. c. = A. geniculata.

RHODAMNIA, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 48. **MYRTACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 715.
MONOXORA, Wight, Illustr. ii. 12. t. 97 (1841).
argentea, Benth. Fl. Austral. iii. 278.—Austral.
Blairiana, F. Muell. Fragm. ix. 141.—Austral.
cinerea, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 48 = *trinervia*.
concolor, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 315 = *trinervia*.
glaucia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79.—N. Guin.
globosa, Blume, l. c.—Borneo.
latifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 480.—Malaya.
Mulleri, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79 = *trinervia*.
Nageli, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 478 = *trinervia*.
sessiliflora, Benth. Fl. Austral. iii. 277.—Austral.
spectabilis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 78 = *trinervia*.
subtriflora, Blume, l. c. 79 = *trinervia*.
trinervia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79.—Burma; Malaya; Austral.

RHODANTHE, Lindl. Bot. Reg. t. 1703 (1834) = **Helipterum**, DC. (Compos.).
atropurpurea, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 776 = *atrosanguinea*.
atrosanguinea, J. Drumm. in Gard. Chron. (1861) 622.—Austral.
immaculata, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 967 = H. Manglesii.
maculata, Hort. cf. Gard. Chron. (1861) 622 = H. Manglesii?
Manglesii, Lindl. Bot. Reg. t. 1703 = H. Manglesii.

RHODAX, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 363 = *Helianthemum*, Tourn. (Cistin.).
alpestris, Fuss, Fl. Transs. 78 = H. cinereum.
ambiguus, Fuss, l. c. 79. — Transs.
canus, Fuss, l. c. 79 = H. canum.
Chamaecistus, Spach, Hist. Veg. Phan. vi. 40 = H. cinereum.

dichotomus, Spach, l. c. 44 = H. dichotomum.
marifolius, Fuss, Fl. Transs. 79 = H. vineale.
montanus, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 364 = H. montanum.
oelandicus, Fuss, Fl. Transs. 78 = H. cinereum.
origanifolius, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1836) 364 = H. origanifolium.
penicillatus, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 340 = H. cinereum.
polyanthus, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 364 = H. polyanthum.
prostratus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 354 = H. prostratum.
vinealis, Fuss, Fl. Transs. 79 = H. vineale.

RHODEA, Endl. Gen. 155 (1837) = *Rohdea*, Roth (Liliac.).

RHODIA, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Sedum*, Tourn. (Crassul.).
officinatum, Crantz, Inst. i. 191 = *Sedum roseum*, Scop.

RHODIOLA, Linn. Gen. ed. I. 318 (1737) = *Sedum*, Tourn. (Crassul.).
algida, Fisch. & Mey. in Schrank, Enum. Pl. Nov. 70 = S. algidum.
asiatica, D. Don, Prod. Fl. Nep. 213 = S. asiaticum.
atropurpurea, Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 39) = S. atropurpureum.
elongata, Fisch. & Mey. in Schrank, Enum. Pl. Nov. 68 = S. roseum, Scop.
gelida, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 67 = S. gelidum.
imbricatum, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 47 = S. roseum, Scop.
integrifolia, Rafin. Atl. Journ. 146 = S. roseum, Scop.
Kirilowi, Regel, ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 472 = S. Kirilowii.
minor, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = S. roseum, Scop.
odora, Salisb. Prod. 308 = S. roseum, Scop.
odorata, Lam. Fl. Fr. iii. 647 = S. roseum, Scop.
quadrifida, Fisch. & Mey. in Schrank, Enum. Pl. Nov. 69 = S. quadrifidum.
rosea, Linn. Sp. Pl. 1035 = S. roseum, Scop.
sibirica, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 268 = S. roseum, Scop.
Stephani, Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 39) = S. Stephani.

RHODIOLA, Lour. Fl. Cochinch. 627 (1790) = *Cardiospermum*, Linn. (Sapind.).
biterinata, Lour. l. c. = C. Halicacabum (Masc.).

RHODOCALYX, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 172. t. 51 (1860). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 725.
calycosus, Miers, Apocyn. S. Am. 140 = *Echites calycosa*.
cinereus, Miers, l. c. 141 = *Haplophyton cimidum*.
coccineus, Miers, l. c. = *Dipladenia coccinea*.
crassifolius, Miers, l. c. 139 = *Echites crassifolia*.
crassipes, Miers, l. c. 140 = *Echites crassipes*.
cuneifolius, Miers, l. c. 142. — Bras.
hypoleucus, Miers, l. c. 140 = *Macrosiphonia hypoleuca*.
lanuginosus, Miers, l. c. 139 = *Macrosiphonia lanuginosa*.
ovatus, Miers, l. c. 141 = *Dipladenia coccinea*.
rotundifolius, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 173. — Bras.
suaveolens, Miers, Apocyn. S. Am. 139 = *Macrosiphonia hypoleuca*.
Tweedianus, Miers, l. c. 142. — Bras.

RHODOCHITON, Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1832) 306, in syn. t. 13. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 935.
volubile, Zucc. l. c. — Mexico.

RHODOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 595 (1825) = *Rhodolaena*, Thou. (Chlaenac.).

RHODOCHLAMYS, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 706 = *Salvia*, Tourn. (Labi.).
speciosa, Schau. l. c. 707 = S. Sessei.

RHODOCISTUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 367 = *Cistus*, Tourn.
Berthelotianus, Spach, l. c. = C. vaginatus.

RHODOCLADA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 327. *LINACEAE*.
rhopaloides, Baker, l. c. 328. — Madag.

RHODOCODON, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 280. t. 8. *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 811.
madagascariensis, Baker, l. c. — Madag.

RHODOCOMA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 450 (1836) = *Restio*, Linn.
capense, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 249 = *Restio Rhodocoma*?
Equisetum, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 275 = *Restio Rhodocoma*.

RHODODENDRON, Linn. Sp. Pl. ed. I. 392 (1753). *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 599.

ANTHODENDRON, Reichb. in Moessl. Handb. i. p. xl. 244, 308 (1827).

AZALEA, Linn. Syst. ed. I. (1735).
BRACHYCALYX, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. i. 220 (1840).

CHAMAECISTUS, Regel, Gartenfl. (1874) 60.
HOCHENWARTIA, Crantz, Inst. ii. 468 (1766).
HYMENANTHES, Blume, Bijdr. 862 (1826).
LOISELERIA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 416, in nota (1831).

LOISELEURIA, Reichb. Nom. 127 (1841).
OSMOTHAMNUS, DC. Prod. vii. 715 (1839).
PLINTHOCROMA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 419 (1867).

RHODORA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 561 (1762).
RHODOTHAMNUS, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850) 51. t. 22.

STEMOTIS, Rafin. Sylva Tellur. 152 (1838).
THEIS, Salisb. ex DC. Prod. vii. 715 (1835).
TSUTSUSI, Adans. Fam. ii. 164 (1763).

VIREYA, Blume, Bijdr. 854 (1826).
acuminatum, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 886. — Borneo.

Adansoni, Pépin, Ann. Fl. et Pom. (1839) 304. — Hab. ?
aeruginosum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 22 = campanulatum.

afghanicum, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 75. — Afghan.
albiflorum, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 43. t. 33; ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xxiv. (1838) 422. — Am. bor. occ.

Albrechtii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871) 227. — Japon.
album, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 72. — Java.
album, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 154 = arboreum.

album, Hoffmgg. Verz. Pfl. 192 = albiflorum.
algarvense, Page, Prod. Southampt. Gard. 38 = baeticum ?

alstroemeroides, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) t. 384.
altaclerense, Lindl. Bot. Reg. t. 1414 = arboreum.

amoenum, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 80; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 64 = indicum.
angustifolium, Hoppe, in Flora, xx. (1837) 185, 205 = hirsutum.

Anthopogon, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 409. — As. bor.; Reg. Himal.

Anthopogon, Wall. Cat. n. 759, partim = setosum.
anthopogonoides, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 350. — China.

apocum, Stein, Gartenfl. (1885) 194. t. 1196. — Ins. Philipp.

arborescens, Torr. Fl. U. St. i. 425. — Am. bor.
arborescens, Sm. Exot. Bot. i. 9. — Ind. or.; Reg. Himal.; Zeylan.

arfakianum, Becc. Malesia, i. (1878) 201. — N. Guin.
argenteum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 9 = grande.

aristatum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 42, nomen = barbatum ?

RHODODENDRON:—

aromaticum, Wall. Cat. n. 1520 = R. Anthopogon.
assamicum, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1881) i. 8 (Quid ?). — Assam.

Aucklandii, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 11 = Griffithianum.

aureum, Georgi, Reise Russ. Reich. i. 214 = chrysanthum.

azaleoides, Desf. Tabl. ed. II. 272 = ponticum.
baeticum, Boiss. & Reut. Diagn. Sér. II. iii. 118. — Hispan.; Lusit.

balsaminaeflorum, T. Moore, Fl. & Pomol. (1883) 81. t. 587.

barbatum, G. Don, Gen. Syst. iii. 844. — Reg. Himal.
Batemani, Hook. f. Bot. Mag. t. 5387 = campanulatum.

bhotanicum, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 475. — Reg. Himal.

bicolor, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 344 = nudiflorum.
bigener, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 450 = maximum.

blandfordiaeflorum, Hook. Bot. Mag. t. 4930 = cinabarinum.

Blandinianum, Martr. in Hérincq, Hort. Franç. (1859) 152. t. 13. — Am. bor.

Blumei, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 366 = niveum.

Boothii, Nutt. l. c. 356. — Reg. Himal.

brachycarpum, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iii. 843. — Japon.

brachycarpum, Zucc. ex Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xvi. (1871) 39 = indicum.

Breynii, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 77; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 46 = indicum.

Brookeanum, Low, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 82. — Borneo.

Buergeri, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 34 = indicum.

Burmanni, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = ledifolium.
buxifolium, Low, ex Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 890. — Borneo.

calendulaceum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 362 = occidentale.

calendulaceum, Torr. Fl. U. St. i. 425. — Am. bor.
californicum, Hook. Bot. Mag. t. 4863. — Am. bor. occ.

Calleryi, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 81; in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 66 = indicum.

calophyllum, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 362 = Maddenii.

calycinum, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 81; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 65 = ledifolium.

camelliaeflorum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 28. — Reg. Himal.

campanulatum, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 410. — Reg. Himal.

Campbelliae, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 6 = arboreum.

campylocarpum, Hook. f. l. c. t. 30. — Reg. Himal.

campylogynum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 10. — China.

camtschaticum, Pall. Fl. Ross. i. 48. t. 33. — Kamtschat.; Ins. Aleut.

Candelabrum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 29 = Thomsonii.

canescens, G. Don, Gen. Syst. iii. 848 = nudiflorum.
capitatum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxiii. (1877) 351. — China.

Carnarvonii, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 342, nomen.
Cartonianum, DC. Prod. vii. 727.

catawbiense, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 194 = ellipticum.

catawbiense, Michx. Fl. Bor. Am. i. 258. — Am. bor.

Catesbaei, Forbes, Hort. Woburn. 90 = seq.

Catesbaeum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vii. 165 = ponticum ?

caucasicum, Sims, Bot. Mag. t. 1145 = seq.

caucasicum, Pall. Fl. Ross. i. 46. t. 31. — Reg. Caucas.

Cavroni, André, in Rev. Hort. (1885) 60, cum ic.

celebicum, DC. Prod. vii. 725 = malayanum.

cephalanthum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 9. — China.

Chamaecistus, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 513 = Redowskianum.

Chamaecistus, Linn. Sp. Pl. 392 = Rodothamnus Chamaecistus.

Championae, Hook. Bot. Mag. t. 4609. — China.

Chapmanii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 61. — Am. bor.

RHODODENDRON :—

chrysanthum, *Pall. Reise*, iii. 729.—Davuria.
 ciliatum, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 24.—Reg. Himal.
 cinnabarinum, *Hook. f. l. c. t. 8.*—Reg. Himal.
 cinnamomeum, *Wall. Cat. n. 760*=arborescens.
 cistiflorum, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 133=R. Chamaecistus.
 citrinum, *Hassk. Cat. Pl. Hort. Bog. Alt.* 161.—Java.
 Clivianum ×, *J. Sm. in Bot. Mag.* t. 4478.
 Collettianum, *Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 75.—Afghan.
 cordifolium, *Dehnh. Cat. Pl. Hort. Camald.* ed. II. 23.—Hab.?
 crispiflorum, *Planch. in Fl. des Serres*, ix. (1853-54) 83=indicum.
 Cunninghamii, *Hort. ex C. Koch, Dendrol.* ii. i. 166=ponticum.
 Curtissii ×, *T. Moore, Flor. & Pomol.* (1884) 113. t. 615.
 Dalhousiae, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* 2. t. 2.—Reg. Himal.
 Danielsianum, *Planch. in Fl. des Serres*, ix. (1853-54) 79=indicum.
 dauricum, *Linn. Sp. Pl.* 392.—Sibir.
 deciduum, *Andr. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 450=ponticum.
 decumbens, *D. Don, ex G. Don, Gen. Syst.* iii. 846=indicum.
 deflexum, *Griff. Notul.* iv. 303; *IC. Pl. As.* t. 519=triflorum.
 Degronianum, *Carr. in Rev. Hort.* (1869) 368.—Japon.
 dilatatum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 34.—Japon.
 durionifolium, *Becc. Malesia*, i. (1878) 202.—Borneo.
 Edgarii, *Gamble, Darjeeling List Trees*, 52=campanulatum.
 Edgeworthii, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* 2. t. 21.—Reg. Himal.
 elaeagnoides, *Hook. f. l. c. t. 23 B*=lepidotum.
 ellipticum, *Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr.* ii. 194.—Am. bor.
 enneandrum ×, *DC. Prod.* vii. 728.
 ericoides, *Low, ex Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* t. 887.—Borneo.
 eximium, *Nutt. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 364=Falconeri.
 Falconeri, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 10.—Reg. Himal.
 Farrerae, *Tate, ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II.* t. 95.—China.
 ferrugineum, *Linn. Sp. Pl.* 392.—Europ.; As. bor.
 flavum, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 847=ponticum.
 flavum, *Pall. Reise*, iii. 320=chrysanthum.
 formosum, *Wall. Pl. As. Rar.* iii. 3. t. 207.—Reg. Himal.
 Fortui, [*T. Moore*,] *Lindl. in Gard. Chron.* (1859) 868; *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5596 (Fortunei).—China.
 fragrans, *Hort. ex DC. Prod.* vii. 722=maximum.
 fragrans, *Maxim. Rhod. As. Or.* 16=R. Anthopogon.
 fulgens, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 25.—Reg. Himal.
 gaultherioides, *Boiss. & Bal. ex Boiss. Pl. Or. Nov.* Dec. i. 4=Orphanidesia gaultherioides.
 germanicum, *Hoppe, in Flora*, xx. (1837) 187=hirsutum.
 Gibsonii, *Paxt. Mag. Bot.* viii. (1841) t. 217=formosum.
 glabratum, *Hoppe, in Flora*, xx. (1837) 185=hirsutum.
 glaucum, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 848=viscosum.
 glaucum, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 17.—Reg. Himal.
 Gowenianum ×, *Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I.* t. 263.
 gracile, *Low, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc.* iii. (1848) 84.—Borneo.
 grande, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 176.—Reg. Himal.
 Griffithianum, *Wight, Ic. Pl.* t. 1203.—Reg. Himal.
 Griffithii, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* 2, sphalm.=praec.
 halense ×, *Gremb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiv. (1874) 375.—Europ.
 hatamense, *Becc. Malesia*, i. (1878) 202.—N. Guin.
 Henryi, *Hance, in Journ. Bot.* xix. (1881) 241; xxii. (1884) 22.—China.

RHODODENDRON :—

hirsutiformum ×, *Gremb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiv. (1874) 376.—Europ.
 hirsutum, *Linn. Sp. Pl.* 392.—Europ. med.
 hispidum, *D. Don, in Edinb. Phil. Journ.* vi. (1822) 48.—Japon.
 hispidum, *Torr. Fl. U. St. i.* 425=viscosum.
 Hodgsonii, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 15.—Reg. Himal.
 Hookeri, *Nutt. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 358.—Reg. Himal.
 hyacinthiflorum, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 450=ponticum.
 hybridum ×, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 195.
 indicum, *Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343*; *Brit. Flow. Gard. Ser. II.* t. 128.—China.
 intermedium, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 448=hirsutum.
 intermedium, *Tausch, in Flora*, xix. (1836) 36=ferrugineum.
 intermedium, *Wender. l. c. ix.* (1826) 357=praec.?
 jasminiflorum, *Hook. Bot. Mag.* t. 4524.—Java.
 javanicum, *Benn. Pl. Fav. Rar.* 85. t. 19.—Java.
 Jenkinsii, *Nutt. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 361.—Reg. Himal.
 Jodogawa, *Hort. Bog. ex Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 162=Keiskei.
 Kaempferi, *Planch. in Fl. des Serres*, ix. (1853-54) 77=indicum.
 kamtschaticum, *Pall. Fl. Ross.* i. 48. t. 33.—As. bor. or.
 Keiskei, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 163.—Japon.
 Kendrickii, *Nutt. in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. II. xii. (1853) 10.—Reg. Himal.
 Knightianum ×, *Forbes, Hort. Woburn.* 90.
 Keysii, *Nutt. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 353.—Reg. Himal.
 Kochii, *Stein, in Gartenfl.* xxxii. (1885) 193. t. 1195.—Ins. Philipp.
 Koempferi, *Planch. in Rev. Hort.* Sér. IV. iii. (1854) 46, sphalm.=Kaempferi.
 Konori, *Becc. Malesia*, i. (1878) 200.—N. Guin.
 Korthalsii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 43.—Sumatra.
 lampungum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 585=malayanum.
 lanatum, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 16.—Reg. Himal.
 lancifolium, *Hook. f. l. c. t. 4*=barbatum.
 lancifolium, *Moench, Meth.* 45=ponticum.
 lapponicum, *Wahlenb. Fl. Suec.* 249.—Reg. bor. et arct.
 lateritium, *Planch. in Fl. des Serres*, ix. (1853-54) 80; et in *Rev. Hort.* Sér. IV. iii. (1854) 63=indicum.
 latifolium, *Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr.* ii. 195.—Am. bor.?
 latifolium, *Hoppe, in Flora*, xxiii. (1840) 525=hirsutum.
 ledifolium, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 846.—China.
 lepidotum, *Wall. Cat. n. 758*.—Reg. Himal.
 leptocarpum, *Nutt. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 256.—Reg. Himal.
 leucanthum, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1835) 115=ledifolium.
 Lindleyi, *T. Moore, in Gard. Chron.* (1864) 364.—Ind. or.?
 linearifolium, *Poir. Encyc.* vi. 267.—Ind. or.?
 linearifolium, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. III. (1846) 131.—Japon.
 Lobbii, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1871) 1323.—Hab.?
 longiflorum, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* iii. (1848) 88.—Borneo.
 longifolium, *Nutt. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 366=grande.
 Loureiriana, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 846.—Cochinch.
 Loweii, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* t. 883.—Borneo.
 Loweii, *Loud. Gard. Mag.* xi. (1835) 79, 190=ponticum.
 lucidum, *Nutt. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 363.—Reg. Himal.
 luteum, *Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343*.—Turcia.
 macranthum, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 846=indicum.
 macranthum, *Griff. Notul.* iv. 303; *IC. Pl. As.* t. 520=Maddenii.
 macrocarpos, *Griff. Itin. Notes*, 138=Dalhousiae.

RHODODENDRON :—

macrocarpum, *Van Houtte, in Fl. des Serres*, xi. (1857) 83 (Quid?).—Ind. or.
 macrophyllum, *D. Don, ex G. Don, Gen. Syst.* iii. 848.—Am. bor. occ.
 macrosepalum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xv. (1871) 228.—Japon.
 macrostemon, *Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VII. xvi. (1871) n. IX. 41.—Japon.
 Maddenii, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 18.—Reg. Himal.
 malayanum, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 17.—Sumatra.
 Manglesi ×, *Hort. Veitch.—Cf. Gard. Chron.* (1885) ii. 48.
 Mariae, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 230.—China.
 maximum, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 43 (excl. syn.)=macrophyllum.
 maximum, *Linn. Sp. Pl.* 392.—Am. bor.
 maximum, *Thunb. Fl. Jap.* 181=Metternichii.
 Metternichii, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap.* i. 23. t. 9.—Japon.
 micranthum, *Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VII. xvi. (1870) n. IX. 18=R. Anthopogon.
 micranthum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) i. 586.—China.
 minus, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 258=punctatum.
 molle, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 846.—China.
 molle, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. III. (1846) 131=sinense.
 Morterii ×, *Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. i.* t. 10.
 moumainense, *Hook. Bot. Mag.* t. 4904.—Burma.
 mucronatum, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 846=ledifolium.
 mucronulatum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. vii. 155; xxi. (1848) i. 585=dauricum.
 multicolor, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 586.—Sumatra.
 mutabile, *Webb, ex Royle, Illustr. Bot. Himal.* 259=campanulatum.
 myrtifolium, *Lodd. Bot. Cab.* t. 908=ponticum.
 myrtifolium, *Schott & Kotschy, ex Schott, in Bot. Zeit.* ix. (1851) 17=ferrugineum.
 narcissiflorum, *Planch. in Fl. des Serres*, ix. (1853-54) 82; et in *Rev. Hort.* Sér. IV. iii. (1854) 67 (sp. dub.).—China.
 nilagiricum, *Zenk. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi.* (1836) 150; *Pl. Ind.* t. 15=arborescens.
 nitidum, *Torr. Fl. U. St. i.* 425=viscosum.
 nivale, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal.* t. 26.—Reg. Himal.
 niveum, *Hook. f. in Journ. Hort. Soc.* vii. (1852) 78.—Reg. Himal.
 nobile, *Wall. Cat. n. 1521*=campanulatum, barbatum.
 Nobleanum, *Hort. ex Lindl. Bot. Reg.* t. 1820. f. 1=caucasicum.
 nudiflorum, *Torr. Fl. U. St. i.* 424.—Am. bor.
 Nuttallii, *Booth, ex Nutt. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 355.—Reg. Himal.
 oblongum, *Griff. Notul.* iv. 303; *IC. Pl. As.* t. 523=Griffithianum.
 obovatum, *Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. Consp.* 6=lepidotum.
 obtusum, *Hort. ex Wats. Dendrol.* ii. t. 162=ponticum.
 obtusum, *Planch. in Fl. des Serres*, ix. (1853-54) 80 et in *Rev. Hort.* Sér. IV. iii. (1854) 64=indicum.
 occidentale, *A. Gray, in Bot. Calif.* i. 458.—Am. bor. occ.
 odoratum, *Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 450=ponticum.
 officinale, *Salisb. Parad. Lond.* t. 80=chrysanthum.
 Oldhamii, *Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VII. xvi. (1871) n. IX. 34.—Ins. Formosa.
 orbiculare, *Decne. in Fl. des Serres*, xxii. (1877) 169.—Tibet.
 ornatisissimum ×, *Versch. in Illustr. Hort.* xiv. (1867) t. 530.
 ornatum, *Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t.* 137=viscosum.
 ovatum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xv. (1871) 230.—China.
 palustre, *Turcz. ex DC. Prod.* vii. 724=R. Anthopogon.
 papuanum, *Becc. Malesia*, i. (1878) 201.—N. Guin.
 Parishii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 475.—Burma.
 parviflorum, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. I. 253=ponticum.
 parviflorum, *Hort. ex DC. Prod.* vii. 723=punctatum

RHODODENDRON:—

- parviflorum*, F. Schmidt, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xii. (1868) n. II. (Reisen Amurl.) 158, sphalm. = *parvifolium*.
parvifolium, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. ix. (1834) 237 = R. Anthopogon.
pelargonioeflorum ×, Van Houtte, in Fl. des Serres, x. (1854–55) 225. t. 1063.
pendulum, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 13.—Reg. Himal.
phoeniceum, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = *ledifolium*.
pictum ×, Forbes, Hort. Woburn. 232.
planifolium, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 365 = *campanulatum*.
polifolium, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 287 = *Andromeda Polifolia*.
ponticum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 562.—As. Min.; Syria.
praecox ×, Davis, ex Gard. Chron. (1878) i. 335.
procerum, Salisb. Prod. 287 = maximum.
prunifolium, Forbes, Hort. Woburn. 91 (Quid?).—Ind. or. Przewalskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 350.—China.
pulchellum, Salisb. Prod. 287 = R. Rhodora.
pulcherrimum, Lindl. Bot. Reg. t. 1820 = *caucasicum*.
pulchrum, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 117 = *ledifolium*.
pumilum, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 14.—Reg. Himal.
pumilum, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 354 = *leptocarpum*.
punctatum, Andr. Bot. Rep. t. 36.—Am. bor.
punicum ×, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853–54) 79.
punicum, Roxb. Hort. Beng. 33; Fl. Ind. ii. 409 = *arborescens*.
purpureum, G. Don, Gen. Syst. iii. 843 = maximum.
purpureum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 154 = *arborescens*.
Purshii, G. Don, l. c. = maximum.
uinquefolium, Bisset & S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 292.—Japon.
ramentaceum, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853–54) 81; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 65 = *indicum*.
Redowskianum, Maxim. Prim. Fl. Amur. 189.—Reg. Amur.
reticulatum, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iii. 846.—Japon.
retusum, Benn. Pl. Fav. Rar. 88. t. 20.—Java; Sumatr.
Rhodora, F. F. Gmel. Syst. 694.—Am. bor.
rhombicum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 164.—Japon.
Rollisonii, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 25 = *arborescens*.
Rovellii ×, Leroy, in Rev. Hort. (1867) 159.
Roylei, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 7 = *cinnabarinum*.
rugosum, Low, ex Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 885.—Borneo.
Russellianum ×, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 9 = *catawbiense*.
salicifolium, Becc. Malesia, i. (1878) 202.—Borneo.
salignum, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* Consp. 6. t. 23 = *lepidotum*.
scabrum, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = *Metternichii*.
Schlippenbachii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871) 226.—Korea.
semibarbatum, Maxim. l. c. 229.—Japon.
Seniavini, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xvi. (1871) n. ix. 33.—China.
serpyllifolium, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 165.—Japon.
setosum, D. Don, in Trans. Wern. Soc. iii. (1821) 408.—Reg. Himal.
Seymourii ×, Herb. ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. v. (1837) 312.
Shepherdii, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 360.—Reg. Himal.
Sieboldii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 33 = *indicum*.
simiarum, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881) 243; xxii. (1884) 22.—China.
Simsii, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853–54) 78 = *indicum*.
sinense, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 290.—Japon.
Sminowii, Trautv. ex Regel, in Gartenfl. (1885) 335.—Reg. Caucas.
Smithii, Nutt. in Hook. Bot. Mag. t. 5120 = *barbatum*.
Smithii ×, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 342.

RHODODENDRON:—

- sparsiflorum*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 363 = *camelliaeflorum*.
speciosum, Salisb. Prod. 287 = *ponticum*.
speciosum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343 = *indicum*?
Standishii ×, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 210.
subcordatum, Becc. Malesia, i. (1878) 203.—Borneo.
sublanceolatum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 163.—Japon.
Taylori ×, Veitch, in Flor. Mag. N. S. (1877) t. 242.
Teysmannii, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 585.—Sumatra.
thibaudiense, Hort. ex Dombr. Fl. Mag. iv. (1865) t. 253 = *cinnabarinum*.
Thomsonii, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 12.—Reg. Himal.
Thunbergii, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853–54) 78 = *indicum*.
thymifolium, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 351.—China.
tigrinum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 451 = maximum.
Toverenae, F. Muell. in Vict. Natural. i. (1884) 101.—N. Guin.
tricolor ×, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343.
triflorum, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 19.—Reg. Himal.
trispidium, Torr. Fl. North & Middle St. i. 184, sphalm. = *hispidum*, Torr.
Tschonoskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871) 230.—Japon.
tubiflorum, DC. Prod. vii. 725 = *malayanum*.
undulatum, Steud. Nom. ed. II. ii. 451 = *arborescens*.
Ungerni, Trautv. ex Regel, in Gartenfl. (1885) 335.—Reg. Caucas.
vaccinioides, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 3.—Reg. Himal.
variolosum, Becc. Malesia, i. (1878) 206.—Borneo.
Vaseyi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 48.—Am. bor.
Veitchianum, Hook. Bot. Mag. t. 4992.—Burma.
velutinum, Becc. Malesia, i. (1878) 204.—Borneo.
venosum, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 365 = *Falconeri*.
venustum, Salisb. Prod. 287 = *arborescens*.
verticillatum, Low, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 86.—Borneo.
virgatum, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 26.—Reg. Himal.
viscosum, Fisch. ex Herd. in Act. Hort. Petrop. i. (1870) 350 = *Redowskianum*.
viscosum, Torr. Fl. U. St. i. 424.—Am. bor.
vittatum, Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 66.—China.
Wallichii, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 6 = *campanulatum*.
Weyrichii, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xvi. (1871) n. ix. 26.—Japon.
Wightii, Hook. f. *Rhod. Sikkim-Himal.* t. 27.—Reg. Himal.
Wilsoni, Nutt. ex Hook. Bot. Mag. t. 5116 = *grande*.
Windsorii, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 357 = *arborescens*.
zeylanicum, Hort. ex Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1364 = *arborescens*.

RHODOGERON, Griseb. Cat. Pl. Cub. 151 (1866).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 291.
coronopifolius, Griseb. l. c. 152.—Cuba.

RHODOLAENA, Thou. Hist. Vég. Isles. Afr. 47. t. 13 (1806). **CHLAENACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 195.
PANDORA, Noronha, ex Thou. l. c. 48 (1806).
RHODOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 595 (1825).
acutifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 322.—Madag.
altivola, Thou. Hist. Vég. Isles. Afr. 48. t. 13.—Madag.

RHODOLEIA, Champ. ex Hook. Bot. Mag. t. 4509 (1850). **HAMAMELIDEAE**, Benth. & Hook. f. i. 668.
Championi, Hook. l. c.—China.
formosa, Champ. ex Hance, in Walp. Ann. iii. 842 = *Championi*.
Teysmanni, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. vi. (1857) 123.—Sumatra.

RHODOLIRION, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 65 = **Hippeastrum**, Herb. (Amaryll.).
andinum, Phil. l. c. 66 = H. Rhodolirion.
montanum, Phil. l. c. 65 = H. uniflorum.

RHODOMYRTUS, Reichb. Nom. 117 (1841).
MYRTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 713.
cymiflora, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 273.—Austral.
macrocarpa, Benth. Fl. Austral. iii. 273.—Austral.
psidioides, Benth. l. c. 272.—Austral.
tomentosa, Wight, Spicil. Neilgherr. i. 60. t. 71.—Ind. or.; Malaya.
trineura, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 272.—Austral.

RHODOPHIALA, Presl, Bot. Bemerk. 115 (1844).
Hippeastrum, Herb. (Amaryll.).
amarylloides, Presl, l. c. = H. pratense.
andina, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 543 = H. Herbertianum.
biflora, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 66.—Chili.
laeta, Phil. Fl. Atac. 51 = H. pratense.
modesta, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 544 = H. modestum.
uniflora, Phil. Fl. Atac. 51 = H. uniflorum.
Volckmanni, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 259 = H. pratense.

RHODOPHORA, Neck. Elem. ii. 91 (1790) = **Rosa**, Tourn.

RHODOPSIS, Lilja, Fl. Sverig. Suppl. i. 42 (1840) = **Calandrinia**, H. B. & K. (Portulac).
discolor, Lilja, l. c. = C. discolor.
speciosa, Lilja, l. c. = C. Menziesii?

RHODOPSIS, Reichb. Nom. 168 (1841) = **Rosa**, Tourn.

RHODOPTERA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 45 (1836) = **Rumex**, Tourn. (Polygon.).
roseus, Rafin. l. c. 46 = *Rumex roseus*.

RHODORA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 561 (1763) = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).
canadensis, Linn. l. c. = Rhodod. Rhodora.
congesta, Moench, Meth. 68 = Rhodod. Rhodora.

RHODORHIZA, Webb, in Bot. Reg. (1841) Misc. 69 = **Convolvulus**, Linn.
florida, Webb, l. c. 70 = C. floridus.
fruticulosa, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 33 = C. fruticulosus.
glandulosa, Webb, in Bot. Reg. (1841) Misc. 70 = C. fruticulosus.
Perraudieri, C. Bolle, in Bonplandia, ix. (1861) 54 = C. Perraudieri (in Addend.).
scoparia, Webb, in Bot. Reg. (1841) Misc. 70 = C. scoparius.
virgata, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 30 = C. scoparius.
volubilis, C. Bolle, in Bonplandia, ix. (1861) 54 = C. Massoni.

RHODORMIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 93 (1836) = **Salvia**, Tourn. (Labiata).
rosaefolia, Rafin. l. c. 94 = S. rosaefolia.

RHODORHIZA, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 28 (1841–60) = **RHODORIZA**, Webb = **Convolvulus**, Linn.

RHODOSERIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 94 = **Onoseris**, DC. (Compos.).
conspicua, Turcz. l. c. 95 = O. Isotypus.

RHODOSPATHA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 91. t. 300 (1845). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 990.
ANEPSIAS, Schott, Gen. Aroid. t. 73 (1858).
ATIMETA, Schott, l. c. t. 71 (1858).
blanda, Schott, in Journ. Bot. ii. (1864) 53.—Bras.
heliconiifolia, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 317.—Bras.
latifolia, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 91. t. 300.—Peruv.
Lechleriana, Schott, Prod. Aroid. 351 = *latifolia*.
Melinoni, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 483 = *blanda*.

RHODOSPATHA :—

Moritziana, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 109.—Venezuela.
oblongata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 91.—Bras.; Peruv.
Poeppigii, Schott, Gen. Aroid. 72 = latifolia.
surinamensis, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 368 = oblongata.
Wendlandii, Schott, in Journ. Bot. ii. (1864) 52.—Am. centr.

RHODOSPHAERA, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 423. **ANACARDIACEAE**.
rhodanthema, Engl. l. c. 424.—Austral.

RHODOSTACHYS, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 57. **BROMELIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 662.
RUCKIA, Regel, Gartenfl. (1868) 69. t. 571.
andina, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 58.—Chili.
bicolor, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 662.—Chili.
grandiflora, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 202.—Chili.
Joinvillei, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 662 = pitcairniaefolia.
litoralis, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 201.—Chili.
pitcairniaefolia, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 662.—Chili.

RHODOSTOMA, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 286 = **Palicourea**, Aubl. (Rubiaceae).
gardenioides, Scheidw. l. c. = P. gardenioides.

RHODOTHAMNUS, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) t. 22 = **Rhododendron**, Linn. (Ericaceae).
kamtchaticus, Lindl. & Paxt. l. c. = Rhodod. kamtchaticum.

RHODOTHAMNUS, Reichb. in Moessl. Handb. 688 (1827). **ERICACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 596.
Chamaecistus, Reichb. l. c. —Europ.

RHODOTYPOS, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. 187. t. 99 (1835). **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 613.
kerrioides, Sieb. & Zucc. l. c. —Japon.

RHODOXYLON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 79 (1836) = **Convolvulus**, Tourn.
floridum, Rafin. l. c. 80 = C. floridus.
scoparium, Rafin. l. c. = C. scoparius.

RHOEA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = **Punica**, Tourn. (Lythraceae).
Punica, St. Lag. l. c. = P. Granatum.

RHOEO, Hance, in Walp. Ann. iii. 659 (1853). **COM-MELINACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 855.
discolor, Hance, l. c. 660.—Mexic.

RHOIACARPOS, A. DC. in DC. Prod. xiv. 634 (1857) = **Colpoon**, Berg. (Santal).
capensis, A. DC. l. c. 635.—Afr. austr.

RHOICARPOS, Ind. Kew. supra, i. 586, in syn., sphalm. = praec.

RHOMBIFOLIUM, Rich. ex DC. Prod. ii. 235 (1825) = **Clitoria**, Linn. (Legumin).
canescens, Rich. ex DC. l. c. 236 = C. guianensis.

RHOMBODA, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 181 = **Hetaeria**, Blume (Orchid.).
lamellata, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 747 = H. lamellata.
longifolia, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 181 = H. longifolia.

RHOMBOLYTHRUM, Link. Hort. Berol. ii. 96 (1833) = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).
Berteroanum, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 387.—Chili.
quinquenerivium, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 293.—Chili.
rhomboideum, Link. Hort. Berol. ii. 296 = T. filiformis.
valdivianum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 294 = Poa valdiviana.

RHOMBOSPORA, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1850) 114 = **Greenia**, Wight & Arn. (Rubiaceae).
Commersonii, Korth. l. c. —Sumatra.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 345 = Wendlandia glabrata.

VOL. II.

RHOPALA, Schreb. Gen. i. 62 (1789) = **Roupala**, Aubl. (Proteaceae).

RHOPALEPHORA, Hassk. in Bot. Zeit. xxii. (1864) 58 = **Aneilema**, R. Br. (Commel.).
Blumei, Hassk. l. c. 59 = A. monadelphum.

RHOPALOBlaste, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 187. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 891.
hexandra, Scheff. l. c. 156. t. 26-27 f. 1.—Ins. Molucc.
micrantha, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 892.—N. Guin.
Princeps, Hort. Bull.—Cf. Gard. Chron. (1880) i. 759.—Hab.?
singaporensis, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 892 = Ptychoraphis singaporensis.

RHOPALOCARPUS, Teijsm. & Binn. ex Miq. Ann. Mus. Bat. Lugd. Bat. ii. 22 (1865) = **Anaxagorea**, A. St. Hil. (Anonac.).
fruticosus, Teijsm. & Binn. ex Miq. l. c. = A. fruticosa.

RHOPALOCNEMIS, Jungh. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. Suppl. i. (1841) 213. **BALANOPHOREAE**, Benth. & Hook. f. iii. 238.
Phaeocordylis, Griff. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 100. t. 8.
phalloides, Jungh. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. Suppl. i. (1841) 215.—Reg. Himal.; Java.

RHOPALOSTIGMA, Phil. Fl. Atac. 42. t. 6 (1860) = **Phrodus**, Miers (Solanac.).
microphyllum, Phil. l. c. —Chili.
pendulum, Phil. l. c. —Chili.
thymifolia, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 24 = P. Bridgesii.

RHOPALOSTIGMA, Schott, in Oestr. Bot. Zeit. ix. (1859) 39 = **Staurostigma**, Scheidw. (Aroid.).
Riedelianum, Schott, l. c. = S. Riedelianum.

RHOPALOSTYLIS, Klotzsch, ex Baill. Adansonina, v. (1864-65) 317 = **Dalechampia**, Linn. (Euphorb.).
buettnerioides, Klotzsch, l. c. = D. micrantha.

RHOPALOSTYLIS, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 180. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 890.
Baueri, H. Wendl. & Drude, in Bot. Zeit. xxxv. (1877) 638.—Ins. Norfolk et Chatham.
sapida, H. Wendl. & Drude, in Kerch. Palm. 255.—N. Zel.

RHOPIUM, Schreb. Gen. 608 (1791) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).
citrifolium, Willd. Sp. Pl. iv. 150 = P. attenuatus.

RHOPHOSTEMON, Wittst. Etymol. Handw. 763 (1856) = **ROTROSTEMON**, Blume = **Pogonia**, Juss (Orch.).

RHORADENDRON, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 59 (1857), sphalm. = **Phoradendron**, Nutt. (Loranthac.).

RHUACOPHILA, Blume, Enum. Pl. Jav. 13 (1827) = **Dianella**, Lam. (Liliac.).
celebica, Blume, l. c. 14 = D. celebica.
javanica, Blume, l. c. = D. nemorosa.

RHUS, [Tourn.] Linn. Gen. ed. I. 84 (1737). **ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 418.
COTINUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
LOBADIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 357; et in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 98.
MALOSMA, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 393 (1883).
METOPIMUM, P. Br. Hist. Jamaic. 177 (1756).
PHILOSTEMON, Rafin. Fl. Ludov. 107 (1817).
POCOPHORUM, Neck. Elem. ii. 226 (1790).
SCHMALZIA, Desv. ex DC. Prod. ii. 72 (1825).
STYFHONIA, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 220 (1838).
TOXICODENDRON, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
TURPINIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352.
VERNIX, Adans. Fam. ii. 342 (1763).

RHUS :—

abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 31, nomen; & ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 438.—Abyss.
acuminata, DC. Prod. ii. 68 = succedanea.
acuminata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = laevigata.
acutidens, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 423.—Afr. austr.
acutiloba, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 612 = R. Toxicodendron.
aequalis, Pers. Syn. i. 326.—Hab.?
affinis, Wall. Cat. n. 995 = semialata.
africana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11.—Afr. austr.
aglaophylla, Eckl. & Zeyh Enum. 148 = undulata.
ailanthoides, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 89 = Picrasma quassioides.
alata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 52 = Hippobromus alatus.
albicans, Willd. Enum. Hort. Berol. 325 = albida.
albida, Schousb. Vextr. Marokko, 142.—Afr. bor.; Arab.; Syria.
albomarginata, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 519.—Afr. austr.
amazonica, Poepp. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 278 = Tapirira guianensis.
Amela, D. Don, Prod. Fl. Nep. 248 = semialata.
amoena, Salisb. Prod. 169 = R. Coriaria.
ampla, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 429.—Afr. trop.
Andrieuxii, Engl. l. c. 389.—Mexic.
angolensis, Engl. l. c. 448.—Afr. trop.
angustifolia, Linn. Sp. Pl. 267.—Afr. austr.
angustifolia, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 512 = puberula.
antillana, Egg. Fl. St. Croix, 41.—Ins. S. Crucis.
arborea, DC. Prod. ii. 73 = Schmidelia Cominia.
arborea, Macfad. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 177 = Picrodendron arboreum.
arborescens, DC. Prod. ii. 73.—N. Granat.
arenaria, Wierzb. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 351 = R. Cotinus.
argentea, Eckl. & Zeyh. Enum. 149 = dissecta.
argentea, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 = angustifolia.
argyrophylla, Presl, Bot. Bemerck. 42 = Anaphrenium argenteum.
aromatica, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 367.—Am. bor.
atomaria, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 51. t. 343 = villosa.
atra, Forst. f. Prod. 23 = Oncocarpus vitiensis.
Aucheri, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 5.—Arab.
bahamensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 72 (Quid ?).—Ins. Bahama.
bicolor, Licht. ex Schult. Syst. vi. 661 = tomentosa.
Bolusii, Sond. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 436.—Afr. austr.
brasilensis, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 198.—Bras.
Bucki-Amela, Roxb. Fl. Ind. ii. 99 = semialata.
Bucki-Amelam, Roxb. Hort. Beng. 22 = praec.
Burchelli, Sond. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 412.—Afr. austr.
Burkeana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 514.—Afr. austr.
Burmanni, DC. Prod. ii. 69 = mucronata.
Cacodendron, Ehrh. in Hann. Mag. (1783) 227; et ej. Beitr. iii. 20 = Ailanthus glandulosa.
calycina, Steud. Nom. cd. II. ii. 451 = Loxostylis alata.
canadensis, Marsh. Arbust. 129 = aromatica.
canadensis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = typhina.
carolinense, Marsh. Arbust. 129 = glabra?
carolinina, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = glabra.
caustica, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 15 = Lithraea venenosa.
Cavanillesii, DC. Prod. ii. 69 = lucida.
celastroides, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 519.—Afr. austr.
chinensis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = semialata.
ciliata, Licht. ex Schult. Syst. vi. 661.—Afr. austr.
ciliolata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 470.—Mexic.
cirrhiflora, Linn. f. Suppl. 184 (= Cissus pauciflora).—Afr. austr.
Clausseniana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 469 = Lithraea Aroeirinha.
Cobbe, Linn. Sp. Pl. 267 = Allophylus Cobbe.
Cominia, Linn. Syst. ed. X. 964 = Schmidelia Cominia.

4 Y

RHUS:—

- Commersonii, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 264.—Bras. concinna, *Burch. Trav.* i. 360.—Afr. austr.
 concolor, Presl, Bot. Bemerk. 42 = Anaphrenium concolor.
 copallina, *Linn. Sp. Pl.* 266.—Am. bor.
 corallina, J. F. Gmel. Syst. 1615 (Index), sphalm. = praec.
 coriacea, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 418.—Afr. austr.
 Coriaria, *Linn. Sp. Pl.* 265.—Reg. Mediterr.; Persia.
 cotina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = R. Cotinus.
 cotinoides, *Nutt. ex Torr. & Gray. Fl. N. Am.* i. 217, in syn.; et ex *Chapm. Fl. S. U. St.* 70.—Am. bor.
 Cotinus, *Linn. Sp. Pl.* 267.—Reg. Medit.; Oriens; Himal.; China.
 Cotinus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 216 = cotinoides.
 crassinervia, Presl, Bot. Bemerk. 42 = laevigata.
 crataegiformis, Pers. Syn. i. 326 = albida.
 crenata, *Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blätter*, i. (1803) 28.—Afr. austr.
 crenatifolia, *Schlecht. in Linnaea*, xvi. (1842) 483.—Mexic.
 crenulata, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 142 = glaucescens.
 crispa, Harv. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 443 = Guenzii.
 cuneifolia, *Linn. f. Suppl.* 183.—Afr. austr.
 cuneifolia, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 513 = dentata.
 decipiens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = Schmidelia decipiens.
 decipiens, Wight & Arn. Prod. 172 = Filicium decipiens.
 dentata, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 52.—Afr. austr.
 denudata, Eckl. & Zeyh. Enum. 143 = viminalis.
 denudata, Licht. ex Schult. Syst. vi. 661 = lancea.
 Dhuna, *Buch.-Ham. in Wall. Cat. n.* 8502 (sp. dub.).—Nepal.
 digitata, *Linn. f. Suppl.* 184 (= *Cissus Thunbergii*, Eckl. & Zeyh.).—Afr. austr.
 dimidiata, *Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter*, i. (1803) 28 (= *Cissus dimidiata*).—Afr. austr.
 dioica, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 325 = albida.
 discolor, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216, nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 507.—Afr. austr.
 discolor, Schrad. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 408 = tomentosa.
 dispar, Presl, Bot. Bemerk. 42 = Anaphrenium dispar.
 dissecta *Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter*, i. (1803) 29.—Afr. austr.
 divaricata, Eckl. & Zeyh. Enum. 146.—Afr. austr.
 diversifolia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 395, sphalm. = seq.
 diversiloba, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 218 = R. Toxicodendron.
 Dregeana, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 516.—Afr. austr.
 Eckloniana, Presl, Bot. Bemerk. 41 = mucronata.
 Eckloniana, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 515.—Afr. austr.
 Ecklonis, Schrad. ex Harv. & Sond. l. c. 509 = tomentosa.
 elegans, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 366 = glabra.
 elliptica, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 214 = tomentosa.
 elongata, Eckl. & Zeyh. Enum. 144 = viminalis.
 elongata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 52 = mucronata.
 erosa, Drège, ex Presl, Bot. Bemerk. 41 = Schmidelia erosa.
 erosa, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 212.—Afr. austr.
 excisa, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 518 = undulata.
 excisa, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 187.—Afr. austr.
 fastigiata, Eckl. & Zeyh. Enum. 146 = puberula.
 fastuosa, Salisb. Prod. 170 = semialata.
 ferruginea, Teijsm. & Binn. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 450 = rufa.
 filicina, [Moc. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 67 = Bursera bipinnata.
 foliosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 143.—Abyss.
 fragrans, Licht. ex Schult. Syst. vi. 661 = viminalis.
 fraxinifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 248 = Evodia fraxinifolia.
 fraxinifolia, Salisb. Prod. 169 = succedanea.
 Gerrardi, Harv. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 442 = viminalis.

RHUS:—

- glabra, *Linn. Sp. Pl.* 265.—Am. bor.
 glauca, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 438 = glaucescens?
 glauca, *Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter*, i. (1803) 27; Pers. Syn. i. 326; Desf. Hist. Arb. ii. 326.—Afr. austr.
 glaucescens, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 143.—Abyss.
 glaucovirens, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 432 = Zeyheri.
 glutinosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 144.—Abyss.
 gracillima, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 445.—Afr. austr.
 gracilis, Hort. ex Engl. l. c. iv. 377 = typhina.
 grandidens, Harv. ex Engl. l. c. 440.—Afr. austr.
 grandidentata, DC. Prod. ii. 72 = dentata.
 grandifolia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 434.—Afr. austr.
 Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 12.—Reg. Himal.
 Guenzii, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 515.—Afr. austr.
 heterophylla, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 136.—Hab.?
 Hindsiana, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 388.—Calif.
 hirsuta, Salisb. Prod. 170 = villosa.
 hirta, Harv. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 425 = tridentata.
 horrida, Eckl. & Zeyh. Enum. 151.—Afr. austr.
 humilis, Eckl. & Zeyh. l. c. 146 = puberula.
 humilis, Salisb. Prod. 170 = R. Toxicodendron.
 hypoleuca, *Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 43.—China.
 Hypselodendrum, Moench, Meth. 73 = typhina.
 incana, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 428.—Afr. austr.
 incana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = villosa.
 incisa, *Linn. f. Suppl.* 183.—Afr. austr.
 indica, Herb. Madr. ex Wight & Arn. Prod. 172 = mysurensis.
 insignis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 11.—Reg. Himal.
 insignis, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 437 = Anaphrenium abyssinicum.
 integerrima, Wall. Cat. n. 8474 = Pistacia Khinjuk.
 integrifolia, Benth. & Hook. f. ex S. Wats. in Wheeler, Rep. Bot. 84.—Calif.
 integrifolia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 388, in syn. sphalm. = Hindsiana.
 japonica, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 248 = seq.
 javanica, *Linn. Sp. Pl.* 265 = semialata.
 juglandifolia, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 248; Cat. n. 996 = Wallichii.
 juglandifolia, Willd. ex Schult. Syst. vi. 649; H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 8. t. 603.—Am. trop.
 Kaempferi, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 97 = vernicifera.
 Kakrasingee, Royle, Illustr. Bot. Himal. 175 = Pistacia Khinjuk.
 khasiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 10.—Reg. Himal.
 Kirkii, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 439.—Afr. trop.
 Kotschyana, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312 = glaucescens.
 Krebsiana, Presl, Bot. Bemerk. 41.—Afr. austr.
 laevicaulis, Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 28 = glabra.
 laevigata, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 1672.—Afr. austr.
 laevis, Wall. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 69 = R. Cotinus.
 lancea, *Linn. f. Suppl.* 184.—Afr. austr.
 lancea, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 516 = Dregeana.
 lanceolata, A. Gray, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 384 = copallina.
 laurina, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 219 = Calif.
 lavandulaefolia, Presl, Bot. Bemerk. 42 = stenophylla.
 Lentii, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 16.—Calif.
 lentiscifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 164 = copallina.
 leucantha, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 50 = copallina.
 leucocarpa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = Schmidelia leucocarpa.
 Lindeniana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 468 = juglandifolia.
 lineata, Spreng. Syst. i. 936 = lineatifolia.

RHUS:—

- lineatifolia, *Orteg. Hort. Matr. Dec.* 89.—Cuba.
 livida, Salisb. Prod. 170 = laevigata.
 lobata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 127 = R. Toxicodendron.
 lobata, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 264.—Ins. Teneriff.
 longifolia, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 522 = Protorhus longifolia.
 longipes, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 431.—Afr. trop.
 longispina, Eckl. & Zeyh. Enum. 148.—Afr. austr.
 lucida, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 166 = mucronata.
 lucida, *Linn. Sp. Pl.* 267.—Afr. austr.
 lucida, E. Mey. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 412 = glauca.
 macrocarpa, Engl. l. c. 449.—Afr. austr.
 macrophylla, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 413.—Mexic.
 macrophylla, A. Rich. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 426 = abyssinica.
 magalismontana, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 510.—Afr. austr.
 marginata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216, nomen.—Afr. austr.
 Meerburgiana, *Schult. Syst.* vi. 663.—Hab.?
 melanocarpa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = Schmidelia melanocarpa.
 melintangensis, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 219 = Canarium glaucum.
 meridionalis, Spreng. Syst. i. 936 = Commersonii.
 metopia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = R. Metopium.
 metopioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 468.—Cuba.
 Metopium, *Linn. Syst.* ed. X. 964.—Am. bor.; Ind. occ.
 Meyeriana, Presl, Bot. Bemerk. 41 = puberula.
 micrantha, Eckl. & Zeyh. Enum. 149 = undulata.
 micrantha, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 221 = dentata.
 microcarpa, Steud. Nom. ed. I. 689 = R. Toxicodendron.
 microlepis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 468 = hypoleuca.
 microphylla, Engelm. in A. Gray, Pl. Wright. i. 31.—Texas.
 mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 10. t. 602.—Mexic.
 mollis, Jacq. Fragm. 74.—Afr. austr.
 mollis, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = parvifolia.
 monophylla, E. Mey. l. c. = Schmidelia monophylla.
 mucronata, Eckl. & Zeyh. Enum. 150 = africana.
 mucronata, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 519 = excisa.
 mucronata, *Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter*, i. (1803) 27.—Afr. austr.
 mucronifolia, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 521 = Anaphrenium abyssinicum.
 mysurensis, Heyne, ex Wight & Arn. Prod. 172.—Ind. or.
 natalensis, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 349.—Afr. austr.
 nepalensis, Hoffing. Verz. Pfl. Nachtr. II. 35 = pruinosa.
 nervosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 147 = excisa.
 nervosa, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 264 = undulata.
 nitida, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 434.—Afr. trop.
 nodosa, Blume, Bijdr. 1164.—Java.
 obliqua, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 444 = Clausena inaequalis.
 obliqua, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 224.—Afr. austr.
 oblongifolia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = Sapindus oblongifolius.
 obovata, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 508.—Afr. austr.
 obovatifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 159 = R. Cotinus.
 obscura, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 243 = Pterocarya caucasica.
 Odina, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8475 = Odina Wodier.
 odorata, Nois. ex Steud. Nom. ed. I. 689, nomen (Quid?).—Hab.?
 ornifolia, Pall. in Gueldenst. Reisen, i. 282 = R. Coriaria.
 Osbeckii, Carr. in Rev. Hortic. (1887) 111.—China.
 Osbeckii, Steud. Nom. ed. II. ii. 452 = semialata.

RHUS:—

- ovata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 358.—Calif.
Oxyacantha, Schousb. ex Cav. in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 36 = albida.
Oxyacanthoides, Dum.-Cours. Bot. Cult. vi. 662; ed. II. vi. 214 = albida.
Oxymetopium, Griseb. Cat. Pl. Cub. 67 = R. Metopium.
pachyrrhachis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 218 = sempervirens.
pallens, Eckl. & Zeyh. Enum. 147 = excisa.
pallida, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = viminalis.
paniciformis, F. Muell. Fragm. vii. 22 = rufa.
paniculata, Wall. Cat. n. 993.—Reg. Himal.; Burma.
paniculosa, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 522 = Anaphrenium paniculosum.
parviflora, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. ii. 100.—Reg. Himal.
parvifolia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 419, sphalm. = praec.
parvifolia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 510.—Afr. austr.
pauciflora, Linn. f. Suppl. 183 = Hippobromus alatus.
pendulina, Eckl. & Zeyh. Enum. 145 = mucronata.
pendulina, Jacq. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 324 = viminalis.
pentaphylla, Desf. Fl. Atlant. i. 267. t. 77.—Reg. Mediter.; Afr. trop.
perniciosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 10 = Pseudomedingium perniciosum.
Petitiana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 144 = glutinosa.
pilipes, Presl, Bot. Bemerk. 41 = mucronata.
pistachiaefolia, Salisb. Prod. 169 = copallina.
platypoda, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = horrida.
plicaeifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 148 = excisa.
Plukenetiana, Eckl. & Zeyh. l. c. 147.—Afr. austr.
polyantha, Benth. Pl. Hartw. 60 = Picramnia polyantha.
populifolia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216. nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 508.—Afr. austr.
potentillaefolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 469.—Mexic.
pruinosa, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. II. 198.—Ind. or.
pterocarpa, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 84 = Spathelia rhoifolia.
pterota, Presl, Bot. Bemerk. 41 = longispina.
puberula, Eckl. & Zeyh. Enum. 146.—Afr. austr.
pubescens, Eckl. & Zeyh. l. c. 145 = pyroides.
pubescens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 52.—Afr. austr.
pubigera, Blume, Bijdr. 1165 = succedanea.
pulcherrima, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 436 = Anaphrenium pulcherrimum.
pumila, Meerb. Pl. Sel. l. c. t. 14 = Meerburgiana.
pumila, Michx. Fl. Bor. Am. i. 182.—Am. bor.
punjabensis, J. L. Stew. ex Brand. For. Fl. 120.—Reg. Himal.
pyroides, Burch. Trav. i. 340.—Afr. austr.
pyroides, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 145 = villosa.
Quartiniana, A. Rich. l. c. 141 = glaucescens.
quercifolia, Steud. Nom. ed. I. 689 = R. Toxicodendron.
quinquefolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 161 = R. Metopium.
Radaelijawel, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 13 = Connarus monocarpus.
radicans, Linn. Sp. Pl. 266 = R. Toxicodendron.
refracta, Eckl. & Zeyh. Enum. 145.—Afr. austr.
Rehmanniana, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 422.—Afr. austr.
retinorrhæa, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 142.—Abyss.
retusa, Zoll. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 230 = rufa.
rhodanthema, F. Muell. in Journ. Pharm. Soc. Vict. i. (1858) 43; et ex Benth. Fl. Austral. i. 489 = Rhodosphaera rhodanthema.
rigida, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 14.—Afr. austr.
rimosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 150 = rigida.
rosaefolia, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. II. 199.—Bras.
rosmarinifolia, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 262 = stenophylla.

RHUS:—

- rosmarinifolia*, Vahl, Symb. Bot. iii. 50.—Afr. austr.
Roxburghii, Steud. Nom. ed. II. ii. 452 = semialata.
rubifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 470.—Mexic.
rufa, Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1863) 52.—Java.
rufescens, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 32 (an Anacard.?).—Jamaic.
rufescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 144 = discolor.
Saeneb, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 206 (non Anacard.).—Arabia.
salicifolia, Presl, Bot. Bemerk. 42 = Anaphrenium abyssinicum.
salicina, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 522 = Anaphrenium abyssinicum.
Samo, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 367 = juglandifolia.
sandwicensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 369.—Ins. Sandvic.
saxatilis, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 71 (non Anacard.).—Mexic.
scandens, Salisb. Prod. 170 = R. Toxicodendron.
Schiedeana, Schlecht. in Linnaea, xvi. (1842) 480.—Mexic.
Schimperi, Hochst. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 441 = glaucescens.
schinoides, Willd. ex Schult. Syst. vi. 649 = Schinus terebinthifolius?
schmideloides, Schlecht. in Linnaea, xvi. (1842) 482 = aromatica.
scoparia, Eckl. & Zeyh. Enum. 148.—Afr. austr.
scytophylla, Eckl. & Zeyh. l. c. 150.—Afr. austr.
semialata, Murr. in Comm. Gotting. vi. (1784) 27. t. 3.—Reg. Himal.; China; Ins. Sandvic.
sempervirens, Scheele, in Linnaea, xxiii. (1850) 566.—Texas.
sericea, Eckl. & Zeyh. Enum. 146 = puberula.
serraeifolia, Burch. Trav. ii. 100 = erosa.
simarubaeifolia, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 367. t. 44.—Ins. Fiji.
Simonii, Carr. in Rev. Hortic. (1866) 339.—China.
simplicifolia, Salisb. Prod. 170 = R. Cotinus.
sinuata, Eckl. & Zeyh. Enum. 147 = obovata.
sinuata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 52.—Afr. austr.
Sonderi, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 435.—Afr. austr.
spathulata, Eckl. & Zeyh. Enum. 148 = undulata.
spicata, Thunb. Fl. Cap. ii. 217 = Schmidelia decipiens.
sternophylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 144.—Afr. austr.
striata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 29. t. 252 = juglandifolia.
suaveolens, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 368 = aromatica.
subcordata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 470 = rubifolia.
subferruginata, Presl, Bot. Bemerk. 41 = divaricata.
succedanea, Linn. Mant. ii. 221.—Reg. Himal.; China; Japon.
Suma, Targ. Tozz. Osserv. Bot. Dec. vi. 3 = R. Coriaria.
sylvestris, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 140.—Japon.
syriaca, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 5 = albida.
taitensis, Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 361 = simarubaeifolia.
tenuiflora, Presl, Bot. Bemerk. 41 = mucronata.
tenuinervis, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 423.—Afr. trop.
terebinthifolia, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 600.—Mexic.
theesans, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 110 = undulata.
Thezera, Pers. Syn. i. 325 = pentaphylla.
Thunbergiana, Schult. Syst. vi. 651 = glauca.
Thunbergii, Hook. Ic. Pl. t. 595 = Anaphrenium argenteum.
thyrsiflora, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 567.—Ins. Socotra.
tomentosa, Linn. Sp. Pl. 266.—Afr. austr.
toxicarium, Salisb. Prod. 170 = R. Toxicodendron.
toxicodendron, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.
Toxicodendron, Linn. Sp. Pl. 266.—Am. bor.
transvaalensis, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 440.—Afr. austr.
triceps, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 = rigida.

RHUS:—

- trichocarpa*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 81.—Japon.
tridactyla, Burch. Trav. i. 340.—Afr. austr.
tridactyla, Eckl. & Zeyh. Enum. 144 = Eckloniana.
tridentata, Linn. f. Suppl. 184 (= Cissus pauciflora).—Afr. austr.
tridentata, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 511.—Afr. austr.
tridentata, Willd. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 433 = pentaphylla.
trifoliata, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = Evodia glabra.
trifoliata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 15 = laevigata.
trijuga, Poir. Encyc. vii. 506 = Schinus terebinthifolius?
trilobata, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 219.—Am. bor. occ.; Mexic.
tripartita, DC. Prod. ii. 72, in syn. = albida.
triphylla, Medic. Pfl. Anat. 106, nomen.—Hab.?
typhia, Crantz, Inst. ii. 275 = seq.
typhina, Linn. Cent. Pl. ii. 14.—Am. bor.
undulata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 52. t. 346.—Afr. austr.
undulata, E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 239 = Schmidelia decipiens.
undulata, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 145 = glaucescens.
vari lobata, Steud. Nom. ed. II. ii. 452 = R. Toxicodendron.
variifolia, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 73 = heterophylla?
Veatchiana, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 24 = Veatchia cedrosensis.
Veitchiana, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 452, sphalm. = praec.
velutina, Wall. Cat. n. 998; et ex G. Don, Gen. Syst. ii. 69 = R. Cotinus.
venenata, DC. Prod. ii. 68.—Am. bor.
venosa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 67.—Cuba.
verniciifera, DC. Prod. ii. 68, partim.—Tibet. or.; Japon.
verniciifera, DC. l. c., partim = Wallichii.
verniciifera, Salisb. Prod. 169 = venenata.
verniciiflora, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 164 = verniciifera.
Vernix, Linn. Sp. Pl. 265, partim = venenata, verniciifera.
Vernix, Thunb. Fl. Jap. 121 = verniciifera.
verrucosa, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 592 = R. Toxicodendron.
villosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 145 = pyroides.
villosa, Linn. f. Suppl. 183.—Afr. trop. et austr.
villosa, E. Mey. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 427 = refracta.
villosissima, Engl. l. c. 447.—Afr. austr.
viminalis, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 368; Vahl, Symb. Bot. iii. 50.—Afr. austr.
viminalis, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 51. t. 344 = lancea.
viminalis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 142 = retinorrhæa.
virens, Lindheim. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 159 = sempervirens.
viridiflora, Duham. Arb. ed. Nov. ii. 163 = typhina.
viridiflora, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 376 = glabra.
viticifolia, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 489.—Austral.
Wallichii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 11.—Reg. Himal.
Wallichii, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 118 = an praec.?
Welwitschii, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 428.—Afr. trop.
Wildingii, Dehnh. Revis. Napol. i. III. 172; ex Walp. Rep. i. 551 = viminalis.
Zeyheri, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 514.—Afr. austr.
ziziphina, Tineo, Pl. Rar. Sic. Pugill. i. 8 = albida.
- RHYACOPHILA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 659 = **Quartinia**, Endl. (Lythrar.).
repens, Hochst. l. c. = Q. repens.
- RHYDITOSPERMUM, Walp. Rep. vi. 196 (1846-47), sphalm. = RHYTIDOSPERMUM, Sch. Bip. = **Matricaria**, Tourn. (Compos.).

- RHYNCHADENIA**, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 248. t. 85 (1853) = *Macradenia*, R. Br. (Orchid.). *cubensis*, A. Rich. l. c. = *M. lutescens*.
- RHYNCHANDRA**, Reichb. Nom. 56 (1841) = seq.
- RHYNCHANTHERA**, Blume, Bijdr. Tabell. 78 (1826) = *Corymbis*, Thou. (Orchid.). *paniculata*, Blume, l. c. = Java.
- RHYNCHANTHERA**, DC. Prod. iii. 106 (1828). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 738. *PROBOSCIDA*, Rich. ex DC. Prod. iii. 106 (1828). *THENARDIA*, [Moc. & Sesse.] ex DC. l. c. 108 (1828). *acuminata*, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 299. —Guian. *adenophora*, Miq. Comm. Phyt. 73. t. 10 = *Acisanthera recurva*. *ambigua*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 210 = *grandiflora*. *betulifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 171. —Guian. *brachyrhyncha*, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 379. —Bras. *bracteata*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 31. —N. Granat. *collina*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 208. —Bolivia. *cordata*, DC. Prod. iii. 107. —Bras. *cordifolia*, Walp. Rep. ii. 120 = *acuminata*. *dichotoma*, DC. Prod. iii. 107. —Bras. *Fothergillae*, DC. l. c. 108 = *Tibouchina Fothergillae*. *Gardneri*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 207. —Bras. *Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 189. —Bras. *grandiflora*, DC. Prod. iii. 107. —Guian.; Bras. *Haenkeana*, DC. l. c. = Peruv. *hispida*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 212. —Bras. *Hookeri*, Naud. l. c. = Peruv. *insignis*, Naud. l. c. 210 = *mexicana*. *intermedia*, Naud. l. c. 211 = *hispida*. *latifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 167. —Bras. *laxa*, Cogn. l. c. 176. —Bras. *limosa*, DC. Prod. iii. 108. —Bras. *Matthaei*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 209 = *Haenkeana*. *Maximowiczii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 185. —Bras. *mexicana*, DC. Prod. iii. 108. —Mexic. *modesta*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 212 = *serrulata*. *monodynamia*, DC. Prod. iii. 107 = *grandiflora*. *monodynamia*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 209 = *cordata*. *novemnervia*, DC. Prod. iii. 107. —Bras. *ovalifolia*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 208. —Bras. *parviflora*, Naud. l. c. 213. —Guian. *pentanthera*, DC. Prod. iii. 108 = *Schrankiana*. *Regnellii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 184. —Bras. *Riedeliana*, Cogn. l. c. = Bras. *rosea*, Cogn. l. c. 181. —Paraguay. *rostrata*, DC. Prod. iii. 108. —Bras. *salicifolia*, Mart. ex DC. l. c. 109 = *serrulata*. *Schrankiana*, DC. l. c. 107. —Bras. *Schrankiana*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 214, partim = *dichotoma*. *secundiflora*, Naud. l. c. 207. —Paraguay. *serrulata*, DC. Prod. iii. 108. —Am. trop. *simplicicaulis*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 208 = *ovalifolia*. *stachydiorpha*, DC. Prod. iii. 108 = *rostrata*. *stricta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 168. —Bras. *ursina*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 207. —Bras. *verbenoides*, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 378. —Bras. *villosissima*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 187. —Bras. *Weddellii*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 213. —Bras.
- RHYNCHARRHENA**, F. Muell. Fragm. i. 128 (1859) = *Pentatropis*, R. Br. (Asclep.). *atropurpurea*, F. Muell. l. c. = *P. atropurpurea*. *quinquepartita*, F. Muell. l. c. = *P. quinquepartita*.
- RHYNCHELYTHRUM**, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446 (1836) = *Panicum*, Linn. (Gramin.). *Dregeanum*, Nees, l. c. 447 = *P. roseum*.
- RHYNCHELYTRUM**, Endl. Gen. 83 (1837) = *praeac*.
- RHYNCHELYTRUM**, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 249. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1120. *grandiflorum*, Hochst. l. c. (Panici sp.). —Afr. trop. *microstachyum*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 97 = *grandiflorum*. *ruficomum*, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 120. —Afr. trop.
- RHYNCHIUM**, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 290 (1867) = *Vicia*, Tourn. (Legumin.). *plicatum*, Dulac, l. c. 291 = *V. Ervilia*.
- RHYNCHOCARPA**, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 403 = *Kedrostis*, Medic. (Cucurbit.). *africana*, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 268 = *K. africana*. *Bainesii*, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 564 = *K. Bainesii*. *corallina*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 180 = *Corallocarpus Fenzlii*. *Courbonii*, Naud. l. c. xviii. (1862) 197 = *Corallocarpus velutinus*. *deltoides*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) II. 105 (sp. dub.). —Burma. *dissecta*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 179 = *K. africana*. *Ehrenbergii*, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 251 = *Corallocarpus Ehrenbergii*. *epigaea*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 178 = *Corallocarpus epigaeus*. *erostris*, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 672 = *Corallocarpus erostris*. *etbaica*, Aschers. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 655 = *Corallocarpus velutinus*. *foetida*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 627 = *K. rostrata*. *foetida*, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 403 = *K. foetidissima*. *foetidissima*, Walp. Rep. ii. 197 = *K. foetidissima*. *Gijef*, Schweinf. ex Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 566 = *Corallocarpus Gijef*. *glomerata*, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1880) II. 819. —Bras. *hirtella*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 181 = *K. hirtella*. *odorata*, Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 104 = *Melothria odorata*. *pedunculosa*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 182 = *Corallocarpus pedunculatus*. *rostrata*, Naud. l. c. 177 = *K. rostrata*. *Schimperi*, Naud. l. c. 180 = *Corallocarpus Schimperi*. *Welwitschii*, Naud. l. c. xviii. (1862) 198. t. 10 = *Corallocarpus Welwitschii*.
- RHYNCHOCARPUS**, Less. Syn. Comp. 382 (1832) = *Relbania*, L'Hérit. (Compos.). *lateriflorus*, Less. l. c. 383 = *Relh. sessiliflora*.
- RHYNCHOCARPUS**, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 84 (1823) = *Cyrtandra*, Forst. (Gesner.). *coccineus*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 12 = *Cyrtandra coccinea*. *cordifolius*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 84 = *C. cordifolia*. *glaber*, Reinw. l. c. = *C. longe-petiolata*. *longirostris*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 12 = *C. longirostris*. *mollis*, Reinw. ex De Vriese, l. c. 16 = *C. mollis*. *nemorosus*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 84 = *C. longe-petiolata*. *repens*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 14 = *C. repens*. *spicatus*, Reinw. ex De Vriese, l. c. = *C. spicata*. *umbellatus*, Reinw. ex De Vriese, l. c. 13 = *C. cuneata*.
- RHYNCHOCORYS**, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 12 (1844). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 978. *ELEPHANTINA*, Bertol. Fl. Ital. vi. 279 (1844). *ELEPHAS*, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 211 (1763). *PROBOSCIPHORA*, Neck. Elem. i. 336 (1790). *RHINANTHUS*, Linn. Sp. Pl. 603 (1753), partim.
- RHYNCHOCORYS** :—*Elephas*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 12. —Europ. austr.; Oriens. *maxima*, Richter, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 25. —Persia. *orientalis*, Benth. in DC. Prod. x. 559. —Reg. Caucas. *strictus*, Boiss. Fl. Orient. iv. 478 = *R. Elephas*.
- RHYNCHODIA**, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 719 (1876). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c. *CERCOCOMA*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 445 (1859 ?). *RHYNCHOSPERMUM*, A. DC. in DC. Prod. viii. 431 (1844). *Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 667. —Ind. or.
- RHYNCHODIUM**, Presl (Bot. Bemerk. 54 (1844)), in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 484 = *Psoralea*, Linn. (Legumin.). *acaule*, Presl, Bot. Bemerk. 54 = *P. acaulis*. *bituminosum*, Presl, l. c. = *P. bituminosa*. *foetidum*, Presl, l. c. = *P. foetida*. *hirtum*, Presl, l. c. = *P. hirta*. *palestinum*, Presl, l. c. = *P. bituminosa*. *sericeum*, Presl, l. c. = *P. tomentosa*.
- RHYNCHOGLOSSUM**, Blume, Bijdr. 741 (1826) (Rhynchoglossum). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1019. *ANTONIA*, R. Br. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 65 (1832). *LOXOTIS*, R. Br. ex Benth. Scroph. Ind. 57 (1835). *KNAPPIA*, Ferd. Bauer, ex Steud. Nom. ed. II. i. 846 (1840); ii. 75 (1841). *RHINOGLOSSUM*, Pritz. Ic. Ind. i. 933 (1855). *Blumei*, DC. Prod. ix. 274 = *obliquum*. *klugoides*, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 163. —Ins. Philipp. *obliquum*, Blume, Bijdr. 741. —Ind. or.; Malaya. *obliquum*, Hohen. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 366 = *Klugia Notoniana*. *Rheedii*, DC. Prod. ix. 274 = *obliquum*. *scabrum*, Dalc. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 140 = *Klugia Notoniana*. *zeylanicum*, Hook. Bot. Mag. t. 4198 = *obliquum*.
- RHYNCHOLACIS**, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 95. *PODOSTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 110. *crassipes*, Spruce, ex Wedd. in DC. Prod. xvii. 56. —Bras. *Hydrocichorium*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 95. —Guian. *linearis*, Tul. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 241. t. 74. f. 5. —Bras. *macrocarpa*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 95. —Guian. *oligandra*, Wedd. in DC. Prod. xvii. 57. —Bras. *tenuifolia*, Spruce, ex Wedd. l. c. = Bras. *varians*, Spruce, ex Wedd. l. c. 56. —Bras.
- RHYNCHOLEPIS**, Miq. Syst. Pip. 282 (1843) = *Piper*, Linn. *brevicuspis*, Miq. l. c. 283 = *P. Rhyncholepsis*. *Cumingiana*, Miq. l. c. 282 = *P. Rhyncholepsis*. *Haenkeana*, Miq. l. c. 284 = *P. denudatum*. *Roxburghii*, Miq. l. c. = *Peperomia rostrata*.
- RHYNCHOLEPSIS**, C. DC. in DC. Prod. xvi. i. 240 (1869) = *praeac*.
- RHYNCHOPAPPUS**, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 493 (1867) = *Crepis*, Vaill. (Compos.). *albidus*, Dulac, l. c. = *C. alpina*. *cinereus*, Dulac, l. c. = *C. taraxacifolia*. *foetidus*, Dulac, l. c. = *C. foetida*.
- RHYNCHOPERA**, Klotzsch, in Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. 103. t. 41 (1850) = *Pleurothallis*, R. Br. (Orchid.). *pedunculata*, Klotzsch, l. c. = *pedunculata*. *punctata*, Karst. Ausw. Neuer Gew. Venez. 21. t. 7. —Venezuela.
- RHYNCHOPETALUM**, Fresen. in Flora, xxi. (1838) II. 603 = *Lobelia*, Linn. (Campan.). *montanum*, Fresen. l. c. 604 = *L. Rhynchopetalum*.

RHYNCHOPSIDIUM, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. vii. 11. (1836) 283, 286 = *Relhania*, L'Hérit. (Compos.).
pedunculatum, DC. Prod. vi. 290 = Relh. pedunculata, Harv.
pumilum, DC. l. c. = Relh. pedunculata, L'Hérit.
sessiliflorum, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. vii. 11. (1836) 283 = Relh. sessiliflora.

RHYNCHOPYLE, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 183.
AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 985.
elongata, Engl. l. c. 184.—Borneo.
marginata, Engl. l. c.—Borneo.

RHYNCHOSIA, Lour. Fl. Cochinch. 460 (1790).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 542.
ARCYPHYLLUM, Ell. in Journ. Acad. Philad. i. (1818) 371.

CHRYSOSEAS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 139 (1835).
COPISMA, E. Mey. l. c. 132 (1835).
CYANOSPERMUM, Wight & Arn. Prod. 259 (1834).
DOLICHOLUS, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 354.
ERIOSEMA, Reichb. Consp. 150 (1828).
EURIOSMA, Desv. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. ix. (1826) 421.
HYDROSIA, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 89 (1835).
NOMISMIA, Wight & Arn. Prod. 236 (1834).
ORTHODANUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 131 (1835).
PHYLLOMATIA, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 113.
PITCHERIA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 93.
POLYTROPIA, Presl, Symb. Bot. i. 21. t. 13 (1830).
PTYCHOCENTRUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 113.
SIGMODOSTYLES, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 93.

acuminata, Eckl. & Zeyh. Enum. 253 = caribaea.
acuminatissima, Mig. Fl. Ind. Bat. i. i. 171.—Java.
acutifolia, Benth. Fl. Austral. ii. 266.—Austral.
acutissima, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 413.—Ind. or.
adenantha, Mig. Fl. Ind. Bat. i. i. 170.—Java.
adenodes, Eckl. & Zeyh. Enum. 254.—Afr. austr.
aequinoctialis, Duchass. & Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 743 = reticulata.
Afzelii, R. Br. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 225 = *Eriosema Afzelii*.
albo-nitens, Lem. Illustr. Hort. viii. (1861) t. 290 = *Desmodium scutatum*.
amatymbica, Eckl. & Zeyh. Enum. 254 = *adenodes*.
angustifolia, DC. Prod. ii. 388.—Afr. austr.
angustifolia, Engelm. ex A. Gray, Pl. Wright. i. 44 = *texana*.
antennulifera, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 223.—Afr. trop.
argentea, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 419.—Afr. trop.
argentea, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 253.—Afr. austr.
aurea, DC. Prod. iii. 386.—Ind. or.
aureo-guttata, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 252.—Ins. Galapag.
australis, Benth. Fl. Austral. ii. 267.—Austral.
avensis, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 222.—Burma.
Balansae, Michx. in Mém. Soc. Phys. Genève. xxviii. (1883) n. vii. 31.—Paraguay.
barbata, Steud. Nom. ed. II. ii. 453.—Peruv.
Beddomei, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 222.—Ind. or.
biflora, DC. Prod. ii. 387 = *Atylosia scarabaeoides*.
Bocandeana, Webb, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 345.—Ins. Cap. Virid.
Borianii, Schweinf. Reliq. Kotschy, 30 = *Glycine Borianii*.
bracteata, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 225.—Ind. or.
bullata, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 257.—Afr. austr.
cajanoides, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 215 = *Eriosema cajanoides*.
calycina, Guill. & Perr. l. c. 214.—Afr. trop.
calycosa, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 48.—Panama.
cana, DC. Prod. ii. 386.—Ind. or.
candicans, Kurz, in Journ. A. Soc. Beng. xlv. (1876) ii. 258.—Burma.

RHYNCHOSIA :—

Candollei, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 473 = minima.
capitata, DC. Prod. ii. 386 = aurea.
caribaea, Auct. Plur. ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 205 = minima.
caribaea, DC. Prod. ii. 384.—Am. bor.; Ind. occ.; Afr. trop. et austr.
Cephalotes, Steud. Nom. ed. II. ii. 453 = *Psoralea tomentosa*.
Chapelieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 387.—Madag.
chrysoposta, Steud. Nom. ed. II. ii. 453.—Afr. austr.
Chrysoscias, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 248.—Afr. austr.
Cienkowski, Schweinf. Reliq. Kotschy, 31 = *Tephrosia lupinifolia*.
Claasseni, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 201.—Bras.
clivorum, S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 131.—Afr. austr.
codoorensis, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 70 = Heynei.
confertiflora, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 231 = *Pseudarthria confertiflora*.
congensis, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 217.—Afr. trop.
codoorensis, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 220 = *codoorensis*.
cordata, Steud. Nom. ed. II. ii. 453 = *Eriosema cordatum*.
corylifolia, Mart. ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 202.—Bras.
crassifolia, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 252.—Afr. austr.
crinita, DC. Prod. ii. 389 = *Eriosema crinitum*.
crotarioides, DC. l. c. 387 = *Flemingia congesta*.
Cunninghamii, Benth. Fl. Austral. ii. 266.—Austral.
cyanosperma, Benth. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 218.—As. et Afr. trop.
debilis, G. Don, Gen. Syst. iii. 347.—Afr. trop.
densiflora, DC. Prod. ii. 386.—Ind. or.; Afr. trop.
densiflora, Wall. Cat. n. 5492 D = aurea.
difformis, DC. Prod. ii. 384 = *tomentosa*.
diffusa, DC. l. c. 388.—Mexic.
discolor, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 30 = *R. Memnonia*.
discolor, Mart. & Gal. Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 199.—Mexic.
diversifolia, Michx. in Mém. Soc. Phys. Genève. xxviii. (1883) n. vii. 33.—Paraguay.
Dregei, Steud. Nom. ed. II. ii. 453 = *Eriosema squarrosium*.
Ecklonei, Steud. l. c.—Afr. austr.
edulis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 123.—Reg. Argent.
elegans, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 228.—Abyss.
elongata, DC. Prod. ii. 386 = aurea.
erecta, DC. l. c. 384 = *tomentosa*.
erodea, DC. Mém. Lég. 368; Prod. ii. 386 = minima.
erythrinoides, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 587 = *phascoloides*.
exigua, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 252.—Ins. Galapag.
faginea, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 212 = *Flemingia faginea*.
falcata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 136 = minima.
Falconeri, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 224.—Reg. Himal.
ferruginea, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 229.—Abyss.
ferulaefolia, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 249.—Afr. austr.
ficifolia, Benth. l. c. 251.—Afr. austr.
filicaulis, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5502 = minima.
filicaulis, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 221.—Afr. trop.
filipes, Benth. in Linnaea, xxiv. (1851) 644.—Ind. or.
flagellaris, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312, nomen = minima.
flavissima, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 219.—Afr. trop.
Fridericiana, DC. Prod. ii. 387.—Ins. Philipp.
frutescens, Steud. Nom. ed. II. i. 459, sphalm. = *rufescens*.
galactioides, DC. Prod. ii. 387 = *Calopogonium galactioides*.
galactioides, Endl. ex Walp. Rep. i. 790.—Am. bor.
Garcini, DC. Prod. ii. 388.—Persia.

RHYNCHOSIA :—

gibba, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 170 = caribaea.
glabra, DC. Prod. ii. 387 = glandulosa.
glandulosa, DC. l. c. 388.—Afr. austr.
glomerata, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 216 = *Eriosema glomeratum*.
Grahami, Wall. Cat. n. 5504 = *Eriosema chinense*.
grandiflora, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 588 = *Eriosema grandiflorum*.
grandifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 454.—Afr. austr.
Grantii, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 223.—Afr. trop.
Heynei, Wight & Arn. Prod. 240.—Ind. or.
himalensis, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 225.—Reg. Himal.
hirsuta, Eckl. & Zeyh. Enum. 256.—Afr. austr.
hirsuta, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 198.—Mexic.
Hookeri, G. Don, Gen. Syst. ii. 347.—Ind. occ.
humilis, Eckl. & Zeyh. Enum. 253 = totta.
incana, Royle, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 223 = *R. Pseudo-cajan*.
inflata, Boj. Hort. Maurit. 164 = caribaea.
intermedia, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 7. n. 10 = caribaea?
Lablab, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 386.—Madag.
latifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 285.—Am. bor.
latissima, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 221.—Afr. trop.
laxiflora, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 44 = minima.
leucophylla, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 202.—Bras.
leucoscias, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 249.—Afr. austr.
lineata, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 202.—Bras.
lobata, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 419.—Bras.
longepedunculata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 226 = *Eriosema longepedunculatum*.
longeracemosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 198.—Mexic.; Panama.
longeramosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 191, in syn., sphalm. = praec.
lucida, DC. Prod. ii. 387 = *Strongylodon ruber*.
Luschnathiana, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 295.—Bras.
macrocarpa, Benth. Pl. Hartw. 11.—Mexic.
macrophylla, DC. Prod. ii. 385 = reticulata.
malacophylla, Boj. Hort. Maurit. 104 = caribaea.
Mannii, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 217.—Afr. trop.
maxima, Boj. Hort. Maurit. 105 = *Baukea insignis*.
medicaginea, DC. Prod. ii. 386 = minima.
melanosperma, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 30 = caribaea.
melanosticta, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 124.—Reg. Argent.
Memnonia, DC. Prod. ii. 386.—Afr. trop.; Arab.; Sind.
mendacinensis, Gill, ex Hook. & Arn. in Bot. Misc. iii. (1833) 199.—Chili.
mendosinensis, Walp. Rep. i. 788 = praec.
menispermoidea, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 102.—Am. bor.
mexicana, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 287 = minima.
mexicana, Steud. Nom. ed. II. ii. 454 = *Eriosema grandiflorum*.
Meyeri, Steud. l. c.—Afr. austr.
microphylla, Wall. Cat. n. 5497 = minima.
microscias, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 249.—Afr. austr.
minima, DC. Prod. ii. 385.—Cosmop. trop. et subtrop.
mollis, DC. l. c. 388.—Afr. trop.
mollissima, Dals. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 186.—Ind. or.
mollissima, G. Don, Gen. Syst. ii. 347.—Afr. trop.
mollissima, Shuttl. ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 256.—Am. bor.
mollissima, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nêrl. Indie, iii. (1846) 78.—Java.
monosperma, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 123.—Reg. Argent.
nervosa, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 253.—Afr. austr.
nitens, Benth. ex Harv. l. c. 257.—Afr. austr.
nitida, Steud. Nom. ed. II. ii. 454.—Afr. austr.

RHYNCHOSIA :—

- nuda*, DC. Mém. Légum. 366; Prod. ii. 385 = minima.
nummularia, DC. Prod. ii. 386.—Ind. or.
Orthodanum, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 257.
 —Afr. austr.
pallida, Micheli, in Mém. Soc. Phys. Genève. xxviii.
 (1883) n. vii. 32.—Paraguay.
paniculata, Steud. Nom. ed. II. ii. 454 = totta.
parviflora, Steud. l. c. = *Eriosema parviflorum*.
parvifolia, DC. Mém. Légum. 367; Prod. ii. 385.—Ins.
 S. Doming.
phaseoloides, DC. Prod. ii. 385.—Am. trop.
picta, Steud. Nom. ed. II. i. 416, in syn., sphalm. =
 secunda.
pilosa, Steud. l. c. ii. 454.—Afr. austr.
pilosa, Wall. Cat. n. 5499.—Burma.
pinnata, Harv. Thes. Cap. i. 50.—Afr. austr.
platyphylla, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 201.—
 Bras.
polystachya, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 231 = *Erio-*
sema polystachyum.
polystachya, Steud. Nom. ed. II. ii. 454 = *Eriosema*
cajanoides.
portobellensis, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.
 1854 (1856) 121.—Panama.
precatoria, DC. Prod. ii. 385 = *phaseoloides*.
prostrata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5496 = minima.
Pseudo-cajan, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 45.
 t. 55.—Reg. Himal.
psoraloides, DC. Prod. ii. 389.—Madag.
puberula, Steud. Nom. ed. II. ii. 454; Harv. in Harv.
 & Sond. Fl. Cap. ii. 255.—Afr. austr.
pubescens, DC. Prod. ii. 386.—Abyss.
pulchella, DC. l. c. 389.—Am. austr.
pulverulenta, Stocks, in Hook. Kew Journ. iv. (1852)
 147 = *R. Memnonia*.
punctata, DC. Mém. Légum. 365; Prod. ii. 385 =
 minima.
quadrata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 254.—
 Afr. austr.
reniformis, DC. Prod. ii. 384 = *tomentosa*.
resinosa, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.
 ii. 218.—Afr. trop.
reticulata, DC. Prod. ii. 385.—Am. trop.
rhodophylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883)
 133.—Madag.
rhombifolia, DC. Prod. ii. 386 = minima.
rhomboidea, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. ii. 265.
 —Austral.
rigidula, DC. Prod. ii. 388.—Afr. austr.
rigidula, Eckl. & Zeyh. Enum. 255 = totta.
riparia, Eckl. & Zeyh. l. c. = glandulosa.
rosea, DC. Prod. ii. 387 = *Canavalia obtusifolia*.
rostrata, Benth. Fl. Austral. ii. 266.—Austral.
rotundifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 454.—Afr. austr.
rufa, DC. Prod. ii. 388 = *Eriosema rufum*.
rufescens, DC. l. c. 387.—Ind. or.; Malaya.
saligna, Steud. Nom. ed. II. ii. 454 = *Eriosema salignum*.
scarabaeoides, DC. Prod. ii. 387 = *Atylosia scarabae-*
oides.
Schimperii, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 626.—Oriens.
secunda, Eckl. & Zeyh. Enum. 252.—Afr. austr.
Senna, Gill. ex Hook. & Arn. in Bot. Misc. iii. (1833)
 199.—Reg. Argent.
sennaensis, Hochst. ex Schweinf. in Verh. Zool.-Bot.
 Ges. Wien, xviii. (1868) 655 = flavissima.
sericea, Gill. ex Hook. & Arn. in Bot. Misc. iii. (1833)
 199.—Chili.
sericea, Span. in Linnaea, xv. (1841) 195.—Ind. or.;
 Malaya.
sericea, Vidal, Sinops. t. 40. f. D = *Flemingia con-*
gesta.
sericophylla, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 63.—
 Java.
sessiliflora, DC. Prod. ii. 389 = *Tephrosia brevipes*.
sessilifolia, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 46, sphalm.
 = praec.
sigmodens, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 251.—
 Afr. austr.
simplicifolia, DC. Prod. ii. 389 = *Eriosema simplici-*
folium.
simplicifolia, Walp. Rep. i. 787 = *singulifolia*.
simplicifolia, Wood, Class-Book (1861), 321 = *tomen-*
tosa.
singulifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 454.—Afr. austr.
splendens, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,
 xviii. (1868) 654.—Afr. trop.
stipulosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 229 = viscosa.

RHYNCHOSIA :—

- striata*, G. Don, Gen. Syst. ii. 347.—Afr. trop.
suaveoleus, DC. Prod. ii. 387.—Ind. or.
subsericea, Walp. Ann. ii. 434 = *Galactia dubia*.
tenuicaulis, Wall. Cat. n. 5495 = minima.
tenuis, Steud. Nom. ed. II. ii. 454 = minima.
texana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 687 = *R. Senna*.
tomentosa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 387
 = *cyanosperma*.
tomentosa, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i.
 (1835) 23.—Am. bor.
tomentosa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874)
 ii. 186 = *sericea*.
totta, DC. Prod. ii. 388.—Afr. austr.
trichodes, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 258 =
 totta.
trinervis, Steud. Nom. ed. II. ii. 454.—Afr. austr.
tuberosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 227 =
Eriosema tuberosum.
uniflora, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 249 =
angustifolia.
velutina, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5501 = *Atylosia*
rugosa.
velutina, Wight & Arn. Prod. 238.—Ind. or.
versicolor, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 132.
 —Madag.
vestita, Wall. Cat. n. 5505 = *Atylosia barbata*.
villosula, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 412 = viscosa.
violacea, DC. Prod. ii. 388 = *Eriosema violaceum*.
virgata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5503 = *Eriosema*
chinense.
viscida, DC. Prod. ii. 387 = *Pseudarthria viscida*.
viscidula, Steud. Nom. ed. II. ii. 454.—Afr. austr.
viscosa, DC. Prod. ii. 387.—As. et Afr. trop.
volubilis, Lour. Fl. Cochinch. 460.—China; Japon.
volubilis, Wood, Class-Book (1861), 321; Bot. & Fl.
 96 = *tomentosa*.
Wightiana, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5500 = *Atylosia*
Candollei.
Zeyheri, Steud. Nom. ed. II. ii. 454 = *Eriosema*
squarrosium.
RHYNCHOSPERMUM, A. DC. in DC. Prod. viii. 431
 (1844) = **Rhynchodia**, Benth. (Scrophul.).
ellipticum, A. DC. l. c. = **Rhynchodia Wallichii**.
Wallichii, A. DC. l. c. = **Rhynchodia Wallichii**.
RHYNCHOSPERMUM, Lindl. in Journ. Hort. Soc. i.
 (1846) 74 = **Trachelospermum**, Lem. (Apocyn.).
jasminoides, Lindl. l. c. = *T. jasminoides*.
RHYNCHOSPERMUM, Reinw. in Syll. Ratisb.
 ii. (1828) 7. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f.
 ii. 263.
LEPTOCOMA, Less. in Linnaea, vi. (1831) 130.
ZOLLINGERIA, Sch. Bip. in Flora, xxxvii. (1854) 273.
verticillatum, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 8.—Java.
RHYNCHOSPORA, Willd. Enum. Hort. Berol. 71
 (1809) = **Rhynchospira**, Vahl (Cyperac.).
RHYNCHOSTELIS, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852)
 770 = **Leochilus**, Knowl. & Westc. (Orchid.).
pygmaea, Reichb. f. l. c. = *L. pygmaeus* (in Addend.).
RHYNCHOSTEMON, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii.
 333 (1847) = **Thomasia**, J. Gay (Stercul.).
canescens, Steetz, l. c. 335 = *T. glutinosa*.
glutinosum, Steetz, l. c. 334 = *T. glutinosa*.
RHYNCHOSTIGMA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen.
 ii. 771 (1876) = **Toxocarpus**, Wight & Arn.
 (Asclep.).
brevipes, Benth. in Hook. Ic. Pl. sub t. 1189.—Afr.
 trop.
parviflorum, Benth. l. c.—Afr. trop.
racemosum, Benth. l. c. t. 1189.—Afr. trop.
RHYNCHOSTYLIS, Blume, Bijdr. 285. t. 49 (1825)
 (Rhynchostylis). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f.
 iii. 574.
gurwalica, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 888 = *retusa*.
guttata, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 93 =
retusa.
papillosa, Heynh. Nom. ii. 594 = *Saccolabium papil-*
losum.
praemorsa, Blume, Bijdr. 286 = *retusa*.
retusa, Blume, l. c.—Ind. or.; Malaya.
violacea, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 93.—
 Ins. Philipp.

RHYNCHOSTYLIS, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 343
 = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbell.).
hirsutus, Tausch, l. c. = *C. hirsutum*.

RHYNCHOTECHUM, Blume, Bijdr. 775 (1825).

- GESNERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1016.
CHEILOANDRA, Griff. in Lindl. Veg. Kingd. 672
 (1847).
CHILIANDRA, Griff. Notul. iv. 150 (1854).
CORYSANTHERA, Wall. Cat. n. 6411 (1831?).
alternifolium, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v.
 198.—Reg. Himal.
Brandisii, C. B. Clarke, l. c. 199.—Burma.
calycinum, C. B. Clarke, l. c.—Reg. Himal.
ellipticum, DC. Prod. ix. 285.—Reg. Himal.
hispidum, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 197.
 —Java.
latifolium, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comm.
 et Cyrt. Beng. t. 93.—Reg. Himal.; Burma.
parviflorum, Blume, Bijdr. 775.—Penang; Java.
tenue, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 199.—
 Ins. Philipp.
vestitum, Wall. ex C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.
 t. 92.—Reg. Himal.

RHYNCHOTHECA, Ruiz & Pav. Prod. 82. t. 15

- (1794). **GERANIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 275.
AULACOSTIGMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx.
 (1847) i. 149.
RHYNCHOTHELIA, Pers. Syn. ii. 92 (1807).
diversifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 233.
 t. 465 = spinosa.
integrifolia, H. B. & K. l. c. 232. t. 464 = spinosa.
spinosa, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 142.—Ecuador.

RHYNCHOSIA, Webb, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 345,
 sphalm. = **Rhynchoshia**, Lour. (Legumin.).

RHYNCHOSPERMUM, A. DC. in DC. Prod. viii. 431
 (1844), sphalm. = **RHYNCHOSPERMUM**, Lindl.

RHYNCHOSTYLIS, Steud. Nom. ed. II. ii. 457 (1841),
 sphalm. = **Rhynchostylis**, Blume (Orchid.).

RHYNCHOTHECUM, A. DC. in DC. Prod. ix. 285
 (1845), sphalm. = **Rhynchotechum**, Blume (Ges-

ner.).
RHYNCHOTHELIA, Pers. Syn. ii. 92 (1807) = **Rhyn-**
chotheca, Ruiz & Pav. (Geran.).

RHYNEA, DC. Prod. vi. 154 (1837); in Dcless. Ic. Sel.
 iv. t. 52 (1839) = **Cassinia**, R. Br. (Compos.).
phylicaeifolia, DC. ll. cc.—Afr. austr.

RHYNEA, Scop. Introd. 262 (1777) = **Mesua**, Linn.
 (Guttif.).

RHYNOSPERMUM, Walp. Ann. iii. 920 (1852-53),
 sphalm. = **RHYNCHOSPERMUM**, DC. = **Rhyn-**
chodia, Benth. (Scrophul.).

RHYPARIA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 239 (1844)
 = **Ryparosa**, Blume (Euphorb.).

RHYSOSPERMUM, Gaertn. f. Fruct. iii. 232. t. 224
 (1805) = **Notelaea**, Vent. (Oleac.).
ellipticum, Gaertn. f. l. c. t. 224. f. 2 = *N. nervosa*.
nervosa, Gaertn. f. l. c. 232 = *N. nervosa*.

RHYSOTOECHIA, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys.
Acad. Muench. ix. (1879) 498, 656. **SAPINDA-**
CEAE.

- bifoliolata*, Radlk. l. c. 656.—Austral.
flavescens, Radlk. l. c. 658.—Austral.
grandifolia, Radlk. l. c. 657.—Borneo.
Mortoniana, Radlk. l. c. 656.—Austral.
ramiflora, Radlk. l. c. 657.—Ins. Celebes.
Robertsoni, Radlk. l. c. 657.—Austral.

RHYSSOCARPUS, Endl. in Bot. Zeit. i. (1843) 459.

- RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 81.
PLEUROCARPUS, Klotzsch, in Bonplandia, vii.
 (1859) 3.
pubescens, Endl. in Bot. Zeit. i. (1843) 459.—Am.
 trop.

RHYSSOLOBIUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.
 217 (1837). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f.
 ii. 769.
dumosum, E. Mey. l. c.—Afr. austr.

RHYSSOSTELMA, Decne. in DC. Prod. viii. 590 (1844). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 751. nigricans, Decne. l. c.—Reg. Argent.

RHYTACHNE, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 11 (1825). Gen. dub. *GRAMINEARUM*, Benth. & Hook. f. iii. 1096. rottboellioides, Desv. l. c. 12.—Afr. trop.; Ind. occ.

RHYTICARPUS, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 540 (1862). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 887. difformis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 887.—Afr. austr. Ecklonis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 540.—Afr. austr. rugosus, Sond. l. c.—Afr. austr.

RHYTICARYUM, Becc. Malesia, i. (1878) 256 = **Ryticaryum**, Becc. (Icacin.).

RHYTIDANDRA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 302 (1854) = **Marlea**, Roxb. (Cornac.). *polyosmoides*, F. Muell. Fragm. ii. 176 = *M. vitiensis*. *vitiensis*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 303. t. 28 = *M. vitiensis*.

RHYTIDANTHE, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 63 (1837) = **Leptorhynchus**, Less. (Compos.). *scabra*, Benth. l. c. = *L. elongatus*.

RHYTIDOLOBUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 113 (1867) = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.). *appendiculatus*, Dulac, l. c. = *H. romanus*.

RHYTIDOPHYLLUM, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 38 (1829) (Rytidophyllum). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1006. auriculatum, Hook. Bot. Mag. t. 3562.—Hab. ? Berteroanum, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 39.—Ind. occ. crenulatum, DC. Prod. vii. 524.—Cuba. exsertum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 198.—Cuba. floribundum, Lem. Fl. des Serres, ii. (1846) t. 178.—Cuba. grande, Linden, ex Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 311 = tomentosum. grande, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 39.—Ind. occ. *Humboldtii*, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 18 = *Campanea Humboldtii*. leucomallum, Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 312.—Ind. occ. melastoma, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 7 (= *Moussonia melastoma*).—Peruv. Oerstedii, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 17 = *Campanea Oerstedii*. petiolare, DC. Prod. vii. 524.—Ins. S. Doming. Plummerianum, DC. l. c.—Ins. S. Doming. prasinatum, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 448.—Bras. purpureum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 6. t. 206 = *Isoloma purpurea*. *Tigridia*, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 18 = *Campanea grandiflora*. tomentosum, Hort. Berol. ex Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 310 = petiolare. tomentosum, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 39.—Ind. occ. Wrightianum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 198.—Cuba.

RHYTIDOSPERMUM, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 277 (1836–50) = **Matricaria**, Tourn. (Compos.). inodorum, Sch. Bip. l. c. = *M. inodora*.

RHYTIDOSPORUM, F. Muell. ex Hook. f. Fl. Tasm. (1855) = **Marianthus**, Hueg. (Pittosp.). procumbens, F. Muell. l. c. = *M. procumbens*. *Stuartianum*, F. Muell. l. c. = *M. procumbens*.

RHYTIDOSTYLIS, Reichb. Nom. 101 (1841) = **RYTIDOSTYLIS**, Hook. & Arn. = **Elaterium**, Jacq. (Cucurb.).

RHYTIDOTUS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 101 (1873) = **Rytidotus**, Hook. f. (Rubiace.).

RHYTIGLOSSA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 285, 444 (1836) = **Dianthera**, Gronov. (Acanth.). *acuminata*, Nees, in DC. Prod. xi. 354 = *D. comata*. *acuminatissima*, Miq. Stirp. Surin. Sel. 129.—Guian.

RHYTIGLOSSA :—

amazonica, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 127.—Bras. *Anagallis*, Mart. & Nees, in Mart. l. c. 119 = *Dianthera Anagallis*. *androsaemifolia*, Nees, in DC. Prod. xi. 352 = *D. androsaemifolia*. *angustifolia*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121 = *D. angustifolia*. *Arnottiana*, Nees, in DC. Prod. xi. 343.—Bras. *axillaris*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 122.—Bras. *barbata*, Nees, in DC. Prod. xi. 355.—Ind. occ. *breviflora*, Nees, l. c. 352 = *D. breviflora*. *campestris*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 118 = *D. campestris*. *Candelariae*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 158 = *D. Candelariae*. *caracasana*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 127.—Am. trop. *cayennensis*, Nees, in DC. Prod. xi. 346 = *D. cayennensis*. *chamaedryoides*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 123.—Bras. *ciliata*, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 364.—Afr. austr. *cordifolia*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121.—Bras. *corymbulosa*, Nees, in DC. Prod. xi. 355.—Guatemala. *cristata*, Regel, Gartenfl. (1852) 132.—Am. austr. ? *cuspidulata*, Nees, in DC. Prod. xi. 348.—Peruv. *dasyclados*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 126 = *D. dasyclados*. *distorta*, Nees, l. c. 125 = *D. distorta*. *divergens*, Nees, l. c. 128.—Bras. *Eckloniana*, Nees, in DC. Prod. xi. 336.—Afr. austr. *ensiflora*, Wood, Class-Book (1861), 536 = *D. americana* ? *geniculata*, Nees, in DC. Prod. xi. 341 = *D. secunda*. *genuflexa*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121.—Bras. *glandulifera*, Presl, Bot. Perner. 95 = *origanoides*. *glandulosa*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 71 = *Blechnum laxiflorum*. *havanensis*, Nees, in DC. Prod. xi. 344 = *D. comata*. *hirsuta*, Nees, l. c. 342.—Peruv. *Hookeriana*, Nees, l. c. 348 = *D. Hookeriana*. *humilis*, Nees, l. c. 340 = *D. ovata*. *Hyssopus*, Nees, l. c. 345.—Mexic. *ilhensis*, Moric. ex Nees, l. c. 342.—Bras. *inaequalis*, Nees, l. c. 349 = *D. inaequalis*. *indica*, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 281 = *D. indica*. *laeta*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 126 = *D. laeta*. *laevilinguis*, Nees, l. c. 120.—Bras. *lanceolata*, Buek, Index in DC. Prod. iii. 379 = *lineolata*. *latifolia*, Nees, in DC. l. c. xi. 353 = *D. latifolia*. *lavandulaefolia*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 124.—Bras. *leucophloea*, Nees, l. c. 129.—Bras. *Lindeniana*, Nees, in DC. Prod. xi. 349 = *D. Lindeniana*. *linearis*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 125.—Bras. *lineolata*, Nees, in DC. Prod. xi. 341.—Peruv. *longiflora*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 128 = *D. longiflora*. *lucida*, Nees, in DC. Prod. xi. 341 = *D. secunda*. *maynensis*, Nees, l. c. 346.—Peruv. *menthoides*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 122.—Bras. *mexicana*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 157 = *D. mexicana*. *Meyeniana*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121 = *Beloperrone Meyeniana*. *microphylla*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 159 = *D. Candelariae*. *microstachya*, Nees, in DC. Prod. xi. 342.—Peruv. *Moricandiana*, Nees, l. c. 341.—Guian. *nana*, Nees, l. c. 346.—Mexic. *nemorialis*, Nees, l. c. 159, in syn., nomen.—Hab. ? *oblonga*, Nees, l. c. 343.—N. Granat. *oblonga*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 124 = *D. oblonga*. *obtusifolia*, Nees, l. c. 120 = *D. ovata*. *organoides*, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 365.—Afr. austr. *ovata*, Nees, in DC. Prod. xi. 336.—Afr. austr. *ovatifolia*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 156.—Mexic. *paniculata*, Hort. Borbon. ex T. Anders. in Journ. Agri.-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 282 (*Justiciae* sp.).—Hab. ? *paniculata*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 129.—Bras. *pauciflora*, Nees, l. c. 123.—Bras. *pectoralis*, Nees, l. c. 128 = *D. pectoralis*.

RHYTIGLOSSA :—

pedunculosa, Nees, in DC. Prod. xi. 339 = *Dianthera americana*. *piatuiensis*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 124.—Bras. *Poeppigiana*, Nees, l. c. 123.—Bras. *polygonoides*, Nees, in DC. Prod. xi. 353.—N. Granat. *prolixa*, Nees, l. c. 336.—Afr. austr. *ptychostoma*, Nees, l. c. 337 = *Justicia ptychostoma*. *punctata*, Nees, l. c. 355 = *D. punctata*. *radicosa*, Nees, l. c. 344 = *Ptyssiglottis radica*. *repens*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 119.—Bras. *reptans*, Nees, in DC. Prod. xi. 343 = *D. reptans*. *rubicunda*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 71.—Afr. austr. *Ruiziana*, Nees, in DC. Prod. xi. 345 = *D. lineolata*. *Sagraeana*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 163 = *D. Sagraeana*. *sarmentosa*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 119.—Bras. *scabra*, Nees, in DC. Prod. xi. 354.—Hab. ? *secunda*, Nees, l. c. 340 = *D. secunda*. *sessilis*, Nees, l. c. 345 = *D. sessilis*. *speciosa*, Nees, l. c. 351 = *D. speciosa*. *symphyantha*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 125.—Bras. *tenuiflora*, Nees, in DC. Prod. xi. 340.—Peruv. *verticillaris*, Nees, l. c. 354.—Porto Rico. *viridiflora*, Nees, l. c. 346 = *Gatesia laete-virens*.

RHYTILEUCOMA, F. Muell. Fragm. ii. 90 (1860) = **Chilocarpus**, Blume (Apocyn.). *chilocarpoides*, F. Muell. l. c. = *C. australis*.

RHYTIS, Lour. Fl. Cochinch. 660 (1790) = **Antidesma**, Burm. (Euphorb.). *fruticosa*, Lour. l. c. = *A. fruticosum*.

RHYTISPERMUM, Link, Handb. i. 579 (1829) = **Lithospermum**, Linn. (Borag.). *apulum*, Link, l. c. ; Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 67 = *L. apulum*. *apulum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 51 = *L. microspermum*. *arvense*, Link, Handb. i. 579 = *L. arvense*. *dispermum*, Link, l. c. 580 = *Rochelia stellulata*. *fruticosum*, Link, l. c. 579 = *L. fruticosum*. *incrassatum*, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 67 = *L. incrassatum*. *medium*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 122 = *L. arvense*. *minimum*, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 68 = *L. minimum*. *patulum*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 122.—Europ. *prostratum*, Link, Handb. i. 579 = *L. fruticosum*. *purpureo-caeruleum*, Link, l. c. = *L. purpureo-caeruleum*. *tenuiflorum*, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 67 = *L. tenuiflorum*. *tinctorium*, Link, Handb. i. 579 = *Alkanna tinctoria*. *villosum*, Link, l. c. 580 = *L. villosum*.

RHYTIGLOSSA, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 118, sphalm. = **RHYTIGLOSSA**, Nees = **Dianthera**, Linn. (Acanth.).

RIANA, Aubl. Pl. Gui. i. 237. t. 94 (1775) = **Alsodeia**, Thou. (Violar.). *Conohoria*, Pritz. Ic. Ind. 939, sphalm. = *A. flavescens*. *guianensis*, Aubl. Pl. Gui. i. 237 = *A. prunifolia*. *tricapularis*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 850 = *Chaillitia Helferiana*.

RIBEIREA, Arruda, ex Koster, Trav. Braz. 499 (1816). *ROSACEAE* ? *sorbilis*, Arruda, ex Koster, l. c.—Bras.

RIBES, Linn. Gen. ed. I. 68 (1737). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 654. **BOTRYCARPUM**, A. Rich. Bot. Méd. ii. 487 (1823), in adnot. **CALOBOTRYA**, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 21. **CEROPHYLLUM**, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 152 (1838). **CHRYSOBOTRYA**, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 18. **COREOSMA**, Spach, l. c. 22 (1835). **GROSSULARIA**, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 243 (1763). **LIEBICHIA**, Opiz, Seznam, 59 (1852).

RIBES:—

- REBIS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 26.
 RIBESIUM, Medic. Phil. Bot. i. 120 (1789).
 ROBSONIA, Reichb. Handb. 233 (1837).
acerifolium, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 649 = rubrum.
acerrimum, Rochel, ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 432 = petraeum.
aciculare, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 25.—Sibir.
acidum, Ehrh. Beitr. v. 161, nomen.—Europ.
acidum, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = rubrum.
aconitifolium, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 661 = nigrum.
aculeatum, Salisb. Prod. 355 = R. Grossularia.
acuminatum, Wall. Cat. n. 6834 = glaciale.
affine, Dougl. ex Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1833) 138 = laxiflorum.
affine, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 60 = campanulatum.
albidum, Paxt. Mag. Bot. x. (1843) 55 = sanguineum.
albiflorum, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 662, sphalm. = seq.
albifolium, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 12. t. 132. f. 6.—Peruv.
albinervium, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110 = rubrum.
album, Gilib. Fl. Lituan. ii. 137 = alpinum.
alceaeifolium, Kunze, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 343 = sanguineum.
alpestre, Wall. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 64. t. 75 = R. Grossularia.
alpinoides, Domb. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 31.—Chili.
alpinum, Linn. Sp. Pl. 200.—Europ.; As. bor.
alpinum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 154 = orientale.
alpinum, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 345 = saxatile.
altaicum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 660 = nigrum.
altaicum, Lodd. ex Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = triste.
altissimum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 199 = petraeum.
ambiguum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 251.—Japon.
americanum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 649 = rubrum.
americanum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4.—Am. bor.
americanum, Pall. Fl. Ross. i. 11. 34 = laxiflorum.
apiifolium, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 661 = nigrum.
atropurpureum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 268 = petraeum.
augustum, Dougl. ex Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = sanguineum.
aureum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 164.—Am. bor. occ.
bacciferum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum.
baicalense, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = rubrum.
balsamiferum, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 94 = cereum.
Beatonii ×.—Cf. Loud. Gardn. Mag. xix. (1843) 269.
Berteroanum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 648.—Chili.
bicolor, Less. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 197 = fragrans.
bicolor, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 646.—Chili.
Biebersteinii, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60; et in DC. Prod. iii. 482 = petraeum.
Billenei, Medic. Pfl. Anat. 106 = americanum.
Billiardii, Carr. in Rev. Hortie. (1867) 140.—Hab.?
boreale, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = nigrum.
brachystachyum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 723.—Chili.
bracteosum, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 233.—Am. bor. occ.
bracteosum, S. Wats. Bot. King's Exped. 99 = Hudsonianum.
bullatum, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 267.—Hab.?
burejense, F. Schmidt, Reisen Amurl. 42.—Reg. Amur.
californicum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = Menziesii.
callibotrys, Wender. Analect. Krit. Bemerk. (1852) n. 12.—Am. bor.?

RIBES:—

- callibotrys*, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457; Walp. Ann. v. 23 (Quid?).—Hab.?
campanulatum, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 500.—Mexic.
campanulatum, Moench, Meth. 683 = americanum.
carpathicum, Kit. ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 432 = petraeum.
caucasicum, Adams, ex Roem. & Schult. Syst. v. 507 = R. Grossularia.
caucasicum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 160 = petraeum.
cereum, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 512.—Am. bor. occ.
chifuense, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 36 = fasciculatum.
chilense, C. Koch, Wochenschr. ii. (1859) 138 = villosum.
ciliatum, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 500.—Mexic.
ciliatum, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 355 = petraeum.
collinum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 647.—Chili.
crispum, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 264 = R. Grossularia.
crispum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 661 = nigrum.
cucullatum, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 340.—Chili.
cuneatum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 426.—Sibir. altaic.
cuneifolium, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 13.—Peruv.
Cynosbati, Linn. Sp. Pl. 202.—Am. bor.; Japon.
dauricum, Georgi, Reise, i. 381; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 196 = R. Diacantha.
decumbens, Ledeb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457, nomen (Quid?).—Sibir.
densiflorum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 649.—Chili.
dependens, Domb. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 27 = macrobotrys.
desmocarpum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 87.—Reg. Himal.
Diacantha, Pall. Reise, iii. 722.—Sibir.
Dikuscha, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 1. 254 = nigrum.
Dillenii, Medic. Beobacht. (1782) 326 = americanum.
dioicum, Moench, Meth. 683 = alpinum.
divaricatum, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 515.—Am. bor. occ.
dubium, Jacques, in Rev. Hortie. Sér. IV. iii. (1854) 279 = R. Grossularia.
ebracteatum, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60 = aureum.
ebracteolatum, C. Gay, Fl. Chil. iii. 34 = alpinoides.
echinatum, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1349 = lacustre.
fasciculatum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. 11. (1843) 189.—China; Japon.
ferox, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 26 = Menziesii.
flavum, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60. t. 2.—Hab.?
Fleischmanni, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = rubrum.
floridum, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. Nachtr. 262 = laxiflorum.
floridum, L'Hérit. Stirp. Nov. 4 = americanum.
Fontainesii, Colla, Hort. Ripul. App. iii. 2 = flavum.
fragrans, Lodd. Bot. Cab. t. 1533 = aureum.
fragrans, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 377.—Sibir.
frigidum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 62 = hirtum.
fuchsioides, Moç. & Sesse, ex Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 58 = speciosum.
Gayanum, Steud. Nom. ed. II. ii. 439, in syn.; Walp. Rep. ii. 360.—Chili.
glaciale, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 513.—Reg. Himal.
glandulosum, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 279 = prostratum.
glandulosum, Grauer, Dec. 2.—Hab.?
glandulosum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 13.—Chili.
glutinosum, Benth. in Trans. Hort. Soc. Ser. II. i. (1835) 476 = sanguineum.
glutinosum, Jacquem. Voy. Bot. 65 = orientale.
Gordonianum ×, Lem. in Fl. des Serres, ii. (1846) t. 165.
gracile, Michx. Fl. Bor. Am. i. 111.—Am. bor.

RIBES:—

- gracile*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 165 = rotundifolium.
gracile, Torr. Fl. N. U. St. i. 269 = R. Cynosbati.
graveolens, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 535 = fragrans.
Griffithii, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 88.—Reg. Himal.
Grossularia, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 799 = aciculare.
Grossularia, Linn. Sp. Pl. 201.—Europ.; Afr. bor.; Reg. Himal.
grossulariaefolium, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum.
grossularioides, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 250.—Japon.
grossularioides, Michx. ex Steud. Nom. ed. I. 691 = oxyacanthoides.
grossularium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = R. Grossularia.
heterotrichum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 662 = americanum.
heterotrichum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 270.—Sibir. altaic.
himalense, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 66. t. 67 = rubrum.
himalense, Royle, Illustr. Bot. Himal. 225 = R. Grossularia.
hirtellum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 111 = oxyacanthoides.
hirtum, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 501.—Am. austr.
Hladnickianum, Freyer, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = rubrum.
Hladnikii, Reichb. ex Nym. Consp. 267 = alpinum.
holosericeum, Hort. Berol. ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 266.—Hab.?
Hookerianum, A. Murr. Oreg. Circ. 1 = Lobbii?
horridum, Rupr. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 117.—Reg. Amur.
hortense, Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 691 = rubrum.
hudsonianum, Bourg. ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 336 = prostratum.
hudsonianum, Richards. in Frankl. 2nd Journ. App. 6.—Am. bor.
hybridum, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 186 = R. Grossularia.
incarnatum, Wedd. Chlor. And. ii. 215.—Peruv.
inebrians, Lindl. Bot. Reg. t. 1471 = cereum.
inodorum, Link. Handb. ii. 7 = aureum.
integrifolium, Phil. in Gartenfl. (1881) 195.—Chili.
intermedium, Bercht. & Presl, Rostl. i. Grossular. 3 = nigrum.
intermedium, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 720.—Hab.?
irriguum, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 516 = divaricatum.
irriguum, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 53 = oxyacanthoides.
japonicum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 253.—Japon.
jurullense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 61 = ciliatum.
Kunthii, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60.—Mexic.
laciniatum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 87 = glaciale.
lacustre, Poir. Encyc. Suppl. ii. 856.—Am. bor.
lathraeum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 641 = rotundifolium.
laxiflorum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 731.—Am. bor.
laxiflorum, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. ed. II. 7 = prostratum.
leptanthum, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 53.—Am. bor. occ.
leptostachyum, Benth. Pl. Hartw. 186.—N. Granat.
leptostachyum, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 65. t. 76 = orientale.
leucocladon, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum.
Lobbii, A. Gray, in Am. Natural. x. (1876) 274.—Calif.
longiflorum, [Nutt.] in Fras. Cat. (1813) n. 74, nomen; et ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 552 = aureum.
lucidum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 481.—Hungar.
luridum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 87.—Reg. Himal.

RIBES:—

macracanthum, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 90, nomen (Quid?).—Hab.?
macrobotrys, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 653 = *petraeum*.
macrobotrys, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iii. 12.—Peruv.
macrocalyx, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 35 = *grossularioides*.
magellanicum, Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 856.—Reg. Magellan.
malvaceum, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 13 = *sanguineum*.
melancholicum, Siev. ex Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 378 = *triste*.
melanthum, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 19 = *orientale*.
Menziesianum, Roem. & Schult. Syst. v. 507 = seq.
Menziesii, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 732.—Am. bor. occ.
mexicanum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 100 = Kunthii.
Meyeri, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 260.—Mont. Altai.
microphyllum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 62.—Mexic.
missouriense, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 662 = *americanum*.
missouriense, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 548 = *gracile*.
missurens, Lodd. ex Wendl. f. in Bartl. & Wendl. f. Beitr. ii. 17 = *aureum*.
mogollonicum, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, viii. (1881) 121.—N. Mexic.
molle, Poepp. ex Rach, in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 42.—Chili.
montanum, Phil. in Linnaea, xxx. (1859–60) 210.—Chili.
multiflorum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 60 = Kunthii.
multiflorum, Kit. in Roem. & Schult. Syst. v. 493.—Europ. austr.
multiflorum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 12 = *alpinum*.
memorosum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 645.—Chili.
nevadense, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 65 = *sanguineum*.
nigrum, Linn. Sp. Pl. 201.—Europ.; As. bor.
nigrum, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 734 = *hudsonianum*.
niveum, Lindl. Bot. Reg. t. 1692 = *gracile*.
nubigenum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 646.—Chili.
occidentale, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = *Menziesii*.
odoratum, Schlecht. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 386 = *ciliatum*.
odoratum, Wendl. f. in Bartl. & Wendl. f. Beitr. ii. 15 = *aureum*.
odoriferum, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 137.—Syria.
officinale, Steud. Nom. ed. I. 691, sphalm. = seq.
officinatum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 303 = *rubrum*.
olidum, Moench, Meth. 683 = *nigrum*.
opulifolium, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = *alpinum*.
opulifolium, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 483 = *multiflorum*.
Oregoni, Hérincq, Hort. Franc. (1872) t. 8 = *aureum*.
orientale, Desf. Hist. Arb. ii. 88; Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 856.—Oriens; Reg. Himal.
Ovallei, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 83.—Chili.
oxyacanthoides, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 799 = R. Grossularia.
oxyacanthoides, Linn. Sp. Pl. 201.—Am. bor.
oxyacanthoides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 111 = *lacustre*.
pallidum, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 268.—Hab.?
palmatum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 274 = *aureum*.
parviflorum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 648.—Chili.
parviflorum, Wedd. Chlor. And. ii. 215.—Ecuador.
parviflorum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 84.—Chili.
pauciflorum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 200 = *nigrum*.
pendulum, Salisb. Prod. 355 = *rubrum*.
pensylvanicum, Lam. Encyc. iii. 49 = *americanum*.

VOL. II.

RIBES:—

petiolare, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 514 = *hudsonianum*.
petraeum, Hort. Prag. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) 720 = *urceolatum*.
petraeum, Sm. Engl. Bot. t. 705 = *rubrum*.
petraeum, Wulf. in Jacq. Misc. ii. 36.—Europ.; As. bor.
pilosum, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = *alpinum*.
pinetorum, Greene, in Coult. Bot. Gaz. v. (1880) 157.—N. Mexic.
pneobalsamum, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 218 = *fragrans*.
polyanthes, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 649.—Chili.
polycarpum, J. F. Gmel. Syst. 419 = *procumbens*.
procumbens, Pall. Fl. Ross. ii. 35. t. 65.—Dahur.
propinquum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 70.—Sibir. or.
prostratum, L'Hérit. Stirp. Nov. 3. t. 2.—Am. bor.
pulchellum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 191.—Sibir.
pumilum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 551 = *cereum*.
punctatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1278 = *orientale*.
punctatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 12. t. 233. f. a.—Chili.
quercetorum, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 83.—Calif.
reclinatum, Linn. Sp. Pl. 201 = R. Grossularia.
recurvatum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 109 = *americanum*.
reniforme, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 25 = *cereum*.
resinosum, James, Cat. 177; ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 332 = *cereum*.
resinosum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 163.—Am. bor.
resinosum, Sims, Bot. Mag. t. 1583 = *orientale*.
rigens, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1866) 50.—Hab.?
rigens, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110 = *prostratum*.
ringens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 654 = *petraeum*.
Roseri, Orph. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 816 = *multiflorum*.
Roetli, Regel, Gartenfl. (1879) 226.—Am. bor. occ.
rotundifolium, Engelm. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. xii. (1861) 193 = *oxyacanthoides*?
rotundifolium, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110.—Am. bor.
rubrum, Linn. Sp. Pl. 200.—Europ.; As. et Am. bor.
rupicola, Phil. in Linnaea, xxx. (1859–60) 210.—Chili.
sanguineum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 164.—Am. bor. occ.
sativum, Syme, Eng. Bot. ed. III. iv. 42 = *rubrum*.
saxatile, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 376.—Sibir.
saxosum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 231 = *oxyacanthoides*.
scabrum, Domb. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 25 = *viscosum*.
Schlechtendalii, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1870) 31 = *rubrum*.
Schmidtianum, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 719 = *americanum*.
Scopolii, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = *alpinum*.
setosum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 383 = *lacustre*.
setosum, Lindl. Bot. Reg. t. 1237; et in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 243.—Am. bor.
sibiricum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 649 = *rubrum*.
speciosum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 731.—Am. bor. occ.
spicatum, Robs. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 240. t. 21 = *rubrum*.
spicatum, Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 432 = *multiflorum*.
spinosum, Lam. Fl. Fr. iii. 470 = R. Grossularia.
Stakori, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 238, nomen.—Sibir.
stamineum, Hornem. Hort. Hafn. 237 = *rotundifolium*.
stamineum, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 30 = *speciosum*.
stenocarpum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 475.—China.
sterile, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = *alpinum*.
stramineum, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. II. (1856) 58. t. 3, sphalm. = *stamineum*.
suaveolens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 256 = *fragrans*.
sublobatum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 647.—Chili.

RIBES:—

subvestitum, Hook. Bot. Mag. t. 4931 = *Lobbii*.
subvestitum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = *Menziesii*.
subvestitum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 645 = *oxyacanthoides*.
sylvestre, Syme, Eng. Bot. ed. III. iv. 43 = *rubrum*.
Takare, D. Don, Prod. Fl. Nep. 208.—Reg. Himal.
tenuiflorum, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 242 = *aureum*.
tomentosum, C. Koch, in Wochenschr. ii. (1859) 138 = *divaricatum*.
tortuosum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 17.—Calif.
tortuosum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = *alpinum*.
trifidum, Hort. ex C. Koch, l. c. 662 = *americanum*.
trifidum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110 = *prostratum*.
triflorum, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 90 = *oxyacanthoides*.
triflorum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = *divaricatum*.
triflorum, Willd. Hort. Berol. t. 61 = *rotundifolium*.
trilobum, Meyen, Reise, i. 314 = *sanguineum*.
triste, Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 21 = *petraeum*.
triste, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 378.—Sibir.
tubiflorum, C. A. Mey. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 140 = *sanguineum*.
tubulosum, Eschsch. in Mém. Acad. Pétersb. x. (1821–22) 283 = *sanguineum*.
urceolatum, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 720.—Hab.?
Uva-crispa, Linn. Sp. Pl. 201 = R. Grossularia.
valdivianum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 650.—Chili.
velutinum, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 83.—Calif.
viburnifolium, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881–82) 202.—Calif.
villosum, C. Gay, Fl. Chil. iii. 35.—Chili.
villosum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 547 = *divaricatum*.
villosum, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 514 = *orientale*.
vinosum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vii. App. 57 = *rubrum*.
viridissimum, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = *alpinum*.
viscosissimum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 163.—Am. bor. occ.
viscosum, Cels, ex Steud. Nom. ed. I. 691 = *resinosum*.
viscosum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 13.—Peruv.
vitifolium, Host, Fl. Austr. i. 308 = *multiflorum*.
vulgare, C. Koch, Fl. Jen. 36 = R. Grossularia.
vulgare, Lam. Encyc. iii. 47 = *rubrum*.
Wolfii, Roth. in Am. Natural. viii. (1874) 358 = *sanguineum*.
xorullense, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 100 = *ciliatum*.

RIBESIOIDES, Linn. Fl. Zeyl. 190 (1747) = *Embelia*, Burm. f. (Myrsin.).

RIBESIUM, Medic. Phil. Bot. i. 120 (1789) = *Ribes*, Linn. (Saxifr.).
campanulatum, Medic. Pfl. Anat. 106 = *Ribes americanum*.
Dillenii, Medic. Phil. Bot. i. 120 = *Ribes americanum*.
nigrum, Medic. l. c. = *Ribes nigrum*.
rubrum, Medic. l. c. = *Ribes rubrum*.

RICHARDIA, Adans. Fam. ii. 158 (1763) = *RICHARDIA*, Houst. = *Richardsonia*, Kunth (Rubiace.).

RICAURTEA, Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ix. (1858) 47 = *Doloiocarpus*, Roland. (Dillen.).
congestiflora, Triana, l. c. 48 = D. Rolandri.
nitida, Triana, l. c. 47 = D. nitida.

RICHAEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 25 (1806) = *Weihea*, Spreng. (Rhizoph.).
madagascariensis, Poir. in Dict. Sc. Nat. xlv. 446 = *Cassipourea madagascariensis*.

RICHARDIA, Houst. ex Linn. Gen. ed. I. 100 (1737) = *Richardsonia*, Kunth (Rubiace.).
adscendens, Steud. Nom. ed. II. ii. 458 = *Richardsonia adscendens*.
brasiliensis, Gomez, Mem. sobre Ipecac. 31 (1801) = *Richardsonia pilosa*.

4 Z

RICHARDIA :—

divergens, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *Richardsonia grandiflora*.
emetica, Schult. f. Syst. vii. 87 = *Richardsonia rosea grandiflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *Richardsonia grandiflora*.
Haenkeana, Steud. l. c. = *Richardsonia Haenkeana*.
humistrata, Steud. l. c. = *Richardsonia humistrata*.
lateralis, Steud. l. c. = *Richardsonia grandiflora*.
pilosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 50 = *Richardsonia pilosa*.
rosea, Schult. f. Syst. vii. 88 = *Richardsonia rosea*.
scabra, Linn. Sp. Pl. 330 = *Richardsonia pilosa*.
sparsa, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *Richardsonia grandiflora*.
stellaris, Steud. l. c. = *Richardsonia stellaris*.
villosa, [Moç. & Sesse.] ex DC. Prod. iv. 569 = *Richardsonia adscendens*.

RICHARDIA, Kunth, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 437. t. 20. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 982. *COLOCASIA*, Link. Diss. Bot. Suerin (1795) 77; et Handb. i. 267 (1829).
OTOSMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 8. (1836); New Fl. Am. ii. 90 (1836).
ZANTEDESCHIA, Spreng. Syst. iii. 765 (1826).
aethiopica, Spreng. Syst. iii. 765; v. 594, sphalm. = seq.
africana, Kunth, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 433.—Afr. austr.
albo-maculata, Hook. Bot. Mag. t. 5140.—Afr. austr.
angustiloba, Schott, in Journ. Bot. iii. (1865) 35.—Afr. trop.
hastata, Hook. Bot. Mag. t. 5176.—Afr. austr.
melanoleuca, Hook. f. l. c. t. 5765.—Afr. austr.

RICHARDIA, Lindl. Veg. Kingd. 715 (1847), sphalm. = **REICHARDIA**, Roth = **Picridium**, Desf. (Compos.).

RICHARDSONIA, Kunth, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 430. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 147.
RICARDIA, Adans. Fam. ii. 158 (1763).
RICHARDIA, Houst. ex Linn. Gen. ed. I. 100 (1737).
SCHIEDEA, Bartl. Ord. 210 (1830).
adscendens, DC. Prod. iv. 569.—Mexic.
brasiliensis, Hayne, Arn. Gew. viii. t. 21 = *pilosa*.
cubensis, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 31.—Cuba.
divergens, DC. Prod. iv. 568 = *grandiflora*.
emetica, Mart. Spec. Mat. Med. Bras. 11 = *rosea*.
grandiflora, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 351.—Bras.
Haenkeana, DC. Prod. iv. 569.—Mexic.
humistrata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 353.—Bras.
lateralis, DC. Prod. iv. 568 = *grandiflora*.
muricata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 143.—Cuba.
pilosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 350.—Am. trop.
rosea, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. n. vii. t. 7.—Bras.
scabra, A. St. Hil. l. c. t. 8; Mart. Spec. Mat. Med. Bras. 10 = *pilosa*.
sericea, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 354.—Bras.
sparsa, DC. Prod. iv. 568 = *grandiflora*.
stellaris, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 352.—Bras.

RICHEA, R. Br. Prod. 555 (1810). *EPACRIDAE*, Benth. & Hook. f. ii. 617.
CYSTANTHE, R. Br. Prod. 555 (1810).
PILITIS, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 443 (1836).
acerosa, F. Muell. Fragm. vi. 69.—Tasman.
Desgrassii, Hombr. & Jacquin. ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 85.—Tasman.
dracophylla, R. Br. Prod. 555, partim.—Tasman.
dracophylla, R. Br. l. c., partim = *scoparia*.
Gunnii, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 273.—Austral.
Milligani, F. Muell. Fragm. vi. 69.—Tasman.
pandanifolia, Hook. f. Fl. Antarct. i. 50.—Tasman.
procera, F. Muell. Fragm. vi. 68.—Tasman.
scoparia, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 273.—Tasman.
sprengelioides, F. Muell. Fragm. vi. 68.—Tasman.

RICHEA, Labill. Voy. i. 186. t. 16 (1798) = **Craspedia**, Forst. (Compos.).
glauca, Labill. l. c. t. 16 = **C. Richea**.

RICHEIA, Steud. Nom. ed. I. 691 (1821) = **RICHAEIA**, Thou. = **Weihea**, Spreng. (Rhizoph.).

RICHELLA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ii. (1852) 325. *ANONACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 26. *monosperma*, A. Gray, l. c.—Ins. Fiji.

RICHERIA, Vahl, Eclog. Am. i. 30. t. 4 (1796). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 286. *GUARANIA*, Baill. Etud. Gén. Euph. 598 (1858). *PODOCALYX*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 202.
australis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 17.—Bras.
Gardneriana, Baill. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 468 = *grandis*.
grandis, Vahl, Eclog. Am. i. 30. t. 4.—Am. trop.
laurifolia, Baill. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 468 = *grandis*.
longifolia, Baill. ex Muell. Arg. l. c. 467 = *grandis*.
loranthoides, Muell. Arg. l. c. 469.—Am. trop.
purpurascens, Baill. ex Muell. Arg. l. c. 467 = *grandis*.
Spruceana, Baill. ex Muell. Arg. l. c. 468 = *grandis*.

RICHIAEA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 681 (1867), sphalm. = **RICHAEIA**, Thou. = **Weihea**, Spreng. (Rhizoph.).

RICHIEA, G. Don, Gen. Syst. i. 276 (1831) = **Ritchiea**, R. Br. (Capparid.).

RICHTERIA, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 126 = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).
pyrethroides, Kar. & Kir. l. c. 127 = **C. Richteria**.

RICINELLA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 153 = **Adelia**, Linn. (Euphorb.).
barbinervis, Muell. Arg. l. c. 154 = **A. barbinervis**.
haemilolandra, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 730.—Ind. occ.
membranifolia, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 306.—Bras.
myricaefolia, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 154 = *Bernardia myricaefolia*.
oaxacana, Muell. Arg. l. c. = **A. oaxacana**.
pedunculosa, Muell. Arg. l. c. 153 = **A. pedunculosa**.
sylvestris, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 730 = **A. sylvestris**.
triloba, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 153 = *triloba*.

RICINOCARPOS, Desf. in Mém. Mus. Par. iii. (1817) 459. t. 22. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 263.

ECHINOSPHERA, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 538 (1840).

ROEPERIA, Spreng. Syst. iii. 13, 147 (1826).
Bowmani, F. Muell. Fragm. i. 181.—Austral.
cyanescens, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 60.—Austral.

glauca, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 18.—Austral.
ledifolius, F. Muell. Fragm. i. 76.—Austral.
major, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 59.—Tasman.

marginatus, Benth. Fl. Austral. vi. 73.—Austral.
Mitchelli, Sond. in Linnaea, xxviii. (1856) 563 = *Bertya Mitchelli*.

muricatus, Muell. Arg. l. c. xxxiv. (1865–66) 61.—Austral.
pinifolius, Desf. in Mém. Mus. Par. iii. (1817) 459. t. 22.—Austral.

psilocladus, Benth. Fl. Austral. vi. 71.—Austral.
puberulus, Baill. Etud. Gén. Euph. 344 = *Bowmani*.
rosmarinifolius, Benth. Fl. Austral. vi. 72.—Austral.
sidaefolius, Baill. Etud. Gén. Euph. 344 = *pinifolius*.
sidaeformis, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 70 = *pinifolius*.

speciosus, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 470.—Austral.

tasmanicus, Sond. & F. Muell. in Linnaea, xxviii. (1856) 562 = *Bertya rosmarinifolia*.

trichophorus, Muell. Arg. l. c. xxxiv. (1865–66) 60.—Austral.

tuberculatus, Muell. Arg. l. c.—Austral.
undulatus, Lehm. Pl. Preiss. ii. 370 = *glauca*.
velutinus, F. Muell. Fragm. ix. 2.—Austral.

RICINOCARPUS, A. Juss. Euph. Tent. 36 (1824) = *prae*c.

RICINODENDRON, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864–65) 533. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 297.
africanus, Muell. Arg. l. c.—Afr. trop.

RICINOIDES, Tourn. ex Moench, Meth. 286 (1794) = **Chrozophora**, Neck. (Euphorb.).
tinctoria, Moench, l. c. = **C. tinctoria**.

RICINOPHYLLUM, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 375 (1844) = **Fatsia**, Decne. & Planch. (Araliac.).
americanum, Pall. ex Ledeb. l. c. = **F. horrida**.

RICINUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 295 (1737). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 321.

CATAPUTIA, Ludw. Gen. 81 (1760).
africanus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *communis*.

americanus, Mill. l. c. n. 2 = *Jatropha Curcas*.
angulatus, Thunb. Diss. Ricin. 6.—Ind. or.
Apelta, Lour. Fl. Cochinch. 585 = *Mallotus Apelta*.
armatus, Andr. Bot. Rep. t. 430 = *communis*.
badius, Reichb. Ic. Bot. Exot. ii. 21. t. 154 = *communis*.

chinensis, Thunb. Diss. Ricin. 5 = *communis*?
communis, Linn. Sp. Pl. 1007.—Reg. trop.

dicoccus, Roxb. Fl. Ind. iii. 690 = *Mallotus moluccanus*.
digitatus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = *communis*.

dioicus, Cheval. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *Mallotus integrifolius*.
dioicus, Forst. f. Prod. 67 = *Macaranga dioica*.

dioicus, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 690.—Ins. Amboin.

dioicus, Wall. Cat. n. 7828 = *Coelodiscus montanus*.
europaeus, T. F. Nees, Gen. Pl. Monochl. t. 38 = *communis*.

floribundus, Reinw. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 962 = *Mallotus floribundus*.
furfuraceus, Wall. Cat. n. 7805 = *Daphniphyllum majus*.

Gibsoni.—Cf. Gard. Chron. (1877) II. 692 = *communis*?
glauca, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 199 = *communis*.

globosus, Willd. Sp. Pl. iv. 567 = *Mettenia globosa*.
hybridus, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) Suppl. ii. 13 = *communis*.

inermis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6; Jacq. Misc. ii. 362 = *communis*.
inermis, Wall. Cat. n. 7806 = *Macaranga hypoleuca*.

integrifolius, Willd. Sp. Pl. iv. 567 = *Mallotus integrifolius*.
japonicus, Thunb. Diss. Ricin. 4 = *communis*?

Jarak, Thunb. Fl. Javan. 23 = *Jatropha Curcas*.
Krappa, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *communis*.

laevis, DC. Not. Jard. Genève. i. 31 = *communis*.
lanceolatus, Thou. ex Baill. Adansonia, i. (1860–61) 255 = *Mallotus integrifolius*.

leucocarpus, Bertol. in Giorn. Arcad. xxi. (1824) 192 [bis] = *communis*.
lividus, Jacq. Misc. ii. 360 = *communis*.

macrocarpus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *communis*.
macrophyllus, Bertol. in Giorn. Arcad. xxi. (1824) 192 [bis].—Hab.?

Mappa, Linn. Amoen. Acad. iv. 124 = *Macaranga Mappa*.

Mappa, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 690 = *Macaranga Tanarius*.

Mappa, Wall. Cat. n. 7810 = *Macaranga Roxburghii*.
medicus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 164 = *communis*.

medius, J. F. Gmel. Syst. 1615 = *prae*c.
megalosperma, Delile, Cent. Pl. Méroé, 89 = *communis*.

minor, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *communis*.
montanus, Wall. Cat. n. 7727 = *Baliospermum axillare*.

morifolius, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 (Quid?).—Java.
nanus, Balb. Cat. Hort. Bot. Taurin. (1813) 65 = *communis*.

Obermanni, Hort. ex Groenland, in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 601 = *sanguineus*.
odoratus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = *Commersonia echinata*.

RICINUS:—

- paniculatus*, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459, nomen.—Hab.?
peltatus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 = communis.
perennis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = communis.
pictus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = *Codiaeum variegatum*.
portoricensis, Juss. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 314 = *Jatropha hernandiaefolia*.
pulchellus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 (Quid?).—Java.
purpurascens, Bertol. Misc. Bot. ix. 4 = communis.
rugosus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = communis.
rutilans, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1017, in syn. = communis.
salicinus, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 142 = *Homonoia riparia*.
sanguineus, Hort. ex Groenland, in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1838) 601.—Hab.?
scaber, Bertol. ex Moris, Stirp. Sard. Elench. 41 = communis.
speciosus, Burm. f. Fl. Ind. 207 (err. typ. 307) = communis.
spectabilis, Blume, Bijdr. 623 = communis.
Tanarius, Linn. Diss. Herb. Amb. in Amoen. Acad. iv. 125 = *Macaranga Tanarius*.
Tanarius, Lour. Fl. Cochinch. 584 = *Mallotus floribundus*.
tomentosus, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 489. t. 116 = *Adriana tomentosa*.
tomentosus, Thunb. Diss. Ricin. 6 (Quid?).—Java.
trilobus, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 108 = *Macaranga triloba*.
trilobus, Thunb. Diss. Ricin. 6 (= praec.?).—Zeylan.
tunisensis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 340 = communis.
undulatus, Bess. Cat. Hort. Bot. Krzem. (1811) 90 = communis.
urens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = communis.
viridis, Willd. Sp. Pl. iv. 564 = communis.
vulgaris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = communis.
- RICOLA**, Renealm. ex Rafin. Fl. Tellur. iii. 23 (1836) = *Gentiana*, Tourn.
bavarica, Rafin. l. c. = *G. bavarica*.
pumila, Rafin. l. c. = *G. pumila*.
verna, Rafin. l. c. = *G. verna*.
- RICOPHORA**, Mill. Gard. Dict. ed. VI. 175 App. (1752) = *Dioscorea*, Plum.
- RICOTIA**, Linn. Sp. Pl. ed. II. 912 (1763). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 72.
aegyptiaca, Linn. l. c. = *R. Lunaria*.
cantonensis, Lour. Fl. Cochinch. 397.—China.
carosula, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 30.—As. Min.
cretica, Boiss. & Heldr. l. c. 29.—Ins. Creta.
Lunaria, DC. Syst. ii. 284.—Syria.
multifida, Herb. Banks, ex DC. l. c. 685 = *Heliophila diffusa*.
Pestalotiana, Cesati, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 532. t. 9.—As. Min.
pinnata, Moench, Meth. 272 = *R. Lunaria*.
sinuata, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 30.—As. Min.
tenera, Herb. Banks, ex DC. Syst. ii. 685 = *Heliophila Peltaria*.
tenuifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 17.—As. Min.
- RIDAN**, Adans. Fam. ii. 130 (1763) = *Actinomeris*, Nutt. (Compos.).
- RIDDELIA**, Rafin. New Fl. Am. iv. 15. (1836) = *Melochia*, Dill. (Stercul.).
antiphylla, Rafin. l. c. 16 = *M. hirsuta*, Cav.
- RIDDELLIA**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 371. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 401.
PSILOSTROPHE, DC. Prod. vii. 261 (1838).
arachnoidea, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 94.—Mexic.
Cooperi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 358.—Am. bor. occ.
tagetina, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 371 (*Tagetinae*).—Am. bor. occ.

RIDELIA, Spach, Hist. Nat. Vég. Phan. ix. 227 (1840), sphalm. = **RIEDELEA**, Cham. = **Lantana**, Linn. (Verben.).

RIDLEIA, Endl. Gen. 1000 (1840) = **RIEDLEA**, Vent. = **Melochia**, Dill. (Stercul.).

RIDOLFIA, Moris, Ind. Sem. Hort. Taur. (1841); Fl. Sard. ii. 212. t. 75 (1842) = **Carum**, Rupp. (Umbell.).
segetum, Moris, ll. cc = *C. Ridolfia*.

RIEDELEA, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 240 = **Lantana**, Linn. (Verben.).
lippioides, Cham. l. c. = *L. Chamissonis*.
officinalis, Lacerda, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 320 = *Vandellia diffusa*.

RIEDELEA, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 171 (1863) = **Satyria**, Klotzsch (Vaccin.).
bahiensis, Mart. l. c. 172 = *S. panurensis*.

RIEDELIA, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1419 (1883). *SCITAMINEAE*.
curviflora, Oliver, l. c. —Malaya.

RIEDELEA, Trin. ex Kunth, Enum. Pl. i. 515 (1833) = **Arundinella**, Raddi (Gramin.).
Mikani, Trin. ex Kunth. l. c. = *A. brasiliensis*.

RIEDLEA, Vent. in Mém. Inst. Sc. Phys. Par. i. (1807) 2 = **Melochia**, Dill. (Stercul.).
Aleurodendron, Steud. Nom. ed. II. ii. 459.—Java.
Berteriana, DC. Prod. i. 492 = *Waltheria glabra*.
borbonica, DC. l. c. 491 = *M. borbonica*.
capitata, Boj. Hort. Maur. 38 = *M. corchorifolia*.
caracasana, DC. Prod. i. 492 = *M. caracasana*.
Chamaedrys, G. Don, Gen. Syst. i. 529 = *M. Chamaedrys*.

concatenata, DC. Prod. i. 492 = *M. corchorifolia*.
concinna, Walp. Ann. ii. 166 = *M. concinna*.
corchorifolia, DC. Prod. i. 491 = *M. corchorifolia*.
cordata, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *M. arborea*.
corymbosa, [Mog. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 491 = *M. corymbosa* (in Addend.).
crenata, DC. Prod. i. 491 = *M. tomentosa*.
cubensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 209.—Cuba.
depressa, DC. Prod. i. 491 = *M. depressa*.
dichotoma, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 208.—Guian.

elongata, Presl, Rel. Haenk. ii. 148.—Calif.
eriantha, DC. Prod. i. 492.—Guian.
graminifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. graminifolia*.
heterotricha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 211 = *M. hirsuta*, Cav.
hirsuta, DC. Prod. i. 492 = *M. hirsuta*, Cav.
hypoleuca, Walp. Ann. ii. 166 = *M. hypoleuca*, Miq.
hyptoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 210.—Bras.
inflata, DC. Prod. i. 491 = *M. lupulina*.
interrupta, Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 375 = *M. interrupta*.
jamaicensis, DC. Prod. i. 492 = *M. venosa*.
Jurgensenii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 211 = *M. Jurgensenii*.
littoralis, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 73.—Bras.
lupulina, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856), 115 = *M. lupulina*.
melissaeifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 149.—Mexic.

mollis, DC. Prod. i. 491 = *M. mollis*.
multiflora, Presl, Rel. Haenk. ii. 147.—Peruv.
nodiflora, DC. Prod. i. 491 = *M. nodiflora*.
odorata, DC. l. c. = *M. odorata*.
peruviana, DC. l. c. = *M. peruviana*.
polystachya, DC. l. c. 490 = *M. venosa*.
pteronema, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 208.—Hab.?

quinquealata, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *Columbia floribunda*.
radiata, Blume, Bijdr. 86 = *M. corchorifolia*.
ramosissima, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 571, in obs.—Ind. or.
ramuliflora, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 132.—Guian.
scutellarioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 210 = *M. scutellarioides*.
sericea, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. venosa*.

RIEDLEA:—

- serrata*, Vent. Choix, t. 37 = *Melochia hirsuta*, Cav.
setulosa, Miq. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 80.—Guian.
siphonandra, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 208.—Ecuador.
sparsiflora, Klotzsch, ex Walp. Ann. ii. 166.—Guian.
supina, DC. Prod. i. 491 = *M. corchorifolia*.
tenella, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 212 = *M. tenella*.
thymifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 149.—Peruv.
tiliaefolia, DC. Prod. i. 491 = *M. arborea*.
tomentella, Presl, Rel. Haenk. ii. 148 = *M. tomentella*.
truncata, DC. Prod. i. 491 = *M. corchorifolia*.
Ulmariae, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. ulmarioides*.
urticaefolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 209 = *M. nodiflora*.
velutina, DC. Prod. i. 491.—Ind. or.
venosa, DC. Prod. i. 492 = *M. venosa*.
villosissima, Presl, Rel. Haenk. ii. 146.—Ins. Marian.
virgultosa, Macfad. Fl. Jamaica. i. 104 = *M. venosa*.
Wallichiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. arborea*.

RIEDLEIA, DC. Prod. i. 490 (1824) = praec.

RIEDLEJA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 205 (1844) = praec.

RIEDLIA, Dum. Anal. Fam. 46 (1829) = praec.

RIENCOURTIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 466 (1827). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 345.

- PONTESIA*, Vell. Fl. Flum. Ic. viii. t. 147 (1827).
RIENCURTIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 26.
TETRANTHA, Poit. ex DC. Prod. v. 696, 503 (sphalm. *PETRANTHA*) (1836).
angustifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 287 = oblongifolia.
glomerata, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 468.—Guian.
latifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 286.—Bras.
longifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 144.—Bras.
oblongifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 287.—Bras.
spiculifera, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 467.—Am. austr.?
tenuifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 287.—Bras.
tenuifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 145 = oblongifolia.

RIENCURTIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 26 = praec.

RIESENBACHIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 36. t. 54 (1835). *ONAGRARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 792.
racemosa, Presl, l. c.—Mexic.

RIESSIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 123; et in Abh. Akad. Berl. (1855) 64. t. 5 C = **Begonia**, Linn.
ferruginea, Klotzsch, l. c. 124 = *B. Hookeriana*.
pulchella, Klotzsch, l. c. = *B. pulchella*.

RIGIDELLA, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 16. *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 691.
flammea, Lindl. l. c.—Mexic.
immaculata, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 62. t. 68.—Guatemala.
maculata, Walp. Ann. iii. 612, sphalm. = praec.
orthantha, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. i. (1845) 107. t. 45.—Mexic.

RIGIOLEPIS, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1160 (1876). *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 572.
borneensis, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1160.—Borneo.

RIGIOPAPPUS, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 548. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 406.
leptocladius, A. Gray, l. c.—Calif.

RIGIOSTACHYS, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 29. *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 309.

RECCHIA, Moç. & Sesse ex DC. Syst. i. 411 (1818). bracteata, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 30.—Mexic.

RIMA, Sonner. Voy. Nouv. Guin. 99. tt. 57–60 (1776) = *Artocarpus*, Forst. (Urtic.).

RINANTHUS, Gilib. Fl. Lituan. i. 307 (1781) = *Rhinanthus*, Linn. (Scrophul.).

RINDERA, Pall. Reise, i. 486 (1771). *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 849.

CYPHOMATTIA, Boiss. Fl. Orient. iv. 272 (1879).

MATTIA, Schult. Obs. Bot. 30, 32 (1809).

angustifolia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—Armenia.

Aucheri, Bunge, l. c. = *Paracaryum Aucheri*.

caespitosa, Bunge, l. c. —As. Min.

canescens, DC. ex A. DC. in DC. Prod. x. 168, in obs. —As. Min.; Persia.

Columnae, Roem. & Schult. Syst. iv. 762 = *Cynoglossum Columnae*.

corymbiformis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *Paracaryum corymbiforme*.

corymbulosa, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 648 = *tetraspis*.

cristata, Roem. & Schult. Syst. iv. 761 = *Paracaryum cristatum*.

cyclodonta, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—Turkest.

echinata, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) 1. 92.—Soongar.

emarginata, Roem. & Schult. Syst. iv. 83 = *Paracaryum angustifolium*.

eriantha, Ledeb. ex Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *lanata*.

glastifolia, Roem. & Schult. Syst. iv. 83 = *Paracaryum glastifolium*.

glochidiata, Wall. Cat. n. 926 = *Paracaryum glochidiatum*.

græca, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 30.—Graecia.

incana, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *Paracaryum incanum*.

laevigata, Roem. & Schult. Syst. iv. 83, 765 = *tetraspis*.

lanata, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—As. Min.; Persia.

lateriflora, Roem. & Schult. Syst. iv. 762 = *Pectocarya lateriflora*.

leptophylla, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *Paracaryum leptophyllum*.

magellensis, Roem. & Schult. Syst. iv. 763 = *Cynoglossum magellense*.

ochroleuca, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 408.—Sibir. altaic.

pilosa, Roem. & Schult. Syst. iv. 762 = *Pectocarya lateriflora*.

pubescens, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 648.—Pontus.

punctata, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *lanata*.

tetraspis, L'Hérit. ex DC. & A. DC. in DC. Prod. x. 168 = *canescens*.

tetraspis, Pall. Reise, i. 486.—Ross.; Sibir.

umbellata, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—Austr.; Sibir.

RINOPODIUM, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 28 (1866) = *Scilla*, Linn. (Liliac.).

bifolia, Salisb. l. c. = *S. bifolia*.

RINOREA, Aubl. Pl. Gui. i. 235. t. 93 (1775) = *Alsodeia*, Thou. (Violar.).

guianensis, Aubl. l. c. = *A. paniculata*.

integrifolia, Ging. in DC. Prod. i. 313 = *A. integrifolia*.

RINXOSTYLIS, Rafin. Sylva Tellur. 87 (1838) = *Vitis*, Tourn. (Ampel.).

repanda, Rafin. l. c. = *V. repanda*.

RINZIA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 239 = *Baeckea*, Linn. (Myrtac.).

crassifolia, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 331 = *B. platystemona*.

RINZIA :—

fumana, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 239 = *Baeckea fumana*.

longifolia, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 331 = *B. scholleraefolia*.

oxycoccoides, Turcz. l. c. = *B. oxycoccoides*.

RIOCREUXIA, Decne. in DC. Prod. viii. 640 (1848). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 780.

torulosa, Decne. l. c. —Afr. austr.

RIPASIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 48 (1836) = *Baptisia*, Vent. (Legumin.).

erulea, Rafin. l. c. = *B. australis*.

RIPIDIUM, Trin. Fund. Agrost. 169 (1820) = *Erianthus*, Michx. (Gramin.).

japonicum, Trin. l. c. = *Miscanthus sinensis*.

Ravennae, Trin. l. c. = *E. Ravennae*.

strictum, Trin. l. c. = *E. Hostii*.

RIPOGONUM, Forst. Char. Gen. 49. t. 25 (1776) = *Rhipogonum*, Forst. (Liliac.).

RIPSELAXIS, Rafin. Alsog. Am. 14 (1838) = *Salix*, Tourn.

herbacea, Rafin. l. c. = *S. herbacea*.

RIPSOCTIS, Rafin. Alsog. Am. 15 (1838) = *Salix*, Tourn.

egyptiaca, Rafin. l. c. = *S. Salsaf?*.

indica, Rafin. l. c. = *S. tetrasperma*.

RIQUERIA, Pers. Syn. i. 152 (1805) = seq.

RIQUEURIA, Ruiz & Pav. Prod. 18 (1794). Gen. dub. *RUBIACEARUM*.

avenia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 70.—Peruv.

RISSOA, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 324 = *Atalantia*, Correa (Rutac.).

ceylanica, Arn. l. c. = *A. ceylanica*.

RITCHIEA, R. Br. in Denh. & Clapp. Voy. App. 225 (1826). *CAPPARIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 110.

erecta, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 769.—Afr. trop.

fragrans, R. Br. in Denh. & Clapp. Voy. App. 225.—Afr. trop.

polypetalata, Hook. ex Hook. f. in Bot. Mag. t. 5344.—Afr. trop.

RITINOPHORA, Neck. Elem. ii. 229 (1790) = *Amyris*, P. Br. (Bursar.).

RITTERA, Schreb. Gen. 364 (1789) = *Swartzia*, Schreb. (Legumin.).

dodecandra, Vahl, Symb. Bot. ii. 60 = *S. dodecandra*.

grandiflora, Vahl, Ecl. Am. ii. 37 = *S. grandiflora*.

pinnata, Vahl, l. c. 38 = *S. pinnata*.

simplex, Vahl, Symb. Bot. ii. 60 = *S. grandiflora*.

triphylla, Sw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *S. triphylla*.

RIVEA, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 407. *CONVOLVULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 868.

Argyrea, Mart. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 327.—Bras.

Bona-nox, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 409. (Conv. Or. 27) = *hypocrateriformis*.

brasiliensis, Mart. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 326.—Bras.

cordata, Choisy, l. c. —Bras.

cuneata, Wight, in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 199 = *Argyrea cuneata*.

exaltata, Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Brit. Gui. 1084, nomen.—Guian.

fragrans, Nimmo, in J. Grah. Cat. Pl. Bomb. 127 = *hypocrateriformis*.

hastata, Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Brit. Gui. 1152, nomen.—Guian.

hirsuta, Wight, Ic. t. 891 = *Argyrea hirsuta*.

hypocrateriformis, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 408. (Conv. Or. 26).—Ind. or.

oblecta, Choisy, l. c. 410. (Conv. Or. 28) = *Argyrea oblecta*.

ornata, Aitch. Cat. Pl. Punj. 100 = *hypocrateriformis*.

ornata, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 409. (Conv. Or. 27).—Ind. or.

pomacea, Wight, Ic. t. 888 = *Argyrea pomacea*.

RIVEA :—

subincana, Choisy, in DC. Prod. ix. 325.—Bras.

tiliaefolia, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 407. (Conv. Or. 25) = *Argyrea tiliaefolia*.

zeylanica, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 209 = *Argyrea populifolia*.

RIVERIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 266. t. 659 (1825) = *Swartzia*, Schreb. (Legumin.).

nitens, H. B. & K. l. c. 267 = *S. nitens*.

RIVINA, Plum. ex Linn. Syst. ed. I. (1735). *PHYTO-LACCACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 80.

DOBERA?, Rafin. Fl. Tellur. iii. 55 (1836).

PIERCEA, Mill. Gard. Dict. ed. VII. (1759).

RIVINIA, Linn. Hort. Cliff. 35 (1737).

SOLANOIDES, Tourn. ex Moench, Meth. 307 (1794).

TITHONA, Linn. Syst. ed. I. (1735).

acuminata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 184 = *Mohlana secunda*.

acuminata, Rafin. New Fl. Am. iv. 13 = *humilis*.

affinis, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 30 = *Mohlana nemoralis*.

apetala, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 84 = *Mohlana guineensis*.

anrantiaica, Warsz. ex Schenk, Ind. Sem. Werceburg. (1861); ex Urban, Add. Ind. Sem. Hort. Berol. (1880) 46.—Am. austr.?

brasiliensis, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. vi. (1793) 63 = *humilis*.

canescens, D. Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *humilis*.

dodecandra, Jacq. Obs. Bot. i. 6 = *Villamilla octandra*.

Ehrenbergiana, Klotzsch, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 11 = *Villamilla octandra*.

glabrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 184 = *humilis*.

gracilis, Salisb. Prod. 67 = *humilis*.

humilis, Linn. Sp. Pl. 121.—Am. trop.

inaequalis, Hook. Ic. Pl. t. 130 = *Mohlana nemoralis*.

laevis, Linn. Mant. i. 41 = *humilis*.

lanceolata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 8 = *humilis*.

Latbenia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6959 = *humilis*?

latifolia, Lam. Illustr. i. 324 = *Mohlana latifolia*.

mexicana, Moç. & Sesse, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 14 = *humilis*?

Moritziana, Klotzsch, ex Moq. l. c. 11 = *Villamilla octandra*.

Mutisii, Willd. ex Schult. Mart. iii. 305, in obs. = *Villamilla octandra*.

obliquata, Rafin. New Fl. Am. iv. 13.—Am. bor.

octandra, Linn. Cent. Pl. ii. 9 = *Villamilla octandra*.

orientalis, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 12 = *humilis*.

pallida, Salisb. Prod. 67 = *humilis*.

paniculata, Linn. Cent. Pl. ii. 9 = *Salvadora persica*.

paraguayensis, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. v. (1868) 206; Contrib. 55.—Paraguay.

peruviana, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 10 = *Villamilla peruviana*.

plumbaginifolia, Willd. ex Moq. l. c. 13 = *humilis*.

portulacoides, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 167 = *humilis*.

procumbens, Ruiz, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 13 = *humilis*.

puberula, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 184 = *humilis*.

purpurascens, Schrad. Gen. Pl. Illustr. 17. t. 5 = *humilis*.

scandens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Villamilla octandra*.

secunda, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 65 = *Mohlana secunda*.

seguierioides, Klotzsch, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 14 = *Ledenbergia seguierioides*.

tetrandra, Desf. Tabl. ed. II. 49 = *humilis*.

tinctoria, Ham. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 598, nomen (Quid?)—Venezuela.

tinctoria, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 10 = *Villamilla peruviana*.

viridiflora, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii. (1883) 105.—Porto Rico.

viridis, F. W. Schmidt, in Mayer, Samml. Phys. Auf. i. (1791) 185 = *humilis*.

RIVINIA, Linn. Hort. Cliff. 35 (1737) = *præc.*

RIXEA, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, i. (1845) 225, t. 22 = *Tropaeolum*, Linn. (Geran.).

azurea, C. Morr. l. c. = *T. azureum*.

RIXIA, Lindl. Veg. Kingd. 367 (1847) = praec.

RIZOA, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 132 = **Gardoquia**, Ruiz & Pav. (Labiata).
ovatifolia, Cav. l. c. 133 = *G. multiflora*.

ROBBAIREA, Boiss. Fl. Orient. i. 735 (1867) = **Polycarpaea**, Lam. (Caryophyll.).
prostrata, Boiss. l. c. = *P. prostrata*.

ROBBIA, A. DC. in DC. Prod. viii. 444 (1844) = **Malouetia**, DC. (Apocyn.).
cestroides, A. DC. l. c. 445 = *M. cestroides*.
gossypina, Miers, Apocyn. S. Am. 108. — Bras.
macrocarpa, Miers, l. c. = *Echites macrocarpa*.

ROBERGIA, Schreb. Gen. 309 (1789) = **Rourea**, Aubl. (Connar.).
frutescens, J. F. Gmel. Syst. 729; Willd. Sp. Pl. ii. 752 = *Rourea frutescens*.
glabra, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 188 = *Rourea glabra*.
hirsuta, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 455 = *Tapiria hirsuta*.

ROBERTA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 171 = seq.

ROBERTIA, DC. Fl. Fr. Suppl. 453 (1815) = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).
pinnatifida, Spreng. Syst. iii. 661 = *H. pinnatifida*.
taraxacoides, DC. Fl. Fr. Suppl. 453 = *H. taraxacoides*.
tenuiflora, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 35 = *H. tenuiflora*.

ROBERTIA, Méral, Fl. Par. 211 (1812) = **Eranthis**, Salisb. (Ranunc.).
hiemalis, Méral, l. c. = *E. hyemalis*.

ROBERTIA, Rich. ex Carr. Conif. ed. I. 498 (1855) = **Phyllocladus**, Rich. (Conif.).

ROBERTIA, Scop. Introd. 154 (1777) = **Bumelia**, Sw. (Sapot.).
decandra, Scop. l. c. = *B. lycioides*.

ROBERTIUM, Picard, in Mém. Soc. Agric. Boulogne, Sér. II. i. (1837) 99 = **Geranium**, Tourn.
anemoneafolium, Picard, l. c. 134 = *G. anemoneafolium*.
lucidum, Picard, l. c. = *G. lucidum*.
macrorrhizum, Picard, l. c. = *G. macrorrhizum*.
minutiflorum, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 351 = *G. Robertianum*.
modestum, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.
purpureum, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.
semiglabrum, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.
simile, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.
vulgare, Picard, in Mém. Soc. Agric. Boulogne, Sér. II. i. (1837) 134 = *G. Robertianum*.

ROBERTSIA, Endl. Gen. 740 (1839) = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).

ROBERTSONIA, Haw. Syn. Pl. Succ. 321 (1812) = **Saxifraga**, Linn.
crenata, Haw. l. c. 322 = *S. umbrosa*.
cuneifolia, Haw. Saxif. Enum. 56 = *S. cuneifolia*.
daurica, Haw. l. c. = *S. davurica*.
dentata, Haw. Syn. Pl. Succ. 323 = *S. umbrosa*.
Geum, Haw. Saxif. Enum. 53 = *S. Geum*.
hibernica, Bree, ex Sternb. Rev. Saxif. Suppl. ii. 5 = *S. umbrosa*.
hieracifolia, Link, Handb. ii. 40 = *S. hieracifolia*.
hirsuta, Haw. Saxif. Enum. 54 = *S. umbrosa*.
hybrida, Link, Handb. ii. 39 = *S. hybrida*.
micranthifolia, Haw. Syn. Pl. Succ. 322 = *S. erosa*.
nivalis, Link, Handb. ii. 40 = *S. nivalis*.
pensylvanica, Link, l. c. = *S. pensylvanica*.
polita, Haw. Syn. Pl. Succ. 322 = *S. umbrosa*.
punctata, Haw. Saxif. Enum. 55 = *S. punctata*.
sarmentosa, Link, Handb. ii. 40 = *S. sarmentosa*.
semipubescent, Link, l. c. = *S. pensylvanica*.
serrata, Haw. Syn. Pl. Succ. 322 = *S. umbrosa*.
sphaeroides, Haw. l. c. = *S. umbrosa*.
stellaris, Link, Handb. ii. 40 = *S. stellaris*.
umbrosa, Haw. Saxif. Enum. 55; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 529 = *S. umbrosa*.

ROBESCHIA, Hochst. ex Fourn. Thèse Crucif. 146 (1865) = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).
sinaica, Hochst. ex Fourn. l. c. = *S. Sophia*.

ROBINA, Aubl. Pl. Gui. ii. 768 (1775), err. typ. = seq.

ROBINIA, Linn. Gen. ed. I. 220 (1737). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 499.
PSEUDO-ACACIA, [Tourn.] Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 364.
Acacia, Linn. Syst. ed. X. 1161 = *R. Pseud-acacia*.
aculeata, Juss. ex DC. Prod. ii. 314 = *Pictetia Jussiae*.
aculeata, Vahl, in West, Bidr. Ste Croix, 300. — Ind. occ.
acuminata, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 306. — Mexic.
alata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *Piscidia Erythrina*.
altagana, Pall. Fl. Ross. i. 68 = *Caragana microphylla*.
amara, Lour. Fl. Cochinch. 455. — China; Cochinch.
ambigua, Poir. Encyc. Suppl. iv. 690 = *dubia*.
amoena, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 60 = *viscosa*.
amorphaeifolia, Hort. ex C. Koch, l. c. 56 = *R. Pseud-acacia*.
angulata, Hort. ex C. Koch, l. c. = *R. Pseud-acacia*.
argentea, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 326 = *Ammodendrum Sieversii*.
argentiflora, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 352 = *Lonchocarpus sericeus*.
aturensis, Humb. ex Spreng. Syst. iii. 246. — N. Granat.
aurea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.
Bessoniana, Hort. ex C. Koch, l. c. 58 = *R. Pseud-acacia*.
bullata, Hort. ex C. Koch, l. c. 56 = *R. Pseud-acacia*.
Camusetii, Leroy, ex C. Koch, l. c. = *R. Pseud-acacia*.
candida, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 327 = *Tephrosia candida*.
capensis, Bnm. f. Fl. Cap. Prod. 22 = *Calpurnia robinoides*.
Caragana, Linn. Sp. Pl. 722 = *Caragana arborescens*.
Chamlagu, L'Hérit. Stirp. Nov. 161. t. 77 = *Caragana Chamlagu*.
chinensis, Pers. Syn. ii. 310 = *Caragana Chamlagu*.
coccinea, Aubl. Pl. Gui. ii. 773 = *Ormosia coccinea*.
coluteoides, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.
complexa, Hort. ex C. Koch, l. c. 61 = *hispida*.
cornigera, Hort. ex C. Koch, l. c. 56 = *R. Pseud-acacia*.
crispa, Hort. ex C. Koch, l. c. = *R. Pseud-acacia*.
cubensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 392. — Cuba.
cyaneus, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 351 = *Lonchocarpus cyaneus*.
cylindrica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.
davurica, Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 304. — Dahuria.
Decaisneana, Verlot, in Rev. Hortic. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.
dissecta, Verlot, l. c. = *R. Pseud-acacia*.
domingensis, Spreng. ex DC. Prod. ii. 168 = *Corynella paucifolia*.
dubia, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 154 = *Milletia sericea*.
dubia, Fourn. in Desv. Journ. Bot. ii. (1813) 204. — Am. bor.
dubia, Poir. Encyc. vi. 227 = *Sabinea dubia*.
echinata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *R. Pseud-acacia*.
edwardsiaeifolia, Verlot, in Rev. Hortic. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.
Ehrenbergia, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 303. — Mexic.
fastigiata, Verlot, in Rev. Hortic. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.
ferox, Pall. Reise, iii. 752 = *Caragana spinosa*.
ferruginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 395. — Venezuela.
ferruginea, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 329 = *Derris ferruginea*.
filiformis, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 206 = *Galactia dubia*.
flava, Lour. Fl. Cochinch. 556. — China bor.
flexilis, Salisb. Prod. 336 = *Caragana microphylla*.
florida, Vahl, in West, Bidr. Ste Croix, 300 = *Sabinea florida*.
fragilis, Salisb. Prod. 336 = *R. Pseud-acacia*.

ROBINIA :—

frutescens, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1044 = *Caragana frutescens*.
Frutex, Linn. l. c. ed. I. 723 = *Caragana arborescens*.
fruticosa, Georgi, Reise, ii. 715 = *Caragana frutescens*.
fruticosa, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 328 = *Milletia fruticosa*.
Galega, Walp. Rep. i. 677 = seq.
Galuga, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 211 = *Milletia racemosa*.
Garagana, Crantz, Inst. ii. 60, sphalm. = *R. Caragana*.
glabra, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *Dalbergia campechiana*.
glabrescens, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 57 = *hispida*.
glandulosa, Spreng. Syst. iii. 248 = *Poiretia psoraloides*.
glutinosa, Sims, Bot. Mag. t. 560 = *viscosa*.
glyciphylla, Poir. Encyc. vi. 227. — Ins. Martinic.
grandiflora, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 168 = *Caragana grandiflora*.
grandiflora, Linn. Sp. Pl. 722 = *Sesbania grandiflora*.
guineensis, Willd. Enum. Hort. Berol. 769. — Afr. trop.
Halimodendron, Link, Handb. ii. 201 = seq.
Halodendrum, Pall. Reise, ii. 741 = *Halimodendrum argenteum*.
Heynei, Wall. Cat. n. 5653 = *Calpurnia lasiogyne*.
hirsuta, Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. lv. (1880) t. 296 = *hispida*?
hispida, Linn. Mant. i. 101. — Am. bor.
hybrida, Audib. ex DC. Prod. ii. 262 = *dubia*.
inermis, Jacq. Select. Am. 210 = *R. Pseud-acacia*.
intermedia, Soulange, in Ann. Soc. Hortic. Par. ii. (1828) 42 = *viscosa*.
jaspidea, Verlot, in Rev. Hortic. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.
javanica, Burm. f. Fl. Ind. 163 = *Cassia glauca*.
javanica, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 291 = *Tephrosia candida*.
jubata, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 370. t. 6 = *Caragana jubata*.
latifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *Lonchocarpus violaceus*.
latifolia, Poir. Encyc. vi. 224 = *Poitea Campanilla*.
latisiliqua, Verlot, in Rev. Hortic. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.
leucantha, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 291 = *Tephrosia candida*.
linearis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.
lucida, Salisb. Prod. 337 = *Caragana Chamlagu*.
ludoviciana, Rafin. Fl. Ludov. 164 (Quid?). — Am. bor.
macrophylla, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 329 = *Milletia auriculata*.
macrophylla, Schrad. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 238 = *hispida*.
macrophylla, Spreng. Syst. iii. 246. — Bras.
maculata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 393. — Mexic.
martinicensis, Pers. Syn. ii. 312 = *Sabinea dubia*.
melanocarpa, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 305. — Mexic.
microphylla, Hort. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = *R. Pseud-acacia*.
microphylla, Pall. Astragal. 116 = *Caragana microphylla*.
mitis, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1044 = *Pongamia glabra*.
mitis, Lour. Fl. Cochinch. 455 = *Pongamia chinensis*.
mollis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 477 = *Caragana frutescens*.
mollis, Vahl, ex DC. Prod. ii. 260 = *Lonchocarpus sericeus*.
mollissima, Vahl, ex Poir. Encyc. vi. 227 = *Cupania Poiratii*.
mongolica, Sw. ex Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 116 = *Caragana arborescens*.
monophyllus, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.
montana, Bartr. Cat. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 488 = *hispida*.
multiflora, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 350 (*Milletia* sp.?). — Afr. trop.
nana, Ell. Sketch, ii. 243 = *hispida*.
neo-mexicana, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 314. — Mexic.
Nicou, Aubl. Pl. Gui. ii. 771 = *Lonchocarpus rufescens*.
Panacoco, Aubl. l. c. 768 = *Swartzia tomentosa*.
patula, Verlot, in Rev. Hortic. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.
pendula, Orteg. Hort. Matr. Dec. 26 = *R. Pseud-acacia*.
pinnata, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 693; ed. II. ii. 461 = *R. Pseud-acacia*?

ROBINIA :—

- polyanthos*, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1260 = *Corynella polyantha*.
procera, Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 304 = *R. Pseud-acacia*.
Pseud-acacia, Linn. Sp. Pl. 722. — Am. bor.
purpurea, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 242. — Am. bor.
pygmaea, Linn. Sp. Pl. 723 = *Caragana pygmaea*.
pyramidalis, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.
pyramidata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7. — Am. centr.
racemosa, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 329 = *Milletia racemosa*.
radicans, Sw. ex Steud. Nom. ed. I. 693 (Quid ?). — Hab. ?
rosea, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. t. 17 = *hispida*.
rosea, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4. — Am. bor.
rubiginosa, Banks, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 92 = *Lonchocarpus rubiginosus*.
rubiginosa, Nees, ex Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. 1. (1824) 31. — Bras.
rubiginosa, Poir. Encyc. vi. 227 = *Cupania Poiratii*.
scandens, Willd. Sp. Pl. iii. 1134 = *Lonchocarpus Nicou*.
Schiedeana, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 306. — Mexic.
sennoides, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 328 = *Mundulea suberosa*.
sepium, Jacq. Ennm. Pl. Carib. 28 = *Lonchocarpus sepium*.
sepium, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1258 = *Lonchocarpus violaceus*.
sericea, Poir. Encyc. vi. 226 = *Lonchocarpus sericeus*.
sericea, Sieber, ex Presl, Symb. Bot. i. 14 = *Tephrosia candida*.
sophoraefolia, Hort. Vindob. ex Steud. Nom. ed. I. 693 = *R. Pseud-acacia*.
speciosa, Sw. ex Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 116 = *Caragana arborescens*.
spectabilis, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 140 = *R. Pseud-acacia*.
spinifolia, Desv. Journ. Bot. (1814) 78 = *Pictetia Desvauxii*.
spinosa, Linn. Mant. ii. 269 = *Caragana spinosa*.
spinosissima, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xv. (1771) 558 = *Caragana spinosa*.
squamata, Hort. Berol. (1844) ex Walp Ann. i. 231 = *Brongniartia robinoides*.
squamata, Vahl, Symb. Bot. iii. 88 = *Ormocarpum sennoides*.
squamosa, Poir. Encyc. vi. 224 = *Ormocarpum sennoides*.
striata, Willd. Sp. Pl. iii. 1132 = *Geoffraea superba*.
stricta, Hoffmgg. Verz. Pfl. 194 = *R. Pseud-acacia*.
subdecandra, L'Hérit. Stirp. Nov. 157. t. 75 = *Calpurnia lasiogyne*.
suberosa, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 327 = *Mundulea suberosa*.
Thonningii, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 349 = *Milletia Thonningii*.
tomentosa, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 71 = *Caragana frutescens*.
tomentosa, Willd. Sp. Pl. iii. 1134 = *Swartzia tomentosa*.
tortuosa, Hoffmgg. Verz. Pfl. 193 = *R. Pseud-acacia*.
tracanthoides, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 371. t. 7 = *Caragana tragacanthoides*.
triflora, L'Hérit. Stirp. Nov. 162 = *Halimodendron argenteum*.
uliginosa, Willd. Sp. Pl. iii. 1133 = *Derris uliginosa*.
umbraculifera, Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = *R. Pseud-acacia*.
undulata, Hort. ex C Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.
Uterhartii, Poit. in Rev. Hort. Sér. II. ii. (1843-44) 447 = *R. Pseud-acacia*.
variegata, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 301. — Mexic.
vesicaria, Jacq. Coll. i. 105 = *Sesbania platycarpa*.
viciaefolia, Bert. ex DC. Prod. ii. 263 = *Poitea viciaefolia* ?
violacea, Beauv. Fl. Owar. ii. 28. t. 76 = *Lonchocarpus sericeus*.
violacea, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28 = *Lonchocarpus violaceus*.
viscosa, Vent. Jard. Cels, t. 4. — Am. bor.

- ROBINSONIA**, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 333. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 441.
corrugata, Phil. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 645 = *Gayana*.
evenia, Phil. l. c. 644. — Ins. J. Fernand.
Gayana, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 28. t. 1. — Ins. J. Fernand.
gracilis, Decne. l. c. 29. — Ins. J. Fernand.
longifolia, Phil. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 644. — Ins. J. Fernand.
macrocephala, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 28. t. 1. — Chili; Ins. J. Fernand.
micrantha, Phil. ex Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. iii. 40 = *gracilis*.
nervosa, Phil. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 645 = *Plantago fernandezia*.
thurifera, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 28. — Ins. J. Fernand.

- ROBINSONIA**, Scop. Introd. 218 (1777) = **Quiina** Aubl. (Guttif.).
guianensis, J. F. Gmel. Syst. 796 = *Q. guianensis*.
melianthifolia, Willd. Sp. Pl. ii. 999 = *Q. guianensis*.

- ROBIQUETIA**, Gaudich. in Frey. Voy. Bot. 426. t. 34 (1826) = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).
ascendens, Gaudich. l. c. = *S. ascendens*.

- ROBSONIA**, Reichb. Handb. 233 (1837) = **Ribes**, Linn. (Saxifr.).
speciosa, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 181 = *Ribes speciosum*.

- ROBYNSIA**, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 193 = **Pachyrhizus**, Rich. (Legumin.).
lobata, Mart. & Gal. l. c. 194 = *P. palmatilobus*.
macrophylla, Mart. & Gal. l. c. 193 = *P. angulatus*.

- ROCAMA**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cviii. 71 (1775) = **Trianthema** Linn. (Ficoid.).
arabica, J. F. Gmel. Syst. 455 = *T. pentandra*.
digyna, DC. Prod. iii. 352 = *T. pentandra*.
prostrata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cviii = *T. pentandra*.

- ROCCARDIA**, Neck. Elem. i. 74 (1790) = **Helip-terum**, DC. (Compos.).

- ROCCARDIA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 119 (1836) = **Stachelina**, DC. (Compos.).
purpurea, Rafin. l. c. = *S. dubia*.

- ROCHEA**, DC. Pl. Grass. t. 103 (1810 ?). *CRASSU-LACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 658.
DIETRICHIA, Tratt. Arch. Gew. n. 449 (1812).
KALOSANTHES, Haw. Rev. Succ. 6 (1821).
albiflora, DC. Prod. iii. 393 = *Crassula albiflora*.
bicolor, Steud. Nom. ed. II. ii. 462 = *odoratissima*.
biconvexa, DC. Prod. iii. 394. — Afr. austr.
Burmanniiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 462 = *Crassula Burmanniana*.
coccinea, DC. Pl. Grass. t. 1. — Afr. austr.
cymosa, DC. Prod. iii. 394 = *Crassula cymosa*.
dejecta, Steud. Nom. ed. II. ii. 462 = *Crassula dejecta*.
dichotoma, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 309 = *Crassula abyssinica*.
falcata, DC. Pl. Grass. t. 103 = *Crassula falcata*.
fascicularis, DC. Prod. iii. 394. — Afr. austr.
flava, DC. l. c. = *Crassula flava*.
jaminea, DC. l. c. — Afr. austr.
media, DC. l. c. = *versicolor*.
microphylla, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 369 = *jaminea*.
odoratissima, DC. Prod. iii. 394. — Afr. austr.
perfoliata, DC. l. c. 393 = *Crassula perfoliata*.
tiniflora, Lem. Illustr. Hort. viii. (1861) sub t. 269. — Afr. austr.
undosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 462. — Afr. austr.
undulata, Steud. l. c. = *Crassula undulata*.
vaginata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 309 = *Crassula abyssinica*.
versicolor, Eckl. & Zeyh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 369 = *odoratissima*.
versicolor, Link, Enum. Hort. Berol. i. 299; DC. Prod. iii. 394. — Afr. austr.

- ROCHEA**, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 322 = **Geissorhiza**, Ker-Gawl. (Irid.).
venusta, Salisb. l. c. = *G. Rochensis*.

- ROCHEA**, Scop. Introd. 296 (1777) = **Aeschynomene**, Linn. (Legumin.).

- ROCHEFORTIA**, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 53 (1788); Fl. Ind. Occ. i. 551. t. 11 (1797). *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 841.
DIPLOSTYLIS, Karst. & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 433.
acanthophora, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 482. — Ind. occ. *brasilensis*, Willd. ex Schult. Syst. vi. 210. — Bras.
cuneata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 54. — Jamaica.
Jacquinii, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 253 = *Ehretia spinosa*.
ovata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 54. — Jamaica.

- ROCHELIA**, Reichb. in Flora, vii. (1824) 243. *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 852.
MACCOYA, F. Muell. Fragm. i. 127 (1859).
RACLATHRIS, Rafin. Sylva Tellur. 167 (1838).
cancellata, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iii. 136. — Cilicia.
cardiosepalis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 420. — Turkest.
glomerata, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 226 = *Krynitzkia glomerata*.
incana, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiv. (1841) 710. — Turkest.
leiocarpa, Ledeb. Fl. Alt. i. 172. — Turkest.
leiosperma, Steud. Nom. ed. II. ii. 56, in syn., sphalm. = *præc.*
Maccoya, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 408. — Austral.
macrocalyx, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 419. — Persia; Afghan.
mollis, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 245. — Persia.
peduncularis, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 35. — Persia.
persica, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 244. — Persia.
rectipes, Stocks, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 176 = *macrocalyx*.
saccharata, Reichb. in Flora, vii. (1824) 243 = *stellulata*.
stellulata, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 178 = *stylaris*.
stellulata, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 13. t. 123. — Enrop.
stylaris, Boiss. Fl. Orient. iv. 245. — Afghan.

- ROCHELIA**, Roem. & Schult. Syst. iv. 11 (1819) = **Echinosperrum**, Sw. (Borag.).
asperata, Boj. ex DC. Prod. x. 152, in nota = *Cynoglossum Rochelia*.
barbata, Roem. & Schult. Syst. iv. 110 = *E. barbatum*.
Borboniae, Roem. & Schult. l. c. 108, 781 = *Cynoglossum Rochelia*.
condylophora, Roem. & Schult. l. c. 782 = *E. condylophorum*.
cynoglossoides, Roem. & Schult. l. c. 111, 783 = *E. cynoglossoides*.
deflexa, Roem. & Schult. l. c. 109 = *deflexum*.
echinophora, Roem. & Schult. l. c. 110 = *E. minimum*.
gracilis, Roem. & Schult. l. c. 111 = *Pectocarya linearis*.
javanica, Roem. & Schult. l. c. 108, 780 = *E. javanicum*.
Lappula, Roem. & Schult. l. c. 109 = *E. Lappula*.
marginata, Roem. & Schult. l. c. 110 = *E. marginatum*.
patens, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 44 = *E. patens*.
patula, Roem. & Schult. Syst. iv. 781 = *E. patulum*.
Redowskii, Roem. & Schult. l. c. 110, 782 = *E. Redowskii*.
spinocarpus, Roem. & Schult. l. c. 111, 783 = *E. Vahlia-num*.
squarrosa, Roem. & Schult. l. c. 109 = *E. patulum*.
strigosa, Roem. & Schult. l. c. 782 = *Cynoglossum borbonicum*.
virginica, Roem. & Schult. l. c. 108 = *E. virginicum*.
zeylanica, Roem. & Schult. l. c. 108, 780 = *Cynoglossum denticulatum*.

- ROCHETIA**, Delile, in Rochet, Sec. Voy. Cho. 344 (1846) = **Trichilia**, P. Br. (Meliac.).
choënsis, Delile, l. c. = *T. emetica*.

- ROCHONIA**, DC. Prod. v. 345 (1836). *COM-POSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 259.
BREPHOCTON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 49 (1836).
cinerarioides DC. Prod. v. 345. — Madag.
cnneata, DC. l. c. — Madag.

RODETIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 323 (1849) = *Bosea*, Linn. (Amarant.).
Amherstiana, Moq. l. c. = *B. Amherstiana*.

RODGERSIA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 389. *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 635.
japonica, Regel, Gartenfl. (1871) t. 708 = seq.
podophylla, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 389.—Japon.

RODIGIA, Spreng. Neue Entdeck. i. 275 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 511.
PACHYLEPIS, Less. Syn. Comp. 139 (1832).
SCLEROLEPIS, Monn. Ess. Hierac. 81 (1829).
alliana, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 328 = *Hypochoeris Achyrophorus*.
commutata, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 275.—Graccia.
interrupta, Sch. Bip. Cich. Suppl. ii. 152 = commutata.
laevigata, Spreng. Neue Entdeck. i. 276 = *Hypochoeris Achyrophorus*.

RODRIGUEZIA, Ruiz & Pav. Prod. 115. t. 25 (1794). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 559.
BURLINGTONIA, Lindl. Bot. Reg. t. 1927 (1837).
PHYSANTHERA, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 330, 463 (1841).
bahiensis, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 90.—Bras.
Barkeri, Hook. Bot. Mag. t. 2746 (Gomesae sp.).—Bras.
Batemani, Lindl. in Poepp. & Endl. Nov. Ge. Sp. i. 41. t. 70.—Peruv.
bifolia, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 239.—Bras.
brachystachys, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.* 87.—Bras.
caloplectron, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) i. 368.—N. Granat.
candida, *Bateman. in Bot. Reg.* (1837) sub t. 1927.—Guian.
carnea, Lindl. l. c. (1843) *Misc.* 72.—N. Granat.
cochlearis, Lindl. l. c. (1842) *Misc.* 22 = *Leochilus cochlearis*.
crispa, Lindl. l. c. (1839) *Misc.* 86 = *Gomesa crispa*.
decora, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 771.—Bras.
eleutherosepala, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 240.—Bras.
ensifolia, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 695, sphalm. = seq.
ensiformis, *Ruiz & Pav. Syst. Veg.* 218.—Peruv.
fragrans, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 771.—Bras.
granadensis, *Reichb. f. l. c.*—N. Granat.
lanceolata, Lodd. Bot. Cab. t. 676 = secunda.
lanceolata, *Ruiz & Pav. Syst. Veg.* 219.—Peruv.
laxiflora, Lindl. Bot. Reg. (1837) *Misc.* 86 = *Gomesa chrysostoma*.
Leeana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) ii. 38.—Hab.?
Lehmanni, *Reichb. f. l. c.* (1883) i. 403.—N. Granat.
leochilina, *Reichb. f. l. c.* (1871) 970.—Costa Rica.
leucantha, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 146.—Bras.
luteola, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1883) i. 688.—Hab.?
macrostachya, Hort. Petrop. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 21 = *Gomesa Fischeri*.
maculata, Lindl. Bot. Reg. (1840) *Misc.* 89 = *Leochilus oncidoides*.
maculata, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 771.—Bras.
mascarenensis, *Spreng. Syst.* iii. 719.—Ins. Mascar.
mascarenensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 463, sphalm. = praec.
microphyta, *Rodrig. Rev. de Engenh.* III. 144; ex *ej. Orch. Nov.* ii. 241.—Bras.
obtusifolia, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 771.—Bras.
pardina, *Reichb. f. l. c.* xx. (1862) 428.—Bras.
planifolia, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 67 = *Gomesa planifolia*.
pubescens, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 771.—Bras.
recurva, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 67 = *Gomesa recurva*.
refracta, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 90, in syn.—Bras.
rigida, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 771.—Bras.

RODRIGUEZIA:—

secunda, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 367. t. 92.—Am. trop.
Stangeana, *Reichb. f. in Hamb. Gartenz.* xiii. (1857) 314.—Hab.?
stenochila, Lindl. Orchid. Linden. 23 = *Scelochilus stenochila*.
sticta, Steud. Nom. ed. II. ii. 463.—Jamaic.
suaveolens, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 195 = *Gomesa foliosa*.
venusta, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 771.—Bras.

RODSCHIEDIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) = *Croton*? Linn. (Euphorb.).
serrata, Dennst. l. c.—Ind. or.

RODSCHIEDIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 413 (1800) = *Capsella*, Medic. (Crucif.).
Bursa-pastoris, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. 435 = *C. Bursa-pastoris*.

RODSCHIEDIA, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 585 = *Securidaca*, Linn. (Polygal.).
surinamensis, Miq. l. c.—Guian.

ROËA, Hueg. ex Benth. in Enum. Pl. Hueg. 34 (1837) = *Sphaerolobium*, Sm. (Legumin.).
linophylla, Hueg. l. c. = *S. linophyllum*.
nudiflora, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 59 = *S. nudiflorum*.

ROEBELIA, Engel, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 680. t. 3. f. 5. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 883.
solitaria, Engel, l. c.—N. Granat.

ROEGNERIA, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 413 = *Agropyron*, J. Gaertn. (Gramin.).
caucasica, C. Koch, l. c. = *A. Raegnerii*.

ROEHLINGIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) = *Tetracera*, Linn. (Dillen.).
suaveolens, Dennst. l. c. = *T. laevis*.

ROELA, Scop. Introd. 149 (1777), sphalm. = *Roëlla*, Linn. (Campan.).

ROELANA, Comm. ex DC. Prod. i. 575 (1824) = *Erythroxyllum*, P. Br. (Lineae).
laurifolia, Comm. ex DC. l. c. = *E. laurifolium*.

ROËLLA, Linn. Coroll. Gen. 4 (1737). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 558.
angustifolia, Roxb. in Beats. Tracts St. Helena, 320 = *Wahlenbergia clivosa*.
bracteata, A. DC. Monog. Camp. 179 = spicata.
bryoides, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 386.—Afr. austr.
caespitosa, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 447 = *muscosa*.
campestris, A. DC. l. c. = spicata.
cernua, Brouss. Elench. Hort. Monsp. (1805) 49 = *Wahlenbergia lobelioides*.
ciliata, Drège, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 446 = *Merciera brevifolia*.
ciliata, Linn. Sp. Pl. 170.—Afr. austr.
cinerea, A. DC. Monog. Camp. 175 = *Lightfootia grisea*.
compacta, Thunb. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 448, 496 = *Merciera tenuifolia*.
decumbens, Loud. Hort. Brit. 77 = *Wahlenbergia capensis*.
decurrens, Andr. Bot. Rep. t. 238 = *Wahlenbergia capensis*.
decurrens, *L'Hérit. Sert. Angl.* 4.—Afr. austr.
Dregeana, A. DC. in DC. Prod. vii. 446 = *ciliata*.
Dunantii, A. DC. Monog. Camp. 175 = *reticulata*.
Eckloniana, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 385.—Afr. austr.
elegans, *Paxt. Mag. Bot.* vi. (1839) 27.—Afr. austr.
erecta, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 444 = *Prismatocarpus altiflorus*.
ericoides, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 385 = spicata.
ericoides, Spreng. Syst. i. 723 = *Prismatocarpus paniculatus*.
filiformis, Lam. Illustr. ii. 66 = *squarrosa*.
filiformis, Poir. Encyc. vi. 232 = *Lightfootia fasciculata*.

ROËLLA:—

fruticosa, L'Hérit. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 444 = *Prismatocarpus fruticosus*.
glabra, Poir. Encyc. vi. 232 = *Lightfootia fasciculata*.
glabrella, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 446 = *Lightfootia grisea*.
glauca, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 387 = spicata.
glomerata, A. DC. in DC. Prod. vii. 447.—Afr. austr.
gracilis, Eckl. & Zeyh. Enum. 385 = *ciliata*.
incurva, Banks, ex A. DC. Monog. Camp. 172 = *ciliata*.
interrupta, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 443 = *Prismatocarpus interruptus*.
lateriflora, Banks, ex A. DC. l. c. 496 = *Merciera brevifolia*.
latiloba, A. DC. l. c. 447.—Afr. austr.
leptosepala, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 593.—Afr. austr.
linifolia, Roxb. in Beats. Tracts St. Helena, 321 = *Wahlenbergia linifolia*.
minor, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 385 = *ciliata*.
muscosa, Linn. f. Suppl. 143.—Afr. austr.
nitida, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 445 = *Prismatocarpus nitidus*.
paniculata, Roxb. in Beats. Tracts St. Helena, 320 = *Wahlenbergia Roxburghii*.
pedunculata, Berg. Desc. Pl. Cap. 42 = *Prismatocarpus paniculatus*.
pinifolia, Thunb. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 448, 496 = *Merciera tenuifolia*.
prostrata, Eckl. & Zeyh. Enum. 387 = spicata.
prostrata, E. Mey. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 447 = *reticulata*.
recurva, Banks, ex A. DC. l. c. 418 = *Lightfootia paniculata*.
recurvata, A. DC. l. c. 447.—Afr. austr.
reflexa, Banks, ex A. DC. l. c. 418 = *Lightfootia fasciculata*.
reticulata, Lam. Encyc. vi. 232; Loisel. Herb. Amat. t. 332 = *ciliata*.
reticulata, Linn. Sp. Pl. 170.—Afr. austr.
rigidula, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 447 = *squarrosa*.
secunda, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 386 = spicata.
spicata, Linn. f. Suppl. 143.—Afr. austr.
squarrosa, Berg. Desc. Pl. Cap. 42.—Afr. austr.
tenuifolia, Thunb. Fl. Cap. ii. 28 = *Merciera tenuifolia*.
ternifolia, Willd. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 592 = *reticulata*.
Thunbergii, A. DC. Monog. Camp. 174 = *Lightfootia tenella*.

ROËLLOIDES, Banks, ex A. DC. Monog. Camp. 164 (1830) = *Prismatocarpus*, L'Hérit. (Campan.).

ROELPINIA, Scop. Introd. 231 (1777), err. typ. = *KOELPINIA*, Scop. = *Acronychia*, Forst. (Rutac.).

ROEMERA, Tratt. Gen. Pl. Disp. 88 (1802) = *Steriphoma*, Spreng. (1827) (Cappar.).
paradoxa, Tratt. l. c. = *S. desmoides*.

ROEMERIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818) = *Scaevola*, Linn. (Gooden.).
Lobelia, Dennst. l. c. = *S. Koenigii*.

ROEMERIA, Medic. in Usteri, Ann. Bot. iii. (1792) 15; DC. Syst. ii. 92 (1821). *PAPAVERACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 53.
argemonoides, *Pomel. Nouv. Mat. Fl. Atl.* 247.—Afr. bor.
bicolor, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) i. 249.—Turkestan.
bivalvis, DC. Syst. ii. 93.—Mesopot.
hybrida, DC. l. c. 92 = violacea.
hybrida, Unio It. ex Presl, Bot. Bemerk. 8 = *Schimperi*.
orientalis, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 374.—Persia; Mesopot.; Afghan.
pinnatifida, *Bélanger, Voy. Ind.*, absque num.—Ind. or.
refracta, DC. Syst. ii. 93.—Tauria.
rhoeadiiflora, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 7.—Persia.
Schimperi, Presl, Bot. Bemerk. 8.—Syria.
vermiculata, Lehm. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 585.—Persia.
violacea, Medic. in Usteri, Ann. Bot. iii. (1792) 15.—Europ.; Afr. bor.

- ROEMERIA, Moench, Meth. 341 (1794) = **Amaranthus**, Linn.
polygonoides, Moench, l. c. = *A. polygonoides*.
- ROEMERIA, Thunb. Nov. Gen. ix. 130 (1798), genus spurium.
argentea, Thunb. l. c. 131 = *Anaphrenium argenteum*.
inermis, Thunb. l. c. = *Sideroxylon inermis*.
melanophleas, Thunb. l. c. = *Myrsine melanophleas*.
- ROEMERIA, Tratt. ex DC. Syst. ii. 92 (1821) = **Steripharma**, Spreng. (1827) (Cappar.).
- ROEMERIA, Zea, ex Roem. & Schult. Syst. i. 61, 287 (1817) = **Diarrhena**, Rafin. (Gramin.).
Zea, Roem. & Schult. l. c. 287 = *D. americana*.
- ROEPERA, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 454. t. 15. f. 3 = **Zygophyllum**, Linn.
aurantiaca, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 70 = *Z. fruticosum*.
Billardieri, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 434. t. 5. f. 3 = *Z. Billardieri*.
buxifolia, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 117 = *Neoroepa buxifolia*.
fabagifolia, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 525. t. 15 = *Z. fruticulosum*.
fruticulosa, A. Juss. l. c. 454. t. 5. f. 3 = *Z. fruticulosum*.
latifolia, Hook. f. Fl. Tasman. i. 60 = *Z. apiculatum*.
- ROEPERIA, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 15 = **Gynandropsis**, DC. (Cappar.).
cleomoides, F. Muell. l. c. = *G. Muellieri*.
- ROEPERIA, Spreng. Syst. iii. 13, 147 (1826) = **Ricinocarpus**, Desf. (Euphorb.).
pinifolia, Spreng. l. c. 147 = *Ricinocarpus pinifolius*.
- ROEPERCHARIS, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 104 (1881) = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
Bennettiana, Reichb. f. l. c. = *H. Bennettiana* (in Addend.).
platyanthera, Reichb. f. l. c. = *H. platyanthera*.
- ROESLINIA, Moench, Meth. Suppl. 211 (1802) = **Chironia**, Linn. (Gentian.).
angustifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 203 = *C. frutescens*.
baccifera, G. Don, l. c. = *C. baccifera*.
decussata, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 472 = *C. frutescens*.
frutescens, G. Don, Gen. Syst. iv. 203 = *C. frutescens*.
tetragona, Moench, Meth. Suppl. 212 = *C. baccifera*.
- ROETTLERA, Vahl, Enum. i. 88 (1805) = **ROTTLERA**, Vahl = **Didymocarpus**, Wall. (Gesner.).
- ROEZLIA, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 98 = **Monothactum**, Naud. (Melast.).
granadensis, Regel, l. c.; et Gartenfl. (1871) 353. = *M. quadrangulare*.
- ROGERIA, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. i. (1824) 457. **PEDALINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1057.
adenophylla, J. Gay, l. c. = *Afr. trop.*
brasilensis, J. Gay, l. c. = *Bras.*
longiflora, J. Gay, l. c. = *Afr. austr.*
microcarpa, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 190. = *Afr. trop.*
- ROGIERA, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) t. 442 = **Rondeletia**, Linn. (Rubiace.).
amoena, Planch. l. c. = *Rond. amoena*.
cordata, Planch. l. c. sub t. 442 = *Rond. cordata*.
elegans, Planch. l. c. sub t. 442 = *Rond. Roezlii*.
elegantissima, Regel, Gartenfl. (1865) t. 490 = *Rond. gratissima*.
gratissima, Linden, ex Planch. in Fl. des Serres, xv. (1862-65) 133 = *Rond. gratissima*.
latifolia, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. ii. (1853) 121. t. 7 = *Rond. amoena*.
menechma, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) sub t. 442 = *Rond. amoena*.
Roezlii, Planch. l. c. = *Rond. Roezlii*.
rugosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 17, in syn. = *Rond. amoena*.
urophylla, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1857) 756. — *Mexic.*
versicolor, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 69; Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) t. 112 = *Rond. amoena*.

- ROHDEA**, Roth, Nov. Pl. Sp. 196 (1821). **LILIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 772.
RHODEA, Endl. Gen. 155 (1837), sphalm.
TRIRAGYNE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 9 (1866).
japonica, Roth, Nov. Pl. Sp. 197. — *Japon.*
nutans, Schult. f. Syst. vii. 1653 = *Tupistra nutans*.
Tupistra, Schult. f. l. c. 173 = *Tupistra squalida*.
- ROHRIA**, Schreb. Gen. 30 (1789) = **Tapura**, Anbl. (Chaillat.).
petioliflora, Willd. Sp. Pl. i. 186 = *T. guianensis*.
Schreberi, J. F. Gmel. Syst. 93 = *T. guianensis*?
Tapura, J. F. Gmel. l. c. = *T. guianensis*.
- ROHRIA**, Vahl, in Danske Nat. Selsk. Skriv. i. ii. (1791) 15 = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).
armata, Vahl, l. c. ii. ii. (1793) 39 = *B. carthamoides*.
bisulca, Thunb. Nov. Gen. 124 = *Cullumia bisulca*.
carlinoides, Vahl, in Danske Nat. Selsk. Skriv. i. ii. (1791) 17 = *B. carlinoides*.
carthamoides, Thunb. l. c. iii. (1793) 103. t. 8 = *B. carthamoides*.
ciliaris, Thunb. l. c. 99 = *Cullumia ciliaris*.
cruciata, Thunb. l. c. 104 = *B. cruciata*.
cuneata, Thunb. l. c. 105 = *B. cuneata*.
cynaroides, Vahl, l. c. ii. (1791) 16 = *B. cynaroides*.
decurrens, Thunb. l. c. iii. (1793) 104 = *Stephanocoma berkheyoides*.
grandiflora, Thunb. l. c. 107 = *B. grandiflora*.
hispida, Thunb. l. c. 101 = *Cullumia hispida*.
ilicifolia, Vahl, l. c. ii. ii. (1793) 40. t. 7 = *B. grandiflora*.
incana, Thunb. l. c. iii. (1793) 106 = *B. fruticosa*.
lanceolata, Thunb. l. c. 98 = *B. lanceolata*.
monanthos, Thunb. l. c. 102 = *B. uniflora*.
obovata, Thunb. l. c. 106 = *B. obovata*.
palmata, Thunb. l. c. 108 = *B. palmata*.
patula, Thunb. Nov. Gen. 124 = *Cullumia patula*.
pectinata, Thunb. l. c. = *Cullumia pectinata*.
pungens, Thunb. l. c. 125 = *B. pungens*.
revoluta, Vahl, in Danske Nat. Selsk. Skriv. ii. ii. (1793) 40 = *B. lanceolata*.
setosa, Thunb. l. c. iii. (1793) 101 = *Cullumia setosa*.
decurrens.
spinosissima, Thunb. l. c. 108 = *B. spinosissima*.
squarrosa, Thunb. l. c. 100 = *Cullumia squarrosa*.
sulcata, Thunb. Nov. Gen. 123 = *Cullumia sulcata*.
- ROIA**, Scop. Introd. 226 (1777) = **Swietenia**, Jacq. (Meliac.).
- ROJOC**, Adans. Fam. ii. 146 (1763) = **Morinda**, Linn. (Rubiace.).
- ROKEJEKA**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 90 (1775) = **Gypsophila**, Linn. (Caryoph.).
capillaris, Forsk. l. c. p. lxvi = *G. Rokejeka*.
deserti, J. F. Gmel. Syst. 703 = *G. Rokejeka*.
- ROLANDRA**, Rottb. in Soc. Med. Havn. Collect. ii. (1775) 256. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 237.
argentea, Rottb. l. c. 258. — *Am. austr.*
diacantha, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 170 = *argentea*.
fruticosa, Rottb. in Soc. Med. Havn. Collect. ii. (1775) 268 = *argentea*.
monacantha, Cass. l. c. = *argentea*.
reptans, Willd. ex DC. Prod. v. 91 = *Trichospira menthoides*.
terminalis, Spreng. Syst. iii. 673 = *Ichthyothere Cunabi*.
- ROLDANA**, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 10 (1825) = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
lobata, La Llave, l. c. = *S. Roldana*.
- ROLFINKIA**, Zenk. Pl. Ind. 13. t. 14 (1837) = **Centratherum**, Cass. (Compos.).
centaurioides, Zenk. l. c. 14, t. 14 = *C. reticulatum*.
- ROLLANDIA**, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 458. t. 74 (1826). **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 546.
ambigua, G. Don, Gen. Syst. iii. 698. — *Ins. Sandvic.*
calycina, G. Don, l. c. 699. — *Ins. Sandvic.*
crispa, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 459 = *lanceolata*.
Delessertiana, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 75 = *lanceolata*.

ROLLANDIA :—

- Humboldtiana*, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 76. — *Ins. Sandvic.*
Kaala, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 45 = *Humboldtiana*.
lanceolata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 458. — *Ins. Sandvic.*
longiflora, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 44. — *Ins. Sandvic.*
montana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 13. t. 74 = *lanceolata*.
pedunculosa, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 46. — *Ins. Sandvic.*
pinnatifida, G. Don, Gen. Syst. iii. 698 = *Delissea pinnatifida*.
scabra, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 46 = *lanceolata*.

- ROLLINIA**, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 28. t. 5 (1825). **ANONACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 27.
biflora, G. Don, Gen. Syst. i. 91. — *Peruv.*
cuspidata, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 20. — *Bras.*
dolabripetala, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 29 = *longifolia*.
edulis, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 30. — *N. Granat.*
emarginata, Schlecht. in Linnaea, ix. (1835) 318. — *Bras.*
exalbida, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 19. — *Bras.*
exsucca, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève, v. (1832) 199. — *Guian.*
fagifolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 29. — *Bras.*
fagifolia, Schlecht. in Linnaea, ix. (1835) 316. — *Bras.*
glaucescens, Miq. Stirp. Surin. Sel. 108 = *resinosa*.
glaucescens, Sond. in Linnaea, xxii. (1849) 557. — *Bras.*
laurifolia, Schlecht. l. c. ix. (1835) 319. — *Bras.*
longifolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 29. — *Bras.*
membranacea, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 30. — *N. Granat.*
micrantha, G. Don, Gen. Syst. i. 91. — *Peruv.*
mucosa, Baill. Adansonia, viii. (1868) 268 = *Sieberi*.
multiflora, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 97. — *Guian.*
orthopetala, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève, v. (1832) 200. — *Guian.*
parviflora, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. t. 30. — *Bras.*
Poeppigii, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 47. — *Bras.*
pterocarpa, G. Don, Gen. Syst. i. 91. — *Peruv.*
puberula, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève, v. (1832) 200. — *Guian.*
pulchrinervia, A. DC. l. c. 201. — *Guian.*
resinosa, Spruce, ex Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 9. — *Guian.*
rufinervis, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 30. — *N. Granat.*
rugulosa, Schlecht. in Linnaea, ix. (1835) 317. — *Bras.*
salicifolia, Schlecht. l. c. — *Bras.*
Sieberi, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève, v. (1832) 199. — *Mexic.*
silvatica, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 18. — *Bras.*
Sonderiana, Walp. Ann. iii. 813 = *glaucescens*.
sylvatica, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1873) 159. — *Bras.*
tenuifolia, DC. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 464. — *Guian.*
tinifolia, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Gui. 1163, nomen. — *Guian.*

- ROLOFA**, Adans. Fam. ii. 256 (1763) = **Mollugo**, Linn. (Ficoid.).

- ROMANA**, Vell. Fl. Flum. 54 (1825), partim = **Buddleia**, Linn. (Logan.).
campestris, Vell. Fl. Flum. 55; i. t. 146 = *B. elegans*.
crenata, Vell. l. c. t. 147. — *Bras.*
integerrima, l. c. t. 148. — *Bras.*

- ROMANZOFFIA**, Cham. in Nees, Hor. Phys. Berol. 71. t. 14 (1820). **HYDROPHYLLACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 830.
altera, Cham. in Linnaea, ii. (1827) 732, 609 = *sitchensis*.
sitchensis, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1833) 156. — *Ins. Sitcha.*
unalaschensis, Cham. in Nees, Hor. Phys. Berol. 72. t. 14. — *Ins. Aleut.*

- ROMANZOWIA**, Spreng. Syst. i. 584 (1825) = *praece.*

- ROMANZOWIA**, DC. Prod. i. 319 (1824) = *praece.*

ROMBUT, Rumph. ex Adans. Fam. ii. 284 (1763) = *Cassytha*, Linn. (Laurin.).

ROMNEYA, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 74. t. 3. *PAPAVERACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 51.
Coulteri, *Harv. l. c.* 75.—Calif.

ROMOVIA, Mnell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1134, in syn. (1866), sphalm. = RONNOWIA, Buc'hoz = *Omphalea*, Linn. (Euphorb.).

ROMUALDEA, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 370 = *Hippocratea*, Linn. (Celastr.).

apiculata, Triana & Planch. l. c., in nota = *H. megacarpa*.

integrifolia, Triana & Planch. l. c. = *H. integrifolia*.

lancifolia, Triana & Planch. l. c. = *H. lancifolia* (in Addend.).

macrophylla, Triana & Planch. l. c. = *H. macrophylla*.

malpighifolia, Triana & Planch. l. c. 372 = *H. integrifolia*.

Wrightiana, Triana & Planch. l. c. = *H. malpighiae-folia*?

ROMULEA, Maratti, Diss. Romul. et Saturn. Romae, 13. t. 1 (1772). *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 694.

ILMU, Adans. Fam. ii. 497 (1763), nomen prius.

SPATALANTHUS, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 300 (1829).

TRICHOMEMA, S. F. Gray, Nat. Afr. Brit. Pl. ii. 195 (1821).

TRICHONEMA, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. t. 575 (1802).

arenaria, Eckl. Top. Verz. 18.—Afr. austr.

aurea, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399 = *sublutea*.

barbata, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. austr.

bulbocodioides, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.

Bulbocodium, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 689 = *Clusiana*.

Bulbocodium, Parl. Fl. Ital. iii. 246 = *Linaresii*.

Bulbocodium, Sebast. & Mauri, Fl. Roman. 17.—Reg. Mediterr.

caelestina, Vis. Cat. Hort. Patav. (1842) 145.—Hab. ?

camerooniensis, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. trop.

candida, Tenore, Cat. Ort. Nap. (1845) 95.—Afr. austr.

caulescens, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399 = *bulbocodioides*.

chloroleuca, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89.—Afr. austr.

chloroleuca, Eckl. Top. Verz. 20 = *bulbocodioides*.

Clusiana, Nym. Syll. Suppl. 62; Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 87.—Hispan.; Lusit.

Columnae, Sebast. & Mauri, Fl. Roman. 18.—Reg. Mediterr.

corsica, Ford. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 107.—Ins. Corsic.

crocea, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xiii. 18 = *R. Bulbocodium*.

crocifolia, Vis. Fl. Dalm. Suppl. 30. t. 2. f. 2.—Dalmat.

cruciata, Eckl. Top. Verz. 19; Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89.—Afr. austr.

cuprea, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. austr.

dichotoma, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89 = *rosea*.

elegans, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 400.—Afr. austr.

elongata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 87.—Ins. Sardo.

filifolia, Eckl. Top. Verz. 20.—Afr. austr.

flaveola, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 106 = *R. Bulbocodium*.

flexuosa, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 400.—Afr. austr.

fragrans, Eckl. Top. Verz. 19 = *Ixia fragrans*.

grandiflora, Tin. in Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1857) 44 = *R. Bulbocodium*.

grandiscapa, F. Gay, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 87.—Ins. Canar.

Hartungii, Parl. ex G. Hartung, Geogn. Verh. Ins. Lanzarote, Fuertav. 143 = *grandiscapa*.

hirsuta, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.

VOL. II.

ROMULEA:—

latifolia, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 237.—Afr. austr.

ligustica, Parl. Fl. Ital. iii. 249.—Italia.

Linaresii, De Not. & Caldesi, ex Parl. Fl. Ital. iii. 249 = *ligustica*.

Linaresii, Parl. Fl. Panorm. i. 38.—Europ.; As. Min.

Linaresii, Rolli, ex Parl. Fl. Ital. iii. 251 = *ramiflora*.

longifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89.—Afr. austr.

Macowani, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. austr.

minima, Tenore, in Mem. Acc. Sc. Borb. Nap. iii. ii. (1832) 117.—Italia.

minuta, Eckl. Top. Verz. 19 = *Pauridia hypoxioides*.

minutiflora, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399.—Afr. austr.

modesta, Jord. Ic. Fl. Enrop. t. 110 = *R. Columnae*.

multiflora, Req. ex Parl. Fl. Ital. iii. 243 = *R. Bulbocodium*.

neglecta, Ford. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 107.—Italia.

nivalis, Boiss. Fl. Orient. v. 116 = *R. Bulbocodium*.

nivalis, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 400.—Afr. austr.

numidica, Ford. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. i. 49.—Algeria.

obscura, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399.—Afr. austr.

Parlatorii, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1857) 45;—Cf. Linnaea, xxix. (1857–58) 749 = *ramiflora*.

parviflora, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.

pubica, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89 = *rosea*.

pulchella, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 106 = *R. Bulbocodium*.

purpurascens, Parl. Fl. Panorm. i. 40 = *ramiflora*.

purpurascens, Tenore, in Mem. Acc. Sc. Borb. Nap. iii. ii. (1832) 117.—Reg. Mediterr.

pylia, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 398.—Afr. austr.

pylia, Nym. Consp. 704 = *R. Bulbocodium*.

ramiflora, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1826) 3; et in Mem. Acc. Sc. Borb. Nap. iii. ii. (1832) 117. t. 7.—Reg. Mediterr.

ramosa, Eckl. Top. Verz. 19 = *arenaria*?

recurva, Eckl. l. c. 20 = *bulbocodioides*.

reflexa, Eckl. l. c. 18.—Afr. austr.

Requienii, Parl. Fl. Ital. iii. 248.—Ins. Corsic.

Revelieri, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. i. 49 = *bulbocodioides*.

Rollii, Parl. Fl. Ital. iii. 251 = *ramiflora*.

rosea, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.

similis, Eckl. l. c.—Afr. austr.

speciosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89 = *rosea*.

spiralis, Baker, l. c. 90.—Afr. austr.

subalbida, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 108 = *R. Columnae*.

sublutea, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 88.—Afr. austr.

subpalustris, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 398.—Afr. austr.

subpalustris, Nym. Consp. 704 = *purpurascens*.

syrtica, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. i. 48 = *R. Bulbocodium*.

tabularis, Eckl. & Zeyh. 18, nomen = *speciosa*.

tortuosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 88.—Afr. austr.

tridentifera, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 398.—Afr. austr.

tnbata, Klatt, l. c. 401.—Afr. austr.

uliginosa, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 690 = *R. Bulbocodium*.

umbellata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 402 = *R. Bulbocodium*.

uncinata, Klatt, l. c. 401 = *hirsuta*.

vulgaris, Eckl. Top. Verz. 18 = *rosea*.

Zeyheri, Eckl. l. c. 19.—Afr. austr.

RONABEA:—

didymocarpus, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 170.—Guian.

emetica, A. Rich. l. c. = *Psychotria emetica*.

erecta, Aubl. Pl. Gui. i. 156 = *P. axillaris*.

latifolia, Aubl. l. c. 154. t. 59 = *P. axillaris*.

morindoides, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 170.—Guian.

myodendron, A. Rich. l. c. = *P. leiocarpa*.

viscoides, A. Rich. l. c. = *P. parasitica*.

RONABIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = *praec.*

myodendra, St. Lag. l. c. = *P. leiocarpa*.

RONCELIA, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 289 (1870), sphalm. = ROUCELA, Dum. = *Campanula*, Tourn.

RONDACHINE, Bosc, Encyc. Agric. vi. (1816) 180 = *Brasenia*, Schreb. (Nymph.).

RONDELETIA, Linn. Gen. ed. I. 59 (1737).

RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 48.

ARACHNIMORPHA, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 28 (1825).

ARACHNOTHRYX, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) sub t. 442.

LIGHTFOOTIA, Schreb. Gen. 122 (1789).

PETESIA, P. Br. Hist. Jamaica. 143. tt. 2, 3 (1756).

ROGIERA, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) t. 442.

STEVENIA, Poit. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 235. t. 60.

WILLDENOVIA, J. F. Gmel. Syst. 362 (1791).

affinis, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 28.—Mexic.

africana, T. Winterb. Account Sierra Leone, ii. 46 = *Crossopteryx Kotschyana*.

alaternoides, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 13.—Cuba.

americana, Linn. Sp. Pl. 172.—Ind. occ.; Am. austr.

amoena, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 26.—Mexic.

arborescens, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 327.—Ind. occ.

asiatica, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 146 = *Wendlandia paniculata*.

asiatica, Linn. Sp. Pl. 172 = *Tarenna zeylanica*.

avenia, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 63.—Cuba.

Backhousii, Hook. f. Bot. Mag. t. 6290.—Am. trop.

Berteriana, DC. Prod. iv. 409.—Ins. S. Doming.

biflora, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 276 = *Sipanea biflora*.

brachyacantha, DC. Prod. iv. 410.—Bras.

brevipes, Benth. Pl. Hartw. 191.—N. Granat.

Budda, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 138 = *Wendlandia coriacea*.

buddleioides, Benth. Pl. Hartw. 69.—Mexic.

buxifolia, Vahl, Ecl. Am. ii. 11. t. 12.—Ind. occ.

byrsophylla, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 74 = *Wendlandia coriacea*.

camarioca, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 62.—Cuba.

capitata, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 217.—Guian.

capitellata, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 28.—Mexic.

chamaebuxifolia, Griseb. Cat. Pl. Cub. 128.—Cuba.

cincta, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 329.—Ind. or.

cinerea, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 141 = *Wendlandia exserta*.

coccinea, [Mog. & Sesse.] ex DC. Prod. iv. 408 = *odorata*.

cordata, Benth. Pl. Hartw. 85.—Guatemala.

coriacea, Spreng. Syst. i. 707 = *Rudgea eriantha*.

coriacea, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 142 = *Wendlandia coriacea*.

cornifolia, Benth. Pl. Hartw. 39 = *Deppea cornifolia*.

correifolia, Griseb. Cat. Pl. Cub. 129.—Cuba.

corymbosa, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. t. 4 = *Greenia Jackii*.

cumanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 394.—Venezuela.

cymosa, Poir. Encyc. vi. 256 = *Plectronia didyma*.

daphnoides, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 327.—Jamaic.

densiflora, Blume, Bijdr. 974 = *Wendlandia densiflora*.

dichotoma, Pers. Syn. i. 203 = *americana*.

dilatata, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 286.—Guian.

discolor, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 396.—N. Granat.

disperma, Jacq. Enum. Pl. Carib. 16.—Am. austr.

dubia, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 28.—Mexic.

RONDELETIA :—

- elongata, Bartl. ex DC. *Prod.* iv. 409.—Mexic.
eriantha, Benth. *Pl. Hartw.* 192.—N. Granat.
erica, Karst. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 147.—
N. Granat.
erythronura, Karst. l. c. 148.—N. Granat.
exserta, Roxb. *Hort. Beng.* 14; *Fl. Ind.* i. 523 =
Wendlandia exserta.
febrifuga, Afzel. ex G. Don, *Gen. Syst.* iii. 516 =
Crossopteryx Kotschyana.
floribunda, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 516 = Holarrhena
africana.
glauca, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 329.—Ind. occ.
glomerulata, Spreng. *Syst.* i. 707.—Guian.
gracilis, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 53.—Mexic.
gratissima, Hemsl. l. c. 25.—Am. trop.
Heynii, Roem. & Schult. *Syst.* v. 234 = Wendlandia
exserta.
hirsuta, Spreng. ex DC. *Prod.* iv. 409 = Berteriana.
hirsuta, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Jamaic.
hirta, Bartl. ex DC. *Prod.* iv. 408 = panamensis.
hirta, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Jamaic.
hypoleuca, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 128.—Cuba.
incana, Spreng. *Syst.* i. 707 = royaefolia.
incana, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Jamaic.
intermedia, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 26.—Mexic.
Jurgensii, Hemsl. l. c. 29.—Mexic.
laevigata, Ait. *Hort. Kew.* ed. II. i. 366.—Ind. occ.
laevigata, DC. *Prod.* iv. 408 (sp. dub.).—Ins. Trinit.
lanceolata, Spreng. *Syst.* i. 707 = Mussaenda luteola.
Landia, Spreng. l. c. = Mussaenda Landia.
laniflora, Benth. *Pl. Hartw.* 85.—Guatemala.
latifolia, Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 43.
—Am. centr.
laurifolia, Sw. *Fl. Ind. Occ.* i. 363.—Jamaic.
leptacantha, DC. *Prod.* iv. 410.—Cuba.
leucophylla, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 395.—
Mexic.
ligustroides, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 26.—Mexic.
Lindeniana, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 13.—
Cuba.
linguiformis, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 29.—Mexic.
longiflora, Cham. in *Linnaea*, ix. (1834) 240 = Hindsia
longiflora.
longifolia, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 137 =
Adenosacme longifolia.
loniceroides, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 516 = Usteria
guineensis.
lucida, Wall. *Cat. n.* 8453 (= *Webera fragrans*).—
Malaya.
macrophylla, Hort. ex Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii.
17 = amoena.
microdon, DC. *Prod.* iv. 408.—Cuba.
microdonta, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii.
(1880) 133 = praec.
microphylla, Wright, ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 127.—
Cuba.
nicaraguensis, Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852)
43.—Nicarag.
nitida, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 29.—Mexic.
obovata, Linn. *Syst. ed. XII.* 163 = odorata.
odorata, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 16.—Cuba; Mexic.
orissensis, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 142 = Wendlandia
exserta.
panamensis, DC. *Prod.* iv. 408.—Panama.
paniculata, Roxb. *Hort. Beng.* 15; *Fl. Ind.* i. 521 =
Wendlandia paniculata.
parviflora, Poir. *Encyc.* vi. 252.—Ins. Martinic.
pedicellaris, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 63.—Cuba.
peduncularis, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 14.—
Cuba.
pendula, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 140 =
Wendlandia pendula.
phialanthoides, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 129.—Ind. occ.
pilosa, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Ind. occ.
Poitaei, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 328; et in *Mem.*
Am. Acad. N. S. viii. (1863) 505.—Ind. occ.
polita, Griseb. l. c. 326.—Jamaic.
proxima, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 139 = Wendlandia
tinctoria.
pubescens, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 396.—
N. Granat.
Purdiei, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5669.—N. Granat.
racemosa, Billb. ex Beurl. in *Vet. Akad. Handl.*
Stockh. 1854 (1856) 133 = Palicourea laevigata.
racemosa, Hort. ex Tenore, in *Parl. Giorn. Bot. Ital.* ii.
(1847) vii–viii. 203 = Psychotria trichotoma.
racemosa, Sw. *Fl. Ind. Occ.* i. 360.—Jamaic.

RONDELETIA :—

- reflexa, Benth. *Pl. Hartw.* 192.—N. Granat.
repens, Linn. *Syst. cd. X.* 928.—Jamaic.?
rhynchospora, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 395.—
N. Granat.
rigida, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1863)
505.—Ind. occ.
Roetzlii, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 23.—
Guatemala.
royaefolia, DC. *Prod.* iv. 410.—Ins. S. Doming.
rugosa, Benth. ex Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.*
(1852) 43.—Am. centr.
scabra, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 29.—Mexic.
scandens, Roxb. *Hort. Beng.* 85; *Fl. Ind.* i. 524.—
Ins. Maurit.
speciosa, Lodd. *Bot. Cab. t.* 1893; *Paxt. Mag. Bot.* ii.
(1836) 242 = odorata.
spicata, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 139 =
Greenia Jackii.
spinescens, Spreng. *Syst.* i. 708 = Randia nitida.
splendens, Regel, *Cat. Pl. Hort. Aksakov.* 124 (Quid?).
—Hab.?
stenosiphon, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 26.—Mexic.
stereocarpa, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 327.—Ins.
Dominic.
stricta, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 140 = Hyptianthera stricta.
strigosa, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 24.—
Guatemala.
superba, Regel, *Cat. Pl. Hort. Askakov.* 124 (Quid?).
—Hab.?
tetrandra, Roxb. *Hort. Beng.* 85; *Fl. Ind.* i. 524 =
Hedyotis macrophylla.
thyrsiflora, Hort. ex Planch. in *Fl. des Serres*, viii.
(1852–53) 13, sub t. 754 = cordata.
thyrsiflora, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 141 = Wendlandia
exserta.
thyrsoides, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Jamaic.
tinctoria, Blume, *Bijdr.* 974 = Wendlandia glabrata.
tinctoria, Roxb. *Hort. Beng.* 15; *Fl. Ind.* i. 522 =
Wendlandia tinctoria.
tinifolia, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 129.—Cuba.
tomentosa, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Jamaic.
triflora, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 34 = pilosa.
trifolia, Jacq. *Select. Am.* 60. t. 43.—Jamaic.
trifoliata, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 1671 = praec.
umbellata, J. F. Gmel. *Syst.* 1616 = umbellulata, Sw.
umbellulata, Macfad. ex Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 328
= hirta.
umbellulata, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41 = buxifolia.
venosa, Wright, ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 128.—Cuba.
verbenacea, Griseb. l. c. 130 = Ceratopyxis verbenacea.
versicolor, J. Sm. in *Bot. Mag.* t. 4579 = amoena.
villosa, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 27.—Mexic.
virgata, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Ins. S. Doming.
volubilis, [Moc. & Sesse.] ex DC. *Prod.* iv. 470 =
Lygodisodia mexicana.

- RONNBERGIA**, E. Morr. & André, *Illustr. Hort.*
(1874) 120. t. 177. **BROMELIACEAE**, Benth. &
Hook. f. iii. 661.
columbiana, E. Morr. in *Belg. Hort.* (1885) 82.—
N. Granat.
Morreniana, Linden & André, in *Illustr. Hort.*
(1874) 120. t. 177.—N. Granat.

- RONNOWIA**, Buc'hoz, *Pl. Nouv. Découv.* 6. t. 4 (1779)
= **Omphalea**, Linn. (Euphorb.).
domingensis, Buc'hoz, l. c. = O. commutata?

- ROPALA**, J. F. Gmel. *Syst.* 225 (1791) = **Roupala**,
Aubl. (Protac.).

- ROPALOCARPUS**, Boj. *Hort. Maurit.* 44 (1837).
TILIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 238.
RAPOLOCARPUS Boj. (err. typ. in loc. cit.).
lucidus, Boj. l. c.—Madag.
Thouarsianus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883)
393.—Madag.
triplinervius, Baill. *Adansonia*, x. (1871) 106.—
Madag.

- ROPALON**, Rafin. *New Fl. Am.* ii. 17 (1836) = **Nuphar**,
Sm. (Nymph.).
sagittatum, Rafin. l. c. = N. sagittae-folium.

- ROPALOPETALUM**, Griff. *Notul.* iv. 716 (1854) =
Artabotrys, R. Br. (Anonac.).
uniflorum, Griff. l. c. 717 = A. burmanicus.

- ROPHOSTEMON**, Endl. *Gen.* 21 (1837), sphalm. =
ROTROSTEMON, Blume = **Pogonia**, Juss.
(Orchid.).

- ROPHOSTEMUM**, Reichb. *Nom.* 55 (1841) = praec.

- ROPOUREA**, Aubl. *Pl. Gui.* i. 198. t. 78 (1775).
VERBENACEAE?
CAMAX, Schreb. *Gen.* i. 144 (1789).
IDESIA, Scop. *Introd.* 199 (1777).
PLOTIA, Neck. *Elem.* ii. 55 (1790).
guianensis, Aubl. *Pl. Gui.* i. 198.—Guian.

- ROPTROSTEMON**, Blume, *Fl. Jav. Praef.* p. vi (1828)
= **Pogonia**, Juss. (Orchid.).
concolor, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 453 = P. concolor.
discolor, Lindl. l. c. = P. discolor.

- RORAM**, Endl. *Gen.* 85, in syn. (1836), sphalm. =
RARAM, Adans. = **Cenchrus**, Linn. (Gramin.).

- RORELLA**, Hall. ex All. *Fl. Pedem.* ii. 88 (1785) =
Drosera, Linn.
longifolia, All. l. c. = Drosera longifolia.
lusitanica, Rafn. *Fl. Tellur.* iii. 36 = Drosophyllum
lusitanicum.
rotundifolia, All. *Fl. Pedem.* ii. 88 = Drosera rotundi-
folia.

- RORIDA**, J. F. Gmel. *Syst.* 260 (1791) = **Cleome**,
Linn. (Cappar.).
arabica, J. F. Gmel. l. c. = C. droserifolia.

- RORIDULA**, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 35 (1775) =
Cleome, Linn. (Cappar.).
arabica, Roem. & Schult. *Syst.* iii. 13 = C. droserifolia.
droserifolia, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* p. lxii = C.
droserifolia.
tetrandra, Vitm. *Summa Pl.* ii. 68 = C. droserifolia.

- RORIDULA**, Linn. *Gen. ed. VI.* 567 (1764). **DRO-**
SERACEAE, Benth. & Hook. f. i. 664.
IREON, Burm. f. *Prod. Fl. Cap.* 6 (1768).
IRIDION, Roem. & Schult. *Syst.* v. 436, in syn.
(1819).
dentata, Linn. *Gen. ed. VI.* 567.—Afr. austr.
gorgonias, Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ix. (1848)
307.—Afr. austr.
muscaripa, Gaertn. *Fruct.* i. 298. t. 62 = dentata.
verticillata, Pers. *Syn.* i. 253 = dentata.

- RORIPA**, Scop. *Fl. Carn. ed. I.* 520 (1760) = **Nastur-**
tium, R. Br. (Crucif.).
amphibia, Bess. *Enum. Pl. Volh.* 27 = N. amphibium.
anceps, Fuss, *Fl. Transs.* 47 = N. anceps.
armoracioides, Fuss, l. c. = N. armoracioides.
auriculata x, Menyh. *Kalocsa Vidék. Növényt.* 39.—
Hungar.
austriaca, Spach, *Hist. Vég. Phan.* vi. 513 = N.
austriacum.
barbareoides, Čelak. in *Arch. Naturw. Landesd. Boehm.*
iii. (1875) 458 = N. sylvestre.
Borbasi, Menyh. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879)
173 = auriculata.
Camelinae, Spach, *Hist. Vég. Phan.* vi. 514 = N.
austriacum.
hispanica, Willk. in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.*
iii. 845 = N. hispanicum.
Kernerii, Menyh. *Kalocsa Vidék. Növényt.* 39 =
N. brachycarpum.
lippizensis, Reichb. *lc. Fl. Germ.* xii. 15 = N. lippizense.
Menyharthiana x, Borb. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix.
(1879) 246.—Hungar.
nasturtioides, Spach, *Hist. Vég. Phan.* vi. 506 =
N. palustre.
palustris, Bess. *Enum. Pl. Volh.* 27; Willk. in Willk.
& Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 844 = N. palustre.
pyrenaica, Spach, *Hist. Vég. Phan.* vi. 506 =
N. pyrenaicum.
riparia, Schur, in *Verh. Naturf. Ver. Bruenn.* xv. 11.
(1877) 71 = N. amphibium.
rivularis, Reichb. *lc. Fl. Germ.* xii. 15 = N. sylvestre.
rusticana, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* i. 127 = Cochlearia
Armoracia.
sylvestris, Fuss, *Fl. Transs.* 47 = sylvestris.
stolonifera, Nym. *Consp.* 35 = N. amphibium.
sylvestris, Bess. *Enum. Pl. Volh.* 27 = N. sylvestre.
terrestis, Fuss, *Fl. Transs.* 47 = N. anceps?

ROSA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 146 (1737). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 625. *HULTENIA*, Reichb. Handb. 243 (1837). *HULTHENIA*, Dum. Not. Nov. Gen. Hult. (1824); Anal. Fam. 39 (1829). *LOWEA*, Lindl. Bot. Reg. t. 1261 (1829). *RHODOPHORA*, Neck. Elem. ii. 91 (1790). *RHODOPHORA*, Reichb. Nom. 168 (1841). *abietina*, Gren. Fl. Jurass. 134 = tomentosa. *abscondita*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 167 = sepium. *abstenta*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 347. — Persia. *abyssinica*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64. — Abyss. *acantha*, Waitz, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen. — Hab. ? *Acharii*, Billb. in Svensk Bot. ix. t. 577 = canina. *acicularis*, Lindl. Ros. Monog. 44. t. 8. — As. bor.; Am. bor. *acicularis*, Rupr. ex Nym. Consp. 236 = carelica. *aciphylla*, Rau, Enum. Ros. 69 = canina. *aculeatissima*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. iii. 340 = spinosissima. *acuminata*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 216 = humilis. *acuminata*, Sw. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 614 = cinnamomea. *acuta*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 270 = canina. *acuta*, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180. — Reg. Caucas. *addita*, Déségl. in Journ. Bot. xi. (1874) 168. — Persia. *adenocalyx*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 434 = canina. *adenophora*, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. ii. 69. — Hungaria. *adenophylla*, Willd. Enum. Hort. Berol. 546. — Hab. ? *adjecta*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 105 = alpina. *adscita*, Déségl. in Billotia, i. (1864) 34 = canina. *aeduensis*, Déségl. & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 37 = sepium. *affinis*, Rau, Enum. Ros. 79 = canina. *affinis*, Sternb. in Flora, ix. (1826) i. Beil. 30 = spinosissima. *Afzeliana*, Fries, Fl. Halland. 87 = canina. *aginenensis*, Ripart, ex Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 169 = Amansii. *agraria*, Ripart, ex Déségl. l. c. 350 = canina. *agrestina*, Ripart, ex Déségl. l. c. = canina. *agrestis*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 416 = gallica. *agrestis*, Savi, Fl. Pis. i. 475. — Europ.; Afr. bor. *agrestis*, Sw. Summa Pl. 18; Adnot. Bot. 39 = canina. *alba*, All. Fl. Pedem. ii. 139 = sempervirens. *alba*, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 232 = tomentosa. *alba*, Linn. Sp. Pl. 492. — Reg. Caucas. *Alberti*, Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 278. — Turkestan. *albicans*, Godet, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 675. — Persia. *albiflora*, Opiz, in Flora, v. (1822) 268 = agrestis. *albiflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 465. — Tauria. *albo-lutescens*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 319, in obs. I. — Gallia. *aleutensis*, Crép. l. c. xiv. (1875) 47; xvi. (1876) 25 = nutkana. *Aliothi*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 177 = trachyphylla. *Allionii*, Burnat & Gremli, Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 16. — Europ. *alpestris*, Déségl. Ess. Monog. Obs. 55 = alpina. *alpestris*, Rapin, ex Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 68 = glauca. *alpicola*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 295. — Gallia. *alpina*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 703. — Europ. *alpina*, Pall. Fl. Ross. ii. 61 = Gmelini. *alpina*, Pall. Reise, ii. 518 = spinosissima. *alpinoides*, Déségl. in Bull. Soc. Sc. Angers (1878). — Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. (1878) Bibl. 107. — Gallia. *alpine-minuta*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 295 = alpicola. *alpipila*, Arv. Ess. Pl. Dauph. (1871) 27 = glauca. *altaica*, Willd. Enum. Hort. Berol. 543 = spinosissima. *amabilis*, Borck. Forstbot. iii. 1833 = seq. ? *amabilis*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 695 = perfecta. *Amansii*, Déségl. & Ripart, ex Déségl. in Journ. Bot. xi. (1874) 169. — Europ.

ROSA :—

ambigens, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 178 = canina. *ambigua*, Lej. Rev. Fl. Spa, 98 = canina. *ambigua*, Lémán, in Journ. Phys. lxxvii. (1818) 366. — Gallia. *ambigua*, Waitz, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen; Spreng. Syst. ii. 548. — Hab. ? *amblyotis*, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1847); (Zimmtr.) 30 = nutkana. *americana*, [Waitz] Breit. Hort. Breit. 416; Link, Enum. Hort. Berol. ii. 56 = blanda. *amoena*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 477 = centifolia. *amoena*, Waitz, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen = praec. ? *amoyensis*, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 297 = microcarpa. *amphora*, Gren. ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 121 = canina. *amygdalifolia*, Ser. in DC. Prod. ii. 601 = laevigata. *analogia*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 32 = canina. *anceps*, Bouteill. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 298. — Gallia. *Ancistrum*, Lémán, in Journ. Phys. lxxvii. (1818) 367. — Gallia. *andegavensis*, Bast. Fl. Maine-et-Loire, 189 = canina. *Andorae*, Burnat & Gremli, Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 45. — Europ. *Andreae*, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1874) 23. — Ins. Sachalin. *Andrewsii*, Tratt. Ros. ii. 205 = alpina. *Andrzeiowskii*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. n. 692 = mollissima. *Andzeiowii*, Bess. Cat. Hort. Crem. Suppl. iv. 19; Enum. Pl. Volh. 19 = canina. *Andzeiowskii*, Nym. Consp. 232 = canina. *Andzejowsciana*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 227 = seq. *Andzejowscii*, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 339, in nota = canina. *Anemone*, Hort. ex Red. Ros. ii. 116 = centifolia. *anemoneflora*, Andr. Ros. t. 32. — Gallia. *anemoneflora*, Fortune, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. ii. (1847) 316. — China. *anglica*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 695 = centifolia. *anisopoda*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 165 = ferox. *anisopoda*, Vukot. in Kern. Sched. Fl. Excurs. iii. 55 = zagrabiensis. *annesiensis*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 75 = tomentosa. *anomala*, Ripart, ex Déségl. & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 37 = tomentosa. *anoplantha*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 178 = pomifera. *anserinaefolia*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 51 = Beggeriana. *apennina*, Woods, Tour. Fl. 123 = agrestis. *apiifolia*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 38 = centifolia. *approximata*, Déségl. in Billotia, i. (1864) 37 = gallica. *apricorum*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 245 = rubiginosa. *arabica*, Crép. l. c. 344 = rubiginosa. *arborea*, Pers. Syn. ii. 50 = moschata. *arcana*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 385. — Europ. *arduennensis*, Crép. in Bull. Acad. Brux. Sér. II. xiv. (1862) 102 = tomentosa. *arduennensis*, Lej. Fl. Spa, ii. 340, sphalm. = Rubus arduennensis. *arenaria*, Bieb. ex Spreng. Syst. ii. 547 = Willdenowii. *arenivaga*, Déségl. ex Jullien, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xii. (1862) 69 = gallica. *arguta*, Muss.-Pursch. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xi. (1872) 78. — Reg. Caucas. *arguta*, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 348 = tomentosa. *argute-serrata*, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 46 (Quid ?). — Europ. *aristata*, Lapeyr. Fl. Pyr. t. 105 = cinnamomea. *arkansana*, Port. & Coult. Fl. Colorado, 38. — Am. bor. occ. *armata*, Stev. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 60 = canina. *armatissima*, Déségl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 114. — Gallia. *armena*, Boiss. Fl. Orient. ii. 674. — Armenia. *Armidae*, Steud. Nom. ed. II. ii. 465 = canina.

ROSA :—

armoricana, Boullu, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 328. — Gallia. *arvatica*, Puget, ex Baker, in Naturalist, i. (1864) 101 = canina. *arvensis*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 192. — Europ. *arvensis*, Lucé, Fl. Osil. 169 = tomentosa. *arvensis*, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 554 = canina. *arvina*, Krock. Fl. Siles. ii. i. 150 (Quid ?). — Europ. *arvina*, Lloyd, Fl. Ouest Fr. ed. II. 180 = gallica. *aspera*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 29. — Helvet. *aspernata*, Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 171 = canina. *asprerima*, Godet, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 678. — Persia. *aspratilis*, Crép. ex Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 171 = canina. *aspreticola*, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 177 = canina ? *assimilis*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 103 = gallica. *atrachostyla*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426. — Gallia. *atropurpurea*, Boullu, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 274. — Gallia. *atropurpurea*, Brot. Fl. Lusit. ii. 488. — Lusitan. *atrovirens*, Viv. Fl. Ital. Fragm. i. 4. t. 6 = sempervirens. *Aucher*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 344. — Persia. *Aucheriana*, Crép. in Heurck, Obs. Bot. 30 = praec. *Aunieri*, Cariot, Etr. Fl. ed. IV. ii. 180 = canina. *aurantiaca*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 695 = R. Eglanteria. *aurelianensis*, Red. ex Link, Handb. ii. 93 = gallica. *australis*, Kern. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 244 = pomifera. *austriaca*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 33 (err. typ. 36); ed. II. 86 = gallica. *austriaca*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 225 = R. Eglanteria. *Axmanni*, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 357 = gallica. *ayreshirea*, Hort. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 211, in obs. = arvensis. *baicalensis*, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) i. Beibl. 12. — Sibir. baical. *Bakeri*, Déségl. in Journ. Bot. ii. (1864) 267 = canina. *Balansaea*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 553. — As. Min. *baldensis*, Kern. ex Déségl. l. c. 217, in obs. = arvensis. *balearica*, Desf. Tabl. ed. I. 175; Pers. Syn. ii. 49 = sempervirens. *ballonianum*, Herm. in Kirsch. Fl. Alsat. i. 245 = spinosissima. *balsamea*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iv. 18 = sepium. *balsamica*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 38 = canina. *baltica*, Roth, Nov. Pl. Sp. 234. — Europ. *Banksiae*, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 256. — China. *Banksiana*, Abel, Narr. Journ. China, 160 = praec. *barbulata*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 430 = canina. *basilica*, Roess, Ros. i. 184 = gallica. *batavia*, Breit. Hort. Breit. 416 (Quid ?). — Hab. ? *Batricis*, Burn. & Gremli, Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 14. — Gallia. *Beggeriana*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 73. — As. temp. *belgica*, Brot. Fl. Lusit. i. 338 = gallica. *belgica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 17 = dama-scena. *Belladonna*, Hort. ex Andr. Ros. iii. 46, in obs. = gallica. *bellevallis*, Puget, ex Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426 = canina. *bengalensis*, Pers. Syn. ii. 50 = indica. *berberifolia*, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1792) 379 t. 10. f. 5. — Persia. *Berneti*, Schmiedely, in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 180. — Europ. *Besseri*, Tratt. Ros. ii. 128 = spinosissima. *bibracteata*, Bast. in DC. Fl. Fr. v. Suppl. 537 = arvensis. *bicolor*, Jacq. Hort. Vindob. i. 1 = R. Eglanteria. *bicolor*, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 70 (= praec. ?). — Europ. *Biebersteiniana*, Tratt. Ros. ii. 5 = canina. *Biebersteinii*, Lindl. in Loud. Encyc. Pl. 444 = ferox.

ROSA :—

- bifera*, Poir. Encyc. vi. 276 = damascena.
biflora, Aubl. Pl. Gui. i. 514 = centifolia?
biflora, Krock. Fl. Siles. ii. i. 151 = alpina.
Billietii, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 337 = agrestis.
bipinnata, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. iii. 351 = centifolia.
bipinnata, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 695 = arvina.
biserrata, Méral, Fl. Par. 190 = canina.
biturigenis, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. ii. 630 = spinosissima.
blanda, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 202.—Am. bor.
blanda, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 344 = nitida.
Blondacana, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 133 = canina.
Boissieri, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 340.—As. Min.
Bonnieri, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 295 = alpicola.
Boracana, Béraud, in Mém. Soc. Agric. Angers, v. (1842) 353 = gallica.
Borbasiana, H. Braun, in Flora, lxviii. (1885) 114.—Europ.
Borboniana, Desp. Ros. Gall. 106 = indica.
Borkhausenii, Steud. Nom. ed. I. 695 = canina.
Boracana, Béraud, ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 216 = gallica.
borealis, Tratt. Ros. ii. 141 = spinosissima.
Boreykiana, Bess. Enum. Pl. Volh. 61 = alba.
Borkhausenii, Tratt. Ros. i. 114 = tomentosa.
Borkhausii, Gaud. ex Ser. Mém. Bot. i. 41 = canina.
Borveri, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 210 = canina.
Bourbonia, Roess. Rosen, ii. 28 = gallica.
Bourgeauiana, Crép. Prim. Mon. Bor. 303 = acicularis.
Boursaultii x, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138, nomen.
Bovernieriana, Lag. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 392 = canina.
brachiata, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 103.—Europ.
brachyantha, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 46 (Quid?).—Europ.
brachypoda, Déségl. & Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 339.—Gallia.
bracteata, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274 = involucrata.
bracteata, Wendl. Bot. Beobacht. 50.—China.
bractescens, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 216 = canina.
Brandisii, Keller, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 12, 172 = Sabini?
Braniciana, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 327, nomen.—Rossia.
Braunii, Keller, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 39.—Austria.
brevipedunculata, Opiz, in Lotos, ix. (1854) 46 (Quid?).—Europ.
brevistyla, DC. Fl. Fr. Suppl. 537 = stylosa.
britannica, Déségl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 218 = tomentosa.
Bronneri, Dierb. in Flora, xi. (1828) i. Erg. 108.—Europ.
Broteri, Tratt. Ros. ii. 98 = moschata.
Brotheri, Scheutz, in Bot. Centralb. ii. (1880) 1245.—Reg. Caucas.
Brownii, Tratt. Ros. ii. 96 = moschata.
brunica, Bouv. in Bull. Inst. Nat. Genève. xix. (1875) 92.—Europ.
Brunneri, Dierb. in Flora, xi. (1828) Index, Erg. 124, sphalm. = Bronneri.
Brunonii, Lindl. Ros. Monog. 120. t. 14 = moschata.
Brunonis, Wall. Cat. n. 689 = praec.
bullata, Savi, Fl. Ital. i. t. 34 = centifolia.
Bungeana, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 84 = hemisphaerica, Herrm.
burgundiaca, Ehrh. Beitr. vi. 97; Pers. Syn. ii. 48 = centifolia.
burgundica, Gmel. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 466 = parvifolia.
Burnati, Burnat. & Gremli, Roses Alpes-Marit. 92 = canina.
caballicensis, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 35 = montana.
cabulica, Boiss. Fl. Orient. ii. 678.—Afghan.
Caesarea, Boiss. l. c. 672 = hemisphaerica, Herrm.
caesia, Sm. Engl. Bot. t. 2367 = canina.

ROSA :—

- calabrica*, Huter, ex Burnat. & Gremli, Roses Alpes-Marit. 79 = rubiginosa.
Caledoniae, Borrer, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 234 = canina.
calendarum, Borek. Forstbot. 330 = damascena.
californica, Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 35.—Calif. *calvatostyla*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 429 = canina.
calycina, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 349 = canina.
calycina, Moench, Verz. 124 (Quid?).—Europ.
camberiensis, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 342 = rubiginosa.
campaniaca, Roess. Rosen, ii. 24.—Hab.?
campanulata, Ehrh. Beitr. vi. 97 = turbinata.
campestris, Dum. Fl. Belg. Prod. 93 = trachyphylla.
campestris, Sw. Summa Pl. 18 = canina.
campestris, Wallr. Ros. Pl. 110 = spinosissima.
camtschatica, Erman, Reise, iii. 303 = nutkana.
camtschatica, Steud. Nom. ed. I. 696 = kamtschatica.
canariensis, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 535, in obs.—Ins. Canar.
candida, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 354 = arvensis.
Candolleana, Thory, Ros. Candoll. 6 = spinosissima.
canescens, Baker, in Naturalist, i. (1864) 97 = canina.
canescens, Krock. Fl. Siles. ii. i. 153.—Europ.
canina, Linn. Sp. Pl. 492.—Europ.; As. temp.
canina, Siev. ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 229 = Gmelini.
canina, Soland. ex Bab. in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 304 = spinosissima.
cantabrica, Crép. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 210 = stylosa.
capnoides, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 565 = tomentosa.
capreolata, Neill, in Edinb. Phil. Journ. (1820) 104 = arvensis.
carbonariensis, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1876) p. lxvii.—Gallia.
cardinalis, Lawr. Ros. t. 59 = gallica.
carelica, Fries, in Fl. Dan. Suppl. ii. 6. t. 76 = acicularis.
carelica, Fries, Summa Veg. Scand. i. 171, 556.—Europ.
Carionii, Déségl. & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 34 = canina.
Carioti, Chabert, in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 677 = canina.
carissima, Roess. Rosen, 68.—Hab.?
carnea, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 478 = gallica.
carnea, Hort. ex Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 366 = centifolia.
Carolina, Duroi, Harbk. Baumz. ii. 355; Walt. Fl. Carol. 149 = humilis.
Carolina, Linn. Sp. Pl. 492.—Am. bor.
carolinensis, Marsh. Arbust. 135 = R. Carolina.
caroliniana, Michx. Fl. Bor. Am. i. 295 = humilis.
carpatia, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 592.—Europ.
caryophyllacea, Bess. Enum. Pl. Volh. 19 = tomentosa.
caryophyllacea, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 164 = rubiginosa.
caryophyllata, Hort. ex Red. Ros. i. 114, in obs. = centifolia.
caryophyllea, Poir. Encyc. vi. 276 = centifolia.
casta, Tratt. ex Link, Handb. ii. 85 = suavis.
catalaunica, Costa, Supl. Fl. Catal. 26 = canina.
caucasica, Lindl. Ros. Monog. 97. t. 11.—Reg. Caucas.
caucasica, Pall. Pl. Ross. i. 11. 62 = canina.
celerata, Baker, in Naturalist, i. (1864) 99 = canina.
Celsiana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 252 = damascena.
celsicola, Arv. Ess. Pl. Dauph. (1871) 27 = glauca.
Celsii, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 367 (nomen).—Gallia.
centifolia, Linn. Sp. Pl. 491.—Reg. Caucas.
centifolia, Lour. Fl. Cochinch. 323 (Quid?).—China.
centipetala, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 133 = praec.
cerasifera, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 146 = collina.
cerea, Roess. ex Red. Ros. i. 69 = R. Eglanteria.
Chaberti, Déségl. in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 180.—Europ.
Chaboissaei, Gren. Fl. Jurass. 241 = canina.
Chailletii, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 339 = rubiginosa.
Chamaerhodon, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 555 = gallica.
Chapusii, Godet, Fl. Jura, Suppl. 73 = canina.

ROSA :—

- Chavini*, Rapin, ex Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 69 = canina.
cheriensis, Déségl. in Billotia, i. (1864) 45 = agrestis.
cherokeensis, Donn, Hort. Cantab. ed. VI. 144 = laevigata.
chinensis, Jacq. Obs. Bot. iii. 7 = indica.
chlorophylla, Ehrh. Beitr. ii. 69 = R. Eglanteria.
Christiana x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii.—xxiv. (1880) 62.—Europ.
Christii x, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 146.—Europ.
ciliaris, Wils. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 229 = canina.
ciliata, Link, Handb. ii. 90.—Europ.
ciliato-petala, Bess. Enum. Pl. Volh. 66 = pomifera.
ciliato-petala, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 253 = mollissima.
cinerascens, Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 677 = canina.
cinerascens, Dum. Fl. Belg. Prod. 93 = tomentosa.
cinerea, Rapin, in Gren. Fl. Jurass. 238 = canina.
cinerea, Sw. in Svensk Bot. t. 553 = cinnamomea.
cinerosa, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 380 = canina.
cinnabarina, Wrede, ex Breit. Hort. Breit. 419 (Quid?).—Hab.?
cinnamomea, Kar. & Kir. ex Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 168 = dissimilis.
cinnamomea, Herrm. Diss. 7 = alpina.
cinnamomea, Linn. Sp. Pl. 491.—Europ.; As. bor.
cinnamomea, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 214 = R. Eglanteria.
ciphiana, Sm. Fl. Brit. ii. 537 = spinosissima.
cladoleia, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 265 = canina.
clinophylla, Thory, in Red. Ros. i. 43.—Ind. or.
clivorum, Scheutz, Stud. Skand. Ros. (1872) 28 = tomentosa.
clotildea, Timb. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 260 = stylosa.
Clusiana, Bouv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) p. xxiv = pomifera, alpina.
Clusiana, Waitz, ex Tratt. Ros. i. 119.—Europ.
coccinea, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 697 (Quid?).—Hab.?
coerulescens, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 293 = ferruginea.
coerulescens, Link, Handb. ii. 83 (Quid?).—Hab.?
cochinchinensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 585.—Cochinch.
collina, Jacq. Fl. Austr. ii. 58 = canina.
collina, Sm. Engl. Bot. t. 1895 = stylosa.
collincola, Ehrh. Beitr. ii. 70 = cinnamomea.
collivaga, Cottet, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 247, 297 = tomentosa.
columnifera, Borek. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 621 = sylvestris.
commutata, Schütz, Stud. Skand. Ros. (1872) 41 = flexuosa.
comosa, Ripart, in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 254 = rubiginosa.
complicata, Gren. Fl. Jurass. 239 = glauca.
concauifolia, Waitz, ex Tratt. Ros. ii. 66.—Hab.?
concinna, Hort. Humb. (1834) ex Steud. Nom. ed. II. ii. 467 (Quid?).—Hab.?
concinna, Lagg. & Puget, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 494 = canina.
condensata, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 118 = canina.
conferta, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 28 = tomentosa.
confusa, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 246 = tomentosa.
conica, Chabert, ex Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 171 = arvina.
consanguinea, Gren. Fl. Jurass. 225 = trachyphylla.
consimilis, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 90 = spinosissima.
conspicua, Bor. l. c. xii. (1862) 55 = arvensis.
controversa, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 499 = canina.
corallina, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 38 = humilis.
corbariensis, Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord. xxx. (1875) p. clxi = sepium.
cordata, Cariot, Etud. Fleurs, ed. VII. ii. (1884) 228.—Gallia.
cordifolia, Baker, in Naturalist, i. (1864) 24 = glauca.

ROSA:—

cordifolia, Host, Fl. Austr. ii. 23 = gallica.
coriacea, Crép. in Heurck, Obs. Bot. 80 = canina.
coriacea, Opiz, in Flora, v. (1822) 268.—Europ.
coriifolia, Fries, Novit. Fl. Suec. ed. I. (1814) 33; ed. II. 147 = canina.
coronata, Crép. Man. Fl. Belg. 52, in nota = involuta.
corrugata, Caldesi, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xii. (1880) 100.—Europ.
coruscans, Waitz, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 57 = rugosa.
corylifolia, Vukot. ex Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxix. (1884) 16.—Croatia.
corymbifera, Borck. Holzart. 319 = canina.
corymbosa, Bast. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 213 = arvensis.
corymbosa, Bosc, ex Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 272 = blanda.
corymbosa, Breit. Hort. Breit. 418 = perfecta.
corymbosa, Ehrh. Beitr. iv. 21 = R. Carolina.
corymbosa, Moench, Verz. 119.—Europ.
Cotteti, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 31 = trachyphylla.
Crantzii, Schultz, Obs. Bot. 94 = rubiginosa.
crassifolia, Wallm. in Liljeb. Svensk Fl. ed. III. 268 = canina.
cremsensis, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 578 = mollissima.
Crepini, Miègev. ex Crép. l. c. viii. (1869) 274 = glauca.
Crepiniana, Déségl. ex Baker, in Naturalist, i. (1864) 97 = canina.
cretacea, Kalenicz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) i. 297, 301, nomen.—Rossia.
cretica, Bosc, Encyc. Agric. vii. 705 (Quid ?).—Ins. Creta.
cretica, Thory, Ros. (1820) 110 = rubiginosa.
cretica, Vest, ex Tratt. Ros. ii. 83 = glutinosa.
cretica, Wallr. Ros. 144, partim = alpina.
crispa, Hort. ex Red. Ros. ii. 12 = arvina.
croatica, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 589 = gallica.
cryptopoda, Baker, in Naturalist, i. (1864) 66 = agrestis.
cryptopoda, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 428 = canina.
cucumerina, Tratt. Ros. ii. 181 = laevigata.
cuprea, Jacq. Fragm. 31 = gallica.
Cursor, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 217 = setigera.
curticola, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 114.—Europ.
curvula, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 367 = canina.
cuspidata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 396 = tomentosa.
cuspidatoides, Crép. in Scheutz, Stud. Skand. Ros. (1872) 37 = tomentosa.
cymbifolia, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 366.—Gallia.
cymosa, Tratt. Ros. i. 87 = microcarpa.
Cynorrhodon, Wallr. Ros. 206; ex Red. Ros. ii. 51 = canina.
Czackiana, Bess. Enum. Pl. Volh. 61 = gallica.
daenensis, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 51; Fl. Orient. ii. 677 = Beggeriana.
dahurica, Auct. = davurica.
dalmatica, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 8.—Europ.
damascena, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15.—Oriens.
dasistema, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 219 = blanda.
Davidi, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiii. (1874) 253.—China.
davurica, Pall. Fl. Ross. i. ii. 61.—Dahuria.
decipiens, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 218 = gallica.
decora, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 512 = flexuosa.
De-la-Soiei, Lagg. & Puget, in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 43 = glauca.
Dematrancea, Lagg. & Puget, ex Cottet, l. c. iv. (1875) 32.—Helvet.
densa, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 141 = rubiginosa.
densiflora, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 61, nomen (Quid ?).—Bohem.
depressa, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 178 = trachyphylla.
Deseglisei, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 224 = canina.
Desvauxii, Desp. Ros. Gall. 107.—Hab. ?

ROSA:—

devoniensis ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1841) 470.
dianthiflora, Andr. Ros. t. 31.—Europ.
dibracteata, Thory, Ros. (1820) 135 = arvensis.
dichroa, Lerch, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 145 = spinosissima.
Dicksoni, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 224.—Hibernia.
didoensis, Boiss. Fl. Orient. ii. 685.—Reg. Caucas.
diffusa, Roxb. Hort. Beng. 92; Fl. Ind. ii. 515 = multiflora.
digitaria, Bosc, ex DC. Prod. ii. 622 = alba.
dijonensis, Roess. Ros. i. 93.—Gallia.
Dilleniana, Baker, ex Déségl. in Journ. Bot. v. (1867) 42.—Europ.
diminuta, Bor. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 546 = rubiginosa.
dimorpha, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iii. 19 = tomentosa.
dimorphacantha, Martin, ex March. & Hardy, in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 248 = rubiginosa.
Diomedis, Gren. ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 121 = canina.
discreta, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 237 = glauca.
dissimilis, Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 168.—Rossia.
distans, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 170 = tomentosa.
diversifolia, Vent. Jard. Cels, 35 = indica.
diversisepala, H. Braun, in Beck, Fl. Hernstein, 353.—Europ.
djamilensis, Boiss. Fl. Orient. ii. 673.—As. Min.
dolosa, Godet, Fl. Jura, Suppl. 72 = canina.
Doniana, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 185 = involuta.
drosophora, H. Braun, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. iii. 56.—Tyrol.
druentica, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1882) 344.—Gallia.
dryadea, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 502 = trachyphylla.
dubia, Bastard, ex Déségl. l. c. 353 = canina.
dubia, Carr. in Rev. Hortie. (1868) 269 = thyrsoflora.
dubia, Wibel, Prim. Fl. Werth. 263 = tomentosa.
Duffitii ×, Schultz, ex Haussk. in Mitth. Geogr. Ges. Jena, ii. (1885) 24.—Europ.
dumalis, Bechst. Forstbot. ed. V. (1843) 582 = canina.
dumalis, Tratt. ex Link, Handb. ii. 94 = gallica.
dumetorum, Lange, in Fl. Dan. t. 2718 = seq. ?
dumetorum, Sm. Engl. Bot. t. 2579 = inodora.
dumetorum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 250 = canina.
dumosa, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 101 = tomentosa.
dumosa, Salisb. Prod. 359 = canina.
Durandii, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 58.—Europ.
Durandii, Crép. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 19 = nutkana.
Ecae, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 54 = xanthina.
echinata, Dupont, ex DC. Prod. ii. 607 = cinnamomea.
echinata, Waitz, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen.—Hab. ?
echinocarpa, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 150 = macrantha.
edita, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 347 = canina.
editorum, Ripart, ex Déségl. l. c. 286 = alpina.
Eglanteria, Linn. Sp. Pl. 491.—Europ.; Oriens.
Eglanteria, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = rubiginosa.
elasmacantha, Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 25.—As. bor.
elata, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 163 = gallica.
elator, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 297 = sepium.
elegans, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 214 = R. Carolina.
elegans, Salisb. Prod. 358 = damascena.
elliptica, Tausch, ex Tratt. Ros. ii. 69; et in Opiz, Boehm. Gew. (1823) 60.—Europ.
elongata, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 484 (err. typ. 448) = multiflora.
elongata, Roess. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 468 = R. Carolina.

ROSA:—

elymaica, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 675.—Persia.
engolismensis, Déségl. & Guillon, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 6.—Europ.
enneaphylla, Rafin. Préc. Découv. 35 = R. Carolina.
episcopalis, Hort. ex Roess. Rosen, 239 = gallica.
erinacea, Desp. Ros. Gall. 18.—Gallia.
erinacea, Hardy, ex Nym. Consp. 236 = involuta.
eriocarpa, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 367, nomen.—Hab. ?
erosa, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 570 = tomentosa.
eriostyla, Ripart & Déségl. l. c. 334 = canina.
erratica, Ripart, in Soc. Dauph. Ech. Pl. iv. (1877) 109 = stylosa.
erronea, Ripart, ex Crép. Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 257 = arvensis.
erubescens, Andr. Ros. t. 18.—Hab. ?
erythrantha, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 224 = canina.
erythrella, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 330 = canina.
Euratiانا, Bosc, ex Link, Handb. ii. 87 = seq. ?
Euratiانا, Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 714 = R. Carolina, rubiginosa, villosa.
exilis, [Crép.] ex Boutt. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 220.—Europ.
falcata, Puget, ex Crép. l. c. viii. (1869) 237 = montana.
fallaciosa, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 391 = canina.
fallax, Gren. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 561 = graveolens.
fallax, Puget, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 226 = canina.
fallens, Déségl. in Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 266 = canina.
farinosa, Bechst. Forstbot. 643; Rau, Enum. Ros. 147 = tomentosa.
farinulenta, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 246 = tomentosa.
fastigiata, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 30 = stylosa.
fastigiata, Salisb. Prod. 358 = arvensis.
fastuosa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 239 = rugosa.
Favrati, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 170 = tomentosa.
Fedtschenkoana, Regel, in Del. Sem. Hort. Petrop. (1876) 36, nomen.—Turkestan.
Fendleri, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 91.—Calif.
fenestralis, Hort. ex Red. Ros. iii. 72 = ferruginea.
fenestrata, Donn, Hort. Cantab. ed. VIII. 170 = setigera.
ferox, Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 262 = rugosa.
ferox, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 339.—As. Min.; Persia.
ferox, Lawr. Ros. t. 42 = cinnamomea.
ferruginea, Vill. Prosp. 46.—Europ.
fimbriata, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 178 = tomentosa.
finitima, Déségl. ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 39 = canina.
firma, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1869) 118 = canina.
firmula, Godet, Fl. Jura, Suppl. (1874) 38 = canina.
Fischeri, Link, Handb. ii. 88 (= seq. ?).—Sibir.
Fischeriana, Bess. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen.—Rossia.
fissispina, Wierzb. ex Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 102 = canina.
flagellaris, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 176 = ferox.
flava, Donn, Hort. Cantabr. ed. IV. 121 (Quid ?).—China.
flava, Wickstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1820) 273.—Tauria.
flavescens, Hassk. Cat. Pl. Hort. Bog. Alt. 265 = arvina.
flexibilis, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 317 = canina.
flexicaulis, Godet, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 675 = albicans.
flexuosa, Rafin. Préc. Découv. 35 = canina.
flexuosa, Rau, Enum. Ros. 127.—Europ.
floccida, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 567 = tomentosa.

ROSA :—

- floribunda*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) Suppl. iv. 19 = rubiginosa.
floribunda, Hort. ex Andr. Ros. t. 106 = multiflora.
florida, Donn, Hort. Cantab. ed. VIII. 159 = R. Carolina.
florida, Poir. Encyc. Suppl. iv. 715 = multiflora.
fluvialis, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 868 = cinnamomea.
foecundissima, Muench. Hausv. v. (1770) 279 = cinnamomea.
foetida, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 29 = tomentosa.
foetida, Herrm. Diss. 18 = R. Eglanteria.
foliolosa, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 460.—Am. bor.
foliosa, Lénan, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 366.—Gallia.
foliolosa, Nutt. l. c. partim = carolina.
Fontanesii, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 157 = agrestis.
formosa, Roess, ex Red. Ros. i. 74 = gallica.
formosula, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 437 = sepium.
Forsteri, Sm. Engl. Fl. ii. 392 = canina.
Fortuneana, Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) Misc. 26 = seq.
Fortuniana ×, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 71.—China.
Fourroei, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 98 = gallica.
fragariaeflora, Ser. ex DC. Prod. ii. 601 = Banksiae ?
fragariaefolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 468, sphalm. = praec.
fragrans, Desp. Ros. Gall. 101.—Hab. ?
fragrans, Red. Ros. i. t. 19 = indica.
fragrans, Salisb. Prod. 358 = R. Carolina.
francofurtana, Muench. Hausv. v. (1770) 288 ; Borck.
francofurtensis, Desf. Tabl. ed. I. 175 = praec.
Franzoni, Christ, Rosen Schweiz (1875), 174 = ferruginea.
Fraseriana ×, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 211.
fraxinea, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 37 = blanda.
fraxinellaefolia, Andr. Ros. t. 100.—Hab. ?
fraxinifolia, Borck. Vers. Forstw. Besch. Holz. 301 = cinnamomea.
fraxinifolia, Dur. & Hilg. in Pacif. Rail. Rep. v. iii. 7 = californica.
fraxinifolia, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 413 = blanda.
fraxinifolia, Hook. Fl. Bor. Am. i. 199 = nutkana.
fraxinifolia, Roess. Ros. i. 219 = R. Carolina.
friburgensis, Lagg. & Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 248 = pomifera.
Friedlanderi, Nym. Consp. 235 = seq.
Friedlanderiana, Bess. Enum. Pl. Volh. 46 = canina.
Friesii, Lagg. & Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 27.—Europ.
Friesii, Schütz, Stud. Ros. Skand. (1872) 39 = canina.
frondosa, Stev. ex Spreng. Syst. ii. 554 = canina.
frutetorum, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iii. 20 ; Enum. Pl. Volh. 18 = canina.
fulgax, Gren. Fl. Jura (1864) 239 = glauca.
fulgens, Andamow. ex Opiz, Natural. xi. (1826) 449 (Quid ?).—Europ.
fulgens, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 160 = cinnamomea.
fusca, Moench, Meth. 688 = arvensis.
fusiformis, Crép. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 214 = canina.
gallica, Linn. Sp. Pl. 492.—Europ. ; Reg. Caucas.
gallicoides, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 218 = arvensis.
Gallinariae, Burnat & Gremli, Suppl. Mon. Ros. Alpes-Marit. 25 = canina ?
Gandogeriana, Debeaux, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) 9 = sempervirens.
Gaudini, Puget, in Déségl. Rev. Sect. Toment. Rosa (1866), 47 = pomifera.
Gebleriana, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 80.—Sibir. altaic.
gemella, Willd. Enum. Hort. Berol. 544 = blanda.
gemina, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 46.—Europ.
geminata, Rau, Enum. Ros. 98 = gallica.
genevensis, Puget, in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 567 = tomentosa.

ROSA :—

- Gennarii*, Huet, ex Gennari, in Mem. Acc. Torin. xxv. (1858) 463 = canina.
gentilis, Sternb. in Flora, ix. (1826) Beil. 79 = spinosissima.
georgina, Hort. Hamb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 469 (Quid ?).—Hab. ?
germanica, Hort. ex Steud. l. c. ed. I. 699 = turbinata.
germanica, Maerkl. ex Steud. l. c. = gallica.
Gillotii, Déségl. & Lucand. in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 15.—Gallia.
Gisleri, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 247 = tomentosa.
glaberrima, Dum. Fl. Belg. Prod. 94 = canina.
glabra, Andr. Ros. t. 40.—Hab. ?
glabra, Baker, in Naturalist, i. (1864) 24 = glauca.
glabra, Meyen, Reise, i. 303 = Meyeniana.
glabrata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 588.—Europ.
glabrata, Vest, ex Tratt. Ros. ii. 220 = ferruginea.
glabrescens, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 340 = rubiginosa.
glabrifolia, Rupr. Stirp. Fl. Petrop. Diatr. 65 = cinnamomea.
glandulifera, Roxb. Hort. Beng. 38 ; Fl. Ind. ii. 514 = moschata.
glandulosa, Bell. in Mém. Acad. Turin, v. 1790-1791 (1793) 230 = alpina.
glandulosa, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 118 ; Enum. Pl. Volh. 20 = canina.
glandulosa, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 91 = montana.
glandulosa, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 214 = R. Carolina ?
glauca, Dierb. Fl. Heidelb. ii. 140 = arvensis.
glauca, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 326 = ferruginea.
glauca, Schott, in Bess. Enum. Pl. Volh. 60 = canina.
glauca, Vill. ex Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 336.—Europ.
glaucescens, Desv. in Mérit, Fl. Par. 192 = canina.
glaucescens, Wulf. in Roem. Arch. iii. iii. (1805) 376 = ferruginea.
glaucofolia, Opiz, in Flora, v. (1822) 268.—Europ.
glauca, Ripart, ex T. Durand, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. ii. (1880) 60 = canina.
glaucophylla, Ehrh. Beitr. ii. 69 = hemisphaerica, Herrm.
glaucophylla, Winch, Ess. Geogr. Distr. Northumb. ed. I. 45 = canina.
glauco-pubescent, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 69.—Europ.
globata, Déségl. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 279 = canina.
globosa, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 215 = humilis.
globularis, Franch. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 221 = canina.
glutinosa, Dematra, Ess. Monog. 6 = pomifera.
glutinosa, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 27 = agrestis.
glutinosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 348.—Europ. ; As. Min.
Gmelini, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 228.—Sibir.
Godeti, Gren. in Godet, Fl. Jura, Suppl. 73 = trachyphylla.
gombensis, Lagg. & Puget, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 54 = pomifera.
gorenkensis, Fisch. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 200 = cinnamomea.
gracilens, Crép. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 212 = montana.
graciliscens, Gren. ex Déségl. in Billotia, i. (1869) 121 = canina.
gracilis, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 186 = involuta.
granata, Red. ex Link, Handb. ii. 93 = gallica.
granatensis, Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 24 = spinosissima.
grandiflora, Lindl. Ros. Monog. 55 = spinosissima.
grandiflora, Salisb. Prod. 358 = gallica.
grandiflora, Wallr. Ann. Bot. 66 = pulverulenta.
grandifolia, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 339 = rubiginosa ?
granensis, Kmet, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 34.—Hungar.
grata, Salisb. Prod. 358 = gallica.
graveolens, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 560.—Europ.
Gremlii, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 176 = rubiginosa.

ROSA :—

- Grenierii*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 168 = pomifera.
Grevillei, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138 = multiflora.
grisea, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 699 (Quid ?).—Hab. ?
grossularifolia, Andr. Ros. t. 30 = gallica.
Guepini, Desv. Fl. Anjou, 325 = canina.
Guilelmi-Waldemarii, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 153 = macrophylla.
Guineti, Schmidely, in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 177.—Gallia.
guttenteinensis, Jacq. f. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 200 = ferruginea.
gymnocarpa, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 461.—Am. bor.
haberiana, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 37 = canina.
Hackeliana, Nym. Consp. 233 = Heckeliana.
haematodes, Boiss. Fl. Orient. ii. 684.—Reg. Caucas.
Hailstoni, Baker, in Lond. Bot. Exch. Club Rep. (1868) 7 = canina.
Halácsyi, H. Braun, in Beck, Fl. Hernstein, 356.—Europ.
hallandica, Scheutz, in Ofvers. Vet. Akad. Foerh. Stockh. (1873) n. ii. 46 = canina.
Halleri, Krock. Fl. Siles. ii. i. 150 = arvensis.
Hampeana, Griseb. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 329.—Hab. ?
Hardii ×, Paxt. Mag. Bot. x. (1843) 195 = involucrata.
hawrana, Kmet, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 38.—Hungar.
Heckeliana, Tratt. Ros. ii. 85.—Ital. ; Graecia.
Heckeliana, Boiss. Fl. Orient. ii. 680, sphalm. = praec.
Heldreichii, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 49.—Thessalia.
helvetica, Hall. f. in Roem. Arch. i. ii. (1797) 6 = villosa.
hemisphaerica, Herrm. Diss. 18.—Phrygia.
hemisphaerica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 200.—Hab. ?
hemitricha, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 373 = canina.
Heriteriana, Link, Handb. ii. 84 = alpina.
Herporhodon, Ehrh. Beitr. ii. 71 = arvensis.
heteracantha, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 350.—Sibir.
heterophylla, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 527 = sepium.
heterophylla, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 195 = mollissima.
hetrostyla, Griff. Notul. iv. 454 ; Ic. Pl. As. iv. t. 574 = moschata.
hibernica, Hook. ex Lindl. Ros. 51 = spinosissima.
hibernica, Sm. Engl. Fl. ii. 393 = glauca.
Hillebrandtii, Weitenw. in Opiz, Natural. xi. (1826) 450.—Europ.
Hirciana, H. Braun, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 6.—Europ. austr.
hirta, H. Braun, Beitr. Kenntn. Gatt. Rosa (1885), 108.—Europ.
hispanica, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 44 = canina.
hispanica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Hispan.
hispidula, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 286 = villosa.
hispidula, Krock. Fl. Siles. ii. i. 152 = alpina.
hispidula, Muench. Hausv. v. (1770) 281 ; Borck.
Forstbot. ii. 1332 = tomentosa.
hispidula, Red. Ros. 159 = spinosissima.
hispidula, Sims, in Bot. Mag. t. 1570 = R. Eglanteria.
hispidocarpa, Chab. in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 677 = R. Carolina.
hispidula, Ripart, in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 386.—Europ.
Histris, Lénan, in Bull. Soc. Philom. (1818) 94 = micrantha.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 153 = macrophylla.
holikensis, Kmet, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 19.—Austria.
hollandica, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 484 (err. typ. 448) = multiflora.
hollandica, Pers. ex Steud. Nom. ed. I. 699 = centifolia.
hololeia, Ripart, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 38 = canina.
holosericea, Borck. Forstbot. iii. 1815.—Europ.
holosericea, Duroi, Obs. Bot. 20 = gallica.
holostica, Roess. Rosen, 188.—Europ.

ROSA :—

- homolaga*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426 = canina.
Hookeriana, Wall. Cat. n. 691; Bertol. Misc. Bot. xxiv. 14 = macrophylla.
horrida, Bess. ex Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 66 = ferox.
horrida, Spreng. Syst. ii. 549 = viminea.
horridula, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 323 = canina.
hudsoniana, Thory, in Red. Ros. i. 95 = R. Carolina.
humifusa, Red. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 623 = gallica.
humifusa, Tratt. Ros. ii. 102 = sempervirens.
humilis, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iv. 19; Enum. Pl. Volh. 20 = canina.
humilis, Marsh. Arbust. Am. 136. — Am. bor.
humilis, Tausch, in Flora, ii. (1819) 465 = gallica.
hungarica, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 234. — Europ.
hyacinthina x, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138, nomen. — Hab. ?
hybernica, Thory, Ros. 141 = glauca.
hybrida, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = arvena.
hybrida, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 554 = alpina.
Hystrix, Lindl. Ros. Monog. 129. t. 17 = laevigata.
Ibara, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. i. 9, sphalm. = R. Iwara.
iberica, Stev. in Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 539 = rubiginosa.
Ilsena, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 334. — Europ.
imitata, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 120 = canina.
immitis, Déségl. l. c. 97 = stylosa.
imperialis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 252 = damascena.
implexa, Gren. Fl. Jurass. 238 = canina.
imponens, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 237 = montana.
incana, Falk, ex Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1820) 275 = laxa.
incana, Kit. ex Tratt. Ros. i. 135. — Hungar.
incarnata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 19 = gallica.
incerta, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 384 = canina.
inclinata, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 326 = glauca.
incomparabilis, Chab. in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 170 = gallica.
inconsiderata, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 117 = canina.
inconspicua, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 357 = canina.
indica, Linn. Sp. Pl. 492. — Ind. or.; China.
inermis, Bertol. in Mem. Acc. Sc. Bologn. Ser. II. iii. (1863) 419 = seq. ?
inermis, Bosc, Encyc. Agric. vii. 705. — Ind. or.; China.
inermis, Delaun. ex Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = alpina.
inermis, Luce, Topog. Nachr. Oesel, 170. — Ins. Balt.
inermis, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 516 = Banksiae.
infesta, Kmet, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 32. — Hungar.
inodora, Fries, Nov. Fl. Snec. 9 = agrestis.
inodora, Hook. in Curt. Fl. Lond. ed. II. t. 117 = canina.
insidiosa, Gren. Fl. Jurass. 233 = tomentosa.
insidiosa, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 501 = trachyphylla.
insignis, Déségl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 112 = canina.
intercalaris, Déségl. l. c. 104 = alpina.
intermedia, Bosc, Encyc. Agric. vii. 705. — Europ.
intermedia, Carr. Rev. Hort. xvii. (1868) 270 = thysiflora.
intermedia, Chab. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 240 = arvena.
intermedia, Desv. ex Link, Handb. ii. 91; Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 591 = canina.
intermissa, Nym. Consp. 232, sphalm. = intromissa.
interveniens, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 354. — Europ.
intricata, Crép. l. c. viii. (1869) 298 = tomentosa.
intricata, Gren. Fl. Jurass. (1864) 239 = glauca.
intromissa, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 298 = tomentosa.

ROSA :—

- involuta*, Braam, Ic. Pl. in Chin. Nasc. t. 17 = bracteata.
involuta, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 513. — Ind. or.; China.
involuta, Sm. Fl. Brit. iii. 1398; Engl. Fl. ii. 377. — Europ.
irregularis, Déségl. & Guillon, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 7. — Europ.
Isaurae, Tratt. Ros. ii. 72 = pulverulenta.
Iwara, Sieber, ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1861) 53. — Japon.
Jacquemontii, Crép. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 368. — Reg. Himal.
jactata, Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 169 = canina.
japonica, Waitz, ex Steud. Nom. ed. I. 699. — Japon.
Jordani, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 146 = sepium.
Jundzilli, Bess. Cat. Pl. Hort. Crem. (1816) 117 = canina ?
Jundzilliana, Baker, in Naturalist, i. (1864) 65 = tomentosa.
Jundzilliana, Bess. ex Enum. Pl. Volh. 61, 67 = canina.
jurana, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 344 = rubiginosa.
kalksburgensis x, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 144. — Europ.
kamtchatica, Vent, Jard. Cels, t. 67 = cinnamomea.
kaschgarica, Rupr. Sert. Tiansch. 46. — Turkest.
kentzensis, Rafin. Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 213 = setigera.
Kingstonia, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed II. v. 476 = centifolia.
Kluckii, Auct. = seq.
Klukii, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 118 = rubiginosa.
Kmetiana, Borb. Magyar Akad. Temész. Kozlem. xvi. (1880) 437, 454. — Hungar.
Kosciuskiiana, Bess. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen = montana.
Kosingtoniana, G. Don, Gen. Syst. ii. 565 = seq.
Kosinsiana, Bess. Enum. Pl. Volh. 64 = canina.
Kotschyana, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 3. — Persia.
Krockeri, Tratt. Ros. ii. 231. — Europ.
labadora, Hort. Hamb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 469. — Labrador.
lacea, Roess. Rosen, ii. 56. — Hab. ?
lacerans, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 85. — Persia.
laciniata, Lej. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 620 = canina ?
lactea, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 337 = stylosa.
lacteola, Waitz, ex Steud. Nom. ed. I. 700 = centifolia.
lactiflora, Déségl. in Fourr. Cat. Cours du Rhone (1869), 76 = rubiginosa.
ladanifera, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iv. (1871) 173 = agrestis.
laevigata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 295. — Am. bor.
laevigata, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 61. — Europ.
laevipes, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 298 = sepium.
laevis, Boullay, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 244 = gallica.
lagenaria, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 553 = alpina.
Laggeri, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 118. — Europ.
lanceolata, Opiz, in Flora, v. (1822) 268 = canina.
latebrosa, Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 170 = canina.
latispina, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 49 = cabulica.
Lattuga, Savi, Fl. Ital. i. 99 = centifolia.
Laurentiae, Andr. Ros. t. 75 = seq.
Lawranceana, Sweet, Hort. Suburb. Lond. (1818) 119. — China.
laxa, Lindl. Ros. Monog. t. 3 = lucida.
laxa, Retz. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 39. — Sibir.
Ledebourii, Spreng. Syst. ii. 551 = tomentosa.
Lecana, Sweet, Guide, 195; Hort. Brit. ed. III. 214. — Hab. ?
Lehmanniana, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. xii. (1851) 287. — Turkestan.
Lemaitrei, Ripart, in Verlot, Cat. Pl. Dauph. 394 = canina.

ROSA :—

- Lemanii*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 230 = micrantha.
lepida, Waitz, ex Tratt. Ros. i. 22. — Hab. ?
Lereschii, Rapin, in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 237. — Europ.
Leschenaultiana, Red. & Thory, ex Wight & Arn. Prod. 301. — Ind. or.
leucantha, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 338; Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 352 = canina.
leucochroa, Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 316 = stylosa.
Leveillei, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxx. — Gallia.
Lheritierana, Red. Ros. iii. 21 = alpina.
libanotica, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 4 = glutinosa.
Libertiana, Tratt. Ros. ii. 80 = micrantha.
Likana, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. li. (1880) 31 = gallica.
Lindleyana, Tratt. Ros. ii. 190 = involucrata.
Lindleyi, Spreng. Syst. ii. 647 = lucida.
Lindleyi, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 367 = moschata.
Linkii, Debnh. Revista Napolit. i. iii. 163; ex Walp. Rep. ii. 12 = multiflora.
lionensis, Roess. Rosen, i. 90. — Hab. ?
litigiosa, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 239, 267 = canina.
livescens, Bess. Cat. Hort. Crem. Suppl. iv. 19; et Enum. Pl. Volh. 29 = canina ?
livida, Host, Fl. Austr. ii. 25 = ferruginea.
Lloydii, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 391 = canina.
longepedunculata, La Soie, in Christ, Rosen Schw. (1873) 180 = montana.
longicuspis, Bertol. Misc. Bot. xxi. 15 = macrophylla.
longifolia, Willd. Sp. Pl. ii. 1079 = indica.
Longii x, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 470.
Loureiriana, G. Don, Gen. Syst. ii. 585. — China; Cochinch.
Lucandiana, Déségl. & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 36. — Gallia.
Luciae, Franch. & Rochebr. l. c. x. (1871) 324. — Japon.
lucida, Auct. ex Meehan, Nat. Flow. ii. 33. t. 9 = humilis.
lucida, Andr. Ros. t. 78. — China.
lucida, Ehrh. Beitr. iv. 22. — Am. bor.
lucida, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 444 = baltica.
lucida, Lawr. Ros. t. 84 = bracteata.
ludibunda, Gren. & Paill. in Gren. Rev. 69 = canina.
lugdunensis, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 141 = agrestis.
lugdunensis, Wrede, ex Breit. Hort. Breit. 425 = lionensis.
lurida, Andr. Ros. t. 92 = ferruginea.
lusitanica, Roess. Rosen, iii. 219. — Lusit.
Lusseri, Lagg. & Puget, in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 42 = ferox.
lutea, Brot. Fl. Lusit. ii. 337 = hemisphaerica, Herrm.
lutea, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11; Lam. Fl. Fr. iii. 132 = R. Eglanteria.
lutescens, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 735 = blanda.
lutetiana, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 93 = canina.
Lyellii, Lindl. Ros. Monog. 12. t. 1 = involucrata.
lyonensis, Steud. Nom. ed. I. 700 = lionensis.
Lyoni, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 345 = humilis.
Macartnea, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 351 = laevigata.
Macartnea, Dum.-Cours. l. c. ed. II. v. 483 = bracteata.
macrantha, Desf. Fl. Sarthe, 77 = canina.
macroacantha, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 314 = canina.
macrocarpa, Boiss. Fl. Orient. ii. 684. — As. Min.
macrocarpa, Mérat, Fl. Par. 190 = canina.
macrocarpa, Nutt. ex Rafin. Med. Bot. ii. 258 = nutkana.
macrodonata, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxx. — Gallia.
macrophylla, Lindl. Ros. Monog. 35. t. 6. — Reg. Himal.; China.
macropoda, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 265 = spinosissima.
macrostylis, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 132 = arvensis.
Maerklini, Dierb. in Flora, xi. (1828) 1. Erg. 108. — Austria.

ROSA:—

- maialis, Desf. *Fl. Atlant.* i. 400.—Afr. bor.
majalis, Borrer, in Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 201 =
acicularis?
majalis, Herrm. *Diss.* 8 = cinnamomea.
majalis, Wallr. *Ros.* 164 = ferruginea.
Makeka, Dupont, ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 622 =
gallica.
maldensis, Roess. *Ros.* ii. 3.—Hab.?
malmundariensis, Lej. *Fl. Spa.* i. 231 = canina.
Malyi, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (1869) 325.
—Europ.
Mandonii, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,
xxviii. (1872) 111 = canina.
Manettii, Hort.—*Cf. Gard. Chron.* (1849) 724, 742.—
Hab.?
maracandica, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* xii.
(1851) n. vii. 286.—Turkestan.
Marciana, Boullu, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiii. (1876)
p. lxxvi = tomentosa.
Mareyana, Boullu, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*
xv. (1876) 556, sphalm. = praec.
marginata, Wallr. *Ann. Bot.* 68 = canina.
marisensis, Simck. & H. Braun, in *Termész. Füzetek*,
ix. (1855) 40.—Europ.
maritima, Wrede, ex Breit. *Hort. Breit.* 425.—
Europ.
marmorea, Roess. *Ros.* i. 186.—Hab.?
marsica, Godet, in *Nouv. Giorn. Bot. Ital.* ix. (1877)
162.—Italia.
Martini, Gren. *Fl. Jurass.* (1864) 242 = canina.
massiliensis, Breit. ex Steud. *Nom.* ed. I. 700; ed. II.
ii. 470.—Hab.?
Mathonneti, Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii. (1869)
263 = spinosissima.
matraënsis ×, Borb.—*Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiv.
(1884) 261.—Europ.
Maukschii, Kitz. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 588 =
scepusiensis.
Maukschii, Schult. *Oestr. Fl.* ed. II. ii. 69.—Hungar.
maxima, Desf. *Tabl.* ed. I. 174 = centifolia.
Maximiliani, Nees, in *Neuwied, Reise Nord-Am.* ii.
434 = Woodsii.
Maximowicziana, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* v.
(1877) 378 = multiflora?
media, Hort. ex DC. *Prod.* ii. 620 = centifolia.
media, B. Martin.—*Cf. Bull. Soc. Bot. Fr.* xxx. (1883)
Bibl. 186.—Gallia.
medioxima, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-*
Loire, xxviii. (1872) 110 = canina.
megacarpa, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 460
= nutkana?
megalocarpa, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-*
Loire, xxviii. (1872) 117.—Europ.
melanocarpa, Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 57 =
spinosissima.
meldensis, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II. v. 474 =
centifolia.
menstrua, Andr. *Ros.* t. 50 = damascena.
menstrualis, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II. v. 486 =
praec.
mentita, Déségl. in *Billotia*, i. (1864) 43 = agrestis.
meridionalis, Burm. & Gremli, *Roses Alpes-Marit.* 75
= canina.
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 354.
—Mexic.
mexicana, Willd. ex Spreng. *Syst.* ii. 555.—Mexic.
Meyeniana, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 470.—Chili.
micans, Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xv. (1876) 555
= tomentosa.
micrantha, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. II. ii. 182, in obs. =
rubiginosa.
micrantha, DC. *Fl. Fr.* vi. 539 = canina.
micrautha, Sm. *Engl. Bot.* t. 2490.—Europ.; As. Min.
microcarpa, Bess. *Cat. Hort. Crem.* (1811) Suppl. iv.
20; *Enum. Pl. Volh.* 18, 60, 62, 81 = spinosissima.
microcarpa, Lindl. *Ros. Monog.* 130. t. 18.—China.
microcarpa, Retz. in *Hoffm. Phylog. Blätter*, i.
(1803) 40.—Sibir.
microphylla, Desf. *Fl. Atlant.* i. 401 = sempervirens.
microphylla, Roxb. *Hort. Beng.* 38; *Fl. Ind.* ii. 515.—
China.
microphylla, Willd. ex Spreng. *Syst.* ii. 547 =
Willdenowii.
microtypus ×, Borb. & Vukot.—*Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.*
xxxiv. (1884) 260.—Europ.
millesia, Linn. *Amoen. Acad.* iv. 484 (Quid?).—
Gallia.

ROSA:—

- miniata, Wrede, ex Steud. *Nom.* ed. I. 700; ed. II. ii.
470.—Europ. austr.
minima, Hort. *Cantab.*—*Cf. Gard. Chron.* (1881) i.
242.—Hab.?
minima, Roess. *Rosen*, 139.—Hab.?
minuta, Bor. ex Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-*
Loire, x. (1861) 167 = pomifera.
minuta, Hort. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 470.—
Hab.?
minutifolia, Parry, in *Bull. Torrey Bot. Club*, ix.
(1882) 97.—Calif.
mirabilis, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,
xxviii. (1872) 101 = gallica.
mirogojana, Vukot. & H. Braun, ex Kern. *Sched. Fl.*
Exsicc. iii. 47 = gallica.
Missonia, Hort. ex Steud. *Nom.* ed. I. 700; ed. II. ii.
470.—Hab.?
missouriensis, Hort. ex Steud. *l. c.* II. ii. 470.—
Am. bor.?
mitis, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.*
xii. (1860) 84 = lacerans.
mitissima, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iv. 358 = spinosissima.
mixta, Chab. in *Cariot. Etud. Fleurs*, ii. (1865)
677 = gallica.
mixta, Tratt. *Ros.* i. 136 = alpina.
modesta, Ripart, ex Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii.
(1869) 260 = stylosa.
mollis, Ledeb. ex Spreng. *Syst.* ii. 551 = tomentosa.
mollis, J. C. Presl, *Fl. Čech.* 102.—Europ.
mollis, Sm. *Engl. Bot.* t. 2459 = mollissima.
mollissima, Willd. *Prod. Fl. Berl.* 437.—Europ.;
As. Min.
monophylla, Hort. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 470 =
berberifolia.
monspeliaca, Gouan, *Fl. Monsp.* 255 = alpina.
monstrosa, Hort. ex Breit. *Hort. Breit.* 425 = centi-
folia.
montana, Chaix, in *Vill. Hist. Pl. Dauph.* i. 346;
iii. 547.—Europ.
montana, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 532 = tomentosa.
montana, Murith, *Bot. Val.* 91 = alpina.
montana, Stev. ex Spreng. *Syst.* ii. 552 = canina.
Montezumae, Humb. & Bonpl. ex Red. & Thory, *Ros.*
i. 55.—Mexic.
monticola, Rapin, *Cant. Vaud.* ed. II. 194 = canina.
montivaga, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,
xxviii. (1872) 107 = canina.
Moorcroftii, Wall. *Cat. n.* 693 = R. Eglanteria?
moschata, Benth. *Fl. Hongk.* 106 = Luciae.
moschata, Herrm. *Diss.* 15.—Oriens.
mosquensis, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 200 = cinna-
momea.
mucronulata, Déségl. in *Godet, Fl. Jura, Suppl.* (1869)
71 = canina.
multiflora, Andr. *Ros.* t. 83 = japonica.
multiflora, Benth. *Pl. Hongk.* 107 = microcarpa.
multiflora, Buch.-Ham. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.*
ii. 365 = involucrata.
multiflora, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. I. iii. 346.—
Hab.?
multiflora, Reyn. ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 620 =
ferruginea.
multiflora, Thunb. *Fl. Jap.* 214.—Japon; China.
multiflora, Wrede, ex Roess. *Ros.* 68 = centifolia.
multivaga, Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xiv. (1875)
341 = rubiginosa.
Mureti ×, Rapin, *l. c.* 236.—Europ.
muricata, Waitz, ex Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 56.
—Hab.?
Murithii, Puget, in *Bull. Soc. Murith.* iii. (1875) 55 =
pomifera.
muscosa, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 22 = gallica.
mutabilis, Bradbury, ex James, in *Long's Exped.* i. 69
= setigera.
mutabilis, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II. v. 475 =
gallica.
mutica, O. F. Muell. in *Fl. Dan.* t. 688 = blanda,
cinnamomea.
myriacantha, DC. *Fl. Fr.* iv. 439 = spinosissima.
myriantha, Carr. in *Rev. Hort.* (1865) 448.—Calif.
myriopolarum, Steud. *Nom.* ed. I. 700 = damascena.
myrtifolia, Hall. *f. ex Steud.* *l. c.* = agrestis.
nana, Thory, *Ros.* 80 = spinosissima.
nankinensis, Lour. *Fl. Cochinch.* 324 = indica.
nanula, Hoffm. *Verz. Pfl.* 108.—China.
napaulensis, Andr. *Ros.* t. 82 = moschata.
nebrodensis, Guss. *Fl. Sic. Syn.* i. 563 = canina.

ROSA:—

- neglecta*, Léman, in *Journ. Phys.* lxxxvii. (1818) 367,
nomen.—Gallia.
neglecta, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xv.
(1876) 524 = agrestis.
nemoralis, Léman, in *Bull. Soc. Philom.* (1818) 94.—
Gallia.
nemorivaga, Déségl. in *Billotia*, i. (1864) 40 = flexuosa.
nemorosa, Libert, in *Lej. Fl. Spa.* ii. 311 = micrantha.
memorum, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*
xv. (1876) 245 = gallica.
nepalensis, Lindl. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 470 =
moschata.
nevadensis, Crép. in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.*
iii. 210 = stylosa.
nitens, Desv. in *Mérat, Fl. Par.* (1812) 192 = canina.
nitida, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 544.—Am. bor.
nitidula, Bess. *Enum. Pl. Volh.* 20, 61, 67 = canina.
nivalis, Donn, *Cat. Hort. Cantab.* ed. VIII. 170 = invo-
luta.
nivea, DC. *Cat. Hort. Monsp.* 137 = laevigata.
nivea, Dupont, ex Lindl. in *Bot. Reg.* sub t. 861 =
moschata.
nivea, Hort. ex Steud. *Nom.* ed. I. 700 = centifolia.
nivea, Rafin. in *Ann. Gén. Sc. Phys.* v. (1870) 218 =
blanda.
Noisettiana, Bosc, *Encyc. Agric.* vii. 705 = seq.
Noisettiana, Red. *Ros.* ii. 77 = indica.
normandica, Hort. ex Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II.
v. 476 = centifolia.
nova, Dum.-Cours. *l. c.* ed. I. iii. 351 = oblongifolia.
nuda, Woods, in *Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 205 =
canina.
numidica, Gren. ex Déségl. in *Journ. Bot.* xii. (1874)
171.—Afr. bor.
nutkana, Presl, *Epim. Bot.* 203.—Am. bor. occ.
oblonga, Déségl. & Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot.*
Belg. xv. (1876) 332 = canina.
oblongata, Opiz, in *Lotos*, iv. (1854) 69.—Europ.
oblongifolia, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. I. iii. 351
(Quid?).—Hab.?
obovata, Lagg. & Puget, ex Cottet, in *Bull. Soc.*
Murith. iv. (1875) 23 = canina.
obovata, Rafin. in *Ann. Gén. Sc. Phys.* v. (1820) 217 =
humilis.
obscura, Puget, in *Fourr. Cat. Pl. Rhone* (1869), 75 =
canina.
obtusa, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*
xv. (1876) 352.—Gallia.
obtusifolia, Christ & Gremli, in *Gremli, Excurs. Schw.*
ed. IV. 174 = scaphusiensis.
obtusifolia, Desv. *Journ. Bot.* ii. (1809) 317 = canina.
occulta, Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii. (1869)
273 = canina.
ochroleuca, Sw. ex Thunb. in *Mus. Nat. Acad. Ups.*
App. xxiii. (1816) 26, nomen.—Sibir.
ochroleuca, Waitz, ex Wikstr. in *Vet. Acad. Handl.*
Stockh. (1820) 271, 272 = lutescens.
odorata, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 138 = indica.
odoratissima, Hort. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 470 =
indica.
odoratissima, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 354 = alpina.
Oederiana, Tratt. *Ros.* ii. 133 = spinosissima.
oenensis, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (1869) 328
= canina.
oleicarpa, Thory, *Ros.* 114 = sepium.
olympica, Donn, *Hort. Cantab.* ed. VI. 144 =
gallica.
omissa, Déségl. in *Billotia*, i. (1864) 47 = mollissima.
opaca, Gren. in *F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem.* 332
= canina.
opacifolia, Chab. in *Cariot. Etud. Fleurs*, ii. (1865)
677 = gallica.
operta, Puget, ex Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii.
(1869) 287 = micrautha.
oplisthes, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 674.—Reg. Caucas.
Opsostemma, Ehrh. *Beitr.* ii. 72 = moschata.
Orbessanea, Red. *Ros.* ii. 21 = turbinata.
oreinosa, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*
xv. (1876) 284 = alpina.
orientalis, Dupont, ex DC. *Prod.* ii. 607.—As. Min.;
Persia.
Orphanidis, Boiss. & Reut. *Diagn. Ser.* II. ii. 50 =
Heckeliana.
orthacantha, Kern. in *Christ, Rosen Schw.* (1873) 168
= canina.
orthosepala, Schimp. & Spenn. in *Spenn. Fl. Friburg.*
iii. 768 = cinnamomea, ferruginea.

ROSA:—

ostensa, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426 = canina.
ovata, Lej. Fl. Spa, ii. 312 = arvensis.
oxyacantha, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 338 = spinosissima.
oxyodon, Boiss. Fl. Orient. ii. 674. —Reg. Caucas.
oxyphylla, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 315, in obs. = canina.
Ozanonii, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 88 = spinosissima.
pallens, Retz. ex Spreng. Syst. App. 200. —Suecia.
pallida, Tratt. ex Link, Handb. ii. 85 = ochroleuca.
palustris, Buch.-Ham. ex Lindl. Ros. Monog. 8 = involucreta.
palustris, Marsh. Arbust. 135; Roess. Rosen, i. 240 = R. Carolina.
pampinula, Roess. ex Steud. Nom. ed. I. 700 = R. Eglanteria.
paniculata, Hort. Genev. ex DC. Prod. ii. 600 = indica.
pannonica, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 143 = gallica.
pannosa, Link, Handb. ii. 83 = indica?
Pantoceki, Holuby, ex Pant. in Verh. Ver. Natur- u. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 117. —Europ.
papaverina, Borck. Forstbot. iii. 1814 = seq.?
papaverina, Moench, ex Roess. Rosen, i. 182 = gallica.
paradoxa, Burnat & Greml. Roses Alpes-Marit. 126 = arvensis.
parisiensis, Wrede, ex Breit. Hort. Breit. 426. —Hab.?
parviflora, Ehrh. Beitr. iv. 21 = humilis.
parvifolia, Andr. Ros. t. 56. —Hab.?
parvifolia, Ehrh. Beitr. vi. 97 = centifolia.
parvifolia, Lindl. Ros. Monog. 70 = humilis.
parvifolia, Pall. Fl. Ross. i. ii. 62 = spinosissima.
parvula, Gren. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1869) 287. —Europ.
parvula, Guss. ex Nym. Consp. 233 = rubiginosa.
parvula, Sauzé & Maill. Cat. Pl. Deux-Sèvres (1864), 27 = stylosa.
patenti-ramea, Debeaux, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxi. (1882) 56 = ferruginea.
pauciflora, Lindl. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 179. —Sibir.
pellita, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 555 = tomentosa.
pellucina, Arv. ex Déségl. l. c. 259 = spinosissima.
pendula, Salisb. Prod. 359 = spinosissima.
pendulina, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 208 = alpina.
pendulina, Linn. Sp. Pl. 492 = spinosissima.
pennina, La Soie, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 39 = glauca.
pennsylvanica, Andr. Ros. t. 101 = gallica vel R. Carolina.
pensylvanica, Michx. Fl. Bor. Am. i. 296 = R. Carolina.
pensylvanica, Wangenh. Beytr. Forstwiss. 113 = humilis.
pentaphylla, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 215. —China.
perfecta, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 701. —Hab.?
permixta, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 147 = ferox.
permutata, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 575. —Europ.
Perrieri, Long, ex Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 425 = montana.
persica, J. F. Gmel. Syst. 855 (nomen prius) = berberifolia.
persicifolia, Hort. ex Hoffm. Verz. Pfl. 108 = indica.
personata, Greml. Excurs. Schw. ed. IV. 178 = pomifera.
perusiana, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 582 = pomifera.
pervirens, Gren. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 257. —Hab.?
petiolaris, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 592 = carpatia.
petropensis, Ozan. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 261 = spinosissima.
phoenicia, Boiss. Diagn. Sér. I. x. 4. —Cilicia; Syria.
phrygia, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 249 = rubiginosa.
picta, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 701. —Hab.?
pilosa, Hort. ex Steud. l. c. ed. II. ii. 471. —Oriens.
pilosa, Opiz, in Flora, v. (1822) 268. —Europ.
pilosiuscula, Opiz, l. c. —Europ.

VOL. II.

ROSA:—

pimpinellifolia, Herb. Hook. f. & Thoms. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 262 = Webbiana.
pimpinellifolia, Linn. Syst. ed. X. 1062 = spinosissima.
pimpinelloides, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 349 (Quid?). —Russia.
pinnatifida, Andr. Ros. t. 41. —Europ.
pisocarpa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 382. —Am. bor. occ.
Pissardi, Carr. in Rev. Hort. (1880) 314. —Reg. Casp.
Pitcairnea, Sabine, ex Link, Handb. ii. 85 = spinosissima.
platyacantha, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 254 = xanthina.
platyphylla, Rau, Enum. Ros. 82 = canina.
platyphylloides, Déségl. & Ripart, in Fourr. Cat. Pl. Cours Rhone (1869), 75 = canina.
plicata, Bechst. Forstbot. ed. V (1843), 583. —Europ.
plicata, Roess. Rosen, ii. 58 = praec.?
podolica, Tratt. ex Link, Handb. ii. 91 = tomentosa.
Pokornyana ×, Kmet. —Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1833) 225. —Europ.
Polliniana, Spreng. Pugill. ii. 66 = arvena.
polyadena, Burnat & Greml. Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 26. —Europ.
polyantha, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 128 = multiflora.
polyanthos, Roess. Rosen, t. 35 = centifolia.
polymorpha, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 769 = canina.
polyphylla, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 37 = acicularis, spinosissima.
pomifera, Herrm. Diss. 16. —Graecia; Reg. Caucas.
pomifera, Lamotte, Cat. Pl. Centr. Fr. 38; Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 217 = mollissima.
Pommaretii, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 286. —Gallia.
pomponia, DC. Fl. Fr. iv. 443 = centifolia.
porrigens, Greml. Excurs. Schw. ed. IV. 163 = gallica.
Portenschlagiana, Tratt. Ros. ii. 203. —Hab.?
Portlandia, Hort. ex Andr. Ros. t. 19 = ruficaulis.
portlandica, Roess. Rosen, i. 240 = praec.?
portugalis, Roess. l. c. ii. 45. —Hab.?
poterifolia, Bess. Enum. Pl. Volh. 62 = spinosissima.
poterifolia, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 679 = glutinosa.
Poterium, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 366. —Gallia.
Pougeti, Bor. ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 136. —Gallia.
Pouzini, Tratt. Ros. ii. 112 = canina.
praecox, Boullu, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 571 = tomentosa.
praecox, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471. —Hab.?
praenestina, Mill. ex Thory, Ros. 92 = gallica.
praeterita, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 499 = canina.
pratensis, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 215 = humilis.
pratensis, Sw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471 = canina.
Presliana, Opiz, in Seits, Rosen (1819), 143 = mollis.
primoriensis, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxix. (1884) 44. —Europ.
procera, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471. —Sibir.
procera, Salisb. Prod. 359 = alba.
procumbens, Roxb. Hort. Beng. 38, nomen. —Ind. or.
procumbens, Ser. Mém. Bot. i. 5 = arvensis.
prolifera, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 701; ed. II. ii. 471 = multiflora.
properata, Boullu, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 571 = tomentosa.
propinqua, Déségl. l. c. xiv. (1875) 343 = rubiginosa.
prostrata, DC. Cat. Hort. Monsp. 138 = semper-virens.
protea, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 503 = trachyphylla.
provincialis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 396 = ferox.
provincialis, Herrm. Diss. 9 = gallica.
proxima, Cottet, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 248 = pomifera.
pruinosa, Baker, in Naturalist, i. (1864) 96 = canina.
pruinosa, Lindl. in Loud. Encyc. Pl. 448. —Sibir.
Pseudo-flexuosa, Ozan. ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 42 = flexuosa.

ROSA:—

Pseudo-indica, Lindl. Ros. Monog. 132 = indica.
Pseudo-lucida, Bess. ex DC. Prod. ii. 604 = baltica.
Pseudopsis, Greml. Excurs. Schw. ed. IV. 175 = canina.
Pseudo-rubiginosa, Lej. Fl. Spa, i. 229 = mollissima.
Pseudo-sepium, Callay, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 42 = agrestis.
Pseudo-vestita, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxvii. —Gallia.
psilophilla, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 501 = trachyphylla.
psilophylla, Rau, Enum. Ros. 101 = canina.
puberula, Desv. ex Ser. Mém. Bot. i. 41 = canina.
pubescens, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 94. —Gallia.
pubescens, Roxb. Hort. Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 514 = moschata.
pubescens, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24. —Europ.
Pugeti, Bor. ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 136 = flexuosa.
pulchella, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. n. 662 = gallica.
pulchella, Salisb. Prod. 358 = spinosissima.
pulchella, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 680 = orientalis.
pulchella, Willd. Enum. Hort. Berol. 545. —Hab.?
pulchella, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 196 = tomentosa.
pulverulenta, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 223 = agrestis.
pulverulenta, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 399. —Reg. Caucas.
pulverulenta, Guss. ex Nym. Consp. 232 = glutinosa.
pumila, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 353 = gallica.
punica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 = R. Eglanteria.
purpurascens, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180. —Sibir.
purpurascens, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 351. —Gallia.
purpurea ×, Hort. ex G. Don, in Load. Hort. Brit. 211.
pusilla, Rafin. in Ann. Nat. 11; et in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 218 = humilis.
pustulosa, Bertol. Fl. Ital. v. 195 = glutinosa.
Puymaurea, Gren. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 549 = rubiginosa.
pyncacantha, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 438, 448. —Hungar.
pyncephala, Christ, in Greml. Excurs. Schw. ed. IV. 169 = tomentosa.
pygmaea, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 397 = gallica.
pygmaea, Krock. Fl. Siles. ii. 154 = Krockeri.
pyramidalis, Wrede, ex Roess. Rosen, i. 67. —Hab.?
pyrenaica, Gouan, Illustr. 31 = alpina.
pyriformis, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 387 = canina.
quassata, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 439 = sepium.
racemosa, Andr. Ros. t. 49. —Gallia.
Rafinesqueiana, Tratt. Ros. ii. 234 = R. Carolina.
Rafinesquii, Ser. in DC. Prod. ii. 611 = blanda.
ramcalis, Puget, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 228 = canina.
ramosissima, Rau, Enum. Ros. 74 = canina.
ramulosa, Godr. Fl. Lorr. ed. II. i. 231 = canina.
ranunculiflora, Andr. Ros. t. 33. —Hab.?
ranunculiformis, Steud. Nom. ed. I. 701; Link, Handb. ii. 92, 93 = praec.
Rapa, Bosc, Encyc. Agric. vii. 704, 706 = lucida.
Rapini, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 72 = hemisphaerica, Herrm.
Ratonsiana, Bess. Enum. Pl. Volh. 65 = canina.
Rauti, Tratt. Ros. ii. 35 = canina.
Ravaudi, Boullu, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 295 = montana.
Ravellae, Christ, in Greml. Excurs. Schw. ed. IV. 162 = involuta.
reclinata ×, Red. & Thory, Ros. iii. 79.
recognita, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 296 = canina.
recondita, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1866) 107 = pomifera.
recurva, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 514 = moschata?
Redoutea, Thory, Ros. 43 = Reduteana.
Redowskiana, Bess. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180. —Hab.?
Reduteana, Thory, ex Red. Ros. i. 101 = nitida.

5 B

ROSA :—

- Regeliana*, Linden & André, Illustr. Hort. xviii. (1871) t. 47 = *rugosa*.
Regelii, Reut. Ind. Sem. Hort. Genev. (1867) 4.—China.
Regina, Roess. Rosen, i. 47 = *centifolia*?
Reginae, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 702 = *praec.*?
Reichenbachiana, Waitz, in *Flora*, vii. (1824) 417.—Hab.?
remensis, DC. Fl. Fr. iv. 443 = *gallica*.
remensis, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 474 = *centifolia*.
repanda, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471 (Quid?).—Scotia.
repens, Muench, Hausv. v. (1770) 281 = *gallica*.
repens, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 355 = *arvensis*.
reptans, Crép. ex Bout. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 298 = *arvensis*.
resinosa, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. ii. 233 = *mollissima*.
resinosa, Lej. Rev. Fl. Spa, 96 = *rubiginosa*.
resinosa, Sternb. in Reichb. Fl. Germ. Excurs. 616 = *pomifera*.
resinosoides, Crép. in Cottet, 'in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 44 = *mollissima*.
reticulata, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 332 = *canina*.
Reuteri, Godet, Fl. Jura, 208, in obs. = *glauc.*
reversa, J. & C. Presl, Fl. Cech. 103 = *alpina*.
reversa, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 293. t. 264 = *spinosissima*.
Reynieri, Hall. f. in Roem. Arch. i. II. (1797) 7 = *montana*.
rhaetica, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 164 = *rubiginosa*.
rhemensis, Roess. Rosen, ii. 64.—Hab.?
Rhodani, Chab. ex Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxiv = *arvina*.
rhoetica, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 304 = *glauc.*
rhombifolia, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxiii.—Gallia.
rhynchocarpa, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 331, in obs. = *canina*.
rigida, Willd. ex Déségl. l. c. xi. (1872) 84 = *ferox*.
rigidula, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 23 = *canina*.
riparia, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 216 = *humilis*.
Ripartii, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 87 = *spinosissima*.
Robertsoni, Baker, ex Syme, Engl. Bot. ed. III. iii. 207 = *involuta*.
Rosenbergiana, Red. & Thory, Ros. ii. 113 = *turbinata*.
rossica, Pall. ex Spreng. Neue Entdeck. iii. 254 = *spinosissima*.
rothomagensis, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 297 = *agrestis*.
rotundifolia, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 617 = *rubiginosa*.
Roussellii, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 353 = *canina*.
Roxburghii, Tratt. Ros. ii. 233 = *microphylla*.
Roxburghii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138 = *multiflora*.
rubella, Sm. Engl. Bot. t. 2521 = *spinosissima*.
rubella, Winch, ex J. Hogg, in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 198 = *spinosissima*.
rubelliflora, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 109 = *canina*.
rubeoides, Andr. Ros. t. 84 = *macrophylla*?
rubescens, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 110 = *canina*.
rubicunda, Hall. f. in Roem. Arch. i. II. (1797) 6 = *ferruginea*.
rubifolia, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 260 = *setigera*.
rubifolia, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxix. (1884) 21 = *subalbida*.
rubiginosa, Coss. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 344 = *canina*.
rubiginosa, Linn. Mant. ii. 564.—Europ.; Reg. Caucas.
rubiginosa, Webb, ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 446 = *micrantha*.
rubra, Lam. Fl. Fr. iii. 130 = *gallica*.
rubricans, Roess. ex Steud. Nom. ed. I. 702 = *centifolia*?
rubrifolia, Rupr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 684 = *haematos.*
rubrifolia, Vill. ist. Pl. Dauph. iii. 549 = *ferruginea*.

ROSA :—

- rubripetala*, Roem. Hort. Turic. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 472.—Hab.?
rubripina, Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 715 = *nitida*.
ruficaulis, Ehrh. Beitr. vii. 138.—Am. bor.
Ruga ×, Lindl. in Bot. Reg. t. 1389.
rugibinosa, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 251, sphalm. = *rubiginosa*.
rugosa, Dematra, Monog. Ros. (1818) 4 = *Friesii*.
rugosa, Thunb. Fl. Jap. 213.—Japon.
rupestris, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 32; ed. II. 85 = *alpina*.
rupicola, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180.—Sibir. altaic.
Ruprechtii, Boiss. Fl. Orient. ii. 682.—Reg. Caucas.
ruralis, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 79 = *gallica*.
ruscinonensis, Gren. & Déségl. ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 33 = *moschata*.
Russelliana, Sincl. ex Forbes, Hort. Woburn. 117.—Hab.?
rustica, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 93 = *stylosa*.
rusticana, Déségl. in Billotia, i. (1864) 34 = *arvensis*.
sabauda, Rapin, in Bull. Soc. Hallér. (1852-53) 178 = *involuta*.
Sabina, Dupont, ex Red. Ros. i. 94 = *rubiginosa*.
Sabini, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 188 = *involuta*.
salaevensis, Christ, ex Nym. Consp. 237 = *alpina*.
salaevensis, Rapin, in Bull. Soc. Hallér. (1852-53) 178 = *montana*.
salaevensis, Verlot, Cat. Pl. Dauph. 115 = *montana*.
salicifolia, Red. Ros. iii. 121 (Index) = *R. Carolina*.
Salisii ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 63.—Europ.
salpanensis, La Soie, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 43 = *ferox*.
Sambrancheriana, La Soie, ex Cottet, l. c. 39 = *glauc.*
sancta, Andr. Ros. t. 98.—Europ.
sancta, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 262.—Abyssin.
sanguinea, Roess. ex Red. Ros. i. 76 = *gallica*.
sanguisorbaefolia, Nois. ex Red. l. c. ii. 8 = *turbinata*.
sanguisorbifolia, Donn, Cat. Hort. Cantab. ed. VIII. 169 = *spinosissima*.
sanguisorbifolia, La Soie, in Christ, Rosen Schw. (1873) 181 = *montana*.
sarmentacea, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 213 = *canina*.
saxatilis, Hort. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 276 = *Fischeriana*.
saxatilis, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. 349 = *canina*.
saxigena, H. Braun.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 410 = *canina*.
Sayi, Schwein. in Long, Exped. Winneb. ii. 388.—Am. bor.
scabrata, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 241 = *canina*.
scabrata, Henning, in Mém. Soc. Nat. Mosc. vi. (1823) 88.—Reg. Caucas.
scabriuscula, Winch, ex Sm. in Engl. Bot. t. 1896 = *tomentosa*.
scandens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = *semper-virens*.
scandens, Moench, Verz. Ausl. Baeume, 118 = *arvensis*.
scaphusiensis, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 175.—Helvet.
seepusiensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 588.—Hungar.
schergiana, Boiss. Fl. Orient. ii. 686.—Syria.
Scheutzii, Christ, in Flora, lvii. (1874) 511 = *mollissima*.
Schimperiana, Hochst. l. c. xxiv. (1841) i. Intell. 31 = *abyssinica*.
Schmidtii, H. Braun, Beitr. Kenntn. Gatt. Rosa (1885), 14 [72].—Europ.
Schottiana, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 358 = *canina*.
Schrenkiana, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 31.—As. centr.
Schultzii, Ripart, in F. Schultz, Fl. Fr. et Allem. 254 = *glauc.*
sciaphila, Schur, Enum. Pl. Transs. 202 = *rubiginosa*.
sclerophylla, Schütz, Stud. Skand. Rosa (1872), 20 = *canina*.
Scopoliana, Tratt. Ros. [i.] ii. 229 = *cinnamomea*.

ROSA :—

- scopulorum*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1882) 545.—Gallia.
scotica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *spinosissima*.
scotophylla, Boullu, in Carlot, Etude Fleurs, ed. VII. ii. (1884) 242.—Gallia.
semiglabra, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 240 = *canina*.
semiglandulosa, Ripart, l. c. xv. (1876) 500 = *canina*.
semperflorens, Curt. Bot. Mag. t. 284.—China.
semperflorens, Desf. Tabl. ed. I. 175 = *damascena*.
semperflorens, Desv. Obs. (1818) 154 = *gallica*.
sempervirens, Bast. Ess. Fl. Maine-et-Loire, 188 = *canina*.
sempervirens, Dup. ex Steud. Nom. ed. I. 702 = *moschata*.
sempervirens, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 368 = *Leschenaultiana*.
sempervirens, Linn. Sp. Pl. 492.—Europ.; Oriens; Ind. or.
sempervirens, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 218 = *rubiginosa*.
sentiosa, Achar. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1813) 91. t. 13 = *canina*.
separabilis, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 30.—Europ.
seperina, Sauzé, ex Déségl. l. c. xv. (1876) 217 = *arvensis*.
sepicola, Sw. ex Fries, Novit. ed. II. 147 = *canina*.
sepium, Lam. Fl. Fr. iii. 129; Borck. ex Rau, Enum. 90 = *canina*.
sepium, Thuill. Fl. Par. ed. II. 252 = *agrestis*.
seposita, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 28.—Gallia.
septicola, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 149 = *micrantha*.
Serafini, Viv. Fl. Lib. Spec. 67 = *seq.*
Seraphini, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 8 = *agrestis*.
sericea, Lindl. Ros. Monog. 105. t. 12.—Reg. Himal.
Seringeana, Godr. Fl. Lorr. ed. II. 255 = *tomentosa*.
serotina, Donn, ex Thory, Ros. 142.—Hab.?
serpens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 238 = *canina*.
serpens, Wibel, Prim. Fl. Werth. 266 = *arvensis*.
Serrae, Dehnh. Rev. Napol. i. III. 163; ex Walp. Rep. ii. 11 = *bracteata*.
serrulata, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 218 = *humilis*.
sertorum, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 703 = *perfecta*.
setigera, Michx. Fl. Bor. Am. i. 295.—Am. bor.
setosa, Bess. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen.—Podolia.
setulifera, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 511 = *flexuosa*.
Sherardi, Davies, Welsh Botanol. 49 = *tomentosa*.
sibirica, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 78 = *canina*.
sibirica, Tratt. Ros. ii. 230 = *spinosissima*.
sicula, Tratt. l. c. 68 = *Heckeliana*.
Sieboldi, Crép. ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 136.—Japon.
Silverhielmii, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. ii. (1844) 195.—Rossia.
similata, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 38 = *canina*.
Simkoviczii, Kmet, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 18.—Europ.
simplex, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 353 = *cinnamomea*.
simplicifolia, Salisb. Prod. 359; Pers. Syn. ii. 47 = *berberifolia*.
sinica, Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 261 = *laevigata*.
sinica, Desf. ex DC. Prod. ii. 606 = *blanda*.
sinica, Hook. Bot. Mag. t. 2847 = *laevigata*.
sinica, Murr. Syst. ed. XIII. 394 = *indica*.
sinica, Tratt. Ros. i. 89 = *semperflorens*.
sinuatidens, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 168 = *canina*.
Sirei, Christ, l. c. 162 = *spinosissima*.
Solandri, Tratt. Ros. ii. 150 = *blanda*.
solstitialis, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 324 = *canina*.
soongarica, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 226 = *cinnamomea*.
sorbifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 703; ed. II. ii. 473 = *spinosissima*.
spathulacifolia, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxix. (1884) 48.—Europ.
speciosa, Andr. Ros. t. 26.—Hab.?
speciosa, Déségl. in Billotia, i. (1864) 39 = *flexuosa*.

ROSA:—

- sphaerocarpa*, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 279 = canina.
- sphaeroides*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 338.—Europ.
- sphaerophora*, Ripart, ex Nym. Consp. 233 = micrantha.
- spherica*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 333 = canina.
- spinatifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 473, sphalm. = spinulifolia.
- spinosissima*, Linn. *Sp. Pl.* 491.—Europ.; As. Min.
- spinosissima*, Pesneau, Cat. Pl. Loire-Inf. (1841) 181 = baltica.
- spinosissima*, Wahlenb. Fl. Upsal. 171 = cinnamomea.
- spinulifolia*, Dematra, Monog. Ros. 8 = rubiginosa.
- spithamea*, A. Gray, in Bot. Calif. ii. 444 = californica.
- Sprengeliana*, Tratt. Ros. ii. 163 = R. Carolina.
- spretia*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 89 = spinosissima.
- spuria*, Puget, ex Déségl. l. c. xxviii. (1872) 109 = canina.
- squarrosa*, Rau, Enum. Ros. 77 = canina.
- stebonensis*, Roess. Rosen, i. 238 = canina.
- stenocarpa*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 113 = micrantha.
- stephanocarpa*, Déségl. & Ripart, l. c. 115 = montana.
- stipulacantha*, Bast. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 356 = canina.
- stipularis*, Méral, Fl. Par. 192 = canina.
- striata*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 703 = gallica.
- stricta*, Macoun & Gibs. in Trans. Bot. Soc. Édinb. xii. (1876) 324 = blanda.
- stricta*, Muhl. Cat. 50 = spinosissima.
- stupenda*, Crép. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 684 = macrocarpa.
- stylosa*, Desv. *Journ. Bot.* ii. (1809) 317.—Europ.
- stylosa*, Pers. Syn. ii. 47 = arvensis.
- suaveolens*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 346 = rubiginosa.
- suavifolia*, Lightf. Fl. Scot. 262 = rubiginosa.
- suavis*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 37.—Hab. ?
- subalba*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 472.—China.
- subalbida*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxix. (1884) 21.—Europ.
- subcinnamomea*, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 261 = canina.
- subcristata*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 97 = canina.
- subdola*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 528 = agrestis.
- subdola*, Kmet, ex H. Braun, in Flora, lxviii. (1885) 114 = Borbasiana.
- Suberti*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 352 = canina.
- subglobosa*, Sm. Engl. Fl. ii. 38 = tomentosa.
- subhispidia*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxix. (1884) 39.—Europ.
- subhybrida*, Borb. ex Vukot. l. c. 20.—Europ.
- subinermis*, Bess. ex Déségl. in Bull. Soc. Sc. Angers, (1878).—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. (1878) Bibl. 107.—Europ.
- subinermis*, Chab. in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 173 = gallica.
- subintrans*, Gren. ex Déségl. in Billotia, i. (1869) 121 = canina.
- sublaevis*, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxi.—Gallia.
- submirra* x, Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeit. xxxiv. (1884) 260.—Europ.
- submissa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxix. (1884) 17.—Europ.
- submitis*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 332 = canina.
- subolida*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 124 = flexuosa.
- subrubra*, Thory & Red. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 472 = R. Eglanteria.
- subsessiliflora*, Boullu, in Feuille. Jeunes Nat. x. (1879–80) 89.—Europ.
- subumbellata*, Schur, Enum. Pl. Transs. 203 = indica ?
- subvillosa*, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 866.—Gallia.
- Sufferti*, Kirsch. Fl. Alsat. i. 247 = tomentosa.
- sulfurea*, Thory, Ros. 123 = R. Eglanteria.
- sulphurea*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 201 = hemisphaerica, Herrm.
- superbissima*, Waitz, ex Steud. Nom. ed. I. 703; ed. II. ii. 472.—Hab. ?

ROSA:—

- surculosa*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 223 = canina.
- Swartziana*, Fries, Fl. Halland. 87 = canina.
- Swartzii*, Billb. in Svensk Fl. t. 541 = praec.
- sylvatica*, Gater. Pl. Montaub. 94 = gallica.
- sylvestris*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 30; ed. II. 84.—Europ.
- sylvestris*, Herrm. Diss. 10 = arvensis.
- sylvestris*, Lindl. Syn. Brit. Fl. 101 = tomentosa.
- sylvestris*, Schrank, Baier. Fl. ii. 23 = canina.
- sylvicola*, Déségl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 122 = rubiginosa.
- sylvularum*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 333.—Europ.
- syntrichostyla*, Ripart, l. c. 312 = canina.
- systyla*, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 31 = stylosa.
- systylomorpha*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 229 = canina.
- sytnensis*, Kmet, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 28.—Hungar.
- Szaboi, Borb.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 338.—Europ.
- tartarica*, Roess. Rosen, ii. 52.—Hab. ?
- taurica*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 394 = canina.
- teneriffensis*, Donn, Cat. Hort. Cantab. ed. VI. 143 (Quid ?).—Ins. Teneriff.
- tenuiglandulosa*, Méral, Fl. Par. 189 = rubiginosa.
- tenuis*, Beck, Fl. Frankf. i. 285 = spinosissima.
- terebinthacea*, Bess. Enum. Pl. Volh. 21, 61, 66 = tomentosa.
- terebinthacea*, Bess. ex Spreng. Syst. ii. 551.—Galicia.
- terebinthinacea*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 159 = flexuosa.
- terebinthinacea*, Gren. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 235 = canina.
- ternata*, Poir. Encyc. vi. 284 = laevigata.
- tetrapetala*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 208. t. 42 = sericea.
- Thea*, Savi, Fl. Ital. ii. 17. t. 47 = indica.
- Thedenii*, Scheutz, Stud. Skand. Ros. (1872) 27.—Europ. bor.
- Thomasii*, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 24 = flexuosa.
- Thoryi*, Tratt. Ros. ii. 85 = multiflora ?
- Thunbergii*, Tratt. l. c. i. 86 = multiflora.
- thuringiaca*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 319.—Europ.
- thuringiaca*, Link, Handb. ii. 94.—Europ. med.
- thyrsiflora*, Leroy, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 204.—Japon.
- Timeyoyi*, Chab. in Cariot, Etud. Fleurs, ed. V. ii. 189 = canina.
- tirolensis*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 331 = canina.
- tolosana*, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iv. (1870) 173.—Europ.
- tomentella*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 94 = canina.
- tomentosa*, Sm. Fl. Brit. ii. 539.—Europ.; As. Min.
- tortuosa*, Wierzb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 232 = canina.
- torulosa*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 366 = macrophylla.
- Touranginiana*, Déségl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 102 = canina.
- trachyphylla*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 228 = canina.
- trachyphylla*, Rau, Enum. Ros. 124.—Europ.
- transalpina*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 163 = arvensis.
- transiens*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 8 = glauca.
- transmota*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1876) 239 = canina.
- transsilvanica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 202 = canina.
- trichocarpa*, Waitz, ex Tratt. Ros. ii. 45 = alba ?
- trichoides*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 386.—Gallia.
- trichoneura*, Ripart, ex Crép. l. c. viii. (1869) 240 = canina.
- tricolor*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 703; ed. II. ii. 473.—Hab. ?
- triflora*, Chab. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 245 = gallica.
- trifoliata*, Bosc, Dict. Agric. ed. II. xiii. 280 = laevigata.

ROSA:—

- trifoliolata*, Rafn. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 213 = setigera.
- triphylia*, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 515 = anemoneflora, Fortune.
- tristis*, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 568 = tomentosa.
- tuguriorum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 544 = arvensis.
- tunoniensis*, Déségl. in Billotia, i. (1864) 46 = tomentosa.
- turbinata*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 206.—Europ.
- turbinata*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 550 = alpina.
- turbinella*, Sw. ex Spreng. Syst. ii. 554 = cinnamomea.
- turgida*, Pers. Syn. ii. 49 = blanda.
- turkestanica*, Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 349.—Turkestan.
- tuschetica*, Boiss. Fl. Orient. ii. 673.—Reg. Caucas.
- tyroliensis*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 495 = tirolensis.
- ucenensis*, Boullu, in Cariot, Etud. Fleurs, ed. VII. ii. (1884) 256 = rubiginosa.
- uliginosa*, Bray, ex Fleisch. & Lindem. Fl. Deutsch. Ostseeprov. 179 (Quid ?).—Prov. balt.
- uliginosa*, Gilib. Fl. Lithuan. Inchoat. Collect. v. 240.—Hab. ?
- umbellata*, Leers, Fl. Herborn. 117, 286 = rubiginosa.
- umbellata*, Leyss. Fl. Hal. 92; Libert, in Lej. Fl. Spa. ii. 313 = canina.
- umbellifera*, Sw. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 570 = tomentosa.
- Uncinella*, Bess. Cat. Pl. Hort. Crem. (1811) Suppl. iv. 21 = canina.
- uncinelloides*, Puget, ex Nym. Consp. 235 = canina.
- undulaeflora*, Andr. Ros. t. 108.—Am. bor.
- unguicularis*, Bertol. Misc. Bot. xxii. 15. t. 3 = Webbi-ana.
- unguiculata*, Desf. Tabl. ed. I. 175 = centifolia.
- unica*, Hort. ex Hoffmgg. Verz. Pfl. 109 = centifolia.
- urbica*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 93 = canina.
- uriensis*, Lagg. & Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 28 = tomentosa.
- usitatissima*, Gater. Pl. Montaub. 94 = alba.
- ustalica*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxix. (1884) 14 = alpina.
- Vaillantiana*, Bor. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 224 = agrestis.
- valesiaca*, Lagg. & Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 43 = canina.
- Vanheurckiana*, Crép. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 683.—Armenia.
- varia*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 775 = gallica.
- varians*, Pohl, ex Link, Handb. ii. 93 (Quid ?).—Europ.
- Vayredae*, Costa, ex Vayr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xi. (1882) 83.—Hab. ?
- velutina*, [Clairv.] Man. Herb. 163 = tomentosa.
- velutinaeflora*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 100 = gallica.
- venosa*, Sw. ex Spreng. Syst. ii. 554 = glauca.
- Ventenatiana* x, Red. & Thory, Ros. iii. 83.
- venusta*, Scheutz, Stud. Skand. Rosa (1872), 36 = mollissima.
- venusta*, Waitz, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 613 = alpina.
- vepretorum*, Link, Handb. ii. 91 = canina.
- verecunda*, Waitz, ex Tratt. Ros. i. 21.—Hab. ?
- Verloti*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 274 = canina.
- versicolor*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 703 = gallica.
- versicolor*, Steud. l. c. = spinosissima.
- versicolor*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 63 = agrestis.
- verticillacantha*, Méral, Fl. Par. 190 = canina.
- vestita*, Godet, Fl. Jura, 210 = tomentosa.
- vestita*, Sternb. in Flora, ix. (1826) i. Beil. 77 = ferruginea.
- Vetteri*, Favr. in Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. i. 10 = cinnamomea.
- Viburnum*, Red. Ros. ii. 58 = centifolia.
- vicina*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 241 = canina.
- Villarsiana*, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 612 = spinosissima.
- Villarsii*, Tratt. ex Link, Handb. ii. 86 = alpina.

ROSA:—

- villosa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 395 = mollissima.
villosa, Falk, Beitr. ii. 191 = tomentosa.
villosa, Linn. Sp. Pl. 491.—Europ.; As. med.
villosa, Pall. Fl. Ross. ii. 63 = pomifera.
villosa, Sm. Engl. Bot. t. 583 = involuta, pomifera.
villosiuscula, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 266 = canina.
villosula, Paill. Rev. Fr. Conté, 362; ex Billotia, i. (1869) 119 = canina.
Vilmosina, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 704; ed. II. ii. 473 = gallica.
viminea, Lindl. Ros. Monog. 49.—Rossia.
vinacea, Baker, in Naturalist, i. (1864) 101 = canina.
vinealis, Ripart, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 36 = canina.
vinetorum, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 499 = canina.
vinodora, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 329 = agrestis.
violacea, Hort. ex Roess. Rosen, i. 200 = gallica.
virescens, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 73 = gallica.
virgata, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 177 = canina.
virginialis, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 704 = centifolia?
virginica, Ripart, ex Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 167 = stylosa.
virginiana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10; Duroi, Harbk. Baumz. ii. 353 = R. Carolina.
virginica, Roess. Rosen, t. 13; Spreng. Nov. Prov. 36 = pracc.
virgultorum, Ripart, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 44 = agrestis.
viridicata, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 239, 266 = canina.
viscida, Puget, ex Crép. l. c. 241 = canina.
viscida, Schultz, in Flora, viii. (1825) 11. Beibl. 78.—Europ.
viscida, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 61.—Bohemia.
viscidula, Gren. ex Bouv. in Bull. Inst. Nat. Genève. xix. (1875) 107.—Europ.
viscosa, Jan, Cat. 8 = agrestis.
vogesiaca, Desport. Ros. Gall. (1828) 88 = glauca.
Vukotinovicii, Borb. ex Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxix. (1884) 23 = alpina.
vulpina, Wallr. Rosae Hist. (1828) 201 = R. Eglanteria.
Waiziana, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 870 = Reichenbachiana.
Wallichii, Sabine, in Wall. Cat. n. 687 = Leschenaultiana.
Wallichii, Tratt. Ros. ii. 193 = sericea.
wasserburgensis, Kirsch. Fl. Alsat. i. (1852) 247 = flexuosa.
Watsoni, Baker, in Naturalist, i. (1864) 98 = canina.
Webbiana, Wall. Cat. n. 683.—Reg. Himal.
Wettsteinii, H. Braun, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 303.—Europ.
Wichurae, C. Koch, Wochenschr. xii. (1869) 202 = multiflora.
Wichuraiana, Crép. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 204 = Luciae.
Wietziana, Auct. ex Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 871 = Reichenbachiana.
Willdenowii, Spreng. Syst. ii. 547.—Reg. Casp.; Sibir.
Willdenowii, Tratt. Ros. ii. 81 = pulchella.
Wilsoni, Borr. in Hook. Brit. Fl. ed. I. 228 = involuta.
Wolfgangiana, Bess. Enum. Pl. Volh. 61, 67 = gallica.
Wolfii, La Soie, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 345.—Europ.
Woodsii, A. Gray, in Mem. Am. Acad. iv. (1849) 42 = californica.
Woodsii, Lindl. Ros. Monog. 21.—Am. bor.
Woodsii, Regel, in Act. Hort. Petrop. (1877) 299 = nutkana.
Wulfenii, Tratt. Ros. i. 200.—Europ.
xanthina, Lindl. Ros. Monog. 132.—China.
xerampelina, Hort. ex Breit. Hort. Breit. 433.—Europ.
Ywara, Carr. in Rev. Hort. (1876) 357.—Japon.
zagrabensis, Vukot. & H. Braun, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. iii. 55.—Croatia.
zalana, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 142.—Europ.

ROSA:—

- zamensis, Simk. & H. Braun, in Termész. Füzetek, ix. (1885) 41.—Hungar.
Zeytheriana, Dehm. Revista Napolit. i. III. 165; ex Walp. Rep. ii. 12.—Hab.?
ROSALESIA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 9 (1824) = **Brickellia**, Ell. (Compos.).
glandulosa, La Llave, l. c. = B. Rosalesia.
ROSANOVIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1004, sphalm. (1876) = seq.
ROSANOWIA, Regel, Gartenfl. xxi. (1872) 33. t. 712 = **Sinningia**, Nees (Gesner.).
conspicua, Regel, l. c.—Bras.
hybrida ×, Nagy, in Illustr. Wien. Gartenfl. Zeitschr. x. (1885) 126.—Bras.
ornata ×, Van Houtte, in Fl. de Serres, xxiii. (1882) 149.
ROSAURA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = **Wedelia**?, Jacq. (Compos.).
ROSCHERIA, H. Wendl. ex Baker, Fl. Maurit. 386 (1877). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 913.
melanochoetes, H. Wendl. l. c. 387.—Ins. Mascar.
ROSCIA, D. Dietr. Syn. Pl. i. 552 (1839), sphalm. = **BOSCIA**, Thunb. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
ROSCOEAE, Roxb. Hort. Beng. 46 (1814); Fl. Ind. iii. 54 (1832) = **Sphenodesma**, Jack (Verbenac.).
pentandra, Roxb. ll. cc. 46; 54 = S. pentandra.
tomentosa, Roxb. ll. cc. [95]; 56 = Conyza tomentosa.
villosa, Roxb. l. c. [95]; 55 = Lagdera aurita.
ROSCOEAE, Sm. Exot. Bot. ii. 97. t. 108 (1804).
SCITAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 641.
CAUTLEA, Royle, Illustr. Bot. Himal. 361 (1839).
alpina, Royle, Illustr. Bot. Himal. 361.—Reg. Himal.
capitata, Sm. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 461.—Nepal.
elator, Sm. l. c. 460.—Reg. Himal.
exilis, Sm. ex Horan. Prod. Scitam. 21 = purpurea.
gracilis, Sm. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 460 = elator.
lutea, Hassk. in Flora, xlvii. (1864) 21.—Ins. Philipp.
lutea, Royle, Illustr. Bot. Himal. 361. t. 89 = elator.
nigro-ciliata, Hassk. in Flora, xlvii. (1864) 21.—Ins. Philipp.
procera, Wall. Pl. As. Rar. iii. t. 242 = purpurea.
purpurea, Sm. Exot. Bot. ii. 97. t. 108.—Reg. Himal.; Burma.
spicata, Sm. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 460.—Reg. Himal.
ROSCYNA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 364 = **Hypericum**, Linn.
americana, Spach, l. c. = H. pyramidatum.
Gebleri, Spach, l. c. = H. Gebleri.
Gmelini, Spach, l. c. = H. Ascyron.
japonica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 21 = H. japonicum.
ROSEA, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1853) 501 = **Tricalysia**, A. Rich. (Rubiace.).
crassifolia, Klotzsch, l. c. = T. crassifolia.
jasminiflora, Klotzsch, l. c. = T. jasminiflora.
ROSEA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 58 (1826) = **Iresine**, P. Br. (Amarant.).
elator, Mart. l. c. 59. t. 155 = I. elator.
Poeppigiana, Klotzsch, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. i. 226 = I. elator.
virgata, Klotzsch, ex Seub. l. c. = I. elator.
ROSENBERGIA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 30 = **Cobaea**, Cav. (Polemon.).
gracilis, Oerst. l. c. 31 = C. gracilis.
penduliflora, Karst. Fl. Columb. i. 27. t. 14 = C. penduliflora.
ROSENIA, Thunb. Nov. Gen. 161 (1801). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 327.
glandulosa, Thunb. l. c. 162.—Afr. austr.
spinescens, DC. Prod. vi. 280.—Afr. austr.

ROSILLA, Less. Syn. Comp. 245 (1832). **COMPOSITAE**, [Benth. & Hook. f. ii. 397].
lutea, Less. l. c.—Mexic.

ROSLINIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 203 (1837) = **ROESLINIA**, Moench = **Chironia**, Linn. (Gentian.).

ROSLINIA, Neck. Elem. i. 357 (1790) = **Justicia**, Houst. (Acanth.).

ROSMARINUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1197.

angustifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = officinalis.

chilensis, Molina, Sagg. Chile, 158 = Sphacele campanulata.

communis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 = officinalis?

ericalix, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 44 = officinalis.

flexuosus, Jord. & Fourr. l. c. = officinalis.

latifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = officinalis.

laxiflorus, Noé, ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 12 = officinalis.

officinalis, Linn. Sp. Pl. 23.—Reg. Mediterr.

prostratus, Fl. Corc. in Ionios Anthol. ii. (1834) 446 = officinalis.

rigidus, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 43 = officinalis.

tenuifolius, Jord. & Fourr. l. c. = officinalis.

ROSPIDIOS, A. DC. in DC. Prod. viii. 220 (1844) =

Diospyros, Linn. (Ebenac.).

vaccinioides, A. DC. l. c. = D. vaccinioides.

ROSSENIA, Vell. Fl. Flum. 31 (1825); i. t. 77 (1827) =

Cusparia, Humb. (Rutac.).

pentaphylla, Vell. ll. cc.—Bras.

ROSSINA, Steud. Nom. ed. II. ii. 652 (1841), sphalm. =

POSSIRA, Aubl. = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).

ROSSMAESSLERA, Reichb. Nom. 113 (1841) =

Gilia, Ruiz & Pav. (Polemon.).

ROSSMANNIA, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (Maerz 1854) 125; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855)

99. t. 9 A = **Begonia**, Linn.

repens, Klotzsch, ll. cc. = B. repens.

ROSSOLIS, Adans. Fam. ii. 245 (1763) = **Drosera**, Linn.

rotundifolia, Moench, Meth. 57 = D. rotundifolia.

septentrionalis, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 232 = D. rotundifolia.

ROSTELLARIA, Gaertn. f. Fruct. iii. 135. t. 207 (1805). 'Genus valde dubium,' Benth. & Hook. f. ii. 653.

SARCORHYNA, Presl, Bot. Bemerk. 103 (1844).

Lessertiana, Gaertn. f. l. c.—Hab.?

ROSTELLARIA, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 76 (1832) = **Justicia**, Houst. (Acanth.).

adenostachya, Nees, l. c. 101 = J. procumbens.

crinita, Nees, l. c. = J. micrantha.

diffusa, Nees, l. c. 100 = J. diffusa.

haplostachya, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1110 = J. haplostachya.

hedyotidifolia, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 100 = J. diffusa.

japonica, Carr. in Rev. Hort. (1866) 400 = J. procumbens?

micrantha, Steud. Nom. ed. II. i. 838, in syn., sphalm. = seq.

mollissima, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 101 = J. simplex.

parviflora, Benth. in Hook. Niger Fl. 481 = J. tenella.

peplodes, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 101 = J. quinqueangularis.

procumbens, Nees, l. c. = J. procumbens.

quinqueangularis, Nees, l. c. = J. quinqueangularis.

reptans, Nees, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1110 = J. trifolioides.

rotundifolia, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 100 = J. diffusa.

Schimperi, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 24 = Rhinacanthus calcaratus?

ROSTELLARIA:—

sexangularis, Hochst. in Flora, xxv. (1842) Beil. i. 144 = *Dicliptera sexangularis*.
tenella, Nees, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1110 = *Justicia tenella*.
Vahlit, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 102 = *J. diffusa*.

ROSTELLULARIA, Reichb. Handb. 190 (1837) = *Justicia*, Honst. (Acanth.).

abyssinica, Brongn. ex Nees, in DC. Prod. xi. 372 = *J. simplex*.

adenostachya, Nees, l. c. 373 = *J. procumbens*.

Blancoi, Hassk. in Flora, xlvii. (1864) 54 = *Dianthera americana*.

brachystachya, Nees, in DC. Prod. xi. 369 = *J. brachystachya*.

crenulata, Nees, l. c. = *J. tenella*.

crinita, Nees, l. c. 373 = *J. micrantha*.

diffusa, Nees, l. c. 371 = *J. diffusa*.

glandulosa, Nees, l. c. 373 = *J. simplex*.

gracilis, Wight, Ic. t. 1541 = *Rungia linifolia*.

haplostachya, Nees, in DC. Prod. xi. 369 = *J. haplostachya*.

hedyotidifolia, Nees, l. c. 370 = *J. diffusa*.

juncea, Nees, l. c. 376 = *J. procumbens*.

media, Nees, l. c. 374 = *J. procumbens*.

mollissima, Nees, l. c. 373 = *J. procumbens*.

obtusata, Nees, l. c. 374 = *J. Blumeana*.

pepoides, Nees, l. c. 375 = *J. quinqueangularis*.

pogonanthra, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 431 = *J. procumbens*.

procumbens, Nees, in DC. Prod. xi. 371 = *J. procumbens*.

psychotrioides, Nees, l. c. 370 = *J. psychotrioides*.

pumila, Hochst. ex Nees, l. c. 372 = *J. simplex*.

quinqueangularis, Nees, l. c. 375 = *J. quinqueangularis*.

reptans, Nees, l. c. 368 = *J. trifolioides*.

rotundifolia, Nees, l. c. 370 = *J. simplex, diffusa*.

Royeniana, Nees, l. c. 373 = *J. Royeniana*.

sarmentosa, Zoll. ex Nees, l. c. 370 = *J. procumbens*.

simplex, Wight, Ic. iv. t. 1542 = *J. notha*.

tenella, Nees, in DC. Prod. xi. 369 = *J. tenella*.

trichochila, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 118. — China.

Vahlit, Nees, in DC. Prod. xi. 376 = *J. diffusa*.

ROSTKOVIYA, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 324. t. 12. *ŒUNCACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 867.

MARSIPPOSPERMUM, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 328. t. 12.

brevifolia, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 76 = *Distichia brevifolia*.

clandestina, Phil. l. c. = *Distichia clandestina*.

gracilis, Hook. f. Fl. Antarct. 83. — Ins. Antarct.

gracilis, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 75. — Chili.

grandiflora, Hook. f. Fl. Antarct. 81. — Ins. Antarct.

magellanica, Hook. f. l. c. = *sphaerocarpa*.

Novae-Zelandiae, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. iv. (1872) 227 = *gracilis*, Hook. f.

sphaerocarpa, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 327. — Reg. Magellan.

ROSTRARIA, Trin. Fund. Agrost. 149 (1820) = *Trisetum*, Pers. (Gramin.).

laevis, Trin. l. c. 150 = *T. panicum*.

pubescens, Trin. l. c. = *T. phleoides*.

ROTALA, Linn. Mant. ii. 143 (1771). *LYTHRARIAE*, [Benth. & Hook. f. i. 776].

alata, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 171. — Ind. or.

apetala, F. Muell. Fragm. iii. 108 = *Ammannia Rotala*.

cordata, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 172. — Ind. or.

decussata, DC. Prod. iii. 76 = *Ammannia pentandra*.

decussata, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467. — Afr. trop.

decussata, Hiern, l. c., partim = *illecebroides*.

densiflora, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 164 = *Ammannia pentandra*.

dentifera, Koehne, l. c. 161. — Mexic.

diandra, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. N. S. W. xiv. (1881) 89 = *Ammannia diandra*.

elatinoides, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 466. — Afr. trop.

filiformis, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 468. — Afr. trop.

ROTALA:—

fimbriata, Wight, Ic. t. 217. — Ind. or.

floribunda, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 156. — Ind. or.

fontinalis, Hiern, in Oliver, Trop. Afr. ii. 468. — Afr. trop.

hexandra, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 167. — Ind. or.

illecebroides, Koehne, l. c. 161. — Ind. or.

indica, Koehne, l. c. 172 = *Ammannia peploides*.

leptopetala, Koehne, l. c. 162. — As. or.

macrandra, Koehne, l. c. 176. — Ind. or.

mexicana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 567. — Mexic.

myriophylloides, Welw. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 469 = *Hydrolythrum Wallichii*.

nummularia, Welw. ex Hiern, l. c. 468. — Afr. trop.

occultiflora, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 152. — Ind. or.

pentandra, Wight, Ic. i. sub t. 217 = *Ammannia pentandra*.

petaloidea, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Ammannia Rotala*.

pusilla, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 128 = *mexicana*.

ramosior, Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 194. — Bras.

repens, Koehne. — Cf. Sitzb. Bot. Ver. Prov. Brandenb. (1877) 48 = *Quartinia repens*.

Ritchiei, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. iv. (1883) 386. — Ind. or.

rotundifolia, Koehne, l. c. i. (1881) 175 = *Ammannia rotundifolia*.

Roxburghiana, Wight, Ic. t. 260. f. B. = *Ammannia pentandra*.

serpiculoides, Welw. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 469. — Afr. trop.

simpliciuscula, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1882) 159. — Ind. or.

stagnina, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467. — Afr. trop.

subrotunda, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 174. — Ind. or.

tenella, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467. — Afr. trop.

tenuis, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 177. — Ind. or.

verticillaris, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467 = *mexicana*.

verticillaris, Linn. Mant. ii. 175 = *Ammannia Rotala*.

Wallichii, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 154 = *Hydrolythrum Wallichii*.

ROTANG, Adans. Fam. ii. 24 (1763) = *Calamus*, Linn. (Palm.).

ROTANGA, Boerh. ex Crantz, Inst. i. 127 (1766) = *Calamus*, Linn. (Palm.).

Calamus, Crantz, l. c. = *C. Rotang*.

ROTBOLLA, Zumag. Fl. Pedem. i. 142 (1849), sphalm. = *Rottboellia*, Linn. f. (Gramin.).

ROTTERBE, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 543. t. 71 (1871) = *BOTHERBE*, Steud. = *Calydorea*, Herb. (Irid.).

bulbosa, Steud. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 134 = *Libertia elegans*.

campestris, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 543 = *C. campestris*.

elegans, Steud. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 153 = *Libertia elegans*.

gracilis, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 544 = *C. nuda*.

luteola, Klatt, l. c. = *C. luteola*.

ROTHECA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 69 (1836) = *Clerodendron*, Linn. (Verben.).

bicolor, Rafin. l. c. = *C. serratum*.

ternifolia, Rafin. l. c. = *C. serratum*.

ROTHERIA, Meyen, Reise, i. 402 (1834) = *Cruckshanksia*, Hook. & Arn. (Rubiace.).

lanceolata, Meyen, l. c. = *C. hymenodon*.

ROTHIA, Lam. Journ. Hist. Nat. i. (1792) 16. t. 1 = *Hymenopappus*, L'Hérit. (Compos.).

carolinensis, Lam. l. c. = *H. scabiosus*.

ROTHIA, Pers. Syn. ii. 638 (1807). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 477.

GOETZEA, Reichb. Consp. 204 (1828).

HARPELEMA, Jacq. f. Eclog. Pl. ii. 6 (1844).

WESTONIA, Spreng. Syst. iii. 230 (1826).

XEROCARPUS, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 169. t. 44 (1832).

hirsuta, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 7. — Afr. trop.

trifoliata, DC. Prod. ii. 382. — Ind. or.; Austral.

ROTHIA, Schreb. Gen. 531 (1791) = *Andryala*, Linn. (Compos.).

andryaloides, Gaertn. Fruct. ii. 371. t. 174. f. 9 = *A. Rothia*.

argentea, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 485 = *A. ragusina*.

cheiranthifolia, Roth, Catalect. fasc. i. 105 = *A. integrifolia*.

floccosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 3 = *A. floccosa*.

laxiflora, Salzm. ex DC. Prod. vii. 247 = *A. laxiflora*.

runcinata, Roth, Catalect. fasc. i. 107 = *A. integrifolia*.

tenuifolia, Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. (1827) 280 = *A. dentata*.

ROTHMANNIA, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1776) 63 = *Gardenia*, Ellis (Rubiace.).

Bowieana, Benth. in Hook. Niger Fl. 384 = *Randia macrantha*.

capensis, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1776) 65. f. 2 = *G. Rothmannia*.

longiflora, Salisb. Parad. Lond. t. 65 = *Randia maculata*.

macrophylla, R. Br. in Wall. Cat. n. 8304 = *Randia macrophylla*.

malleifera, Hook. Niger Fl. 383 = *Randia malleifera*.

Stanleyana, Hook. l. c. = *Randia maculata*.

ROTHROCKIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 295. *ASCLEPIADEAE*.

cordifolia, A. Gray, l. c. — Am. bor.

ROTMANNIA, Neck. Elem. ii. 450 (1790) = *Eperua*, Aubl. (Legumin.).

ROTTBOELIA, Scop. Introd. 233 (1777) = *Ximenia*, Linn. (Oleace.).

ROTTBOELLA, Murr. Syst. 124 (1784) = *Rottboellia*, Linn. f. (Gramin.).

ROTTBOELLIA, Host, Gram. Austr. i. 19. t. 24 (1801) = *Lepturus*, R. Br. (Gramin.).

ROTTBOELLIA, Linn. f. Nov. Gram. Gen. in Amoen. Acad. x. 22 (1779), partim. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1129.

APOGONIA, Fourr. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1130 (1883).

COELORACHIS, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 64. t. 141 (1829).

CYMBACHNE, Retz. Obs. vi. 36 (1791).

LASIURUS, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 145 (1859).

MANISURIS, Linn. Mant. ii. 164 (1767).

PELTOPHORUS, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 188.

PHACELURUS, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 423 (1844).

PHOLIURUS, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 67 (1821).

STEGOSIA, Lour. Fl. Cochinch. 51 (1790).

adscendens, Brot. Fl. Lusit. i. 84 = *Lepturus cylindricus*.

agropyroides, Hack. in Bol. Soc. Broter. iii. (1885) 135. — Afr. trop.

altissima, Poir. Voy. Barb. ii. 105 = *compressa*.

anthephoroides, Steud. in Flora, xxix. (1846) 22 = *Ischaemum antephoroides*.

arabica, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Lepturus filiformis*.

articulata, Thunb. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 787 = *compressa*.

arundinacea, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 444 = *exaltata*.

aurita, Steud. Syn. Pl. Gram. 361. — Am. trop.

Balansae, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. iii. 312. — Paraguay.

barbata, Spreng. Syst. i. 300 = *Xerachloa barbata*.

ROTTBOELLIA :—

barbata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Stenotaphrum subulatum*.
Beyreichii, Trin. ex Steud. l. c. (Quid ?).—Hab. ?
biflora, Roth, Neue Beitr. i. 121 = *Lepturus pannonicus*.
biflora, Roxb. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. i. 357 (*Lepturi* sp.).—Ind. or.
brevis, Chauvin, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361.—Ins. Wagiu.
campestris, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 151.—Am. bor.
ciliaris, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 (= *Aegilops ciliaris*).—Ind. or.
ciliata, Nutt. Gen. Am. i. 83 = *Elionurus tripsacoides*.
Coelorachis, Forst. f. Prod. 9.—N. Caled.
complanata, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iv. (1810) 89. t. 5 = *Stenotaphrum glabrum*.
compressa, Beauv. Agrost. 109. t. 21. f. 81 = *Stenotaphrum glabrum*.
compressa, Guss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Lepturus filiformis*.
compressa, Linn. f. Suppl. 114.—Reg. trop.
corrugata, Baldw. in Am. Journ. Sc. Ser. I. i. (1819) 355.—Am. bor.
corymbosa, Linn. f. Suppl. 114 = *Ophiurus corymbosus*.
cylindrica, Torr. Bot. Whipl. Exped. 103; Chapm. Fl. S. U. St. 579.—Am. bor.
cylindrica, Willd. Sp. Pl. i. 464 = *Lepturus cylindricus*.
Cymbachne, Willd. l. c. 465.—Ind. or.
denudata, Steud. Syn. Pl. Gram. 362 = *exaltata*.
digitata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. t. 92.—Oriens.
dimidiata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 23; Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iv. (1810) 89 = *Stenotaphrum glabrum*.
diversiflora, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361 = *Andropogon imberbis*.
elegantissima, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Elionurus Royleanus*.
erecta, Savi, in Nuov. Giorn. Lett. Pisan. iv. (1806) 250 = *Lepturus filiformis*.
exaltata, Linn. f. Suppl. 114.—Reg. trop.
fasciculata, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 14 = *R. Coelorachis*.
fasciculata, Lam. Illustr. i. 204 = *compressa*.
filifolia, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 200 = *loricata*.
filiformis, Roth, in Usteri, Ann. Bot. x. (1794) 38 = *Lepturus filiformis*.
foliata, Steud. Syn. Pl. Gram. 361 = *latifolia*.
foliosa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 291 = *latifolia*.
formosa, R. Br. Prod. 206.—Austral.
glabra, Roxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 353 = *compressa*.
glabrata, Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 521 = *Andropogon imberbis*.
glandulosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 250.—Burma; Malaya.
gracilis, Mill. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Lepturus filiformis*.
Hamiltoni, Trin. ex Steud. l. c. (Quid ?).—Bengal.
hirsuta, Vahl, Symb. Bot. i. 11.—Afr. trop.; Arab.; Afghan.
hordeoides, Munro, in Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 442.—Afr. austr.
impressa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 235.—Cuba.
incurva, Roem. & Schult. Syst. ii. 799, in obs. = *Lepturus incurvatus*.
incurvata, Linn. f. Suppl. 114 = *Lepturus incurvatus*.
incurvata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 72 = *Lepturus cylindricus*.
laevis, Retz. Obs. iii. 11 = *Ophiurus perforatus*.
latifolia, Steud. in Flora, xxix. (1846) 21.—China; Japon.
loliacea, Bory & Chaub. Expéd. Mor. 46. t. 3. f. 2 = *Lolium lepturoides*.
loricata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 250.—Bras.; Cuba.
mollicoma, Hance, in Journ. Bot. ix. (1871) 134.—China.
monandra, Cav. Ic. i. 27. t. 39. f. 1 = *Psilurus nardoides*.
muricata, Benth. Fl. Austral. vii. 514 = *ophiuroides*.
muricata, Retz. Obs. iii. 12.—Ind. or.; Austral.
myurus, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 68.—Ind. or.
nigrescens, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 364.—Zeylan.

ROTTBOELLIA :—

occreata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 250 = *Andropogon imberbis* ?
ophiuroides, Benth. Fl. Austral. vii. 514.—Austral.
paleacea, Steud. ex Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. ii. 301 = *Stenotaphrum glabrum*.
paniculata, Salzm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Spartina bahiensis*.
paniculata, Spreng. Syst. i. 300 = *Schedonnardus texanus*.
pannonica, Host, Gram. Austr. i. t. 24 = *Lepturus pannonicus*.
perforata, Roxb. Pl. Corom. ii. 43. t. 182 = *Ophiurus perforatus*.
pilosa, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 785 (*Enteropogonis* sp. ?).—Ind. or.
pilosa, Willd. Sp. Pl. i. 465 = *Oropetium thomaeum*.
pubescens, Bertol. Misc. Bot. i. 10 = *Lepturus pubescens*.
pulcherrima, Wall. ex Kunth, Enum. Pl. i. 468 = *Ratzeburgia pulcherrima*.
punctata, Retz. Obs. iii. 11 = *Ophiurus corymbosus*.
ramosa, Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 521 = *aurita*.
ramosa, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 11 = *Lepturus cylindricus*.
repens, Forst. f. Prod. 9 = *Lepturus repens*.
Rhytachne, Hack. in Bol. Soc. Broter. iii. (1885) 136.—Afr. trop.
Roxburghiana, Schult. Mant. ii. 430 = *Lepturus pannonicus*.
rugosa, Nutt. Gen. Am. i. 84.—Am. bor.
salina, Hort. ex Link, Enum. Hort. Brol. i. 101 = *Lepturus pannonicus*.
salsa, Fisch. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 798 = *Lepturus pannonicus*.
Salzmanni, Trin. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361 = *Andropogon imberbis* ?
Sandorii, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 335 = *digitata*.
sanguinea, Retz. Obs. iii. 25 = *Andropogon Pseudograya*.
scorpioides, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Ctenium carolinianum*.
Selloana, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. iii. 312.—Bras.
setacea, Roxb. Pl. Corom. ii. 17. t. 132 = *Microchloa setacea*.
setosa, Meyen, Reise, ii. 266, nomen.—Ins. Luzon.
setosa, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 329 = *exaltata*.
sphathacea, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xi = *compressa*.
stigmosa, Trin. ex Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. ii. (1844) 243, nomen = *aurita*.
stipoides, Steud. Syn. Pl. Gram. 370 = *Andropogon heteranthus*.
stolonifera, Poir. Encyc. vi. 310 = *Stenotaphrum glabrum*.
striata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361.—Ind. or.
stricta, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 705; ed. II. ii. 474 = *Spartina stricta*.
subulata, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 733 = *Lepturus filiformis*.
subulata, Savi, in Nuov. Giorn. Pisan. iv. (1806) 250 = *Lepturus cylindricus*.
tessellata, Steud. Syn. Pl. Gram. 362 = *corrugata*.
thomaea, Koen. in Naturf. xxiii. (1788) 210; Willd. Sp. Pl. i. 464 = *Oropetium thomaeum*.
Tranchelli, J. F. Gmel. Syst. 197 = *compressa*.
trichantha, Roth, Nov. Pl. Sp. 43 (*Enteropogonis* sp. ?).—Ind. or.
tripsacoides, Lam. Illustr. i. 205.—Afr. trop. ?
uncinata, Beauv. Agrost. 109; Spreng. Syst. i. 299 = *compressa*.
uniflora, A. Cunn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 371 = *Zoysia pungens*.
villosa, Poir. Encyc. vi. 313.—Ind. or.
Xerochloa, Spreng. Syst. i. 300 = *Xerochloa imberbis*.

ROTTBOLLA, Zúmag. Fl. Pedem. i. 93 (1849), sphalm. = *praec*.

ROTTBOLLIA, Cav. Ic. i. 27 (1791) = *praec*.

ROTTLERA, Roxb. Pl. Corom. ii. 36. t. 168 (1798) = **Mallotus**, Lour. (Euphorb.).
acuminata, Baill. Etud. Gén. Euph. 426 = *M. acuminatus*.
acuminata, A. Juss. Tent. Euph. 33 = *M. tiliae-folius*.

ROTTLERA :—

acutifolia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Mallotus acuminatus*.
affinis, Baill. Etud. Gén. Euph. 424 = *M. claoxyloides*.
affinis, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 41 = *M. philippinensis*.
alba, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 829 = *M. albus*.
albicans, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Cephalocroton discolor*.
albicans, Mor. ex Reichb. f. & Zoll. in Verh. Natuuk. Ver. Nederl. Indie, i. (1856) 21 = *Cephalocroton albicans*.
angulata, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. angulatus*.
aurantiaca, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 270 = *M. philippinensis*.
aureopunctata, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 122 = *M. Lawii*.
barbata, Wall. Cat. n. 7822 = *M. barbatus*.
bifaria, Wall. l. c. n. 7981 = *Gelonium multiflorum*.
Blumeana, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. Blumeanus*.
Blumei, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 486 = *M. tiliae-folius*.
borneensis, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. borneensis*.
brasiliensis, Spreng. Syst. iii. 877 = *Croton brasiliensis*.
calcosa, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. calcosus*.
cantonensis, Spreng. Syst. iii. 878 = *M. Apelta*.
chinensis, A. Juss. Tent. Euph. 33 = *M. Apelta*.
congesta, Wall. Cat. n. 7981, B = *Gelonium multiflorum*.
cordifolia, Benth. Fl. Hongk. 307 = *M. repandus*.
dentata, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 69 = *M. oppositifolius*.
diadema, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. diadenus*.
dicocca, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 829 = *M. repandus*.
digyna, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *Macaranga digyna*.
dioica, Baill. Etud. Gén. Euph. 423 = *M. repandus*.
dioica, Roxb. ex Wall. Cat. n. 7827, A = *dicocca*.
discolor, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 143 = *M. discolor*.
dispar, Blume, Bijdr. 608 = *M. dispar*.
dispar, Mor. Syst. Verz. Zoll. 17 = *M. Moritzianus*.
eglandulosa, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 348, nomen (Quid ?).—Ins. Timor.
eriocarpa, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. eriocarpus*.
fasciculata, Wall. Cat. n. 7981, B = *Gelonium multiflorum*.
ferruginea, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 828 = *M. ferrugineus*.
flavigutta, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 453 = *M. acuminatus*.
floribunda, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *M. floribundus*.
Furetiana, Baill. Etud. Gén. Euph. 426, nomen = *M. Furetianus*.
fuscescens, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. fuscenscens*.
gigantea, Reichb. f. & Zoll. ex Kurz, in Tijdschr. Nederl. Indie, xxvii. (1864) 44 = *Macaranga gigantea*.
glaberrima, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 41 = *M. glaberrimus*.
glauca, Hassk. l. c. = *Macaranga denticulata*.
hexandra, Roxb. Hort. Beng. [105]; Fl. Ind. iii. 829 = *Macaranga hexandra*.
hispida, Kurz, ex Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxiv. (1864) 43 = *Macaranga hispida*.
Hookeriana, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. Hookerianus*.
Inophyllum, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 183. t. 75 = *Codiaeum Inophyllum*.
integrifolia, Wall. Cat. n. 7810, F = *Macaranga Tanarius*.
japonica, Spreng. Syst. iii. 878 = *M. japonicus* (cf. Addend.).
javanica, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 41 = *Macaranga javanica*.
Korthalsii, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. Korthalsii*.
laccifera, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 157 = *M. repandus*.

ROTTLERA:—

- Lambertiana*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *Mallotus Lambertianus*.
lanceolata, Wall. Cat. n. 7981 = *Gelonium multiflorum*.
lappacea, Wall. l. c. n. 7845 = *Coelodiscus lappaceus*.
longestipulata, Kurz, ex Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 43 = *Macaranga longestipulata*.
longifolia, Reichb. f. & Zoll. in Verh. Naturk. Ver. Nederl. Indie, i. (1856) 31 = *M. longifolius*.
macrostachya, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 454 = *M. macrostachys*.
mappoides, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 122 = *M. albus*.
Miqueliana, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *Borneo*.
mollis, Wall. Cat. n. 7839 = *M. philippinensis*.
mollissima, Wall. l. c. n. 7825 = *Alchornea mollis*.
molucaana, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 122 = *M. moluccanus*.
montana, Heyne, ex Wall. Cat. n. 7833 = *Macaranga javanica*.
montana, Wall. Cat. n. 7833 = *M. philippinensis*.
Moritziana, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. Moritzianus*.
multiglandulosa, Blume, Bijdr. 609 = *M. moluccanus*.
muricata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. muricatus*.
oblongifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 396 = *M. oblongifolius*.
oppositifolia, Blume, Bijdr. 608 = *M. Blumeanus*.
oppositifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. rhamnifolius*.
paniculata, A. Juss. Tent. Euph. 33 = *M. cochinchinensis*.
paniculata, Wall. Cat. n. 7812, 7818 = *M. albus*, repandus.
peltata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 395 = *M. ricinoides*.
peltata, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 828 = *M. Roxburghianus*.
peltata, Wight, l. c. t. 1873 = *M. albus*.
philippinensis, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. philippinensis*.
pyncostachys, F. Muell. Fragm. iv. 138 = *M. ricinoides*.
repanda, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. repandus*.
rhombifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 272 = *M. repandus*.
rhynchophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 454 = *M. subpeltatus*.
ricinoides, A. Juss. Tent. Euph. 33 = *M. ricinoides*.
rufidula, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 453 = *M. rufidulus*.
scabrifolia, A. Juss. Tent. Euph. 111 = *M. repandus*.
scandens, Span. in Linnaea, xv. (1841) 348 = *M. scandens*.
Schimperii, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 21 = *Croton macrostachys*.
spathulata, Panch. ex Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 222 = *Cleidion verticillatum*.
sphaerocarpus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 454 = *M. sphaerocarpus*.
stipulosa, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. stipulosus*.
stylaris, Scheff. in Miq. l. c. = *M. stylaris*.
subfalcata, Reichb. f. & Zoll. in Verh. Naturk. Ver. Nederl. Indie, i. (1856) 11 = *Macaranga subfalcata*.
subpeltata, Baill. Etud. Gén. Euph. 423 = *M. subpeltatus*.
suffruticosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7843 = *Baliospermum axillare*.
Tanarius, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Macaranga Tanarius*.
tetracocca, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 826 = *M. albus*.
Thwaitesii, Baill. Etud. Gén. Euph. 426 = *Podadenia sapida*.
tiliaefolia, Blume, Bijdr. 607 = *M. tiliaefolius*.
tinctoria, Roxb. Pl. Corom. ii. 36. t. 168 = *M. philippinensis*.
Tokbrai, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 122 = *M. Tokbrai*.
tomentosa, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Macaranga Tanarius*.
trinervis, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 348 = *M. repandus*.
urandra, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 229 = *Cleidion javanicum*.

ROTTLERA:—

- viscida*, Blume, Bijdr. 608 = *Mallotus repandus*.
Zippelii, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *M. ricinoides*.
Zollingeri, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. Zollingeri*.
Zollingeriana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 394 (*Xylosmatis* sp. ?).—Java.

ROTTLERA, Vahl, Enum. i. 88 (1805) (Roettlera) = **Didymocarpus**, Wall. (Gesner.).
incana, Vahl, l. c. = *D. Rottleriana*.

ROTTLERA, Willd. in Goett. Journ. Wiss. i. (1797) 7. t. 1 = **Trewia**, Linn. (Euphorb.).
Hoperiana, Blume, ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 953 = *T. nudiflora*.
indica, Willd. in Goett. Journ. Wiss. i. (1797) 8 = *T. nudiflora*.
operiana, Blume, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 423 = *T. nudiflora*.
rusciflora, Spreng. Syst. iii. 878 = *T. rusciflora*.

ROTULA, Lour. Fl. Cochinch. 121 (1790) = **Rhabdia**, Mart. (Borag.).
aquatica, Lour. l. c. = *Rhabdia lycioides*.

ROUBIEVA, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 292. t. 10. **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 52.
anthelmintica, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 387 = *Chenopodium ambrosioides*.
bonariensis, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 52. —Am. austr.
Botrys, Fuss, Fl. Trans. 552 = *Chenopodium Botrys*.
multifida, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 292. t. 10. —Am. austr.

ROUCELA, Dum. Comm. Bot. 14 (1822) = **Campanula**, Tourn.
Erinus, Dum. l. c. = *C. Erinus*.
hederacea, Dum. Fl. Belg. 58 = *Wahlenbergia hederacea*.

ROUCHERIA, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 141. t. 2. **LINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 243.
calophylla, Planch. l. c. = *Guian*.
Griffithiana, Planch. l. c. 143. —Ins. Molucc.
humirifolia, Planch. l. c. = *Hebeptalum humirifolium*.
latifolia, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 245 = *Hebeptalum latifolium*.
macrophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 136. —Sumatra.
Schomburgkii, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 526. —Guian.

ROUHAMON, Aubl. Pl. Gui. i. 93. t. 36 (1775) = **Strychnos**, Linn. (Logan.).
Bredemeyeri, DC. Prod. ix. 18. —Venezuela.
brevifolium, Spruce, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 277 = *S. brevifolia*.
Curare, DC. Prod. ix. 17 = *S. Curare*.
divaricatum, DC. l. c. = *S. Rouhamon*.
glabrum, Sagot, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 275 = *S. glabra*.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 93 = *S. Rouhamon*.
Medeola, Sagot, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 282 = *S. Medeola*.
pedunculatum, A. DC. ex DC. Prod. ix. 561 = *S. pedunculata*.
stans, DC. Prod. ix. 18. —Bras.

ROULINIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 320 = **Nolina**, Michx. (Liliac.).
acrotricha, Brongn. l. c. = *Dasyllirion acrotrichum*.
gracilis, Brongn. l. c. = *Dasyllirion acrotrichum*.
Humboldtiana, Brongn. l. c. = *N. parviflora*.
Karwinskiana, Brongn. l. c. = *N. longifolia*.
longifolia, Brongn. l. c. = *N. Hartwegiana*.
pitcairniaefolia, Nuytens, ex Versch. Cat. n. 21 (1879-80), cum ic. —Hab. ?
serratifolia, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 320 = *Dasyllirion serratifolium*.

ROULINIA, Decne. in DC. Prod. viii. 516 (1844). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 762.
acuta, Decne. l. c. 517. —Bras.
barbata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 253. —Bras.

ROULINIA:—

- blanda*, Decne. in DC. Prod. viii. 517. —Guian.
connivens, Decne. l. c. 518. —Bras.
convolvulacea, Decne. l. c. 517. —Bras.
corymbosa, Decne. l. c. —Bras.
fluminensis, Decne. l. c. —Reg. Argent.
guayanensis, Decne. l. c. —Guian.
Jacquini, Decne. l. c. —Mexic.
jamaicensis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 757. —Ind. occ.
modesta, Decne. in DC. Prod. viii. 517. —Bras.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 115. —N. Mexic.
parviflora, Decne. in DC. Prod. viii. 518. —Bras.
Riedelii, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 217. —Bras.
Selloana, Fourn. l. c. 216. —Bras.
Sprucei, Fourn. l. c. —Bras.
surinamensis, Miq. Stirp. Surin. Sel. 169. —Guian.
tamifolium, Decne. in DC. Prod. viii. 517. —Bras.
unifaria, Engelm. ex Torr. Bot. Mex. Bound. 160. —Texas.
versicolor, Herb. Gen. Amat. 4. t. 26; Decne. in DC. Prod. viii. 517 = *tamifolium* ?

ROUMEA, DC. Prod. i. 256 (1824), sphalm = RUMEA, Poit. = **Xylosma**, Forst. (Bixin.).

ROUPALA, Aubl. Pl. Gui. i. 83. t. 32 (1775). **PROTEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 178.
DICKNECKERIA, Vell. Fl. Flum. i. t. 105 (1827).
LEINKERIA, Scop. Introd. 345 (1777).
RHOPALA, Schreb. Gen. 62 (1789).
ROPALA, J. F. Gmel. Syst. ii. 225 (1791).
RUPALA, Vahl, Symb. Bot. iii. 20 (1794).
adiantifolia, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 56. —Bras.
affinis, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 112. —Bras.
attenuata, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 10 = *Helicia attenuata*.
aurea, Linden, in Belg. Hort. xvi. (1866) 202. —Bras.
australis, Linden, Cat. n. 14 (1859) 8. —Bras.
Bleasdalii, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. N. S. Wales, (1881) 28. —Austral.
Boissieriana, Meissn. in DC. Prod. xiv. 430. —N. Granat.
borealis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 78. —Mexic.
brasiliensis, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 55. —Bras.
chrysogenia, Mart. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 93 (= *Adenostephanus incana*). —Bras.
cochinchinensis, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192 = *Helicia cochinchinensis*.
complicata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 153. —N. Granat.
complicata, Linden, Cat. n. 8 (1853) 3; et ex Schlecht. in Bot. Zeit. xi. (1853) 717. —Am. trop.
corcovadensis, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 433 = *Pohl*.
cordifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 152. —N. Granat.
dentata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192. —Guian.
dentigera, Knight. Prot. 103. —Ins. Trinit.
Dickneckeria, Steud. Nom. ed. II. ii. 487 (= *Adenostephanus Sellowii*). —Bras.
diversifolia, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 193. —Peruv.
diversifolia, Schott, in Wien. Med. Jahrb. vi. n. 11; ex Schult. Mant. iii. 287 = *heterophylla*.
diversifolia, Zucc. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 433 = *Pohl*.
elegans, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 112. —Bras.
excelsa, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 362 = *Helicia excelsa*.
ferruginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 152. —N. Granat.
frigida, Linden, Cat. n. 18 (1863), 10 (Quid ?). —Hab. ?
frondosa, Rich. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 427 = *montana*.
Gardneri, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 83. t. 31. f. 1. —Bras.
glabrata, Klotzsch, ex Meissn. l. c. 84. —Bras.
glabrata, Wall. Cat. n. 1039 = *Helicia robusta*.
glaucophylla, Linden, Cat. n. 13 (1858); n. 14, (1859) 8. —Bras.

ROUPALA :—

- gracilis*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 90.—Bras.
granatensis, Linden, Cat. n. 24 (1869).—N. Granat.
grandifolia, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 56.—Bras.
hameliaefolia, Rudge, Pl. Guian. i. 22. t. 31 = Panopsis hameliaefolia.
heterophylla, Herb. Monac. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 433 = Pohlii.
heterophylla, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 111. t. 90.—Bras.
inaequalis, Pohl, l. c. 110. t. 89 (= *Adenostephanus inaequalis*).—Bras.
javanica, Steud. Nom. ed. II. ii. 487 = Helicia robusta.
laurifolia, Knight, Prot. 102 = nitida.
longepetiolata, Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 85 = rhombifolia.
longepetiolata, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 109. t. 88.—Bras.
loranthoides, Meissn. in DC. Prod. xiv. 425.—Guatemala.
lucens, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 84. t. 31. f. 2.—Bras.
macrophylla, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 112.—Bras.
macropoda, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 474.—N. Granat.
Martii, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 87. t. 32. f. 3.—Bras.
media, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 191.—Guian.
moluccana, R. Br. l. c. = Helicia moluccana.
moluccana, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 10 = Helicia petiolaris.
moluccana, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 361 = Helicia attenuata.
montana, Aubl. Pl. Gui. i. 83.—Guian.
montana, Willd. Sp. Pl. i. 536 = media.
multiflora, Schott, in Spreng. Syst. iv. Add. 403 (= *Andriapetalum reticulatum*).—Bras.
myrtoidea, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 35. t. 149 = Orites myrtoidea.
nervosa, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 56.—Bras.
nitida, Rudge, Pl. Guian. i. 26. t. 39.—Guian.
obovata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 153.—N. Granat.
obtusata, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 54.—Bras.
ochrantha, Mart. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 86 = brasiliensis.
organensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 135 (= *Adenostephanus organensis*).—Bras.
ovalis, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 54 = tomentosa.
ovalis, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 107. t. 86.—Bras.
ovata, Jack, in Malay. Misc. ii. (1827) n. vii. 95 = Helicia ovata.
pamplonensis, Linden, Cat. n. 8 (1853), 3, in desc. = Boissieriana.
peruviana, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192.—Peruv.
pinnata, Lam. Illustr. i. 243 = Euplassa meridionalis.
Pohlii, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 89. t. 33.—Bras.
polystachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 154 (= *Andriapetalum polystachyum*).—N. Granat.
Princeps, Linden, in Belg. Hort. vii. (1857) 198.—N. Granat.
pyrifolia, Knight, Prot. 102.—Guian.
racemosa, Roxb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 439 = Helicia attenuata.
rhombifolia, Mart. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 85.—Bras.
robusta, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 363 = Helicia robusta.
robusta, Spreng. Syst. i. 482, partim = Helicia cochinchinensis.
Rousselii, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1865) 394.—N. Caled.
Sanctae-Catharinae, Linden, Cat. n. 17 (1862), 8.—Bras.
Schomburgkii, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 474.—Bras.
serrata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192 = Helicia serrata.
serrata, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 42 = Helicia robusta.
serratifolia, Linden, in Belg. Hort. xvi. (1866) 202.—Bras.

ROUPALA :—

- sessilifolia*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 = Panopsis hameliaefolia.
silaifolia, Linden, Cat. n. 18 (1863), 10 (Quid?).—Hab.?
suaveolens, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 473.—Guian.
Thomesiana, Moric. Pl. Nouv. Am. 172. t. 100.—Bras.
tomentosa, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 108. t. 87.—Bras.
velutina, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 54 = brasiliensis.
veraguensis, Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 87 = Martii.
Vieillardii, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 229.—N. Caled.
Wallichii, Steud. Nom. ed. II. ii. 487 = Helicia robusta.
Warmingii, Meissn. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1870) 148.—Bras.

ROUPALIA, T. Moore & Ayres, Gard. Mag. Bot. ii. (1850) t. ad p. 33, sphalm. = **Roupellia**, Wall. & Hook. (Apocyn.).
grata, T. Moore & Ayres, l. c. = Roupellia grata.

ROUPALLIA, Hassk. in Flora, xl. (1857) 103 = seq.

ROUPELLIA, Wall. & Hook. ex Benth. in Hook. Bot. Mag. t. 4466 (1849). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 713.
grata, Wall. & Hook. l. c.; et in Hook. Niger Fl. 449.—Afr. trop.

ROUREA, Aubl. Pl. Gui. i. 467. t. 187 (1775). **CONNARACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 432.
MALBRANCIA, Neck. Elem. ii. 366 (1790).

- ROBERGIA**, Schreb. Gen. 309 (1789).
acuminata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 48.—Singapore.
acutipetala, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 528.—Java.
Afzelii, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 418 = santaloides.
Balansaeana, Baill. Adansonia, xi. (1875) 309.—N. Caled.
Bowiniana, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 231.—Afr. trop.
brachyandra, F. Muell. Fragm. viii. 6.—Austral.
caudata, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 419.—Reg. Himal.
coccinea, Hook. f. ex Hook. Niger Fl. 290 = Byrsocarpus coccineus.
commutata, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 420.—Ind. or.; China.
concolor, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.
cuspidata, Benth. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 181.—Bras.
dasyphylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 528 = Cnestis ramiflora.
discolor, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 180.—Bras.
diversifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 528.—Sumatra.
Doniana, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 179.—Bras.
florida, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 206.—Sumatra.
fluminensis, Baill. Hist. Pl. ii. 5 = Bernardinia fluminensis.
fraterna, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 416 = induta.
frutescens, Aubl. Pl. Gui. i. 467.—Guian.
fulgens, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 423.—Singapore.
Gardneriana, Planch. l. c. 417.—Bras.
glabra, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 41.—Venezuela.
Grosourdyana, Baill. Adansonia, ix. (1868-70) 149.—Venezuela.
heterophylla, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 456.—Afr. trop.
heterophylla, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 419.—Ins. Philipp.
humilis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 262.—Borneo.
induta, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 417.—Bras.
javanica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 262.—Java.
ligulata, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 181.—Bras.
lucida, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 423.—Java.

ROUREA :—

- macrophylla*, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 183.—Bras.
Martiana, Baker, l. c. 178.—Bras.
microphylla, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 421.—China.
Milletii, Planch. l. c. 420 (Milletii).—China.
mimosoides, Planch. l. c.—Ins. Nicobar.
multiflora, Planch. l. c. 418.—Ins. Philipp.
myriantha, Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 198.—Afr. trop.
nitida, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 423.—Java.
oblongifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 283 = glabra.
orientalis, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 230 = Byrsocarpus orientalis.
Palisotii, Baill. l. c. 233, in textu.—Afr. trop.
parallela, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 421 = similis.
parvifolia, Planch. l. c. 420 = concolor.
paucifoliata, Planch. l. c. 415 = glabra.
Pervilleana, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 232.—Ins. Mascar.
phyllanthoides, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.
platysepala, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 336.—Madag.
polyphylla, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.
puberula, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 179.—Bras.
pulchella, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 419.—Malacca.
reticulata, Planch. l. c. 416 = induta.
revoluta, Planch. l. c. 415.—Guian.
rugosa, Planch. l. c. 422.—Malaya.
santaloides, Wight & Arn. Prod. 144.—Ind. or.
sclerocarpa, Wight & Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 51 = Connarus Wightii.
similis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.
simplicifolia, Blume, l. c. 263.—Sumatra.
Solanderi, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 456.—Afr. trop.
Sookurthoontee, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 265 = commutata.
sororia, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 421 = similis.
stenopetala, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 49.—Burma.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xxvi. (1853) 221.—Guian.
villosa, Planch. l. c. xxiii. (1850) 422.—Burma; Sumatra.
Wallichiana, Planch. l. c. 421.—Burma.

ROUREOPSIS, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 423. **CONNARACEAE** [Benth. & Hook. f. i. 432].
javanica, Planch. l. c.—Java.
pubinervis, Planch. l. c.—Malaya.

ROUSSAEEA, DC. Prod. vii. 522 (1839) = seq.

ROUSSEA, Sm. Ic. Ined. i. 6. t. 6 (1789). **SAXIFRAGEAE**, Benth. & Hook. f. i. 645.
ROUSSAEEA, DC. Prod. vii. 522 (1839).
ROUSSEAUUVIA, Boj. Hort. Maurit. 246 (1837).
ROUSSOA, Roem. & Schult. Syst. iii. 3, 92 (1818).
salicifolia, Spreng. Syst. i. 419 = Lucuma Sellowii.
simplex, Sm. Ic. Ined. i. 6. t. 6.—Ins. Mascar.

ROUSSEAUUVIA, Boj. Hort. Maurit. 246 (1837) = praec.

ROUSSEAUUXIA, DC. Prod. iii. 152 (1828). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 753.
articulata, DC. l. c. = Dichaetanthera articulata.
chrysophylla, DC. l. c. 153.—Madag.

ROUSSELIA, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 503 (1826). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 393.
LITHOCNIDE, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48 (1836).
lappulacea, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 503.—Ind. occ.

ROUSSINIA, Gandich. Bot. Voy. Bonite, t. 21 (1844-52) = **Pandanus**, Linn.
indica, Gandich. l. c. t. 21. ff. 1-4 = P. Leram.
indica, Gandich. l. c. t. 21. ff. 5-9 = P. palustris.

ROUSSOA, Roem. & Schult. Syst. iii. 3, 92 (1818) = **Rousseau**, Sm. (Saxifr.).

ROXBURGHIA, [Banks, in] Roxb. Pl. Corom. i. 29. t. 32 (1795) = *Stemona*, Lour. (Roxburgh.).
gloriosa, Pers. Syn. i. 412 = *S. tuberosa*.
gloriosoides, Roxb. Pl. Corom. i. 26. t. 32 = *S. tuberosa*.
gloriosoides, Zoll. ex Kunth, Enum. Pl. v. 288 = *javonica*.
japonica, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 9 = *S. japonica*.
japonica, Miq. ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 92, in syn. = *S. sessilifolia*.
javonica, Kunth, Enum. Pl. v. 288. —Malaya; Austral.
moluccana, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 9. —Ins. Molucc.
rostrata, Russ. Herb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 57, 58 = *Thunbergia fragrans*.
ruscifolia, Zucc. ex Schnizl. Iconog. i. t. 56^b. f. 17. —Hab. ?
sessilifolia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 211 = *S. sessilifolia*.
Stemona, Steud. Nom. ed. II. ii. 475 = *S. tuberosa*.
viridiflora, Sm. Exot. Bot. i. 111 = *S. tuberosa*.

ROXBURGHIA, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 168 (1820) = *Olaux*, Schreb.
baccata, Koen. ex Roxb. l. c. = *O. scandens*.

ROYDSIA, Roxb. Hort. Beng. 42 (1814); Pl. Corom. iii. 86. t. 289 (1819); Fl. Ind. ii. 643 (1832).
CAPPARIDAE, Benth. & Hook. f. i. 110.
STIXIS, Lour. Fl. Cochinch. 295 (1790), nomen prius.
floribunda, Planch. ex Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409 = *philippinensis*.
obtusifolia, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. l. c. 180. —Burma.
parviflora, Griff. Notul. iv. 578. —Burma.
philippinensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) 11. 329. —Ins. Philipp.
suaveolens, Roxb. Hort. Beng. 42; Pl. Corom. iii. 86. t. 289; Fl. Ind. ii. 643. —Reg. Himal.

ROYENA, Linn. Gen. ed. I. 114 (1737). *EBENA-CEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 663.
ambigua, Salisb. Prod. 285 (Quid?). —Afr. austr.
ambigua, Vent. Jard. Malm. 17. —Afr. austr.
angustifolia, Salisb. Prod. 285. —Hab. ?
angustifolia, Willd. Sp. Pl. ii. 633 = *hirsuta*.
brachiata, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 213 = *pallens*.
cistoides, Welw. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 87. —Afr. trop.
cordata, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 211. —Afr. austr.
corylifolia, Salisb. Prod. 284 = *villosa*.
crassifolia, Salisb. l. c. 285. —Afr. austr.
cuneata, Poir. Encyc. vi. 322 = *hirsuta* ?
cuneata, Spreng. Syst. ii. 360 = *pallens*.
cuneifolia, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 214 = *pallens*.
decidua, Burch. Trav. i. 317 = *pallens*.
falcata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 217 = *glabra*.
glabra, Linn. Sp. Pl. 397. —Afr. austr.
glandulosa, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 89. —Afr. austr.
hirsuta, Jacq. Coll. v. 110. t. 13. f. 1 = *pallens*.
hirsuta, Linn. Sp. Pl. 397. —Afr. austr.
hirsuta, Sieber, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 214 = *glabra*.
hispidula, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 85 = *pallens*.
latifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 23, nomen. —Hab. ?
lucida, Linn. Sp. Pl. 397. —Afr. austr.
lycioides, Desf. Tabl. ed. I. 79, nomen; A. DC. in DC. Prod. viii. 214 = *pallens*.
macrophylla, E. Mey. ex A. DC. l. c. 218 = *Euclea natalensis*.
media, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475, nomen. —Afr. austr.
microphylla, Burch. Trav. i. 348 = *hirsuta*.
myrtifolia, Salisb. Prod. 285 = *glabra*.
nitens, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 87. —Afr. austr.
oleifolia, Desf. ex Hiern, l. c. 85 = *pallens*.
opaca, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 217 = *cordata*.

VOL. II.

ROYENA:—

ovalifolia, Salisb. Prod. 285 = *Euclea polyandra*.
pallens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 80. —Afr. austr.
parviflora, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 88. —Afr. austr.
polyandra, Linn. f. Suppl. 240 = *Euclea polyandra*.
pubescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 457 = *pallens*.
ramulosa, E. Mey. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 212 = *pallens*.
rufescens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 217 = *Euclea ovata*.
rugosa, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 212 = *hirsuta*.
scabra, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 13 = *villosa*.
scabrida, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 82. —Afr. austr.
scandens, Burch. ex Hiern, l. c. = *villosa*.
sericea, Bernh. in Flora, xxvii. (1844) 824 = *pallens*.
sessilifolia, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 84. —Hab. ?
supra-cordata, Burch. ex Hiern, l. c. 81 = *cordata*.
villosa, Linn. Syst. ed. XII. 302. —Afr. austr.

ROYENIA, Hout. ex Linn. Gen. ed. I. 348 (1737) = *Loeselia*, Linn. (Polemon).

ROYLEA, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475 (1841) = *Melanocenchris*, Nees (Gramin.).
Pennisetum, Nees, ex Steud. l. c. = *M. Royleana*.

ROYLEA, Wall. Pl. As. Rar. i. 57. t. 74 (1830).
LABIATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1212.
elegans, Wall. l. c. —Reg. Himal.

RUAGEA, Karst. Fl. Columb. ii. 51. t. 126 (1862?) = *Guarea*, Linn. (Meliac.).
glabra, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xv. (1872) 368 = *G. Trianae*.
pubescens, Karst. Fl. Columb. ii. 51. t. 126 = *G. Ruagea*.

RUBACHIA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 11 = *Marlierea*, Cambess. (Myrtac.).
Antonia, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 29. —Bras.
glomerata, Berg, l. c. 31, 536. —Bras.
involuta, Berg, l. c. 29. —Bras.
lateriflora, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 12. —Bras.
Neuwiediana, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 29. —Bras.
obumbrans, Berg, l. c. 28. —Bras.
spathulata, Berg, l. c. 535. —Bras.
spiciflora, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 12. —Bras.

RUBENTIA, Boj. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475 (1841) = *Toddalia*, Juss. (Rutac.).
angustifolia, Boj. ex Steud. l. c. = *T. aculeata*.

RUBENTIA, Comm. ex Juss. Gen. 378 (1789) = *Elaeodendron*, Jacq. f. (Tiliac.).
angustifolia, Colla, Hort. Ripul. App. ii. 356 = *E. orientale*.
longifolia, Desf. Tabl. ed. I. 201 = *E. orientale*.
mauritiana, Desf. l. c. = *E. orientale*.
olivina, J. F. Gmel. Syst. 408 = *E. orientale*.

RUBEOLA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 144 (1763) = *Crucianella*, Linn. (Rubiace.).
angustifolia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 398 = *C. angustifolia*.
heterophylla, Moench, Meth. 526 = *C. latifolia*.
latifolia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 398 = *C. latifolia*.
linearifolia, Moench, Meth. 525 = *C. angustifolia*.
maritima, Moench, l. c. 526 = *C. maritima*.

RUBIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *RUBIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 149.
acalculata, Cav. Ic. ii. 75. t. 195 = *tinctorum* ?
aculeata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 237, nomen = *himalayensis*.
acuminata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 127 = *Galium uropetalum*.
affinis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 111 = *vilis*.
alata, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 384 = *cordifolia*.
albicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 53. —Persia.
anglica, Huds. Fl. Angl. ed. I. 54 = *peregrina*.

RUBIA:—

angustifolia, Linn. Mant. i. 39. —Lusit.; Ins. Balear.
angustissima, Wall. Cat. n. 6207. —Reg. Himal.; Burma.
Aparine, Baill. Hist. Pl. vii. 373 = *Galium Aparine*.
aspera, Pohl, ex DC. Prod. iv. 592 (*Relbunii* sp.). —Bras.
Aucher, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 54. —Persia; Arab.; Afghan.
Aucher, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 463, partim = *peregrina*.
Bocconi, Petagn. Inst. Bot. ii. 255 = *peregrina*.
borealis, Baill. Hist. Pl. vii. 374 = *Galium boreale*.
brachypoda, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 57 = *Olivierii*.
Braunii, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 27 = *discolor*.
brevicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 100 = *albicaulis*.
Brownii, Michx. Fl. Bor. Am. i. 81 = *Galium hispidulum*.
Brownii, Sprng. Syst. i. 397 = *Relbunium hypocarpium*.
canariensis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 706 = *fruticosa*.
charaefolia, Wall. Cat. n. 6210 = *angustissima*.
chilensis, Molina, Sagg. Chile, 141 = *Galium chilense* (in Addend.).
chilensis, Willd. Sp. Pl. i. 604 = *Relbunium hypocarpium*.
chinensis, Regel & Maack, in Regel, Tent. Fl. Ussur. 76. —As. or.
ciliata, DC. Prod. iv. 591 = *Relbunium ciliatum*.
clematifolia, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 338 = *cordifolia*.
cordata, Thunb. Fl. Jap. 60 = *cordifolia*.
cordifolia, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 344 = *discolor*.
cordifolia, Linn. Syst. ed. XII. 229. —As. trop. et temp.; Afr. trop.
cordifolia, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 151 = *petiolaris*.
corymbosa, DC. Prod. iv. 591 (*Relbunii* sp.). —Peruv.
cretica, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 342 = *Olivierii*.
crocea, DC. Prod. iv. 591 (*Relbunii* sp.). —Peruv.
Cruciata, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *Galium Cruciata*.
dalmatica, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 342 = *peregrina*.
debilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 340. —Ecuador.
diffusa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 592 (*Relbunii* sp.). —Bras.
discolor, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xviii. (1845) i. 310. —Abyss.
dolichophylla, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. ii. (1844) 115. —Soongar.
Donietii, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 156 = *Olivierii*.
Edgeworthii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 203. —Reg. Himal.
ephedroides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 231. —Bras.
equisetoides, Cham. & Schlecht. l. c. 232. —Bras.
florida, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 70. —Persia.
fruticosa, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 147. —Ins. Canar.
galioides, Poir. Encyc. Suppl. ii. 705 = *fruticosa*.
glabra, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 112. —Bras.
glomerata, Pohl, ex DC. Prod. iv. 566 = *Triodon glomeratus*.
gracilis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 111 = *Asperula Platygallium*.
graeca, Baill. Hist. Pl. vii. 376 = *Galium graecum*.
guadaloupensis, Spreng. Syst. i. 397. —Ins. Guadal.
Haenkeana, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 363. —Chili.
himalayensis, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 86. —Reg. Himal.
hirsuta, Schlecht. ex Wedd. Chlor. And. ii. 37 = *Galium hirsutum*.
hirta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 338 = *Relbunium ciliatum*.
hispidula, Willd. ex Spreng. Syst. i. 397 = *Relbunium hypocarpium*.
hypocarpia, DC. Prod. iv. 591 = *Relbunium hypocarpium*.
iberica, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 463 = *tinctorum*.
incana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 333 = *Relbunium hypocarpium*.
indecora, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 229 = *Relbunium hypocarpium*.

RUBIA :—

intricata, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 362 = *Galium latoramosum*.
javana, DC. Prod. iv. 588 = cordifolia.
Kotschy, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 70 = albicaulis.
laevigata, DC. Prod. iv. 591 = *Relbunium laevigatum*.
laevis, Poir. Voy. Barb. ii. 111 = *Galium Poirertianum*.
laevis, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 151 = Thunbergii.
Linnaeana, Baill. Hist. Pl. vii. 374 = *Galium trifidum*.
longifolia, Poir. Encyc. Suppl. ii. 705 = angustifolia.
lucida, Linn. Syst. ed. XII. 732 = peregrina.
lucida, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ii. 32 = Olivierii.
Manjith, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 177 = cordifolia.
micans, Fl. Corc. in Ionios Anthol. iv. 944 (Quid ?).—Ins. Corcyra.
mitis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 112 = chinensis.
Mollugo, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *Galium Mollugo*.
monantha, DC. Prod. iv. 591.—Peruv.
montana, Steud. Nom. ed. II. i. 659, in syn. = praec. ?
mucronata, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 363 = diffusa ?
Munjista, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 374 = cordifolia.
nitida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 339 (*Relbunium* sp.).—Ecuador.
noxia, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 229 (*Relbunium* sp.).—Bras.
Olivierii, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 132.—Ins. Scio.
orinocensis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 228 = *Relbunium hypocarpium*.
orinocensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 339 (*Relbunium* sp.).—Venezuela.
ovalis, DC. Prod. iv. 591 (*Relbunium* sp.).—Peruv.
palustris, Baill. Hist. Pl. vii. 373 = *Galium palustre*.
pauciflora, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 54.—Persia.
peregrina, Linn. Sp. Pl. 109.—Europ.; Reg. Mediterr.
peregrina, Murith, Bot. Valais, 91 = tinctorum.
peregrina, Walt. Fl. Carol. 86 = *Galium hispidulum*.
peregrina, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 410 = *Galium tataricum*.
petiolaris, DC. Prod. iv. 588.—Afr. austr.
purpurea, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 84. t. 92 = cordifolia.
pusilla, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 363 = *Galium pusillum*, Endl.
ramosissima, Pohl, ex DC. Prod. iv. 591 = *Relbunium hypocarpium*.
Relbun, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 229 = *Relbunium hypocarpium*.
Requienii, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 247 = angustifolia.
Richardiana, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 362.—Chili.
rigida, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *Galium rigidum*.
rotundifolia, Poir. Encyc. Suppl. ii. 706 = peregrina.
rotundifolia, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 267.—Syria.
rupestris, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 111 = *Relbunium hypocarpium* ?
scabra, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 340.—Ecuador.
scabra, Salisb. Prod. 59 = fruticosa.
scandens, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 66 = cordifolia.
secunda, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 10 = cordifolia.
Sellowiana, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 214 (*Relbunium* sp.).—Bras.
sikkimensis, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 188.—Reg. Himal.
splendens, Hoffm. & Link, Fl. Port. ii. 67. t. 85 = peregrina.
sylvestris, Brot. Fl. Lusit. i. 153 = peregrina.
sylvestris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = tinctorum.
syrticola, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 111 = *Asperula scoparia*.
tatarica, Nym. Consp. 323, in syn.; Baill. Hist. Pl. vii. 374 = *Galium tataricum*.
techenis, Rafin. Fl. Ludov. 76 = *Galium hispidulum*.
tenuifolia, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 273 = Olivierii.
Thunbergii, DC. Prod. iv. 590.—Afr. austr.
tibetica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 204.—Tibet occ.
tinctoria, Salisb. Prod. 59 = tinctorum.

RUBIA :—

tinctorum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 68 = *Galium Aparine*.
tinctorum, Linn. Sp. Pl. 109.—Europ. austr.; Oriens.
tinctorum, With. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 193 = peregrina.
trachyantha, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 70 = albicaulis.
tricornis, Baill. Hist. Pl. vii. 373 = *Galium tricornis*.
tuberculosa, Benth. Pl. Hartw. 195 = *Relbunium tuberosum*.
valantioides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 231 (*Relbunium* sp.).—Bras.
vera, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *Galium verum*.
vilis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 230 (*Relbunium* sp.).—Bras.
Walteri, DC. Prod. iv. 590 = *Galium hispidulum*.

RUBINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Antidesma* ?, Burm. (Euphorb.).

RUBIOIDES, Soland. ex Gaertn. Fruct. i. 112 (1788) = *Opercularia*, Gaertn. (Rubiaceae).
aspera, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 205 = *O. aspera*.
diphylla, Soland. ex A. Cunn. l. c. = *O. diphylla*.

RUBUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *ROSA-CEAE*, Benth. & Hook. f. i. 616.

AMETRON, AMPOMELE, CUMBATA, CYLASTIS, DYC-TISPERMA, MANTEIA, SELNORITION, Rafin. Sylva Tellur. 159–161 (1838).

CYLACTIS, Rafin. in Am. Journ. Sc. Ser. I. i. (1819) 377.

DALIBARDA, Linn. Sp. Pl. 491 (1753).

abortivus, Kuntze, Method. 69.—Archip. Luchu.

abruptus, Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. I. 92 = ulmifolius.

absconditus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 167.—Europ.

acanthophyllus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 161.—Venezuela.

acanthostachys, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 232 = pubescens, Weihe.

acaulis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 298 = arcticus.

acerifolius, Wall. Cat. n. 744 = glomeratus.

aceroideus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 36 = trifidus.

acheruntinus, Tenore, Syll. Fl. Neap. 603 = caesius.

acicularis, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 203.—Europ.

aciculatissimus, Hegetschw. Fl. Schw. 490.—Helvet.

aciculatus, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 172 = serpens.

acidacanthos, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 240 = tomentosus.

aciodontos, Lefèv. ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 83.—Europ.

acridentulus, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 67 = hirtus.

acroleucophorus, Ripart, ex Genev. l. c. 290 = tomentosus, Borck.

aculeatissimus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 300 = rosaceus.

aculeatus, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 706, nomen.—Hab. ?

aculeoidaeus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224, nomen.—Gallia.

aculeolatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 228.—Europ.

acuminatissimus, Hassk. in Hoef. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 146.—Java.

acuminatus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 92 = thyrsoides.

acuminatus, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 43.—Reg. Himal.

acutatus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 144.—Europ.

acutiflorus, Greml. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 124.—Europ.

acutifolius, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 211.—Europ.

acutipetalus, Lefèv. & P. J. Muell. l. c. 174 = macrophyllus.

acutisepalus, P. J. Muell. l. c. 207.—Europ.

acutus, Pritz. Ic. Ind. ii. 247, sphalm. = *Rumex acutus*.
adenoleucus, Chabois. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 267 = nemorosus.
adenophyllus, G. Braun, ex Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 99.—Europ.

RUBUS :—

adenotrichos, Schlecht. in Linnaea, xlii. (1839) 267.—Mexic.
adornatus, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 234.—Europ.
adpressus, Ripart & Genev. in Genev. Monog. Rub. ed. II. 257 = arduennensis.
adscitus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 88 = hirtus.
adspersus, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 602 = carpinifolius.
aegopodioides, Ser. in DC. Prod. ii. 565 = triflorus.
affinis, Betcke, in Meklenburg. Archiv, iv. (1850) 93 = sulcatus.
affinis, Liebm. in Fl. Dan. t. 2539 = thyrsoides.
affinis, Madden, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 337 = ellipticus.
affinis, Weihe & Nees, Rub. Germ. 18 (err. typ. 22).—Europ.
agastachys, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 204 = geniculatus.
aggregatus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 277 = obscurus.
agrestis, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 297. t. 268 = tomentosus, nemorosus.
agriacanthus, Genev. Monog. Rub. ed. II. 297.—Europ.
albatus, Bayer, Bot. Excurs. Oesterr. 289 = bifrons.
albescens, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 519 = lasiocarpus.
albicans, Kit. ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. ii. 80.—Hungar.
albicomus, Greml. Beitr. Fl. Schw. 30 = saltuum.
albidus, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 288 = villicaulis.
albomicans, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 277.—Europ.
alcaefolius, Poir. Encyc. vi. 247 = moluccanus.
alceaefolius, Vidal, Sinops. t. 46. f. C = Rolfei.
alpestris, Blume, Bijdr. 1108.—Java.
alpinus, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 7.—Jamaic.
alterniflorus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 160 = macrophyllus.
althaeifolius, Bab. Fl. Camb. 305 = tomentosus, Borck.
althaeoides, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 222.—China.
althaeaeifolius, Host, ex Tratt. Ros. iii. 37 = nemorosus.
amaeniflorus, Lefèv. in Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 256 = amoeniflorus.
ambifarius, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = tomentosus, Borck. ?
ambiguus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 258.—Europ.
amblycaulon, Boul. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 28 = nemorosus.
amblystachys, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 307.—Europ.
amiantinus, Focke, Syn. Rub. Germ. 192, 195.—Europ.
amictifolius, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 298 = tomentosus, Borck.
amictus, P. J. Muell. ex Genev. l. c. 156 = vestitus.
ammobius, Focke, Syn. Rub. Germ. 118.—Europ.
amoeniflorus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223.—Europ.
amoenus, Koehl. in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. II. 54 = hirtus.
amoenus, Portenschl. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 146 = ulmifolius.
amphibolus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 89.—Europ.
amphichloros, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 279 = Sprengelii.
amphitapos, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 240 = tomentosus, Borck.
amplificatus, E. Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 58 = macrophyllus.
amplifolius, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 294 = hirtus.
amplithyrus, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
amygdalanthus, Focke, Syn. Rub. Germ. 174 = thyrsoides.
anadenes, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 191 = macrophyllus.

RUBUS:—

- analogus*, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 232 = hirtus.
- anceps*, Boul. & Letendre, ex Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 224 = umbelliformis.
- anchostachys*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xx. (1866) 32 = ulmifolius.
- ancistrophorus*, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 268.—Europ.
- Andersoni*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 333.—Reg. Himal.
- Andersonii*, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 218, 222.—Europ.
- angulatus*, Rafin. *Fl. Ludov.* 98 (Quid?).—Am. bor.
- angulosus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 128.—Europ.
- angustatus*, Chab. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 92.—Europ.
- angustifolius*, Kaltenb. *Fl. Aach. Beckens*, 274.—Europ.
- angustifolius*, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 119.—Europ.
- anomalus*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 136 = tomentosus, Borch.
- anoplostachys*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 292.—Europ.
- antarcticus*, Kuntze, *Method.* 115 = geoides, radicans, Cav., Gunnianus.
- antennifer*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 337.—Reg. Himal.
- apertionum*, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 253.—Europ.
- apetalus*, Poir. *Encyc.* vi. 242.—Afr. trop.; Ins. Borbon.
- apiculatus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 680.—Europ.
- apiculiferus*, P. J. Muell. & Timb. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.
- appendiculatus*, Tratt. *Ros.* iii. 31.—Hungar.
- approximatus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 242.—Europ.
- approximatus*, Quest. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 307 = Fockeli.
- apricus*, Wimm. *Fl. Schles.* ed. III. (1857) 626 = Koehleri.
- aralioides*, Hance, in *Fourn. Bot.* xxii. (1884) 41.—China.
- archimonomophyllus*, Kuntze, *Method.* 124, in nota.—Hab.?
- arcticus*, Linn. *Sp. Pl.* 494.—Reg. bor. et arct.
- arctatus*, Kuntze, *Method.* 69 = moluccanus.
- arduennensis*, Libert, ex Lej. *Fl. Spa*, ii. 317.—Europ.
- arenarius*, Koehl. ex Wimm. & Grab. *Fl. Siles.* (1829) i. ii. 26 = fruticosus.
- arenarius*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 38 = tomentosus, Borch.
- arenosus*, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.
- Areschougii*, Blytt, in *Bot. Notiser* (1875), 43 = caesius.
- argentatus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 93 = pubescens, Weihe.
- argenteus*, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* ii. 434 = tomentosus, Borch.
- argenteus*, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 48 = thyrsoideus.
- argenteus*, Weihe & Nees, *Rub. Germ.* 45. t. 19 = pubescens, Weihe.
- argenteus*, Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 195 = amiantinus.
- argutifolius*, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 150 = Sprengelii.
- argutus*, Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 60 = villosus.
- argyropsis*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 170 = thyrsoideus.
- armeniacus*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 183.—Armenia.
- Arrhenii*, Beurl. ex Nym. *Consp.* 221 = corylifolius.
- Arrhenii*, Lange, *Haandb. Dansk. Fl.* ed. I. 309.—Europ.
- arvinus*, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 285.—Europ.
- Aschoffii*, Weihe, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 476 = corylifolius.
- asper*, D. Don, *Prod.* 234 = rosaefolius.
- asper*, F. & C. Presl, *Delic. Prag.* 222.—Europ.
- asper*, Royle, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 336 = macilentus, Jacq.
- asper*, Weihe, ex Lej. & Court. *Comp. Fl. Belg.* ii. 174 = rudis.

RUBUS:—

- aspericaulis*, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 141.—Europ.
- aspermus*, Ripart, ex Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 104 = Sprengelii.
- aspreticolus*, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 259.—Europ.
- assamensis*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 197.—Reg. Himal.
- asseruatus*, Ripart & Genev. in *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 136 = hirtus.
- assurgens*, Boul. & Bouv. ex Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 224 = nemorosus.
- atlanticus*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 314.—Alger.
- atratus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 70, 82 = rudis.
- atrocaulis*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 163 = villicaulis.
- atrorubens*, P. J. Muell. & Lefèv. l. c. 181.—Europ.
- atrorubens*, Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 234 = adornatus.
- atrovirens*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 153 = rosaceus.
- atrovirescens*, P. J. Muell. ex Nym. *Consp.* 219 = Lejeunei?
- attenuatus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 96 = Guentheri.
- australis*, Forst. f. *Prod.* 40.—N. Zel.
- australis*, Kern. in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, ii. (1871) 155; Nov. Pl. Sp. Decas, iii. 32 = tomentosus, Borch.
- austriacus*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 174 = thyrsoideus.
- avellanaefolius*, Koehl. ex Wimm. & Grab. *Fl. Siles.* (1829) i. ii. 24 = plicatus.
- avellanus*, P. J. Muell. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 129 = ulmifolius.
- aviicolus*, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 115.—Europ.
- axillaris*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 139.—Europ.
- axilliflorus*, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 280.—Europ.
- Babingtonii*, Bell Salter, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xv. (1845) 307 = thyrsoideus.
- badius*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 276.—Europ.
- Bagnalli*, Bloxam, ex Briggs, in *Bot. Exch. Club Rep.* 1876 (1878) 14 = Briggsii.
- baldensis*, Kern. in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, ii. (1871) 144; Nov. Pl. Sp. Decas, iii. 21 = tomentosus, Borch.
- Balfourianus*, Bloxam, ex Bab. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xix. (1847) 86 = corylifolius.
- balticus*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 350 = Koehleri.
- Banningii*, G. Braun, ex Focke, l. c. 148 = rhamnifolius.
- Banningii*, Focke, l. c. 261 = vulgaris.
- Barbeyi*, Favrat & Gremli, in *Gremli, Excurs. Schw.* ed. IV. 150 = arduennensis.
- Bastardianus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xiv. (1868) 87 = ulmifolius.
- bavarius*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 351 = Koehleri.
- Bayeri*, Focke, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xviii. (1868) 99.—Europ.
- begoniaefolius*, Holuby, l. c. xxv. (1875) 315.—Europ.
- Bellardi*, Libert, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 365 = serpens.
- Bellardi*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 688 = glandulosus.
- bellidiflorus*, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* i. 292 = ulmifolius.
- bellulus*, P. J. Muell. & Timb. ex Martr. *Fl. Tarn*, 215.—Europ.
- belophorus*, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 111.—Europ.
- Bergii*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 262 = fruticosus.
- berolinensis*, Krause, in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxvi. (1885) 16.—Europ.
- Bertramii*, G. Braun, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 117.—Europ.
- bertricensis* ×, Wirtg. ex Focke, l. c. 240.—Europ.
- Betckei*, Marss. *Fl. Neuvorpomm.* 148 = Metschii.
- betulinus*, D. Don, *Prod. Fl. Nap.* 233 = acuminatus.
- bhotanensis*, Kuntze, *Method.* 67 = moluccanus.
- bicolor*, Arrond. in *Bull. Soc. Polym. Morb.* (1862) 113; et ej. *Cat. Pl. Morb.* 34.—Gallia.
- bifidus*, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 220 = stenopetalus.

RUBUS:—

- biflorus*, Buch.-Ham. ex Sm. in *Rees, Cycl.* xxx. n. 9.—Reg. Himal.
- bifrons*, Vest, ex Tratt. *Ros.* iii. 28.—Europ.
- bijugus*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 200 = lasiocarpus.
- Billotii*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 283.—Europ.
- bipartitus*, Boul. & Bouv. ex Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 254 = arduennensis.
- birmanicus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 331.—Burma.
- biturigenis*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 59.—Europ.
- blanditus*, P. J. Muell. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 315 = Lejeunei.
- Blondaei*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 105 = rudis.
- Bloxami*, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 194 = thyrsoideus.
- Bloxamianus*, Colem. ex Baker, in *Bot. Exch. Club Rep.* 1862 (1863) 8 = R. Radula.
- Bloxamii*, Lees, in *Steele, Handb. Field Bot.* 55.—Europ.
- bogotensis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 220.—N. Granat.
- boliviensis*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 158.—Bolivia.
- bonariensis*, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 477, nomen.—Reg. Argent.
- Boraceus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 87.—Europ.
- borbonicus*, Pers. *Syn.* ii. 51.—Ins. Borbon.
- borealis*, Spach, ex Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 147 = strigosus.
- Borreri*, Bell Salter, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xv. (1845) 306 = Sprengelii.
- Boschianus*, Zoll. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xiv. (1857) 176.—Java.
- bosquetianus*, Timb. & P. J. Muell. ex Martr. *Fl. Tarn*, 212.—Europ.
- Bouweti*, Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 296 = ulmifolius.
- brachyadenes*, P. J. Muell. ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 33 = foliosus.
- brachyandrus*, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 29.—Europ.
- brachyanthus*, Prog. in *Ber. Bot. Ver. Landshut*, viii. (1882) 98.—Europ.
- brachybotrys*, Focke, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xvi. (1884) 170.—Europ.
- brachyclados*, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.
- brachypetalus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 96.—Europ.
- brachyphyllos*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 158 = arduennensis.
- brachystachys*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 200.—Europ.
- brachystemon*, Heimerl, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxii. (1882) 109.—Austria.
- bracteatus*, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 193 = thyrsoideus.
- bracteatus*, A. Gray, ex Kuntze, *Method.* 54 = Sieboldii.
- bracteatus*, Weihe, in *Lej. & Court. Comp. Fl. Belg.* ii. 162.—Europ.
- brasilensis*, Mart. *Cat. Hort. Monac.* (1829) 173.—Bras.
- bregutiensis*, Kern. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 300 = vestitus.
- brevicaulis*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 94.—Europ.
- breviflorus*, Gremli, l. c. 97.—Europ.
- brevipes*, Gremli, l. c. 96.—Europ.
- breviramus*, Ripart & Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 47 = Sprengelii.
- brevis*, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 33.—Europ.
- Briggsii*, Bloxam, in *Fourn. Bot.* vii. (1869) 33.—Europ.
- bucciburgensis*, Banning & Focke, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 148 = rhamnifolius.
- Buergeri*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 36.—Japon.
- buhnensis*, G. Braun, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 311 = obscurus, Kaltenb.
- bursonnensis*, Lefèv. ex Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 110 = thyrsoideus.
- caeruleus*, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 242 = caesius.
- caesio-idaeus*, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève.* ed. II. 294.—Europ.

RUBUS:—

- caesio-idiacus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 183 = *caesius*.
caesius, Boj. Hort. Maurit. 127 = fruticosus.
caesius, Linn. *Sp. Pl.* 493.—Europ.; Oriens; As. bor. Caffischii, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 278.—Europ.
calanthelos, Focke, l. c. 261 = vulgaris.
calcareus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 181 = virgultorum.
calcareus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 254 = pubescens, Weihe.
Caldesianus, Focke, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xvi. (1884) 169.—Europ.
caliculatus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens. 283 = serpens. californicus, Kuntze, *Method.* 102.—Calif.
callianthus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 294 = nemorosus.
calliphyllus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 168 = hirtus.
calvatus, Lees, in Kirby, Fl. Leicest. 42 = silvaticus.
calycinoides, Kuntze, *Method.* 67, 78 = moluccanus.
calycinus, Wall. in D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 235.—Reg. Himal.
campestris, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 284.—Europ.
canadensis, Linn. *Sp. Pl.* 494.—Am. bor.
canadensis, Torr. Fl. N. U. St. i. 488 = triflorus.
canaliculatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 182.—Europ.
candefactus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen.—Europ.
candicans, Lasch. in Linnaea, viii. (1833) 297 = thyrsoides.
candicans, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 601.—Europ.
canescens, DC. Cat. Hort. Monsp. 139 = tomentosus, Borck.
cannabinus, Boul. & Letendre, ex Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222 = ulmifolius.
cannabinus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 127.—Europ.
canus, Kit. in Rochel, Pl. Banat. Rar. 26, nomen = tomentosus, Borck.
cardiophyllus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 86 = arduennensis.
carisiensis, Ripart & Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 55 = ulmifolius.
carneiflorus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 169.—Europ.
carneistylus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 179.—Europ.
carpinctorum, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxi. (1882) 373.—Europ.
carpinifolius, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, vi. (1859) 76 = macrophyllus.
carpinifolius, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 58 = rhamnifolius.
carpinifolius, J. & C. Presl, Delic. Prag. 220 = plicatus.
carpinifolius, Weihe & Nees, Rub. Germ. 36. t. 13.—Europ.
Casparyi, Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 324 = R. Radula.
castoreus, Fries, Mant. ii. 37.—Europ.
causasicus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 183.—Reg. Caucas.
cavatifolius, P. J. Muell. ex Bab. in Journ. Bot. xvi. (1878) 144 = Koehleri.
cedrorum, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 694 = tomentosus, Borck.
celebicus, Blume, Bijdr. 1107.—Ins. Celebes.
celtidifolius, Focke, ex Gremli, Beitr. Fl. Schw. 33 = brachyandrus.
centronotus, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 411; Nov. Pl. Sp. Decas. iii. 18.—Tirol.
cerasifolius, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 98.—Europ.
cerchoviensis, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 91.—Europ.
cerinostylus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 156.—Europ.
cernuus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 194 = hirtus.
Chaboissaei, P. J. Muell. l. c. 156 = macrophyllus.
chalaranthus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 35 = Sprengelii.
Chamaemorus, Fisch. ex DC. Prod. ii. 565 = stellatus.
Chamaemorus, Linn. *Sp. Pl.* 494.—Reg. bor. et arct.

RUBUS:—

- chartaceus, Kuntze, *Method.* 61, 76.—Java.
chinensis, Ser. in DC. Prod. ii. 557 = rosaeifolius.
chinensis, Thunb. Diss. Rub. 8 = parvifolius.
chloracanthus, Boul. & Gillot, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 224 = thyrsoides.
chlorocarpus, Bor. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 239 = ulmifolius.
chlorophyllus, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = orthocanthus.
chlorostachys, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 303.—Europ.
chlorothyrsos, Focke, in Bremen, Abh. ii. (1871) 462 = silvaticus.
chnoophyllus, P. J. Muell. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 327 = tomentosus, Borck.
chnoostachys, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 240 = tomentosus, Borck.
chrysacanthus, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 454.—Europ.
chrysocarpus, Mundt, ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 17 = rigidus, Sm.
chrysohyllus, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. r. 380.—Java.
cicur, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 311.—Hungar.
cinerascens, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 197 = foliosus.
cinerascens, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 171 = obscurus, Kaltenb.
cinereus, Godr. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 544 = hirtus.
cinereus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 607 = tomentosus, Borck.
cinereus, Weihe, ex Reichb. l. c. 602 = pubescens, Weihe.
cissoides, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 245 = australis.
citriodorus, Lej. ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 163 = plicatus.
Clarkei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 337.—Reg. Himal.
clematitifolius, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 455.—Europ.
clethrapihus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 167 = carpinifolius.
coarctatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 133 = candicans.
cochinchinensis, Tratt. Ros. iii. 97.—China.
Colemanni, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicest. 38.—Europ.
collinus, DC. Cat. Hort. Monsp. 139.—Europ.; As. Min.
collinus, Delile, ex Nym. Consp. 218 = tomentosus, Borck.
collinus, Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 167 = arduennensis.
collinagus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 292 = ulmifolius.
coloratus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126 = hirtus.
comintanus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 298 = rosaeifolius.
Commersonii, Poir. Encyc. vi. 240 = rosaeifolius.
commiscibilis, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 301.—Europ.
commixtus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 112.—Europ.
communis, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222 = truncifolius.
communis, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 602 = vulgaris.
compactiflorus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen.—Europ.
compactus, Benth. Pl. Hartw. 129.—Peruv.
compas, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64, nomen.—Abyss.
concinus, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 309 = obscurus, Kaltenb.
concolor, Ley, in Rabenh. Bot. Centralbl. i. (1846) 434.—Europ.
concolor, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 249.—Ins. Madera.
concolor, Wall. Cat. n. 733 = niveus, Wall.
condensatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 167.—Europ.
confinis, Lindeb. in Bot. Notiser (1883), 105.—Suecia.
confinis, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 262.—Europ.
confinis, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 309 = tomentosus, Borck.

RUBUS:—

- confluentinus*, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 232 = pubescens, Weihe.
confusus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 231 = ulmifolius.
congestus, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 130 = ulmifolius.
conglomeratus, Boul. & Letendre, ex Lefèv. l. c. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.
conothyrso, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 271.—Europ.
consimilis, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 278.—Europ.
consimilis, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 236 = villicaulis.
consociatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 173.—Europ.
conspectus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 19.—Europ.
conspersus, Pritz. Ic. Ind. ii. 247, sphalm. = Rumex conspersus.
conspicuus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1859) 71; et Pollichia, xvi-xvii. (1859) 122 = vestitus.
constrictiflorus, Boul. & Timb. ex Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 219 = ulmifolius.
constrictifolius, Boul. ex Malbranche, l. c. xxvi. (1879) 126.—Europ.
constrictus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 79.—Europ.
contemptus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 245 = ulmifolius.
controversus, Ripart, ex Genev. l. c. 244 = ulmifolius.
convexifolius, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 302.—Europ.
coptophyllus, A. Gray, in Perry, Exped. Jap. ii. 311 = microphyllus.
corchorifolius, Linn. f. Suppl. 263.—China; Japon.
cordatus, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 671.—Europ.
cordifolius, D. Don, Prod. Fl. Nep. 233 = moluccanus.
cordifolius, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = glabriusculus.
cordifolius, J. & C. Presl, Delic. Prag. 219 = cordatus.
cordifolius, Weihe & Nees, Rub. Germ. 21. t. 5 = rhamnifolius.
cordigerus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 370 = serpens.
cordylifolius, Walp. Rep. ii. 16, sphalm. = Wahlbergii.
coreanus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 34.—China; Corea.
coriaceus, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 81.—Hungar.
coriaceus, Poir. Encyc. vi. 237.—Peruv.
coriifolius, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 157.—Mexic.
coronarius, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 144 = rosaeifolius.
coronatus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222 = serratifolius.
corylifolius, Bess. Enum. Pl. Volh. 47 = nessensis, sulcatus.
corylifolius, DC. Fl. Fr. iv. 475 = nemorosus.
corylifolius, Hayne, Arn. Gew. iii. t. 11 = plicatus.
corylifolius, Sm. Fl. Brit. 542.—Europ.
corylinus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 169.—Europ.
corymbiflorus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 283.—Europ.
corymbosus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 151 = orthocanthus.
corymbosus, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 600 = nitidus.
costaricanus, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 159.—Costa Rica.
costatus, Dum. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 161 = thyrsoides.
Courtoisiana, Lej. in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 170 = vestitus.
crassifolius, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 236 = pubescens, Weihe.
crassus, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 381.—Hungar.
crataegifolius, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 98.—China.
Crippsii, Clarke, Trav. i. ed. II. Add. p. xxii.—Turcia.
crispus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 147.—Europ.
cruentatus, P. J. Muell. l. c. 294 = obscurus, Kaltenb.
Cumingii, Kuntze, *Method.* 76.—Ins. Philipp.

RUBUS:—

- Cunctator*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 281.—Europ.
cuneatus, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 126 = *ulmifolius*.
cuneifolius, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève*. ed. II. 282.—Europ.
cuneifolius, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 347.—Am. bor.
cuneifolius, Weihe, ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 602 = *vulgaris*.
Cupanianus, Guss. *Fl. Sic. Syn.* i. 570.—Sicil.
curtidens, Gremli, *Excurs. Schw.* ed. IV. 144 = *foliosus*.
curvistylus, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 125 = *vestitus*.
cuspidatus, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 180 = *nemorosus*.
cuspidiferus, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 89 = *ulmifolius*.
cuspidifolius, P. J. Muell. l. c. 172.—Europ.
cyclopetalus, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 169 = *thyrsoides*.
cynomorus, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, x. (1861) 21.—Europ.
Dalibarda, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 708.—Am. bor.
dalibardoides, Kuntze, *Method.* 110 = *calycinus*.
dalmaticus, Guss. *Fl. Sic. Syn.* i. 567 = *ulmifolius*.
dalmatinus, Tratt. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 184 = *ulmifolius*.
darschilingensis, Kuntze, *Method.* 67 = *moluccanus*.
dasyclados, Kern. in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, ii. (1871) 155; *Nov. Pl. Sp. Decas*, iii. 38.—Europ.
Davidianus, Kuntze, *Method.* 58.—China.
debilis, Ball, in *Journ. Bot.* xi. (1873) 332.—Marocc.
debilis, Boul. ex *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 115.—Europ.
debilitatus, Ripart, ex *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 15 = *caesius*.
Decaisneanus, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 223 = *papulosus*.
Decheni, Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 220 = *macrophyllus*.
decipiens, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 158.—Europ.
Declotii, Ortm. in *Flora*, xviii. (1835) 489 = *nitidus*.
decorus, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 151.—Europ.
decumbens, Thunb. *Diss. Rub.* 5.—Am. bor.
decurtatus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 210.—Europ.
degener, Kuntze, *Method.* 122.—Hab. ?
degener, P. J. Muell. ex *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 22 = *caesius*.
delectus, P. J. Muell. ex *Nym. Consp.* 221 = *nemorosus*.
delicatulus, Martr. *Fl. Tarn*, 206.—Gallia.
delicatus, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 312.—Europ.
deliciosus, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 196.—Am. bor. occ.
deltaefolius, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 256 = *caesius*.
deltoides, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 181 = *tomentosus*, Borck.
demotus, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xiv. (1863) 91 = *ulmifolius*.
densiflorus, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 36 = *silvaticus*.
dentatus, Bab. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xvii. (1846) 241 = *Leightonianus*.
dentatus, Bloxam, in *Kirby, Fl. Leicest.* 39 = *glandulosus*.
denticulatus, Kern. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 282.—Europ.
dentosus, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.
depauperatus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 274 = *nemorosus*.
derasus, Lefèv. & P. J. Muell. l. c. 239.—Europ.
Deseglisei, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 130.—Europ.
despectus, *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 132 = *hirtus*.
Dethardingii, Krause, in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxvi. (1858) 18, nomen.—Europ.
dichromis, Prog. in *Ber. Bot. Ver. Landshut*, viii. (1882) 106 = *Bayeri*.
dicrophilus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 392 = *orthocanthus*.
diffusus, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 127 = *ulmifolius*.

RUBUS:—

- digitatus*, Spreng. *Pugill.* i. 34.—Hab. ?
dimorphus, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 124.—Europ.
discolor, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 146 = *rudis*.
discoideus, P. J. Muell. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 58.—Europ.
discolor, Auct. Scand. ex *Nym. Consp.* 217 = *villicaulis*.
discolor, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* i. 546 = *bifrons*.
discolor, Weihe & Nees, *Rub. Germ.* 46, partim = *ulmifolius*.
discolor, Weihe & Nees, l. c. t. 20 = *pubescens*, Weihe.
discriminatus, P. J. Muell. ex *Nym. Consp.* 221 = *nemorosus*.
disjectus, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 132.—Europ.
disjunctus, P. J. Muell. & Lefèv. l. c. 216.—Europ.
disparatus, P. J. Muell. l. c. 107.—Europ.
dissectus, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13 = *tomentosus*, Borck.
dissectus, Thunb. *Diss. Rub.* 5.—China.
dissociatus, Boul. & Malbranche, ex Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 223 = *scaber*.
distans, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 256 = *lasiocarpus*.
distactus, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 296 = *Koehleri*.
divaricatus, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 382.—Hungar.
divaricatus, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 130 = *carpinifolius*.
divergens, P. J. Muell. l. c. 182.—Europ.
divergens, Neum. in *Bot. Notiser* (1885), 90.—Europ.
diversifolius, Lindl. *Syn. Brit. Fl.* ed. I. 93 = *nemorosus*.
diversifolius, Tineo, *Pl. Rar. Sicil.* 41.—Sicilia.
divexiramus, P. J. Muell. ex *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 88 = *tomentosus*, Borck.
domesticus, Pritz. *Ind. ii.* 247, sphalm. = *Rumex domesticus*.
Donianus, Spreng. *Syst.* v. 602 = *foliolosus*.
Douglasii, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 477 = *leucodermis*.
Drejeri, G. Jens. in *Fl. Dan.* t. 3023 = *mucronatus*.
droseraceus, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 223 = *exsolutus*.
dryadeus, Ripart, ex *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 28 = *corylifolius*.
drymophilus, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 223.—Europ.
dubiosus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 237 = *tomentosus*, Borck. ?
dumetorum, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 267 = *Schiedeanus*.
dumetorum, Weihe, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 153 = *nemorosus*.
dumosus, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 220, nomen.—Europ.
dumosus, Salisb. *Prod.* 364 = *fruticosus*.
duricorius, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 23 = *tomentosus*, Borck.
durus, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 36.—Cuba.
dyscolus, Ripart & *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 44 = *nemorosus*.
Ebneri, Kern. in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, ii. (1871) 169; *Nov. Pl. Sp. Decas*, iii. 46 = *orthocanthus*.
echinaceus, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (1869) 201.—Hungar.
echinatus, Lindl. *Syn. Brit. Fl.* ed. I. 94 = *R. Radula*.
echinatus, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 171.—Europ.
echinophora, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 32 = *echinatus*.
Ecklonii, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 176.—Afr. austr.
effusus, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 116.—Europ.
eglandulosus, Lefèv. & P. J. Muell. l. c. 164.—Europ.
Eglanteria, Tratt. *Ros.* iii. 9 = *rosaeifolius*.
egregius, Focke, in *Bremen, Abh.* ii. (1871) 463 = *thyrsoides*.
eifeliensis, Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 235 = *Menkei*.
elatiar, Focke, in *Gremli, Beitr. Fl. Schw.* 50 = *thyrsoides*.
elegans, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 170.—Europ.

RUBUS:—

- ellipticus*, Sm. in *Rees, Cycl.* xxx. n. 16.—Ind. or.
elongatus, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 91 = *macrophyllus*.
elongatus, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève*. ed. II. 283.—Europ.
elongatus, Sm. *Pl. Ic. Ined.* t. 62.—Java.
emarginatus, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 164.—Europ.
emersistylus, Bab. in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 175 = *Briggsii*.
emersistylus, P. J. Muell. ex *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 77.—Europ.
enoplostachys, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 130 = *ulmifolius*.
Enslenii, Tratt. *Ros.* iii. 63 = *villosus*.
entomodontos, P. J. Muell. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 312 = *obscurus*.
epipsilos, Focke, l. c. 258 = *villicaulis*.
erectus, J. F. Gmel. *Syst.* 1616, sphalm. = *serratus*.
erectus, Koehl. ex Weihe, in *Wimm. & Grab. Fl. Siles.* (1829) i. II. 52.—Europ.
ericetorum, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 218, 223 = *linguifolius*.
eriocarpa, Liebm. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 162.—Mexic.
eriphyllus, Ripart, ex *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 337 = *tomentosus*, Borck.
eristachys, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 225.—Europ.
erubescens, Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 234 = *obscurus*.
erythracanthus, P. J. Muell. & Lefèv. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 250.—Europ.
erythradenes, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 288 = *hirtus*.
erythrinus, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 196 = *Sprengelii*.
erythroclados, Mart. ex Hook. f. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 62.—Bras.
erythrostylus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 157.—Europ.
euryptetalus, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 209 = *villicaulis*.
euryptetalus, Krause, in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxvi. (1885) 14.—Europ.
euryphyllus, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 295.—Europ.
exactus, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 167.—Europ.
exalbatus, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 161.—Europ.
exasperatus, Lefèv. & P. J. Muell. l. c. 149.—Europ.
excavatus, Lefèv. & P. J. Muell. l. c. 135 = *Sprengelii*.
excelsior, P. J. Muell. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 167 = *candicans*.
excultus, Lefèv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 221 = *ulmifolius*.
excurvatus, Kuntze, *Method.* 71 = *moluccanus*.
exilis, Lange, in *Fl. Dan.* t. 3027 = *R. Radula*.
expallescens, Timb. & Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 128 = *ulmifolius*.
expansus, Lefèv. & P. J. Muell. ex *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 44 = *tomentosus*, Borck.
exsecatus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 311 = *obscurus*.
exsolutus, Lefèv. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 241.—Europ.
exsuccus, Stend. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 256 = *apetalus*.
extensifolius, Boul. & Ripart, ex *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 334 = *tomentosus*, Borck.
fagicola, Martr. *Fl. Tarn*, 219.—Gallia.
fagifolius, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, v. (1830) 571.—Mexic.
Fairholmianus, Gardn. in *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 5 = *moluccanus*.
falcarius, P. J. Muell. ex Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 232 = *pubescens*, Weihe.
falcatus, Kaltenb. *Fl. Aach. Beckens*, 266 = *candicans*.
falciferus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 84.—Europ.
Falconeri, Kuntze, *Method.* 68 = *moluccanus*.
fallacinus, Ripart, ex *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 263 = *villicanlis*.
fallax, T. M. Chab. ex P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 155 = *thyrsoides*.

RUBUS:—

- fallax*, Kuntze, Method. 55 = moluccanus.
fasciculatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 182 = tomentosus, Borch.
fastigiatus, Bab. ex Nym. Consp. 221 = corylifolius.
fastigiatus, Weihe & Nees, Rub. Germ. 16. t. 2 = nessensis, sulcatus.
fastuosus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 220, nomen.—Europ.
ferox, Vest. ex Tratt. Ros. iii. 40 = horridus, nemorosus.
ferox, Wall. Cat. n. 724.—Reg. Himal.; Burma.
ferox, Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 153 = nemorosus.
ferriararum, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 40 = hirtus.
ferrugineus, Wickst. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1827) 68.—Ins. Guadaloup.
ferruginosus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 231.—Europ.
festivus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 314 = Lejeunei.
Fieberi, Ortm. in Opiz, Nom. 15 = nemorosus.
fimbriifolius, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 256 = thyrsoideus.
Finlaysonianus, Wall. Cat. n. 7109.—Siam.
firmitus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 94.—Helvet.
Fischii, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 5, 19.—Europ.
fissipetalus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 153 = rudis.
fissus, Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. II. 92 = nessensis.
flaccidifolius, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 300.—Europ.
flaccidus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 134 = villicaulis.
flagellaris, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 24 = trivialis.
flagellaris, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 261.—Europ.
flagellaris, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. II. (1818) 26 = triflorus.
flagellaris, Willd. Enum. Hort. Berol. 549 = canadensis.
flagelliformis, Koehl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 689 = glandulosus.
flavescens, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 195.—Europ.
flavo-virens, Genev. in Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 255, nomen = vestitus.
flavus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = ellipticus.
flexicaulis, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 71, 96 = Sprengelii.
flexipes, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.
flexuosus, Lej. Rev. Fl. Spa, 238, nomen.—Europ.
flexuosus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 240 = saltuum.
floccosus, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.
floribundus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 219.—Ecuador.
floribundus, Ley, in Rabenh. Bot. Centralbl. i. (1846) 435 = Lejeunei.
floribundus, Weihe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 684 = thyrsoiflorus.
floridus, Tratt. Ros. iii. 73 = villosus.
Fockeanus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 206.—Reg. Himal.
foliolatus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 216.—Europ.
foliolosus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 256.—Reg. Himal.
foliosus, Bab. Brit. Rub. 243 = silvaticus.
foliosus, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 35 = vestitus.
foliosus, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 682.—Europ.
fontinalis, Kuntze, Method. 60.—Java.
Fordii, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 298 = Hanceanus.
formidabilis, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 128.—Europ.
formosensis, Kuntze, Method. 73.—Ins. Formosa.
formosus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 127.—Europ.
fortis, Focke, Syn. Rub. Germ. 70.—Europ.
fossicola, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 381.—Europ.

RUBUS:—

- fragaria*, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i. (1791) 38.—Europ.
fragariaeflorus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 173.—Europ.
fragarioides, Bertol. Misc. Bot. xxii. 16.—Reg. Himal.
fragrans, Focke, Syn. Rub. Germ. 172 = thyrsoideus.
fragrans, Salisb. Prod. 364 = R. Idaeus.
frambaesianus, Lam. Fl. Fr. iii. 135 = R. Idaeus.
Frangipani, Tineo, ex Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 157 = ulmifolius.
fraternus, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 34 = vestitus.
fraxinifolius, Poir. Encyc. vi. 242.—Java.
frondosus, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 199 = villosus.
fruticetorum, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 279.—Europ.
fruticosus, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 236 = plicatus.
fruticosus, Linn. Sp. Pl. 493.—Europ.
fruticosus, Lour. Fl. Cochinch. 325 = cochinchinensis.
fruticosus, Marsh. Arbust. 137 = villosus.
fruticosus, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 58 = nessensis, sulcatus.
fruticosus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 220 = rhamnifolius.
fruticosus, Sm. Fl. Brit. ii. 543 = ulmifolius.
fruticosus, Weihe & Nees, Rub. Germ. 24 = candicans.
Fuckelii, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235.—Europ.
fuleratus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 178.—Europ.
furfuraceus, Wall. Cat. n. 739 = lasiocarpus.
fuscoater, Weihe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 681.—Europ.
fuscoater, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 156 = adornatus.
fuscus, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 681 = pallidus.
gallicus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 219, 221.—Europ.
Gardenerianus, Kuntze, Method. 42 = moluccanus.
geifolius, Kuntze, l. c. 97 = incisus.
Genevierii, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 193 = thyrsoiflorus.
geniculatus, Focke, in Bremen, Abh. i. (1868) 289 = carpinifolius.
geniculatus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 267.—Europ.
geoides, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 19.—Reg. Magellan.
Gerard-Martini, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 287 = Lejeunei.
geromensis, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 185 = serpens.
giganteus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 72, 98.—Europ.
glaber, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = R. Idaeus.
glaber, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 600 = nitidus.
glaberrimus, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 80 = leucanthus.
glabratus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 221.—Am. austr.
glabrefactus, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 227 = tomentosus, Borch.
glabriusculus, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 267.—Malaya.
glandulosus, Bell. in Mém. Acad. Turin, 1790-91 (1793), 230.—Europ.; Oriens.
glandulosus, Guenther. Grab. & Wimm. Enum. Pl. Siles. (1824) 86 = Guentheri.
glandulosus, Menke, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 680 = Menkei.
glandulosus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 607 = hirtus.
glandulosus, Schleich. & Willd. ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 152 = Schleicheri.
glandulosus, Spreng. ex Wallr. Sched. Crit. 231 = corylifolius.
glaphyrus, Ripart & Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 235 = pubescens, Weihe.
glancicomans, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.
glaucofolius, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 70 = leucodermis.
glaucoaulis, Kuntze, Method. 72.—Tibet.
glaucovirus, Maass. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xii. (1870) 162.—Europ.
glaucus, Benth. Pl. Hartw. 173.—N. Granat.
glomeratus, Blume, Bijdr. 1111.—Java.
glomeriflorus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98.—Europ.

RUBUS:—

- gломicellus*, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen.—Europ.
Godroni, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 540 = pubescens, Weihe.
Godroni, Lec. & Lamotte, Cat. Pl. Centr. Fr. 151 = nemorosus.
Godroni, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 184.—Europ.
goniophyllus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 80.—Europ.
gorizianus, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 129; Nov. Pl. Sp. Decas, iii. 6.—Europ.
Gowreepul, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 517 = ellipticus.
Grabowskii, Bab. Brit. Rub. 123 = carpinifolius.
Grabowskii, Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. II. 32 = thyrsoideus.
gracilentus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 245.—Europ.
gracilescens, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 104 = Bayeri.
gracilicaulis, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 125 = hirtus.
gracilis, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 380.—Europ.
gracilis, J. & C. Presl, Delic. Prag. 220 = nemorosus.
gracilis, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 519 = niveus, Wall.
grandiflorus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 291 = nemorosus.
grandiflorus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 108 = macrophyllus.
grandifolius, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 32.—Ins. Madera.
grandifolius, Salisb. Prod. 364 = odoratus.
granulatus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 154.—Europ.
gratiflorus, P. J. Muell. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 198 = macrophyllus.
gratiosus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 153.—Europ.
gratus, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 26 = villicaulis.
Grayanus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 152.—Archip. Luchu.
Gremlii, Focke, Syn. Rub. Germ. 266.—Europ.
Grenierii, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221 = goniophyllus.
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 327.—Reg. Himal.
grypoacanthus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 133 = hirtus.
Guentheri, Bab. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xix. (1847) 17 = seq.
Guentheri, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicest. 41 = saltuum.
Guentheri, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 679.—Europ.
guestphalicus, Focke, Syn. Rub. Germ. 431 = obscurus.
Gunnianus, Hook. Ic. Pl. t. 291.—Tasmania.
guyanensis, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 160.—Guian.
gymnostachys, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 28 = thyrsoiflorus.
gymnostylos, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 306.—Europ.
Haellstroemi, Kuntze, Method. 130 = arcticus.
hakonensis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 333 = Lambertianus.
Hamiltoni, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 328.—Reg. Himal.
Hamiltonianus, Ser. in DC. Prod. ii. 566 = moluccanus.
hamosus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 71, 94 = arduennensis.
hamulosus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 76 = nitidus.
Hanceanus, Kuntze, Method. 72.—China.
Harpago, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 100.—Europ.
Hasskarlii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. r. 331 = glomeratus.
Hasskarlii, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 306 = Menkei.
hawaiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 504. t. 56.—Ins. Sandvic.

RUBUS:—

- hebecarpus, *P. J. Muell. in Bonplandia*, ix. (1861) 282.—Europ.
 hedycaurus, *Focke, Syn. Rub. Germ.* 190.—Europ.
 helveticus, *Gremli, Beitr. Fl. Schw.* 36=silvaticus.
 hemistemon, *P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 314=nessensis.
 heptaphyllus, *Opiz, in Flora*, v. (1822) 269=nessensis.
 hercynicus, *G. Braun, ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 370.—Europ.
 heteracanthus, *P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 102.—Europ.
 heteracanthus, *Weihe, ex Lej. Rev. Fl. Spa*, 101=rosaceus.
 heterocaulon, *Ortm. in Opiz, Nom.* 14=nessensis.
 heteroclitus, *P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 127=carpinifolius.
 heteromorphus, *Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 255.—Europ.
 heterophyllus, *Host, Fl. Austr.* ii. 32.—Europ.
 heterophyllus, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 38.—Am. bor.
 hevellicus, *Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxvi. (1885) 18.—Europ.
 hexagynus, *Roxb. Hort. Beng.* 39; *Fl. Ind.* ii. 516.—Reg. Himal.; Burma.
 hibiscifolius, *Focke, in Bremen, Abh.* iv. (1874) 197.—Reg. Himal.
 hiemalis, *Kuntze, Method.* 69=moluccanus.
 Hillii, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict.* ii. (1858) 67=moluccanus.
 himalaicus, *Kuntze, Method.* 66=moluccanus.
 Hippolapathum, *Pritz. Ic. Ind.* ii. 247, sphalm.=Kumex Hippolapathum.
 hirsutuosus, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 72, 98.—Europ.
 hirsutus, *J. & C. Presl, Delic. Prag.* 221.—Europ.
 hirsutus, *Thunb. Diss. Rub.* 7.—Japon.
 hirsutus, *Wimm. Fl. Schles.* ed. III. (1857) 627=Koehleri.
 hirsutus, *Wirtg. Prod. Fl. Pr. Rheinl.* 61=vestitus.
 hirtellus, *Ripart, ex Genev. Monog. Rub.* ed. II. 318=villicaulis.
 hirtifolius, *P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 290=vestitus.
 hirtocaulis, *Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 251.—Europ.
 hirtus, *Aspegren, Förs. Blekingst. Fl.* 37=Koehleri.
 hirtus, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 607=glandulosus.
 hirtus, *Roxb. Hort. Beng.* 38; *Fl. Ind.* ii. 518=ellipticus.
 hirtus, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* ii. 150, t. 141.—Europ.; Reg. Caucas.
 hispanicus, *Willk. in Bot. Zeit.* ii. (1844) 819=ulmifolius.
 hispidulus, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 51=carpinifolius.
 hispidulus, *Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 361=Schleicheri.
 hispidus, *Linn. Sp. Pl.* 493.—Am. bor.
 hispidus, *Marsh. Arbust.* 137=trivialis.
 hispidus, *E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève.* ed. II. 275=obscurus, *Kaltenb.*
 Histrix, *Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 687=Hystrix.
 Histrix, *Koehl. ex Bluff & Fingerh. l. c.* 681=Koehleri.
 Hochstetterorum, *Seub. Fl. Azor.* 48.—Ins. Azor.
 Hoffmeisterianus, *Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1847) 14=niveus, *Wall.?*
 Hollandrei, *P. J. Muell. in Flora*, xli. (1858) 185=corylifolius.
 holbleucus, *Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 72, 104=villicaulis.
 holorodos, *Ripart, ex Genev. Monog. Rub.* ed. II. 256=arduennensis.
 holosericeus, *Vest, ex Tratt. Ros.* iii. 48.—Europ.
 holosericeus, *Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast.* 153=nemorosus.
 Hookeri, *Focke, in Bremen, Abh.* iv. (1874) 198.—Reg. Himal.
 horrefactus, *P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 252.—Europ.
 horricaulis, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 858=hirtocaulis.
 horridicaulis, *P. J. Muell. in Bonplandia*, ix. (1861) 284.—Europ.

RUBUS:—

- horridulus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 341.—Reg. Himal.
 horridus, *Betcke, in Meklenburg. Archiv*, iv. (1850) 132=Koehleri.
 horridus, *Hartm. Handb. Skand. Fl.* ii. 139.—Suecia.
 horridus, *Koehl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 680=Schleicheri.
 horridus, *Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl.* i. 30=nemorosus.
 horridus, *Weihe, ex Spreng. Syst.* ii. 529.—Europ.
 horripilus, *Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 126.—Europ.
 Horsfieldii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 375=lasiocarpus.
 horstensis x, *Banning & Focke, ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 206.—Europ.
 hostilis, *P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, l. c.* 324=R. Radula.
 humifusus, *Bab. in Trans. Edinb. Bot. Soc.* ii. (1846) 245=saxicolus.
 humifusus, *Schlecht. in Linnaea*, xiii. (1839) 270=humistratus.
 humifusus, *Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 685=Schleicheri.
 humilis, *P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 246.—Europ.
 humistratus, *Steud. Nom.* ed. II. ii. 478.—Mexic.
 humorosus, *P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 219.—Europ.
 humulifolius, *C. A. Mey. Beitr. Pfl. Russ. Reich.* v. 57, t. 1.—Rossia.
 hungaricus, *Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 314.—Hungaria.
 hybridus, *Kaltenb. Fl. Aach. Beckens*, 278.—Europ.
 hybridus, *Vest, in Steyer. Zeitschr.* i. 162; ex *Focke, Syn. Rub. Germ.* 105=nessensis.
 hybridus, *Vill. Prosp.* 46; *Hist. Pl. Dauph.* iii. 559=glandulosus.
 hydrastifolius, *A. Gray, in Perry, Jap. Exped.* ii. 311=trifidus.
 hylonomus, *Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 224.—Europ.
 hylophilus, *Ripart, ex Genev. Monog. Rub.* ed. II. 238.—Europ.
 hypargyrus, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 45=niveus, *Wall.*
 hypoleucus, *Vest, in Syll. Ratisb.* i. (1824) 235=tomentosus, *Borck.*
 hypoleucus, *Focke, Syn. Rub. Germ.* 218=macrophyllus.
 hypoleucus, *Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 143.—Europ.
 hypomalacus, *Focke, Syn. Rub. Germ.* 274.—Europ.
 hypomallos, *P. J. Muell. ex Focke, l. c.* 238=thyrsoides, tomentosus, *Borck.*
 Hystrix, *Weihe & Nees, Rub. Germ.* 92=rosaceus.
 idaeoides, *Ruthe, ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 411=caesius.
 Idaeus, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 428=parvifolius.
 Idaeus, *Linn. Sp. Pl.* 492.—Europ.; Oriens; As. bor.
 Idaeus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 346=strigosus.
 Idaeus, *Thunb. Fl. Jap.* 216=Thunbergii, *Sieb. & Zucc.*
 Idaeus, *Vell. Fl. Flum.* 220; v. t. 81=floribundus.
 imbricatus, *Hort, in Trans. Bot. Soc. Edinb.* iv. (1853) 113.—Europ.
 immitis, *Bor. Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 188=nemorosus.
 imperialis, *Cham. & Schlecht. in Linnaea*, ii. (1827) 13.—Bras.
 inaequiaculeatus, *Kuntze, Method.* 97=incisus.
 inaequidentatus, *Boul. & Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 127=ulmifolius.
 inamoenus, *Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 126.—Europ.
 inaspectus, *P. J. Muell. in Bonplandia*, ix. (1861) 297.—Europ.
 incarnatus, *P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 95=villicaulis.
 incisus, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 35=trifidus.
 incisus, *Thunb. Fl. Jap.* 217.—China; Japon.
 inclinabilis, *Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 124.—Europ.
 inconspicuus, *Lange, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hosp.* iii. 221=minutiflorus.
 incultus, *Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 369=serpens.
 incurvatus, *Bab. in Trans. Bot. Soc. Edinb.* iii. (1850) 54=corylifolius.

RUBUS:—

- indicus, *Heyne, ex Wall. Cat. sub n.* 742=lasiocarpus.
 indicus, *Leschen. ex Ser. in DC. Prod.* ii. 568=hexagynus.
 indicus, *Thunb. Diss. Rub.* 5.—Ind. or.?
 indotatus, *Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 128.—Europ.
 indusiatus, *Focke, Syn. Rub. Germ.* 284.—Europ.
 indutus, *Boul. & Vendr. ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 220, nomen=fastuosus.
 inermis, *Pourr. in Mém. Acad. Toul.* iii. (1788) 326.—Europ.
 inermis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 549=villosus.
 infestus, *Bill. ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 307=Fuckeli.
 infestus, *Hartm. Handb. Skand. Fl.* ed. III. 120=horridus, *Hartm.*
 infestus, *Kaltenb. Fl. Aach. Beckens*, 293=carpinifolius.
 infestus, *Waldst. & Kit. ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 478, nomen (an seq.?).—Europ.
 infestus, *Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast.* 153.—Europ.
 inflatus, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 860=irrufatus.
 innominatus, *S. Moore, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 226.—China.
 inopacatus, *P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 117.—Europ.
 insectifolius, *Lefev. & P. J. Muell. l. c.* 176.—Europ.
 insericatus, *P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora*, xlii. (1859) 233=obscurus, *Kaltenb.*
 insignis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 329.—Reg. Himal.
 insignitus, *Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 130=ulmifolius.
 insolatus, *P. J. Muell. in Flora*, xli. (1858) 166=hirtus.
 insularis, *Aesch. Skånes Fl.* ed. II; *et in Bot. Notiser* (1881), 158.—Suecia.
 intectus, *P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1849) 247=Sprengelii.
 integribasis, *P. J. Muell. ex Genev. Monog. Rub.* ed. II. 345=nessensis.
 intermedius, *Ortm. in Flora*, xviii. (1835) 496.—Europ.
 intricatus, *P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 277.—Europ.
 inuncatus, *Lefev. & P. J. Muell. l. c.* 105.—Europ.
 irasuensis, *Lieb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 160.—Costa Rica.
 irrufatus, *P. J. Muell. in Bonplandia*, ix. (1861) 291.—Europ.
 Ischelus, *Buch. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 339=lasiocarpus.
 italicus, *Link. Handb.* ii. 110.—Ital.
 jamaicensis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 427=rosaeifolius.
 jamaicensis, *Linn. Mant.* i. 75.—Am. trop.
 jambosoides, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xv. (1861) 222.—China.
 japonicus, *Focke, in Bremen, Abh.* iv. (1874) 198.—Japon.
 japonicus, *Linn. Mant.* ii. 245=Kerria japonica.
 japonicus, *Veitch, ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* iii. (1852-53) 163.—Japon.
 javanicus, *Blume, Bijdr.* 1108.—Java.
 Jansenii, *Lange, in Fl. Dan.* t. 2833=orthacanthus.
 juglandifolius, *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* ii. (1874) 455.—Europ.
 Kaltenbachii, *Metsch. in Linnaea*, xxviii. (1856) 170=Metschii, hirtus.
 Kingii, *Kuntze, Method.* 55=moluccanus.
 Koehleri, *Bor. Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 195=Deseglisei.
 Koehleri, *Weihe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 689=glandulosus.
 Koehleri, *Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. l. c.* 681.—Europ.
 Kurzianus, *Kuntze, Method.* 69=moluccanus.
 lacer, *Kuntze, l. c.* 103=nutkanus.
 laceratus, *P. J. Muell. in Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 229.—Europ.
 laciniatus, *Willd. Hort. Berol.* t. 82.—Hab.?
 lacteus, *Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 313.—Europ.
 laetevirens, *Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut*, viii. (1882) 95.—Europ.
 laetus, *Prog. l. c.* 92.—Europ.
 laevifactus, *P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ.* 257=thyrsoides.

RUBUS:—

- laevigatus*, Wall. Cat. n. 1280 = lucens.
 Lambertianus, Ser. in DC. Prod. ii. 567.—China.
Lamottei, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 21 = tomentosus, Borch.
lamprococcus, Focke, in Bremen, Abh. i. (1867) 307.—Europ.
lamprophyllus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 94 = Bayeri.
Lamyi, Genev. Monog. Rub. ed. II. 92 = tomentosus, Borch.
lanatus, Focke, in Bremen, Abh. i. (1867) 294 = vestitus.
lanatus, Wall. Cat. n. 746.—Reg. Himal.
Langei, G. Jens. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 221 = silvaticus.
lanuginosus, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 69 = glandulosus.
lanuginosus, Stev. ex Ser. in DC. Prod. ii. 564.—Reg. Caucas. ?
Laschii, Focke, Syn. Rub. Germ. 402.—Europ.
lasiocarpus, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 6.—Ind. or.; Malaya.
lasioclados, Focke, Syn. Rub. Germ. 198 = pubescens, Weihe.
lasiococcus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881–82). 201.—Am. bor. occ.
lasioctachys, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 106.—Europ.
latebrosus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 24 = caesius.
latifolius, Boul. & Bouv. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 66 = nemorosus.
latifolius, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 94.—Europ.
latifolius, Kuntze, Method. 70 = moluccanus.
latifrons, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
laxatus, Ripart & Genev. in Genev. Monog. Rub. ed. II. 30 = corylifolius.
laxiflorus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 206.—Europ.
Lechleri, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 161.—Peruv.
Lecoqui, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 27 = caesius.
Leesii, Bab. in Steele, Handb. Field Bot. 60 = R. Idaeus.
Lefevrei, P. J. Muell. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 183.—Europ.
Leguei, Genev. Monog. Rub. ed. II. 31 = tomentosus, Borch.
Leightoni, Lees, ex Leight. Fl. Shrops. 233 = rudis.
Leightonianus, Bab. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xvii. (1846) 240.—Europ.
Lejeunei, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 683.—Europ.
Lejeunei, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 307 = Fockii.
Lemaitrei, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 257.—Europ.
lentiginosus, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 60 = affinis.
lephracanthus, Boul. & Timb. ex Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 219, sphalm. = tephracanthus.
lepidus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 294 = amiantinus.
leptacanthos, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 353 = Koehleri.
leptocalyx, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 105 = Bayeri.
leptocaulon, Boul. & Letendre, ex Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.
leptoclados, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 299.—Europ.
leptopetalus, Focke, Syn. Rub. Germ. 386.—Europ.
leptopetalus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 95.—Europ.
leptostachys, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 165.—Europ.
leucadenes, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 304.—Europ.
leucandrus, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 27 = villicaulis.
leucanthemus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 122 = vestitus.
leucanthus, Hance, in Walp. Ann. ii. 468.—China.
leucocarpus, Arr. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 334.—Zeylan.
leucodermis, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. 178; et ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 454.—Am. bor. occ.

RUBUS:—

- leucophaeus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 264 = tomentosus, Borch.
leucophyllus, Vest. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 226 = tomentosus, Borch.
leucostachys, Dougl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 478 = leucodermis.
leucostachys, Schlecht. ex Sm. Engl. Fl. ii. 403 = vestitus.
levefactus, P. J. Muell. ex Nym. Consp. 216 = thyrsoides.
Levi, Focke, Syn. Rub. Germ. 268 = silvaticus.
Libertianus, Weihe, in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 163.—Europ.
Liebmanni, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 158.—Mexic.
ligerinus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 68, 73 = caesius.
ligulatus, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
lilacinus, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 376 = hirtus.
Lindebergii, P. J. Muell. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 292 = bifrons.
Lindleanus, Lees, in Phytol. iii. (1848) 361 = vulgaris.
lineatus, Reinw. ex Blume, Bijdr. 1108.—Reg. Himal.; Java.
Lingua, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 686.—Europ.
linguifolius, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 83.—Europ.
lingulatus, Lefèv. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 148.—Europ.
Linkianus, Ser. in DC. Prod. ii. 560.—Hab. ?
lithuanicus, Gilib. Hist. Pl. Europ. ii. 321.—Europ.
lividus, G. Braun, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 365 = serpens.
Lloydianus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 26 = tomentosus, Borch.
lobatus, Wall. Cat. sub n. 737 = calycinus.
Lobbianus, Hook. Ic. Pl. t. 741, 742.—Java.
Loehrii, Wirtg. in Flora, xxxix. (1856) 236 = rudis.
longicaulis, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126.—Europ.
longicuspis, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 120 = rudis.
longiflorens, Ripart, in Genev. Monog. Rub. ed. II. 276 = pubescens, Weihe.
longifolius, Bunn. in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 109.—Bras.
longifolius, Host, Fl. Austr. ii. 30.—Europ.
longifolius, Kunze, Method. 96.—Hab. ?
longifolius, Wall. Cat. sub n. 727 = lasiocarpus.
longipetalus, Dougl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 478, nomen.—Am. bor. occ.
longisepalus, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 297.—Europ.
longithyriger, Lees, ex Bab. Brit. Rub. 231 = pyramidalis.
loxensis, Benth. Pl. Hartw. 128.—Peruv.
lucens, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 199.—Reg. Himal.
lucorum, P. J. Muell. ex Lefèv. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 260.—Europ.
Ludwigii, Eckl. & Zeyh. Enum. 263.—Afr. austr.
luteifolius, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 219 = carpinifolius.
lutescens, Lefèv. l. c. 220 = constrictus.
luxurians, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 193 = macrophyllus.
Maassii, Focke, ex Bertram, Fl. Braunsch. 75 = rhamnifolius.
macilentus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 42.—Europ.
macilentus, Jacquem. Voy. Bot. 49 t. 60.—Reg. Himal.
Macraei, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 505. t. 57.—Ins. Sandvic.
macranthelos, Marss. Fl. Neuvorpomm. 147 = vestitus.
macroacanthos, Weihe & Nees, Rub. Germ. 44 = vulgaris.
macroacanthos, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 296 = vestitus.
macrobelos, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.
macrocardiophyllus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 337 = thyrsiflorus ?

RUBUS:—

- macrocarpus*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 7 = moluccanus.
macrocarpus, Benth. Pl. Hartw. 129.—Ecuador.
macrocarpus, King, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 141 = Hookeri.
macrodonatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 185.—Europ.
macropetalus, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 178. t. 59 = ursinus.
macropetalus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 254.—Europ.
macrophyllodes, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 172 = macrophyllus.
macrophyllus, Weihe & Nees, Rub. Germ. 35. t. 12.—Europ.
macropodus, Ser. in DC. Prod. ii. 557 = parvifolius.
macrostachys, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 150.—Europ.
macrostemon, Focke, Syn. Rub. Germ. 193 = pubescens, Weihe.
macrothyrus, Lange, in Fl. Dan. t. 2832 = vestitus.
magdeburgensis, Maass, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 151 = rhamnifolius.
magnificus, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 158 = thyrsiflorus.
malacophyllus, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = tomentosus, Borch.
malagassus, Focke, in Bremen, Abh. viii. (1884) 473.—Madag.
maleficus, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 314.—Europ.
Mandonii, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 162.—Bolivia.
marchicus, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 15.—Europ.
marginum, P. J. Muell. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 271 = tomentosus, Borch.
masarinensis, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 139.—Ins. Mascar.
massiliensis, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.
Maximowiczii, Kuntze, Method. 64.—Japon.
maximus, Kuntze, l. c. 62.—Java.
maximus, Linn. ex Nym. Consp. 221 = corylifolius.
maximus, Marss. Fl. Neuvorpomm. 151.—Europ.
maximus, Neum. in Bot. Notiser (1885), 90.—Suecia.
medius, Kuntze, Method. 95.—Japon.
megalacanthus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 78.—Europ.
megalococcus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 157.—Bolivia.
megapolitana, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 14.—Europ.
megathamnus, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 150 = tomentosus, Borch.
melanochlamys, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 101 = hirtus.
melanoxydon, P. J. Muell. & Wirtg. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 133 = villicaulis.
Menkei, Weihe, ex Spreng. Syst. ii. 528 = vestitus.
Menkei, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 679.—Europ.
mentitus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 324 = R. Radula, thyrsiflorus.
menyhazensis, Sink. in Termesz. Füzetek, ix. (1885) 42.—Europ.
Menziesii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 179 = spectabilis.
Mercierii, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 271 = arduennensis.
meridionalis, Kern. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 226 = tomentosus, Borch.
Metschii, Focke, l. c. 359.—Europ.
mexicanus, Kuntze, Method. 102.—Mexic.
micans, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 546.—Europ.
micans, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 168 = tomentosus, Borch.
micrandrus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 338 = tomentosus, Borch.
micranthus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 235 = lasiocarpus.
microacanthus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 263 = nensensis.
microcarpus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 25.—Europ.
microdonatus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi–xvii. (1859) 244.—Europ.

RUBUS:—

- micropetalus*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 6 = moluccanus.
microphyllus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = foliolosus.
microphyllus, Linn. f. Suppl. 263.—China; Japon.
microphyllus, Reichb. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 688 = Koehleri.
Mikani, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 56 = Koehleri.
minor, Kuntze, Method. 97 = crataegifolius.
minutiflorus, Lange, Desc. Pl. Nov. Hisp. fasc. i. 2. t. 3. —Europ.
minutiflorus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 235 = Schleicheri.
miser, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 156. —Costa Rica.
mitis, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98. —Europ.
mitissimus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 11 = caesius.
mixtus, Ripart, ex Genev. l. c. 260 = villicaulis.
modestus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 8 = caesius.
moestus, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 378. —Europ.
mollifolius, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 267. —Europ.
mollis, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 378. —Europ.
mollis, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 379 = lineatus.
mollis, J. & C. Presl, Delic. Prag. 218 = nemorosus.
moluccanus, Linn. Sp. Pl. 1197. —Reg. Himal.; Malaya.
monanthus, Kuntze, Method. 142 = humulifolius.
mongolicus, Kuntze, l. c. 92. —Mongol.
montanus, Libert, ex Lej. Fl. Spa. ii. 317 = candicans.
montanus, Ortm. ex Opiz, Seznam, 85. —Europ.
montanus, Wimm. Fl. Schles. ed. III. (1857) 631 = nemorosus.
montanus, Wirtg. in Flora, xxxix. (1856) 236 = carpinifolius.
monticolus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 127. —Europ.
Moorei, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 67. —Austral.
morifolius, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 164. —Europ.
morifolius, Siebold, ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 125. —Japon.
mortuorum x, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxi. (1882) 376. —Europ.
Mougeoti, Bill. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 166 = nemorosus.
mucronatus, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicest. 43 = hirtus.
mucronatus, Ser. in DC. Prod. ii. 565. —Am. bor.
mucronipetalus, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 298. —Europ.
mucronulatus, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 196 = hirtus.
Muelleri, F. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. i. (1884) 9. —Austral.
Muelleri, Wirtg. ex Nym. Consp. 220 = serpens.
Muenteri, Marss. Fl. Neuvorpomm. 144 = rhamnifolius.
Mullerii, Lefèv. ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 180. —Europ.
multifidus, Boulay & Malbranche, ex Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222, nomen. —Europ.
multiflorus, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 19. —Europ.
multiflorus, Thunb. Diss. Rub. 7. —Hab.?
multisetosus, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 102 = hirtus.
Mundtii, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 18 = rigidus, Sm.
mutabilis, Gencv. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 84 = rudis.
myriacanthus, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 178 = ursinus.
myriacanthus, Focke, in Bremen, Abh. ii. (1871) 467 = nemorosus.
myriadenophorus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 39 = thyriflorus.
myrianthus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 136. —Madag.
myrianthus, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxi. (1882) 372 = pubescens, Weihe,
 VOL. II.

RUBUS:—

- Myricae*, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 27. —Europ.
mysorensis, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 235 = lasiocarpus.
napophilus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 220. —Europ.
natkanus, G. Don, Gen. Syst. ii. 540, sphalm. = nutkanus.
Neesii, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 227 = ulmifolius.
neglectus, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = nemorosus.
neglectus, Peck, Rep. Reg. N. York St. Univ. xxii. 53. —Am. bor.
nemocharis, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 191 = Sprengelii.
nemophilus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 206 = arduennensis.
nemoralis, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 139 = Sprengelii.
nemoralis, Neum. in Bot. Notiser (1885), 91. —Suecia.
nemorensis, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 198. —Europ.
nemorivagus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 27 = corylifolius.
nemorosus, Boenn. Prod. Fl. Monast. 153 = vestitus.
nemorosus, Guenth. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 404 = oreogeton.
nemorosus, Hayne, Arzn. Gew. iii. t. 10. —Europ.; Reg. Caucas.
nemorum, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 235 = carpinifolius.
neo-mexicanus, A. Gray, Pl. Wright. ii. 55. —N. Mexic.
nessensis, W. Hall, in Trans. Roy. Soc. Edinb. iii. (1794) Hist. 21. —Europ.
neurophanes, Boul. & Cornet, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 247 = arduennensis.
nexusus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 309 = nitidus.
nigellus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = fruticetorum.
nigricatus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 204. —Europ.
nilagiricus, Focke, in Bremen, Abh. v. (1877) 406 = ramosus.
nitens, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223 = nemorosus.
nitidus, Bell Salt, in Phytol. ii. (1845) 101 = vulgaris.
nitidus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 265 = affinis.
nitidus, Rafin. Fl. Ludov. 98 (Quid?). —Am. bor.
nitidus, Weihe & Nees, Rub. Germ. 19. t. 4. —Europ.
nivalis, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 181 = strigosus?
niveus, Thunb. Diss. Rub. 9. —Hab.?
niveus, Wall. Cat. n. 734; et ex G. Don, Gen. Syst. ii. 530. —Reg. Himal.
nobilis, Hort. Angl. ex Regel, Gartenfl. vi. (1857) 86. —Hab.?
nodiflorus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 95, nomen = orthocanthus.
novus, Kuntze, Method. 112. —Austral.
nubigenus, H. B. & K. Gen. et Sp. vi. 220. —Ecuador.
nubis, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 585 = R. Chamaemorus.
numidicus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 175. —Afr. bor.
nutans, Vest, in Syll. Ratisb. i. (1824) 238 = nessensis.
nutans, Wall. Cat. n. 738. —Reg. Himal.
nutkanus, Moc. ex Ser. in DC. Prod. ii. 566. —Am. bor. occ.
obcuneatus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 196. —Europ.
obliquus, Bloxam, in Journ. Bot. viii. (1870) 69 = rudis.
obliquus, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235 = pallidus.
oblongatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 184. —Europ.
oblongifolius, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 304 = Menkei.
obotriticus, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 15. —Europ.
obovatis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 298 = hispidus.
obovatus, Ell. Sketch, i. 570 = hispidus.
obovatus, Pers. Syn. ii. 52. —Am. bor.
obrosus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 234. —Europ.
obscurifrons, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 315 = Lejeunei.
obscurus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 281. —Europ.

RUBUS:—

- obscurus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 200. —Europ.
obsectifolius, P. J. Muell. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 254, nomen = R. Radula.
obtruncatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 152. —Europ.
obtusangulus, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = arduennensis.
obtusatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 95 = villicaulis.
obtusiflorus, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 144 = foliosus.
obtusifolius, Pritz. Ic. Ind. ii. 247, sphalm. = Rumex obtusifolius.
obtusifolius, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 291 = vestitus.
obtusifolius, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 409 = ulmifolius.
obvallatus, Boul. & Gillot, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 175 = vestitus.
occidentalis, Boland. Cat. 11, nomen = leucodermis.
occidentalis, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1029 = R. Idaeus.
occidentalis, Linn. Sp. Pl. 493. —Am. bor.
occiduus, Boul. & Bouv. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 236 = carpinifolius.
ochlanthus, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 260 = Lambertianus.
odoratus, Linn. Sp. Pl. 494. —Am. bor.
offensus, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 286. —Europ.
oigocladus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 134. —Europ.
Oldhami, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 34 = pungens.
oleifolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 478, nomcn. —Reg. Argent.
oligacanthus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 178 = nemorosus.
oliganthos, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 287. —Europ.
Olivieri, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 35 = corchorifolius.
omalodontos, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 354 = Koehleri.
omissus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 252 = arduennensis.
opacus, Bertram, Fl. Braunsch. ed. II. 74 = Bertramii.
opacus x, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 25 = plicatus.
opulentus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 136. —Europ.
opulifolius, Bertol. Misc. Bot. xxii. 16. t. 4. —Reg. Himal.
orbiculatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 209. —Europ.
orbifolius, Boul. & Letendre, ex Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = bifrons.
oreades, P. J. Muell. & Wirtg. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 89 = orthocanthus.
oreogeton, Focke, Syn. Rub. Germ. 404. —Europ.
oreophilus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 227. —Europ.
organensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 342. —Bras.
orgyalis, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen. —Europ.
orthacanthus, Wimm. Fl. Schles. ed. III. (1857) 626 = seq.
orthoacanthus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 104 = seq.
orthocanthus, Wimm. in Flora, xl. (1857) 77. —Europ.
Ortmanni, Opiz, in André, Oekon. Neuigk. i. (1835); et in Lotos, iv. (1854) 70 = montanus, Ortm.
ovalifolius, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 263 = silvaticus.
oxyacanthus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 131. —Europ.
oxyphyllus, Wall. Cat. n. 7110 = acuminatus.
pacificus, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 259. —China.
pallens, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 340 = scaber.
pallens, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 248 = ulmifolius.
pallens, Weihe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 684 = scaber.

RUBUS:—

- pallidiflorus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 187.—Europ.
pallidus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 103 = foliosus.
pallidus, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 682.—Europ.
palmatoides, Kuntze, Method. 93, 96.—China?
palmaris, Thunb. Fl. Jap. 217 = microphyllus.
paniculatus, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 140 = rosaeifolius.
paniculatus, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 40 = ellipticus.
paniculatus, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 518 = parvifolius.
paniculatus, Schlecht. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 61 = fruticosus.
paniculatus, Sm. in Rees, Cyclop. xxx. n. 41.—Reg. Himal.
pannosus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 304 = Menkei.
panormitanus, Tineo, Pl. Rar. Sicil. 24.—Sicilia.
Pappi, Eckl. & Zeyh. Enum. 263 = rosaeifolius.
papulosus, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 142.—Europ.
paradoxus, S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 132 = leucanthus.
Parkeri, Hance, l. c. xx. (1882) 260.—China.
parviflorus, Nutt. Gen. Am. i. 308 = nutkanus.
parvifolius, Linn. Sp. Pl. 1197.—Malaya; China; Austral.
parvifolius, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 40 = lasiocarpus?
parvifolius, Sm. in Rees, Cyclop. xxx. n. 21 = foliolosus.
parvifolius, Walt. Fl. Carol. 149 = cuneifolius, Pursh.
parvulus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 74 = caesius.
parvus, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. vi. (1874) 243.—N. Zel.
patens, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 265 = caesius.
patulus, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 97 = ulmifolius.
pauciflorus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 136.—Madag.
pauciflorus, Wall. ex Lindl. in Bot. Reg. t. 854 = lasiocarpus.
panicistamineus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 96.—Europ.
pectinelloides, Kuntze, Method. 79, 107.—Japon.
pectinellus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1871) 147.—Japon.
pedatifolius, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 71, 93; x. (1861) 35.—Europ.
pedatus, Banks & Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 33 = grandifolius.
pedatus, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 63.—Am. bor. occ.
peduncularis, Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.
pedunculatus, Steud. Nom. ed. II. ii. 478 = seq.
pedunculatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = niveus, Wall.
pellitus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 297 = tomentosus, Borck.
peltaefolius, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 107.—Europ.
peltatus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1871) 154.—Japon.
pendulinus, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 290 = hirtus.
peniculus, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.
pensilvanicus, Poir. Encyc. vi. 246 = strigosus.
pentagonus, Wall. Cat. n. 731 = alpestris.
pentaphyllos, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 289.—Europ.
perarmatus, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
permiscibilis, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 236 = tomentosus, Borck.
perplexus, P. J. Muell. ex Focke, l. c. 375 = hirtus.
persicinus, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 137; Nov. Pl. Sp. Decas, iii. 14 = thyrsoides.
persicus, Boiss. Fl. Orient. ii. 693.—Persia.
petiolulatus, Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
Pettianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 259.—Abyss.
petraeus, Koehl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 688 = Koehleri.
petraeus, Walp. Rep. ii. 19, sphalm. = Prunus Padus.

RUBUS:—

- phillyphyllus*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 190.—Europ.
phoenicolasius, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1871) 160.—Japon.
phyllophorus, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 178 = glandulosus.
phyllostachys, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 133 = thyrsoides.
piletocaulon, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 281 = vestitus.
piletostachys, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 43 = Gremlii.
piletostachys, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 548 = macrophyllus.
piletosus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 278 = villicaulis.
pilocalyx, Kuntze, Method. 77 = moluccanus.
pilocarpus, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 42 = vestitus.
pilocephalus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126.—Europ.*
pinnatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = lasiocarpus.
pinnatus, Willd. Sp. Pl. ii. 1081 = rosaeifolius.
pistillatus, Sm. Exot. Bot. ii. 53. t. 86 = arcticus.
platyacanthus, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 86.—Europ.
platycephalus, Focke, Syn. Rub. Germ. 329.—Europ.
platypetalus, Timb. & P. J. Muell. ex Mart. Fl. Tarn, 213.—Europ.
platyphyllus, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 210, 215 = villicaulis, macrophyllus.
platyphyllus, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 348 = glandulosus.
platyphyllus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 217.—Europ.
plicatus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 167 = persicus.
plicatus, Weihe & Nees, Rub. Germ. 15. t. 1.—Europ.
plinthostylus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 108 = Sprengelii.
podhradiensis x, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 374.—Europ.
podophyllos, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 281 = hirtus.
poliophyllus, Kuntze, Method. 68 = moluccanus.
polyacanthus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 95 = Bayeri.
polyandrus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26; ed. II. (1827) 84 (Quid?).—Java.
polyanthemus, Lindeb. in Bot. Notiser (1883), 105.—Suecia.
polyanthus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 96 = tomentosus, Borck.
polycarpus, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 313.—Europ.
polymorphus, Host, Fl. Austr. ii. 29.—Europ.
polymorphus, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 744.—Europ.
polytrichus, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 102 = hirtus.
populosus, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 142.—Europ.
porphyracanthos, Focke, Syn. Rub. Germ. 148 = rhamnifolius.
praecaltus, Lefev. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 237 = vulgaris.
praecox, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 124; Nov. Pl. Sp. Decas, iii. 1 = sulcatus.
praecox, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 600 = nitidus.
praeruptorum, Boul. ex Bab. in Journ. Bot. xvi. (1878) 143.—Europ.
praestabilis, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 196 = amiantinus.
praetermissus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 208 = arduennensis.
praetervisus, Ripart, ex Genev. l. c. 247 = pubescens, Weihe.
prasinifolius, Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.
prasinus, Focke, in Bremen, Abh. i. (1867) 302 = orthocanthus.
prehensibilis, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 453.—Europ.
Preslii, Weitenweb. in Opiz, Natural. 346 = plicatus.
prionodontus, Lefev. ex P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 117.—Europ.
procerus, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 209 = thyrsoides.

RUBUS:—

- procumbens*, Muhl. Cat. ed. I. 50; cd. II. 52 = canadensis.
prolectibilis, Ripart & Genev. in Genev. Monog. Rub. ed. II. 315 = villicaulis.
prolixatus, Ripart & Genev. l. c. 87 = tomentosus, Borck.
prolongatus, Boul. & Letendre, ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221 = candefactus.
proratiflorus, Timb. & P. J. Muell. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.
propinquus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 88 = ulmifolius.
propinquus, Richards. in Frankl. 1st Journ. ed. II. App. 19 = arcticus.
prostratus, DC. ex Steud. Nom. ed. I. 706 = tomentosus, Borck.
prostratus, Seidel, ex Steud. l. c. = hispidus.
Provostii, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 21 = caesius.
proximellus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 330 = tomentosus, Borck.
pruinosis, Arrhen. Rub. Suec. Monog. 15 = corylifolius.
pruinosis, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
pruinosis, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Ind. ii. (1845) 587.—Java.
psammophilus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 47 = nemorosus.
Pseudo-americanus, Kuntze, Method. 90, 96 = crataegifolius.
Pseudo-arcticus, Kuntze, l. c. 151 = arcticus.
Pseudo-caesius, Weihe & Nees, Rub. Germ. 103. t. 46 B = caesius.
Pseudo-idaeus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 129 = nensensis.
Pseudo-idaeus, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i. (1791) 37 = I. daeus?
Pseudo-idaeus, Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 151 = caesius.
Pseudo-incisus, Kuntze, Method. 93 = incisus.
pseudopsis, Gremli, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 394 = orthocanthus.
Pseudo-radula, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 379.—Europ.
Pseudo-tiliaceus, Kuntze, Method. 60 = paniculatus?
Pseudo-triflorus, Kuntze, l. c. 129 = humulifolius.
pubescens, Rafin. in Med. Repos. N. York, Ser. III. ii. (1811) 333 = saxatilis.
pubescens, Vest, ex Tratt. Ros. iii. 34.—Europ.
pubescens, Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 152.—Europ.
pubicaulis, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 266 = nemorosus.
pubinervis, Blume, Bijdr. 1110.—Java.
Pugeti, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.
pulchellus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 97.—Europ.
pulcher, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 148.—Europ.
pulcherrimus, Hook. Ic. Pl. t. 729-730 = lineatus.
pulcherrimus, Neum. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. (1883) n. VIII. 65 = polyanthemus.
pumilus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 155.—Mexic.
punctulatus, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235 = thyrsoides.
pungens, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 48. t. 59.—Reg. Himal.; Japon.
Purchasii, Bloxam, in Journ. Bot. xvi. (1878) 208.—Europ.
purpureistylus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 171.—Europ.
purpureus, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 98 = parvifolius.
purpureus, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 374 = thyrsoides.
pusillus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 14 = caesius.
pyncanthus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 196 = Lambertianus.
pyncanthus, Genev. Monog. Rub. ed. II. 210 = Sprengelii.
pyncostachys, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 101 = tomentosus, Borck.

RUBUS:—

- pycnostylus, *P. J. Muell. in Bonplandia*, ix. (1861) 293.—Europ.
pygmaeopsis, Focke, Syn. Rub. Germ. 364 = Schleicheri.
pygmaeus, Bab. Man. Brit. Bot. ed. V. 104 = praeruptorum.
pygmaeus, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 190 = rosacens.
pygmaeus, Metsch, in Linnaea, xxviii. (1856) 178 = Bayeri.
pygmaeus, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 687 = Koehleri.
pygmaeus, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 161, partim = Schleicheri.
pyramidalis, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 101.—Europ.
pyramidalis, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 275 = vestitus.
pyramidalis, Quest. ex Bab. Brit. Rnb. 235 = saltuum.
pyramidalis, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 192 = Sprengelii.
pyramidalis, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 291 = vulgaris.
pyrifolius, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 328 = Hamiltoni.
pyrifolius, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. l. c. = hexagynus.
pyrifolius, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 61.—Java.
quadratus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 182.—Europ.
Quartinianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 257.—Abyss.
Questieri, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 120.—Europ.
quinquelobus, Stokes, Bot. Mat. Mcd. iii. 142 = odoratus.
racemigerus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 128 = R. Radula.
racemosus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 34 = macrophyllus.
racemosus, Roxb. Hort. Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 519.—Ind. or.
Raddeanus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 182.—Reg. Caucas.
radicans, Cav. Ic. v. 7.—Chili.
radicans, Focke, in Bremen, Abh. v. (1877) 407 = Fockeanus?
Radula, Weihe, in Boenn. Prod. Fl. Monast. 152.—Europ.
ramosus, Bloxam, in Journ. Bot. ix. (1871) 330.—Europ.
ramosus, Neum. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. xl. (1883) n. VIII. 82 = caesius.
rariiflorus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 125.—Europ.
Ravi, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 602 = vulgaris.
reclinatus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 37.—Europ.
rectangulatus, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 14.—Europ.
rectangulatus, Maass, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 209 = villicaulis.
rectangulifolius, Kuntze, Method. 60.—China.
rectispinus x, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 239.—Europ.
reduncus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 211 = arduennensis.
reflexus, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 461 = moluccanus.
Reichenbachii, Koehl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 685 = villicaulis.
Reinwardtii, Kuntze, Method. 56.—Java.
remotus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126 = brachyandrus.
repens, Gueldenst. Reisen, ii. 4, 197; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 72 (Quid?).—Ross.
reptans, Herb. Par. ex Kuntze, Method. 107.—Mexic.
reticulatus, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, 165; Nov. Pl. Sp. Decas. iii. 42.—Europ.
reticulatus, Wall. Cat. n. 747.—Reg. Himal.
retrodatatus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 168.—Europ.
retrogressus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 20 = caesius.
retrospiciens, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
Reussii, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 314 = Guentheri.
Reuteri, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 272.—Europ.
rhamnifolius, Bill. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 262 = ulmifolius.

RUBUS:—

- rhamnifolius*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 22. t. 6.—Europ.
rhamnifolius, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 150 = bifrons.
rhenanus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 184.—Europ.
rhodacantha, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 217 = Ludwigii.
rhombifolius, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 233 = vulgaris.
rhombifolius, Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 151 = villicaulis.
rhombophyllus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 175.—Europ.
ribesifolius, Sieber, ex Hook. f. Fl. Tasm. i. 112 = parvifolius.
ribifolius, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 127 = incisus.
ribifolius, Willd. ex Ser. in DC. Prod. ii. 559 = spectabilis.
Ribis-folius, Gilib. Fl. Lituan. ii. 244 = R. Chamaemorus.
rigidatus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 127.—Europ.
rigidus, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 274.—Europ.
rigidus, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 5.—Afr. austr.
Ripartii, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 300 = tomentosus, Borch.
riualis, Genev. l. c. viii. (1860) 76 = caesius.
rivularis, P. J. Muell. in Flora, xlii. (1859) 237 = serpens.
robustus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 87 = pubescens, Weihe.
robustus, Presl, Epim. Bot. 196.—Peruv.
robustus, Wirtg. ex Nym. Consp. 218 = tomentosus, Borch.
Roezli, Regel, Gartenfl. (1875) 227; et in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1875) 285 = deliciosus.
Rolfi, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 171.—Ins. Philipp.
roridus, Lindl. Bot. Reg. t. 1607.—Madag.
rorulentus, Haldasy, in Kern. Sched. Fl. Exsicc. iii. 39.—Europ.
rosacens, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 685.—Europ.
rosaeiflorus, Hook. Ic. Pl. t. 46 = roseus.
rosaeiflorus, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 519 = lasiocarpus.
rosaeifolius, Sm. Pl. Ic. Ined. iii. t. 60.—As. trop.
rosaeifolius, Vidal, Sinops. t. 46. f. D = fraxinifolius.
roseiflorus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 179 = caesius.
roseus, Poir. Encyc. vi. 245.—Peruv.
rosifolius, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 147 = rosaeifolius.
rostochiensis, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 18.—Europ.
rosulans, Kuntze, Method. 65, 78 = moluccanus.
rosulentus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 76 = plicatus.
Rothii, Focke, in Bremen, Abh. ii. (1871) 461 = vestitus.
rotundatus, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 177 = Sprengelii.
rotundifolius, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicester. 39.—Europ.
rotundifolius, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 178.—Europ.
rotundifolius, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 384.—Java.
rotundifolius, Royle, Illustr. Bot. Himal. 203, nomen = lasiocarpus.
rotundifolius, Wall. Cat. n. 730 = ellipticus.
rotundifolius, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 291 = vestitus.
rotundipetalus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 82 = candicans.
Roxburghianus, Wall. Cat. n. 732 = parvifolius.
Roylei, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 154. t. 6 = foliolosus.
rubellus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 156.—Europ.
rubens, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 604 = Menkei.
rubeolus, Reichb. ex Nym. Consp. 216 = affinis.
rubeolus, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 600 = rhamnifolius.

RUBUS:—

- ruber*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 243 = saxatilis.
rubescens, Lej. Fl. Spa, ii. 340 = rosaceus.
rubicaulis, Steud. Nom. ed. II. ii. 479, sphalm. = rubricaulis.
rubicolor, Bloxam, in Syme, Engl. Bot. ed. III. iii. 180.—Europ.
rubicundus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 310 = obscurus, Kaltenb.
rubifolius, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 19 = trifidus.
rubiginosus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223 = rufescens.
rubiginosus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 207.—Europ.
rubricaulis, Weihe, ex Weihe & Nees, Rub. Germ. 69 = apiculatus.
rubriflorus, Kuntze, Method. 102.—Mexic.
ruderalis, Chab. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 272 = villicaulis.
rudicaulis, Genev. l. c. viii. (1860) 89.—Europ.
rudiformis, Genev. l. c. xxiv. (1868) 151 = rudis.
rudis, Bab. Brit. Rub. 189 = R. Radula.
rudis, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 687.—Europ.
rufescens, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 152.—Europ.
rugosus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = moluccanus.
rugosus, G. Jens. ex Lange, Fl. Dan. t. 2905 = slesvicensis.
rugosus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 149 = formosensis.
rugosus, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 34 = moluccanus.
Ruizii, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 162.—Peruv.
rupestris, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 180 = nemorosus.
russeicaulis, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222, nomen.—Europ.
rusticanus, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 279 = ulmifolius.
sabaudus, Focke, ex Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = ulmifolius.
sacer, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1032 = ulmifolius.
saevus, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 383 = Koehleri.
salisburgensis, Focke, Syn. Rub. Germ. 280.—Enrop.
Salteri, Bab. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xvii. (1846) 172 = silvaticus.
saltuum, Focke, in Gremli, Beitr. Fl. Schw. 30.—Europ.
sanctus, Knntze, Taschen-Fl. Leipz. 262 = caesius.
sanctus, Schreb. Ic. et Desc. Pl. Dec. 15. t. 8 = ulmifolius.
sanguineus, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 334 = ulmifolius.
sanguinolentus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 61.—Ins. Borbon.
sapidus, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 269.—Mexic.
Sauli, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 33 = pubescens, Weihe.
saxatilis, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 201 = triflorus.
saxatilis, Linn. Sp. Pl. 494.—Reg. bor. temp. et arct.
saxicolus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 202 = hirtus.
scaber, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 289 = hirtus.
scaber, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 683.—Europ.
scabridus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 158.—Europ.
scabrifolius, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 96 = Bayeri.
scabripes, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 69, 81 = Sprengelii.
scabrosus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 185 = nemorosus.
scandens, Juss. ex Poir. Encyc. vi. 237 = saxatilis.
scandens, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 154.—Mexic.
scanicus, Aresch. Skånes Fl. ed. II; et in Bot. Notiser (1881), 158.—Europ.
Schefferi, Focke, in Bremen, Abh. viii. (1884) 472.—Java.
Schiedeanus, Steud. Nom. ed. II. ii. 479.—Mexic.
schistogenes, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 238 = nemorosus.

RUBUS:—

- Schlechtendahlia*, Weihe, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 62 = macrophyllus.
Schleicheri, Holuby, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 390 = orthocanthus.
Schleicheri, Weihe, ex Tratt. Ros. iii. 22.—Europ.
Schlickumi, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235 = thyrsoideus.
Schmelleri, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 377.—Europ.
schmidelioides, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 245 = australis.
Schomburgkii, Klotzsch, in Schomb. Faun. et Fl. Brit. Gui. 1102, nomen.—Guian.
Schottii, Pohl, ex Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 157.—Bras.
Schultzei, Ripart, ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 289 = tomentosus, Bork.
Schummelii, Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 47.—Europ.
Schwarzeri ×, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 376.—Europ.
scaphilus, Lange, in Fl. Dan. t. 3026.—Europ.
sciophilus, Lefev. ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 205.—Europ.
secophilus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 178.—Europ.
Sellowii, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 15.—Arg. Argent.
semipellitus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 336 = tomentosus, Bork.
semivestitus, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 197.—Europ.
seminiviridis, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.
sempervirens, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 201 = hispidus.
Sendtneri, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 109.—Europ.
senticetorum, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 255.—Europ.
senticosus, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 51.—Europ.
separinus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 71, 90, 111 = vestitus.
sepicolus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 273 = nemorosus.
sepincolus, Boul. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 253, nomen = R. Radula.
sepium, Ripart, ex Genev. Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 53 = nemorosus.
septicolus, Arrond. Cat. Pl. Morb. 33 = sepicolus.
septorum, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 271 = macrophyllus.
sericatus, P. J. Muell. & Lefev. l. c. 125.—Europ.
sericatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 184.—Europ.
sericeus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 241 = R. Idaeus.
sericophyllus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 240 = tomentosus, Bork.
serpens, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 538 = orthocanthus.
serpens, Weihe, in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 172.—Europ.
serratifolius, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 237.—Europ.
serratus, J. F. Gmel. Syst. 856 = villosus.
serriculatus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 250 = ulmifolius.
sertiflorus, P. J. Muell. ex Genev. l. c. 96 = rosaceus.
sessilifolius, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 336 = ellipticus.
setigerus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 222.—Europ.
setosolignosus, Kuntze, Method. 69 = moluccanus.
setosus, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 198 = hispidus.
setulosus, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 199.—Europ.
siculus, Presl. Fl. Sic. p. xxiv = tomentosus, Bork.
Sieboldii, Blume, Bijdr. 1110.—Java.
siekensis, Banning, in Focke, Syn. Rub. Germ. 271 = conothyrso.
sikkimensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 336.—Reg. Himal.
sikkimensis, Kuntze, ex Hook. f. l. c. 341 = rosaceifolius.
silesiacus, Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 53 = thyrsoideus.

RUBUS:—

- silvaticus*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 41. t. 15.—Europ.
silvaticus, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 209 = villicaulis.
silvestris, Focke, l. c. 330 = foliosus.
silvicolus, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 855 = sylvicolus.
similatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 114.—Europ.
similis, Kuntze, Method. 94 = microphyllus.
sinensis, Hort. ex Ser. in DC. Prod. ii. 556 = rosaceifolius.
slesvicensis, Lange, in Fl. Dan. t. 2905.—Europ.
sorbifolius, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1871) 158 = rosaceifolius.
sordidus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98.—Europ.
sparsipilus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 73 = hirtus.
spectiosus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 135 = bifrons.
spectabilis, James, Cat. 182 = deliciosus.
spectabilis, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 291 = arduennensis.
spectabilis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 348. t. 16.—Am. bor.
speluncarum, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 453.—Europ.
sphenoides, Focke, ex Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = tomentosus, Bork.
sphenoiphyllus, G. Braun, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 270 = glaucovirens.
sphenophyllus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 215.—Europ.
spicatus, Lefev. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 57 = pubescens, Weihe.
spicatus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = elongatus? Sm.
spiculatus, Boul. & Bouv. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 248 = nemorosus.
spidnostachys, Ripart & Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 275 = villicaulis.
Spina-curva, Boul. & Gillot, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 317 = villicaulis.
spinetorum, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 281.—Europ.
spinossissimus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 177 = nemorosus.
spinossissimus, Schur, Enum. Pl. Transs. 186 = heterophyllus, Host.
spinulicaulis, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 305.—Europ.
spinuliferus, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 213.—Europ.
spinulifolius, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 127.—Europ.
spinulosus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 169.—Europ.
splendens, Chab. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 266 = villicaulis.
splendens, Genev. l. c. x. (1861) 36.—Europ.
splendidus, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 130.—Europ.
spoliatus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 48 = carpinifolius.
Sprengelii, Weihe, in Flora, ii. (1819) 18.—Europ.
squalidus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 20.—Europ.
stellatus, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 64.—Am. bor.
stelliger, Turcz. ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.
stellinus, Kuntze, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 434 = tomentosus, Bork.
stenoacanthus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 110.—Europ.
stenopetalus, Cham. in Choris, Voy. Pittor. (Kamtchat). 10 = spectabilis.
stenopetalus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 94.—Europ.
stenophyllus, P. J. Muell. l. c. 98 = carpinifolius.
stenoplos, Focke, Syn. Rub. Germ. 434 = rhamnifolius.
stenothyrsos, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 315.—Europ.
stereacanthos, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 189 = macrophyllus.
sterilis, Kuntze, Method. 69, 78 = moluccanus.

RUBUS:—

- Stendneri*, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 669.—Afr. trop.
stictocalyx, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 285.—Europ.
stipularis, Benth. Pl. Hartw. 173.—N. Granat.
striatus, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.
stricticaulis, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126.—Europ.
strigosus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 297.—Am. bor.
suaveolens, Eichw. Skizze, 162 (Quid?).—Ross.
suaveolens, Thunb. Diss. Rub. 6.—Hab.?
suavifolius, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 35 = vestitus.
subcanus, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 45 = Sprengelii.
submarginatus, P. J. Muell. & Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.
suberectus, Anders. ex Sm. Engl. Bot. t. 2572; et in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 218 = nensensis.
suberectus, Baer, in Flora, iv. (1821) 411 = Sprengelii.
suberectus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 179 = villosus.
Suberti, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 281 = ulmifolius.
subfulgens, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 109 = Sendtneri.
subherbaceus, Kuntze, Method. 83.—Hab.?
subinermis, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 162.—Europ.
subinermis, Ruprecht, in Beitr. Pfl. Russ. Reich. iv. 66 = nensensis.
subintegrifolius, Kuntze, Method. 113 = humulifolius.
sublenis, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.
sublustris, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 54 = corylifolius.
subramiflorus, Kuntze, Method. 54, 79 = Sieboldii.
subvelutinus, Boul. & Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 319 = villicaulis.
sulcatus, Koehl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 669 = fruticosus.
sulcatus, Vest, ex Tratt. Ros. iii. 42.—Europ.
sumatranus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 307.—Sumatra.
sundaicus, Blume, Bijdr. 1111.—Java.
Swinhoii, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 211.—Ins. Formosa; China.
sylvarum, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 196 = macrophyllus.
sylvaticus, Leight. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 206 = villicaulis.
sylvestris, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 288 = foliosus.
sylvicolus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 113.—Europ.
taeniarum, Lindeb. Nov. Fl. Scand. 5. t. 1 = infestus, Weihe.
tagallus, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 9.—Ins. Luzon; China.
Tanakae, Kuntze, Method. 94.—Japon.
tardiflorus, Focke, ex Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 96 = foliosus.
tauricus, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 68 = fruticosus.
tenacellus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 52 = ulmifolius.
tenellus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 248.—Europ.
tenuiarmatus, Lees, in Phytol. (1853) 818 = corylifolius.
tenuiflorus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 205 = thyrsoideus.
tenuiglandulosus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 97 = foliosus.
tenuis, Bell Salt, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 305 = caesius.
tenuis, Kuntze, Method. 154.—Europ.
tephracanthos, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 130 = ulmifolius.
tephrodes, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 260.—China.
tereticaulis, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 173 = tomentosus, Bork.
teretiunculus, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 282 = vestitus.
ternatus, Thunb. Diss. Rub. 8.—Hab.?
tetraphyllus, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 413.—Am. bor.
thamnocharis, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 263 = nemorosus.

RUBUS:

thamnophtus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 247 = arduennensis.
thelybatus, Focke, Syn. Rub. Germ. 279.—Europ.
Thomsonii, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 198.—Reg. Himal.
Thuillieri, Poir. Encyc. Suppl. iv. 694 = rhamnifolius, tomentosus, Borck.
Thunbergii, Blume, Bijdr. 1109 = parvifolius.
Thunbergii, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 18.—Japan.
thuringensis, Metsch, in Linnaea, xxviii. (1856) 199 = R. Radula.
thyrsanthoides, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 15.—Europ.
thyrsanthus, Focke, Syn. Rub. Germ. 168 = thyrsoides.
thyrsiflorus, Betcke, in Meklenburg. Archiv, iv. (1850) 125 = Metschii.
thyrsiflorus, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 684.—Europ.
thyrsiger, Banning & Focke, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 341 = scaber.
thyrsoides, Bab. Brit. Rub. 108 = pubescens, Weihe.
thyrsoides, Schur, Enum. Pl. Transs. 186 = candicans.
thyrsoides, Wimm. Fl. Schles. (1832) 204.—Europ.
tiliaceus, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 161 = tiliacifolius, Focke.
tiliaceus, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 35 = paniculatus.
tiliaceus, Strach. & Winterb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 331 = lanatus.
tiliacifolius, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 159.—Mexic.
tiliacifolius, Weihe, ex Spreng. Syst. ii. 529.—Europ.
titanoophilus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 30 = nemorosus.
Tokkura, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 65.—Japan.
tomentellus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 301 = tomentosus, Borck.
tomentosus, Borck. in Roem. Neues Mag. Bot. i. (1794) 2.—Europ.
tomentosus, Bory, Voy. ii. 375 = borbonicus.
tomentosus, Thunb. Diss. Rub. 5.—Europ.
tomentosus, Willd. Sp. Pl. ii. 1083.—Europ.; As. Min.
tongloensis, Kuntze, Method. 66, 78 = moluccanus.
trachydermis, Focke, Syn. Rub. Germ. 324.—Europ.
trachypus, Boul. & Gillot, in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 20.—Europ.
transalpinus ×, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 58.—Europ.
transiens, Kuntze, Method. 79, 107.—Japan.
tremulus, Lefèv. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 138.—Europ.
Treutleri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 331.—Reg. Himal.
Trevirani, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 53 = thyrsoides.
trichocarpus, Timer. ex Bab. Brit. Rub. 129 = scaber.
trichomallus, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 268.—Mexic.
tricornatus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.
trifidus, Steud. Nom. ed. II. ii. 479 = trilobus.
trifidus, Thunb. Fl. Jap. 217.—Japan.
triflorus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 233 = acuminatus.
triflorus, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. ed. II. 19.—Am. arct.
trifoliatus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 26 = lineatus.
trifoliatus, Weihe, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 479, nomen.—Germ.
trigonodonthos, Boul. ex Genev. Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 25 = nemorosus.
trilobus, [Moq. & Sesse,] ex Ser. in DC. Prod. ii. 566.—Mexic.
triphyllus, Bell. in Mém. Acad. Trin. 1790-91 (1793) 231 = tomentosus, Borck.
triphyllus, Thunb. Fl. Jap. 215 = parvifolius.
tristifrons, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 262 = villicaulis.
tristis, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 97.—Europ.
trivialis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 296.—Am. bor. occ.
trivialis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 347 = canadensis.

RUBUS:

truncifolius, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 139.—Europ.
tuberculatus, Bab. Fl. Camb. 306 = nemorosus.
tumidus, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = arduennensis.
Uhdeanus, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 159.—Mexic.
ulmifolius, J. & C. Presl, Delic. Prag. i. 223 = nemorosus.
ulmifolius, Schott, in Oken, Isis (1818), fasc. v. 821.—Europ.
umbelliformis, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 265.—Europ.
umbraticolus, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 97.—Europ.
umbraticus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 114 = vestitus.
umbrosus, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 60 = nessensis.
umbrosus, Maass, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 151 = rhamnifolius.
umbrosus, Weihe, ex Nym. Consp. 217 = villicaulis.
uncatus, Wall. Cat. n. 750 = macilentus, Jacquem.
uncinatus, Heut. ex Nym. Consp. 219 = rudis.
uncinatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 154.—Europ.
uncinelliferus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 280 = villicaulis.
uncinellus, P. J. Muell. & Lefèv. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 286 = caesius.
undulatus, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 283.—Europ.
uniflorus, Kuntze, Method. 91, 97.—Mexic.
universalis, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 218 = ulmifolius.
ursinus, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 11.—Am. bor. occ.
ursinus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 456, partim = spectabilis.
urticaefolius, Poir. Encyc. vi. 246.—Peruv.
ustulatus, Lefèv. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 58 = pubescens, Weihe.
valesiacus, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 150 = arduennensis.
validulus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 20 = caesius.
validus, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.
vallicolus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 188.—Europ.
variabilis, Lefèv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223 = saltuum.
velatus, Lefèv. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 34 = Sprengelii.
velicaulis, Koehl. ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 62 = villicaulis.
velutinus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 140 = nutkanus.
velutinus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 221 = collinus.
velutinus, Vest, ex Tratt. Ros. iii. 47 = Menkei.
vendeanus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 72, 98 = villicaulis.
vepretorum, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 276.—Europ.
vernus, Focke, in Bremen, Abh. v. (1877) 407.—Japan.
versistipulatus, Kuntze, Method. 84.—Hab. ?
vespicum, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = tomentosus, Borck.
vestiferus, P. J. Muell. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 256, nomen = thyrsiflorus.
Vestii, Focke, Syn. Rub. Germ. 155.—Europ.
vestitus, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 684.—Europ.
vicinus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 283 = villicaulis.
Victoris, Mart. Fl. Tarn, 221.—Europ.
vigorosus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Nym. Consp. 216 = affinis.
Villarsianus, Focke, in Gremli, Beitr. Fl. Schw. 28 = orthocanthus.
villicaulis, Koehl. ex Weihe & Nees, Rub. Germ. 43. t. 17.—Silesia.
villosulus, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 291 = ulmifolius.
villosus, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 210.—Am. bor.

RUBUS:

villosus, Lasch. in Linnaea, viii. (1833) 297 = vestitus.
villosus, Thunb. Fl. Jap. 218 = corchorifolius.
villosus, Torr. Fl. N. York, i. 215 = heterophyllus, Willd.
vinetorum, Holandre, Fl. Moselle, ed. I. 267 = vestitus.
virescens, G. Braun, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 224.—Europ.
virescens, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235 = Fockelii.
viretorum, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 275 = tomentosus, Borck.
virgultorum, P. J. Muell. l. c. 273.—Europ.
viridis, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 284 = serpens.
viridis, Presl, ex Ort. in Flora, xviii. (1835) 488 = nessensis.
viridulus, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxi. (1882) 376.—Europ.
viscosus, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 170 = foliosus.
vitifolius, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 10 = ursinus.
vogesiatus, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 170.—Europ.
Vrabelianus, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 203.—Europ.
vulgaris, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 200 = vestitus.
vulgaris, Focke, in Bremen, Abh. i. (1868) 287 = villicaulis.
vulgaris, Weihe & Nees, Rub. Germ. 38.—Europ.
vulgarius, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 58.—Europ.
vulgatus, Genev. l. c. xx. (1866) 32.—Europ.
vulnificus, Lefèv. ex Genev. l. c. xxviii. (1872) 53 = ulmifolius.
vulpinus, Desf. Tabl. ed. I. 178 = Sprengelii.
Wahlbergii, Arrhen. Rub. Suec. Monog. 43.—Europ.
Wahlbergii, Focke, in Bremen, Abh. i. (1868) 305 = Laschii.
Wahlbergii, Godr. Monog. 17 = Godroni.
Wahlbergii, Neum. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. xl. (1833) n. viii. 78; et in Bot. Notiser (1885), 91 = corylifolius.
Wallichianus, Wight & Arn. Prod. 298 = ellipticus.
Warrenii, Bloxam, ex Bab. in Journ. Bot. xvi. (1878) 115 = villicaulis.
Wawrai, Kuntze, Method. 56 = moluccanus.
Weigeltii, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 55 = hirtus.
Weiheanus, Focke, ex Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98.—Europ.
Weiheanus, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 253 = pubescens, Weihe.
Weihei, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 31 = nemorosus.
Weihei, Lej. in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 164 = sulcatus.
Weinteri, Genev. Monog. Rub. ed. II. 268 = pubescens.
Weitenweberi, Ort. in Opiz, Nom. 16 = tomentosus, Borck.
Wiegmanni, Weihe, ex Spreng. Syst. ii. 528 = vestitus.
Wimmeri, Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 53 = macrophyllus.
Winteri, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 196 = pubescens, Weihe.
Wirtgeni, Auersw. ex Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 155.—Europ.
Wrightii, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 387.—Japan.
yessoicus, Kuntze, Method. 130.—Japan.
yunnanicus, Kuntze, l. c. 71.—China.
Zahlbrucknerianus, Endl. Atakt. t. 35 = parvifolius.

RUCKERIA, DC. Prod. vi. 483 (1837). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 453.
euryopsidis, DC. l. c. 484.—Afr. austr.
othonnoides, DC. l. c.—Afr. austr.
tagetoides, DC. l. c.—Afr. austr.

RUCKIA, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1867) 28; et Gartenfl. (1868) 65. t. 571 = *Rhodostachys*, Phil. (Bromel.).
Ellemeetiana, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1874) i. 243 = seq.
Ellemeti, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1867) 28; et Gartenfl. (1868) 65 = *Rhod. andina*.

RUDBECKIA, Adans. Fam. ii. 80 (1763) = *Conocarpus*, Gaertn. (Combret.).

RUDBECKIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 365.
CENTROCARPHA, D. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. II. 310 (1830); et in Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 87 (1831).
DRACONTOPSIS, Lem. in Orb. Dict. v. 123 (1849).
DRACOPIS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 273 (1825).
DRACOPSIS, Lem. in Orb. Dict. v. 123 (1849).
HELIOPHTHALMUM, Rafin. Fl. Ludov. 72 (1817).
OBELISCOTHECA, Adans. Fam. ii. 128 (1763).
RATABIDA, Loud. Hort. Brit. Suppl. II. 665 (1839).
TITHONIA, Raeusch. Nom. ed. III. 251 (1797).
alata, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. 16. t. 593 = *Helianthus quadridentatus*.
alata, Neuenh. in Roem. Arch. i. II. (1797) 30.—Am. bor.
alismaefolia, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 310.—Am. bor.
amplexicaulis, Vahl, in Skriv. Nat. Selsk. Kjoeb. ii. II. (1793) 29. t. 4.—Am. bor.; Mexic.
amplexifolia, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. 16. t. 592 = *amplexicaulis*.
angulata, Rafin. Atl. Journ. i. 48 (Quid?).—Am. bor.
angustifolia, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1231 = *Helianthus angustifolius*.
apetala, Torr. ex Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 77 = *Helianthus Radula*.
aristata, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = *triloba*.
aspera, Desf. Tabl. ed. I. 107 = *fulgida*.
aspera, Pers. Syn. ii. 477 = *speciosa*?
asprima, Hornem. ex Maund, Bot. Gard. vii. t. 647.—Am. bor.
atrorubens, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 80.—Am. bor.
bellidioides, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 12 = *Spilanthes amnicoides*.
bicolor, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 81.—Am. bor.
biennis, Chapm. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 309 = *triloba*.
bupleuroides, Shutt. ex Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 629.—Florida.
californica, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 357.—Calif.
chrysomela, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 143 = *fulgida*.
cicutaeifolia, Spreng. Syst. iii. 613.—Am. bor.
cinerea, Hort. ex DC. Prod. v. 559 = *Lepachys pinnatifida*.
citriodora, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 707 = *Lepachys pinnatifida*.
columnaris, Sims, Bot. Mag. t. 1601; Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 575 = *Lepachys columnaris*.
columnifera, [Nutt.] in Fras. Cat. (1813) n. 75; Pursh, l. c. = *Lepachys columnaris*.
decumbens, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 11 = *Spilanthes amnicoides*.
densifolia, Sm. l. c. n. 10 = *Aspilula bupththalmiflora*, *Viguiera anchusaefolia*.
dentata, Cav. Desc. 223 = *Viguiera dentata*.
digitata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *laciniata*.
digitata, Willd. Sp. Pl. iii. 2247 = *Lepachys pinnatifida*.
discolor, Ell. Sketch, ii. 454 = *hirta*.
discolor, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = *fulgida*.
Drummondii, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 51.—Am. bor.
fulgida, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 251.—Am. bor.
fulgida, Meehan, Nat. Flowers, Ser. II. i. t. 14 = *speciosa*.
glabra, DC. Prod. v. 556 = *nitida*.
globosa, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 79 = *Lepachys Tagetes*.
gracilis, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = *spathulata*.
gracilis, Nutt. Gen. Am. ii. 178 = *hirta*.
grandiflora, Gmel. ex DC. Prod. 556.—Am. bor.
Heliopsisidis, A. H. Curtiss, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 261 = *spathulata*.
Heliopsisidis, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 310.—Am. bor.

RUDBECKIA:—

heterophylla, Schur, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) Sitzb. 118 = *amplexicaulis*.
heterophylla, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 312.—Florida.
hirta, Linn. Sp. Pl. 907.—Am. bor.
hispida, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. i. 223 = *Echinacea purpurea*.
laciniata, Linn. Sp. Pl. 906.—Am. bor.
laevigata, Nutt. Gen. Am. ii. 178 = *nitida*.
laevigata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574.—Am. bor.
laevis, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. iii. 58 = *Lepachys pinnatifida*.
lanceolata, Bertol. Misc. Bot. vii. 40.—Am. bor.
lanceolata, Bisch. Del. Sem. Hort. Heidelb. (1848) 4; ex Walp. Ann. ii. 855.—Am. bor.
lanceifolia, Bisch. Heidelb. Consp. Crit. (1852) 7 = *præc.*?
leucantha, Lag. Gen. et Sp. Nov. 32.—Mexic.
maxima, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 354.—Am. bor.
media, [Spreng]. Bot. Gart. Halle, 80 (Quid?).—Hab.?
Mohrii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 217 = *bupleuroides*.
mollis, Ell. Sketch, ii. 453.—Am. bor.
montana, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 217.—Am. bor. occ.
moschata, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 480.—Am. bor.
napifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 244.—Mexic.
Neumanni, Steud. Nom. ed. II. ii. 480 = *Newmani*.
Neumannii, Hort. ex Viln. Fl. Pl. Terre, ed. III. 990 = *laciniata*.
Newmani, Loud. Hort. Brit. 358 = *fulgida*.
Newmani, Loud. l. c. Suppl. ii. 584, in syn.—Am. bor.
nitida, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 78.—Am. bor.
nudicaulis, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 311 = *grandiflora*.
nudicaulis, Pers. Syn. ii. 477 = *Viguiera nudicaulis*.
nudiflora, Bertol. Misc. Bot. vii. 39.—Am. bor.
occidentalis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 355.—Am. bor. occ.
odorata, Hort. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 576 = *Lepachys pinnatifida*.
odorata, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 78 = *subtomentosa*.
oppositifolia, Hort. ex Viln. Fl. Pl. Terre, ed. I. 743 = *amplexicaulis*.
oppositifolia, Linn. Sp. Pl. 907 = *Heliopsis laevis*.
pallida, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 77 = *Echinacea angustifolia*.
pauciflora, [Zinn.] Steud. Nom. ed. I. 707 = *Zinnia pauciflora*.
perfoliata, Cav. Ic. iii. 27 = *amplexicaulis*.
pinnata, Vent. Jard. Cels. 71 = *Lepachys pinnatifida*.
Porteri, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 83 = *Gymnolomia Porteri*.
purpurea, Linn. Sp. Pl. 907 = *Echinacea purpurea*.
quinata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *laciniata*.
Radula, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 575 = *Helianthus Radula*.
rupestris, Chick. in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 188 = *triloba*.
scabra, Cav. Desc. 224 = *triloba*.
scabra, Hort. ex Viln. Fl. Pl. Terre, ed. I. 747 = *fulgida*.
serotina, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 80 = *hirta*.
serotina, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 4 = *Echinacea purpurea*.
spathulata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 144.—Am. bor.
spathulata, Nutt. Gen. Am. ii. 178 = *amplexicaulis*.
spathulata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = *mollis*.
speciosa, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 353 = *Echinacea purpurea*.
speciosa, Wender. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 30.—Am. bor.
strigosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 354 = *hirta*.
subtomentosa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 575.—Am. bor.
Tagetes, James, in Long, Exped. ii. 256, 353 = *Lepachys Tagetes*.
tomentosa, Ell. Sketch, ii. 453 = *subtomentosa*.
triloba, Linn. Sp. Pl. 907.—Am. bor.

RUDBECKIA, Scop. Introd. 131 (1777) = *præc.*

RUDELIA, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1419 (1883).
SCITAMINEAE.
curviflora, Oliver, l. c. — Archip. Ind.

RUDGEA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 327. tt. 18, 19. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 125.
PACHYSANTHUS, Presl, Bot. Bemerk. 87 (1844); in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 517.
amazonica, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 449, 460.—Bras.
angustifolia, Muell. Arg. l. c. 453, 462.—Bras.
apoda, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 178.—Bras.
bacciflora, Muell. Arg. l. c. 164.—Bras.
Blanchetiana, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 452, 461.—Bras.
brachyandra, Muell. Arg. l. c. 451, 461.—Bras.
breviflora, Muell. Arg. l. c. 456, 463.—Bras.
Burchelliana, Muell. Arg. l. c. 453, 462.—Bras.
calycina, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 459.—Bras.
caribaea, Benth. l. c. 460.—Ind. occ.
Casarettoana, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 452, 461.—Bras.
celastrina, Muell. Arg. l. c. 450, 460.—Bras.
ciliata, Spreng. Syst. i. 755 = *Coffea ciliata*.
Clausseniana, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 461.—Bras.
clavipes, Benth. l. c. 462.—Bras.
conocarpa, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 456, 463.—Bras.
corniculata, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 462.—Bras.
coronata, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 449.—Bras.
corymbulosa, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 461.—Bras.
cutjensis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 215.—Bras.
cyanosperma, Muell. Arg. l. c. 211.—Bras.
decipiens, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 454, 462.—Bras.
discolor, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 460.—Bras.
elliptica, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 219.—Bras.
eriantha, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 458.—Bras.
erioloba, Benth. l. c. 459.—Bras.
erythrocarpa, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 451, 461.—Bras.
fissistipula, Muell. Arg. l. c. 449, 460.—Bras.
Francavillana, Muell. Arg. l. c. 454, 462.—Bras.
gardenioides, Muell. Arg. l. c. 455.—Bras.
Gaudichaudii, Muell. Arg. l. c. 453, 461.—Bras.
Glaziovii, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 217.—Bras.
Gomeziana, Muell. Arg. l. c. 177.—Bras.
goyazensis, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 450, 461.—Bras.
Heurckii, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 209.—Bras.
Hostmanniana, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 459.—Guian.
ilheotica, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 217.—Bras.
insignis, Muell. Arg. l. c. 203.—Bras.
intercedens, Muell. Arg. l. c. 205.—Bras.
interrupta, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 457.—Bras.
involucrata, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 219.—Bras.
irregularis, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 451, 461.—Bras.
jacobinensis, Muell. Arg. l. c. 453, 461.—Bras.
japurensis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 177.—Bras.
jasminioides, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 452.—Bras.
laciniata, Muell. Arg. l. c. 454, 462.—Bras.
lanceaefolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 327. t. 18.—Guian.
lanceolata, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 455.—Bras.
Langsdorffii, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 191.—Bras.
lasiostylis, Muell. Arg. l. c. 212.—Bras.

RUDGEA :—

- leiocarpoides, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456.—Bras.
 longiflora, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 457.—Bras.
 longistipula, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 449, 460.—Bras.
 loniceroides, *Muell. Arg. l. c.* 454, 462.—Bras.
 Lundiana, *Muell. Arg. l. c.* 456, 463.—Bras.
 macrophylla, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 456.—Bras.
 magnoliaefolia, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 450.—Bras.
 major, *Muell. Arg. l. c.* 452.—Bras.
 Martiana, *Muell. Arg. l. c.* 453, 462.—Bras.
 medians, *Muell. Arg. ll. cc.*—Bras.
 mexicana, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 501 = *Coffea mexicana*.
 micrantha, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 454.—Bras.
 microcephala, *Muell. Arg. l. c.* 456, 464.—Bras.
 Miersiana, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 461.—Bras.
 mucronata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. (1850) 185.—Bras.
 multicostata, *Muell. Arg. l. c.* 207.—Bras.
 myrsinaefolia, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 455.—Bras.
 Nettoana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 450, 460.—Bras.
 Neuwiedii, *Muell. Arg. l. c.* 455, 463.—Bras.
 nitida, *Spreng. Syst. i.* 755 = *Coffea nitida*.
 nivosa, *Andr. in Rev. Hort.* (1866) 308; et *Berkeley, in Journ. Hort. Soc. N. S. i.* (1866) 156.—Bras.
 nobilis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 172.—Bras.
 nodosa, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 456.—Bras.
 ochroleuca, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.—Bras.
 ovalifolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 328. t. 19.—Guian.
 ovalis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 462.—Bras.
 pachyphylla, *Muell. Arg. l. c.* 183.—Bras.
 pachysanthus, *Muell. Arg. l. c.* 208.—Bras.
 palicouroides, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 455.—Bras.
 paniculata, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 457.—Bras.
 panurensis, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.—Bras.
 parquoides, *Muell. Arg. l. c.* 450.—Bras.
 parvifolia, *Muell. Arg. l. c.* 454.—Bras.
 psammophila, *Muell. Arg. l. c.* 453, 462.—Bras.
 racemosa, *Spreng. Syst. i.* 755 = *Coffea racemosa*, *Ruiz & Pav.*
 recurva, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.—Bras.
 reticulata, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 458.—Bras.
 Riedeliana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.—Bras.
 Schomburgkiana, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 459.—Guian.
 Selloana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 453, 462.—Bras.
 sessilis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 182.—Bras.
 spicata, *Spreng. Syst. i.* 755 = *Coffea spicata*.
 stenantha, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.—Bras.
 snbcordata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 178.—Bras.
 snbsessilis, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 458.—Bras.
 symplocoides, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 455, 463.—Bras.
 tenuifolia, *Muell. Arg. l. c.* 453, 462.—Bras.
 tinguana, *Muell. Arg. l. c.* 455, 463.—Bras.
 triflora, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 460.—Bras.
 umbellata, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456 = *Psychotria Arrabidaea*.
 umbrosa, *Muell. Arg. l. c.* 452, 461.—Bras.
 vellerea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 208.—Bras.
 verticillata, *Spreng. Syst. i.* 755 = *Coffea verticillata*.

RUDGEA :—

- viburnoides, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 458.—Bras.
 Weddelliana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 451, 461.—Bras.
 ypanemensis, *Muell. Arg. l. c.* 452, 461.—Bras.

RUDOLPHIA, *Medic. Malv.* 111 (1787) = **Malpighia**, *Plum.*
edulis, *Medic. l. c.* 112 = *M. urens*.

RUDOLPHIA, *Willd. in Ges. Natrf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 451. **LEGUMINOSAE**, *Benth. & Hook. f.* i. 532.
dubia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 432. t. 591 = *Centrosema hastatum*.
elliptica, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix.* (1826) 422 (= *Collaea rugosa*).—Bras.
frondosa, *Poir. Encyc. vi.* 333 = *Butea frondosa*.
peltata, *Willd. in Ges. Natrf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 453.—*Ins. S. Doming.*
portoricensis, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 161 = *volubilis*.
rosea, *Tussac, Fl. Antill. i.* 149. t. 22 (rosaea).—*Ins. S. Doming.*
scandens, *Poir. in Dict. Sc. Nat. xlvii.* 419 = *volubilis*.
sericea, *Steud. Nom. ed. II. i.* 241 = *volubilis*.
superba, *Poir. Encyc. vi.* 332 = *Butea superba*.
volubilis, *Willd. in Ges. Natrf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 452.—Porto Rico; Mexic.

RUDOLPHO-ROEMERIA, *Steud. ex Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 30 = **Kniphofia**, *Moench (Liliac.)*.
isoëtifolia, *Steud. l. c.* = *K. isoëtifolia*.

RUEHSSIA, *Karst. in Verh. Ver. Gartenb. Preuss.* xix. (1849) II. 304 = **Marsdenia**, *R. Br. (Asclep.)*.
estebanensis, *Karst. in Linnaea*, xxviii. (1856) 424.—*N. Granat.*
glauca, *Karst. l. c.*—*N. Granat.*
macrophylla, *Karst. l. c.*—*N. Granat.*
pubescens, *Karst. l. c.*—*N. Granat.*
purpurea, *Schlecht. l. c.* xxvi. (1853-55) 669.—*N. Granat.*

RUELINGIA, *Ehrh. Beitr.* iii. 132 (1788) = **Anacampseros**, *Linn. (Portul.)*.
Anacampseros, *Ehrh. l. c.* 133 = *A. Telephiastrum*.
angustifolia, *Haw. Rev. Pl. Succ.* 60 = *A. angustifolia*.
arachnoides, *Haw. Syn. Pl. Succ.* 125 = *A. arachnoides*.
filamentosa, *Haw. l. c.* = *A. filamentosa*.
lanceolata, *Haw. l. c.* 126 = *A. lanceolata*.
patens, *Ehrh. Beitr.* iii. 135 = *Talinum patens*.
polyphylla, *Haw. Suppl. Pl. Succ.* 65 = *A. polyphylla*.
reflexa, [*Spreng.*] *Bot. Gart. Halle*, 20.—*Hab.?*
rubens, *Haw. Syn. Pl. Succ.* 125 = *A. arachnoides*.
rufescens, *Haw. Suppl. Pl. Succ.* 64 = *A. arachnoides*.
triangularis, *Ehrh. Beitr.* iii. 134 = *Talinum triangulare*.
varians, *Haw. Suppl. Pl. Succ.* 64 = *A. Telephiastrum*.

RUELLIA, *Plum. ex Linn. Syst. ed. I* (1735).
ACANTHACEAE, *Benth. & Hook. f.* ii. 1077.
ANTHELEMA, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 66 (1836).
APHRAGMIA, *Nees, in Lindl. Syst. Nat. ed. II.* 444 (1836).
ARRHOSTOXYLUM, *Mart. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 209 (1847).
AUBLETIA, *Neck. Elem. i.* 356 (1790).
COPIOGLOSSA, *Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 294.
CRYPHIANCANTHUS, *Nees, in Del. Sem. Hort. Vrat.* (1841); et in *Linnaea*, xvi. (1842) 298.
CYRTACANTHUS, *Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 51 (1847).
DIPTERACANTHUS, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 75 (1832).
DIZYGANDRA, *Meissn. Gen.* 294 (1840).
EURYCHANES, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 52. t. 3 (1847).
FABRIA, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 185, nomen (1843).
GYMNACANTHUS, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 126.
HEMONACANTHUS, *Nees, in DC. Prod.* xi. 725 (1847).

RUELLIA :—

- HOLTZENDORFFIA, *Klotzsch & Karst. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 727 (1847).
 HOMOTROPIUM, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 47. t. 2 (1847).
 LARYSACANTHUS, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 123.
 NEOWEDIA, *Schrad. in Neuwied, Reise Bras.* ii. 343 (1821).
 OPTHALMACANTHUS, *Nees, in DC. Prod.* xi. 219 (1847).
 PATTERSONIA, *J. F. Gmel. Syst.* 925 (1791).
 SCORODOXYLUM, *Nees, in Benth. Pl. Hartw.* 236 (1846).
 SIPHONACANTHUS, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 45. t. 1 (1847).
 SOLENACANTHUS, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 122.
 STEMONACANTHUS, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 53. tt. 4, 205 (1847).
 STEPHANOPHYSUM, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 83. tt. 155, 156 (1831).
 UPUDALIA, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 66 (1836)
acaulis, *R. Br. Prod.* 479.—*Austral.*
acaulis, *Ruiz, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 282 = *Stenandrium dulce*.
achimeniflorum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 503.—*Costa Rica.*
achyranthifolia, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 391.—*Hab.?*
acicularis, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 480, sphalm. = seq.
aciculata, *Roth, Nov. Pl. Sp.* 301 = *Haplanthus tentaculatus*.
acuminata, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 452.—*Ind. occ.*
acutangula, *Nees, ex Mart. in Flora*, xxi. (1838) II. *Beibl.* 61.—*Bras.*
adhaerens, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 114.—*Arab.*
affinis, *T. Anders. in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S.* i. (1868) 269 = *speciosa*.
alata, *Blume, ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 480, nomen.—*Java.*
alata, *Wall. Pl. As. Rar.* i. 26 = *Strobilanthes Wallichii*.
alba, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 55.—*Bras.*
albicans, *Bert. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 724 = *albicaulis*.
albicaulis, *Bert. ex Spreng. Syst.* ii. 822.—*N. Granat.*
alopecuroides, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 49 = *Lepidagathis alopecuroides*.
alternata, *Burm. f. Fl. Ind.* 135 = *Hemigraphis alternata*.
amabilis, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 7.—*Afr. trop.*
amoena, *Nees, in DC. Prod.* xi. 203, in syn.—*Am. austr.*
amplectens, *Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 86 = *Strobilanthes auriculatus*.
ampliata, *Edgew. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 193 = *Strobilanthes Wallichii*.
amygdalaefolia, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 480 = *Strobilanthes anisophyllus*.
Anagallis, *Burm. f. Fl. Ind.* 135 = *Bonnaya veronicaefolia*.
angusta, *Boj. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 511 = *Isoglossa angusta*.
angustifolia, *Poir. Encyc. vi.* 338 = *Hygrophila angustifolia*.
angustifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 93 = *Blechum angustifolium*.
anisophylla, *Wall. ex Hook. Exot. Fl.* iii. t. 191 = *Strobilanthes anisophyllus*.
antipoda, *Linn. Sp. Pl.* 635 = *Bonnaya veronicaefolia*.
arborescens, *Pav. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 217 = *Bravaisia floribunda*.
arcuata, *Herb. Madr. ex Wall. Cat. n.* 2334 = *Stenophonium Russellianum*.
argentea, *Wall. Cat. n.* 2339 = *Strobilanthes Sabinianus*.
aristata, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 104 = *Calophanes Persoonii*.
aristata, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 73 = *Lepidagathis hyalina*.
aromatica, *Roxb. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 127 = *patula*.
aruensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 134.—*Ins. Aru.*
aspera, *Nees, in DC. Prod.* xi. 147 = *Strobilanthes scaber*.
asperula, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 1079.—*Bras.*
atropurpurea, *Wall. Cat. n.* 2398 = *Strobilanthes atropurpureus*.

RUELLIA :—

atroviridis, Wall. Cat. n. 2404 = *Asystasia atroviridis*.
attenuata, Wall. l. c. n. 2345 = *Echinacanthus attenuatus*.
auriculata, Wall. l. c. n. 2341 = *Strobilanthes auriculatus*.
australis, Cav. Ic. vi. 62; *R. Br. Prod.* 479.—Austral.
axillaris, Steud. Nom. ed. II. ii. 480 = *Ebermaiera axillaris*.
axillaris, Wall. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 127 = *patula*.
balsamica, Linn. f. Suppl. 289 = *Cardanthera balsamica*.
barbata, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 701, in syn. = *Gonzalea Coccocypselum*.
barbata, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 83.—Ind. or.
barbata, Wall. Cat. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 155 = *Strobilanthes barbatus*.
barlerioides, Roth, Nov. Pl. Sp. 310 = *Petalidium barlerioides*.
Beddomei, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 413.—Ind. or.
biceps, Steud. Nom. ed. II. ii. 480 = *Strobilanthes capitatus*.
bicolor, Blume, *Bijdr.* 795.—Java.
bicolor, Ruiz, ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 136 = *geminiflora*.
biflora, Balb. ex Nees, l. c. 122 = *strepens*.
biflora, Boj. ex Nees, l. c. 726 = *Phayloopsis longifolia*.
biflora, Bosc, ex Nees, l. c. 108 = *Calophanes humistratus*.
biflora, Linn. Sp. Pl. 635 = *Calophanes oblongifolius*?
biflora, Pav. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 133.—Peruv.
bignoniaceiflora, S. Moore, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 198.—Afr. trop.
bilabiata, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Britenz. 84, nomen = *Sautiera tinctorum*.
biloba, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 72 = *Asystasia coromandeliana*.
blechioides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 93 = *Blechum laxiflorum*.
Blechum, Linn. Syst. ed. X. 1120; *Amoen. Acad.* v. 400 = *Blechum Brownei*.
Blumeana, Nees, in *DC. Prod.* xi. 149 = *Hemigraphis alternata*.
Blumei, Steud. Nom. ed. II. ii. 480.—Java.
Boungaie, Hemsl. *Diagn. Pl.* Nov. 35.—Mexic.
brachyopoda, Boj. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 726 = *Phayloopsis longifolia*, T. Anders.
brachysiphon, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1078; *Hiern*, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 73.—Bras.
bracteata, R. Br. *Prod.* 479.—Austral.
bracteata, Heyne, in Wall. Cat. n. 2357 = *Strobilanthes Heyneanus*.
bracteata, Roxb. Hort. Beng. [95]; *Fl. Ind.* iii. 47 = *Petalidium barlerioides*.
bracteata, Vahl, ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 466 = *Blechum Brownei*.
bracteata, Wall. Cat. n. 2357 B = *Strobilanthes quadrangularis*.
bracteata, Willd. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 155 = *Hygrophila quadrivalvis*.
brasiliensis, Mart. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ix. 29 = *solitaria*.
brasiliensis, Spreng. Syst. ii. 822 = *Hygrophila portoricensis*.
brevicaulis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 428.—Madag.
Brunoniana, Wall. Cat. n. 2368 = *Strobilanthes Brunonianus*.
callosa, Wall. l. c. n. 2359 = *Strobilanthes callosus*.
calycina, Wall. l. c. n. 2417 = *Strobilanthes Helictus*.
campestris, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 504.—Costa Rica.
candida, Ruiz & Pav. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 134, in syn.—Peruv.
canescens, Heyne, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 428 = *Stenosiphonium Russellianum*.
capitata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 120 = *Strobilanthes pentstemonoides*.
capitata, Wall. Cat. n. 2351 = *Strobilanthes capitatus*, pentstemonoides.
carnea, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 85.—Ins. Socotr.
carolinensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *strepens*?
cayennensis, Spreng. Syst. ii. 823.—Guian.
Cephalotes, Wall. Cat. n. 2352 = *Strobilanthes pentstemonoides*.

RUELLIA :—

cernua, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 260, partim = *Beddomei*.
cernua, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2380 A = *Calophanes Nagchana*.
cernua, Heyne, ex Wall. l. c. n. 2380, partim = *Cardanthera balsamica*.
cernua, Roxb. Hort. Beng. 46; *Fl. Ind.* iii. 45.—Ind. or.
chelonoides, Wall. Cat. n. 2335 = *Asystasia crispata*.
chenopodiifolia, Poir. Encyc. vi. 339 = *Adenosma chenopodiifolia*.
chinensis, Lam. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 475 = *Dicliptera ciliaris*.
chinensis, Lyll, ex Nees, l. c. 476 = *Dicliptera madagascariensis*.
chinensis, Nees, l. c. 147.—China.
ciliaris, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2373 C = *Hygrophila angustifolia*.
ciliaris, Linn. Mant. i. 89 = *Blepharis edulis*?
ciliaris, Pers. Syn. ii. 176 = *pilosa*, Linn.
ciliata, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2392 = *Strobilanthes barbatus*.
ciliata, Hornem. *Enum. Pl. Hort. Hafn.* (1807) 53; *Hort. Hafn.* ii. 585.—Ind. or.; Burma.
ciliata, Ruiz, ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 110 = *Calophanes ciliatus*.
ciliata, Wall. Cat. n. 2415 = *Strobilanthes ciliatus*.
ciliata, Wall. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 156 = *Barleria cristata*.
ciliatiflora, Hook. Bot. Mag. t. 3718.—Reg. Argent.
ciliata, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 420.—Am. bor.
cirsioides, Nees, in *Linnaea*, xv. (1841) 354 = *Crabbea nana*.
clandestina, Hook. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 153 = *obtusata*.
clandestina, Linn. Sp. Pl. 634 = *tuberosa*.
coccinea, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 83.—Ind. occ.
collina, Wall. Cat. n. 2343 = *Strobilanthes collinus*.
colorata, Blume, *Bijdr.* 795.—Java.
colorata, Vell. Fl. Flum. 267; vi. t. 99 (= *Lago-chilium montanum*).—Bras.
colorata, Wall. Cat. n. 2388 = *Strobilanthes coloratus*.
commutata, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Calophanes Nagchana*.
comosa, Roxb. Hort. Beng. 46; *Fl. Ind.* iii. 43 = *Strobilanthes rufescens*.
comosa, Vell. Fl. Flum. 265; vi. t. 91 = *Aphelandra squarrosa*.
comosa, Wall. Cat. n. 2414 = *Ebermaiera axillaris*.
concarvifolia, Orteg. Hort. Matr. Dec. 94 = *patula*.
confinis, Nees, in *DC. Prod.* xi. 148 = *Hemigraphis confinis*.
contorta, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 496 = *Peristrophe contorta*.
cordata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 104 = *pilosa*, Linn.
cordifolia, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 84 = *Stenosiphonium Russellianum*.
coromandeliana, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2399 = *Asystasia coromandeliana*, violacea.
coromandelina, Herb. Monac. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 166 = *Asystasia coromandeliana*.
corymbosa, Wall. ex Nees, l. c. 167 = *Strobilanthes Panichanga*.
corynotheca, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iv. 546.—Austral.
costata, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 76.—Bras.
crenata, Benth. ex Hohen. in *Flora*, xxxii. (1849) 558 = *Hemigraphis latebrosa*.
crispa, Linn. Herb. ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 446 = *Strobilanthes scaber*.
crispa, Linn. Sp. Pl. 635 = *Hemigraphis crispa*.
crispa, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 83 = *Hemigraphis venosa*.
crispa, Roxb. ex T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 461 = *Hemigraphis dura*.
cristata, Andr. Bot. Rep. t. 506 = *Aphelandra cristata*.
Crossandra, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Hemigraphis latebrosa*.
Crucis, Steud. l. c. = *tetragona*, Link.
cucullata, Boj. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 726 = *Phayloopsis parviflora*.
Cumingiana, Nees, l. c. 148 = *Hemigraphis Cumingiana*.
Currori, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 24.—Afr. trop.
curviflora, Nees & Mart. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 50.—Bras.

RUELLIA :—

Cusia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2386 = *Strobilanthes flaccidifolius*.
cuspidata, Heyne, ex Wall. l. c. n. 2405 = *Lepidagathis cuspidata*.
cyanea, Boj. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 121, in syn.—Madag.
Decaisniana, Nees, l. c. 150 = *Hemigraphis Decaisneana*.
deccanensis, J. Grah. Cat. Pl. Bomb. 162 = *prostrata*.
decipiens, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 83 = *Hemigraphis decipiens*.
densa, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 74.—Bras.
densiflora, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 504.—Panama.
denticulata, Wall. Cat. n. 2418 = *Strobilanthes denticulatus*.
dependens, Hook. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 470 = *Rungia parviflora*.
dependens, Roxb. Hort. Beng. 46; *Fl. Ind.* iii. 49 = *Lepidagathis hyalina*.
depressa, Linn. f. Suppl. 290 = *Aptosimum depressum*.
depressa, Wall. Cat. n. 2379 = *Calophanes Nagchana*.
Devosiaua, Hort. Makoy, ex E. Morr. in *Belg. Hort.* xxvii. (1877) 344, t. 19.—Bras.
dichotoma, Bert. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 142 = *paniculata*.
difformis, Linn. f. Suppl. 289 = *Cardanthera triflora*.
diffusa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 195.—Ins. S. Doming.
diffusa, Royle, ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 171 = *Aechmanthera tomentosa*.
diffusa, Vell. Fl. Flum. 266; vi. t. 94 = *Nelsonia campestris*.
diffusa, Wall. Cat. n. 2383 = *Hemigraphis latebrosa*.
Digitalis, Koen. ex Spreng. Syst. ii. 825 = *Asystasia coromandeliana*.
dimidiata, Nees, in *DC. Prod.* xi. 157 = *Hygrophila angustifolia*.
Dipteracanthus, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 504.—Mexic.
discolor, Lecchi, ex Colla, Hort. Ripul. App. ii. 356 = *nova*.
discolor, Nees, in *DC. Prod.* xi. 149.—Java.
dissitifolia, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 73.—Bras.
disticha, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2365 = *Lepidagathis hyalina*.
divaricata, Hoffing. Verz. Pfl. 193 = *lactea*.
divaricata, Wall. Cat. n. 2372 = *Strobilanthes divaricatus*.
diversifolia, S. Moore, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 198.—Afr. trop.
domingensis, Spreng. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 136, in syn.—Ins. S. Doming.
dorsiflora, Retz. Obs. vi. 31 = *Phayloopsis parviflora*.
Drummondiana, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 326.—Texas.
dubia, Vahl, ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 79 = *Ebermaiera elongata*.
dulcis, Cav. Ic. vi. 62, t. 585, f. 2 = *Stenandrium dulce*.
dulcis, Wall. Cat. n. 7167 = *Lepidagathis dulcis*.
dulcissima, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Lepidagathis dulcis*.
dura, Nees, in *Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 311 = *Hemigraphis dura*.
ebracteata, Dalz. in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 342 = *Hemigraphis ebracteolata*.
ebracteolata, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 462 = *Hemigraphis ebracteolata*.
echinata, Wall. Cat. n. 2356 = *Strobilanthes pectinatus*.
elegans, Hook. Bot. Mag. t. 3389 = *Hemigraphis latebrosa*.
elegans, Poir. Encyc. Suppl. iv. 727 = *formosa*.
elongata, Beauv. Fl. Owar. i. 46 = *Whitfieldia longifolia*.
erecta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2395 = *Hemigraphis latebrosa*.
erecta, Burm. f. Fl. Ind. 135 = *Calophanes Nagchana*.
erecta, Roth, Nov. Pl. Sp. 308 = *patula*.
eristachya, Boj. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 67 = *Nelsonia campestris*.
eucoma, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Ebermaiera axillaris*.
extensa, Steud. l. c. = *Strobilanthes extensus*.
falcata, Steud. l. c. = *Lepidagathis falcata*.
fasciculata, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2394 = *Hemigraphis latebrosa*.

RUELLIA:—

fasciculata, Retz. Obs. iv. 28 = *Lepidagathis fasciculata*.
flicifolia, Salzm. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 22 = *Hygrophila costata*.
filiformis, Heyne, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Asystasia violacea*.
filiformis, Klein, ex Nees, in DC. Prod. xi. 165 = *Asystasia coromandeliana*.
fimbriata, Wall. Cat. n. 2363 = *Strobilanthes fimbriata*.
flaccida, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 91 = *Hemigraphis flaccida*.
flagelliformis, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 471. —Ins. Molucc.
flava, Pers. Syn. ii. 177. —Ind. or.
flava, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 43 = *Hemigraphis flava*.
flava, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 152 = *ochroleuca*.
flexuosa, Wall. Cat. n. 2412 = *Strobilanthes pentstemonoides*.
floribunda, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 236. —Peruv.
foetida, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 656 = *rubra*.
foliosa, Schweinitz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 122 = *strepens*.
formosa, Andr. Bot. Rep. t. 610. —Bras.
formosa, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 169 = *Aphelandra formosa*.
formosa, Ledeb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 481, nomen (Quid?). —Hab.?
fragrans, Forst. f. Prod. 44 = *Limnophila serrata*.
fulgida, Andr. Bot. Rep. t. 527. —N. Granat.
Gairae, Rohr, ex Nees, in DC. Prod. xi. 466 = *Blechnum Brownii*.
geminiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 240. —Am. trop.
gemmipara, Nees, in DC. Prod. xi. 220, in syn. —Mexic.
geniculata, Boj. ex Nees, l. c. 107 (= *Dyschoriste geniculata*). —Madag.
geniculata, Vell. Fl. Flum. 265; vi. t. 93 = *Stenandrum mandiocanum*.
gigantea, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 75. t. 102 = *Trichanthera gigantea*.
glabra, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 312 = *glandulosa*.
glabrata, Herb. Petrop. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.
glabrata, Wall. Cat. n. 2390 = *Strobilanthes glabratus*.
glandulosa, Roth, Nov. Pl. Sp. 312 (Gen.?). —Ind. or.
glaucescens, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 85, in syn. = *Hemigraphis glaucescens*.
glomerata, Herb. Madr. ex Nees, in Wall. l. c. 94 = *Phayloopsis parviflora*.
glomerata, Wall. Cat. n. 2361 = *Strobilanthes glomeratus*.
glutinosa, Roxb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 261 = *Phayloopsis parviflora*.
glutinosa, Wall. Cat. n. 2350 = *Strobilanthes glutinosus*.
gossypina, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. i. 38. t. 42; Wall. Cat. n. 2332 = *Aechmanthera tomentosa*.
grandiflora, Blanch. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 30 = *speciosa*.
grandiflora, Pers. Syn. ii. 175 = *longiflora*.
grandiflora, Poir. Encyc. vi. 340. —Ins. Guadeloup.
grandiflora, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 134 = *candida*.
grandiflora, Salzm. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 31 (= *Dipteracanthus subringens*). —Bras.
grandis, Hort. ex Hook. Bot. Mag. t. 4366 = *Strobilanthes lactatus*.
graveolens, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 202. —Nepal.
Griffithiana, Nees, in DC. Prod. xi. 149 = *Hemigraphis Griffithiana*.
guttata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 114. —Arab.
Hamiltoniana, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Strobilanthes coloratus*.
Herbstii, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 75. —Bras.
hirsuta, T. Anders, in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 270, in syn. = *Hemigraphis Decaisneana*.
hirsuta, Ell. Sketch, ii. 109 = *ciliosa*.
hirsuta, Nees, in DC. Prod. xi. 148 = *Hemigraphis hirsuta*.
hirsuta, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 51 = *Hygrophila phlomisoides*.
VOL. II.

RUELLIA:—

hirsuta, Vell. Fl. Flum. 266; vi. t. 96 = *geminiflora*.
hirsuto-glandulosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.
hirta, D. Don, Prod. Fl. Nep. 119 = *Strobilanthes nutans*.
hirta, Vahl, Symb. Bot. iii. 84. t. 67 = *Hemigraphis hirta*.
hispida, DC. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *lactea*.
hispida, Rich. ex Nees, l. c. 87 = *Hygrophila hispida*.
hispida, Vahl, ex Nees, l. c. 137 = *geminiflora*.
hispidosa, Boj. ex Nees, l. c. 262 = *Phayloopsis parviflora*.
Hochstetteri, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Calophanes radicans*.
Hoffmannseggii, Steud. l. c. = *lactea*.
homonyma, Steud. l. c. = *Asystasia Kunthiana*.
Hookeriana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.
Humboldtiana, Klotzsch, ex Nees, in DC. Prod. xi. 207, in syn. —N. Granat.
humifusa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.
humifusa, Pers. Syn. ii. 177. —Ins. Seychell.
humilis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 182 = *ciliosa*.
humilis, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 40. —Bras.
humistrata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 23 = *Calophanes humistratus*.
Huttonii, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 25. —Afr. austr.
hybrida, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 420 = *ciliosa*.
hygrophila, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 65. —Bras.
hygrophiloides, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.
hyssopifolia, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 111 = *Calophanes hyssopifolius*.
imbricata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 113 = *Phayloopsis longifolia*.
imbricata, Hook. ex Nees, in DC. Prod. xi. 181 = *Strobilanthes verruculosus*.
imbricata, Vahl, Symb. Bot. ii. 73 = *Phayloopsis parviflora*.
imbricata, Wall. Cat. n. 7156 = *Strobilanthes imbricata*.
inaperta, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) ii. 198. —Hab.?
incana, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 85 = *Lepidagathis incana*.
incana, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 408 = *Hygrophila incana*.
indigofera, Griff. Journ. 237 = *Strobilanthes flaccidifolius*.
indigotica, Fortune, Resid. Chin. 158 = *Strobilanthes flaccidifolius*.
inflata, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 110. —Guian.
infundibuliformis, Andr. Bot. Rep. t. 542; Roxb. Fl. Ind. iii. 41 = *Crossandra undulaefolia*.
insignis, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 85. —Ins. Socotra.
intrusa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 113 = *Asystasia coromandeliana*.
inundata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 239. —N. Granat.
involuta, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2357 = *Strobilanthes Heyneanus*.
involuta, Vahl, Symb. Bot. iii. 83 (Gen.?). —Ind. or.
isophylla, Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = *Strobilanthes isophyllus*.
Jacquemontiana, Nees, in DC. Prod. xi. 145 = *Strobilanthes glutinosus*.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 254. —Japon.
japurensis, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.
Junghuhniana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 790. —Java.
jussieuoides, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 370. —Mexic.
justiciaeflora, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 176 = *Hygrophila lacustris*.
justicoides, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 94 = *Phayloopsis parviflora*.
Kunthiana, Wall. Cat. n. 2367 = *Strobilanthes Kunthiana*.
Kunthiana, Wall. l. c. n. 2419 = *Asystasia Kunthiana*.

RUELLIA:—

lactea, Cav. Ic. iii. 28. t. 255. —Mexic.
lactea, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 197 = *tuberosa*.
lacustris, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 96 = *Hygrophila lacustris*.
lagopodes, Ryan, ex Nees, in DC. Prod. xi. 263 = *Lepidagathis alopecuroides*.
lamiifolia, Wall. Cat. n. 2347 = *Strobilanthes lamiifolius*.
lanato-viscosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. —Mexic.
latebrosa, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 186 = *Hemigraphis ebracteolata*.
latebrosa, Roth, Nov. Pl. Sp. 307 = *Hemigraphis latebrosa*.
latebrosa, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 46 = *Hemigraphis hirta*.
latifolia, Roth, ex Nees, in DC. Prod. xi. 146 = *Hemigraphis hirta*.
leptostachya, Wall. Cat. n. 2411 = *Dianthera Wallichii*.
lilacina, Hook. Bot. Mag. t. 4147 = *solitaria*.
littoralis, Linn. f. Suppl. 289 = *Calophanes littoralis*.
litturata, Hort. Berol. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.
longepetiolata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. —Mexic.
longiflora, DC. ex Nees, in DC. Prod. xi. 216 = *curviflora*.
longiflora, Drumm. ex Nees, l. c. 123 = *ciliosa*.
longiflora, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. (1846) sub t. 13 = *solitaria*.
longiflora, Nees, in DC. Prod. xi. 140 = *Whitfieldia longifolia*.
longiflora, Pers. Syn. ii. 176 = *longifolia*, Rich.
longiflora, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 210 (= *Arrhoxystylum glabrum*). —Bras.
longiflora, Vahl, Symb. Bot. i. 45. —Arab.
longifolia, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 460. —Beluchist.
longifolia, T. Anders. l. c. vii. (1864) 27 = *Whitfieldia longifolia*.
longifolia, Raesch. Nom. ed. III. 180 = *cayennensis*.
longifolia, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 110. —Guian.
longifolia, Roth, Nov. Pl. Sp. 306 = *Hygrophila angustifolia*.
longifolia, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 50 = *Hygrophila spinosa*.
longifolia, Thunb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 182 = *Strobilanthes cernuus*.
Lorentziana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 259. —Reg. Argent.
lupulina, Wall. Cat. n. 2355 = *Strobilanthes lupulinus*, Heyneanus.
luzona, Nees, in DC. Prod. xi. 151 = *Hemigraphis luzona*.
Lysimachia, Hort. Monsp. ex Nees, l. c. 198 = *tuberosa*.
macrantha, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 37. —Bras.
macrocalyx, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 218 = *Macrostegia Ruiziana*.
macrocarpa, Wall. Cat. n. 2348 = *Asystasia macrocarpa*.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 241 = *fulgida*.
macrophylla, Vahl, Symb. Bot. ii. 72. t. 39. —Am. trop.
macrophylla, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 207 (= *Stemonacanthus Willdenoviana*). —Hab.?
macrosiphon, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 92. —Burma.
maculata, Tafalla, ex Nees, in DC. Prod. xi. 290 (= *Lagochilium maculatum*). —Hab.?
maculata, Wall. Pl. As. Rar. iii. 33. t. 250 = *Strobilanthes maculatus*.
maderensis, Hort. ex Nees, in DC. Prod. xi. 159 = *solitaria*.
madurensis, Poir. Encyc. vi. 341 = *Calophanes littoralis*.
magnifica, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 37 = *macrantha*.
Maranhonis, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 142 = *viscidula*.
matutina, Hochst. & Steud. ex Presl, Bot. Bemerk. 94 = *patula*.
menthoides, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 72. —Bras.

RUELLIA:—

- Methia*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2384 = prostrata.
microphylla, Cav. Ic. vi. 63. t. 586. f. 2 = Calophanes microphylla.
microphylla, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 106 = Calophanes littoralis.
modesta, Mart. ex Nees, l. c. 465 = Pentstemonacanthus modestus.
mollissima, Klein, ex Nees, l. c. 91 = Hygrophila incana.
mollissima, Vahl, Symb. Bot. iii. 82 = Hypoestes mollissima.
monodelpha, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 482, sphalm. = Strobilanthes monadelphus.
monanthos, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 125, in syn. —Madag.
montana, Wall. Cat. n. 2391 = Barleria montana.
Moritziana, Klotzsch, ex Nees, in DC. Prod. xi. 137 = geminiflora.
mucronata, Wall. Cat. n. 2366 = Lepidagathis purpuricaulis, hyalina.
multicaulis, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 24 = Calophanes multicaulis.
mutabilis, Zipp. in Alg. Konst.-en Letter-Bode (1829), i. 297, nomen. —Malaya.
mysurensis, Roth, Nov. Pl. Sp. 303 = Asystasia Lauriana.
Nagchana, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2396 = Calophanes Nagchana.
nana, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 355 = Crabbea nana.
napifera, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 573. —Java.
Neesiana, Klotzsch, ex Schlecht. in Linnaea, xiv. (1840) 289 = tetragona, Link.
Neesiana, Wall. Pl. As. Rar. i. 73. t. 83 = Asystasia Neesiana.
neglecta, Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = Calophanes Nagchana.
nemoralis, Hilsenb. & Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 159 (= *Rhytiglossa nemoralis*). —Afr. trop.?
nemoralis, Vahl, ex Nees, l. c. 165 = Asystasia coromandeliana.
nemorosa, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 574. —Java.
nemorum, Russ. ex Wall. Cat. n. 2399 C = Asystasia intrusa.
Nilbutia, Buch.-Ham. ex Wall. l. c. n. 2366 D = Lepidagathis purpuricaulis.
noctiflora, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 326. —Am. bor.
nova, Colla, Hort. Ripul. App. ii. 356, nomen. —Hab. ?
nubica, Delile, Cent. Pl. Meroë, 74. —Aegypt.
nultans, Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = Strobilanthes glomeratus.
obliqua, Pers. Syn. ii. 177. —Java.
obliqua, Wight, ex Wall. Cat. n. 2399 D = Asystasia coromandeliana.
oblongifolia, Kinn, ex Nees, in DC. Prod. xi. 122 = strepens.
oblongifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 23 = Calophanes oblongifolius.
oblongifolia, Rafin. ex Nees, in DC. Prod. xi. 123 = ciliata.
obovata, Blume, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 482, nomen. —Java.
obovata, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 2375 = Cardanthera triflora.
obovata, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 51 = Hygrophila phlomoides.
obovata, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 75 = Ebermaiera glauca.
obscura, Russ. ex Wall. Cat. n. 2382 = Hemigraphis latebrosa.
obtusa, Nees, in DC. Prod. xi. 152. —N. Granat.
ochroleuca, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 56. —Bras.
ocymoides, Cav. Ic. v. 9 = patula.
ovalifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. —Mexic.
ovata, Cav. Ic. iii. 28. t. 254 = Calophanes linearis.
ovata, Delar. ex Nees, in DC. Prod. xi. 122 = strepens.
ovata, Gouan, ex Nees, l. c. 127 = patula.
ovata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 104. —Afr. austr.
ovata, Willd. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 49 = lactea.
pallida, Vahl, Symb. Bot. ii. 72. —Arab.

RUELLIA:—

- pallida*, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 126 = prostrata.
Panichanga, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2387 = Strobilanthes Panichanga.
paniculata, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 409 = Nomaphila stricta.
paniculata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 239 (= *Dipteracanthus turbacensis*). —N. Granat.
paniculata, Linn. Herb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 554 = Peristrophe bicalyculata.
paniculata, Linn. Sp. Pl. 635. —Am. trop.
paniculata, Scop. ex Nees, in DC. Prod. xi. 197 = tuberosa.
paniculata, Vahl, ex Nees, l. c. 141 = albicaulis.
paniculata, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 92 = Barleria tomentosa.
parabolica, Nees, in DC. Prod. xi. 144 = Hemigraphis parabolica.
Parryi, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 326. —Texas.
parva, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. —Mexic.
parviflora, Baldw. ex Nees, in DC. Prod. xi. 107 = Calophanes oblongifolius.
parviflora, Hort. Tonell. ex Nees, l. c. 123 = Hemigraphis latebrosa.
patula, Hort. Par. ex Nees, in DC. Prod. xi. 126 (= *Dipteracanthus dubius*). —Hab. ?
patula, Jacq. Misc. ii. 358. —Abyss.; Arab.; Ind. or.; Burma.
patula, Salzmann, ex Nees, in DC. Prod. xi. 135 = trivialis.
pauciflora, Wall. Cat. n. 2369 = Codonacanthus pauciflorus.
Pavala, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 47 = Hemigraphis latebrosa.
pectinata, Wall. Cat. n. 2356 = Strobilanthes pectinatus.
pedunculata, Torr. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 325. —Am. bor.
pedunculosa, Nees, in DC. Prod. xi. 211, in syn. —Peruv.
pentstemonoides, Wall. Cat. n. 2340 = Strobilanthes pentstemonoides.
persica, Burm. f. Fl. Ind. 135. t. 42. f. 1 = Blepharis edulis.
persicifolia, Lindl. in Bot. Reg. t. 955; Griff. Itin. Notes, 70 = Strobilanthes anisophyllus.
petiolaris, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 262 = Phayloopsis longifolia.
petiolata, Boj. ex Nees, l. c. 726 = praec.
phlomoides, Wall. Cat. n. 2376 = Hygrophila phlomoides.
picta, Lodd. Bot. Cab. t. 1448. —Ins. S. Doming.
pilosa, Herb. Vindob. ex Nees, in DC. Prod. xi. 200. (= *Siphonacanthus pubens*). —Bras.
pilosa, Linn. f. Suppl. 290. —Afr. austr.
pilosa, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 127, in syn. —Mexic.
pilosa, Vell. Fl. Flum. 268; vi. t. 100 (= *Dipteracanthus Neesianus*). —Bras.
polysperma, Roth, Nov. Pl. Sp. 305 = Hygrophila Serpyllum.
porrigens, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 41. —Bras.
Portellae, Hook. f. Bot. Mag. t. 6498. —Bras.
primulacea, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 546. —Austral.
primulifolia, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 382 = Hemigraphis primulaefolia.
prismatica, Vell. Fl. Flum. 267; vi. t. 98 = Aphelandra prismatica.
prostrata, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = lactea.
prostrata, Poir. Encyc. vi. 349. —Ind. or.; Afr. trop.
pubescens, Pers. Syn. ii. 176 = pilosa, Linn.
pubiflora, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 259. —Reg. Argent.
pulchella, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = rubicaulis.
pulcherrima, T. Anders. ex Hemsl. Biol. Centr.-Am. Bot. ii. 507. —Mexic.
pumila, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 199, in syn. —Peruv.
Pumilio, R. Br. Prod. 479 = australis.
punctata, Nees, in DC. Prod. xi. 147 = Strobilanthes anceps.
Purdiana, Hook. Bot. Mag. t. 4298. —N. Granat. ?
Puri, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 35. —Bras.

RUELLIA:—

- purpuricaulis*, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 96 = Lepidagathis purpuricaulis.
quadrangularis, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 494 = Asystasia chelonoides.
quadrangularis, Vell. Fl. Flum. 267; vi. t. 97 = Aphelandra sciophila.
quadrangularis, Wall. Cat. n. 2358 = Strobilanthes quadrangularis.
quadrifaria, Wall. l. c. n. 7152 = Hemigraphis quadrifaria.
quadrivalvis, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1824) 291 = Hygrophila quadrivalvis.
quaterna, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 284 = Asystasia scandens.
quitensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 240 = Calophanes quitensis.
quitensis, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 96 = Calophanes Schiedeana.
racemosa, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 42 = Ebermaiera racemosa.
radicalis, Buch.-Ham. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 96 = Lepidagathis Hamiltoniana.
radicans, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 24 = Calophanes radicans.
radicans, Wall. Cat. n. 2410 = Hygrophila angustifolia.
radiciflora, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 160 = Lepidagathis cristata.
rasa, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 73. —Bras.
ravaccensis, Nees, in DC. Prod. xi. 144. —Ins. Rawak.
reflexa, Royle, ex Nees, in DC. l. c. 194 = Strobilanthes alatus.
reniformis, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 94 = Phayloopsis parviflora.
repanda, Blume, Bijdr. 794 = Blumeana.
repanda, Linn. Sp. Pl. ed. II. 886. —Malaya.
repens, Blanco, Fl. Filip. ed. i. 493 = Hemigraphis repens.
repens, Burm. f. Fl. Ind. t. 41. f. 2 = Calophanes Nagchana.
repens, Hort. Madr. ex Nees, in DC. Prod. xi. 124 = prostrata.
repens, Linn. Mant. i. 89. —Burma; Malaya.
repens, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 109 = Calophanes repens.
repens, Wall. Cat. n. 2384 = prostrata, suffruticosa.
reptans, Forst. f. Prod. 44 = Hemigraphis reptans.
retrofacta, Wall. Cat. n. 7165 = Lepidagathis purpuricaulis.
rhamnifolia, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 142 = albicaulis.
rhytiphylla, Nees, l. c. 150 = Hemigraphis rhytiphylla.
ringens, Linn. Sp. Pl. 635 = Hygrophila angustifolia.
ringens, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 44 = prostrata.
rivinaefolia, Wall. Cat. n. 2413 = Justicia vasculosa.
rivularis, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 396 = Hygrophila rivularis.
Rohrii, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 466 = Blechnum Brownei.
rosea, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507. —Mexic.
rosea, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 61 (= *Arrhoxystylum roseum*). —Bras.
rosea, Wall. ex Nees, in DC. Prod. xi. 177 = Strobilanthes roseus.
rotundifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 120 = Strobilanthes lamiifolius.
rubicanlis, Cav. Ic. v. 10. —Mexic.
rubicunda, Wight, ex Wall. Cat. n. 2337 = Strobilanthes rubicundus.
rubra, Aubl. Pl. Gui. ii. 666. —Guian.
rubra, Nees, in DC. Prod. xi. 211. (= *Arrhoxystylum Haenkeanum*). —Peruv.
rubra, Willd. ex Nees, l. c. 209. (= *Arrhoxystylum Willdenovianum*). —Ind. occ.
rufescens, Roth, Nov. Pl. Sp. 304 = Strobilanthes rufescens.
rupestris, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 462 = Hemigraphis ebracteolata.
rupestris, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 93 = Stenandrium rupestre.
Russelliana, Wall. Cat. n. 2400 = Stenosiphonium Russellianum.
Sabiniana, Wall. l. c. n. 2338 = Strobilanthes Sabinianus.
salicifolia, Bert. ex Nees, in DC. Prod. xi. 92 = Hygrophila portoricensis.

RUELLIA:—

salicifolia, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 511 = *Isoglossa angusta*.
salicifolia, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2374 B = *Hygrophila quadrivalvis*.
salicifolia, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 88 = *Hygrophila costata*.
salicifolia, Vahl, Symb. Bot. iii. 84 = *Hygrophila angustifolia*.
sanguinea, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 260.—Reg. Argent.
sarmentosa, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 83 = *Hemigraphis hirta*.
satipoorensis, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 281 = *Hemigraphis latebrosa*.
saxicola, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 503 = *Hypoestes saxicola*.
scabra, Gaudich. ex Nees, l. c. 150 = *Hemigraphis Decaisneana*.
scabra, Juss. ex Pers. Syn. ii. 178 = *obliqua*.
scabra, Wall. Cat. n. 2377 = *Strobilanthes heteromallus*.
scabra, Wall. l. c. n. 2393 = *Strobilanthes scaber*.
scabrata, Wall. l. c. n. 2393 C = *Strobilanthes scaber*.
scabrosa, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 1074 = *Stenandrium scabrosum*.
scariosa, Wall. Cat. n. 2354 = *Lepidagathis scariosa*.
scariosa, Wall. l. c. n. 7166 = *Lepidagathis falcata*.
Schlechtendalia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507.—Mexic.
sclerichiton, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 7.—Afr. trop.
seclusa, S. Moore, l. c. xiv. (1876) 208.—China.
secunda, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 495 = *Lepidagathis secunda*.
secunda, Vahl, Symb. Bot. iii. 84 = *Asystasia coromandeliana*.
secunda, Wall. Cat. n. 2401 = *Asystasia intrusa*.
secunda, Wight, ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 99 = *Strobilanthes exareolatus*.
secundiflora, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 166 = *Asystasia coromandeliana*.
semitetrandra, Jacq. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 555, nomen.—Hab.?
serpens, Nees, in DC. Prod. xi. 145.—Java.
serrata, Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. (1815) 143 = *Bonnaya penicillata*.
sesamoides, Wall. Cat. n. 2408 = *Strobilanthes consanguineus*, *Stenosiphonium Russellianum*.
sessilis, Balb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *lactea*.
setigera, Pers. Syn. ii. 176 = *Calophanes Persoonii*.
setigera, Wight, ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 81 = *Calophanes Nagchana*.
setigera, Zeyh. ex Nees, in DC. Prod. xi. 391 = *Adhatoda divaricata*.
Sibua, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2384 F = *suffruticosa*.
silvaccola, Mart. ex Nees, in DC. Prod. xi. 213 = *formosa*.
simplex, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 97.—Cuba.
siphonantha, Hilsenb. & Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 112 = *Calophanes siphonanthus*.
solitaria, Vell. Fl. Flum. 266; vi. t. 95.—Bras.
speciosa, Mart. ex Nees, in DC. Prod. xi. 215 = *formosa*.
speciosa, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 30.—Bras.
speciosa, Schott, ex Nees, in DC. Prod. xi. 118 = *macrantha*.
spicata, Nees, in DC. Prod. xi. 161 (= *Lagochilium spicatum*).—Mexic.
spicata, Roth, Nov. Pl. Sp. 310 = *Strobilanthes consanguineus*.
spicata, Vell. Fl. Flum. 265; vi. t. 92 = *Geissomeria distans*.
spiciflora, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 547.—Austral.
spinescens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 104.—Afr. austr.
stemonacanthoides, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507.—Costa Rica.
strepens, Beck, Bot. N. & Mid. St. 285 = *ciliata*.
strepens, Bert. ex Nees, in DC. Prod. xi. 136 = *domingensis*.
strepens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 114 = *pallida*.
strepens, Hort. Madrit. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *tuberosa*.
strepens, Linn. Sp. Pl. 634.—Am. bor.; Ind. occ.
strepens, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 136 = *geminiflora*.
strepens, Sw. ex Nees, Mart. Fl. Bras. ix. 40 = *humilis*.
strepens, Wight, ex Nees, in DC. Prod. xi. 127 = *patula*.
strigosa, Nees, l. c. 148 = *Hemigraphis strigosa*.

RUELLIA:—

strobilina, Wall. Cat. n. 2362 = *Strobilanthes nutans*.
suaveolens, Span. in Linnaea, xv. (1841) 331 = *Striga curviflora*?
subcaulis, C. Koch & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 12.—Hab.?
subcapitata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507.—Nicaragua.
subdentata, Klotzsch, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 33.—Bras.
subsericea, Wall. Cat. n. 2416 = *Stenosiphonium Russellianum*.
suffruticosa, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 53.—Ind. or.
sumatrensis, Roth, Nov. Pl. Sp. 311.—Sumatra.
sylvaccola, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 60 = *formosa*.
tanacetifolia, Herb. Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 68 = *Cardanthera triflora*.
tentaculata, Linn. Cent. Pl. ii. 22; Amoen. Acad. iv. 320 = *Haplanthus tentaculatus*.
tenuis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2366 C = *Lepidagathis purpuricaulis*.
tetragona, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 85 = *Blumei*.
tetragona, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 133.—Bras.
tetragona, Thunb. Fl. Javan. 22.—Java; Zeylan.
tetragonostachya, Wall. Cat. n. 7168 = *Neuracanthus tetragonostachyus*.
tetrasperma, Champ. ex Benth. in Kew Journ. v. (1853) 132.—China.
thomana, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) II. 199.—Ins. S. Thomas.
thunbergiaeflora, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 24 = *Distichocalyx thunbergiaeflora*.
thymifolia, Herb. Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 462 = *Calophanes Persoonii*.
tomentosa, Wall. Cat. n. 2333 = *Aechmanthera tomentosa*.
trichotoma, Nees, in DC. Prod. xi. 149.—Java.
triflora, DC. ex Nees, l. c. 122 = *ciliata*.
triflora, Pav. ex Nees, l. c. 198 = *tuberosa*.
triflora, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 52 = *Cardanthera triflora*.
trinervis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2500 A = *Lepidagathis trinervis*.
trivialis, Blanch. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 39.—Bras.
tuberosa, Linn. Sp. Pl. 635.—Am. bor. et trop.
tubiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 241.—N. Granat.
tubiflora, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 142 = *noctiflora*.
tubulata, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 202.—Peruv.
Tweediana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 259.—Reg. Argent.
uliginosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 494 = *Blechum Brownei*.
uliginosa, Linn. f. Suppl. 290 = *Cardanthera uliginosa*.
uliginosa, Mart. ex Nees, in DC. Prod. xi. 68 = *Cardanthera triflora*.
uliginosa, Nees, l. c. 149 = *discolor*.
uliginosa, Wall. Cat. n. 2378, partim = *Hygrophila polysperma*.
ulmifolia, Wall. l. c. n. 2360 = *Strobilanthes rufescens*.
umbrosa, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2399 B = *Asystasia coromandeliana*, *violacea*.
undulata, Vahl, Symb. Bot. iii. 82 = *Hygrophila quadrivalvis*.
undulata, Vis. Sem. Rar. Patav. (1847) 4; et ex Linnaea, xxiv. (1851) 181.—Hab.?
uniflora, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 125 = *monanthos*.
urens, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 302 = *Hemigraphis dura*.
urophylla, Wall. Cat. n. 2344 = *Strobilanthes urophyllus*.
urticifolia, Wall. l. c. n. 2346 = *Strobilanthes alatus*.
ustulata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2366 B = *Lepidagathis hyalina*.
variabilis, Macrae, ex Nees, in DC. Prod. xi. 165 = *Asystasia coromandeliana*.
variabilis, Zipp. in Hall, Bijdr. Nat. Wetensch. v. (1830) 180 = *mutabilis*.
varians, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2492 B = *Daedalacanthus montanus*.
varians, Vent. Jard. Cels. 46 = *Daedalacanthus nervosus*.

RUELLIA:—

variegata, Lubbers, Cat. Pl. Rar. San-Donato (1880), 13 = *Strobilanthes maculatus*.
venosa, Blume, Bijdr. 795 = *Hemigraphis confinis*.
venosa, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 423 = *Hemigraphis venosa*.
ventricosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 241.—N. Granat.
ventricosa, Poir. Encyc. vi. 339 = *cayennensis*.
venusta, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 92.—China.
verticillata, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *lactea*.
verticillata, Spreng. Syst. ii. 822 = *Hygrophila longifolia*.
verticillata, Wall. Cat. n. 2409 = *Cardanthera verticillata*.
verticilliflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 483 = *Cardanthera verticillata*.
villosa, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 200.—Bras.
vincaeflora, DC. ex Nees, l. c. 122 = *strepens*.
vinoides, Willd. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 36.—Bras.
vindex, Mart. ex Nees, l. c. 42.—Bras.
violacea, Aubl. Pl. Gui. ii. 668.—Guian.
violacea, Ruiz, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.
viscidula, Mart. ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 93.—Bras.
viscosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 239 = *paniculata*.
viscosa, Pav. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 25 = *Calophanes Maranhonis*.
viscosula, Wall. ex Nees, in DC. Prod. xi. 260 = *Lepidagathis fasciculata*.
Wightiana, Wall. Cat. n. 2397 = *prostrata*.
Zeyheri, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 25.—Afr. austr.
zeylanica, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 42 = *Asystasia coromandeliana*.

RUEPPELIA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 203. t. 37 (1847) = *Aeschynomene*, Linn. (Legumin.).
abyssinica, A. Rich. l. c. = A. Ruppellii.

RUGELIA, Shuttlew. ex Chapm. Fl. S. U. St. 246 (1860) = *Senecio*, Tourn. (Compos.).
nudicaulis, Shuttlew. ex Chapm. l. c. = S. Rugelia.

RUGENDASIA, Schiede, ex Schlecht. Hort. Halens. 14 (1841) = *Weldenia*, Schult. f. (Commel.).
majalis, Schiede, ex Schlecht. l. c. = W. candida.

RUGENIA, Neck. Elem. ii. 78 (1790), sphalm. = *Eugenia*, Mich. (Myrtac.).

RUIZIA, Cav. Diss. iii. 117. tt. 36, 37 (1787). *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 221.
aurea, Hort. ex Baker, Fl. Maurit. 59 = *Cossignia pinnata*.
cordata, Cav. Diss. iii. 117. t. 36. f. 2.—Ins. Borbon.
diversifolia, Jacq. Hort. Schoenb. iii. t. 295 = *variabilis*.
diversifolia, Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 54.—Hab.?
integrifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 483, nomen.—Ins. Borbon.
laciniata, Cav. Diss. iii. 119 = *variabilis*.
lobata, Cav. l. c. 118. t. 36. f. 1.—Ins. Borbon.
palmata, Cav. l. c. 119 = *variabilis*.
variabilis, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 24.—Ins. Borbon.

RUIZIA, Ruiz & Pav. Prod. 135. t. 29 (1794) = *Peumus*, Molina (Laurin.).
fragrans, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 267 = P. Boldus.

RULAC, Adans. Fam. ii. 383 (1763) = *Acer*, Tourn. (Sapind.).

RULINGIA, R. Br. in Bot. Mag. t. 2191 (1820). *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 226.
ACHILLEOPSIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1849) II. 9.
althaeifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 151 = *grandiflora*.
cistifolia, A. Cunn. ex Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 354, sphalm. = *hermanniaefolia*.
corylifolia, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jul. 1832) 171.—Austral.

RULINGIA :—

corylifolia, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 237 = parviflora. *craurophylla*, F. Muell. Fragm. ix. 59.—Austral. *crispa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 10 = Commersonia crispa. *cristifolia*, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. i. 240 = hermanniaefolia. *cuneata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 151.—Austral. *dasyphylla*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 55 = pannosa. *densiflora*, Benth. Fl. Austral. i. 241.—Austral. *grandiflora*, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 12.—Austral. *hermanniaefolia*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 353.—Austral. *hexamera*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 151 = cuneata. *Kempeana*, F. Muell. Fragm. xi. 113.—Austral. *loxophylla*, F. Muell. l. c. i. 68.—Austral. *macrantha*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 503.—Madag. *madagascariensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 104.—Madag. *magniflora*, F. Muell. Fragm. viii. 223.—Austral. *malvaefolia*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 356.—Austral. *nana*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 150 = parviflora. *oblongifolia*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 353 = hermanniaefolia. *pannosa*, R. Br. in Bot. Mag. t. 2191.—Austral. *parviflora*, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 12.—Austral. *pauciflora*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 570.—Austral. *platycalyx*, Benth. Fl. Austral. i. 240.—Austral. *pulchella*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 10 = Commersonia pulchella. *rotundifolia*, Turcz. l. c. (1852) ii. 152.—Austral. *rugosa*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 352.—Austral. *salvifolia*, Benth. Fl. Austral. i. 238.—Austral.

RUMEA, Poit. in Mém. Mus. Par. i. (1815) 62. t. 4 = **Xylosma**, Forst. (Bixin.). *abyssinica*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 34 = Aberia abyssinica. *chinensis*, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475 (= *Phoberos chinensis*).—China. *cochinchinensis*, Wall. ex Steud. l. c. = Scolopia cochinchinensis. *coriacea*, Poit. in Mém. Mus. Par. i. (1815) 63. t. 4 = X. nitidum. *crocea*, Steud. Nom. ed. II. i. 532, sphalm. = praec. *floribunda*, Agardh, Theor. Syst. Pl. t. 13. f. 13–15.—Hab. ? *hebecarpa*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 9 = Aberia Gardnerii. *inermis*, DC. Prod. i. 256 = Fluggea microcarpa. *Jangomas*, Spreng. Syst. ii. 632.—Cochinch.

RUMEX, Linn. Syst. ed. I (1735). **POLYGONACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 100.

ACETOSA, Neck. Elem. ii. 214 (1790). **ACETOSELLA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836). **ANALITON**, Rafin. l. c. (1836). **ATECOSA**, Rafin. l. c. (1836). **EUTRALIA**, Rafin. l. c. (1836). **LAPATHUM**, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 277 (1763). **MENOPHYLA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 45 (1836). **OXYLAPATHON**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 159. **PATIENTIA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836). **RHODOPTERA**, Rafin. l. c. 45 (1836). **STEINMANNIA**, Opiz, Seznam, 93 (1852). **TOMARIS**, Rafin. Fl. Tellur. 46 (1836). **VIBONES**, Rafin. l. c. 45 (1836). *abortivus* ×, Ruhm. in Eichl. Jahrb. Berl. i. (1881) 253.—Europ. *abyssinicus*, Desf. Tabl. ed. II. 48 = arifolius. *abyssinicus*, Jacq. Hort. Vindob. iii. 48. t. 93.—Abyss. *Acetosa*, Linn. Sp. Pl. 337.—Europ.; As. bor. *Acetosella*, Holl. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 72 = suffruticosus. *Acetosella*, Linn. Sp. Pl. 538.—Europ.; As. bor. *acetoselloides*, Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. i. (1854) 282.—Oriens. *acetosus*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 113, 134 = R. Acetosa. *acidus*, Salisb. Prod. 258 = R. Acetosa.

RUMEX :—

aculeatus, Linn. Syst. ed. X. 991 = bucephalophorus. *acuminatus*, Campd. Monog. Rum. 116 = R. Acetosa. *acutus*, All. Fl. Pedem. ii. 202 = obtusifolius. *acutus*, Curt. Fl. Lond. fasc. iii. 21 = sanguineus. *acutus*, Fries, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 52 = conspersus. *acutus*, Linn. Sp. Pl. 335.—Europ. *acutus*, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 359 = maritimus. *acutus*, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 22 = maximus. *acutus*, Sm. Fl. Brit. i. 391 = conglomeratus. *acutus*, Wahlenb. Fl. Suec. 233 = R. Hydrolapathum. *adulterinus*, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 197 = acutus. *aegyptiacus*, Balb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 58 = pulcher. *aegyptiacus*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 290 = Marschallianus. *aegyptiacus*, Linn. Sp. Pl. 335.—Aegypt. *aegyptius*, Linn. Syst. ed. X. 990 = praec. *aetnensis*, Presl, Delic. Prag. 68 = scutatus. *afer*, Savi, in Atti Stor. Nat. Bologn. iii. (1830) 90.—Aegypt. *agrestis*, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = R. Acetosa. *agrestis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 580 = obtusifolius. *alexandrinus*, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1476, nomen.—Hab. ? *alismaefolius*, Fresen. in Flora, xxi. (1838) 602.—Abyss. *Allioni*, Link, Handb. i. 306 = montanus. *alpestris*, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 62 = scutatus. *alpinus*, Georgi, Reise, i. 207 = Gmelini. *alpinus*, Hook. in Engl. Bot. Suppl. t. 2694 = longifolius. *alpinus*, Linn. Sp. Pl. 334.—Europ.; Reg. Caucas. *altissimus*, Wood, in Proc. Am. Assoc. (1853) 177.—Am. bor. *ambiguus*, J. Gay, ex Gaud. Fl. Helv. ii. 589, in obs. = acutus. *ambiguus*, Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 44 = R. Acetosa. *americanus*, Campd. Monog. Rum. 151 = vesicarius vel scutatus. *amplexicaulis*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 200 = montanus. *amplexicaulis*, Rafin. New Fl. Am. iv. 53 = R. Acetosa. *amplexicaulis*, Tenore, Fl. Nap. iii. 394 = tmoleus. *amurensis*, F. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. Amur. 223.—Mandchuria. *angustatus*, Rafin. New Fl. Am. iv. 53 = R. Acetosa. *angustifolius*, Campd. Monog. Rum. 63, 73. t. 1. f. 2.—As. Min. *angustifolius*, Engelm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 64 = Engelmanii. *angustissimus*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 536 = graminifolius. *Anthoxanthus*, Murr. Prod. Gotting. 52 = maritimus. *Anthoxanthum*, Moench, Enum. Pl. Hass. 174 = praec. *antiscorbuticus*, Salisb. Prod. 258 = R. Hydrolapathum. *aquaticus*, Campd. Monog. Rum. 100 = maximus. *aquaticus*, Linn. Sp. Pl. 336.—Europ.; As. bor. *aquaticus*, Sm. Fl. Brit. i. 394 = R. Hydrolapathum. *arboreus*, Salisb. Prod. 258 = R. Lunaria. *arcticus*, Trautv. in Middend. Sibir. Reise, i. ii. 29.—Sibir. aret. *arenarius*, Poepp. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 52 = cuneifolius. *Areschougii*, Eckstr. ex Aresch. in Bot. Notiser (1866), 10, 54.—Europ. *arifolius*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 487; ed. II. ii. 324 = abyssinicus. *arifolius*, All. Fl. Pedem. ii. 204 = montanus. *arifolius*, Linn. f. Suppl. 212.—Afr. austr. *Aristidis*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 103.—Afr. bor. *armenus*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 209.—Armenia. *armoraciaefolius*, Neum. in Bot. Notiser (1885), 155.—Europ. *arvensis*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 165 = R. Acetosella. *atriplicifolius*, Reichb. ex Schult. f. Syst. vii. 1460 = pictus. *auratus*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 30 = sanguineus. *aureus*, Hoepf. in Mag. Naturk. Helv. iv. (1789) 35 = sanguineus. *aureus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = maritimus. *auritus*, Campd. Monog. Rum. 149.—Oriens. *Berlandieri*, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii. (1883) 104 (an seq. ?).—Porto Rico. *Berlandieri*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 45.—Am. bor. occ.; Chili. *bidens*, R. Br. Prod. 421.—Austral.

RUMEX :—

bidentula, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = R. Acetosa. *biformis*, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1857) 26.—Cf. Linnaea, xxix. (1857–58) 733.—Gallia. *biformis*, Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt. 161 = acutus. *bipinnatus*, Linn. f. Suppl. 211 = pictus. *bonariensis*, Campd. Monog. Rum. 144.—Reg. Argent. *brasilensis*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 349.—Bras. *brevipes*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 55.—Mexic. *Britannica*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 135 = R. Hydrolapathum. *Britannica*, Linn. Sp. Pl. 334.—Am. bor. *Britannicus*, Ell. Sketch, i. 414 = verticillatus. *britannicus*, Hoffing. Verz. Pfl. 239 = R. Britannica. *Brownianus*, Raoul, Choix Pl. N. Zel. 42 = flexuosus. *Brownianus*, Schult. f. Syst. vii. 1395 = seq. *Brownii*, Campd. Monog. Rum. 64, 81.—Austral. *Brownii*, Schlecht. in Linnaea, xx. (1837) 576 = pulcher. *bucephalophorus*, Linn. Sp. Pl. 336.—Reg. Mediterr. *bulbosus*, Campd. Monog. Rum. 151.—Hab. ? *Burchelli*, Campd. l. c. 135 = luxurians. *caldeirarum*, H. C. Wats. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 43 = aquaticus. *callosissimus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 57 = dentatus. *calthaefolius*, Campd. Monog. Rum. 150.—Aegypt. *campestris*, Savi, Fl. Pis. i. 372 = conglomeratus. *Candollii*, Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 52 = alpinus. *cassius*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1013.—Syria. *chalepensis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11.—Syria. *chilensis*, Herb. Berol. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 44 = longifolius. *chilensis*, Hort. Par. ex Moris, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 46 = cuneifolius. *chinensis*, Campd. Monog. Rum. 63, 75 = maritimus. *chrysocarpos*, Moris, Enum. Sem. Hort. Taurin. (1813); ex cod. in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 46. t. 2.—Mexic. *crystallinus*, Auct. = crystallinus. *Claytoni*, Campd. Monog. Rum. 66, 99. = R. Britannica. *Commersonianus*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1221 = seq. *Commersonnii*, Campd. Monog. Rum. 72, 148 = R. Acetosa. *comosus*, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xvi. 48 = maritimus. *comosus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 76 = aegyptiacus. *condylodes*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 288 = nemorosus. *confertus*, Willd. Enum. Hort. Berol. 397 = alpinus. *confusus* ×, Simk. in Termész. Füzetek, i. (1877) 238.—Hungar. *conglomeratus*, Murr. Prod. Gotting. 52.—Europ. austr.; As. occ. *consersus*, Hartm. Skand. Fl. ed. I. 147.—Europ. *cordatus*, Desf. Tabl. ed. I. 40, nomen; Cat. Hort. Par. ed. III. 389.—Afr. austr. *cordifolius*, Hornem. ex Campd. Monog. Rum. 151, nomen; et ex Reichb. Pl. Crit. v. 52.—Europ.; As. bor. *creticus*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 102 = tuberosus. *creticus*, Campd. Monog. Rum. 149 = bucephalophorus ? *crispatus*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 59 = ucranicus. *crispatus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 217 = maritimus. *crispatus*, Pers. Syn. i. 395 = maritimus. *crispus*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 59 = longifolius. *crispus*, Linn. Sp. Pl. 335.—Europ.; As. bor. *crispus*, Lour. Fl. Cochinch. 216 = maritimus. *cristatus*, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 139.—Hab. ? *cristatus*, Fries, Nov. Fl. Suec. 100 = conspersus. *cristatus*, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1436 = cordifolius. *cristatus*, Wall. Sched. Crit. 163 = acutus. *crystallinus*, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1861) 28.—Austral. *cuneifolius*, Campd. Monog. Rum. 66, 95.—Am. austr. *Cunninghamii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 62 = flexuosus. *daghestanicus*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 209 = nemorosus. *dentatus*, Linn. Mant. ii. 226.—Oriens; Ind. or. *dentatus*, Wall. Cat. 1730 (sp. diversa).—Ind. or. *denticulatus*, Campd. Monog. Rum. 143 = maritimus. *denticulatus*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 208 = pulcher. *dictyocarpus*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 192 = obtusifolius. *digynus*, Linn. Sp. Pl. 337 = Oxyria digyna.

RUMEX:—

- dimorphus*, Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 43 = arifolius.
Dioscoridis, Hayne, Arn. Gew. xiii. 5. t. 5 = orientalis.
distans, Dum. Fl. Belg. 17 = longifolius.
divaricatus, Fries, Mant. iii. 25 = obtusifolius.
divaricatus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 477 = pulcher.
divaricatus, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 182 = conglomeratus.
domesticus, Hartm. Skand. Fl. ed. I. 148 = longifolius.
Dregeanus, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 496 = Afr. austr.
Dregei, Meissn. in DC. Prod. xiv. 68 = praec.
Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 272 = pulcher.
Drummondii, F. Muell. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 61 = praec.?
dubius, Gunn. Fl. Noveg. ii. 26 = maritimus.
dubius, Retz. Fl. Scand. Prod. 64 = conglomeratus.
dumosus, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 62. — Austral.
Ecklonianus, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 493. — Afr. austr.
Ecklonii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 50 = praec.
Ehrenbergii, Meissn. l. c. 56 = dentatus.
elbrusensis, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 100. — Persia.
elongatus, Guss. Pl. Rar. Neap. (1826) 150. t. 28 = crispus.
Engelmanni, Ledeb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 64. — Am. bor. occ.
erosus, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1476, nomen. — Hab.?
erubescens ×, Smk. in Termesz. Füzetek. i. (1877) 239. — Hungar.
exsanguis, Kit. ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 576 = nemorosus.
falcarius, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 512 = R. Acetosella.
ferrugineus, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 158 = conglomeratus.
fimbriatus, R. Br. Prod. 421 = Brownii.
fimbriatus, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 455 = flexuosus.
fimbriatus, Poir. Encyc. v. 65. — Afr. austr.
Fischeri, Reichb. Ic. Pl. Crit. iv. 58 = crispus.
flexuosus, Soland. ex Forst. f. Prod. 90. — N. Zel.
floridanus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 46. — Florida.
foveolatus, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 328 = pulcher.
Friesii, Aresch. in Oefvers. Vet. Akad. Handl. Stockh. 1862 (1863) 58, in syn. = aquaticus.
Friesii, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 36 = obtusifolius.
frutescens, Thou. Fl. Tristan d'Acugn. 38. — Ins. Tristan d'Acugn.
garipensis, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 491. — Afr. austr.
gentilis, Loennr. ex Aresch. in Bot. Notiser (1866), 7, 52 = acutus.
giganteus, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 323. — Ins. Sandvic.
glaber, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 75 = Emex spinosa.
glaucus, Jacq. Coll. i. 63 = scutatus.
glomeratus, Schreb. Spicil. Fl. Lips. ed. II. 64 = conglomeratus.
glomeratus, Tenore, Fl. Nap. v. p. vi = sanguineus.
Gmelini, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 100; xxv. (1852) ii. 444. — Sibir. baical.
gracilis, Eckstr. in Bot. Notiser (1866), 52 = acutus.
gracilis, Schur, Enum. Pl. Transs. 579 = sylvestris.
gracilis, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iv. 80 = orientalis.
gramineus, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 512 = graminifolius.
graminifolius, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 921. — Kamtschat.
granulosus, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 484, nomen. — Hab.?
halophilus, F. Muell. Fragm. iv. 48. — Austral.
hamatus, Trevir. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 174 = nepalensis.
hamulosus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 693 = nepalensis.
haplorhizus, Czern. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 445 = R. Acetosa.
hastaeifolius, Campd. Monog. Rum. 148 = scutatus.
hastatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 74. — Reg. Himal.
hastatus, Link. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 70 = scutatus.
hastifolius, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 290 = scutatus.
hastifolius, Guss. ex Nym. Consp. 635 = intermedius.

RUMEX:—

- hastulatus*, Baldw. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 64 = Engelmanni.
hastulatus, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = R. Acetosa.
hastulatus, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 29 = Muchlenbeckia chilensis.
Helolapathum, Drejer, ex Hornem. in Fl. Dan. t. 2288 = aquaticus.
heteranthos ×, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 393. — Europ.
heterophyllus, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 (Quid?). — Am. bor.
heterophyllus, Schultz, Prod. Pl. Starg. Suppl. i. 21 = maximus.
hexagynus, Auct. ex Schult. f. Syst. vii. 1476, nomen (Quid?). — Hab.?
hippiatricus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 281. — Chili.
Hippolapathum, Fries, Nov. Fl. Suec. ed. II. 106 = longifolius, aquaticus.
hirsutus, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 484, nomen. — Italia.
hispanicus, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 112 = montanus.
hispanicus, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 709 = R. Acetosa.
horizontalis, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 211. — As. Min.
hortensis, Vis. ex Nym. Consp. 635 = R. Acetosa.
hostilis, Lour. Fl. Cochinch. 217. — Cochinch.
Hydrolapathum, Campd. Monog. Rum. 145 = conspersus.
Hydrolapathum, Huds. Fl. Angl. ed. II. 154 (Hydrolapathum). — Europ.
hydrolapathus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = praec.
hymenosepalus, Torr. Bot. Mex. Bound. 177. — Am. bor. occ.
incomtus, Weinm. in Flora, iv. (1821) 28 = brasiliensis.
induratus, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 107 = scutatus.
infestus, Salisb. Prod. 258 = R. Acetosella.
integrifolia, Rafin. New Fl. Am. iv. 52. — Am. bor.
intermedius, DC. Fl. Fr. Suppl. 369. — Europ. austr.
intermedius, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 449 = thyrsoides.
intermedius, Sturm, Deutschl. Fl. Heft 74; et ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 65 = R. Acetosa.
italicus, Hort. Par. ex Campd. Monog. Rum. 112 = montanus.
japonicus, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 56 = crispus.
Klotzschianus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 57 = dentatus.
Knafii ×, Čelak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ii. (1873) 158. — Europ.
Kunthianus, Schult. f. Syst. vii. 1423 = seq.
Kunthii, Campd. Monog. Rum. 66, 97 = longifolius.
lacerus, Balb. in Mém. Acad. Turin (1802), 335 = pictus.
lacerus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 485 = bucephalophorus.
lachanus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 209 (sp. dub.). — Anatol.
laevigatus, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 159 = obtusifolius.
lanceolatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 67. — Afr. austr.
lanuginosus, Campd. Monog. Rum. 150. — Oriens.
Lappula, Meissn. in DC. Prod. xiv. 58. — Hab.?
latifolius, Humb. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 61. — Am. austr.
latifolius, G. F. W. Mey. Chlor. Hannov. 478 = aquaticus.
lativalvis, Meissn. in Linnaea, xiv. (1848) 497. — Afr. austr.
lentatus, Gouan, Herb. Monsp. 268 (Quid?). — Hab.?
leucocephalus, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1473 = bucephalophorus.
limoniastrium, Faub. & Spach, Illustr. ii. 6. t. 106. — Arab.
limosus, Thuill. Fl. Par. ed. II. 182 = palustris.
linearis, Campd. Monog. Rum. 90. — Afr. austr.
lingulatus ×, Jungner, in Bot. Notiser (1885), 155. — Europ.
lingulatus, Schur, Enum. Pl. Transs. 580 = crispus.
litoralis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 181. — Peruv.
longifolius, Auct. ex S. Wats. in Bot. Calif. ii. 8 = occidentalis.
longifolius, DC. Fl. Fr. Suppl. 368 = R. Hydrolapathum.
longifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 180. — Am. austr.

RUMEX:—

- longifolius*, Krock, Fl. Siles. Suppl. ii. 40 (Quid?). — Europ.
Loureiianus, Schult. f. Syst. vii. 1474 = seq.
Loureiirii, Camp. Monog. Rum. 142 = maritimus.
lucidus, Campd. l. c. 150 = pictus.
Ludovicianus, Rafin. Fl. Ludov. 30 (Quid?). — Am. bor.
Luederi, Muent. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 188 = crispus.
Lunaria, Linn. Sp. Pl. 336. — Ins. Canar.
luxurians, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 70 = scutatus.
luxurians, Linn. Mant. i. 64. — Afr. austr.
luxurians, Pourr. ex Nym. Consp. 635 = montanus.
macranthus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 80 = angustifolius.
macrophyllus, Campd. Monog. Rum. 67 = arifolius.
macrophyllus, Wallr. ex Hayne, Arn. Gew. xiii. sub t. 5 = orientalis.
macropterus, G. Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 53 = obtusifolius.
maderensis, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) rcimp. 12. — Ins. Canar. et Mader.
magellanicus, Campd. Monog. Rum. 144 (sp. dub.). — Reg. Magellan.
magellanicus, Griseb. in Goett. Abh. vi. (1854) 118. — Reg. Magellan.
maricola, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 281. — Chili.
maritimus, Linn. Sp. Pl. 335. — Reg. temp. et sub trop.
maritimus, E. Mey. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 491 = garipensis.
maritimus, With. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 356 = palustris.
Marschallianus, Reichb. Ic. Pl. Crit. iv. 58; vi. 13. — Sibir.; Taur.
maximus, Campd. Monog. Rum. 149 = alpinus?
maximus, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 99 = R. Hydrolapathum.
maximus, Schreb. in Schweigg. & Korte, Fl. Erlang. i. 152. — Europ.
membranosus, Poir. Voy. Barb. ii. 155 = bucephalophorus.
menzalensis, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1013 = dentatus.
mexicanus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 45. — Mexic.
Meyeri, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 494. — Afr. austr.
Meyerianus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 50 = praec.
micranthus, Campd. ex Meissn. l. c. 65 = R. Acetosa.
microcarpus, Campd. Monog. Rum. 143. — China.
montanus, Campd. l. c. 149 = monticola.
montanus, Desf. Tabl. ed. II. 48. — Europ.
montevideensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 144 = cuneifolius.
monticola, Schult. f. Syst. vii. 1476. — Italia.
Muelleri, Meissn. in DC. Prod. xiv. 61 = pulcher?
multifidus, All. Fl. Pedem. ii. 205 = intermedius.
multifidus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 482 = R. Acetosella, acetoselloides.
multiflorus, Pers. Syn. i. 395 = dentatus.
muricatus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 195 = maritimus.
muricatus, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iv. (1865) 340. — Europ.
mutabilis, Campd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 65 = R. Acetosa.
nepalensis, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 64 = nepalensis.
nebroides, Campd. Monog. Rum. 72, 150 = intermedius.
neglectus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 493. — N. Zel.
Nemolapathum, Ehrh. Beitr. i. 181 = conglomeratus.
Nemolapathum, Wallr. Sched. Crit. 158 = nemorosus.
nemorosus, Schrad. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 397. — Europ.; Oriens; Am. bor. et austr.
nemorosus, Stev. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 52 = conspersus.
nepalensis, Spreng. Syst. ii. 159. — As. occ.; Ind. or.; Malaya; Afr. austr.
nervosus, Vahl, Symb. Bot. i. 27. — Arab.
nipponicus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 471 = pulcher.
nivalis, Hegetschw. Fl. Schw. 345. — Europ. austr.
oblongus, Campd. Monog. Rum. 115 = R. Acetosa.
obtusifolius, Auct. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 54 = acutus.
obtusifolius, Fries, ex Meissn. l. c. 50 = sylvestris.
obtusifolius, Herb. Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6289 = dentatus.

RUMEX:—

obtusifolius, Linn. *Sp. Pl.* 335.—Europ.; As. et Am. bor.
occidentalis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 253.—Am. bor. occ.
ochotensis, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1476, nomen (Quid?).—Sibir.?
olitoria, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 53 = R. Acetosa.
olympicus, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 45 = R. Patientia.
oravicensis, Wierzb. ex Nym. *Consp.* 634 = sanguineus.
orbiculatus, A. Gray, *Man. Bot. N. U. St.* ed. V. 420.—Am. bor.
orientalis, Bernh. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1433.—Graec.; As. Min.; Syria.
Oxylapathum, Gueldest. ex Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 503 = obtusifolius.
Oxylapathum, Wallr. ex Fries, *Nov. Fl. Suec.* ed. II. 101 = acutus.
oxyotus, Campd. *Monog. Rum.* 114 = R. Acetosa.
oxysepalus, Meissn. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 625 = pulcher.
pallidus, Bigel. *Fl. Bost.* ed. III. 153 = salicifolius.
paludosus, Huds. *Fl. Angl.* ed. II. i. 154 = aquaticus.
paludosus, With. *Bot. Arr. Brit. Pl.* ed. III. ii. 354 = conglomeratus.
paluster, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 353 = seq.
palustris, Sm. *Fl. Brit.* i. 394.—Europ.; As. bor.
palustroides x, Simk. in *Termész. Füzetek*, i. (1877) 237.—Hungar.
Papilio, Coss. & Bal. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 260.—Marocc.
papillaris, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl.* Nov. 107 = R. Acetosa.
paraguayensis, Parodi, in *Anal. Soc. Cient. Argent.* v. (1878) 160; *Contrib.* 52.—Paraguay.
parvifolius, Willd. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1417 = litoralis.
patens, Ind. Sem. Hort. Berol. (1851); ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 54 = obtusifolius.
Patientia, Gaud. ex Meissn. l. c. 46 = magellanicus.
Patientia, Linn. *Sp. Pl.* 333.—Europ. austr.; Oriens.
Patientia, Pall. ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 291 = alpinus.
pauciflorus, Campd. *Monog. Rum.* 104 = alpinus.
paucifolius, Nutt. ex S. Wats. in *Bot. King's Exped.* 314.—Am. bor. occ.
pectinatus, Ehrenb. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 56 = dentatus.
peregrinus, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 46 = nepalensis.
peregrinus, Schult. f. *Syst.* vii. 1437.—Hab.?
persicarioides, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 76 = nervosus.
persicarioides, Hort. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 59 = ucranicus.
persicarioides, Linn. *Sp. Pl.* 335 = maritimus.
peruanus, Meyen, ex Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 52 = cuneifolius.
pictus, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 76.—Syria; Aegypt.
platyphyllus, Aresch. in *Ofvers. Vet. Akad. Stockh.* xix. (1862) 73 = aquaticus.
polygamus, Cav. *l. c.* i. 14 = R. Lunaria.
polygonifolius, Hort. *Vindob.* ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 47 = R. Britannica.
pratensis, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 165 = R. Acetosa.
pratensis, Mert. & Koch, *Deutschl. Fl.* ii. 609 = acutus.
propinquus x, Aresch. in *Bot. Notiser* (1840), 22.—Europ.
Pseudo-acetosa, Bertol. *Fl. Ital.* iv. 252 = R. Acetosa.
Pseudo-alpinus, Hoefft, *Cat. Pl. Kursko*, 26 = alpinus.
pubescens, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 211 = scutatus.
pulcher, Ehrenb. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 55 = brevipes.
pulcher, Linn. *Sp. Pl.* 336.—Europ.; Oriens.
pulcherrimus, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1394 = ucranicus.
purpureus, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 350.—Hab.?
purpureus, Poir. *Encyc.* v. 63 = obtusifolius.
pusillus, Delarb. *Fl. Auv.* ed. II. 523 = conglomeratus.
pyncocarpus, Wallr. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 486 = conglomeratus.
pyrenaicus, Pourr. ex Lapeyr. *Suppl. Hist. Pl. Pyr.* 49 = R. Acetosella.
quadridentatus, Ehrenb. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 1013 = dentatus.
ramulosus, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 55 = nepalensis.
Raulini, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xii. 100.—Ins. Creta.
Regeli, F. Schmidt, *Reisen Amurl.* 167 = crispus.

RUMEX:—

reniformis, Radde, *Reise in Sued-Ost Sibir.* 131 = Oxysia digyna.
repandus, Bosc, ex Pers. *Syn.* i. 395 = fimbriatus.
reticulatus, Bess. *Ind. Sem. Hort. Cremen.* (1820); et ex Spreng. *Neue Entdeck.* iii. 18 (excl. syn.) = pulcher.
retroflexus, Lag. *Elench. Pl.* 13; ex Schult. f. *Syst.* vii. 1449 = alpinus.
rheifolius, Hort. ex Schult. f. l. c. 1436 = cordifolius.
Romassa, Remy, in *C. Gay, Fl. Chil.* v. 280.—Chili.
roseus, Aucher, ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 71 = vesicarius.
roseus, Linn. *Sp. Pl.* 337.—Reg. Mediterr.; Oriens.
roseus, Poir. *Encyc.* v. 65 = pictus.
Roxburghianus, Schult. f. *Syst.* vii. 1402 = nepalensis.
Roxburghianus, Wall. *Cat. n.* 1731 = maritimus, dentatus.
rubellus, Steud. *Nom. ed. I.* 710; *ed. II.* ii. 486 = ucranicus.
Rugelii, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 54 = obtusifolius.
rugosus, Campd. *Monog. Rum.* 113 = R. Acetosa.
rupestris, Le Gall, in *Congr. Sc. Fr.* xvi. i. (1850) 143; *Fl. Morb.* 501.—Europ.
sagittatus, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 67 = luxurians.
sagittifolius, Campd. *Monog. Rum.* 150 = R. Acetosa.
sagittifolius, Plenk, ex Campd. l. c. 108 = abyssinicus.
salicifolius, Weinm. in *Flora*, iv. (1821) 28.—Am. bor.
sanguineus, Linn. *Sp. Pl.* 334.—Europ.
sanguineus, Poir. *Encyc.* v. 59 = obtusifolius.
sarcorrhizus, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 351 = cordatus.
Saxe, Kellogg, in *Pacif. Rural Press* (June 1879); ex Curran, in *Bull. Calif. Acad.* i. n. III. (1885) 146 = hymenosepalus.
scandens, Burch. *Trav.* ii. 146 = luxurians.
Schimper, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 67.—Abyss.
Schultzii, Meissn. l. c. 74 = Shultzii.
scutatus, Herb. Banks, ex Campd. *Monog. Rum.* 136 = cordatus.
scutatus, Linn. *Sp. Pl.* 337.—Europ.; Oriens.
septum, Bieb. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1728 = obtusifolius.
setaceus, Buch.-Ham. ex Meissn. in *Wall. Pl. As. Rar.* iii. 64 = maritimus.
Shultzii, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 353, nomen.—Am. bor.
silvester, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 353 = sylvestris.
sinuatus, Nathort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 486 = tingitanus.
songaricus, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. 85.—Sibir. altaic.
spatulatus, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 67.—Afr. austr.
spinous, Linn. *Sp. Pl.* 337 = Emex spinosa.
spinous, Thomas, ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 58 = pulcher.
spinous, Thunb. *Prod. Pl. Cat.* 67 = Emex australis.
spurius, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 353, nomen.—Am. bor.
Steini, Becker, *Fl. Frankf.* i. 165 = palustris.
stenophyllus x, Simk. in *Termész. Füzetek*, i. (1877) 233.—Europ.
stenophyllus, Ledeb. *Fl. Alt.* ii. 58.—Reg. Cauc.; As. bor.
stenophyllus, Timb. & Jeanb. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) p. lxxii = R. Acetosa.
Steudelianus, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 56 = obtusifolius.
Steudelii, Hochst. ex A. Br. in *Flora*, xxiv. (1841) 278 = obtusifolius.
strepens, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1424 = longifolius.
strictus, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 350 = dentatus.
strictus, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 57 = cassius.
subrotundus, Campd. *Monog. Rum.* 151.—Oriens.
subtrilobus, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 46.—Lydia.
suffocatus, Moris, ex Bertol. *Fl. Ital.* iv. 242 = pulcher.
suffruticosus, J. Gay, ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 72.—Hispan.
supinus, Campd. *Monog. Rum.* 147 = R. Acetosella.
sylvaticus, Herb. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 486 = nemorosus.
sylvaticus, Rafin. *Ann. Nat.* (1820) 12.—Am. bor.
sylvaticus, Schrad. ex Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 350 = acutus.
sylvestris, Campd. *Monog. Rum.* 146 = obtusifolius.
sylvestris, Wallr. *Sched. Crit.* 161.—Europ.
syriacus, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 53 = obtusifolius.
tauricus, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1411 = conglomeratus.

RUMEX:—

thyrsiflorus, Fingerh. in *Linnaea*, iv. (1829) 380 = R. Acetosa.
thyrsoides, Desf. *Fl. Atlant.* i. 321.—Reg. Mediterr.
thyrsoides, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* iii. 44 = intermedius.
tingitanus, Linn. *Syst.* ed. X. 991.—Reg. Mediterr.
tingitanus, Webb & Bourg. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 67 = maderensis.
tmoleus, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xii. 101.—As. Min.
tolimensis, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xiii. (1849) 262.—N. Granat.
Tournefortii, Campd. *Monog. Rum.* 149 = intermedius.
triangularis, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 368, in obs. = R. Acetosa.
triangularis, Guss. *Fl. Sic. Syn.* i. 434 = intermedius.
trifidus, Campd. *Monog. Rum.* 129.—Hab.?
tuberculatus, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 268 = pulcher.
tuberosus, Eckl. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 486 = luxurians.
tuberosus, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 481.—Graec.; Afr. bor.; Oriens.
tuberosus, Poir. *Encyc.* v. 67 = R. Acetosa.
tuberosus, Roxb. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 486 = nepalensis.
tuberosus, Sieber, ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 67 = lativalvis.
tuberosus, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 67 = cordatus.
turdicus, Boiss. *Diagn. Ser. II.* iv. 79 = crispus.
ucranicus, Fisch. *Cat. Hort. Gorenk.* (1812) 16; et Bess. ex Spreng. *Nov. Prov.* 36.—Rossia.
uliginosus, Guss. *Pl. Rar. Neap.* (1826) 151. t. 29 = palustris.
umbellatus, Houtt. *Handleid.* viii. 414 = Polygonum chinense.
uncatus, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1401 = nepalensis.
uncinatus, Ehrenb. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 58 = pulcher.
uncinatus, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1401 = nepalensis.
uncinulatus, Schrad. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1823) 5 = nepalensis.
undulatus, Bess. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 43 = aquaticus.
undulatus, Desf. *Cat. Hort. Par.* ed. III. 389 = cristatus, alpinus.
undulatus, Schrank, *Baier. Fl.* i. 625 = conglomeratus.
undulatus, Willd. ex Spreng. *Syst.* ii. 160 = dentatus.
venosus, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 733.—Am. bor.
verticillatus, Linn. *Sp. Pl.* 334.—Am. bor.
verticillatus, Richards. in *Frankl. 1st Journ. App.* ed. II. II = salicifolius.
verticillatus, Ucria, Hort. *Reg. Panorm.* 164 = sanguineus.
vesicarius, Linn. *Sp. Pl.* 336.—Graecia; Afr. bor.; Oriens.
vinealis, Timb. & Jeanb. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) p. lxxii = R. Acetosa.
virgatus, Haeuke, in *Jirasek, Beob. Riesengeb.* (1791) 39 = conglomeratus.
viridis, Steud. *Nom. ed. I.* 710 = sanguineus.
Wallichianus, Meissn. in *Wall. Pl. As. Rar.* iii. 64 = maritimus.
Wallichii, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 48 = praec.
Wallrothii, Nym. *Syll.* 327 = obtusifolius.
Warrenii, Trimen, ex Nym. *Consp.* 635 = Knafii.
Winterlii, Zuccagni, *Syn. Pl. Hort. Florent.* 45 = conglomeratus.
Woodsii, De Not. *Cat. Sem. Roma* (1875), 28; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* viii. (1876) 42.—Italia.
xanthorrhizus, Pers. *Syn.* i. 394 = R. Britannica.

RUMFORDIA, DC. *Prod.* v. 549 (1836). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 359.
floribunda, DC. l. c. 550.—Mexic.

RUMIA, Hoffm. *Gen. Umbell.* ed. II. 171 (1816) = *Trinia*, Hoffm. (Umbell.).
athamantoides, DC. *Prod.* iv. 98 (= *Stenocoelium athamantoides*).—Sibir. altaic.
capensis, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 271 = Capnophyllum africanum.
depressa, Boiss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* i. (1844) 126 = *Trachydium depressum*.
frigida, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* vi. 77.—Graecia.
Guicciardii, Boiss. & Heldr. l. c.—Graecia.
Kotschy, Boiss. l. c. Ser. I. vi. 59 = *Trachydium Kotschy*.

RUMIA:—

leiogona, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 125 = *Trinia Hoffmanni*.
microcampa, Hoffm. Gen. Umbell. ed. II. 175 = *Hippomarathrum crispum*.
multiflora, Ledeb. Fl. Ross. ii. 281. — Rossia.
seseloides, Hoffm. Gen. Umbell. ed. II. 174. — Sibir. altaica.
taurica, Hoffm. l. c. 173 = *Sanicula crithmifolia*.

RUMINIA, Parl. 'Due Nov. Gen. Monocot. 3'; ex ej. Fl. Ital. iii. 84 (1858) = *Leucojum*, Linn. (Amaryll.).
hyemalis, Parl. ll. cc. 4; 85 = *L. hyemale*.
nicaeensis, Jord. & Four. Ic. Fl. Europ. 26. t. 65. f. 108 = *L. hyemale*.

RUMPFIA, Linn. Syst. ed. I (1735) = seq.

RUMPHIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 1193 (1753). *ANA-CARDIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 428.
 TSIENTANI, Adans. Fam. ii. 303 (1763).
amboinensis, Linn. Sp. Pl. 1193. — Ind. or.
tiliaefolia, Poir. Encyc. vi. 352 = *amboinensis*.

RUMPUTRIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 92 (1836) = *Cassytha*, Linn. (Laurin.).
fasciculata, Rafin. l. c. = *C. filiformis*?

RUNCINA, Allem. in Nov. Act. Nat. Cur. iv. (1770) 94 (Quid?).

RUNGIA, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 77 (1832). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1120.
apiculata, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 60. — Ind. or.
Arnottiana, Wight, Ic. t. 1550 = *Wightiana*.
Beddomei, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 549. — Burma.
Brandisii, C. B. Clarke, l. c. — Burma.
chinensis, Benth. Fl. Hongk. 266. — China.
ciliata, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 111. — Am. austr.
crenata, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518. — Ind. or.
diversiformis, Nees, in DC. Prod. xi. 472. — Ins. Philipp.
elegans, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 196. — Ind. or.
grandis, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 46. — Afr. trop.
himalayensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 548. — Reg. Himal.
interrupta, Nees, in DC. Prod. xi. 732, in syn. = *Dicliptera interrupta*.
khasiana, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518. — Reg. Himal.
laeta, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 546. — Ind. or.
laticor, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 313. — Ind. or.
linifolia, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110. — Ind. or.
longifolia, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 235, partim = *laticor*.
longifolia, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. t. 266 = *parviflora*.
longifolia, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 313. — Zeylan.
Mastersi, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 519. — Assam.
muralis, Royle, ex Nees, in DC. Prod. xi. 470 = *parviflora*.
origanoides, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110 = *parviflora*.
parviflora, Nees, l. c. — Ind. or.; Burma.
pectinata, Nees, in DC. Prod. xi. 470 = *parviflora*.
polygonoides, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110 = *parviflora*.
pubinervia, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 46. — Afr. austr.
punduana, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110 = *Justicia punduana*.
repens, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518, partim = *parviflora*.
repens, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110. — Ind. or.
sisparensis, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518. — Ind. or.
stolonifera, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 547. — Reg. Himal.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 567. — Sumatra.
Wightiana, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110. — Ind. or.

RUPALA, Vahl, Symb. Bot. iii. 20 (1794) = *Roupala*, Aubl. (Proteac.).

RUPALLEYA, Morière, in Bull. Soc. Linn. Normand. viii. (1864) 317. t. 15 = *Stropholirion*, Torr. (Liliac.).
volubilis, Morière, l. c. = *S. californicum*.

RUPICAPNOS, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 (1860) = *Fumaria*, Tourn. (Papav.).
africana, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 240 = *F. africana*.
Caput-plataleae, Pomel, l. c. 244 = *F. numidica*.
cerefolia, Pomel, l. c. 242 = *F. africana*.
corymbosa, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. africana*.
delicatala, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 246 = *F. numidica*.
erosa, Pomel, l. c. 243 = *F. numidica*.
graciliflora, Pomel, l. c. 241 = *F. africana*.
longipes, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. numidica*.
muricaria, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 245 = *F. numidica*.
numidica, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. numidica*.
ochracea, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 242 = *F. africana*.
platycentra, Pomel, l. c. 242 = *F. africana*.
Reboudiana, Pomel, l. c. 379 = *F. numidica*.
sarcocapnoides, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. numidica*.
speciosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 241 = *F. africana*.
tenuifolia, Pomel, l. c. 244 = *F. numidica*.

RUPIFRAGA, 'Linn.' ex Rafin. Fl. Tellur. ii. 67 (1836) = *Saxifraga*, Linn.
cuscutiformis, Rafin. l. c. iv. 121 = *S. sarmentosa*.
sarmentosa, 'Linn.' ex Rafin. l. c. ii. 68 = *S. sarmentosa*.

RUPPELIA, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 149 (1871) = *RUEPELIA*, A. Rich. = *Aeschynomene*, Linn. (Legumin.).

RUPPIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *NAIADACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1014.
BUCCAFERREA, Mich. ex Petagna, Inst. Bot. v. 1826 (1787).
antarctica, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 116 = *Cymodocea antarctica*.
aragonensis, Losc. Pard. Ser. Inconf. Pl. Arag. 105 = *rostellata*?
brachypus, J. Gay, in Coss. Notes Crit. 10 = *maritima*.
brevipes, Bertol. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 507 = *maritima*.
didyma, Sw. ex Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1825) 427 = *maritima*.
drepanensis, Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 878 = *maritima*.
marina, Fries, Summa Veg. Scand. 68 (err. typ. 69) = *maritima*.
maritima, Griff. Notul. iii. 196 = *rostellata*.
maritima, Linn. Sp. Pl. 127. — Reg. temp. et trop.
obliqua, Schur, ex Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv. xviii. (1852) i. 355 = *rostellata*.
rostellata, Koch, ex Reichb. Ic. Pl. Crit. ii. 66. — Europ.; As. trop.
salina, Schur, Enum. Pl. Transs. 634 = *rostellata*.
spiralis, Dum. Fl. Belg. 164 = *maritima*.
subsessilis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 333 = *Potamogeton pectinatus*.
transsilvanica, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 356 = *rostellata*.
trichodes, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1846-47) 426 = *maritima*.

RUPRECHTIA, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1840) 148. t. 4. *POLYGONACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 104.
MAGONTA, Vell. Fl. Flum. 165 (1825); iv. t. 60 (1827).
amentacea, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 56. — Bras.
apetala, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 268. — Bolivia.
brachysepala, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 58. — Bras.
brachystachya, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 630. — Guian.
carpinoides, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 58. — Bras.
corylifolia, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 113. — Reg. Argent.

RUPRECHTIA:—

costata, Meissn. in DC. Prod. xiv. 180 = *Cumingii*.
Cruegerii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 710 = *fagifolia*.
Cumingii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 179. — Panama.
excelsa, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 113. — Reg. Argent.
fagifolia, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 58. — Bras.
glaucia, Meissn. l. c. 59. — Bras.
Jamesonii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 179. — Peruv.
laurifolia, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1840) 150. — Bras.
laxiflora, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 56. — Bras.
Lundii, Meissn. l. c. 54. — Bras.
Martii, Meissn. l. c. 58. — Bras.
mollis, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 268. — Bolivia.
polystachya, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 89. — Reg. Argent.
ramiflora, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1840) 150. — N. Granat.
salicifolia, C. A. Mey. l. c. — Bras.
tenuiflora, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 629. — Bras.
triflora, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 89. — Reg. Argent.
Viraru, Griseb. l. c. 90. — Reg. Argent.

RUPRECHTIA, Opiz, Seznam, 86 (1852) = *Tha-hietrum*, Tourn. (Ranunc.).
aquilegifolia, Opiz, l. c. = *T. aquilegifolium*.

RUSCUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *LILIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 764.
aculeatus, Linn. Sp. Pl. 1041. — Europ.; Oriens.
androgynus, Linn. l. c. = *Semele androgyna*.
anthopus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 = *Semele androgyna*.
dumosus, Clarke, Trav. i. ed. II. Add. p. xxii. — Rumelia.
flexuosus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *aculeatus*.
frutescens, Mill. l. c. n. 8. — Mexic.
humilis, Salisb. Prod. 255 = *R. Hypoglossum*.
Hypoglossum, Linn. Sp. Pl. 1041. — Europ. austr.
Hypophyllum, Linn. l. c. — Reg. Mediterr. et Caucas.
latifolius, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 = *Semele androgyna*.
laurifolius, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 487 = *Danaë Laurus*.
laxus, Sm. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 334 = *aculeatus*.
lugubris, Salisb. Pord. 255 = *R. Hypophyllum*.
microglossus, Bertol. Fl. Ital. x. 401 = *R. Hypoglossum*.
parasiticus, Gueldenst. Reisen, i. 426 = *aculeatus*?
procerus, Salisb. Prod. 255 = *Semele androgyna*.
racemosus, Linn. Sp. Pl. 1041 = *Danaë Laurus*.
racemus, Crantz, Inst. i. 200, sphalm. = *præc.*
reticulatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 13 = *Behnia reticulata*.
terminalis, Salisb. Prod. 255 = *Danaë Laurus*.
trifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5. — Ins. Graecia.
troadensis, Clarke, Trav. ii. 146. — Graecia.
volubilis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 13 = *Asparagus medeoloides*.

RUSSEA, J. F. Gmel. Syst. 237 (1791) = *Rousseia*, Sm. (Saxifrag.).

RUSSEGERA, Endl. Nov. Stirp. Dec. 38 (1839) = *Lepidagathis*, Willd. (Acanth.).
collina, Endl. l. c. = *L. radicalis*.

RUSSELIA, Jacq. Enum. Pl. Carib. 6 (1760). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 940.
alata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 3. — Bras.
alternifolia, Pers. Syn. ii. 164. — Peruv.
americana, Raeusch. Nom. ed. III. 180 = *sarmentosa*.
depressa, Walp. Rep. iii. 234 = *Aptosimum depressum*.
ephedroides, Benth. Pl. Hartw. 69 = *verticillata*.
equisetiformis, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 377. — Mexic.
flammea, Rafin. New Fl. Am. ii. 71 = *sarmentosa*.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 359 = *rotundifolia*.

RUSSELIA :—

juncea, Zucc. in *Flora*, xv. (1832) II. Beibl. 99.—Mexic.
multiflora, Sims, Bot. Mag. t. 1528 = *sarmentosa*.
paniculata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 19 = *sarmentosa*.
polyedra, Zucc. in Abh. Akad. Muench. ii. (1831-36) 328 = *sarmentosa*.
rotundifolia, Cav. Ic. v. 9. t. 415.—Mexic.
sarmentosa, Jacq. Enum. Pl. Carib. 25; *Select. Am.* 178.—Am. trop.
syringaeifolia, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 376 = *sarmentosa*.
ternifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 359 = *sarmentosa*.
verticillata, H. B. & K. l. c. 360.—Mexic.

RUSSELIA, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. iii. 364 (1832) = **Ormocarpum**, Beauv. (Legumin.).

RUSSELIA, Linn. f. Suppl. 24 (1781) = **Vahlia**, Thunb. (Saxifrag.).
capensis, Linn. f. l. c. 175 = *V. capensis*.
oldenlandioides, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 449 = *V. oldenlandioides*.
viscosa, Roxb. l. c. = *V. viscosa*.

RUSSELLIA, Buek, Index ad DC. Prod. iii. 389 (1858), sphalm. = **Bursera**, Jacq.

RUSTIA, Klotzsch, in Hayne, Arzn. Gew. xiv. sub t. 14; et sub t. 15 (1846). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 45.

HENLEA, Karst. Fl. Columb. 38 in textu (1858); 157. t. 78 (1861).

TRESANTHERA, Karst. l. c. 37. t. 19 (1858).

formosa, Klotzsch, in Hayne, Arzn. Gew. xiv. sub t. 15.—Bras.

occidentalis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 14.—Mexic.

Pohlana, Klotzsch, in Hayne, Arzn. Gew. xiv. sub t. 15 = *formosa*.

Sellowiana, Klotzsch, l. c. = *formosa*.

RUTA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). **RUTACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 286.

APLOPHYLLUM, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 464.

DESMOPHYLLUM, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 14 (1836-50).

HAPLOPHYLLUM, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 766 (1832).

RUTARIA, Webb, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 287 (1862).

acutifolia, DC. Prod. i. 711.—Persia.

albiflora, Hook. Exot. Fl. t. 79 = Boenninghausenia albiflora.

altera, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *graveolens*.

angustifolia, Pers. Syn. i. 464 = *chalepensis*.

Besseri, Nym. Syll. 219.—Rossia.

Biebersteinii, Neir. Nachtr. 280 = *suaveolens*.

bracteosa, DC. Prod. i. 710 = *chalepensis*.

Buxbaumii, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 129 = *patavina*.

Buxbaumii, Poir. Encyc. vi. 336.—Oriens.

chalepensis, Linn. Mant. i. 69.—Reg. Mediterr.

chalepensis, Wall. Cat. n. 7113 = *graveolens*.

ciliata, Savi, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 487 = *glabra*.

ciliata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *graveolens*.

communis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 (Quid?).—Java.

cordata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 206.—Nepal.

coronata, Nym. Syll. 219.—Europ.

corsica, DC. Prod. i. 710.—Ins. Corsic.

crithmifolia, Moric. ex DC. l. c. = *graveolens*.

dahurica, DC. Prod. i. 712.—Dahuria.

Dampatis, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 207 = Boenninghausenia albiflora.

dichotoma, DC. Prod. i. 711.—Persia.

divaricata, Salzm. in Flora, iv. (1821) 109 = *corsica*.

divaricata, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxiv = *graveolens*.

diversifolia, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 487, nomen (Quid?).—Hab.?

fernandezia, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 52.—Ins. J. Fernand.

frutescens, Siev. ex Fisch. Enum. Pl. Schrenk. i. 90 = *acutifolia*.

RUTA :—

fruticulosa, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. i. 13.—Syria.

fumariaefolia, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 125 = *chalepensis*.

glabra, DC. Prod. i. 711.—Assyria.

graveolens, Linn. Sp. Pl. 383.—Europ. austr.

holopetala, Kitt. Taschenb. ed. II. 794 = *graveolens*.

hortensis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *graveolens*.

intermedia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 488 = *graveolens*.

japonica, Siebold, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 486 = Boenninghausenia albiflora.

latifolia, Salisb. Prod. 320 = *chalepensis*.

legitima, All. Fl. Pedem. i. 280 = *montana*.

linearis, DC. Prod. i. 712.—Sibir.

linifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 309 = *suaveolens*?

linifolia, Linn. Sp. Pl. 384.—Hispan.; Afr. bor.

linifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 273 = Buxbaumii.

macrophylla, Moris, Stirp. Sard. Elench. 11 = *chalepensis*.

macrophylla, Soland. in Bot. Mag. t. 2018.—Afr. bor. montana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Reg. Mediterr. et Caucas.

Montbretii, Viv. Pl. Aegypt. Dec. iv. 13 = *tuberculata*.

obtusifolia, Ledeb. ex Eichw. Pl. Casp. Cauc. 37.—Reg. Casp.

officinalis, Pall. Reise Suedl. Statth. ii. 80 = *graveolens*. Oreojasme, Webb & Berth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. (1840) 130.—Ins. Canar.

parviflora, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 440 = *villosa*.

patavina, Linn. Sp. Pl. 384.—Europ. austr.

patavina, Poir. Encyc. vi. 335 = *pubescens*.

patavina, Portenschl. Enum. t. 7, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 766 = *linifolia*.

perforata, Bieb. Besch. Casp. 172.—Sibir. baical.

pinnata, Linn. f. Suppl. 232.—Ins. Canar.

pubescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 446.—Hispan. punctata, Presl, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 88 = *chalepensis*.

rosmarinifolia, Pers. Syn. i. 465.—Hispan.

spatulata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 63. t. 370 = Buxbaumii.

suaveolens, Bess. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 179 = Besseri.

suaveolens, DC. Prod. i. 711.—Rossia; Thracia. subtripinnata, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 21.—Japan.

sylvestris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *montana*. taurica, Nym. Syll. 220.—Taur.

tenuifolia, Vill. Prosp. 47; Gouan, Herbor. 26; Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 326 = *montana*.

thesioides, Fisch. ex DC. Prod. i. 712.—Reg. Casp. tuberculata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 86.—Aegypt.; Arab.; Persia.

tuberculata, Viv. Pl. Aegypt. Dec. iv. 13 = *glabra*. villosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 310.—Reg. Caucas.

villosa, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 272 = *fruticulosa*, Buxbaumii.

RUTAEA, M. Roem. Syn. Hesper. 93 (1846) = **Turraea**, Linn. (Meliac.).

floribunda, M. Roem. l. c. = *T. floribunda*.

heterophylla, M. Roem. l. c. 94 = *T. heterophylla*.

lobata, M. Roem. l. c. = *T. heterophylla*.

maculata, M. Roem. l. c. = *T. maculata*.

obtusifolia, M. Roem. l. c. 93 = *T. obtusifolia*.

quercifolia, M. Roem. l. c. 94 = *T. heterophylla*.

rigida, M. Roem. l. c. = *Quivisia chilisantha*.

sericea, M. Roem. l. c. 93 = *T. sericea*.

RUTARIA, Webb, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 287 (1862) = **Ruta**, Tourn.

RUTERIA, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 380 = **Psoralea**, Linn. (Legumin.).

africana, Medic. l. c. = *P. pinnata*.

decidua, Moench, Meth. Suppl. 38 = *P. aphylla*.

pinnata, Medic. Phil. Bot. ii. 41 = *P. pinnata*.

tenuifolia, Moench, Meth. Suppl. 38 = *P. tenuifolia*.

RUTHEA, Bolle, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. iii-iv. (1861-62) 174 = **Lichtensteinia**, Cham. & Schlecht. (Umbell.).

herbanica, Bolle, l. c.—Ins. Canar.

RUTICA, Neck. Elem. ii. 202 (1790), sphalm. = **Urtica**, Tourn.

RUTIDEA, DC. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 219. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 116.

RYTIDEA, Spreng. Syst. i. 515 (1825).

coriacea, Baker, Fl. Maurit. 149.—Ins. Mascar. decorticata, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 190.—Afr. trop.

ferruginea, Hiern, l. c. 189.—Afr. trop.

fuscescens, Hiern, l. c. 191.—Afr. trop.

glabra, Hiern, l. c. 190.—Afr. trop.

hispida, Hiern, l. c. 189.—Afr. trop.

membranacea, Hiern, l. c. 190.—Afr. trop.

mollis, Blume, ex DC. Prod. iv. 495.—Ins. Pinang. olenotricha, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 189.—Afr. trop.

parviflora, Benth. in Hook. Niger Fl. 416, partim = olenotricha.

parviflora, DC. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 219.—Afr. trop.

rufipilis, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 188.—Afr. trop.

Smithii, Hiern, l. c. 189.—Afr. trop.

RUTIDOCHLAMYS, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 497 = **Podolepis**, Labill. (Compos.).

Mitchellii, Sond. l. c. = *P. Rhytidochlamys*.

RUTIDOSIS, DC. Prod. vi. 158 (1837). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 316.

ACTINOPAPUS, Hook. f. ex A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 226.

PUMILO, Schlecht. in Linnaea, xxi. (1848) 448.

acoma, F. Muell. Fragm. ii. 89 = *Acomis rutidosea*. arachnoidea, Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 341 = *Podolepis Rhytidochlamys*.

auricoma, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 408 = *helichrysoides*.

Brownii, Benth. Fl. Austral. iii. 594.—Austral. helichrysoides, DC. Prod. vi. 159 (helichrysoides).—Austral.

leiolepis, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 131.—Austral.

leptorrhachoides, F. Muell. Fragm. v. 148.—Austral. leucantha, F. Muell. l. c. i. 35.—Austral.

macra, F. Muell. l. c. iv. 145 = *Acomis macra*.

Murchisonii, F. Muell. l. c. i. 34.—Austral.

Pumilo, Benth. Fl. Austral. iii. 595.—Austral.

RUTILIA, Vell. Fl. Flum. 156 (1825); iv. t. 19 (1827) (Quid?).

ternata, Vell. ll. cc. 19.—Bras.

RUTOSMA, A. Gray, Gen. Illustr. ii. 143. t. 155 (1849) = **Thamnosma**, Torr. & Frém. (Rutac.).

texanum, A. Gray, l. c. 144. t. 155 = *T. texanum*.

RUTTYA, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 27. **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1105.

HABLANATHERA, Hochst. in Bot. Zeit. ii. (1844) 853 (sphalm.).

HABLANATHERA, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 71. ovata, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 27.—Afr. austr.

RUYSCHIA, Jacq. Enum. Pl. Carib. 2 (1760). **TERNSTROEMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 181.

LOGHANIA, Scop. Introd. 236 (1777).

SOUROUBEA, Aubl. Pl. Gui. 244. t. 97 (1775).

amazonica, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 176. t. 292.—Bras.

bahiensis, Mart. l. c. 178.—Bras.

bicolor, Benth. Bot. Voy. Sulph. 73. t. 29.—Panama. clusiaefolia, Jacq. Enum. Pl. Carib. 17; *Select. Am.* 75.—Am. trop.

corallina, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 177. t. 294.—Bras. crassipes, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 378.—N. Granat.

cymbadenia, Delp. in Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, xii. (1869) 196 = *clusiaefolia*.

fragrans, Mor. ex Wittm. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 248 = *clusiaefolia*.

guianensis, Vitm. Summa Pl. ii. 250 = *R. Souroubea*. laurifolia, Presl, Bot. Bemerk. 24 = *clusiaefolia*.

lepidota, Mig. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 83.—Guian.

mexicana, Baill. Adansonia, x. (1872) 241.—Mexic.

RUYSCHIA:—

- Pavonii, *G. Don, Gen. Syst.* i. 625.—Peruv.
pilophora, *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér.*
IV. xvii. (1862) 379.—N. Granat.
Souroubea, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 50.—Guian.
sphaeradenia, *Delp. in Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano,*
xii. (1869) 180.—Peruv.
Spixiana, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 177. t. 293.—
Bras.
subsessilis, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 73. t. 29.—
Panama.
Surubea, *J. F. Gmel. Syst.* 407 = *R. Souroubea*.

RUYSCHIA, *Linn. Syst. ed. I* (1735) = **Dracocephalum**, *Tourn. (Labiata).*

RUYSCHIANA, *Boerh. ex Mill. Gard. Dict. ed. VII.*
(1759) = **Dracocephalum**, *Tourn. (Labiata).*
fasciculata, [Clairv.] *Man. Herb.* 190 = *D. Ruyschiana*.
laciniata, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2* = *D. austriacum*.
spicata, *Mill. l. c. n. 1* = *D. Ruyschiana*.
verticillata, *Mill. l. c. n. 3* = *D. peregrinum*.

RYANAEA, *DC. Prod. i.* 255 (1824) = seq.

- RYANIA**, *Vahl, Eclog. Am. i.* 51. t. 9 (1796). *BIXI-*
NEAE, *Benth. & Hook. f. i.* 126.
PATRISIA, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792)
110.
TETRACOCYNE, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*
(1863) 1. 555.
acuminata, *Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii.
1. 492.—Bras.
Candollei, *Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I.*
xi. (1843) 16.—Guian.
canescens, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1. 490.—
Bras.
chocoensis, *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.*
xvii. (1862) 117.—N. Granat.
dentata, *Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I.* xi.
(1843) 16; *et Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1. 493.
—Venezuel.
Kunthii, *Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I.* xi.
(1843) 16 = *dentata*.
Mansoana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1. 490.—
Bras.
parviflora, *Eichl. l. c.* 493 = *Patrisii*.
Patrisii, *Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I.* xi.
(1843) 16.—Bras.; Guian.
Reideliana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1. 491.—
Bras.
Sagotiana, *Eichl. l. c.*—Bras.; Guian.
speciosa, *Vahl, Eclog. Am. i.* 51. t. 9.—Am. trop.
tomentosa, *Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I.* xi.
(1843) 15 = *speciosa*?

RYCKIA, *Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii.* (1878) 35, 48,
sphalm. = *RYKIA*, *De Vriese* = **Pandanus**, *Rumph.*

RYDITOPHYLLUM, *Walp. Rep. ii.* 721 (1843),
sphalm. = **Rytidophyllum**, *Mart. (Gesner).*

RYDITOSTYLIS, *Walp. Rep. ii.* 204 (1843), sphalm.
= **RYTIDOSTYLIS**, *Hook. & Arn. = Elaterium*,
Linn. (Cucurb.).

RYKIA, *De Vriese, in Verh. Kon. Akad. Wetensch. ii.*
(1854) 203 = **Pandanus**, *Rumph.*
furcata, *De Vriese, l. c.* = *P. furcatus*.

RYMANDRA, *Salisb. in Knight, Prot.* 124 (1809) =
Knightia, *R. Br. (1810) (Proteac.).*
excelsa, *Knight, l. c.* = *K. excelsa*.

RYMIA, *Endl. Gen.* 743 (1839) = **Euclea**, *Murr.*
(Ebenac.).
polyandra, *Endl. Cat. Hort. Acad. Vindob. ii.* (1843)
123 = *E. polyandra*.

RYNCHOSIA, *Macfad. Fl. Jamaic. i.* 275 (1837),
sphalm. = **Rhynchosisia**, *Lour. (Legumin.).*

RYNCHOSPORA, *Vahl, Enum. ii.* 229 (1806).
CYPERACEAE, *Benth. & Hook. f. iii.* 1058.
ASTEROSCHOENUS, *Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i.*
124 (1842).
CALYPTROLEPIS, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 151 (1855).
CALYPTROSTYLIS, *Nees, in Linnaea, ix. (1834)* 295.
VOL. II.

RYNCHOSPORA:—

- CEPHALOSCHOENUS**, *Nees, in Linnaea, ix. (1834)*
295.
CERATOSCHOENUS, *Nees, l. c.* 296 (1834).
CHAETOSPORA, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i.* 229
(1815).
DIPLOCHAETE, *Nees, in Linnaea, ix. (1834)* 296.
ECHINOSCHOENUS, *Nees, in Linnaea, ix. (1834)*
297.
EPHIPPIORHYNCHIUM, *Nees, in Mart. Fl. Bras. ii.*
1. 134. t. 12 (1842).
EXPHALOSCHOENUS, *Nees, in Hook. Journ. Bot. ii.*
(1840) 398.
HALOSCHOENUS, *Nees, in Linnaea, ix. (1834)* 296.
HAPLOSTYLIS, *Nees, l. c.* 295 (1834).
HYGROCHARIS, *Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i.* 147, in
nota (1842).
KLEISTOCALYX, *Steud. in Flora, xxxiii. (1850)* 229,
nomen.
LEPTOSCHOENUS, *Nees, in Hook. Journ. Bot. ii.*
(1840) 398.
LONCHOSTYLIS, *Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii.*
(1836) 370.
MICROCHAETA, *Reichb. Nom.* 192 (1841).
MITROSPORA, *Nees, in Linnaea, ix. (1834)* 295.
MORISIA, *Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.*
1834) 265.
NEMOCHLOA, *Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i.* 148.
t. 14, 15 (1842).
PACHYMITRA, *Nees, l. c.* 115 (1842).
PLEUROSTACHYS, *Brongn. in Duperr. Voy. Coq.*
Bot. 172. t. 31 (1829).
PTEROCHEATE, *Arn. ex Boeck. in Linnaea, xxxvii.*
(1871-73) 600.
PTEROTHECA, *Presl, Symb. Bot. i.* 55. t. 35 (1831).
PTILOCHAETA, *Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i.* 147.
t. 8 (1842).
PTILOCLADIUM, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 149 (1855).
RYNCHOSPORA, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 71
(1809).
SPERMODON, *Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp.* 27
(1819).
SPHAEROSCHOENUS, *Hook. & Arn. in Hook. Bot.*
Beech. Voy. 227, in adnot. (1841).
TRICHOCHAETA, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 155 (1855).
TRIODON, *Rich. ex Pers. Syn. i.* 60, in nota (1805).
ZOSTEROSPERMUM, *Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp.*
28 (1819).
adulta, *Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849)* 166 =
polyphylla.
alba, *Vahl, Enum. ii.* 236, partim.—Europ.; Am. bor.
alba, *Vahl, l. c.* partim = *fusca*.
albiceps, *Kunth, Enum. Pl. ii.* 289.—Bras.
albida, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 561.—
Bras.
alpina, *Spreng. Syst. i.* 195 = *Carpha alpina*.
amazonica, *Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. ii.* 292.—Am.
aust.
anomala, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 149 (*Fimbristylidis* sp.).
—Java.
aristata, *Boeck. in Flora, xl. (1857)* 36.—Mexic.
armerioides, *J. & C. Presl, Rel. Haenk. i.* 197. t. 31.
f. 2.—Am. trop.
articulata, *Schult. Mant. ii.* 49 = *aurea*.
arundinacea, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-)*
80) 27.—Bras.
asperula, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 144 = *aurea*.
aurea, *Sieber, ex Schult. Mant. ii.* 43, in obs. =
cyperoides.
aurea, *Vahl, Enum. Pl. ii.* 229.—Reg. trop.
auriculata, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869)*
144 = *albiceps*.
avenacea, *Spreng. Syst. i.* 197 = *Cyathochaeta avenacea*.
bahiensis, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 455 = *pterocarpa*.
Baldwinii, *A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835)*
210. f. 19.—Am. bor.
barbata, *Kunth, Enum. Pl. ii.* 290 = *pterocarpa*.
Berteroana, *Boeck. in Flora, xli. (1858)* 645.—Ins. S.
Doming.
Beyrichii, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 144.—Bras.
biceps, *Torr. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii.*
(1835) 219, in obs. = *cephalantha*, *A. Gray*.
biflora, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871)* 156.
—Bras.
binervis, *Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828)*
269 = *Hypolytrum mauritianum*.
Boivini, *Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874)* 403.—Ins.
Barbon.

RYNCHOSPORA:—

- brachychaeta*, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 180 = *pallida*,
M. A. Curt.
brasiliensis, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-)*
80) 26.—Bras.
brevirostris, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 246.—Cuba.
bromoides, *Kunth, Enum. Pl. ii.* 300 = *comata*.
Brownii, *Roem. & Schult. Syst. ii.* 86 = *glauc.*
brunnea, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 593.—
Peruv.
brunnea, *Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii.* 297 = *glauc.*
bulbocaulis, *Boeck. in Flora, lxii. (1879)* 567
(*Actinoschoeni* sp.).—Afr. trop.
caduca, *Ell. Sketch, i.* 62.—Am. trop.
cajennensis, *Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874)* 404.—
Guian.
canaliculata, *Boeck. in Flora, lxiii. (1880)* 451.—Bras.
candida, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 605.—
Afr. trop.; Am.
capillacea, *Boj. Hort. Maurit.* 386.—Hab.?
capillacea, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 141 = *fusca*.
capillacea, *Torr. Fl. U. St. i.* 55.—Am. bor.
capitata, *Roem. & Schult. Syst. ii.* 88.—Venezuela.
capitellata, *Ell. Sketch, i.* 61 = *glomerata*.
capitellata, *Vahl, Enum. Pl. ii.* 235 = *glauc.*
caracasana, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 607.
—Venezuela.
cariciformis, *Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i.* 145.—
Bras.
castanea, *Nees & Meyen, Reise, ii.* 119; *et ex*
Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = *glauc.*
cephalantha, *A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii.*
(1835) 218. f. 30.—Am. bor.
cephalantha, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii.* 293.—
Cuba.
cephalophora, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 146.—Bras.
Cephalotes, *Vahl, Enum. ii.* 237.—Am. austr.
cephalotoides, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 242 = *comata*.
cernua, *Griseb. l. c.* 248.—Cuba.
ceylonica, *Kunth, Enum. Pl. ii.* 294 = *triflora*.
Chapmanii, *M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II.*
vii. (1849) 409.—Florida.
chinensis, *Nees & Meyen, ex Nees, in Nov. Act. Nat.*
Cur. xix. Suppl. i. (1843) 108 = *glauc.*
ciliata, *Vahl, Enum. ii.* 235.—Am. bor.
ciliatifolia, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 143 = *pterocarpa*.
ciliolata, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 563.—
Bras.
cinnamomea, *Boeck. in Flora, xli. (1858)* 645.—Am.
bor.
clandestina, *Spreng. Syst. i.* 194 = *Cyathochaeta clan-*
destina.
comata, *Link, Hort. Berol. i.* 280.—Am. trop.
compressa, *J. Carey, ex Chapm. Fl. S. U. St.* 525.—
Florida.
conferta, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 615.—
Bras.
conferta, *Chapm. ex M. A. Curt. in Am. Journ. Sc.*
Ser. II. vii. (1849) 409 = *Chapmanii*.
conica, *Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ.* 15 =
R. Cephalotes.
consanguinea, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)*
536.—Bras.
coriifolia, *Boeck. l. c.* xxxviii. (1874) 406.—Bras.
corniculata, *A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii.*
(1835) 205 = *laxa*.
corymbifera, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 619
= *longiflora*.
corymbifera, *Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.*
i. (1843) 107.—Austral.
crassipes, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869)*
146.—Bras.
cubensis, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 246 = *filiformis*.
cubensis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 576 = *tenuis*.
cubensis, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii.* 294.—Cuba.
Curtisii, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 141 = *pallida*, *M. A.*
Curt.
curvula, *Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73)* 596.—
Bras.
curvula, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 574.—Ins. Trinit.
cymosa, *Ell. Sketch, i.* 58 = *fascicularis*, *Vahl*.
cymosa, *Nutt. Gen. Am. i.* 33.—Am. bor.
cyperoides, *Mart. in Denkschr. Akad. Muench. vi.*
1816-17 (1820) 149.—Afr. *et* Am. trop.
decurrens, *Chapm. Fl. S. U. St.* 525 = *patula*.
deflexa, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 243.—Cuba.
deusta, *Spreng. Syst. i.* 195 = *Mesomolena deusta*.
diandra, *Spreng. l. c.* 197 = *Cyathochaeta diandra*.

RYNCHOSPORA :—

- diodon*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 245 in obs.; Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 558 = *lunata*.
discolor, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 148 = *Wightiana*.
disstiflora, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56, nomen; et ex Boeck. l. c. 598.—Peruv.
distans, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *glaucula*.
distans, Ell. Sketch, i. 59 = *Grayii*.
distans, Vahl, Enum. ii. 235.—Am. bor.
distans, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 296 = *glomerata*.
distichophylla, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-80) 26.—Bras.
divergens, Chapm. ex M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 409.—Am. bor.
dodecandra, Baldw. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 207 = *megalocarpa*.
Drummondiana, Boeck. in Flora, xli. (1858) 644 = *gracilentia*.
echinata, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 284, 290 = *Actinoschoenus filiformis*.
effusa, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 142 = *glaucula*.
elator, Kunth, Enum. Pl. ii. 289.—Bras.
Elliotii, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 69.—Am. bor.
Elliotii, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 204. f. 12 = *Grayii*.
emaciata, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 149.—Bras.
etuberculata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = *Scirpus leptolepis*.
exaltata, Kunth, Enum. Pl. ii. 291.—Bras.
exilis, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 440.—Bras.
eximia, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 601.—Mexic.
Fabri, Steud. Syn. Pl. Cyp. 147 = *Panicum lanatum*.
fascicularis, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 296 = *distans*.
fascicularis, Nutt. Gen. Am. i. 33.—Am. bor.
fascicularis, Vahl, Enum. ii. 234.—Am. bor.
ferruginea, Roem. & Schult. Syst. ii. 85 = *glaucula*.
ferruginea, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *polyphylla*.
filifolia, Kunth, Enum. Pl. ii. 299 = *Sellowiana*, Steud.
filifolia, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 366.—Am. bor.
filiformis, Balb. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *distans*.
filiformis, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *cymosa*.
filiformis, Vahl, Enum. ii. 232.—Am. centr.
filiformis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 281 = *Dichromena caracasana*.
flavida, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 439.—Bras.
florida, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 71 = *aurea*.
florida, Griseb. Fl. Brit. West Ind. 575 = *longiflora*.
foliata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142.—Am. bor.
fusca, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. i. 127 — *Europ.*; Am. bor.
fusca, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 216 = *gracilentia*.
gigantea, Link, Jahrb. i. III. (1820) 76.—Bras.
glaucula, Baldw. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 210 = *Baldwinii*.
glaucula, Vahl, Enum. ii. 233.—Geront. trop.
Glaziovii, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 405.—Bras.
globosa, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 15 = *pterocarpa*.
globosa, Roem. & Schult. Syst. ii. 89.—Am. austr.
globulifera, Link, Jahrb. i. III. (1820) 76 = *cyperoides*.
glomerata, Vahl, Enum. ii. 234.—Am. bor.
glomerata, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 216 = *Scirpus flaccifolius*.
Gollmeri, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 556.—Venezuela.
gracilentia, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 215. f. 27.—Am. bor.
gracilis, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = *laxa*.
gracilis, Vahl, Enum. ii. 234 = *glaucula*.
gracilis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 300 = *polyphylla*.
gracillima, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 435.—Zeylan.
gracillima, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 181 = *pallida*, M. A. Curt.
Grayana, Chapm. ex M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 409 = *Chapmanii*.
Grayii, Kunth, Enum. Pl. ii. 539.—Am. bor.

RYNCHOSPORA :—

- Griffithii*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 404.—Ind. or.
Haenkei, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 199 = *Wallichiana*.
Hamiltonii, Kunth, Enum. Pl. ii. 291 = *pterocarpa*.
Harveyi, W. Boott, in Coult. Bot. Gaz. ix. (1884) 85 = *Torreyana*.
heterophylla, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 553 = *Chapmanii*.
Hildebrandtii, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 508.—Madag.
hirsuta, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 576 = *Dichromena ciliata*.
hirsuta, Vahl, Enum. ii. 231.—Am. trop.
hirta, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 146, in obs.; et in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 543.—Bras.
hispidula, Boeck. l. c. (1871-73) 604.—Guian.
hispidula, Griseb. Cat. Pl. Cub. 245.—Cuba.
Hoffmanni, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 637.—Costa Rica.
Hookeri, Boeck. l. c. 621.—Ind. or.
Humboldtiana, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = *Dichromena repens*.
humilis, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *cymosa*.
ignorata, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 508.—Cuba.
inexpansa, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 456 = *longispicata*.
inexpansa, Vahl, Enum. ii. 232.—Am. bor.
intermedia, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 296 = *cephalantha*, A. Gray.
intermixta, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 184 = *pusilla*, Chapm.
Jelskiana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 401.—Guian.
jubata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 254 = *R. Marisculus*.
juncea, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = *glaucula*.
junciformis, Boeck. in Flora, xli. (1858) 646.—Guian.
Kamphoeveneri, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 508 = *gracillima*.
Knieskernii, J. Carey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. iv. (1847) 25.—Am. bor.
Kunthii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 297.—Mexic.
Kyssor, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 74 = *Scirpus grossus*.
laevigata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 145.—Guian.
laevis, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 166 = *glaucula*.
lamprosperma, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 183 = *divergens*.
lanceolata, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 288 = *capitata*.
lavarum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 415.—Ins. Sandvic.
lavarum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 98 = *glaucula*.
laxa, R. Br. Prod. 230 = *glaucula*.
laxa, Schult. Mant. ii. 46, partim = *longiflora*.
laxa, Vahl, Enum. ii. 231.—Am. bor.
Lechleri, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56, nomen; et ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 633.—Peruv.
leptorhyncha, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 180.—Cuba.
leptostachya, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 591 = *tenuis*.
leucocarpa, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 335.—Madag.
leucocephala, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 144 = *Dichromena leucocephala*.
leucocephala, Nees & Meyen, in Linnaea, ix. (1834) 297, nomen.—Hab.?
Lindeniana, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244.—Cuba.
longibracteata, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 534.—Guian.
longiflora, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269.—Ins. Martinic.
longirostris, Ell. Sketch, i. 59 = *laxa*.
longirostris, Steud. Syn. Pl. Cyp. 145 = *amazonica*.
longiseta, Steud. l. c. 140 = *caduca*.
longisetis, R. Br. Prod. 230.—Austral.
longisetis, F. Muell. Fragm. ix. 17 = *tenuifolia*.
longispicata, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 600.—Bras.
lunata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244.—Am. trop.
Lundii, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 147.—Bras.
luzuliformis, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1871-73) 632.—Am. austr.

RYNCHOSPORA :—

- macrocarpa*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 629 = *spectabilis*.
macrochaeta, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56, nomen; et ex Boeck. l. c. 632.—Peruv.
macrostachya, Torr. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 206. t. 6. f. 14.—Am. bor.
macrostylis, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 74 = *pterocarpa*.
marginata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = *globosa*.
Marisculus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 297.—Am. trop.
Mauritii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 = *cyperoides*.
megalocarpa, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 208. f. 16.—Am. bor.
mexicana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 144.—Mexic.
mexicana, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 182 = *rufa*.
micrantha, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 197 = *Torreyana*.
micrantha, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 48 = *rariflora*.
micrantha, Vahl, Enum. ii. 231.—Mexic.
microcarpa, Baldw. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 202. f. 9.—Am. bor.
microseta, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = *ciliata*.
miliacea, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 198. f. 4 = *sparsa*.
millegrana, Schrad. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 139.—Am. trop.
Minarum, Steud. l. c. 143.—Bras.
minor, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 143.—Bras.
mollis, Schult. Mant. ii. 49.—Nepal.
monostachya, Steud. Syn. Pl. Cyp. 140 = *Eleocharis tuberculosa*.
Moritziana, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 640.—Venezuela.
multiflora, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 200. f. 7 = *Elliotii*.
multiflora, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 143 = *polyantha*.
nardifolia, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 560.—Bras.
Neesii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146.—Bras.
nervosa, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 143 = *Dichromena ciliata*, pulchella.
nitens, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 568, in nota.—Am. bor.
nitida, Spreng. Neue Entdeck. iii. 10 = *Tetraria compar*.
nivea, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 527 (*Dichromena* sp.).—Am. bor.
ochrocephala, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 568.—Afr. trop.
odorata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 242 = *R. Marisculus*.
oligantha, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 212. f. 22.—Texas.
oligosantha, Endl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 216 = *Scirpus flaccifolius*.
oxycephala, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 184 = *eximia*.
pallens, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 146 = *Sellowiana*, Steud.
pallida, M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 409.—Am. bor.
pallida, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146.—Bras.
paniculata, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 211. f. 21.—Am. bor.; Ind. occ.
paniculata, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *polyphylla*.
paniculifera, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146 = *Schiedeana*.
paraensis, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 300.—Bras.
parva, Kunth, l. c. 302 = *Wallichiana*.
parviflora, Beyr. ex Kunth, l. c. 297 = *microcarpa*.
parviflora, Vahl, ex Kunth, l. c. 279 = *micrantha*.
patula, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 201. f. 8.—Am. bor.
pauciflora, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *cymosa*.
pauciflora, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 284 = *Actinoschoenus filiformis*.
pendula, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 201 = *Elliotii*.
pennisetia, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244 = *plumosa*.
Persooniana, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 536 = *Dichromena repens*.
petraea, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 142 = *glaucula*.
pilosa, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 537.—Bras.
pilulifera, Bertol. in Bologn. Opusc. Sc. iii. (1819) 406.—Bras.
plumosa, Ell. Sketch, i. 58.—Am. bor.
podosperma, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 183 = *longispicata*.

RYNCHOSPORA :—

- Pohliana*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = globosa.
polyantha, Steud. l. c. 147.—Bras.
polycephala, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = polyphylla.
polycephala, Wydl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 291 = cyperoides.
polyphylla, Balb. ex Kunth, l. c. 279 = micrantha.
polyphylla, Vahl, Enum. ii. 230.—Ind. occ.
Prescottiana, Wall. Cat. n. 3423 = longisetis.
Presleana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = globosa.
pruinosa, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 535.—Cuba.
Pseudo-mariscus, Kunth, Enum. Pl. ii. 303 = gigantea.
psilocaryoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 247.—Cuba.
pterocarpa, Roem. & Schult. Syst. ii. 89.—Am. austr.
pterochaeta, F. Muell. Fragm. ix. 17.—Austral.
pubera, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 528 = *Dichromena pubera*.
punctata, Boeck. l. c. 580.—Mexic.; Venezuel.
punctata, Ell. Sketch, i. 60 = cymosa.
pungens, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 253 = glauca.
pura, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = *Dichromena ciliata*.
pusilla, Chapm. ex M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 409; Fl. S. U. St. 528.—Florida.
pusilla, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 271.—Ind. occ.
tycnocarpa, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 208. f. 17 = megalocarpa.
pyramidata, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 15 = polyphylla.
racemosa, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 182.—Cuba.
rariflora, Ell. Sketch, i. 58.—Am. bor.
Ravenelii, M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 410 = divergens.
recurvata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 145.—Bras.
repens, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 531 = *Dichromena repens*.
rigida, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 145.—Bras.
rigida, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = glauca.
rigida, Spreng. Syst. i. 195 = polyphylla.
riparia, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 561.—Bras.
robusta, Boeck. l. c. 616.—Bras.
Rudoi, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 27.—Bras.
rufa, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 149.—Bras.
Ruiziana, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 641.—Peruv.
ruppioides, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1344 = *Scirpus submersus*.
Sartoriana, Boeck. in Flora, xl. (1857) 36.—Mexic.
scaberrima, Boeck. l. c. lxiii. (1880) 452.—Bras.
scabrata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 243 = pruinosa.
scapigera, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 402.—Guian.
Schaffneri, Boeck. l. c. xxxvii. (1871-73) 575.—Mexic.
Schiedeana, Kunth, Enum. Pl. ii. 300.—Mexic.
schoenoides, Wood, Class-Book (1861), 744 = Elliotti.
Schottmuelleri, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 27 (*Pleurostachys* sp.).—Bras.
Schraderiana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146 = aurea.
scirpoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 247, in obs.; A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 568.—Am. bor.
sclerioides, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 99 = thyrsoidea.
scutellata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 246.—Cuba.
Selloiana, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 620.—Bras.
Sellowiana, Steud. Ncm. ed. II. ii. 456; et Syn. Pl. Cyp. 145.—Bras.
semihirsuta, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 614.—Bras.
semiinvoluta, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 198.—Peruv.
semiplumosa, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 213. t. 6. f. 23.—Am. bor.
senegalensis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149.—Afr. trop.
seslerioides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 247 (*Dichromenae* sp.).—Cuba.
setacea, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 159 = tenerrima.
setacea, Vahl, Enum. ii. 233.—Am. austr.

RYNCHOSPORA :—

- setacea*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = rariflora.
setigera, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 145.—Bras.
setigera, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = longibracteata.
sinensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 456 = chinensis.
sparganioides, Boj. Hort. Maurit. 386 = cyperoides.
sparganioides, Steud. Syn. Pl. Cyp. 144 = exaltata.
sparsa, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = micrantha.
sparsa, Vahl, Enum. ii. 230.—Am. bor.
speciosa, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 536.—Bras.
speciosa, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 138 = aurea.
spectabilis, Hochst. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 760.—Afr. austr.
spermodon, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 576 = tenerrima, Nees.
spicata, Spreng. Syst. i. 194 = *Scleria pleostachya*.
stellata, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 271 = *Dichromena leucocephala*.
stenocarpa, Kunth, Enum. Pl. ii. 294.—Bras.
stenophylla, Chapm. Fl. S. U. St. 525.—Florida.
stenorhyncha, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 575 = triflora.
stipitata, Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 660 = R. Marisculus.
stolonifera, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 562.—Bras.
stricta, Boeck. l. c. 603.—Bras.; Guian.
subcapitata, Boeck. l. c. 547 = R. Minarum.
suberostis, Boeck. l. c. 579 = Grayii.
subimberbis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 245.—Cuba.
sublateralis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 148 (*Schoeni* sp.).—Austral.
subulirostris, Steud. l. c. 149 = aurea.
surinamensis, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 297 = aurea.
syriatica, Nees, l. c. = comata.
tenella, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 595.—Bras.
tenerrima, Boeck. l. c. 554.—Venezuela.
tenerrima, Nees, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 26.—Am. trop.
tenuifolia, Benth. Fl. Austral. vii. 350.—Austral.
tenuifolia, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244 = stenophylla.
tenuirostris, Kunth, Enum. Pl. ii. 303 = cyperoides.
tenuis, Bald. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 217 = distans.
tenuis, Link, Jahrb. i. iii. (1820) 76.—Bras.
tenuiseta, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 179 = R. Marisculus.
terminalis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 143.—Bras.
testacea, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 148.—Bras.
texensis, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 602 = nitens.
Thouarsii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 297 = glauca.
thyrsoides, Nees & Meyen, l. c.—Ins. Sandvic.
Torreyana, A. Gray, in Ann. Lyc. York, iii. (1835) 197.—Am. bor.
Torreyana, Griseb. Cat. Pl. Cub. 243 = cymosa.
triceps, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 642.—Peruv.
triceps, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 759 = cyperoides.
triceps, Steud. Nom. ed. II. ii. 456.—Am. austr.
trichophora, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 145 = cariciformis.
triflora, M. A. Curt. in Post. Journ. Nat. Hist. i. (1837) 140 = oligantha.
triflora, Vahl, Enum. ii. 231.—As. et Am. trop.
trigyna, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 21.—Abyss.
trispicata, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 136 = triflora.
umbraticola, Poepp. & Kunth, in Kunth, Enum. Pl. ii. 300.—Peruv.
uniflora, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 439.—Bras.
Urvillei, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 = cyperoides.
Vahlia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = *Dichromena ciliata*.
velutina, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 149.—Bras.
vicosensis, Schult. Mant. ii. 46 = glauca.
vulcani, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 638.—Costa Rica.

RYNCHOSPORA :—

- Wallichiana*, Kunth, Enum. Pl. ii. 289.—Ind. or.
Warmingii, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 143.—Bras.
Wightiana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 148.—Ind. or.
zeylanica, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 352 = triflora.

 RYNCHOSTYLIS, Blume, Bijdr. 285. t. 49 (1825) = **Rhynchostylis**, Blume (Orchid.).

- RYPARIA*, Blume, Fl. Jav. Praef. 8 (1828) = **Ryparosa**, Blume (Euphorb.?).
caesia, Blume, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 339 = *Ryparosa caesia*.
dubia, Blume, ex Baill. l. c.—Hab. ?

RYPAROSA, Blume, Bijdr. 600 (1825). Gen. dub. **EUPHORBIACEARUM**.—Cf. Benth. & Hook. f. iii. 257.

- RYPARIA*, Blume, Fl. Jav. Praef. 8 (1828).
caesia, Blume, Bijdr. 601.—Java.

RYSODIUM, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 263 = **Astragalus**, Tourn. (Legumin.).
pterstylis, Stev. l. c. = A. *pterstylis*.

RYSSOPTERYS, Blume, ex A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 21. t. 35 (1837). **MALPIGHIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 257.

- abutilifolia*, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 385.—N. Hibern.
chrysantha, Hassk. Hort. Bog. Desc. 133.—Java.
Cumingiana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 386.—Ins. Philipp.
dealbata, A. Juss. l. c.—Ins. Philipp.
microstema, A. Juss. l. c. 384.—Ins. Philipp.; Java.
ovata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 583.—Ins. Philipp.
rufescens, Turcz. l. c.—Java.
tilliaefolia, Blume, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 384 = *microstema*.
tilliaefolia, A. Juss. l. c.—Java.
timorensis, Blume, ex A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 21.—Ins. Timor.
tomentosa, Blume, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 514 = *Aspidopterys tomentosa*.

RYTACHNE, Endl. Gen. 109 (1837) = **Rhytachne**, Desv. (Gramin.).

RYTICARYUM, Becc. in Malesia, i. (1877) 120. **ICACINEAE**.

- fasciculatum*, Becc. l. c. 121.—N. Guin.
macrocarpum, Becc. l. c. (1878) 256.—N. Guin.
oleraceum, Becc. l. c. (1877) 121.—'Grande Kei.'
racemosum, Becc. l. c.—N. Guin.

RYTIDEA, Spreng. Syst. i. 515 (1825) = **Rutidea**, DC. (Compos.).

RYTIDOLOMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 319 = **Dictyanthus**, Decne. (Asclep.).
reticulatum, Turcz. l. c. 320 = D. *reticulatus*.

RYTIDOPHYLLUM, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 38 (1829) = **Rhytidophyllum**, Mart. (Gesnerac.).

RYTIDOSPERMA, Steud. Syn. Pl. Gram. 425 (1855) = **Deschampsia**, Beauv. (Gramin.).
Lechleri, Steud. l. c. = D. *caespitosa* ?

RYTIDOSPERMUM, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 96, sphalm. = praec.

RYTIDOSTYLIS, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 424. t. 97 (1841) = **Elaterium**, Jacq. (Cucurb.).
amazonica, Spruce, ex Cogn. Diagn. Cucurb. fasc. ii. 55 = E. *amazonicum*.
gracilis, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 425. t. 97 = E. *gracile*.

RYTIDOTUS, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1071 (1870). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 101.
RHYTIDOTUS, Hook. f. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 101 (1873).
sandvicensis, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1071.—Ins. Sandvic.

RYTIGLOSSA, Steud. Nom. ed. II. ii. 488 (1841) = RHYTIGLOSSA, Nees = *Dianthera*, Linn. (Acanth.).

RYTIGYNIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 178 (1850) = *Vangueria*, Juss. (Rubiaceae).
senegalensis, Blume, l. c. 179.—Afr. trop.

RYTILIX, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 219 = *Manisuris*, Sw. (Gramin.).
glandulosa, Rafin. l. c. = *M. granularis*.

S

SABADILLA, Brandt & Ratzeb. in Hayne, Arzn. Gew. xiii. t. 27 (1837) = *Schoenocaulon*, A. Gray (Liliac.).
officinatum, Brandt & Ratzeb. l. c. = *Sch. officinale*.

SABAL, Adans. Fam. ii. 495 (1763). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 922.
Adansoni, *Guerns. in Bull. Soc. Philom.* iii. (1803) 206. t. 25.—Am. bor.
adiantum, Rafin. Fl. Ludov. 17 (Quid?).—Am. bor.
Blackburnianum, *Glazebrook, in Loud. Gard. Mag.* v. (1829) 52. ff. 10–13.—Ind. occ.
carolinianum, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 356 = Adansoni.
coerulescens, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1875) i. 589.—N. Granat.
columnare, Hort. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 320, 348. nomen.—Hab.?
elatum, Hort. ex Mart. l. c.—Hab.?
giganteum, Fulchir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 489 = *mexicanum*?
glaucescens, Lodd. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 320, nomen.—Ins. Trinit.
graminifolium, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 141, nomen.—Am. austr.
havanensis, Lodd. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 320, 348 (Quid?).—Hab.?
Histrix, Pursh, ex Nutt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 293 = *Rhapidophyllum Histrix*.
Magdalenae, Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) 32, nomen.—N. Granat.
mauritiiforme, Griseb. & H. Wendl. in Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 514.—Ind. occ.
mexicanum, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 246. t. 8.—Mexic.
minimum, Nutt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 293 = Adansoni.
minus, Pers. Syn. i. 399 = Adansoni.
oleraceum, Hort. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 320, 348 (Quid?).—Hab.?
Palmetto, Hort. l. c. 246 = *mexicanum*.
Palmetto, Lodd. ex Schult. f. Syst. vii. 1487.—Am. bor.
Palmetto, Rein, in Ber. Senckenb. Naturf. Ges. Frankf. (1873) 150 = *Blackburnianum*.
pumila, Ell. Sketch, i. 430 = Adansoni.
Sanfordi, Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) 32, nomen.—Florida.
serrulatum, Schult. f. Syst. vii. 1486 = *Brahea serrulata*.
taurinum, Hort. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 320, 348 (Quid?).—Jamaic.
umbraculiferum, Hort. ex Mart. l. c. 246 = *mexicanum*.
umbraculiferum, Mart. l. c. 245. t. 130 = *Blackburnianum*.
Woodfordii, Lodd. ex Mart. l. c. 247, nomen.—Ins. Trinit.

SABATIA, Adans. Fam. ii. 503 (1763) = *Sabbatia*, Adans. (Gentian.).

SABAZIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xvi. 480 (1827). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 362.
BAZIASA, Steud. Nom. ed. II. i. 192 (1840).
humilis, Cass. in Dict. Sc. Nat. xvi. 481.—Mexic.
microglossa, DC. Prod. v. 497.—Mexic.
occidentalis, DC. l. c., sphalm. = *Siegesbeckia occidentalis*.
portoricensis, DC. l. c., sphalm. = *Siegesbeckia portoricensis*.
sarmentosa, Less. in Linnaea, v. (1830) 148.—Mexic.
urticaefolia, DC. Prod. v. 497.—Am. trop.

SABBATA, Vell. Fl. Flum. 352 (1825); viii. tt. 94–95 (1827). Gen. dub. *COMPOSITARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 223.

polyphylla, Vell. l. c. viii. t. 95.—Bras.
romana, Vell. l. c. 352; viii. t. 94.—Bras.

SABBATIA, Adans. Fam. ii. 503 (1763) (Sabatia). *GENTIANEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 810.
LAPITHEA, Griseb. in DC. Prod. ix. 48 (1845).
NEUROLA, Rafin. New Fl. Am. iv. 92 (1836).
amena, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
amoena, G. Don, Gen. Syst. iv. 207 = *stellaris*.
anceps, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
angularis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 137.—Am. bor.
australis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 194 = *Zygostigma australe*.
Boykini, A. Gray, ex Chapm. Fl. S. U. St. 354.—Am. bor.
brachiata, Ell. Sketch, i. 285.—Am. bor.
brevifolia, Rafin. Atl. Journ. 147 (Quid?).—Am. bor.
calycosa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 138.—Am. bor.
campanulata, Torr. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 120 = *gracilis*.
campestris, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 197.—Am. bor.
chloroides, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 137.—Am. bor.
concinna, Wood, Class-Book (1861), 584 = *brachiata*.
corymbosa, Baldw. ex Ell. Sketch, i. 283.—Am. bor.
cymosa, G. Don, Gen. Syst. iv. 207 = *corymbosa*.
diffusa, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
Elliotii, Steud. Nom. ed. II. ii. 489 (Elliotii).—Am. bor.
formosa, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 7 = *campestris*.
gentianoides, Ell. Sketch, i. 286.—Am. bor.
gracilis, Ell. l. c. 284 = *stellaris*.
gracilis, Salisb. Parad. Lond. t. 32.—Am. bor.
heterophylla, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
lanceolata, Torr. & Gray, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 356 = *corymbosa*.
lingulata, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
macrophylla, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 171.—Am. bor. occ.
maculata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 812, in obs.—Mexic.
nervosa, Rafin. New Fl. Am. iv. 92.—Am. bor.
nivea, Rafin. Med. Fl. ii. 77.—Am. bor.
obtusifolia, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
oligophylla, Featherman, in Univ. Mississip. Rep. (1871); ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 115 = *gentianoides*.
paniculata, Ell. Sketch, i. 282 = Elliotii.
paniculata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 138.—Am. bor.
petiolata, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
pulchella, Rafin. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 49 = *gracilis*.
pulchella, Spreng. Syst. i. 581 = *Erythraea ramosissima*?
pumila, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab.?
simplex, Bertol. Misc. Bot. x. 27 = *Rhexia stricta*.
stellaris, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 137.—Am. bor.
stricta, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 = *Curtia gentianoides*?
tenuifolia, Rafin. l. c. (= *Schubleria tenuifolia*).—Am. trop.
umbellata, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
verticillaris, Spreng. Syst. i. 580 = *Curtia gentianoides*.

SABBATIA, Moench, Meth. 386 (1794) = *Micromeria*, Benth. (Labiata).
corymbosa, Moench, l. c. = *M. Juliana*.

SABDARIFFA, Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl. v. 1857 (1836) = *Hibiscus*, Linn. (Malv.).
digitata, Kostel. l. c. = *H. digitatus*.
rubra, Kostel. l. c. = *H. Sabdariffa*.

SABIA, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xii. (1818) 355. t. 14. *SABIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 414.
ANDROGLOSSA, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 42.
ENANTIA, Falc. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 75.
MENISCOSTA, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 923 (1839).
MENISCOSTA, Blume, Bijdr. 28 (1825).
Bullockii, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 9 = *japonica*.
campanulata, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 311.—Reg. Himal.

SABIA:—

celastrinea, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 1269 (Index) = *limoniacea*.
densiflora, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 520.—Sumatra.
elliptica, Miq. l. c.—Sumatra.
floribunda, Miq. l. c. = *Meliosma elliptica*.
japonica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xi. (1867) 430.—China; Japon.
lanceolata, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 355. t. 14.—Reg. Himal.
leptandra, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 209.—Reg. Himal.
limoniacea, Wall. Cat. n. 1000.—Reg. Himal.
malabarica, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 39.—Ind. or.
Meniscosta, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 369.—Malaya.
paniculata, Edgew. ex Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 211.—Reg. Himal.
paniculata, Seem. Bot. Voy. Herald, 362 = *limoniacea*.
parviflora, Wall. Cat. n. 1001 = *purpurea*.
parviflora, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 310.—Reg. Himal.
pauciflora, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 370.—Ins. Molucc.
purpurea, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 209.—Reg. Himal.
sumatrana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 370.—Sumatra.
tomentosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 3.—Assam?
viridissima, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 304.—Ins. Andam.

SABICEA, Aubl. Pl. Gui. i. 192. t. 75, 76 (1775). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 72.
PAIVA, Vell. Fl. Flum. 104 (1825); iii. t. 16 (1827).

SCHWENKFELDA, Schreb. Gen. 123 (1789).
aspera, Aubl. Pl. Gui. i. 194. t. 76.—Guian.
aurea, Steud. Nom. ed. I. 712 = *Coccocypselum aureum*.
calycina, Benth. in Hook. Niger Fl. 399.—Afr. trop.
cana, Hook. Ic. Pl. t. 247.—Peruv.
capitellata, Benth. in Hook. Niger Fl. 398.—Afr. trop.
cauliflora, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 77.—Afr. trop.
cinerea, Aubl. Pl. Gui. i. 192. t. 75.—Guian.
crinita, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 228.—Madag.
diversifolia, Pers. Syn. i. 203.—Ins. Mascar.
edulis, Seem. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 266 = *aspera*.
eriantha, DC. Prod. iv. 439 = *cinerea*.
ferruginea, Benth. in Hook. Niger Fl. 397.—Afr. trop.
geantha, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 78.—Afr. trop.
glabrescens, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 219 = *aspera*.
grisea, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 192 = *cinerea*.
guianensis, Baill. Hist. Pl. vii. 320 = *Patima guianensis*.
hirsuta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 417 = *aspera*.
hirta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 46 = *aspera*.
macrophylla, Steud. Nom. ed. II. ii. 489, sphalm. = *Nonatelia macrophylla*.
Moralesii, Griseb. Cat. Pl. Cub. 124 = *Lasianthus Moralesii*.
Perrottetii, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 228 = (*Uncaria* sp.).—Afr. trop.
pilosa, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 76.—Afr. trop.
pumila, Barth. ex DC. Prod. iv. 440.—Peruv.
purpurea, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 228.—Bras.
segregata, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 77.—Afr. trop.
setosa, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 228.—Madag.
tomentosa, A. Rich. l. c.—Bras.
triflora, DC. Prod. iv. 439.—Madag.
umbellata, Pers. Syn. i. 203.—Peruv.
velutina, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 219 = *aspera*.
venosa, Benth. in Hook. Niger Fl. 399.—Afr. trop.
villosa, Roem. & Schult. Syst. v. 265 = *aspera*.
Vogelii, Benth. in Hook. Niger Fl. 398.—Afr. trop.

SABINA, Hall. in Rupp. Fl. Jen. 336 (1745) = **Juniperus**, Tourn. (Conif.).
alba, Antoine, Cupress. Gatt. 70 = *J. virginiana*.
aquatica, Antoine, l. c. 70 = *Taxodium heterophyllum*.
bacciformis, Antoine, l. c. 69 = *J. phoenicea*.
bermudiana, Antoine, l. c. 65. t. 87 = *J. bermudiana*.
Cabiancae, Antoine, l. c. 41. t. 54 = *J. chinensis*.
caesia, Antoine, l. c. 68 = *J. caesia*.
californica, Antoine, l. c. 52. t. 72 = *J. virginiana*.
chinensis, Antoine, l. c. 54. t. 75 = *J. chinensis*.
Corneyana, Antoine, l. c. 54. t. 74 = *Cupressus torulosa*.
cupressifolia, Antoine, ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 125 = *J. Sabina*.
davurica, Antoine, Cupress. Gatt. 56. t. 77 = *J. davurica*.
dealbata, Antoine, l. c. 68 = *J. communis*.
dimorpha, Antoine, l. c. 70 = *J. chinensis*.
excelsa, Antoine, l. c. 45. t. 60 = *J. excelsa*.
Fischeri, Antoine, l. c. 53. t. 73 = *J. Pseudo-sabina*.
flaccida, Antoine, l. c. 37. t. 49 = *J. flaccida*.
foetidissima, Antoine, l. c. 49. tt. 67-71 = *J. foetidissima*.
fragrans, Antoine, l. c. 70 = *J. virginiana*.
gigantea, Antoine, l. c. 36. t. 48 = *J. mexicana*.
glauca, Antoine, l. c. 71 = *J. virginiana*.
gossainthanea, Antoine, l. c. 69 = *J. virginiana*.
Grisebachii, Antoine, l. c. 61 = *J. foetidissima*.
isophyllus, Antoine, l. c. 48. tt. 64-66 = *J. excelsa*.
lycia, Antoine, l. c. 44. t. 59 = *J. phoenicea*.
mexicana, Antoine, l. c. 38. t. 51 = *J. mexicana*.
occidentalis, Antoine, l. c. 64. tt. 85-86 = *J. occidentalis*.
officinalis, Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 387 = *J. Sabina*.
Olivieri, Antoine, Cupress. Gatt. 70 = *J. excelsa*.
osteosperma, Antoine, l. c. 51.—Hab.?
pachyphlaea, Antoine, l. c. 39 = *J. pachyphlaea*.
phoenicea, Antoine, l. c. 42. t. 57 = *J. phoenicea*.
plochyderma, Antoine, l. c. 40. t. 52 = *J. pachyphlaea*.
polycarpus, Antoine, l. c. 47. t. 63 = *J. excelsa*.
procera, Antoine, l. c. 36. t. 47 = *J. procera*.
prostrata, Antoine, l. c. 57. t. 79 = *J. Sabina*.
Pseudothurifera, Antoine, l. c. 60. t. 82 = *J. thurifera*?
racemosa, Antoine, l. c. 71 = *J. racemosa*.
recurva, Antoine, l. c. 67. t. 88 = *J. recurva*.
religiosa, Antoine, l. c. 47. t. 61 = *J. excelsa*.
sphaerica, Antoine, l. c. 52. t. 72 = *J. sphaerica*.
squamata, Antoine, l. c. 66. t. 89 = *J. recurva*.
struthiacea, Antoine, l. c. 69 = *J. chinensis*.
tamariscifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 125 = *J. Sabina*.
tetragona, Antoine, Cupress. Gatt. 40. t. 53 = *J. tetragona*.
thurifera, Antoine, l. c. 51 = *J. thurifera*?
turbinata, Antoine, l. c. 41. t. 56 = *J. phoenicea*.
virginiana, Antoine, l. c. 61. tt. 83. 84 = *J. virginiana*.
vulgaris, Antoine, l. c. 58. t. 80 = *J. Sabina*.

SABINEA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 92.
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 501.
carinalis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 183.—Ind. occ.
dubia, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 92.—
 Ins. Martinic.
florida, DC. l. c.—Ind. occ.

SABSAB, Adans. Fam. ii. 31 (1763) = **Paspalum**,
 Linn. (Gramin.).

SABULINA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 785 (1832) =
Arenaria, Rupp. (Caryoph.).
austriaca, Reichb. l. c. 787 = *A. austriaca*.
bannatica, Reichb. l. c. = *A. banatica*.
biflora, Reichb. l. c. 790 = *Stellaria biflora*.
caespitosa, Reichb. l. c. 788 = *A. verna*.
capillacea, Reichb. l. c. 786 = *A. grandiflora*.
conferta, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii.
 (1869) 195 = *A. tenuifolia*.
falcata, Schur, Enum. Pl. Transs. 111 = *A. setacea*.
fastigiata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 786 = *A.*
rostrata.
frutescens, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11.
 (1877) 136 = *A. setacea*.
Gerardi, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 788 = *A. verna*.
glareosa, Schur, Enum. Pl. Transs. 111 = *A. recurva*.
graminifolia, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 789 =
A. clandestina, graminifolia.
hybrida, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi.
 (1868) 347 = *A. tenuifolia*.

SABULINA :—

lanceolata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 790 = *Arenaria*
lanceolata.
laricifolia, Reichb. l. c. 789 = *A. laricifolia*.
laxa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868)
 347 = *A. grandiflora*.
macrocarpa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 788 = *A. larici-*
folia.
marginata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv.
 (1853) 13 = *A. setacea*.
mediterranea, Reichb. l. c. Fl. Germ. v. 27 = *A. mucro-*
nata.
mucronata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 786 = *A.*
mucronata.
polygonoides, Reichb. l. c. 790 = *A. polygonoides*.
Ponae, Reichb. l. c. = *A. bavarica*.
procera, Reichb. l. c. 787 = *A. graminifolia*.
ramosissima, Schur, Enum. Pl. Transs. 113 = *A.*
ramosissima.
recurva, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 788 = *A. recurva*.
rostrata, Reichb. l. c. 787 = *A. rostrata*.
setacea, Reichb. l. c. 786 = *A. setacea*.
sphagnoides, Reichb. l. c. 790 = *A. polygonoides*.
striata, Reichb. l. c. 789 = *A. laricifolia*.
stricta, Reichb. l. c. = *A. stricta*.
tenella, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x.
 (1859) 73 = *A. verna*.
tenuifolia, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 785 = *A. tenuifolia*.
verna, Reichb. l. c. 788 = *A. verna*.
Villarsii, Reichb. l. c. 787 = *A. Villarsii*.
viscosa, Reichb. l. c. 786 = *A. tenuifolia*.

SACAGLOTTIS, G. Don, Gen. Syst. i. 676 (1831),
 sphalm. = **Sacoglottis**, Mart. (Humir.).

SACCARUM, Sanguin. in Atti Acc. Pont. Lincei, Ser. I.
 v. (1852) 501, 555 = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).

SACCELLIUM, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 47.
 t. 13 (1808). **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f.
 ii. 839.
lanceolatum, Humb. & Bonpl. l. c.—Peruv.

SACCHARIFERA, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 131 (1812)
 = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).
officinalis, Stokes, l. c. 132 = *Saccharum officinarum*.
spontanea, Stokes, l. c. = *Saccharum spontaneum*.

SACCHAROPHORUM, Neck. Elem. iii. 209 (1790) =
 seq.

SACCHARUM, Linn. Gen. ed. I. 18 (1737). **GRA-**
MINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1125.
ERIOCHRYSIS, Beauv. Agrost. 8. t. 4. f. 11 (1812).
PHRAGMITES, Adans. Fam. ii. 34 (1763).
PLAZERIUM, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. i. 474
 (1833).
SACCHARIFERA, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 131
 (1812).
SACCHAROPHORUM, Neck. Elem. iii. 209 (1790).
acinaciforme, Spreng. Syst. i. 282 = *Dimeria acinaci-*
formis.
aegyptiacum, Willd. Enum. Hort. Berol. 82 = spon-
 taneum.
alopecuroideum, Nutt. Gen. Am. i. 60 = *Erianthus*
saccharoides.
Alopecurus, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 100
 = *Imperata exaltata*.
angustifolium, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or.
 107 = *stenophyllum*.
angustifolium, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.
 iv. (1836) 92 = *Erianthus saccharoides*.
Antillarum, Roem. & Schult. Syst. ii. 877 = *Setaria*
setosa.
appressum, Kit. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 34 =
Erianthus Hostii.
argenteum, Brouss. Elench. 50 = *Andropogon saccha-*
roides.
arundinaceum, Retz. Obs. iv. 14.—Ind. or.; China.
asperum, Steud. Syn. Pl. Gram. 407 = *Erianthus*
asper.
aureum, Spreng. Pugill. ii. 17 = *Pollinia aurea*.
Baldwini, Spreng. Syst. i. 282 = *Erianthus strictus*.
benghalense, Retz. Obs. v. 16 = *arundinaceum*.
bicorne, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 266 =
Andropogon bicornis.
biflorum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 16 = *spontaneum*.

SACCHARUM :—

brasilianum, Trin. in Mém. Acad. Péters. Sér. VI. ii.
 (1833) 311 = *Erianthus asper*.
brevibarbe, Pers. Syn. i. 103 = *Erianthus saccharoides*.
brunneum, Desv. Opusc. 65 (Panici sp.).—Ind. or.
caducum, Tausch, in Flora, xix. (1836) 527 = spon-
 taneum.
canaliculatum, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 246
 = *spontaneum*.
capense, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = *Erianthus*
capensis.
caudatum, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 68 =
Imperata exaltata.
cayennense, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881)
 66.—Am. trop.
chinense, Nees, in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 241
 = *spontaneum*.
chinense, Roxb. Hort. Beng. 6, nomen = *officinarum*.
ciliare, Anderss. in Oevers. Vet. Akad. Handl. Stockh.
 (1855) 155 = *S. Sara*.
confertum, J. & S. Presl, Rel. Haenk. i. 346 = *Im-*
perata exaltata.
conjugatum, Spreng. Syst. i. 283 (= *Andropogon*
conjugatus).—Ind. or.
contortum, Nutt. Gen. Am. i. 60; Spreng. Syst. i. 282
 = *Erianthus saccharoides*.
contractum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 182 =
Imperata exaltata.
cylindricum, Lam. Encyc. i. 594 = *Imperata arun-*
dinacea.
densum, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 100 =
Miscanthus japonicus.
diantrum, Koen. ex Retz. Obs. v. 16 = *Imperata*
arundinacea.
dissitiflorum, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi.
 (1847) 11. 1219 = *Panicum Teneriffae*.
distichophyllum, Steud. ex Jardin, in Mém. Soc. Sc.
 Nat. Cherb. v. (1857) 299, 325 = *Miscanthus*
japonicus.
dubium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 183 = *Imperata*
exaltata.
Ecklonii, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = *Erianthus ca-*
pensis.
edule, Hassk. in Flora, xxv. (1842) 11. Beibl. 3 =
officinarum.
erianthoides, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825)
 308 = *Erianthus saccharoides*.
europaeum, Pers. Syn. i. 103 = *Imperata arundinacea*.
exaltatum, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 245 =
arundinaceum?
fasciculatum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 490 =
Andropogon leucostachyus.
fastigiatum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 409 =
Erianthus fastigiatus.
fatuum, Bechey, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 490, nomen
 (Quid?).—Hab.?
filifolium, Steud. Syn. Pl. Gram. 409 = *Erianthus fili-*
folius.
floridulum, Labill. Sert. Austr. Caled. 13. t. 18 =
Miscanthus japonicus.
fulvum, R. Br. Prod. 203 = *Pollinia Cumingii*.
fusum, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 236.—
 Ind. or.
giganteum, Pers. Syn. i. 103 = *Erianthus saccharoides*.
giganteum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii.
 (1833) 311 (*Erianthi* sp.).—Am. trop.
glaucum, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 (*Polliniae* sp.).—
 Java.
grandiflorum, Walp. Ann. iii. 792 = *Panicum insigne*.
Griffithii, Boiss. Fl. Orient. v. 453 = *S. Sara*.
Griffithii, Munro, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix.
 (1882) 191 = *praec.*?
hirsutum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 16 = *Rottboellia*
hirsuta.
holcoides, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 254.—
 Bras.; Paraguay.
indum, Pers. Syn. i. 103 = *Imperata arundinacea*.
infirum, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56 =
officinarum.
insulare, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 99 =
spontaneum.
irritans, R. Br. Prod. 203 = *Pollinia irritans*.
jaculatorium, Lour. Fl. Cochinch. 53 = *Imperata*
exaltata.
jamaicense, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii.
 (1833) 312 = *Erianthus Ravennae*.
japonicum, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 328
 = *Miscanthus sinensis*, *japonicus*.

SACCHARUM:—

- Klagha*, Jungh. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 405 = spontaneum.
Koenigii, Retz. Obs. v. 16 = Imperata arundinacea.
laguroides, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 326 = Imperata arundinacea.
longifolium, Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 66.—Ind. or.
longisetum, Walp. Ann. iii. 793 (= *Tricholaena longiseta*).—Abyss.
macilentum, Chauv. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 406 = Imperata exaltata.
maximum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. (1838) 92 = Erianthus maximus.
mexicanum, Brouss. ex Hornem. Hort. Hafn. i. 75 = Imperata Hookeri.
monandrum, Koland. in Act. Lit. Univ. Hafn. (1777) 285.—Jamaic.; Guian.
monandrum, Sw. ex Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 252, in obs. = Imperata exaltata.
Munja, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 246 = S. Sara? Narenga, Wall. Cat. n. 8856.—Ind. or.; China.
Narenga, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 66, sphalm. = prae.
negrosense, Steud. Syn. Pl. Gram. 407 = Imperata exaltata.
obscurum, Steud. l. c. (Miscanthi sp.).—Japon.
obscurum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 313 = Erianthus Hostii?
occidentale, Sw. Adnot. Bot. 17 = monandrum.
officinale, Salisb. Prod. 17 = seq.
offinarum, Linn. Sp. Pl. 54.—Reg. Calid. cult.
Palisoti, Tausch, in Flora, xix. (1836) 527 = spontaneum.
pallidum, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 66.—Afr. austr.
panicum, Lam. Encyc. i. 595. t. 40. f. 1 = Pogonatherum saccharoideum.
panicum, Griff. Notul. iii. 73 = Pogonatherum saccharoideum.
pappiferum, Lam. Illustr. i. 155 = Pappophorum alopecuroideum.
pedicellare, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 310 (Erianthi sp.).—Ins. Nukahiva.
polydactylum, Thunb. Fl. Jap. 42 = Miscanthus japonicus, sinensis.
polydactylum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 490 = Panicum saccharoides.
polystachyum, Siebold, ex Kunth, Enum. Pl. i. 124 = Panicum lanatum.
polystachyum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 21 = Panicum saccharoides.
praegrande, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = Miscanthus japonicus.
procerum, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 243 = arundinaceum.
propinquum, Steud. Syn. Pl. Gram. 406 = spontaneum.
punctatum, Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 46 = spontaneum.
rarum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 70 = Perotis rara.
Ravennae, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 51 = Imperata arundinacea.
Ravennae, Murr. Syst. ed. XIII. 88 = Erianthus Ravennae.
repens, Willd. Sp. Pl. i. 322 (Tricholaena sp.).—Afr. trop.
reptans, Lam. Illustr. i. 155 = Panicum repens?
roseum, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 518 = Miscanthus sinensis.
rufipilum, Steud. Syn. Pl. Gram. 409 = Erianthus fulvus.
rufum, Steud. l. c. = Pollinia argentea.
sagittatum, Aubl. Pl. Gui. i. 50 = Gynierium saccharoides.
Sapé, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 368 = Imperata brasiliensis.
Sara, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 244.—Ind. or.; Afghan.
semidecumbens, Roxb. l. c. 236 = spontaneum.
sinense, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 244 = officinarum.
Sisca, Cav. Ic. iii. 47 = Imperata arundinacea.
Sorghum, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = Erianthus Sorghum.
speciosissimum, Tausch, in Flora, xix. (1836) 527 = spontaneum.
sphacelatum, Walp. Ann. iii. 793 (= *Tricholaena sphacelata*).—Afr. trop.

SACCHARUM:—

- spicatum*, Burm. ex Kunth, Enum. Pl. i. 477 = Imperata arundinacea.
spicatum, Linn. Sp. Pl. 54 = Perotis latifolia.
spicatum, Thunb. Fl. Jap. 42; J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 346 = Imperata arundinacea.
spontaneum, Linn. Mant. ii. 183.—Geront. trop.
stenophyllum, Bueae, in De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 107.—Ins. Timor.
strictum, Nutt. Gen. Am. i. 60 = Erianthus strictus.
strictum, Spreng. Pugill. ii. 16 = Erianthus Hostii.
Teneriffae, Linn. f. Suppl. 106 = Panicum Teneriffae.
ternatum, Spreng. Syst. i. 283 = Andropogon ternatus.
Thunbergii, Retz. Obs. v. 17 = Imperata arundinacea.
tinctorium, Steud. Syn. Pl. Gram. 469 (Miscanthi sp.).—Japon.
tridentatum, Spreng. Syst. i. 283 = Apocopsis tridentatus.
tripsacoides, Beauv. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 783 = Hemarthra compressa.
tristachyum, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = Pollinia argentea.
versicolor, Steud. l. c. 409 = Erianthus versicolor.
villosum, Steud. l. c. 408 (= Erianthi sp.).—Bras.
violaceum, Tussac, Fl. Antill. i. 160. t. 25 = officinarum.
Warmingianum, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 254.—Bras.

SACCIDIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 301 (1835) = **Holothrix**, Rich. (Orchid.).
pilosum, Lindl. l. c. = H. pilosa.

SACCILABIUM, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 294 = **Nepeta**, Riv. (Labiata).
basilicoides, Rottb. l. c. = N. basilicoides.
viscosa, Rottb. l. c. = N. viscosa.

SACCOCALYX, Coss. & Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xx. (1853) 80. t. 5 = **Satureia**, Linn. (Labiata).
satureioides, Coss. & Dur. l. c. 81.—Alger.

SACCOCALYX, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 269 = **Astragalus**, Tourn. (Legumin.).
calycinus, Stev. l. c. = A. calycinus.
coluteoides, Stev. l. c. = A. coluteoides.
follicularis, Stev. l. c. = A. follicularis.
halicacabus, Stev. l. c. = A. halicacabus.
laguroides, Stev. l. c. = A. laguroides.
lineatus, Stev. l. c. = A. lineatus.
lupulinus, Stev. l. c. = A. lupulinus.
tumidus, Stev. l. c. = A. Clusii.
Vulnerariae, Stev. l. c. = A. Vulnerariae.

SACCOCHILUS, Blume, Fl. Jav. Praef. p. viii (1828) = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).

SACCOGLOTTIS, Endl. Gen. 1040 (1840) = **Sacoglottis**, Mart. (Humir.).

SACCOLABIUM, Blume, Bijdr. 292 (1825). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 578.
CERATOCILUS, Blume, Bijdr. 358. t. 25 (1825).
GASTROCHILUS, D. Don, Prod. Fl. Nep. 32 (1825).
MICROPERA, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 282.
OECEOCIADES, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1522 (1832); Gen. et Sp. Orch. 235 (1833).
OMOEIA, Blume, Bijdr. 359 (1825).
ROBIQUETIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 426. t. 34 (1826).
SACCOCHILUS, Blume, Fl. Jav. Praef. p. viii (1828).
acuminatum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 304 = Sarcanthus peninsularis.
acutifolium, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 223.—Reg. Himal.
albo-lineatum, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 20.—Siam.
ampullaceum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7307.—Reg. Himal.; Burma.
aphyllum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 223 = Angraecum aphyllum.
ascendens, Lindl. l. c. = Ins. Molucc.
bellinum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1884) i. 174.—Burma.
Berkeleyi, Reichb. f. l. c. (1883) i. 814.—Burma?
Bertholdi, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 297.—Ins. Fiji.
bifidum, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 3.—Ins. Philipp.

SACCOLABIUM:—

- bigibbum*, Reichb. f. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 5787.—Burma; Malaya.
bipunctatum, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 145 (Cleisostomatis sp.).—Burma.
Blumei, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 55 = Rhynchostylis retusa.
borneense, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) i. 563.—Borneo.
brevifolium, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 225.—Zeylan.
buccosum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1871) 938.—Reg. Himal.; Burma.
calcaratum, F. Muell. Fragm. i. 192 = Cleisostoma tridentatum.
calceolare, Lindl. in Wall. Cat. n. 7302.—Reg. Himal.; Malaya.
calceolare, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 97 = intermedium.
calopteryum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) ii. 520.—N. Guin.
carinatum, Griff. Notul. iii. 354 = papillosum.
chionanthum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 35.—Java.
clavatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 223.—Ind. or.
coeleste, Reichb. f. in Gard. Chron. (1885) i. 692.—Hab.?
compressum, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 9.—Ins. Philipp.
constrictum, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 52.—Ins. Fiji.
coriaceum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224 = Aërides coriaceum.
curvifolium, Lindl. l. c. 222.—Burma; Java.
dasyogon, Lindl. l. c. = calceolare?
densiflorum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7311 = Cleisostoma spicatum.
dentatum, Reichb. f. in Walp. Am. vi. 883, sphalm. = seq.
denticulatum, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 145 = acutifolium.
discolor, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 42 = S. Pumilio.
distichum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36.—Reg. Himal.
dives, Reichb. f. in Gard. Chron. (1875) ii. 130.—Hab.?
fasciculatum, Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 238.—N. Guin.
filiforme, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36.—Ind. or.
flexum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) i. 520.—N. Guin.
flexuosum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 (Cleisostomatis sp.).—Reg. Himal.; Burma.
fragrans, Par. & Reichb. f. in Journ. Bot. xii. (1874) 197.—Burma.
galeatum, Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 305 = Cleisostoma maculosum.
gemmatum, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 50.—Reg. Himal.
giganteum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7306 = Vanda densiflora.
gracile, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 225.—Zeylan.
Graefei, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) ii. 716.—Ins. Fiji.
Griffithii, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 145 = Microsaccus javensis.
gurwalicum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 32 = Rhynchostylis retusa.
guttatum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7308 = Rhynchostylis retusa.
Hanissonii, Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 241, sphalm. = seq.?
Harrisonianum, Hook. Bot. Mag. t. 5433.—Malaya.
Heathi, Hort. ex Gard. Chron. (1885) ii. 369 = Rhynchostylis retusa.
Hendersonianum, Reichb. f. l. c. (1875) ii. 356.—Hab.?
Hillii, F. Muell. Fragm. i. 192.—Austral.
Humboldtii, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1885) 537.—Ins. Comor.
Huttoni, Hook. f. Bot. Mag. t. 5681.—Java.
intermedium, Griff. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 33.—Reg. Himal.
Jerdonianum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 886.—Ind. or.
lineare, Lindl. in Wall. Cat. n. 7312 (Aëridis sp.).—Ind. or.
lineolatum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 304 = ochraceum.
littorale, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) ii. 198.—Malacca.

SACCOLABIUM:—

- Macphersonii*, F. Muell. Fragm. vii. 96 = *Cleisostoma Macphersonii*.
macrostachyum, Lindl. Sert. Orch. t. 47 = *Rhynchostylis retusa*.
micranthum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7300.—Reg. Himal.; Burma.
Mimus, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) i. 266.—Ins. Pacif.
miniaturum, Hook. Bot. Mag. t. 5326 = *curvifolium*.
miniaturum, Lindl. Bot. Reg. (1847) sub t. 26.—Java.
niveum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224.—Zeylan.
obliquum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7304.—Burma.
ochraceum, Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 2.—Ind. or.
pachyglossum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 34.—Borneo.
pallens, Cathcart, ex Lindl. l. c. 35.—Reg. Himal.
paniculatum, Wight, Ic. t. 1676 = *lineare*.
papillosum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 264 (= *Acampe Wightiana*).—Ind. or.
papillosum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7305; et Bot. Reg. t. 1552.—Ind. or.
papillosum, Wight, Ic. t. 1672 (= *Acampe congesta*).—Ind. or.
parvulum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 = *buccosum*.
praemorsum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 22 = *Rhynchostylis retusa*.
Pumilio, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 886.—Reg. Himal.
pusillum, Blume, Bijdr. 292, t. 50.—Java.
pusillum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 = *S. Pumilio*.
quinquefidum, Lindl. in Hook. Journ. Bot. ii. (1843) 238.—N. Hibern.
racemiferum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224 = *Sarcanthus pallidus*.
radicosum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 285.—Abyss.
ramosum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224 (*Cleisostomatis* sp.).—Reg. Himal.; Burma.
ramulosum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 34.—Java.
reflexum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7309 = *Renanthera elongata*.
repens, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 491, nomen.—Ind. or.
retusum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 630 = *Rhynchostylis retusa*.
Rheedii, Wight, Ic. v. 19 = *Rhynchostylis retusa*.
ringens, Lindl. in Wall. Cat. n. 7313 = *Aërides radicosum*.
roseum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 225.—Zeylan.
roseum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 = *filiforme*.
rubrum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7310 = *curvifolium*.
rubrum, Wight, Ic. t. 1673 = *Aërides radicosum*.
speciosum, Wight, l. c. t. 1674–75 = *Aërides maculosum*.
spicatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 221 = *Rhynchostylis retusa*.
striatum, Lindl. l. c. 224 = *Angraecum striatum*.
tenerum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 (*Cleisostomatis* sp.).—Ind. or.
trichromum, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xv. (1859) 51 = *pallens*.
undulatum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7301 = *Cleisostoma undulatum*.
violaceum, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 93 = *Rhynchostylis violacea*.
virescens, Gardn. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 35 = *brevifolium*.
viridiflorum, Lindl. l. c. 36.—Ind. or.
Walkerianum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 887 = *roseum*.
Wightianum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7303, partim = *Aërides radicosum*.
Witteanum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) ii. 618.—Java.
- SACCONIA**, Endl. Gen. 541 (1838) = **Chione**, DC. (Rubiaceae).
glabra, Endl. ex Walp. Rep. ii. 487 = *C. glabra*.
- SACCOPETALUM**, Benn. Pl. Jav. Rar. 165, t. 35 (1838). **ANONACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 28. Bidwilli, Benth. Fl. Austral. i. 53.—Austral.

SACCOPETALUM:—

- Brahei, F. Muell. Fragm. viii. 159.—Austral.
carnosum, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 418.—Java.
Horsfieldii, Benn. Pl. Jav. Rar. 165, t. 35.—Java.
longiflorum, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. 151.—Ind. or.
sclerocarpum, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 88.—Burma.
tomentosum, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 152.—Ind. or.
- SACCOPECTUS**, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 117 = **Allopectus**, Mart. (Gesner.).
strigosus, Oerst. l. c. 118 = *A. strigosus*.
- SACCOSTOMA**, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 449 (1845). **LABIATAE** (Quid?).
urticaefolium, Wall. ex Voigt, l. c. nomen.—Ind. or.
- SACCULARIA**, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. (1863) 17 = **Antirrhinum**, Tourn. (Scrophul.). ii. Veatchii, Kellogg, l. c. = *A. junceum*.
- SACCELLIUM**, Spreng. Syst. iii. 851 (1826) = **Saccellium**, Humb. & Bonpl. (Borag.).
- SACHARUM**, Scop. Introd. 75 (1777) = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).
- SACHSIA**, Griseb. Cat. Pl. Cub. 150 (1866). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 291.
divaricata, Griseb. l. c. 151.—Cuba.
polycephala, Griseb. l. c.—Cuba.
tricephala, Griseb. l. c.—Cuba.
- SACODON**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 45 (1836) = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).
macranthum, Rafin. l. c. = *C. macranthum*.
ventricosum, Rafin. l. c. = *C. macranthum*.
- SACOGLOTTIS**, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 146 (1827). **HUMIRIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 247.
amazonica, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 104 = *guianensis*.
amazonica, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 146.—Bras.
cuspidata, Urb. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 444.—Bras.
densiflora, Urb. l. c. 445.—Bras.
dentata, Urb. l. c. 444.—Bras.
dichotoma, Urb. l. c. 446.—Bras.
gabonensis, Urb. l. c. 449 = *Aubrya gabonensis*.
guianensis, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 103.—Gulan.
macrophylla, Urb. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 446.—Bras.
oblongifolia, Urb. l. c. 447.—Bras.
obovata, Urb. l. c. 443.—Bras.
subcrenata, Urb. in Sitzb. Ges. Naturf. Berl. (1878) 5 = *Humiria subcrenata*.
- SACOILA**, Rafin. Fl. Tellur. ii. 86 (1836) = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).
lurida, Rafin. l. c. = *Sp. orchioides*.
- SACRANTHUS**, Endl. Ench. 331 (1841), sphalm = **SAIRANTHUS**, G. Don = **Nicotiana**, Linn. (Solan.).
- SADRUM**, Soland. ex Baill. in DC. Prod. xvii. 18 (1873) = **Pyrenacantha**, Wight (Oclac.).
volubile, Soland. ex Baill. l. c. = *P. scandens*.
- SADYMYIA**, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 25 (1859) = **Samyda**, Linn.
villosa, Griseb. l. c. = *Samyda villosa*.
- SAELANTHUS**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 33 (1775) = **Vitis**, Linn. (Ampel.).
digitatus, Forsk. l. c. 35 (= *Cissus digitata*).—Arab.
glandulosus, Forsk. l. c. 34 (= *Cissus glandulosa*).—Arab.
quadrangulus, Forsk. l. c. 33 = *V. quadrangularis*.
rotundifolius, Forsk. l. c. 35 (= *Cissus rotundifolia*).—Arab.
ternatus, Forsk. l. c. (= *Cissus ternata*).—Arab.

SAFRAN, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 473 = **Crocus**, Tourn. (Irid.).
officinarum, Medic. l. c. = *C. sativus*.

SAGERAEA, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 207 = **Bocagea**, A. St. Hil. (Anonac.).
cauliflora, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 5.—Sumatra.
Dalzellii, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 9. t. 42 = *B. Dalzellii*.
elliptica, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 93 = *B. elliptica*.
Hookeri, Pierre, Fl. For. Coch. t. 15 = *B. elliptica*.
lanceolata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 10.—Borneo.
laurina, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 207 = *B. Dalzellii*.
Thwaitesii, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 93 = *B. Thwaitesii*.

SAGERETIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 359, t. 13. f. 2. **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 379.

AFARCA, Rafin. Sylva Tellur. 30 (1838).
affinis, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *Rhamnus affinis*.
Blumii, G. Don, l. c. 28 = *oppositifolia*.
Brandrethiana, Aitch. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 62.—Oriens; Ind. bor. occ.
corymbosa, G. Don, Gen. Syst. ii. 29.—Ind. occ.
costata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 645.—Java.
decussata, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *senticosa*?
divergens, Steud. Nom. ed. II. ii. 491.—Chili.
elegans, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 359.—Mexic.; Peruv.
filiformis, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *oppositifolia*.
guayaquilensis, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Ecuador.
hamosa, Brongn. l. c. 360.—Ind. or.; China.
lanceolata, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *Rhamnus lanceolata*.
leprosa, G. Don, l. c. = *Rhamnus leprosa*.
Michauxii, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Am. bor.
oppositifolia, Brongn. l. c. 360.—Ind. or.; Malaya.
parviflora, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *oppositifolia*.
ramosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 169 = *hamosa*?
riparia, Steud. Nom. ed. II. ii. 491.—Chili.
rugosa, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 9.—China.
senticosa, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Peruv.
spicata, Brongn. l. c.—Peruv.
splendens, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *Rhamnus splendens*.
theezans, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Ind. bor. occ.; Burma; China.
trigyna, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *oppositifolia*.
trinervis, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 172.—Chili.
Wrightii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 358.—Texas.

SAGINA, Linn. Syst. ed. I (1735). **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 151.

PHALOE, Dum. Fl. Belg. 110 (1827).
SPERGELLA, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. p. lxx. (1827).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 47.—Abyss.
acicularis, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 756 = *subulata*, Wimm.
ambigua, Lloyd, Fl. Ovest Fr. ed. I. 74 = *ciliata*.
ammannioides, Heyne, ex Wall. Cat. n. 7504 = *Bergia ammannioides*.
apetala, Linn. Mant. ii. 559.—Europ.
breviflora, Gilib. Fl. Lituan. ii. 148 = *procumbens*.
bryoides, Froel. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 793.—Europ.
caespitosa, Lange, Pl. Groenl. 133; Consp. Fl. Groenl. i. 22 = *nivalis*.
cerastioides, Sm. Engl. Bot. t. 166; et in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 343 = *Cerastium tetrandrum*.
chilensis, C. Gay, Fl. Chil. i. 282.—Chili.
ciliaris, Fenzl, Verbr. Alsin. tab. ad p. 57 = *Spergula ciliaris*.
ciliata, Fries, in Liljeb. Sv. Fl. ed. III. 713.—Europ.
corsica, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 15.—Corsica.

SAGINA:—

- crassicaulis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 191.—Calif.
crassifolia, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. iv.* (1826) 617 = *Colobanthus crassifolius*.
debilis, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 50 = *maritima*.
decandra, Reichb. Ic. Pl. Crit. vii. 27. t. 875 = *Arenaria verna*, sedoides.
decumbens, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 177.—Am. bor.
densa, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 49 = *maritima*.
depressa, Schultz, *Prod. Fl. Starg. Suppl. i.* 10 = *ciliata*
dichotoma, Heuff. in *Flora*, xxxvi. (1853) 626.—Hungar.
Elliotii, Fenzl, ex A. Gray, *Man. Bot. N. U. St. ed.* II. 61 = *decumbens*.
erecta, Lam. *Encyc. vi.* 390, partim = *apetala*.
erecta, Linn. Sp. Pl. 128 = *Cerastium quaternellum*.
erecta, O. F. Muell. in *Fl. Dan.* t. 845 = *maritima*.
fasciculata, Boiss. *Diagn. Ser. II. i.* 83.—Sibir.
fasciculata, Poir. *Encyc. vi.* 390.—Afr. bor.
filiculis, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 16 = *apetala*.
filiformis, Pourr. ex Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl.* 27 = *maritima*.
fontinalis, Short & Peter, in *Transylv. Journ. Med.* (1836) 600 = *Stellaria crassifolia*.
glabra, Fenzl, *Verbr. Alsin.* tab. ad p. 57.—Europ.
glandulifera, Nym. *Consp.* 1010 (Index) = *nodosa*.
glandulosa, Bess. ex Nym. l. c. 120 = *nodosa*.
graminifolia, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér. V. i.* (1864) 292.—Bolivia.
Haenkeana, C. Gay, *Fl. Chil.* i. 284.—Chili.
Hochstetteri, Reichardt, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xxi. (1871) 34.—Ins. St. Paul (Mar. Ind. austr.).
humifusa, Fenzl, ex Rohrb. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 262.—Bras.
intermedia, Fenzl, in *Ledeb. Fl. Ross.* i. 339 = *nivalis*.
kevandensis, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov.* 22.—Hispan.
Lamyi, F. Schultz, *Arch. Fl. Fr.* 174.—Gallia.
laricina, Fenzl, *Verbr. Alsin.* tab. ad p. 46 = *Spergularicina*.
Linnaei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 378 = *occidentalis*.
Linnaei, Presl, *Rel. Haenk.* ii. 14 (Linnei).—Reg. bor. et arct.
Loscosii, Boiss. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 604 = *sabuletorum*.
macrocarpa, Losc. & Pard. *Ser. Inconf. ed. II.* 64 = *sabuletorum*.
macrocarpa, Maly, *Enum.* 293 = *Linnaei*.
magellanica, Willd. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 25 = *Colobanthus quitensis*.
maritima, D. Don, in *Gen. Engl. Bot.* t. 2195.—Europ.
maxima, A. Gray, in *Mem. Am. Acad. N. S. vi.* (1858–59) 382 = *Linnaei*.
media ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii–xxiv. (1880) 71.—Europ.
melitensis, Gulia, ex Duthie, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 37 = *apetala*.
micrantha ×, Bor.—Cf. *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) Bibl. 187.—Europ.
muscoides, Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I. 108 = *bryoides*.
muscosa, Jord. *Pugill. Pl. Nov.* 32 = *procumbens*.
nevadensis, Boiss. *Pugill. Pl. Nov.* 22.—Hispan.
nivalis, Fries, *Nov. Mant.* iii. 31.—Reg. bor. et arct.
nodosa, Fenzl, *Verbr. Alsin.* tab. ad p. 18.—Reg. bor. temp.
occidentalis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* x. (1875) 344.—Am. bor. occ.
octandra, Ziz. ex Mert. & Koch, *Deutschl. Fl.* i. 864 = *Cerastium quaternellum*.
oxysepala, Boiss. *Fl. Orient.* i. 663.—Armenia.
patula, Jord. Obs. Pl. Crit. i. (1846) 23 = *ciliata*.
pilifera, Fenzl, *Verbr. Alsin.* tab. ad p. 57 = *glabra*.
pilifera, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 756 = *subulata*, Wimm.
procumbens, Boland. *Cat.* 6 = *occidentalis*.
procumbens, Hook. *Bot. Misc.* iii. (1833) 147 an seq. ?.—Chili.
procumbens, Linn. *Sp. Pl.* 128.—Reg. bor. temp.
procumbens, Pursh, *Fl. Am. Sept. i.* 219 = *decumbens*.
procumbens, Thunb. *Fl. Jap.* 80 = *Linnaei*.
quitensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 19 = *Colobanthus quitensis*.
repens, Burnat, ex Gremli, *Excurs. Schw.* ed. IV. 102 = *glabra*.
Reuteri, Boiss. *Diagn. Ser. II. i.* 82.—Hispan.
Revelieri, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc. i.* 11 = *subulata*.

SAGINA:—

- Rodriguezii*, Willk. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 113 = *maritima*.
sabuletorum, Lange, *Desc. et Ic. Ill.* 3.—Hispan.
saxatilis, Wimm. *Fl. Schles.* (1841) 75 = *Linnaei*.
setigera, Bisch. *Del. Sem. Hort. Heidelb.* (1852) 8.—Hab. ?
sinensis, Hance, in *Journ. Bot.* vi. (1868) 46 = *Linnaei*.
Spergella, Fenzl, *Verbr. Alsin.* tab. ad p. 18 = *Linnaei*.
stricta, Fries, *Novit. Fl. Suec.* iii. 122 = *maritima*.
subulata, Presl, *Fl. Sic.* 158.—Europ.
subulata, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 178 = *decumbens*.
subulata, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. iv.* (1826) 617 = *Colobanthus subulatus*.
subulata, Wimm. *Fl. Schles.* (1841) 76.—Hispan.
urbica, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 613.—Chili.
urceolata, Viv. *Fl. Lib. Spec.* 67; *Fl. Cors.* 3 = *maritima*.
valdiviana, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 22.—Chili.
virginica, Linn. *Sp. Pl.* 128 = *Bartonia tenella*.
viscida, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 491 = *procumbens* ?

SAGITTA, Adans. *Fam.* ii. 459 (1763) = **Sagittaria**, Rupp. (*Alismac.*).
maior, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. ii. 239 = **Sagittaria sagittifolia**.

SAGITTARIA, Rupp. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735).

- ALISMACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1006.
DIPHOREA, Rafin. *Neogenyt.* 3 (1825).
DREPACHENIA, Rafin. l. c. 3 (1825).
LOPHIOPUS, Miq. *Ill. Arch. Ind. Fl.* 50 (1871).
SAGITTA, Adans. *Fam.* ii. 459 (1763).
acuminata, Sm. in *Rees, Cycl.* xxxi. n. 4 = *sagittifolia*.
acutifolia, Linn. ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 218 = *intermedia*.
acutifolia, Linn. f. *Suppl.* 419 = *pugioniformis*.
acutifolia, Pursh, *Fl. Am. Sept. ii.* 397 = *graminea*.
affinis, Seub. in *Mart. Fl. Bras.* iii. i. 111.—Bras.
alismaefolia, Phil. ex M. Mich. in *DC. Monog. Phan.* iii. 76 = *montevidensis*.
alpina, Willd. *Sp. Pl.* ed. 410 = *sagittifolia*.
andina, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857–58) 45 = *montevidensis*.
angustifolia, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1141 = *lancifolia*.
aquatica, Lam. *Fl. Fr.* ii. 197 = *sagittifolia*.
Blumei, Kunth, *Enum.* Pl. iii. 158 = *guayanensis*.
bracteata, Willd. ex Seub. in *Mart. Fl. Bras.* iii. i. 106 = *guayanensis*.
brasilensis, Mart. ex M. Mich. in *DC. Monog. Phan.* iii. 57 = *Echinodorus floribundus*.
bulbosa, Donn, *Hort. Cantab.* ed. VI. 246; et ex Sims, *Bot. Mag.* sub t. 1632 = *heterophylla*.
calycina, Engelm. ex Torr. in *Bot. Mex. Bound.* 212.—Am. bor.
cerulea, Rafin. *Fl. Ludov.* 18 (Quid ?).—Am. bor.
chilensis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 155 = *montevidensis*.
chinensis, Sims, *Bot. Mag.* t. 1631.—China.
cordifolia, Lam. *Encyc.* ii. 504 = *Echinodorus macrophyllus* ?
cordifolia, Roxb. *Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 647 = *guayanensis*.
cristata, Engelm. in *Arthur, Contrib. Fl. Iowa*, n. v; ex Upham, *Cat. Fl. Minnesota*, 138.—Am. bor.
Domiana, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 375 = *sagittifolia*.
echinocarpa, Mart. *Amoen. Bot. Monac.* (Ausw. Merkw. Pl.) 6. t. 3 = *guayanensis*.
edulis, Schlecht. in *Linnaea*, xviii. (1844) 432 = *sagittifolia*.
falcata, Pursh, *Fl. Am. Sept. ii.* 397 = *lancifolia*.
gigantea, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 759 = *sagittifolia*.
gracilis, Pursh, *Fl. Am. Sept. ii.* 396 = *sagittifolia*.
graminea, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 190.—Am. bor.
guayanensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 250.—Reg. trop.
guianensis, Schecht. in *Linnaea*, vi. (1831). 43 = *praec.*
guayanensis, Kunth, *Syn. Pl. Aequin.* I. 261 = *praec.*
hastata, Pursh, *Fl. Am. Sept. ii.* 396 = *sagittifolia*.
hermaphrodita, Buch.-Ham. in *Wall. Cat. n.* 4991 = *sagittifolia*.

SAGITTARIA:—

- heterophylla*, Bert. ex Steud. *Nom. ed. II. ii.* 491 = *incrassata*.
heterophylla, Pursh, *Fl. Am. Sept. ii.* 396.—Am. bor.
heterophylla, Schreb. in *Schweig. & Koerte, Fl. Erlang.* ii. 119 = *sagittifolia*.
hirundinacea, Blume, *Enum. Pl. Jav.* i. 34 = *sagittifolia*.
incrassata, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 491.—Chili.
intermedia, M. Mich. in *DC. Monog. Phan.* iii. 80.—Ind. occ.
japonica, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. III. 1002 = *sagittifolia*.
lagoënsis, Seub. ex Warm. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1872) 113.—Bras.
lancifolia, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 759 = *sagittifolia*.
lancifolia, Linn. *Syst. ed. X.* 1270.—Ind. occ.
lappula, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 22 = *guayanensis*.
latifolia, Willd. *Sp. Pl.* iv. 409 = *sagittifolia*.
longiloba, Engelm. in *Torr. Mex. Bound. Surv.* 212 = *sagittifolia*.
macrophylla, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1834) 137 = *sagittifolia*.
macrophylla, Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* i. (1829–30) 289.—Mexic.
major, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. ii. 239; Schrank, *Fl. Monac.* iv. t. 336 = *sagittifolia*.
mexicana, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 491 = *macrophylla*.
minor, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 2 = *sagittifolia*.
monocca, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 218 = *sagittifolia*.
montevidensis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 156—Reg. Argent.
natans, Michx. *Fl. Am. Bor.* ii. 190.—Am. bor.
natans, Pall. *Reise.* iii. 757 = *sagittifolia*.
nymphaeifolia, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 44; et ex Steud. *Nom. ed. II. ii.* 491 = *Limnophyton obtusifolium*.
obtusifolia, Thunb. *Fl. Jap.* 242 = *sagittifolia*.
obtusifolia, Linn. *Sp. Pl.* 993 = *Limnophyton obtusifolium*.
obtusissima, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 26 = *guayanensis*.
ovata, [Delile,] *Red. Lül.* t. 411 = *lancifolia*.
palaefolia, Nees & Mart. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 21 = *Echinodorus ellipticus*.
papillosa, Buchen. in *Bremen, Abh.* ii. (1871) 27, 44 = *lancifolia*.
parviflora, Wall. *Cat. ex Micheli*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 62 = *guayanensis*.
plantaginifolia, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* ix. 11. (1842) 379 = *lancifolia*.
pubescens, Muhl. *Cat.* 86.—Am. bor.
pugioniformis, Linn. *Diss. Pl. Surin.* (1775) 15.—Guian.
Purshii, Rich. in *Kunth, Enum. Pl.* iii. 160 = *graminea*.
pusilla, Blume, *Enum. Pl. Jav.* i. 34 = *guayanensis*.
pusilla, Nutt. *Gen. Am.* ii. 213 = *nutans*.
pygmaea, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 138 = *sagittifolia*.
radicans, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc.* v. (1837) 159 = *Echinodorus radicans*.
ranunculoideus, Vell. *Fl. Flum.* t. 32 = *Hydrocleys Commersonii*.
rhombifolia, Cham. in *Linnaea*, x. (1836) 219.—Bras.
rhomboidalis, M. Mich. in *DC. Monog. Phan.* iii. 66 = *rhombifolia*.
rigida, Pursh, *Fl. Am. Sept. ii.* 397.—Am. bor.
sagittaeifolia, Auct. = *sagittifolia*.
sagittata, Thunb. *Fl. Jap.* 242 = *sagittifolia*.
sagittifolia, Linn. *Sp. Pl.* 993.—Europ.; As.; Am. bor.
sagittifolia, Lour. *Fl. Cochinch.* 570 = *chinensis*.
sagittifolia, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 323 = *pugioniformis*.
sagittifolia, Vell. *Fl. Flum.* x. t. 31 = *Echinodorus muricatus*.
Sellowiana, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 159 = *lancifolia*.
Seubertiana, Mart. ex Seub. in *Mart. Fl. Bras.* iii. i. 110.—Bras.
simplex, Pursh, *Fl. Am. Sept. ii.* 397 = *sagittifolia*.
simplex, Torr. *Consp.* 356 = *graminea*.
sinensis, Sims, *Bot. Mag.* t. 1631 = *sagittifolia*.
Sprucei, M. Mich. in *DC. Monog. Phan.* iii. 80.—Bras.
stolonifera, Engelm. & A. Gray, in *Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 234 = *graminea*.
subulata, Buchen. in *Bremen, Abh.* ii. (1871) 490, 500 = *natans*.

SAGITTARIA :—

- subulata*, Schomb. *Fauna & Fl. Brit. Gui.* 1117.—Guian.
teniaefolia, Phil. ex M. Mich. in DC. Monog. Phan. iii. 76 = montevidensis.
trachysepalata, Engelm. ex M. Mich. l. c. 74 = lancifolia.
triandra, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 144 = Wisneria triandra.
triflora, Hort. Bog. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 239 = Hydrocharis Morsus-ranae.
triflora, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 26 = guayanensis.
trifolia, Linn. Sp. Pl. 993 = sagittifolia.
variabilis, Engelm. in A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 493 = sagittifolia.
vulgaris, Gueldenst. Reisen, ii. 45 = sagittifolia.

SAGMEN, Hill, Veg. Syst. iv. 35 (1762) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
jaceoides, Hill, Herb. Brit. i. 113 = C. Scabiosa.
Scabiosa, Hill, Hort. Kew. 66 = C. Scabiosa.
sempervirens, Hill, l. c. = C. sempervirens.

SAGONEA, Aubl. Pl. Gni. i. 285. t. 111 (1775) = **Hydrolea**, Linn. (Hydroph.).
aquatica, Poir. Encyc. vi. 392 = H. caroliniana.
palustris, Aubl. Pl. Gui. i. 285. t. 111 = H. caroliniana.

SAGOTIA, Baill. Adansonia, i. 53 (1860-61). **EU-PHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 302.
racemosa, Baill. l. c. 54.—Guian.

SAGOTIA, Duchass. & Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 737 = **Desmodium**, Desv. (Legum.).
triflora, Duchass. & Walp. l. c. 738 = D. triflorum.

SAGRAEA, DC. Prod. iii. 170 (1828). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 766.
CAPITELLARIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 103.

STAPHIDIATRUM, Naud. l. c. xvii. (1852) 325.
acutiflora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 9 = Henriettella fascicularis.
aphanantha, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137 = Clidemia aphanantha.
attenuata, Triana, l. c.—Ind. occ.
aureo-sericea, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 100.—Jamaic.
Berterii, DC. Prod. iii. 171 = plumosa.
Bonplandii, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Am. trop.

bracteolata, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 55.—Jamaic.
capillaris, DC. Prod. iii. 170.—Jamaic.
capilliflora, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Bras.

capillipes, Triana, l. c.—Bras.
capitata, Triana, l. c. 139.—Guian.
cognata, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 722 = Clidemia rubra.

columnaeifolia, DC. Prod. iii. 170 = Clidemia rubra.
coriacea, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Guian.

crossopetala, Triana, l. c. 139.—Jamaic.
discolor, Triana, l. c.—N. Granat.
domingensis, DC. Prod. iii. 171.—Ins. S. Doming.
dumosa, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 53.—Jamaic.
epiphytica, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—N. Granat.

fascicularis, DC. Prod. iii. 170 = Henriettella fascicularis.

glomerata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 96 = Ossaea glomerata.

Grisebachii, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Jamaic.

guadalupensis, DC. Prod. iii. 170.—Ins. Guadalup.
haeretica, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 100 = Oxymeris cornoides.

heteronervis, Naud. l. c. 98 = Ossaea heteronervis.
heteroneura, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Bras.

hirsuta, DC. Prod. iii. 171 = Ossaea hirsuta.

hirtella, DC. l. c. = Ossaea hirtella.

lanata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 97 = Ossaea lanata.

latifolia, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Ind. occ.

Lima, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 99 = Ossaea Lima.

Lindeniana, Naud. l. c. 96 = Ossaea scabrosa.

SAGRAEA :—

macrandra, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 46.—Cuba.
melanophyllum, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Bras.
microphylla, DC. Prod. iii. 171 = Ossaea microphylla.

minutiflora, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Bras.

neurocarpa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 94 = Octopleura micrantha.

obliqua, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Peruv.

ossaeaeformis, Triana, l. c. 138.—Ind. occ.

pauciflora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 100 = Calycogonium echinatum.

penninervis, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Cuba.

petiolata, Triana, l. c. = Clidemia Deppeana.

pilosa, DC. Prod. iii. 171.—Jamaic.

platyphylla, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Bras.

plumosa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 93.—Jamaic. ; Venezuela.

polystachya, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Porto Rico.

racemifera, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 91, 102 = Miconia racemifera.

rariflora, DC. Prod. iii. 171.—Venezuela.

rubinervis, Sauv. Fl. Cub. 47 = domingensis.

rubra, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137 = Clidemia rubra.

salicifolia, Triana, l. c.—Ins. Trinit.

scabrida, DC. Prod. iii. 170 = Henriettella fascicularis.

scabrosa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 97 = Ossaea glomerata.

scabrosa, Seem. Bot. Voy. Herald, 124 = Henriettella Seemannii.

scalpta, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 95 = Ossaea scalpta.

serpens, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—N. Granat.

sessiliflora, DC. Prod. iii. 170 = Clidemia rubra.

sessiliflora, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Am. trop.

sparsiflora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 98 = Henriettella lateriflora.

sparsiflora, Wawra, Bot. Reis. Maximil. 24 = Henriettella umbelluliflora.

tetragona, DC. Prod. iii. 171.—Ins. Dominic.

trichotoma, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Cuba.

trinitensis, Triana, l. c. 137.—Ins. Trinit.

umbrosa, DC. Prod. iii. 171.—Ind. occ.

virgata, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 52.—Jamaic.

Wrightii, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Cuba.

SAGUERUS, Adans. Fam. ii. 24 (1763) = **Arenga**, Labill. (Palm.).

americanus, H. Wendl. in Kerch. Palm. 256 = Mauritia flexuosa.

australasicus, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 219.—Austral.

Gamuto, Houtt. Handleid. i. 410. t. 4. f. 2 = A. saccharifera.

Langbak, Blume, Rumphia, ii. 131. tt. 96, 125.—Malaya.

Rumphii, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 626 = A. saccharifera.

saccharifer, Blume, Rumphia, ii. 128. t. 123-124 = A. saccharifera.

Westerhoutii, H. Wendl. & Drude, in Kerch. Palm. 256 = A. obtusifolia.

Wightii, H. Wendl. & Drude, l. c. = A. Wightii.

SAGUS, Rumph. ex Gaertn. Fruct. i. 27 (1788) = **Metroxylon**, Rottb. (Palm.).

americana, Poir. Encyc. vi. 395 = Mauritia Sagus.

amicum, H. Wendl. in Bot. Zeit. xxxvi. (1878) 115.—Ins. Pacif.

elata, Reinw. ex Blume, Rumphia, ii. 156. t. 128. f. 1 = Pigafettia elata.

farinifera, Gaertn. Fruct. ii. 186 = Raphia pedunculata.

flaris, Blume, Rumphia, ii. 154. t. 128 = Pigafettia flaris.

filifera, Gisek. Prael. 94.—Ind. or.

gemina, Steud. Nom. ed. II. ii. 492, sphalm. = genuina, Labill.

SAGUS :—

genuina, Gisek. Prael. 94 = Metroxylon Sagus.

genuina, Labill. ex Blume, Rumphia, ii. 153 = M. micracanthum.

hospita, Kerch. Palm. 162, in adnot.—Hab. ?

inermis, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 623 = M. Sagus.

Koenigii, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 19 = M. Sagus.

laevis, Jack, in Malay. Misc. iii. [1823?] 9; Blume, Rumphia, ii. 147. tt. 86, 126, 127 = M. Sagus.

longispina, Blume, l. c. 154 = M. longispinum.

micracantha, Blume, l. c. 153 = M. micracanthum.

microcarpa, Zipp. ex Hall, Bijdr. Nat. Wet. v. (1830) 178, nomen = Pigafettia filaris.

microserma, Zipp. ex Hall, l. c. 178 = Pigafettia filaris.

Palma-pinus, Gaertn. Fruct. i. 27. t. 10 = Raphia Gaertneri.

pedunculata, Poir. Encyc. Suppl. v. 13 = Raphia pedunculata.

Raphia, Poir. l. c. vi. 395 = Raphia vinifera.

Ruffia, Jacq. Fragm. 7 = Raphia pedunculata.

Rumphii, Willd. Sp. Pl. iv. 404 = M. Sagus.

spinosa, Roxb. Hort. Beng. 68, nomen = M. Sagus ?

sylvestris, Blume, Rumphia, ii. 153 = Pigafettia elata.

taedigera, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 54. t. 45 = Raphia vinifera.

vinifera, Pers. Syn. ii. 562 = Raphia vinifera.

vitiensis, H. Wendl. in Seem. Viti, App. 444; et in Fl. Vit. 279. t. 80 = M. vitiense.

SAHAGUNIA, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 316. **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 377.

ACANTHINOPHYLLUM, Fr. Allem. in Rev. Brazil. i. (1858) 368.

mexicana, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 316.—Mexic.

SAHLBERGIA, Reichb. Consp. 95 (1828) = **SALHBERGIA**, Neck. = **Gardenia**, Ellis (Rubiace.).

SAINTLEGERIA, Cordem. in Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 300 = **Chloranthus**, Sw.

gracilis, Cordem. ex Baill. l. c.—China.

SAINTMORYSIA, Endl. Gen. 438 (1838) = **Athanasia**, Linn. (Compos.).

pachyphylla, Walp. Rep. vi. 211 = A. dentata.

SAIRANTHUS, G. Don, Gen. Syst. iv. 467 (1837) = **Nicotiana**, Linn. (Solan.).

glutinosus, G. Don, l. c. = N. glutinosa.

SAIROCARPUS, Nutt. ex A. DC. in DC. Prod. x. 592 (1846) = **Antirrhinum**, Tourn. (Scrophul.).

californicus, Nutt. l. c. = A. Nuttallianum.

SAIVALA, Jones, in As. Res. iv. (1799) 275 = **Blyxa**, Noronha (Hydroch.).

valisnerioides, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5047 = B. Saivala.

SAJORIUM, Endl. Gen. Suppl. iii. 98 (1843) = **Plukenetia**, Linn. (Euphorb.).

africanum, Baill. Etud. Gén. Euph. 483.—Afr. austr.

corniculatum, Baill. l. c. 484 = P. corniculata.

corniculatum, D. Dietr. Syn. Pl. v. 331.—Java.

tamnoides, Baill. Etud. Gén. Euph. 484 = P. tamnoides.

volubile, Baill. l. c. 483 = P. volubilis.

SAKERSIA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 757 (1867). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.

africana, Hook. f. l. c.—Afr. trop.

echinulata, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 458.—Afr. trop.

SALABERTIA, Neck. Elem. ii. 238 (1790) = **Tapiria**, Juss. (Anacard.).

SALACCA, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 3 = **Zalacca**, Rumph. (Palm.).

edulis, Reinw. l. c. = Z. edulis.

SALACIA, Linn. Mant. ii. 159, 293 (1771). *CELAS-TRINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 370.
 ANTHODISCUS, Endl. Gen. 1091, in syn. (1841).
 ANTHODON, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 45 (1798).
 ANTHODUS, Mart. in Schult. Mant. i. 253, 348 (1822).
 CALYPSO, Thou. Hist. Vég. Afr. i. 33. t. 6 (1805).
 CLERCIA, Vell. Fl. Flum. i. tt. 73, 74 (1827).
 CUSTINIA, Neck. Elem. ii. 223 (1790).
 DIPLESTHES, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 19.
 JOHNSIA, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 172 (1820).
 KIPPISIA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 414, 416.
 MACAHANEA, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 6. t. 371 (1775).
 MACANEA, Juss. Gen. 257 (1789).
 PERITASSA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 402.
 PYRAMIDOSTYLUM, Mart. ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 155 (1878).
 RADDIA, Spreng. Syst. i. 177, in syn. (1825).
 RADDISIA, Leandro, in Denkschr. Akad. Muench. vii. (1821) 237. t. 15.
 SARCOCAMPSA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 408.
 TONSELLA, Schreb. Gen. 34 (1789).
 TONTELEA, Aubl. Pl. Gui. i. 31. t. 10 (1775).
affinis, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 281 = senegalensis.
affinis, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 159.—Bras.
africana, DC. Prod. i. 570.—Afr. trop.
alternifolia, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 306.—Afr. austr.
amygdalina, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 159.—Bras.
anomala, Peyr. l. c. 144.—Bras.
arbores, Peyr. l. c. 156 = undulata.
attenuata, Peyr. l. c. 149.—Bras.
brachypoda, Peyr. l. c. 150.—Bras.
brasilensis, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
Brunoniana, Wight & Arn. Prod. 105.—Ind. or.
Buddinghii, Scheff. in Flora, lii. (1869) 306; *et in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 16.—Java.
Calypso, DC. Prod. i. 571.—Madag.
calypsoides, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 107.—Bras.
campestris, Walp. Rep. i. 402.—Bras.
capilliflora, Sagot, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 134 = Hippocratea comosa.
celebica, Blume, Rumphia, iv. 19.—Ins. Celebes.
cerasifera, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 376.—Afr. trop.
cerasiformis, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 219.—Java.
chinensis, Linn. Mant. ii. 293 = Roxburghii?
chlorantha, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 375.—Afr. trop.
cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. 526 = Roxburghii?
cognata, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 144.—Bras.
conferta, Peyr. l. c. 159.—Bras.
cornifolia, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 281.—Afr. trop.
coromandeliana, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 392, nomen.—Ind. or.
crassifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
debilis, Walp. Rep. i. 402.—Afr. trop.
decussata, G. Don, Gen. Syst. i. 627 = Hippocratea decussata.
densiflora, Wall. Cat. n. 4224.—Ind. or.; Burma.
dentata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 334.—Madag.
diandra, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 151.—Ins. Celebes.
diandra, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 53, 407 = reticulata.
dichotoma, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 581.—Hab.?
diffusiflora, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 143.—Bras.
distincta, Peyr. l. c. 151.—Bras.
Ducis-Wuertembergiae, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 307.—Afr. trop.
dulcis, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 9.—Bras.
elegans, Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 373.—Afr. trop.
elliptica, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
elongata, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 282.—Afr. trop.
erecta, Walp. Rep. i. 403.—Afr. trop.

SALACIA :—
erythroxyloides, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 160 = elliptica.
evonymiflora, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 149.—Java.
exsculpta, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Sumatra.
Finlaysonii, Wall. Cat. n. 4220.—Siam.
flavescens, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 300.—Burma; Penang.
floribunda, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 97.—Ins. Comor.
floribunda, Wight, Illustr. i. 134 = densiflora.
fluminensis, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 149.—Bras.
fruticosa, Wall. Cat. n. 4223.—Ind. or.
glomerata, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
grandiflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 300.—Burma; Penang.
grandiflora, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 157.—Bras.
grandifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
Griffithii, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 628.—Ind. or.
guianensis, Klotzsch, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 158 = lacunosa.
hippocrateoides, Peyr. l. c. 142.—Bras.
javanensis, Blume, Bijdr. 219.—Java.
Jenkinsii, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1875) ii. 203.—Assam.
kalahiensis, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Borneo.
Korthalsiana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 152.—Java.
Kraussii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 230 = alternifolia.
lacunosa, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 158.—Guian.
laevigata, DC. Prod. i. 570.—Hab.?
laevigata, Wight, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 295. Suppl. t. 36 = Hippocratea obtusifolia.
lanceolata, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 424.—Java.
latifolia, Wall. Cat. n. 4222.—Singapore.
laxiflora, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 145.—Bras.
leptoclada, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 96.—Ins. Comor.
Lobbii, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 626.—Singapore.
longifolia, Hook. f. ex M. Laws. l. c. —Malaya.
longifolia, Wall. Pl. As. Rar. iii. 47. t. 278; Cat. n. 4225 = densiflora.
lucida, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 373.—Afr. trop.
macrocarpa, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Borneo.
macrophylla, Blume, Bijdr. 221.—Cochinch.; Java.
macrophylla, Miq. Stirp. Surin. Sel. 85.—Guian.
macroperma, Wight, Spicil. Neilgherr. i. 28. t. 32; Ic. t. 962.—Ind. or.
madagascariensis, DC. Prod. i. 570.—Madag.
Maingayi, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 626.—Penang.
Mannii, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 376.—Afr. trop.
Martiana, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 146.—Bras.
melitocarpa, Blume, Bijdr. 220.—Java.
membranacea, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 627.—Reg. Himal.
memecyloides, Wall. Cat. n. 4218 = verrucosa.
micrantha, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
Miersii, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 147.—Bras.
multiflora, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 109 = Hippocratea ovata.
multiflora, DC. Prod. i. 570.—Guian.
multiflora, Wight, Illustr. i. 134 = polyantha, Steud.
myrtifolia, Griff. Notul. iv. 470.—Burma.
oblonga, Wall. Cat. n. 4226.—Ind. or.
oblongifolia, Blume, Bijdr. 220.—Java.
oblongifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 628 = elliptica.
oblongifolia, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 374.—Afr. trop.
oblongifolia, Rottl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 492 = oblonga.
obovata, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 96 = multiflora.
obtusifolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 105.—Bras.
oleoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 334.—Madag.

SALACIA :—
oppositifolia, Rottl. ex M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 628 = oblonga.
ovalis, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Java.
ovalis, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 627.—Malacca.
pachyphylla, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 158.—Guian.
pallidescens, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 376.—Afr. trop.
Pancheri, Baill. Adansonia, x. (1872) 184.—N. Caled.
paniculata, G. Don, Gen. Syst. i. 627.—Bras.
paniculata, Wall. Cat. n. 4214 B, partim = Hippocratea Grahami.
parviflora, Sagot, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 143.—Guian.
patens, Decne. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 492.—Ins. Timor.
patens, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 374.—N. Granat.
platyphylla, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1875) ii. 203.—Ins. Nicobar.
podopetala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 581 = prinoides.
polyantha, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Borneo.
polyantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 492.—Burma.
pomifera, Wall. Cat. n. 4227 = oblonga.
pomifera, Wight, Arn. Prod. 105 = densiflora.
prinoides, DC. Prod. i. 571.—Ind. or.
pruinosa, Seem. Bot. Voy. Herald, 90 (Hippocrateae sp.).—Panama.
pyriformis, Steud. Nom. ed. II. ii. 492; Walp. Rep. i. 402.—Afr. trop.
Radula, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
reticulata, Wight, Illustr. i. 134.—Ind. or.
Richardii, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 148.—Guian.
Riedeliana, Peyr. l. c. 147.—Bras.
Roxburghii, Wall. Cat. n. 4217.—Ind. or.
rubra, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 627.—Malacca.
rufescens, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 283.—Afr. trop.
rugosa, Wall. Cat. n. 4228.—Ind. or.
rugulosa, Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xi. (1881) 174.—Guian.
saigonensis, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 272.—Cochinch.
scabra, DC. Prod. i. 570.—Guian.
scandens, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 148.—Am. trop.
senegalensis, DC. Prod. i. 570.—Afr. trop.
servata, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 109.—Bras.
sinensis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 26 = prinoides.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 107 = chinensis.
sinensis, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 47 (Quid?).—Ins. Philipp.
sororia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 151.—N. Guin.
sylvestris, Steud. Nom. ed. II. ii. 92; Walp. Rep. i. 402.—Bras.
tenuicula, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 146.—Bras.
terminalis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 407 = Hippocratea Arnottiana.
tortuosa, Griff. Notul. iv. 471; Ic. Pl. Asiat. t. 581. f. 2.—Burma.
trigonocarpa, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 96.—Madag.
trinervia, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.
triplinervis, Llanos, in Mem. Acad. Cienc. Mad. ii. (1859) 500.—Hab.?
undulata, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 107.—Bras.
Vahlana, Cambess. l. c. 105, in adnot.—Ins. Trinit.
velutina, Cambess. l. c. 108.—Bras.
verrucosa, Wight, Illustr. i. 134.—Burma; Ins. Philipp.
verrucosa, Wright, ex Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 172, in syn.—Cuba.
viminea, Wall. Cat. n. 7267.—Burma.
viridiflora, Payer, Organog. 164. t. 35. f. 1-13.—Hab.?
Wightiana, Wall. Cat. n. 4221 = prinoides.
Zeyherii, Spreng. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 230.—Afr. austr.

SALACISTIS, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 36 = *Hetaeria*, Blume (Orchid.).
novembrilis, Reichb. f. l. c.—Java.

SALAKKA, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 112 (1823) = **Zalacca**, Rumph. (Palm.).
edulis, Reinw. l. c. = *Z. edulis*.

SALAXIS, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 317. **ERICACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 594.
COCOSPERMA, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 215.

LAGENOCARPUS, Klotzsch, l. c. (1838).
abietina, Willd. Enum. Hort. Berol. 415 = *Philippia abietina*.
arborescens, Willd. l. c. 415 = *Philippia arborescens*.
aristata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1261 = *Philippia aristata*.
artemisioides, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 212.—Afr. austr.
axillaris, Salisb. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 828.—Afr. austr.
brachyphylla, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1261 = *Philippia brachyphylla*.
brevifolia, D. Dietr. l. c. = ciliata.
Chamissonis, D. Dietr. l. c. 1269 = *Philippia Chamissonis*.
ciliata, Benth. in DC. Prod. vii. 711.—Afr. austr.
ciliata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia ciliata*.
densa, D. Dietr. l. c. = *Philippia densa*.
flexuosa, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 213.—Afr. austr.
floribunda, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia floribunda*.
galioides, D. Dietr. l. c. = *Philippia galioides*.
Goudotiana, D. Dietr. l. c. = *Philippia Goudotiana*.
gracilis, D. Dietr. l. c. 1261 = *Ericinella gracilis*.
hexandra, Klotzsch, in *Linnaea*, ix. (1834) 352.—Afr. austr.
imbricata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 319, 493 = *Philippia abietina*.
Leeana, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia Leeana*.
mauritanica, Boj. ex Wall. Cat. n. 1525 = *Philippia abietina*.
micrantha, Benth. in DC. Prod. vii. 711.—Afr. austr.
montana, Boj. Hort. Maurit. 195 = *Philippia brachyphylla*.
montana, Willd. Enum. Hort. Berol. 415 = *Philippia montana*.
multiflora, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1261 = *Ericinella multiflora*.
octandra, Klotzsch, in *Linnaea*, ix. (1834) 353.—Afr. austr.
parviflora, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia parviflora*.
puberula, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 212.—Afr. austr.
ramosissima, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia ramosissima*.
rugosa, Benth. in DC. Prod. vii. 711.—Afr. austr.
Sieberi, Benth. l. c.—Afr. austr.
tenuifolia, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia tenuifolia*.
tenuissima, D. Dietr. l. c. 1261 = *Philippia tenuissima*.
viscosa, D. Dietr. l. c. = *Philippia viscosa*.

SALAZARIA, Torr. in Bot. Mex. Bound. 133. t. 39 (1858). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1201.
mexicana, Torr. l. c.—Mexic.

SALCEDA, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 374 (1854) = **Camellia**, Linn. (Ternstr.).
montana, Blanco, l. c. = *C. lanceolata*.

SALDANHA, Vell. Fl. Flum. 141 (1825); Ic. iii. tt. 157, 158 (1827) = **Hillia**, Jacq. (Rubiaceae).
illustris, Vell. l. c. 142; iii. t. 157.—Bras.
nobilis, Vell. l. c. t. 158.—Bras.

SALDANHAEAE, Bur. in Baill. Adansonia, viii. (1867–68) 354. tt. 7, 11, 12. **BIGNONIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1035.
confertiflora, Bur. l. c. 356.—Bras.
lateriflora, Bur. l. c.—Bras.

SALDINIA, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 206. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 129.
Pseudomorinda, A. Rich. l. c. 206.—Madag.

SALGADA, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 221 (1845) = **Eusideroxylon**, Teijsm. & Binn. (Laurin.).
lauriflora, Blanco, l. c. = *E. Zwageri*.

SALHBERGIA, Neck. Elem. i. 262 (1790) = **Gardenia**, Ellis (Rubiaceae).

SALICA, Hill, Hort. Kew. 172/24 (1768) = **Lythrum**, Linn.
Lythastrum, Hill, l. c. = *L. Thymifolia*.

SALICARIA, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752) = **Lythrum**, Linn.
Graefferi, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 86, 493 = *L. Hyssopifolia*.
Hyssopifolia, Lam. Fl. Fr. iii. 103 = *L. Hyssopifolia*.
Hyssopifolia, Moench, Meth. Suppl. 231 = *L. Salicaria*.
spicata, Lam. Fl. Fr. iii. 103 = *L. Salicaria*.
Thymifolia, Lam. l. c. 104 = *L. Thymifolia*.
virgata, Moench, Meth. 665 = *L. virgatum*.
vulgaris, Moench, l. c. = *L. Salicaria*.

SALICORNIA, [Tourn.] Linn. Sp. Pl. ed. I. 357 (1737).
CHENOPODIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 66.
SARCATHRIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836).
acetaria, Pall. Illustr. tt. 1, 2. f. 1 = herbacea.
Alpini, Lag. Mem. Pl. Barrill. 48 = fruticosa.
ambigua, Michx. Fl. Bor. Am. i. 2 = fruticosa.
amplexicaulis, Vahl, Symb. Bot. ii. 1 = *Haloepelis amplexicaulis*.
anceps, Lag. Mem. Pl. Barrill. 52 = fruticosa.
annua, Sm. Engl. Bot. t. 415 = herbacea.
appressa, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1866) 333.—Europ.
arabica, Linn. Sp. Pl. 3 = fruticosa.
arabica, Pall. Reise, i. 481 = *Kalidium caspicum*.
arabica, Raddi, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 157 = *Suaeda fruticosa*.
Arbuscula, R. Br. Prod. 411 = *Arthrocnemum arbusculum*.
Arbuscula, DC. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 151 = fruticosa.
Arbuscula, Moric. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 493 = *Arthrocnemum glaucum*.
australis, Soland. ex Forst. f. Prod. 88.—Austral.
Bergii, Lor. & Niederl. in Roca, Exped. Rio-Negro, ii. 194.—Patag.
bidens, Benth. Fl. Austral. v. 204.—Austral.
biennis, Afzel. ex Sm. Fl. Brit. i. 2 = herbacea.
Bigelowii, Torr. Bot. Mex. Bound. 184.—Am. bor.
brachiata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 1019 = *Arthrocnemum ciliolatum*.
brachiata, Roxb. Hort. Beng. [79]; Fl. Ind. i. 84.—Ind. or.
californica, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 151 = *Arthrocnemum fruticosum*.
caspica, Linn. Sp. Pl. 4 = *Kalidium caspicum*.
caspica, Pall. Reise, i. 480 = *Halostachys caspica*.
cinerea, F. Muell. Fragm. vi. 251.—Austral.
corticosa, Walp. ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 60 = *Gaudichaudiana*.
cruciata, Coqueb. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 310 = herbacea.
cruciata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 2 = *Halocnemum strobilaceum*.
Doeringii, Lor. & Niederl. in Roca, Exped. Rio-Negro, ii. 194.—Patag.
drepanensis, Tineo, ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 338 = *Halocnemum strobilaceum*.
Emerici, Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 176 = herbacea.
equisetifolia, Willd. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 145 = fruticosa.
europaea, Linn. Sp. Pl. 3 = fruticosa, herbacea.
falcata, J. F. Gmel. Syst. 1618, sphalm. = *foliata*.
fastigiata, Losc. & Pard. Ser. Inconf. Pl. Arag. ed. I. 90 = *Microcnemum fastigiatum*.
foliacea, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 610 = *Kalidium foliatum*.
foliata, Pall. Reise, i. 482 = *Kalidium foliatum*.
foliosa, Vahl, Enum. i. 12 = *Kalidium foliatum*.
frutescens, Friedrich. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 296 = fruticosa.
fruticosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 5.—Europ.; Afr. bor.
fruticosa, Moq. Chenop. Enum. 112 = *Halocnemum strobilaceum*.
fruticosa, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. II. 1 = herbacea.
fruticosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 1 = *Arthrocnemum glaucum*, macrostachyum.
fruticulosa, Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. (1827) 280 = fruticosa.

SALICORNIA :—

Gaudichaudiana, Moq. Chenop. Enum. 115.—Bras.
glaucua, Delile, Fl. Egypt. Illustr. 69 = *Arthrocnemum glaucum*.
glaucua, Sieber, ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 338 = *Halocnemum strobilaceum*.
glaucua, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 8 = fruticosa?
herbacea, Fée, ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 296 = fruticosa.
herbacea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 5.—Europ.
indica, R. Br. Prod. 411 = australis.
indica, Drège, Zwei Pfl. Docum. 159, 217 = *natalensis*.
indica, Ritt. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 333 = *Heterostachys Ritteriana*.
indica, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. ii. (1799) 111. t. 4. f. 4 = *Arthrocnemum indicum*.
intermedia, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 110 = herbacea.
leioestachya, Benth. Fl. Austral. v. 203.—Austral.
lignosa, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 111 = fruticosa?
macedonica, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 48 = herbacea.
macrostachya, Moric. Fl. Venet. i. 2 = *Arthrocnemum glaucum*.
megastachya, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 113.—Europ.
mucronata, Bigel. Fl. Bost. ed. III. 2 = *Bigelowii*.
mucronata, Lag. Mem. Pl. Barrill. 58 = *Arthrocnemum glaucum*.
natalensis, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 62.—Afr. austr.
Neei, Lag. Mem. Pl. Barrill. 51 = fruticosa.
nodulosa, Delile, Fl. Egypte, 147 = *Haloepelis amplexicaulis*.
pachystachya, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 51.—Madag.
Pallasiana, C. A. Mey. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 321 = *Kalidium foliatum*.
Pallasii, C. A. Mey. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 361 = *Kalidium caspicum*.
patula, Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 175 = herbacea.
peregrina, Weinm. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 309 = herbacea.
perennans, Willd. Sp. Pl. i. 24 = herbacea.
perennis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = herbacea.
perfoliata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 3 = *Haloepelis perfoliata*.
peruviana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 193 = fruticosa.
procumbens, Sm. Engl. Bot. t. 2475 = herbacea.
prostrata, Pall. Illustr. t. 3 = herbacea.
pusilla, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 110 = herbacea.
pygmaea, Pall. Illustr. i. 8. t. 2. f. 2 = *Haloepelis pygmaea*.
quinqueflora, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 59 = australis.
radicans, Mert. & Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. ed. III. i. 292 = herbacea.
radicans, Sm. Engl. Bot. t. 1691 = fruticosa.
ramosissima, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 110 = herbacea.
robusta, F. Muell. Fragm. vi. 251 = *Pachycornia robusta*.
Salsola, Coqueb. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 310 = herbacea.
sarmentosa, Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 174 = fruticosa.
sempervirens, Sauvages, ex Steud. Nom. ed. I. 714 = fruticosa.
simplex, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 7 = virginica.
stricta, Willd. ex Steud. Nom. ed. I. 714 = herbacea.
strobilacea, Delile, Fl. Egypte. t. 3. f. 2 = *Haloepelis amplexicaulis*.
strobilacea, Gaertn. Fruct. ii. 210. t. 127. f. 8 = *Kalidium foliatum*.
strobilacea, Pall. Reise, i. 481 = *Halocnemum strobilaceum*.
tenuis, Benth. Fl. Austral. v. 204.—Austral.
virginica, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 2 = *Arthrocnemum glaucum*.
virginica, Linn. Sp. Pl. 4 (virginia).—Am. bor.
virginica, Nutt. Gen. Am. i. 2 = *Bigelowii*.
virginica, Scholler, Barb. Suppl. 311 = fruticosa.

SALIMORI, Adans. Fam. ii. 177 (1763) = *Cordia*?, Linn. (Borag.).

SALIOIA, Schwag. ex Leplay, in D  mid. Voy. Russ. M  r. ii. 236 (1842) = *Salsola*?, Linn. (Chenop.).
Loeslii, Schwag. l. c. (Quid ?)—Ross.

SALISBURIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 330 = *Ginkgo*, Linn. (Conif.).
adiantifolia, Sm. l. c. = *G. biloba*.
Billardieri, Rich. ex Carr. Conif. ed. I. 500 = *Phyllocladus rhomboidalis*.
biloba, Hoffmgg. Verz. Pfl. 109 = *G. biloba*.
Ginkgo, Rich. Conif. 133. t. 3^{bis} = *G. biloba*.
macrophylla, Reyn. Cat. S  n  cl. (1854) 40 = *G. biloba*.

SALISBURYA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 109 (1824) = praec.

SALISIA, Lindl. Swan River App. 10 (1839) = *Kunzea*, Reichb. (Myrtac.).
pulchella, Lindl. l. c. = *K. sericea*.

SALISIA, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 373 = *Xanthostemon*, F. Muell. (Myrtac.).
aurantiaca, Panch. l. c. (= *Fremya aurantiaca*).—N. Caled.
flava, Panch. l. c. (= *Fremya flava*).—N. Caled.
rubra, Panch. l. c. = *X. rubrum*.
rugosa, Panch. l. c. 374 = *X. Pancheri*.

SALISIA, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 179 = *Gloxinia*, L'H  rit. (Gesner.).
gloxiniaeflora, Regel, l. c. = *G. maculata*.
maculata, Regel, in Bot. Zeit. ix. (1851) 894 = *G. maculata*.
pallidiflora, Regel, l. c. = *G. maculata*.
suaveolens, Regel, l. c. = *G. maculata*.

SALIX. [Tourn.] Linn. Syst. ed I (1735); Gen. ed. I. 300 (1737). *SALICINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 411.

AMERINA, ARGORIPS, BIGGINA, DIAMARIPS, DIPLIMA, DIPLUSION, NECTOLIS, NECTOPIX, NECTUSION, NESTYLIX, OISODIX, PLEIARINA, PSATHERIPS, RIPSLEXIS, RIPSOTIS, SOKOLOFIA, TELESMA, URNECTIS, USIONIS, VETRIX, VIMEN, Rafin. Alsog. Am. 13-15 (1838).
CAPRAEA, Opiz, Seznam. 25 (1852).
GRUENERA, Opiz, l. c. 48 (1852).
KNAFIA, Opiz, l. c. 56 (1852).
LUSEKIA, Opiz, l. c. 61 (1852).

acmophylla, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 98.—Oriens; Ind. or.

acuminata, Lange, Dansk. Fl. ed. II. 658 = *Smithiana*.
acuminata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 14; Pall. Fl. Ross. ii. 81 = *cinerea*.

acuminata, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 21 = *grandifolia*.

acuta, Szub. Spis Drzew. Krzew. Krol. Polsk. 136.—Polonia.

acutifolia, Borrer, ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 150 = *boganidensis*?

acutifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 668 = *daphnoides*.

adenophylla, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 146.—Labrador.

adscendens, Sm. Engl. Bot. t. 1962 = *repens*.

aegyptiaca, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvi, 170 (an seq. ?)—Aegypt.

aegyptiaca, Linn. Cent. Pl. i. 32; Amoen. Acad. iv. 295 = *S. Safsaf*.

aegyptiaca, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6 = *capensis*.

affinis, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 132 = *Smithiana*.

affinis, Schur, Enum. Pl. Transs. 619 = *incana*.

aglaia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 501 = *daphnoides*.

ajanensis, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 107 = *sitchensis*.

alataica, Kar. ex Stsch  gl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 197 = *subcordata*.

alaternoides, Forbes, Salict. Woburn. 151. t. 76 = *Lapponum*.

alaternoides, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 68 = *nigricans*.

alba, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 183 = *hexandra*.

alba, Linn. Sp. Pl. 1021.—Europ.; As. et Afr. bor.

alba, Thunb. Fl. Jap. 25 = *Thunbergiana*.

Alberti, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 463.—As. centr.

SALIX :—

albescens, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 68 = *nigricans*.

albicans, Bonjean, ex Ser. l. c. 21 = *grandifolia*.

albida, Schleich. ex Ser. l. c. 31 = *glauca*.

albiphila, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 196 = *Lapponum*.

albovirens, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 127 = *nigricans*.

alnoides, Schang. & Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 347, 349 = *pyrolaeifolia*.

alopcuroides, Tausch, Ind. Hort. Canal. (1821); ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 = *triandra*.

alpestris, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 129 = *ovata*.

alpestris, Wulf. ex Willd. Sp. Pl. iv. 680 = *S. Arbuscula*.

alpigena, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 369 = *retusa*.

alpina, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 255 = *S. Arbuscula*, Myrsinites.

altaica, Lundstr. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. (1877) 36.—Sibir. altaic.

Amandae, Anderss. in DC. Prod. xvi. 11. 288 = *glauca*.

Amaniana, Willd. Sp. Pl. iv. 663 = *nigricans*.

ambigua x, Ehrh. Beitr. vi. 103.—Europ.

ambigua, Pollini, Fl. Veron. iii. 162 = *cinerea*.

ambigua, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 617 = *nigra*.

ambigua, Salisb. Prod. 394 = *aurita*.

ambigua, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 40 = *repens*.

americana, Walp. Ann. v. 747 = *lanata*.

amigdalina, Vill. Fl. Delphin. 109 = *triandra*.

amplexicaulis, Bory & Chaub. Fl. P  lop. 64. t. 36 = *purpurea*.

amygdalifolia, Gilib. Exercit. ii. 406 = *triandra*.

amygdalina, Boiss. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. 11. 211 = *alba*.

amygdalina, Linn. Sp. Pl. 1016 = *triandra*.

amygdaloides, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 114 = *nigra*.

Andersoniana, Sm. Engl. Bot. t. 2343 = *nigricans*.

androgyna, Hoppe, ex Willd. Sp. Pl. iv. 654 = *triandra*.

androgyna, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 11. 523.—Europ.

Anglorum, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 541 = *phlebophylla*.

angustata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 613 = *cordata*.

angustifolia, Poir. in Duham. Arb. ed. Nov. iii. 125 = *incana*.

angustifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 699.—Oriens; As. bor.

angustifolia, Wulf. in Jacq. Coll. iii. 48 = *repens*.

annularis, Forbes, Salict. Woburn. 41. t. 21 = *babylonica*.

Ansoniana, Forbes, l. c. 213. t. 107 = *nigricans*.

apiculata, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 470 = *tetrasperma*.

apoda, Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 37.—Reg. Caucas.

appendiculata, Vahl, in Fl. Dan. t. 1056 = *glauca*.

appendiculata, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 775 = *grandifolia*.

aquatica, Lam. Fl. Fr. ii. 231 = *S. Caprea*?

aquatica, Ser. Ess. Saul. 20 = *aurita*.

aquatica, Sm. Fl. Brit. 1065; Engl. Bot. t. 1437 = *cinerea*.

arborescens, Hartig, Lehrb. Forstl. Pfl. 23; ex Wimm. Sal. Europ. 167, 169 = *purpurea*, *oxycarpa*.

Arbuscula, Anderss. in DC. Prod. xvi. 11. 292 = *fruticulosa*.

Arbuscula, Linn. Sp. Pl. 1018.—Europ.; As. bor.

Arbuscula, Pall. Fl. Ross. ii. 83 = *myrtilloides*.

Arbuscula, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 771 = *hastata*.

Arbuscula, Wahlenb. in Fl. Dan. t. 1055 = *phylicifolia*.

arbusculoides, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 147.—Am. arct.

arbutifolia, Pall. Fl. Ross. i. 11. 79 = *hastata*.

arbutifolia, Ser. Ess. Saul. 44 = *S. Myrsinites*.

arbutifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 682.—Europ.

arctica, Pall. Fl. Ross. i. 11. 86.—Reg. arct.

arenaria, Linn. Sp. Pl. 1019 = *repens*.

arenaria, Willd. Sp. Pl. iv. 689 = *Lapponum*.

argentea, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 395.—Am. bor.

argentea, Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiii. (1850) 11. 528.—Rossia.

argentea, Sm. Fl. Brit. 1059 = *repens*.

SALIX :—

argophylla, Nutt. N. Am. Sylva, i. 71. t. 20 = *longifolia*.

arguta, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 32 = *lasiantra*.

argyrocampa, Anderss. l. c. 107.—Am. bor.

asplenifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 1. 540 = *incana*.

atrocinerea, Brot. Fl. Lusit. i. 31 = *cinerea*.

atropurpurea, Forbes, Salict. Woburn. 284 = *nigricans*.

atrovirens, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = *nigricans*.

attenuata, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 246 = *grandifolia*.

aubonnensis, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65 = *nigricans*.

aurea, Salisb. Prod. 393 = *alba*.

auriculata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *triandra*.

aurigerana, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 598 = *S. Caprea*.

aurita, Host, Sal. 23-25 = *nigricans*.

aurita, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ.; As. bor.

auritoides, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 257 = *purpurea*.

Aurora, Laestad, ex Anderss. in Bot. Notiser (1866), 147 = *fuscescens*.

Austinae, Bebb, in Bot. Calif. ii. 88.—Calif.

australior, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 43 = *fragilis*.

australis, Forbes, Salict. Woburn. 205. t. 103 = *cinerea*.

australis, Hilsenb. & Boj. ex Fries, Mant. i. 77 = *madagascariensis*.

australis, Schleich. ex Spreng. Pugill. ii. 88 = *nigricans*.

austriaca, Host, Sal. 19. t. 64 = *purpurea*.

axillaris, Anderss. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 275 = *S. Safsaf*.

Azaolana, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 539 = *tetrasperma*.

babylonica, Linn. Sp. Pl. 1017.—Reg. Caucas.; As. bor.

badensis, Doell, Fl. Bad. 519 = *nigricans*.

baicalensis, Turcz. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. 11. 276 = *speciosa*.

balsamifera, Barratt, ex Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 125 = *discolor*.

Barclayi, Anderss. l. c.—Am. bor.

Barrattiana, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 146. t. 187.—Am. bor.

Basfordiana, Scaling, ex J. Salter, in Gard. Chron. (1882) i. 298.—Gallia.

Baumgarteniana, Schur, Enum. Pl. Transs. 618 = *purpurea*.

bavarica x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxix. (1880) 117.—Europ.

berberifolia, Pall. Reise, iii. 759.—Sibir. altaic.

bicolor, Ehrh. Beitr. v. 162 = *phylicifolia*.

bicolor, Fries, Mant. i. 53 = *livida*.

bifida, Wulf. Fl. Nor. Phan. 780 = *incana*.

bifurcata, Chevall. Fl. Env. Par. ii. 357 = *purpurea*.

Bigelovii, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 139 = *lasiolepis*.

bigemmis, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. 260 = *daphnoides*.

blanda, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 50 = *alba*.

Blumhardtiana, Schimp. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 21 = *S. Safsaf*.

Blyttii, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 210 = *pyrenaica*.

boganidensis, Trautv. in Middend. Reise, i. 11. Bot. 154.—Sibir.

Bonplandiana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 24. t. 101, 102.—Mexic.

borealis, Fries, in Bot. Notiser (1840), 193 = *nigricans*.

Borreri, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 732 = *seq.*

Borreriana, Sm. Engl. Fl. iv. 174 = *phylicifolia*.

brachycarpa, Nutt. N. Am. Sylv. i. 69 = *longifolia*.

brachylepis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 503.—Japan.

brachystachys, Benth. Pl. Hartw. 336.—Am. bor.

bracteata, Anderss. in DC. Prod. xvi. 11. 213 = *seq.*

bracteosa, Turcz. ex Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 77) = *macrolepis*.

Brayi, Ledeb. Fl. Alt. iv. 289 = *berberifolia*.

Brayi, Nym. Consp. 670 = *S. Myrsinites*.

brevijulis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 387.—Sibir. baical.

brevistyla, Richter, in Corresp. Ver. Naturk. Presb. ii. (1863) 196.—Europ.

SALIX:—

- Breweri, *Bebb*, in *Bot. Calif.* ii. 88.—Calif.
 Brownei, *Lundstr.* in *Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* (1877) 6, 8, 12, 37.—Ins. N. Zembla.
 Buergeriana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 28.—Japon.
buxifolia, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 54=Lapponum.
buxifolia, Trev. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 290 = phlebophylla.
caerulea, Sm. Engl. Bot. t. 2431=alba.
caesia, *Vill. Hist. Pl. Dauph.* iii. 768. t. 50.—Gall.; Helv.
californica, *Bebb*, in *Bot. Calif.* ii. 89.—Calif.
calliantha, J. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xv. (1865) 44=purpurea.
callicarpaea, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 295=arctica.
calodendron, Wimm. Sal. Europ. 187=Smithiana.
calophylla, Wall. Cat. n. 9102=tetrasperma?
caloptera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 26.—Japon.
calostachya, *Anderss.* in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* 1850 (1851) 489.—Reg. Himal.
calyculata, *Hook. f. ex Anderss.* in *Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 55.—Reg. Himal.
campestris, Fries, Nov. Mant. ed. II. i. 68=nigricans.
cana, *Mart. & Gal.* in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 344.—Mexic.
canaliculata, Bess. Enum. Pl. Volh. 77=repens.
canariensis, C. Sm. ex Link. in *Buch. Besch. Canar. Ins.* 159.—Marocc.; Ins. Canar.
candida, *Fluegge*, ex *Willd. Sp. Pl.* iv. 708.—Am. bor.
candidula, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67=nigricans.
canescens, Fries, Mant. i. 58=Lapponum.
canescens, Willd. Sp. Pl. iv. 687=oleaefolia.
Canthiana x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 218.—Europ.
cantoniensis, *Hance*, in *Journ. Bot.* vi. (1868) 48.—China.
capensis, *Thunb. Fl. Cap.* i. 139.—Afr. austr.
Caprea, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 201=cinerea.
Caprea, *Linn. Sp. Pl.* 1020.—Europ.; As. bor.
Caprea, Oed. Fl. Dan. t. 245=lanata.
capraeformis, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 217=viminalis.
capreoides, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 120=brachystachys.
capreola, Kern. ex Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. i. 70=S. Caprea.
caprina, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 148=S. Caprea.
Capusii, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xviii. (1884) 251.—Turkestan.
cardiophylla, *Trautv. & Mey.* in *Middend. Reise (Fl. Ochot. 77)*.—As. bor. or.
carinata, Sm. Fl. Brit. 1055=S. Arbuscula.
carinthiaca, Host, Sal. t. 113=cinerea.
carniolica, Host, Fl. Austr. ii. 64=purpurea.
caroliniana, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 226=nigra.
carpinifolia, Schleich. ex Spreng. Pugill. ii. 89=nigricans.
caspica, Hort. ex Willd. Sp. Pl. iv. 668=daphnoides.
caspica, Pall. Fl. Ross. i. ii. 74=volgensis.
caucasica, Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. i. 68=silesiaca.
cerasifolia, Goldb. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 608=nigricans.
cerasifolia, Schleich. ex Spreng. Pugill. ii. 88=hastata.
Chalaf, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. lxxvi.—Aegypt.
Chamissonis, *Anderss.* in *DC. Prod.* xvi. ii. 290.—Am. bor.
chinensis, *Burm. f. Fl. Ind.* 211 (err. typ. 311).—China; Japon.
chinensis, Molina, Sagg. Chile, 137=Humboldtiana.
chlorocarpa, Schur, Enum. Pl. Transs. 616=fragilis.
chlorophana, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 260=glabra.
chlorophylla, *Anderss.* in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. i. 138.—Am. bor.
chlorostachya, *Turcz.* in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) i. 373.—Sibir.
chrysanthos, Vahl, in Fl. Dan. t. 1057=lanata.
chrysophylla, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bologn. Ser. II. iv. (1864) 314=Daltoniana.
ciliata, DC. Fl. Fr. 293=pyrenaica.
cinerascens, Duby, Bot. Gall. 423=grandifolia.
cinerascens, Link. ex Willd. Sp. Pl. iv. 706.—Europ. austr.

SALIX:—

- cinerea*, Kar. & Kir. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 269=Smithiana.
cinerea, *Linn. Sp. Pl.* 1021.—Europ.; Oriens; As. bor.
cinerea, Schleich. ex Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. i. 69=aurita.
cinerea, Sm. Fl. Brit. 1063=daphnoides.
cinnamomea, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25=aurita.
cistifolia, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?).—Europ.
cladostema, Hayne, Dendr. Fl. Umg. Berl. 190=aurita.
clavata, Wall. Cat. n. 3698=Lindleyana.
clethraefolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25=nigricans.
clorophana, Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. i. 178 (*chlorophana*)=glabra.
cochleata, *Dum. Fl. Belg.* 13.—Belgium.
coerulescens, Doell, Fl. Bad. 517=livida.
coerulescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 374=acutifolia.
coluteoides, *Mirb. in Mém. Mus. Par.* xiv. (1827) 462.—Afr. trop.
commixta, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 225=discolor.
comosa, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 nomen (Quid?).—Europ.
compacta x, Anderss. in Bot. Notiser (1867), 112.—Europ.
composita, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?).—Europ.
concolor, Host, Fl. Austr. ii. 639=purpurea.
concolor, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67=nigricans.
conformis, Forbes, Salict. Woburn. 47. t. 24=Smithiana.
conformis, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 19=aurita.
confusa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 383=lanata.
conifera, Waugh. Beytr. 123. t. 31=phylicifolia.
connata, Bess. ex Link. Handb. ii. 453=repens.
constricta, Guss. Enum. Pl. Inar. 403=cinerea.
cordata, *Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 236.—Am. bor. et arct.
cordifolia, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 615=cordata.
cordifolia, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 152=glaucula.
cordifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 611=arctica.
coriacea, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 68; Forbes, Salict. Woburn. 223. t. 112=nigricans.
coruscans, Jacq. Fl. Austr. t. 408=S. Arbuscula.
coruscans, Willd. Sp. Pl. iv. 681=glabra.
corylifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 385=pyrolaefolia.
cotinifolia, Sm. Engl. Bot. t. 1403=nigricans.
Cotteti, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xiv. (1864) 368.—Europ.
Cotteti, Lagg. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 294=retusa.
Coulteri, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 119=sitchensis.
crassa, Barratt, Salic. Am. n. 7=discolor.
crassa, *Peterm. in Flora*, xxvii. (1844) 374.—Europ.
crassifolia, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 68=nigricans.
crassijulis, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. 308=Pallasii.
crataegifolia, Bertol. in Desv. Journ. Bot. ii. (1813) 76 (1832)=glabra.
crispa, Forbes, Salict. Woburn. 83. t. 42=nigricans.
crisposerrata, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 43=nigricans.
Croweana, Sm. Engl. Bot. t. 1115=phylicifolia.
cuneata, Nutt. N. Am. Sylv. i. 66=sitchensis.
cuneata, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 623=arctica.
curtiflora, *Anderss.* in *Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.* xv. (1858) 130.—Am. bor.
curvirostris, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?).—Enrop.
cuspidata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 59=tetrasperma.
cuspidata, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. 47=pentandra.
Cutleri, *Tuckerm.* in *Am. Journ.* Ser. I. xlv. (Oct. 1843) 36.—Am. bor.
cyanolimnæa, *Hance*, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 294.—China.
cyathipoda, Anderss. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 275=S. Salsaf.

SALIX:—

- cyclostigma*, *Peterm. in Flora*, xxvii. (1844) 372.—Europ.
cydoniifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25=nigricans.
cyllenea, Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1188=incana.
dahurica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 377=purpurea.
Daltoniana, *Anderss.* in *Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 49.—Reg. Himal.
damascena, Forbes, Salict. Woburn. 285. t. 157=nigricans.
daphneola, Tausch, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 276=Lapponum.
daphnoides, *Vill. Prosp.* 51; *Hist. Pl. Dauph.* iii. 765.—Europ.; As. bor.
dasycarpa, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 618=S. Myrsinites.
dasyclados, Wimm. in *Flora*, xxxii. (1849) 35=Smithiana.
Davalliana, Sm. Engl. Fl. iv. 175=phylicifolia.
Daviesii, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vii. 98.—Persia.
dealbata, Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* 1850 (1851), 472=acmophylla.
decipiens, Hoffm. Hist. Sal. ii. 9=fragilis.
decumbens, Forbes, Salict. Woburn. 175. t. 88=repens.
decumbens, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25.—Europ.
densa, Wall. Cat. n. 9103=tetrasperma.
denticulata, Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* 1850 (1851), 481=elegans.
denudata, Rafin. Fl. Ludov. 116 (Quid?).—Am. bor.
denudata, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65=nigricans.
depressa, Fries, Mant. i. 57=livida.
depressa, Hoffm. Hist. Sal. i. 39=repens.
depressa, Linn. Fl. Suec. ed. II. 352=lanata.
desertorum, *Richards.* in *Frankl. 1st Journ.* (1823) 753.—Am. bor.
dichroa, Doell, Fl. Bad. 511=purpurea.
Dicksoniana, Sm. Engl. Bot. t. 1390=phylicifolia.
diffusa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25=nigricans.
digenea x, J. Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiv. (1874) 204.—Europ.
diplodictya, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 307=Pallasii.
discolor, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 123=chlorophylla.
discolor, Host, Sal. 18. t. 60, 61=purpurea.
discolor, *Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 234.—Am. bor.
discolor, Schrad. ex Willd. Sp. Pl. iv. 695=phylicifolia.
disperma, Roxb. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 58=tetrasperma.
divaricata, Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. i. 127=nigricans.
divaricata, Pall. Fl. Ross. i. ii. 80=arctica.
divergens, *Anderss.* in *DC. Prod.* xvi. ii. 316.—Reg. Himal.
diversifolia, Rochel, ex Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. i. 116=repens.
Doniana, Sm. Engl. Fl. iv. 213.—Europ.
dracunculifolia, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vii. 99=angustifolia.
dracunculoides, Anderss. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 466=Trautvetteriana.
Drummondiana, Barratt, in *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 144.—Am. bor.
dubia, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 314=cinerea.
dubia, Suter, Fl. Helv. ii. 283=S. Myrsinites.
dubia, Trautv. in Bull. Acad. Sc. Pétersb. i. (1836) 132, nomen=nigra.
dumetorum, Suter, Fl. Helv. ii. 284=cinerea.
dura, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25; Forbes, Salict. Woburn. 209. t. 105=cardiophylla, nigricans.
Ehrhartiana, E. Mey. Chlor. Hannov. 486=pentandra.
elaegnifolia, Forbes, Salict. Woburn. 137. t. 69=glaucula.
elaegnifolia, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111=purpurea.
elaegnoides, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 91=glaucula.
Elaeagnos, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 257=incana.
elbrusensis, Boiss. *Diagn.* Ser. I. xii. 117=purpurea.
elegans, Bess. Enum. Pl. Volh. 77=myrtilloides.
elegans, Host, Fl. Austr. ii. 652=hastata.
elegans, Wall. Cat. n. 3699.—Reg. Himal.

SALIX:—

- elegantissima, C. Koch, Wochenschr. xiv. (1871) 381.—Japon.
elliptica, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = nigricans.
Erdingeri, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 243 = daphnoides.
eriantha, Schleich. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 415 = hastata.
eriocarpa, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 502.—Japon.
eriocephala, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 225 = discolor.
eriolepis, Less. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 171 = hastata.
eriphylla, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 48.—Reg. Himal.
eristachya, Wall. Cat. n. 3704.—Reg. Himal.
erythrocoma, Barratt, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 206 = lasiandra
erythrophleba, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 196 = Lapponum.
estipulata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 356 (Quid ?).—Europ.
euclasia, Goldb. ex Hoeft, Cat. Koursk, 63 = fragilis.
excelsa, J. F. Gmel. Syst. 74 = seq. ?
excelsa, Tausch, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 643 = fragilis.
excelsior, Host, Sal. 8. t. 28 = fragilis.
exigua, Nutt. N. Am. Sylv. 75 = longifolia.
fagifolia, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 43 = nigricans.
fagifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 704 = silesiaca.
falcata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 23 = Humboldtiana.
falcata, Pursh. Fl. Am. Sept. ii. 614 = nigra.
farinosa, Hartig, Nachtr. Naturg. Forstl. Cult. Pfl. Deutschl. 7 = Seringiana.
Fendleriana, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 115 = lasiandra.
Fenzliana, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 195 x = retusa.
ferruginea, G. Anders. ex Forbes, Salict. Woburn. 255. t. 128 = Smithiana.
finmarchica, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 441 = myrtilloides.
firma, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65 = nigricans.
fissa, Dum. Fl. Belg. 13 = pentandra.
fissa, Hoffm. Hist. Sal. i. 61 = purpurea.
flabellaris, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 497.—Reg. Himal.
flava, Schoepf. ex J. F. Gmel. Syst. 74 = humilis.
flavescens, Host, Sal. 31. t. 101 = S. Arbuscula.
flavescens, Nutt. N. Am. Sylv. i. 65 = brachystachys.
flavissima, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111, nomen (Quid ?).—Europ.
flavo-virens, Hornem. Cat. Pl. Hort. Hafn. Suppl. ii. 11 = nigra.
flexibilis, Gilib. Exercit. ii. 406 = alba.
floribunda, Forbes, Salict. Woburn. 107. t. 54 = phyllicifolia.
floridana, Chapm. Fl. S. U. St. 430.—Florida.
Flueggeana, Willd. Sp. Pl. iv. 709 = oleaeifolia.
fluviatilis, Nutt. N. Am. Sylv. i. 73 = longifolia.
foetida, Schleich. ex DC. Fl. Fr. iii. 296 = S. Arbuscula.
foetida, Sm. Engl. Fl. iv. 208 = repens.
foliolosa, Willd. Sp. Pl. iv. 685.—Europ.
foliosa, Afzel. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 653 = livida.
Forbesiana, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 117 = repens.
Forbesiana, Loud. Arb. Brit. iii. 1581 = phyllicifolia.
Forbyana, Sm. Fl. Brit. 1041 = purpurea.
formosa, Willd. Sp. Pl. iv. 680 = S. Arbuscula.
Forsteriana, Sm. Engl. Bot. t. 2344 = nigricans.
fragilior, Host, Sal. 6. t. 22 = fragilis.
fragilis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvi (Quid ?).—Aegypt.
fragilis, Host, Sal. 5. tt. 18, 19 = pentandra.
fragilis, Linn. Sp. Pl. 1017.—Europ.; As. bor.
fragilissima, Host, Sal. 6. tt. 22, 23 = fragilis.
fragillima, Schur, Enum. Pl. Transs. 616 = fragilis.
fragrans, Salisb. Prod. 393 = pentandra.
frangula, Willd. ex Schleichl. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = nigricans.
Friesiana, Anderss. in Bot. Notiser (1866), 156 = repens.
Friesii, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 183 = pentandra.
fruticosa, Doell, Fl. Bad. 515 = Smithiana.
fruticulosa, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 53.—Reg. Himal.

SALIX:—

- fruticulosa*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 368 = S. Arbuscula.
fulcrata, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 139.—Am. bor.
fumosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) t. 384 = arctica.
furcata, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 291 = fruticulosa.
furcata, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 173 = purpurea.
fusca, Fries, Mant. i. 69 = myrtilloides.
fusca, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 151 = argyrocarpa.
fusca, Jacq. Fl. Austr. t. 409 = S. Myrsinites.
fusca, Linn. Sp. Pl. 1020 = repens.
fusca, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 612 = petiolaris.
fusca, Tausch, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 307 = purpurea.
fuscenscens, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 97.—Kamschat.
fuscior, Anderss. l. c. 163.—Am. bor.
gariepina, Burch. Trav. i. 317 = capensis.
geminata, Forbes, Salict. Woburn. 257. t. 129 = Smithiana.
gemmata, Wimm. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 304 = Seringiana.
Geyeriana, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 122.—Am. bor. occ.
glabra, Ledeb. Fl. Ross. iii. 623 = caesia.
glabra, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 255.—Europ.
glabrata, Herb. Heyne, ex Wall. Cat. n. 7977 = Excoecaria crenulata.
glabrata, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 25.—Europ.
glabrescens, Lindl. in Wall. Cat. n. 3706 = tetrasperma ?
glabricarpa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = nigricans.
glacialis, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 131.—Am. bor.
glareosa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = nigricans.
glaucina, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ.; As. et Am. bor.
glaucina, Sm. Engl. Bot. t. 1810 = Lapponum.
glaucina, Willd. Berl. Baumz. 388 = S. Arbuscula.
glaucescens, Host, Sal. 23 = nigricans.
glaucescens, Moench, Meth. Suppl. 116 = S. Arbuscula.
glaucoides, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 284 = S. Myrsinites.
glaucophylla, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 474 = acmophylla.
glaucophylla, Bess. Enum. Pl. Volh. 38 = Lapponum.
glaucophylla, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 68 = nigricans.
glaucops, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 281 = glauca.
Gmelini, Pall. Fl. Ross. i. ii. 77 = viminalis.
Gmelini, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) t. 390 = Lapponum.
Gmeliniana, Turcz. l. c. = praec.
gnaphaloides, Schleich. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 276 = Lapponum.
Goepfertii, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 68 = hastata.
gongylocarpa, Shuttlew. ex Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 114 = nigra.
Govaniana, Wall. Cat. n. 3699 = elegans.
gracilentia, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 447 = fragilis.
gracilis, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 127 = petiolaris.
gracilistyla, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 26.—Japon.
Grahami, Borrer, ex Baker, in Journ. Bot. v. (1867) 157. t. 66 = retusa.
grandifolia, Fries, ex Nym. Consp. 667 = S. Caprea.
grandifolia, Ser. Ess. Saul. 20.—Europ.
grisea, Hook. Kew Journ. vii. (1855) 372 = seq. ?
grisea, Marsh. ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 417.—Am. bor.
grisea, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352, nomen (Quid ?).—Am. bor. ?
grisea, Wall. Cat. n. 3700 G = Wallichiana.
grisea, Willd. Sp. Pl. iv. 699 = sericea.
griseocens x, Anderss. in Bot. Notiser (1867), 112.—Europ.
grisonensis, Forbes, Salict. Woburn. 197. t. 99 = nigricans.
grisophylla, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.
groenlandica, Lundstr. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. (1877) n. xiv. 36.—Ins. N. Zembla.
gryonensis, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.

SALIX:—

- guseniensis*, Wimm. Sal. Europ. 231 = cinerea.
Halleri, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.
Hartmanniana, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 275 = lanata.
Hartwegi, Benth. Pl. Hartw. 46 = lasioplepis.
hastata, Hoppe, ex Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 774. t. 50 = nigricans.
hastata, Linn. Sp. Pl. 1017.—Europ.; As. bor.
hastata, Thuill. Fl. Par. ed. II. 512 = triandra.
Heerii x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 104.—Europ.
Hegetschweileri, Heer, in Hegetschw. Fl. Schw. 963 = phyllicifolia.
Heimerli x, H. Braun, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 107.—Europ.
heliciflora, Tausch, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 308 = purpurea.
Helix, Linn. Sp. Pl. 1017 = purpurea.
helvetica, Forbes, Salict. Woburn. 287 = nigricans.
helvetica, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 783 = Lapponum.
herbacea, Linn. Sp. Pl. 1018.—Reg. bor. et arct.
herbacea, Schrenk, Reise, ii. 523 = rotundifolia.
herbacea, Soland. in Phipps, Voy. 202; Hook. in Parry, Narr. 2nd Voy. (1825) 404 (1827) = polaris.
hermaphroditica, Linn. Sp. Pl. 1015 = pentandra.
heterophylla, Bray, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 51 = alba.
heterophylla, Host, Sal. 26. t. 87 = aurita.
heterophylla, Schult. Fl. Starg. Suppl. 51 = repens.
heterophylla, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 141 = hastata.
hexandra, Ehrh. Beitr. vii. 138.—Austria.
himalensis, Klotzsch, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 482 = elegans.
Hindsiana, Benth. Pl. Hartw. 335 = longifolia.
hippophaefolia, Ledeb. Fl. Ross. iii. 601 = purpurea.
hippophaefolia, Thuill. Fl. Par. ed. II. 514 = molissima.
hippophaefolia, Wimm. & Grah. Fl. Siles. ii. 363 = multiformis.
hircina x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xiv. (1864) 99 = incana.
hirsuta, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6 = capensis.
hirta, Sm. Engl. Bot. t. 1404 = nigricans.
hirtula, Anderss. in Bot. Notiser (1866), 147 = myrtilloides.
Hoffmanniana, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 568 = cinerea.
Hoffmanniana, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 159 = lasiandra.
Hoffmanniana, Sm. Engl. Bot. t. 2620 = triandra.
Hoffmanniana, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 173 = purpurea.
holosericea, Ser. in Flora, xiii. (1830) t. Erg. 41 = Seringiana.
holosericea, Willd. Sp. Pl. iv. 708 = Smithiana.
Hookeriana, Barratt, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 145. t. 180.—Am. bor.
Hoppeana, Willd. Sp. Pl. iv. 654; Sturm, Deutschl. Fl. Heft 25 = triandra.
Horsfieldiana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 461 = tetrasperma.
Hosteana, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iv. (1810) 53 = S. Arbuscula ?
Hostii x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 213 = viminalis.
Houstoniana, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 614 = nigra.
Huartina, Sm. Engl. Fl. iv. 203 = Lapponum.
Hugelii, Wimm. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 41 = tetrasperma.
Huguénini x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 117; xxv. (1882) 104.—Europ.
Humboldtiana, Willd. Sp. Pl. iv. 657.—Am. austr.
humilis, Marsh. Arbust. 140.—Am. bor.
humilis, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 439 = phyllicifolia.
humillima, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 248.—Am. arct.
hungarica, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 9.—Europ.
Huteri, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xvi. (1866) 370 = Lapponum.
hybrida, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 263 = nigricans.
hybrida, Opiz, in Flora, v. (1822) 270.—Europ.

SALIX:—

- hybrida*, Rafn. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352, nomen (Quid?).—Am. bor.?
hybrida, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 253.—Europ.
hybrida, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 778 = *S. Caprea*.
hyperborea, Anderss. Sal. Lapp. 51. f. 12 = *hastata*.
hypophæfolia, Forbes, Salict. Woburn. 13, sphalm. = *hippophæfolia*.
ichnostachya, Wall. Cat. n. 3704; *Lindl. ex Wight*, Ic. t. 1953.—Ind. or.
ilicifolia, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 127 = *nigricans*.
ilicifolia, Willd. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 542 = *berberifolia*.
iliensis, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 464.—As. centr.
incana, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 225 = *candida*.
incana, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = *nigricans*.
incana, Schrank, Baier. Fl. i. 230.—Europ.
incanescens, Forbes, Salict. Woburn. 239. t. 120 = *cinerea*.
incerta, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 594 = *triandra*.
incubacea, Linn. Sp. Pl. 1020 = *repens*.
indigena, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvi = *S. Safsaf*.
insignis, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 47.—Reg. Himal.
integra, Thunb. Fl. Jap. 24 = *repens*.
intermedia, Host, Sal. 17. t. 56, 57 = *incana*.
intermedia, Thomas, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 145 = *S. Arbuscula*.
irrorata, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 117.—Mexic.
iserana, J. & C. Presl, Fl. Čech. 204 = *aurita*.
jacquiniana, Willd. Sp. Pl. iv. 692 = *S. Myrsinites*.
jacquinii, Host, Syn. 529 = *præc.*
japonica, Thunb. Fl. Jap. 24. t. 31 = *babylonica*.
jaspidea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 501 = *daphnoides*.
javanica, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 3 = *tetrasperma*.
julacea, Anderss. l. c. 1856 (1851), 476 = *S. Caprea*.
Junghuhniana, Anderss. ex Miq. Illustr. Fl. Ind. Arch. 13.—Java.
juratensis, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = *nigricans*.
kamaunensis, Lindl. in Wall. Cat. n. 3701 = *elegans*.
kanderiana, Ser. Ess. Saul. 37 = *Seringeana*.
Karelini, Turcz. ex Stschégel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 196, 393.—As. centr.
kassanogluensis, Kotschy, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. n. 212 = *alba*.
Kawajanagi, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 24 = *Buergeriana*, gracilistyla.
Kernerii, Erding, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xv. (1865) 78 = *incana*.
kilnensis, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 320 = *myrtillodes*.
Kirilowiana, Stschégel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 198.—Sibir. altaic.
Kitabeliana, Willd. Sp. Pl. iv. 683 = *retusa*.
Kochiana, Hartig, Naturg. Forstl. Cult. 569 = *purpurea*.
Kochiana, Trautv. in Bull. Acad. Sc. Pétersb. i. (1836) 132, nomen; et in Mém. Sav. Etr. Pétersb. iii. (1837) 632. t. 1.—Sibir. altaic.
Koernickei, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 263 = *daphnoides*.
koreensis, Anderss. l. c. 271.—Korea.
Kovatsii, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 190 = *triandra*.
kossoviensis, Bess. in Mem. Pharm. Ac. Viln. ii. 649.—Lithuan.
Kraetliana, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii–xxiv. (1880) 117; xxv. (1882) 105.—Europ.
Krausei, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 29 = *triandra*.
kumaonensis, Auct. = *kamaunensis*.
lactea, Bray, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. 11. (1818) 43. t. 2 = *Lapponum*.
lacustris, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25; Forbes, Salict. Woburn. 231. t. 116 = *nigricans*.
Laestadiana, Hartm. Skand. Fl. ed. III. 237 = *Lapponum*.
laeta, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 51 = *repens*.
laevigata, Bebb, in Am. Natural. viii. (1874) 202.—Calif.
laevis, Hook. Brit. Fl. ed. I. 482 = *S. Myrsinites*.
Laggeri, Wimm. in Flora, xxxvii. (1854) 162 = *grandifolia*.

SALIX:—

- Lambertiana*, Sm. Fl. Brit. 1041 = *purpurea*.
lanata, Lightf. Fl. Scot. ii. 602 = *S. Caprea*.
lanata, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ. et As. bor.
lanata, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 777 = *cinerea*.
lanceolata, Fries, Novit. ed. II. 283 = *Smithiana*.
lanceolata, Ser. Ess. Saul. 37 = *Seringeana*.
lanceolata, Sm. Engl. Bot. t. 1436 = *triandra*.
lancifolia, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 34 = *lasiandra*.
lancifolia, Doell, Fl. Bad. 112 = *Smithiana*.
Lantana, Hartig, Naturg. Forstl. Cult. 410. t. 41 = *ambigua*.
lanuginosa, Pall. Fl. Ross. ii. 83 = *lanata*.
lapponica, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *seq.*
Lapponum, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ.: As. bor.
Lapponum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 389 = *speciosa*.
lasiandra, Benth. Pl. Hartw. 335.—Am. bor. occ.
lasiocarpa, Wimm. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 218 = *silesiaca*.
lasiolepis, Benth. Pl. Hartw. 335.—Calif.
lasistylis, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 373.—Europ.
latifolia, Forbes, Salict. Woburn. 235. t. 118 = *nigricans*.
latifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 344.—Mexic.
latiuscula, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 165.—Am. bor.
laurifolia, Wesmael, in Bull. Congr. Bot. Brux. (1864) 280 = *pentandra*.
laurina, Sm. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 122 = *phylicifolia*.
laurinea, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 343 = *phylicifolia*.
lavandulaefolia, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 601 = *incana*.
laxa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = *nigricans*.
laxiflora, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. ii. t. 2749 = *phylicifolia*.
laxiflora, Kern. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 176 = *glabra*.
Ledebouriana, Trautv. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 132, nomen; et in Mém. Sav. Etr. Pétersb. iii. (1837) 631 = *purpurea*.
Lemana, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = *nigricans*.
Lemmoni, Bebb, in Bot. Calif. ii. 88.—Calif.
lenta, Fries, Fl. Suec. Mant. i. 78 = *tetrasperma*.
leptocladus, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 144.—Sibir.
leucantha, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111, nomen (Quid?).—Europ.
leucophylla, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 444 = *Lapponum*.
libanotica, Boiss. Fl. Orient. iv. 1185 = *alba*.
ligustrina, Host, Sal. t. 15–16 = *triandra*.
ligustrina, Michx. f. Hist. Arb. Am. iii. 226. t. 5 = *nigra*.
ligustroides, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65 = *hastata*.
limnogenia, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) 64 = *aurita*?
limnogenia, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 187 = *grandifolia*.
limosa, Trautv. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 277 = *speciosa*.
limosa, Wahlenb. Fl. Lapp. 265 = *Lapponum*.
Lindleyana, Wall. Cat. n. 3697.—Reg. Himal.
linearis, Forbes, Salict. Woburn. 177. t. 89 = *incana*.
linearis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 379 = *viminialis*.
lingulata, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 281.—Am. bor.
lithuania, Bess. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 608 = *nigricans*.
littoralis, Host, Sal. 15. t. 52 = *repens*.
livescens, Doell, Fl. Bad. 520 = *aurita*.
livescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 386 = *repens*.
livida, Wahlenb. Fl. Lapp. 272. t. 16. f. 6.—Europ.
livida, Wimm. in Denkschr. Bresl. Ges. (1853) 147 = *aurita*.
longiflora, Wall. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 50.—Reg. Himal.
longifolia, Lam. Fl. Fr. ii. 232 = *vininialis*.

SALIX:—

- longifolia*, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 238.—Am. bor.
longifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *Seringeana*.
longipes, Hook. f. & Thoms. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 56 = *S. Serpyllum*.
longipes, Shuttlew. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 114 = *nigra*.
longirostris, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 226 = *tristis*.
loniceraefolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 375 = *Kochiana*.
lucida, Jacquem. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 497 = *flabellaris*.
lucida, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 239.—Am. bor.
ludoviciana, Rafn. Fl. Ludov. 115 (Quid?).—Am. bor.
Ludwigii, Bonj. ex Bertol. Fl. Ital. x. 313 = *nigricans*.
Ludwigii, Schkuhr, Handb. iv. 227. t. 317 = *silesiaca*.
lutea, Nutt. N. Am. Sylv. i. 63. t. 19 = *cordata*.
lutescens, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 253 = *cinerea*.
lutescens, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.
Lyoni, Forbes, Salict. Woburn. 19. t. 10.—Helvet.
macilenta, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 141.—Kamtschat.
mackenziana, Barratt, ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 149.—Am. arct.
macrocarpa, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 479 = *phylicifolia*.
macrocarpa, Nutt. N. Am. Sylv. i. 83.—Am. bor. occ.
macrocarpa, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 292 = *glauc.*
macrolepis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 371.—As. bor.
macronectaria, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 373.—German.
macrophylla, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 64 = *grandifolia*.
macrophylla ×, Kern. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, x. (1860) 247 = *S. Caprea*.
macropoda, Stschégel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1854) i. 197.—Sibir. altaic.
macrorhyncha, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 155 = *phylicifolia*.
macrostachya, Nutt. N. Am. Sylv. i. 72 = *longifolia*.
macrostipulacea, Forbes, Salict. Woburn. 259. t. 130 = *nigricans*.
macrostipularis, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.
madagascariensis, Boj. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 15.—Madag.
magellanica, Poir. Encyc. Suppl. iv. 66 = *Humboldtiana*.
majalis, Wahlenb. Fl. Lapp. 270 = *phylicifolia*.
malifolia, Bess. Fl. Galic. ii. 313 = *livida*.
malifolia, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.
malifolia, Sm. Fl. Brit. 1053 = *hastata*.
marginata, Wimm. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 21 = *nigra*.
marinifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 697 = *repens*.
marrubifolia, Tausch, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 276 = *Lapponum*.
Martiana, Leyb. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 228. t. 72 = *Humboldtiana*.
Mauckschii, Hartig, Naturg. Forstl. Cult. 396 = *silesiaca*.
mauernensis, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 261 = *purpurea*.
Medemii, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 100 = *cinerea*.
melanolepis, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 293 = *glauc.*
melanopsis, Nutt. N. Am. Sylv. i. 78 = *amygdaloides*.
membranacea, Thuill. Fl. Par. ed. II. 515 = *purpurea*.
menthaefolia, Host, Sal. 23–25 = *nigricans*.
Mesnyi, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 38.—China.
mespilifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.
Meyeriana, Rostl. in Willd. Berl. Baumz. ed. II. 427; Forbes, Salict. Woburn. 65. t. 33; Borrer, in Hook. Brit. Fl. ed. I. 417; ed. III. 421 = *pentandra*.
micans, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 49 = *alba*.
Michelliana, Forbes, Salict. Woburn. t. 125 = *Smithiana*.
microdonta, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.

SALIX:—

microphylla, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 354 = *taxifolia*.
microphylla, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861) 37.—Hispan.
microstachya, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 377 = *angustifolia*.
Mielichhoferi, Saut. in Flora, xxxii. (1849) 662 = *glabra*.
Mielichhoferi, Tausch, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 290 = *S. Myrsinites*.
minutiflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 304 = *caesia*.
Miquelii, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 166.—Japon.
mirabilis, Host, Sal. 13. t. 46 = *purpurea*.
mollis, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = *aurita*.
mollissima, Ehrh. Beitr. vi. 101.—Europ.
mollissima, Sm. Fl. Brit. 1070 = *Smithiana*.
mollissima, Wahlenb. Fl. Carp. 317 = *purpurea*.
monadelphica, Koch, ex Schur, Enum. Pl. Transs. 618 = *purpurea*.
monandra, Hoffm. Hist. Sal. i. 18 = *purpurea*.
monandra, Host, Sal. 22. t. 71, 72 = *grandifolia*.
monica, Bebb, in Bot. Calif. ii. 90.—Calif.
monspeliensis, Forbes, Salict. Woburn. 59. t. 30 = *fragilis*.
montana, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65 = *nigricans*.
mucronata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6 = *capensis*.
Muehlenbergiana, Barratt, ex Torr. Fl. N. York, ii. 205 = *humilis*.
Muehlenbergiana, Willd. Sp. Pl. iv. 692 = *tristis*.
multiformis, Doell, Fl. Bad. 506.—Europ.
multiglandulosa, Wimm. Sal. Europ. 196 = *Lapponum*.
multinervis, Doell, Fl. Bad. 516 = *cinerea*.
murina, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26.—Europ.
mutabilis, Forbes, Salict. Woburn. 288. t. 160 = *nigricans*.
mutabilis, Host, Sal. tt. 42, 43.—Europ.
mutabilis, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *ambigua*.
myricaefolia, Anderss. l. c. 1850 (1851), 483 = *divergens*.
myricoides, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 235 = *cordata*.
myrsinifolia, Salisb. Prod. 394 = *nigricans*.
Myrsinites, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 540 = *Chamissonis*.
Myrsinites, Hoffm. Hist. Sal. 71 = *nigricans*.
Myrsinites, Linn. Sp. Pl. 1018.—Europ.
myrsinitoides, Fries, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 290 = *nigricans*.
myrtilloides, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 51.—Reg. Himal.
myrtilloides, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 132 = *S. Novae-Angliae*.
myrtilloides, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 539 = *fuscescens*.
myrtilloides, Linn. Sp. Pl. 1018.—Reg. bor.
myrtilloides, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 770 = *S. Arbuscula*.
myrtilloides, Willd. Sp. Pl. iv. 686 = *caesia*.
myrtoides, Doell, Fl. Bad. 522 = *livida*.
myrtoides, Fries, Mant. i. 70; Hartm. Skand. Fl. ed. IV. 322 = *myrtilloides*.
Myurus, Wimm. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 41 = *tetrasperma*.
nana, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *repens*?
Napoleona, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 616 = *babylonica*.
Napoleonis, F. Schultz, Arch. Fl. 239 = *praece*.
natalensis, Wimm. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 14 = *capensis*.
neglecta, Gorski, ex Anderss. l. c. 103 = *myrtilloides*.
Neireichii, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 258 = *purpurea*.
Neissana x, Kern. l. c. 217.—Europ.
nepetaeifolia, J. & C. Presl, Fl. Cech. 205.—Europ.
neriifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 (Quid).—Helvet.
neriosa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.
nevadensis, S. Wats. in Am. Natural. vii. (1873) 302.—Am. bor. occ.
nigra, Marsh. Arbust. 293.—Am. bor.
nigrescens, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.
nigricans, Sm. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 120.—Europ.; As. bor.

SALIX:—

nilagirica, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 22 = *tetrasperma*.
nipponica, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 502.—Japon.
nitens, G. Anders. ex Sm. Engl. Fl. iv. 174 = *phylicifolia*.
nitens, Gilib. Exercit. ii. 408 = *Lapponum*.
nitens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 380 = *viminalis*.
nitida, J. F. Gmel. Syst. 74 (Quid?).—Aegypt.? *nivalis*, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 152 = *reticulata*.
nivalis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 68 = *herbacea*.
nivea, Ser. Ess. Saul. 51 = *Lapponum*.
nivea, Sm. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 278 = *candida*.
nobilis, Fries, Novit. i. 78 = *tetrasperma*.
Normanni, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 288 = *S. Myrsinites*.
notha, Anderss. in Bot. Notiser (1867), 114 = *S. Myrsinites*.
Novae-Angliae, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 160.—Am. bor.
nummularia, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 298.—Sibir. arct.
nummulariaefolia, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 127 = *nigricans*.
obcordata, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 291.—Am. bor.
oblongifolia, Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 81).—As. bor.
obovata, Wall. Cat. n. 3698 = *flabellaris*.
obscura, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 269.—Reg. Himal.
obtusa, Richter, ex Corresp. Ver. Naturk. Presb. ii. (1863) 195.—Europ.
obtusa, Schleich. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 415.—Helvet.
obtusifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 705.—Lappon.
occidentalis, Bosc, ex Koch, Comment. 16.—Ind. occ.
octandra, Delile, ex Aitch. Cat. Punjab Pl. 140 = *acmophylla*.
octandra, Sieber, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 276 = *S. Salsaf*.
Oldhamiana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 25.—Japon.
oleaefolia, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 784.—Europ.
oleifolia, Host, ex Wimm. Sal. Europ. 161 = *purpurea*.
oleifolia, Ser. Ess. Saul. 11 = *incana*.
oleifolia, Sm. Fl. Brit. 1065 = *cinerea*.
oleifolia, Wimm. Herb. Sal. 66; ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 305 = *oleaefolia*.
Olgae, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 465, nomen; Pl. Nov. Fedtsch. 79.—Turkestan.
olivacea, Thuill. Fl. Par. ed. II. 515 = *purpurea*.
onusta, Bess. Enum. Pl. Volh. 78 = *myrtilloides*.
onychiophylla, Anderss. ex Nym. Consp. 671 = *herbacea*.
oppositifolia, Host, Sal. 11. t. 38 = *purpurea*.
orbicularis, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 300.—Am. bor.
oreophila, Hook. f. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 57.—Reg. Himal.
ovalifolia, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 306.—Am. arct.
ovata, Ser. Ess. Saul. 92.—Europ.
ovata, Spreng. Pugill. i. 62 = *nigricans*.
oxycarpa, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 45.—Reg. Himal.
oxyphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 24 = *Humboldtiana*.
padifolia, Anderss. in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 451.—Japon.
Pallasii, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 285.—Kamtschat.
pallidifolia, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 33.—Am. bor.
pallidifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.
pallida, Forbes, Salict. Woburn. 191. t. 96 = *oleaefolia*.
pallida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 25 = *Bouplandiana*.
pallida, Ledeb. Fl. Alt. iv. 261 = *purpurea*.
pallida, Salisb. Prod. 394 = *alba*.
pallida, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.
paludosa, Hartm. Skand. Fl. ed. III. 236 = *myrtilloides*.

SALIX:—

paludosa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 419 = *aurita*.
paludosa, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 43 = *nigricans*.
palustris, Host, Sal. 7. t. 24 = *fragilis*.
Pameachiana, Barratt, Salic. Am. n. 16 = *alba*.
pannosa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 31; Forbes, Salict. Woburn. 245. t. 122 = *nigricans*.
paradoxa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 25 = *discolor*.
parietariifolia, Host, Sal. t. 23-25 = *nigricans*.
parviflora, Host, l. c. 14. t. 49 = *Doniana*.
parvifolia, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 283 = *glaucula*.
parvifolia, Sm. Engl. Bot. t. 1961 = *repens*.
patens, Forbes, Salict. Woburn. 77. t. 39 = *phylicifolia*.
patula, Kern. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 305 = *oleaefolia*.
patula, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.
patula, Ser. l. c. 11 = *incana*.
Patzeeana, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 117, 124 = *repens*.
Patzeei, Wimm. ex Anderss. l. c. 93 = *aurita*.
pedicellata, Desf. Fl. Atlant. ii. 362.—Reg. Mediterr. occ.
pedicellaris, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 611 = *myrtilloides*.
pellita, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 139 = *chlorophylla*.
Peloritana, Prestandr. ex Tineo, Pl. Rar. Sicil. 31 = *oxycarpa*.
pendula, Moench, Meth. 336; Salisb. Prod. 393 = *babylonica*.
pendula, Ser. Ess. Saul. 79 = *fragilis*.
pendulina, Wender. in Schrift. Nat. Ges. Marb. ii. (1831) 235 = *purpurea*.
pensylvanica, Hort. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 611 = *myrtilloides*.
pensylvanica, Hort. l. c. 616 = *petiolaris*.
pentandra, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 183 = *hexandra*.
pentandra, Linn. Sp. Pl. 1016.—Europ.; As. bor.
pentandra, Nutt. N. Am. Sylv. i. 61 = *lucida*.
pentandra, Thuill. Fl. Par. ed. II. 513 = *triandra*.
pentandra, Walt. Fl. Carol. 243 = *nigra*.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 99.—Persia.
persicaefolia, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 = *fragilis*?
persicifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. II. 30 = *fragilis*.
petiolaris, Sm. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 122.—Am. bor.
petraea, [G. Anders. in] Forbes, Salict. Woburn. 193. t. 97 = *nigricans*.
petrosa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.
phaeophylla, Anderss. in Bot. Notiser (1867), 116 = *S. Myrsinites*.
philicifolia, Crantz, Inst. i. 176 = *phylicifolia*.
phillyreifolia, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. t. 2660 = *phylicifolia*.
phlebophylla, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 132.—Am. bor.
phlomoides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 415; iii. 628 = *cinerea*.
phylicaefolia, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 139 = *phylicifolia*.
phylicifolia, J. Carey, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 416 = *chlorophylla*.
phylicifolia, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 542 = *macilenta*.
phylicifolia, Linn. Sp. Pl. 1016.—Europ.
phylicifolia, Wahlenb. Fl. Lapp. 270 = *nigricans*.
phylicifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 1003 = *glabra*.
phylicoides, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 123.—Am. bor. occ.
Pierotii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 27.—Japon.
pilosa, Bray, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 608 = *nigricans*.
pilosa, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 47 = *S. Myrsinites*.
pinetorum, Czern. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 183, nomen (Quid?).—Rossia.
Pitcheriana, Baratt, Salic. Am. n. 22 = *nigra*?
planifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 611.—Am. bor.; Labrador.
plicata, Fries, Novit. i. 66 = *repens*.
podophylla, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) 142.—Sibir.
Pokornyii, Kern. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, x. (1860) 181 = *pentandra*.
polaris, Wahlenb. Fl. Lapp. 261.—Reg. arct.
poliphylla, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.

SALIX:—

polyandra, Gleditsch, Forstw. ii. 4. 43; ex Schrank, Baier. Fl. i. 229 = pentandra.
polygonifolia, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 43 = nigricans.
polymorpha, Ehrh. Beitr. v. 160 = repens.
polymorpha, Host, Sal. t. 69 = cinerea.
pomeranica, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 66; Forbes, Salict. Woburn. 281. t. 153 = daphnoides.
pondicheriana, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 489 = ichnostachya.
Pontederæ, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 766 = hastata.
Pontederæna, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = purpurea.
Pontederæna, Willd. Sp. Pl. iv. 661 = hastata.
populifolia, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 494 = tetrasperma?
populifolia, Schleich. ex Spreng. Pugill. ii. 89. — Europ.
praecox, Dum. Fl. Felg. 12 = cinerea, acutifolia, daphnoides.
praecox, Hoppe, ex Willd. Sp. Pl. iv. 670 = daphnoides.
praecox, Salisb. Prod. 394 = S. Caprea.
pratensis, Host, Sal. 15. tt. 50, 51 = repens.
pratensis, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 252 = purpurea.
prinoides, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 613 = brachystachys.
procumbens, Forbes, Salict. Woburn. 121. t. 61 = S. Myrsinites.
prolixa, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 94. — Am. bor. occ.
propendens, Chaub. in Act. Linn. Soc. Bord. xix. (1853) 234. — Gallia.
propendens, Ser. Ess. Saul. 73 = babylonica.
propingua, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. t. 2729 = phyllicifolia.
prostrata, Ehrh. Beitr. vi. 103 = caesia.
prostrata, Muhl. Cat. 95 = Cutleri.
prostrata, Sm. Fl. Brit. 1060 = repens.
protea, Anderss. in Bot. Notiser (1866), 157 = nigricans.
proteaeifolia, Forbes, Salict. Woburn. 149. t. 75 = ambigua.
pruinosa, Bess. Cat. Hort. Bot. Crem. 121 = acutifolia.
pruinosa, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = nigricans.
pruinosa, Wendl. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 172 = daphnoides.
prunifolia, Host, Sal. 23–25 = nigricans.
prunifolia, Sm. Fl. Brit. 1054 = S. Arbuscula.
Pseudo-aurita, Schur, Enum. Pl. Transs. 620 = lanata.
Pseudo-caprea, Bluff & Fingeh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 570 = acuminata.
Pseudo-cordata, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 161 = Novae-Angliae.
Pseudo-glaucæ, Anderss. ex Nym. Consp. 670 = glauca.
Pseudo-grisea, Steud. Nom. ed. II. ii. 498 = Wallichiana.
Pseudo-myrsinites, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 129. — Am. bor.
psilocarpa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
psilostigma, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 496 = eriophylla.
pubera, Koch, in Boenn. Prod. Fl. Monast. 300 = mollissima.
puberula, Doell, Fl. Bad. 518 = nigricans.
pubescens, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = grandifolia.
pulchella, Host, Sal. 30. t. 98 = S. Arbuscula.
pulchra, Wimm. Sal. Europ. 7 = daphnoides.
pumila, Salisb. Prod. 394 = herbacea.
punctata, Wahlenb. Fl. Lapp. 269 = nigricans.
purpurea, Linn. Sp. Pl. 1017. — Europ.; As. et Afr. bor.
Purshiana, Spreng. Syst. v. 608 (Index) = nigra.
pycnocarpa, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 139 = chlorophylla.
pycnostachya, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 44. — Reg. Himal.
pyracanthoides, Turcz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 184 = chlorostachya.
pyracanthos, Turcz. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 246 = chlorostachya.
pyramidalis, Budischtschew, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 184, nomen (Quid?). — Rossia.
pyrenaica, Gouan, Illustr. 77. — Europ. austr.

VOL. II.

SALIX:—

pyrifolia, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 162. — Am. bor.
pyrifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
pyrina, Wall. Cat. n. 3705 = tetrasperma.
pyroanthoides, Turcz. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 143 = chlorostachya.
pyrolaeifolia, Ledeb. Fl. Alt. iv. 270. — Ross. arct.
pyrolaeifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
radicans, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 69 = triandra.
radicans, Sm. Engl. Bot. t. 2700 = phyllicifolia.
ramifusca, Forbes, Salict. Woburn. 105. t. 53 = phyllicifolia.
Rapini, Ayasse, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 341 = hastata.
rectifolia, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 313 = S. Myrsinites.
recurvata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 609 = humilis.
recurvata, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
reflexa, Forbes, Salict. Woburn. 187. t. 94 = nigricans.
reflexa, Rostk. in Willd. Baums. ed. II. 442; ex Fl. Sedin. 385 (Quid?). — Europ.
reflexiflora, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?). — Europ.
regalis, Hort. ex Wesmael, in Bull. Congr. Bot. Brux. (1864) 280 = alba.
Regelia, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 309. — Soon-garia.
Reichardtii, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 249 = S. Caprea.
Reinii, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 459 = glabra.
repanda, Dum. Fl. Belg. 12. — Europ.
repens, Linn. Sp. Pl. 1020. — Europ.; As. bor.
repens, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 610 = argyrocampa.
reptans, Rupr. Fl. Samoied. Cisural. 54. t. 3. — Ross. arct.
reticulata, Linn. Sp. Pl. 1018. — Reg. arct. et bor.
reticuloides, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 301 = praec.
retractata, F. Fellm. in Bull. Soc. Nat. Mosc. viii. (1835) 287. — Europ. bor.
retusa, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 153 = phlebophylla.
retusa, Linn. Syst. ed. X. 1287. — Europ.
retusa, Oakes, ex Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (Oct. 1843) 36 = Cutleri.
retusa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1854) i. 386 = nummularia.
retusa, With. Arr. Brit. Pl. t. 31 = S. Myrsinites.
retusoides, J. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 1221 = retusa.
Reuteri, Mor. Fl. Schweiz, 459 (1844) = daphnoides.
reversifolia, Wahlenb. ex Schur, Enum. Pl. Transs. 621 = repens.
raetica, Kern. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 136 = phyllicifolia.
rhannifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 117. t. 26 = fuscens.
rhannifolia, Pall. Fl. Ross. i. ii. 84. — Sibir.
Rhodani, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
Richardsoni, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 147. t. 182. — Am. arct.
rigida, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 237; Willd. Sp. Pl. iv. 667 = cordata.
riparia, Willd. l. c. 698 = incana.
Ritschelii, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 313 = purpurea.
rivalis, Host, Sal. 25. tt. 81, 82 = nigricans.
rivularis, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26; Forbes, Salict. Woburn. 203. t. 102 = nigricans.
rorismarinifolia, Gouan, Hort. Monsp. 501 = incana.
rosea, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 231 = purpurea.
rosmarinifolia, Barratt & Hook. Fl. Bor. Am. ii. 148 = petiolaris.
rosmarinifolia, Laest. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 232 = fuscens.
rosmarinifolia, Linn. Sp. Pl. 1020 = repens.
rosmarinifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 612 = petiolaris.
Rossmassleri, Willk. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 309 = purpurea.

SALIX:—

rostrata, Richards. in Frankl. Voy. 1st Journ. (1823) 753 = livida.
rostrata, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 31; ex Ser. Ess. Saul. 65 = nigricans.
rostrata, Thuill. Fl. Par. ed. II. 516 = repens.
Rothii, Hoppe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 169 = cinerea.
rotundata, Forbes, Salict. Woburn. 207. t. 104 = nigricans.
rotundifolia, Nutt. N. Am. Sylv. i. 75. — Am. bor. occ.
rotundifolia, Royle, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 497 = flabellaris.
rotundifolia, Trautv. in Nouv. Mém. Acad. Mosc. ii. (1832) 304. — Europ. arct.
Roylei, Klotzsch, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 479 = hastata.
rubens, J. & C. Presl, Fl. Čech. 203 = silesiaca.
rubens, Schrank, Baier. Fl. i. 226 = nigra.
rubra, Huds. Fl. Angl. ed. I. 364 = purpurea.
rubra, Richards. in Frankl. Voy. 1st Journ. 752 = longifolia.
Rudbeckiana, Fries, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 241 = nigricans.
rufescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 380 = viminalis.
rufinervis, DC. Fl. Fr. v. 371 = cinerea.
rugosa, Ser. Ess. Saul. 18 = aurita.
rugosa, Schleich. ex Ser. l. c. 67 = nigricans.
rugulosa, Anderss. in Bot. Notiser (1866), 145 = myrtilloides.
rugulosa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
rupestris, Donn, ex Sm. Engl. Bot. t. 2342 = phyllicifolia.
Russelliana, Sm. Fl. Brit. 1045 = fragilis.
sabulosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 385 = pyrolaeifolia.
sachalinensis, F. Schmidt, Reisen Amurl. 173. — Ins. Sachalin.
Sadleri, Syme, in Journ. Bot. xiii. (1875) 33 = lanata.
Safsaf, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 76. — Afr. bor. et trop.
salviaefolia, Brot. Fl. Lusit. i. 29; Link, ex Willd. Sp. Pl. iv. 688 = oleaefolia.
salviaefolia, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 747 = incana.
sanguinea, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?). — Europ.
Sansoniana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 377 = purpurea.
sarawchanica, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 466; Pl. Nov. Fedtsch. 80. — As.
sarmentacea, Fries, Novit. i. 75. — Europ. bor.
saxatilis, Turcz. in Ledeb. Fl. Ross. iii. 621; in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 391. — Sibir. baical.
Schleicheriana, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65; Forbes, Salict. Woburn. 195. t. 98 = nigricans.
Schnelleriana, Richter, in Corresp. Ver. Naturk. Presb. ii. (1863) 194 (Quid?). — Europ.
Schraderiana, Willd. Sp. Pl. iv. 695 = phyllicifolia.
Schrenkiana, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 179 = glabra.
Schultziana, Willd. ex Link, Handb. ii. 453 = repens.
sclerophylla, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 52. — Reg. Himal.
Scouleriana, Barratt, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 145 = brachystachys, sitchensis.
secta, Hook. f. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 57 = oreophila.
semicordata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 147 = phyllicifolia.
semihelix, Lasch. ex Wimm. Sal. Europ. 173 = purpurea.
semperflorens, Host, Sal. tt. 5–16 = triandra.
Sendtneri x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii–xxiv. (1880) 117. — Europ.
senegalensis, Mert. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 12 = coluteoides.
sensitiva, Barratt, Salic. Am. n. 8 = discolor.
sepiaria, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 127 = nigricans.
septentrionalis, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 671 = nigricans.
sericans, Tausch, ex Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 214 = Smithiana.
sericea, Marsh. Arbust. 140 = petiolaris.
sericea, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 239. — Am. bor.
sericea, Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 382 = glauca.
sericocarpa, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 43. — Reg. Himal.

5 H

SALIX:—

Seringeana, Lecoq & Lamotte, Cat. 336 = oleaeifolia.
Seringiana, Gaud. Fl. Helv. vi. 251.—Europ.
serotina, Pall. Reise, iii. 759 = viminalis.
serotina, Schur, Enum. Pl. Transs. 617 = triandra.
serpens, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?).—Europ.
serpyllifolia, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 255 = retusa.
Serpyllum, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 55.—Reg. Himal.
serrulata, Willd. Sp. Pl. iv. 664 = hastata.
sessilifolia, Nutt. N. Am. Sylv. i. 68.—Am. bor. occ.
sibirica, Pall. Fl. Ross. i. ii. 78 = caesia.
Sieboldiana, Blume, Bijdr. 517.—Japon.
Sieboldii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 505 = elegantissima.
Sieberti, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 68 = purpurea.
sikkimensis, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 269.—Reg. Himal.
silesiaca, Fries, ex Nym. Consp. 667 = S. Caprea.
silesiaca, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 65 = nigricans.
silesiaca, Willd. Sp. Pl. iv. 660.—Europ.; Reg. Caucas.
sitchensis, Sanson, ex Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1833) 162. t. 2.—Am. bor. occ.
skiaphila, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111, nomen (Quid?).—Europ.
Smithiana, Willd. Enum. Hort. Berol. 1008.—Europ.
Sommerfeltii, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 291 = S. Myrsinites.
songarica, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 53.—Soongar.
sordida, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 257 = purpurea.
sordida, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 65 = nigricans.
spadicea, Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 373 = cinerea.
spathulata, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 54 = repens.
spathulata, Willd. Sp. Pl. iv. 700 = repens.
speciosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 130.—Am. arct.; Sibir.
speciosa, Host, Sal. 5. t. 17 = triandra.
speciosa, Nutt. N. Am. Sylv. i. 58 = lasiandra.
spectabilis, Host, Sal. tt. 3, 4 = triandra.
sphacelata, Loisel. Fl. Gall. ii. 343 = grandifolia.
sphacelata, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 21 = grandifolia.
sphacelata, Sommerf. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 845 = livida.
sphacelata, Willd. Sp. Pl. iv. 702 = S. Caprea.
sphaerocephala, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 240 = purpurea.
sphenocarpa, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 196 = Lapponum.
sphenogyna, Wimm. l. c. = Lapponum.
spiraeaeifolia, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 40 = aurita.
spiraeifolia, Willd. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 416 = nigricans.
spissa, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 283 = subcordata.
splendens, Bray, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 110 = alba.
splendens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 380 = viminalis.
spuria, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 54; Willd. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 279 = Lapponum.
stagnalis, Nutt. N. Am. Sylv. i. 66 = brachystachys.
Starkeana, Willd. Sp. Pl. iv. 677 = livida.
stenoclados, Doell, Fl. Bad. 521 = livida.
stenostachya, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 188 = glabra.
stipulacea, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 343.—Mexic.
stipularis, Ser. Ess. Saul. 20 = grandifolia.
stipularis, Sm. Fl. Brit. 1079 = viminalis.
stolbergensis, Wallr. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 171 = hastata.
strepida, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26; Forbes, Salict. Woburn. 199. t. 100 = nigricans.
Stuartiana, Sm. Engl. Bot. t. 2586; Hook. Fl. Bor. Am. ii. 151 = Lapponum.
Sturteana, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 187 = livida?
stylaris, Ser. Ess. Saul. 62 = nigricans.
stylosa, DC. Fl. Fr. Suppl. 339 = nigricans.
suaveolens, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 491 = tetrasperma.

SALIX:—

subalpina, Forbes, Salict. Woburn. 185. t. 93 = repens.
subalpina, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xvi. (1866) 338.—Europ.
subaurita, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 67 = silesiaca.
subcaprea, Anderss. l. c. = silesiaca.
subcinerea, Anderss. l. c. = silesiaca.
subconcolor, Ser. Ess. Saul. 54 = Lapponum.
subcordata, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 128.—Am. bor.
subfragilis, Anderss. in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 450.—Japon.
subglabra, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 237 = glabra.
subhastata, Laest. ex Anderss. Sal. Lapp. 21 = lanata.
sublanata, Anderss. ex Nym. Consp. 669 = lanata.
subnivalis, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 106.—Europ.
subopposita, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 28.—Japon.
subsericea, Doell, Fl. Bad. 517 = repens.
subserata, Willd. Sp. Pl. iv. 671 = S. Safsaf.
subtriandra, Neilr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, i. (1851) 119.—Europ.
sudetica, Host, Sal. 28 = Lapponum.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 474.—Sumatra.
taiymyrensis, Trautv. in Middend. Sibir. Reise, 27. t. 5, 6 = arctica.
Tauschiana, Sieber, Cat. (1821); ex Wimm. Sal. Europ. 196; Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 68 = Lapponum.
taxifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 22.—N. Mexic.
tenera, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 288.—Am. bor. occ.
tenuiflora, Host, Sal. t. 5-16 = triandra.
tenuifolia, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.
tenuifolia, Sm. Engl. Bot. t. 2186 = phyllicifolia.
tenuifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 376 = purpurea.
tenuijulis, Ledeb. Fl. Alt. iv. 262 = purpurea.
tenuior, Borier, in Engl. Bot. Suppl. t. 2650 = phyllicifolia.
tenuis, Host, Sal. 14. tt. 47, 48 = repens.
tenuis, Tausch, in Literat. Flora (1837), 174 (err. typ. 673) = purpurea.
tephrocarya ×, Wimm. Sal. Europ. 205.—Europ.
Teplouchovi ×, Schroed. in Gard. Chron. (1882) ii. 108.—Hab.?
testacea, Wright, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 201 = nigra.
tetrandra, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 66, nomen; Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 28. t. 612.—Europ.
tetrapla, Walk. Ess. 408; ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 578 = phyllicifolia.
tetrasperma, Roxb. Pl. Corom. i. 66. t. 97.—Ind. or.; Malaya.
thianschanica, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 471.—Turkestan.
Thomasiana, Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 16. t. 560 = retusa.
Thomasii, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 297.—Helvet.
Thomsoniana, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 54.—Reg. Himal.
Thunbergiana, Blume, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 271.—Japon.
thymelaeoides, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 49 = S. Arbuscula.
tiliaefolia, Schleich, ex Spreng. Pugill. ii. 87 = nigricans.
Timmii, Schkuhr, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 169 = cinerea.
tinctoria, Sm. in Rees, Cycl. xxxi. n. 13 = pentandra.
tomentella, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
tomentosa, Host, Sal. 28 = Lapponum.
tomentosa, Schrad. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 278 = candida.
tomentosa, Ser. Ess. Saul. 14 = S. Caprea.
torfacea, Schleich, ex Ser. l. c. 67 = nigricans.
Torreyana, Barratt, Salic. Am. n. 29.—Am. bor.
tortuosa, Host, Sal. t. 15 = cinerea.
Traunsteineri, Kern. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 308 = purpurea.
Trautvetteriana, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 465.—As. centr.

SALIX:—

Trevirani, Wimm. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 204 = triandra.
Trevirani, Spreng. Pugill. i. 61 = mollissima.
triandra, Linn. Sp. Pl. 1016.—Europ.; Oriens; As. bor.
triandroides, Ehrh. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 28 = triandra.
trichocarpa, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 43 = nigricans.
tridentata, Viv. Fl. Lib. Spec. 61. t. 7. f. 4 = Nitraria tridentata.
tristis, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 393.—Am. bor.
tristis, Hort. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 614 = nigra.
tristis, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 241.—Am. bor.
tuberculata, Moench, Meth. 336; Dum. Fl. Belg. 13 (Quid?).—Europ.
turfacea, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 127 = nigricans.
turgida, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
udensis, Trautv. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 81).—Sibir.
uliginosa, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 21 = grandifolia.
uliginosa, Starke, ex Willd. Sp. Pl. iv. 677 = livida.
uliginosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 1007 = aurita.
ulmifolia, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 21 = nigricans.
ulmifolia, Thuill. Fl. Par. ed. II. 518 = S. Caprea.
ulmifolia, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 776 = aurita.
unalaschkensis, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 539 = ovalifolia.
undulata, Ehrh. Beitr. vi. 101 = triandra.
undulata, Forbes, Salict. Woburn. 25. t. 13 = multifloris.
undulata, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 66 = nigricans.
uralensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 529 = purpurea.
urophylla, Lindl. in Wall. Cat. n. 3708 = tetrasperma.
Uva-ursi, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 610 = Cutleri.
Uva-ursi, Seem. Bot. Voy. Herald, 40 = ovalifolia.
vacciniifolia, Sm. Engl. Bot. t. 2341 = S. Arbuscula.
vaccinoides, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.
vagans, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1851) 121 = livida.
vagans, Hook. f. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 54 = Thomsoniana.
vallesiaca, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
varia, Host, Sal. t. 5-16 = triandra.
varians, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 127 = nigricans.
vaudensis, Forbes, Salict. Woburn. 233. t. 117 = nigricans.
vaudensis, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 263 = cinerea.
velutina, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 53 = nivea.
velutina, Schrad. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 650 = Smithiana.
venulosa, Sm. Fl. Brit. 1055 = S. Arbuscula.
venusta, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 288.—Am. bor.
venusta, Host, Sal. t. 5-16 = triandra.
versicolor, Forbes, Salict. Woburn. 153. t. 77 = repens.
versifolia, Ser. Ess. Saul. 40 = repens.
versifolia, Wahlenb. Fl. Lapp. 271 = myrtilloides.
vestita, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 610.—Am. bor.
viadrina, Wimm. in Hartig, Naturg. Forstl. Cult. 6 = viminalis.
viburnoides, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 61 = hastata.
Villarsiana, Fluegge, ex Willd. Sp. Pl. iv. 655 = triandra.
villosa, D. Don, ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 144 = glauca.
villosa, Forbes, Salict. Woburn. 183. t. 92 = tristis.
villosa, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
villosula, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 43 = nigricans.
vilmensis, Gorski, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 24 = myrtilloides.
viminalis, Balb. Fl. Taur. 165 = incana.
viminalis, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 451 = Kirilowiana.
viminalis, Linn. Sp. Pl. 1021.—Europ.; As. bor.
viminalis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 377 = purpurea.
violacea, G. Anders. ex Sm. in Rees, Cycl. xxxi. n. 33 = daphnoides.
violacea, Bray, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. i. 95 = myrtilloides.
violacea, Holl. ex Nym. Consp. 666 = mollissima.
violacea, Hort. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 250 = phyllicifolia.

SALIX :—

violacea, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 66, nomen (Quid ?).—Hab. ?
virescens, Forbes, Salict. Woburn. 13 = mollissima.
virescens, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 785 = viminalis.
virgata, Forbes, Salict. Woburn. 23. t. 12 = multiformis.
virgata, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.
viridis, Fries, Novit. ed. II. 283 = fragilis.
viridula, Anderss. in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 451 = padifolia.
vitellina, Linn. Sp. Pl. 1016 = alba.
volgensis, Anderss. in DC. Prod. xvi. II. 314.—Rossia.
vratislaviana x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 216.—Europ.
vulgaris, Clayton, ex Gronov. Fl. Virg. ed. II. (1762) 154 = nigra.
vulpina, Anderss. in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 452 = Miquelii.
Wahlenbergii, Anderss. in Bot. Notiser (1867), 115 = nigricans.
Waldesteniana, Willd. Sp. Pl. iv. 679 = S. Arbuscula.
Wallichiana, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 477.—Reg. Himal.
Wallichii, Wimm. ex Anderss. l. c. vi. (1867) n. i. 4 = tetrasperma.
wargiana, Lej. Fl. Spa, ii. 322 = fragilis.
washitana, Muhl. ex Rafin. Fl. Ludov. 138, nomen (Quid ?).—Am. bor.
Weigeliana, Willd. Sp. Pl. iv. 678 = phyllicifolia.
Weinmanniana, Spreng. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) i. 95 = mytilloides.
Wichurae, Anderss. l. c. vi. (1867) 135 = glauca.
Wichurae, Kern. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. II. 305 = incana.
Wilhelmsiana, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 627 = angustifolia.
Willdenoviana, Forbes, Salict. Woburn. 81. t. 41 = nigricans.
Wimmeri, Kern. in Flora, xxxv. (1852) 511 = daphnoides.
Wimmeriana, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 130 = purpurea.
Wolfii, Bebb, in Wheeler, Rep. Bot. U. St. Geogr. Surv. vi. 241.—Am. bor. occ.
Woolgariana, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. t. 2651 = purpurea.
Wrightii, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 115 = nigra.
Wulfeniana, Forbes, Salict. Woburn. 95 = phyllicifolia.
Wulfeniana, Pollini, Fl. Veron. iii. 160 = nigricans.
Wulfeniana, Willd. Sp. Pl. iv. 660 = glabra.
Zedlitziana x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 217.—Europ.
Zeyheri, Sond. ex Fries, in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xiii. (1856) 121 = capensis.
Zollingeri, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 108 = tetrasperma.
zygostemon, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. xii. 118 = oxycarpa.

SALIZARIA, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 382 (1878), sphalm. = **Salazaria**, Torr. (Labiata).

SALKEA, Steud. Nom. ed. II. ii. 500 (1841), sphalm. = seq.

SALKEN, Adans. Fam. ii. 322 (1763) = **Dalbergia**, Linn. (Legumin.).

SALLOA, Walp. Rep. v. 17 (1845), sphalm. = **GALLOA**, Hassk. = **Cocculus**, DC. (Menisp.).

SALMALIA, Schott & Endl. Melet. 35 (1832) = **Bombax**, Linn. (Malvac.).
insignis, Schott & Endl. l. c. 35 = B. insignis.
malabarica, Schott & Endl. l. c. = B. malabaricum.

SALMASIA, Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 317 = **Aira**, Linn. (Gramin.).
corymbosa, Bubani, l. c. = A. intermedia.

SALMASIA, Reichb. Handb. 295 (1837), sphalm. = **SALMALIA**, Schott & Endl. = **Bombax**, Linn. (Malvac.).

SALMASIA, Schreb. Gen. 201 (1789) = **Tachibota**, Aubl. (Inc. Sed.).
guianensis, J. F. Gmel. Syst. 500 = T. guianensis.
racemosa, Willd. Sp. Pl. i. 1502 = T. guianensis.
spinosa, Spreng. Neue Entdeck. ii. 166 = **Zanthoxylum Ochroxylum**.

SALMEA, DC. Cat. Hort. Monsp. 140 (1818). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 381.
FORNICARIA, Rafin. Sylva Tellur. 116 (1838).
HOPKIRKIA, Spreng. Nov. Prov. 23 (1818).
angustifolia, Benth. Bot. Voy. Sulph. 117.—Mexic.
caleoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Cuba.
curviflora, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1818) 112 = **Otopappus curviflorus**.
Eupatoria, DC. Cat. Hort. Monsp. 140.—Ind. occ.
fruticulosa, Steud. Nom. ed. II. i. 775, in syn. (= *Armania fruticulosa*).—Am. austr.
glaberrima, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Cuba.
grandiceps, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 88 = S. Eupatoria.
hirsuta, DC. Cat. Hort. Monsp. 140.—Jamaic.
oligocephala, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 194.—Mexic.
oppositiceps, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 89 = *hirsuta*.
parviceps, Cass. l. c. 88 = S. Eupatoria.
pauciceps, Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Ind. occ.
petrochioides, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 375.—Ind. occ.
salicifolia, Brongn. in Rev. Hort. Sér. III. i. (1847) 87.—Hab. ?
scandens, DC. in Cat. Hort. Monsp. 140 = S. Eupatoria.
sessilifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 375.—Ind. occ.

SALMEOPSIS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 381 (1873). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. l. c. Claussenii, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1152.—Bras.

SALMIA, Cav. Ic. iii. 24. t. 246 (1794) = **Sansevieria**, Thunb. (Haemod.).
ebracteata, Cav. l. c. = S. lanuginosa.
guineensis, Cav. l. c. = S. guineensis.
spicata, Cav. l. c. = S. thyrsiflora.

SALMIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 399 = **Carludovica**, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
acuminata, Willd. l. c. 401 = C. acuminata.
angustifolia, Willd. l. c. = Cyclanthus Plumierii.
funifera, Spreng. Syst. iii. 772 = C. funifera.
humilis, Steud. Nom. ed. II. ii. 501 = C. humilis.
jamaicensis, Steud. l. c. = C. jamaicensis (in Addend.).
latifolia, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 401 = C. latifolia.
palmaefolia, Willd. l. c. = Cyclanthus Plumierii.
palmata, Willd. l. c. = C. palmata.
petrobioides, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 375.—Ind. occ.
subacaulis, Schult. Mant. iii. 341 = C. trigona.
tetragona, Roem. & Schult. Syst. iii. 496 = C. tetragona.
trigona, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 401 = C. trigona.

SALMONEA, Vahl, Enum. i. 8 (1805) = **Salomonina**, Lour. (Polygal.).
cantonensis, Vahl, l. c. = Salomonina cantoniensis.

SALMONIA, Scop. Introd. 209 (1777) = **Vochysia**, Juss.

SALOMONIA, Heist. Syst. 5 (1748) (Quid ?).

SALOMONIA, Lour. Fl. Cochinch. 14 (1790). **POLYGALEAE**, Benth. & Hook. f. i. 136.
EPRIXANTHES, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 25 (1823).

angulata, Griff. Notul. iv. 539 = ciliata ?
aphylla, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 221 ; et in Trans. Linn. Soc. xiv. (1845) 112.—Malaya.
Arnottiana, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 3 = oblongifolia.
canarana, Hassk. in Miq. l. c. = oblongifolia.
cantonensis, Lour. Fl. Cochinch. 14.—As. trop.
ciliata, DC. Prod. i. 334.—Ind. or.
cordata, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 322 ; et in Wight, Illustr. i. 49. t. 22 = ciliata.
cylindrica, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 79.—Burma.
edentula, DC. Prod. i. 334.—Reg. Himal.

SALMONIA :—

Hörneri, Hassk. in Miq. Pl. Jungh. 123 = oblongifolia ?
leptostachya, Wall. Cat. n. 4193 = oblongifolia.
longiciliata, Kurz, in Journ. As Soc. Beng. xli. (1872) II. 292.—Burma.
oblongifolia, DC. Prod. i. 334.—As. trop. ; Austral.
obovata, Wight, Illustr. i. 49. t. 22 = oblongifolia.
parasitica, Griff. Notul. iv. 538 = aphylla.
petiolata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 200 = edentula.
ramosissima, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 352.—Ins. Philipp.
rigida, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 148 = oblongifolia.
sessiliflora, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 207, sphalm. = seq.
sessilifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 200 = oblongifolia.
setoso-ciliata, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 149 = oblongifolia.
stricta, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 152 = oblongifolia.
subrotunda, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 146 = cantoniensis.
tenella, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 243 = aphylla.
trinervata, Steud. Nom. ed. II. ii. 373 = cantoniensis.
uncinata, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 148 = oblongifolia ?

SALPIANTHUS, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 154. t. 44 (1808) = **Boldoa**, Cav. (Nyctag.).
arenarius, Humb. & Bonpl. l. c. 155 = B. lanceolata.
purpurascens, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 309 = **Cryptocarpus globosus**.

SALPICHROA, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 321. **SOLANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 899.

BUSBECKEA, Mart. Cat. Hort. Monac. (1829) 69.
PERIZOMA, Miers, ex Lindl. Veg. Kingd. 622 (1847).
PLANCHONIA, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 471 (1852).
SALPICHROMA, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 333.
ciliata, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 329 = **Lycium ciliatum**.
dependens, Miers, l. c. 325.—Peruv.
diffusa, Walp. Ann. iii. 169.—Am. trop.
glandulosa, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 325.—Peruv.
hirsuta, Miers, l. c.—Peruv.
ramosissima, Miers, l. c. 326.—Peruv.
rhomboidea, Miers, l. c.—Reg. Argent.
tristis, Walp. Rep. iii. 170.—Peruv.
Wrightii, Miers, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 231.—Am. bor. occ.

SALPICHROMA, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 333 = **Salpichroa**, Miers (Solan.).
breviflorum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 474.—Peruv.
ciliata, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 334 = **Lycium ciliatum**.
cuspidatum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 474.—Peruv.
dependens, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 334 = **Salpichroa dependens**.
Didieranum, Jaub. in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 117.—Peruv.
diffusum, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 335 = **Salpichroa diffusa**.
glandulosum, Miers, l. c. 334 = **Salpichroa glandulosa**.
hirsutum, Miers, l. c. = **Salpichroa hirsuta**.
Mandonianum, Wedd. Chlor. And. ii. 98.—Bolivia.
parviflorum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 476.—Bras.
ramosissimum, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 334 = **Salpichroa ramosissima**.
rhomboideum, Miers, l. c. = **Salpichroa rhomboidea**.
triste, Miers, l. c. 335 = **Salpichroa tristis**.
urceolatum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 475.—Mexic.

SALPIGLOSSIS, Ruiz & Pav. Prod. 94. t. 19 (1794). **SOLANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 909.
atro-purpurea, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.-Dec. 1827) 176 = sinuata.
aurea, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 762 = sinuata.
Barcklayana, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 599 = seq.

SALPIGLOSSIS:—

- Barclayana*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 112 = sinuata.
coccinea, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 135, t. 100 = sinuata.
fulva, Court. in Mag. Hort. i. (1833) 219, n. 411.—Chili.
hybrida, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 762 = sinuata.
integrifolia, Hook. Bot. Mag. t. 3113 = Petunia violacea.
integrifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 1978.—Reg. Argent.
intermedia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 594; Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 112 = sinuata.
linearis, Hook. Bot. Mag. sub t. 3113; et t. 3256.—Reg. Argent.
parviflora, G. Don, ex Benth. in DC. Prod. x. 202 (Petuniae sp.).—Hab.?
parviflora, Phil. Fl. Atac. 45 = Reyesia chilensis.
picta, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 258 = straminea.
prostrata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 153.—Calif.
purpurea, Miers, Trav. ii. 531.—Chili.
sinuata, Hook. & Arn. ex Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 190 = Petunia viscidula.
sinuata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 163.—Chili.
spinescens, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. v. 127.—Chili.
straminea, Hook. Exot. Fl. iii. t. 229.—Chili.
variabilis, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 809 = sinuata.

SALPIGLOTTIS, Hort. ex C. Koch, in Neue Verh. Berl. Gartenb. i. (1853) 400 = praec.

SALPINGA, Mart. in DC. Prod. iii. 112 (1828).

- MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 755.
cristata, DC. Prod. iii. 113 = Macrocentrum cristatum.
fasciculata, DC. l. c. = Macrocentrum fasciculatum.
longifolia, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 80.—Bras.
margaritacea, Triana, l. c.—Bras.
parviflora, DC. Prod. iii. 113 = Macrocentrum cristatum.
secunda, Schrank & Mart. ex DC. l. c.—Bras.

SALPINGANTHA, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, iii. (1847) 240, sphalm. = SALPIXANTHA, Hook. = Geissomeria, Lindl. (Acanth.).

SALPINGOGLOTTIS, C. Koch, in Neue Verh. Berl. Gartenb. i. (1853) 401 = Salpiglossis, Ruiz & Pav. (Solanac.).

SALPIXANTHA, Hook. Bot. Mag. t. 4158 (1845) = Geissomeria, Lindl. (Acanth.).
coccinea, Hook. l. c. = G. coccinea.

SALSA, Feuillé, ex Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 70 (1802) = Herreria, Ruiz & Pav. (Liliac.).

SALSOLA, Linn. Syst. ed. I (1735). **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 71.

- CAROXYLON**, Thunb. Nov. Gen. ii. 37 (1782).
HALOTHAMNUS, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 50. t. 136 (1846).
ISGARUM, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836).
KALI, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 261 (1763).
SARCOMORPHIS, Boj. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 179 (1849).
SODA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 145.
abrotanoides, Bunge, in Bull. Acad. Petersb. xxv. (1879) 366.—Mongol.
acicularis, Salisb. Prod. 153 = S. Kali.
acuminata, C. Dietr. Syn. Pl. ii. 998 = Suaeda acuminata.
affinis, C. A. Mey. ex Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. i. (1843) 360.—Sibir.
africana, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 176 = aphylla.
argentina, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 303 = vermiculata, Linn.
alopecurioides, Delile, Fl. Egypte, 200. t. 21 = Halogeton alopecuroides.
altissima, Dryand. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 170 = Helicella altissima.
altissima, Linn. Sp. Pl. ed. II. 324 = Suaeda altissima.
annularis, Poir. Encyc. vii. 298 = Suaeda fruticosa.
anomala, C. A. Mey. ex Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 14. t. 12 = Horaninovia juniperina.

SALSOLA:—

- anonyma*, Poir. Encyc. vii. 299 = Suaeda anonyma.
aphylla, Linn. f. Suppl. 173.—Afr. austr.
aphylla, Spreng. Syst. i. 925 = Kochia aphylla.
arabica, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 970, in obs. = Anabasis Ehrenbergii.
arborescens, Linn. f. Suppl. 173 = S. Arbuscula.
Arbuscula, Pall. Reise, i. 487.—Rossia; Pers.; Sibir.
arenaria, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 80 = Kochia arenaria.
articulata, Cav. Ic. iii. 43. t. 284 = Haloxylon articulatum.
articulata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 55 = Anabasis articulata.
asparagoides, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 194.—Japan.
atriplicifolia, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 35 = Cycloloma platyphyllum.
Atriplicis, Schult. Obs. Bot. 52 = Cycloloma platyphyllum.
aurantiaca, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 963.—Persia; Afghan.
Auricula, Moq. Chenop. Enum. 135.—Persia; Afghan.
australis, R. Br. Prod. 411 = S. Kali.
baccata, Poir. Encyc. vii. 298 = Suaeda baccata.
baccifera, Pall. Illustr. t. 23 = clavifolia.
baccifera, Schrad. Neues Journ. iii. (1809) 88 = Suaeda baccifera.
Bottae, Boiss. Fl. Orient. iv. 964, in obs.—Arab.
brachiata, Pall. Illustr. 30. t. 22.—As. med.
brachyphylla, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 959.—Persia.
brachyphylla, Spreng. Syst. i. 924 = Kochia brevifolia.
brachypteris, Moq. Chenop. Enum. 147 = S. Kali.
brevifolia, Desf. Fl. Atlant. i. 218 = vermiculata, Linn.
buxifolia, Hort. Par. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 622 = praec.?
caesia, Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1838) 357 = ericoides.
Calluna, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 191, nomen.—Afr. austr.
camphorosmoides, Desf. Fl. Atlant. i. 218 = Noaea spinosissima.
cana, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 190 = crassa.
candida, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 191, nomen.—Afr. austr.
canescens, Boiss. Fl. Orient. iv. 963.—As. Min.; Persia.
canescens, Desf. Tabl. ed. I. 41 = Chenolea diffusa.
carinata, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 36. t. 28.—Reg. Casp.; Soongar.; Afghan.
carinata, Spreng. Syst. i. 923 = Chenopodium carinatum.
carnosa, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 161 = Suaeda maritima.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 111 = S. Kali.
Caroxylon, Moq. Chenop. Enum. 143 = aphylla.
celtifolia, Schult. Syst. vi. 243 = ciliata.
chenopodiana, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 161 = Suaeda maritima.
chenopodioides, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. ii. 463 = Cycloloma platyphyllum.
ciliata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 14.—Hab.?
cinerea, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 110. t. 106 = Kochia sedoides.
clavifolia, Pall. Reise, ii. 486.—Rossia; As. bor.
clavifolia, Unio, It. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 157 = Suaeda setigera.
collina, Pall. Illustr. 34. t. 26.—Rossia; Reg. Himal.; Sibir.
conglomerata, Gueldenst. Reisen, ii. 98.—Ross. austr.
controversa, Todaro, ex Nym. Consp. 631 = S. Kali.
coquimbana, Molina, Sagg. Chil. 132, 330.—Chili.
corniculata, C. Dietr. Syn. Pl. ii. 998 = Suaeda corniculata.
cortica, Meyen, Reise, i. 378.—Chili.
corymbosa, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 60 = Cycloloma platyphyllum.
crassa, Bieb. in Mem. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 100.—Rossia; As. bor.
daghestanica, Turcz. ex Bunge, Anab. Revis. 26.—Reg. Caucas.
dasyantha, Pall. Illustr. 19. t. 11 = Kochia arenaria.
decumbens, Lam. Fl. Fr. iii. 241 = S. Kali.

SALSOLA:—

- decurrens*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 53. t. 138 = S. Auricula.
dendroides, Pall. Illustr. 22. t. 14 = verrucosa.
depressa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 197 = Suaeda platensis.
dichotoma, Pall. Reise, iii. 604 = Ofaiston paucifolium.
didyma, Lour. Fl. Cochinch. 17.—Afr. trop.
diffusa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 48 = Kochia sericea.
dioeca, Spreng. Syst. i. 923 = Kochia dioica.
divaricata, Mass. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 141 = longifolia.
divergens, Poir. Encyc. vii. 299 = Suaeda hortensis.
Echinus, Labill. Ic. Pl. Syr. dec. ii. 10. t. 5 = Noaea spinosissima.
elata, Wight, in Wall. Cat. n. 6944 = Suaeda nudiflora.
ennaea, Jan, Elench. Pl. Parm. (1826) 4 = vermiculata Linn.
eriantha, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 135 = Kochia eriophora.
ericaefolia, Adams, in Hoffm. Hort. Mosq. (1808) n. 2764 = ericoides.
ericifolia, Mass. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 141 = vermiculata, Linn.
ericoides, Bieb. in Mem. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 141.—Reg. Transcauc.
ericoides, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 258 = Webbii.
ericoides, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 160 = verrucosa.
eriophora, Steph. ex Bieb. in Mem. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 17 = Kochia eriophora.
erubescens, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1834) 5 = collina.
exasperata, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 7 = S. Arbuscula.
farinosa, Poir. Encyc. vii. 298 = Suaeda vera.
ferox, Delile, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 218 = Cornulaca monacantha.
flavescens, Cav. Ic. iii. 45. t. 288 = vermiculata, Linn.
florida, Poir. Encyc. Suppl. v. 191 = Seidlitzia florida.
foetida, Delile, Fl. Egypt. Illustr. n. 310.—Afr. trop.; Arab.; Ind. or.
foetida, Vest, ex Schult. Syst. vi. 238 = Suaeda foetida.
foliosa, Schrad. ex Schult. l. c. 235 = clavifolia.
frutescens, Pall. Reise, i. 488 = crassa.
fruticosa, Bieb. Tabl. Prov. Casp. 149 = Suaeda dendroides.
fruticosa, Cav. Ic. iii. 44. t. 285 = longifolia.
fruticosa, Drège, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 131 = Kochia villosa.
fruticosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 324 = Suaeda fruticosa.
fruticosa, Wall. Cat. n. 6944 = Suaeda nudiflora.
gemmascens, Pall. Illustr. 24.—Persia; As. bor.
genistoides, Juss. ex Poir. Encyc. vii. 294.—Hispan.
georgica, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 814 = verrucosa.
glaucia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 185.—Reg. Caucas.; Persia.
glaucia, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 160 = ericoides.
globulifolia, Poir. Encyc. vii. 298 = Suaeda vermiculata.
glomerata, Steph. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 206 = Halogeton glomeratus.
glomerulata, Delile, Fl. Aegypt. 56 = Halogeton alopecuroides.
glomerulata, Meyen, Reise, i. 375.—Chili.
gossypina, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 956.—Persia.
grandiflora, Link, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 502.—Lusitan.
Helena, Bory, ex Schult. Syst. vi. 242 = Suaeda fruticosa.
heterocarpa, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 953 = sogdiana.
hirsuta, Linn. Sp. Pl. ed. II. 323 = Kochia hirsuta.
hispidula, Boiss. Fl. Orient. iv. 960.—Turkest.; Afghan.
hyssopifolia, Nocca, ex Usteri, Ann. Bot. vi. (1793) 60 = Kochia hyssopifolia.
hortensis, Desf. Tabl. ed. II. 50; Cat. Hort. Par. ed. III. 73; et ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 158 = Suaeda altissima.
Hostii, Tratt. Arch. 93. t. 112 = Suaeda maritima.
hyssopifolia, Pall. Reise, i. 491 = Kochia hyssopifolia.
imbricata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 57.—Arab.

SALSOLA :—

- incanescens*, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 35. t. 26 = spissa.
indica, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6946 C = Suaeda fruticosa.
indica, Willd. Sp. Pl. i. 1317 = Suaeda maritima.
inermis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 57.—Aegypt.; Syria.
Jacquemontii, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 188 = S. Kali?
Kali, Linn. Sp. Pl. 222.—Reg. bor. et austr. temp.
Lana, Edgew. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 236 = Suaeda fruticosa.
Lana, Stocks, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 950 = Haloxylon recurvum.
lanata, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 135 = Kochia eriophora.
lanata, Mass. ex Link. in Buch. Besch. Canar. Ins. 141 = Chenolea canariensis.
lanata, Pall. Reise, ii. 736.—Ross.; As. bor.
lanata, Poll. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 132 = Kochia prostrata.
lanata, Vahl, in Hornem. Hort. Hafn. 259 = Kochia hyssopifolia.
lancifolia, Boiss. Fl. Orient. iv. 958.—Palaestin.
laniflora, S. G. Gmel. Reise, i. 160. t. 37 = Kochia arenaria.
laniflora, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 135 = Kochia eriophora.
laniflora, Linn. f. Suppl. 172 = lanata.
lanuginosa, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 135 = Kochia eriophora.
lanuginosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 502 = glomerulata.
laricina, Pall. Illustr. 21. t. 13.—Ross.; As. bor.
latifolia, Hort. Par. ex Poir. Encyc. vii. 298 = Cycloloma platyphyllum.
leiosperma, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 997 = Suaeda altissima.
leucoxyllum, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 183 = ericoides.
linearis, Ell. Sketch, i. 332 = Suaeda maritima.
littoralis, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 180.—Madag.
longifolia, J. F. Gmel. Syst. 1618 = seq.
longifolia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 55.—Afr. bor.; Palaest.
longifolia, Lam. Fl. Fr. iii. 233 = S. Soda.
lutea, Delile, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 215 = Anabasis setifera.
macrophylla, R. Br. Prod. 411 = S. Kali.
marina, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.
maritima, Bieb. Tabl. Prov. Casp. 150; Poir. Encyc. vii. 291 = Suaeda maritima.
Marosticum, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 191, sphalm. = Moorcroftiana.
mendocinensis, Gill. ex Moq. l. c. 156 = Suaeda divaricata.
microphylla, Cav. Ic. iii. 45. t. 287 = vermiculata, Linn.
mollis, A. Cunn. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 138 = Sclerolaena bicomis.
mollis, Desf. Fl. Atlant. i. 218 = Suaeda vermiculata.
monandra, Pall. Reise, iii. 724 = Osaiston paucifolium.
monobracea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 55 = Kochia muricata.
monocrophylla, Steud. Nom. ed. I. 723, sphalm. = macrophylla.
monoica, Poir. Encyc. vii. 299 = Suaeda monoica.
monoptera, Bunge, in Bull. Acad. Pétersb. xxv. (1879) 364.—Sibir.
Moorcroftiana, Wall. Cat. n. 6947 = foetida.
Moquiniana, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 52. t. 137 = S. Auricula.
mucronata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 56 = Noaea spinosissima.
muricata, Bieb. Tabl. Prov. Casp. 148 = Kochia sedoides.
muricata, Linn. Mant. i. 54 = Kochia muricata.
mutica, C. A. Mey. ex Becker, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 455.—Ross. austr.
nitida, Clarke, Trav. iii. 42.—Aegypt.
nitraria, Pall. Illustr. 23. t. 15 = spissa.
nitrosa, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 809 = spissa.
nudiflora, Wall. Cat. n. 6945 = Suaeda maritima.
nudiflora, Willd. Sp. Pl. i. 1313 = Suaeda nudiflora.
obtusifolia, Ledeb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 372.—Sibir.

SALSOLA :—

- oppositiflora*, Pall. Reise, i. 735 = Girgensohnia oppositiflora.
oppositifolia, Desf. Fl. Atlant. 219 = longifolia.
oppositifolia, Pall. Reise, ii. 477 = Petrosimonia sibirica.
oppositifolia, Sieber, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 190 = Sieber.
orientalis, S. G. Gmel. Reise, iv. 47. t. 5.—Cf. J. F. Gmel. Syst. 453 = rigida.
Pallasiana, Vest. ex Schult. Syst. vi. 240 = brachiata.
paniculata, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 60 = Cycloloma platyphyllum.
papillosa, Willk. Iber. Halbins. 146.—Hispan.
Passerina, Bunge, in Linnaea, xvii. (1843) 4, in adnot. = gemmascens.
persica, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 964.—Persia.
physophora, Schrad. Neues Journ. iii. (1809) 88 = Suaeda physophora.
pilosa, Pall. Reise, ii. 477 = Halimocnemis malacophylla.
pinnatifida, Schult. Syst. vi. 243.—Aegypt.
platyphylla, Michx. Fl. Bor. Am. i. 174 = Cycloloma platyphyllum.
polycnolos, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 823 (Halimocnemis sp. ?).—Ross. austr.
polycnolos, Linn. Mant. i. 54.—Hispan.; Sicil.
prostrata, Linn. Sp. Pl. 222 = Kochia prostrata.
prostrata, Pall. Reise, i. 490 = Kochia arenaria.
pulla, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1839) 190 = brachiata.
pygmaea, Schrad. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda microsperma?
radiata, Desf. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 28. t. 34 = Cycloloma platyphyllum.
recurva, Wall. Cat. n. 6943 = Haloxylon recurvum.
Richterli, Karel. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 185 = S. Arbuscula.
rigida, Pall. Illustr. 20. t. 12.—Oriens; As. bor.
rosacea, Bieb. Tabl. Prov. Casp. App. 143 = crassa.
rosacea, Cav. Ic. iii. 44. t. 286 = S. Kali.
rosacea, Linn. Sp. Pl. 222.—As. med.; Sibir.
rosea, S. G. Gmel. ex Nym. Consp. 631 = praec.
rubescens, Franch. in Révoil, Çomalı, 60.—Afr. trop.
salsa, Cav. Ic. iii. 46. t. 290 = Suaeda spicata.
salsa, Jacq. Hort. Vindob. iii. 44. t. 83 = Suaeda maritima.
salsa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 324 = Suaeda salsa.
salsa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 197 = Suaeda plattensis.
salsa, Roxb. in Beatson, Tracts St. Helena, 322 = Suaeda fruticosa.
sativa, Cav. Ic. iii. 46. t. 291 = Suaeda spicata.
sativa, Herb. Madr. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 191 = Suaeda fruticosa.
sativa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 323 = Halogeton sativus.
sativa, Wight, in Wall. Cat. n. 6945 = Suaeda maritima.
sativa, Zeyh. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 131 = Kochia villosa.
scabra, Hort. ex Moq. l. c. 161 = Suaeda maritima.
scariosa, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 31 = S. Kali.
sclerantha, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp. Cauc. 35. t. 27 = carinata.
scoparia, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 144 = Kochia scoparia.
sedifolia, Salisb. Prod. 153 = Suaeda fruticosa.
sedoides, Pall. Reise, i. 492 = Kochia sedoides.
sericea, Ait. Hort. Kew. i. ed. I. 317 = Kochia sericea.
seriphoides, Stev. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 190.—Ins. Canar.
setifera, Lag. Gen. et Sp. Nov. 12 = Suaeda setigera.
setigera, Steud. Nom. ed. II. ii. 502 = praec.
sibirica, Koel. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 213 = Anabasis brachiata.
Sieberi, Presl, Bot. Bemerk. 108.—Aegypt.
Sieversiana, Pall. ex Steud. Nom. ed. II. i. 848 = Kochia scoparia.
Soda, Brot. Fl. Lusit. i. 404 = grandiflora.
Soda, Linn. Sp. Pl. 223.—Europ. austr.; As. et Afr. bor.
Soda, Pall. Reise, ii. 493 = collina.
Soda, Weinm. in Flora, v. (1822) 300 = S. Kali
sogdiana, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 473.—Persia; Turkest.
songarica, Siev. ex Pall. Illustr. 35. sub t. 38 = Kochia scoparia.

SALSOLA :—

- Souda*, Loeff. Iter, 132 = Halogeton sativus.
spicata, Pall. Illustr. 27. t. 19 = glauca.
spicata, Willd. Sp. Pl. i. 1311 = Suaeda spicata.
spinescens, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 179.—Arab.
spinescens, Wight. Ic. t. 1795 = foetida.
Spinifex, Pall. Illustr. 32. t. 24 = Noaea spinosissima.
Spinifex, Poir. Encyc. Suppl. v. 190 = Kochia sedoides.
spinosa, Lam. Fl. Fr. iii. 240 = S. Kali.
spissa, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 103.—Rossia; As. or. et bor.
splendens, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 327 = Suaeda setigera.
squarrosa, Stev. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 190.—Ins. Naxos.
stellata, Hort. ex Moq. l. c. 60 = Cycloloma platyphyllum.
Stocksii, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 75 = Haloxylon recurvum.
stricta, Spreng. Syst. i. 293 = Chenopodium strictum.
strobilifera, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.
Suaeda, Poir. Encyc. vii. 299 = Suaeda vera.
suaedoides, Moq. Chenop. Enum. 148 = spissa.
subaphylla, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp. Cauc. 34. t. 24.—Reg. Casp.; Afghan.
subdecandra, Lag. Elench. Pl. Hort. Matr. (1813) 13, nomen (Quid ?).—Hab.?
succulenta, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.
tamariscifolia, Cav. Ic. v. 69.—Europ.
tamariscifolia, Falk, Beitr. ii. 141 = tamariscina.
tamariscifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 12 = genistoides.
tamariscina, Pall. Reise, iii. 604.—Rossia; Reg. Cauc.; As. bor.
tenuifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 188 = Kochia arenaria.
tenuifolia, Falk, Beitr. ii. 141 = tamariscina.
tetragona, Delile, Fl. Egypt, 203. t. 21. f. 4.—Aegypt.; Arab.
tetrandra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 53 = tetragona.
tomentosa, Spach, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 208 = canescens.
Tournefortii, Spach, ex Moq. l. c. 209 = Noaea Tournefortii.
Tragus, Linn. Cent. Pl. ii. 13; Amoen. Acad. iv. 310 = S. Kali.
triandra, Poir. Encyc. Suppl. v. 190 = Kochia hyssopifolia.
triflora, Pers. Syn. i. 296 = Suaeda altissima.
trigyna, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 503 = Suaeda maritima.
trigyna, Willd. Sp. Pl. i. 1312 = Suaeda altissima.
tuberculata, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 178.—Afr. austr.
turgida, Dum. Fl. Belg. 23 = S. Kali.
ulicina, Bunge, in Bull. Acad. Pétersb. xxv. (1879) 364 = Horaninovia ulicina.
ulicina, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 29.—Turkestan.
vera, Schult. Syst. vi. 242 = Suaeda vera.
vermiculata, Bieb. Tabl. Prov. Casp. App. 145 = gemmascens.
vermiculata, Brot. Fl. Lusit. i. 404.—Lusitan.
vermiculata, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.
vermiculata, Linn. Sp. Pl. 223.—Reg. Medit.; As. bor.
vermiculata, Pall. Reise, i. 488 = rigida.
verrucosa, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 103.—Oriens; Ind. bor. occ.
verrucosa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 160 = gemmascens.
verticillata, Schousb. Vextr. Marokko, 123 = longifolia.
villosa, Delile, Illustr. n. 309; D. Dietr. Syn. Pl. ii. 997 = rigida.
villosa, Sieber, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 955 = inermis.
Webbii, Moq. Chenop. Enum. 139.—Hispan.

SALTIA, R. Br. in Salt. Abyss. App. 64 (1814), nomen = *Cometes*, Linn. (Illecebr.).
abyssinica, A. Br. l. c. = C. abyssinica.

SALTIA, R. Br. in Wall. Pl. As. Rar. i. 17 (1830).
AMARANTACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 29.
globosa, Hochst. & Steud. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 325 = Cyathula globulifera.
papposa, R. Br. in Wall. Pl. As. Rar. i. 17.—Ind. or.
Seddera, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 325 = papposa.

SALTZWEDELIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 480 (1800) = *Genista*, Linn. (Legumin.).
sagittalis, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. 498 = *G. sagittalis*.
tetragona, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 357 = *G. sagittalis*.

SALUTIAEA, Colla, in Mem. Acc. Torin. Ser. II. x. (1849) 208 = *Achimenes*, P. Br. (Gesner.).
grandiflora, Colla, l. c. = *A. grandiflora*.

SALUTIEA, Griseb. Jahreshb. 1850 (1853), 367; ex Pfeiff. Nom. ii. 1028 = praec.

SALVADORA, Garcin, ex Linn. Diss. Chen. 36 (1751); in Amoen. Acad. iii. 21. *SALVADORACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 681.

PELLA, Gaertn. Fruct. i. 143. t. 28. f. 8 (1788).
biflora, Lour. Fl. Cochinch. 88.—Cochinch.
capitulata, Lour. l. c. 87.—Cochinch.
crassinervia, Hochst. ex T. Anders. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. i. (1860) 30 = *persica*.
glabra, Baill. Adansonia, ix. (1870) 290 = *Dobera Roxburghii*.
indica, Royie, Illustr. Bot. Himal. 319; Wight, Illustr. ii. 229 = *persica*.
madurensis, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 140 = *Azima sarmentosa*.
oleoides, Decne. l. c. 140. t. 144 = *persica*.
paniculata, Zucc. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 503 = *persica*.
persica, Linn. Sp. Pl. 122.—Oriens; Ind. or.; Afr. bor.
persica, Wall. Cat. n. 1042 = *Cansjera Rheedii*.
Stocksii, Wight, Illustr. 229 = *persica*.
surinamensis, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 7 = *Cybianthus myrianthos*.
Wightiana, Planch. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 190 = *persica*.

SALVERTIA, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. vi. (1820) 266. *VOCHYSIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 977.
convallariaeodora, A. St. Hil. l. c.—Bras.
thyrsiflora, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 16. t. 110 = *convallariaeodora*.

SALVIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1194.

AETHIOPIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 134.

AITOPIS, BELOSIS, CODANTHERA, CROLOCOS, ELELIS, ENIPEA, EPIADENA, EURIPLES, FLIPANTA, GLUTINARIA, HEMATODES, HEMISTEGIA, KIOSMINA, LARNASTYRA, LESEMA, MEGYATHUS, MELLIGO, OEOSKON, ORMIASIS, ORMILIS, PIARADENA, PLEUDIA, RHODORMIS, SOBISO, TEREPI, Rafin. Fl. Tellur. iii. 89–94 (1836).

COVOLA, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 227.

DRYMOPHACE, Opiz, Seznam, 38 (1852).

GALLITRICHUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 134.

HEMISPHACE, Opiz, l. c. 50 (1852).

HORMINUM, Moench, Meth. 376 (1794).

JUNGIA, Moench, l. c. 378 (1794).

LEONIA, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 6 (1825).

PLETHIOSPHACE, Opiz, Seznam, 75 (1852).

MELINUM, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 200.

RHODOCHLAMYS, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 706.

SCHRADERIA, Medic. Phil. Bot. ii. 40 (1791).

SCLAREA, Moench, Meth. 374 (1794).

STENARRHENA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 111 (1825).

STIEFIA, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 200; Phil. Bot. ii. 40 (1791).

abyssinica, R. Br. in Salt, Voy. Abyss. App. 62 = *Meriandra benghalensis*.

abyssinica, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. 2 = *nilotica*.

abyssinica, Linn. f. Suppl. 88 = *nudicaulis*, spinosa.

acaulis, Vahl, Enum. i. 257 = *lyrata*?

acetabulosa, Linn. Mant. i. 25.—As. Min.; Syria.

acuminata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 24. t. 37.—Peruv.

acuminata, Vent. Jard. Cels. t. 50 = *azurea*.

acuminatissima, Steud. Nom. ed. II. ii. 503 = *azurea*.

acutata, Brot. Phyt. Lusit. i. 203 = *S. Verbenaca*.

acutifolia, Lam. Illustr. i. 68 = *nutans*.

acutifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 24. t. 38.—Peruv.

adglutinans, Lag. Gen. et Sp. Nov. 2.—Mexic.

SALVIA :—

aegyptiaca, Linn. Mant. i. 26 = *spinosa*.
aegyptiaca, Linn. Sp. Pl. 23.—Geront. trop. et subtrop.

Aethiopsis, Brot. Fl. Lusit. i. 18 = *argentea*.
Aethiopsis, Linn. Sp. Pl. 27.—Europ. austr.; Oriens.

affinis, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 99.—Mexic.

affinis, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 724 = *virgata*.

africana, Linn. Sp. Pl. ed. II. 38.—Afr. austr.

agglutinans, Roem. & Schult. Syst. i. 582 = *adglutinans*.

agrestis, Linn. Amoen. Acad. iii. 399 = *pratensis*.

agrestis, Vell. Fl. Flum. 14; i. t. 35.—Bras.

agrestis, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 402 = *S. Verbenaca*.

albicaulis, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 234.—Afr. austr.

albida, Jacq. Obs. 10 = *candidissima*.

albiflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 76.—Mexic.

albo-caerulea, Linden, in Belg. Hort. vii. (1857) 199.—Mexic.

algeriensis, Desf. Fl. Atlant. i. 23. t. 3.—Afr. bor.

alpestris, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 237 = *sylvestris*.

altissima, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 140. t. 195.—Bras.

Alvajaca, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 38.—Costa Rica.

amabilis, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 13 = *farinacea*.

amara, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 2 = *amarissima*.

amarissima, Orteg. Hort. Matr. Dec. 4.—Mexic.

ambigua ×, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ii. (1873) 353.—Europ.

ambigua, Roehrb. & Savat. Cat. Pl. La Charente, 167, in obs. = *S. Verbenaca*?

ambigua, Salisb. Prod. 74 = *nubia*.

amethystina, Salisb. l. c. = *mexicana*.

amethystina, Sm. Ic. Ined. ii. 27. t. 27.—N. Granat.

amoena, Sims, Bot. Mag. t. 1294 = *lamiifolia*.

amplexicaulis, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 236 = *virgata*.

amplexicaulis, Lam. Illustr. i. 68 = *sylvestris*.

angulata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 721.—Venezuela.

angustifolia, Cav. Ic. iv. 9. t. 317.—Mexic.

angustifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 15 = *azurea*.

angustifolia, Salisb. Prod. 73 = *dentata*.

antirrhiniflora, Dehnh. Cat. Pl. Hort. Camald. 27.—Hab.?

applanata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 3 = *nilotica*.

aprica, Dupuy, ex Nym. Consp. 569 = *pratensis*.

aprica, Schur, Enum. Pl. Transs. 522 = *nemorosa*.

arachnoidea, Noé, ex Walp. Ann. iii. 256 = *phlo-moides*.

arenaria, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 257.—Bras.

argaea, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 601 = *recognita*.

argentea, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 223 = *candidissima*.

argentea, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 773 = *officinalis*.

argentea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 38.—Reg. Mediterr.

arguta, Benth. Lab. Gen. et Sp. 283 = *salicifolia*.

arida, Salisb. Prod. 73 = *aegyptiaca*.

aristata, Auch. ex Benth. in DC. Prod. xii. 270.—Persia.

aristulata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 67.—Mexic.

arizonica, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 370.—Arizona.

armena, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 654 = *candidissima*.

Arrabidaea, Steud. Nom. ed. II. ii. 503.—Bras.

asiophylla, Steud. l. c., sphalm. = *aspidophylla*.

aspera, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 71.—Mexic.

asperata, Falc. ex Benth. in DC. Prod. xii. 282.—Reg. Himal.

asperifolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 281.—Reg. Himal.

asperula, Hort. ex Benth. l. c. 237 = *sylvestris*.

aspidophylla, Schult. Mant. i. 206 = *lanceolata*.

assurgens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 293.—Mexic.

atlantica, Pers. Syn. i. 29 = *argentea*.

atomaria, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 18 = *verbascifolia*.

SALVIA :—

atropatana, Bunge, Lab. Pers. 47.—Persia.
Aucheri, Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 38.—As. Min.

aurasiaca, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 306 = *argentea*.
aurea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 38.—Afr. austr.

auriculata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *triloba*.

aurita, Schult. Obs. Bot. 10 = *officinalis*.

aurita, Thunb. Prod. Pl. Cap. 96.—Afr. austr.

austriaca, Jacq. Fl. Austr. ii. 8.—Europ. austr. or.

austriaca, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 656 = *staminea*.

axillaris, Moq. & Sesse, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 270.—Mexic.

ayavacensis, Schult. Mant. i. 195, sphalm. = *seq.*

ayavazensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 298.—Peruv.

azurea, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 299 = *lamiifolia*.

azurea, Lam. Journ. Hist. Nat. i. (1792) 409.—Am. bor.

baccifera, Etling. Salv. 18 = *triloba*.

bachtiarica, Bunge, Lab. Pers. 47 = *atropatana*.

baetica, Boiss. Elench. 73 = *bullata*.

Balansae, Noé, ex Coss. Notes Crit. 139.—Afr. bor.

balaustina, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 133. t. 189.—Bras.

ballotaeflora, Benth. Lab. Gen. et Sp. 270.—Texas; Mexic.

barbata, Lam. Illustr. i. 72 = *africana*.

Barrelieri, Etling. Salv. 46 = *inamoena*.

Barrelieri, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 235 = *virgata*.

Barrelieri, Tenore, Fl. Nap. i. 9. t. 2 = *pratensis*.

Bauhini, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 235 = *virgata*.

Baumgartenii, Heuff. ex Griseb. & Schenk, in Wiegmann. Arch. xviii. (1852) 328 = *pratensis*.

bavarica, Schrank, Baier. Fl. ii. 133 = *austriaca*?

Beckeri, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 276.—Reg. Caucas.

bengalensis, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 145 = *Meriandra benghalensis*.

Benthamiana, Boiss. ex Benth. in DC. Prod. xii. 269 = *Russeggeri*.

Benthamiana, Gardn. & Field. Sert. Pl. t. 19.—Bras.

Benthamii, Pohl, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 187 = *brevipes*.

Bernardina ×, Parish, ex Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 211.—Calif.

Bertolonii, Vis. Fl. Dalm. ii. 189.—Europ. austr.

Bethelli, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1831) i. 51 = *involuta*.

Betonica, Schult. Mant. i. 188 = *elongata*.

betonicaefolia, Etling. Salv. 48 = *pendula*.

betonicaefolia, Lam. Illustr. i. 70 = *S. Verbenaca*.

bicolor, Lam. l. c. 69.—Reg. Mediterr. occ.

bifida, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 202 = *Forskohlei*.

biflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 24 = *tubiflora*.

biserrata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 66.—Mexic.

Blancoana, Webb & Heldr. ex Walp. Ann. iii. 254 = *S. Candelabrum*.

Blodgettii, Chapm. Fl. S. U. St. 319.—Am. bor.

Bodeana, Bunge, Lab. Pers. 42.—Persia.

bogotensis, Benth. in DC. Prod. xii. 312.—N. Granat.

boliviana, Van Houtte, in Fl. des Serres, xi. (1856) 151.—Bolivia.

Bolleana, Noé, ex Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 284.—Ins. Canar.

Bonplandiana, F. G. Dietr. Vollst. Lexic. Gaertn. Nachtr. vii. 403 = *discolor*.

Boostiana, Jacq. f. Eclog. i. 69. t. 47 = *lamiifolia*.

Boosii, Tratt. Arch. Gew. i. 58. t. 92 = *lamiifolia*.

Boucheana, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 9.—Am. trop.

Bourgeana, W. Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. xxi. (1885) 96.—Lycia.

brachiata, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 145 = *plebeia*.

brachycalyx, Boiss. Fl. Orient. iv. 625.—As. Min.; Syria.

brachypoda, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *brevipes*.

bracteata, Poir. Encyc. vi. 622 = *hirsuta*.

bracteata, Sims, Bot. Mag. t. 2320 = *S. Sclarea*.

bracteata, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 242.—As. Min.; Syria.

brasiliensis, Spreng. Syst. i. 56 = *splendens*.

SALVIA :—

brevicalyx, *Benth. in DC. Prod.* xii. 309.—Mexic.
breviflora, Moq. & Sesse, ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 274 = spicata.
brevipes, *Benth. in DC. Prod.* xii. 321.—Bras.
Broussonetii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 227.—Ins. Canar.; Afr. bor.
Broussoneti, Bolle, in *Bonplandia*, viii. (1860) 284 = Bolleana.
bullata, Orteg. Hort. Matr. Dec. 109 = tenella.
bullata, Vahl, *Enum.* i. 265.—Hispan.; Lusitan.
bullulata, *Benth. in DC. Prod.* xii. 327.—Peruv.
bupleuroides, Presl, ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 271.—Mexic.
byzantina, Hort. ex *Benth.* l. c. 240 = *S. Verbenaca*.
byzantina, Juss. ex *Steud. Nom.* ed. I. 725.—Turcia.
cabulica, *Benth. in DC. Prod.* xii. 268.—Afghan.
cacliaefolia, *Benth.* l. c. 348.—Mexic.
cadmica, Boiss. *Diagn.* Ser. I. v. 6.—As. Min.
caduca, Vahl, ex Hornem. Hort. Hafn. i. 30 = virgata.
caerulea, Linn. *Sp. Pl.* 26.—Afr. austr.
caesia, Scheele, in *Linnaea*, xxii. (1849) 588 = *farinacea*.
caesia, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 40 = polystachya.
caespitosa, Montbr. & Auch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* vi. (1836) 39.—As. Min.
calaminthaefolia, Vahl, *Enum.* i. 233.—Ins. S. Doming.
Calverti, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 626 = *staminea*.
calycina, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* i. 13. t. 16.—Graecia.
calyciniflata, Moq. & Sesse, ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 288 = *Sessei*.
camaraefolia, *Benth. in DC. Prod.* xii. 342.—N. Granat.
Camertoni, Regel, in *Bot. Zeit.* xi. (1853) 334 = *elegans*?
campanulata, Wall. ex *Benth. in Wall. Pl. As. Rar.* i. 67.—Reg. Himal.
campestris, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 20 = *virgata*.
cana, Wall. Cat. n. 2145 = *lanata*.
canariensis, Linn. *Sp. Pl.* 26.—Ins. Canar.
candelabrifolmis, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 134 = *S. Candelabrum*.
Candelabrum, Boiss. *Elench.* 72.—Hispan.
candicans, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 61.—Mexic.
candidissima, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 22 = *verbascifolia*.
candidissima, Guss. *Fl. Sicil. Prod.* i. 16 = *argentea*.
candidissima, Vahl, *Enum.* i. 278.—As. Min.
Candollei, Timb. in *Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* i. (1872-73) 285.—Gallia.
canescens, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 250 = *pallida*.
canescens, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 86.—Reg. Caucas.
capitata, Schlecht. in *Linnaea*, xxvi. (1853-55) 292.—Mexic.
Capusii, Franch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xviii. (1884) 232.—Turkestan.
cardinalis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 301. t. 152 = *fulgens*.
cardiophylla, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 721.—Am. austr.
carduacea, *Benth. l. c.* 302.—Calif.
carnea, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 300.—N. Granat.
carnosa, Dougl. ex *Benth.* in *Bot. Reg.* sub t. 1469 = *Audibertia incana*.
cataonica, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 602.—As. Min.
catarioides, Loisel. ex *Drapiez, Herb. Amat.* vi. (1833) t. 390.—Hab.?
caucasica, Schrank, in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 58 = *virgata*.
Cedronella, Boiss. *Diagn.* Ser. I. v. 3.—Graecia.
cedrosensis, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 212.—Calif.
ceratophylla, Linn. *Sp. Pl.* 27.—As. Min.; Persia.
ceratophylla, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 68 = *S. Verbenaca*.
ceratophylla, Tenore, *Syll. Fl. Neap.* 21 = *ceratophylloides*.
ceratophylloides, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* p. lix = *lanigera*.
ceratophylloides, Linn. *Mant.* i. 26.—Sicilia; Aegypt.
ceratophylloides, Vahl, *Enum.* i. 279 = *S. Verbenaca*.
cespitosa, Montbr. & Auch. = *caespitosa*.

SALVIA :—

chamaedrifolia, Andr. Bot. Rep. t. 416 = *chamaedryoides*.
chamaedryoides, Cav. *Ic.* ii. 77. t. 197.—Texas; Mexic.
Chamaedrys, Willd. Hort. Berol. i. 29 = *chamaedryoides*.
Chamaeclaeagnea, Roem. & Schult. Syst. i. 634, sphalm. = seq.
Chamaeclagnus, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 1 = *paniculata*.
Chapmani, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. 370.—Am. bor.
chilensis, Regel & Koern. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 45.—Chili.
chinensis, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 725.—China.
chionantha, Boiss. *Diagn.* Ser. I. v. 8.—As. Min.
chnoodes, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 98.—Lycia; Mesopot.
chorassanica, Bunge, *Lab. Pers.* 45.—Persia.
chromatica, Hofmigg. *Verz. Pfl.* 194 = *officinalis*.
chrysantha, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 72.—Mexic.
chrysophila, J. A. Schmidt, in Mart. *Fl. Bras.* viii. 187 = *rigida*.
chrysophylla, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 96.—Lycia.
ciliata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 286 = *coccinea*.
ciliata, Hort. ex Poir. *Encyc.* vi. 588 = *hirsuta*.
ciliata, Rafin. *Fl. Ludov.* 41 (Quid?).—Am. bor.
ciliacea, Boiss. *Diagn.* Ser. II. iv. 19 = *crassifolia*.
cinnabarina, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 63.—Mexic.
circinnata, Cav. *Ic.* iv. 9. t. 318 = *amarissima*.
clandestina, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 36 = *S. Verbenaca*.
clandestina, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 16. t. 24 = *controversa*.
clandestinoides, Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 169 = *S. Verbenaca*.
clausa, Vell. *Fl. Flum.* 13; i. t. 33.—Bras.
Claytoni, M. A. Curt. ex A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. 370 = *urticifolia*.
Claytoni, Ell. Sketch, i. 32 = *S. Verbenaca*.
Claytoni, Nutt. *Gen. Am.* 17.—Am. bor.
cleistogama, De Bary & Paul, *Ind. Sem. Hort. Halens.* (1867) 6.—Cf. *Bot. Zeit.* xxix. (1871) 555.—Afr. austr.
clinopodioides, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 294. t. 145.—Mexic.
Clusii, Hort. ex Vilms. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 773 = *officinalis*.
Clusii, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 37 = *triloba*.
Clusii, Timb. in *Mém. Acad. Toul. Sér. VII.* ii. (1870) 237 = *pratensis*.
coarctata, Vahl, *Enum.* i. 253 = *foetida*.
coccinea, Buchoz, ex *Etling. Salv.* 23 (an seq.?).—Hab.?
coccinea, Juss. ex Murr. in *Comm. Gotting.* i. (1778) 86. t. 1.—Am. bor. et trop.
coelestina, Carr. in *Rev. Hort.* (1878) 49.—Mexic.
coerulea, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 298.—Bras.
coerulea, Hort. ex *Benth.* l. c. 299 = *lamiifolia*.
collina, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 288.—Ecuador.
collina, Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 18 = *S. Verbenaca*.
collina, Salisb. *Prod.* 73 = *sylvestris*.
collina, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 522 = *nemorosa*.
colorans, Hort. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 287 = *splendens*.
colorata, Linn. Syst. ed. XII. 66 = *aurea*.
colorata, Thore, *Chlor. Land.* 17 = *S. Horminum*.
colorata, Vahl, *Enum.* i. 230 = *africana*.
Columbariae, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 302.—Am. bor. occ.
commutata, *Benth.* l. c. 222 = *dominica*.
comosa, Peyr. in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 32.—Mexic.
comosa, Salisb. *Prod.* 73 = *S. Horminum*.
complanata, Wall. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 504, sphalm. = *campanulata*.
compressa, Vent. *Fard. Cels.* 59.—Persia; Afghan.
concolor, Lamb. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 297.—Mexic.
confertiflora, Pohl, *Pl. Bras. Ic.* ii. 134. t. 190.—Bras.
confusa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 210.—Europ. austr.
congesta, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 194.—Abyss.
Conradi, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 97.—Caria.
controversa, Tenore, *Syll. Fl. Neap.* 18.—Reg. Mediterr.

SALVIA :—

cordata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 268.—Bras.
coriifolia, Scheele, in *Linnaea*, xxii. (1839) 587 = *azurea*.
corrugata, Vahl, *Enum.* i. 252.—Peruv.
corymbosa, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2149 = *plebeia*.
costaricensis, Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 39.—Costa Rica.
crassifolia, Desf. *Arb.* i. 134.—Europ. austr.
crassifolia, Jacq. *Fragm.* 47. t. 60 = *bicolor*.
crassifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* i. 19. t. 26.—As. Min.
cremenecensis, Bess. *Enum. Pl. Volh.* 40 = *pendula*.
crenata, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 74.—Mexic.
cretica, Linn. *Sp. Pl.* 23.—Hispan.; Creta.
crispula, *Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 234.—Afr. austr.
Cruckshanksii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 261 (Cruckshanksii).—Peruv.
cryptantha, Montbr. & Auch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* vi. (1836) 40.—As. Min.
cryptanthos, Schult. *Obs. Bot.* 12 = *hirsuta*.
cryptoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 275.—Madag.
cuneifolia, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 270.—Mexic.
cuphaefolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 288.—Peruv.
curviflora, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 284.—Mexic.
cuspidata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 23. t. 40.—Peruv.
cyanea, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 296.—Mexic.
cyanea, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. 21 = *lamiifolia*.
cyaneus, Boiss. & Bal. *Diagn.* Ser. II. iv. 19.—Armenia.
cyanifera, Otto, ex *Benth.* in *DC. Prod.* xii. 336 = *cyanea*.
cyaniflora, A. Dietr. in Otto & Dietr. *Allg. Gartenz.* i. (1833) 301 = *cyanea*.
cyanocalyx, Boiss. in *Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 148, nomen.—As. Min.
cypria, Ung. & Kotschy, *Ins. Cyp.* 266.—Ins. Cyprus.
dasyantha, Lem. in *Rev. Hort.* Sér. IV. viii. (1859) 438.—N. Granat.
decipiens, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 64 = *patens*.
deltoidea, Pers. *Syn.* i. 28 = *S. Regla*.
densiflora, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 721.—Ins. Dominic.?
dentata, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. i. 37.—Afr. austr.
derasa, *Benth. Pl. Hartw.* 242.—N. Granat.
deserta, Schangin, in *Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat.* (1824) 6 = *sylvestris*.
deserti, Decne. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* ii. (1834) 248.—Arab.
desertorum, J. A. Schmidt, in Mart. *Fl. Bras.* viii. 189 = *scabrida*.
dianthera, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. i. 263 = *Meriandra benghalensis*.
dichroa, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 6004 = *bicolor*.
dichroantha, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 96.—Lycia.
dichroma, La Llave, in *La Naturaleza*, vii. (1885) Apénd. 82.—Mexic.
dielytroides, Roetz, ex Van Houtte, in *Fl. des Serres*, xxiv. (1861) 31 = *Roetzi*.
digyna, Stokes, *Bot. Mat. Med.* i. 58 = *cretica*.
discolor, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 294.—Peruv.
disermas, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 36.—Syria.
disermas, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 16 = *S. Verbenaca*.
distans, Pohl, ex Steud. *Nom.* ed. I. 725 = *austriaca*.
divaricata, Montbr. & Auch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* vi. (1836) 37.—Cappadoc.
diversifolia, *Benth.* in *DC. Prod.* xii. 274, in syn. = *nivea*.
diversifolia, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot.* ii. 108 = *chinensis*?
doliostachys, Lag. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 724 = *pulchella*.
dominica, Linn. *Sp. Pl.* 25.—Syria.
dominica, Sw. *Obs. Bot.* 18. t. 1. f. 1 = *serotina*.
dracocephaloides, Boiss. *Diagn.* Ser. I. v. 4.—Persia.
Dregeana, *Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 234.—Afr. austr.
dubia, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 657 = *pratensis*.
dubia, Lowe, in Hook. *Journ. Bot.* i. (1834) 37 = *S. Verbenaca*.

SALVIA:—

dumetorum, Andr. in Bess. Enum. Pl. Volh. 3, 40.—Europ. bor.; As. bor.;
 Eckloniana, Benth. in DC. Prod. xii. 273.—Afr. austr. elata, Host, Fl. Austr. i. 24 = sylvestris.
 elata, Poir. Encyc. vi. 625 = azurea.
 elegans, Vahl, Enum. i. 238.—Mexic.
 elongata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 287. t. 139.—Mexic.
 elongata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 75 = protracta.
 elongata, Salisb. Prod. 74 = indica.
 elongata, Spreng. Pugill. i. 3 = bullata.
 elongata, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 231 = azurea.
 elsholtzioides, Benth. Bot. Voy. Sulph. 152. t. 50 = hyptoides.
 Engelmanni, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 368 (Salviastri sp.).—Texas.
 Engelmanni, Hort. ex Schlecht. in Linnaea, xxvii. (1854) 504 = Roemeriana.
 eremetica, Cerv. ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 2 = polystachya.
 eremophila, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 12.—Persia.
 eriocalyx, Bert. ex Roem. & Schult. Syst. i. Addit. ii. 246.—Jamaic.
 eriophora, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 611.—Cilicia.
 erosa, Desf. Tabl. ed. II. 68; et ex Poir. Encyc. Suppl. v. 49 = S. Verbenaca.
 euphratica, Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 40.—Cappadoc.
 exasperata, Cav. in Anal. Hist. Nat. ii. (1800) 113. t. 17 = ceratophylloides.
 excelsa, Benth. ex Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 90.—Mexic.
 excisa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 25 = tubiflora.
 exserta, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 274.—Reg. Argent.
 farinacea, Benth. Lab. Gen. et Sp. 274.—Texas; Mexic.
 farinosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 78 = purpurea.
 filamentosa, Tausch, in Flora, xxv. (1842) 282; Regel, Gartenfl. vii. (1858) t. 232 = coccinea.
 filipes, Benth. in DC. Prod. xii. 309.—Mexic.
 fimbriata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 299. t. 149 = tiliifolia.
 flavescens, Füss. ex Steud. Nom. ed. I. 726.—Hab. ?
 flexuosa, Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 248.—Mexic.
 flexuosa, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 57 = limbata.
 flocculosa, Benth. Pl. Hartw. 244.—Ecuador.
 floribunda, Brongn. in Lem. Hort. Univ. iii. (1841) 296.—Hab. ?
 florida, Benth. in DC. Prod. xii. 338.—Peruv.
 foetida, Lam. Illustr. i. 69.—Marocc.
 foliosa, Benth. in Bot. Reg. t. 1429 = rhombifolia.
 fontinalis, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 177.—Ind. or.
 formosa, L' Hér. Stirp. Nov. 41 = leonuroides.
 Forskählei, Linn. Mant. i. 26 = seq.
 Forskählei, Linn. Syst. ed. XII. 67.—As. Min.
 Fortunii, Benth. in DC. Prod. xii. 354.—China.
 fragifera, Etling. Salv. 19. n. 5 = pomifera.
 frigida, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 10.—As. Min.
 frigida, Boiss. Fl. Orient. iv. 620 = xanthocheila.
 frugifera, Benth. Lab. Gen. et Sp. 215 = pomifera.
 fruticetorum, Benth. l. c. 284.—Bras.
 fruticosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = triloba.
 fruticulosa, Benth. Lab. Gen. et Sp. 721.—Mexic.
 fruticum, Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 163 = grandiflora.
 fulgens, Cav. Ic. i. 15. t. 23.—Mexic.
 Fuschii, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. VII. ii. (1870) 213.—Gallia.
 Gaillardoti, Boiss. Fl. Orient. iv. 628 = viscosa.
 galatica, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 653.—Galatia.
 galeata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 27. t. 42.—Peruv.
 Galeottii, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 75 = coccinea.
 gargarica, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829); ex ej. Syll. Fl. Neap. 18 = virgata.
 garipensis, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 232.—Afr. austr.
 Gerardiana, Benth. in Wall. Cat. n. 2150 = coccinea.

SALVIA:—

gesneraeflora, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 49. t. 47.—N. Granat.
 gesneriaefolia, Lindl. ex Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) t. 179, sphalm. = praec.
 gigantea, Desf. Tabl. ed. II. 68; Cat. Hort. Par. ed. III. 394 = virgata.
 Gilliesii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 265.—Chili.
 glabra, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 68.—Mexic.
 glabrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 299.—Mexic.
 glandulifera, Cav. in Anal. Hist. Nat. ii. (1800) 111.—Ecuador.
 glaucescens, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. t. 192 = coccinea.
 glechomaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 290. t. 141.—N. Mexic.
 glumacea, H. B. & K. l. c. 298.—Mexic.
 glutinosa, Linn. Sp. Pl. 26.—Europ. austr.; Oriens; Reg. Himal.
 gossypina, Benth. Pl. Hartw. 330 = carduacea.
 Goudotii, Benth. in DC. Prod. xii. 339.—N. Granat.
 graciliflora, Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. x. 57 = aurita.
 graciliflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 75.—Mexic.
 gracilis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 258.—Mexic.
 Grahami, Benth. in Bot. Reg. t. 1370.—Mexic.
 grandidentata, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829); ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 519 = virgata.
 grandiflora, Etling. Salv. 17.—As. Min.
 grandiflora, Hornem. Hort. Hafn. i. 27 = pendula.
 grandiflora, Née, ex Cav. Ic. v. 33 = patens.
 grandiflora, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. v. 3 = officinalis.
 grandiflora, Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 163 (Quid?).—Croatia.
 granitica, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 65.—Afr. austr.
 grata, Vahl, Enum. i. 244 = oppositiflora.
 graveolens, Vahl, l. c. 273 = dominica.
 Greggii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 369.—Texas; Mexic.
 guaranitica, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 298.—Bras.
 Gundelia, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 653.—Oriens.
 Gussonii, Boiss. ex Nym. Consp. 569 = argentea.
 Hablitziana, Pall. Tabl. Taur. 44; et ex Clarke, Trav. i. 572.—Tauria.
 Hablitziana, Willd. Sp. Pl. i. 129 = scabiosaefolia.
 haematodes, Linn. Sp. Pl. 24 = pratensis.
 haematodes, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 29 = S. Sclarea.
 Haenkei, Benth. Lab. Gen. et Sp. 283.—Peruv.
 halaensis, Vicary, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. i. (1848) 432.—Ind. or.
 Hallieri, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 726.—Hab. ?
 hastaeifolia, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 233.—Afr. austr.
 hastata, Etling. Salv. 48 = nutans.
 Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient. iv. 605.—Cataonia.
 Heerii, Regel, Gartenfl. iv. (1855) 77. t. 115.—Peruv.
 Heldreichiana, Boiss. ex DC. Prod. xvii. 320 = Russeggeri.
 helianthemifolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 254.—Mexic.
 Henryi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 368.—N. Mexic.
 herbacea, Benth. Lab. Gen. et Sp. 720.—Mexic.
 Hermani, Timb. ex Nym. Consp. 570.—Europ.
 heterophylla, Hort. ex Benth. in DC. Prod. xii. 294 = S. Verbenaca.
 hians, Royle, ex Benth. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 373.—Reg. Himal.
 hiemalis, Brot. Phyt. Lusit. ii. 3 = S. Verbenaca.
 hierosolymitana, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 61.—Syria.
 Hilarii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 282.—Bras.
 hirsuta, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 1. t. 253.—Mexic.
 hirta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 296.—Peruv.
 hirta, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 60 = storodoniaefolia.
 hirtella, Vahl, Enum. i. 249.—Peruv.
 hispanica, Etling. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 420 = officinalis.
 hispanica, Linn. Sp. Pl. 25.—Am. trop.
 hispanorum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 1 = lavandulaefolia.

SALVIA:—

horminioides, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 327 = S. Verbenaca.
 Horminum, Linn. Sp. Pl. 24.—Reg. Mediterr.
 Hoveyi, Hort. ex Gard. Chron. (1880) ii. 695 = splendens.
 Humboldtiana, F. G. Dietr. Vollst. Lexic. Gaertn. vii. 418 = spicata.
 Humboldtiana, Schult. Mant. i. 183 = lavanduloides.
 Humboldtii, Spreng. Syst. i. 64 = spicata.
 humilis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 247.—Mexico.
 hybrida, Schur, Enum. Pl. Transs. 522.—Europ.
 Hydrangea, DC. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 717.—Persia.
 hyemalis, Auct. = hiemalis.
 hyemalis, Boose, ex A. Dietr. Sp. Pl. i. 276 = lamiifolia.
 hypanica, Andr. in Bess. Enum. Pl. Volh. 3 = virgata.
 hypargeia, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 34 = Montbretii.
 hypochionaea, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 8.—Oriens.
 hypochionaea, Buhse, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 620 = atropatana.
 hypoleuca, Benth. in DC. Prod. xii. 279.—Persia.
 hypoleuca, Hochst. ex Benth. l. c. 282 = Schimperii.
 hyptoides, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 74.—Mexic.
 ianthina, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xv. (1847) 362.—Mexico.
 illyrica, Schult. Obs. Bot. 8 = S. Verbenaca.
 inamoena, Vahl, Enum. i. 269.—Hispan.
 incana, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 68.—Mexic.
 incarnata, Cav. Anal. Hist. Nat. ii. (1800) 112 = elegans.
 incarnata, Etling. Salv. 25 = triloba, recognita.
 incisa, Benth. in DC. Prod. xii. 352.—Afr. austr.
 inconspicua, Benth. Lab. Gen. et Sp. 247.—Mexic.
 incurvata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 24. t. 42.—Peruv.
 indica, Heyne, ex Roem. & Schult. Syst. i. 263 = Meriandra benghalensis.
 indica, Linn. Sp. Pl. 26.—Ind. or.
 indica, Linn. l. c., partim = brachycalyx.
 integerrima, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 = africana.
 integrifolia, Hardwicke, in As. Res. vi. (1799) 349 = lanata.
 integrifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 26. t. 36.—Peruv.
 intermedia, Schult. Obs. Bot. 9 = nilotica.
 interrupta, Hort. ex Benth. in DC. Prod. xii. 265 = confusa.
 interrupta, Schousb. Vextr. Marokko, 18.—Marocc.
 involucrata, Cav. Ic. ii. 3. t. 105.—Mexic.
 Jaminiana, Noé, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 581.—Afr. bor.
 japonica, Thunb. Fl. Jap. 22. t. 5.—Japon.
 judaica, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 61.—Syria.
 Karwinski, Benth. Lab. Gen. et Sp. 725.—Mexic.
 Keerlii, Benth. l. c. 263.—Mexic.
 Kochiana, Kunze, Ind. Sem. Hort. Lips. (1847) 4 = S. Aethiopsis.
 Korolkowi, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 356.—Turkestan.
 Kotschy, Benth. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 600 = Russeggeri.
 Kotschy, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 46 = macrosiphon.
 kurdica, Boiss. & Hohen. ex Benth. in DC. Prod. xii. 268.—Kurdistan.
 lachnostachys, Benth. Lab. Gen. et Sp. 267.—Bras.
 laciniata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 2 = S. Verbenaca.
 laciniata, Jord. Gr. Rec. Grenoble (1849), 24 = pratensis.
 laevigata, H. B. & K. Nov. Gen. & Sp. ii. t. 147 = involucrata.
 laevis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 251.—Mexic.
 lamiifolia, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 37. t. 318.—Ind. occ.
 lampsanaefolia, Vahl, ex Steud. Nom. ed. I. 727 = verticillata.
 lanata, Roxb. Hort. Beng. [80]; Fl. Ind. i. 146.—Reg. Himal.
 lanata, Salisb. Prod. 74 = canariensis.
 lanata, Stokes, Bot. Mat. Med. 52 = aethiopica.
 lanceaefolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 49 = lanceolata.
 lanceolata, Brouss. App. Elench. Pl. Hort. Monsp. (1805) 15.—Am. bor. occ.; Mexico.
 lanceolata, Lam. Illustr. i. 72 = nivea.

SALVIA:—

- lanigera, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 95, 394.—Afr. bor.
 lanigera, Poir. Encyc. Suppl. v. 49 = controversa.
 lantanaefolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 69.—Mexic.
 langinosa, Burm. f. Fl. Cap. Prod. i.—Afr. austr.
 lasiantha, Benth. Lab. Gen. et Sp. 276.—Mexic.
 lasiocephala, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 306.—Mexic.
 lasiostachys, Benth. in DC. Prod. xii. 350.—Afr. austr.
 latens, Benth. Pl. Hartw. 242.—N. Granat.
 latifolia, A. Anders. in Trans. Soc. Arts & Manuf. xxv. (1807) 210 = lamiifolia.
 latifolia, Vahl, Enum. i. 271.—Afr. bor.
 lavandulaefolia, Spreng. Syst. i. 58 = lavanduloides.
 lavandulaefolia, Vahl, Enum. i. 222.—Europ. austr.
 lavanduloides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 287.—Mexic.
 laxa, Benth. in DC. Prod. xii. 313 = ballotaefolia.
 Lemmoni, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 309.—Arizona.
 Leonia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 303.—Mexic.
 leonuroides, Gloxin, Obs. Bot. 15. t. 2.—Peruv.
 leptophylla, Benth. Lab. Gen. et Sp. 249.—Mexic.
 leptostachys, Benth. l. c. 258.—Mexic.
 leriaefolia, Benth. in DC. Prod. xii. 287.—Afghan.
 leucantha, Cav. Ic. i. 16. t. 24.—Mexic.
 leucanthera, Vis. in Linnaea, xiv. (1840) 137 = lamiifolia.
 leucocephala, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 302.—Ecuador.
 leucoclada, Benth. in DC. Prod. xii. 314.—Bras.
 leucodermis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 276.—Madag.
 leuconeura, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 20 = S. Aethiopis.
 libanotica, Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II. iv. 16.—Syria.
 limbata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 86.—As. Min.; Persia.
 linarioides, Hort. ex Henders. in Paxt. Flow. Gard. vii. (1840) 77.—Am. austr. ?
 Lindenii, Benth. in DC. Prod. xii. 333.—Mexic.
 lineariifolia, Benth. l. c. 308, sphalm. = lineatifolia.
 linearis, Ruiz & Pav. Fl. Peruv. i. t. 41 = revoluta.
 lineata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 724.—Mexic.
 lineatifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 2 = polystachya.
 linifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 70.—Mexic.
 Linkiana, Schult. Mant. i. 182 = pilantha.
 Littae, Vis. in Padov. Nuov. Saggi, vi. (1847) 87.—Mexic.
 longepetiolata, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 657 = Forskohlei.
 longiflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 23. t. 10.—Peruv.
 longiflora, Willd. Sp. Pl. i. 141 = tubifera.
 longifolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 185 = azurea.
 longifolia, Willd. Sp. Pl. i. 141 = stachyoides.
 longispicata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 73.—Mexic.
 longistyla, Benth. Lab. Gen. et Sp. 295.—Mexic.
 lophantha, Benth. in DC. Prod. xii. 301.—Guatemala.
 Lorentii, Hochst. in Lorent, Wanderung. 333.—Mesopot.
 Lorentzii, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 239.—Reg. Argent.
 Lowei, Steud. Nom. ed. II. ii. 506 = S. Verbenaca.
 loxensis, Benth. Pl. Hartw. 145.—Peruv.
 lupinoides, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1019 = pratensis.
 lusitanica, Jacq. f. Eclog. i. 57.—Hispan.
 lusitanica, Poir. Encyc. vi. 666 = sclaraeoides.
 lutea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 297. t. 148.—Ecuador.
 lutea, Linn. Sp. Pl. 26.—Afr. austr.
 lyræfolia, Salisb. Prod. 73 = lyrata.
 lyrata, Linn. Sp. Pl. 23.—Am. bor.
 macilenta, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 13.—Arab.
 macrantha, Schlecht. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 314 = patens.
 macrantha, Schur, Enum. Pl. Transs. 520 = pratensis.
 macrocalyx, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 133.—Bras.
 macrochlamys, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 595.—Armenia.
 macrophylla, Benth. Lab. Gen. et Sp. 725.—Peruv.
 macrophylla, Tausch, in Flora, xxv. (1842) 282 = hians.
 VOL. II.

SALVIA:—

- macrosiphon, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 11.—Persia; Afghan.
 macrosiphonia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = praec.
 macrostachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 298.—Ecuador.
 madrensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 327. t. 70.—Mexic.
 magnifica, Warsz. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 292, nomen.—Hab. ?
 malacophylla, Benth. in DC. Prod. xii. 312.—Peruv.
 marginata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 236.—Afr. austr.
 Mariana, Mart. in Benth. Lab. Gen. et Sp. 282.—Bras.
 marrubioides, Vahl, Enum. i. 223 (marrubioides) = triloba.
 Martensii, Gal. in Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 77.—Mexic.
 Mathewii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 722.—Peruv.
 Matico, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 239.—Reg. Argent.
 maurorum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 615.—Marocc.
 maxima, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 130 (Quid ?).—Hab. ?
 melissaeiflora, Benth. in DC. Prod. xii. 331.—Bras.
 melissifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 94 = mexicana.
 melissodora, Lag. Gen. et Sp. Nov. 2 = scorodoniaefolia.
 membranacea, Benth. Lab. Gen. et Sp. 259.—Mexic.
 menthaefolia, Tenore, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 379.—Hab. ?
 mentiens, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 137. t. 193.—Bras.
 Merjamie, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 10 = nudicaulis.
 mexicana, Hemsl. in Gard. Chron. (1883) i. 341 = discolor.
 mexicana, Linn. Sp. Pl. 25.—Mexic.
 mexicana, Walt. Fl. Carol. 65 = azurea.
 micrantha, Desf. Tabl. ed. I. 57, nomen = S. Verbenaca.
 micrantha, Vahl, Enum. i. 235 = tenella.
 microcalyx, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 589.—Mexic.
 microculis, Poir. Encyc. vi. 614 = elegans.
 microphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 294.—Mexic.
 microphylla, Torr. Bot. Mex. Bound. 131 = Greggii.
 microstegia, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 17 = verbascifolia.
 miltiorhiza, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 124 (Enum. Pl. Chin. Bor. 50).—China.
 minor, Gleichen, Ausl. Mikrosk. Entdeck. 23.—Hab. ?
 minutiflora, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 124 (Enum. Pl. Chin. Bor. 50) = plebeia.
 misella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 290.—Mexic.
 mitis, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 27.—Peruv.
 Mocinoi, Benth. Lab. Gen. et Sp. 271.—Mexic.
 modesta, Boiss. Fl. Orient. iv. 621.—As. Min.
 mollis, Donn, Hort. Cantab. ed. III. 7 = verticillata.
 mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. t. 153 = amethystina.
 mollis, Jacq. f. Eclog. 56. t. 37 = virgata.
 mollissima, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 71.—Mexic.
 Molucella, Benth. Lab. Gen. et Sp. 216 = acetabulosa.
 monadelphæ, Stokes, Bot. Comment. i. 133.—Hab. ?
 montana, Gardn. & Field. Sert. Pl. Sub. t. 20.—Bras.
 montana, Salisb. Prod. 74 = phlomoides.
 Montbretii, Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 42.—As. Min.; Syria.
 monticola, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 238.—Afr. austr.
 Moorcroftiana, Wall. ex Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 67.—Reg. Himal.
 moschata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 293. t. 143.—N. Granat.
 multicaulis, Vahl, Enum. i. 225 = acetabulosa.
 multifida, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 17 = S. Verbenaca.
 mutilata, Medic. Bot. Beobacht. (1783) 115 (Quid ?).—Hab. ?
 nana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 289.—Peruv.
 napaeifolia, Auct. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 304 = nilotica.
 napifolia, Auct. Croat. ex Nym. Consp. 571 = verticillata.
 napifolia, Jacq. Hort. Vindob. ii. 71. t. 152.—As. Min.; Galliā; Ital.

SALVIA:—

- neglecta, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 18 = S. Verbenaca.
 nemorensis, Pall. Reise Prov. Russ. Reich. ii. 103 = nemorosa ?
 nemorosa, Baumg. ex Nym. Consp. 569 = pratensis.
 nemorosa, Colm. Cat. Pl. Catalun. 122 = valentina.
 nemorosa, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 242.—Europ.
 nemorosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 35 = sylvestris.
 neovidensis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 284.—Bras.
 nepetifolia, Desf. Tabl. ed. II. 68; Poir. Encyc. Suppl. v. 48 = hirsuta.
 nepetoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 299. t. 150 = amarissima.
 nervata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 77.—Mexic.
 nervosa, Benth. Lab. Gen. et Sp. 268.—Bras.
 nigricans, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1883) i. 341; (1883) ii. 588 = discolor.
 nilotica, Juss. ex Jacq. Hort. Vindob. iii. 48. t. 92 = nubia.
 nilotica, Murr. in Comm. Gotting. (1778) 98. t. 2.—Aegypt.
 nipponica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 107.—Japon.
 nitida, Benth. in DC. Prod. xii. 300.—Mexic.
 nitidifolia, Orteg. Hort. Matr. Dec. 53 = mexicana.
 nivea, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 619 = verbascifolia.
 nivea, Thunb. Prod. Pl. Cap. 96.—Afr. austr.
 nodosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 25 = leonuroides.
 nubia, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 42.—Afr. bor. occ.
 nubia, Murr. in Comm. Gotting. (1778) 90. t. 3 = nilotica.
 nubicola, Wall. Pl. As. Rar. i. 68; Cat. n. 2146 = glutinosa.
 nudicaulis, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 24 = virgata.
 nudicaulis, Vahl, Enum. i. 266.—Arab.
 nutans, Linn. Sp. Pl. 27.—Europ. austr. or.
 nutans, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 366 = pendula.
 oblonga, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 24 = virgata.
 oblongata, Schur, Enum. Pl. Transs. 961 (Index) = pratensis.
 oblongata, Vahl, Enum. i. 256 = S. Verbenaca.
 oblongifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 79.—Mexic.
 obovata, Ell. Sketch, i. 33 = lyrata.
 obscura, Benth. Lab. Gen. et Sp. 245 = occidentalis.
 obtusa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 72.—Mexic.
 obtusata, Brot. Phyt. Lusit. i. 203 = S. Verbenaca.
 obtusata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 97.—Afr. austr.
 occidentalis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 14.—Am. trop.
 ochroleuca, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 254; xxii. (1875) 65, nomen.—Marocc.
 ocimoides, Roxb. in Wall. Pl. As. Rar. i. 68; Cat. n. 2148 = lyrata ?
 odorata, Willd. Enum. Hort. Berol. 43 = candidissima.
 officinalis, Linn. Sp. Pl. 23.—Reg. Mediterr.
 officinalis, Pall. Tabl. Taur. 44 = grandiflora.
 oligophylla, Auch. ex Benth. in DC. Prod. xii. 279 = hypoleuca.
 oligostachya, Gasparr. in Ann. Civ. i. (1833) 117.—Europ.
 oppositiflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 26. t. 43.—Ecuador.
 orbicularis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 151.—Panama.
 Orbignaei, Benth. in DC. Prod. xii. 338.—Peruv.
 oreades, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 621 = frigida.
 orgyalis, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 136 = recognita.
 orientalis, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 629 = argentea.
 orientalis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = rosaefolia.
 Ottoniana, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1850) 12 = seq. ?
 Ottonis, Lehm. in E. Otto, Hamb. Gartenz. vi. (1850) 350; Regel, in Gartenfl. (1853) 129; in Bot. Zeit. xi. (1853) 335.—Mexic. vel Peruv. ?
 ovalifolia, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 267.—Bras.
 ovata, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. vii. 465 = triloba.
 Owerini, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 479 = aristata.
 oxyodon, Webb & Heldr. ex Walp. Ann. iii. 254.—Hispan.

SALVIA:—

- pachystachya*, Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) 1. 462 = caespitosa.
palaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 303.—N. Granat.
palaestina, Benth. Lab. Gen. et Sp. 718.—Syria.
pallida, Benth. l. c. 250.—Bras.
paludiflora, St. Amans, Fl. Agen. 10 = S. Verbenaca.
paniculata, Linn. Mant. i. 25.—Afr. austr.
papilionacea, Cav. Ic. iv. 9 = mexicana.
papillosa, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. iii. 58 = officinalis.
paposa, Phil. Fl. Atac. 39.—Chili.
parquenensis, Moq. & Sesse, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 273.—Mexico.
Parryi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 369.—Texas.
parviflora, Brot. Phyt. Lusit. i. 203 = S. Verbenaca.
parviflora, Roxb. Hort. Beng. 4 = plebeia.
parviflora, Salisb. Prod. 74 = nilotica.
parviflora, Vahl, Enum. i. 268 = syriaca.
parvifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 232.—Madag.
patens, Cav. Ic. v. 33. t. 454.—Mexico.
patula, Desf. Fl. Atlant. i. 25 = argentea.
patula, Maund, Bot. Gard. v. 714 = praec.?
pauciflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 303.—Mexico.
pauciserrata, Benth. Pl. Hartw. 241.—N. Granat.
Pavonii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 278.—Peruv.
pectinifolia, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33 = caespitosa.
peloponnesiaca, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 47.—Graec.
pendula, Bess. Fl. Galic. i. 41 = nutans.
pendula, Vahl, Enum. i. 281.—Europ. or.
pentstemonoides, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 13.—Texas.
persepolitana, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 60.—Persia.
persicifolia, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 231.—Bras.
petiolaris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 304.—N. Granat.
phlomoidea, Asso, Oryctog. Arag. 158. t. 4.—Hispan.
phlomoidea, Cav. Ic. iv. 10. t. 320 = hirsuta.
phlyctidea, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 655.—Transcauc.
phoenicea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 302. t. 155.—Ecuador.
Piasezkii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 528.—China.
pichinchensis, Benth. Pl. Hartw. 243.—Ecuador.
pilantha, Link, Enum. Hort. Berol. i. 10 (sp. dub.).—Oriens.
pilifera, Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. (1836) 40.—As. Min.
pilosa, Vahl, Enum. i. 241.—Peruv.
Pinardi, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 59.—Syria.
pinifolia, Roem. & Schult. Syst. i. 220, sphalm. = *pinifolia*.
pinnata, Linn. Sp. Pl. 27.—As. Min.; Syria.
pinnifolia, Pall. Tabl. Taur. 44 = scabiosaefolia.
pisidica, Boiss. & Heldr. ex Benth. in DC. Prod. xii. 269.—As. Min.
Pitcheri, Torr. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 251 = azurea.
platycheila, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 292.—Calif.
plebeia, R. Br. Prod. 501.—As. or.; Austral.
plectranthoides, Griff. Notul. iv. 199.—Reg. Himal.
plumosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 26. t. 37.—Peruv.
pogonocalyx, Hance, in Journ. Linn. Soc. xlii. (1873) 85.—China.
polyadenia, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. v. 7 = limbata.
polyclonos, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 47 = compressa.
polymorpha, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 149. t. 19 = S. Verbenaca.
polystachya, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 77 = xalapensis.
polystachya, Orteg. Hort. Matr. Dec. 55.—Mexico.
pomifera, Linn. Sp. Pl. 24.—Graecia; Syria.
porphyrantha, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 301. f. 16 = Roemeriana.
porphyrata, Hook. Bot. Mag. t. 4939, sphalm. = praec.
porphyrocalyx, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 277.—Madag.
potentillaefolia, Boiss. & Heldr. ex Benth. in DC. Prod. xii. 270.—As. Min.; Syria.

SALVIA:—

- praecox*, Loisel. Not. 6 = virgata.
praecox, Savi, Fl. Pisan. i. 22 = S. Verbenaca.
praecox, Vahl, Enum. i. 274 = spinosa.
prasiifolia, Benth. Bot. Voy. Sulph. 151.—Mexic.
pratensis, Habl. Phys. Besch. Taur. 143 = virgata.
pratensis, Linn. Sp. Pl. 25.—Europ.; Reg. Caucas.
Prionitis, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 74.—China.
prismatica, Hemsl. Biol. Centr. Am. ii. 558 = hispanica.
privoides, Benth. Bot. Voy. Sulph. 150.—Am. trop.
procumbens, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 27 = occidentalis.
procurrens, Benth. Lab. Gen. et Sp. 266.—Am. austr.
propinqua, Benth. l. c. 267.—Bras.
prostratus, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 200.—Ins. Galapag.
protracta, Benth. in DC. Prod. xii. 309.—Mexic.
proxima, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 62 = vitifolia.
prunelloides, Benth. Pl. Hartw. 90 = nana.
prunelloides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 289.—Mexico.
prysmatica, Cav. Desc. 14 = hispanica.
Przewalskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 526.—China.
Pseudo-aethiopsis, Boiss. Fl. Orient. iv. 619 = verbascifolia.
Pseudo-coccinea, Jacq. Coll. ii. 302 = coccinea.
Pseudo-pendula, Schur, Enum. Pl. Transs. 961 (Index) = nutans.
Pseudo-silvestris, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 42.—Persia.
pubescens, Benth. Lab. Gen. et Sp. 723.—Mexic.
pulchella, DC. Cat. Hort. Monsp. 142.—Am. austr.
pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 288. t. 140 = spicata.
pumila, Benth. Lab. Gen. et Sp. 726 = aegyptiaca.
punctata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 27. t. 39.—Ecuador.
pungens, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 350 = nilotica.
punicea, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 65 = elegans.
purpurascens, Mart. & Gal. l. c. 69.—Mexic.
purpurea, Cav. Ic. ii. 52. t. 166.—Mexic.
purpurina, La Llave, in La Naturalesa, vii. (1885) Apénd. 82.—Mexic.
pustulata, Benth. in DC. Prod. xii. 327.—Peruv.
pyramidalis, Petagn. Inst. Bot. ii. 54.—Calabr.
pyrenaica, Linn. Sp. Pl. 25.—Mont. Pyren.
pyrenaica, Vahl, Enum. i. 263 = bicolor.
pyrifolia, Domb. ex Cav. Desc. 13, in obs. = fulgens, leonuroidea.
quercifolia, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 235 = virgata.
quitensis, Benth. in DC. Prod. xii. 339.—Ecuador.
racemosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 25.—Peruv.
radicans, Poir. Encyc. vi. 621 = occidentalis.
Radula, Benth. in DC. Prod. xii. 291.—Afr. austr.
raphanifolia, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 237.—Afr. austr.
Rascheyana, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 58.—Syria.
Rassami, Boiss. Fl. Orient. iv. 615 = palaestina.
recognita, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33.—As. Min.
rectiflora, Vis. Sem. Hort. Patav. (1839) (Ort. Bot. Pad. 145).—Mexic.
recurva, Benth. in DC. Prod. xii. 336.—Mexic.
reflexa, Hornem. Enum. Pl. Hort. Hafn. (1807) 34 = lanceolata.
Regeliana, Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 93.—Reg. Caucas.
Regia, Cav. Ic. v. 33. t. 455.—Mexic.
remota, Benth. in DC. Prod. xii. 304.—Mexic.
repens, Benth. Lab. Gen. et Sp. 267 = ovalifolia.
repens, Burch. ex Benth. l. c. 306.—Afr. austr.
reptans, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 38 = angustifolia.
reticulata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 64.—Mexic.
Reuteriana, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 10.—Persia.
revoluta, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 23. t. 41.—Peruv.
rhinosina, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 239.—Reg. Argent.
rhombifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 26. t. 36.—Peruv.

SALVIA:—

- rhytidea*, Benth. in DC. Prod. xii. 280.—Afghan.
rigida, Benth. Lab. Gen. et Sp. 269.—Bras.
rigida, Thunb. Prod. Pl. Cap. 96 = dentata.
ringens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 14. t. 18.—Graecia.
riparia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 300.—Peruv.
rivularis, Gardn. & Field. Sert. Pl. t. 20.—Bras.
Roborowskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 527.—China.
Roemeriana, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 586.—Texas; Mexic.
Roemeriana, Torr. Bot. Mex. Bound. 132, partim = Henryi.
Roetzli, Scheidw. in Fl. des Serres, xiv. (1861) 31.—Mexic.
rosaefolia, Hort. ex Schult. Mant. i. 183 = pilantha.
rosaefolia, Sm. Ic. Ined. i. 5. t. 5.—Armenia.
Rosani, Tenore, Fl. Nap. iii. 22 = viridis.
rosea, Vahl, Enum. i. 244 = coccinea.
rosmarinifolia, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 632 = lavandulaefolia.
rosmarinoides, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 269.—Bras.
Rosmarinus, Schleiden, Handb. Med. Pharm. Bot. i. 265 = Rosmarinus officinalis.
rostrata, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i. (1791) 8 = pratensis.
rotundifolia, Benth. in DC. Prod. xii. 273 = Eckloniana.
rotundifolia, Salisb. Prod. 74 = africana.
rotundifolia, Vis. in Mem. Ist. Venet. i. 1842 (1843), 42. t. 1 = grandiflora.
rubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 301. t. 154.—Ecuador.
rubicunda, Wender. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 233 = pratensis.
rubifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 56.—Syria.
rubiginosa, Benth. in DC. Prod. xii. 301.—Mexic.
rubra, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 17 = virgata.
rudis, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 235.—Afr. austr.
rufida, Willd. ex Schult. Mant. i. 189 = rufula.
rufula, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 291.—N. Granat.
rugosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 97.—Afr. austr.
rugosissima, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1837-43) 244. t. 7 = controversa.
rumicifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 305.—Ecuador.
runcinata, Linn. f. Suppl. 89.—Afr. austr.
Ruprechtii, Boiss. Fl. Orient. iv. 624 = Beckeri.
Russegeri, Fenzl, Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) [4]; et ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 138.—As. Min.
Russellii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 312.—As. Min.; Mesopot.
ruthenica, Weinm. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii. 55 = nutans.
rutilans, Carr. in Rev. Hort. (1873) 251.—Hab.?
sabulicola, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 121 = S. Verbenaca.
saccata, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 424 = argentea.
sagittata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 23. t. 35.—Peruv.
sahendica, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 172.—Persia.
salicifolia, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 140. t. 196.—Bras.
saligna, Willd. ex A. Dietr. Sp. Pl. i. 307 = spicata.
Salvatori, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 772 = pratensis.
Sanctae-luciae, Seem. Bot. Voy. Herald, 327.—Mexic.
santolinaefolia, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 13.—Persia; Ind. bor. occ.
sarawschanica, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 62.—Turkestan.
saxicola, Wall. ex Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 68; Cat. n. 2147.—Reg. Himal.
Scabiosae, Pers. Syn. i. 29 = seq.
scabiosaefolia, Lam. Journ. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 44. t. 27.—Peruv.
scabra, Benth. Lab. Gen. et Sp. 305 = runcinata.
scabra, Thunb. Prod. Pl. Cap. 97.—Afr. austr.
scabrida, Bertol. Fl. Ital. i. Sp. Add. 855 = Bertolonii.
scabrida, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 140. t. 195.—Bras.
scapiformis, Hance, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 368.—China.
Schielii, Walp. Ann. vi. 1273 (Index), sphalm. = Shielii.

SALVIA :—

- Schimperi, *Benth. in DC. Prod.* xii. 282.—Abyss.
Schimperi, Hochst. ex Benth. in DC. *Prod.* xii. 262 = *Meria* dra benghalensis.
 Schmalhauseni, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 356.—Bokhara.
Sclearaea, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. II. 236 = austriaca.
sclearaeoides, *Brot. Fl. Lusit.* i. 17.—Lusitan.
Sclarea, Linn. *Sp. Pl.* 27.—Reg. Mediterr.; Oriens.
Scorodonia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 264 = scorodoniaefolia.
scorodoniaefolia, *Desf. Tabl.* ed. II. 67; *Poir. Encyc. Suppl.* v. 46.—Mexic.
scrobiculata, *Meyen, Reise*, ii. 45.—Peruv.
scutellarioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 304. t. 158.—Ecuador.
secunda, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 285.—Bras.
Sellowiana, *Benth. in DC. Prod.* xii. 329.—Bras.
semitrata, *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1829) 30) 298.—Mexic.
semperflorens, *La Llave, in La Naturaleza*, vii. (1885) *Apénd.* 81.—Mexic.
serotina, Linn. *Mant.* i. 25.—Ind. occ.
serotina, Vahl, *Enum.* i. 232 = tenella.
serrata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 257.—Bras.
Sessei, Benth. l. c. 288.—Mexic.
sessilifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 276.—Madag.
Shielei, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 45.—Persia.
Sibthorpii, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélop.* 2 = S. Verbenaca.
Sibthorpii, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* i. 17. t. 22 = virgata.
sidaefolia, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 67.—Mexic.
Sideritidis, *Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 255.—Peruv.
Sideritidis, Vahl, *Enum.* i. 250 = hirsuta.
Sieberi, *Presl, Bot. Bemerk.* 100 = palaestina.
silvestris, Auct. = *silvestris*.
simplex, *Spreng. Syst.* i. 58 = elongata.
Simsiana, *Schult. Mant.* i. 210 = S. *Sclarea*.
sinaica, Delile, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 718 = palaestina.
sinapifolia, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 659 = Russellii.
sipylea, Lam. *Illustr.* i. 68 = triloba.
smyrnaea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 5.—As. Min.
somalensis, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 93.—Afr. trop.
Sonklari, *Pant. in Magyar, Növényt. Lapok*, v. (1881) 151.—Europ. austr.
sordida, *Benth. Pl. Hartw.* 241.—N. Granat.
Souchetii, Van Houtte, in *Fl. des Serres*, xiv. (1861) 32 = Rozeii.
speciosa, *Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 272.—Peruv.
spectabilis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 304 = patens.
speirematoides, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 114.—Cuba.
sphacelioides, *Benth. in DC. Prod.* xii. 337.—N. Granat.
spicata, *Schult. Mant.* i. 202.—Mexic.
spicata, Willd. ex A. Dietr. *Sp. Pl.* i. 277 = collina.
Spielmanni, *Scop. Del. Insub.* iii. 31. t. 15 = viridis.
Spielmanni, Willd. *Enum. Hort. Berol.* i. 38 = S. Verbenaca.
Spielmanniana, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 21 = S. Verbenaca.
spinosa, Linn. *Mant.* ii. 511.—Arab.; Mesopot.
spinosa, Moench, *Meth.* 373 = nilotica.
spinulosa, Montbr. & Auch. ex Benth. in DC. *Prod.* xii. 283 = frigida.
spiraeifolia, *Boiss. & Hohen. Diagn.* Ser. I. v. 5.—Syria.
splendens, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 687; *Sellow, ex Nees, in Neuwed. Reise Bras.* ii. 335.—Bras.
squalens, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 297.—Peruv.
squarrosa, *Scheidw. in Hort. Belge*, v. (1838) 187. t. 10.—Mexic.
stachydea, Klein, ex *Schult. Mant.* i. 216 = *Meriandra benghalensis*.
stachydifolia, *Benth. in I. C. Prod.* xii. 311.—Peruv.
stachyoides, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 287. t. 138.—Mexic.
staminea, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 65 = patens.

SALVIA :—

- staminea*, Montbr. & Auch. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. vi. (1836) 41.—As. Min.
stenophylla, *Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 306.—Afr. austr.
stolonifera, *Benth. Pl. Hartw.* 70.—Mexic.
striata, *Benth. in DC. Prod.* xii. 343.—Peruv.
strictiflora, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 234.—Peruv.
strobilanthea, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 214.—Cuba.
suaveolens, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 306 = argentea.
subincisa, *Benth. Pl. Hartw.* 20.—N. Mexic.
sublobata, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 520 = pratensis.
subrotunda, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 290.—Bras.
subsessilis, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 237.—Afr. austr.
subspathulata, *Lehm. in E. Otto, Hamb. Gartenz.* vi. (1850) 457.—Afr. austr.
subtriflora, Roem. & Schult. *Syst.* i. 610 (Index) = tubiflora.
subtriloba, *Schrank, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 58 = triloba.
suffruticosa, Montbr. & Auch. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. vi. (1836) 39.—As. Min.
superba, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 769 = coccinea.
sylvestris, Cav. *Desc.* 291 (*silvestris*) = valentina.
sylvestris, Linn. *Sp. Pl.* 24.—Europ. or.; As. bor.
sylvestris, Vell. *Fl. Flum.* 14; i. t. 34 = Arrabidae.
sylvestris, Vis. *Stirp. Dalm.* 46 = Bertolonii.
sylicola, *Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 304.—Afr. austr.
syplea, Lam. *Illustr.* i. 68 = triloba.
syriaca, Gouan, ex Benth. in DC. *Prod.* xii. 279 = dominica.
syriaca, Linn. *Syst.* ed. X. 854.—As. Min.; Syria; Persia.
Szovitsiana, Bunge, *Lab. Pers.* 43.—Persia.
Tafallae, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 260.—Peruv.
taraxacifolia, *Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 253; xxii. (1875) 65.—Marocc.
taurica, *Habl. ex Willd. Sp. Pl.* i. 129 = scabiosaefolia.
taurica, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 235 = virgata.
tauricola, Schott & Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 608 = acetabulosa.
taurina, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 237 = sylvestris.
Tchihatcheffii, *Boiss. Fl. Orient.* iv. 598.—Galatia.
tebesana, Bunge, *Lab. Pers.* 52.—Persia.
tenella, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 14.—Am. trop.
Tenorii, *Spreng. Pugill.* i. 2 = pratensis.
tenuifolia, *Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 304 = triangularis.
tenuior, Desf. ex Roem. & Schult. *Syst.* i. 200 = lavalundaeifolia.
tetragona, Moench, *Meth.* 373 = hispanica.
texana, Torr. *Bot. Mex. Bound.* 132.—Texas.
thymiflora, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 2 = lamiifolia.
thymoides, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 255.—Mexic.
thyrsiflora, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 151.—Mexic.
tiberina, Mauri, in Tenore, *Viagg. Abruzz.* 41 = pratensis.
tiliaefolia, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 7.—Mexic.
tingitana, Etling. *Salv.* 35 = foetida.
tmolea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 9.—As. Min.
tolimensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 292.—N. Granat.
tomentella, Pohl, *Pl. Bras. Ic.* ii. 138. t. 194.—Bras.
tomentosa, Heyne, ex Wall. *Cat. n.* 2152 = Gomphostemma strobilinum.
tomentosa, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 2 = grandiflora.
tortuosa, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 292. t. 142.—N. Granat.
transsilvanica, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 57 = pratensis.
Trautvetteri, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 355.—Turkestan.
triangularis, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 96.—Afr. austr.
trichocalycina, *Benth. in DC. Prod.* xii. 356.—Afghan.
trichoclada, *Benth. l. c.* 267.—Mesopot.
trichostemoides, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 19 = lanceolata.
trichostyle, Bischoff, Del. *Sem. Hort. Heidelberg.* (1847) in adnot.—Cf. *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. ix. (1848) 319 = farinacea.

SALVIA :—

- tricolor*, Hort. ex Benth. in DC. *Prod.* xii. 290 = pratensis.
tricolor, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 773 = officinalis.
tricolor, Lem. *Illustr. Hort.* iii. (1856) *Misc.* 71. t. 120.—Mexic.
tricuspidata, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 78.—Mexic.
triloba, Linn. *f. Suppl.* 88.—Europ. or.; As. Min.
truncata, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 34 = viridis.
tubaeformis, Auct. = *tubiformis*.
tubifera, Cav. *Ic.* i. 16. t. 25.—Mexic.
tubiflora, Sm. *Ic. Ined.* 26. t. 26.—Peruv.
tubiformis, Klotzsch, in Otto & Dietr. *All. Gartenz.* ix. (1841) 114 = rectiflora.
Turdi, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 194.—Abyss.
uliginosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 251.—Bras.
umbratica, Hance, in *Journ. Bot.* viii. (1870) 75.—China.
undulata, *Benth. in DC. Prod.* xii. 275.—Afr. austr.
undulata, *Wender. ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 508.—Hab.?
urmiensis, Bunge, *Lab. Pers.* 48.—Persia.
urticifolia, Linn. *Sp. Pl.* 24.—Am. bor.
uruguayensis, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 258.—Bras.
valentina, Vahl, *Enum.* i. 268.—Hispan.
vanensis, Boiss. & Noé, *Diagn.* Ser. II. iv. 17 = suffruticosa.
varia, Vahl, *Enum.* i. 273 = syriaca.
variabilis, Loisel. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 241 = S. Verbenaca.
variegata, Host, *Fl. Austr.* i. 27.—Hungar.
variegata, Waldst. & Kit. ex Willd. *Enum. Hort. Berol.* i. 36 = pratensis.
velutina, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 275.—Bras.
velutina, Vahl, *Enum.* i. 268 = sylvestris.
venusta, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 301. t. 153 = amethystina.
verbascifolia, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* iii. 24.—As. Min.; Persia.
Verbenaca, Linn. *Sp. Pl.* 25.—Europ.; Oriens.
verbenacoides, Brot. *Fl. Lusit.* i. 17 = S. Verbenaca.
verbenaeifolia, Salisb. *Prod.* 73 = S. Verbenaca.
versicolor, Lag. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 508.—Hispan.
verticillata, Linn. *Sp. Pl.* 26.—Europ. austr.; Oriens.
vestita, *Benth. in DC. Prod.* xii. 346.—N. Granat.
villosula, Benth. Lab. Gen. et Sp. 720 = Martensii.
violacea, Donn, Hort. *Cantab.* ed. II. 5; et ex A. Dietr. *Sp. Pl.* i. 276 = lamiifolia.
violacea, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 26. t. 43.—Ecuador.
virgata, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. i. 39.—Europ. austr. or.; Oriens.
virgata, Ortega, Hort. *Matr.* Dec. 3 = angustifolia.
virgata, Savi, Bot. *Etrusc.* ii. 4 = pratensis.
viridis, Linn. *Sp. Pl.* 24.—Reg. Mediterr.; Oriens.
viscida, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 268.—Bras.
viscosa, Jacq. *Misc.* ii. 328.—Ital.
viscosa, Wight, ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 509 = *Meriandra benghalensis*.
vitifolia, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 724.—Mexic.
Viviani, Sieber, ex Reichb. *Pl. Crit.* vi. 18. t. 524 = S. Verbenaca.
vulnerariaefolia, Willd. *Sp. Pl.* i. 149 = scabiosaefolia.
Wagneriana, Polak. in *Linnaea*, xli. (1877) 591.—Costa Rica.
Warszewicziana, Regel, in *Flora*, xxxii. (1849) 184.—Guatemala.
Wiedemanni, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 599.—Anatolia.
xalapensis, *Benth. in DC. Prod.* xii. 308.—Mexic.
xanthocheila, Boiss. ex Benth. l. c. 284.—As. Min.; Persia.
- SALVIASTRUM**, Heist. *Syst.* 16 (1748) = **Tarchonanthus**, Vaill. (Compos.).
- SALVIASTRUM**, Scheele, in *Linnaea*, xxii. (1849) 584. **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1196. *texanum*, Scheele, l. c. 585.—Texas.
- SALZMANNIA**, DC. *Prod.* iv. 617 (1830). **RUBIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 106. *nitida*, DC. l. c.—Bras.

SALZWEDELIA, O. F. Lang, in *Flora*, xxvi. (1843)
770 = SALTZWEDELIA, Fl. Wett. = **Genista**,
Linn. (Legumin.).

SAMADERA, Gaertn. *Fruct.* ii. 352. t. 159 (1791).
SIMARUBEAE, Benth. & Hook. f. i. 310.
BIFOREIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 14 (1806).
LOCANDI, Adans. Fam. ii. 449 (1763).
MANUNGALA, Blanco. Fl. Filip. ed. I. 306 (1837).
MAUDUITA, Comm. ex DC. Prod. i. 592 (1824).
NIOTA, Lam. Illustr. t. 299 (1796?).
SAMANDURA, Linn. Fl. Zeyl. 202 (1747), nomen prius.
VITMANNIA, Vahl, Symb. Bot. iii. 51. t. 60 (1794).
brevipetala, Scheff. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxii.
(1871) 410.—Java.
glandulifera, Presl, *Symb. Bot.* ii. 1. t. 51.—Ind. or.
indica, Gaertn. *Fruct.* ii. 352. t. 156.—Ind. or.
lucida, Planch. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846)
562.—Burma.
madagascariensis, A. Juss. in *Mém. Mus. Par.* xii.
(1825) 516. t. 27.—Madag.
pentapetala, G. Don, Gen. Syst. i. 811 = indica.
tetrapetala, G. Don, l. c.—Madag.

SAMANDURA, Linn. Fl. Zeyl. 202 (1747) = praec.

SAMARA, Linn. Mant. ii. 144 (1771) (excl. syn. p. 199)
= **Embelia**, Purm. (Myrsin.).
atropunctata, Arn. in *Proc. Linn. Soc. i.* (1847) 327 =
E. viridiflora.
aurantiaca, Arn. l. c. = E. viridiflora.
australiana, F. Muell. *Fragm.* vi. 164.—Austral.
Blackburnia, Spreng. *Syst. i.* 441 = *Zanthoxylum*
Blackburnia.
esculenta, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 147
= E. floribunda.
floribunda, Benth. & Hook. f. ex Kurz, in *Journ. As.*
Soc. Beng. xlv. (1877) ii. 222 = E. Ribes, floribunda.
frondosa, King, ex Gamble, *List Darjeeling Trees*,
52 = E. Gamblei.
Helicia, D. Dietr. *Syn. Pl. i.* 497 = *Helicia cochinchinensis*.
Izquierda, Spreng. *Syst. i.* 442.—Peruv.
laeta, Linn. Mant. ii. 199 = *Memecylon umbellatum*?
laeta, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 151 = *Myrsine laeta*.
longifolia, Benth. Fl. Hongk. 205.—Ins. Hongkong.
microcalyx, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1877)
ii. 221 = E. microcalyx.
Myrtillus, Kurz, l. c. 223 = E. Myrtillus.
Nagushia, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.*
147 = E. Nagushia.
obovata, Benth. in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 301.—
Ins. Hongkong.
paniculata, Roxb. *Hort. Beng.* 83; *Fl. Ind. i.* 414 =
Ardisia Samara.
parviflora, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1877)
ii. 223 = E. parviflora.
philippensis, Vidal, *Sinops. t.* 61. f. D = E. philippi-
nensis.
picta, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 2302 = E. robusta.
polygama, Roxb. *Hort. Beng.* 83; *Fl. Ind. i.* 414 =
Ardisia polygama.
racemosa, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 232 = E. race-
mosa.
Rheedii, Wight, *l. c.* 1591 = E. viridiflora.
Ribes, Benth. & Hook. f. ex Kurz, in *Journ. As. Soc.*
Beng. xlv. (1877) ii. 222 = E. Ribes.
robusta, Benth. & Hook. f. ex Kurz, l. c. = E. robusta.
scandens, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 232 = E.
javanica.
sessiliflora, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1877)
ii. 223 = E. sessiliflora.
undulata, Arn. in *Proc. Linn. Soc. i.* (1847) 327 =
E. Nagushia.
vestita, Benth. & Hook. f. ex Kurz, in *Journ. As. Soc.*
Beng. xlv. (1877) ii. 223 = E. vestita, nutans.
viridiflora, Arn. in *Proc. Linn. Soc. i.* (1847) 327 =
E. viridiflora.
viridiflora, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 173 = E. viridiflora.

SAMARA, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 32 (1788); *Fl. Ind.*
Occ. i. 261 (1797) = **Myrsine**, Linn.
coriacea, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 32 = M. coriacea.
floribunda, Willd. *Sp. Pl. i.* 665 = M. floribunda.
guianensis, Sw. *Obs. Bot.* 51 = M. floribunda.
laeta, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 151 = M. laeta.
myricoides, Willd. ex Schult. *Mant. iii.* 220 = M.
popayanensis.

SAMARA:—

myrtifolia, Willd. ex Schult. *Mant. iii.* 220 = *Myrsine*
myrtifolia.
pentandra, Ait. *Hort. Kew. ed. I. i.* 160 = M. pen-
tandra.
pentandra, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 98 = M. flori-
bunda.
Potama, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 146
= M. africana.
saligna, Willd. ex Schult. *Mant. iii.* 220 = M. saligna.
sessilis, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 147 =
M. seniserrata.
subspinosa, Buch.-Ham. l. c. = M. semiserrata.

SAMAROPYXIS, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 464 (1860)
= **Hymenocardia**, Wall. (Euphorb.).
elliptica, Miq. l. c. 465 = H. punctata.

SAMARPSES, Rafin. *New Fl. Am.* iii. 93 (1836) =
Fraxinus, Tourn. (Oleac.).
triptera, Rafin. l. c. = F. platycarpa.

SAMBUCUS, Tourn. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735).
CAPRIFOLIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 3.
EBULUM, Garcke, *Fl. Deutschl. ed. VII.* 184
(1865).

PHYTEUMA, Lour. *Fl. Cochinch.* 138 (1790).
TRIPETELUS, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 14
(1839).
adnata, Wall. *Cat. n.* 482; et ex DC. *Prod.* iv. 322.—
Reg. Himal.
angustifolia, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790)
ed. I. Art. iv. 27 = javanica.
alba, Rafin. *Alsog. Am.* 48 (Quid?).—Am. bor.
arborescens, Gilib. *Exercit. i.* 5 = nigra.
arborescens, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* ii. 13
= racemosa.
australis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828)
140.—Bras.
bipinnata, Cham. & Schlecht. l. c. v. (1830) 171.—
Mexic.
bipinnata, Moench, *Meth.* 506 = canadensis.
caerulea, Rafin. *Alsog. Am.* 48 (caerulea).—Am. bor.
occ.
californica, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii. i.* 72 =
caerulea?
canadensis, Burm. f. *Fl. Ind.* 75 = *Turpinia pomi-*
fera.
canadensis, Linn. *Sp. Pl.* 269.—Am. bor.
canadensis, Thunb. *Fl. Jap.* 126 = javanica.
chinensis, Lindl. in *Trans. Hort. Soc. vi.* (1826) 297
= javanica.
cochinchinensis, Spreng. *Syst. i.* 935 = Loureiriana.
columnaris, Hort. ex Lebas, in *Rev. Hort.* (1884)
398 = pyramidata.
dimidiata, Rafin. *Alsog. Am.* 49 (Quid?).—Am. bor.
dissecta, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii. i.* 71 =
nigra.
ebuloides, Desv. ex DC. *Prod.* iv. 323.—China.
Ebulus, Linn. *Sp. Pl.* 269.—Europ.; Oriens; Reg.
Himal.
elegans, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii. i.* 71 =
nigra.
floribunda, Hort. l. c. = nigra.
florida, Salisb. *Prod.* 173 = nigra.
Fontenaysii, Carr. in *Rev. Hort.* (1868) 99 =
caerulea?
Gaudichaudiana, DC. *Prod.* iv. 322.—Austral.
glaucula, Benth. *Pl. Hartw.* 313 = mexicana.
glaucula, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* ii. 13 =
caerulea.
graveolens, Willd. ex Schult. *Syst. vi.* 641 = peruviana.
herbacea, Gilib. *Fl. Lituan. i.* 250 = S. Ebulus.
hirta, Tausch, in *Flora*, xxi. (1838) 737.—Hab.?
humilis, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII. n.* 5 = S. Ebulus.
humilis, Rafin. *Ann. Nat.* 13 = canadensis.
integerrima, Stokes, *Bot. Mat. Med. ii.* 173 =
Loureiriana.
japonica, Thunb. *Fl. Jap.* 125.—Japon.
javanica, Reinw. ex Blume, *Bijdr.* 657.—As. trop.
laciniata, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII. n.* 2 = nigra.
lanceolata, Banks, ex Lowe, in *Trans. Camb. Phil.*
Soc. iv. (1831) 31 = nigra.
leucocarpa, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii. i.* 71 =
nigra.
linearis, Hort. l. c. = nigra.
Loureiriana, DC. *Prod.* iv. 323.—China.
lucida, Tausch, in *Flora*, xxi. (1838) 737.—Hab.?

SAMBUCUS:—

maderensis, Lowe, *Man. Fl. Mad.* i. 381.—Ins. Mader.
medullosa, Gilib. *Fl. Lituan. i.* 2 = nigra.
melanocarpa, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883)
76.—Am. bor. occ.
mexicana, Presl, ex DC. *Prod.* iv. 322.—Am. bor.
occ.
monstrosa, Hort. ex Loud. *Hort. Brit. Suppl. ii.* 671 =
nigra.
nigra, Linn. *Sp. Pl.* 269.—Europ.; As. bor.
nigra, Lour. *Fl. Cochinch.* 181 = Loureiriana.
nigra, Marsh. *Arbust.* 141 = canadensis.
nigra, Thunb. *Fl. Jap.* 126 = racemosa.
palmensis, Link, in *Buch. Besch. Canar. Ins.* 151.—
Ins. Canar.
paucijuga, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848)
ii. 277.—Transcauc.
peruviana, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 429.—
Peruv.
phyteumoides, DC. *Prod.* iv. 323.—Cochinch.
pubens, Michx. *Fl. Bor. Am. i.* 181 = racemosa.
pubescens, Pers. *Syn. i.* 328 = racemosa.
pulverulenta, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. ii. i.* 71 =
nigra.
pyramidata, Hort. ex Lebas, in *Rev. Hort.* (1884)
398.—Hab.?
racemosa, Linn. *Sp. Pl.* 270.—Reg. bor. temp.
repens, Rafin. *Alsog. Am.* 47 (Quid?).—Am. bor.
rotundifolia, Lodd. ex Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 257 =
nigra.
rubra, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 482, p. 235 =
javanica.
rupestris, Rafin. *Alsog. Am.* 50 (Quid?).—Am. bor.
Sieboldiana, Blume, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd.*
Bat. ii. 265 = racemosa.
suaveolens, DC. *Prod.* iv. 323, sphalm. = peruviana.
Thunbergiana, Blume, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd.*
Bat. ii. 265 = javanica.
Thunbergii, G. Don, *Gen. Syst. iii.* 438 = javanica.
tiliaefolia, Wall. *Cat. n.* 483; et ex DC. *Prod.* iv. 257
= Toricellia tiliaefolia.
velutina, Durand & Hilg. in *Pacif. Rail. Rep.* v. 8;
et in *Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii.* (1855)
39 = mexicana.
verrucosa, Rafin. *Alsog. Am.* 49 = racemosa.
virescens, Desf. *Hist. Arbr. i.* 348 = nigra.
vulgaris, Neck. *Delic. Gallo-Belg. i.* 156 = nigra.
Wightiana, Wall. *Cat. n.* 6303 = javanica.
Williamsii, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V. v.* (1866)
217 = racemosa.
xanthocarpa, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict. i.*
(1855) 42.—Austral.

SAMBULUS, Mohl & Schlecht. in *Bot. Zeit.* v. (1847)
424, err. typ. = SUMBULUS, H. Reinsch = **Ferula**,
Tourn. (Umbell.).

SAMERARIA, Desv. *Journ. Bot.* iii. (1813) 161 =
Isatis, Linn. (Crucif.).
armena, Desv. l. c. = I. armena.
cardiaca, Trautv. in *Act. Hort. Petrop. i.* (1871)
31.—Reg. Casp.
elegans, Boiss. *Fl. Orient. i.* 375.—Persia.
glastifolia, Boiss. l. c.—Armenia.
leiocarpa, Boiss. l. c.—Persia.
stylophora, Boiss. l. c.—Persia.

SAMODIA, Bando, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx.* (1843)
350 = **Samolus**, Tourn. (Primul.).
ebracteata, Bando, l. c. = *Samolus ebracteatus*.

SAMOLUS, [Tourn.] Linn. *Syst. ed. I* (1735). **PRIMU-**
LACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 638.
SAMODIA, Bando, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx.*
(1843) 350.

SHEFFIELDIA, Forst. *Char. Gen. t.* 9 (1776).
africanus, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 5 = porosus?
ambiguus, R. Br. *Prod.* 429 = repens?
americanus, Spreng. *Syst. i.* 702 = S. Valerandi.
aquaticus, Lam. *Fl. Fr. iii.* 329 = S. Valerandi.
Beccabungaefacie, Gilib. *Fl. Lituan. i.* 60 = S.
Valerandi.
bracteatus, Stokes, *Bot. Mat. Med. i.* 344 = S. Valerandi.
campanuloides, R. Br. *Prod.* 429 = porosus.
caulescens, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst. v.* 4, in obs.
= S. Valerandi.
ebracteatus, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 223.
t. 129.—Am. bor.; Ind. occ.

SAMOLUS :—

- floribundus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 181 = S. Valerandi.
geniculatus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 422 = S. Valerandi.
juncus, R. Br. Prod. 428.—Austral.
latifolius, Duby, in DC. Prod. viii. 74.—Chili.
littoralis, R. Br. Prod. 428 = repens.
littoralis, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 34.—Hab.?
longipes, Hook. ex Shuttl. in Bot. Zeit. iii. (1845) 222 = ebracteatus.
parviflorus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 337 = repens.
parviflorus, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176 = S. Valerandi?
platyphyllus, F. Muell. Census, 91.—Austral.
porosus, Thunb. Fl. Cap. ii. 32.—Afr. austr.
repens, Pers. Syn. i. 171.—Austral.; N. Zel.
spathulatus, Duby, in DC. Prod. viii. 74.—Am. austr.
subnudicaulis, A. St. Hil. ex Compt. Rend. Acad. Sc. Par. (1838) ii. 98.—Bras.
superbus, Brickell, in Med. Repos. N. York, vi. (1803) 327 (Quid?).—Am. bor.
Valerandi, Linn. Sp. Pl. 443.—Reg. temp.

SAMUDRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 72 (1836) = **Argyrea**, Lour. (Convolv.).
speciosa, Rafin. l. c. = A. speciosa.

SAMYDA, Linn. Coroll. Gen. 21 (1737). **SAMY-**

- DACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 797.
GEUNZIA, Neck. Elem. ii. 440 (1790).
SADYMA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 25 (1859).
affinis, Spreng. Syst. ii. 354.—Ins. S. Doming.
arborescens, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109 = Casearia stipularis.
basanica, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7192 C? = Casearia tomentosa.
Cansiala, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1836) 225 = Casearia tomentosa.
comocladifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia comocladifolia.
coriacea, Poir. l. c. = Casearia coriacea.
crenata, Poir. Encyc. vi. 491 = Casearia nitida.
decandra, Jacq. Enum. Pl. Carib. 21 = Casearia parvifolia.
decurrens, Spreng. Syst. ii. 354.—Bras.
denticulata, Poir. in Dict. Sc. Nat. xvii. 159 = serrulata.
dodecandra, Jacq. Enum. Pl. Carib. 21 = serrulata.
fragilis, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia fragilis.
glabra, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 227; et in Wall. Cat. n. 7195 A = Casearia graveolens.
glabrata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68.—Ind. occ.
grandiflora, Griseb. Cat. Pl. Cub. 11.—Cuba.
grandiflora, Spreng. Syst. ii. 354.—Bras.
greviaefolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia greviaefolia.
Guidonia, Linn. Sp. Pl. 443 = Casearia brevipes.
hirsuta, Poir. Encyc. vi. 493 = Casearia hirsuta.
icosandra, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1962 = Casearia icosandra.
ilicifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 31 = Casearia ilicifolia.
Iroucana, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109 = Casearia ramiflora.
lucida, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 509.—Ind. occ.
macrocarpa, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 48.—Mexic.
macrophylla, Willd. Sp. Pl. ii. 625 = Casearia viridiflora.
multiflora, Cav. Ic. i. 48. t. 67.—Ind. occ.
nitida, Linn. Syst. ed. X. 1025 = Casearia nitida.
Niviana, Poir. Encyc. vi. 493 = Casearia serrulata.
parviflora, Linn. Syst. ed. X. 1025 = Casearia parvifolia.
parviflora, Poir. Encyc. vi. 491 = Casearia sylvestris.
parvifolia, Poir. l. c. 492 = Casearia parvifolia.
petiolaris, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 454 = Laetia suaveolens.
Piscidia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7193 D = Casearia tomentosa.
Pitumba, Poir. Encyc. vi. 492 = Casearia macrophylla.
polyandra, Willd. Sp. Pl. ii. 626 = Casearia Melis-taurum.
procera, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 67 = Laetia procera, casearioides.

SAMYDA :—

- pubescens*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 263 = Casearia tomentosa.
pubescens, Linn. Sp. Pl. ed. II. 758.—Ind. occ.
pubescens, Linn. l. c., partim = serrulata.
rosea, Sims, Bot. Mag. t. 550 = serrulata.
rubra, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 48.—Mexic.
Selloi, Spreng. Syst. ii. 354 = Casearia inaequilatera.
serrulata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 374 = Casearia tomentosa.
serrulata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 558.—Ind. occ.
silvestris, Poir. Encyc. vi. 492 = *silvestris*.
spinescens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68 = Casearia brevipes.
spinosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 557 = Casearia ramiflora.
spinulosa, Vent. Choix, 43. t. 43 = glabrata.
stipularis, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia stipularis.
suaveolens, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 66 = Laetia suaveolens.
sylvestris, Poir. Encyc. vi. 492 (*silvestris*) = Casearia sylvestris.
tinifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia tinifolia?
tomentosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68 = Casearia hirta.
velutina, DC. Prod. ii. 48.—Ins. S. Doming.
villosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68.—Jamaic.
viridiflora, Poir. Encyc. vi. 493 = Casearia viridiflora.

SANAMUNDA, Adans. Fam. ii. 285 (1763) = **Passerina**, Linn. (Thymel.).
Myrsinites, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 147 = Thymelaea Sanamunda.
tomentosa, Zumag. Fl. Pedem. ii. 156 = P. hirsuta.

SANAMUNDA, Neck. Elem. ii. 179 (1790) = **Daphne**, Linn. (Thymel.).

SANCHEZIA, Ruiz & Pav. Prod. 5. t. 32 (1794). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1083.

- ANCYLOGYNE**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 63. t. 7 (1847).
glabra, Pers. Syn. i. 24 = oblonga.
glaucophylla, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1869) 587 = nobilis.
hirsuta, Pers. Syn. i. 24 = ovata.
longiflora, Hook. f. ex Planch. in Fl. des Serres, xxiii. (1880–83) 257. t. 2460.—Ecuador.
munita, Planch. l. c.—Am. trop.
nobilis, Hook. f. Bot. Mag. t. 5594.—Ecuador.
oblonga, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 7. t. 8. f. 6.—Peruv.
ovata, Ruiz & Pav. l. c.—Peruv.

SANDERSONIA, Hook. Bot. Mag. t. 4716 (1853). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 830.
aurantiaca, Hook. Bot. Mag. t. 4716.—Natal.
littonioides, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 262 = Littonia Welwitschii.

SANDORICUM, Cav. Diss. vii. 359. tt. 202, 203 (1789). **MELIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 333.
Beccarianum, Baill. Adansonia, xi. (1873–76) 264.—Borneo.
borneense, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 33.—Malaya.
dasyneuron, Baill. Adansonia, xi. (1873–76) 265.—Borneo.
emarginatum, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 553.—Molucca.
glaberrimum, Hassk. Retzia, i. 145 = indicum.
indicum, Cav. Diss. vii. 359. tt. 202, 203.—As. trop.
Maingayi, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 554 = borneense.
nervosum, Blume, Bijdr. 163 = indicum.
serratum, G. Don, Gen. Syst. i. 680.—Ind. or.
ternatum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 346 = indicum.
venosum, M. Roem. Syn. Hesper. 109 = indicum.

SANFORDIA, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 53 = **Geleznovia**, Turcz. (Rutac.).
calycina, J. Drumm. ex Harv. l. c. 54 = G. calycina.

SANGUINARIA, Dill. ex Linn. Syst. ed. I (1735). **PAPAYERACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 53.
acaulis, Moench, Meth. 227 = canadensis.
canadensis, Linn. Sp. Pl. 505.—Am. bor.

SANGUINARIA :—

- grandiflora*, Rosc. Fl. Illustr. Seasons, t. 8; ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. v. t. 147 = canadensis.
stenopetala, Steud. Nom. ed. II. ii. 510 = canadensis.
vernalis, Salisb. Prod. 376 = canadensis.
virginiana, Gaertn. Fruct. ii. 479 = canadensis.

SANGUINELLA, Gleichen, Mikrosk. Untersuch. 4 [bis] t. 8 (1764) = **Panicum**, Linn.

- Thunbergii*, Gleichen, ex Beauv. Agrost. 177 = Hemarthria compressa.
tripsacoides, Gleichen, ex Beauv. l. c. = Hemarthria compressa.

SANGUISORBA, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = **Poterium**, Linn. (Rosac.).

- alpina*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. i. 142.—Sibir. altaic.
altissima, Moench, Meth. 519 = P. officinale.
Andersonii, G. Don, Gen. Syst. ii. 594.—Sibir.
angustifolia, Radde, Ber. Reis. Sued. Ost-Sibir. 466 = P. tenuifolium.
annua, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 429 = P. annuum.
armena, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 95.—Kurdistan.
auriculata, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 110 = P. officinale.
bracteosa, Bess. ex Eichw. Skizze, 163 = P. officinale.
canadensis, Linn. Sp. Pl. 117 = P. canadense.
carnea, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 144 = P. officinale.
cernua, Bess. in Flora, xvii. (1834) i. Beibl. 11 = P. officinale.
cordifolia, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 22 = P. officinale.
decandra, Benth. & Hook. f. Gen. i. 624, sphalm. = seq.
diandra, Wall. Cat. n. 710 = P. diandrum.
dictyocarpa, Franch. Fl. Cher-et-Loire, 180 = P. sanguisorba.
dodecandra, Moretti, in Eibl. Ital. lxx. (1833) 436; et in Flora, xvi. (1833) 655 = P. dodecandrum (in Addend.).
garganica, Bertol. Fl. Ital. ii. 191 = P. garganicum.
hispanica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = P. officinale.
ingrica, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 193 (Quid?).—Rossia.
longifolia, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bologn. xii. (1861) 234 = P. longifolium.
macrostachya, Comolli & Jan, in Cat. Pl. Hort. Parm. (1833); et in Fl. Comen. i. 200 = P. dodecandrum (in Addend.).
major, Gilib. Fl. Lituan. i. 18 = P. officinale.
mauritanica, Desf. Fl. Atlant. i. 142 = P. verrucosum.
media, Hook. Fl. Bor. Am. i. 197 = P. sitchense.
media, Linn. Sp. Pl. ed. II. 169 = P. canadense.
microcephala, Presl, Epim. Bot. 202.—Am. bor. occ.
minor, Bertol. Fl. Ital. ii. 189 = P. polygamum.
minor, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 110 = P. sanguisorba.
montana, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 212 = P. officinale.
muricata, Franch. Fl. Cher-et-Loire, 181 = P. polygamum.
myriophylla, Reichb. ex A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. i. 10.—Hab.?
neglecta, G. Don, Gen. Syst. ii. 594 = P. officinale.
obtusata, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 160.—Japon.
occidentalis, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 429 = P. annuum.
officinalis, Linn. Sp. Pl. 116 = P. officinale.
palustris, Rafin. Atl. Journ. 153 (Quid?).—Am. bor.
Pimpinella, Spenn. Fl. Friburg. iii. 1085, in textu = P. sanguisorba.
polygama, Nyland. Spicil. Fl. Fenn. Cent. i. 10 = P. polygamum?
Poterium, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 14 = P. sanguisorba.
praecox, Bess. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 611 = P. officinale.
rubra, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 69 = P. officinale.
sabauda, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = P. officinale.
serotina, Jord. Pugill. Pl. Nov. (1852) 71 = P. officinale.
sitchensis, C. A. Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 35) = P. sitchense.
spinosa, Bertol. Fl. Ital. ii. 191 = P. spinosum.

SANGUISORBA:—

tenuifolia, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 144 = *Poterium tenuifolium*.
Vallistellinae, Bertol. Fl. Ital. ii. 772 = *P. dodecandrum* (in Addend.).

SANHILARIA, Leandr. ex DC. Prod. vii. 26 (1838) = *Stiffia*, Mikan (Compos.).

SANICULA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 70 (1737). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 880.

TRICLINIUM, Rafin. Fl. Ludov. 79 (1817).
arctopoides, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 141.—Am. bor. occ.

azorica, Guthnick, ex Seub. Fl. Azor. 41.—Ins. Azor.
bipinnata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 347.—Calif.
bipinnatifida, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 258.—Am. bor. occ.

brasiliensis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 935 = *Klotzschia brasiliensis*.

canadensis, Linn. Sp. Pl. 235.—Am. bor.
canadensis, Thunb. Fl. Jap. 116 = *elata*.

canadensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 49 = *europaea*.
capensis, Eckl. & Zeyh. Enum. 339 = *europaea*.

chilensis, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 84 = *graveolens*.

chinensis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 106 = *europaea*.

ciliaris, Sm. ex H. C. Wats. in Godman, Nat. Hist. Azor. 165 = *azorica*.

ciliata, Soland. ex H. C. Wats. l. c. = *azorica*.
crassicaulis, Poepp. ex DC. Prod. iv. 84 = *S. Liberta*.

crithmifolia, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 419.—*Tauria*.

elata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 183 = *europaea*.

europaea, Linn. Sp. Pl. 235.—Europ.; As. bor.; Afr. austr.

graveolens, Poepp. ex DC. Prod. iv. 85.—Chili.
hermaphrodita, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 183 = *europaea*.

japonica, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 46 = *Cryptotaenia canadensis*.

javanica, Blume, Bijdr. 882 = *europaea*.
lacinata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 347.—Am. bor. occ.

lamelligera, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 11.—China.

Liberta, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 353 (err. typ. 253).—Chili.

macrorrhiza, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 84 = *graveolens*.

marilandica, Linn. Sp. Pl. 235.—Am. bor.
marilandica, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 602, partim = *canadensis*.

maritima, Kellogg, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 431, nomen; et in Bot. Calif. ii. 451.—Calif.

marylandica, DC. Prod. iv. 84 = *marilandica*.
Menziesii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 142.—Am. bor. occ.

mexicana, DC. Prod. iv. 84.—Mexic.
montana, Reinw. ex Blume, Bijdr. 882 = *europaea*.

nevadensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 139.—Calif.

nudicaulis, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 347 = *Menziesii*.

officinalis, Gouan, Hort. Monsp. 131; [Clairv.] Man. Herb. 78 = *europaea*.

officinarum, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 137 = *europaea*.
orthacantha, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 227.—China.

pinnatifida, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 314 = *bipinnata*.

rubriflora, F. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. Amur. 123.—China.

sandwicensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 705. t. 88.—Ins. Sandvic.

sylvatica, Salisb. Prod. 159 = *europaea*.
triclinalia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.

Triclinium, DC. Prod. iv. 85 = *canadensis*.
trilobata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 6 = *europaea*.

tuberculata, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xi. (1867) 431.—Korea.

tuberosa, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 91.—Am. bor. occ.

vulgaris, Fries, Summ. Veg. Scand. 24 = *europaea*.

SANILUM, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70 (1836), nomen prius = *Hewittia*, Wight & Arn. (1837) (Convolv.).

bicolor, Rafin. l. c. = *H. bicolor*.
bracteatum, Rafin. l. c. = *H. bicolor*.

copticum, Rafin. l. c. = *Ipomoea dissecta*.
humile, Rafin. l. c. = *Ipomoea humilis*, Rafin.

parviflorum, Rafin. l. c. = *Ipomoea parviflora*.

SANSEVERA, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 260 (1812) = seq.

SANSEVERINA, Thunb. Fl. Cap. ii. 322 (1817) = *Sanseveria*, Thunb. (Haemod.).

SANSEVIELLA, Reichb. Consp. 44 (1828), nomen prius = *Reineckea*, Kunth (Liliac.).

carnea, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 510 = *R. carnea*.

SANSEVIERA, Willd. Sp. Pl. ii. 159 (1799) = seq.

SANSEVIERIA, Thunb. Prod. Pl. Cap. 65 (1794).
HAEMODORACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 679.

ACYNTHA, Medic. Theodora, 76 (1786).
SALMIA, Cav. Ic. iii. 24. t. 246 (1794).

aethiopica, Thunb. Prod. Pl. Cap. 65 = *zeylanica*.
angolensis, Welw. Apont. 543, nomen; et ex Carr. in Rev. Hort. (1861) 447 = *cylindrica*.

angustiflora, Lindb. in Act. Soc. Sc. Fenn. x. (1871) 130 = *thyrsiflora*.

angustifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 547 = *thyrsiflora*.

bracteata, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 253.—Afr. trop.

Aubrytiana, Carr. in Rev. Hort. (1861) 449.—Afr. trop.

canaliculata, Carr. l. c.—Afr. trop.
cannaefolia, Spreng. Syst. ii. 93 = *Cordyline terminalis*.

carnea, Andr. Bot. Rep. t. 361 = *Reineckia carnea*.
cylindrica, Boj. Hort. Maurit. 349; Hook. Bot. Mag. t. 5093.—Afr. trop.

Ehrenbergii, Schwaef. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 549.—Abyss.

ensifolia, Haw. Syn. Pl. Succ. 66 = *zeylanica*.
flexuosa, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 11 = *Dracaena angustifolia*.

fragrans, Jacq. Fragn. 29 = *Dracaena fragrans*.
fruticosa, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 11 = *Dracaena angustifolia*.

fulvocincta, Haw. Succ. Pl. Suppl. 30 = *thyrsiflora*.
glauca, Haw. Syn. Pl. Succ. 65 = *guineensis*.

grandicuspis, Haw. l. c. 67 = *zeylanica*.
guineensis, Willd. Sp. Pl. ii. 159.—Afr. trop.

hyacinthoides, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 = *guineensis*.

javanica, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 11 = *Dracaena elliptica*.

laetevirens, Haw. Syn. Pl. Succ. 66 = *guineensis*.
lanuginosa, Willd. Sp. Pl. ii. 160.—Ind. or.

latifolia, Boj. Hort. Maurit. 348 = *guineensis*.
longiflora, Sims, Bot. Mag. t. 2634.—Afr. trop.

nilotica, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 548.—Afr. trop.

polyphylla, Haw. Syn. Pl. Succ. 65 = *guineensis*.
pumila, Haw. l. c. 67 = *zeylanica*.

rosea, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. viii. 504 = *Reineckia carnea*.

Roxburghiana, Schult. f. Syst. vii. 357.—Ind. or.
rufocincta, Hort. Angl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 548 = *thyrsiflora*.

sarmentosa, Jacq. Fragn. 83. t. 132. f. 3 = *Reineckia carnea*.

senegambica, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 548.—Afr. trop.

sessiliflora, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 739 = *Reineckia carnea*.

spicata, Haw. Syn. Pl. Succ. 66 = *thyrsiflora*.
stenophylla, Link, Enum. Hort. Berol. i. 342 = *zeylanica*.

striata, Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 (Quid?)—Hab. ?

sulcata, Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 549 = *cylindrica*.

thyrsiflora, Thunb. Prod. Pl. Cap. 65.—Afr. austr.
venosa, Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 (Quid?)—Hab. ?

zeylanica, Roxb. Pl. Corom. ii. 43. t. 184 = *Roxburghiana*.

zeylanica, Willd. Sp. Pl. ii. 159.—Zeylan.

SANSOVINIA, Scop. Introd. 228 (1777) = *Leea*, Linn. (Ampel.).

SANTALUM, Linn. Gen. ed. II. 165 (1742). *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 224.

SIRIUM, Schreb. Gen. 82 (1789).
acuminatum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 684 = *Fusanus acuminatus*.

album, Linn. Sp. Pl. 349.—Ind. or.
angustifolium, A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Fusanus acuminatus*.

austro-caledonicum, Vieill. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 61.—N. Caled.

capense, Spreng. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 635, 686 = *Rhoiacarpus capensis*.

cognatum, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 616 = *Fusanus acuminatus*.

crassifolium, A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Fusanus crassifolius*.

Cunninghamii, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 223 (*Fusanus* sp.).—N. Zel.

Cygnorum, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 615 = *Fusanus spicatus*.

diversifolium, A. DC. in DC. Prod. xiv. 684 = *Fusanus persicarius*.

ellipticum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 442 = *Freycinetianum*.

ellipticum, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 335 = *album*.

Freycinetianum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 442. t. 45.—Ins. Sandvic.

Hornei, Seem. Fl. Vit. 210.—Ins. Fiji.

insulare, Bert. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Freycinetianum*.

lanceolatum, R. Br. Prod. 356.—Austral.

lanceolatum, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 579 = *Fusanus acuminatus*.

Mida, Hook. Ic. Pl. t. 563, 575 = *Cunninghamii*.
myrtifolium, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 444 = *album*.

oblongatum, R. Br. Prod. 355 = *lanceolatum*.
obtusifolium, R. Br. l. c. 356.—Austral.

ovatum, R. Br. l. c. 355.—Austral.

paniculatum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 94 = *Freycinetianum*.

persicarium, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 41 = *Fusanus persicarius*.

Preissianum, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 615 = *Fusanus acuminatus*.

Preissii, F. Muell. Fragn. ii. 179 = *praec. ?*

pyrularium, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1859) 327.—Ins. Sandvic.

spicatum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Fusanus spicatus*.

venosum, R. Br. Prod. 355 = *lanceolatum*.
Yasi, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 258; Fl. Vit. 210.—Ins. Fiji.

SANTIA, Savi, in Mem. Soc. Ital. Mod. viii. (1798) ii. 479 = *Polypogon*, Desf. (1800) (Gramin.).

elongata, Parl. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 393 = *P. elongatus*.

maritima, Fior. in Nuov. Giorn. Pis. Lett. xvii. Sc. (1828) 111 = *P. maritimus*.

monspeliensis, Parl. Fl. Palerm. i. 73 = *P. monspeliensis*.

plumosa, Savi, in Mem. Soc. Ital. Mod. viii. (1798) ii. 479 = *P. monspeliensis*.

unioloides, Rafin. Chlor. Aetn. 7 = *Demazeria sicula*.

SANTIA, Wight & Arn. Prod. 422 (1834) = *Lasianthus*, Jack (Rubiace.).

venulosa, Wight & Arn. l. c. = *L. venulosus*.

SANTIERA, Span. in Linnaea, xv. (1841) 328, sphalm. = *Sautiera*, Decne. (Acanth.).

SANTIRIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 209. f. 40 (1850). *BURSERACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 325.

apiculata, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 537.—Malacca.

Beccarii, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 162.—Borneo.

bornensis, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 43.—Borneo.

caesia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 166.—Borneo.

SANTIRIA:—

- conferta*, A. W. Benn. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 537.—Malacca.
costata, A. W. Benn. l. c.—Malacca.
fasciculata, A. W. Benn. l. c. 539.—Malacca.
glabrifolia, Engl. in DC. *Monog. Phan.* iv. 164.—Borneo.
Griffithii, Engl. Bot. *Jahrb.* i. (1881) 43.—Malacca.
laevigata, Blume, Mus. Bot. *Lugd. Bat.* i. 211.—Sumatra.
Maingayi, A. W. Benn. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 538 = *oblongifolia*.
mollis, Engl. in DC. *Monog. Phan.* iv. 157.—Borneo.
montana, Blume, Mus. Bot. *Lugd. Bat.* i. 212.—Borneo.
multiflora, A. W. Benn. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 538.—Malacca.
oblongifolia, Blume, Mus. Bot. *Lugd. Bat.* i. 211.—Malaya.
parviflora, Engl. in DC. *Monog. Phan.* iv. 155.—Borneo.
pilosa, Engl. l. c. 159.—Borneo.
Planchonii, A. W. Benn. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 536.—Malacca.
puberula, A. W. Benn. l. c. 537.—Malacca.
rostrata, Blume, Mus. Bot. *Lugd. Bat.* i. 213.—Borneo.
rubiginosa, Blume, l. c.—Sumatra.
rufescens, Blume, l. c.—Sumatra.
rugosa, Blume, l. c. 212.—Sumatra.
serrulata, Engl. in DC. *Monog. Phan.* iv. 160.—Borneo.
Teysmanni, Engl. l. c. 162.—Ins. Ceram.
tomentosa, Blume, Mus. Bot. *Lugd. Bat.* i. 211.—Sumatra.
virgata, Blume, l. c. 213.—Borneo.

SANTOLINA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 248 (1737). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 420.

- africana*, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 8 = *S. Chamaecyparissus*.
Ageratum, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea Ageratum*.
alpina, Bertol. Amoen. Ital. 43 = *Lasiospermum pedunculare*.
alpina, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1180 = *Anthemis montana*.
alpina, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 = *Achillea cretica*.
Amellus, Linn. Syst. ed. X. 1207 = *Salmea Eupatoria*.
annua, Linn. Sp. Pl. 842 = *Lonas inodora*.
anthemoides, Linn. l. c. ed. II. 1180 = *Achillea cretica*.
atrata, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea atrata*.
Benthamiana, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 10 = *S. Chamaecyparissus*.
brevicaulis, Jord. l. c. = *S. Chamaecyparissus*.
brevidentata, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 172 = *S. Chamaecyparissus*.
brevifolia, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.
canescens, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 = *rosmarinifolia*.
capitata, Linn. Pl. Rar. Afr. 18 = *Athanasia capitata*.
Chamaecyparissus, Linn. Sp. Pl. 842.—Europ. austr.
chamaemelifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Hab.?
coronopifolia, Crantz, Inst. i. 287 = *Athanasia coronopifolia*.
corsica, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.
crenata, Linn. Sp. Pl. 842.—Afr. trop.
crithmifolia, Hort. Berol. ex Hornem. Hort. Hafn. Add. 971.—Hab.?
crithmifolia, Linn. Sp. Pl. 843 = *Athanasia crithmifolia*.
cuneifolia, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea Herbarota*.
cupressiformis, Lam. Fl. Fr. ii. 42 = *viridis*.
decumbens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3.—Hab.?
dentata, Linn. Sp. Pl. 843.—Afr. trop.
dentata, Moench, Meth. 580 = *S. Chamaecyparissus*.
diversifolia, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.
elegans, Boiss. ex DC. Prod. vii. 296.—Hispan.
erecta, Pers. Syn. ii. 407 = *Anthemis montana*.
erecta, Poir. Encyc. vi. 508 = *Lasiospermum pedunculare*.

SANTOLINA:—

- ericoides*, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 504 = *S. Chamaecyparissus*.
eriosperma, Desf. Tabl. ed. I. 99; Pers. Syn. ii. 407 = *Lasiospermum pedunculare*.
falcata, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea falcata*.
flava, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. xxxi = *Anthemis tinctoria*.
fragrantissima, Forsk. l. c. 147 = *Achillea fragrantissima*.
glabrescens, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.
grandiflora, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 80 = *pectinata*.
heterophylla, Willk. & Cutand. in Linnaea, xxx. (1859) 106 = *oblongifolia*.
homophylla, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 8 = *S. Chamaecyparissus*.
impressa, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 363 = *rosmarinifolia*.
incana, Lam. Fl. Fr. ii. 43 = *S. Chamaecyparissus*.
intricata, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.
jamaicensis, Linn. Syst. ed. X. 1207 = *Calca jamaicensis*.
laevigata, Linn. Pl. Rar. Afr. 18 = *Athanasia aspera*.
leucantha, Bertol. Amoen. Ital. 43 = *pinnata*.
linearifolia, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 12 = *S. Chamaecyparissus*.
lobata, Jord. l. c. 12 = *S. Chamaecyparissus*.
macrophylla, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea macrophylla*.
magna, Baill. l. c. = *Achillea magna*.
maritima, Crantz, Inst. i. 287 = *Diotis candidissima*.
maschalantha, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) ii. 199 = *Lasiospermum pedunculare*.
microcephala, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.
Millefolium, Baill. Hist. Pl. viii. 61, 311 = *Achillea Millefolium*.
minor, Mill. Gard. ed. VIII. n. 6 = *rosmarinifolia*.
montana, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 39. t. 852 = *Anthemis Sibthorpii*.
moschata, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea moschata*.
muricata, Guss. ex DC. Prod. vi. 15 = *Achillea muricata*.
neapolitana, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 10 = *S. Chamaecyparissus*.
nobilis, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea nobilis*.
oblongifolia, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 18.—Hispan.
oppositifolia, Linn. Syst. ed. X. 1207 = *Isocarpha oppositifolia*.
pallida, Salisb. Prod. 189 = *S. Chamaecyparissus*.
pectinata, Benth. Cat. Pl. Pyr. 117.—Mont. Pyren.
pectinata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 = *rosmarinifolia*.
pinnata, Donn, Hort. Cantab. ed. II. 105 = *Lasiospermum pedunculare*.
pinnata, Viv. Elench. Hort. Dinegro, 31.—Ital.
provincialis, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.
Ptarmica, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea Ptarmica*.
ptarmicoides, Lam. Illustr. Gen. t. 671. f. 5 = *Achillea fragrantissima*.
pubescens, Linn. Cent. Pl. ii. 31.—Afr. trop.
pygmaea, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 (Quid?).—Hab.?
rigida, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 166; Fl. Graec. t. 853 = *Anthemis cretica*.
rigidula, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 10 = *S. Chamaecyparissus*.
rosmarinifolia, Linn. Sp. Pl. 842.—Europ. austr.
scariosa, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 365.—Marocc.
semidentata, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 362.—Hispan.
sericea, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 13 = *S. Chamaecyparissus*.
simplicifolia, L'Hérit. ex DC. Prod. vi. 37 = *Achillea fragrantissima*.
sinaica, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1833) 83 = *Tanacetum sinaicum*.
sinaitica, Boiss. Fl. Orient. iii. 353, sphalm. = *praec.*
squarrosa, Linn. Pl. Rar. Afr. 18; Cent. Pl. ii. 30 = *Relbania squarrosa*.
squarrosa, Willd. Sp. Pl. iii. 1798 = *S. Chamaecyparissus*.
suaveolens, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 520.—Am. bor.

SANTOLINA:—

- terrestris*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 147 = *Anacyclus alexandrinus*.
tinctoria, Molina, Sagg. Chile, 142 = *Cephalophora glauca*.
tomentosa, Lam. Fl. Fr. ii. 41 = *Diotis candidissima*.
tomentosa, Pers. Syn. ii. 406 = *S. Chamaecyparissus*.
trifurca, Hill, Veg. Syst. iii. 126, sphalm. = *seq.*
trifurcata, Linn. Sp. Pl. 843.—Afr. trop.
tuberculosa, Lam. Fl. Fr. ii. 42 = *rosmarinifolia*.
valida, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.
variifolia, Salisb. Prod. 189 = *rosmarinifolia*.
villosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *S. Chamaecyparissus*.
villosissima, Poir. Encyc. vi. 505 = *S. Chamaecyparissus*.
virens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *viridis*.
viridis, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 504 = *seq.*?
viridis, Willd. Sp. Pl. iii. 1798.—Europ. austr.
viscosa, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25.—Hispan.

SANVITALIA, Gualt. in Lam. Journ. Nat. Hist. ii. (1792) 176. t. 33. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 357.

- ANATIS, DC. Prod. v. 628 (1836).
 LAURENTIA, Steud. Nom. ed. I. 466 (1821).
 LORENTEA, Orteg. Hort. Matr. Dec. 41. t. 5 (1797).
 Aberti, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 87.—N. Mexic.
acapulcensis, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 154.—Mexic.
acinifolia, DC. Prod. v. 628 = *procumbens*.
angustifolia, Engelm. ex A. Gray, Pl. Wright. i. 12.—Mexic.
fruticosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 155.—Mexic.
helianthoides, Rich. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2190.—Peruv.
mexicana, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1238 = *Zinnia Haageana*.
ocymoides, DC. Prod. v. 628.—Mexic.
procumbens, Lam. Journ. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 176. t. 33.—Mexic.
tragiaefolia, DC. Prod. v. 628 = *ocymoides*.
versicolor, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 189.—Reg. Argent.
villosa, Cav. Ic. iv. 31. t. 35 = *procumbens*.

SANVITALIOPSIS, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 357 (1873) = **Zinnia**, Linn. (Compos.).**SAOUARI**, Aubl. Pl. Gui. i. 599. t. 240 (1775) = **Caryocar**, Linn. (Ternstr.).
glabra, Aubl. l. c. = *C. glabrum*.
villosa, Aubl. l. c. 601 = *C. villosum*.**SAPINDUS**, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 359 (1737). *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 404.

- APHANIA, Blume, Bijdr. 236 (1825).
 DIDYMOCOCCUS, Blume, Rumphia, iii. 103, in obs. (1847).
 ELECTRA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2.
 PSEUDIMA, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 300, 309; ix. (1879) 495, 515.
 TRIGONACHRAS, Radlk. l. c. (1878) 299, 304; ix. (1879) 500.
abruptus, Lour. Fl. Cochinch. 233 = *S. Mukorossi*.
abstergens, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 111 = *trifolius*, Linn.
abyssinicus, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 277.—Abyss.
acuminatus, Rafin. New Fl. Am. iii. 22 = *marginatus*.
acuminatus, Wall. Cat. n. 8035 = *S. Mukorossi*.
acutus, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 111 = *trifolius*, Linn.
acutus, Wall. Cat. n. 8096 (Engelhardtiae sp.).—Ind. or.
adenophyllus, Wall. l. c. n. 8044 = *Cupania adeno-phylla*.
alatus, Salisb. Prod. 280 = *S. Saponaria*.
alternifolius, Buch.-Ham. ex Wight & Arn. Prod. 112 = *Erioglossum edule*.
angulatus, Poir. Encyc. vi. 665.—Hab.?
angustifolius, Blume, Rumphia, iii. 99.—Hab.?

SAPINDUS:

angustifolius, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 94 (sp. diversa).—Mont. Khasia.
 arborescens, Aubl. Pl. Gui. i. 357. t. 139.—Guian.
 attenuatus, Wall. Cat. n. 8037.—Reg. Himal.
 australis, Benth. Fl. Austral. i. 464.—Austral.
 baccatus, Blanck. in Fl. Filip. ed. I. 290.—Ins. Philipp.
 balius, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 396.—Ins. Bali.
 benghalensis, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 113 = Nephelium Longana.
 bifoliolatus, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 634.—Ind. or.
 bijugus, Wall. Cat. n. 8045 = Hemiglyssa canescens.
 capensis, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 80 = oblongifolius.
 capensis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 240.—Afr. austr.
 cerasinus, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 197.—Bras.
 chinensis, Murr. Syst. XIII. 315 = Koelreuteria paniculata.
 cinereus, A. Cunn. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 258 = Cupania subcinerea.
 cinereus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 402 = Nephelium Longana.
 cultratus, Turcz. l. c. 403.—Ins. Philipp.
 cuspidatus, Blume, Rumphia, iii. 98.—N. Guin.
 Danura, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 94.—Ind. or.; Burma.
 deficiens, Wight & Arn. Prod. 111 = Hemiglyssa deficiens.
 detergens, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 280 = S. Mukorossi.
 detergens, Wall. Cat. n. 8042 = Dittelasma Rarak.
 divaricatus, Hoffm. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 419 = marginatus.
 divaricatus, Willd. ex A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 390.—Bras.
 Drummondii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 281 (excl. var.) = marginatus.
 edulis, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 36 = Nephelium Lit-chi.
 edulis, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 64 = Erioglossum edule.
 emarginatus, Vahl, Symb. Bot. iii. 54 = trifoliatus, Linn.
 erectus, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 683.—Zeylan.
 esculentus, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. t. 63.—Bras.
 falcatus, Rafin. Med. Bot. ii. 261 = marginatus.
 Forsythii, DC. Prod. i. 607 = marginatus.
 fraxinifolius, DC. l. c. 608 = Erioglossum edule.
 fraxinifolius, Herb. Par. ex Blume, Rumphia, iii. 149 = Scorodendron pallens.
 frutescens, Aubl. Pl. Gui. i. 355. t. 138.—Guian.
 fruticosus, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 283.—Ins. Molucc.
 fuscatus, Buch.-Ham. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 685 = Dittelasma Rarak.
 glabratus, Wall. Cat. n. 8095 = Xerospermum Noronhianum.
 glabrescens, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 281 = Guarea fulva.
 Glenieii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 408 = Glenniea unijuga.
 guineensis, G. Don, Gen. Syst. i. 666.—Afr. trop.
 inaequalis, DC. Prod. i. 608 = marginatus.
 indicus, Poir. Encyc. vi. 667.—Ind. or.
 juglandifolius, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 391.—Bras.
 Koelreuteria, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 289 (= Hemiglyssa Perrottetii).—Ins. Philipp.
 laurifolius, Balb. ex DC. Prod. i. 608 = marginatus.
 laurifolius, Vahl, Symb. Bot. iii. 54 = trifoliatus, Linn.
 lepidotus, Wall. Cat. n. 8036 = Aglaia Wallichii.
 longifolius, Buch.-Ham. ex Wight & Arn. Prod. 112 = Erioglossum edule.
 longifolius, Vahl, Symb. Bot. iii. 53.—Ins. Molucc.
 lucidus, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 36.—Ins. S. Doming.
 maduriensis, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 144.—Java.
 marginatus, Willd. Enum. Hort. Berol. 432.—Am. bor.
 mauritanus, Hort. Par. ex Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 361.—Ins. Maurit.

SAPINDUS:

microcarpus, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1318 = arborescens.
 microcarpus, Jardin, Hist. Nat. Iles Marquises, 25 = S. Saponaria.
 microcarpus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) ii. 205.—Siam.
 microcarpus, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 341.—Peruv.
 microcarpus, Wight & Arn. Prod. 112 = Meliosma Amottiana.
 mollis, Blume, Rumphia, iii. 98 = trifoliatus, Linn.?
 monogynus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8049 = Nephelium Longana.
 montanus, Blume, Rumphia, iii. 97.—Java.
 Mukorossi, Gaertn. Fruct. i. 342. t. 70.—As. trop.
 multijugus, Wall. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 685 = Chiocheton paniculatus?
 oahuensis, Hillebr. ex Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 401.—Ins. Sandvic.
 oblongifolius, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 240.—Afr. austr.
 oblongus, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 198.—Bras.
 obovatus, Wight & Arn. Prod. 111 = Blighia sapida.
 Pappae, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 241.—Afr. austr.
 peruvianus, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 312.—Peruv.
 pinnatus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = Dittelasma Rarak.
 pinnatus, Roxb. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 672 = Erioglossum edule.
 polyphyllus, Roxb. Hort. Beng. 29, nomen = S. Mukorossi?
 pubescens, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 22.—Java.
 Rarak, DC. Prod. i. 608 = Dittelasma Rarak.
 rigidus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Am. austr.
 ruber, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, i. 298.—Burma.
 rubiginosus, Roxb. Pl. Corom. i. 44. t. 62 = Erioglossum edule.
 rufescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 404.—Bras.
 salicifolius, DC. Prod. i. 608 = Atalaya salicifolia.
 Saponaria, Lam. Illustr. ii. 441. t. 307 = marginatus.
 Saponaria, Linn. Sp. Pl. 367 (excl. syn. Pluk.).—Am. bor. et austr.
 Saponaria, Lour. Fl. Cochinch. 238 = Dittelasma Rarak.
 senegalensis, Poir. Encyc. vi. 666.—Afr. trop.
 serratus, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 284 = Jagera Roxburghii.
 simplicifolius, G. Don, Gen. Syst. i. 666 = Sorindeia juglandifolia.
 sinensis, J. F. Gmel. Syst. 642 = chinensis.
 spinosus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 526 = Zanthoxylum emarginatum.
 squamosus, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 282 = Cupania glabrata.
 stellulatus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 403 = Euphoria stellulata.
 stenopteris, DC. Prod. i. 607.—Ins. S. Doming.
 surinamensis, Poir. Encyc. vi. 665.—Guian.
 tetraphyllus, Vahl, Symb. Bot. iii. 54 = Hemiglyssa canescens.
 Thwaitesii, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 683.—Zeylan.
 tomentosus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) ii. 204.—Burma.
 travancorensis, Wall. Cat. n. 8047 = Canarium commune.
 trifoliatus, Linn. Sp. Pl. 367.—As. trop.
 trifoliatus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 586.—N. Granat.
 Turczaninowii, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 8, 105.—Ins. Philipp.
 undulatus, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 94 = Nephelium Longana?
 unijugus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 56 = Glenniea unijuga.
 vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 251.—Ins. Fiji.
 xanthocarpus, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 119 = Deinbollia xanthocarpa.

SAPIOPSIS, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1205, in syn. (1866) = Sapium, P. Br. (Euphorb.).
 cremostachys, Muell. Arg. l. c. = Sapium Aucuparium.

SAPIUM, P. Br. Hist. Jamaic. 338 (1756). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 334.
 CARUMBUM, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 411 (1877).
 CONOSAPIUM, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 87.
 FALCONERIA, Royle, Illustr. Bot. Himal. 354. t. 84 a (1839).
 GYMNOBOTHRYA, Wall. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 526 (1858).
 SAPIOPSIS, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1205, in syn. (1866).
 STILLINGFLEETIA, Boj. Hort. Maurit. 284 (1837).
 TRIADICA, Lour. Fl. Cochinch. 610 (1790).
 acutifolium, Benth. Pl. Hartw. 90 = Stillingia acutifolia.
 adenodon, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 160 = Bonania adenodon.
 aereum, Klotzsch, ex Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 119.—Peruv.
 annuum, Torr. Bot. Mex. Bound. 201 = Stillingia annua.
 aquifolium, J. Sm. in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 41 = Alchornea ilicifolia.
 Aucuparium, Jacq. Enum. Pl. Carib. 21; Select. Am. 249.—Am. trop.
 Aucuparium, Willd. Sp. Pl. iv. 572 = S. Laurocerasum.
 aureum, Buek, Index ad DC. Prod. iv. 364, sphalm. = aereum.
 baccatum, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 694.—As. trop.
 Balansae, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. xi. (1881) 53.—Reg. Argent.
 berberifolium, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xv. ii. 907 = Alchornea ilicifolia.
 biglandulosum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 116 = S. Aucuparium.
 bingerium, Roxb. ex Willd. Sp. Pl. iv. 572 = indicum.
 bingyricum, Roxb. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1216 = praec.
 Brownei, Banks, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 49 = S. Laurocerasum.
 cordifolium, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 693 = Alchornea mollis.
 cuneatum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 49.—Jamaic.
 Dacdece, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7965 = baccatum.
 daphnoides, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 176 = S. Aucuparium.
 discolor, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 121.—China; Malaya.
 Drummondii, Jacques, in Lem. Hort. Univ. (1844) 289 (= Eriodaphus Clossianus).—Hab.?
 erythrospermum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 119 = Bonania erythrosperma.
 eugeniaefolium, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7971.—Reg. Himal.
 haematospermum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 217.—Bras.
 herbertiaefolium, Jacques, in Lem. Hort. Univ. (1844) 289.—Austral.
 hexandrum, Wall. Cat. n. 7965 = baccatum.
 Hippomane, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 275 = S. Aucuparium.
 Hurmais, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 229 = indicum.
 ilicifolium, Willd. Sp. Pl. iv. 573 = Hippomane spinosa.
 indicum, Willd. Sp. Pl. iv. 572.—Ind. or.
 insigne, Trimen, Cat. Pl. Zeyl. 83.—Ind. or.
 jamaicense, Sw. Adnot. Bot. 62 = S. Aucuparium.
 laevifolium, Thou. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 513 = Stillingia obtusifolia.
 laevigatum, Lam. Encyc. ii. 735 = Stillingia obtusifolia.
 laurifolium, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 49 = S. Laurocerasum.
 Laurocerasum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 411.—Ind. occ.
 leucogynum, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 176.—Cuba.
 leucospermum, Griseb. l. c. 177.—Cuba.
 lineatum, Lam. Encyc. ii. 734 = Stillingia obtusifolia.
 longifolium, Boj. Hort. Maurit. 284, nomen (Quid?).—Hab.?
 macrocarpum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 119.—Peruv.
 marginatum, Muell. Arg. l. c. 120.—Bras.

SAPIUM:—

- montevidense*, Klotzsch, ex Baill. Adansonia, v. (1864-65) 320 = *S. Aucuparium*.
Moritzianum, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 100 = *S. Aucuparium*.
myricifolium, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 178 = *Bonania myricifolia*.
obovatum, Klotzsch, ex Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 120.—Bras.
obtusifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 = *Excoecaria obtusifolia*.
obtusifolium, Lam. Encyc. ii. 735 = *Stillingia obtusifolia*.
obtusilobum, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 116.—Venezuel.
oppositifolium, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 513 = *Stillingia oppositifolia*.
peruvianum, Steud. Nom. ed. II. ii. 512 = *Excoecaria obtusifolia*.
populifolium, Wall. Cat. n. 7966 = *baccatum*.
prunifolium, Klotzsch, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 45 = *S. Aucuparium*.
salicifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 = *S. Aucuparium*.
salpingadenium, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 121.—Bolivia.
sebiferum, Roxb. Hort. Beng. 69; *Fl. Ind.* iii. 693.—Reg. trop.
Sellowianum, Klotzsch, ex Baill. Adansonia, v. (1864-65) 320 = *S. Aucuparium*.
serratum, Klotzsch, ex Baill. l. c. = *S. Aucuparium*.
sterculiaceum, Wall. Cat. n. 7974 = *Baccaurea bracteata*.
stylare, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 119.—Venezuel.
suberosum, Muell. Arg. l. c. xxxiv. (1865-66) 217.—Ins. Barbados.
sylvaticum, Torr. Bot. Mex. Bound. 201 = *Stillingia sylvatica*.
tanguinum, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 116 = *Stillingia obtusifolia*.
terminale, Muell. Arg. l. c. = *Stillingia terminalis*.
zelayense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 = *Stillingia zelayensis*.

SAPONARIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *CARYO-*

- PHYLLAE*, Benth. & Hook. f. i. 146.
BOOTIA, Neck. ex DC. Prod. i. 365 (1824).
PROTEINIA, Reichb. Nom. 205 (1841).
SMEGMATHAMNIUM, Fenzl, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 42. t. 244 (1841).
VACCARIA, Medic. Phil. Bot. i. 96 (1789).
acerosa, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 69 = *Gypsophila acerosa*.
aenesia, Heldr. in *Atti Congr. Bot. Firenze*, 1874 (1876), 238.—Graec.
aetnensis, Rafin. Chl. Aetn. 9.—Ital.
alpina, Pall. Reise, iii. 34 = *Silene paucifolia*.
alsinoides, Viv. Fl. Cors. Prod. App. ii. 7, in obs. = *ocymoides*.
amplissima, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 (*amplissimus*) = *S. Vaccaria*.
andicola, Kunze, ex Rohrb. Monog. *Silene*, 231.—Chili.
artegioides, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. t. 11, sphalm. = *ortegioides*.
astroides, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 402 = *tridentata*.
atocioides, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 16 = *prostrata*.
barradensis, Boiss. l. c. viii. 72 = *Gypsophila hirsuta*.
Baumgartenii, Janka, in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 559 = *Silene dinarica*.
bellidifolia, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 239 = *Valeriana apula*.
bellidifolia, Sm. Spicil. Bot. 5.—Europ. or.
Bodeana, Boiss. Fl. Orient. i. 527.—Persia.
caespitosa, Bivona, in Rafin. Stat. Sicil. 27 = *depressa*.
caespitosa, DC. Rapp. Voy. ii. 78; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 601.—Mont. Pyren.
caespitosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 79. t. 339 = *Silene Saxifraga*.
calabrica, Guss. Pl. Rar. 164. t. 31.—Ital.; Graec.
calabrica, Heldr. ex Nym. Consp. 98 = *graeca*.
Calvertii, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 51 = *prostrata*.
cerastoides, Fisch. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 212.—Reg. Casp.
chloraeifolia, Kunze, Ind. Hort. Lips. (1846).—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 163.—As. Min.

VOL. II.

SAPONARIA:—

- corrugata*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 237.—Turkestan.
cretica, Linn. Sp. Pl. ed. II. 584 = *Tunica cretica*.
depressa, Bivona, Stirp. Nov. Kar. Sicil. ii. [15].—Sicil.
diffusa, Lam. Fl. Fr. ii. 540 = *Gypsophila repens*.
dioica, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, i. (1826) 38 = *Silene antirrhina*.
dioica, Moench, Meth. 76 = *Lychnis dioica*.
elegans, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 238 = *caespitosa*.
Elisabethae, Fenzl, ex Nym. Consp. 93 = *Silene Elisabethae*.
fasciculata, Boiss. & Rent. Diagn. Ser. I. viii. 73 = *Gypsophila fasciculata*.
fastigiata, Lam. Fl. Fr. ii. 541 = *Gypsophila fastigiata*.
filicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 71 = *Gypsophila hirsuta*.
filipes, Boiss. l. c. Ser. II. i. 69 = *Gypsophila floribunda*.
floribunda, Boiss. l. c. 70 = *Gypsophila floribunda*.
fruticulosa, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopo. 26. t. 12 = *Gypsophila fruticulosa*.
glutinosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 322.—Reg. Medit. et Cauc.
graeca, Boiss. Fl. Orient. i. 528.—Graecia.
Griffithiana, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 70.—Afghan.
hirsuta, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. iv. 9 = *Gypsophila hirsuta*.
hirta, Steud. Nom. ed. I. 732, sphalm. = *praec.*
hispanica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII (in Errat.) = *S. Vaccaria*.
holopetala, Ledeb. Fl. Ross. i. 301 = *prostrata*.
hybrida, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *officinalis*.
illyrica, Linn. Mant. i. 70 = *Tunica illyrica*.
inclusa, C. Koch, in *Linnaea*, xv. (1841) 711 = *S. Vaccaria*?
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 16.—As. Min.
liniflora, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. i. 525.—Mesopot.
lutea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 585 (excl. syn. Bocc.).—Europ.
lutea, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 306 = *Silene paucifolia*.
mesogitana, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 16.—As. Min.
mollis, Boiss. l. c. viii. 72 = *Gypsophila hirsuta*.
multiflora, Hort. ex Regel, Gartenfl. i. (1852) 101 = *calabrica*.
 muralis, Lam. Fl. Fr. ii. 540 = *Gypsophila muralis*.
nervosa, Gilib. Fl. Lituan. ii. 163 = *officinalis*.
noctiflora, Fenzl, ex Nym. Consp. 93 = *Silene noctiflora*.
nodiflora, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 15.—Syria.
ocymifolia, Salisb. Prod. 302 = seq.
ocymoides, Linn. Sp. Pl. 409.—Europ. austr.
officinalis, Linn. l. c. 408.—Europ.; As. occ.
officinaria, Rupr. Fl. Cauc. 176 = *praec.*
orientalis, Linn. Sp. Pl. 409.—Oriens.
ortegioides, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 25 = *Gypsophila ortegioides*.
oxyodonta, Boiss. Fl. Orient. i. 525 = *S. Vaccaria*.
pamphylica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 74.—As. Min.
parvula, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga, i. (1847) 181.—Turkestan.
pentagona, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 512 = *S. Vaccaria*.
perfoliata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 163; Roxb. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 464 = *S. Vaccaria*.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 18.—Persia.
picta, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 202 = *Gypsophila picta*.
plumbaginea, Stschégl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. (1853) 323. t. 4.—Reg. Cauc.
polygonoides, Jaub. & Spach, Illustr. v. 2. t. 402 = *Gypsophila hirsuta*.
porrigens, Linn. Mant. ii. 239 = *Gypsophila porrigens*.
prostrata, Willd. Enum. Hort. Berol. 465.—As. Min.
pulvinaris, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 74.—As. Min.; Syria.
Pumilio, Boiss. l. c. i. 18 = *pulvinaris*.
pungens, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 133 = *Acanthophyllum spinosum*.
repens, Lam. Fl. Fr. ii. 542 = *ocymoides*.
rubra, Lam. l. c. 541 = *S. Vaccaria*.
saxatilis, Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. iii. (1820) 13.—Hispan.

SAPONARIA:—

- segetalis*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 194 = *S. Vaccaria*.
Sewerzowi, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 246.—Turkestan.
sicula, Rafin. Specch. ii. 7 = *depressa*.
Smithii, Ser. in DC. Prod. i. 367 = *Silene Saxifraga*.
Struthium, Loeffl. Iter Hisp. 73 = *Gypsophila Struthium*.
syriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 73.—Syria.
thessala, Jaub. & Spach, Illustr. v. 2 = *Gypsophila hirsuta*.
thymifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 17 = *Gypsophila hirsuta*.
tridentata, Boiss. l. c.—Syria.
tubulosa, F. Muell. Native Pl. Vict. i. 136 = *Gypsophila tubulosa*.
Vaccaria, Linn. Sp. Pl. 409.—Europ.; As. Min.; Sibir.
villosa, Rafin. Fl. Ludov. 93 (Quid?).—Am. bor.
viscosa, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 264 = *ocymoides*.
viscosa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 212.—Armen.; Persia.
vulgaris, Pall. Reise, iii. 655 = *officinalis*.

SAPOTA, Plum. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752) =

- Achras**, Linn. (Sapotac.).
Achras, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *A. Sapota*.
armata, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = *Sideroxylon tomentosum*.
australis, A. DC. l. c. = *Sideroxylon australe*.
Baueri, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 229.—N. Caled.
cerasifera, Welw. Apont. 585. n. 17.—Afr. trop.
costata, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = *Sideroxylon costatum*.
curvifolia, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 68 = *Lucuma curvifolia*.
elengoides, A. DC. in DC. Prod. viii. 176 = *Sideroxylon tomentosum*.
elongata, Gaertn. f. Fruct. iii. 136.—Hab. ?
Endlicheri, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 228.—N. Caled.
ferruginea, Walp. Rep. vi. 455 = *A. Sapota*.
gonocarpa, Mart. & Eichl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 60.—Bras.
Lessertii, A. DC. in DC. Prod. viii. 174 = *Sideroxylon Lessertii*.
mammosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Lucuma mammosa*.
marginata, Decne. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 169. t. 13.—Ins. Cap. Virid.
Mulleri, Blume, ex Bleekrod. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vii. (1857) 225 = *Mimusops Kauki*.
nigra, J. F. Gmel. Syst. 750 = *Diospyros Ebenum*.
parvifolia, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = *Sideroxylon parvifolium*.
Pohlmaniana, F. Muell. Fragm. v. 184 = *Sideroxylon Pohlmanianum*.
polita, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 517.—Cuba.
pyrulifera, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 328.—Ins. Fiji.
rugosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 399.—Ind. occ.
sandwicensis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861-62) 328.—Ins. Sandvic.
Sellowiana, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 67 = *Lucuma marginata*.
sericea, A. DC. in DC. Prod. viii. 176 = *A. sericea*.
Sideroxylon, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 399 = *A. Sapota*.
spectabilis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 580.—Sumatra.
tomentosa, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = *Sideroxylon tomentosum*.
venosa, A. DC. l. c. 174 = *Lucuma venosa*.
vitiensis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 328.—Ins. Fiji.

SAPRANTHUS, Seem. Journ. Bot. iv. (1866) 369. t. 54 = **Porcelia**, Ruiz & Pav. (Anonac.).
nicaraguensis, Seem. l. c.—Am. centr.

- SAPRIA**, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 216.
CYTINACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 119.
Griffithii, Hook. f. in DC. Prod. xvii. 112, in syn. sphalm. = seq.
himalayana, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 217.—Assam.

5 K

SAPROSMA, Blume, *Bijdr.* 956 (1826). *RUBIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 131.
DYSODDENDRON, Gardn. in *Calc. Journ. Nat. Hist.* vii. (1847) 1.

DYSOSMIA, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 325 (1859).
arborescens, Blume, *Bijdr.* 956.—Java.
ceylanicum, Bedd. *Forest. Man. Bot.* 134/12.—Ind. or.
consimile, Kurz, *For. Fl. Brit. Burma*, ii. 29.—Reg. Himal.; Burma.
corymbosum, Bedd. *Forest. Man. Bot.* 134/12.—Ind. or.
dispar, Hassk. in *Flora*, xxviii. (1845) 226.—Java.
fragrans, Bedd. *Forest. Man. Bot.* 134/11.—Ind. or.
fruticosum, Blume, *Bijdr.* 956.—Java.
glomeratum, Bedd. *Forest. Man. Bot.* 134/11 = *indicum*.
hirsutum, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* ii. 11. (1851) 251.—Sumatra.
indicum, Dalz. in *Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 37.—Ind. or.
scabridum, Bedd. *Forest. Man. Bot.* 134/12.—Zeylan.
ternatum, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 131.—Reg. Himal.; Burma.
Wightii, Bedd. *Forest. Man. Bot.* 134/11 = *ceylanicum*.

SARACA, Linn. *Mant.* i. 13 (1767). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 583.

JONESIA, Roxb. in *As. Res.* iv. (1795) 355.
arborescens, Burm. f. *Fl. Ind.* 85 = *indica*.
cauliflora, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 272.—Malacca.
declinata, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 84, 1080.—Sumatra.
indica, Linn. *Mant.* i. 98.—Ind. or.; Malaya.
Lobbiana, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 272.—Burma.
macroptera, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 1080.—Sumatra.
minor, Miq. l. c. 84 = *indica*.
obtusifolia, Miq. l. c. 85.—Java.
palembanica, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 272.—Sumatra.
triandra, Baker, l. c.—Burma; Malaya.
Zollingeriana, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 84 = *indica*.

SARACENA, Tourn. ex Mill. *Gard. Dict.* ed. VI. (1752) = **Sarracenia**, Linn.

SARACENIA, Spreng. *Gen.* i. 433 (1830) = *præc.*

SARACHA, Ruiz & Pav. *Prod.* 31. t. 34 (1794).

SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 891.
BELLINIA, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 56 (1819).
DISKION, Rafin. *Sylva Tellur.* 55 (1838).
JALTOMATA, Schlecht. *Ind. Sem. Hort. Hal.* (1838).
JALTONIA, Steud. *Nom. ed. II.* i. 797 (1840).
acutifolia, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 449 (Physalidis sp.?).—Calif.
alata, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 431.—Peruv.
allogona, Schlecht. in *Linnaea*, xix. (1847) 308.—Mexic.
angulata, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 133, nomen.—Mexic.
auriculata, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 448.—N. Granat.
biflora, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 42. t. 179 = *Hebecladus biflorus*.
Boissieri, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* xi. (1853) 93 (= *Lycioplesium Boissieri*).—Venezuel.
brasiliensis, Klotzsch, in *Linnaea*, xiv. (1840) 290 = *Athenaea pogogena*.
ciliata, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 446.—Peruv.
conoides, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 891 = *Chamaesaracha sordida*?
consperpa, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 449.—Mexic.
contorta, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 43. t. 180.—Peruv.
Coronopus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad. x.* (1874) 62 = *Chamaesaracha Coronopus*.
dentata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 43. t. 179.—Peruv.
diffusa, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 447 = *laxa*.
frondosa, Miers, l. c. xi. (1853) 93 = *Poecilochroma frondosum*.
Funkiana, Miers, l. c. = *Poecilochroma Funkianum*.
geniculata, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 133 = *Physalis geniculata*.
glabrata, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 448.—Mexic.

SARACHA :—

glandulosa, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 450.—N. Granat.
guttata, Miers, l. c. xi. (1853) 93 = *Poecilochroma guttatum*.
Jaltomata, Schlecht. *Ind. Sem. Hort. Hal.* (1839) 10; ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 432.—Mexic.
Jaltonia, Steud. *Nom. ed. II.* i. 796, in syn., sphalm. = *præc.*
laxa, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 447.—Mexic.
Lindeniana, Miers, l. c. xi. (1853) 93 = *Poecilochroma Lindenianum*.
Lobbiana, Miers, l. c. = *Poecilochroma Lobbianum*.
maculata, Miers, l. c. = *Poecilochroma maculatum*.
micrantha, DC. *Cat. Hort. Monsp.* (1813) 58, nomen = *Zuccagniana*.
Miersii, Dun. & A. DC. in *DC. Prod.* xiii. i. 684 = *laxa*.
nana, A. Gray, in *Proc. Am. Acad. x.* (1874) 62 = *Chamaesaracha nana*.
peruviana, F. G. Dietr. *Vollst. Lexik. Gaertn.* viii. 522 (sp. confusa).
procumbens, Math. ex Dun. & A. DC. in *DC. Prod.* xiii. i. 683 = *propinqua*.
procumbens, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 43. t. 180.—Peruv.
propinqua, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 446.—Peruv.
pubescens, Humb. ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 690.—Peruv.
punctata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 42. t. 178.—Peruv.
quitoensis, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* xi. (1853) 93 = *Poecilochroma quitensis*.
Sellowiana, Miers, l. c.—Bras.
solanacea, Miers, l. c. iii. (1849) 450 = *Bassovia solanacea*.
sordida, A. Gray, in *Proc. Am. Acad. x.* (1874) 62 = *Chamaesaracha sordida*.
stapelioides, Decne. ex Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1864) *Suppl.* 18.—Hab.?
umbellata, DC. *Cat. Hort. Monsp.* (1813) 142 = *procumbens*.
umbellata, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 451.—Peruv.
vestita, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 449.—N. Granat.
villosa, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 452.—Peruv.
viscosa, Link, ex D. Don, in *Sweet, Brit. Flow. Gard.* Ser. II. t. 323.—Peruv.; Chili.
viscosa, Schrad. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1832) 5; ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 433 (Physalidis sp.).—Mexic.
Zuccagniana, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 452.—Am. austr.

SARAGODRA, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 513 (1841) = **Gelonium**, Roxb. (Euphorb.).
glabra, Hort. ex Steud. l. c. = *G. multiflorum*.

SARANA, Fisch. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 251 = **Fritillaria**, Tourn. (Liliac.).
edulis, Fisch. ex Baker, l. c. 274 = *F. camschatcensis*.

SARANTHE, Eichl. in *Berl. Phys. Abh.* 1883 (1884), 85 = **Myrosma**, Linn. f. (Scitam.).
cuiabensis, Eichl. l. c. 86 = *Maranta cuyabensis*.
Klotzschiana, Eichl. l. c. = *Maranta Klotzschiana*.
leptostachya, Eichl. l. c. = *Maranta leptostachya*.
Moritziana, Eichl. l. c. = *Maranta Moritziana*.
pygmaea, Eichl. l. c. = *Maranta pygmaea*.
Riedeliana, Eichl. l. c. = *Maranta Riedeliana*.
unilateralis, Eichl. l. c. = *Myrosma unilaterale*.

SARCANDRA, Gardn. in *Calc. Journ. Nat. Hist.* vi. (1846) 348 = **Chloranthus**, Sw.
chloranthoides, Gardn. l. c. = *C. brachystachys*.

SARCANTHEMUM, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1818) 74 = **Psiadia**, Jacq. (Compos.).
Coronopus, Cass. l. c. = *P. Coronopus*.

SARCANTHERA, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 64 (1836) = **Gymnostachyum**, Nees (Acanth.).
venusta, Rafin. l. c. = *G. venustum*.

SARCANTHIDION, Baill. *Adansonia*, xi. (1874) 199. **OLACINEAE**.
sarmentosum, Baill. l. c.—N. Caled.

SARCANTHUS, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 209 = **Heliotropium**, Linn. (Borag.).
aspermus, Anderss. l. c.—Ins. Galapag.

SARCANTHUS, Lindl. *Coll. Bot.* t. 39 B (1821).
ORCHIDAEAE, Benth. & Hook. f. iii. 580.

aietinus, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1869) 416.—Assam.
armeniaceus, Reichb. f. in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xxiv. (1856) 219.—Afr. trop.
asperus, Reichb. f. in *Hamb. Gartenz.* xxi. (1865) 297.—Burma.
belophorus, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1883) 11. 262.—Hab.?
callosus, Reichb. f. in *Bonplandia*, v. (1857) 41 = *Cleisostoma callosum*.
chrysomelas, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1869) 662.—Burma.
croceus, Lodd. *Cat. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 634, nomen.—Ins. Philipp.
dealbatus, Reichb. f. in *Walp. Ann.* vi. 892.—Ins. Philipp.
densiflorus, Par. & Reichb. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 136 = *Cleisostoma spicatum*.
erinaceus, Reichb. f. in *Seem. Fl. Vit.* 298.—Ins. Fiji.
filiformis, Lindl. *Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 61.—Reg. Himal.
filiformis, Wight, l. c. t. 1684 = *Saccolabium filiforme*.
flexus, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1881) 11. 492.—Borneo.
geminatus, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 243.—Ins. Molucc.
guttatus, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1443 = *Rhynchostylis retusa*.
Hincksiana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1878) 1. 73.—Hab.?
insectifer, Reichb. f. in *Bot. Zeit.* xv. (1857) 159.—Ind. or.; Burma.
laxus, Reichb. f. l. c. xxiv. (1866) 378.—Burma.
Lendyanus, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1884) 1. 44.—Annam.
macrodon, Reichb. f. l. c. (1872) 1555.—Ind. or.
nirabilis, Reichb. f. l. c. (1878) 11. 300.—Burma?
nagarensis, Reichb. f. in *Seem. Fl. Vit.* 298.—Ins. Fiji.
ornithorrhynchus, Reichb. f. in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xxiv. (1856) 219.—Hab.?
oxyphyllus, Wall. ex Lindl. *Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 58.—Burma.
pallidus, Lindl. *Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 78.—Reg. Himal.; Burma.
paniculatus, Lindl. in *Bauer, Illustr. Orch. Pl. Gen.* t. 9.—China.
Parishii, Hook. *Bot. Mag.* t. 5217.—Burma.
pauciflorus, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 21.—Sumatra.
pauciflorus, Wight, l. c. t. 1747 = *peninsularis*.
peninsularis, Dalz. in *Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 343.—Ind. or.
praemorsus, Lindl. ex Spreng. *Syst.* iii. 721 = *Saccolabium papillosum*.
pugioniformis, Reichb. f. in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xxiv. (1856) 219.—Venezuel.
racemifer, Reichb. f. in *Walp. Ann.* vi. 891 = *pallidus*.
roseus, Wight, l. c. t. 1685 = *Saccolabium filiforme*.
rostratus, Lindl. *Coll. Bot.* t. 39 B.—China.
secundus, Griff. *Notul.* iii. 362.—Reg. Himal.
Stowellianus, Batem. in *Hook. Bot. Mag.* sub t. 5630 = *erinaceus*.
striolatus, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1882) 11. 168.—Ins. Philipp.
suaveolens, Reichb. f. in *Bonplandia*, v. (1857) 40.—Java.
subulatus, Reichb. f. l. c. 41.—Java.
succisus, Lindl. in *Bot. Reg.* t. 1014.—China.
teretifolius, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 234.—China.
teretifolius, Reichb. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 136.—Burma.
terminus, Reichb. f. in *Hamb. Gartenz.* xvi. (1860) 15.—Java.
timorensis, Decne. in *Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 365.—Ins. Timor.
tricolor, Reichb. f. in *Bonplandia*, iii. (1855) 219 = *pallidus*.
Walkerianus, Wight, l. c. t. 1686 = *Saccolabium roseum*.
Williamsoni, Reichb. f. in *Hamb. Gartenz.* xxi. (1865) 353.—Burma.

SARCATHRIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836) = **Salicornia**, Tourn. (Chenop.).
ambigua, Rafin. l. c. = *Arthrocnemum ambiguum*.
indica, Rafin. l. c. = *Arthrocnemum indicum*.
procumbens, Rafin. l. c. = *Sal. herbacea*.
radicans, Rafin. l. c. = *Sal. fruticosa*.
strobilacea, Rafin. l. c. = *Halocnemum strobilaceum*.
virginica, Rafin. l. c. = *Sal. fruticosa*.

SARCAULIS, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 310. **SAPOTACEAE**.
macrophyllus, Radlk. l. c. 311.—Bras.

SARCHOCHILUS, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 150 (1885) = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.).

SARCINANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 196 (1857) = **Carludovica**, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
utilis, Oerst. l. c. 197 = *C. utilis*.

SARCOBATUS, Nees, in Neuwied, Reise Nord-Am. ii. 446 (1841). **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 76.
Fremontia, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 95. 317. t. 3 (1845).
Maximiliani, Nees, in Neuwied, Reise Nord-Am. ii. 447.—Am. bor.
vermiculatus, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 149 = *Maximiliani*.

SARCOBODIUM, Beer, Prakt. Orch. 306 (1854) = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
Lobbii, Beer, l. c. = *B. Lobbii*.

SARCOCA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 55 (1836) = **Phytolacca**, Tourn.
abyssinica, Rafin. l. c. = *P. abyssinica*.
dioica, Rafin. l. c. = *P. dioica*.
icosandra, Rafin. l. c. = *P. icosandra*.

SARCOCALYX, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 479 = **Aspalathus**, Linn. (Legumin.).
capensis, Walp. l. c. 480 = *A. sarcoides*.

SARCOCALYX, Zipp. in Alg. Konst. en Letter-Bode, i. (1829) 298 = **Exocarpus**, Labill. (Santal).
miniatus, Zipp. l. c. = *E. latifolius*.

SARCOCAMPSA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 408 = **Salacia**, Linn. (Celastrin.).
campestris, Miers, l. c. = *Sal. campestris*.
silvestris, Miers, l. c. 409 = *Sal. sylvestris*.

SARCOCAPNOS, DC. Syst. ii. 129 (1821). **PAPAVERACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 56.
Aplectrocapnos, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. v. 79 (1844).
baetica, Nym. Consp. 26.—Hispan.
crassifolia, DC. Syst. ii. 130.—Mauritania.
enneaphylla, DC. l. c. 129.—Lusitan.
speciosa, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 14 = *crassifolia*.

SARCOCARPON, Blume, Bijdr. 21 (1825) = **Kadsura**, Kaempf. (Magnol.).
scandens, Blume, l. c. = *K. scandens*.

SARCOCAULON, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 73 (1826). **GERANIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 272.
Burmanni, Sweet, l. c.—Afr. austr.
L'Heritieri, Sweet, l. c.—Afr. austr.
Patersonii, Eckl. & Zeyh. Enum. 57.—Afr. austr.

SARCOCEPHALUS, Afzel. ex R. Br. in Tuckey, Congo, App. v. 467 (1818); et ex Sabine, in Trans. Hort. Soc. v. (1824) 442. t. 18. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 29.
Cephalina, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 105 (1828).
Platanocarpum, Korth. Obs. Nacl. Ind. 18 (1839).
Bartlingii, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 133.—Ins. Philipp.
buruensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 179.—Malaya.
Cadamba, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 63; et in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1877) ii. 125 = *Anthocephalus morindaefolius*.

SARCOCEPHALUS—
cordatus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 133.—As. et Austral. trop.
dasyphyllus, Miq. l. c. Suppl. 538.—Sumatra.
esculentus, Afzel. ex Sabine, in Trans. Hort. Soc. v. (1824) 442. t. 18.—Afr. trop.
glaberrimus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 134.—Ins. Philipp.
Horsfieldii, Miq. l. c. = *cordatus*.
Jungbuhnii, Miq. l. c.—Malaya.
mitragynus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 180.—Ins. Amboin.
Russegeri, Kotschy, ex Schweinf. Reliq. Kotsch. 49. t. 33.—Afr. trop.
subditus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 134.—Malaya.
undulatus, Miq. l. c. 133.—Ins. Celebes.

SARCOCHILUS, R. Br. Prod. 332 (1810). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 575.
Adenoncos, Blume, Bijdr. 381 (1825).
Camarotis, Lindl. in Wall. Cat. n. 7329; ex ej. Gen. et Sp. Orch. 219 (1833).
Chiloschista, Lindl. Bot. Reg. (1832) sub t. 1522.
Cylindrochilus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 307 (1861).
Dendrocolla, Blume, Bijdr. 286. t. 67 (1825).
Grosourdua, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxii. (1864) 297.
Gunnia, Lindl. Bot. Reg. (1834) sub t. 1699.
Micropera, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1522 (1832).
Ornitharium, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 188. f. 117.
Crisdice, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 93.
Pteroceras, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 6.
Stereochilus, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 38.
Thrixspermum, Lour. Fl. Cochinch. 519 (1790), nomen prius.

acuminatissimus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—Java.
adversus, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 241.—N. Zel.
amplexicaulis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 499.—Java.
anceps, Reichb. f. l. c. 500.—Java.
angustifolius, Reichb. f. l. c.—Java.
Arachnites, Reichb. f. l. c. 498.—Reg. Himal.; Malaya.
Armitii, F. Muell. Fragm. ix. 49.—Austral.
aurifer, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—China.
australis, Reichb. f. l. c. 501 = *parviflorus*.
Baileyi, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 291 = *Taeniophyllum Muelleri*.
Barklyanus, F. Muell. Fragm. i. 89 = *parviflorus*.
Beckleri, F. Muell. Census, 111 = *Cleisostoma Beckleri*.
Berkeleyi, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) i. 557, in syn.—Ins. Nicobar.
brevilabris, F. Muell. Census, 111 = *Cleisostoma brevilabre*.
breviscapa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 332.—N. Zel.
calcaratus, F. Muell. Fragm. ii. 181 = *Cleisostoma tridentatum*.
Calceolus, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 19.—Ins. Philipp.
Ceciliae, F. Muell. Fragm. v. 42. t. 42.—Austral.
compressus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—Java.
croceus, Lindl. Bot. Reg. (1846) sub t. 19.—Ins. Philipp.
dilatatus, F. Muell. Fragm. i. 191 = *olivaceus*.
divitiflorus, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 292.—Austral.
emarginatus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.
erectus, F. Muell. Census, 111 = *Cleisostoma erectum*.
falcatus, R. Br. Prod. 332.—Austral.
Fitzgeraldii, F. Muell. Fragm. vii. 115.—Austral.
fusco-luteus, Lindl. Bot. Reg. (1847) sub t. 18.—Borneo.
gracilentus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 499.—Malaya.
Gunnii, F. Muell. Fragm. i. 90 = *parviflorus*.
Hartmanni, F. Muell. l. c. viii. 248.—Austral.
Hillii, F. Muell. l. c. ii. 94.—Austral.
Hystrix, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Burma.
japonicus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 206.—Japan.
Keffordii, F. Muell. Census, Suppl. ii. 3 = *Cleisostoma Keffordii*.
lilacinus, Griff. Notul. iii. 334.—Malaya.
Macphersonii, F. Muell. Fragm. viii. 248.—Austral.

SARCOCHILUS—
maculatus, Pfitzer, Vergl. Morph. Orch. 15; Benth. & Hook. f. Gen. iii. 575 (*Saccolabium* sp.).—Ind. or.
minimus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.
nepalensis, Spreng. Syst. iii. 721 = *Saccolabium calceolare*.
obtusius, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.
olivaceus, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 32.—Austral.
pallidus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Malaya.
parviflorus, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 34.—Austral.
philippinensis, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 82, 150.—Ins. Philipp.
phyllorrhizus, F. Muell. Fragm. v. 201.—Austral.
pictus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 501 = *olivaceus*.
praemorsus, Spreng. Syst. iii. 721 = *Saccolabium papillosum*.
pulchellus, Trimen, Syst. Cat. Pl. Ceyl. 89.—Zeylan.
purpurascens, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—Java.
purpureus, Benth. & Hook. f. (in Herb. Kew.).—Ind. or.
pusillus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.
rhopalorrhachis, Reichb. f. l. c.—Java.
rubricentrum, Fitzg. in Gard. Chron. (1880) ii. 38.—Austral.
serraeformis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498 = *S. Arachnites*.
Sillemianus, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) i. 524, in syn.—Burma?
spurius, Reichb. f. in Ann. Walp. vi. 500.—Java.
subulatus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.
teres, Reichb. f. l. c. 499.—Java.
tridentatus, Reichb. f. l. c. 500 = *Cleisostoma tridentatum*.
unguiculatus, Lindl. in Bot. Reg. (1840) Misc. 67.—Ins. Philipp.
usneoides, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 497.—Reg. Himal.
Zollingeri, Reichb. f. l. c. 500.—Java.

SARCOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 594 (1825) = **Sarcolaena**, Thou. (Chlaenac.).

SARCOCHLAMYS, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 89 (1844-52). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 389.
pulcherrima, Gaudich. l. c.—Ind. or.; Malay.

SARCOCLINIUM, Wight, Ic. v. II. 24. t. 1887-88 (1852) = **Agrostistachys**, Dalz. (Euphorb.).
Gaudichaudi, Baill. Etud. Gén. Euph. 310, nomen = *A. Gaudichaudi*.
Hookeri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 279 = *A. Hookeri*.
longifolium, Wight, Ic. t. 1887-88 = *A. longifolia*.
sessilifolium, Kurz, in Flora, lviii. (1875) 31.—Singapore.

SARCOCOCCA, Lindl. Bot. Reg. t. 1012 (1826). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 266.
Austrobuxus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 444 (1860).
Lepidopelma, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 118. t. 22 (1862).
coriacea, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 491 = *pruniformis*.
Hookeriana, Baill. Monog. Bux. 53 = *pruniformis*.
laurifolius, Kunth, Enum. Pl. v. 190 = *pruniformis*.
nepalensis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 327 = *pruniformis*.
pruniformis, Lindl. Bot. Reg. t. 1012.—Ind. or.; Malaya.
salicifolia, Baill. Monog. Bux. 49 = *pruniformis*.
saligna, Muell. Arg. in DC. Prod. xvi. i. 11 = *pruniformis*.
sumatrana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 191 = *pruniformis*.
trinervia, Wight, Ic. t. 1877 = *pruniformis*.
zeylanica, Baill. Monog. Bux. 52 = *pruniformis*.
Zollingeri, Baill. l. c. 54 = *pruniformis*.

SARCOCODON, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 169. **ASCLEPIADEAE**.
speciosus, N. E. Br. l. c. 170.—Afr. trop.

SARCOCOLLA, Linn. Syst. ed. I (1735). **PENAEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 202.
Brachysiphon, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 24. t. 2.
acuta, Kunth, in Linnaea, v. (1830) 678.—Afr. austr.
formosa, Kunth, l. c.; et A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 25.—Afr. austr.

SARCOCOLLA :—

fucata, *Endl. Gen. Suppl.* iv. 11. 74; *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 489.—Afr. austr.
fucata, Zeyh. ex *A. DC. l. c.* = *squamosa*.
imbricata, Benth. & Hook. *f. Gen.* iii. 202.—Afr. austr.
Lessertiana, A. Juss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* vi. (1846) 26 (= *Glischrocolla Lessertiana*).—Afr. austr.?
Linnaei, *A. Juss. l. c.* 25.—Afr. austr.
longiflora, Kunth, in *Linnaea*, v. (1830) 678; *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 489.—Afr. austr.
minor, *A. DC. l. c.*—Afr. austr.
retzioides, Eckl. & Zeyh. ex *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 104 = *Endonema retzioides*.
rupestris, Eckl. & Zeyh. ex *Sond. l. c.* 102.—Afr. austr.
speciosa, Eckl. & Zeyh. ex *Sond. l. c.* 103.—Afr. austr.
squamosa, Kunth, in *Linnaea*, v. (1830) 678.—Afr. austr.

SARCOCORDYLIS, Wall. Cat. n. 7249 (1832?) = **Balanophora**, Forst.

SARCOCYPHULA, Harv. Thes. Cap. ii. 58. t. 191 (1863) = **Cynanchum**, Linn. (Asclep.).
Gerrardi, Harv. l. c.—Afr. austr.

SARCODACTILIS, Gaertn. f. *Fruct.* iii. 39. t. 185 (1805) = **Citrus**, Linn. (Rutac.).
helicteroides, Gaertn. f. l. c. = *C. decumana*.

SARCODACTYLIS, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 513 (1841) = *prae.*

SARCODES, Torr. in *Smithson. Contrib.* vi. (1854) (Pl. Frémont.) 17. t. 10. **MONOTROPEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 606.
PTEROSPOROPSIS, Kellogg, fide A. Gray, ex Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 606 (1876).
sanguinea, Torr. in *Smithson. Contrib.* vi. (1854) (Pl. Frémont.) 18.—Calif.

SARCODISCUS, Griff. *Notul.* iv. 380 (1854) = **Kibara**, Endl. (Monim.).
chloranthiformis, Griff. l. c. = *K. Blumei*.

SARCODIUM, Pers. *Syn.* ii. 352 (1807) = *seq.*

SARCODUM, Lour. *Fl. Cochinch.* 462 (1790).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 498.
scandens, Lour. l. c.—Cochinch.

SARCOGLOSSUM, Beer, *Prakt. Orch.* 306 (1854) = **Cirrhaea**, Lindl. (Orchid.).
suaveolens, Beer, l. c. = *C. tristis*.

SARCOGLOTTIS, Presl, *Rel. Haenk. i.* 95. t. 15 (1827) = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).
cerina, W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 634 = *Spiranthes cerina*.
diaphana, W. Baxt. l. c. = *Spiranthes diaphana*.
diuretica, W. Baxt. l. c. = *Spiranthes diuretica*.
grandiflora, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 107 = *Spiranthes picta*.
lobata, W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 634 = *Spiranthes lobata*.
picta, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 106 = *Spiranthes picta*.
rosulata, W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 634 = *Spiranthes rosulata*.
rufescens, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 107 = *Spiranthes rufescens*.
speciosa, Presl, *Rel. Haenk. i.* 96. t. 15 = *Spiranthes speciosa*, Lindl.

SARCOGONUM, G. Don, in *Sweet, Hort. Brit. ed. III.* 577 (1839) = **Muehlenbeckia**, Meissn. (Polygon.).
adpressum, G. Don, l. c. = *M. adpressa*.
complexum, Kunze, in *Linnaea*, xvii. (1843) 570 = *M. complexa*.
depressum, G. Don, ex *Loud. Encyc. Pl. Suppl.* ii. 1354 = *M. australis*.

SARCOLAENA, Thou. *Hist. Vég. Afr. Austr.* 37. tt. 9, 10 (1806). **CHLAENACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 195.
SARCOCHLAENA, Spreng. *Syst.* ii. 594 (1825).
TANTALUS, Noronha, ex Thou. *Hist. Vég. Afr. Austr.* 39 (1806).

SARCOLAENA :—

Bojeriana, *Baill. Adansonia*, x. (1872) 177.—Madag.
eriphora, Thou. *Hist. Vég. Afr. Austr.* 40.—Madag.
grandiflora, Thou. l. c. t. 9.—Madag.
multiflora, Thou. l. c. t. 10.—Madag.

SARCOLEMMMA, Griseb. ex Lorentz, *Veget. Nord. Entre Rios*, 80 (1878) = **Sarcostemma**, R. Br. (Asclep.).

SARCOLIPES, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 290 (1837) = **Crassula**, Dill.
pubescens, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. Sarcolipes*.

SARCOLOBUS, R. Br. in *Mem. Wern. Soc. i.* (1809) 34. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 769.
Banksii, *Schult. Syst.* vi. 58.—Java.
carinatus, Griff. *Notul.* iv. 53 = *globosus*.
carinatus, Wall. in *As. Res.* xii. (1816) 570. t. 4.—Ind. or.; Burma.
globosus, Wall. l. c. 568. t. 5.—Ind. or.; Malaya.
narcoticus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 502.—Java.
Spanoghei, *Miq. l. c.*—Java.
virulentus, Griff. *Notul.* iv. 54 = *carinatus*?

SARCOMERIS, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xv. (1851) 340 = **Pachyanthus**, A. Rich. (Melastom.).
coriacea, Naud. l. c. = *P. cubensis*.

SARCOMORPHIS, Boj. ex Moq. in *DC. Prod.* xiii. 11. 179 (1849) = **Salsola**, Linn. (Chenop.).
littoralis, Boj. ex Moq. l. c. 180 = *Salsola littoralis*.

SARCOMPHALIUM, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 113 (1867) = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).
amethystinum, Dulac, l. c. = *H. amethystinus*.

SARCOMPHALUS, P. Br. *Hist. Jamaic.* 179 (1756).
RHAMNEAE, Benth. & Hook. f. i. 376.
acutifolius, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 32.—Cuba.
carolinianus, Rafin. *Sylva Tellur.* 29 = *Rhamnus caroliniana*.
divaricatus, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 31.—Cuba.
graeus, Rafin. *Sylva Tellur.* 29 = *Rhamnus Sibthorpiana*.
havanensis, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 31.—Ind. occ.
laurinus, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 100 = *retusus*.
levigatus, Rafin. *Sylva Tellur.* 29 = *Ceanothus laevigatus*.
mauritanus, Rafin. l. c. = *Zizyphus Jujuba*.
prunifolius, Rafin. l. c. = *Rhamnus prunifolia*.
retusus, Rafin. l. c.—Ind. occ.
Shortianus, Rafin. l. c. = *Rhamnus lanceolata*.

SARCONERIS, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 16 (1836) = **Campefia**, Rich. (Commel.).
bibracteata, Rafin. l. c. = *C. Zanonia*.

SARCOPETALUM, F. Muell. *Pl. Vict.* i. 26, *Suppl.* t. 3 (1860). **MENISPERMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 37.
Harveyanum, F. Muell. l. c. 27; *Suppl.* t. 3.—Austral.

SARCOPHYLLUM, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 32 (1835) = **Lebeckia**, Thunb. (Legumin.).
carnosum, E. Mey. l. c. = *L. contaminata*.
carnosum, Sims, *Bot. Mag.* t. 2502 = *L. Simsiana*.
carnosum, Willd. ex Walp. in *Linnaea*, xiii. (1839) 472 = *Coelidium ciliare*.
gnidioides, Willd. ex Walp. l. c. = *Coelidium Vogelii*.
grandiflorum, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 32 = *L. grandiflora*?

SARCOPHYLLUM, Willd. *Sp. Pl.* iii. 968 (1800) = *seq.*

SARCOPHYLLUS, Thunb. in *Schrad. Journ.* i. (1799) 323 = **Aspalathus**, Linn. (Legumin.).
carnosus, Thunb. l. c. 324 = *A. sarcodes*.

SARCOPHYSA, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iv. (1849) 190 = **Juanulloa**, Ruiz & Pav. (Solan.).
speciosa, Miers, l. c. 191 = *J. speciosa*.

SARCOPHYTE, Sparrm. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* xxvii. (1776) 300. t. 7. **BALANOPHOREAE**, Benth. & Hook. f. iii. 234.
ICHTHYOSMA, Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 671. t. 8.
sanguinea, *Sparrm. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* xxvii. (1776) 300. t. 7.—Afr. austr.

SARCOPODIUM, Lindl. in *Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i.* (1850) 155 = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
affine, Lindl. & Paxt. l. c., in obs. = *B. affine*.
amplum, Lindl. & Paxt. l. c. = *Dendrobium amplum*.
Cheiri, Lindl. & Paxt. l. c. = *B. Cheiri*.
Dearei, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1883) 11. 108. f. 17.—Hab.?
fuscescens, Lindl. *Fol. Orchid. Sarc.* 2 = *Dendrobium fuscescens*.
grandiflorum, Lindl. l. c. 3 = *B. grandiflorum*.
Griffithii, Lindl. l. c. 6 = *B. Griffithii*.
leopardinum, Lindl. & Paxt. *Flow. Gard. i.* (1850–51) 155, in obs. = *B. leopardinum*.
Lobbii, Lindl. & Paxt. l. c. = *B. Lobbii*.
macranthum, Lindl. & Paxt. l. c., in obs. = *B. macranthum*.
megalanthum, Lindl. *Fol. Orchid. Sarc.* 4 = *B. megalanthum*.
pileatum, Lindl. l. c. = *B. pileatum*.
psittacoglossum, Reichb. f. ex Hook. *Bot. Mag.* t. 5408 = *B. psittacoglossum*.
purpureum, Reichb. f. in *Bonplandia*, iv. (1856) 330.—Java.
Reinwardtii, Lindl. *Fol. Orchid. Sarc.* 4 = *B. Reinwardtii*.
rotundatum, Lindl. l. c. 2 (*Dendrobii* sp.).—Reg. Himal.
striatum, Lindl. l. c. 5 = *B. striatum*.
triadenium, Lindl. l. c. 2 = *B. triadenium*.
uniflorum, Lindl. l. c. 6 = *B. uniflorum*.

SARCOPOTERIUM, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 43 = **Poterium**, Linn. (Rosac.).
spinosum, Spach, l. c. = *P. spinosum*.

SARCOPTERYX, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* ix. (1879) 500, 658. **SAPINDACEAE**.
coriacea, Radlk. l. c. 659.—Ins. Waigiou.
Martyana, Radlk. l. c.—Austral.
melanophloea, Radlk. l. c.—N. Guin.
squamosa, Radlk. l. c. 659 = *Cupania glabrata*.
stipitata, Radlk. l. c. = *Ratonia stipitata*.

SARCOPYRAMIS, Wall. *Tent. Fl. Nap.* 32. t. 23 (1824). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 754.
grandiflora, Griff. *Notul.* iv. 678 = *napalensis*.
javanensis, Triana, in *Trans. Linn. Soc. xxviii.* (1871) 77, sphalm. = *seq.*
javanica, Zoll. & Mor. *Syst. Verz. Zoll.* 12 = *napalensis*.
lanceolata, Wall. Cat. n. 6290 = *napalensis*.
napalensis, Wall. *Tent. Fl. Nep.* 32. t. 23.—Reg. Himal.; Malay.

SARCORHYNA, Presl, *Bot. Bemer.* 103 (1844) = **Rostellaria**, Gaertn. f. (Acanth.).
Lessertiana, Presl, l. c. = *R. Lessertiana*.

SARCOSIPHON, Plume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 65. f. 18 (1849) = **Bagnisia**, Becc. (Burmamn.).
clandestinum, Plume, l. c.—Java.

SARCOSPERMA, Hook. f. in *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 655 (1876). **SAPOTACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
PERONIA, R. Br. in *Wall. Cat. n.* 7543 (1832).
arborescens, Hook. f. in *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 655.—Reg. Himal.
Griffithii, Hook. f. l. c.—Reg. Himal.
laurinum, Hook. f. l. c. 649, in obs., 655.—China.

SARCOSTEMMA, R. Br. in *Mem. Wern. Soc. i.* (1809) 50. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 763.

MONOSTEMMA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1848) i. 255.
SARCOLEMMMA, Griseb. ex Lorentz, *Veget. Nord. Entre Rios*, 80 (1878).
acidum, Voigt, *Hort. Suburb. Calc.* 542 = *brevistigma*.

SARCOSTEMMA :—

- annulare*, Roth, Nov. Pl. Sp. 178 = *Holostemma Rheedianum*.
aphyllum, Hochst. ex Decne. in DC. Prod. viii. 538 = *viminale*.
aphyllum, Schult. Syst. vi. 116.—Afr. austr.
apiculatum, Decne. in DC. Prod. viii. 539.—Bras.
arenarium, Benth. Bot. Voy. Sulph. 34.—Calif.
australe, R. Br. Prod. 463.—Austral.
barbatum, Mart. ex Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 235.—Bras.
bicolor, Decne. in DC. Prod. viii. 541 = *Philibertia elegans*.
bifidum, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 235.—Bras.
bilobum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 438 = *Philibertia cynanchoides*.
bonariense, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 296.—Reg. Argent.
brachystigma, Hook. Ic. Pl. t. 861, sphalm. = seq.
brevistigma, Wight & Arn. in Wight, Contrib. 59.—Ind. or.; Burma.
brevistylum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 274, sphalm. = *praece*.
Brownii, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 139 = *Philibertia viminalis*.
Brunonianum, Wight & Arn. in Wight, Contrib. 59.—Ind. or.
campanulatum, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 36.—Peruv.?
clausum, Schult. Syst. vi. 114 = *Philibertia viminalis*.
crassifolium, Chapm. Fl. S. U. St. 368 = *Philibertia viminalis*.
crassifolium, Decne. in DC. Prod. viii. 540 = *Philibertia crassifolia*.
crispum, Benth. Pl. Hartw. 291 = *Philibertia crispa*.
cumanense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 195 = *Philibertia cumanensis*.
cuspidatum, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 233.—Bras.
cynanchoides, Decne. in DC. Prod. viii. 540 = *Philibertia cynanchoides*.
Daltoni, Decne. in Hook. Niger Fl. 149. t. 14.—Ins. Cap. Virid.
Dombeyanum, Decne. in DC. Prod. viii. 539.—Peruv.
Donianum, Decne. l. c. 542 = *Philibertia gracilis*.
elegans, Decne. l. c. 541 = *Philibertia elegans*.
flavum, Decne. l. c. 540 = *Philibertia flava*?
Forskalianum, Schult. Syst. vi. 117.—Arabia.
Gardneri, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 233.—Bras.
Gilliesii, Decne. in DC. Prod. viii. 542 = *Philibertia solanoides*.
glaucum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 194. t. 229.—Am. austr.; Venezuela.
gracile, Decne. in DC. Prod. viii. 539 = *Philibertia gracilis*.
grandiflorum, Decne. l. c. 541 = *Philibertia gracilis*.
hastatum, Decne. l. c.—Peruv.
heterophyllum, Engelm. ex Torr. in Pacif. Rail. Rep. v. 362 = *Philibertia linearis*.
incanum, Decne. in DC. Prod. viii. 542 = *Philibertia solanoides*.
intermedium, Decne. l. c. 538.—Ind. or.
Jacquinii, Decne. l. c. 542.—N. Granat.
Lindenianum, Decne. l. c. 541 = *Philibertia Lindeniana*.
lineare, Decne. in Benth. Pl. Hartw. 25 = *Philibertia linearis*.
lineare, Spreng. Neue Entdeck. iii. 35.—Venezuela.
luridum, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 26 = *Philibertia lurida*.
marsupiflorum, Decne. in DC. Prod. viii. 541.—Peruv.
mauritanum, Boj. Hort. Maurit. 214 = *Decanema Bojerianum*.
nudum, C. Sm. ex Decne. in Hook. Niger Fl. 149 = *Daltoni*.
Odontolepis, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 17.—Ins. Rodrig.
ovatum, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 221 = *Vince-toxicum Meyeri*.
pallidum, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 235.—Bras.
pannosum, Decne. in DC. Prod. viii. 540 = *Philibertia pannosa*.
pedunculatum, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 235.—Bras.
pubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 194.—Am. austr.

SARCOSTEMMA :—

- pyrotechnicum*, Schult. Syst. vi. 116 = *Leptadenia Spartium*.
quadriflorum, Decne. in DC. Prod. viii. 542.—Peruv.
riparium, Decne. l. c. 540.—Bras.
rotundifolium, Decne. l. c. = *Philibertia rotundifolia*.
Schottii, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 234.—Bras.
solanoides, Decne. in DC. Prod. viii. 541 = *Philibertia solanoides*.
stellare, Griseb. in Lorentz, Veget. Nord. Entre Rios, 80, nomen.—Reg. Argent.
stipitaceum, Schult. Syst. vi. 116.—Arabia.
Stockii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 27.—Sind.
Swartzianum, Schult. Syst. vi. 115 = *Philibertia viminalis*.
tetrapterum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 255.—Afr. austr.
texanum, Engelm. ex Torr. Bot. Mex. Bound. 160 = *Philibertia cynanchoides*.
Thunbergii, G. Don, Gen. Syst. iv. 156 = *aphyllum*.
undulatum, Torr. Bot. Mex. Bound. 161 = *Philibertia undulatum*.
variifolium, Decne. in DC. Prod. viii. 541.—Peruv.
viminale, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 51.—Afr. trop.
viminale, Wall. ex Decne. in DC. Prod. viii. 538 = *brevistigma*.
viminale, Wight & Arn. Contrib. 59 = *intermedium*.

- SARCOSTIGMA**, Wight & Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xiv. (1853) 299. *OLACINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 354.
edule, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 298.—Ins. Andaman.
Horsfieldii, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 241. t. 47.—Java.
Kleinii, Wight & Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xiv. (1833) 299.—Ind. or.; Malaya.
Roxburghii, Wall. ex Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1846) 282.—Ind. or.
Vogelii, Miels, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. x. (1852) 117.—Afr. trop.
Wallichii, Baill. Adansonia, x. (1872) 282.—Burma.

- SARCOSTOMA**, Blume, Bijdr. 339. t. 45 (1825) = **Den-drobium**, Sw. (Orchid.).
javanica, Blume, Bijdr. 340. t. 45 = *D. Sarcostoma*.
juncea, Steud. Nom. ed. II. ii. 514 (err. typ.) = *praece*.
SARCOSTYLES, Presl, ex DC. Prod. iv. 15 (1830) = **Hydrangea**, Gronov. (Saxifr.).
peruviana, Presl, l. c. 16 = *H. peruviana*.

- SAROTHECA**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 241 (1850). *LINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 245.
macrophylla, Blume, l. c. 242.—Malaya.

- SAROTHECA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 474 = **Schinus**, Linn. (Anacard.).
bahiensis, Turcz. l. c. = *Sch. terebinthifolius*.

- SARCOTOECHIA**, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 501, 659 = **Ratonia**, DC. (Sapind.).
cuneata, Radlk. l. c. 659 = *R. tenax*.
protracta, Radlk. l. c. 660 = *R. tenax*.

- SARCOZYGIUM**, Bunge, in Linnaea, xvii. (1843) 7. t. 1. *ZYGOPHYLLAE*, Benth. & Hook. f. i. 266.
xanthoxylum, Bunge, l. c. 8.—Mongolia.

- SARDINIA**, Vell. Fl. Flum. 144 (1825); iii. t. 163 (1827) = **Guettarda**, Vent. (Rubiace.).
bella, Vell. l. c.—Bras.

- SARIAVA**, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 12 = **Symplocos**, Linn. (Styrac.).

- SARIBUS**, Blume, Rumphia, ii. 48. t. 95, 96 (1836) = **Livistona**, R. Br. (Palm.).
chinensis, Blume, l. c. 49, in obs. = *L. chinensis*.
cochinchinensis, Blume, l. c., in obs. = *L. cochinchinensis*.
olivaeformis, Hassk. in Hoen. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 176 = *L. olivaeformis*.
rotundifolius, Blume, Rumphia, ii. 49. t. 95, 96 = *L. rotundifolia*.
subglobosus, Hassk. in Hoen. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 177 = *L. subglobosa*.

- SARISSUS**, Gaertn. Fruct. i. 118. t. 25 (1788) = **Hydrophylax**, Linn. f. (Rubiace.).
anceps, Gaertn. l. c. = *H. maritima*.

- SARMENTARIA**, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 140 = **Adelobotrys**, DC. (Melastom.).
decora, Naud. l. c. 141 = *A. adscendens*.

- SARMIENTA**, Ruiz & Pav. Prod. 4 (1794). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1012.

- URCEOLARIA**, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 136, 277 (1810).
repens, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 8. t. 7.—Chili.
scandens, Pers. Syn. i. 13 = *repens*.

- SARNA**, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 414 = **Apo-danthes**, Poit. (Cytinac.).
Cauletreti, Karst. l. c. 415 = *A. Blanchetii*?
Ingae, Karst. l. c. = *A. Calliandrae*?

- SAROSANTHERA**, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 103. t. 16 (1840?) = **Adinandra**, Jack (Temstr.).
excelsa, Korth. l. c. 104.—Borneo.
lasiopetala, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 41 = *A. lasiopetala*.

- SAROTES**, Lindl. Swan River App. 19 (1839) = **Guichenotia**, J. Gay (Stercul.).
latifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 150 = *Lasiopetalum rosmarinifolium*.
ledifolia, Lindl. Swan River App. 19 = *G. Sarotes*.
micrantha, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 346 = *G. micrantha*.
pogonantha, F. Muell. Fragm. ii. 7 = *G. micrantha*.
rosmarinifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 149 = *Lasiopetalum rosmarinifolium*.
semihastata, F. Muell. Fragm. ii. 4 = *G. semihastata*.

- SAROTHAMNOS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.

- SAROTHAMNUS**, Wimm. Fl. Schles. (1832) 278 = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).
affinis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 134. t. 40 = *C. affinis*, Boiss.
arbores, Boiss. l. c. 137 = *C. baeticus*.
arbores, Webb, Iter Hisp. 52, in obs. = *C. arbores*.
baeticus, Webb, l. c. = *C. baeticus*.
Balansae, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 7 = *C. Balansae*.
Bourgaei, Boiss. l. c. 6.—Hispan.
cantabricus, Bourg. ex Nym. Consp. 150 = *C. eriocarpus*.
cantabricus, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 616.—Hispan.
Carlieri, Comp. ex Nym. Consp. 150 = *catalaunicus*.
catalaunicus, Webb, Iter Hisp. 52, in obs. = *C. catalaunicus*.
commutatus, Willk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 105.—Hispan.
eriocarpus, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 10 = *C. eriocarpus*.
gaditanus, Boiss. & Reut. l. c. = *C. baeticus*.
grandiflorus, Webb, Otia Hisp. 45. t. 39 = *C. grandiflorus*.
malacitanus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 137 = *C. malacitanus*.
oxyphyllus, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 7.—Hispan.
parviflorus, Willk. & Cutand. in Linnaea, xxx. (1859-60) 95 = *C. albus*.
patens, Plan. Fl. Gallega, 164 = *Welwitschii*.
patens, Webb, Iter Hisp. 51 = *C. patens*.
purgans, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 349 = *C. purgans*.
scoparius, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 1. 152 = *C. scoparius*.
virgatus, Webb, Iter Hisp. 52 = *C. grandiflorus*.
vulgaris, Wimm. Fl. Schles. (1832) 278 = *C. scoparius*.
Welwitschii, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 28.—Hispan.

- SAROTHECA**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 113. t. 18 (1847) = **Justicia**, Linn. (Acanth.).
elegans, Nees, l. c. = *J. elegans*, Pohl (cf. Addend.).
rostrata, Nees, in DC. Prod. xi. 383 = *J. rostrata*.
salviaeflora, Nees, l. c. = *J. salviaeflora*.
scabra, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 114 = *Aphelandra pectinata*?

SAROTHRAS, Linn. Diss. Chen. 14 (1751); Amoen. Acad. iii. 11 (1787) = *Hypericum*, Tourn. *blentinensis*, Savi f. in Nuov. Giorn. Pisan. xxxix. (1839) 225 = *H. mutilum*. *canadensis*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 = *H. canadense*. *cuneifolia*, Rafin. Atl. Journ. 17 = *H. Sarothra*? *Drummondii*, Grev. & Hook. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 236. t. 107 = *H. Drummondii*. *fastigiata*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 79 = *H. adpressum*. *gentianoides*, Linn. Sp. Pl. 272 = *H. Sarothra*. *gentianoides*, Lour. Fl. Cochinch. 182. —Cochinchina. *hypericoides*, Nutt. Gen. Am. i. 204 = *H. Sarothra*. *Loureiriana*, Schult. Syst. vi. 679 = *gentianoides*, Lour. *parviflora*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192 = *H. mutilum*. *pauciflora*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 79 = *H. canadense*. *quinquenervia*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 = *H. mutilum*. *trinervia*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 79 = *H. triplinerve*?

SAROTHROSTACHYS, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 185 = *Sebastiania*, Spreng. (Euphorb.). *daphniphylla*, Buck, Index ad DC. Prod. iv. 366 = *Seb. daphniphylla*. *Laureola*, Buck, l. c. = *Seb. Laureola*. *Luschnathiana*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 185 = *Seb. multiramea*. *multiramea*, Klotzsch, l. c. = *Seb. multiramea*.

SARRACENA, Tourn. ex Linn. Hort. Cliff. 497 (1737) = seq.

SARRACENIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 510 (1753). *SARRACENIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 48. *SARRAZINIA*, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 223 (1824). *adunca*, Sm. Exot. Bot. i. 103 = *variolaris*. *atropurpurea*, Hort. Bull. in Gard. Chron. (1880) i. 759 = *flava*. *atrosanguinea*, Hort. Bull. ex André, in Illustr. Hortic. xxvii. (1880) 87. t. 386 = *præc.* *calceolata*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. iv. (1834) 49. t. 1 = *psittacina*. *Catesbaei*, Ell. Sketch, ii. 11 = *flava*. *Chelsoni* ×, Hort. Veitch. in Gard. Chron. (1880) i. 722. f. 125. *Courtii* ×, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1881) ii. 381. *crispata* ×, Hort. Bull. ex André, in Illustr. Hortic. xxvii. (1880) 87. t. 387. *Drummondii*, Croom, in Ann. Lyc. N. York, iv. (1848) 100. —Am. bor. *Drummondii*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850–51) 1. t. 1 = *undulata*. *erythropus* ×, Hort. ? —Cf. Gard. Chron. (1882) i. 713. —Hab. ? *flava*, Linn. Sp. Pl. 510. —Am. bor. *formosa* ×, Hort. Veitch. —Cf. Gard. Chron. (1881) ii. 281. *Gronovii*, Wood, Class-Book (1861), 222; Am. Bot. & Flor. 30 = *flava*, *rubra*. *heterophylla*, Eaton, Man. Bot. ed. IV. 447 = *purpurea*. *heterophylla*, Ell. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 514 = *flava*. *lacunosa*, Bartr. Trav. ed. II. (1794) p. xii. 415 = *variolaris*? *leucophylla*, Rafin. Fl. Ludov. 14 = *Drummondii*? *melanorrhoda* ×, Hort. Veitch, in Gard. Chron. (1882) ii. 281. —Hab. ? *minor*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 138 = *Sweetii*. *minor*, Wall. Fl. Carol. 153 = *variolaris*. *Mooreana* ×, —Cf. Gard. Chron. (1877) i. 425. *Moorei* ×, Mast. in Gard. Chron. (1881) ii. 40. *nutans*, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 260 = *Heliamphora nutans*. *Popei* ×, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1881) i. 691. *psittacina*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 311 (*psittacina*). —Am. bor. *pulchella*, Croom, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xxv. (1834) 75 = *psittacina*. *purpurea*, Linn. Sp. Pl. 510. —Am. bor. *rubra*, Planch. in Fl. des Serres, Sér. I. x. (1854–55) 243. t. 1074 = *Sweetii*. *rubra*, Walt. Fl. Carol. 152. —Am. bor. *Rugelii*, Shutt. ex A. DC. in DC. Prod. xvii. 6 = *flava*. *Stevensi* ×, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1881) ii. 40. f. 7.

SARRACENIA:—

Sweetii, A. DC. in DC. Prod. xvii. 5. —Am. bor. *undulata*, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. i. (1852) 126. —Am. bor. *variolaris*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 310. —Am. bor. *Williamsii* ×, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1874) ii. 49; (1881) i. 629.

SARRACHA, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. p. xxxix (1827) = *Saracha*, Ruiz & Pav. (Solan.).

SARRATIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 233, 268 (1849) = *Amaranthus*, Linn. *Berlandieri*, Moq. l. c. 268 = *A. polygonoides*. *polygonoides*, Moq. l. c. 270 = *A. polygonoides*. *scariosa*, Moq. l. c. 269 = *A. scariosus*. *urceolata*, Moq. l. c. = *A. urceolatus*.

SARRAZINIA, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 223 (1824) = *Sarracenia*, Linn.

SARRIZINIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 514 (1841), sphalm. = *præc.*

SARTORIA, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 109 (1849) = *Onobrychis*, Linn. (Legumin.). *hedysaroides*, Boiss. & Heldr. l. c. —Taurus.

SARTWELLIA, A. Gray, Pl. Wright. i. (in Smithson. Contrib. iii.) 122. t. 6 (1852). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 407. *Flaveriae*, A. Gray, in Pl. Wright. i. 122. —Texas. *mexicana*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1882) 107, nomen; xix. (1884) 34. —Mexic.

SASALI, Adans. Fam. ii. 305 (1763) = *Grewia*, Linn. (Tiliac.).

SASANQUA, Nees, in Liter. Flora, iv. (1834) 144 = *Camellia*, Linn. (Ternstr.). *malliflora*, Rafin. Sylva Tellur. 140 = *C. Sasanqua*. *ochroleuca*, Rafin. l. c. = *Gordonia anomala*. *odorata*, Rafin. l. c. —Hab. ? *oleifera*, Rafin. l. c. = *C. Sasanqua*. *vulgaris*, Nees, in Liter. Flora, iv. (1834) 144 = *C. Sasanqua*.

SASSA, Bruce, ex J. F. Gmel. Syst. 1038 (1791) = *Acacia*, Willd. (Legumin.). *gummifera*, J. F. Gmel. l. c. = *A. gummifera*.

SASSAFRAS, Linn. Syst. ed. I (1735); Nees, Laur. Expos. 17 (1833). *LAURINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 160. *albidum*, Nees, Syst. Laurin. 490 = *officinale*. *Goesianum*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 94 = *Massoia aromatica*. *Loureiri*, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 481 = *Cinnamomum Parthenoxylon*. *mauritanum*, Boj. Hort. Maurit. 273 = *Hernandia peltata*. *officinale*, Nees & Eberm. Handb. Med.-Pharm. Bot. ii. 418; Nees, Syst. Laurin. 488. —Am. bor. *officinale*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 23 = *Lindera triloba*. *officinatum*, J. S. Presl, Rostl. ii. 68 = *officinale*. *Parthenoxylon*, Nees, Syst. Laurin. 491 = *Cinnamomum Parthenoxylon*. *rubrum*, Rafin. Sylva Tellur. 134 = *officinale*? *Thunbergii*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 23 = *Lindera umbellata*.

SASSAFRIDIUM, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 171 (1864). *LAURINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 160. *veraguense*, Meissn. l. c. —Mexic.

SASSEA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 128. —Cf. in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 132. t. 12 C = *Begonia*, Linn. *columnaris*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 128 = *B. columnaris*. *glabra*, Klotzsch, l. c. = *B. columnaris*. *Hoffmanniana*, Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod. xv. i. 275 = *B. Urticae*. *Urticae*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 128 = *B. Urticae*.

SASSIA, Molina, Sagg. Chile, 145 (1782) = *Oxalis*, Linn. (Geran.). *perdicaria*, Molina, l. c. 146 = *O. lobata*. *tinctoria*, Molina, l. c. = *O. violacea*.

SATANIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Flacourtia*, Comm. (Bixin.).

SATANOCRATER, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 676. *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1085. *fellatensis*, Schweinf. l. c. —Afr. trop.

SATARIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 20 (1836) = *Peucedanum*, Tourn. (Umbell.). *linearis*, Rafin. l. c. 21 = *P. triternatum*, Nutt.

SATIRIUM, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 372 (1768) = *Satyrium*, Linn. (Orchid.).

SATTADIA, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 231 (1885). *ASCLEPIADEAE*. *Burchellii*, Fourn. l. c. 232. —Bras.

SATUREGIA, Leers, Fl. Herborn. 135 (1775) = seq.

SATUREIA, Linn. Coroll. Gen. 9. n. 961 (1737). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1187. *FURERA*, Adans. Fam. ii. 193 (1763). *NOSTELIS*, Rafin. Sylva Tellur. 76 (1838). *PILOBLEPHIS*, Rafin. New Fl. Am. iii. 52 (1836). *SACCOCALYX*, Coss. & Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xx. (1853) 80. t. 5. *SATURIATRUM*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 137. *Acinos*, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 577 = *Calamintha Acinos*. *alpina*, Scheele, l. c. = *Calamintha alpina*. *alternipilosa*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 668. —Reg. Caucas. *americana*, Poir. Encyc. vi. 571 = *Hyptis scoparia*. *angustifolia*, Presl, Fl. Sic. p. xxxvi = *Micromeria graeca*. *approximata*, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. Manip. iv. 13 = *Micromeria approximata*. *approximata*, Frivald. in Flora, xiv. (1836) 438. —Graec. *argaea*, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33 = *Thymus Serpyllum*. *atropatana*, Bunge, Lab. Pers. 36. —Persia. *bachtarica*, Bunge, l. c. 37. —Persia. *Boissieri*, Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 565. —As. Min. *brachiata*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 300 = *hortensis*. *brevis*, Jord. & Fourn. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 44 = *montana*. *Calamintha*, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 577 = *Calamintha officinalis*. *Campanella*, Ehrenb. Naturg. Reise, 13. —Afr. bor. *canescens*, Guss. Pl. Rar. 228. t. 42 = *Micromeria canescens*. *capitata*, Desf. Fl. Atlant. ii. 9 = *Micromeria nervosa*. *capitata*, Linn. Sp. Pl. 568 = *Thymus capitatus*. *ciliata*, Avé-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 66 = *montana*. *Clinopodium*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 135 = *Calamintha Clinopodium*. *coccinea*, Bertol. Misc. Bot. viii. 23 = *Calamintha coccinea*. *coerulea*, Fanka, in Kanitz, Pl. Roman. 94. —Banat. *collina*, Salisb. Prod. 77 = *S. Thymbra*. *condaea*, Juss. ex Poir. Encyc. vi. 571 = *Hyptis scoparia*. *congesta*, Hornem. Hort. Hafn. 541 = *Micromeria graeca*. *consentina*, Tenore, Prod. Fl. Nap. App. v. 17 = *Micromeria graeca*. *cordata*, Moris, ex Bertol. Fl. Ital. x. 519 = *Micromeria cordata*. *corsica*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 137 = *Calamintha corsica*. *cristata*, Nym. Syll. 102 = *Micromeria cristata*. *cuneata*, Reichb. Ic. Fl. Germ. xviii. t. 1272, sphalm. = seq. *cuneifolia*, Tenore, Prod. Fl. Nap. 33. —Reg. Mediterr. *dalmatica*, Nym. Syll. 102 = *Micromeria dalmatica*.

SATUREIA:—

diffusa, Benth. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 566 = *alternipilosa*.
ericoides, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 328 = *Gardoquia microphylla*.
fasciculata, Rafn. Préc. Découv. 39 = *Micromeria approximata*.
fasciculata, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 248 = *cuneifolia*.
Fenzlii, Nym. Syll. Suppl. 20 = *Micromeria Pulegium*.
filicaulis, Schott, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 562 = *hortensis*.
filiformis, Desf. Fl. Atlant. ii. 8 = *Micromeria microphylla*.
filiformis, Nym. Syll. 102 = *Micromeria filiformis*.
filiformis, Tenore, Marin. Viagg. i. 299 = *Micromeria nervosa*.
flexuosa, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 45 = *montana*.
glandulosa, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 125 = *Calamintha glandulosa*.
globifera, Steud. Nom. ed. I. 733, sphalm. = seq. *globulifera*, Desf. Tabl. ed. I. 58, nomen. — Hab.?
glomerata, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 613 = *inodora*.
graeca, Linn. Sp. Pl. 568 = *Micromeria graeca*.
grandiflora, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 577 = *Calamintha grandiflora*.
graveolens, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 143 = *Calamintha graveolens*.
hirsuta, J. & C. Presl, Delic. Prag. 79 = *Micromeria Juliana*.
hirta, Host, Fl. Austr. ii. 134 = *cuneifolia*.
hispida, Ehrh. Beitr. vii. 147. — *Graecia*?
hispida, Nym. Syll. 102 = *Micromeria hispida*.
hortensis, Linn. Sp. Pl. 568. — Reg. Medit.; Oriens.
Hostii, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 125 = *Calamintha thymifolia*.
hyssopifolia, Bertol. in Ann. Stor. Nat. (1829) III. 406 = *montana*.
hyssopifolia, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 428 = *obovata*.
illyrica, Host, Fl. Austr. iii. 133 = *montana*.
incana, Spreng. Syst. ii. 719 = *Micromeria obovata*.
inodora, Host, Fl. Austr. ii. 135 = *Micromeria parviflora*.
inodora, Salzmann, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 354. — Reg. Medit. occ.
intermedia, Benth. in DC. Prod. xii. 210 = *mutica*.
intermedia, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 91. — Reg. Caucas.
intricata, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1881) 96. — Hispan.
Juliana, Linn. Sp. Pl. 567 = *Micromeria Juliana*.
Juliana, Pall. Tabl. Taur. 53 = *montana*.
Kitaibelii, Wierzb. ex Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 177 = *montana*.
lanata, C. Sm. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 143 = *Micromeria lanata*.
laxiflora, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 668 = *hortensis*.
Libanotis, [Spreng.] Bot. Gart. Halle, 84 (Quid?). — Syria.
longiflora, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 566. — Persia.
longiflora, Presl, Fl. Sicul. p. xxxvi = *Micromeria graeca*.
macrantha, C. A. Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 67. — Reg. Caucas.
marifolia, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 125 = *Micromeria marifolia*.
Mastichina, Linn. Sp. Pl. 567 = *Thymus Mastichina*.
micrantha, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 142 = *Micromeria graeca*.
microphylla, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 120 = *Micromeria microphylla*.
mollis, Webb, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 515, nomen. — Ins. Teneriff.
montana, Linn. Sp. Pl. 568. — Europ. austr.; Reg. Caucas.
mucronifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 300 = *montana*.
mutica, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 49. — Reg. Caucas.
nemorosa, Tardent, Ess. Hist. Nat. Bessarab. 54, nomen (Quid?). — Bessarab.
Nepeta, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 577 = *Calamintha Nepeta*.

SATUREIA:—

nervosa, Desf. Fl. Atlant. ii. 9. t. 121. f. 2 = *Micromeria nervosa*.
obovata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 18. — Hispan.
officinarium, Crantz, Inst. i. 526 = *hortensis*.
Olla, Ehrenb. Naturg. Reise, 13. — Afr. bor.
origanoides, Linn. Sp. Pl. 568 = *Cunila Mariana*.
ovata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *Micromeria ovata*.
pachyphylla, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 295 = *hortensis*.
parmassica, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 563 = *approximata*.
parviflora, Presl, Fl. Sic. p. xxxvi = *Micromeria Juliana*.
parviflora, Vis. in Flora, xii. (1829) i. Erg. 13 = *Micromeria parviflora*.
petraea, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 45 = *montana*.
Piperella, Bertol. Fl. Ital. vi. 50 = *Micromeria croatica*, M. Piperella.
plumosa, Hampe, in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 127 = *Micromeria nervosa*.
provincialis, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 45 = *montana*.
punctata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *Micromeria punctata*.
pygmaea, Sieber, ex Vis. Stirp. Dalm. Spec. 11 = *montana*.
pyrenaica, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 89 = *montana*.
rigida, Bartr. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 354. — Florida.
rigidula, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 46 = *montana*.
rupestris, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 130 = *Micromeria rupestris*.
scabra, Presl, Fl. Sic. p. xxxvi. — Sicilia.
sessiliflora, Presl, l. c. = *Micromeria graeca*.
sicula, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 89 = *Micromeria graeca*.
Sideritis, Benth. in DC. Prod. xii. 212, sphalm. = *Micromeria obovata*.
Sophia, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 733 = *Micromeria Juliana*.
spicata, Crantz, Inst. i. 525 = *Micromeria Juliana*.
spicata, Vis. Fl. Dalm. ii. 195 = *cuneifolia*.
spicigera, Boiss. Fl. Orient. iv. 566 = *alternipilosa*.
spinosa, Heldr. ex Nym. Cons. 591 = *approximata*.
spinosa, Linn. Cent. Pl. ii. 19; Amoen. Acad. iv. 317. — Ins. Creta.
stricta, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 255 = *Nepeta heliotropifolia*.
subtata, Boiss. Fl. Orient. iv. 565. — Reg. Caucas.
subspicata, Bartl. ex Vis. Stirp. Dalm. Kar. ii. t. 4 = *montana*.
Teneriffae, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = *Micromeria microphylla*.
tenuifolia, Botteri, ex Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 593 = *Micromeria longifolia*.
tenuifolia, Tenore, Prod. Fl. Nap. 33 = *Micromeria graeca*.
tenuis, Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 143 = *Micromeria tenuis*.
Thymbra, Linn. Sp. Pl. 567. — Reg. Mediterr. or.
thymifolia, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 428 = *Micromeria rupestris*.
thymoides, Nym. Syll. 102 = *Micromeria thymoides*.
thymoides, Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 19 = *Micromeria varia*.
Tragoriganum, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 248 = *S. Thymbra*.
trifida, Moench, Meth. 386 = *montana*.
varia, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 71 = *Micromeria varia*.
variegata, Host, Fl. Austr. iii. 134 = *montana*.
viminea, Burm. f. Fl. Ind. 126 = *hortensis*.
viminea, Linn. Syst. ed. X. 1096 = *Micromeria obovata*.
virgata, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 299 = *Micromeria Juliana*.
virgata, Vis. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 353 = *cuneifolia*.
virginiana, Linn. Sp. Pl. 567 = *Pycnanthemum lanceolatum*, linifolium.
virginica, Hill, Veg. Syst. xviii. 51 = *praec.*

SATYRIUM, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752) = *praec.*

SATURIASTRUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 133 = *Satureia*, Linn. (Labiata).
montanum, Fourr. l. c. = *Satureia montana*.
petraeum, Fourr. l. c. = *Satureia montana*.

SATURNIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 (Euphorb.?).

SATURNIA, Maratt. Pl. Romul. et Saturn. 18. t. 2 (1772) = *Allium*, Tourn. (Liliac.).
cernua, Maratt. Fl. Rom. i. 258 = *A. Chamaemoly*.
Chamaemoly, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 92 = *A. Chamaemoly*.
etrusca, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 59 = *A. Chamaemoly*.
littoralis, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 21 = *A. Chamaemoly*.
rubrinervis, Jord. & Fourr. l. c. 22 = *A. Chamaemoly*.
viridula, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 60 = *A. Chamaemoly*.

SATYRIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 21. VACCINIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 567.
 RIEDELIA, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 171 (1863).
clonantha, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 22. — Am. centr.
panurensis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 568. — Bras.
Warszewiczii, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 22. — Am. centr.

SATYRIDIDIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 345 (1838) = *Satyrium*, Linn. (Orchid.).
rostratum, Lindl. l. c. = *Satyrium rhynchanthum*.

SATYRIUM, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 270 (1737), partim; Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 214. ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 629.

AVICEPS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 345 (1838).
 DIPLECTHRUM, Pers. Syn. ii. 508 (1807).
 SATYRIDIDIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 345 (1838).
aculeatum, Linn. f. Suppl. 402 = *Eulophia aculeata*.
acuminatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 339. — Afr. austr.
adnatum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 118 = *Pelexia adnata*.
albidum, Linn. Sp. Pl. 944 = *Habenaria albidula*.
albiflorum, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 76 = *nepalense*.
alpinum, Pers. Syn. ii. 507 = *Hermium alpinum*.
alpinum, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 63 = *Habenaria viridis*.
amoenum, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 21. — Ins. Borbon.
anthropomorpha, Pers. Syn. ii. 507 = *Aceras anthropophora*.
anthropophora, Pers. l. c. = *Aceras anthropophora*.
Atherstonei, Reichb. f. in Flora, lxiv. (1881) 328. — Afr. austr.
atlanticum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 300 = *Habenaria intacta*.
aureum, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 31 = *coriifolium*.
barbatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa barbata*.
bicallosum, Thunb. l. c. 6. — Afr. austr.
bicorne, Thunb. l. c. — Afr. austr.
bifidum, Thunb. l. c. 5 = *Disa bifida*.
bifolium, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 273. — Abyss.
bifolium, Wahlenb. Fl. Suec. 579 = *Habenaria bifolia*.
brachypetalum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 299. — Abyss.
bracteale, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 290 = *Habenaria viridis*.
bracteatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342 = *Lindley-anum*.
bracteatum, Pers. Syn. ii. 507 = *Habenaria viridis*.
bracteatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6. — Afr. austr.
calceatum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxi. (1855) 520. — Madag.
candidum, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 82. — Afr. austr.
capense, Houtt. Handleid. xii. 502 = *Eulophia tristis*.
capense, Linn. Pl. Rar. Afr. 27; Amoen. Acad. vi. 110 = *Eulophia aculeata*.
carneum, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 196. — Afr. austr.
cassideum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 341 = *parviflorum*.
cernuum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa physodes*.

SATYRIUM:—

chrysostachyum, Herschel, in Bot. Reg. (1838) Misc. 84 = *coriifolium*.
ciliatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 341 = *nepalense*.
conopseum, Wahlenb. Fl. Suec. 579 = *Habenaria conopsea*, Benth.
cordifolium, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344.—Afr. austr.
coriifolium, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.
coriophoroides, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 274.—Abyss.
cornutum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 30 (err. typ. 26).—Afr. austr.
cornutum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa cornuta*.
cristatum, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 84.—Afr. austr.
cucullatum, Lodd. Bot. Cab. t. 104 = *coriifolium*.
cucullatum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216 = *bicorne*.
cylindricum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa cylindrica*.
debile, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 67.—Afr. austr.
densiflorum, Brot. Fl. Lusit. i. 22 = *Habenaria intacta*.
densiflorum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 340 = *parviflorum*.
diphyllum, Link. in Schrad. Journ. ii. (1799) 323 = *Habenaria cordata*.
draconis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa draconis*.
elatum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 119 = *Spiranthes elata*.
emarcidum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 67.—Afr. austr.
Epipogium, Linn. Sp. Pl. 945 = *Epipogon aphyllum*.
erectum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 340 = *coriifolium*.
erectum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.
eristomum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342.—Afr. austr.
excelsum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa excelsa*.
ferrugineum, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 62 = *Habenaria viridis*.
ferrugineum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa ferruginea*.
flexuosum, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 7 (= *Peristylus flexuosus*).—Ins. Mascar.
flexuosum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa flexuosa*.
foliosum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 7054 (= *Coelogyssum secundum*).—Ind. or.
foliosum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 336 = *Hallackii*.
foliosum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.
fuscum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 337 = *Habenaria viridis*.
giganteum, Linn. f. Suppl. 402 (= *Cyrtopera gigantea*).—Afr. austr.
gracile, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 338.—Madag.
gramineum, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 6 = *Habenaria graminea*.
grandiflorum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 4 = *Disa uniflora*.
Hallackii, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 476.—Afr. austr.
Herscheliae, Harv. Gen. S. Afr. Pl. 326, nomen.—Afr. austr.
hians, Linn. f. Suppl. 401 = *Disa lacera*?
hircinum, Linn. Sp. Pl. 944 = *Orchis hircina*.
hirsutum, Gilib. Exercit. ii. 484 = *Goodyera repens*.
hirtellum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 118.—Jamaic.
humile, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 339.—Afr. austr.
Ivantallae, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 183.—Afr. trop.
lanceum, Pers. Syn. ii. 507 = *Ophrys lancea*.
latifolium, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 10 = *Habenaria chlorantha*.
leucocomos, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 182.—Afr. trop.
ligulatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342.—Afr. austr.
Lindleyanum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 474.—Afr. austr.
lineatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 343 = *bracteatum*.
lingulatum, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 42 (err. typ. 24) = *Habenaria viridis*.
longicauda, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 337.—Afr. austr.
longicollis, Lindl. l. c. 335 = *maculatum*.
lupulinum, Lindl. l. c. 338.—Afr. austr.
lydenburgense, Reichb. f. in Flora, lxiv. (1881) 328 = *eristomum*.

SATYRIUM:—

macrophyllum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 338.—Afr. austr.
macrostachyum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 298 = *coriophoroides*.
maculatum, Burch. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 337.—Afr. austr.
maculatum, Desf. Fl. Atlant. ii. 319 = *Habenaria intacta*.
marginatum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 476.—Afr. austr.
membranaceum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.
militare, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342 = *sphaerocarpum*.
Monorchis, Pers. Syn. ii. 507 = *Herminium Monorchis*.
muticum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344.—Afr. austr.
nepalense, D. Don, Prod. Fl. Nep. 26.—Ind. or.
nigrum, Linn. Sp. Pl. 944 = *Habenaria nigra*.
obsoletum, Pers. Syn. ii. 507 = *Habenaria obsoleta*.
ochroleucum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 66.—Afr. austr.
odoratissimum, Wahlenb. Fl. Suec. 578 = *Habenaria odoratissima*.
odorum, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 86.—Afr. austr.
orchioides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 118 = *Spiranthes orchioides*.
orientale, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 (Quid?).—Java.
orobanchoides, Linn. f. Suppl. 402 = *Corycium orobanchoides*.
pallidum, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 77 = *nepalense*.
paludosum, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 182.—Afr. trop.
papillosum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 341 = *erectum*.
parviflorum, Lindl. l. c. 336 = *marginatum*.
parviflorum, Pers. Syn. ii. 506 = *Habenaria intacta*.
parviflorum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.
pedicellatum, Linn. f. Suppl. 402 = *Eulophia aculeata*.
Perrottetianum, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 76 = *nepalense*.
pictum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344 = *bracteatum*.
plantagineum, Linn. Syst. ed. X. 1244 = *Spiranthes orchioides*.
praealtum, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 11 = *Habenaria praealta*.
pumilum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6.—Afr. austr.
pustulatum, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 18 = *erectum*.
pygmaeum, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 86.—Afr. austr.
repens, Linn. Sp. Pl. 945 = *Goodyera repens*.
repens, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 157 = *Goodyera pubescens*.
retusum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 343.—Afr. austr.
rhynchanthum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 342.—Afr. austr.
riparium, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 183.—Afr. trop.
rosellatum, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 8 = *Habenaria masearensis*.
rostratum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 338.—Madag.
rufescens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa rufescens*.
sagittale, Thunb. l. c. = *Disa sagittalis*.
saxicolum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 474.—Afr. austr.
scanense, Linn. ex Steud. Nom. ed. I. 734 = *Habenaria albida*.
Schimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 300.—Abyss.
secundum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 4 = *Disa racemosa*.
spathulatum, Thunb. l. c. 5 = *Disa spathulata*.
sphaerocarpum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 337.—Afr. austr.
spirale, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 118 = *Spiranthes tortilis*.
spirale, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 9 = *Habenaria spiralis*, A. Rich.
stenopetalum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 336.—Afr. austr.
striatum, Ker-Gawl. in Brand. Journ. Sc. viii. (1820) 221 = *bracteatum*.
striatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6.—Afr. austr.
tabulare, Linn. f. Suppl. 402 = *Cymbidium tabulare*.
tenellum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa tenella*.
tortum, Thunb. l. c. = *Disa torta*.

SATYRIUM:—

trifidum, Vill. Hist. [Pl. Dauph. ii. 42 = *Habenaria albida*.
trinerve, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344.—Madag.
triste, Linn. f. Suppl. 402 = *Eulophia tristis*.
utriculatum, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 84 = *candidum*.
vallisoletanum, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. (Orch. Opusc.) 7.—Mexic.
venosum, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 361.—Hab.?
virescens, Pers. Syn. ii. 507 = *Habenaria herbiola*.
viride, Linn. Sp. Pl. 944 = *Habenaria viridis*.
Welwitschii, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 182.—Afr. trop.
Wightianum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 340 = *nepalense*.

SAUBINETIA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 282. t. 49 (1848) = **Verbesina**, Linn. (Compos.).
helianthoides, Remy, l. c. 284.—Chili.

SAUERIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 122; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 40. t. 2 A = **Begonia**, Linn.
crenata, Hassk. in Versl. Kon. Akad. Wetensch. iv. (1855) 139 = *B. crenata*.
sulcata, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 122; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 41 = *B. sulcata*.

SAUL, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 84 (1834) = **Shorea**, Linn. (Dipteroc.).
fallarea, Roxb. ex Wight & Arn. l. c. = *Shorea Talura*.
Tumbagia, Steud. Nom. ed. II. ii. 516 = seq.
Tumbagaia, Roxb. ex Wight & Arn. l. c. = *Shorea Tumbagaia*.

SAULCYA, Michon, Voy. Relig. Or. ii. 383 (1854) = **Odontospermum**, Neck (Compos.).
hierochuntica, Michon, l. c. (= *Asteriscus pygmaeus*).—Afr. bor.; Palaest.

SAUNDERSIA, Reichb. f. in Bot. Congr. Lond. 120 (1866); Beitr. Orch. 17. t. 6 (1869). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 561.
mirabilis, Reichb. f. ll. cc. 120; 19.—Bras.

SAURAVIA, Spreng. Anleit. ii. II. 818 (1818) = **Saurauja**, Willd. (Ternstr.).

SAUROBROMA, Rafin. Sylva Tellur. 32 (1838) = **Celtis**, Tourn. (Urtic.).
iguanense, Rafin. l. c. = *C. aculeata*.

SAURAUJA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 407. t. 4. **TERNSTROEMIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 184.

APATELIA, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1821) 426.

BLUMIA, Spreng. Syst. iii. 126 (1826).
DRAYTONIA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 206. t. 15 (1854).

LEUCOTHEA, Moç. & Sesse, ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1821) 419.

MARUMIA, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 79 (1823).

OBELANTHERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 148.

OVERSTRATIA, Deschamps, ex R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 171 (1840).

PALAU, Ruiz & Pav. Prod. 100. t. 22 (1794), nomen prius.

REINWARDTIA, Blume, ex Nees, in Syll. Ratisb. i. (1824) 96.

SAURAVIA, Spreng. Anleit. ii. II. 818 (1818).

SCAPHA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1770) ed. I. Art. iv. 3.

TONSHIA, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 225 (1825).

VANALPHIMIA, Lechen. ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1821) 419.

aesculifolia, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 42.—Java.

altissima, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 108.—N. Guin.

Andreana, Oliver, ex F. Muell. Census, Suppl. ii. 3, nomen.—Austral.

angustifolia, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 50 = *lanceolata*.

SAURAUJA:—

- angustifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 242.—Mexic.
 anisopoda, Turcz. l. c.—Mexic.
 armata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 59.—Burma.
 aspera, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 242.—Mexic.
 barbiger, Hook. Ic. Pl. t. 331 = leucocarpa.
 biserrata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 211.—Peruv.
 blumeana, Spreng. l. c. 210 = bracteosa.
 Blumia, Steud. Nom. ed. II. ii. 516.—Java.
 Blumiana, Benn. Pl. Fav. Rar. 174.—Java.
 brachybotrys, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 245.—N. Granat.
 bracteolata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 422.—Java.
 bracteosa, DC. l. c. 423. t. 6.—Java.
 brevirostris, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 106.—N. Guin.
 callithrix, Miq. l. c. 111.—Ins. Celebes.
 campodonta, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 482 = tristyla.
 cauliflora, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 425.—Java.
 ceramica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 111.—Ins. Ceram.
 cerea, Griff. ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 288.—Reg. Himal.
 costata, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 56.—Ins. Celebes.
 crenulata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 424.—Java.
 crenulata, Wight, ex Wall. Cat. n. 1459 = Gordonia obtusa.
 Cumingiana, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 38 = late-bractea.
 cuneata, Blume, Bijdr. 127 = bracteolata.
 cuspidella, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 108.—Sumatra.
 dasyantha, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 49.—Sumatra.
 dicalyx, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 112.—Ins. Ceram.
 distasosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 131.—Java.
 euryolepis, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 48.—Ins. Celebes.
 exasperata, De Vriese, l. c. 56.—Ins. Philipp.
 excavata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 130.—Borneo.
 excelsa, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 407.—N. Granat.
 fasciculata, Wall. Pl. As. Rar. ii. 40.—Reg. Himal.
 ferox, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 132.—Borneo.
 ferruginea, Griff. Itin. Notes, 120 (sp. dub.).—Reg. Himal.
 floccifera, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 267.—N. Granat.
 gigantea, Blume, Bijdr. 129 = bracteosa.
 gigantea, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 424.—Java.
 glabrata, Steud. Nom. ed. II. ii. 516; Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 119.—Peruv.
 grandifolia, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 26.—Java.
 Griffithii, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 286.—Assam.
 Hasskarliana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 484.—Java.
 hirsuta, Blume, Bijdr. 128.—Java.
 horrida, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 162.—Borneo.
 inflexidens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 481 = tristyla.
 Jackiana, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 127 = cauliflora.
 Junghuhnii, Choisy, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 148.—Java.
 Kegeliana, Schlecht. in Bot. Zeit. xi. (1853) 694.—Guatemala.
 Korthalsii, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 26 = leprosa.
 laevigata, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 267.—N. Granat.
 lanceolata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 421. t. 4.—Java.
 latibractea, Choisy, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 148.—Ins. Philipp.
 latipetala, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 4.—Mexic.
 lepidicalyx, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 109.—Ins. Celebes.

VOL. II.

SAURAUJA:—

- leprosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 131.—Java.
 leucocarpa, Schlecht. in Linnaea, x. (1836) 249.—Mexic.
 leucophylla, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 125 = tristyla.
 Lindenii, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 90.—Hab.?
 longifolia, Oliver, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 98.—Ins. Celebes.
 macrophylla, Hort. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 102.—Hab.?
 macrophylla, Linden, in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 27 = villosa?
 macrotricha, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 60.—Burma; China.
 media, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 125 = tristyla.
 micrantha, Blume, Bijdr. 127.—Java.
 micrantha, Griff. Itin. Notes, 71 = Roxburghii?
 microphylla, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 49.—Java.
 mollis, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 210.—Java.
 monadelpha, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 8.—N. Guin.
 montana, Seem. Bot. Voy. Herald, 87. t. 16 = veraguensis.
 Moritziana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 243.—Venezuela.
 muricata, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 46.—Ins. Celebes.
 muricata, Steud. Nom. ed. II. ii. 516.—Java.
 napaulensis, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 421.—Reg. Himal.
 nigrescens, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 128.—Borneo.
 Noronhiana, Blume, Bijdr. 127 = nudiflora.
 novo-guineensis, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 7.—N. Guin.
 nudiflora, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 422. t. 5.—Java.
 Obelanthra, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 245 = villosa.
 oligolepis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 109.—Ins. Celebes.
 oreophila, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 3.—Mexic.
 oxyphylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 480 = tristyla.
 paniculata, Wall. ex G. Don, Gen. Syst. i. 567 = napaulensis.
 parviflora, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 268.—N. Granat.
 pauciserrata, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 3.—Mexic.
 peduncularis, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 267.—N. Granat.
 pedunculata, Hook. Ic. Pl. t. 341-342.—Mexic.
 pendula, Blume, Bijdr. 127.—Java.
 Planchoni, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 161.—Malaya.
 polyantha, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 36 = vulcani.
 polyodon, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 107.—Molucc. vel Celebes?
 polytricha, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 480 = setigera.
 punduana, Wall. Pl. As. Rar. ii. 40.—Reg. Himal.
 pycnotricha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 244.—Venezuela.
 Reinwardtiana, Blume, Bijdr. 128.—Java.
 rosea, Fungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. viii. (1841) 384.—Java.
 Roxburghii, Wall. Pl. As. Rar. ii. 40.—Reg. Himal.; Burma.
 rubicunda, Seem. Fl. Vit. 14.—Ins. Fiji.
 rubiformis, Vathek, in Linnaea, xl. (1876) 221.—Costa Rica.
 rugosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 245.—Ins. Philipp.
 Ruiziana, Steud. Nom. ed. II. ii. 516.—Peruv.
 sakoembangensis, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 134.—Borneo.
 sarapiquensis, Carr. in Rev. Hort. (1877) 60.—Costa Rica.
 scabra, Poepp. ex Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 118.—Peruv.
 scabrida, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 3.—Mexic.
 serrata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 420. t. 3; Prod. i. 526.—Mexic.
 setidens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 481 = vulcani.
 setigera, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 133.—Sumatra.
 singalangensis, Korth. l. c. 134.—Sumatra.
 spadicea, Blume, Bijdr. 128 = lanceolata.

SAURAUJA:—

- spectabilis, Hook. Bot. Mag. t. 3982.—Am. austr.
 squamellicaula, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 112.—Ins. Molucc.
 sterculiifolia, Griff. Itin. Notes, 198 = napaulensis?
 strigillosa, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 266.—N. Granat.
 subcordata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 124.—Borneo.
 tewensis, Korth. l. c. 133.—Borneo.
 Teysmanniana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 481 = tristyla.
 tomentosa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 211.—N. Granat.; Ecuador.
 tristyla, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 423. t. 7.—As. trop. or.
 ursina, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 265.—N. Granat.
 veraguensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 249.—Panama.
 villosa, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 420. t. 2; Prod. i. 525.—Mexic.
 vulcani, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 128.—Sumatra.
 xanthotricha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 243.—Venezuela.

SAUROGLOSSUM, Lindl. Bot. Reg. t. 1618 (1833) = *Spiranthes*, Rich. (Orchid.).*elatum*, Lindl. l. c.—Bras.*monophyllum*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 269 = *Cranichis monophylla*.*tenue*, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. i. (1858) 334.—Cuba.SAUROMATUM, Schott, in Schott & Endl. Melet. i. 17 (1832). *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 966.*abyssinicum*, Schott, Syn. Aroid. 25.—Abyss.*asperum*, C. Koch, in Belg. Hort. xv. (1865) 101 = *Dracontium asperum*.*ferox*, Linden, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 305 = *Anchomanes dubius*.*guttatum*, Schott, in Schott & Endl. Melet. i. 17.—Ind. bor. occ.*Horsfieldii*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 196.—Java.*nubicum*, Schott, Syn. Aroid. 25.—Afr. trop.*pedatum*, Schott, in Schott & Endl. Melet. i. 17 = *guttatum*.*pulchrum*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 221.—Sumatra.*punctatum*, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. i. (1858) 263 = *guttatum*.*sessiliflorum*, Kunth, Enum. Pl. iii. 28 = *guttatum*.*simulense*, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 349 = *guttatum*.*venosum*, Kunth, Enum. Pl. iii. 28; Schott, Prod. Aroid. 71 = *guttatum*.SAUROPUS, Blume, Bijdr. 595 (1825). *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 271.*CERATOGYNUM*, Wight, Ic. v. ii. 26. t. 1900 (1852).*albicans*, Blume, Bijdr. 596.—Ind. or.; Malaya.*assimilis*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 284.—Zeylan.*brevipes*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 73.—Burma.*Ceratogynum*, Baill. Etud. Gén. Euph. 635 = *quadrangularis*.*compressus*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 243.—Reg. Himal.; Burma.*Gardnerianus*, Wight, Ic. vi. 6. t. 1951 = *albicans*.*indicus*, Wight, Ic. t. 1952 = *albicans*.*macranthus*, Hassk. Retzia, i. 166.—Java.*macranthus*, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 187 = *albicans*.*quadrangularis*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 73.—Ind. or.*repandus*, Muell. Arg. in Flora, lv. (1872) 2.—Reg. Himal.*retroversus*, Wight, Ic. vi. 6. t. 1951.—Zeylan.*rhamnoides*, Blume, Bijdr. 596.—Java.*rigidus*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 284.—Zeylan.*rostratus*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 447.—Sumatra.*spectabilis*, Miq. l. c. 446.—Sumatra.*sumatranus*, Miq. l. c.—Sumatra.*trinervius*, Hook. f. & Thoms. ex Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 72.—Reg. Himal.*zeylanicus*, Wight, Ic. t. 1952 = *albicans*.SAURUOPSIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 589 = *Saururus*, Plum. (Piperac.).*chinensis*, Turcz. l. c. 590 = *Saururus Loureiri*.*Cumingii*, C. DC. in DC. Prod. xvi. i. 239 = *Saururus Loureiri*.

SAURURUS, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 108 (1737).
PIPERACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 127.
 MATTUSCHKIA, J. F. Gmel. Syst. ii. 589 (1791).
 SAURUROPSIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi.
 (1848) i. 589.
 SPATHIUM, Lour. Fl. Cochinch. 217 (1790).
 cernuus, Linn. Sp. Pl. 341.—Am. bor.
 cernuus, Thunb. Fl. Jap. 154 = Loureiri.
 chinensis, Hort. ex Loud. Hort. Brit. 144, nomen; et
 Encyc. Pl. 298.—China.
 Loureiri, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845)
 102.—China; Japon.
 lucidus, Donn. Hort. Cantab. ed. III. 66 = cernuus.
 natans, Linn. Mant. ii. 227 = Aponogeton mono-
 stachyum.
 sinensis, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 77 = chi-
 nensis.
SAUSSUREA, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 156,
 198. tt. 10, 13. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f.
 ii. 471.
 APLOTAXIS, DC. in Guill. Archiv. Bot. ii. (1833)
 330.
 AUCLANDIA, Falc. in Trans. Linn. Soc. xix. (1842)
 23.
 BENNETTIA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 440
 (1821).
 CYATHIDIUM, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal.
 251. t. 56 (1835).
 ERIOCORYNE, Wall. ex DC. Prod. vi. 514 (1837).
 ERIOSTEMON, Less. Syn. Comp. 12 (1832).
 FROLOVIA, Ledeb. ex DC. Prod. vi. 538 (1837).
 HEMISTEPTA, Bunge, in Dorp. Jahrb. Litt. i. (1833)
 221.
 HETEROTRICHUM, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 551
 (1819).
 LAGUROSTEMON, Cass. in Dict. Sc. Nat. liii. 466
 (1828).
 POECILOTRICHE, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 528
 (1867).
 THEODOREA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. (1827)
 500, 513; liii. 463 (1828).
 acanthocarpa, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.
 378 = Jurinea ceratocarpa.
 acaulis, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 91 =
 Thomsoni.
 acuminata, Turcz. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort.
 Petrop. i. 37 = alpina.
 affinis, Spreng. ex DC. Prod. vi. 540.—As. trop.
 alaschanica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii.
 (1881) 492.—As. centr.
 alata, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 202 =
 japonica.
 Alberti, Regel & Winkler, in Act. Hort. Petrop. vi.
 (1879) 298.—Turkestan.
 albescens, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp.
 Ind. 233.—Reg. Himal.
 alpina, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 198.—
 Reg. bor. et arct.
 amara, DC. l. c. 200.—Sibir.
 amara, Less. in Linnaea, ix. (1834) 169 = glomerata.
 americana, Eaton, in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 283.
 —Am. bor. occ.
 amoena, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841)
 447 (amaena) = salicifolia.
 amurensis, Turcz. ex DC. Prod. vi. 534 = eriolepis.
 Andersoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 226.—Reg.
 Himal.
 andryaloides, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, l. c.
 227.—Reg. Himal.
 angustifolia, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 200 =
 alpina.
 Apus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881)
 490.—As. centr.
 arenaria, Maxim. l. c.—China.
 asperifolia, Sch. Bip. ex Herd. in Bull. Soc. Nat.
 Mosc. xli. (1868) ii. 12 = elongata.
 Atkinsoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 226.—Reg.
 Himal.
 atriplicifolia, Bieb. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) 1.
 Beibl. 15 = serrata.
 blanda, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842)
 354.—Sibir. altaic.
 borealis, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli.
 (1868) ii. 38 = alpina.
 bracteata, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 94. t. 102.—
 Reg. Himal.
 brahuica, Boiss. Fl. Orient. iii. 566 = candicans.

SAUSSUREA :—

Bungei, Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. Enum.
 Pl. Jap. i. 255 = affinis.
 caespitosa, Wall. Cat. n. 2913 = taraxacifolia.
 cana, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 18. t. 75.—Sibir. altaic.
 candicans, C. B. Clarke, Comp. Ind. 232.—Reg.
 Himal.
 Candolleana, C. B. Clarke, l. c. 230 = Clarkei.
 Candolleana, Wall. Cat. n. 3289.—Reg. Himal.;
 Soongar.
 carthamoides, Buch.-Ham. ex DC. Prod. vi. 540 =
 affinis.
 centauroides, Tausch, in Flora, xi. (1828) ii. 484.—
 Sibir. or.
 ceratocarpa, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 93. t. 101 =
 Jurinea ceratocarpa.
 chenopodifolia, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878)
 92 = albescens.
 chinensis, Sch. Bip. in Flora, xxxv. (1852) 48 =
 japonica.
 Clarkei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 372.—Reg.
 Himal.
 compacta, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli.
 (1868) ii. 23 = alpina.
 congesta, Turcz. ex DC. Prod. vi. 535.—Dahuria.
 conica, C. B. Clarke, Comp. Ind. 224 = uniflora.
 controversa, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199 =
 discolor.
 coronata, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.
 iii. (1845) 107.—Soongaria.
 crassifolia, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 201.—
 Sibir.
 crepidifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847)
 ii. 47.—As. bor.
 daurica, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii.
 (1834) 251.—Dahuria.
 Davidi, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 180.—
 China.
 deltoidea, C. B. Clarke, Comp. Ind. 235.—Reg.
 Himal.
 denticulata, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 18. t. 74.—
 Sibir.
 denticulata, Wall. Cat. n. 2917.—Reg. Himal.
 depressa, Gren. in Mém. Acad. Besang. (1849); ex
 Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 272 = alpina.
 depressa, Heuff. ex Nym. Consp. 415 = discolor.
 discolor, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199.—
 Europ.; As. bor.
 dissecta, Ledeb. Fl. Alt. iv. 19, in nota = japonica.
 duensis, F. Schmidt, Reisen Amurl. 152.—Ins.
 Sachalin.
 elata, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 20. t. 80.—Sibir. altaic.
 elegans, Ledeb. l. c. 19. t. 77.—Sibir. altaic.
 elliptica, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.
 372.—Reg. Himal.
 elongata, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 201.—
 Sibir.
 epilobioides, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii.
 (1881) 495.—China.
 eriolepis, Bunge, ex DC. Prod. vi. 535.—China;
 Manchuria.
 eriostemon, Wall. Cat. n. 2912.—Reg. Himal.
 esthonica, Baer, in Rupr. Stirp. Fl. Petrop. 21 (cf.
 Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. vii. (1885)
 5).—Ross.
 Falconeri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 369.—Reg.
 Himal.
 filifolia, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vi.
 (1879) 312.—As. centr.
 flavescens, Spreng. Syst. iii. 380 = Serratula flavescens.
 foliosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 373.—Reg. Himal.
 foliosa, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 17. t. 69.—Sibir. altaic.
 Frolovii, Ledeb. l. c. iv. 16. t. 352.—Sibir. altaic.
 fruticulosa, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.
 (1841) 448 = cana.
 Gebleriana, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.
 Sc. Nat. vii. (1855) 6.—Sibir. altaic.
 glacialis, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1867) ii.
 144.—Turkestan.
 glanduligera, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.
 371.—Reg. Himal.
 glauca, Ledeb. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) 1. Beibl.
 15 = Laxmanni.
 glomerata, Poir. Encycl. Suppl. v. 71.—Sibir.
 Gmelini, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 392 =
 Serratula Gmelini.
 Gmelini, Hort. Dorp. ex Herd. in Bull. Soc. Nat.
 Mosc. xli. (1868) ii. 48 = amara.

SAUSSUREA :—

gossipiphora, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1821)
 414.—Reg. Himal.
 gossypifera, Spreng. Syst. iii. 381 = praec.
 gossypina, Wall. Pl. As. Rar. ii. 32. t. 138 = praec.
 gossypiphora, Wall. Cat. n. 2910 B = sacra.
 gracilis, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874)
 518.—Japon.
 graminifolia, Wall. Cat. n. 2911.—Reg. Himal.
 grandifolia, Maxim. Prim. Fl. Amur. 169.—Reg.
 Amur.
 Griffithii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 47.—Afghan.
 hieracioides, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 371.—Reg.
 Himal.
 Hookeri, C. B. Clarke, Comp. Ind. 230.—Reg. Himal.
 hypoleuca, Spreng. ex DC. Prod. vi. 541.—Reg.
 Himal.
 integerrima, Spreng. l. c. 536 = graminifolia.
 intermedia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832)
 193 = japonica.
 iodostegia, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 109.—
 China.
 Jacea, C. B. Clarke, Comp. Ind. 233.—Reg. Himal.
 japonica, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 203.—
 Japon.
 Karelinii, Stschégel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi.
 (1848) ii. 244.—As. centr.
 kaschgarica, Rupr. Sert. Tiansch. 54.—Turkestan.
 Katschaete, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii.
 (1881) 491.—China.
 Kunthiana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 225.—Reg.
 Himal.
 laciniata, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 16. t. 64.—Sibir.
 altaic.
 laevigata, Tausch, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 517 =
 glomerata.
 Lappa, C. B. Clarke, Comp. Ind. 233.—Reg. Himal.
 latifolia, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 17. t. 70.—Sibir.
 altaic.
 Laxmanni, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) 1.
 Beibl. 15.—Sibir. baical.
 Ledebouri, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868)
 ii. 41 = alpina.
 leucantha, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. 2 = alpina.
 leucophylla, Schrenk, in Bull. Soc. Acad. Pétersb. x.
 (1842) 354 = pygmaea.
 liatroides, Fisch. ex DC. Prod. vi. 532 = pycnoce-
 phala.
 linearis, Champ. & Benth. in Hook. Kew Journ. iv.
 (1852) 235 = japonica.
 lyrata, Fisch. ex Loud. Hort. Brit. 329, nomen.—
 Sibir.
 lyrata, Franch. in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv.
 (1884) 229 = affinis.
 macrocephala, Less. in Linnaea, vi. (1831) 87 = glome-
 rata.
 macrophylla, Bunge, ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc.
 xli. (1868) ii. 17 = latifolia.
 macrophylla, Sauter, in Flora, xxiii. (1840) 413 =
 alpina.
 malitiosa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii.
 (1881) 493.—China.
 marginata, Borszcz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.
 viii. (1883) 482, nomen.—As. centr.
 Maximowiczii, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli.
 (1869) ii. 14.—Japon.
 Medusa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881)
 488.—China; Mongolia.
 mollis, Spreng. Syst. iii. 381 = Jurinea humilis.
 monoecephala, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 444 = pyg-
 maea.
 monticola, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App.
 ed. II. 29 = alpina.
 mucronata, Spreng. ex DC. Prod. v. 376 = Pluchea lan-
 ceolata.
 multiflora, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199 =
 salicifolia.
 multiflora, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App.
 747 = alpina.
 nepalensis, Spreng. Syst. iii. 380 = eriostemon.
 nigrescens, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii.
 (1881) 491.—China.
 nikoensis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 407.—
 Japon.
 nipponica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 183.—
 Japon.
 nivea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii.
 153 = eriolepis.

SAUSSUREA:—

- nuda*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 61 = alpina.
obvallata, Wall. Cat. sub n. 2906.—Reg. Himal.
odontolepis, Sch. Bip. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 13.—China; Manchuria.
ovata, Benth. in Henders. & Hume, Lahore to Yarkand, 325.—Turkestan.
paleata, Maxim. Prim. Fl. Amur. 168.—Reg. Amur.
papposa, Turcz. ex DC. Prod. vi. 534 = crassifolia.
parviflora, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 200 = serrata.
pectinata, Bunge, ex DC. Prod. vi. 538.—China.
peguensis, C. B. Clarke, Comp. Ind. 235.—Burma.
phaeantha, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 489.—China.
piptathera, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 76, in obs.—Reg. Himal.
Poljakowi, Glehn, in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 60.—Sibir.
polyphylla, Schrenk, ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 5 = pygmaea.
polypodifolia, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 201 = elongata.
polypodifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 46 = runcinata.
polystichoides, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 369.—Reg. Himal.
Przewalskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 494.—China.
pteroaulon, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 95. t. 103 = Candolleana.
pujolica, Costa, Suplem. Fl. Catalon. 47.—Hispan.
pulchella, Fisch. ex DC. Prod. vi. 537 = japonica.
pulvinata, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 493.—China.
Pumilio, Fisch. ex DC. Prod. vi. 535 = alpina.
pynoccephala, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 59.—Sibir. altaic.
pygmaea, Spreng. Syst. iii. 381.—Europ.; Sibir.
religiosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 26, 251 = Jurinea macrocephala, Benth.
Riederi, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 35.—Kamtchat.
rigida, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 19. t. 79.—Sibir. altaic.
robusta, Ledeb. l. c. i. 16. t. 65.—Sibir. altaic.
Roylei, C. B. Clarke, Comp. Ind. 229.—Reg. Himal.
runcinata, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 202.—Sibir.
sachalinensis, F. Schmidt, Reisen Amur. 152.—Reg. Amur.
sacra, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 76.—Reg. Himal.
salicifolia, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 200.—Sibir.
salsa, Spreng. Syst. iii. 381.—Reg. Cauc.; As. bor.
scabiosaefolia, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 666 = elongata.
scabra, Less. in Linnaea, ix. (1834) 180 = glomerata.
scaposa, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 480.—Japon.
Schanginiana, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 5 = pygmaea.
Schlagintweitii, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 94 = bracteata?
Schultzii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 366.—Reg. Himal.
Semenovii, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) ii. 142.—Turkestan.
serrata, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199.—Sibir. altaic.
serratuloides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 35.—Sibir. altaic.
setifolia, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 95 = subulata.
sordida, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 389.—Sibir. altaic.
sorocephala, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 226.—Reg. Himal.
sorocephala, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 38.—Sibir. altaic.
squarrosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 44.—Dahuria.
Stella, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 490.—China.
stemmaphora, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 93 = Jurinea ceratocarpa.
Stoliczkae, C. B. Clarke, Comp. Ind. 225.—Reg. Himal.

SAUSSUREA:—

- stricta, Spreng. ex DC. Prod. vi. 540 = affinis.
Stubendorffii, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 26.—Sibir.
subsiniuata, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 62 = alpina.
subulata, C. B. Clarke, Comp. Ind. 226, partim.—Reg. Himal.
subulata, C. B. Clarke, l. c., partim = werneroides.
Sugho, C. B. Clarke, l. c. 225.—Reg. Himal.
sylvatica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 495.—China.
Tanakae, Franch. & Sav. ex Maxim. l. c. xix. (1874) 516.—Japon.
tangutica, Maxim. l. c. xxvii. (1881) 489.—China.
taraxacifolia, Wall. Cat. n. 2914.—Reg. Himal.
tenuis, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 19. t. 78.—Sibir. altaic.
Thomsoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 227.—Reg. Himal.
Tlesii, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 60 = alpina.
triangulata, Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 58).—Sibir. or.
tridactyla, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 377.—Reg. Himal.
triptera, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 515.—Japon.
uniflora, C. B. Clarke, Comp. Ind. 229 = Roylei.
uniflora, Wall. Cat. n. 2916.—Reg. Himal.
ussuriensis, Maxim. Prim. Fl. Amur. 167.—Manchuria.
werneroides, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 367.—Reg. Himal.
Yakla, C. B. Clarke, Comp. Ind. 227.—Reg. Himal.

SAUSSUREA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 11 = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).
caerulea, Salisb. l. c. = F. ovata.
cordifolia, Salisb. l. c. = Liliun cordifolium.

SAUSSURIA, Moench, Meth. 388 (1794) = **Nepeta**, Linn. (Labiata.).
pinnatifida, Moench, l. c. = N. lavandulacea.

SAUSSURIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 175 = **Saussurea**, DC. (Compos.).

SAUTIERA, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 383. **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1088.
SANTIERA, Span. in Linnaea, xv. (1841) 328, sphalm. *Decaisnii*, Nees, in DC. Prod. xi. 98 = tinctorum.
tinctorum, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 383.—Timor.

SAUVAGEA, Linn. Gen. ed. II. 241 (1742) = seq.

SAUVAGESIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 203 (1753). **VIOLARIEAE**, Benth. & Hook. f. i. 120.
IRON, P. Br. Hist. Jamaica. 179. t. 12. f. 3 (1756).
SAUVAGEA, Linn. Gen. ed. II. 241 (1742).
Adima, Aubl. Pl. Gui. i. 251 = erecta.
deflexifolia, Gardn. in Hook. Ic. Pl. t. 484.—Bras.
deflexifolia, Miq. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 409 = erecta.
elata, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 107.—Ind. occ.; Guian.
elegantissima, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. ix. (1822) 325 = Lavradia elegantissima.
erecta, Aubl. Pl. Gui. i. 254; Spreng. Neue Entdeck. i. 296 = Sprengelii.
erecta, Linn. Sp. Pl. 203.—Am. et Afr. trop.
ericoides, Ging. in DC. Prod. i. 316 = Lavradia alpestris.
fruticosa, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 38.—Bras.
geminiflora, [Moç. & Sesse,] ex Ging. in DC. Prod. i. 315 = erecta.
gracilis, Steud. Nom. ed. II. ii. 517, in syn. = erecta.
Kappleri, Miq. Stirp. Surin. Sel. 105 = Sprengelii.
laxa, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 38 = erecta.
linearifolia, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 106 = pusilla.
longifolia, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 407.—Bras.
nutans, Pers. Syn. i. 253 = erecta.
ovata, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 36 = racemosa.
pendula, Mart. ex Ging. in DC. Prod. i. 316 = Lavradia alpestris.
peruviana, Roem. & Schult. Syst. v. 457 = erecta.

SAUVAGESIA:—

- pulchella, Planch. in Seem. Bot. Voy. Herald, 80.—Am. trop.
pusilla, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 35.—Bras.
racemosa, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 98.—Bras.
ramosissima, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 409.—Bras.
rubiginosa, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 101.—Bras.
salicifolia, Ging. in DC. Prod. i. 316.—Bras.
Salzmännii, Benth. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 412 = tenella.
serpyllifolia, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 37. t. 25 = Sprengelii.
Sprengelii, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 99.—Am. trop.
tenella, Lam. Illustr. ii. 119.—Am. trop.

SAUVAGIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 175 = praec.

SAUVALLEE, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 156 (1873). **COMMELINACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 855.
Blainii, Wright, l. c. 157.—Cuba.

SAVA, Adans. Fam. ii. p. (21) (1763) = **Onosma**, Linn. (Borag.).

SAVASTANA, Schrank, Baier. Fl. i. 100, 337 (1789) = **Hierochloë**, S. G. Gmel. (Gramin.).
hirta, Schrank, l. c. 337 = H. berealis.

SAVASTANIA, Scop. Introd. 213 (1777) = **Tibouchina**, Aubl. (Melastom.).

SAVASTONIA, Neck. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 518, err. typ. (1841) = praec.

SAVIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = **Amphicarpaea**, Ell. (Legumin.).
volubilis, Rafin. l. c. = A. monoica.

SAVIA, Willd. Sp. Pl. iv. 771 (1805). **EUPHORBIAEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 270.
CHARIDIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 572 (1858).
GONATOGYNE, Klotzsch, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 13 (1873).
PETALODISCUS, Baill. Etud. Gén. Euph. 571. t. 22 (1858).
Actephila, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 243 = Actephila excelsa.
Bojeriana, Baill. Adansonia, viii. (1868) 345.—Madag.
clusiifolia, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 164.—Cuba.
dictyocarpa, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 704.—Bras.
elegans, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 78.—Ins. Mascar.
erythroxyloides, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 157.—Cuba.
Laureola, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 33.—Madag.
laurifolia, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 163.—Cuba.
mimosoides, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 34.—Madag.
oblongifolia, Baill. l. c. 35.—Madag.
platyrachis, Baill. l. c. 33.—Madag.
pulchella, Baill. l. c. 35.—Madag.
sessiliflora, Willd. Sp. Pl. iv. 771.—Ins. S. Doming.
zeylanica, Baill. Etud. Gén. Euph. 571, nomen = Actephila excelsa.

SAVIGNYA, DC. Syst. ii. 283 (1821). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 85.
aegyptiaca, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 395 = longistyla.
aegyptiaca, DC. Syst. ii. 283.—Aegypt.
longistyla, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 27.—Algeria.
parviflora, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 14 = aegyptiaca.
SAVINIONA, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 30 (1836) = **Lavatera**, Linn. (Malvac.).
acerifolia, Webb & Berth. l. c. 31 = L. acerifolia.
brachyfolia, Walp. Rep. i. 291, sphalm. = seq.
brachyloba, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 32 = L. brachyfolia.

SAVIONA, Pritz. Ic. Ind. i. 989 (1855) = praec.

SAXEGOTHAEA, Lindl. in Journ. Hort. Soc. vi. (1851) 258. *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 434.

SAXEGOTHEA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 434 (1880), err. typ.

SQUAMATAXUS, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 168 (1866). conspicua, Lindl. in Journ. Hort. Soc. vi. (1851) 258; et in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 111.—Chili.

gracilis, Hort. ex Gord. Pinet. 280 = Podocarpus nubigena.

SAXEGOTHEA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 434 (1880) err. typ. = praec.

SAXIFRAGA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 131 (1737). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 635.

ADENOGYNE, APHOMONIX, EVAIEZOA, HEMIEVA, HETERISIA, HEXAPHOMA, PIAROPHYLA, PONISTA, STEIRANISIA, TELESONIX, TULORIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 65-70 (1836).

ANTIPHYLLA, AULAXIS, CHRONDOSEA, CILIARIA, DERMASEA, HIRCULUS, LEPTASEA, LOBARIA, MEGASEA, MUSCARIA, SPATULARIA, Haw. Saxifr. Enum. 6-47 (1821).

BERGENIA, Moench, Meth. 664 (1794).

DIPTERA, Borck. in Roem. N. Mag. i. (1794) 29.

GERYONIA, Schrank, ex Hoppe, in Flora, i. (1818) 229.

HYDATICA, Neck. Elem. ii. 387 (1790).

KINGSTONIA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 531 (1821).

LEPTARRHENA, Reichb. Handb. 230 (1837).

LIGULARIA, Duval, Pl. Succ. 11 (1809).

MICRANTHES, Haw. Syn. Pl. Succ. 320 (1812).

MISCOPETALUM, Haw. l. c. 323 (1812).

ROBERTSONIA, Haw. Syn. Pl. Succ. 321 (1812).

RUPIFRAGA, Linn. ex Rafin. Fl. Tellur. ii. 67 (1836).

SAXIFRAGIA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735).

SEKIKI, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 209; Phil. Bot. ii. 49 (1791).

abyssinica, Rich. ex Engl. Monog. Saxifr. 76 = hederacea-folia.

acaulis, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 68; Fl. Helvet. iii. 127 = muscoides.

aciculata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226 = flagellaris? aconitifolia, Field. & Gardn. Sert. Pl. t. 57 = Boykinia aconitifolia.

adenodes, Poepp. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 75. t. 26.—Am. austr.

adenophora, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 40.—Macedon.; Cappadoc.

adoxidea, Griff. Notul. iv. 428; Ic. Pl. Asiat. t. 570 = Chrysosplenium lanuginosum.

adscendens, Haw. Misc. Nat. 162 = altifida.

adscendens, Jacq. Coll. i. 197. t. 11 = controversa.

adscendens, Linn. Sp. Pl. 405.—Reg. bor. et arct.

adscendens, Vahl, in Skrivt. Nat. Selsk. Kjoeb. ii. i. (1792) 12 = aquatica.

aestivalis, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 37 = punctata.

affinis, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 418 = hypnoides.

afghanica, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 56.—Afghan.

aggregata, Lej. Rev. Fl. Spa, 81 = hypnoides.

aizoidea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.

aizoides, Linn. Sp. Pl. 403.—Reg. bor. et arct.

aizoidoides, Midgev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 22.—Mont. Pyren.

Aizoon, Guss. ex DC. Prod. iv. 20 = lingulata.

Aizoon, Jacq. Fl. Austr. v. 18. t. 438.—Reg. bor. et arct.

Aizoon, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = marginata.

aizoonia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = S. Aizoon.

ajugaefolia, Wahlenb. Fl. Carpat. 122 = perdurans.

ajugifolia, Linn. Cent. Pl. 11; Amoen. Acad. iv. 271.—Europ. austr.

Alberti, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 584.—Turkestan.

alchemilloides, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 142.—Reg. Argent.

Allioni, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 378 = pedemontana.

SAXIFRAGA :—

Allioni, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 68 = muscoides.

almeriensis, Willk. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 525 = Camposii.

alpina, Pav. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 421 = peruviana.

alpina, Salisb. Prod. 306 = aizoides.

altaica, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = melaleuca.

altifida, Haw. Saxifr. Enum. 24.—Hab.?

altissima, Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xv. (1870) 273.—Europ.

ambigua x, DC. Fl. Fr. vi. 517.—Europ.

amplexifolia, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 2. t. 2 = Leptarrhena amplexifolia.

amullacea, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. iv. 21; ex ej. Fl. Nap. 59, 60 = muscoides.

andicola, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 427.—Ecuador.

andicola, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 48 = cordillerarum.

Andrewsii x, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 570.

androsacea, Comolli, Prod. Fl. Comens. 78 = sedoides.

androsacea, Linn. Sp. Pl. 399.—Europ.

androsacea, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 310 = caespitosa?

androsacea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 276 = exarata.

angulosa, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 29 = rotundifolia.

angustifida, Hort. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 526 = hypnoides.

angustifolia, Hall. f. ex Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 67 = Seguerii.

angustifolia, Haw. Misc. 166; Hort. ex DC. Prod. iv. 31; Schleich, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 70 = hypnoides.

annua, Lapeyr. Fl. Pyren. 59 = tridactylites.

aphylla, Sternb. Rev. Saxifr. 40. t. 11.—Europ.

aphylla, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. iv. 21 = sedoides.

apennina, Bertol. f. in Bull. Sc. Med. Ser. II. ix. 65; ex Bertol. Fl. Ital. iv. 479 = cuneifolia.

aquatica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 317 = irrigua.

aquatica, Lapeyr. Fl. Pyren. t. 28.—Mont. Pyren.

arachnoidea, Sternb. Rev. Saxifr. 23. t. 15.—Helvet.

arachnoidea, Zanted. in Comm. Ateneo Brescia, 1815 (1818), 90 = praec.?

arctica, Willd. ex Sternb. Saxifr. Suppl. ii. 66 = muscoides.

arenarioides, Brign. Fasc. Pl. Foroju. 24 = tenella.

aretioides x, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. II. i. 11. 60.—Europ.

aretioides, Lapeyr. Fl. Pyren. 28. t. 13.—Mont. Pyren.

arguta, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 356 = punctata.

aristulata, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68.—Reg. Himal.

arundana, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 693. t. 64 B = dichotoma.

asarifolia, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. t. 24 = odontophylla.

ascendens, Auct. = adscendens.

aspera, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 314 = flagellaris.

aspera, Linn. Sp. Pl. 402.—Europ. austr.

atlantica, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 48.—Hispan.

atrata, Engl. in Bull. Acad. Petersb. xxix. (1883) 117.—China.

atropurpurea, Wulf. ex Sternb. Rev. Saxifr. 41. t. 11. b. f. 2 = muscoides.

atrurubens, Bertol. in Desv. Journ. Bot. ii. II. (1813) 76; et Amoen. Ital. 99 = aizoides.

atrurubens, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 10 = muscoides.

aurea, Jacquem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 397 = flagellaris.

aurea, Steud. Nom. ed. I. 735 = Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium.

australis, Moric. Fl. Venet. i. 431 = lingulata.

autumnalis, Jacq. Obs. i. 31 = S. Aizoon.

autumnalis, Pall. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 19 = serpyllifolia.

autumnalis, Linn. Sp. Pl. 402 = aizoides.

axillaris, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 268 = ajugifolia.

axillaris, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 477 = perdurans.

Baumgarteni, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 126 = retusa.

SAXIFRAGA :—

Baumgarteni, Schur, Enum. Pl. Transs. 239 = adscendens.

Bellardi, All. Fl. Pedem. ii. 72 = controversa.

Besleri, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 52 = Hostii.

bicolor, Sternb. l. c. 49 = serpyllifolia.

bicuspidata, Hook. f. Fl. Antarct. 281. t. 97.—Reg. Magell.

bifida, Hook. ex Engl. Monog. Saxifr. 202 = bicuspidata.

biflora, All. Fl. Pedem. ii. 71. t. 21. f. 1.—Europ. austr.

biflora, Ledeb. Fl. Ross. ii. 205 = oppositifolia.

bimaculata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiii. (1840) 71 = Sieversiana.

bitemata, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 231. t. 64.—Hispan.

Blanca, Willk. Fl. Hisp. Balear. 8.—Hispan.

bohemica, Panz. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 274 = hypnoides.

Boissieri, Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 528.—Hispan.

Bongardi, Presl, ex Engl. l. c. = leucanthemifolia.

Bonplandii, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 430 = peruviana.

Boryi, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 65.—Graecia.

Bourgacana, Boiss. & Reut. l. c. 71.—Hispan.

Boussingaultii, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835) 49. t. 1. f. 1.—Ecuador.

brachypoda, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 378.—Reg. Himal.

bracteata, D. Don, l. c. 367.—Sibir.

bronchialis, Linn. Sp. Pl. 400.—Reg. bor. et arct.

Brunoniana, Wall. Cat. n. 444.—Reg. Himal.

Brunonis, Ser. in DC. Prod. iv. 45 = praec.

bryoides, Linn. Sp. Pl. 400 = aspera.

bryoides, Pall. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 382 = nitida.

bryophora, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 533.—Calif.

bulbifera, Linn. Sp. Pl. 403.—Europ. austr.

bulbifera, Oed. Fl. Dan. t. 390 = cernua.

bulbosa, Hochst. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 529 = granulata.

Burseriana, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 226 = aretioides.

Burseriana, Linn. Sp. Pl. 400.—Europ. austr.

caerulea, Pers. Syn. i. 488 = oppositifolia.

caesia, Linn. Sp. Pl. 399.—Europ. austr.

caesia, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 294 = squarrosa.

caespitosa, Asso. Syn. Stirp. Arag. 52 = pentadactylis.

caespitosa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 383 = Spiraea pectinata.

caespitosa, Lag. & Rodr. in Anal. Cienc. Nat. v. (1802) 278; D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 428 = mixta.

caespitosa, Linn. Sp. Pl. 404.—Reg. bor. et arct.

caespitosa, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 293 = muscoides.

caespitosa, Sm. Engl. Fl. ii. 273 = hypnoides.

caespitosa, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 673 = exarata.

californica, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 585 = Tellima Cymbalaria.

callosa, Sm. in Rees, Cycl. xxxi. [n. 2] = longifolia.

calyciflora, Lapeyr. Fl. Pyren. 28. t. 12 = media.

calycina, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 10 = davarica.

Camposii, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 47.—Hispan.

canaliculata, Boiss. & Reut. ex Engl. Monog. Saxifr. 169.—Europ.

Candollei, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 242 = geranioides.

Candollei, Salzm. ex Pouz. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 561 = pedemontana.

canescens, Haw. Syn. Pl. Succ. 325.—Hab.?

cantabrica, Boiss. & Reut. ex Engl. Monog. Saxifr. 191 = hypnoides.

capillipes, Reichb. ex Engl. l. c. 229 = cuneifolia.

capitata, Lapeyr. Fl. Pyren. 55. t. 30 = aquatica.

Careyana, A. Gray, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 116.—Am. bor.

carinthiaca, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 24 = S. Aizoon.

carnosa, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 137 = granulata.

caroliniana, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iii. (1848) 39.—Am. bor.

caroliniana, Hort. ex Ser. in DC. Prod. iv. 39 = pensylvanica.

SAXIFRAGA:—

- caroliniana*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 41 = *erosa*.
carpathica, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 552.—Transsylv.
carpetana, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. 12 = *atlantica*.
cartilaginea, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 5. t. 3.—Reg. Caucas.; Persia.
castellana, Boiss. & Reut. ex Nym. Consp. 273 = *granulata*.
catalaunica, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 64 = *lingulata*.
ceratophylla, [Dryand in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 70 = *trifurcata*.
ceratophylla, Willd. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 530 = *pentadactylis*.
cernua, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 409, partim = *debilis*.
cernua, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 232 = *granulata*.
cernua, Linn. Sp. Pl. 403.—Reg. bor. et arct.
cervicornis, Viv. Fl. Cors. Prod. App. 2 = *pedemontana*.
cespitosa, Scop. Ann. II. Hist. Nat. (1769) 51 = *caespitosa*, Scop., etc.
Chamissoi, Sternb. Rev. Saxifr. Snppl. i. 12. t. 10. f. 1 = *tricuspidata*.
Chamissonis, Sternb. ex Ser. in DC. Prod. iv. 35 = *rivularis*.
cherlerioides, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 382 = *bronchialis*.
cherlerioides, Presl, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 208 = *nitida*.
chilensis, Poepp. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 530 = *adenodes*.
chinensis, Lour. Fl. Cochinch. 281 = *sarmentosa*.
chlorantha, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 269 = S. Aizoon.
chlorantha, Schur, Enum. Pl. Transs. 233 = *luteoviridis*.
chrysantha, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 83.—Am. bor. occ.
chrysosplenifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 20.—Graecia; Creta.
ciliaris, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 55 = *mixta*.
ciliata, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 65.—Reg. Himal.
ciliata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226. t. 49. f. 2 = *ligulata*.
ciliata, Walp. Rep. ii. 365; v. 827 = *imbricata*.
ciliolata, Schur, Enum. Pl. Transs. 231 = S. Aizoon.
circinnata, Hort. Monac. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 552 = *controversa*.
citrina, Hegetschw. Fl. Schw. 398.—Helvet.
Clusii, Auct. Germ. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 132 = *stellaris*.
Clusii, Gouan, Illustr. 28.—Mont. Pyren.
Clusii, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 43 = *leucanthemifolia*.
cochleariaefolia ×, Schrad. ex Kunze, l. c. xvi. (1842) 318.—Europ.
cochlearis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 559 = *lingulata*.
coerulea, Auct. = *caerulea*.
columnaris, Steud. Nom. ed. I. 735 = *pedemontana*.
comosa, Fellm. in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 500 = *stellaris*.
compacta, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 239.—Sibir. or.
compacta, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 9. t. 1. f. 3 = *valdensis*.
condensata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1537, partim = *sileniflora*.
condensata, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 226. t. 3 = *hypnoides*.
confusa, Lej. Rev. Fl. Spa, 80 = *hypnoides*.
congesta, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 63 = *hypnoides*.
congesta, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 207 = *bronchialis*.
confifera, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 332.—Hispan.
controversa, Hort. Lond. ex Haw. Saxifr. Ennm. 32 = *hypnoides*.
controversa, Sternb. Rev. Saxifr. 43. t. 16.—Europ. austr.; Am. bor.
corbariensis, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. VII. vii. (1875) 469 = *geranioides*.
cordifolia, Haw. Misc. Nat. 157 = *crassifolia*.
cordigera, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68.—Reg. Himal.
cordillerarum, Presl, Rel. Haenk. ii. 55.—Peruv.
coriacea, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 240.—Sibir. arct.

SAXIFRAGA:—

- coriacea*, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 48 = *Leptarrhena pyrolaeifolia*.
coriophylla, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 333 = *Rocheana*.
corouensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 239 = *adscendens*.
corsica, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 642 = *granulata*.
cortusaefolia, Sieb. & Zucc. in Akad. Muench. iv. 11. (1843) 190.—Japon.
corymbosa, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 17.—Caria.
corymbosa, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 70.—Reg. Himal.
corymbosa, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 137 = *granulata*.
Cossoniana, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 70 = *granulata*.
Cotyledon, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 313 = *cartilaginea*.
Cotyledon, Linn. Sp. Pl. 398.—Europ.
Cotyledon, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = *marginata*.
Cotyledon, Wulf. ex Jacq. Coll. iv. 291 = S. Aizoon.
crassifolia, Linn. Sp. Pl. 401.—Sibir.
crateriformis, Hort. Oxon. ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = *hypnoides*.
crenata, Steud. Nom. ed. I. 735; Sweet, Hort. Brit. ed. I. 181 = *umbrosa*.
crocea, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 69 = *muscoideis*.
crustacea, Hoppe, Taschenb. (1805) 237 = seq.
crustata, Vest, in Bot. Zeit. Regensb. iii. (1804) 95; iv. (1805) 42; Man. Bot. 656.—Europ. austr.
cultrata, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 23 = S. Aizoon.
cuneata, Willd. Sp. Pl. ii. 658.—Hispan.
cuneifolia, Cav. Ic. iii. 25 = *cuneata*.
cuneifolia, Linn. Syst. ed. X. 1026.—Europ. austr.
curvata, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = *hypnoides*.
cuscutaeformis, Lodd. Bot. Cab. t. 186.—Japon.?
cuspidata, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 63 = *pedatifida*.
Cymbalaria, Linn. Sp. Pl. 405.—As. Min.; Persia.
Cymbalaria, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 72. t. 378 = *Sibthorpii*.
Cymbalaria, Sternb. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *rivularis*.
Cymbalaria, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 261 = *sibirica*.
cymbalariaefolia, Ehrenb. ex Engl. Monog. Saxifr. 77 = *hederacea*.
cymosa, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 91. t. 88 = *pedemontana*.
dahurica, Lyall, ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 542 = *Lyallii*.
dahurica, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 42 = *cuneifolia*.
davurica, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 569, partim = *Lyallii*.
davurica, Willd. Sp. Pl. ii. 645.—As. bor.; Am. bor. occ.
Debeauxii, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 152 = *dichotoma*.
debilis, Engelm. ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864) 62.—Am. bor. occ.
decipiens, Ehrh. Beitr. v. 47, 175 = *hypnoides*.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 6.—China.
demissa, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 8 = *mutata*.
densa, Haw. Misc. Nat. 166 = *hypnoides*.
densa, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 26 = *nitida*.
densifolia, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = *hypnoides*.
denticulata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 413 = *umbrosa*.
denticulata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 270 = *aretioides*.
denudata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 421 = *hypnoides*.
denudata, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. Bor. Am. i. 567 = *punctata*.
depressa, Sternb. Rev. Saxifr. 42. t. 11 = *androsacea*.
diapensioides, Bell, in Mém. Acad. Turin, v. 1790–1791 (1793), 227. t. 5.—Europ. austr.
diapensioides, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 22 = *serpyllifolia*.
diapensioides, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 54 = *media*.

SAXIFRAGA:—

- diapensoides*, Kurz, in Flora, lv. (1872) 286, sphalm. = *diapensioides*?
dichotoma, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 51.—Hispan.
digitata, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. I. 736 = *pentadactylis*.
digitata, Pourr. ex Steud. l. c. ed. II. ii. 520 = *muscoideis*.
dilatata, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 24 = S. Aizoon.
dissimilis, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 176 = *rivularis*?
divaricata, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 374 = *exarata*.
diversifolia, Wall. Cat. n. 452.—Reg. Himal.
diversifolia, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 63.—Europ. centr.
dubia, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = *hypnoides*.
egregia, Engl. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 113.—China.
elata, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 575 = *Poykinia occidentalis*.
elator, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 115 = *Hostii*.
elator, Wimm. Fl. Schles. (1857) 470 = S. Aizoon.
elegans, Mackay, Fl. Hibern. i. 65 = S. Geum.
elegans, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 573.—Am. bor. occ.
elegans, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 34 = *exilis*.
elegans, Zeyh. ex Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 208 = seq.?
elegantula, Boiss. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 449 = *granulata*.
elongata, Panz. ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = *hypnoides*.
elongata, Sternb. Rev. Saxifr. 9. t. 4 = *virginensis*.
elongella, Haw. Misc. Nat. 167 = *muscoideis*.
elongella, Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 340 = *hypnoides*.
Engleri, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 102.—Europ.
erecta, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = S. Aizoon.
erioblasta, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 67.—Hispan.
eripophora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 372.—Am. bor.
erosa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 311.—Am. bor.
Eschholzii, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 9. t. 10. f. 3.—Am. bor. et arct.
Eschscholtzii, Cham. ex DC. Prod. iv. 22 = *serpyllifolia*.
evolvuloidea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.
evolvuloides, Wall. Cat. n. 447 = *hispidula*.
exarata, All. Fl. Pedem. ii. 73. t. 88. f. 2 = *muscoideis*.
exarata, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 335 = *adenophora*.
exarata, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 280 = *cordillerarum*.
exarata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 244 (excl. syn.) = *caespitosa*.
exarata, Vill. Prosp. 47; Hist. Pl. Dauph. iii. 674. t. 44.—Europ. austr.
excavata, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 319 = *cuneifolia*.
exilis, Pollini, in Brugnat. Giorn. Fis. ix. (1816) 29 = *tridactylites*.
exilis, Steph. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 8. t. 3. f. 1.—Sibir.; Am. arct.
Facchini, Koch, in Flora, xxv. (1841) 624; Syn. Fl. Germ. ed. II. 445 = *muscoideis*.
Federici-Augusti, Biasoletti, Rel. Viagg. Dalm. 199, 213 = *porophylla*.
ferruginea, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jul.-Oct. 1829) 349 = *leucanthemifolia*.
filamentosa, Cham. ex Ser. in DC. Prod. iv. 45 = *flagellaris*.
flicaulis, Wall. Cat. n. 445.—Reg. Himal.
fimbriata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 404 = *Eschholtzii*.
fimbriata, Wall. Cat. n. 443.—Reg. Himal.
Fischeri, Ser. in DC. Prod. iv. 22 = *serpyllifolia*.
flabellifolia, K. Br. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 569 = *davurica*.
flagellaris, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 25. t. 6.—Reg. bor. et arct.
flava, Lam. Fl. Fr. iii. 529 = S. Hirculus.
flavescens, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 13. t. 9. f. 2 = *hypnoides*.
Flittneri, Heuff. in Flora, xxxvii. (1854) 289 = *perdurans*.
floribunda, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1532 = *florulenta*.

SAXIFRAGA :—

- florulenta*, Moretti, in *Brugnat. Giorn. Fis.* II. vii. (1824) 105.—Europ. austr.
foliolosa, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 275 = stellaris.
foliosa, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1527 = praec.
foliosa, Orsini, ex Tenoire, Syll. Fl. Neap. 203 = androsacea.
fonticola, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 90 = rotundifolia.
Forbesii, Vasey, in *Am. Entomologist & Botanist*, ii. (1870) 288.—Am. bor.
Forsteri ×, Stein, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 291.—Europ.
Fortunei, Hook. Bot. Mag. t. 5377.—China.
fragarioides, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, vii. (1881) 121.—Calif.
fragilis, Hort. Schweig. ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 92 = trifurcata.
fragilis, Sieber, ex Steud. Nom. ed. I. 736 = rotundifolia.
Frederici-Augusti, Biasoletto, Rel. Viagg. Dalm. t. 1 = porophylla.
furcata, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. I. 736.—Mont. Pyren.
fusca, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xviii. (1873) 38.—Japon.
Gaudini ×, Bruegg. Cat. Hort. Turic. (1868) 5.—Europ.
geifolia, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 135 = S. Geum.
gemmifera, Pers. Syn. i. 490 = hypnoides.
gemmaulosa, Boiss. in *Bibl. Univ. Genève*, N. S. xiii. (1838) 409.—Hispan.
geranioides, Geners. Elench. Scepus. 31 = perdurans.
geranioides, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 965 = neglecta.
geranioides, Host, Syn. Fl. Austr. 231 = petraea, Linn.
geranioides, Linn. Cent. Pl. i. 10; *Amoen. Acad.* iv. 271.—Mont. Pyren.
geranioides, Prey. & Zirk, ex Bab. in *Journ. Linn. Soc.* xi. (1870) 308 = petraea, Prey. & Zirk.
Geum, Linn. Sp. Pl. 401.—Europ. occ.
Geum, Pall. Reise, ii. 35; Pursh, Fl. Am. Sept. i. 311 = punctata.
Geum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 276 = taygetea.
gibraltarica, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 47 = globulifera.
Girtanneri ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 84.—Europ.
glabella, Bertol. in *Giorn. Arcad.* xxi. (1824) 192 [bis].—Ital.; Graec.
glandulifera, Jacquem. Journ. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 395 = ramulosa.
glandulosa, Wall. Cat. n. 442 = brachypoda.
glandulosa, Willd. ex Ser. in DC. Prod. iv. 46 = brachialis.
glauca, [Clairv.] Man. Herb. 140 = diapiensoides.
glaucescens, Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 131 = granulata.
globulifera, Desf. Fl. Atlant. i. 342. t. 96.—Reg. Mediterr. occ.
globulifera, Schur, Enum. Pl. Transs. 232 = S. Aizoon.
globulifera, Webb, ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 448 = Maweana.
Gmelini, Host, Fl. Austr. i. 512 = hypnoides.
gracilis, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = erosa.
gracilis, Steph. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 7. t. 5. f. 1 = punctata.
gracilis, Sternb. ex Ser. in *Nat. Anz. Schw. Ges.* i. (1818) 74 = hypnoides.
gracca, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 807 = granulata.
granatensis, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 46 = globulifera.
grandiflora, Sternb. Rev. Saxifr. 20. t. 12 = sibirica.
granigera, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 40 = sibirica.
granulata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 314 = sibirica.
granulata, Desf. Fl. Atlant. i. 341 = atlantica.
granulata, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1857) 63 = sibirica.
granulata, Linn. Sp. Pl. 403.—Europ.
granulata, Pollini, Fl. Veron. ii. 29 = bulbifera.
groenlandica, Colm. ex Costa, Fl. Catal. 92 = exarata.

SAXIFRAGA :—

- groenlandica*, Lapeyr. Fl. Pyr. 39. t. 19 = mixta.
groenlandica, Linn. Sp. Pl. 404 = caespitosa.
Grzegorzewskii, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. vi. (1856) 241 = perdurans.
Guthriana ×, Hort. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 537.
Haenseleri, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 13.—Hispan.
Hausmanni ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 105.—Europ.
hederacea, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 317 = S. Cymbalaria.
hederacea, Linn. Sp. Pl. 405.—Europ. austr.; As. Min.
hederaefolia, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 317.—Abyss.
Hegetschweileri ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 91.—Europ.
helianthemifolia, Willd. ex Sternb. Saxifr. Suppl. ii. 19 = Merkii.
hemisphaerica, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1857) 62.—Reg. Himal.
heterantha, Hook. Fl. Bor. Am. i. 252. t. 78 = Mertensiana.
heteromalla, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 966.—Sibir. or.
heterophylla, Sternb. Rev. Saxifr. 50 = pedemontana.
heucherifolia, Griseb. & Schenk, in *Wieg. Archiv*, xxviii. (1852) 1. 317 = rotundifolia.
Heuffelii, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 28 = rotundifolia.
hibernica, Haw. Saxifr. 29 = hypnoides.
hibernica, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. t. 11 = umbrosa.
hieracifolia, Porter, in *Hayd. Rep.* (1871) 782 = integrifolia.
hieracifolia, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 17. t. 18.—Reg. bor. et arct.
hirculoides, Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 67 = S. Hirculus.
hirculoides, Engl. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1883) 112.—China.
Hirculus, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxiii. (1862) 409 = chrysanthia?
Hirculus, Linn. Sp. Pl. 402.—Reg. bor. et arct.
hirsuta, Linn. Syst. ed. X. 1026 = umbrosa.
hirta, Donn, Hort. Cantab. ed. V. 107; Sm. Engl. Bot. t. 2291 = hypnoides.
hirta, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 117 = caespitosa.
hispanica, Coss. ex Nym. Consp. 273 = dichotoma.
hispidula, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 380.—Reg. Himal.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in *Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 146 = flagellaris.
Hohenwartii, Vest, ex Sternb. Rev. Saxifr. 26. t. 7 = sedoides.
Hornungii, Shuttlew. in *Mag. Zool. & Bot.* ii. (1838) 512.—Hutvet.
Hostii, Tausch, in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 240.—Europ. austr.
Huetiana, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 72.—Kurdistan.
Huteri ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 147.—Europ.
hybrida, Haw. Misc. Nat. 164 = hypnoides.
hybrida, Sternb. Rev. Saxifr. 17. t. 8. f. 3.—Mont. Pyren.
hybrida, Vill. ex Lapeyr. Fl. Pyren. 51 = umbrosa.
hyperborea, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 274 = rivularis.
hypnoides, All. Fl. Pedem. ii. 72 = exarata.
hypnoides, Linn. Sp. Pl. 405.—Europ.
hypnoides, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 296 = adscendens.
hypnoides, Vitm. Sagg. Ist. Erb. Alp. 29 = caespitosa.
Iduroei, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 353.—Japon.
imbricata, Bertol. in *Ann. Stor. Nat.* iv. (1830) 260 = squarrosa.
imbricata, Lam. Fl. Fr. iii. 531 = retusa.
imbricata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226. t. 49.—Reg. Himal.
immaculata, Fl. Nicro. Danub. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 521 = intacta.
incisata, Schur, Enum. Pl. Transs. 238 = muscoides.

SAXIFRAGA :—

- inclinata* ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146.—Europ.
incrusteda, Vest, in *Bot. Ze't. Regensb.* iii. (1804) 95, 96 = crustata.
incurva, Mack. ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = caespitosa.
incurvifolia, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 423 = caespitosa.
Infundibulum, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1863) 5.—Hab.?
intacta, Willd. Enum. Hort. Berol. 459.—Europ.
integrifolia, Hook. Fl. Bor. Am. i. 249. t. 86.—Am. bor. occ.
integrifolia, Schleich. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 539 = muscoides.
intermedia, Gaud. Fl. Helvet. iii. 288 = exarata.
intermedia, Hegetschw. Fl. Helv. i. 288 = aspera.
intermedia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 181.—Hab.?
intermedia, Tausch, ex Link, Enum. Hort. Perol. i. 415 = hypnoides.
intricata, Lapeyr. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 20 = exarata.
iradiana, F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. (1850) 176 = mixta.
irrigua, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 460.—Tauria.
irrigua, Fisch. ex Spreng. Nov. Prov. 36 (Quid?).—Sibir.
Jacqgiana ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxii. (1879) p. xxix.—Europ.
Jacquemontiana, Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 68. t. 78. f. 2.—Reg. Himal.
Jamesiana, Walp. Rep. ii. 367 = seq.
Jamesii, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 204.—Am. bor. occ.
juniperifolia, Adams, in *Weber & Mohr, Beitr.* i. 53.—Reg. Caucas.
juniperina, Boiss. Fl. Orient. ii. 804, sphalm. = praec.
Kochii, Hornung, in *Flora*, xviii. (1835) 465 = biflora.
Kolenatiana, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 39 = cartilaginea.
Kotschy, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 65.—As. Min.
Kruhsiana, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 46 = nitida.
Kunzeana, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 121 = dichotoma.
lactea, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 71.—Sibir. or.
ladanifera, Balb. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 540 = pedemontana.
ladanifera, Lapeyr. Fl. Pyren. 65. t. 42 = geranioides.
laeta, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 24 = S. Aizoon.
laetevirens, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 451 = hypnoides.
laevis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 314.—Reg. Caucas.
laevis, Donn, Hort. Cantab. ed. V. 107 = hypnoides?
laevis, Haw. Misc. 165 = hypnoides.
lanceolata, Haw. Syn. Pl. Succ. 324.—Europ. austr.
lantoscana, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 63 = lingulata.
lanuginosa, Jacquem. ex Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 67 = S. Hirculus.
lanuginosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226.—Ind. or.
Lapeyrousii, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 397.—Mont. Pyren.
Lapeyrousii, Herbach, Stirp. Rar. Bucov. 35 = luteo-viridis.
Lapeyrousii, Sternb. Rev. Saxifr. 51 = hypnoides.
lasiophylla, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 29 = rotundifolia.
lasiostigma, Pers. Syn. i. 490 = caespitosa.
latepetiolata, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 120.—Hispan.
latifida, Haw. Syn. Pl. Succ. 325; D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 420 = hypnoides.
latiflora, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1857) 71.—Reg. Himal.
latifolia, DC. Prod. iv. 32 = hypnoides.
laurentiana, Ser. in DC. l. c. 35 = rivularis.
laxa, Schleich. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 540 = hypnoides.
lepismigena, Plan. Fl. Gallea, 224 = Clusii.
leptophylla, Froel. ex Ser. in DC. Prod. iv. 24 = aphylla.
leptophylla, Pers. Syn. i. 490 = hypnoides.

SAXIFRAGA:—

- leucantha*, Thomas, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 70 = exarata.
leucanthemifolia, Lapeyr. Fl. Pyr. 49. t. 25 = Clusii.
leucanthemifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 260. —Am. bor. occ.
ligulata, Murr. in Comm. Gotting. (1781) 26. t. 1 = sarmentosa.
ligulata, Wall. in As. Res. xiii. (1820) 398. —Reg. Himal.
linearis, Hort. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 541 = hypnoides.
lineata, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. t. 7 = muscoides.
lingulata, Bell. in Mém. Acad. Turin, v. 1790-91 (1793) 226. —Europ. austr.
lingulata, Moretti, Tentat. 5 = intacta.
Linnaei, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 69 = adscendens.
longifolia, Auct. ex Nym. Consp. 268 = crustata.
longifolia, Host, Fl. Austr. i. 409 = Hostii.
longifolia, Lapeyr. Fl. Pyren. 26. t. 11. —Europ. austr.
longifolia, Moretti, Notiz. ed. I. 11 = intacta.
longifolia, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = marginata.
longiscapa, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 388 = nivalis.
lutea, Gilib. Fl. Lituan. ii. 179 = S. Hirculus.
luteopurpurea, Lapeyr. Fl. Pyren. 29. t. 14 = Lapeyr. rousii.
luteopurpurea, Sternb. Rev. Saxifr. 7; Suppl. ii. 48. —Transsylv.
luteopurpurea, Waldst. & Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 637 = luteoviridis.
luteoviridis, Schott & Kotschy, ex Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1851) 65. —Transsylv.
Lyallii, Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 542. —Am. bor. occ.
Lychnitis, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68. —Reg. Himal.
lysimaichoides, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 145 = diversifolia, Wall.
Macnabiana, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1855) i. 705, 770 = S. Cotyledon.
macrantha, Boiss. Fl. Orient. ii. 807 = sibirica.
macropetala, Kern. ex Engl. Monog. Saxifr. 280. —Europ.
maculata, Schrank, Baier. Fl. i. 690. —Bavar.
maderensis, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 414. —Ins. Mader.
magellanica, Poir. Encyc. vi. 686. —Reg. Magellan.
malvaefolia, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club. ix. (1882) 121. —Calif.
Malyi, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 23 = S. Aizoon.
marginata, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 26 = Boryi.
marginata, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 1. t. 1. f. 1. —Italia.
marylandica, Hort. ex Sternb. l. c. i. 4 = pensylvanica.
Mawcana, Baker, in Gard. Chron. (1871) 1355. —Marocc.
media, Gouan, Illustr. 27. —Mont. Pyren.
media, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 70. t. 376 = porophylla.
media, Tausch, in Flora, xii. (1829) 10 = hypnoides.
melaena, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 66 = mixta.
melaleuca, [Fisch.] Hort. Gorenk. ed. I. (1808) 99; et in Spreng. Pugill. ii. 61. —Mont. Altai.
Merkii, Fisch. in Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 1. t. 1. f. 3. —Sibir.
Mertensiana, Bongard, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1835) 141. —Am. bor. occ.
Meyeri, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 11. t. 21. —Sibir.
micrantha, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 50. —Reg. Himal.
micrantha, Fisch. ex DC. Prod. iv. 48 = Leptarrhena pyrolaeolia.
micranthifolia, Steud. Nom. ed. I. 736 = erosa.
microphylla, Royle, ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 72. —Reg. Himal.
microphylla, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 63. —Europ. centr.
Milesii, Hort. Leichtl. ex Baker, in Gard. Chron. (1882) ii. 102 = ligulata.
minor, Sieber, ex Steud. Nom. ed. I. 736; et ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 543, nomen. —Hab.?
minuta, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 276 = tridactylites.

SAXIFRAGA:—

- mixta*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 460 = exarata.
mixta, Lapeyr. Fl. Pyren. 41. t. 20. —Mont. Pyren.
modesta, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 12. t. 626 = S. Geum.
mollis, Sm. ex Spreng. Syst. ii. 364 = sibirica.
monodactylites, Bory, ex Thore, Promen. Gascogne, 24 = tridactylites?
Moorcroftiana, Wall. Cat. n. 453 = diversifolia, Wall.
moschata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 436 = hypnoides.
moschata, Lapeyr. ex DC. Prod. iv. 28, partim = pubescens.
moschata, Wulf. in Jacq. Misc. ii. (1781) 128. t. 21. f. 2 = muscoides.
mucronulata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 27. t. 50 f. 2 = flagellaris.
multicaulis, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1864); ex Engl. Monog. Saxifr. 228 = cuneifolia.
multifida, Rosbach, in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 111. —Hab.?
multiflora, Ehrh. ex Ser. in DC. Prod. iv. 19 = S. Cotyledon.
multiflora, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 532. —Sibir.
multinervis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 267 = androsacea.
muralis, Salisb. Prod. 306 = tridactylites.
Mureti x, Ramb. in Verh. Schw. Nat. Ges. Chur, (1863) 191. —Europ.
Murithiana, Tissièrè, in Bull. Soc. Murith. i. (1868) 28. —Helvet.
muscoides, All. Fl. Pedem. ii. 70 = planifolia.
muscoides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 460 = exarata.
muscoides, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 123. —Europ.; As. Min.; Persia.
muscosa, Schrank, Baier. Fl. i. 700 = muscoides.
muscosa, Suter, Fl. Helvet. i. 251 = pubescens.
mutata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 570. —Europ. austr.
mysotifolia, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 373 = Merkii.
mysotifolia, Pall. ex Spreng. Syst. ii. 364 = flagellaris.
nana, Engl. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 118. —China.
neglecta, Bray, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 9. t. 6. —Sibir.; Kamtsch.
neglecta, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. 19 = S. Aizoon.
Nelsoniana, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 355 = punctata.
Nelsoniana, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 124. t. 29 = Boykinia Richardsoni.
nervosa, Lapeyr. Fl. Pyren. 63. t. 39 = exarata.
nervosa, Miègev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 19. —Mont. Pyren.
nevadensis, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 67 = mixta.
nigricans, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 46 = nivalis.
nitida, Schreb. ex Sternb. Rev. Saxifr. 32. t. 10. f. 4. —Hab.?
nivalis, Linn. Sp. Pl. 401. —Reg. bor. et arct.
nivalis, Muhl. Cat. 44 = virginienensis.
nivalis, Pall. Reise, iii. 444 = davurica.
norica x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 147. —Europ.
notata, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 22 = S. Aizoon.
nothana, Moç. ex Ser. in DC. Prod. iv. 40 = stellaris?
nuda, Ser. l. c. 41 = erosa.
nudicaulis, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 366. —Am. bor. occ.
nutans, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 242 = S. Hirculus.
nutans, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 368 = Romanzoffia unalaschensis vel sitchensis.
nutans, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 69. —Reg. Himal.
obscura, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 646. —Mont. Pyren.
obtusifida, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 416. —Hispan.
obtusifolia, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 61. —Helvet.
odontophylla, Wall. Cat. n. 454. —Reg. Himal.
odontophylla, Wall. l. c., partim = sibirica.
officinatum, Crantz, Inst. ii. 426 = granulata.
olympica, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 19 = rotundifolia.
oppositifolia, Linn. Sp. Pl. 402. —Reg. bor. et arct.

SAXIFRAGA:—

- oranensis*, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 284. —Alger.
orientalis, Jacq. Obs. ii. 9. t. 34 = S. Cymbalaria.
Pacumbis, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 209 = ligulata.
Padellae x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 85. —Europ.
Pallasiana, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 19 = serpyllifolia.
pallida, Wall. Cat. n. 450. —Reg. Himal.
palmata, Lapeyr. Fl. Pyren. 64. t. 41 = geranioides.
palmata, Sm. Engl. Bot. t. 455 = hypnoides.
palmata, Steph. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 8. t. 6. f. 2 = sibirica.
palpebrata, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 67. —Reg. Himal.
palustris, Link, Enum. Hort. Berol. i. 412 = pensylvanica.
palustris, Salisb. Prod. 306 = S. Hirculus.
paniculata, Cav. Desc. 473; Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 112. —Hispan.
paniculata, Hornem. Hort. Hafn. i. 402 = trifurcata.
paniculata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = S. Cotyledon.
paniculata, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 30 = geranioides.
paniculata, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 431 = granulata.
paradoxa, Sternb. Rev. Saxifr. 22. n. 35. t. 14. —Carinth.
Parisii, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 154 = atlantica?
parnassica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 19 = adscendens.
parnassifolia, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 405 = diversifolia, Wall.
parnassifolia, Wall. Cat. n. 451, partim = corymbosa, Hook. f. & Thoms.
parnassiodes, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 27. —Turkestan.
Parryi, Torr. Bot. Mex. Bound. 69. —Am. bor. occ.
parvicalyx, Jacquem. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 68 = Jacquemontiana.
parviflora, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. Manip. iv. 11. t. 3 = hederacea.
parviflora, Fisch. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 556 = Leptarrhena pyrolaeolia.
patens, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 65 = caesia.
patens x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146. —Europ.
patens, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. t. 12 = valdensis.
pauciflora, Sternb. l. c. Suppl. i. 6. t. 4 = nivalis.
Pavonii, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 434. —Peruv.
pectinata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 312 = Spiraea pectinata.
pectinata, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 21 = S. Aizoon.
pedatifida, Ehrh. ex Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 340. —Europ. austr.
pedemontana, All. Fl. Pedem. ii. 73. —Europ. austr.
pedemontana, Willd. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 547 = aquatica.
pekinensis, Maxim. Ind. Pekin. in Prim. Fl. Amur. Suppl. 120. —China.
peltata, Torr. ex Benth. Pl. Hartw. 311. —Calif.
penduliflora, Bast. in Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 17 = granulata.
pensylvanica, Linn. Sp. Pl. 399. —Am. bor.
pentadactylis, Lapeyr. Fl. Pyren. 64. t. 40. —Mont. Pyren.
perdurans, Kit. ex Wahlenb. Fl. Carpat. 123. —Transsylv.
perporosa, Schur, Enum. Pl. Transs. 234 = retusa.
perpusilla, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 72. —Reg. Himal.
peruviana, Sternb. Rev. Saxifr. 55. t. 22. —Peruv.
petiolaris, R. Br. in Ross, Voy. ed. II. ii. 192 = rivularis.
petraea, Gouan, Illustr. 29. t. 18. f. 3 = aquatica.
petraea, Gunn. Fl. Norveg. ii. 30. n. 427 = contraversa.
petraea, Linn. Syst. ed. X. 1027. —Europ. austr.
petraea, Pall. Ind. Taur. 147 = irrigua.
petraea, Prey. & Zirk. ex Bab. in Journ. Linn. Soc. xi. (1870) 308. —Islandia.

SAXIFRAGA:—

- petraea*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 184 = hypnoides.
petraea, Willd. Sp. Pl. ii. 654 = adscendens.
petrosa, Vahl, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 522 = *petraea*, Linn.
pillifera, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 66.—Reg. Himal.
pilosa, Haw. Misc. Nat. 157 = *virginiensis*.
planifolia, Lapeyr. Fl. Pyren. 31 = muscoides.
planifolia, Sternb. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *serpyllifolia*.
planipetala, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1535 = hypnoides.
plantaginifolia, Hook. in Parry's 2nd Voy. Suppl. 394 = *hieracifolia*.
platypetala, Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 391 = hypnoides.
polita, Hort. ex Ser. in DC. Prod. iv. 42 = *umbrosa*.
polita, Link, Enum. Hort. Berol. i. 414 = hypnoides.
polydactyla, Pall. Reise, iii. 320 = *davurica*.
Ponae, Sternb. Rev. Saxifr. 47. t. 11. f. 6 = *petraea*, Linn.
porophylla, Bertol. in Desv. Journ. Bot. ii. (1813) 76.—Europ. austr.
porphyrantha, Hort. Gotting. ex Engl. Monog. Saxifr. 176 = muscoides.
portosantana, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 68.—Ins. Mader.
praecox, Bernh. ex Engl. Monog. Saxifr. 84 = *tridactylites*.
primulaefolia, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 46 = *nivalis*.
procumbens, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 522 = hypnoides.
propaginea, Pourr. ex Engl. Monog. Saxifr. 134 = *Clusii*.
propinqua, R. Br. in Ross, Voy. ed. II. ii. 192 = *S. Hirculus*.
prorepens, Fisch. ex Sternb. Rev. Saxifr. 59 = *flagellaris*.
Prostiana, Nym. Consp. 270 = *mixta*.
Prostii, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. 34 = *pedatifida*.
protensa, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 63.—Helvet.
Pseudo-adscendens, Schur, Enum. Pl. Transs. 238 = *tridactylites*.
Pseudo-bronchialis, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II (1812) 61.—Hab.?
Pseudo-Burseriana, Fisch. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *bronchialis*.
Pseudo-caesia, Rochel, Pl. Banat. Rar. 35. t. 3 = *Rocheliana*.
Pseudo-hypnoides, Murith, Bot. Val. 94 = *exarata*.
Pseudo-sancta, Fanka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 176.—Balkan.
pubescens, DC. Fl. Fr. iv. 375 = *mixta*.
pubescens, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 327.—Europ.
pubescens, Sternb. in Linnaea, vi. (1831) 556 = *caespitosa*.
pulchella, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 426 = *exarata*.
punctata, Gunn. Fl. Norveg. ii. 140 = *cuneifolia*.
punctata, Haw. ex Nym. Consp. 294 = *umbrosa*.
punctata, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 231 = *Mertensiana*.
punctata, Linn. Sp. Pl. 401.—Sibir.; Am. bor. occ.
punctata, Pall. Reise, iii. 731 = *davurica*.
punctata, Rottb. in Skrift. Kjoeb. Selsk. x. (1770) 445. t. 3. f. 10 = *nivalis*.
pungens, [Clairv.] Man. Herb. 140 = *Vandellii*.
purpurascens, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 61.—Reg. Himal.
purpurea, All. Fl. Pedem. ii. 71 = *retusa*.
pusilla, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 35.—Ins. Aleut.
pygmaea, Haw. Misc. Nat. 168 = muscoides.
pyramidalis, Lapeyr. Fl. Pyren. 32 = *S. Cotyledon*.
pyramidalis, Salisb. Prod. 305 = *S. Aizoon*.
pyramidalis, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = *lingulata*.
pyramidata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *S. Cotyledon*.
pyrenaica, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 296 = *androsacea*.
pyrenaica, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 371 = muscoides.
pyrolifolia, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 389 = *Leptarrhena pyrolaeifolia*.
quinquedens, Haw. Syn. Pl. Succ. 325 = hypnoides.
quinquifida, Haw. Misc. Nat. 163 = hypnoides.
quinquifida, Lam. Fl. Fr. iii. 533 = *geranioides*.
radicans, Jacquem. Voy. Bot. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 397 = *flagellaris*.

SAXIFRAGA:—

- ramosissima*, Schur, Enum. Pl. Transs. 239 = *adscendens*.
ramulosa, Wall. Cat. n. 446.—Reg. Himal.
ranunculifolia, Hook. Fl. Bor. Am. i. 246. t. 83.—Am. bor.
ranunculoides, Haw. Enum. Saxifr. 25 = *irrigua*.
recta, Lapeyr. Fl. Pyren. 33. t. 15 = *S. Aizoon*.
recta, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = *marginata*.
recurva, Bree, ex Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 63 = hypnoides.
recurvifolia, Lapeyr. Fl. Pyren. 30 = *caesia*.
Redofskyi, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 241 = *stellaris*.
Redowskyana, Presl, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = *davurica*.
reflexa, Hook. Fl. Bor. Am. i. 249. t. 85.—Am. bor.
reflexa, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *S. Hirculus*.
Regelii, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 107.—Europ.
repanda, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 17. t. 5 = *rotundifolia*.
reticulata, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *Sieversiana*.
reticulata, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 21. t. 13 = *S. Cymbalaria*.
retroflexa, Hort. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = hypnoides.
retusa, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 556 = *oppositifolia*.
retusa, Gouan, Illustr. 28. t. 18. f. 1.—Europ. austr.
Reuteriana, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 730.—Hispan.
Rhei, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 30 = muscoides.
Richardsonii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 247 = *Boykinia Richardsonii*.
rigens, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 474 = *Rocheliana*.
rigida, C. Sm. ex Ser. in DC. Prod. iv. 39 = *hieracifolia*.
rivalis, Uspensky, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vii. (1834) 372 = seq.
rivularis, Linn. Sp. Pl. 404.—Reg. bor. et arct.
rivularis, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 640 = *carpathica*.
rivularis, Thomas, ex DC. Prod. iv. 35 = *granulata*.
rivularis, S. Wats. in Bot. King's Exped. v. 93 = *debilis*.
robusta, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 22 = *S. Aizoon*.
Rocheliana, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 55.—Banatus.
rorida, Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 218 = *irrigua*.
rosacea, Moench, Meth. 106 = hypnoides.
rosea, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 = *biflora*.
Rossii, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1258.—Manchuria.
rosularis, Haw. Misc. Nat. 159 = *S. Aizoon*.
rosulenta, Ehrh. ex Ser. in DC. Prod. iv. 19 = *S. Aizoon*.
rotundifolia, Geners. Elench. Scep. n. 372; ex Wahlenb. Fl. Carpat. 119 = *hieracifolia*.
rotundifolia, Linn. Sp. Pl. 403.—Graec.; Reg. Caucas.
rotundifolia, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 964 = *punctata*.
rotundifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 71. t. 377 = *chrysosplenifolia*.
Rudolphiana, Hornsch. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 269 = *oppositifolia*.
rupestris, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 233 = *adscendens*.
rupestris, Salisb. Prod. 306; Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = hypnoides.
rupestris, Thomas, ex Ser. l. c. 22 = *valdensis*.
rupestris, Willd. Sp. Pl. ii. 653 = *petraea*, Linn.
Russi, Presl, Delic. Prag. 140 = *bulbifera*.
sabulicola, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 153 = *atlantica*.
sachalinensis, F. Schmidt, Reisen Amurl. 133.—Ins. Sachalin.
saginooides, Froel. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 = *sedoides*.
saginooides, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68.—Reg. Himal.
sancta, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 332.—Graecia; As. Min.
sarmentosa, Linn. f. Suppl. 240.—China; Japon.
scapigera, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 59; Suppl. ii. 19 = *serpyllifolia*.

SAXIFRAGA:—

- scardica*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 332.—Graecia.
scariosa, Schleich. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 551 = hypnoides.
Schleicheri, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 176 = *stellaris*.
Schmidtii, Regel, Gartenfl. (1878) 225 = *lingulata*?
Schraderi, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. 11. t. 8 = hypnoides.
Scopolii, Vill. Prosp. 47; Hist. Pl. Dauph. iii. 670 = *adscendens*.
scotophila, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 23 = *hederacea*.
scrobiculata, Schur, ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 551 = *retusa*.
secunda, Moretti, in Brugnati. Giorn. Fis. II. viii. (1825) 285 = muscoides.
secunda, Willd. ex Cham. in Linnaea, ii. (1827) 608 = *Romanzoffia unalaschensis*, *sitchensis*.
sednensis, Clarion, ex Sternb. Rev. Saxifr. 53 = *lingulata*.
sedoides, Linn. Sp. Pl. 404.—Europ. austr.
Sedoides, Wahlenb. Veg. Helvet. 79, partim; Murith, Bot. Val. 94 = *Seguieri*.
Seguieri, Spreng. Fl. Hal. Mant. 40.—Helvet.
semidecandra, Fisch. ex DC. Prod. iv. 42 = *umbrosa*.
semidodecandra, Walp. Rep. ii. 364 = *punctata*.
semipubescens, Sweet, Hort. Suburb. Lond. 97 = *pensylvanica*.
Sempervivum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 40 = *porophylla*.
sendaica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 38.—Japon.
septifida, Haw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 (Quid?).—Hibernia.
serpyllifolia, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864), 62 = *chrysanthia*.
serpyllifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 311.—Reg. bor. et arct.
serrata, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 5 = *umbrosa*.
serratifolia, Mackay, ex Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. 709 = *umbrosa*.
setigera, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 312 = *flagellaris*.
sibirica, Linn. Syst. ed. X. 1027.—As. bor. et arct.
sibirica, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = *davurica*.
sibirica, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 312 = *cernua*?
sibirica, Sternb. Rev. Saxifr. 23 = *Sieversiana*.
sibirica, Wahlenb. Fl. Carpat. 121 = *carpathica*.
Sibthorpii, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 22.—Graecia.
Sieversiana, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 16.—Sibir.
sileniflora, Hook. Fl. Bor. Am. i. 245.—Am. bor. occ.
silenifolia, Engl. Monog. Saxifr. 172, sphalm. = *praec.*
sobolifera, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 243 = *flagellaris*.
spathularis, Brot. Fl. Lusit. 172 = *umbrosa*.
spatulata, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 231 = *eriolabata*.
spatulata, Desf. Fl. Atlant. i. 342. t. 96. f. 2.—Afr. bor.
spatulata, Haw. Misc. Nat. 165 = hypnoides.
sphaeroidea, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 181 = *umbrosa*.
spicata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 354 = *punctata*.
spinulosa, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 96 = *bronchialis*.
spinulosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 227. t. 50. f. 2 = *flagellaris*.
sponkhemica, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 224 = hypnoides.
Spruneri, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 18.—Thessal.
spuria x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146.—Europ.
squarrosa, Sieber, in Flora, iv. (1821) 99.—Tyrol.
Stabiana, Tenore, Syll. Fl. Neap. 201 = *S. Aizoon*.
Steinmanni, Tausch, Hort. Canal. dec. i. 76; et in Flora, vii. (1824) 85 = hypnoides.
Stella-aurea, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 72.—Reg. Himal.
stellaris, Linn. Sp. Pl. 400.—Reg. bor. et arct.
stellata, Pav. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 430.—Peruv.
Stelleriana, Merk. ex Ser. in DC. Prod. iv. 46.—Sibir.
stenoglossa, Tausch, ex Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 22.—Europ.
stenopetala, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 70 = *aphylla*.
stenophylla, Royle, Illustr. Bot. Himal. 227. t. 50 f. 1 = *flagellaris*.

SAXIFRAGA :—

- Stephaniana*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 8. t. 6 = *sibirica*.
Sternbergii, Willd. Enum. Hort. Berol. 462 = *caespitosa*.
stolonifera, Meerb. Afbeeld. t. 23. (1775); Jacq. Misc. ii. 327 = *sarmentosa*.
Stracheyi, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 61.—Reg. Himal.
striata, Hall. f. ex Gaud. Fl. Helv. iii. 129 = *muscoides*.
stricta, C. Sm. ex Nym. Consp. 274 = *hieracifolia*.
strigosa, Wall. Cat. n. 448.—Reg. Himal.
Sturmiana, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 25 = *S. Aizoon*.
stylosa, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 236.—Bolivia.
subacaulis, Hegetsch. Fl. Schw. 397 = *muscoides*.
submutica, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 = *S. Aizoon*.
snbverticillata, Boiss. Fl. Orient. ii. 803.—Reg. Caucas.
Sullivantii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 575 = *Sullivantia* Ohionis.
tangutica, Engl. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 114.—China.
taygetea, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 19.—Graecia.
tecta, Kit. in Linnaea, xxii. (1863) 473 = *luteoviridis*.
tellimoides, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvi. (1871) 216.—Japon.
tenella, Wulf. in Jacq. Coll. iii. 144. t. 17.—Europ. anstr.
tenera, Sternb. Rev. Saxifr. t. 9 B = *androsacea*.
tenera, Suter, Fl. Helvet. i. 245 = *planifolia*.
tenerrima, Willk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 111 = *tridactylites*.
Tenorii, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 69. t. 14.—Europ. austr.
terekensis, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 123.—Sibir. altaic.
texana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 455.—Am. bor. occ.
thessalica, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. 26, in obs. = *porophylla*.
thyroidea, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 240.—Italia.
thysanodes, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 33 = *ligulata*.
Tilingiana, Regel & Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 94.—As. or.
tirolensis x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146.—Europ.
Tolmiei, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 567 (Tolmaei).—Am. bor. occ.
tombeanensis, Boiss. ex Engl. in Verh. Bot.-Zool. Ges. Wien, xix. (1869) 554 = *diapensioides*.
transsilvanica, Fuss, Fl. Transs. 236.—Transsylv.
trichodes, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 295 = *sedoides*.
tricuspidata, Rottb. in Skrift. Kioeb. Selsk. x. (1770) 446.—Reg. bor. et arct.
tridactylites, Linn. Sp. Pl. 404.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
tridens, Haw. Syn. Pl. Succ. 324 = *hypnoides*?
tridens, Jan, ex DC. Prod. iv. 24 = *androsacea*.
tridentata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 426 = *hypnoides*.
trifida, Gilib. Fl. Lituan. ii. 181 = *tridactylites*.
trifida, Haw. Misc. Nat. 165 = *hypnoides*.
trifida, Vand. Fasc. Pl. 13 (Quid?).—Ital.
trifurcata, Schrad. Hort. Gotting. fasc. i. 13. t. 7.—Hispan.
trigyna, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 235.—Chili.
tuberosa, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 9 = *punctata*.
uliginosa, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 39 = *hieracifolia*.
umbellulata, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 71.—Reg. Himal.
umbrosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 574.—Europ. occ.
unalaschensis, Fisch. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 2 = *Leptarrhena pyrolaeifolia*.
unalaschensis, Presl, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = *davurica*.
unguiculata, Engl. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 115.—China.
uniflora, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 275 = *caespitosa*.
uniflora, Froel. ex DC. Prod. iv. 24 = *aphylla*.
uniflora, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. 13. t. 9. f. 1 = *hypnoides*.

VOL. II.

SAXIFRAGA :—

- vaginalis*, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 220 = *neglecta*.
vaginata, Presl, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 39 = *rivularis*.
Vahlit, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 370 = *adscendens*.
valdensis, DC. l. c. Suppl. 517.—Europ. austr.
Vandellii, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 636 = *arctioides*.
Vandellii, Sternb. Rev. Saxifr. 34. t. 10.—Europ. austr.
varians, Sieber, ex Ser. in DC. Prod. iv. 25 = *muscoides*.
venosa, Haw. Enum. Saxifr. 23 = *caespitosa*.
verna, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 524 = *virginiensis*.
vernalis, Willd. Hort. Berol. i. 43 = *virginiensis*.
veronicaefolia, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 325 = *atlantica*.
veronicaefolia, Pers. Syn. i. 489 = *bulbifera*.
villosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 462 = *hypnoides*.
virginiana, Poit. in Rev. Hort. (1879) 260 = *virginiensis*.
virginica, Nutt. Gen. Am. i. 285 = *seq.*
virginiensis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 269.—Am. bor.
viscidula, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 69.—Reg. Himal.
viscosa, Hort. ex Haw. Misc. Nat. 164 = *hypnoides*?
vivipara, Vest, in Flora, iii. (1820) 405 = *bulbifera*.
Wahlenbergii, Ball, in Bot. Zeit. iv. (1846) 401 = *perdurans*.
Wallacei, McNab.—Cf. Gard. Chron. (1883) i. 670 = *Camposii*.
Wallichiana, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. t. 22 = *fimbriata*.
Wettsteinii x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 87.—Europ.
Wildiana, Kunze, in Linnaea, xvii. (1843) 575.—Hab.?
Willkommiana, Boiss. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 556 = *Camposii*.
Wolleana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 569 = *erosa*.
Wormskoldii, Fisch. ex DC. Prod. iv. 42 = *umbrosa*.
Wulfeniana, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 126 = *retusa*.
Zeleborii, Schott, l. c. 246.—Enrop. austr.
Zimmereri x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146.—Europ.

SAXIFRAGIA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = *Saxifraga*, Linn.

SAXO-FRIDERICIA, Rob. Schomb. Rapat. Frid.

- Aug. Braunsch. (1845) 13. t. 2. *RAPATEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 858.
aculeata, Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 457.—Guian.
regalis, Rob. Schomb. Rapat. Frid.-Aug. Braunsch. (1845) 14. t. 2.—Guian.
subcordata, Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 459.—Bras.

SCABIOSA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).

- DIPSACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 159.
ANISODENS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 465 (1867).
ASTEROCEPHALUS, Lag. Gen. et Sp. Nov. 8 (1816).
ASTROCEPHALUS, EUPTILIA, GONOKEROS, LOMELIOSIA, PENTENA, SIXALIX, TEREIPHAS, THLASIDIA, TREMASTELMA, XETOLA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 95, 96 (1836).
CALLISTEMMA, Boiss. Fl. Orient. iii. 146 (1875).
CHETARIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 521 (1841).
CHETASTRUM, Neck. Elem. i. 712 (1790).
COLUMBARIA, J. & C. Presl, Fl. Čech. 32 (1819).
CYRTOSTEMMA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 321 (1841).
DIOTOTHECA, Rafin. Fl. Ludov. 74 (1817).
KNAUTIA, Linn. Gen. ed. I. 23 (1737).
PTEROCOPHALUS, Vaill. ex Adans. Fam. ii. 152 (1763).
PYCNOCOMON, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 93. t. 88 (1820).
SCLEROSTEMMA, Schott, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 64 (1818).
SPONGOSTEMMA, Reichb. Nom. 72 (1841).
SUCCISA, Neck. Elem. i. 109 (1790).
TRICHERA, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814); ex Roem. & Schult. Syst. iii. 54 (1819).
TROCHOCEPHALUS, Opiz, ex Bercht. Oek. Fl. Poehm. ii. 222 (1838).
acaulis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = *S. Columbaria*.
achaeta, Vis. & Panč. in Mem. Ist. Venet. xii. (1863) 465.—Serbia.
acutiflora, Reichb. Pl. Crit. iv. 24. t. 326 = *maritima*.
affinis, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 78 = *S. Columbaria*.
afghanica, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 67.—Afghan.
africana, Linn. Sp. Pl. ed. II. 145.—Afr. austr.
africana, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 83 = *cretica*.
agrestis, Láng, ex Nym. Consp. 344 = *Scopolii*.
agrestis, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 77 = *arvensis*.
agrestis, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 226 = *gramuntia*.
alba, Scop. Delic. Insub. iii. 33 = *ucranica*.
albescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 144 = *Cephalaria leucantha*.
aleppica, Conlt. Mem. Dipsac. 35. t. 2. f. 8 = *palaestina*.
alpestris, Jord. Pugill. Pl. Nov. 84 = *lucida*.
alpestris, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 536.—Sibir.
alpigena, Schur, Enum. Pl. Transs. 962 (Index) = *arvensis*.
alpina, Georgi, Besch. Russ. Reich. Nachtr. 259 = *Cephalaria tatarica*.
alpina, Linn. Sp. Pl. 98 = *Cephalaria alpina*.
alpina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 79 = *Cephalaria ambrosioides*.
altissima, Jacq. Hort. Vindob. ii. 87 = *africana*.
altissima, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *Cephalaria tatarica*.
ambigua, Avé-Lall. Diss. Pl. Quib. 8 = *pyrenaica*.
ambigua, Frivald. in Flora, xix. (1836) 438.—Macedon.
ambigua, Tenore, Fl. Neap. App. v. 7 = *maritima*.
ambrosioides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 80; Fl. Graec. ii. 5 t. 103 = *Cephalaria ambrosioides*.
amoena, Jacq. f. Eclog. i. 86. t. 59.—As. Min.; Persia.
amplexicaulis, Linn. Mant. ii. 195.—Hab.?
anatolica, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 82 = *rotata*.
anethifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 524, sphalm. = *S. Columbaria*.
angulata, Rafin. Caratteri, 81 = *maritima*.
angustifolia, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 206.—Hab.?
angustifolia, Salisb. Prod. 54 = *Cephalaria syriaca*.
anthemifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 371 = *S. Columbaria*.
arenaria, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxi.—Aegypt.; Arab.
argentea, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 296 = *sicula*.
argentea, Linn. Sp. Pl. 100 = *ucranica*.
arvensis, Linn. l. c. 99.—Europ.; Reg. Caucas.
arvensis, Tenore, Syll. Fl. Neap. 59 = *integrifolia*.
arvensis, Ucria, ex DC. Prod. iv. 657 = *maritima*.
asterocephala, Thuill. Fl. Par. ed. II. 72 = *suaveolens*.
atrata, Lag. Elench. Hort. Madrit. (1805); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 7. n. 103 = *Cephalaria tatarica*.
atropurpurea, Linn. Sp. Pl. 100 = *maritima*.
attenuata, Linn. f. Suppl. 118 = *Cephalaria attenuata*.
Aucheri, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 111.—Syria; Assyria.
australis, Wulf. in Roem. Arch. iii. III. (1803) 316.—Europ. austr.
baetica, Boiss. Elench. Pl. Nov. Hisp. 58.—Hispan.
Bailletii, Timb.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1863) p. xviii = *maritima*.
Balansae, Reut. Cat. Hort. Genev.; ex Boiss. Fl. Orient. iii. 145 = *palaestina*.
banatica, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 10.—Bannat.
bellidifolia, Lam. Fl. Fr. iii. 347 = *arvensis*.
bellidis-folia, Gilib. Fl. Lituan. i. 169 = *S. Columbaria*.
bicolor, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 143.—Kurdistan.
bidens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 80; Fl. Graec. ii. 6. t. 104.—As. Min.
Biebersteinii, Roem. & Schult. Syst. iii. 75 = *micrantha*.
bipinnata, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 37 = *ochroleuca*.

5 M

SCABIOSA :—

bipinnata, Nym. Consp. 343 = stellata.
bohémica, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 79 = arvensis.
borealis, Salisb. Prod. 54 = S. Succisa.
brachiata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 83 ;
 Fl. Graec. ii. 9. t. 109.—Europ. austr. ; As. Min.
brachycarpa, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. ii. 113.
 —Kurdistan.
brevicoma, Nym. Consp. 343 = stellata.
brevis, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448 = papposa.
breviscapa, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 73 =
 crenata.
brevisetia, Jord. Pugill. Pl. Nov. 101 = gramuntia.
brigitantia, Jord. l. c. 97. = S. Columbaria.
Broussonetii, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448.—Hispan.
Brunoniiana, Wall. Cat. n. 429 = Dipsacus Lesche-
 naultii.
Buekiana, Eckl. & Zeyh. Enum. 371.—Afr. austr.
caerulea, Kielm. Diss. Pl. Hort. Tuebing. (1814) 16 ;
 Schult. Mant. iii. 43 = caucasica.
caerulea, Gueldenst. Reisen, ii. 10 (Quid ?).—Rossia.
caerulea, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 525 =
 S. Columbaria.
caesaraugustana, Echeand. Fl. Caesaraug. 25.—Hispan.
calocephala, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 80 = palaestina.
calyptocarpa, St. Amans, Fl. Agen. 60 = maritima.
camelorum, Coss. & Dur. Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855)
 251.—Algeria.
campestris, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 7 =
 arvensis.
cana, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448.—Oriens.
candicans, Jord. Pugill. Pl. Nov. 99 = pyrenaica.
Candolliana, Wall. Cat. n. 430.—Reg. Himal.
Candollii, DC. Prod. iv. 654 = praec.
canescens, Hort. Taur. ex DC. Prod. iv. 651 =
 arvensis.
canescens, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 50 =
 suaveolens.
capillata, Roem. & Schult. Syst. iii. 64 = gramuntia.
carpathica, Fisch. ex Spreng. Syst. i. 377 = arvensis.
caucasica, Sims, Bot. Mag. t. 886 = seq.
caucasica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98.—Reg. Caucas. ;
 Soongaria.
centauroides, Lam. Illustr. i. 250 = Cephalaria corni-
 culata.
centauroides, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 (Quid ?).
 —Hispan.
ceratophylla, Roem. & Schult. Syst. iii. 521.—Sibir.
ceratophylla, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xii =
 S. Columbaria.
ciliata, Spreng. in Schrad. Journ. (1880) ii. 199.—
 Graec.
cilicica, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 229,
 nomen.—As. Min.
cinerascens, Jord. Pugill. Pl. Nov. 89 = holosericea.
cinerea, Lam. Illustr. i. 251 = pyrenaica.
cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. 68 (sp. dub.).—
 Cochinch. ; China.
coerulea, Auct. = caerulea.
colchica, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856)
 ii. 371, in textu.—Reg. Caucas.
collina, Req. in Guérin, Desc. Vaubl. ed. II. 248.—
 Hispan.
collina, Salisb. Prod. 54 = stellata.
collina, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 78.—Bohem.
Columbaria, Linn. Sp. Pl. 99.—Europ. ; As. bor. ; Afr.
 bor. et austr.
Columbaria, Willk. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.
 ii. 17 = maritima.
Columnnae, Tenore, Fl. Nap. i. 29. t. 7 = gramuntia.
commutata, Roem. & Schult. Syst. iii. 65 =
 S. Columbaria.
comosa, Fisch. ex Roem. & Schult. l. c. 84 = Fischeri.
connata, Hornem. Hort. Hafn. i. 128 = caucasica.
coriacea, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii.
 (1801) 416 = Cephalaria corniculata.
corniculata, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 11 =
 Cephalaria corniculata.
Cornucopia, Viv. Fl. Lib. Spec. 67.—Italia.
coronopifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 85 ;
 Fl. Graec. ii. 13. t. 114 = crenata.
coronopifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521
 = ceratophylla.
cosmoides, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 113.—Graec.
crassicaulis, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 218
 = S. Columbaria.
crenata, Cyrill. Pl. Rar. Neap. i. 11. t. 3.—Reg.
 Mediterr.

SCABIOSA :—

crenata, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 28 (Quid ?).—
 Rossia.
cretacea, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 93 = Ceph-
 alaria corniculata.
cretica, Linn. Sp. Pl. 100.—Ins. Creta ; Sicil.
cretica, Willch. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 53 =
 plumosa.
crinita, Kotschy & Boiss. in Boiss. Fl. Orient. iii. 133.
 —Kurdistan.
Cupani, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 160 = maritima.
Dahuriae, Fisch. ex DC. Prod. iv. 658 = Fischeri.
Dallaportae, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 138.—Ins.
 Cephalon.
daucoides, Desf. Fl. Atlant. i. 23. t. 28.—Alger.
davurica, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521 =
 isetensis.
decemariata, Portenschl. ex Schult. Mant. iii. 36 =
 brachiata.
decurrens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 80 =
 Cephalaria graeca.
decurrens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 28 = Cephalaria
 attenuata.
diandra, Lag. in Varied. Cienc. ii. iv. (1805) 39 =
 papposa.
dichotoma, Lam. Illustr. i. 249 = Cephalaria syriaca.
dichotoma, Ucria, in Roem. Arch. i. 1. (1796) 68.
 —Mauritan. ; Sicil.
diffusa, Reichb. Hort. Bot. i. 13. t. 16.—Ins. Canar.
dipsacifolia, Host, Fl. Austr. i. 191 = sylvatica.
dipsacoides, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. 229,
 nomen.—As. Min.
dissecta, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 465 = gramuntia.
divaricata, Clarke, Trav. ii. 644 = papposa.
divaricata, Jacq. Hort. Vindob. i. 5 = ucranica.
divaricata, Lam. Illustr. i. 250 = rutaeifolia.
diversifolia, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 75 =
 banatica.
dubia, Moench, Enum. Pl. Indig. Hass. 62 = arvensis.
dumetorum, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol.
 146.—Ins. Canar.
eburnea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 82 ; Fl.
 Graec. ii. 7. t. 106 = ucranica.
elata, Hornem. Hort. Hafn. i. 126 = Cephalaria
 tatarica.
elegans, Spreng. Pugill. ii. 24 = caucasica.
eremophila, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 79.—Arab.
fenestrata, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 63 = arenaria.
fimbriata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 19 =
 palaestina.
Fischeri, DC. Prod. iv. 658.—Dahuria.
flava, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 356 = Ceph-
 alaria graeca.
flavescens, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii.
 (1852) 1. 350 = ochroleuca.
flavida, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. iii. 141.
 —Persia.
Fleischmanni, Hladn. ex Nym. Consp. 347 = arvensis.
Frivaldskyi, Steud. Nom. ed. II. ii. 525 = ambigua.
frutescens, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 252.—
 Afr. trop.
frutescens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 =
 cretica.
fruticulosa, C. Sm. ex DC. Prod. iv. 654.—Ins.
 Canar.
fumarioides, Vis. & Panč. in Mem. Ist. Venet. xii.
 (1864) 466.—Banat.
Fussiana, Schur, Enum. Pl. Transs. 962 (Index) =
 Cephalaria radiata.
Gemonae, D. Dietr. Syn. Pl. i. 452 = humilis.
gigantea, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1811) 4 =
 Cephalaria tatarica.
glabrata, Schott, in Roem. & Schult. Syst. iii. 61 =
 S. Succisa.
glabrescens, Jord. Pugill. Pl. Nov. 82 = lucida.
Gmelini, [Honck.] Verz. Aller Gew. Deutschl. 397
 (Quid ?).—Europ.
Gmelini, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. iii. (1812)
 149 ; et in Journ. Phys. lxxv. (1812) 433 = ucranica.
gracilis, Boiss. Fl. Orient. iii. 135 = semipapposa.
gracilis, Roem. & Schult. Syst. iii. 61 = gramuntia.
graeca, D. Dietr. Syn. Pl. i. 447 = Cephalaria graeca.
graminifolia, Linn. Cent. Pl. i. 6 ; Amoen. Acad. iv.
 267.—Europ. austr.
gramontia, Linn. Sp. Pl. ed. II. 148 = gramuntia.
gramuntia, Brot. Fl. Lusit. i. 145 = lusitanica.
gramuntia, Linn. Syst. ed. X. 889.—Reg. Mediterr.
gramuntiana, Gouan, Hort. Monsp. 62 = praec.

SCABIOSA :—

grandiflora, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 160 = S. Cornucopia.
grandiflora, Scop. Delic. Insub. iii. 29. t. 14 = mari-
 tima.
grandiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 525 = caucasica.
Guitardi, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864)
 p. lxxxviii, in textu = lucida.
gumbetica, Boiss. Fl. Orient. iii. 137.—Reg. Caucas.
Gussonii, Tineo, ex Nym. Consp. 342 = crenata.
Hacquetii, Lam. Illustr. i. 250 = Cephalaria tran-
 sylvanica.
Heraclea, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521 ;
 (sp. dub.).—Fret. Gadit.
heterophyllos, S. G. Gmel. It. i. 150. t. 28 ; ex J. F.
 Gmel. Syst. 229 = ochroleuca.
heterotricha, Opiz, in Lotos, ii. (1852) 229 (Quid ?).—
 Europ.
hirsuta, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 59 = arvensis.
hirsuta, [Mazziari], in Ionios, Anthol. iii. (1834) 691 =
 S. Succisa.
hirta, Willd. in Roem. & Schult. Syst. iii. 521 =
 ucranica.
hispanica, Willd. l. c.—Hispan.
hispidula, Portenschl. ex Roem. & Schult. l. c. 58 =
 ciliata.
hispidula, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 112.—Graecia ; As.
 Min.
Hladnikiana, Host, Fl. Austr. i. 195 = lucida.
holosericea, Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec. iii. 49.—Europ.
 austr.
holosericea, DC. Fl. Fr. Suppl. 489 = lucida.
holosericea, Panč. ex Nym. Consp. 343 = ochroleuca.
Hookeri, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.
 218.—Reg. Himal.
Hornemannii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 38.—Hab. ?
humilis, Host, Fl. Austr. i. 195.—Carniol.
humilis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 28 = Cephalaria
 attenuata.
hybrida, All. Auct. Fl. Pedem. 9 = integrifolia.
hybrida, Bouch. Fl. Abb. 12 ; ex Roem. & Schult.
 Syst. iii. 54 = arvensis.
hymettia, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. ii. 111.
 —Graecia.
hyrcanica, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856)
 ii. 370, in textu.—Reg. Caucas.
incana, Roem. & Schult. Syst. iii. 521 = suaveolens.
incana, Willd. ex Roem. & Schult. l. c. = ucranica.
incisa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 18 = africana.
indurata, Linn. Mant. ii. 196 = africana.
inflexa, Kluk, in Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 336 =
 australis.
integrata, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 88 = mari-
 tima.
integrifolia, [Honck.] Verz. Aller Gew. Deutschl. 383
 (Quid ?).—Germania.
integrifolia, Linn. Sp. Pl. 99.—Graec. ; As. Min.
integrifolia, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 164 = arvensis.
integrifolia, Savi, Fl. Pisan. i. 162 = sylvatica.
intermedia x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Granb.
 II. xxiii-xxiv. (1880) 114.—Europ.
intermedia, Roem. & Schult. Syst. iii. 76 = lusitanica ?
involuta, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 84 ;
 Fl. Graec. ii. 11. t. 112 = papposa.
isetensis, Colm, Cat. Pl. Catal. 76 = pulsatiloides.
isetensis, Linn. Mant. i. 37.—Reg. Caucas. ; As. bor.
Jacquini, Roem. & Schult. Syst. iii. 77, in obs. =
 stellata.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 113.—
 Japon.
joppensis, Reichb. Hort. Bot. i. 13. t. 17 = Cephalaria
 joppensis.
Jordani, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864)
 p. lxxxviii, in textu = pyrenaica.
Kitaibeli, Schult. Obs. Bot. 18 = ciliata.
laciniata, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 87 = S.
 Columbaria.
laciniata, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 28 = praec. ?
laevigata, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 255 =
 Cephalaria corniculata.
lanata, Hill, Veg. Syst. v. 46.—Afr. austr.
lasiosperma, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448 = fruticulosa.
lasiosperma, Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x.
 (1881) 193.—Ins. Canar.
laxiflora, Willd. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 128 =
 pyrenaica.
legionensis, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9.—Hispan.
leiocephala, Hoppe, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl.
 i. 754 = gramuntia.

SCABIOSA :—

- leptopoda*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 78 = arenaria.
leucantha, Linn. Sp. Pl. 98 = *Cephalaria leucantha*.
leucanthema, Frivald. ex Nym. Consp. 346 = *Cephalaria graeca*.
leucanthema, Hill, Veg. Syst. v. 39. t. 20. — Gallia.
leucocephala, Link, Handb. i. 856 (Index) = *Cephalaria leucantha*.
limonifolia, Vahl, Symb. Bot. ii. 27. — Sicilia.
linifolia, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 36 = rotata.
lobata, Nym. Consp. 343 = stellata.
longepedunculata, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II (1812), 43, nomen = amoena.
longifolia, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 4. — Europ.
Loretiana, Timb. ex Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxii = gramuntia.
lucida, Ait. Hort. Kew. ed. II. i. 229 = nitens.
lucida, Vill. Prosp. 18; Hist. Pl. Dauph. ii. 293. — Europ.
lusitanica, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448. — Lusitan.
lutea, Hort. ex Loud. Hort. Brit. i. 44. — Rossia.
lutescens, Gilib. Fl. Lituan. i. 169 = ochroleuca.
lycia, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, i. (1885) 109. — As. Min.
lyrata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 203 = sicula.
lyrata, Lam. Illustr. i. 250 = integrifolia.
lyrophylla, Vis. in Mem. Ist. Venet. xv. (1870) t. 19 (Pl. Serb.) = seq.
macedonica, Vis. l. c. 12. — Graecia.
macrochaete, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 143. — Persia.
macropoda, Costa, ex Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 103 = pulsatilloides.
major, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 786 = atropurpurea.
maritima, Lag. Elench. Hort. Madrit. (1808); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 8. n. 111 = lusitanica?
maritima, Linn. Cent. Pl. ii. 8; Amoen. Acad. iv. 304. — Reg. Mediterr.; Ins. Canar.
maritima, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = S. Columbaria.
maritima, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 295 = pyrenaica.
maritima, Wulf. in Roem. Arch. iii. 111. (1805) 317 = ucranica.
mediterranea, Viv. App. Fl. Cors. Prod. 1 = *Cephalaria leucantha*.
micrantha, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 168. — Serbia; Reg. Caucas.; Armen.
microcephala, Nym. Syll. 59. — Hispan.
mixta, De Not. Prosp. Fl. Ligust. 52. — Liguria.
moldavica, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 58 = integrifolia.
mollis, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 27 = pyrenaica.
mollis, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 7 = gramuntia.
mollissima, DC. Fl. Fr. Suppl. 490 = pyrenaica.
mollissima, Viv. Ann. Bot. i. 11. (1804) 161 = gramuntia.
monspeliaca, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 727. — Tauria.
monspeliensis, DC. Prod. iv. 655 = stellata.
monspeliensis, Jacq. Misc. ii. 320 = praec.?
montana, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 95. — As. Min.; Reg. Ural.
montana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = arvensis.
montana, Schur, ex Nym. Consp. 343 = ochroleuca.
multisetia, Vis. Stirp. Dalm. Rar. 1. t. 1 = brachiata.
neglecta, Hornem. Hort. Hafn. i. 127. — Italia.
nitens, Roem. & Schult. Syst. iii. 82. — Ins. Azores.
nitida, Bernh. ex Roem. & Schult. l. c. 68 = amoena.
nivea, Agardh, ex Roem. & Schult. l. c. 81. — Hispan.
norica, Vest, in Bot. Zeit. Regensb. iv. (1805) 40 = lucida.
nudicaulis, Lam. Illustr. i. 252 = S. Columbaria.
nudicaulis, Sieber, Reise Kreta, ii. 321 = sphaciotica.
ochroleuca, Linn. Sp. Pl. 101. — Europ.; As. bor.
ochroleuca, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = S. Columbaria.
odontostemma, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 145 = palaestina.
odora, Salisb. Prod. 55 = maritima.
officinarum arvensis, Crantz, Inst. i. 352 = arvensis.
Olivieri, Coult. Mém. Dipsac. 36. t. 2. f. 10. — Arab.; Persia; Afghan.; Soongar.
orientalis, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9. — Oriens.
orophila, Timb. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxi = S. Columbaria.
ovatifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9 = sylvatica.
Owerini, Boiss. Fl. Orient. iii. 133. — Reg. Caucas.
palaestina, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448 = brachiata.

SCABIOSA :—

- palaestina*, Linn. Mant. i. 37. — As. Min.; Syria; Persia.
pallida, Láng, ex Nym. Consp. 343, 344 = ochroleuca, banatica.
pallida, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 218 = S. Columbaria.
pallida, Salisb. Prod. 55 = cretica.
pannonica, Jacq. Enum. Vindob. 22 = sylvatica.
papposa, Gaertn. Fruct. ii. 38. t. 86. f. 4 = plumosa.
papposa, Linn. Sp. Pl. 101. — Ins. Cyprus; Syria; Persia.
parviflora, Desf. Fl. Atlant. i. 119 = dichotoma.
patens, Jord. Pugill. Pl. Nov. 94 = S. Columbaria.
pauciseta, DC. Prod. iv. 658 = gramuntia.
pectinata, Lag. Elench. Fl. Madrit. (1803) 33; ex ej. Gen. et Sp. Nov. 8. n. 108. — Arab.
permixta, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 319 = S. Columbaria.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 81 = palaestina.
phrygia, Boiss. l. c. Ser. II. vi. 96 = palaestina.
pilosa, Roem. & Schult. Syst. iii. 80 = ucranica.
pinnata, Gueldenst. Reisen, ii. 10 (Quid?). — Rossia.
plumosa, Link, in Schrad. Neues Journ. ii. (1807) 11. 300 = lusitanica.
plumosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 84; Fl. Graec. ii. 11. t. 111. — Graecia; Syria; Persia.
polymorpha, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 76 = arvensis.
polymorpha, Weigel, Obs. 23 = S. Columbaria, ochroleuca.
porphyrostephana, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 146 = rotata.
praemorsa, Gilib. Fl. Lituan. i. 168 = S. Succisa.
pratensis, Jord. Pugill. Pl. Nov. 91 = S. Columbaria.
pratensis, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 78 = arvensis.
procera, Salisb. Prod. 55 = africana.
prolifera, Linn. Syst. ed. X. 889. — Syria; Ins. Cyprus.
prolifera, [Mazziari,] in Ionios, Anthol. iii. (1834) 691 = S. Succisa.
propontica, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9. — As. Min.
Pseudoaustralis, Roem. & Schult. Syst. iii. 61 = australis.
Pseudo-banatica, Schnr, Enum. Pl. Transs. 300 = lucida.
Pterocephala, Linn. Sp. Pl. 100. — Graecia.
pubescens, Jord. Pugill. Pl. Nov. 90 = lucida.
pubescens, Wahlb. Fl. Carpat. 38 = ciliata.
pubescens, Waldst. & Kit. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 57 = collina.
pulsatilloides, Boiss. Elench. 58. — Hispan.
pumila, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 4 = S. Columbaria.
pyrenaica, All. Fl. Pedem. i. 140. t. 25. — Europ. austr.
pyrenaica, Hornem. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 38 = Hornemanni.
pyrenaica, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 48 = amoena.
radiata, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 78 = arvensis.
repens, Brign. Fasc. Pl. Forojul. 19 = australis.
repens, [Honck.] Verz. Aller Gew. Tentschl. 397 (Quid?). — Germania.
Reuteriana, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 112. — Caria.
reversa, Ledeb. Ind. Hort. Dorpat. Suppl. (1824) 6. — Sibir.
rhizantha, Viv. Fl. Lib. Spec. 6. t. 3 = arenaria.
rhodantha, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 435 = Olivieri.
rigida, Linn. Pl. Rar. Afr. 8; in Amoen. Acad. vi. 84 = *Cephalaria rigida*.
rigida, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *Cephalaria leucantha*.
rosea, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 526 = maritima.
rotata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 102. — As. Min.; Persia.
rubella, Opiz, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 751; et Natural. viii. (1824) 76 = S. Columbaria.
rupestris, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 95 = isetensis.
rutaefolia, Vahl, Symb. Bot. ii. 26. — Reg. Mediterr. occ.
ruthenica, Tchertkoff, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 16, nomen. — Ross. centr.
Salcedi, Lag. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 55. — Hispan.
Saviana, Reichb. Hort. Bot. i. 38. t. 53 = maritima.
saxatilis, Cav. Ic. ii. 68. t. 184. — Hispan.
scabra, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = *Cephalaria scabra*.
Schimperiiana, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 112 = palaestina.

SCABIOSA :—

- schizopetala*, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 145 = palaestina.
Scopolii, Link, Enum. Hort. Berol. i. 128. — Europ. austr.
scrophulariaefolia, Boiss. Fl. Orient. iii. 133 = crinita.
semipapposa, Salz. ex DC. Prod. iv. 658. — Reg. Mediterr. occ.
sericea, Jord. Pugill. Pl. Nov. 98 = graminifolia.
serrata, Lam. Illustr. i. 249 = integrifolia.
setifera, Lam. l. c. 251. — Europ. austr.
setulosa, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 31 = palaestina.
sibirica, Lam. Illustr. i. 249 = *Cephalaria syriaca*.
Sibthorpiana, Sibth. & Sm. Prod. Fl. Graec. i. 84; Fl. Graec. ii. 10. t. 110 = brachiata.
sicula, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98 = micrantha.
sicula, Linn. Mant. ii. 196. — Europ. austr.; As. Min.
silenifolia, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 170. — Europ.
simplex, DC. Fl. Fr. iv. 231 = stellata.
simplex, Desf. Fl. Atlant. i. 125. — Afr. bor.
solitaria, [Mazziari,] in Ionios, Anthol. iii. (1834) 698. — Ins. Corcyra.
songarica, Schrenk, Enum. Pl. Nov. i. 55. — Sibir.
spathulata, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448. — Hispan.
spathulata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 369. — Europ.
speciosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 245. t. 55. f. 2. — Reg. Himal.
sphaciotica, Frivald. ex Nym. Consp. 341 = S. Pterocephala.
sphaciotica, Roem. & Schult. Syst. iii. 86. — Ins. Creta.
sphakiottica, Sieber, Herb. Cret. 2, nomen = praec.?
spretia, Jord. Pugill. Pl. Nov. 92 = S. Columbaria.
squamaeflora, Sieber, ex Schult. Mant. iii. 45 (Quid?). — Hab.?
stellaris, Salisb. Prod. 54 = stellata.
stellata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98 = rotata.
stellata, Linn. Sp. Pl. 100. — Reg. Mediterr. occ.
stellata, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98, in syn. = micrantha.
stellata, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 76 = ochroleuca.
stricta, Seidel, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 55, in syn. = arvensis.
stricta, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 147 = lucida.
styriaca, Vest, in Flora, iv. (1821) 146. — Styria.
suaveolens, Desf. Tabl. ed. I. 110. — Europ.; As. Min.
subescens, Reichb. Ic. Fl. Germ. xxii. 18 (err. typ.) = *pubescens*.
subpubescens, Hort. ex Schult. Mant. iii. 28 = arvensis.
Succisa, Linn. Sp. Pl. 98. — Europ.; As. bor. trop. & austr.
sulphurea, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. ii. 123. — Armenia.
sylvatica, Linn. Sp. Pl. ed. II. 142. — Europ.; Reg. Caucas.
sympaganthera, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 49 = Calycera balsamitaefolia.
syriaca, D. Dietr. Syn. Pl. i. 451, sphalm. = styriaca.
syriaca, Linn. Sp. Pl. 98 = *Cephalaria syriaca*.
syriaca, Urv. ex Coult. Mém. Dips. 25 = *Cephalaria transylvanica*.
tatarica, Hahl. Phys. Besch. Taur. 154 = *Cephalaria corniculata*.
tatarica, Hornem. Hort. Hafn. i. 126 = montana.
tatarica, Linn. Sp. Pl. 99 = *Cephalaria tatarica*.
tatarica, Lumnitz, Fl. Poson. 55 = ciliata.
tatarica, Viv. ex Coult. Mém. Dips. 25 = *Cephalaria transylvanica*.
taygetea, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 73. — Graecia.
tennifolia, Frivald. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 527 = triniaefolia.
tenuifolia, Lag. Elench. Hort. Madrit. (1803); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 8. n. 111 = Insitanica?
tenuifolia, Presl, Symb. Bot. i. 20. t. 12. — Hab.?
tenuifolia, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 59 = ochroleuca.
tenuifolia, Savi, Bot. Etrusc. i. 122 = gramuntia.
tenuifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521 = ucranica.
tenuis, Sprun. in Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 114. — Graecia.
tenuisecta, Jord. Pugill. Pl. Nov. 96 = gramuntia.
Thunbergii, Roem. & Schult. Syst. iii. 76, in nota = S. Columbaria.

SCABIOSA :—

- Timeroyi*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 401 = *sylvatica*.
tmolca, Boiss. Fl. Orient. iii. 139 = *ucranica*.
tolosana, Timb. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxi = *S. Columbaria*.
tomentosa, Cav. Ic. ii. 66. t. 183. — Hispan.
tomentosa, J. F. Gmel. Syst. 229 = *pyrenaica*.
tomentosa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 218 = *Buekiana*.
tomentosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 85 = *sphaciatica*.
transsilvanica, Sprun. ex Nym. Consp. 343 = *maritima*.
transylvanica, All. Fl. Pedem. i. 138 = *Cephalaria corniculata*.
transylvanica, Linn. Sp. Pl. 98 = *Cephalaria transylvanica*.
transylvanica, Sieber, ex DC. Prod. iv. 648 = *Cephalaria joppensis*.
trenta, Hacq. Pl. Alp. 14. t. 4 = *Cephalaria transylvanica*.
triandra, Linn. Sp. Pl. 99 = *gramuntia*.
trichotoma, Moench, Meth. 490 = *integrifolia*.
trifida, Thunb. Prod. Pl. Cap. 28 = *Cephalaria attenuata*.
triniaeifolia, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 333. — Graecia; Rumelia.
Triumfetti, Moretti, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 61 = *australis*.
trivialis, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 78 = *arvensis*.
turicensis ×, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 114. — Europ.
ucranica, Linn. Syst. ed. X. 889. — Europ.; As. Min.; Persia.
uniflora, [Mazzari], in Ionios, Anthol. iii. (1834) 698. — Ins. Corcyra.
uniseta, Savi, Fl. Pisan. i. 167 = *gramuntia*.
uralensis, Murr. in Comm. Gotting. (1782) 13. t. 4 = *Cephalaria corniculata*.
uralensis, Willd. Sp. Pl. i. 551; et ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 447 = *Cephalaria tatarica*.
urceolata, Desf. Fl. Atlant. i. 122 = *rutaefolia*.
Urvillei, D. Dietr. Syn. Pl. i. 447 = *integrifolia*.
ustulata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = *Cephalaria corniculata*.
Vahlia, Coult. Mém. Dips. 35. t. 2. f. 6 = *palaestina*.
Vaillantii, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 99 = *Cephalaria syriaca*.
varia, Gilib. Fl. Lituan. i. 167 = *arvensis*.
variifolia, Boiss. Fl. Orient. iii. 137. — Ins. Rhodus.
velutina, Jord. Pugill. Pl. Nov. 87 = *pyrenaica*.
venusta, Hort. Bonon. ex Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. (1867) 93, nomen. — Hab. ?
verbascifolia, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 459. — Gallia.
verbenacea, Lam. Illustr. i. 250 = *Cephalaria attenuata*.
vestina, Facc. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 447; et in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. iv. (1854) 13. — Europ.
vestita, Jord. Pugill. Pl. Nov. 86 = *pyrenaica*.
villosa, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 383 (Quid ?). — Germania.
villosa, Schousb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 527, nomen. — Maroc.
virens, Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 194. — Ins. Canar.
virescens, Nym. Consp. 342 = *graminifolia*.
Virga-pastoris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *suaveolens*.
vivipara, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 527 (Quid ?). — Hab. ?
Webbiana, D. Don, in Bot. Reg. t. 717 = *ochroleuca*.
Willkii, Link, in Schrad. Neues Journ. ii. (1807) II. 299 = *plumosa*.
Wulfeniana, Hort. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. 24 = *maritima*.
Wulfenii, Roem. & Schult. Syst. iii. 76, in nota = *ucranica*.

SCABRITA, Linn. Mant. i. 3 (1767) = **Nyctanthus**, Linn. (Oleac.).
scabra, Linn. Syst. ed. XII. 115 = *N. Arbor-tristis*.
triflora, Linn. Mant. i. 37 = *N. Arbor-tristis*.

SCADIANUS, Rafin. Atl. Journ. 164 (1833) = **Crinum**, Linn. (Amaryll.).
multiflorus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 = *C. americanum*.

SCADOXUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 19 (1836) = **Hæmanthus**, Tourn. (Amaryll.).
multiflorus, Rafin. l. c. = *H. multiflorus*.

SCADUAKINTOS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 (1836) = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
umbellaris, Rafin. l. c. = *B. lactea*.

- SCAEVOLA**, Linn. Mant. ii. 145 (1771). *GOODE-NOVIEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 539.
BAUDINIA, Lesh. ex DC. Prod. vii. 511 (1839).
CAMPUSIA, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. i. (1851) 148, partim.
CERBERA, Lour. Fl. Cochinch. 136 (1790).
CROSSOTOMA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 583 (1840).
GLYPHA, Lour. ex Endl. Gen. 506, in syn. (1838).
HEMICHARIS, Salisb. ex DC. Prod. vii. ii. 510 (1839).
LOBELIA, Adans. Fam. ii. 157 (1763).
MERKUSIA, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. i. (1851) 150.
MOLKENBOERIA, De Vriese, in Nat. Verh. Haarl. x. (1854) 38. t. 7.
POGONANTHERA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 583 (1840).
POGONETES, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 443. (1836).
ROEMERIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 24 (1818).
TEMMINCKIA, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. i. (1851) 141, partim.
XEROCARPA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 583 (1840).
acmula, R. Br. Prod. 584 = *saligna*.
amblyanthera, F. Muell. Fragm. i. 121. — Austral.
amboinensis, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 210. — Ins. Amboin.
anchusaefolia, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 68. — Austral.
angulata, R. Br. Prod. 586. — Austral.
apteranthera, F. Muell. Fragm. i. 121. — Austral.
atriplicina, F. Muell. l. c. ii. 18. — Austral.
attenuata, R. Br. Prod. 583. — Austral.
auriculata, Benth. Fl. Austral. iv. 99. — Austral.
Bela-Modagani, Roem. & Schult. Syst. v. 163 = *Koenigii*.
Benthamea, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 411 = *striata*.
Billardieri, D. Dietr. Syn. Pl. i. 786 = *Koenigii*.
Brookeana, F. Muell. in Vict. Natural. i. (Dec. 1884) 122. — Austral.
caespitosa, R. Br. Prod. 585 = *globulifera*.
calliptera, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 70 = *striata*.
Candollei, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 405 = *platyphylla*.
cancscens, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 69. — Austral.
Chamissoniana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 461. t. 82. — Ins. Sandvic.
chlorantha, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 137 = *Koenigii*.
ciliata, G. Don, Gen. Syst. iii. 728 = *Chamissoniana*.
clandestina, F. Muell. Fragm. i. 206 = *Diaspasis filifolia*.
collaris, F. Muell. Rep. Bab. Exped. 15. — Austral.
coriacea, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 253. — Polynes.
Corsoniana, G. Don, in Loud. Gard. Mag. xviii. (1842) 370. — Ins. Molucc.
crassifolia, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 56. t. 78. — Austral.
cumana, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 35. — Am. centr.
cuneiformis, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 56. t. 80. — Austral.
Cunninghamii, DC. Prod. vii. 508. — Austral.
Cunninghamii, Steud. Nom. ed. II. ii. 527, partim = *Hymenanthera crassifolia*.
depauperata, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 83. — Austral.
depressa, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410 = *longifolia*?
Drummondii, DC. Prod. vii. 508 = *nitida*.
enanthophylla, F. Muell. Fragm. viii. 58. — Austral.
fasciculata, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 68. — Austral.
fastigiata, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 406 = *nitida*.
flaccida, De Vriese, l. c. 407 = *thesioides*.
floribunda, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 152. — Ins. Fiji.
Gaudichaudi, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 89. — Ins. Sandvic.

SCAEVOLA :—

- Gaudichaudiana*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 226 = *Chamissoniana*.
geniculata, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 404 = *Goodenia geniculata*.
glabra, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 89. — Ins. Sandvic.
glandulifera, DC. Prod. vii. 510. — Austral.
glaucescens, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410 = *canescens*.
globulifera, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 55. t. 79. — Austral.
goodeniacea, F. Muell. Fragm. i. 121 = *Catosperma Muelleri*.
gracilis, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 129. — Ins. Kermadec.
grandiflora, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 70 = *Leschenaultia linarioides*.
Groeneri, F. Muell. Fragm. vi. 15. — Austral.
hainanensis, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 229. — China.
hispida, Cav. Ic. vi. 7. t. 510. — Austral.
holosericea, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 408. — Austral.
Hookeri, F. Muell. ex Hook. f. Fl. Tasm. i. 231. t. 67. — Australia.
humifusa, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410. — Austral.
humilis, R. Br. Prod. 585. — Austral.
ivaefolia, L'Hérit. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 325. — Ins. Trinit.
Koenigii, Vahl, Symb. Bot. iii. 36. — Reg. trop.
laevigata, Pers. Syn. i. 195 = *microcarpa*.
Lambertiana, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 139 = *Koenigii*.
lanceolata, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 69. — Austral.
lasiantha, F. Muell. Fragm. i. 207 = *lanccolata*.
lativaga, Hance, in Walp. Ann. ii. 1054 = *Koenigii*.
Leschenaultii, DC. Prod. vii. 506 = *Koenigii*.
ligustrifolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 253 = *Chamissoniana*.
linearis, R. Br. Prod. 586. — Austral.
Lobelia, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 250 = *Koenigii*.
Lobelia, Murr. Syst. ed. XIII. 178; Thunb. Prod. Pl. Cap. 38. — Reg. trop.
longifolia, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410. — Austral.
lycioides, DC. Prod. vii. 512 = *spinescens*.
lyratifolia, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 405 (al. gen. ?). — Austral.
Macraei, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. i. (1851) 30 = *S. Lobelia*.
macrocalyx, De Vriese, l. c. 138 = *Koenigii*.
macrodonata, DC. Prod. vii. 511 = *striata*?
macrophylla, Benth. Fl. Austral. iv. 98. — Austral.
macropoda, DC. Prod. vii. 509 = *striata*.
macrostachya, Benth. Fl. Austral. iv. 97. — Austral.
Maitlandi, F. Muell. in Trans. Bot. Soc. Edinb. vii. (1863) 497; et in Edinb. N. Phil. Journ. N. S. xvii. (Jan.-Apr. 1863) 231 = *Cunninghamii*.
membranacea, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 69 = *villosa*?
Menziesiana, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 227 = *Chamissoniana*.
micrantha, Presl, Rel. Haenk. ii. 58. — Ins. Philipp.
microcarpa, Cav. Ic. vi. 6. t. 509. — Austral.
microphylla, Benth. Fl. Austral. iv. 100. — Austral.
mollis, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 89. — Ins. Sandvic.
montana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 460 = *Gaudichaudi*.
montana, Labill. Sert. Austro-Caled. 41. t. 42 = *Koenigii*.
multiflora, Lindl. Swan River App. 26 = *nitida*.
nitida, R. Br. Prod. 584. — Austral.
Novae-Zelandiae, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 52 = *Hymenanthera crassifolia*.
Oldfieldii, F. Muell. Fragm. ii. 19. — Austral.
oleoides, DC. Prod. vii. 512 = *spinescens*.
oppositifolia, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 528. — Ins. Molucc.
ovalifolia, R. Br. Prod. 584. — Austral.
oxyclona, F. Muell. Fragm. x. 58. — Austral.
pallida, R. Br. Prod. 585 = *microcarpa*.
paludosa, R. Br. l. c. 586. — Austral.
paniculata, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 407 = *thesioides*.

SCAEVOLA:—

- parvifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* iv. 91.—Anstral.
- patens, *F. Muell. Fragm.* iii. 33 = depauperata.
- phlebotopetala, *F. Muell. l. c.* ii. 18.—Austral.
- piliplena, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 581.—Java.
- pilosa, *Benth. in Enum. Pl. Hueg.* 69; *DC. Prod.* vii. 511.—Anstral.
- platyphylla, *Lindl. Swan River App.* 26.—Anstral.
- plumerioides, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* viii. (1843) 252 = Koenigii.
- Plumieri, *Blume, Bijdr.* 730 = Koenigii.
- Plumieri, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 36 = *S. Lobelia*.
- polystachya, *DC. Prod.* ii. 508 = thesioides.
- porocarya, *F. Muell. Fragm.* ii. 19.—Austral.
- prostrata, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 406 = *Dampiera diversifolia*.
- pterosperma, *De Vriese, l. c.* i. 408 = *Goodenia incana*.
- pubescens, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* viii. (1843) 253 = *Chamissoniana*.
- pusilla, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 412 = *Goodenia tenella*.
- Reinwardtii, *De Vriese, l. c.* 409 = *Verreanxia Reinwardtii*.
- repens, *De Vriese, l. c.* 406 = paludosa.
- restiacea, *Benth. Fl. Austral.* iv. 91.—Austral.
- revoluta, *R. Br. Prod.* 586.—Austral.
- rufa, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 405 = glandulifera.
- saligna, *Forst. f. Prod.* 89.—N. Caled.
- semiamplexicaulis, *DC. Prod.* vii. 509 = platyphylla.
- semiamplexicaulis, *De Vriese, in Nat. Verh. Haarl. x.* (1854) 41 = auriculata.
- senegalensis, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 59 = *S. Lobelia*.
- sericea, *Forst. f. Prod.* 89; *Vahl, Symb. Bot.* ii. 37 = Koenigii.
- sericophylla, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* iv. 102.—Austral.
- Sieberi, *De Vriese, in Nat. Verh. Haarl. x.* (1854) 33 = *S. Lobelia*.
- sinuata, *R. Br. Prod.* 584 = saligna.
- sphaerocarpa, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 409 = holosericea.
- spinescens, *R. Br. Prod.* 586.—Austral.
- squarrosa, *Lindl. Swan River App.* 26 = thesioides.
- stenophylla, *Benth. Fl. Austral.* iv. 104.—Austral.
- striata, *R. Br. Prod.* 586.—Austral.
- stricta, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 408 = *Goodenia scapigera*.
- stricta, *Roem. & Schult. Syst.* v. 167, sphalm. = striata.
- suaveolens, *R. Br. Prod.* 585.—Austral.
- Taccada, *Roxb. Hort. Beng.* 15; *Fl. Ind.* i. 527 = Koenigii.
- tenera, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 409 = *Goodenia caerulea*.
- thesioides, *Benth. in Enum. Pl. Hueg.* 68.—Austral.
- Thunbergii, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 387 = *S. Lobelia*.
- tomentosa, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 460. t. 81.—Austral.
- torutuosa, *Benth. Fl. Austral.* iv. 91.—Austral.
- Tournoa, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 10 (Quid?).—Hab.?
- trinervia, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 407 = canescens.
- umbellata, *De Vriese, l. c.* 411 = *Goodenia filiformis*.
- uvifera, *Stocks, in Wight, Ic.* t. 1613 = *S. Lobelia*.
- velutina, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 58 = Koenigii.
- Verreauxii, *F. Muell. Bot. Teachings* (1877), 65.—Austral.

- SCALESIA**, *Arn. in Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 443 (1836). *COMPOSITAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 367.
- affinis, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 212.—Ins. Galapag.
- aspera, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 180.—Ins. Galapag.
- atractylodes, *Arn. in Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 443.—Ins. Galapag.
- Darwinii, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 211.—Ins. Galapag.
- decurrens, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 182.—Ins. Galapag.
- devisa, *Anderss. l. c.* 179.—Ins. Galapag.
- gummifera, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 212.—Ins. Galapag.
- incisa, *Hook. f. l. c.* 210.—Ins. Galapag.

SCALESIA:—

- ovata, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855), 181.—Ins. Galapag.
- pedunculata, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 211.—Ins. Galapag.

- SCALIA**, *Sims, Bot. Mag.* t. 956 (1806) = **Podolepis**, *Labill. (Compos.)*.
- jaceioides, *Sims, l. c.* = *P. acuminata*.

- SCALIGERA**, *Adans. Fam.* ii. 323 (1763) = **Aspalathus**, *Linn. (Legumin.)*.
- orientalis, *Rafin. Sylva Tellur.* 69 = *A. orientalis*.

- SCALIGERIA**, *DC. Coll. Mém.* v. 70 (1829); *Prod.* iv. 248 (1830) = **Conopodium**, *Koch (Umbell.)*.
- cretica, *Boiss. Diagn. Ser. I. x.* 52 (= *Bunium creticum*, *Urv.*).—Europ. austr.
- elata, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 877 (= *Elaeosticta meifolia*).—Syria; Mesopot.
- glaucescens, *Boiss. l. c.* (= *Elaeosticta glaucescens*).—Persia.
- lazica, *Boiss. l. c.* 876.—As. Min.
- meifolia, *Boiss. l. c.* (= *Elaeosticta meifolia*).—As. Min.; Syria.
- microcarpa, *DC. Prod.* iv. 249 (= *Bunium creticum*, *Urv.*).—Oriens.
- nodosa, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 878 (= *Elaeosticta nodosa*).—Persia.
- podagrarioides, *Boiss. l. c.* 876.—As. Min.
- rotundifolia, *Boiss. l. c.* = *Pimpinella rotundifolia*.
- Tournefortii, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 70 (= *Bunium creticum*, *Urv.*).—Graecia.

- SCALIOPSIS**, *Walp. in Linnaea*, xiv. (1840) 318 = **Podolepis**, *Labill. (Compos.)*.
- Lucaeana, *Walp. l. c.* = *P. longipedata*.

- SCANDALIDA**, *Adans. Fam.* ii. 326 (1763) = **Lotus**, *Tourn. (Legumin.)*.
- flava, *Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 384 = *L. siliculosus*.
- rubra, *Medic. l. c.* = *L. Tetragonolobus*.
- siliquosa, *Medic. Phil. Bot.* i. 205 = *L. siliculosus*.
- tetragonoloba, *Medic. l. c.* = *L. Tetragonolobus*.

- SCANDEDERIS**, *Thou. Orch. Isles Afr.* 3^{me} Tabl. (1822) = **SCAREDERIS**, *Thou.* = **Dendrobium**, *Sw. (Orchid.)*.
- scandens, *Thou. l. c.*—Ins. Maurit.

SCANDIX, *Tourn. ex Linn. Syst.* ed. I (1735).

- UMBELLIFERAE**, *Benth. & Hook. f.* i. 899.
- CYCLOTAXIS**, *Boiss. Diagn. Ser. I. x.* 48 (1849).
- DASYSPERMUM**, *Neck. Elem.* i. 276 (1790), partim.
- PECTEN**, *Lam. Fl. Fr.* iii. 437 (1778).
- WYLIA**, *Hoffm. Gen. Umb.* 3. t. 2 (1814).
- aegyptiaca, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 528 (Quid?).—Hab.?
- affinis, *Hort. ex Boiss. l. c.* ii. 915 = *macrorrhyncha*.
- affinis, *C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 917 = *grandiflora*.
- Anthriscus*, *Linn. Sp. Pl.* 257 = *Anthriscus vulgaris*.
- apiculata, *DC. Prod.* iv. 221 = *iberica*.
- aromatica, *Wahlenb. in Oken, Isis*, xxi. (1826) 984 = *Chaerophyllum aromaticum*.
- Aucheri, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 58.—Oriens; Afghan.
- aurea, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 123 = *Chaerophyllum aureum*.
- australis, *Bong. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 80 = *microcarpa*.
- australis, *Linn. Sp. Pl.* 257.—Reg. Mediterr.
- Balansae, *Reut. Cat. Hort. Genev.* (1867) 2.—Cilicia.
- brachycarpa, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 916 = *Balansae*.
- brachycarpa, *Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825) 10; *Fl. Sic. Prod.* i. 350.—Sicil.; Syria.
- brevirostris, *Boiss. & Reut. Cat. Hort. Genev.* (1868) 4.—Hispan.
- Bulbocastanum, *Moench, Meth.* 101 = *Carum Bulbocastanum*.
- bulbosa, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 123 = *Chaerophyllum bulbosum*.
- Cerefolium, *Linn. Sp. Pl.* 257 = *Anthriscus Cerefolium*.
- chilensis, *Molina, Sagg. Chil.* 125.—Chili.
- clavata, *Banks & Soland. ex Hook. Fl. Antarct.* ii. 288 = *Osmorhiza chilensis*.

SCANDIX:—

- clavata, *DC. Prod.* iv. 283, in syn., sphalm. = *Chaerophyllum macrospermum*.
- cornuta, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 27 = *S. Pecten-Veneris*.
- cretica, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. n. 4 = *S. Pecten-Veneris*.
- dulcis, *Muhl. Cat.* 41; *DC. Prod.* iv. 232 = *Osmorhiza brevistylis*.
- falcata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 230 = *iberica*.
- falcata, *Londes, in Mém. Soc. Nat. Mosc.* i. (1811) 31 = *grandiflora*.
- fumarioides, *Chaub. & Bory, Nouv. Fl. Pélop.* 19 = *Anthriscus tenerimus*.
- fumarioides, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* iii. 249 = *Anthriscus fumarioides*.
- georgica, *C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 915 = *iberica*.
- gilanica, *S. G. Gmel. Reise*, iii. 303. t. 31. f. 2 = *Chaerophyllum macrospermum*.
- glaberrima, *Desf. Fl. Atlant.* i. 260 (= *Bunium glaberrimum*).—Alger.
- glochidiata, *Labill. Nov. Holl. Pl.* i. 75. t. 102 = *Daucus brachiatus*.
- grandiflora, *Linn. Sp. Pl.* 257.—Europ. or.; As. Min.
- hirsuta, *Biasol. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 528 = *grandiflora*.
- hirsuta, *Scop. Fl. Carn.* ed. II. i. 211 = *Chaerophyllum hirsutum*.
- hispanica, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 57 = *macrorrhyncha*.
- hispanica, *Cutand. Fl. Matr.* 340 = *S. Pecten-Veneris*.
- hispida, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 27 = *Anthriscus vulgaris*.
- hispidula, *Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bologn.* v. (1862) 427 = *pinnatifida*.
- iberica, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 425.—As. Min.; Persia.
- iberica, *Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. I. x.* 50 = *pisidica*.
- inferta, *Jacq. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 528, sphalm. = seq.
- infesta, *Linn. Syst.* ed. XII. 732 = *Caucalis infesta*.
- laeta, *Salisb. Prod.* 167 = *Anthriscus vulgaris*.
- latifolia, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* iii. 77. t. 284 = *Lecokia cretica*.
- macrorrhyncha, *C. A. Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. 86.—As. Min.
- macrosperma, *Willd. ex Schult. Syst.* vi. 597 = *Chaerophyllum macrospermum*.
- microcarpa, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1865) 42.—Hispan.
- millefolia, *Willd. ex Spreng. Syst.* i. 903 = *Chaerophyllum millefolium*.
- nodosa, *Linn. Sp. Pl.* 257 = *Chaerophyllum nodosum*.
- nutans, *Moench, Meth.* 101 = *Chaerophyllum temulum*.
- odorata, *Linn. Sp. Pl.* 257 = *Myrrhis odorata*.
- orientalis, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 369 = *grandiflora*.
- palaestina, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 918.—Palaestin.
- parviflora, *Retz. f. Pugill.* 12 = *pinnatifida*?
- Pecten, *Scop. Fl. Carn.* ed. II. i. 211 = seq.
- Pecten-Veneris, *Linn. Sp. Pl.* 256 (Pecten?).—Europ.; Oriens.
- pectinifera, *Stokes, Bot. Mat. Med.* ii. 122 = seq.
- pectiniformis, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 70, 134 = *praec.*
- persica, *Mart. in Linnaea*, xii. (1838) Litt. 87 = *S. Pecten-Veneris*.
- petraea, *Auct. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 528 = *australis*.
- pinnatifida, *Vent. Jard. Cels.* t. 14.—Reg. Mediterr.; Oriens.
- pinnatifida, *Willk. in Flora*, xxxiv. (1851) 728 = *S. Pecten-Veneris*.
- pisidica, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 49.—As. Min.
- procumbens, *Linn. Sp. Pl.* 257 = *Chaerophyllum procumbens*.
- radiata, *Salisb. Prod.* 167 = *australis*.
- rostrata, *Salisb. l. c.* 166 = *S. Pecten-Veneris*.
- Russelliana, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 369 = *pinnatifida*.
- Stella, *Stend. Nom. ed. II.* ii. 528, sphalm. = seq.
- stellata, *[Soland. in] Russ. Aleppo*, ed. II. ii. 249 = *pinnatifida*.
- taurica, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1846) 11. 355.—Tauria.
- temula, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 122 = *Chaerophyllum temulum*.

SCANDIX :—

- tenuifolia*, Salisb. Prod. 166 = *Anthriscus Cerefolium*.
ternata, Moench, Meth. 101 = *Cryptotaenia canadensis*.
tinctoria, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 212 = *Chaerophyllum aromaticum*.
trichosperma, Linn. Mant. i. 57 = *Caucalis trichosperma*.
trichosperma, Schur, Enum. Pl. Transs. 963 (Index) = *Anthriscus Cerefolium*.
turgida, Boiss. Fl. Orient. ii. 918.—Cilicia.
ulgaris, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 503 = *S. Pecten-Veneris*.
Wilhelmssii, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 915 = *S. Pecten-Veneris*.

- SCAPHA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Saurauja*, Willd. (Ternstr.).
acuminata, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 121 = *Ternstroemia acuminata*.
Candollii, Choisy, l. c. = *Saur. tristyla*.
cauliflora, Noronha, ex DC. Prod. i. (1821) 425 = *Saur. cauliflora*.
elegans, Choisy, l. c. xiv. (1855) 121.—Ins. Philipp.
ferox, Choisy, l. c. = *Saur. ferox*.
gigantea, Noronha, ex DC. l. c. i. (1821) 424 = *Saur. gigantea*.
leucophloia, Choisy, l. c. xiv. (1855) 121 = *Saur. lencophloia*.
nigrescens, Choisy, l. c. = *Saur. nigrescens*.
pinangiana, Choisy, l. c. = *Saur. tristyla*.
rubiginosa, Choisy, l. c. = *Saur. Jackiana*.
serrata, Choisy, l. c. = *Ternstroemia serrata*.
spadicea, Choisy, l. c. = *Saur. spadicea*.
subcordata, Choisy, l. c. = *Saur. subcordata*.

- SCAPHESPERMUM, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 58 = *Seseli*, Linn. (Umbell.).
trilobum, Edgew. l. c. = *Seseli trilobum*.

- SCAPHISPATHA, Brongn. ex Schott, Prod. Aroid. 214 (1860). *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 978.
gracilis, Brongn. ex Schott, l. c. = *Bolivia*.

- SCAPHIUM, Schott & Endl. Melet. 33 (1832) = *Sterculia*, Linn.
Wallichii, Schott & Endl. l. c. = *St. scaphigera*.

- SCAPHOPETALUM, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 28. *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 983.
Blackii, Mast. l. c. 29. t. 2.—Afr. trop.
longepedunculatum, Mast. l. c. 28. t. 3.—Afr. trop.
Mannii, Mast. l. c. 29. t. 3.—Afr. trop.

- SCAPHYGLOTTIS, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 58 (1835). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 525.

- CLADOBIUM, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446 (1836).
affinis, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 59.—Peruv.
Behrii, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 219.—Panama.
conferta, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 59.—Peruv.
dubia, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 219.—Mexic.
fasciculata, Hook. Ic. Pl. t. 317.—Guian.
graminifolia, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 59.—Peruv.
Kienastii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 219.—Mexic.
leucantha, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 856.—Bras.
mesocopis, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 220.—Costa Rica.
pallidiflora, Lindl. in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 646.—Ins. Trinit.
parviflora, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 58.—Peruv.
pendula, Poepp. & Endl. l. c.—Peruv.
reflexa, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 20.—Guian.
rosea, Hook. Ic. Pl. t. 313 = *violacea*.
ruberrima, Lindl. Orch. Linden. 22 = *Ornithidium ruberrimum*.

SCAPHYGLOTTIS :—

- stellata*, Lodd. ex Lindl. Bot. Reg. (1889) Misc. 44.—Guian.
Tafallae, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 855.—Peruv.
violacea, Lindl. Bot. Reg. t. 1901.—Guian.

- SCAREDEDERIS, Thou. Orch. Iles Afr. t. 91 (1822) = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).
scandens, Thou. l. c. (Quid ?).—Ins. Maurit.

- SCARIOLOA, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. 270 (1795) = *Lactuca*, Linn. (Compos.).
viminea, F. W. Schmidt, l. c. = *L. viminea*.

- SCELOCHILUS, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 261. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 558.
heterophyllus, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 105.—Ecuador.
Jamiesoni, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852–53) 88.—Ecuador.
Lindenii, Lindl. & Paxt. l. c.—Venezuela.
Ottonis, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 261.—Venezuela.
saccatus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 689.—Peruv.
stenochilus, Reichb. f. l. c. = *Lindenii*.

- SCEPA, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 441 (1836) = *Aporosa*, Blume (Euphorb.).
aurita, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 254 = *A. anrita*.
chinensis, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 72 = *A. microcalyx*.
Lindleyana, Wight, Ic. t. 361 = *A. Lindleyana*.
microstachya, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 256 = *A. microstachya*.
stipulacea, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 441 = *A. microstachya*.
villosa, Lindl. l. c. = *A. villosa*.

- SCEPASMA, Blume, Bijdr. 582 (1825) = *Phyllanthus*, Linn. (Euphorb.).
buxifolia, Blume, l. c. = *P. buxifolius*.
longifolia, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 143 = *P. acutissimus*.
parvifolia, Reichb. f. & Zoll. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 229.—Malaya.

- SCEPINIA, Neck. Elem. i. 78 (1790) = *Pteronia*, Linn. (Compos.).
dichotoma, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 45 = *P. oppositifolia*.
lepidophylla, Cass. l. c. = *P. glomerata*.

- SCEPOCARPUS, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 98 (1869) = *Urera*, Gaudich. (Urtic.).
Mannii, Wedd. l. c.—Afr. trop.

- SCEPSEOTHAMNUS, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 248 = *Alibertia*, A. Rich. (Rubiace.).
gardenioides, Cham. l. c. 249.—Bras.
rotunda, Cham. l. c. 250.—Bras.
vinosa, Cham. l. c. 249 = *rotunda*.

- SCEPSOTHAMNUS, Steud. Nom. ed. II. ii. 528 (1841), sphalm. = *praec.*

- SCEPTRANTHES, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xx. (1836) 413 = *Cooperia*, Herb. (Amaryll.).
Drummondii, R. Grah. l. c. = *C. paniculata*.

- SCEPTRANTHUS, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 723 (1883), err. typ. = *praec.*

- SCEPTROCNIIDE, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxii. (1877) 233. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 382.
macrostachya, Maxim. l. c. 240.—Japon.

- SCEPTRUM-CAROLINUM, Linn. Fl. Lapp. 197 (1737) = *Pedicularis*, Linn. (Scrophul.).

- SCEURA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 37 (1775) = *Avicennia*, Linn. (Verben.).
marina, Forsk. l. c. = *A. officinalis*.

- SCHACHTIA, Karst. in Linnaea, xxx. (1859–60) 156. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 80.
dioica, Karst. l. c. 157.—N. Granat.

- SCHAEFFERA, Schreb. Gen. ii. 681 (1791), sphalm. = *seq.*

- SCHAEFFERIA, Jacq. Enum. Pl. Carib. 10 (1760). *CELASTRINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 367.
Berterii, Griseb. Cat. Pl. Cub. 56.—Ins. S. Doming.
buxifolia, Nutt. Sylv. N. Am. ii. 42. t. 56 = *frutescens*.
completa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 38 = *frutescens*.
cuneifolia, A. Gray, Pl. Wright. i. 35.—Texas.
frutescens, Jacq. Enum. Pl. Carib. 33; *Select. Am.* 259; *Karst. Fl. Columb.* i. 183.—Am. bor.; Ind. occ.
lateriflora, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 38.—Ins. S. Doming.
Marchii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 710.—Jamaic.
paniculata, Spreng. Neue Entdeck. iii. 49.—Bras.
racemosa, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 41.—Mexic.
viridescens, [Moq. & Sesse,] ex DC. l. c. = *frutescens*.

- SCHAEFFNERA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 492 (1873), sphalm. = *SCHAFFNERA*, Sch. Bip. = *Dicoma*, Cass. (Compos.).

- SCHAENOLAENA, Lindl. Veg. Kingd. 778 (1847), sphalm. = *SCHOENOLAENA*, Bunge = *Xanthosia*, Rudge (Umbell.).

- SCHAENOPRASUM, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 76 (1879), sphalm. = *SCHOENOPRASUM*, H. B. & K. = *Allium*, Tourn. (Liliac.).

- SCHAENUS, Gouan, Fl. Monsp. 388 (1765), err. typ. = *Schoenus*, Linn. (Cyperac.).

- SCHAETZELIA, Sch. Bip. in Walp. Ann. ii. 949 (1852) = *Schaetzellia*, Sch. Bip. (Compos.).

- SCHAETZELLIA, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvii. (1849) 82 = *Onoseris*, DC. (Compos.).
Deckeri, Klotzsch, l. c. = *O. Isotypus*.

- SCHAETZELLIA, Sch. Bip. in Flora, xxxiii. (1850) 419. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 242.
DICHAETA, Sch. Bip. l. c. xxxiii. (1850).
SCHAETZELIA, Sch. Bp. in Walp. Am. ii. 949 (1852).
mexicana, Sch. Bip. in Flora, xxxiii. (1850) 419.—Mexic.

- SCHAETZELLIA, Sch. Bip. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvii. (1849) 192, nomen = *Hinterhubera*, Sch. Bip. (Compos.).
columbica, Sch. Bip. l. c. = *H. columbica*.

- SCHAFFNERA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 63. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1124.
gracilis, Benth. in Hook. Ic. Pl. xiv. 59. t. 1378.—Mexic.

- SCHAFFNERA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 42 = *Dicoma*, Cass. (Compos.).
carduoides, Sch. Bip. l. c. = *D. tomentosa*.

- SCHANGINIA, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 394 (1829) = *Suaeda*, Forsk. (Chenop.).
altissima, Hohen. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 781 = *Suaeda heterocarpa*.
altissima, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 159 = *Suaeda altissima*.
Arbuscula, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 733.—Sibir. altaic.
baccata, Moq. Chenop. Enum. 119 = *Suaeda baccata*.
baccifera, Ledeb. Fl. Ross. iii. 776 = *Suaeda baccifera*.
Borszczowii, Bunge, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 131, nomen.—Reg. Ural.
hortensis, Moq. Chenop. Enum. 119 = *Suaeda hortensis*.
inderiensis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 460.—Reg. Ural.

SCHANGINIA:—

- linifolia*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 395 = *Suaeda linifolia*.
linifolia, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 320. t. 23 = *Suaeda hortensis*.
tribracteata, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1869) 188.—
 Russia.
trigyna, Heynh. Nom. ii. 640 = *Suaeda trigyna*.

SCHAPHESPERMUM, Edgew. in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 253, sphalm. = SCAPHESPERMUM, Edgew. = *Seseli*, Linn. (Umbell.).

SCHAUERA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 202, in adnot. (1836) = *Aydendron*, Nees (Laurin.).

SCHAUERIA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 25 = *Hyptis*, Jacq. (Labiata).
graveolens, Hassk. l. c. = *H. suaveolens*.

SCHAUERIA, Nees, Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1838). —Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 119. ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1116.

FLAVICOMA, Rafn. Fl. Tellur. iv. 63 (1836).
caduciflora, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 261.—
 Reg. Argent.

calicotricha, Nees, Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1838).—

Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 119.—Bras.

capitata, Nees, in DC. Prod. xi. 316.—Bras.

decipiens, Nees, l. c. 318.—Mexic.

flavicomis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1883) i. 14.—

Bras.

gonyostachya, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 106.—Bras.

hirsuta, Nees, l. c. 103.—Bras.

humuliflora, Nees, l. c. 102.—Bras.

lachnostachya, Nees, l. c. 105.—Bras.

linearifolia, Torr. Bot. Mex. Bound. 123 = *Dianthera*

linifolia.

linifolia, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1114 = *præc.*

lophura, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 104.—Bras.

macrophylla, Nees, l. c. 105.—Bras.

malifolia, Nees, l. c. 103.—Bras.

marginata, Nees, l. c. 102.—Bras.

Maximiliani, Nees, l. c. 106.—Bras.

paniculata, Nees, l. c.—Bras.

parvifolia, Torr. Bot. Mex. Bound. 122 = *Dianthera*

parvifolia.

Schottii, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 107.—Bras.

sulphurea, Nees, l. c. 104.—Bras.

virginica, Nees, l. c. 105.—Bras.

SCHHEADENDRON, Bertol. f. in Mem. Acad. Sc. Bologn. ii. (1850) 572, sphalm. = SHEADENDRON, Auct. = *Combretum*, Linn.

SCHEDONNARDUS, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 228, 229, nomen; Syn. Pl. Gram. 146 (1855). GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1167. *texasus*, Steud. II. cc.—Texas.

SCHEDONORUS, Beauv. Agrost. 99. t. 19. f. 2 (1812) = *Festuca*, Linn. et *Bromus*, Linn. (Gramin.).

alpinus, Hoppe, Agrost. Dec. 4; ex Schult. Mant. ii. 389 = *F. montana*.

altissimus, Beauv. Agrost. 99 = *F. sylvatica*.

americanus, Roem. & Schult. Syst. ii. 706 = *F. poaeoides*.

arundinaceus, Dum. Obs. Gram. Belg. 106 = *F. elatior*.

arundinaceus, Roem. & Schult. Syst. ii. 700 = *Graphephorum arundinaceum*.

asper, Gaud. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 643 = *B. asper*.

auratus, Beauv. Agrost. 99 = *F. violacea*.

aureus, Beauv. l. c. = *F. spadicea*.

Benekeni, Lange, in Fl. Dan. t. 2826 = *B. asper*.

Beneki, Lange, in Bull. Soc. Bot. Belg. xiii. (1874) 310, sphalm. = *præc.*

Billardierianus, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 419 = *F. littoralis*.

bonariensis, Roem. & Schult. Syst. ii. 709 = *Poa pallens*.

bromoides, Wight, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = *F. scaberrima*, Wightiana.

caeruleus, Roem. & Schult. Syst. ii. 699 = *F. caeruleus*.

calamarius, Beauv. Agrost. 99 = *F. sylvatica*.

Caldasii, Roem. & Schult. Syst. ii. 709 = *F. Caldasii*.

ciliatus, Kjellm. in Nordensk. Vega-Exped. Vetensk.

Iakt. i. 557 = *B. ciliatus*.

compressus, Roem. & Schult. Syst. ii. 700 = *F. spadicea*.

SCHEDONORUS:—

consobrinus, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iii. (1869) 130 = *Festuca spadicea*.

curvatus, Beauv. Agrost. 99 = *F. elatior*.

deciduus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 115 = *F. sylvatica*.

divaricatus, Roem. & Schult. Syst. ii. 703 = *Cutandia divaricata*.

dumetorum, Beauv. Agrost. 99 = *F. rubra*.

elatior, Beauv. l. c. = *F. elatior*.

erectus, Gaud. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 637 = *B. erectus*.

Eskia, Beauv. Agrost. 99 = *F. varia*.

exaltatus, Schult. Mant. iii. 644 = *F. montana*.

ferrugineus, Vest. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 221 = *F. spadicea*.

Gerardi, Beauv. Agrost. 99 (Quid ?).—Europ.

giganteus, Gaud. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 644 = *Bromus giganteus*.

glaucus, Beauv. Agrost. 99 = *F. glauca*.

Hookerianus, Benth. Fl. Austral. vii. 656 = *F. Hookeriana*.

inermis, Beauv. Agrost. 99 = *B. inermis*.

lanatus, Roem. & Schult. Syst. ii. 708 = *F. mollis*.

latifolius, Roem. & Schult. l. c. 710 = *F. latifolia*.

littoralis, Beauv. Agrost. 99 = Roem. & Schult. l. c.

707 = *F. littoralis*.

lividus, Roem. & Schult. l. c. = *F. livida*.

loliaceus, Beauv. Agrost. 99 = *F. loliacea*.

longifolius, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 529 = *B. inermis*.

modesta, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = *F. modesta*.

montana, Opiz, Seznam, 89 = *F. montana*.

nigrescens, Beauv. Agrost. 99 = *F. rubra*.

nitidus, Roem. & Schult. Syst. ii. 706 = *F. rubra*.

nutans, Roem. & Schult. l. c. 704 = *F. pulchella*.

obtusius, Roem. & Schult. l. c. 710 = *F. nutans*.

patulus, Roem. & Schult. l. c. 710 = *F. patula*.

phoenicoides, Roem. & Schult. l. c. 699 = *Brachypodium*

ramosum.

pilosus, Beauv. Agrost. 99 = *Poa violacea*.

poaeiformis, Beauv. l. c. = *Poa violacea*.

pratensis, Beauv. l. c. = *F. elatior*.

procerus, Roem. & Schult. Syst. ii. 708 = *F. eminens*.

pulchellus, Beauv. Agrost. 99 = *F. pulchella*.

pumilus, Roem. & Schult. Syst. ii. 706 = *F. varia*.

quadridens, Roem. & Schult. l. c. 710 = *Triodia cuprea*.

radicans, Dum. Obs. Gram. Belg. 106 = *F. elatior*.

remotiflorus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 283 = *F. pauciflora*?

rhaeticus, Beauv. Agrost. 99 = *Poa violacea*.

scaber, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 529 = *F. Neesiana*.

Scheuchzeri, Beauv. Agrost. 99 = *F. pulchella*.

scirpoides, Benth. Fl. Austral. vii. 655 = *F. scirpoides*.

serotinus, Beauv. Agrost. 99 = *Diplachne serotina*.

serotinus, Rostrop, in Kjoeh. Vidensk. Meddel. 1864

(1864), 119 = *B. asper*.

spadiceus, Roem. & Schult. Syst. ii. 700 = *F. spadicea*.

spicatus, Roem. & Schult. l. c. 707 = *F. spicata*.

sterilis, Fries, Summ. Veg. 76 = *B. sterilis*.

sylvaticus, Beauv. Agrost. 99 = *F. sylvatica*.

tectorum, Fries, Summ. Veg. 76 = *B. tectorum*.

tenellus, Beauv. Agrost. 99 = *F. tenella*, Willd.

tenuifolius, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix.

(1884) 327, nomen (Quid ?).—Rossia.

trichodes, Schult. Mant. iii. 645 = *Eragrostis may-*

purensis.

triflorus, Roem. & Schult. Syst. ii. 709 = *F. triflora*.

unioloides, Roem. & Schult. l. c. 708 = *B. unioloides*.

varius, Beauv. Agrost. 99 = *F. varia*.

versicolor, Opiz, Seznam, 89 = *F. varia*.

violaceus, Beauv. Agrost. 99 = *F. rubra*.

violaceus, Link, Hort. Berol. i. 171 = *Poa violacea*.

SCHEELEA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 264.

PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 947.

attaleoides, Karst. l. c. 265; Fl. Columb. i. 135. t. 67. —N. Granat.

butyracea, Karst. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 256. —Hab.?

Cephalotes, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 269.—Bras.

excelsa, Karst. l. c. 267.—N. Granat.

imperialis, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1875) i. 589.—N. Granat.

SCHEELEA:—

insignis, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 269.—Bras. *macrocarpa*, Karst. l. c. 268.—Venezuela.

Maripa, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 256, nomen.—Hab.?

Princeps, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 269.—Bras.

regia, Karst. l. c. 266; Fl. Columb. ii. 145. t. 167.—N. Granat.

SCHEERIA, Seem. in Bot. Mag. t. 4743 (1853) =

Achimenes, P. Br. (Gesner.).

ichthyostoma, Seem. Bot. Voy. Herald, 185 = *A. ichthyostoma*.

lanata, Hanst. in Linnaea, xxvii. (1854) 714 = *A. lanata*.

mexicana, Seem. in Bot. Mag. t. 4743 = *A. Scheerii*.

panamensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 185 = *A. panamensis*.

SCHEFFIELDIA, Scop. Introd. 183 (1777), sphalm. = SHEFFIELDIA, Forst. = *Samolus*, Linn. (Primul.).

SCHEFFLERA, Forst. Char. Gen. 45. t. 23 (1775).

ARALIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 940.

affinis, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 141.—N. Caled.

Andraeana, Baill. l. c.—N. Caled.

apioides, Baill. l. c. 145.—N. Caled.

Balansaeana, Baill. l. c. 142.—N. Caled.

Candelabrum, Baill. l. c. 146.—N. Caled.

crassipes, Baill. l. c. 144.—N. Caled.

Cunninghami, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 89.—N. Zel.

Cussoniae, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 143.—N. Caled.

digitata, Forst. Char. Gen. 46.—N. Zel.

diphyrena, Baill. Hist. Pl. vii. 162 = *Heptapleurum dipyrenum*.

elongatum, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 144.—N. Caled.

Emiliana, Baill. l. c. 143.—N. Caled.

Faguetti, Baill. l. c. 142.—N. Caled.

Gabriellae, Baill. l. c. 144.—N. Caled.

Golip, Baill. l. c. 142.—Ins. Lifu.

indivisa, Baill. l. c. 140.—N. Caled.

Marcellana, Baill. l. c.—N. Caled.

Nono, Baill. l. c. 141.—N. Caled.

Pancheri, Baill. l. c. 143.—N. Caled.

parvifolia, Baill. l. c. 144.—N. Caled.

stellata, Baill. Hist. Pl. vii. 161 = *Heptapleurum stellatum*.

Toto, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 140.—N. Caled.

umbellifera, Baill. Hist. Pl. vii. 162 = *Cussonia umbellifera*.

Vieillardii, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 146.—N. Caled.

vitiensis, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 176.—Ins. Fiji.

SCHEIDWEILERIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad.

(Maerz, 1854) 123; et in Abh. Akad. Berl. 1854

(1855), 58. t. 46 = *Begonia*, Linn.

digitata, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz,

1854) 123 = *B. digitata*.

ferrata, Klotzsch, l. c. 123, nomen (an seq.?).—Bras.

inciso-serrata, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854

(1855), 61 = *B. inciso-serrata*.

luxurians, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz,

1854) 123 = *B. luxurians*.

muricata, Klotzsch, l. c. = *B. muricata*.

parviflora, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855),

59 = *B. parviflora*.

repens, Hassk. Hort. Bog. Desc. 325 = *B. mollis*.

Sellowiana, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz,

1854) 123, nomen.—Bras.

SCHELHAMERIA, Heist. Syst. 9 (1748) = *Cheiranthus*, Linn. (Crucif.).

SCHELHAMMERA, R. Br. Prod. 273 (1810).

LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 829.

PARDUYNA, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 58 (1866).

SCHELHAMMERIA, Moench, Meth. Suppl. 119 (1802) = *Carex*, Dill. (Cyperac.).
capitata, Moench, l. c. = *C. cyperoides*.
cyperoides, Dum. Fl. Belg. 145; Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72 = *C. cyperoides*.

SCHELLINGIA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 231. t. 1 = *Aegopogon*, Beauv. (Gramin.).
tenera, Steud. l. c. 232. t. 1 = *A. geminiflorus*.

SCHELVERIA, Nees & Mart. in Flora, iv. (1821) 299, 328 = *Angelonia*, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).
arguta, Nees & Mart. l. c. = *A. procumbens*.

SCHENKIA, Griseb. in Bonplandia, i. (1853) 226 = *Erythraea*, Rich. (Gentian.).
sebaeoides, Griseb. l. c. = *E. sebaeoides*.

SCHENODORUS, Beauv. Agrost. 177 (Index) (1812); Roem. & Schult. Syst. ii. 698 (1817).—Cf. Poir. Encyc. Suppl. v. 84 (1817) = *SCHEDONORUS*, Beauv. = *Festuca*, Linn. et *Bromus*, Linn. (Gramin.).

SCHERPERIA, Rafin. Sylva Tellur. 109 (1838), sphalm. = seq.

SCHEPPIERIA, Neck. Elem. ii. 67 (1793) = *Cadaba*, Forsk. (Cappar.).
aphylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 14 = *C. juncea*.
juncea, DC. Prod. i. 245 = *C. juncea*.

SCHERARDIA, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 82 (1768), sphalm. = *Sherardia*, Linn. (Rubiace.).

SCHETTI, Adans. Fam. ii. 146 (1763) = *Ixora*, Linn. (Rubiace.).

SCHUCHLERIA, Heynh. Nom. i. 729 (1840), nomen. *COMPOSITAE* (Quid?).
patula, Heynh. l. c. = China.

SCHUCHZERA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 171 = seq.

SCHUCHZERIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *NAIADACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1012.
PAPILLARIA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 45 (1867).
TELMATOPHILA, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).
asiatica, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 243 = palustris.
palustris, Linn. Sp. Pl. 338.—Reg. bor. temp.
paniculata, Gilib. Exercit. ii. 502 = palustris.
Pseudo-asphodelus, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 263 = *Tofieldia calyculata*.
unicapularis, Comm. ex Lam. Encyc. iii. 266 = *Rostkovia grandiflora*, Hook. f.

SCHLUKZERIA, Hill, Veg. Syst. xxvi. 13 (1774), sphalm. = praec.

SCHIDIOMYRTUS, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 237 = *Baeckea*, Linn. (Myrtac.).
crenulata, Schau. l. c. 237 = *B. crenulata*.
diosmifolia, Schau. l. c. = *B. decemfida*.
ericacea, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 148 = *Micromyrtus microphylla*.
micrantha, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 237 = *Thryptomene baeckea*.
Sieberi, Schau. l. c. = *B. crenulata*.
tenella, Schau. l. c. = *Micromyrtus microphylla*.

SCHIDOSPERMUM, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56 (1857) = *Chlorophytum*, Ker-Gawl. (Liliac.).
Sansevieria, Griseb. l. c. = *C. Schidospermum*.

SCHIECKEA, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 398. Genus dubium *SAPINDACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. i. 392.

SCHIECKIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 674 (1883), sphalm. = *Schiekia*, Meissn. (Haemod.).

SCHIEDEA, Bartl. Ord. 210 (1830) = *Richardsonia*, Kunth (Rubiace.).
mexicana, Bartl. ex DC. Prod. iv. 569 = *R. Haenkeana*.

SCHIEDEA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 46. *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 151.
EUCLADUS, Nutt. ex Hook. Ic. Pl. t. 650 (1844).
amplexicaulis, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 310.—Ins. Sandvic.

SCHIEDEA :—

diffusa, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 138.—Ins. Sandvic.

globosa, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 311.—Ins. Sandvic.

Hookeri, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 133.—Ins. Sandvic.

Kaalae, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 175.—Ins. Sandvic.

ligustrina, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 46.—Ins. Sandvic.

Menziesii, Hook. Ic. Pl. sub t. 649–650.—Ins. Sandvic.

Nuttallii, Hook. l. c. t. 649–650.—Ins. Sandvic.

oahuensis, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 175 = *Nuttallii*.
Remyi, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 310.—Ins. Sandvic.

spergulina, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 135.—Ins. Sandvic.

stellarioides, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 310.—Ins. Sandvic.

viscosa, H. Mann, l. c. 311.—Ins. Sandvic.

SCHIEDEA, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 186 = *Tertrea*, DC. (Rubiace.).

martinicensis, A. Rich. l. c. 187 = *T. martinicensis*.

SCHIEKIA, Meissn. Gen. 397 (1842). *HAEMODORACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 674.

TROSCHELIA, Klotzsch, in Rich. Schomb. Reise Guian. 1066 (1848).

orinocensis, Meissn. Gen. Comm. 300.—Guian.

SCHIEVERECKIA, Nym. Consp. 54 (1878) = *SCHIVERECKIA*, Andr. = *Alyssum*, Tourn. (Crucif.).

SCHILLERA, Reichb. Consp. 204 (1828) = *Eriolaena*, DC. (Stercul.).

SCHILLERIA, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 609 = *Piper*, Linn.

abutiloides, Kunth, l. c. 721 = *P. abutiloides*.
aqualis, Kunth, l. c. 687 = *P. aequale*.

aurita, Kunth, l. c. 713 = *P. auritum*.
barbata, Kunth, l. c. 712 = *P. barbatum*.

callosa, Kunth, l. c. 689 = *P. callosum*.
Carpunya, Kunth, l. c. 693 = *P. Carpunya*.

catalpaefolia, Kunth, l. c. 718 = *P. marginatum*.
caudata, Kunth, l. c. 716 = *P. marginatum*.

Churumayu, Kunth, l. c. 706 = *P. Churumayu*.
colubrina, Kunth, l. c. 684 = *P. colubrinum*.

cornifolia, Kunth, l. c. 697 = *P. cornifolium*.
coruscans, Kunth, l. c. 708 = *P. coruscans*.

corylifolia, Kunth, l. c. 699 = *P. dilatatum*.
cumanensis, Kunth, l. c. 632 = *P. cumanense*.

grandifolia, Kunth, l. c. 709 = *P. grandifolium*.
halesiaefolia, Kunth, l. c. 681 = *P. halesiaefolium*.

heterophylla, Kunth, l. c. 688 = *P. heterophyllum*.
Hilariana, Kunth, l. c. 711 = *P. Hilarianum*.

inaequalifolia, Kunth, l. c. 631, in syn. = *Peperomia inaequalifolium*.

indecora, Kunth, l. c. 722 = *P. indecorum*.
Jussiaeana, Kunth, l. c. 680 = *P. Jussiaeanum*.

Karwinskiana, Kunth, l. c. 700 = *P. Karwinskianum*.
lanceaefolia, Kunth, l. c. 702 = *P. lanceaefolium*.

lapathifolia, Kunth, l. c. 714 = *P. lapathifolium*.
laurifolia, Kunth, l. c. 691 = *P. laurinum*.

lentaginoides, Kunth, l. c. 683 = *P. lentaginoides*.
leptura, Kunth, l. c. 679 = *P. lepturum*.

lineata, Kunth, l. c. 704 = *P. lineatum*.
longifolia, Kunth, l. c. 725 = *P. longifolium*.

Lucaeana, Kunth, l. c. 678 = *P. Lucaeanum*.
macrophylla, Kunth, l. c. 715 = *P. macrophyllum*.

marginata, Kunth, l. c. 718 = *P. marginatum*.
Martiana, Kunth, l. c. 691 = *P. Martianum*.

melastomoides, Kunth, l. c. 724 = *P. melastomoides*.
Mikaniana, Kunth, l. c. 719 = *P. Mikanianum*.

oblonga, Kunth, l. c. 696 = *P. oblongum*.
obovata, Kunth, l. c. 686 = *P. obovatum*.

persicariaefolia, Kunth, l. c. 684 = *P. persicariaefolium*.
pilulifera, Kunth, l. c. 722 = *P. piluliferum*.

populifolia, Kunth, l. c. 709 = *P. Kunthianum*.
riparia, Kunth, l. c. 707 = *P. grandifolium*.

rivinoides, Kunth, l. c. 682 = *P. rivinoides*.
rudis, Kunth, l. c. 703 = *P. rude*.

ulmifolia, Kunth, l. c. 698 = *P. dilatatum*.
umbrosa, Kunth, l. c. 726 = *P. umbrosum*.

variegata, Kunth, l. c. 695 = *P. variegatum*.
velutina, Kunth, l. c. 701 = *P. velutinum*.

xylosteoides, Kunth, l. c. 677 = *P. xylosteoides*.

SCHIMA, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530 (1841) = *SEHIMA*, Forsk. = *Ischaemum*, Linn. (Gramin.).
inscalpta, Hochst. ex Walp. Ann. iii. 803, 1135 = *I. laxum*.
macrostachyum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 472 = *I. laxum*.

SCHIMA, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 80 (1823). *TERNSTROEMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 185.

antherisosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 145.—Sumatra.

bancana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 113.—Malaya.

crenata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 143 = *Noronhae*.
excelsa, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 80 = *Gordonia excelsa*.

hypoglauca, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 484 = *Wallichii*.
khassiana, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 289.—Reg. Himal.

mollis, Dyer, l. c. 288.—Burma.

monticola, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1874) ii. 93, nomcn.—Burma.

Noronhae, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 80; Bijdr. 130.—Malaya.

oblata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 65 = *Noronhae*.

rigida, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 113.—Java.

sulcinervia, Miq. l. c.—Sumatra.

superba, Gardn. & Champ. in Hook. Kew Journ. i. (1849) 246 = *Noronhae*.

Wallichii, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 144 = *Adinandra villosa*.

Wallichii, Choisy, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 144.—Reg. Himal.; Malaya.

SCHIMPERA, Hochst. ex Steud. in Endl. Gen. 889 (1839). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 96.

TRAILLIA, Lindl. ex Endl. Gen. Suppl. 1419 (1841).

arabica, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530.—Arab.

persica, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 18.—Persia.

SCHINNONGIA, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 223. *IRIDEAE* (Quid?).

ciliata, Schrank, l. c.—Afr. austr.

SCHINOPSIS, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 403 (1876) = *Quebrachia*, Griseb. (Anacard.).

Balsanea, Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) 286.—Paraguay.

brasiliensis, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 404. t. 87.—Bras.

Haenkeana, Engl. l. c. 406.—Peruv.

Lorentzii, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 46 = *Q. Lorentzii*.

marginata, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 464.—Reg. Argent.

peruviana, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 405. t. 86. f. 2.—Peruv.

SCHINOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.

SCHINUS, Linn. Gen. ed. I. 358 (1737). *ANACARDIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 422.

DUVAUA, Kunth, in Ann. Soc. Nat. Sér. I. ii. (1824) 340.

MOLLE, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 341 (1763).

SARCOTHECA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1858) i. 474.

Areira, Linn. Sp. Pl. 389 = *S. Molle*.

Aroeira, Vell. Fl. Flum. x. t. 135 = *terebinthifolius*.

aurantiodorus, Ruiz, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 326 = *Mauria aurantiodora*.

benghalensis, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 194 = *Protium serratum*.

bituminosus, Salisb. Prod. 171 = *S. Molle*.

Bonplandianus, March. Rev. Anacard. 164 = *dependens*.

Chichita, Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent. xvi. (1883) 96.—Reg. Argent.

chilensis, March. Rev. Anacard. 164 = *latifolius*.

crenatus, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 423.—Chili.

dentatus, Andr. Bot. Rep. t. 620.—Ins. Sandvic.

dependens, Orteg. Hort. Matr. Dec. 102.—Bras.

discolor, Benth. Bot. Voy. Sulph. 11.—Calif.

Fagara, Linn. Sp. Pl. 389.—Jamaica.

Huygan, Molina, Sagg. Chil. ed. I. 169, 355 = *dependens*.

SCHINUS:—

- indicus*, Burm. f. Fl. Ind. 215 (err. typ. 315) (Quid?).—Ind. or.
latifolius, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 389.—Chili.
lentiscifolius, March. Rev. Anacard. 164.—Bras.
leucocarpus, Mart. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 394 = *Lithraea Aroeirinha*.
Limonia, Linn. Sp. Pl. 389 = *Limonia acidissima*.
Lithi, Domb. ex March. Rev. Anacard. 183 = *Lithraea venenosa*.
Mellisii, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 423.—Ins. S. Helena.
Molle, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 346 = *Lithraea Aroeirinha*.
Molle, Linn. Sp. Pl. 388.—Am. trop.
molloides, Vell. Fl. Flum. x. t. 134 (*moleoides*) = *Lithraea Aroeirinha*.
montanns, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 422.—Chili.
mucronulata, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 52 = *terebinthifolius*.
myricoides, Linn. Sp. Pl. 388 = *Cuscuta africana*.
Niara, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 194 = *Protium serratum*.
Pearcei, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 423.—Peruv.
procerus, March. Rev. Anacard. 164 = *Cyrtocarpa procera*.
pubescens, Spreng. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 176 = *Zanthoxylum rhoifolium*.
rhoifolius, Mart. in Flora, xx. (1847) 11. Beibl. 101 = *terebinthifolius*.
Saheria, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 193 = *Protium serratum*.
sinuatus, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 423.—Reg. Argent.
spinosus, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 388.—Bras.
tenuifolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 530, sphalm. = *ternifolius*.
terebinthifolius, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 399.—Bras.
ternifolius, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 177 = *Lithraea Aroeirinha*.
tragodes, Linn. Sp. Pl. 389 = *Zanthoxylum tragodes*.
virgatus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 98, nomen.—Peruv.
weinmanniaefolius, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 385.—Bras.

SCHINZIA, Dennst. Schlus. Hort. Malab. 31 (1818) = *Alsodeia*?, Thou. (Violar.).
inconspicua, Dennst. l. c. (Quid?).—Ind. or.

SCHISACHYRIUM, Munro, in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 53, sphalm. = **SCHIZACHYRIUM**, Nees = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

SCHISANDRA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 218. t. 47 (1803) = **Schizandra**, Michx. (Magnol.).

SCHISANTHES, Haw. Suppl. Pl. Succ. 128 (1819) = **Narcissus**, Tourn. (Amaryll.).
orientalis, Haw. l. c. 129 = *N. Tazetta*.

SCHISMATOCLAEA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 159. **RUBIACEAE**.
concinna, Baker, l. c. xxi. (1885) 407.—Madag.
psychotrioides, Baker, l. c. xx. (1883) 160.—Madag.
viburnoides, Baker, l. c. xxi. (1885) 407.—Madag.

SCHISMATOGLOTTIS, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. Ind. Archip. 83 (1854). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 984.

apoballis, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 318.

colobogonium, Schott, l. c. xv. (1865) 34.
zantedeschia, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 9.

acuminatissima, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 281.—Borneo.

asperata, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 297.—Borneo.

barbata, Engl. l. c. 298.—Borneo.
Beccariana, Engl. l. c. 297.—Borneo.

calyptata, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Ind. Archip. 83.—Malaya.

concinna, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 281 = *acuminatissima*.

conoidea, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 298.—Borneo.

VOL. II.

SCHISMATOGLOTTIS:—

- crispata*, Hook. f. Bot. Mag. t. 6576.—Borneo.
decora, Bull. Cat. (1884) 16; et in Gard. Chron. (1884) i. 711.—Borneo.
elongata, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 298 = *Rhynchopyle elongata*.
Lansbergiana, Linden, Cat. n. 109 (1883) 5; et in Gard. Chron. (1883) i. 510 = *Lavallei*.
latifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 214 = *rupestris*.
Lavallei, Linden, in Illustr. Hort. xxviii. (1881) t. 418.—Malaya.
longipes, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 214 = *calyptata*.
longispatha, Bull. Cat. (1881) 20, 6, cum ic.; et in Illustr. Hort. xxix. (1882) 159. t. 466.—Borneo.
marginata, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 298 = *Rhynchopyle marginata*.
modesta, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 125.—Borneo.
neoguineensis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1885) ii. 776.—N. Guin.
ovata, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 125.—Borneo.
picta, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 317.—Java.
picta, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 25 (an praec.?).—Java.
pulchra, N. E. Br. in Illustr. Hort. xxxi. (1884) t. 520.—Borneo.
pusilla, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 184.—Ins. Philipp.
riparia, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 281 = *calyptata*.
rupestris, Zoll. & Mor. ex Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 77.—Java.
siamensis, Bull. Cat. (1885) 15 (*Aglaonematis* sp.?).—Siam.
sumatrana, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 80.—Sumatra.
variegata, Hook. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 353.—Borneo.
variegata, Hort. ex N. E. Br. in Gard. Chron. (1885) ii. 776 = *neoguineense*.

SCHISMATOPERA, Klotzsch, in Wieg. Archiv. vii. (1841) 178 = *Pera*, Mutis (Euphorb.).
distichophylla, Hochst. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 44 = *P. distichophylla*.
laurina, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 324 = *P. distichophylla*.
Martiana, Klotzsch, in Wieg. Arch. vii. (1841) 178 = *P. distichophylla*.

SCHISMAXON, Steud. in Bot. Zeit. xvi. (1856) 391, nomen = **Xyris**, Gronov.
distichoides, Steud. l. c. = *X. subnata*.

SCHISMOCERAS, Presl, Rel. Haenk. i. 96. t. 13. f. 2 (1827) = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).
disticha, Presl, l. c. = *D. distichum*.

SCHISMUS, Beauv. Agrost. 73. t. 15. f. 4 (1812). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1195.
ELECTRA, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. (1813) 299.

HEMISACRIS, Steud. in Flora, xii. (1829) 490.

arabicus, Nees, Fl. Afr. Austr. 422 = *minutus*.
brevifolius, Nees, l. c. —Afr. austr.
calycinus, Coss. in Expl. Sc. Alg. 138 (an seq.?).—Marocc.

calycinus, Coss. & Dur. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 399 = *marginatus*.

fasciculatus, Beauv. Agrost. 74 = *marginatus*, Panicum sanguinale.

Gouani, Trin. Fund. Agrost. 148 = *Deschampsia juncea*.

hirsutus, Trin. l. c. 148 = *minutus*.

marginatus, Beauv. Agrost. 74. t. 15.—Europ. austr.; As. med.; Afr. austr.

marginatus, Willk. in Flora, xxxv. (1852) 530 = *Koeleria cantabrica*.

minutus, Roem. & Schult. Syst. ii. 584.—Reg. Caucas.

ovalis, Nees, Fl. Afr. Austr. 421.—Afr. austr.

patens, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 371 = *Leptochloa patens*.

scaberimus, Nees, Fl. Afr. Austr. 423.—Afr. austr.

spectabilis, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. (1852) 255 = *minutus*.
tenuis, Steud. Syn. Pl. Gram. 295.—Afr. austr.

Villarsii, Trin. Fund. Agrost. 148 = *Deschampsia juncea*.

SCHISTACHNE, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. (1852) 252 = **Aristida**, Linn. (Gramin.).
ciliata, Fig. & De Not. l. c. = *A. ciliata*.

SCHISTANTHE, Kunze, Ind. Sem. Hort. Lips. (1841).—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 109 = **Alonsoa**, Ruiz & Pav. (Scrophul.).
peduncularis, Kunze, ll. cc.—Afr. austr.

SCHISTOCARPHA, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 409. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 437.
NEILREICHIA, Fenzl, in Denkschr. Akad. Wien. i. (1850) 258. t. 30.
bicolor, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 409.—Mexic.

SCHISTOCARPIA, Pritz. Ic. Ind. i. 999 (1855) = *praec.*

SCHISTOCODON, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 362 = **Toxocarpus**, Wight & Arn. (Asclep.).
Meyenii, Schau. l. c. 363 = *T. Wightianus*.

SCHISTOGYNE, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 292. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 758.
Decaisneana, Karst. Fl. Columb. ii. 121.—Bras.
sylvestris, Decne. in DC. Prod. viii. 588 = *Decaisneana*.
sylvestris, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 292.—Uruguay.

SCHISTOPHRAGMA, Benth. ex Endl. Gen. 679 (1839) = **Conobea**, Aubl. (Scrophul.).
pusilla, Benth. in DC. Prod. x. 392 = *C. pusilla*.

SCHISTOSTEPHIUM, Less. Syn. Comp. 251 (1832). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 432.
argyreum, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 168 = *flabelliforme*.
crataegifolium, Fenzl, ex Harv. & Sond. l. c. 169.—Afr. austr.
flabelliforme, Less. Syn. Comp. 251.—Afr. austr.
rotundifolium, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 169.—Afr. austr.

SCHIVERECKIA, Andr. ex DC. Syst. ii. 300 (1821) = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).
contorta, Andr. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 136, in nota.—Kamtschat.
iberidea, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 29 (= *Ptilotrichum cappadocicum*).—As. Min.
imeretica, Rupr. Fl. Cauc. 106, 291 = *Draba imeretica*.
podolica, Andr. & Bess. ex DC. Syst. ii. 300 = *A. podolicum*.
spathulata, Andr. ex DC. Syst. ii. 304 = *A. spathulatum*.

SCHIVERECKIA, Andr. ex DC. in Ann. Mus. Par. vii. (1821) 232 = *praec.*

SCHIWERETZKIA, Rupr. Fl. Cauc. 106 (1869) = *praec.*

SCHIZACHYRIUM, Nees, Agrost. Bras. 331 (1829) = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
brevifolium, Nees, l. c. 332 = *A. brevifolius*.
condensatum, Nees, l. c. 333 = *A. condensatus*.
filiforme, Nees, l. c. 338 = *A. tener*.
hirtiflorum, Nees, l. c. 334 = *A. hirtiflorus*.
intermedium, Nees, l. c. = *A. consanguineus*.
Myosurus, Nees, in *Linnaea*, xix. (1847) 695 = *A. hirtiflorus*.
paradoxum, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 359 = *A. brevifolius*.
semiberbe, Nees, Agrost. Bras. 336 = *A. semiberbis*.
striatum, Nees, l. c. 332 = *Ischaemum laxum*.
tenerum, Nees, l. c. 338 = *A. tener*.
zeylanicum, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530; Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 365 = *A. Pseudo-graya*.

SCHIZANDRA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 218. t. 47 (1803) (*Schisandra*); DC. Syst. i. 544 (1818) **MAGNOLIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 19.
COSBAEA, Lem. Illustr. Hort. ii. (1855) 71.
MAXIMOVITZIA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 19 (1862), sphalm.

SCHIZANDRA :—

- MAXIMOWICZIA, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1856) 142, 124.
 SPHAEROSTEMA, Blume, Bijdr. 22 (1825).
 STELLANDRIA, Brickell, in Med. Repos. N. York, vi. (1808) 327.
 axillaris, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 45.—Reg. Himal.; Java.
 chinensis, C. Koch, Dendrol. i. 386; Baill. Hist. Pl. i. 148.—China; Japon.
 coccinea, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 219. t. 47; Sims, Bot. Mag. t. 1413.—Am. bor.
 elongata, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 44.—Reg. Himal.; Java.
 grandiflora, Hook. f. & Thoms. l. c.—Reg. Himal.
 Hanceana, Baill. Hist. Pl. i. 150.—China.
 japonica, Baill. l. c. = Kadsura japonica.
 japonica, Hance, in Journ. Bot. xviii. (1880) 258 = chinensis.
 nigra, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 144.—Japon.
 propinqua, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 45.—Reg. Himal.

SCHIZANGIUM, Bartl. ex DC. Prod. iv. 571 (1830) = **Mitracarpum**, Zucc. (Rubiaceae).
 durum, Bartl. ex DC. l. c. 572 = M. Schizangium.

SCHIZANTHERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1862) ii. 322 = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melastom.).
 bullata, Turcz. l. c. = M. bullata.

SCHIZANTHES, Endl. Gen. 179 (1837) = SCHISANTHES, Haw. = **Narcissus**, Tourn. (Amaryll.).

- SCHIZANTHUS**, Ruiz & Pav. Prod. 6. t. 1 (1794).
 SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 909.
 SCIZANTHUS, Pers. Syn. ii. 161 (1807).
 alpestris, Poepp. ex Benth. in DC. Prod. x. 202.—Chili.
 calycosus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 529.—Chili.
 candidus, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 45.—Chili.
 duodecemfidus, Stokes, Bot. Comment. i. 117 = pin-natus.
 Evansianus, Paxt. Mag. Bot. viii. (1841) 171 (sp. dub.).
 —Hab.?
 Gayanus, Phil. in Linnaea, xxx. (1859–60) 198.—Chili.
 Gilliesii, Phil. l. c. xxix. (1857–58) 28.—Chili.
 gracilis, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. v. 153.—Chili.
 Grahami, Gill. in Hook. Bot. Mag. t. 3044.—Chili.
 Hookeri, Gill. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.–June; 1830) 176; et in Bot. Mag. t. 3070.—Chili.
 humilis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530 = pinnatus.
 incanus, Hort. ex C. Morr. in Belg. Hort. ii. (1852) 42. t. 6. f. 2 = retusus.
 integrifolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 530.—Chili.
 lacteus, Phil. Fl. Atac. 45.—Chili.
 laetus, Phil. l. c.—Chili.
 latifolius, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 214.—Chili.
 lilacinus, Kunze, in Linnaea, xxiv. (1851) 229.—Chili.
 major, Hoffmgg. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530 = pinnatus.
 pinnatifidus, Lindl. Bot. Reg. (1843) sub. t. 45 = pinnatus.
 pinnatus, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 13. t. 17.—Chili.
 porrigens, R. Grah. in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 401; Hook. Exot. Fl. t. 86 = pinnatus.
 Priestii, Paxt. Mag. Bot. i. (1835) t. 31 = pinnatus.
 retusus, Hook. Bot. Mag. t. 3045.—Chili; Peruv.
 violaceus, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1853) 758 = pinnatus.

SCHIZOBASIS, Baker, in Journ. Bot. xi. (1873) 105.
 LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 786.
 ADENOTHECA, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 255.
 angolensis, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 255.—Afr. trop.
 cuscutoides, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 786.—Afr. austr.

SCHIZOBASIS :—

- flagelliformis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 261.—Afr. austr.
 intricata, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 368.—Afr. austr.
 Macowani, Baker, l. c. xi. (1873) 105.—Afr. austr.

SCHIZOCALYX, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 319 = **Calycorectes**, Berg (Myrtac.).
 Pohlianus, Berg, l. c. 320.—Bras.

SCHIZOCALYX, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beil. 1 = **Dobera**, Juss. (Salvador.).
 coriaceus, Hochst. l. c. 2 = D. Roxburghii.

SCHIZOCALYX, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 575 = **Origanum**, Tourn. (Labi.).
 smyrnaeus, Scheele, l. c. = O. Onites.
 syriacus, Scheele, l. c. = O. Maru?

SCHIZOCALYX, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 73. RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 39.
 bracteosa, Wedd. l. c. 74.—N. Granat.
 neo-caledonica, Brongn. & Gris, l. c. Sér. V. xiii. (1870–71) 382.—N. Caled.
 rubiginosa, Brongn. & Gris, l. c. 380.—N. Caled.

SCHIZOCAPSA, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881) 292. TACCACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 741.
 plantaginea, Hance, l. c.—China.

SCHIZOCARPUM, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1830).—Cf. Linnaea, vi. (1831) Litt. 73 = CUCURBITACEAE, [Benth. & Hook. f. i. 825].
 filiforme, Schrad. l. c.—Mexic.
 Liebmannii, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 553.—Mexic.

SCHIZOCARYA, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 325 = **Gaura**, Linn. (Onagrar.).
 crispa, Spach, l. c. 384 = G. crispa.
 Drummondii, Spach, l. c. 382 = G. Drummondii.
 Kunthii, Spach, l. c. 383 = G. coccinea.
 micrantha, Spach, l. c. 382 = G. parviflora.

SCHIZOCASIA, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 148.
 AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 978.
 acuta, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 186.—N. Guin.
 Portei, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 148.—Ins. Philipp.

SCHIZOCENTRON, Meissn. Gen. Comm. 355 (1843) = **Heeria**, Schlecht. (Melastom.).
 elegans, Meissn. l. c. = H. elegans.

SCHIZOCHILUS, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 78.
 ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 632.
 Zeyheri, Sond. l. c.—Afr. austr.

SCHIZOCHITON, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 251 (1827) = **Chisocheton**, Blume (Meliac.).

SCHIZOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 595 (1825) = **Schizolaena**, Thou. (Chlaenac.).

SCHIZOCODON, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 723. t. 2. DIAPENSIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 620.
 ilicifolius, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xii. (1868) 71.—Japon.
 soldanelloides, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 725. t. 2. f. 1.—Japon.
 uniflorus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xii. (1868) 71.—Japon.

SCHIZODIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 358 (1838) = **Disa**, Berg. (Orchid.).
 arcuatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 359 = D. torta.
 bifidum, Reichb. f. in Flora, lxvi. (1883) 460 = D. bifida.
 clavigerum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 360.—Afr. austr.
 flexuosum, Lindl. l. c. 359 = D. flexuosa.
 Gueinzii, Reichb. f. in Linnaea, xx. (1847) 694.—Afr. austr.

SCHIZODIUM :—

- inflexum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 360 = Disa inflexa.
 longipetalum, Lindl. l. c. 359 = D. torta?
 maculatum, Lindl. l. c. 360 = D. maculata.
 obliquum, Lindl. l. c. 359 = D. bifida?
 obtusatum, Lindl. l. c. = D. bifida?
 rigidum, Lindl. l. c. 360 = D. bifida.
 torta, Steud. Nom. ed. II. ii. 530 = D. torta.

SCHIZOGLOSSUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 218 (1837). ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 753.

ASPIDOGLOSSUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 200 (1837).

LAGARINTHUS, E. Mey. l. c. 202 (1837).
 MACKENIA, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 233 (1868).

RHINOLOBIUM, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 420.

atropurpureum, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 219.—Afr. austr.
 bidens, E. Mey. l. c. 220.—Afr. austr.

cordifolium, E. Mey. l. c. 219 = Cynanchum cordifolium.
 euphorbioides, E. Mey. l. c.—Afr. austr.

Gerrardi, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 753 (Gerardi) = Gomphocarpus Gerrardi.

Grantii, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 109.—Afr. trop.

hamatum, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 220.—Afr. austr.

hirsutum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 1. 256.—Afr. austr.

interruptum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 753.—Afr. austr.

Petherickianum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 109.—Afr. trop.

virens, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 219.—Afr. austr.

SCHIZOGYNE, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 23 (1828) = **Inula**, Linn. (Compos.).

glaberrima, DC. Prod. v. 473.—Ins. Canar.

obtusifolia, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 23.—Ins. Canar.

sericea, DC. Prod. v. 473 = obtusifolia.

SCHIZOICA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 249 = **Napaea**, Linn. (Malvac.).
 laevis, Alef. l. c. = N. dioica.
 palmata, Alef. l. c. = N. dioica.

SCHIZOLAENA, Thou. Hist. Vég. Afr. 43. t. 12 (1807). CHLAENACEAE, Benth. & Hook. f. i. 195.

SCHIZOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 595 (1825).

cauliflora, Thou. Hist. Vég. Afr. 43. t. 12.—Madag.

elongata, Thou. l. c. 44.—Madag.

exinvolucrata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 97.—Madag.

rosea, Thou. Hist. Vég. Afr. 43. t. 12.—Madag.

SCHIZOLEPIS, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 186. t. 26 (1842) = **Scleria**, Berg. (Cyperac.).

abortiva, Nees, l. c. 187 = Scleria abortiva.

arguta, Nees, l. c. 189 = Scleria arguta.

foliosa, Nees, l. c. 188 = Scleria plusiophylla.

latifolia, Nees, l. c. 186 = Scleria arundinacea.

myricocarpa, Nees, l. c. 189 = Scleria myricocarpa.

olyroides, Nees, l. c. 187 = Scleria olyroides.

panicoides, Nees, l. c. 188 = Scleria panicoides.

rufescens, Schrad. ex Nees, l. c. 187 = Scleria olyroides.

Sieberi, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 188 = Scleria Sieberi.

silvestris, Nees, l. c. 223–224 = Scleria sylvestris.

trigonocarpa, Nees, l. c. 186 = Scleria arundinacea.

SCHIZOLOBIUM, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 399. LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 569.

excelsum, Vog. l. c.—Bras.

glutinosum, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1846) 157.—Bras.?

SCHIZOMERIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.–June, 1830) 94. SAXIFRAGEAE, Benth. & Hook. f. i. 651.

ovata, D. Don, l. c. 95.—Austral.

SCHIZONEPHOS, Griff. Notul. iv. 383 (1854) = *Piper*, Linn.
glaucescens, Griff. l. c. = *P. Schizonephos*.

SCHIZONOTUS, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1876) 66. *ASCLEPIADEAE*.
purpurascens, A. Gray, l. c. — Calif.

SCHIZONOTUS, Lindl. ex Wall. Cat. n. 703 (1830) = *Spiraea*, Linn. (Rosac.).
discolor, Rafin. New Fl. Am. iii. 75 = *Sp. discolor*.
Lindleyanus, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 = *Sp. sorbifolia*.
sorbifolius, Lindl. ex Wall. Cat. n. 703 = *Sp. sorbifolia*.
tomentosus, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 71 = *Sp. sorbifolia*.

SCHIZOPEPON, Maxim. Prim. Fl. Amur. 110 (1859). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 839.
bryoniaefolius, Maxim. l. c. 111. t. 6. — Manchuria.

SCHIZOPETALON, Sims, Bot. Mag. t. 2379 (1823). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 76.
PERREYMONDIA, Barn. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 168.
Gaynum, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 145. — Chili.
maritimum, Barn. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 167. — Chili.
Walcheri, Barn. l. c. 168, sphalm. = seq.
Walkeri, Sims, Bot. Mag. t. 2379; Hook. Exot. Fl. i. t. 74. — Chili.

SCHIZOPETALUM, DC. Prod. i. 236 (1824) = *praece*.

SCHIZOPHRAGMA, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. 58. t. 26 (1835). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 641.
hydrangioides, Sieb. & Zucc. l. c. 60. — Japon.

SCHIZOPHYLLUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 452 = *Lipochaeta*, DC. (Compos.).
micranthum, Nutt. l. c. 453 = *L. micrantha*.

SCHIZOPLEURA, Endl. Gen. 1228 (1840) = *Beaufortia*, R. Br. (Myrtac.).
Dampieri, Walp. Rep. ii. 162 = *B. Dampieri*.
macrostemon, Walp. l. c. = *B. macrostemon*.
purpurea, Walp. l. c. = *B. purpurea*.

SCHIZOPOGON, Reichb. Consp. 52 (1828) = *Andropogon*, Linn. (Gramin.).
decumbens, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 = *A. brevifolius*.

SCHIZOPSERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 181 = *Schizoptera*, Turcz. (emend. a C. Muell.).

SCHIZOPSIS, Bur. ex Baill. Adansonia, v. (1864–65) 371. t. 10, 11 = *Tynanthus*, Miers (Bignon.).
chimonantha, Bur. ex Baill. l. c. 375. — Bras.
fasciculata, Bur. ex Baill. l. c. 379. — Bras.
Goudotiana, Bur. ex Baill. l. c. 374. — N. Granat.
labiata, Bur. ex Baill. l. c. 373. — Bras.
panurensis, Bur. ex Baill. l. c. — Bras.
polyantha, Bur. ex Baill. l. c. 378. — Peruv.
Regnelliana, Bur. ex Baill. l. c. 379. — Bras.

SCHIZOPTERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 181 (Schizopsera). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 349.
trichotoma, Turcz. l. c. 182. — Ecuador.

SCHIZOSPERMUM, Boiv. ex Baill. Adansonia, xii. (1879) 235 = *Cremaspora*, Benth. (Rubiace.).
tubulosum, Boiv. ex Baill. l. c. = *C. tubulosa*.

SCHIZOSTACHYUM, Nees, Agrost. Bras. 535 (1829). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1214.
CHLOOTHAMNUS, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 386 (1854).
acutiflorum, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 137. — Ins. Philipp.
Apus, Steud. Syn. Pl. Gram. 332 = *Bambusa Apus*.
Bitung, Steud. l. c. = *Bambusa Bitung*.

SCHIZOSTACHYUM:—

Blumei, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 136 = *hindostanicum*.
Blumii, Nees, Agrost. Bras. 535. — Java.
brachycladum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 89. — Ins. Molucc.
capitatum, Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. (1839) 136 = *Guadua capitata*.
chilianthum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 88 = *Melocanna gracilis*.
dumetorum, Munro, in Seem. Bot. Voy. Herald, 424. — China.
Durie, Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. (1839) 136 = *Bambusa Blumeana*.
elegantissimum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 90 (= *Besha elegantissima*). — Java.
glaucifolium, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 137. — Ins. Fiji.
Hasskarlianum, Kurz, Bamboo, 68. — Java.
hindostanicum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 252. — Ind. or.
Iraten, Steud. Syn. Pl. Gram. 332. — Java.
Irratum, Kurz, Bamboo, 66, sphalm. = *praece*.
longispiculatum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 89. — Java.
loriforme, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 150 = *Dendrocalamus flagellifer*.
parviflorum, Munro, l. c. 153 = *Dinorchloa Tjankorreh*.
parvifolium, Munro, l. c. 136. — Madag.
serpentinum, Kurz, Bamboo, 67. — Java.
Zollingeri, Steud. Syn. Pl. Gram. 332 = *Melocanna Zollingeri*.

SCHIZOSTEMMA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1834) 344 = *Oxypetalum*, R. Br. (Asclep.).
Kingii, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 509 = *Vincetoxicum boerhaavifolium*.
longifolium, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1834) 334 = *O. solanoides*.
microphyllum, Decne. l. c. 345 = *O. microphyllum*.
parviflorum, Decne. l. c. = *O. parviflorum*.
solanoides, Decne. l. c. = *O. solanoides*.

SCHIZOSTEPHANUS, Hochst. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762 (1876) = *Vincetoxicum*, Moench (Asclep.).

SCHIZOSTIGMA, Arn. in Arn. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1842). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 72.
hirsutum, Arn. l. c. — Ind. or.

SCHIZOSTIGMA, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 275 = *Cucurbitella*, Walp. (Cucurb.).
asperata, Arn. l. c. = *C. asperata*.

SCHIZOSTYLIS, Backh. & Harv. in Bot. Mag. t. 5422 (1864). *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 702.
coccinea, Backh. & Harv. l. c. — Afr. austr.
ixioides, Harv. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 108 = *panciflora*.
pauciflora, Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867–68) 380. — Afr. austr.

SCHIZOTECHIUM, Reichb. Nom. 205 (1841) = *Stel-laria*, Linn. (Caryoph.).

SCHIZOTHECA, Ehrenb. in Abh. Akad. Berl. i. (1832) 429 = *Thalessia*, Soland. (Hydroch.).
Hemprichii, Ehrenb. l. c. — Afr. bor.

SCHIZOTHECA, Lindl. Veg. Kingd. 513 (1847) = *Atriplex*, Tourn. (Chenop.).
Halimus, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 143 = *A. Halimus*.
hastata, Fourr. l. c. = *A. hastata*.
laciniata, Fourr. l. c. = *A. laciniata*.
littoralis, Fourr. l. c. = *A. littoralis*.
patula, Fourr. l. c. = *A. patula*.
rosea, Fourr. l. c. = *A. rosea*.
tatarica, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ii. (1873) 149 = *A. tatarica*.

SCHIZOTRICHIA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 410 (1873). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. l. c.
eupatorioides, Benth. l. c. — Peruv.

SCHKUHRIA, Moench, Meth. 566 (1794) (Sekuhria);
Cass. in Dict. Sc. Nat. xlix. 115 (1827) = *Siegesbeckia*, Linn. (Compos.).
dichotoma, Moench, l. c.; Cass. l. c. = *Sieg. flosculosa*.

SCHKUHRIA, Roth, Catalect. fasc. i. 116 (1797).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 403.
ACHYROPAPPUS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 257. t. 390 (1820).
CHAMAESTEPHANUM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140.
HOPKIRKIA, DC. Prod. v. 660 (1836).
MIERIA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 9 (1825).
TETRACARPUM, Moench, Meth. Suppl. 241 (1802).
abrotanifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 280, in syn., sphalm. = *abrotanoides*.
abrotanoides, [D.] Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 322 = *bonariensis*.
abrotanoides, Roth, Catalect. fasc. i. 117. — Peruv.
anthemoides, Wedd. Chlor. And. i. 74, in obs. = *Bahia anthemoides*.
Bigelovii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 199 = *Bahia Bigelovii*.
bitemata, A. Gray, l. c.; Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 212 = *Bahia bitemata*.
bonariensis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 321. — Chili.
Hopkirkia, A. Gray, Pl. Wright. ii. 94. — Mexic.
integrifolia, A. Gray, in Am. Natural. viii. (1874) 213 = *Bahia nudicaulis*.
isopappa, Benth. Pl. Hartw. 205. — N. Granat.
multiflora, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 322. — Reg. Argent.
neo-mexicana, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 96 = *Bahia neo-mexicana*.
octoaristata, DC. Prod. v. 654. — Peruv.
oolepis, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 80; et in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 529 = *pusilla*.
pedata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 199 = *Bahia pedata*?
pusilla, Wedd. Chlor. And. i. 73. — Peruv.; Bolivia.
pusilla, Wedd. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 403 = *Bahia anthemoides*?
senecioides, Nees, Del. Sem. Hort. Bonn. (1831); ex DC. Prod. v. 654. — Mexic.
virgata, DC. l. c. — Mexic.
Wisizeni, A. Gray, in Mem. Am. Acad. iv. (1849) 96. — Mexic.
Woodhousei, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 199 = *Bahia Woodhousei*.
Wrightii, A. Gray, Pl. Wright. ii. 95. — N. Mexic.

SCHLAGINTWEITIA, Griseb. in Goett. Abh. v. (1855) 156 = *Hieracium*, Tourn. (Compos.).
intybacea, Griseb. l. c. = *H. intybaceum*.

SCHLECHTENDAHLIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 408 (1873), sphalm. = *Adenophyllum*, Pers. (Compos.).

SCHLECHTENDALIA, Less. in Linnaea, v. (1830) 242. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 484.
luzulaefolia, Less. l. c. 243. — Bras.

SCHLECHTENDALIA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 296 (1827) = *Mollia*, Mart. (Tiliac.).
speciosa, Spreng. l. c. = *M. speciosa*.

SCHLECHTENDALIA, Willd. Sp. Pl. iii. 2125 (1803) = *Adenophyllum*, Pers. (Compos.).
capillacea, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. v. 638 = *A. coccineum*.
glandulosa, Willd. Sp. Pl. iii. 2125 = *A. coccineum*.

SCHLEGELIA, Miq. in Bot. Zeit. ii. (1844) 785.
BIGNONIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1052.
axillaris, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 445. — Ins. Dominic.
brachyantha, Griseb. Cat. Pl. Cub. 191. — Cuba.
elongata, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 73. — Guian.
lilacina, Miq. in Bot. Zeit. ii. (1844) 786. — Guian.
parasitica, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 445. — Ind. occ.
violacea, Griseb. l. c. (Tabebuia sp.). — Ind. occ.

SCHLEICHERA, Willd. Sp. Pl. iv. 1096 (1805) *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 404.
CUSSAMBUM, [Rumph.] ex Buch.-Ham. in Mem. Wern. Soc. v. ii. (1826) 356.

SCHLEICHERA :—

- aculeata*, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora, v. 1829 = *trijuga*.
amoena, Walp. Rep. v. 366 = *Melicocca amoena*.
pentapetala, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 275 = *Cupania pentapetala*.
ptychocarpa, F. Muell. Fragm. ix. 97 = *Dysoxylum ptychocarpum*.
pubescens, Roth, Nov. Pl. Sp. 385 = *trijuga*.
revoluta, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 575, in obs.—Ins. Philipp.
subundulata, Turcz. l. c. 574.—Ins. Philipp.
trijuga, Mor. Syst. Verz. Zoll. 22 = *Cupania Lesseriana*.
trijuga, Willd. Sp. Pl. iv. 1396.—Ind. or.; Malaya.

SCHLEIDENIA, Endl. Gen. 646 (1839) = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).

- bahiensis*, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 37 = *H. polyphyllum*.
barbata, Fresen. l. c. 43 = *H. barbatum*.
Clausseni, Fresen. l. c. 38 = *H. Clausseni*.
dasycarpa, Fresen. l. c. 37.—Bras.
elliptica, Fresen. l. c. 42.—Bras.
filiformis, Fresen. l. c. 40 = *A. filiforme*.
fumana, Fresen. l. c.—Bras.
Gardneri, Fresen. l. c. 35.—Bras.
glomerata, Fresen. l. c. 39 = *H. polyphyllum*.
hispida, Fresen. l. c. 37 = *H. fruticosum*.
humistrata, Fresen. l. c. 34 = *H. humistratum*.
incana, Fresen. l. c. 38.—Bras.
inundata, Fresen. l. c. 43 = *H. inundatum*.
lagoensis, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867) 15.—Bras.
leptostachya, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 43.—Bras.
linifolia, DC. Prod. ix. 558.—Bras.
longepetiolata, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 42.—Bras.
macrantha, Fresen. l. c. 40.—Bras.
macrodon, Fresen. l. c. 35.—Bras.
ocellata, Fresen. l. c. 41 = *H. ocellatum*.
ovalifolia, Fresen. l. c.—Bras.
paradoxa, DC. Prod. ix. 557.—Bras.
parciflora, DC. l. c.—Bras.
polyphylla, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 37 = *H. polyphyllum*.
pubescens, Fresen. l. c. 35.—Bras.
pullulans, Fresen. l. c. 34.—Bras.
salicoides, Fresen. l. c. 38 = *H. salicoides*.
stenostachya, DC. Prod. ix. 558.—Bras.
strictissima, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 39 = *H. strictissimum*.
subracemosa, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867) 16.—Bras.

SCHLERANTHUS, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bologn. ii. (1850) 295, sphalm. = **Scleranthus**, Linn. (Illecebr.).**SCHLIMIA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1875) 285 = **Lisianthus**, Aubl. (Gentian.).
Princeps, Regel, l. c. 286 = **L. Princeps**.**SCHLIMMIA**, Planch. & Linden, in Linden, Cat. (1852); ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 115. **ORCHIDACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 553.
alpina, Reichb. & Warsz. in Bonplandia, ii. (1854) 98.—N. Granat.
jasminodora, Planch. & Linden, in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 115.—N. Granat.
trifida, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) ii. 708.—N. Granat.**SCHLOSSERIA**, Mill. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 (1841) = **Coccoloba**, Linn. (Polygon.).**SCHLOSSERIA**, Vukot. in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 350 = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
heterophylla, Vukot. l. c. = *P. carvifolium*, Vill.**SCHLUMBERGERA**, Lem. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 253 = **Epiphyllum**, Haw. (Cact.).
epiphyllodes, Lem. l. c. = *E. Russellianum*.**SCHLUMBERGERIA**, E. Morr. Belg. Hort. xxviii. (1878) 311. **BROMELIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 668.
Lindeni, E. Morr. Belg. Hort. xxxiii. (1883) 121. t. 10-12.—Peruv.**SCHLUMBERGERIA** :—

- Morreniana*, E. Morr. Belg. Hort. xxxiii. (1883) 46, t. 4-6.—Ecuador vel Peruv.
Roezli, E. Morr. l. c. xxviii. (1878) 311; xxix. (1879) 360. t. 19.—Peruv.
virescens, E. Morr. l. c. xxix. (1879) 225, 360 = *Roezli*.

SCHMALTZIA, 'Desv.' ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 (1841) = seq.**SCHMALZIA**, Desv. ex DC. Prod. ii. 72 (1825) = **Rhus**, Tourn. (Anacard.).
aromatica, Desv. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 = *Rhus aromatica*.**SCHMARDAEA**, Karst. Fl. Columb. i. 187. t. 93. (1861?) = **Elutheria**, M. Roem. (Meliac.).
microphylla, Karst. ex C. Muell. in Walp. Ann. vii. 560 = *E. microphylla*.
nobilis, Karst. Fl. Columb. i. 187. t. 93 = *E. microphylla*.**SCHMIDELIA**, Linn. Mant. i. 10 (1767). **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 396.
APORETICA, Forst. Char. Gen. 131. t. 66 (1776).
AZAMARA, Hochst. ex Reichb. Nom. 145 (1841).
GEMELLA, Lour. Fl. Cochinch. 648 (1790).
NASSAVIA, Vell. Fl. Flum. iii. tt. 155, 156 (1827).
ORNITROPHE, Juss. Gen. 247 (1789).
TOXICODENDRON, Gaertn. Fruct. i. 207. t. 44 (1788).*abyssinica*, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 80 = *Allophylus zeylanicus*.*acuminata*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 55 = *Allophylus zeylanicus*.*adenophylla*, Wall. Cat. n. 8063 = *Allophylus Cobbe*.*affinis*, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 121.—Afr. trop.*africana*, DC. Prod. i. 611 = *Allophylus zeylanicus*.*allophylla*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.*Allophyllus*, DC. Prod. i. 611 = *Allophylus zeylanicus*.*alnifolia*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 422.—Afr. trop.*amazonica*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 6.—Bras.*angustata*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 371.—N. Granat.*anodonta*, F. Muell. Fragm. i. 2 = *Ratonia anodonta*.*aporetica*, Wall. Cat. n. 8058; Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 74 = *Allophylus Cobbe*.*bahiensis*, Turcz. in Bull. Sc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 398 = *Connarus Blanchetii*.*bantamensis*, Blume, Bijdr. 231 = *Allophylus fulvinervis*.*bidentata*, Wall. Cat. n. 8062 = *Allophylus zeylanicus*.*Bojeriana*, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 38 = *Allophylus Cobbe*.*caracasana*, Karst. Fl. Columb. ii. 83. t. 142.—Venezuela.*chartacea*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) ii. 183.—Reg. Himal.*Cobbe*, DC. Prod. i. 610 = *Allophylus Cobbe*.*cochinchinensis*, DC. l. c. 611 = *Allophylus Cobbe*.*cochinchinensis*, Spreng. Syst. ii. 222.—Cochinch.*Cominia*, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 697.—Ind. occ.*conduplicata*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1180, nomen.—Guian.*conferta*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 217 = *Allophylus zeylanicus*.*decipiens*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153.—Afr. austr.*dentata*, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 93 = *Allophylus Cobbe*.*dioica*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 5 = *heterophylla*.*distachya*, DC. Prod. i. 610 = *Allophylus Cobbe*.*Dregeana*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 239 = *monophylla*.*edulis*, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. t. 67.—Bras.*erosa*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153; Presl, Bot. Bemerk. 41.—Afr. austr.*excelsa*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 371.—N. Granat.*floribunda*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 38.—Peruv.**SCHMIDELIA** :—*foetidissima*, Wall. Cat. n. 8064 (an *Gynocardia* sp.?).
—Ind. or.*fulvinervis*, Blume, Bijdr. 231 = *Allophylus fulvinervis*.*Gemella*, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 24.—Cochinch.*glabra*, Roxb. ex Wall. Cat. n. 8057 = *Allophylus Cobbe*.*glabrata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 122.—Am. trop.*Goudotii*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 372.—N. Granat.*grandifolia*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 421.—Afr. trop.*grossedentata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 401 = *Allophylus Cobbe*.*guaranitica*, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 133.—Bras.*guianensis*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1180, nomen.—Guian.*heterophylla*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 383. t. 82.—Bras.*hirtella*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 248.—Afr. trop.*hispida*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 55 = *Allophylus zeylanicus*.*inaequilatera*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 6. = *occidentalis*.*integerrima*, Wall. Cat. n. 8065 = *Evodia Roxburghiana*.*integrifolia*, DC. Prod. i. 610 = *Allophylus Cobbe*.*javensis*, Blume, Bijdr. 232.—Java.*Kobbe*, Lam. Illustr. ii. 443. t. 312. f. 2 = *Allophylus Cobbe*.*laevigata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 399.—Bras.*leptostachya*, Blume, Rumphia, iii. 141.—Java.*leucocarpa*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153.—Afr. austr.*levis*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 382.—Bras.*littoralis*, Blume, Bijdr. 232.—Java.*macrocarpa*, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 283 = *Picrodendron arboreum*.*macrophylla*, DC. Prod. i. 610.—Guian.*macrophylla*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 180, nomen = *Allophylus Cobbe*.*magica*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 423.—Afr. trop.*melanocarpa*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153.—Afr. austr.*Meyeri*, Planch. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 424 = *monophylla*.*mollis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 123.—N. Granat.*monophylla*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 775 = *hirtella*.*monophylla*, Presl, Bot. Bemerk. 40.—Afr. trop. et austr.*mutabilis*, Blume, Rumphia, iii. 140.—Java.*natalensis*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 239 = *erosa*.*nervosa*, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 281 = *Thouinia nervosa*.*nitidula*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 370.—N. Granat.*oblongifolia*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 424.—Afr. trop.*obovata*, A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped. i. 249 = *Allophylus Cobbe*.*occidentalis*, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 665.—Am. trop.*orientalis*, Sw. l. c. 666 = *Allophylus Cobbe*.*ornitrophoides*, Wall. Cat. n. 8055 = *Allophylus Cobbe*.*paniculata*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 38.—Peruv.*panigera*, G. Don, Gen. Syst. i. 663.—N. Caled.*parviflora*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 180, nomen = *Allophylus Cobbe*.*pinnata*, DC. Prod. i. 611 = *Pometia pinnata*.*puberula*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 382.—Bras.*punctata*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 38. t. 244.—Peruv.*pyriformis*, F. Muell. Fragm. i. 2 = *Ratonia pyriformis*.*quercifolia*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 7.—Bras.*racemosa*, Linn. Mant. i. 67 = *Allophylus Cobbe*.

SCHMIDELIA :—

- reflexa, Baker, in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 425.—Afr. trop.
 repanda, Baker, l. c. 422.—Afr. trop.
Rheedei, Wight, Ic. t. 964; Spicil. Neilgherr. i. 30. t. 33 = *Allophylus* Cobbe.
rhomboidalis, Nadeaud, Enum. Pl. Tahiti, 70 = *Allophylus* Cobbe.
 rigida, Sw. *Fl. Ind. Occ.* ii. 663.—Ins. S. Doming.
 rubrifolia, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 103.—Abyss.
 scrobiculata, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 37. t. 244.—Peruv.
semitentata, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 798 = *occidentalis*.
senegalensis, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 = *africana*.
sericea, Cambess. in A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* i. 380 = *occidentalis*.
serrata, DC. Prod. i. 610 = *Allophylus* Cobbe.
spicata, DC. l. c. 611 = *Allophylus* Cobbe.
ternata, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 24 = *Allophylus* Cobbe.
 thyrsoideis, Baker, in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 423.—Afr. trop.
timoriensis, DC. Prod. i. 611 = *Allophylus* Cobbe.
 tomentosa, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 164.—Borneo.
triandra, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 218 = *Schleichera* trijuga.
undulata, Arn. in Hook. *Journ. Bot.* iii. (1841) 152, 153 = *decipiens*.
unguicularis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 399 = *occidentalis*.
varians, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 408 = *Allophylus* zeylanicus.
 velutina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1838) i. 400.—Guian.
 vestita, Wall. Cat. n. 8066 = *Allophylus* Cobbe.
 villosa, Wight, Ic. t. 401 = *Allophylus* Cobbe.
 viticifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 215.—Cuba.

SCHMIDIA, Wight, Ic. t. 1848 (1852) = **Thunbergia**, Linn. (Acanth.).
bicolor, Wight, l. c. = *T. Wightiana*.

SCHMIDTIA, Moench, Meth. Suppl. 217 (1802) = **Toipis**, Adans. (Compos.).

- abyssinica*, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxix. (1841) i. Intell. 27 = *T. abyssinica*.
ambigua, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 433 = *T. virgata*.
anethifolia, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 131 = *T. pectinata*.
capensis, Reichb. ex Froel. in DC. Prod. vii. 218 = *Hieracium* capense.
coronopifolia, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 404 = *T. coronopifolia*.
farinulosa, Webb, in Hook. Niger Fl. 143.—Ins. Cap. Virid.
filiformis, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 399 = *T. filiformis*.
fruticosa, Moench, Meth. Suppl. 218 = *T. fruticosa*.
laciniata, Sch. Bip. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 406 = *T. laciniata*.
lagopoda, Sch. Bip. l. c. 408 = *T. lagopoda*.
nobilis, Sch. Bip. l. c. 399 = *T. nobilis*.
parviflora, Sch. Bip. l. c. 404 = *T. coronopifolia*.
quercifolia, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 131 = *T. umbellata*.
Webbii, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 409 = *T. Webbii*.

SCHMIDTIA, Steud. in J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 144 (1852). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1175.
 pappophoroides, Steud. l. c. 145.—Ins. Cap. Virid.
 quinqueseta, Benth. ex Ficalho & Hiern, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1881) 31.—Afr. trop.

SCHMIDTIA, Tratt. Fl. Austr. i. 12. t. 451 (1811) = **Coleanthus**, Seid. (Gramin.).
subtilis, Tratt. l. c. = *C. subtilis*.
utriculata, J. & C. Presl, Fl. Cech. 12 = *C. subtilis*.
utriculosa, Sternb. in Flora, ii. (1819) 6 = *C. subtilis*.

SCHMIDELIA, Murr. Syst. ed. XIII. 310 (1774) = **Schmidelia**, Linn. (Sapind.).

- SCHNELLA**, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 411 = **Bauhinia**, Linn. (Legumin.).
brachystachya, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 98 = *cumanensis*.
columbiensis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 89 = *B. cumanensis*.
excisa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 214 = *B. excisa*.
emarginata, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1210, nomen.—Guian.
flexuosa, Walp. Rep. v. 572 = *B. flexuosa*.
longipetala, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 98 = *B. longipetala*.
macrophylla, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 210 = *B. macrophylla*.
macrostachya, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 411 = *B. Raddiana*.
microstachya, Raddi, l. c. = *B. Langsdorffiana*.
rosea, Walp. Rep. v. 572 = *B. rosea*.
rubiginosa, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 97 = *B. rubiginosa*.
smilacina, G. Don, Gen. Syst. ii. 459 = *B. smilacina*.
splendens, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 97 = *B. splendens*.
vestita, Benth. Pl. Hartw. 171.—N. Granat.

SCHNITTSPAHNIA, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) 436 = **Landtia**, Less. (Compos.).
Rueppellii, Sch. Bip. l. c. 439 = *L. Rueppellii*.
Schimperi, Sch. Bip. l. c. = *L. Schimperii*.

SCHNITZLEINIA, 'Steud.' ex Walp. Ann. iii. 625 (1852-53) = **SCHNIZLEINIA**, Steud. = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).

SCHNIZLEINIA, Mart. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 46 (1872) = **Emmotum**, Desv. (Olac.).
nitida, Mart. ex Engl. l. c. = *E. nitens*.

SCHNIZLEINIA, Steud. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 31 = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).
amica, Steud. l. c. (= *Hypoxis Schnizleinia*).—Abyss.

SCHNIZLEINIA, Steud. Nom. ed. II. i. 213, in syn. (1840) = **Boissiera**, Hochst. (Gramin.).

SCHNIZLEINIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 532, 720 (1841) = **Trochiscanthes**, Koch (Umbell.).
nodiflora, Steud. l. c. = *T. nodiflora*.

SCHOBERA, Scop. Introduct. 158 (1777) = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).
hirsuta, Rafin. Sylva Tellur. 158 = *H. parviflorum*?

- SCHOBERA**, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 395 (1829) = **Suaeda**, Forsk. (Chenop.).
acuminata, C. A. Mey. l. c. 398 = *Suaeda acuminata*.
altissima, C. A. Mey. l. c. 402, in obs. = *Suaeda altissima*.
americana, C. A. Mey. l. c. = *Suaeda plattensis*.
australis, C. A. Mey. l. c.—Austral.
baccifera, Hohen. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 168 = *Suaeda setigera*.
baccifera, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 402, in obs. = *Suaeda baccifera*.
Biebersteiniana, C. A. Mey. l. c. = *Suaeda microphylla*.
calceoliformis, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 166 = *Suaeda calceoliformis*.
Clemente, Steud. Nom. ed. II. ii. 532 = *Suaeda setigera*.
corniculata, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 399 = *Suaeda corniculata*.
crassifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 532.—Hispan.
cycloptera, Bunge, ex Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) ii. 64.—Soongar.
dendroides, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 159 = *Suaeda dendroides*.
Dumortieri, Steud. Nom. ed. II. ii. 532 = *Suaeda maritima*.
fruticosa, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 402, in obs. = *Suaeda fruticosa*.
fruticulosa, Less. in Linnaea, ix. (1834) 200.—Sibir.
glaucia, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 56 = *Suaeda glauca*.
heterophylla, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 734 = *Suaeda heterophylla*.

SCHOBERIA :—

- hortensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 532 = *Suaeda hortensis*.
indica, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iv. 1438 = *Suaeda maritima*.
leiosperma, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 397 = *Suaeda altissima*.
linearis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 465 = *Suaeda linearis*.
linifolia, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = *Suaeda maritima*.
macrocarpa, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 402, in obs. = *Suaeda maritima*.
maritima, C. A. Mey. l. c. 400 = *Suaeda maritima*.
microphylla, Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 3, 6 = *Suaeda dendroides*.
microphylla, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 402, in obs. = *Suaeda microphylla*.
microsperma, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 14. t. 13 = *Suaeda microsperma*.
monoica, Steud. Nom. ed. II. ii. 532 = *Suaeda monoica*.
montana, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = *Suaeda maritima*.
nudiflora, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iv. 1438 = *Suaeda nudiflora*.
obtusifolia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 466 = *Suaeda obtusifolia*.
occidentalis, S. Wats. in Bot. King's Exped. 295.—Am. bor. occ.
Pallasiana, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 402, in obs. = *Kochia hirsuta*.
parviflora, Less. in Linnaea, ix. (1834) 201 = *Suaeda microsperma*.
physophora, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 396 = *Suaeda physophora*.
prostrata, C. A. Mey. l. c. 402, in obs. = *Suaeda microsperma*.
pterantha, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 734 = *Suaeda pterantha*.
pygmaea, Kar. & Kir. l. c. (1842) 436 = *Suaeda minima*.
salinaria, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 62.—Europ.
salsa, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 401 = *Suaeda salsa*.
setigera, C. A. Mey. l. c. 402, in obs. = *Suaeda setigera*.
spicata, C. A. Mey. l. c. = *Suaeda spicata*.
suffruticulosa, Less. ex Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 465 = *Suaeda physophora*.
tortuosa, Moq. ex Bunge, l. c. 464.—Hab.?
transoxana, Bunge, l. c. 467 = *Suaeda pterantha*.
trigyna, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 402, in obs. = *Suaeda altissima*.
vera, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 465 = *Suaeda vera*.

SCHOEBERA, Neck. Elem. i. 278 (1790), sphalm. = **SCHOBERA**, Scop. = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).

SCHOENANTHUM, Mich. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

SCHOENANTHUS, Adans. Fam. ii. 38 (1763) = *praec.*

SCHOENEFELDIA, Kunth, Rév. Gram. 283. t. 53 (1830). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1164.

- gracilis*, Kunth, l. c.—Afr. trop.
nutans, Steud. Syn. Pl. Gram. 202.—Afr. trop.
pallida, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 1852 (1853), 183.—Ind. or.
ramosa, Trin. Sp. Gram. Ic. iii. t. 359.—Ins. Cap. Virid.
stricta, Steud. Syn. Pl. Gram. 202 = *gracilis*.

SCHOENFELDIA, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 183 (Schaeffeldia), sphalm. = *praec.*

SCHOENIA, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 480 (1845). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 314.
Cassiniana, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 481.—Austral.
chlorocephala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 193 = *Helipterum chlorocephalum*.

SCHOENIA :—

Humboldtiana, Steetz, ex Walp. Rep. vi. 244 = *Helipterum Humboldtianum*.
oppositifolia, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 480 = *Cassiniana*.

SCHOENIDIUM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 = *Ficinia*, Schrad. (Cyperac.).
laterale, Nees, l. c. = *F. lateralis*.

SCHOENISSA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 91 (1866) = *Allium*, Tourn. (Liliac.).
caucasea, Salisb. l. c. = *A. globosum*.
rosea, Salisb. l. c. = *A. Schoenoprasum*.
schoenoprasa, Salisb. l. c. = *A. Schoenoprasum*.

SCHOENLEINIA, Klotzsch, in Hayne, Arzn. Gew. xiv. sub t. 15 (1843) = *Bathysa*, Presl (Rubiace.).
barbinervis, Klotzsch, l. c. = *B. stipulata*.
cuspidata, Klotzsch, l. c. = *Bras*.
thyrsoides, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864) 186. — *N. Granat*.

SCHOENLEINIA, Klotzsch, ex Lindl. Veg. Kingd. 182 (1847) = *Ponthieva*, R. Br. (Orchid.).

SCHOENOBIBLOS, Endl. Gen. 330 (1838) = seq.

SCHOENOBIBLUS, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 65 (1824). *THYMELAEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 189.
daphnoides, Mart. l. c. = *Bras*.

SCHOENOCAULON, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iv. (1837) 127. *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 836.

ASAGRAEA, Lindl. Bot. Reg. t. 33 (1839).

SABADILLA, Brandt & Ratzeb. in Heyne, Arzn. Gew. xiii. t. 27 (1837).

SKOINOLON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 27 (1836), nomen prius.

Coulteri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 477. — *Mexic*.

Drummondii, A. Gray, in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 388, in nota. — *Mexic*.

gracile, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iv. (1837) 127. — *Am. bor*.

intermedium, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 477. — *Mexic*.

officinale, A. Gray, in Benth. Pl. Hartw. 29. — *Mexic*.

texanum, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 262 = *Drummondii*.

SCHOENOCEPHALUM, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 130 (1847). *RAPATEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 859.

arthrophyllum, Seub. l. c. 131. — *Bras*.

Martianum, Seub. l. c. 130. — *Bras*.

SCHOENODORUS, Roem. & Schult. Syst. ii. 42 (1817) = *Schedonorus*, Beauv. (Gramin.).

SCHOENODUM, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 79. t. 29 (1806) = *Lyginia*, R. Br. et *Leptocarpus*, R. Br. (Restiac.).

chilense, C. Gay, Fl. Chil. vi. 152 = *Leptocarpus chilensis*.

gracile, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 532 = *Anarthria gracilis*.

laevis, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria laevis*.

pauciflorum, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria prolifera*.

proliferum, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria prolifera*.

scabra, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria scabra*.

scariosum, Kunth, Enum. Pl. iii. 447 = *Leptocarpus scariosus*.

simplex, Kunth, l. c. 446 = *Leptocarpus Brownii*.

tenax, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 80. t. 229 = *Leptocarpus tenax*, *Lyginia barbata*.

SCHOENOLAENA, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 289 (1845) = *Xanthosia*, Rudge (Umbell.).
juncea, Bunge, l. c. = *X. juncea*.
tenuior, Bunge, l. c. 290 = *X. tenuior*.

SCHOENOLIRION, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 103. *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 785.

AMBLOSTIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 26 (1836).

OXYTRIA, Rafin. l. c. (1836).

album, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 103. — *Calif*.

croceum, A. Gray, in Am. Natural. x. (1876) 427. — *Am. bor*.

Elliotii, Feay, ex A. Gray, l. c. — *Florida*.

Michauxii, Torr. Bot. Mex. Bound. 220. — *Am. bor*.

Michauxii, Torr. l. c., partim = *texanum*.

texanum, A. Gray, in Am. Natural. x. (1876) 427. — *Am. bor*.

SCHOENOPRASUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 277 (1815) = *Allium*, Tourn. (Liliac.).

lineare, H. B. & K. l. c. = *A. Kunthii*.

longifolium, H. B. & K. l. c. = *A. longifolium*.

vulgare, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 159 = *A. Schoenoprasum*.

SCHOENOPSIS, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 341 (1819) = *Tetraria*, Beauv. (Cyperac.).

Burmanni, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 528. — *Afr. austr*.

flexuosa, Nees, l. c. — *Afr. austr*.

SCHOENORCHIS, Reinw. Cat. Gew. Buitenz. 100 (1823), nomen; Blume, Bijdr. 361 (1825). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 581.

juncifolia, Reinw. l. c.; Blume, l. c. — *Java*.

micrantha, Reinw. l. c.; Blume, l. c. 362 = *Saccolabium chionanthum*.

paniculata, Blume, l. c. = *Saccolabium ramulosum*.

SCHOENOXIPHUM, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 581. *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1072.

HEMICAREX, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1072 (species africanae).

Burkei, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 386 = *Dregeanum*.

capense, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 533. — *Afr. austr*.

Dregeanum, Kunth, Enum. Pl. ii. 529. — *Afr. austr*.

Ecklonii, Nees, in Linnaea, x. (1836) 200. — *Afr. austr*.

Lehmanni, Kunth, ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 245 = *Carex Eesenbeckiana*.

Ludwigii, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 764 = *rufum*.

Meyerianum, Kunth, Enum. Pl. ii. 530 = *capense*.

rufum, Nees, in Linnaea, x. (1836) 201. — *Afr. austr*.

Sickmannianum, Kunth, Enum. Pl. ii. 530. — *Afr. austr*.

Thunbergii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 305 = *rufum*.

Thunbergii, Nees, l. c. x. (1836) 201. — *Afr. austr*.

SCHOENUS, Linn. Coroll. Gen. 2 (1737), pro parva parte; Benth. Fl. Austral. vii. 352 (1878). *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1062.

CHAETOSPORA, R. Br. Prod. 232 (1810).

CYCLOCAMPE, Steud. Syn. Pl. Cyp. 156 (1855).

CYCLOCARPA, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 339 (1855).

GYMNOCHAETA, Steud. Syn. Pl. Cyp. 156 (1855).

HELOTHRIX, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 45.

ISOSCHOENUS, Nees, l. c. 49 (1841).

STREBLIDIA, Link. Hort. Berol. i. 276 (1827).

aculeatus, Linn. Sp. Pl. 42 = *Crypsis aculeata*.

acuminatus, R. Br. Prod. 231. — *Austral*.

acutus, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 18. t. 18 = *Cladium schoenoides*.

aggregatus, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 202 = *Scirpus flaccifolius*.

aggregatus, Steud. ex Kunth, l. c. 202, in obs. = *Ficinia tenuifolia*.

aggregatus, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i. (1803) 5; Fl. Cap. i. 349 = *nigricans*.

albus, Linn. Sp. Pl. 44 = *Rynchospora alba*.

altissimus, Salz. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 152 = *Cladium germanicum*.

anceps, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena anceps*.

angularis, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 128 = *Kyllinga peruviana*.

SCHOENUS :—

angustifolius, Vahl, Enum. ii. 225 = *Dulichium spathaceum*.

aphyllus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 280. — *Austral*.

aphyllus, Vahl, Enum. ii. 209 = *Actinoschoenus Thouarsii*.

apogon, Roem. & Schult. Syst. ii. 77. — *Austral*; *N. Zel*.

arenarius, Schrad. Anal. Cyp. 27. t. 4. f. 2 = *Tetraria compar*.

aristatus, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 309 (= *Elynanthus cuspidatus*). — *Afr. austr*.

aristatus, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in Mélang. (1811), nomen. — *Madag*.

aristatus, Steud. in Flora, xii. (1829) 135 = *Hypodiscus duplicatus*.

aristatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (= *Elynanthus aristatus*). — *Afr. austr*.

Armeria, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 279. — *Austral*.

articulatus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 184 = *Rynchospora aurea*.

arundinaceus, Soland. ex Forst. f. Prod. 89, nomen; Vahl, Enum. ii. 220. — *N. Zel*; *Ins. Molucc*; *N. Caled*.

asper, Schrad. in Schult. Mant. ii. 41 = *Fimbristylis aspera*.

asperocarpus, F. Muell. Fragm. ix. 29. — *Austral*.

atratus, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) iii. 2069 = *Ficinia setiformis*.

axillaris, Lam. Illustr. i. 137 = *Rynchospora cephalantha*.

axillaris, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251. — *N. Zel*.

barbatus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 277. — *Austral*.

barbatus, Vahl, Eclog. Am. ii. 4 = *Rynchospora pterocarpa*.

Benthami, F. Muell. Census, 127 = *compressus*.

bifidus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 282. — *Austral*.

Bobartiae, Retz. Obs. iv. 9. — *Zeylan*.

Bonanni, Presl, Fl. Sic. p. xliii = *nigricans*.

breviculmis, Benth. Fl. Austral. vii. 364. — *Austral*.

brevifolius, R. Br. Prod. 231. — *Austral*.

brevisetis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251. — *Austral*.

bromoides, Lam. Illustr. i. 137 (= *Lepidosperma thermale*). — *Afr. austr*.

Brownii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 298 = *apogon*.

brunneus, Soland. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 65 = *Scirpus rufus*.

bulbosus, Linn. Mant. ii. 178 = *Ficinia bulbosa*.

bulbosus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia secunda*.

Burmanni, Vahl, Enum. ii. 227 (= *Tetrariae* sp.). — *Afr. austr*.

calostachyus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251. — *Austral*; *Malaya*.

capensis, Linn. Cent. Pl. i. 4; Amoen. Acad. iv. 264 = *Ficinia ramosissima*.

capillaceus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (= *Elynanthus* sp.). — *Afr. austr*.

capillaris, F. Muell. Census, 128 (= *Elynanthus capillaceus*). — *Austral*.

capillaris, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 20 = *Mariscus capillaris*.

capitatus, Crantz, Inst. i. 408 = *Kyllinga brevifolia*, *Mariscus Dregeanus*.

capitatus, Dubois, Méth. ed. II. 247 = *Scirpus Michelianus*.

capitatus, F. Muell. Fragm. ix. 58. — *Austral*.

capitatus, Pers. Syn. i. 60 = *Rynchospora glomerata*.

capitatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 617 = *Rynchospora capitata*.

capitellatus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 36 = *Rynchospora glomerata*.

Capitellum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia setiformis*.

caricoides, Steud. in Flora, xii. (1829) 137 = *Hemichlaena angustifolia*.

castaneus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 303 = *Cladium germanicum*.

Cephalotes, Rottb. Desc. Nov. Pl. 61; Progr. 14 = *Rynchospora Cephalotes*.

cerasiformis, Poir. Encyc. Suppl. v. 617 = *Rynchospora globosa*.

ciliaris, Michx. Fl. Bor. Am. i. 36 = *Rynchospora ciliata*.

SCHOENUS:—

- ciliaris*, Muhl. Desc. Gram. 11 = *Rynchospora plumosa*.
ciliatus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 23 = *Dichromena ciliata*.
circinalis, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 43 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.
Cladium, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Cladium germanicum*.
coarctatus, Seenus, Reise Istrien, 74 = *Juncus maritimus*.
coloratus, Linn. Sp. Pl. 43 = *Dichromena leucocephala*.
comatus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 41 = *Rynchospora comata*.
compar, Linn. Mant. ii. 177 = *Tetraria compar*.
compressus, Benth. Fl. Austral. vii. 357.—Austral.
compressus, Linn. Sp. Pl. 43 = *Scirpus Caricis*.
compressus, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 12 = *nigricans*.
concinus, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 299.—N. Zel.
confervoides, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 173 = *Scirpus confervoides*.
congestus, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 76 = *Cladium germanicum*.
corniculatus, Lam. Illustr. i. 137 = *Rynchospora laxa*.
coronatus, Steud. in Flora, xii. (1829) 136 = *Ficinia laxa*.
corymbosus, Pers. Syn. i. 59 = *Rynchospora aurea*.
crentus, Benth. Fl. Austral. vii. 357.—Austral.
curvifolius, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.
cuspidatus, Rottb. Desc. Nov. Pl. 66; Progr. 13 (= *Elynanthus cuspidatus*).—Afr. austr.
cygneus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81.—Austral.
cymosus, Willd. Sp. Pl. i. 265 = *Rynchospora cymosa*.
cyperinus, J. F. Gmel. Syst. 1621, sphalm. = seq.
cyperoides, Retz. Obs. iv. 8 = *Fimbristylis tristachya*.
cyperoides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Rynchospora cyperoides*.
dactyloides, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 321 (= *Lepidosperma thermale*).—Afr. austr.
dactyloides, Vahl, Enum. ii. 224 = *Asterochaete glomerata*.
deformis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.
deustus, Berg. Desc. Pl. Cap. 10 = *Ficinia scariosa*.
deustus, F. Muell. Census, 128 = *Mesomelaena deusta*.
dispar, Spreng. Neue Entdeck. iii. 8 = *Ficinia secunda*.
distans, Michx. Fl. Bor. Am. i. 36 = *Rynchospora distans*.
distans, F. Muell. Census, 127 = *calostachyus*.
distans, Muhl. Desc. Gram. 11 = *Rynchospora Grayii*.
distans, Poir. Encyc. Suppl. ii. 249 = *Rynchospora longispicata*.
Drummondii, Benth. Fl. Austral. vii. 359.—Austral.
Drummondii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 165 = *Gahnia polyphylla*.
effusus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Cladium germanicum*.
efoliatus, F. Muell. Fragm. ix. 32.—Austral.
elatus, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 117 = *falcatus*.
elevatus, Soland. ex Forst. f. Prod. 89 = *Cladium germanicum*.
elongatus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 312 = *Asterochaete elongata*.
ericetorum, R. Br. Prod. 231.—Austral.
erinaceus, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 165.—Afr. trop.
erraticus, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 22 (*Fimbristylis* sp.).—Afr. trop.
Fabri, Rottb. Desc. Nov. Pl. 62; Progr. 28 = *Panicum lanatum*.
falcatus, R. Br. Prod. 232.—Austral.
falcatus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 298 = *Cladium schoenoides*.
fasciatus, Rottb. Desc. Nov. Pl. 67. t. 16. f. 5 (= *Tetrariae* sp.).—Afr. austr.
fascicularis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 37 = *Rynchospora fascicularis*, Nutt.
fascicularis, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 48.—Austral.
ferrugineus, Huds. Fl. Angl. ed. I. 14 = *Scirpus rufus*.
ferrugineus, Krock. Fl. Siles. i. 57. t. 8 = *Juncus bufonius*.
ferrugineus, Linn. Sp. Pl. 43.—Europ.
festucoides, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 20 (= *Isolepis festucoides*).—Madag.

SCHOENUS:—

- filiformis*, Lam. Illustr. i. 135 = *Ficinia filiformis*.
filiformis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia fastigiata*.
filiformis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 265 = *Ficinia bracteata*.
Filum, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 18. t. 18 = *Gahnia trifida*.
fimbristylodes, F. Muell. Census, 128 = *Cladium undulatum*.
flaviculmis, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81 = *brevisetis*.
flavus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 278.—Austral.
flavus, Humb. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 75 (= *Monotrema flavum*).—Venezuela.
flexuosus, Steud. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 309 (= *Elynanthus cuspidatus*).—Afr. austr.
flexuosus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.
floribundus, Willd. ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 270 = *Cladium germanicum*.
floridus, Rudge, Pl. Gui. 15. t. 18 = *Rynchospora aurea*.
fluitans, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 81. t. 141.—Tasman.
fragiferus, Rudge, Pl. Gui. 15. t. 17 = *Rynchospora cyperoides*.
Fribri, J. F. Gmel. Syst. 136, sphalm. = *Fabri*.
fuscus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1664 = *Rynchospora fusca*.
fuscus, Muhl. Desc. Gram. 6 = *Rynchospora Grayii*.
glaucus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 249 = *Rynchospora rariflora*.
globifer, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81 = *brevifolius*.
globosus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 229 = *Dichromena ciliata*.
globosus, Rudge, Pl. Gui. 14. t. 15 = *Rynchospora pterocarpa*.
globosus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 288 = *Rynchospora globosa*.
globuliferus, Willd. ex Kunth, l. c. 291 = *Rynchospora cyperoides*.
glomeratus, Linn. Sp. Pl. 44 = *Rynchospora glomerata*.
glomeratus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Asterochaete glomerata*.
gracilis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Rynchospora racemosa*.
grammatophyllus, F. Muell. Fragm. ix. 31.—Austral.
grandiflorus, F. Muell. l. c. 30.—Austral.
Halleri, [Honck.] Verz. Aller Gew. Deutschl. 127 (Quid?).—Europ.
Hasskarli, Steud. Syn. Pl. Cyp. 166 = *Gahnia javanica*.
hemisphaericus, Humb. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 75 = *Rynchospora pterocarpa*.
hirsutus, Vahl, Eclat. Am. i. 6 = *Rynchospora hirsuta*.
hirtus, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 114 = *Rynchospora pilosa*.
hispidulus, Vahl, Enum. ii. 219 = *Rynchospora consanguinea*.
holoschaenoides, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 = *Rynchospora cyperoides*.
humilis, Benth. Fl. Austral. vii. 374.—Austral.
hypomelas, Spreng. Neue Entdeck. iii. 8 = *nigricans*.
Hystrix, Vahl, Enum. ii. 226 = *Hypodiscus aristatus*.
imberbis, R. Br. Prod. 231.—Austral.
imberbis, Poir. l. c. 251 = *apogon*.
inanis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Scirpus spathaceus*.
incanus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 12.—Aegypt.
indicus, Lam. Encyc. i. 740 = *Ficinia setiformis*.
indutus, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 372.—Austral.
inermis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 304 = *Scleria triglomerata*.
inexpansus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora inexpansa*.
intermedius ×, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 108.—Europ.
involutus, Rottb. Desc. Nov. Pl. 64. t. 19. f. 1 (Tetrariae? sp.).—Afr. austr.
juncus, Willd. Phyt. 2 = *Scirpus supinus*.
juncoides, Vahl, Enum. ii. 211 (= *Isolepis consanguinea*).—Bras.
lacustris, Bernh. Syst. Verz. Erf. 26 = *Scirpus lacustris*.
laevis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.
lanatus, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 19. t. 20.—Austral.

SCHOENUS:—

- lanatus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 206 (= *Isolepis lanata*).—Am. austr.
lanceus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Schoenoxiphium Sickmannianum*.
lateralis, Vahl, Enum. ii. 211 = *Ficinia lateralis*.
latifolius, Vahl, l. c. 226 = *Scleria communis*.
laxiflorus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 166 = *apogon*.
laxus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Rynchospora glauca*.
lithospermus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 65 = *Scleria Flagellum-nigrorum*.
longifolius, Rudge, Pl. Gui. 14. t. 16 = *Hoppia microcephala*.
longirostris, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora laxa*.
longirostris, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *Rynchospora longiflora*.
longisetis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Rynchospora longisetis*.
macrocephalus, Boeck. in Flora, lxi. (1878) 144 (= *Tetrariae* sp.).—Afr. austr.
macrostachyus, Noë, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. viii. 34 = *Scirpus maritimus*.
marginatus, Kunze, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 421 = *Carex aphylla*.
mariscoides, Muhl. Desc. Gram. 4 = *Scleria triglomerata*.
Marisculus, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 147 = *Rynchospora Marisculus*.
Mariscus, Linn. Sp. Pl. 42 = *Cladium germanicum*.
maritimus, Lam. Fl. Fr. iii. 543 = *Cyperus acgyptiacus*.
maritimus, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 137 = *Rynchospora tenuis*.
maschulinus, Roem. & Schult. Syst. ii. 77 = *axillaris*.
melanostachys, R. Br. Prod. 231.—Austral.
microstachys, Vahl, Enum. ii. 220 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.
miliaceus, Lam. Illustr. i. 137 = *Rynchospora sparsa*.
minimus, T. F. Forst. in Symons, Syn. Pl. Brit. 197 = *Juncus capitatus*.
minutulus, F. Muell. Fragm. ix. 32.—Austral.
moniliferus, Sparrm. ex Spreng. Syst. iii. 830 = *Scleria margaritifera*.
monocephalus, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 143 = *Rynchospora pterocarpa*.
monoiicus, Sm. Engl. Bot. t. 1410 = *Kobresia caricina*.
Moorei, Benth. Fl. Austral. vii. 367.—Austral.
Moorei, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 384 = *pauciflorus*.
mucronatus, Linn. Sp. Pl. 42 = *Cyperus acgyptiacus*.
multiglumis, Benth. Fl. Austral. vii. 368.—Austral.
nanus, Benth. l. c. 364.—Austral.
natans, Benth. l. c. 375.—Austral.
Neesii, F. Muell. Census, 128 = *Tricostularia Neesii*.
nemorum, Vahl, Symb. Bot. iii. 8 = *Hypolytrum latifolium*.
nigricans, Hoppe, Taschenb. (1800) 135; (1802) 55 = *ferrugineus*.
nigricans, Linn. Sp. Pl. 43.—Cosmop.
nitens, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252.—Austral.; N. Zel.; Chili.
nitens, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 313 = *Asterochaete nitens*.
niveus, Murr. Syst. ed. XIII. 81 = *Kyllinga triceps*.
nudus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 165 = *Cladium Gunnii*.
obtusifolius, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 281.—Austral.
octandrus, F. Muell. Fragm. ix. 31 (= *Elynanthus octandrus*).—Austral.
odontocarpus, F. Muell. l. c. 32.—Austral.
odoratus, Aubl. Pl. Gui. i. 44 = *Kyllinga odorata*.
oliganthos, Kunth, Enum. Pl. ii. 253, in syn., sphalm. = *Ficinia filiformis*.
oligostachyus, F. Muell. Fragm. ix. 38 = *bifidus*.
pallens, Schrad. Anal. Cyp. 25 = *Ficinia setiformis*.
paludosus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251 = *Tricostularia paludosa*.
palustris, Bernh. Syst. Verz. Erf. 26 = *Eleocharis palustris*.
paniculatus, Burm. f. Fl. Ind. 19 = *Scleria elata*, sumatrensis.
paniculatus, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 296 = *Gahnia javanica*.
paniculatus, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2; in Mélang. (1811), nomen.—Madag.

SCHOENUS :—

- paradoxus*, Spreng. Syst. i. 190 (= *Isolepis paradoxa*).—Venezuela.
- pauciflorus*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 298.—N. Zel.
- pauciflorus*, F. Muell. Census, 128 = *Tricostularia pauciflora*.
- pauciflorus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = *Rynchospora glauca*.
- pedicellatus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.
- pilosus*, Willd. Phyt. 3 (= *Abildgaardia pilosa*).—Afr. bor.
- pleiostemoneus*, F. Muell. Fragm. ix. 52.—Austral.
- polycephalus*, Pers. Syn. i. 59 = *Rynchospora cyperoides*.
- polymorphus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 67; Progr. 13 = *Fimbristylis ferruginea*.
- polyphyllus*, Vahl, Eclog. Am. ii. 5 = *Rynchospora polyphylla*.
- pteroecarpus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 617 = *Rynchospora pterocarpa*.
- puberulus*, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. i. (1831) 196 (*Fimbristylidis* sp.).—Reg. Himal.
- pubescens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 228 = *Dichromena pubera*.
- pubigerus*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 116 = *Rynchospora robusta*.
- punctatus*, R. Br. Prod. 232.—Austral.
- punctorius*, Vahl, Enum. ii. 217 (*Tetrariae* sp.).—Afr. austr.
- pungens*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 308 = *Tetraria compar*.
- pusillus*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 20 (Rynchosporae sp.).—Ind. occ.
- quadrangularis*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 274.—Afr. austr.
- radiatus*, Forst. ex Vahl, Enum. ii. 220 = *arundinaceus*.
- radiatus*, Linn. f. Suppl. 101 = *Ficinia radiata*.
- rariflorus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora rariflora*.
- recurvatus*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 132 = *Rynchospora recurvata*.
- restioides*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 (*Cladii* sp.).—Ind. occ.
- ruber*, Lour. Fl. Cochinch. 52 = *Rynchospora Wallichiana*.
- rubiginosus*, Soland. ex Forst. f. Prod. 89 = *Cladium glomeratum*.
- rufus*, Huds. Fl. Angl. ed. II. 15 = *Scirpus rufus*.
- rugosus*, Vahl, Eclog. Am. ii. 5 = *Rynchospora glauca*.
- scabripes*, Benth. Fl. Austral. vii. 368.—Austral.
- scariosus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia bracteata*.
- scariosus*, Vahl, Enum. ii. 210 = *Ficinia scariosa*.
- Scheuchzeri* ×, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii–xxiv. (1880) 119.—Europ.
- sculptus*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 286.—Austral.
- secans*, Linn. Syst. ed. X. 865 = *Scleria Flagellum-nigrorum*.
- secundus*, Vahl, Enum. ii. 215 = *Ficinia secunda*.
- setaceus*, Berg. in Act. Helv. vii. (1772) 130. t. 9 = *Rynchospora tenerima*.
- setaceus*, Muhl. Desc. Gram. 6 = *Rynchospora capillacea*.
- setaceus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 19 = *Rynchospora fusca*.
- setaceus*, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *Rynchospora distans*.
- setifolius*, Benth. Fl. Austral. vii. 359 = *Ficinia tenuifolia*.
- Sodaliun*, Hariot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxi. (1884) 154.—Fuegia.
- spadiceus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 227 (= *Isolepis paradoxa*).—Venezuela.
- spadiceus*, Vahl, Enum. ii. 210 = *Scirpus spadiceus*.
- sparganoides*, Lindl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 291 = *Rynchospora cyperoides*.
- sparsus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora sparsa*.
- sparteus*, R. Br. Prod. 231.—Austral.
- spathaceus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 63 = *Dulichium spathaceum*.
- Spermodon*, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 280 = *Rynchospora tenerima*, Nees.
- sphaerocephalus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena sphaerocephala*.
- spicatus*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3 (*Tetrariae* sp.).—Afr. austr.
- spicatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia bulbosa*.

SCHOENUS :—

- spilocarpus*, Soland. ex Seem. Fl. Vit. 316 = *Gahnia schoenoides*.
- stellatus*, Lam. Encyc. i. 741 = *Dichromena leucocephala*.
- striatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia setiformis*.
- stygius*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena stygia*.
- subbulbosus*, Benth. Fl. Austral. vii. 358 = *capitatus*.
- subserratus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 136 = *Ficinia setiformis*, brevifolia.
- surinamensis*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 68; Progr. 14 = *Rynchospora aurea*.
- surinamensis*, Soland. ex Forst. f. Prod. 89 (an praec. ?).—Ins. Tahiti.
- sylvaticus*, Bernh. Syst. Verz. Erf. 27 = *Scirpus sylvaticus*.
- sylvaticus*, Salzm. ex Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849) 167 = *Rynchospora comata*.
- tenax*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 298 = *breviflorus*.
- Tendo*, Banks & Soland. ex Hook. f. l. c.—N. Zel.
- tenellus*, Benth. Fl. Austral. vii. 375 = *fluitans*.
- tener*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 9.—Afr. austr.
- tenuiflorus*, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 75.—Am. austr. ?
- tenuifolius*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 228 = *Dichromena tenuifolia*.
- tenuis*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. i. ed. II. (1871) 94.—N. Zel.
- tenuissimus*, Benth. Fl. Austral. vii. 365 = *Lepidospora tenuissima*.
- Tepperi*, F. Muell. Fragm. xi. 106 = *trachycarpus*.
- tetragonus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena tetragona*.
- thermalis*, Linn. Mant. ii. 172 (= *Lepidosperma thermalis*).—Afr. austr.
- trachycarpus*, F. Muell. Fragm. ix. 33.—Austral.
- triceps*, Vahl, Eclog. Am. ii. 4 = *Rynchospora cyperoides*.
- Tricostularia*, F. Muell. Census, 128 = *Tricostularia compressa*.
- tristachyus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (*Tetrariae* sp.).—Afr. austr.
- tuberosus*, Burm. f. Fl. Ind. 190 = *Cyperus rotundus*.
- turbinatus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.
- umbellatus*, Jacq. Coll. i. 113 = *Mariscus ovularis*.
- umbellatus*, Walt. Fl. Carol. 70 = *Rynchospora laxa*.
- unispiculatus*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 365.—Austral.
- ustulatus*, Linn. Mant. ii. 178 (= *Elynanthus ustulatus*).—Afr. austr.
- vacillans*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. x. (1878) 421 = *axillaris*.
- vaginatus*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 371.—Austral.
- velutinus*, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 282 = *Rynchospora velutina*.
- villosus*, R. Br. Prod. 231.—Austral.
- viscosus*, Schrad. Anal. Cyp. 26 = *Tetraria compar*.

SCHOEPIA, Schreb. Gen. 129 (1789). **OLACINAE**, Benth. & Hook. f. i. 348.

- CODONIUM**, Rohr, ex Vahl, in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. ii. (1792) 206.
- DIPLOCALYX**, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 81. t. 54 (1853).
- HAENKEA**, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 8. t. 231 (1802).
- SCHOEPIOPSIS**, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 75.
- acuminata*, Wall. Cat. n. 486; et ex DC. Prod. iv. 320.—Reg. Himal.
- americana*, Willd. Sp. Pl. i. 996 = *Schreberi*.
- angulata*, Planch. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 5.—Mexico.
- arborescens*, Roem. & Schult. Syst. v. 160 = *Schreberi*.
- brasiliensis*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 622.—Bras.
- chinensis*, Gardn. & Champ. in Hook. Kew Journ. i. (1849) 308.—China.
- chrysophyllodes*, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 261, in obs.—Ind. occ.
- confertiflora*, Planch. ex Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 74 = *quintuplinervis*.
- didyma*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 119.—Cuba.
- flexuosa*, Roem. & Schult. Syst. v. 160.—Peruv.
- fragrans*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 188.—Reg. Himal.
- grandifolia*, Baill. Adansonia, iii. (1862–63) 117.—Bras.

SCHOEPIA :—

- jasminodora*, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 135.—Ins. Luchu; Japon.
- Marchii*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 310 = *chrysophyllodes*.
- mexicana*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 622.—Mexic.
- nigricans*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 249 = *brasiliensis*.
- obliquifolia*, Turcz. l. c. (sp. dub.).—Bras.
- obovata*, Wright, Sauv. Fl. Cub. 21.—Cuba.
- odorata*, Wall. Cat. n. 485 = *fragrans*.
- parvifolia*, Planch. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 5 (an praec. ?).—Mexic.
- quintuplinervis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 248.—Bras.
- Schreberi*, F. F. Gmel. Syst. 376.—Peruv.
- vacciniiflora*, Planch. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xv. (1872) 382, nomen.—N. Granat.
- vacciniiflora*, Planch. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 5 (an praec. ?).—Guatemala.

SCHOEPIOPSIS, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii.

- (1878) 75 = **Schoepfia**, Schreb. (Olacln.).
- acuminata*, Miers, l. c. = *Schoepfia acuminata*.
- chinensis*, Miers, l. c. = *Schoepfia chinensis*.
- fragrans*, Miers, l. c. 76 = *Schoepfia fragrans*.
- jasminodora*, Miers, l. c. 77 = *Schoepfia jasminodora*.

SCHOLERA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 62, in syn. (1883), sphalm. = **SCHOLLIA**, Jacq. f. = **Hoya**, R. Br. (Asclep.).**SCHOLLERA**, Rohr, in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. ii. (1792) 210 = **Microtea**, Sw. (Phytol.).

- debilis*, Rohr, l. c. = *M. debilis*.

SCHOLLERA, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 165, 170 (1788) = **Oxycoccus**, Tourn. (Vaccin.).

- erecta*, Steud. Nom. ed. I. 746 = *Vaccinium erythrocarpum*.
- erythrocarpa*, Steud. l. c. = *Vaccinium erythrocarpum*.
- europaea*, Steud. l. c. = *O. palustris*.
- hispidula*, Steud. l. c. = *Chiogenes serpyllifolia*.
- macrocarpa*, Steud. l. c. = *O. macrocarpum*.
- Oxycoccus*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 170 = *O. palustris*.
- paludosa*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 331 = *O. palustris*.
- palustris*, Steud. Nom. ed. I. 746 = *O. palustris*.

SCHOLLERA, Schreb. Gen. 785 (1791) = **Heteranthera**, Ruiz & Pav. (Ponted.).

- graminea*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175; A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 485 = *H. graminea*.
- graminifolia*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 438, in obs., nomen = *H. graminea*.
- limosa*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175 = *H. limosa*.

SCHOLLIA, Jacq. f. Eclog. Pl. i. 5. t. 2 (1811) = **Hoya**, R. Br. (Asclep.).

- camosa*, Schrank, ex Steud. Nom. ed. I. 414, 746 = *H. camosa*.
- chinensis*, Jacq. f. Eclog. Pl. i. 7 = *H. camosa*.
- cochinchinensis*, Jacq. f. l. c. = *H. cochinchinensis*.
- crassifolia*, Jacq. f. l. c. 5. t. 2 = *H. camosa*.
- viminialis*, Jacq. f. l. c. 8 = *Philibertia viminialis*.
- volubilis*, Jacq. ex Steud. Nom. ed. I. 414, 746 = *Dregea volubilis*.

SCHOLTZIA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 241. **MYRTACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 700.

- PIPTANDRA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1862) II. 323.
- PRITZELIA**, Schau. in Flora, xxvi. (1843) 405, 407, nomen.
- capitata*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 69.—Austral.
- ciliata*, F. Muell. Fragm. iv. 76.—Austral.
- decandra*, F. Muell. l. c. 75 = *Thryptomene saxicola*.
- denticulata*, F. Muell. l. c. = *Thryptomene denticulata*.
- Drummondii*, Benth. Fl. Austral. iii. 70.—Austral.
- laxiflora*, Benth. l. c. 69.—Austral.
- leptantha*, Benth. l. c.—Austral.
- obovata*, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 241.—Austral.
- oligandra*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 70.—Austral.
- parviflora*, F. Muell. Fragm. iv. 76.—Austral.

SCHOLTZIA :—

spathulata, *Benth. Fl. Austral.* iii. 68.—Austral.
teretifolia, *Benth. l. c.* 70.—Austral.
uberiflora, *F. Muell. Fragm.* iv. 74.—Austral.
umbelliflora, *F. Muell. l. c.* 75.—Austral.

SCHOMBURGHIA, DC. *Prod.* vii. 293 (1838) =
Geissopappus, Benth. (Compos.).
caleoides, DC. *l. c.* 294 = *G. caleoides*.

SCHOMBURGKIA, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 396 (1873)
= *praece*.

SCHOMBURGKIA, Lindl. *Sert. Orch.* tt. 10, 13
(1838). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 534.
Bryslana, Lem. *Jard. Fleur.* i. (1851) Misc. 34 =
tibicinis.
carinata, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 621 = *Lyonsii*.
crispa, Lindl. *Sert. Orch.* t. 10.—Guian.
Galeottiana, A. Rich. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. iii.
(1845) 23 = tibicinis.
gloriosa, Reichb. f. in *Hamb. Gartenz.* xvi. (1860) 178
= *crispa*.
Humboldtii, Reichb. f. in *Bonplandia*, iv. (1856) 328.
—Venezuela.
Luddemani, Prill. in *Journ. Soc. Imp. Hort. Par.*
viii. (1862) 123 = *undulata*.
Lyonsii, Lindl. in *Gard. Chron.* (1853) 615.—
Jamaic.
marginata, Hook. *Bot. Mag.* t. 3729, partim =
crispa.
marginata, Lindl. *Sert. Orch.* t. 13.—Guian.
rosea, Linden, ex Lindl. *Bot. Reg.* (1845) sub t. 53.—
N. Granat.
tibicinis, *Batem. Orch. Mex. et Guat.* t. 30; et ex
Lindl. *Bot. Reg.* (1841) Misc. 57.—Am. centr.
undulata, Lindl. *l. c.* (1844) sub t. 23; *Misc.* 13.—
Venezuela.
violacea, Paxt. *Mag. Bot.* xvi. (1849) 123 = *undulata*.
Wallisii, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 116.—
N. Granat.

SCHORIGERAM, Adans. *Fam.* ii. 355 (1763) = **Tragia**,
Plum. (Euphorb.).

SCHORTIA, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 794
(1863) = **Actinolepis**, DC. (Compos.).
californica, Hort. ex Vilm. *l. c.* = *A. coronaria*.

SCHOTIA, Jacq. *Coll.* i. 93 (1786). **LEGUMINOSAE**,
Benth. & Hook. f. i. 581.
OMPHALOBIUM, Jacq. ex DC. *Prod.* ii. 508 (1825);
et *Eclog. Pl.* ii. 6. t. 126 (1844).
THEODORA, Medic. *Theod.* 16 (1786).
afra, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 79 = *speciosa*.
alata, Thunb. *Fl. Cap. ed. Schult.* 389.—Afr. austr.
angustifolia, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 161 =
speciosa.
brachypetala, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 39.—
Afr. austr.
capitata, Bolle, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 18.—
Afr. trop.
diversifolia, Walp. in *Linnaea*, xiii. (1839) 541 =
latifolia.
humboldtoides, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* ii. 310.—Afr.
trop.
latifolia, Jacq. *Fragm.* 23. t. 15. f. 4.—Afr. austr.
parvifolia, Dehnh. *Rivist. Napol.* i. iii. 179.—Afr.
austr.
parvifolia, Jacq. *Fragm.* 85. t. 136. f. 4.—Afr. austr.
simplicifolia, Vahl, ex DC. *Prod.* ii. 508 = *Bandeiraea*
simplicifolia.
speciosa, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 356 = *Cynometra*
ramiflora.
speciosa, Jacq. *Coll.* i. 93; *l. c.* *Pl. Rar.* i. 8. t. 75.—
Afr. austr.
stipulata, Ait. *Hort. Kew.* ed. II. iii. 33 = *speciosa*.
tamarindifolia, Afzel. ex Sims, *Bot. Mag.* t. 1153 =
speciosa.

SCHOUSBEA, Rafin. *Princ. Somiol.* 29 (1814) =
SCHOUSBOEA, Willd.

SCHOUSBOEA, Schum. & Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* 449
(1827) = **Alchornea**, Sw. (Euphorb.).
cordifolia, Schum. & Thonn. *l. c.* = *A. cordifolia*.
VOL. II.

SCHOUSBOEA, Willd. *Sp. Pl.* ii. 578 (1799) =
Cacoucia, Aubl. (Combret.).
coccinea, Willd. *l. c.* = *C. coccinea*.
commutata, Spreng. *Syst.* ii. 332 = *Laguncularia*
racemosa.

SCHOUTENIA, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* i.
(1848) 312. **TILIACEAE**, Benth. & Hook. f. i.
237.
ACTINOPHORA, Wall. *Cat. n.* 1163 (1830).
Godefroyana, Baill. *Adansonia*, xi. (1876) 370.—Siam.
ovata, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848)
313.—Java.

SCHOUTENSIA, Endl. *Prod. Fl. Norf.* 79, in obs.
(1833) = **Pittosporum**, Banks.
monophylla, Endl. *l. c.* = *P. tenuifolium*.

SCHOUWIA, DC. *Syst.* ii. 643 (1821). **CRUCI-**
FERAE, Benth. & Hook. f. i. 89.
CYCLOPTERYGIUM, Hochst. in *Flora*, xxxi. (1848)
175.
SUBULARIA, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 117 (1775).
arabica, DC. *Syst.* ii. 644.—Arab.
arabica, Steud. & Hochst. ex Jaub. & Spach, *Illustr.*
iii. 145 = *Schimperii*.
brassicaefolia, Jaub. & Spach, *l. c.* = *arabica*.
brevisepta, Hochst. in *Flora*, xxxi. (1848) 175 =
Schimperii.
glastifolia, Jaub. & Spach, *Illustr.* iii. 146 = *arabica*.
Schimperii, Jaub. & Spach, *l. c.* 145.—Aegypt.; Arab.
thebaica, Webb, in *Parl. Giorn. Bot. Ital.* ii. (1847) 219
= *Schimperii*.

SCHOUWIA, Schrad. in Goett. *Gel. Anz.* i. (1821) 717
= **Goethea**, Nees & Mart. (Malvac.).
semiserrata, Schrad. *l. c.* = *G. sempervirens*.

SCHOWIA, Sweet, *Hort. Brit. ed.* III. 43 (1839), sphalm.
= *praece*.

SCHRADERA, Vahl, *Eclog. Am.* i. 35. t. 5 (1796).
RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 66.
FUCHSIA, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 62 (1788).
URCEOLARIA, Willd. in Cothen. *Dispos. Veg.* 10
(1790).
brasiliensis, Mart. ex Schult. *f. Syst.* vii. 164.—Bras.
capitata, Vahl, *Eclog. Am.* i. 35.—Ind. occ.
cephalophora, Griseb. in *Mem. Am. Acad.* N. S. viii.
(1868) 504.—Cuba.
Cephalotes, Willd. *Sp. Pl.* ii. 238.—Jamaic.
cephalotis, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880)
134 = *praece*.
jamaicensis, Pers. *Syn.* i. 201 = *S. Cephalotes*.
ligularis, Rudge, *Pl. Gui.* i. 29. t. 45 = *Cephaëlis*
ligularis.
longifolia, Spruce, ex Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* sub t.
1068 = *Stachyarrhena longifolia*.
polyccephala, DC. *Prod.* iv. 444.—Guian.
spicata, Spruce, ex Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* sub t.
1068 = *Stachyarrhena spicata*.
stellata, Benth. *Bot. Voy. Sulph.* 106. t. 40.—N.
Granat.
umbellata, Presl, *Bot. Bemerk.* 81.—Peruv.

SCHRADERA, Willd. in Goett. *Journ. Wiss.* i. (1797) 1
= **Croton**, Linn. (Euphorb.).
scandens, Willd. *l. c.* = *C. trilobatus*.

SCHRADERIA, Medic. *Phil. Bot.* ii. 40 (1791) =
Salvia, Tourn. (Labi.).
hastata, Moench, *Meth.* 378 = *Salvia canariensis*.

SCHRANCKIA, Scop. ex J. F. Gmel. *Syst.* 515 (1790)
= **Goupia**, Aubl. (Celastr.).
quinquefaria, J. F. Gmel. *l. c.* = *G. glabra*.

SCHRANKIA, Medic. *Pflanzeng.* 42 (1792) = **Rapi-**
strum, Tourn. (Crucif.).
divaricata, Moench, *Meth. Suppl.* 86 = *R. perenne*.
rugosa, Medic. *Pflanzeng.* 44 = *R. rugosum*.
sulcata, Moench, *Meth. Suppl.* 87 = *R. orientale*.

SCHRANKIA, Willd. *Sp. Pl.* iv. 1041 (1806). **LEGU-**
MINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 593.
LEPTOGLOTTIS, DC. *Mém. Lég.* 451 (1825).
aculeata, Willd. *Sp. Pl.* iv. 1041.—Mexic.
angustata, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 400.—Am. bor.

SCHRANKIA :—

brachycarpa, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840)
130 = *Mimosa invisa*.
distachya, [Mog. & Sesse,] ex DC. *Prod.* ii. 443.—
Mexic.
elata, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843)
309 = *Mimosa Ervendbergii*.
glabra, Benth. in Hook. *Lond. Journ. Bot.* v. (1846)
94 = *Mimosa spiciflora*.
hamata, Humb. & Bonpl. ex Willd. *Sp. Pl.* iv. 1042.
—Am. trop.
leptocarpa, DC. *Prod.* ii. 443.—Am. trop.
macrostachya, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* iv. (1842)
414 = *Mimosa millefoliata*.
mexicana, Rafin. *New Fl. Am.* i. 43 = *aculeata*.
nova, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 535 (Quid ?).—Mexic.
platycarpa, A. Gray, in *Bost. Journ. Nat. Hist.* vi.
(1850) 183.—Texas.
rhodostachya, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* iv. (1842)
414 = *Mimosa rhodostachya*.
Sellowii, Benth. *l. c.* 415 = *Mimosa Selloi*.
subinermis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xvii.
(1882) 350.—Mexic.
uncinata, Pritz. *l. c.* Ind. ii. 254, sphalm. = *Smilax*
pubera.
uncinata, Willd. *Sp. Pl.* iv. 1043.—Am. bor.

SCHREBERA, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 1662 (1763) =
Cuscuta, Tourn. (Convolv.).
schinoides, Linn. *l. c.* = *C. africana*.

SCHREBERA, Retz. *Obs.* vi. 25 (1791) = **Elaeo-**
dendron, Jacq. f. (Tiliac.).
albans, Retz. *l. c.* = *E. glaucum*.
Pongati, DC. *Prod.* vii. 548, sphalm. = *Sphenoclea*
zeylanica.

SCHREBERA, Roxb. *Pl. Corom.* ii. 1. t. 101 (1798).
OLEACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 675.
NATHUSIA, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.*
25; ii. 671.
alata, Welw. in *Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 41 =
Saundersiae.
golungensis, Welw. *l. c.* 40.—Afr. trop.
pubescens, Kurz, in *Flora*, lv. (1872) 399 = *swietenoides*.
Saundersiae, Harv. *Thes. Cap.* ii. 40.—Afr. austr. et trop.
swietenoides, Roxb. *Pl. Corom.* ii. 1. t. 101.—Ind. or.;
Burma.
trichoclada, Welw. in *Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869)
41.—Afr. trop.

SCHREBERA, Schreb. in *Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.*
i. (1773) t. 5. f. 1 (cf. p. 91) = **Hartogia**, Linn. f.
(Celastr.).
schinoides, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 28 = *H. capensis*.

SCHREIBERIA, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 535 (1841),
sphalm. = *seq.*

SCHREIBERSIA, Pohl, in *Flora*, viii. (1825) 183 =
Augusta, Pohl (Rubi.).

SCHRENCKIA, Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 883 (1867),
sphalm. = *seq.*

SCHRENCKIA, Fisch. & Mey. in Schrenk, *Enum. Pl.*
Nov. 63 (1841) = **Hippomarathrum**, Link
(Umbell.).
vaginata, Fisch. & Mey. *l. c.* 64 = *H. vaginatum*.

SCHRENCKIA, Regel & Schmalh. in *Act. Hort.*
Petrov. v. (1877) 606. **UMBELLIFERAE**.
involuta, Regel & Schmalh. *l. c.*—Turkestan.
papillaris, Regel & Schmalh. *l. c.* 608.—Turkestan.
pungens, Regel & Schmalh. *l. c.* 607.—Turkestan.

SCHROPHULARIA, Medic. *Beobacht.* (1783) 132, err.
typ. = **Serophularia**, Linn.

SCHTSCHUROWSKIA, Regel & Schmalh. ex
Regel, *Pl. Nov. Fedsch.* 40 (1882). **UMBELLI-**
FERAE.
meifolia, Regel & Schmalh. *l. c.*—Kokan.

SCHUBERTA, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, viii.
(1881) 171 = **SCHUBERTIA**, Auct.

SCHUBERTIA, Blume, *Bijdr.* 884 (1826) = **Hors-**
fieldia, Blume (Umbell.).
aculeata, Blume, *l. c.* 885 = *H. aculeata*.

SCHUBERTIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 55. t. 33 (1824) = *Araujia*, Brot. (Asclep.).
auricoma, Lem. in Fl. des Serres, ii. (1846) t. 169 = *graveolens*.
Grahami, Decne. in DC. Prod. viii. 535 = *graveolens*.
grandiflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 57.—Bras.
graveolens, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 2.—Bras.
hamata, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 297.—Bras.
Kefersteinii, Schlecht. in Bot. Zeit. x. (1852) 553.—N. Granat.
longiflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 57.—N. Granat.
multiflora, Mart. l. c. i. 56. t. 33.—Bras.
muricata, Manso, ex Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 296.—Bras.
tristis, Seem. Bot. Voy. Herald, 160 = *Macroscopis tristis*.

SCHUBERTIA, Mirb. in Nouv. Bull. Soc. Philom. iii. (1812) 123 = *Taxodium*, Rich. (Conif.).
capensis, Spreng. Syst. iii. 890 = *Callitris arborea*.
disticha, Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 75 = *T. distichum*.
japonica, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. 352 = *T. heterophyllum*.
nucifera, Denh. ex Endl. Syn. Conif. 70 = *T. heterophyllum*.
sempervirens, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. 353 = *Sequoia sempervirens*.

SCHUDIA, Molina, ex C. Gay, Fl. Chil. iii. 143 (1847) = *Osmorhiza*, Rafin. (Umbell.).
chilensis, Molina, ex C. Gay, l. c. = *O. Berterii*.

SCHUEBLERIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 113. tt. 186–188 (1827) = *Curtia*, Cham. & Schlecht. (Gentian.).
coarctata, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 442 = *tenuifolia*.
conferta, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 115. t. 186. f. 2.—Bras.
diffusa, Mart. l. c. 114 = *C. diffusa*.
intermedia, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 218.—Bras.
obtusifolia, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 194.—Bras.
patula, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 117.—Bras.
pusilla, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 163.—Bras.
stricta, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 116 = *C. gentianoides*.
tenella, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 442 = *tenuifolia*.
tenella, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 117 = *C. tenella*.
tenuifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 202.—Am. trop.

SCHUECHIA, Endl. Gen. 1178 (1840) = *Qualea*, Aubl. (Vochys.).
brasiliensis, Endl. ex Walp. Rep. ii. 68 = *Q. ecalcarata*.

SCHUENKIA, Rafin. Princ. Somiol. 30 (1814) = *Schwenkia*, Linn. (Solanac.).

SCHUERMANNIA, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 386 = *Darwinia*, Rudge (Myrtac.).
homoranthoides, F. Muell. l. c. 387 = *D. Schuermanni*.

SCHUFIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 177 = *Fuchsia*, Plum. (Onagr.).
arborescens, Spach, l. c. = *F. arborescens*.

SCHULTESIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 103. tt. 180–182 (1827). *GENTIANEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 811.

REICHERTIA, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 397.
XESTAEA, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 35.
angustifolia, Griseb. in DC. Prod. ix. 68.—Bras.
aptera, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 9.—Bras.
Aubletii, G. Don, Gen. Syst. iv. 196 = *stenophylla*.
australis, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 127.—Bras.
Benthianiana, Klotzsch, ex Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 34.—Guian.
brachyptera, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 8.—Bras.
crenuliflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 104.—Bras.
Doniana, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 209.—Bras.
gracilis, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 105. t. 181.—Bras.
heterophylla, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 136.—Am. trop.

SCHULTESIA:—

lisianthoides, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 348.—Am. centr.
neuroptera, Griseb. ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 208 = *heterophylla*.
pachyphylla, Griseb. in DC. Prod. ix. 67.—Bras.
pallens, Bunbury, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 110 = *stenophylla*.
Pohlana, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 205.—Bras.
Schomburgkiana, Prog. l. c. 206.—Guian.
stenophylla, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 106. t. 182.—Am. trop.
subcrenata, Klotzsch, ex Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 34.—Guian.

SCHULTESIA, Roth, Enum. Pl. Phaen. Germ. i. i. 690 (1827) = *Wahlenbergia*, Schrad. (Campan.).
hederacea, Roth, l. c. = *W. hederacea*.

SCHULTESIA, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 708 = *Gomphrena*, Linn. (Amarant.).
capitata, Schrad. l. c. = *G. rupestris*.

SCHULTESIA, Spreng. Pugill. ii. 17 (1815) = *Chloris*, Sw. (Gramin.).
petraea, Spreng. l. c. = *C. petraea*.

SCHULTZIA, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 63 = *Herpetacanthus*, Nees (Acanth.).
brasiliensis, Nees, in DC. Prod. xi. 366, in syn. = *H. Schultzia*.

SCHULTZIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 350 = *Obolaria*, Linn. (Gentian.).
obolarioides, Rafin. l. c. 356 = *O. virginica*.

SCHULTZIA, Spreng. Pl. Umb. Prod. 30 (1813).
UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 909.
Benthami, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 697.—Ind. or.
compacta, Ledeb. Fl. Ross. ii. 258.—Sibir. altaic.
crinita, Spreng. Pl. Umb. Prod. 30.—Sibir. altaic.

SCHULTZIA, Wall. Cat. n. 589 (1830) = *Cortia*, DC. (Umbell.).
Lindleyi, Wall. Cat. l. c.; et ex DC. Prod. iv. 187 = *C. Lindleyi*.

SCHUMACHERIA, Spreng. Gen. 232 (1830) = *Wormskioldia*, Thonn. (Turner.).
raphanoides, Spreng. ex D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1008 = *W. heterophylla*.

SCHUMACHERIA, Vahl, in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjøeb. vi. (1810) 122. *DILLENACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 13.
PLEURODESMIA, Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xvi. (1834) 316.
alnifolia, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 66.—Zeylan.
angustifolia, Hook. f. & Thoms. l. c.—Zeylan.
castaneifolia, Vahl, in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjøeb. vi. (1810) 122.—Zeylan.

SCHURMANSIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 177. t. 32 (1850). *VIOLARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 120.
angustifolia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 157.—Borneo.
elegans, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 178.—Ins. Amboin.

SCHWABEA, Endl. Nov. Stirp. Dec. 81 (1839).
ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1108.
POGONOSPERMUM, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beil. 5.
ciliaris, Nees, in DC. Prod. xi. 384.—Afr. trop.
ciliata, Nees, l. c. 431, sphalm. = *praec.*
modesta, Endl. Nov. Stirp. Dec. 81.—Afr. trop.
spicigera, Nees, in DC. Prod. xi. 384.—Afr. trop.

SCHWAEGRICHENIA, Reichb. Consp. 147 (1828) = *Hedwigia*, Sw. (Burs.).

SCHWAEGRICHENIA, Spreng. Pugill. ii. 58 (1815) = *Anigozanthos*, Labill. (Haemod.).
flavida, Spreng. l. c. = *A. flavida*.
rufa, Spreng. l. c. = *A. rufa*.

SCHWALBEA, Linn. Gen. ed. I. 188 (1737). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 975.
americana, Linn. Sp. Pl. ed. I. 606.—Am. bor.

SCHWANNIA, Endl. Gen. 1058 (1840). *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 262.
FIMBRIARIA, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 63. t. 173 (1833).
anisandra, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 608 = *Janusia anisandra*.
caudata, A. Juss. l. c. 607 = *Janusia caudata*.
crassistipula, A. Juss. l. c. 610 = *Janusia muricata*.
cujabensis, Presl, Pot. Bemerk. 23 = *elegans*.
elegans, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 611.—Bras.
intermedia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 395.—Bras.
janusioides, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 606 = *Janusia amazonica*.
muricata, A. Juss. l. c. 609 = *Janusia muricata*.

SCHWARTZIA, Vell. Fl. Flum. 221 (1825); v. t. 84 (1827) = *Norantea*, Aubl. (Ternstr.).
glabra, Vell. ll. cc.—Bras.

SCHWEIGGERA, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 166. t. 297 (1829) = *Renggeria*, Meissn. (Guttif.).
comans, Mart. l. c. t. 297. f. 2 = *R. comata*.
comata, Steud. Nom. ed. II. ii. 535, sphalm. = *praec.*

SCHWEIGGERA, E. Mey. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 170, 178 = *Gladiolus*, Tourn. (Irid.).
montana, E. Mey. ex Baker, l. c. 178 = *G. arenarius*.
memorosa, E. Mey. ex Baker, l. c. = *G. montanus*.

SCHWEIGGERIA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 167 (1821). *VIOLARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 117.
GLOSSARRHEN, Mart. in DC. Prod. i. 290 (1824).
floribunda, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 282 = *fruticosa*.
fruticosa, Spreng. Neue Entdeck. ii. 167.—Bras.
mexicana, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 204.—Mexic.
pauciflora, Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 40 = *fruticosa*.

SCHWEINFURTHIA, A. Br. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. xx. (1866) 24. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 933.
papilionacea, Boiss. Fl. Orient. iv. 387 = *sphaerocarpa*.
pedicellata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 934 (lapsu, *pedicellaris*).—Arab.
pterosperma, A. Br. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. xx. (1866) 24.—Aegypt.; Arab.
sphaerocarpa, A. Br. l. c.—Afghan.

SCHWEINITZIA, Ell. Sketch, i. 478, in obs. (1817); et ex Nutt. Gen. Am. ii. Add. (1818). *MONOTROPEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 606.
MONOTROPSIS, Schwein. ex Ell. Sketch, i. 478 (1817).
caroliniana, G. Don, Gen. Syst. iii. 867 = *odorata*.
odorata, Ell. Sketch, i. 478, 479.—Cf. DC. Prod. vii. 11. 780.—Am. bor.
Reynoldsiae, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 301.—Florida.

SCHWENKFELDA, Schreb. Gen. 123 (1789) = *Sabicea*, Aubl. (Rubiace.).
aspera, Spreng. Neue Entdeck. i. 281 = *Coccocypselum canescens*.
aspera, Willd. Sp. Pl. i. 982 = *Sabicea aspera*.
aurea, Spreng. Neue Entdeck. i. 280 = *Coccocypselum aureum*.
cinerea, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 452 = *Sabicea cinerea*.
diversifolia, Spreng. Syst. i. 765 = *Sabicea diversifolia*.
eriantha, D. Dietr. Syn. Pl. i. 793 = *Sabicea cinerea*.
glabra, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 85 = *Urophyllum glabrum*.
hirsuta, Spreng. l. c. i. 765 = *Sabicea aspera*.
hirta, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 450 = *Sabicea aspera*.
macrophylla, Spreng. Syst. i. 765 (= *Nonatelia macrophylla*).—Venezuela.
malaccensis, Spreng. l. c. iv. Cur. Post. 85 = *Urophyllum villosum*.
pumila, D. Dietr. Syn. Pl. i. 794 = *Sabicea pumila*.
triflora, D. Dietr. l. c. 793 = *Sabicea triflora*.
umbellata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 55 = *Sabicea umbellata*.
villosa, D. Dietr. Syn. Pl. i. 793 = *Urophyllum villosum*.
villosa, Willd. ex Spreng. Syst. i. 765 = *Sabicea aspera*.

SCHWENKFELDIA, Willd. Sp. Pl. i. 982 (1797) = praec.

SCHWENKIA, Linn. Gen. ed. VI. 567 (1764). *SO-*

LANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 911.

CHAETOCYLUS, Vahl, Enum. i. 101 (1805).

MATHAEA, Vell. Fl. Flum. 22 (1825).

MATTHISSONIA, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 390.

SCHWENKIA, Rafin. Princ. Somiol. 30 (1814).

adscendens, [Willd.] Link, Jahrb. i. iii. (1820) 51 = *hirta*.

americana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 375. t. 180 = *hirta*.

americana, Linn. Gen. ed. VI. 567.—Bras.

angustifolia, Benth. in DC. Prod. x. 195.—Bras.

brasiliensis, Poir. Encyc. Suppl. v. 88.—Bras.

brevisetia, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 29.—Bras.

browallioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 375. t. 181.—Venezuela.

chenopodiacea, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1155, nomen.—Guian.

curviflora, Benth. in DC. Prod. x. 196.—Bras.

deflorata, Vathek, in Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1875) [2].—Bras.

discolor, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 312.—Hab. ?

divaricata, Benth. in DC. Prod. x. 193.—Bras.

fasciculata, Benth. l. c. 195 = *Melananthus dipyre-*

noides.

glabrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 374. t. 178. —N. Granat.

grandiflora, Benth. in DC. Prod. x. 193.—Guian.

guianensis, Benth. l. c. 195.—Guian.

guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 8.—Afr. trop.

Hilariana, DC. Pl. Rar. Hort. Genèv. 35. t. 10.—Bras.

hirta, Klotzsch, in Linnaea, xiv. (1840) 289.—Bras.

hyssopifolia, Benth. in DC. Prod. x. 195.—Bras.

Karstenii, Vathek, in Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1875) [2].—N. Granat.

longiseta, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 30.—Bras.

micrantha, Benth. in DC. Prod. x. 195.—Bras.

mollissima, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 541 = *divaricata*.

mollissima, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 47.—Bras.

ovalifolia, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 253. —Bras.

pallens, D. Dietr. Syn. Pl. i. 41 = *patens*.

patens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 374. t. 179.—Venezuela.

pubescens, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 48.—Bras.

tenuis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 214.—Reg. Argent.

Tweedianae, Benth. in DC. Prod. x. 196 = *curviflora*.

ventricosa, Vathek, in Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1875) [2].—Bras.

volubilis, Benth. in DC. Prod. x. 193.—Bras.

SCHWERINIA, Karst. Ausw. Gew. Venez. 12 (1848) = *Meriania*, Sw. (Melastom.).

barbinervis, Klotzsch, in Karst. l. c. 13 = *M. barbinervis*.

cordata, Karst. Fl. Columb. i. 35. t. 18. f. b = *M. cordata*.

superba, Karst. Ausw. Gew. Venez. 13 = *M. Karstenii*.

Trianae, Karst. Fl. Columb. i. 35. t. 18. f. a = *M. speciosa*.

SCHWEYCKERTA, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 447 (1805) = *Limnanthemum*, S. T. Gmel. (Gentian.).

nymphoides, C. C. Gmel. l. c. = *L. nymphoides*.

SCHWEYCKERTA, Griseb. in DC. Prod. ix. 138 (1845) = praec.

SCHYCHOWSKIA, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 70 (1869) = seq.

SCHYCHOWSKYA, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 187. t. 13 = *Flourya*, Gaudich. (Urtic.).

ruderalis, Endl. l. c. = *F. ruderalis*.

SCIADIARA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70 (1836) = *Convolvulus*, Tourn.

Cneorum, Rafin. l. c. = *C. Cneorum*.

ruber, Rafin. l. c. = *Calystegia setifera* ?

SCIADICARPUS, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 20 = *Kibara*, Endl. (Monim.).

Brongniartii, Hassk. l. c. = *K. Blumei*.

SCIADIOSERIS, Kunze, in Bot. Zeit. ix. (1851) 349 = *Senecio*, Tourn. (Compos.).

vaginata, Kunze, l. c. = *Sen. cervariaefolius*.

SCIADIPHYLLUM, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 165 (1844) = *Sciadophyllum* P. Br. (Araliac.).

SCIADOCALYX, Regel, Gartenfl. ii. (1853) 257. t. 61 = *Isoioma*, Decne. (Gesner.).

digitalaeflora, Linden & Andr. in Illustr. Hort. xvii. (1870) 95. t. 17.—N. Granat.

Luciani ×, Andr. l. c. xxi. (1874) 151. t. 182.

Warszewiczii, Regel, Gartenfl. ii. (1853) 257, cum ic. —N. Granat.

SCIADODENDRON, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 7. Genus dubium *ARALIACEARUM*.—Cf.

Benth. & Hook. f. i. 935.

excelsum, Griseb. l. c. —Panama.

SCIADONARDUS, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen. *GRAMINEAE*.

distichophyllus, Steud. l. c. (Quid?).—Ara. bor.

SCIADOPANAX, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 73. t. 27 = *Panax*, Linn. (Araliac.).

Boivini, Seem. l. c. 74 = *P. Boivini*.

SCIADOPHILA, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 618 = *Rhamnus*, Linn.

maytenoides, Phil. l. c. —Chili.

SCIADOPHYLLUM, P. Br. Hist. Jamaic. 190. t. 19 (1756) (*Sciadophyllum*); Reichb. Consp. 145 (1828). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 940.

ACTINOPHYLLUM, Ruiz & Pav. Prod. 51. t. 8 (1794).

abyssinicum, Steud. Nom. ed. II. ii. 537 = *Heptapleurum abyssinicum*.

acuminatum, Poir. Encyc. vi. 746.—Peruv.

angulatum, Poir. l. c. 745.—Peruv.

anomalum, G. Don, Gen. Syst. iii. 391.—Ins. Trinit.

assanicum, C. Koch, in Wochenschr. ii. (1859) 364, 365 (sp. dub.).—Ind. or.

avene, Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 19 = *Heptapleurum avene*.

Baikiei, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 267 = *Heptapleurum Baikiei*.

Barteri, Seem. l. c. = *Heptapleurum Barteri*.

Belangeri, March. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xlvii. (1879) 92.—Ins. Martinic.

Brownii, Spreng. Syst. i. 953.—Jamaic.

Burchellianum, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 147. —Bras. ?

capitatum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 306 = *Oreopanax capitatum*.

caudatum, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen.—Hab. ?

confusum, March. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 244.—Bras.

conicum, Poir. Encyc. vi. 746.—Peruv.

decaphyllum, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 266.—Guian.

digitatum, G. Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 537 = *Pachira insignis*.

divaricatum, Blume, Bijdr. 876 = *Heptapleurum divaricatum*.

elatum, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 267 = *Heptapleurum elatum*.

ellipticum, Blume, Bijdr. 878 = *Heptapleurum venulosum*.

farinosum, Blume, l. c. 875 = *Heptapleurum tomentosum*.

ferugineum, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107.—Peruv.

Gayanum, Decne. & Planch. l. c., nomen.—Hab. ?

Goudotii, Planch. & Linden, ex Seem. Journ. Bot. iii. (1865) 266.—N. Granat.

heterotrichum, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen.—N. Granat.

Humboldtianum, Decne. & Planch. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 268.—N. Granat.

humile, Blume, Bijdr. 875 = *Heptapleurum parasiticum*.

SCIADOPHYLLUM :—

Jacquinii, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861)

190 = *Hedera arborea*.

japurense, Mart. & Zucc. ex March. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 244.—Bras.

Karstenianum, March. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xlvii. (1879) 93.—Venezuela.

longifolium, Blume, Bijdr. 876 = *Heptapleurum longifolium*.

lucidum, Blume, l. c. 877 = *Heptapleurum longifolium*.

macrostachyum, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 222 = *Brassala macrostachya*.

Manni, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 267 = *Heptapleurum Mannii*.

Mathewsii, Seem. l. c. 268.—Peruv.

micranthum, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen; et (1884) 321.—N. Granat.

ochroleucum, Decne. & Planch. l. c. 107, nomen.—Hab. ?

oxyanthum, Planch. & Linden, ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 266, nomen.—N. Granat.

palmatum, Blume, Bijdr. 875 = *Trevesia sundaica*.

parasticum, Blume, l. c. 877 = *Heptapleurum parasiticum*.

pedicellatum, Poir. Encyc. vi. 746.—Peruv.

pentandrum, Poir. l. c. 747.—Peruv.

Planchonianum, March. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 92.—Ecuador.

pulchellum, Hort. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 269 = *Tupidanthus calyptatus*.

pulchrum, Hort. ex Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 106.—Hab. ?

quinduense, DC. Prod. iv. 261.—N. Granat.

racemiferum, Miq. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 269, nomen (Quid?).—Hab. ?

racemiflorum, Miq. in Linnaea, xxv. (1852) 651.—Chili.

rotundifolium, Hort. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 269. (= *Heptapleuri* sp.).—Hab. ?

rubiginosum, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen.—Venezuela.

samydifolium, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 117.—Cuba.

scandens, Blume, Bijdr. 878 = *Heptapleurum scandens*, Seem.

sphaerocoma, Benth. Bot. Voy. Sulph. 102.—N. Granat.

Sprucei, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 268.—Peruv.

subavene, Blume, Bijdr. 876 = *Heptapleurum Coronae-sylvae*.

tomentosum, Blume, l. c. 877 = *Heptapleurum tomentosum*.

Trianae, Planch. & Linden, ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 268, nomen.—N. Granat.

verticillatum, Span. in Linnaea, xv. (1841) 208 = *Heptapleurum verticillatum*.

villosum, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen.—N. Granat.

SCIADOPITYS, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. i. t. 101, 102 (1841?). *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 437.

verticillata, Sieb. et Zucc. l. c.—Japan.

SCIADOSERIS, C. Muell. in Walp. Ann. v. 143 (1858), err. typ. = *SCIADIOSERIS*, Kunze = *Senecio*, Tourn. (Compos.).

SCIADOTAENIA, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 51 = seq.

SCIADOTENIA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 43. *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 39.

SCIADOTAENIA, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 51.

amazonica, Eichl. in Flora, xlvii. (1864) 395.—Bras.

cayennensis, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 51.—Guian.

ramiflora, Eichl. in Flora, xlvii. (1864) 395.—Peruv.

SCIAPHILA, Blume, Bijdr. 514 (1825). *TRIURIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1002.

APHYLLEIA, Champ. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 468.

SCIAPHILA :—

- HYALISMA, Champ. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 468.
 SORIDIUM, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1852) 47, 49, t. 6.
 albescent, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 11. —Bras.
 consimilis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 322. —Ins. Philipp.
 corymbosa, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 12. —Bras.
 erubescens, *Miers, in Proc. Linn. Soc.* ii. (1850) 74; et in *Trans. Linn. Soc.* xxi. (1852) 48. —Zeylan.
 janthina, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 294. —Ind. or.; Zeylan.
 khasiana, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 1003. —Reg. Himal.
 maculata, *Miers, in Proc. Linn. Soc.* ii. (1850) 73; et in *Trans. Linn. Soc.* xxi. (1852) 48. —Ins. Philipp.
 nana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 322. —Java.
 picta, *Miers, in Proc. Linn. Soc.* ii. (1850) 73; et in *Trans. Linn. Soc.* xxi. (1852) 48. —Venezuela.
 purpurea, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 11. —Bras.
 secundiflora, *Thw. ex Benth. l. c.* 10. —Zeylan.
 tenella, *Blume, Bijdr.* 515. —Java.

SCILLA, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 95 (1737). *LILIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 814.

- ADENOSCILLA, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 187 (1856).
 AGRAPHIS, Link, Handb. i. 166 (1829).
 BARNARDIA, Lindl. Bot. Reg. t. 1029 (1826).
 BASALTOGETON, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 27 (1866).
 CALOSCILLA, Jord. et Fourr. Ic. Fl. Europ. ii. 14. t. 245 (1869).
 ENDYMION, Dum. Fl. Belg. 140 (1840).
 EPIMENIDION, HENONIX, KOZOLA, LAGOCODES, ONCOSTEMA, SKILLA, SYNCODIUM, TRACTEMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 13, 22, 25, 57.
 ERATOBOTRYS, Fenzl, in Endl. Gen. Pl. Suppl. ii. 13 (1842).
 HYACINTHOIDES, Medic. in Usteri, Ann. Bot. ii. (1791) 9.
 HYLOMENES, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 26 (1866).
 IONCOMELLOS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 62 (1836).
 LEDEBOURIA, Roth, Nov. Pl. Sp. 194 (1821).
 MONOCALLIS, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 27 (1866).
 NECTAROSCILLA, Parl. Nov. Gen. Monocot. 27 (1854).
 OTHOCALLIS, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 28 (1866).
 PETRANTHE, Salisb. l. c. 27 (1866).
 PROSPERO, Salisb. l. c. 28 (1866).
 RINOPodium, Salisb. l. c. 28 (1866).
 SOMERA, Salisb. l. c. 26 (1866).
 STELLARIS, Dill. ex Moench, Meth. 303 (1794).
 SUGILLARIA, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 18 (1866).
 SIMIRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 28 (1836).
 USTERIA, Medic. in Act. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 480.
 XEODOLON, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 18 (1866).
 acaulis, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 364. —Peruv.
 alliifolia, *Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr.* i. 188 = verna.
 alpina, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iii. (1852) 90; iv. (1853) 75 = bifolia.
 alvesiana, *Welw. ex Nym. Consp.* 729 = vincentina.
 amara, *Crantz, Inst.* i. 495 = amoena.
 amethystina, *Salisb. Prod.* 243 = Hyacinthus amethystinus.
 amethystina, *Vis. in Flora*, xii. (1829) i. Erg. 11 = pratensis.
 amoena, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 278; [DC. in] *Red. Lil.* iii. t. 130 = sibirica.
 amoena, *Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélo.* 23 = messeniaca.
 amoena, *Linn. Sp. Pl.* 309. —Europ. austr.
 amoenula, *Hornem. Hort. Hafn.* i. 331 = sibirica.
 angusta, *Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 237 = Camassia Fraseri.
 anthericoides, *Poir. Voy. Barb.* ii. 149 = Urginea anthericoides.
 anthericoides, *Willd. ex Kunth, Enum. Pl.* iv. 332 = Urginea Scilla.
 arenaria, *Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 249. —Afr. trop.
 Aristides, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* v. (1858) 104. —Alger.
 autumnalis, *Curt. Bot. Mag.* t. 919 = obtusifolia.
 autumnalis, *Linn. Sp. Pl.* 309. —Reg. Mediterr. & Caucas.

SCILLA :—

- azurea, *Goldb. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* v. (1817) 125 = sibirica.
 Barberi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 247. —Afr. austr.
 Barnardia, *C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr.* i. (1858) 316. —China.
 Belli, *Baker, in Gard. Chron.* (1884) ii. 488. —Persia.
 benguellensis, *Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 249. —Afr. trop.
 Berthelotii, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 337. —Ins. Canar.
 Bertolonii, *Duby, Bot. Gall. ed. II.* i. 465 = italica.
 biflora, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 69. t. 302 = Ornithogalum biflorum.
 bifolia, *Hort. Berol. ex Vilms. Fl. Pl. Terre, ed. III.* 1046 = sibirica.
 bifolia, *Linn. Sp. Pl.* 309. —Europ.; As. Min.
 bifolia, *Oed. Fl. Dan.* t. 568 = verna.
 bifolia, *Petter, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 428 = Hyacinthus dalmaticus.
 bifolia, *Retz. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1769) 246 = italica.
 bifolia, *Sieber, ex Schult. f. Syst.* vii. 581 = Chionodoxa nana.
 bifolia, *Thunb. Fl. Jap.* 138 = orientalis.
 bifolia, *Ucria, Hort. Reg. Panorm.* 156 = obtusifolia.
 bipartita, *Salzm. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 244 = linguata.
 bithynica, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vii. 111 = amoena.
 blanda, *Salisb. Prod.* 244 = Lachenalia orchioides.
 brachyphylla, *Schult. f. Syst.* vii. 573 = Hyacinthus brevifolius.
 brevifolia, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 1468; *Schult. f. Syst.* vii. 574 = Hyacinthus brevifolius.
 brumalis, *Haw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III.* 697, nomen (Quid?). —Hab.?
 byzantina, *Hort. Par. ex Poir. Encyc.* vi. 739 = italica.
 camerooniana, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* iii. App. 9. —Afr. trop.
 campanulata, *Ait. Hort. Kew. ed. I.* i. 444 = hispanica.
 campestris, *Savi, Fl. Pis.* i. 350 = Ornithogalum umbellatum.
 candida, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 814, in obs. = peruviana.
 capensis, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 10 = Urginea altissima.
 carnea, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 528 = bifolia.
 cernua, [Delar. in] *Red. Lil.* sub t. 298 = sibirica.
 cernua, *Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1855) 230 = bifolia.
 cernua, *Salisb. Prod.* 242 = festalis.
 chinensis, *Benth. Fl. Hongk.* 373. —China.
 Chladnii, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* i. (1850) 39 = bifolia.
 chloroleuca, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 325 = Ornithogalum biflorum.
 ciliaris, *Hort.* —Cf. *Gard. Chron.* (1875) i. 306 = peruviana.
 ciliolata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 385. —Alger.
 Clusiana, *Hort. ex Vilms. Fl. Pl. Terre, ed. I.* 795 = peruviana.
 Clusii, *Parl. Fl. Ital.* ii. 462 = peruviana.
 comata, *Hoffmg. Verz. Pfl.* 111 = peruviana.
 comosa, *Salisb. Prod.* 243 = Muscari comosum.
 concinna, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 235. —Afr. austr.
 concinna, *Salisb. Prod.* 242 = lusitanica.
 concolor, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* iii. App. 13. —Afr. austr.
 congesta, *Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 250. —Afr. trop.
 Cooperi, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5580. —Afr. austr.
 coromandeliana, *Roxb. Hort. Beng.* 24; *Fl. Ind.* ii. 147 = Urginea indica.
 coronaria, *Salisb. Prod.* 243 = Hyacinthus orientalis.
 corsica, *Boull. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, v. (1878) 88 = autumnalis.
 corymbosa, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* sub t. 1468 = Hyacinthus corymbosus.
 Cundra, *Buch.-Ham. in Wall. Cat. n.* 5062 = Urginea indica.
 Cupani, *Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825) 10; *Fl. Sic. Prod.* i. 416. —Sicilia.
 Cupaniana, *Schult. f. Syst.* vii. 559 = praec.
 Curreri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 249. —Afr. trop.

SCILLA :—

- dalmatica, *Presl, ex Avé-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. 71 = Muscari pallens.
 dasyantha, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 337. t. 231 = haemorrhoidalis.
 decora, *Salisb. Prod.* 243 = Lachenalia pendula.
 denudata, *Buch.-Ham. in Wall. Cat. n.* 5062 = Urginea indica.
 dubia, *C. Koch, in Linnaea*, xix. (1847) 315 = bifolia.
 dumetorum, *Balansa, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 234 = autumnalis.
 elongata, *Parl. Nuov. Gen. e Sp.* 24 = peruviana.
 eriophora, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 10 = hyacinthoides.
 esculenta, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 1574 = Camassia Fraseri.
 exigua, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 247. —Afr. austr.
 fallax, *Steinheil, in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* i. (1834) 103 = obtusifolia.
 fastigiata, *Viv. App. Fl. Cors. Prod.* 1 = Hyacinthus fastigiatus.
 festalis, *Salisb. Prod.* 242. —Europ.
 firmifolia, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* iii. App. 7. —Afr. austr.
 fistulosa, *Rafin. Préc. Découv.* 45 = Cupani.
 flaccidula, *Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 249. —Afr. trop.
 flexuosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 245. —Afr. austr.
 floribunda, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 188. —Afr. austr.
 fragrans, *Salisb. Prod.* 243 = Muscari moschatum.
 Fraseri, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V.* 533 = Camassia Fraseri.
 fugax, *Munby, Fl. Alger.* 36 = Urginea fugax.
 gallica, *Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm.* (1872) 39; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* v. (1873) 157 = autumnalis.
 geminiflora, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 325 = Ornithogalum biflorum.
 Gerrardi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 237. —Afr. austr.
 haemorrhoidalis, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 336. t. 230. —Ins. Canar.
 Hanburii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 235. —Oriens.
 hemisphaerica, *Boiss. Voy. Bot. Espagne*, ii. 613 = peruviana.
 hirsuta, *Willd. ex Kunth, Enum. Pl.* iv. 319 = villosa.
 hispanica, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 8. —Hispan.
 hispida, *J. Gay, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 430 = Hyacinthus hispidus.
 hispidula, *Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 248. —Afr. trop.
 Hohenackeri, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. 79. —Reg. Caucas.
 Hohenackeri, *Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1855) 230 = bifolia.
 Hughii, *Bertol. Fl. Ital.* iv. 108, in syn. = peruviana.
 humifusa, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) i. 626. —Afr. austr.
 hyacinthoides, *Desf. ex Link, in Buch, Besch.* Canar. Ins. 140 = haemorrhoidalis.
 hyacinthoides, *Jacq. Coll.* i. 61 = hispanica.
 hyacinthoides, *Linn. Syst. ed. XII.* 243. —Europ. austr.
 indica, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* iii. App. 12. —Ind. or.; Abyss.
 indica, *Roxb. Hort. Beng.* 24; *Fl. Ind.* ii. 147 = Urginea indica.
 inflata, *Salisb. Prod.* 243 = Muscari botryoides.
 intermedia, *Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825); *Fl. Sic. Prod.* i. 417 = obtusifolia.
 iridifolia, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 338 = latifolia.
 italica, *DC. Fl. Fr.* iii. 213 = hyacinthoides.
 italica, *Host, Fl. Austr.* i. 434 = pratensis.
 italica, *Linn. Herb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 242 = verna.
 italica, *Linn. Sp. Pl.* 308. —Europ. austr.
 Jacquini, *J. F. Gmel. Syst.* 552 = hispanica.
 japonica, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 233. —Japan.
 japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 137 = Heloniopsis japonica.
 Kirkii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 254. —Afr. trop.

SCILLA:—

- Kladnii*, Schur, Enum. Pl. Transs. 668 = bifolia.
Kranssli, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 243.—Afr. austr.
lanceaefolia, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 182.—Afr. austr.
lanceolata, Baker, l. c. iii. App. 14.—Afr. austr.
lanceolata, Viv. App. Fl. Cors. Prod. ii. 3 = *Urginea Scilla*.
latifolia, Willd. ex Schult. f. *Syst.* vii. 566.—Ins. Canar.
laxa, Schur, Enum. Pl. Transs. 669 = bifolia.
laxiflora, Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 250.—Afr. trop.
lingulata, Steud. Nom. ed. I. 747 = *lingulata*.
lilacina, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 13.—Nubia.
Lilio-hyacinthus, Linn. *Sp. Pl.* 308.—Europ. austr.
linearifolia, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 184.—Afr. austr.
lingulata, Poir. *Voy. Barb.* ii. 151.—Afr. bor.
livida, Baker, in *Gard. Chron.* (1883) II. 166.—Afr. austr.
lorata, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 14.—Afr. austr.
Ludwigii, Baker, l. c. 9.—Afr. austr.
lusitanica, Linn. *Syst. ed. XII.* 243.—Hispan.
lusitanica, Sims, Bot. Mag. t. 1999 = *latifolia*.
lusitanica, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 321 = monophyllos.
Macowani, Baker, in *Gard. Chron.* (1875) I. 748.—Afr. austr.
macrogonia, Link, in *Schrad. Journ.* ii. (1799) 319.—Lusitan.
maculata, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 250.—Ind. or.
maculata, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 100 = *lanceaefolia*.
maesta, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 10.—Afr. trop.
maritima, Linn. *Sp. Pl.* 308 = *Urginea Scilla*.
mauritanica, Schousb. Vextr. Marokko, 168 = *vincentina*.
mauritanica, Steud. Nom. ed. I. 747 = *praec.*
messenia, Boiss. *Diagn. Ser. I.* vii. 110.—Graecia.
micrantha, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 328 = *Urginea micrantha*.
microscypha, Baker, in *Gard. Chron.* (1881) II. 102.—Afr. austr.
minima, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 6.—Afr. austr.
minor, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 9 = bifolia.
monanthos, C. Koch, l. c. xxii. (1849) 251 = sibirica.
monophylla, Plan. Ens. Fl. Gallega, 380 = seq.
monophyllos, Link, in *Schrad. Journ.* ii. (1799) 319.—Lusitan.
monstrosa, Salisb. Prod. 243 = *Muscari comosum*.
montana, Savi, Due Cent. 89 = *Ornithogalum narbonne*.
natalensis, Planch. in *Fl. des Serres*, x. (1854–55) 185. t. 1043.—Afr. austr.
nivalis, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 63 = bifolia.
nonscripta, Hoffm. & Link, in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schrift.* iv. (1803) 19 = *festalis*.
numidica, Poir. *Voy. Barb.* ii. 150.—Alger.
nutans, Sm. Engl. Bot. t. 377 = *festalis*.
obtusifolia, Poir. *Voy. Barb.* ii. 149.—Sardin.; Afr. bor.
odorata, Link, in *Schrad. Journ.* ii. (1799) 319; *Brot. Fl. Lusit.* i. 527.—Hispan.
orientalis, Thunb. in *Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 334.—Japon.
ovalifolia, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1871) 6 (Quid?).—Hab.?
ovatifolia, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 183 = *lanceaefolia*.
pallida, Salisb. Prod. 241 = *italica*.
pallidiflora, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 179.—Afr. austr.
Pancration, Nym. Syll. 369 = *Urginea Scilla*.
paradoxa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 267 = *Allium paradoxum*.
parviflora, Desf. Fl. Atlant. i. 300. t. 87 = *numidica*.
parviflora, Guss. Cat. Rar. Hort. Boccad. 57; ex ej. Fl. Sic. Prod. i. 418 = *obtusifolia*.
parviflora, Salisb. Prod. 242 = *hyacinthoides*.
patula, DC. Fl. Fr. iii. 211 = *hispanica*.
pauciflora, Link, ex Schult. f. *Syst.* vii. 561 = *italica*.

SCILLA:—

- pauciflora*, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 181.—Afr. austr.
pendula, Baker, l. c. iii. App. 14.—Afr. austr.
peruviana, Linn. *Sp. Pl.* 309.—Reg. Mediterr.
Petitiana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 328 = *Urginea Petitiana*.
platyphylla, Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 250.—Afr. trop.
plumbea, Lindl. Bot. Reg. t. 1355.—Afr. austr.
polyantha, Baker, in *Gard. Chron.* (1878) I. 104.—Afr. austr.
polyphylla, Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 249.—Afr. trop.
polyphylla, Royle, Illustr. Bot. Himal. 391 (= *Ornithogalum polyphyllum*).—Ind. or.
pomeridiana, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 143 = *Chlorogalum pomeridianum*.
praebacteata, Haw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 697 = *peruviana*.
praecox, Donn. Hort. Cantab. ed. II. 41 = *sibirica*.
praecox, Willd. Sp. Pl. ii. 128 = bifolia.
prasina, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 10.—Afr. austr.
pratensis, Berger, ex Schult. f. *Syst.* vii. 563 = *verna*.
pratensis, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 9 = *sibirica*.
pratensis, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 207. t. 189.—Croatia.
Princeps, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 189.—Afr. austr.
pubens, Welw. ex Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 40 = *peruviana*.
pulchella, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 286 = *autumnalis*.
pumila, Brot. Fl. Lusit. i. 527 = monophyllos.
purpurea, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *italica*.
puschkinoides, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 295.—Turkestan.
pusilla, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 183.—Afr. austr.
Quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 329 = *Urginea Quartiniana*.
racemosa, Balansa, ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 234 = *autumnalis*.
Raewskiana, Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1884) 655.—Turkestan.
Ramburei, Boiss. Elench. 86 = *verna*.
revoluta, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 6.—Afr. austr.
Richardiana, Buching. ex Baker, l. c. 11.—Abyss.
rigidifolia, Kunth, Enum. Pl. iv. 330.—Afr. austr.
romana, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 939 = *Hyacinthus romanus*.
rosea, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1828) 17 = bifolia.
Roseni, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 250 = *sibirica*.
Sandersoni, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 5.—Afr. austr.
saturata, Baker, in *Journ. Bot.* xii. (1874) 365.—Afr. austr.
secunda, Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl. vi. (1856) 194 = bifolia.
serotina, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 859 = *Dipcadi serotinum*.
serotina, Schousb. Vextr. Marokko, 165 = *Urginea anthericoides*.
sibirica, Andr. Bot. Rep. t. 365.—Ross.; As. Min.
sicula, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 813 = *peruviana*.
simensis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 327 = *Urginea simensis*.
simiarum, Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 249.—Afr. trop.
socialis, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 180.—Afr. austr.
sordida, Salisb. Prod. 243 = *Dipcadi serotinum*.
spathulata, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 187.—Afr. austr.
spicata, Baker, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 328.—Afr. trop.
squamosa, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 109 = *S. Lilio-hyacinthus*.
stellaris, Salisb. Prod. 241 = *peruviana*.
Strangwaysii, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1839) 12. n. 11.—Byzantium.
suaveolens, Salisb. Prod. 243 = *Muscari racemosum*.

SCILLA:—

- subglauca*, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 186.—Afr. austr.
subnivalis, Nym. Consp. 730 = bifolia.
subsecunda, Baker, in *Gard. Chron.* (1881) II. 38.—Afr. austr.
subtriphylla, Schur, Enum. Pl. Transs. 668 = bifolia.
sylvatica, Czetz, 'Eod. Muz. (1872) 20' = bifolia.
sylvestris, Savi, Due Cent. 88 = *Ornithogalum pyrenaicum*.
tetraphylla, Linn. f. Suppl. 200 = *Chlorophytum tetraphyllum*.
tingitana, Schousb. Vextr. Marokko, 169 = monophyllos.
tricolor, Baker, in *Gard. Chron.* (1880) II. 230.—Afr. austr.
triflora, Phil. Fl. Atac. 51.—Chili.
trifolia, Schur, Enum. Pl. Transs. 668 = bifolia.
Ughii, Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Prod. 162 = *peruviana*.
umbellata, Ram. in Bull. Soc. Philom. ii. (1800) 130. t. 8. f. 6 = *verna*.
undulata, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 11.—Afr. austr.
undulata, Desf. Fl. Atlant. 300. t. 88 = *Urginea undulata*.
uniflora, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 318 = *sibirica*.
unifolia, Linn. Sp. Pl. 309 = *Ornithogalum unifolium*.
verna, Bourg. ex Nym. Consp. 729 = *lusitanica*.
verna, Huds. Fl. Angl. ed. II. 142.—Europ. occ.
verna, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 714 = *italica*.
verna, Moris, Stirp. Sard. Elench. 47 = *Hyacinthus fastigiatus*.
vernalis, Salisb. Prod. 242 = *verna*.
versicolor, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 305.—Afr. austr.
versicolor, Salisb. Prod. 214 = *Lachenalia tricolor*.
villosa, Desf. Fl. Atlant. i. 299. t. 85. f. 2.—Afr. bor.
vincentina, Link & Hoffm. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schrift.* iv. (1803) 17.—Lusitan.
viridiflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 255.—Afr. austr.
viridis, Salisb. Prod. 243 = *Dipcadi filamentosum*.
Vivianii, Bertol. Fl. Ital. x. 517 = *peruviana*.
xanthandra, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 316, in obs. = *sibirica*.
zambesiaca, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* iii. App. 8.—Afr. trop.
zebrina, Baker, l. c. t. 185.—Afr. austr.

- SCILLOPSIS, Lem. in Illustr. Hortic. ii. (1855) Misc. 96; iii. (1856) Misc. 33 = *Lachenalia*, Jacq. (Liliac.).
anguinea, Lem. l. c. iii. (1856) 34 = *L. anguinea*.
angustifolia, Lem. l. c. 33 = *L. contaminata*.
bifolia, Lem. l. c. 35 = *L. isopetala*.
contaminata, Lem. l. c. 34 = *L. contaminata*.
fragrans, Lem. l. c. 35 = *L. versicolor*.
hyacinthoides, Lem. l. c. = *L. contaminata*.
isopetala, Lem. l. c. = *L. isopetala*.
liliflora, Lem. l. c. = *L. liliflora*.
lucida, Lem. l. c. 34 = *L. lucida*.
mediana, Lem. l. c. 35 = *L. mediana*.
nervosa, Lem. l. c. 34 = *L. nervosa*.
orthopetala, Lem. l. c. = *L. orthopetala*.
patula, Lem. l. c. 35 = *L. patula*.
purpurea, Lem. l. c. = *L. versicolor*.
purpureo-coerulea, Lem. l. c. = *L. purpureo-coerulea*.
pustulata, Lem. l. c. 34 = *L. pustulata*.
racemosa, Lem. l. c. = *L. racemosa*.
rosea, Lem. l. c. 35 = *L. isopetala*.
unicolor, Lem. l. c. 34 = *L. versicolor*.
unifolia, Lem. l. c. = *L. unifolia*.
violacea, Lem. l. c. 35 = *L. violacea*.

SCINDAPSUS, Schott, Melet. 21 (1832). AROI-DEAE, Benth. & Hook. f. iii. 992.

- CUSCUARIA, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.
angulatus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 219 = *Raphidophora montana*.
angustifolius, Hassk. in Hov. & De Vries, Tijdschr. ix. (1842) 164 = *Raphidophora angustifolia*.
anomalus, Carr. in Rev. Hortic. (1884) 536 = *Monstera acuminata*.
arborum, Presl, Epim. Bot. 242 = *Pothos macrostachyus*.
argyraeus, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 255 = *pictus*.
aruensis, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 270.—Ins. Arn.

SCINDAPSUS :—

- bipinnatifidus*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 65 = *Epipremnum mirabile*.
Beccarii, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 182.—Sumatra.
cannaefolius, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 271.—Borneo.
caudatus, Schott, Melet. 21 = *Epipremnum mirabile*.
coriaceus, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 271.—Borneo.
crassipes, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 182.—Borneo.
Cuscuaria, Presl, Epim. Bot. 242.—Malaya.
decursivus, Mor. Syst. Verz. Zoll. 82 = *Epipremnum mirabile*.
decursivus, Schott, Melet. 21 = *Raphidophora decursiva*.
dilaceratus, C. Koch & H. Sello, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 5 = *Monstera dilacerata*.
erectus, Presl, Epim. Bot. 242 = *Aglaonema marantifolium*.
Forsteri, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 161 = *Raphidophora pertusa*.
geniculatus, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 271.—Borneo.
giganteus, Schott, Melet. 21 = *Epipremnum giganteum*.
glauca, Schott, l. c. = *Raphidophora glauca*.
Haenkii, Presl, Epim. Bot. 240 = *Aglaonema Haenkei*.
hederaceus, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.—Malaya.
inaequilaterus, Presl, Epim. Bot. 240 = *Pothos Cumingianus*.
inquinatus, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 283 = *hederaceus*.
lingulatus, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 58 = *Raphidophora lingulata*.
longipes, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 270.—Borneo.
marantaeifolius, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 187 = *S. Cuscuaria*.
medius, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 82 = *Epipremnum medium*.
microstachyus, De Vriese & Miq. in Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 188 = *Anadendrum affine*.
montanus, Kunth, Enum. Pl. iii. 64 = *Anadendrum montanum*.
occidentalis, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 88 = *Monstera occidentalis*.
officinalis, Schott, Melet. 21.—Ind. or.; Burma.
Peepla, Schott, l. c. = *Raphidophora Peepla*.
Peepla, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 336 = *Raphidophora pertusa*.
pertusus, Schott, Melet. 21 = *Raphidophora pertusa*.
pictus, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 164.—Malaya.
pinnatifidus, Schott, Melet. 21 = *Epipremnum mirabile*.
pinnatus, Schott, l. c. = *Epipremnum mirabile*.
pothoides, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 184 = *hederaceus*.
pothoides, Schott, Prod. Aroid. 394 = *pictus*.
pteropodus, Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 23.—Sumatra.
Rumphii, Presl, Epim. Bot. 242 = *Pothos Rumphii*.
sylvestris, Kunth, Enum. Pl. iii. 64 = *Raphidophora angustifolia*.
tener, Presl, Epim. Bot. 242 = *Pothos gracilis, tener*.

SCIOBIA, Reichb. Nom. 66 (1841) = **SCIOPHILA**, Gandich. = **Procris**, Comm. (Urtic.).

SCIODAPHYLLUM, Blume, Bijdr. 875 (1826) = **Hep-tapleurum**, Gaertn. (Araliac.).

SCIODAPHYLLUM, P. Br. Hist. Jamaic. 190. t. 19 (1756) = **Sciadophyllum**, P. Br. (Araliac.).

SCIOPHILA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 493. t. 120 (1826) = **Procris**, Comm. (Urtic.).
cephalida, Gaudich. l. c. 494 = *P. cephalida*.
frutescens, Gaudich. l. c. 493, in nota absque diagn. = *P. frutescens*?
salicifolia, Gaudich. l. c. 494 = *P. cephalida*?
sessile, Gaudich. l. c. = *Elatostema sessile*.
sessilifolia, Gaudich. l. c. = *Elatostema sessile*?
torresiana, Gaudich. l. c. 493. t. 120 = *P. cephalida*.

SCIOPHILA, Wibel, Prim. Fl. Werth. 147 (1799) = **Maianthemum**, Weber (Liliac.).
convallarioides, Wibel, l. c. = *M. Convallaria*.

SCIOPHYLLA, Heller, Fl. Wirceb. 158 (1810) = *praec.*

SCIOTHAMNUS, Endl. Gen. 780 (1839) = **Peucedanum**, Tourm. (Umbell.).
capensis, Endl. ex Walp. Rep. ii. 412 = *P. capense*.
collinus, Endl. l. c. 413 = *P. collinum*.
montanus, Endl. l. c. = *P. Ecklonianum*.
virgatus, Endl. l. c. = *P. capense*.

SCIRPIDIUM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 293 = **Eleocharis**, R. Br. (Cyperac.).
aciculare, Nees, l. c. 293 = *E. acicularis*.
grande, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 97 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.
nigrescens, Nees, l. c. = *E. nigrescens*.
piuhiense, Nees, l. c. = *E. sulcata*.
sulcatum, Nees, l. c. 98 = *E. sulcata*.
tenuis, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 293 = *E. tenuis*.

SCIRPODENDRON, Zipp. ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxviii. (1869) ii. 84. **CYPERACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1056.
PTYCHOCARYA, R. Br. in Wall. Cat. n. 3538 (1830).
costatum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxviii. (1869) ii. 85.—As. trop.
pandaniforme, Zipp. ex Kurz, l. c. = *costatum*.
sulcatum, Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 65. t. 28 = *costatum*.

SCIRPUS, [Tourm.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 12 (1737). **CYPERACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1049.

ANDROCOMA, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 396.

ANTHOPHYLLUM, Steud. Syn. Pl. Cyp. 160 (1855).

APLOSTEMON, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 105.

BAETHRYON, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).

BLEPHAROLEPIS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 91 (1847).

BLYSMUS, Panz. ex Schult. Mant. ii. 41 (1824).

CLAVULA, Dum. Fl. Belg. 143 (1827), pro parte.

CREPIDOCARPUS, Klotzsch, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 414.

DESMOSCHOENUS, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 271 (1853).

DICHELOSTYLIS, Endl. Gen. 118, in syn. (1836).

DICHISMUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106.

DICHOSTYLIS, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 39 (1819).

DIPLARINUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106.

DISTICHMUS, Endl. Gen. 119 (1837).

ELEOGITON, Link, Hort. Berol. i. 293 (1827).

ELYTOSPERMUM, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. i. (1831) 200. t. 2.

HELEOPHILA, Schult. Mant. ii. 2 (1824).

HELEOPHYA, Flora, iv. (1821) 25.

HELEOPHYLAX, Beauv. ex Lestib. Ess. Fam. Cyp. 41 (1819).

HELEOPHYLAX, Steud. Nom. ed. II. i. 743 (1840).

HEMICARPHA, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 263.

HOLOSCHOENUS, Link, Hort. Berol. i. 293 (1827).

HYMENOCARPHA, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 43 (1819).

IOLEPIS, R. Br. Prod. 221 (1810).

LEIOPHYLLUM, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).

LIMNOCHLOA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 78, pro majore parte.

MALACOCARPHA, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 292.

MEGADENUS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).

NEMOCHARIS, Beurl. in Bot. Notiser (1853), 52.

NEMUS, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 13 (1825).

NOMOCHLOA, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 37 (1819).

OXYCARYUM, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 90 (1847).

PTEROLEPIS, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2071.

PTERYGOLEPIS, Reichb. Nom. 236 (1841).

PTERYGOLEPIS, Opiz, Seznam, 83 (1852).

SEIDLIA, Opiz, Natural. xi. (1826) 349.

STENOPHYLLUS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).

ABLEPHARUS, Griseb. Cat. Pl. Cub. 240 = *cubensis*.

SCIRPUS :—

- acaulis*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 78.—Chili.
acicularis, Linn. Sp. Pl. 48 = *Eleocharis acicularis*.
acicularis, Oed. in Fl. Dan. t. 167 = *Eleocharis palustris*.
acicularis, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 52 = *cernuus*.
acicularis, Willd. ex Kunth, l. c. 142 = *Eleocharis exigua*.
acicularis, Zanard. ex Parl. Fl. Ital. ii. 67 = *Eleocharis atropurpurea*.
acrostachys, Steud. in Flora, xii. (1829) 148 = *Ficinia composita*.
acuminatus, Muhl. Desc. Gram. 27 = *Eleocharis acuminata*.
acuminatus, Steud. in Flora, xii. (1829) 146 = *Ficinia acuminata*.
acuta, Poir. Encyc. Suppl. v. 102 = *Eleocharis acuta*.
acutangulus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 213 = *Eleocharis fistulosa*.
acutus, Muhl. Desc. Gram. 33 = *lacustris*.
acutus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 192 = *mucronatus*.
acutus, Spreng. Syst. i. 203 = *Eleocharis acuta*.
acutus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 141 = *Eleocharis acicularis*.
adscendens, Willd. ex Kunth, l. c. 198.—Aegypt.
aegyptiacus, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 196 = *littoralis*.
aegyptiacus, Poir. Encyc. vi. 770.—Aegypt.; Ital.
aemulans, Steud. Syn. Pl. Cyp. 87 = *grossus*.
aestivalis, Retz. Obs. iv. 12 = *Fimbristylis aestivalis*.
aestivalis, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 230 = *Fimbristylis squarrosa*.
affinis, Roth, Nov. Pl. Sp. 30 = *maritimus*.
afflatus, Benth. Fl. Hongk. 394 = *Eleocharis afflata*.
aggregatus, Ruiz, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 709 = *pungens*.
albescens, Phil. f. Cat. Pl. Vass. Chil. 310 = *inundatus*.
albo-ater, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 102 = *Eleocharis ocreata*.
albovittatus, Schur, Enum. Pl. Transs. 694, in syn. = *S. Holoschoenus*.
albus, Salisb. Prod. 31 = *Rynchospora alba*.
alpinus, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 32 = *pumilus*.
altissimus, Gilib. Exercit. ii. 514 = *lacustris*.
ambiguus, Schult. Mant. ii. 85 = *divaricatus*.
amentaceus, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 270 = *Fimbristylis complanata*.
americanus, Pers. Syn. i. 68 = *pungens*.
anceps, Poir. Encyc. vi. 782 = *Cladium iridifolium*.
anceps, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 287 = *Fimbristylis complanata*.
andinus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 554.—Chili.
androgyna, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis androgyna*.
Andrzejewscii, Bess. ex Schult. Mant. ii. 536 = *lacustris*.
angachillensis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 496 = *inundatus*.
angulatus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 155 = *Eleocharis fistulosa*.
anisochaetus, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 174.—Cuba.
annuus, All. Fl. Pedem. ii. 277 = *Fimbristylis diphylla*.
annuus, Host, Gram. Austr. iii. 42. t. 63 = *Fimbristylis dichotoma*.
annuus, Thuill. Fl. Par. ed. II. 22 = *Eleocharis ovata*.
anomalus, Retz. Obs. v. 15 = *Hypolytrum latifolium*.
antarcticus, Linn. Mant. ii. 181.—Afr. austr.
antarcticus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *diabolicus*?
antarcticus, Vahl, Enum. ii. 261, partim (= *Isolepis barbata*).—Geront. trop.
apus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 78 = *Fimbristylis Vahl.*
aquatilis, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352, nomen.—Am. bor.
arabicus, Ehrenb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 716 = *littoralis*.
arenarius, Benth. Fl. Austral. vii. 325.—Austral.
arenarius, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 741 = *Fimbristylis arenaria*.
argenteus, Rottb. Desc. Nov. Pl. 51; Progr. 27 = *Fimbristylis argentea*.
aristatus, Willd. Sp. Pl. i. 300; Vahl, Enum. ii. 271 = *Fuirena glomerata*.

SCIRPUS:—

articulatus, Linn. *Sp. Pl.* 47.—Afric.; Ind. or.; Austral.
arvensis, Retz. Obs. iv. 11 = *Fimbristylis ferruginea*.
arvensis, Roxb. *Fl. Ind.* i. 224 = *Fimbristylis diphylla*.
asper, J. & C. Presl, *Rel. Haenk.* i. 194.—Chili.
asperulus, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 104; Spreng. *Syst.* i. 213 (*Bulbostylidis* sp.).—Am. trop.
atacamensis, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 482 = *rigidus*?
atracha, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 103 = *Eleocharis atracha*, R. Br.
atrofactus, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 317 = *Eleocharis capitata*.
atropurpureo-vaginat, Boeck. in *Flora*, lxv. (1882) 14 = *nodosus*.
atropurpureus, Retz. Obs. v. 14 = *Eleocharis atropurpurea*.
atropurpureus, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 150 = *Eleocharis capitata*.
atrovirens, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 79; *Hort. Berol.* t. 99 = *sylvaticus*.
attenuatus, Franch. & Sav. *Enum. Pl. Jap.* ii. 543.—Japan.
ancklandicus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 491.—N. Zel.
auro-nitens, Nees & Ehrenb. ex Boeck. l. c. 723 = *maritimus*.
australis, Murr. *Syst. ed. XIII.* 85 = *S. Holoschoenus*.
autumnalis, Linn. *Mant.* ii. 180 = *Fimbristylis autumnalis*.
autumnalis, Rottb. *Desc. Nov. Pl.* 58. t. 17 = *Cyperus Haspan*.
badius, J. & C. Presl, *Rel. Haenk.* i. 193 = *pungens*.
Baeothryon, Linn. f. *Suppl.* 103 = *pauciflorus*.
Baeothryon, Timm. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 159 = *caespitosus*.
Baeothryon, Wöhleb. *Suppl.* 3; ex Schrad. *Fl. Germ.* i. 127 = *Eleocharis palustris*.
bahiensis, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 83 = *Eleocharis Sellowiana*.
Bailii, Kohts, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (1869) 334 = *caespitosus*.
Baldwinianus, Schult. *Mant.* ii. 85 = *Fimbristylis diphylla*.
balearicus, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 166 = *littoralis*.
bangalorensis, Heyne, ex Wall. *Cat. n.* 3464 = *corymbosus*.
barbata, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 104. (*Bulbostylidis* sp.).—Geront. trop.
barbatulus, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 583 (*Index*) = *lacustris*.
barbatus, Rottb. *Desc. Nov. Pl.* 52; *Progr.* 27 = *Fimbristylis barbata*.
barbatus, Vahl, ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 211 = *Fimbristylis vestita*.
barbulatus, Kunth, l. c. 165 = *lacustris*.
Bellardi, Wahlenb. *Fl. Lapp.* 15 = *Kobresia scirpina*.
bengalensis, Pers. *Syn.* i. 68 = *Fimbristylis milliacea*.
Bergianus, Spreng. *Syst.* i. 212 = *antarcticus*.
Berlandieri, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 103. (*Fimbristylidis* sp.).—Mexic.
bicapitatus, Poir. *Encyc.* vi. 761 = *Ficinia bulbosa*.
biceps, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 134 = *Ficinia bulbosa*.
bicolor, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 28 = *Thouarsianus*.
bifolius, Wallr. *Sched. Crit.* 27 = *rufus*.
bispicatus, Koen. ex Roxb. *Hort. Beng.* 6; *Fl. Ind.* i. 220 = *Fimbristylis schoenoides*.
bisumbellatus, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 15 = *Fimbristylis dichotoma*.
bivalvis, Lam. *Illustr.* i. 141.—Madag.
bonariensis, Poir. *Encyc.* vi. 763 = *Fimbristylis ferruginea*.
brachyceras, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) 1. *Intell.* 21, *nomen*; et ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 496 = *corymbosus*.
brachyphyllus, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 212 = *Fimbristylis barbata*.
bracteatus, Bigel. in *New Engl. Med. Journ.* v. (1816) 335 (*Quid?*).—Am. bor.
Brayii, Hoppe, ex Roem. & Schult. *Syst.* ii. 137 = *lacustris*.
breviculmis, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 742 (*Fimbristylidis* sp.).—Afr. austr.
brevifolius, Bernh. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 212 = *Fimbristylis barbata*.

SCIRPUS:—

brevifolius, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 99 = *Fimbristylis ferruginea*.
brevifolius, Rottb. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 190 (*Quid?*).—Ind. or.
brevifolius, Roxb. *Hort. Beng.* [81]; *Fl. Ind.* i. 229 = *Fimbristylis diphylla*.
brevis, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 600 = *cernuus*.
brevivaginat, Boeck. in *Flora*, xli. (1858) 413 = *pungens*.
Bridgesii, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 508 = *inundatus*.
brizoides, Benth. *Fl. Austral.* vii. 326.—Anstral.
brizoides, Willd. ex Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 80 = *lineatus*.
bromeliaefolius, Rudge, *Pl. Gui.* 19. t. 24 = *Diplasia karataefolia*.
Brownii, Spreng. *Syst.* i. 204 = *Eleocharis capitata*.
brunneo-vaginat, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1879-80) 25. (*Fimbristylidis* sp.).—Bras.
brunneus, Muhl. *Desc. Gram.* 42 = *polyphyllus*.
bufonius, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 105; Spreng. *Syst.* i. 213 = *Fimbristylis capillaris*.
bulbiferus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 482.—Afr. austr.
bulbosus, Rottb. *Desc. Nov. Pl.* 46; *Progr.* 25 = *Ficinia scariosa*.
caducus, Delile, *Fl. Egypte*, 153 = *Eleocharis caduca*.
caespitosus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 488, *partim* = *pumilus*.
caespitosus, Linn. *Sp. Pl.* 48.—Europ.; Am. bor.
caespitosus, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 148 = *Eleocharis palustris*.
californicus, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 538 = *riparius*.
campestris, Roth, in *Usteri, Ann. Bot.* xiv. (1795) 18 = *pauciflorus*.
campestris, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 148 = *Eleocharis palustris*.
camptotrichus, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 173.—Cuba.
camtschaticus, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 158 = *Eleocharis palustris*.
canaliculato-triqueter, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 318 = *grossus*.
Canbyi, A. Gray, in *Proc. Acad. Sc. Philad.* (1864) 18 = *leptolepis*.
Candelabrum, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 232 = *Fimbristylis diphylla*.
capensis, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 3 = *maritimus*.
capensis, Rottb. *Desc. Nov. Pl.* 53; *Progr.* 24 = *Ficinia bulbosa*.
capillaceus, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 239 = *Eleocharis capillacea*.
capillaceus, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 30 = *nanus*, *Eleocharis acicularis*.
capillaris, Linn. *Sp. Pl.* 49 = *Fimbristylis capillaris*.
capillifolius, Parl. *Fl. Ital.* ii. 83.—Afr. austr.
capitatus, Burm. f. *Fl. Ind.* 21 = *Fuirena uncinata*.
capitatus, Linn. *Sp. Pl.* 48 = *Eleocharis capitata*.
capitatus, Muhl. *Desc. Gram.* 30 = *Eleocharis albida*.
capitatus, Schreb. *Spicil.* 60 = *Eleocharis ovata*.
capitatus, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 145 = *Eleocharis tenuis*.
capsularis, Lour. *Fl. Cochinch.* 44.—China.
caribaeus, Griseb. in *Goett. Abh.* vii. (1857) 269 = *Eleocharis ochreateus*.
caribaeus, Rottb. *Desc. Nov. Pl.* 46; *Progr.* 24 = *Eleocharis capitata*.
caricinus, Schrad. *Fl. Germ.* i. 132 = *S. Caricis*.
Caricis, Retz. *Fl. Scand. Prod.* 11.—Europ.; As. media.
carinatus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 392.—Am. bor.
carinatus, Sm. *Engl. Fl.* i. 60 = *lacustris*.
carolinianus, Lam. *Illustr.* i. 142 = *Fimbristylis castanea*.
carolinianus, Panz. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 282 = *Rynchospora nitens*.
cartilagineus, Benth. *Fl. Austral.* vii. 328 = *Gunnii*.
cartilagineus, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 103; Spreng. *Syst.* i. 208 = *antarcticus*.
castaneus, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 31 = *Fimbristylis castanea*.
castaneus, Muhl. *Desc. Gram.* 38 = *Fimbristylis coarctata*.
castaneus, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 227, 282 = *Fimbristylis autumnalis*, *Rynchospora nitens*.

SCIRPUS:—

Cephalotes, Heyne, ex Roth, *Nov. Pl. Sp.* 30 = *maritimus*.
Cephalotes, Jacq. *Hort. Vindob.* i. 42. t. 97 = *Kyllinga monocephala*.
Cephalotes, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 76 = *Rynchospora Cephalotes*.
Cephalotes, Walt. *Fl. Carol.* 71 = *Lipocarpha Humboldtiana*.
cernuus, Vahl, *Enum.* ii. 245.—Cosmop.
cespitatus, Ehrh. *Beitr.* vi. 84, *nomen* = *caespitosus*.
cespitatus, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 99 = *Fimbristylis caespitosus*.
cespitatus, Pollich, *Hist. Pl. Palat.* i. 39 = *pauciflorus*.
Chaeta, Schult. *Mant.* ii. 72 = *Eleocharis acicularis*.
chaetarius, Spreng. *Syst.* i. 203; Thw. *Euum. Pl. Zeyl.* 435 = *Eleocharis Chaetaria*.
chaetodes, Link, in Buch, *Beschr. Canar. Ins.* 138 = *cernuus*.
Chamissoi, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. 1. 107 = *riparius*.
chilensis, Meyen, *Reise*, i. 380, *nomen*; et Nees & Meyen, in *Linnaea*, ix. (1834) 293 = *pungens*.
chinensis, Munro, in *Seem. Bot. Voy. Herald*, 423.—Ind. or.; China.
chinensis, Osb. *It.* 220 = *squarrosus*.
Chirigota, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 176 (*Fimbristylidis* sp.).—Cuba.
ciliaris, Linn. *Mant.* ii. 182 = *Fuirena glomerata*.
ciliaris, Pers. *Syn.* i. 77 = *Fuirena pubescens*.
ciliatofolius, Ell. *Sketch*, i. 82; *Darlingt. Florul. Cestr.* 7 (*Fimbristylidis* sp.).—Am. bor.
ciliatus, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 86 = *lacustris*.
ciliolatus, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1871) 152 = *Fimbristylidis* sp.).—Guian.
cinereofuscus, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 236, 237 = *Fimbristylis ferruginea*.
cinnamometorum, Vahl, *Enum.* ii. 278 = *Fimbristylis cyperoides*.
cinnamomeus, Boeck. in *Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 505 (*Fimbristylidis* sp.).—Madag.
circinatus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 762 (*Fimbristylidis* sp.).—Am. trop.
clathratus, Reichb. *lc. Fl. Germ.* viii. 39, in obs.—setaceus?
Clintonii, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxviii. (1864) 290.—Am. bor.
coarctatus, Ell. *Sketch*, i. 83 = *Fimbristylis coarctata*.
cognatus, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xv. (1861) 228 = *mucronatus*.
coleotrichus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 763 (*Fimbristylidis* sp.).—Afr. trop.
collinus, Boeck. l. c. 746 = *Fimbristylis contexta*.
comosus, Dum. *Fl. Belg.* 143.—Belgium.
comosus, Wall. in *Roxb. Fl. Ind.* ed. Carey, i. 234 = *Eriophorum comosum*.
compactus, Hoffm. *Deutschl. Fl.* ed. II. i. 1. 25 = *maritimus*.
compactus, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 102; Spreng. *Syst.* i. 203 = *Eleocharis compacta*.
complanatus, Retz. Obs. v. 14 = *Fimbristylis complanata*.
compressus, Moench, *Meth.* 349 = *Eleocharis ovata*.
compressus, Pers. *Syn.* i. 66 = *S. Caricis*.
confervoides, Poir. *Encyc.* vi. 755.—Madag.
congestus, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 41 = *Eleocharis congesta*.
congestus, Reichb. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 211 (= *Isolepis junciformis*).—Am. austr.
conglomeratus, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 227 = *pungens*.
conicus, Presl, ex Mert. & Koch, *Deutschl. Fl.* i. 427, in *syn.* = *Eleocharis palustris*.
coniferus, Poir. *Encyc.* vi. 756 = *Lepironia mucronata*.
conostachys, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 756 (*Fimbristylidis* sp.).—Bras.
consanguineus, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 138; et in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 754 (*Fimbristylidis* sp.).—Bras.; Reg. Argent.
consperus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 505 = *inundatus*.
constrictus, Schrad. ex Kunth, *Enum. Pl.* ii. 153 = *Eleocharis geniculata*.
cornatus, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 177 = *Fimbristylis squarrosa*.
coronarius, Vahl, *Enum.* ii. 261 = *Cyperus coronarius*.

* = *Juncus effusus* Linn.
Fl. Sin. iii. 163 (1903)

SCIRPUS:—

- corymbiferus*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 176 = *Rynchospora ignorata*.
corymbosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 14 = *maritimus*.
corymbosus, Heyne, in Roth, Nov. Pl. Sp. 28.—Afr.; Ind. or.
corymbosus, Linn. Cent. Pl. ii. 7; Amoen. Acad. iv. 303 = *Rynchospora aurea*.
costatus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 511.—Tasman.; Abyss.
crassiusculus, Benth. Fl. Austral. vii. 326.—Austral.
crinalis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 265 (*Eleocharis* sp.).—Reg. Argent.
criniger, A. Gray, in Proc. Pl. Am. Acad. vii. (1868) 392.—Calif.
crinitus, Poir. Encyc. vi. 752 = *Ficinia filiformis*.
cubensis, Poepp. & Kunth, in Enum. Pl. ii. 172.—Am. trop.; Afr. trop.
Cumingii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 491 = *Carex setifolia*.
cuspidatus, Roem. & Schult. Syst. ii. 67, sphalm., in citat. (*Tetralaria* sp.).—Afr. austr.
cuspidatus, Roth, Nov. Pl. Sp. 31 = *Fuirena Walli-chiana*.
cuspidatus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 213 (= *Isolepis puberula*).—Madag.
Custoris, Hegetschw. Fl. Schw. 49 = *lacustris*.
cylindraceus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 238 = *Fimbristylis spadicea*.
cymosus, Lam. Illustr. i. 141 = *Fimbristylis rigida*.
cymosus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis cymosa*.
cymosus, Spreng. Syst. i. 209 = *Rynchospora distans*.
cyperiformis, Muhl. Desc. Gram. 41 = *Mariscus glomeratus*.
cyperinus, Kunth, Enum. Pl. ii. 170 = *S. Eriophorum*.
cyperoides, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 461.—Mexic.
cyperoides, Lam. Fl. Fr. iii. 553 = *maritimus*.
cyperoides, Linn. Mant. ii. 181 = *Mariscus Siberianus*.
cyperoides, Spreng. Syst. i. 208.—Austral.
debilis, Lam. Illustr. i. 141 = *Fimbristylis ferruginea*.
debilis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 55 = *erectus*.
decipiens, A. St. Hil. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 208 = *riparius*.
decumanus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 168 = *maritimus*.
densus, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, 231 (*Fimbristylis* sp.).—Ind. or.
denudata, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis denudata*.
depauperata, Poir. l. c. 98; Muhl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 233 = *Fimbristylis diphylla*.
depressus, Vell. Fl. Flum. 35; i. t. 83 = *Eleocharis geniculata*.
deserticola, Phil. Fl. Atac. 53.—Chili.
Despreuxii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 86 = *littoralis*.
diabolicus, Steud. in Flora, xii. (1829) 147.—Afr. austr.
dichotomus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 39 = *Fimbristylis diphylla*.
dichotomus, Linn. Sp. Pl. 50 = *Fimbristylis dichotoma*.
dichotomus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 43 = *Fimbristylis spadicea*.
dichotomus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 235, 239 = *Fimbristylis diphylla*, *junciformis*.
dictyospermus, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 175 = *Eleocharis cellulosa*.
Dietrichiae, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 109.—Austral.
digitatus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 691 = *flaccifolius*.
dioecus, Boeck. l. c. 719.—Afr. austr.
diphyllus, Retz. Obs. v. 15 = *Fimbristylis diphylla*.
dipsaceus, Rottb. Desc. Nov. Pl. 56 = *Fimbristylis dipsacea*.
dipsaceus, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 204 = *S. Hystrix*.
dissitus, Duthie, in Saharunpore Report (1885) = *S. Caricis*.
distichus, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 343 = *S. Caricis*.
divaricatus, Ell. Sketch, i. 88, t. 2. f. 4.—Am. bor.
domingensis, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 14.—Ins. S. Doming.
domingensis, Pers. Syn. i. 67 = *Fimbristylis spadicea*.
Donianus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 28 = *quad-rangulus*.

SCIRPUS:—

- Drummondii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 318 = *lineatus*.
dubius, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 215 = *Eleocharis plantaginea*?
Duvalii, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 36 = *lacustris*.
ebenocarpus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 224 = *antarcticus*.
echinatus, Linn. Sp. Pl. 50 = *Mariscus panicus*.
echinatus, Muhl. Desc. Gram. 39 = *Mariscus ovularis*.
Eckloneus, Steud. in Flora, xii. (1829) 148 = *Ficinia Ecklonea*.
effusus, Gueldenst. Reisen, ii. 179; ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 252, nomen (Quid?).—Ross. austr.
Ehrenbergii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 712 = *maritimus*.
elatus, Boeck. l. c. 694 = *S. Holoschoenus*?
elatus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 252 (Quid?).—Ross. austr.
elatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis denudata*.
elegans, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 226 = *Eleocharis geniculata*.
elegans, Salisb. Prod. 31 = *Cyperus Luzulae*.
elegantulus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 317 = *Eleocharis ovata*.
Elliottii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 28 = *Fimbristylis diphylla*.
ellipticus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 146 = *Eleocharis tenuis*, *montana*.
elychniarius, Molina, Sagg. Chil. 153 (Quid?).—Chili.
elongatus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 40 = *Eriophorum comosum*.
elongatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis diphylla*.
equisetoides, Ell. Sketch, i. 79 = *Eleocharis inter-stincta*.
erectus, Poir. Encyc. vi. 761.—As. temp.; Am. bor.; Austral.
Eriophorum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 33.—As. or.; Am. bor.
eriphorus, Poepp. ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *stramineus*.
erraticus, Rota, ex De Not. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 366 = *Eleocharis atropurpurea*.
exaltatus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 56 = *polyphyllus*, Vahl.
excelsus, Salisb. Prod. 31 = *Cladinn germanicum*.
exiguus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 225 = *Eleocharis acicularis*.
exilis, Poir. Encyc. Suppl. v. 105; Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 228 = *Fimbristylis exilis*.
expallescens, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 509.—Afr. austr.
falcatius, Vahl, Enum. ii. 275 = *Fimbristylis junci-formis*.
fascicularis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 188 = *Ludwigii*.
fastigiatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18 = *Ficinia fastigiata*.
ferrugineus, Linn. Sp. Pl. 50 = *Fimbristylis ferruginea*.
festucoides, Poir. Encyc. vi. 752 (= *Isolepis festucoides*).—Madag.
ficinioides, Kunth, Enum. Pl. ii. 172.—Afr. austr.
filamentosus, Vahl, Enum. ii. 262 (= *Isolepis fila-mentosa*).—Afr. trop.
filiculmis, Schrad. ex Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 311 = *Eleocharis sulcata*.
filiformis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3 (*Ficinia* sp.).—Afr. austr.
filiformis, Lam. Illustr. i. 138 = *Eleocharis tenuis*.
filiformis, Savi, Fl. Pisan. i. 46 = *cernuus*.
fimbriatus, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 138 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.
fimbriatus, Poir. Encyc. vi. 779 = *Fimbristylis diphylla*.
fimbriatus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 235 = *Fimbristylis pilosa*.
fimbriatus, Delile, Fl. Egypte, 155 = *littoralis*.
fistulosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 14 = *articulatus*.
fistulosus, Poir. Encyc. vi. 749 = *Eleocharis fistulosa*.
flaccidus, Reichb. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 3 = *Eleocharis capitata*.
flaccifolius, Steud. Syn. Pl. Cyp. 83.—Afr. austr.
flavescens, Gromow, ex Trantv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 293, nomen (Quid?).—Hab.?
flavescens, Poir. Encyc. vi. 756 = *Eleocharis capitata*.

SCIRPUS:—

- floccosus*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 241. (*Fimbristylis* sp.).—Cuba.
floridanus, Michx. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 158 = *nanus*.
fluitans, Linn. Sp. Pl. 48.—Geront.
fluviatilis, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 500 = *maritimus*.
foliatus, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 414 = *Schoenus axillaris*.
fragrans, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 47.—Peruv.
frondosus, Banks & Soland. ex Boeck. in Flora, lxi. (1878) 141.—N. Zel.
furva, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis furva*.
fuscescens, Link, Jahrb. i. iii. (1820) 81 = *Fimbristylis dichotoma*.
fuscus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 212 (= *Isolepis asperula*).—Am. trop.
Gaudichaudianus, Kunth, Enum. Pl. ii. 157 = *Eleo-charis ocreata*.
Gaudichaudii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 511 = *inundatus*.
geniculatus, Linn. Sp. Pl. 48 = *Eleocharis geniculata*.
giganteus, Kunth, Enum. Pl. ii. 172.—Bras.
giganteus, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in Mélang. (1811), nomen.—Madag.
Giraudyi, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 483 = *fluitans*.
glaucescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 76 = *Eleocharis glaucescens*.
glaucophyllus, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871) 153. (*Fimbristylis* sp.).—Bras.
glaucus, Lam. Illustr. i. 142 = *maritimus*.
glaucus, Nees & Meyen, in Linnaea, ix. (1834) 293 = *asper*.
glaucus, Smith, Engl. Bot. t. 2321 = *lacustris*.
glaucus, Torr. Fl. U. St. 44 = *Eleocharis glaucescens*.
Glaziovii, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871) 152 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.
globifer, Welw. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 87 = *lacustris*.
globiferus, Linn. f. Suppl. 104 = *S. Holoschoenus*.
globosus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 27 = *nodosus*.
globulosus, Retz. Obs. vi. 19 = *Fimbristylis globulosa*.
globulosus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. 217 = *Fimbristylis ferruginea*.
glomeratus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3460 = *Cyperus arenarius*.
glomeratus, Linn. Sp. Pl. 52 = *Mariscus Dregeanus*.
glomeratus, Retz. Obs. iv. 11 = *Fimbristylis spathacea*.
glomeratus, Roxb. Fl. Ind. i. 224 = *Fimbristylis diphylla*.
glomeratus, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 47 = *mucronatus*.
glutinosus, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 270 = *nodosus*.
Gmelini, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 138 (Quid?).—Europ.
gracilis, Koch, in Salz. Enum. Pl. Rar. Gall. 9 = *cernuus*.
gracilis, Kunth, Enum. Pl. ii. 585 = *Eleocharis maculosa*.
gracilis, Poir. Encyc. vi. 763 = *Ficinia Poirctii*.
gracilis, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 289. t. 15. f. 1 = *nodosus*.
gracilis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 227 = *Fimbri-stylis tenuis*.
gracilis, Zeyh. ex Kunth, l. c. 256 = *Ficinia gracilis*.
gracillimus, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 140; et in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 761 (*Fimbri-stylis* sp.).—Abyss.
gracillimus, Kohts, in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 333 = *setaceus*.
gramineus, Neck. Delic. Gallo-Belg. 27 = *sylvaticus*.
Griffithii, Boeck. in Flora, xli. (1858) 595 = *grossus*.
grossus, Linn. f. Suppl. 104.—Ind. or.; Malaya.
Gunnii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 493.—Tasman.
hakonensis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 110 = *Eleocharis tetraquetra*.
Halleri, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 188 = *pauciflorus*.
Halleri, Vitm. Summa Pl. i. 150 = *supinus*.
Hallii, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 563 = *supinus*.
hamulosus, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1814) 356.—Reg. Casp.
hemisphaericus, Roth, Nov. Pl. Sp. 29 = *Lipocarpa sphacelata*.
heterocarpus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 171 = *supinus*.

SCIRPUS:—

- heteromorphus*, Steud. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 311 = *Eleocharis nodulosa*.
hexatrichus, Ehrh. ex Boiss. Fl. Orient. v. 387 = *Eleocharis macrantha*.
Hildebrandtii, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 263 (*Fimbristylis* sp.).—Afr. trop.
hirtus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 210 = *Fimbristylis vestita*.
hirtellus, Vahl, Eclog. Am. iii. 1 = *Fimbristylis hirtella*.
hirtus, Griseb. Cat. Pl. Cub. 241 (*Fimbristylis* sp.).—Cnba.
hirtus, Poir. Encyc. Suppl. v. 106; Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 224 = *Fimbristylis squarrosa*.
hispanicus, Gueldenst. Reisen, i. 109; ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 252 (Quid?).—Ross. austr.
hispidulus, Vahl, Enum. ii. 276.—Afr. trop.
Hochstetteri, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 739 (*Fimbristylis* sp.).—Abyss.
Holoschoenus, Linn. Sp. Pl. 49.—Geront.
Holoschoenus, Oed. Fl. Dan. t. 454 = *lacustris*.
Holoschoenus, Thunb. Fl. Cap. i. 368 = *Thunbergii*.
Hookeri, Kunth, Enum. Pl. ii. 173.—Chili.
Hoppii, Weihe, in Flora, xi. (1828) 118 = *triqueter*.
hottentottus, Linn. Mant. ii. 82 = *Fuirena hirta*.
Humboldtii, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 112 = *Hemicarpha subsquarrosa*.
Humboldtii, Spreng. Syst. i. 213 (= *Isolepis junciformis*).—Am. austr.
humilis, Vell. Fl. Flum. 35; i. t. 84.—Bras.
humilis, Wallr. Sched. Crit. 27 = *nanus*.
humilis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 212 (= *Isolepis scabra*).—Peruv.
humillimus, Benth. Fl. Austral. vii. 324.—Austral.
hyalinolepis, Steud. ex Jardin, in Bull. Soc. Linn. Normand. Sér. II. ix. (1875) 278, 280 = *maritimus*.
Hystrix, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17.—Afr. austr.
inanis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 86 = *spatheus*.
inclinatus, Aschers. & Schweinf. ex Boiss. Fl. Orient. v. 381 = *corymbosus*.
incomtus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 693.—Afr. austr.
incurvatus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 214 = *articulatus*.
intermedius, Čelak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 742 = *sylvaticus*.
intermedius, A. Gray, ex Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 300 = *Eleocharis olivacea*.
intermedius, Muhl. Desc. Gram. 31 = *Eleocharis intermedia*.
intermedius, Poir. Encyc. vi. 767 = *S. Holoschoenus*.
intermedius, Thuill. Fl. Par. ed. II. 21 = *Eleocharis palustris*.
interstinctus, Poepp. ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *Eleocharis geniculata*.
interstinctus, Vahl, Enum. ii. 149 = *Eleocharis interstincta*.
intricatus, Linn. Mant. ii. 182 = *Cyperus aristatus*.
inundatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 103; Spreng. Syst. i. 207.—Austral.; Am.; Austr.
iridifolius, Bory. Voy. ii. 94; Poir. Encyc. vi. 783 = *Cladium iridifolium*.
Isolepis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 498.—Ind. or.; Afr. austr.
Janii, Bess. ex Schult. Mant. ii. 536 = *lacustris*.
japonicus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 109 = *Eleocharis afflata*.
Jardinei, Steud. & Jardin, in Bull. Soc. Linn. Normand. Sér. II. ix. (1875) 278, 280 = *lacustris*.
javanus, Nees, in Wight, Contrib. 112 = *mucronatus*.
juncus, Forst. f. Prod. 6 = *Fimbristylis juncea*.
junciformis, Nees, in Wight, Contrib. 112 = *erectus*.
junciformis, Poir. Encyc. Suppl. v. 105 (= *Isolepis junciformis*).—Am. austr.
junciformis, Retz. Obs. vi. 19.—China.
juncoides, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 216 = *erectus*.
juncoides, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 211 (= *Isolepis junciformis*).—Am. austr.
Junguhnii, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 307.—Java.
Kalli, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 15 = *Cyperus aegypticus*.
kamtschaticus, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. i. (1831) 198 = *Eleocharis palustris*.
Kielmeyeri, Schimp. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 539 = *Fimbristylis complanata*.

VOL. II.

SCIRPUS:—

- Koshewnikowii*, Litwinow, ex Kotsom, in Bull. Soc. Nat. Mosc. lvii. (1882) 220, nomen.—Ross.
Kunthii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 508 = *ficinioides*.
kyllingoides, Boeck. l. c. 733.—Ind. or.; Afr. trop.
Kysoor, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 230 = *grossus*.
laciniatus, Nees & Ehrenb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 723 = *maritimus*.
laciniatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia laciniata*.
lacustris, Linn. Sp. Pl. 48.—Cosmop.
laetevirens, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 103 = *Eleocharis atropurpurea*.
lanatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 104 (= *Isolepis lanata*).—Am. austr.
laniferus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 768 (*Bulbostylis* sp.).—Afr. trop.
lappaceus, Lam. Illustr. i. 139 = *Cyperus aristatus*.
lateralis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 15 = *supinus*.
lateralis, Retz. Obs. iv. 11 = *erectus*?
lateriflorus, J. F. Gmel. Syst. 127 = *praec.*?
latifolius, Bertol. in Bologn. Opusc. Sc. iii. (1819) 406 = *Pleurostachys tenuiflora*.
latifolius, Gilib. Exercit. ii. 515 = *sylvaticus*.
lavarum, Poir. Encyc. vi. 783 = *Cladium iridifolium*.
Lawianus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 497 = *Fimbristylis digitata*.
laxifolius, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 435 = *Eleocharis variegata*.
laxus, Poir. Encyc. Suppl. v. 101 = *Fimbristylis diphylla*.
Lejeunei, Weihe, in Flora, xi. (1828) 116 = *triqueter*.
lemburgensis, Schult. Mant. ii. 85, sphalm. = *limburgensis*.
lenticularis, Poir. Encyc. Suppl. v. 103; Spreng. Syst. i. 208.—Austral.; N. Zel.
lenticularis, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 328 = *sylvaticus*.
leptaleus, Koch, in Syll. Ratisb. i. (1824) 8 = *cernuus*.
leptocarpus, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 109 = *Lipocarpa microcephala*.
leptolepis, Chapm. Fl. S. U. St. 520.—Am. bor.
leptopus, Boeck. in Flora, xli. (1858) 414 = *asper*.
leptos, Wright, in Sauv. Fl. Cuba, 176 = *nanus*.
leptostachys, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 485.—Afr. austr.
Lereschii, Thom. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 853 = *Eleocharis atropurpurea*.
leucostachys, Poir. Encyc. Suppl. v. 104 (= *Isolepis leucostachya*).—Am. trop.
Lichtensteinianus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 745 = *Fimbristylis Lichtensteiniana*.
limburgensis, Lej. Fl. Spa, ii. 289 = *Eleocharis palustris*.
limosus, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2069 = *Eleocharis limosa*.
lineatus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 32.—Am. bor.
lineatus, Muhl. Desc. Gram. 45 = *divaricatus*.
lineolatus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 545 = *erectus*.
lithospermus, Linn. Sp. Pl. 51 = *Scleria lithosperma*.
lithospermus, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in Mlang. (1811), nomen.—Madag.
lithuanicus, Bess. ex Schult. Mant. ii. 535 = *lacustris*.
littoralis, Fluegge, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 74 = *rufus*.
littoralis, Schrad. Fl. Germ. i. 142. t. 5. f. 7.—Europ.; Asia; Aegypt.
longebracteatus, Salz. ex Reichb. in Flora, xiii. (1830) 497 = *S. Holoschoenus*.
longifolius, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 49 = *pungens*.
longifolius, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 = *Hypolytrum longifolium*.
Lorentzii, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 378 (*Bulbostylis* sp.).—Reg. Argent.
lucidus, Less. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 168 = *maritimus*.
Ludwigii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 486.—Afr. austr.
lupulinus, Spreng. Fl. Hal. Mant. 30 = *Mariscus glomeratus*.
luteus, Gilib. Exercit. ii. 513 = *caespitosus*.
luzonensis, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 193 = *erectus*.
Luzulae, Linn. Syst. ed. X. 868 = *Cyperus Luzulae*.

SCIRPUS:—

- luzulinus*, Reichb. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 211 (= *Isolepis junciformis*).—Am. trop.
Lyallii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 297 = *corymbosus*.
macer, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 503.—Madag.
macranthus, Boeck. in Flora, xli. (1858) 415 = *leptolepis*.
macrophyllus, Bess. ex Schult. Mant. ii. 535, in obs. = *lacustris*.
macrostachys, Lam. Illustr. i. 142 = *maritimus*.
macrostachys, Willd. Enum. Hort. Berol. 78 = *praec.*
macrostylis, Spreng. Syst. i. 208 = *Rynchospora pterocarpa*.
maculosus, Vahl, Enum. ii. 247 = *Eleocharis maculosa*.
madagascariensis, Boeck. in Bremen, Abh. vii. (1880) 37 = *supinus*.
margaritifera, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 697 = *Schoenus apogon*.
marginatus, Muhl. Desc. Gram. 28 = *Eleocharis mutata*.
marginatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia filiformis*.
maritimus, Linn. Sp. Pl. 51.—Cosmop.
Martii, Dufour, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 117 = *Cladium germanicum*.
mauritanicus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 84 = *mucronatus*.
maximus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 231 = *grossus*.
medius, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 75 = *lacustris*.
medius, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 216 = *Eleocharis fistulosa*.
megapotamicus, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 4 = *Rynchospora luzuliformis*.
megastachys, Steud. Syn. Pl. Cyp. 87 = *maritimus*.
melanocarpus, Baldw. ex Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 311 = *Eleocharis melanocarpa*.
melanocarpus, Griseb. Cat. Pl. Cub. 239 = *Eleocharis pachystyla*.
melanocephalus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 311 = *Eleocharis albibracteata*.
melanorrhizus, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 504 = *pungens*.
melanospermus, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. i. (1831) 199 = *supinus*.
melanospermus, Salz. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 78 = *Eleocharis ocreata*.
melanostachys, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 600 = *Eleocharis macrorhiza*.
melas, Kunze, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 169 = *pungens*.
membranaceus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia membranacea*.
Meyenii, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 75 = *lacustris*.
Meyeri, Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 121, in textu = *pumilus*.
Michauxii, Pers. Syn. i. 68 = *Fimbristylis autumnalis*.
Michelianus, Linn. Sp. Pl. 52.—Europ.; Afr. bor.; Asia.
Michelianus, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 19 = *Cyperus pygmaeus*.
micranthus, Vahl, Enum. ii. 254.—Am. bor. et austr.
microcarpus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 195 = *sylvaticus*.
microlepis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 239 = *Eleocharis minima*.
miliaceus, Linn. Syst. ed. X. 868 = *Fimbristylis quadrangularis*?
miliaceus, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 231 = *Fimbristylis diphylla*.
miliaceus, Thunb. Fl. Jap. 37 = *Fimbristylis ferruginea*.
Minaeae, Todaro, Rar. Pl. Sic. Decad. i; in Atti Acc. Sc. Palermo, N. S. i. (1845) 15 = *cernuus*.
minus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 49 = *cernuus*.
minus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 55 = *micranthus*.
minus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 219 = *Fimbristylis dipsacea*.
minus, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 195 = *antarcticus*.
minus, Vahl, Enum. ii. 253 = *Fimbristylis barbata*.
minus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 268 = *S. Isolepis*.
mitratus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 544 = *Eleocharis palustris*?
mitratus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 570 (*Eleocharis* sp.).—Am. trop.

5 P

SCIRPUS:—

- modestus*, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 311 = *cernuus*.
mollis, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 227 = *Rynchospora mollis*.
monander, Rottb. Desc. Nov. Pl. 50 = *Fimbristylis argentea*.
monander, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 222 (= *Isolepis barbata*).—Geront. trop.
monander, Willd. Sp. Pl. i. 311 = *Lipocarpa sphacelata*.
monophyllus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 193 = *pungens*.
monostachyos, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 219 = *Fimbristylis schoenoides*.
montanus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 226 = *Eleocharis montana*.
Moseleyanus, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 262.—Ins. Nightingale.
mucronatus, Host, Gram. Austr. iii. 44 = *triqueter*.
mucronatus, Linn. Sp. Pl. 50 = Geront.
mucronatus, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 44 = *maritimus*.
mucronatus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 23 = *pungens*.
mucronatus, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 219 = *supinus*.
mucronulatus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 31 = *Fimbristylis autumnalis*.
Muehlenbergianus, Schult. Mant. ii. 74 = *Eleocharis Muehlenbergianus*.
Muehlenbergii, Spreng. Syst. i. 207 = *Fimbristylis barbata*.
multicaulis, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 96 = *Eleocharis ovata*.
multicaulis, Sm. Fl. Brit. i. 48 = *Eleocharis palustris*.
multicaulis, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 146 = *Eleocharis tenuis montana*.
multicostatus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 298 = *costatus*.
muricatus, Poir. Encyc. vi. 765 = *Rynchospora cypoides*.
muscosus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 224, nomen.—N. Zel.
mutatus, Linn. Syst. ed. X. 867 = *Eleocharis mutata*.
muticus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 41 = *mucronatus*.
mysurensis, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3467 = *mucronatus*.
nanus, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 311 = *inundatus*.
nanus, Poir. Encyc. vi. 759 = *Fimbristylis argentea*.
nanus, Spreng. Pugill. i. 4.—Europ.; Aegypt.; Am. bor. et centr.
natans, Boj. Hort. Maurit. 333 = *supinus*.
natans, Griseb. Cat. Pl. Cub. 238.—Cuba.
natans, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 194 = *riverialis*.
natans, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *tenuissimus*.
Neesii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 504.—Afr. austr.
nervosus, Boeck. l. c. 484.—Abyss.
nevadensis, S. Wats. in Bot. King's Exp. 360.—Am. bor.
nigrescens, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 91 = *Eleocharis nigrescens*.
nigricans, Poir. Encyc. Suppl. v. 104; Spreng. Syst. i. 212 = *inundatus*.
nigricans, Steud. Nom. ed. II. ii. 540 = *Schoenus nigricans*.
niloticus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 33 = *Fimbristylis miliacea*.
niloticus, J. F. Gmel. Syst. 126 = *Fimbristylis dichotoma*.
nindensis, Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1881) 27.—Afr. trop.
nitens, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 696 = *Schoenus nitens*.
nitens, Vahl, Enum. ii. 272 = *Rynchospora nitens*.
nitidulus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 232 = *Fimbristylis diphylla*.
nobilis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 159 = *maritimus*.
nodosus, Rottb. Desc. Nov. Pl. 52; Progr. 24.—Reg. austr. temp.
nodulosus, Roth, Nov. Pl. Sp. 29 = *Eleocharis nodulosa*.
nubigenus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 554 = *acaulis*.
nudipes, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 312 = *cernuus*.
nudissimus, Steud. & Jardin, in Bull. Soc. Linn. Normand. Sér. II. ix. (1875) 278, 280 = *Eleocharis palustris*.

SCIRPUS:—

- nudus*, Rafin. Atl. Journ. 18 (Quid?).—Am. bor.
numidianus, Vahl, Enum. ii. 254 = *cernuus*.
nutans, Retz. Obs. iv. 12 = *Fimbristylis nutans*.
obtus-trigonus, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 80 = *Eleocharis mutata*.
obtusifolius, Heyne, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 239 = *Fimbristylis junciformis*.
obtusifolius, Lam. Illustr. i. 141 = *Fimbristylis obtusifolia*.
obtusus, Willd. Enum. Hort. Berol. 76 = *Eleocharis ovata*.
ochreatus, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 535 = *Eleocharis ochreata*.
oliganthus, Steud. in Flora, xii. (1829) 146 = *Ficinia filiformis*.
oligostachyus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 743.—Abyss.
Oliveri, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 260 = *Thouarsianus*.
Olneyi, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 238.—Am. bor.
Onaei, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 544 = *Eleocharis tetraquetra*.
orgyalis, Rafin. Ann. Nat. 16 = *lacustris*.
ovatus, Gilib. Exercit. ii. 512 = *Eleocharis palustris*.
ovatus, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 11. 562 = *Eleocharis ovata*.
pachystylus, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 174 (*Eleocharidis* sp.).—Cuba.
pallascens, Boeck. ex Hemsl. Bot. Challenger, i. 11. 158 = *Thouarsianus*.
pallascens, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 229 = *Fimbristylis dichotoma*.
pallascens, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 237 = *Fimbristylis ferruginea*.
pallascens, Willd. ex Link, Hort. Berol. i. 292 = *Fimbristylis diphylla*.
palmaris, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 150 = *Eleocharis ochreata*.
paludicola, Kunth, l. c. 163.—Afr. austr.
palustris, Linn. Sp. Pl. 47 = *Eleocharis palustris*.
panormitanus, Parl. Fl. Ital. ii. 99 = *S. Holoschoenus*.
paradoxus, Boeck. in Kjöeb. Vidensk. Meddel. (1869) 136; et in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 739.—Bras.
Parlatoris, Bivona f. Piant. Ined. 2; et in Parl. Fl. Ital. ii. 96 = *S. Holoschoenus*.
parviflorus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis diphylla*.
parviflorus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 230 = *Fimbristylis miliacea*.
parvulus, Roem. & Schult. Syst. ii. 124 = *nanus*.
pauciflorus, Lightf. Fl. Scot. ii. 1078.—Europ.; Asia.
pauciflorus, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis pauciflora*.
pauciflorus, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352, nomen (Quid?).—Am. bor.
pectinatus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 218 = *littoralis*.
pendulus, Muhl. Desc. Gram. 44 = *lineatus*.
pentagonus, Roxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 218 = *Fimbristylis quinqueangularis*.
perpusillus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 496.—Chili.
petasatus, Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) 1. 64 = *Eleocharis tetraquetra*.
phaeocarpus, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 312.—Chili.
Philippi, Tineo, Pl. Rar. Sicil. 36 = *littoralis*.
pictus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 503 = *cernuus*?
pileatus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 110 = *Eleocharis palustris*.
pilosus, Retz. Obs. vi. 19 = *Fuirena glomerata*.
pilosus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18.—Afr. austr.
planiculmis, F. Schmidt, Reisen Amurl. 190 = *erectus*.
planifolius, Muhl. Desc. Gram. 32.—Am. bor.
plantagineus, Retz. Obs. v. 14 = *Eleocharis plantaginea*.
plantagineus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 212 = *Fimbristylis quinqueangularis*.
plantagineus, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 123 = *Eleocharis interstincta*.
plantaginoides, Rottb. Desc. Nov. Pl. 45 = *Eleocharis plantaginea*.
plicarhachis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 239 = *Eleocharis variegata*.

SCIRPUS:—

- plumosus*, R. Br. Prod. 223; Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 559 = *littoralis*.
pollicaris, Delile, Fl. Acg. Illustr. 50 = *nanus*.
Pollichii, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 374 = *triqueter*.
polycoleus, De Not. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 326 = *supinus*.
polymorphus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 60 = *S. Holoschoenus*.
polymorphus, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 74 (*Eleocharidis* sp.).—Bras.
polyphyllus, Vahl, Enum. ii. 274.—Am. bor.
polystachyus, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 108.—Austral.
polytrichoides, Retz. Obs. iv. 11 = *Fimbristylis polytrichoides*.
praelongatus, Poir. Encyc. vi. 764 = *articulatus*.
Preslii, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 175 = *mucronatus*.
prolifer, Rottb. Desc. Nov. Pl. 55; Progr. 25.—Afr. austr.; Austral.
prolifer, Thou. Fl. Tristan d'Acugn. 36. t. 7 = *Thouarsianus*.
prolifero-ramosus, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 261 = *Thouarsianus*.
propinqua, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis squarrosa*.
Pseudo-schoenus, Steud. in Flora, xii. (1829) 147 = *Ficinia tristachya*.
Pseudo-triqueter, Steud. Syn. Pl. Cyp. 86 = *riparius*.
pterigosperma, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis pterigosperma*.
Pterolepis, Kunth, Enum. Pl. ii. 166 = *littoralis*.
puberulus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 31 = *Fimbristylis diphylla*.
puberulus, Poir. Encyc. vi. 767 (= *Isolepis puberula*).—Madag.
pubescens, Lam. Illustr. i. 139 = *Fuirena pubescens*.
pubescens, Pers. Syn. i. 68; Link, Jahrb. i. III. (1820) 80 = *Fimbristylis diphylla*.
pubigerus, Bernh. ex Link, Hort. Berol. i. 239 = *Fimbristylis diphylla*.
pulchellus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 698.—Afr. austr.
pulcher, Rudge, Pl. Gui. 18. t. 23 = *Hypolytrum pungens*.
Pumilio, Spreng. Syst. i. 204 = *Eleocharis pusilla*.
pumilus, Vahl, Enum. ii. 243.—Reg. bor.
pumilus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 191 = *cernuus*.
punctatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis punctata*.
punctatus, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 93 = *Eleocharis nana*.
pungens, Poir. Encyc. Suppl. v. 102 = *Hypolytrum pungens*.
pungens, Vahl, Enum. ii. 255.—Europ.; Am.
pungens, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 164 = *lacustris*.
purpureo-ater, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 379 (*Fimbristylidis* sp.).—Abyss.
pusillus, Hrb. Lucae, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 141 = *Eleocharis acicularis*.
pusillus, Poir. Encyc. Suppl. v. 103 = *Eleocharis pusilla*.
pusillus, Vahl, Enum. ii. 246 = *nanus*?
pusillus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 143 = *Eleocharis intermedia*.
pynostachys, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 129 = *Lipocarpa Humboldtiana*.
pygmaeus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 392 = *cernuus*.
pygmaeus, Lam. Illustr. i. 139 = *Eleocharis Chaetaria*.
quadrangularis, Thou. ex Cat. Hort. Maurit. (1822) 4 = *Fimbristylis miliacea*?
quadrangulatus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 30 = *Eleocharis mutata*.
quadrangulus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 40 (sp. dub.).—Nepal.
quadriflorus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 761 (*Fimbristylidis* sp.).—Bras.
quinqueangularis, Vahl, Enum. ii. 279 = *Fimbristylis quinqueangularis*.
quinquefarius, Buch.-Ham. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 701.—Ind. or.; Afghan.
quinqueflorus, Vitm. Summa Pl. i. 150 = *pauciflorus*.
racemosus, Spreng. Syst. i. 213.—Bras.
radiatus, Steud. Nom. ed. II. ii. 541, sphalm. = *radicans*, Poir.
radiatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18 = *Ficinia radiata*.
radicans, Poir. Encyc. vi. 751 = *Eleocharis acicularis*.

SCIRPUS:—

- radicans, *Schkuhr*, in *Usteri*, Ann. Bot. iv. (1793) 49. t. 1.—Europ.
ramosus, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 377 = *fluitans*.
rarus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis rara*.
reclinatus, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 143 = *Eleocharis intermedia*.
Rehmanni, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 159 = *S. Hystrix*.
Reichenbachii, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 737 (*Bulbostylidis* sp.).—Am. trop.
remireoides, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 266.—Reg. Argent.
Renschii, Boeck. in *Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 504 (*Bulbostylidis* sp.).—Madag.
repens, Willd. ex Schult. Mant. ii. 84, in obs. = *Eleocharis capitata*.
reptans, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 = *Dichromena repens*.
reptans, Thuill. Fl. Par. ed. II. 22 = *Eleocharis palustris*.
reticulatus, Lam. Illustr. i. 142 = *polyphyllus*?
retroflexus, Poir. Encyc. vi. 753 = *Eleocharis Chaetaria*.
retrofractus, Linn. Sp. Pl. 50 = *Mariscus retrofractus*.
retusus, Koen. ex Wall. Cat. n. 3428 = *Rynchospora Wallichiana*.
rigescens, Willd. ex Schult. Mant. ii. 84, in obs. = *Fimbristylis spathacea*.
rigidus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 492.—Peruv.
rigidus, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 312 (*Fimbristylidis* sp.).—Reg. Argent.
rigidus, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. 1. 107 = *riparius*.
riparius, Pers. Syn. i. 68 = *maritimus*.
riparius, Poir. Encyc. Suppl. v. 103; Spreng. Syst. i. 208 = *cernuus*.
riparius, J. & C. Presl, *Rel. Haenk.* i. 193.—Am. austr.; Calif.
rivularis, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 504.—Afr. austr.
rivularis, Don, ex Nees, l. c. ix. (1834) 288 = *Fuirena umbellata*.
robustus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 56 = *maritimus*.
romanus, Linn. Sp. Pl. 49 = *S. Holoschoenus*.
Rosellinii, Ces. Pass. & Gibelli, *Compend. Fl. Ital.* 99 = *lacustris*.
rostellatus, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1836) 318 = *Eleocharis rostellata*.
Rothii, Hoppe, in *Sturm, Deutschl. Fl. Heft* 36 = *pungens*.
rufescens, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 138; et in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 755 (*Bulbostylidis* sp.).—Bras.
rufus, Schrad. Fl. Germ. i. 133. t. 1. f. 3.—Europ.; Asia.
ruppioides, Thw. ex Sauv. Fl. Cub. 176, in obs. = *submersus*.
salbundius, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3499 = *Fimbristylis quinquangularis*.
salinus, Schmidt, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 541 = *maritimus*.
Savii, Sebast. & Mauri, Fl. Rom. Prod. 22 = *cernuus*.
scaber, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 220 = *Fimbristylis acuminata*.
scaberrimus, Boeck. in *Flora*, xli. (1858) 595 = *grossus*.
scariosus, Roem. & Schult. Syst. ii. 61, sphalm. = *Ficinia bracteata*.
Scheuchzeri, Vitm. Summa Pl. i. 150 = *Eriophorum vaginatum*.
Schimperianus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 750 (*Bulbostylidis* sp.).—Abyss.
schoenoides, Boeck. l. c. 745 = *Fimbristylis Kunthiana*.
schoenoides, Ell. Sketch, i. 89 = *Rynchospora Elliotii*.
schoenoides, Retz. Obs. v. 14 = *Fimbristylis schoenoides*.
schoenoides, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 221 = *Fimbristylis monostachya*.
Schomburgkianus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 757 (*Rynchosporae* sp.).—Guian.
Schweinfurthianus, Boeck. l. c. 758 (*Bulbostylidis* sp.).—Afr. trop.
Sellowianus, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 138; et l. c. 748 (*Fimbristylidis* sp.).—Bras.
Sellowianus, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 312 = *Eleocharis Sellowiana*.
semisubterraneus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 495.—Peruv.

SCIRPUS:—

- senegalensis*, Lam. Illustr. i. 140 = *Lipocarpa argentea sepium*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. i. 78 = *pauciflorus*.
sericeus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis sericea*.
serrulatus, Vahl, Eclog. Am. iii. 1 = *Fimbristylis diphylla*.
sesquipollicaris, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 203 = *micranthus*.
setaceus, Linn. Mant. ii. 321 = *cernuus*.
setaceus, Linn. Sp. Pl. 49, partim.—Austral.; Asia; Europ.
setaceus, Thnbn. Prod. Pl. Cap. 17 = *antarcticus*.
setifolius, Boeck. in *Flora*, lxii. (1879) 160 (*Bulbostylidis* sp.).—Paraguay.
simplex, Ell. Sketch, i. 76 = *Eleocharis tortilis*.
sinensis, Kunth, Enum. Pl. ii. 202, in syn. = *squarrosus*.
Smithii, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 563 = *erectus*.
soloniensis, Dubois, Meth. ed. II. 249 = *Eleocharis ovata*.
spadiceus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 493.—Ind. occ. et Afr. trop.
spadiceus, Linn. Sp. Pl. 51 = *Fimbristylis spadicea*.
spadiceus, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 80 = *Schoenus nitens*.
Sparmanni, Lam. Illustr. i. 140 = *Ficinia sylvatica*.
spathaceus, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 759.—Afr. austr.
spathaceus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 32 = *Dulichium spathaceum*.
speciosus, Salisb. Prod. 31 = *Eriophorum angustifolium*.
sphacelatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 102; Spreng. Syst. i. 204 = *Eleocharis sphacelata*.
sphaerocarpus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 741 (*Bulbostylidis* sp.).—Afr. trop.
sphaerocephalus, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 137; et in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 748 (*Bulbostylidis* sp.).—Bras.
sphaerolepis, Boeck. ll. cc. 140; 766 (*Bulbostylidis* sp.).—Bras.
spiralis, Bosc. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 145 = *Eleocharis tortilis*.
spiralis, Rottb. Desc. Nov. Pl. 42 = *Eleocharis spiralis*.
spiralis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 153 = *Eleocharis plantaginea*.
spiraloides, Roxb. Hort. Beng. [81], nomen = *Eleocharis fistulosa*.
squammosus, Link, Jahrb. i. III. (1820) 79 = *squarrosus*.
squarrosulus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 88 = *maritimus*.
squarrosus, Linn. Mant. ii. 181.—Afr.; Asia.
squarrosus, Poir. Encyc. Suppl. v. 100 = *Fimbristylis squarrosa*.
squarrosus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 28 = *Thouarsianus*.
stans, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 14.—Ind. occ.
stenophyllus, Ell. Sketch, i. 83 (*Bulbostylidis* sp.).—Am. bor.
sterilis, Salzmann ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 118 = *Fimbristylis spadicea*.
Steudneri, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 733.—Abyss.
stolonifer, Roth, in *Usteri*, Ann. Bot. x. (1794) 36 = *fluitans*.
stramineus, Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 269.—Am. bor.
striatulus, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 266 = *Eleocharis bonariensis*.
strictus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis diphylla*.
strictus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 226 = *Fimbristylis spathacea*.
strobiliferus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 317 = *maritimus*.
strobilinus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 219 = *maritimus*.
stygius, Ferber, ex Fleischer, Syst. Verz. Ostsee-Prov. Bek. Gew. Phan. (1830) (Lithogr.) 120 = *Juncus stygius*.
subaphyllus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 705 = *subcapitatus*.
subappendiculatus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 84 = *pungens*.
subarticulatus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 215 = *articulatus*.
subcapitatus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 351.—Ind. or.; Sumatra; China.
subcucullatus, Berggren, Ny-Zeel. Fanerog. 12. t. 5. f. 16-20 = *aucklandicus*.
subdistichus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 490 = *natans*.

SCIRPUS:—

- submersus*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 175.—Am. trop.; Zeylan.
subprolifer, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 492 = *cernuus*.
subquadriflorus, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 139 = *quadriflorus*.
subsquarrosus, Muhl. Desc. Gram. 39 = *micranthus*.
subterminalis, Torr. Fl. U. St. 47.—Am. bor.
subulatus, Vahl, Enum. ii. 268 = *littoralis*.
sulcatus, Ell. Sketch, i. 56 = *Fimbristylis diphylla*.
sulcatus, Roth, Nov. Pl. Sp. 30 = *Eleocharis Rothiana*.
sulcatus, Thou. Fl. Tristan d'Acugn. 36. t. 7.—Ins. Trist. da Cunha.
sulciculmis, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. 1. 103 = *Eleocharis atropurpurea*.
sundanensis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 304 = *mucronatus*.
supinus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 700, partim = *erectus*.
supinus, Linn. Sp. Pl. 49.—Reg. temp.
swampianus, Bosc. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 168 = *maritimus*.
sylvaticus, Linn. Sp. Pl. 49.—Europ.; Am. bor.
sylvaticus, Vahl, Enum. ii. 271, partim = *radicans*.
Tabernaemontani, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 101 = *lacustris*.
Tabernaemontani, Salzmann ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 702 = *littoralis*.
Tatora, Kunth, Enum. Pl. ii. 166 = *riparius*.
tegetalis, Burch. Trav. i. 260, in nota = *spathaceus*.
tenellus, Link, Jahrb. i. III. (1820) 80 = *Fimbristylis tenella*.
tenellus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 224 = *Fimbristylis tenera*.
tener, Spreng. Syst. i. 204 = *Eleocharis gracilis*.
tenerrimus, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. 1. 94 = *Eleocharis minima*.
tenuiculus, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 74 = *Eleocharis sulcata*.
tenuifolius, DC. Fl. Fr. Suppl. 300 = *pungens*.
tenuifolius, Rudge, Pl. Gui. 18. t. 22 = *Fimbristylis capillaris*.
tenuis, Schreb. ex Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. 12 = *Eleocharis palustris*.
tenuis, Spreng. in *Flora*, xii. (1829) 1. Beil. 12.—Afr. austr.
tenuis, Willd. Enum. Hort. Berol. 76 = *Eleocharis tenuis*.
tenuispicatus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 740 (*Bulbostylidis* sp.).—Mexic.
tenuissimus, Boeck. l. c. 481.—Afr. austr.
tereticulmis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 85 = *riparius*.
ternatanus, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 307 = *chinensis*.
tetragonus, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis tetragona*.
tetragonus, Poir. Encyc. vi. 767 = *Fimbristylis miliacea*.
tetraqueter, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 434 = *Eleocharis tetraquetra*.
thermalis, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1051 = *semisubterraneus*.
Thouarsi, Roem. & Schult. Syst. ii. 134 (*Bulbostylidis* sp.).—Madag.?
Thouarsianus, Schult. Mant. ii. 84.—Ins. Trist. da Cunha.
Thuarsii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 27 = *sulcatus*.
Thunbergii, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 719 = *S. Holoschoenus*.
Thunbergii, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 4.—Afr. austr.
Thwaitesii, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 380 (*Fimbristylidis* sp.).—Ind. or.
thyrsiflorus, Willd. Enum. Hort. Berol. 78 = *S. Eriophorum*.
timorensis, Kunth, Enum. Pl. ii. 162 = *erectus*.
tomentosus, Poir. Encyc. Suppl. v. 101 = *Fimbristylis diphylla*.
Torreyi, Olney, in *Proc. Franklin Soc. Providence*, i. (1847) 32; et ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 499.—Am. bor.
tortilis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 144 = *Eleocharis tortilis*.
tranquebariensis, Roth, Catalect. iii. 6 = *Fimbristylis ferruginea*.
translucens, Le Gall, ex Lloyd, Fl. Loire-Inf. 275; et in *Congr. Sc. Fr.* xvi. i. (1850) 146 = *nanus*.
trialatus, Boeck. in *Flora*, xli. (1859) 445 = *Cyperus turgidulus*.

SCIRPUS:—

- triangularis*, Steud. Nom. ed. I. 752 = *pungens*.
triangulatus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 217 = *mucronatus*.
tricarinatus, Pers. Syn. i. 68 = *mucronatus*.
trichobasis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 298.—Madag.
trichodes, Muhl. Desc. Gram. 30 = *Eleocharis acicularis*.
trichoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 225 = *Eleocharis trichoides*.
trichophyllus, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 224 = *Fimbristylis Vahl.*
tridentatus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 225 = *maritimus*.
triflorus, Poir. Encyc. ii. 249 = *Rynchospora triflora*.
trigonus, Nolte, Novit. Fl. Holsat. 9 = *lacustris*.
trigonus, Roth, Neue Beytr. i. 90 = *triqueter*.
trigynus, Linn. Mant. ii. 180 = *Ficinia scariosa*.
triqueter, R. Br. Prod. 223 = *pungens*.
triqueter, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 373 = *littoralis*.
triqueter, Linn. Mant. i. 29.—Europ.; Austral.
triqueter, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 153 = *Olneyi*.
trispicatus, Linn. f. Suppl. 103 = *Ficinia sylvatica*.
trispicatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia membranacea*.
tristachyos, Boj. Hort. Maurit. 333 (= *Isolepis barbata*).—Geront. trop.
tristachyos, Rothb. Desc. Nov. Pl. 48; Progr. 25 = *Ficinia tristachya*.
tristachyos, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 221 = *Fimbristylis ferruginea*.
tristachyos, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 254 = *Ficinia Bergiana*.
tristachyos, Zoll. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 96 = *supinus*.
truncatus, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 254 = *Ficinia lateralis*.
truncatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia truncata*.
tuberculatus, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 145 = *Eleocharis tortilis*.
tuberculatus, Ell. Sketch. i. 78 = *Eleocharis tuberculata*.
tuberculosis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 30 = *Eleocharis tuberculosa*.
tuberosus, Desf. Fl. Atlant. i. 50 = *maritimus*.
tuberosus, Roxb. Hort. Beng. 6; Pl. Corom. iii. 25. t. 231 = *Eleocharis tuberosa*.
tumidus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 212 = *Eleocharis plantaginea*.
turgidus, Pers. Syn. i. 66 = *Eleocharis ovata*.
turgidus, Thuill. Fl. Par. ed. II. 22 = *lacustris*.
typhinus, Rafin. Atl. Journ. 18 (Quid?).—Am. bor.
uliginosus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 520 = *lacustris*.
uliginosus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 620 = *Eleocharis acicularis*.
umbellaris, Lam. Illustr. i. 141 = *Fimbristylis globulosa*.
umbellatus, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in Mélang. (1811), nomen (Quid?).—Madag.
umbellatus, Roxb. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 294 = *Rynchospora aurea*.
uncinatus, Willd. Sp. Pl. i. 300 = *Fuirena uncinata*.
uniflorus, Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 120 = *pumilus*.
uniglumis, Link. Jahrb. i. III. (1820) 77 = *Eleocharis palustris*.
uninodis, Boiss. Fl. Orient. v. 380, in syn. = *supinus*.
Urvillei, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 510 = *inundatus*.
vaginatus, Salisb. Prod. 31 = *Eriophorum vaginatum*.
vaginatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia bulbosa*.
Vahl., Lam. Illustr. i. 139 = *Fimbristylis Vahl.*
Vahl., Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 85 = *Mariscus filiformis*.
validus, Benth. Pl. Hartw. 27 = *riparius*.
validus, Vahl, Enum. ii. 268 = *lacustris*.
variabilis, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis diphylla*.
varians, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 698 = *inundatus*.
variegatus, Poir. Encyc. vi. 749 = *Eleocharis variegata*.
varius, Schreb. ex Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. 11 = *Eleocharis palustris*.
velatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis squarrosa*.

SCIRPUS:—

- venustus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 479.—Afr. austr.
verrucosulus, Steud. in Flora, xii. (1829) 145.—Afr. austr.
vestitus, Reichb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 753 = *Fimbristylis vestita*.
villosus, Poir. Encyc. vi. 780 = *Fimbristylis diphylla*.
virens, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 261 = *Thouarsianus*.
viscosus, Lam. Illustr. i. 142 = *Cyperus elegans*.
viviparus, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 93 = *Eleocharis tenuissima*.
vulgaris, [Mazzari], in Ionios Anthol. ii. (1834) 460 = *maritimus*.
Wallichianus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 27 = *Fimbristylis Wallichiana*.
Wallichii, Nees, in Wight, Contrib. 112 = *erectus*.
Wallrothii, Bernh. in Flora, viii. (1825) 607 = *rufus*.
Warmingii, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 136; et in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 744 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.
Wichurii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 729 = *Eriophorum cyperinum*.
Wightianus, Boeck. l. c. 765 (*Fimbristylis* sp.).—As. et Afr. trop.
Willemetii, Steud. Nom. ed. I. 752.—Ins. Maurit.
Wolfgangii, Bess. ex Schult. Mant. ii. 536 = *lacustris*.
Wolfii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 77 (*Eleocharis* sp.).—Am. bor.
Xyridis, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis Xyridis*.
yokoscensis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 543 = *nanus*.
Zeyheri, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 752 (*Bulbostylis* sp.).—Afr. austr.

SCIRRHOPHORUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1. 188 = SKIRRHOPHORUS, DC. = **Angianthus**, Wendl. (Compos.).

SCIURIS, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 150, 153 = **Galipea**, Aubl. (Rutac.).
aromatica, Vahl, Enum. i. 101 = *G. aromatica*.
bracteata, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 156 = *G. bracteata*.
corymbosa, Spreng. Syst. i. 38 = *G. trifoliata*.
multiflora, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 155 = *G. multiflora*.
odoratissima, D. Dietr. Syn. Pl. i. 100 = *Cusparia odoratissima*.
simplicifolia, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 157 = *G. simplicifolia*.
simplicifolia, Spreng. Syst. i. 39 = *Cusparia macrophylla*.
trifoliata, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 155 = *G. trifoliata*.

SCIURIS, Schreb. Gen. i. 24 (1789) = **Raputia**, Aubl. (Rutac.).
aromatica, J. F. Gmel. Syst. 49 = *R. aromatica*.
Ossana, Nees & Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 542 = *R. Ossana*.

SCIURUS, D. Dietr. Syn. Pl. i. 32, 100 (1839), sphalm. = *præc.*

SCIZANTHUS, Pers. Syn. ii. 161 (1807), sphalm. = **Schizanthus**, Ruiz & Pav. (Solan.).

SCKUHRIA, Moench, Meth. 566 (1794) = **Siegesbeckia**, Linn. (Compos.).
dichotoma, Moench, l. c. = *Siegesbeckia flosculosa*.

SCLAERANTHUS, Thunb. Prod. Pl. Cap. 80 (1794) err. tpy. = **Scleranthus**, Linn. (Illecebr.).

SCLARAEA, Steud. Nom. ed. I. 752 (1821) = seq.

SCLAREA, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752) = **Salvia**, Tourn. (Labi.).
Aethiops, Mill. l. c. ed. VIII. n. 2 = *Salvia Aethiops*.
argentea, Mill. l. c. n. 15 = *Salvia argentea*.
ceratophylla, Mill. l. c. n. 8 = *Salvia ceratophylla*.
decidua, Moench, Meth. 375 = *Salvia Verbenaca*.
distans, Moench, l. c. = *Salvia austriaca*.
glutinosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11 = *Salvia glutinosa*.
indica, Mill. l. c. n. 9 = *Salvia indica*.

SCLAREA:—

- lanata*, Moench, Meth. 374 = *Salvia Aethiops*.
lusitanica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *Salvia lusitanica*.
mexicana, Mill. l. c. n. 14 = *Salvia mexicana*.
nemorosa, Mill. l. c. n. 6 = *Salvia sylvestris*.
orientalis, Mill. l. c. n. 10 = *Salvia rosaefolia*.
pratensis, Mill. l. c. n. 4 = *Salvia pratensis*.
punctata, Moench, Meth. 374 = *Salvia sylvestris*.
spinosa, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 = *Salvia spinosa*.
sylvestris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *Salvia sylvestris*.
syriaca, Mill. l. c. n. 5 = *Salvia sylvestris*.
tingitana, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 = *Salvia foetida*.
tomentosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 13 = *Salvia canariensis*.
triloba, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 = *Salvia triloba*.
tuberosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 = *Salvia pratensis*.
viscosissima, Moench, Meth. 376 = *Salvia pyrenaica*.
vulgaris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *Salvia Sclarea*.

SCLEPSION, Rafin. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vii. (1857) 355 = **Laportea**, Gaudich. (Urtic.).
divaricatum, Rafin. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 78 = *L. canadensis*.

SCLERACHNE, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 15. t. 4 (1838). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1113.
punctata, R. Br. l. c. 15.—Java.

SCLERACHNE, Torr. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1845) 273 = **Thurberia**, Benth. (Gramin.).
arkansana, Torr. ex Trin. l. c. 274 = *T. arkansana*.
cyathopoda, F. Muell. Fragm. viii. 116 = *Chionachne cyathopoda*.
pilosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1845) 275 = *T. arkansana*.

SCLERANTHUS, Linn. Syst. ed. I (1735). **ILLECEBRACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 19.

DITOCA, Banks & Soland. ex Gaertn. Fruct. ii. 196. t. 126 (1791).

KNABEL, Adans. Fam. ii. 506 (1763).

MNIARUM, Forst. Char. Gen. 1. t. 1 (1776).

abyssinicus, *adsurgens*, *aquidulens*, *anisodus*, *argillophilus*, *arrectifolius*, *Aschersoni*, *banaticus*, *bigeninus*, *Bilimeckii*, *brachyphyllus*, *byzantinus*, *cancellatus*, *canescens*, *capitulatus*, *caudiger*, *comatus*, *condensatus*, *conocephalus*, *corymbulosus*, *crinitus*, *crispatus*, *Decandollii*, *densifolius*, *densiramaeus*, *diander*, *dicanrifolius*, *diffusus*, *dirnsteinensis*, *dissitiflorus*, *Drogeanus*, *echinophorus*, *Falkii*, *fasciculifolius*, *Fenzlii*, *flicaulis*, *filiferriaculis*, *floribundus*, *foliosus*, *Friedrichthalii*, *Fritzscheanus*, *fuscus*, *gemmaulosus*, *glomerifer*, *griseus*, *Haepi*, *hamulatus*, *Haslingeri*, *Hasskarlii*, *Hausmanni*, *Heldreichii*, *Herbichii*, *heterogeneus*, *Heufleri*, *Hoemeanus*, *Hohenackeri*, *holanthus*, *horridus*, *humilis*, *Janii*, *Kessneri*, *Kittelii*, *Kohlianus*, *Kotschyanus*, *laricifolius*, *laxus*, *lepidus*, *leptodus*, *leucoloma*, *longidens*, *longisetus*, *macilentus*, *macrocephalus*, *macronemus*, *Medusellus*, *micranthus*, *microcephalus*, *microdus*, *mollis*, *myrianthus*, *myriocarpus*, *nivemontanus*, *orthocarpus*, *orthoxys*, *oxystephanus*, *paradoxus*, *picturatus*, *pictus*, *pityophilus*, *pleiotomus*, *polyclados*, *porphyrocaulis*, *Poscharskyi*, *procerus*, *Pseudopolycarpus*, *pycnocarpus*, *Reichardtii*, *remotiflorus*, *repens*, *retroperulatus*, *riparius*, *Rochelii*, *Schimperi*, *Schottii*, *Schroederi*, *scoparius*, *Sekerae*, *semiglaber*, *Serpentini*, *setifer*, *spergulfolius*, *squarrosus*, *stenoloma*, *stipatus*, *striatipes*, *sulcifer*, *Tabernaemontani*, *tenuis*, *tortuosus*, *valgus*, *variflexus*, *verticillifer*, *Wilkommii*, *Wollmari*, *Reichb.* in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 114-115 (Quid?).—Europ.
aetnensis, Strobl. l. c. xxiv. (1874) 148 = *perennis*.
anisochaitos, *bjelagoranus*, *curvibracteatus*, *erlmagellus*, *jastrebianus*, *micromeroides*, *montenegrinus*, *Pantocsekii*, *polychaitos*, *seticeps*, *subuncinatus*, *uncinellus*, *unculatus*, *unguiculatus*, *venustus*, *Reichb.* ex Pant. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 25-26 (Quid?).—Europ.
annuus, Linn. Sp. Pl. 406.—Europ.; As. temp.

SCLERANTHUS:—

- arenarius*, Schnr. Enum. Pl. Transs. 224 = perennis.
ascrivensis, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen.—Europ.
attenuatus, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) ii. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.
Augustae, *Carthusianorum*, *chersonensis*, *cinereus*, *crispatus*, *debilis*, *decipiens*, *dumosus*, *gypsophilanthus*, *hyssopifolius*, *inflexus*, *Johannis*, *leiphaemus*, *leucocarpus*, *leucococcus*, *madonius*, *marginellus*, *moenchiaeformis*, *myosotoides*, *obscurus*, *oligoconus*, *pelviger*, *polybotrys*, *profusus*, *sanctus*, *Seladonius*, *setibracteatus*, *sordidus*, *Sprengelii*, *stenodus*, *subspathaceus*, *suprafastigiatus*, *tenellus*, *tenuicaulis*, *tenuifolius*, *Theodori*, *vagans*, Reichb. ex Hoeme, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 143-148. (Quid ?).—Europ.
biennis, Reut. in Compt. Rend. Soc. Haller. (1853-54) 20 = annuus.
biflorus, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 74.—N. Zel.; Austral.
borborygius, Reichb. ex Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 55 = annuus.
brachycarpus, *brachyodon*, *Follioti*, *implicatus*, *leucoperos*, *longirameus*, *longiramoseus*, *obsoletus*, *Petronellae*, *serpyllaceus*, *stenoleucus*, Reichb. ex Wiesbauer, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 152-154 (Quid ?).—Europ.
brumalis, *clemmontanus*, *compactus*, *concinus*, *Durandoi*, *expansus*, *Havranus*, *Holubyi*, *Knažicanus*, *laevigatus*, *leptochaetos*, *leucocarpus*, *paganus*, *rusticus*, *serotinus*, *soroanus*, *Tauscheri*, Reichb. ex Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 55-57 (Quid ?).—Europ.
campestris, Schur, Enum. Pl. Transs. 224 = annuus.
caniceps, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) ii. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.
cattaroneus, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen = *ascrivensis*.
celtiniensis, Reichb. l. c.—Europ.
chaitophyllus, *Cumani*, *cymulosus*, *engadineus*, *graniiti*, *insignis*, *intricatus*, *juveneus*, *modestus*, *ptyocarpus*, *sparsiflorus*, *spectabilis*, *subcrinitus*, *verecundus*, *Warnstorfi*, Reichb. ex Hausskn. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 127-129 (Quid ?).—Europ.
cinereus, Reichb. ex Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 55 = annuus.
collinus, Hormung, ex Opiz, Natural. x. (1825) 232 = verticillatus.
collinus, Schur, Enum. Pl. Transs. 224 = annuus.
comosus, Dum. Fl. Belg. 23 = annuus.
corrigioleflorus, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = perennis.
Csetzii, Reichb. in Oestr. Bot. Zeit. xxii. (1872) 115 = uncinatus.
curvibracteatus, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen (Quid ?).—Europ.
Delorti, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 205, 206 = verticillatus.
Delorti, Sauzé & Maill. Cat. Deux-Sèvres, 30 = S. Pseudopolycarpus.
diander, R. Br. Prod. 412.—Austral.
dichotomus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 10 = perennis.
echinulifer, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 114 = annuus.
divaricatus, Dum. Fl. Belg. Prod. 23 = verticillatus.
fallax, Boenn. Prod. Fl. Monast. 123 = perennis.
fasciculatus, Hook. f. Fl. Tasman. i. 42 = biflorus.
fastigiatus, Hochst. in Flora, viii. (1825) 536 = perennis.
ferrugineus, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = annuus.
Fussii, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = uncinatus.
gracilidens, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) ii. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.
glomeratus, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = verticillatus vel annuus.
gypsophilanthus, Reichb. l. c. = perennis.
hamosus, Ponz. Fl. Gard. i. 371. t. 3 = uncinatus.
Haynaldi, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = uncinatus.
hirsutus, J. & C. Presl, Delic. Prag. 66 = perennis.
intermedius, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 565 = perennis.
intermedius, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = annuus.
Jankei, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = uncinatus.

SCLERANTHUS:—

- Lindemanni*, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) ii. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.
marginatus, Guss. Fl. Sic. Prod. 486 = perennis.
marginellus, Reichb. ex Hausskn. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 129 = annuus.
Martini, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 206 = uncinatus.
microdichodon, Reichb. ex Tauscher, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 323 = dichotomus.
mnarioides, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 13.—Austral.
neglectus, Rochel, ex Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 345; et in Pl. Banat. Rar. 35. t. 3. f. 10 = perennis.
Noëanus, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = perennis.
Orsinii, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen (Quid ?).—Europ.
perennis, Linn. Sp. Pl. 406.—Europ.
polycarpus, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 206 = uncinatus.
polycarpus, DC. ex Nym. Consp. 257 = verticillatus.
polycarpus, Linn. Cent. Pl. 216; Amoen. Acad. iv. 313 = verticillatus.
polynemoides, Willk. & Costa, in Linnaea, xxx. (1859-60) 98.—Hispan.
praecox, Wallr. ex Hoeme, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 144 = verticillatus.
Pseudopolycarpus, *Lacroix*, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 558.—Europ.
Pseudovercillatus, Reichb. ex Pant. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 26 = verticillatus.
pungens, R. Br. Prod. 412.—Austral.
Reichenbachii, Tauscher, ex Hoeme, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 145, nomen (Quid ?).—Hungar.
rodmanus, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = uncinatus.
tauricus, Presl, ex Nym. l. c. = annuus.
tenuissimus, Reichb. ex Nym. l. c. = verticillatus.
umagellus, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen (Quid ?).—Europ.
uncinatus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1850) 107; ii. (1851) 10.—Europ. austr.
verticillatus, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 205, 206 = S. Pseudopolycarpus.
verticillatus, Tausch, in Flora, xii. (1829) i. Erg. 50.—Europ.; As. Min.
Visianii, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen.—Europ.

SCLERIA, Berg. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxvi. (1765) 142. tt. 4, 5. *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1070.

- ANERMA*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 170 (1847).
CHONDROLOMIA, Nees, l. c. 173 (1847).
CRYPTOPodium, Schrad. ex Nees, l. c. 180 (1847).
CYLINDROPUS, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303; et in Edinb. N. Phil. Journ. xv. (Oct. 1834) 266.
DIAPHORA, Lour. Fl. Cochinch. 578 (1790).
DIPLAGRUM, R. Br. Prod. 241 (1810).
DIPLOSCYPHUS, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1850) 262.
HYMENOLYTRUM, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 174. t. 22 (1842).
HYPOPORUM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.
MACROLOMIA, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 181. t. 24 (1847).
MASTIGOSCLERIA, Nees, l. c. 177 (1847).
OMOSCLERIA, Nees, l. c. 180 (1847).
OPHRIDIUM, Schrad. ex Nees, l. c. 183 (1847).
OPHRYSCLERIA, Nees, l. c. 182. t. 25 (1847).
SCHIZOLEPIS, Schrad. ex Nees, l. c. 186. t. 26 (1847).
SPHAEROPUS, Boeck. in Flora, lvi. (1873) 89.
TRACHYLOMIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 174 (1847).
abortiva, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 302.—Madag.
acanthocarpa, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 154.—Bras.
adamantina, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = *Lagenocarpus adamantinus*.
affinis, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 542 = *pratensis*.
africana, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1071.—Afr. trop.
alata, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = *hebecarpa*.
albionigra, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 371.—Bras. alta, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 485.—Ind. or.
anceps, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 257.—Mexic.
androgyna, Nees, in Wight, Contrib. 117.—Ind. or.
angusta, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.—Afr. austr.

SCLERIA:—

- angustata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 542, sphalm. = *prae*.
annularis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 176.—Ind. or.; China.
approximata, Hassk. in Hoev. & De Vries, Tijdschr. x. (1843) 118 = *sumatrensis*.
arguta, Steud. Syn. Pl. Cyp. 172.—Bras.
arundinacea, Kunth, Enum. Pl. ii. 347.—Am. trop.
aspera, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 482 = S. Radula.
asperata, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = *pratensis*.
asperrima, Steud. Syn. Pl. Cyp. 170.—Nicaragua.
atropurpurea, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-80) 29.—Bras.
atrosanguinea, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 175 = *bulbifer*.
auricoma, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 549 (Quid ?).—Am. bor.
Baldwinii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 175.—Am. bor.
bancana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 602.—Malaya.
Barteri, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 504.—Afr. trop.
Bertolonii, Martens, in Flora, xl. (1857) 570 = *oryzoides*.
biflora, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 573 = *tesse-lata*.
Boivini, Steud. Syn. Pl. Cyp. 173.—Madag.
Bourgeau, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 29.—Mexic.
bracteata, Cav. Ic. v. 34. t. 457.—Am. austr.
Brekiana, Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 491.—Bras.
Brownii, Kunth, Enum. Pl. ii. 349.—Austral.
bulbifera, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 510.—Abyss.
caespitosa, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 167.—Afr. trop.
campestris, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = *Cryptangium campestre*.
canaliculato-triquetra, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 573.—Afr. trop.
capillaris, R. Br. Prod. 240 = *lithosperma*.
capitata, Willd. Sp. Pl. iv. 319 (*Pteroscleriac* sp.).—Guian.
caricina, Benth. Fl. Austral. vii. 426.—As. et Austral. trop.
caroliniana, Willd. Sp. Pl. iv. 318 = *pauciflora*.
cenchroides, Kunth, Enum. Pl. ii. 352 = *hirtella*.
cervina, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 171.—Afr. trop.
ceylanica, Kunth, Enum. Pl. ii. 358 = *zeylanica*.
chinesica, Kunth, Enum. Pl. ii. 357.—As. et Austral. trop.
chlorantha, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 506.—Ins. S. Doming.
ciliaris, Nees, in Wight, Contrib. 117 = *chinensis*.
ciliata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 167.—Am. bor.; Ind. occ.
ciliolata, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 31 = *racemosa*.
cincta, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = *Rhynchospora tenuis*.
clathrata, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 510.—Abyss.
communis, Kunth, Enum. Pl. ii. 340 = *pratensis*.
comosa, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171.—Bras.
complanata, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 571.—Afr. trop.
composita, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 444.—Bras.
conspersa, Sellow, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 179 = *pterota*?
coriacea, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 259.—Costa Rica.
corymbifera, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 537 = *androgyna*.
corymbosa, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 574 = *androgyna*.
cyanocarpa, Kunth, Enum. Pl. ii. 347 = *sylvestris*.
cymosa, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 155, 158.—Bras.
cyperina, Kunth, Enum. Pl. ii. 345.—Guian.
debilis, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 186 = *hemitaphra*.
densifolia, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = *Cryptangium Minarum*.
depauperata, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 118.—Polynes.
dictyocarpa, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 249 = *Torreyana*.
Dietrichiae, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 121 = *hebecarpa*.

SCLERIA :—

- diffusa*, Michx. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 359 = verticillata.
Dillonia, Boeck. in Flora, lxi. (1878) 38 = foliosa.
dioica, Leconte, ex Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 229 = Baldwinii.
discolor, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 541. — Bras.
distans, R. Br. Prod. 240 = Brownei.
distans, Poir. Encyc. vii. 4. — Ind. occ.
diurensis, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 573. — Afr. trop.
divaricata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303. — Am. trop.
Doederleiniana, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 512 = scrobiculata.
Dregana, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Afr. austr.
dumicola, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 169. — Afr. austr.
elata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 353. — As. trop.
elata, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 186. — Cuba.
Elliotii, Chapm. Fl. S. U. St. 531 = ciliata.
elongata, F. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 202. — Mexic.
erythrorrhiza, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 167. — Afr. trop.
exaltata, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 511 = hebecarpa.
fasciculata, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 301 = Rynchospora Cephalotes.
fenestrata, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 549 = tessellata.
filiformis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = lithosperma.
Flagellum, Poir. Encyc. vii. 1, sphalm. = S. Flagellum-nigrorum.
flaccida, Steud. Syn. Pl. Cyp. 174 = triglomerata.
flagellata, Sw. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 506 = pterota.
Flagellum, Benth. in Hook. Niger Fl. 555 = ovuligera.
Flagellum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 578 = reflexa.
Flagellum, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 88 = seq.
Flagellum-nigrorum, Berg. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxvi. (1765) 144. t. 4. — Am. trop.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 233 = bracteata.
foliosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 509. — Abyss.
foliosa, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 187 = microcarpa.
foveolata, Cav. Ic. v. 35. — Panama.
foveolata, Llanos, Fragm. Fl. Filip. 103 = scrobiculata.
glandiformis, Boeck. in Flora, xli. (1858) 647. — Afr. trop.
glaucescens, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 202 = lithosperma.
Glazioviana, Boeck. in Flora, lxxv. (1882) 352. — Bras.
glomerulata, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 170. — Afr. trop.
gracilis, Ell. Sketch, ii. 557. — Am. bor.; Ind. occ.
gracilis, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 113 = lithosperma.
gracillima, Boeck. in Flora, xlii. (1879) 570. — Afr. trop.
Graeffeana, Boeck. l. c. lviii. (1875) 121 = margaritifera.
grandifolia, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 230 = arundinacea.
guahensis, Schrad. ex Boeck. l. c. xxxviii. (1874) 512 = margaritifera.
guianensis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = Lagenocarpus guianensis.
haematostachys, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 512. — Java.
Harlandi, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 248. — Ins. Hongk.
Hasskarliana, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 511 = elata, Thw.
hebecarpa, Nees, in Wight, Contrib. 117. — As. et Austral. trop.
hemitaphra, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169. — Am. bor.; Ind. occ.
Hildebrandtii, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 454. — Afr. trop.
Hilsenbergii, Ridl. in Journ. Bot. xxii. (1884) 16. — Madag.
hirsuta, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 489. — Java.
hirsuta, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 103 = junciformis, Thw.
hirta, Boeck. in Flora, lxxv. (1882) 29. — Mexic.
hirta, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 352 = hirtella.
hirtella, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 439 = melanotricha, distans.

SCLERIA :—

- hirtella*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 168 = ciliata.
hirtella, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19. — Afr. et Am. trop.
hispidula, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 511. — Abyss.
holcoides, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Afr. austr.
homonyma, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179 = scabruscula.
Hookeriana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 498. — Ind. or.
Hostmanniana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium leptocladum.
humilis, Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 235 = hirtella.
humilis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium humile.
hypoxis, Schweinf. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 465 = Schimperiana.
interrupta, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 168 = hirtella.
interrupta, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 112. — Guian.
interrupta, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 544 = hispidula.
japonica, Stend. Syn. Pl. Cyp. 169 = hebecarpa.
Jelskiana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 469 = Torreyana.
junciformis, Kunth, Enum. Pl. ii. 356 = Cryptangium junciforme.
junciformis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 354. — Zeylan.
junciformis, Welw. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 163. — Afr. trop.
Junghuhniana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 499. — Java.
Kappleriana, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 172 = arundinacea.
Kunthiana, Steud. l. c. 176 = verticillata, Muhl.
Kunthii, Miq. Sert. Exot. 4. t. 2 = Cryptangium leptocladum.
lacustris, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 185. — Cuba.
laevis, Willd. Sp. Pl. iv. 13 = levis.
lagoënsis, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 151. — Am. trop.
lateriflora, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 455 = ceylanica.
latifolia, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 103 = oryzoides.
latifolia, Nees, in Flora, xi. (1828) 303 = Sieberi.
latifolia, Reichb. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. r. 183 = mitis.
latifolia, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = pratensis, pterota.
latifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18. — Am. trop.
laxa, R. Br. Prod. 240. — Austral.
laxa, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 376 = Torreyana.
leptocladia, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 355 = Cryptangium leptocladum.
leptoculmis, Wood, Class Book (1861), 746 = oligantha.
leptostachya, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Bras.
levis, Retz. Obs. iv. 13. — As. trop.
Liebmanni, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179. — Am. trop.
lithosperma, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 574 = elata, Thw.
lithosperma, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18. — Amphig. trop.
longifolia, Boeck. in Flora, lxxv. (1882) 30. — Madag.
lucida, Stend. Syn. Pl. Cyp. 168 = mitis.
luzulaeformis, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 188 = Liebmanni.
mackaviensis, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 119. — Austral.
macrantha, Boeck. l. c. xli. (1858) 647 = ciliata.
macrantha, Boeck. l. c. lxii. (1879) 572 = melanomphala.
macrocarpa, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 183 = racemosa.
macrocarpa, Salzm. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 521 = paludosa.
macrocarpa, Wall. Cat. n. 3538 = Scirpodendron costatum.
macrophylla, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 200 = bancana.
macrosperma, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 344 = racemosa.
madagascariensis, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 514. — Madag.
major, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = androgyna.

SCLERIA :—

- malaccensis*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 507 = bancana.
margaritifera, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = pratensis.
margaritifera, Willd. Sp. Pl. iv. 312. — Austral.; Polynes.
Martii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171. — Am. trop.
Mechowiana, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 510. — Afr. trop.
melaleuca, Reichb. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 29. — Am. trop.
melanocephala, Drège, Zwei Pfl. Docum. 147, sphalm. = seq.
melanomphala, Kunth, Enum. Pl. ii. 345. — Afr. austr. et trop.
melanosperma, Nees & Arn. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 515 = hebecarpa.
melanostoma, Boeck. l. c. 514 = hebecarpa.
melanotricha, Hochst. & A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 511. — Abyss.
melicoides, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853) 127. — N. Granat.
mexicana, Boeck. l. c. xxxviii. (1874) 500. — Mexic.
Meyeriana, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Afr. anstr.
Michauxii, Chapm. Fl. S. U. St. 522 = hirtella.
micrantha, Poir. Encyc. Suppl. v. 108 = hemitaphra.
microcarpa, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 302. — Am. trop.
micrococca, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179. — Nicaragua.
microdiscus, Steud. l. c. 175 = Rynchospora Berteroana.
microstachya, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 454. — Bras.
Minarum, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium Minarum.
minutiflora, Rich. ex Spreng. Syst. iii. 831 = Rynchospora micrantha.
mitis, Berg. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxvii. (1765) 145. t. 5. — Am. austral.
mollis, Kunth, Enum. Pl. ii. 352 = hirtella.
Moritziana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 460. — Venezuela.
mncronata, Poir. Encyc. vii. 3. — Ind. or.
Muehlenbergii, Steud. Nom. ed. II. ii. 543; Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 474 = Torreyana.
Muehlenbergiana, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Selsk. Skr. ii. (1851) 258 = hemitaphra.
multifoliata, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 510. — Malaya.
muricata, Boeck. l. c. 540. — Am. trop.
myricocarpa, Kunth, Enum. Pl. ii. 347. — Bras.
myriocarpa, Steud. Syn. Pl. Cyp. 172, sphalm. = praec.
Naumanniana, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 94. — Afr. trop.
Neesiana, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 229 = scrobiculata.
Neesii, Kunth, Enum. Pl. ii. 358. — Zeylan.; Borneo.
nervosa, Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1827) 75. — Ins. Guadal.
nigricans, F. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 201. — N. Granat.
nitida, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 350 = triglomerata.
notoptera, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303 = Pteroscleria guianensis.
Novae-Hollandiae, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 120 = laxa.
nutans, Kunth, Enum. Pl. ii. 351 = hirtella.
Oakesiana, Robbins, ex Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 234 = pauciflora.
oligantha, Michx. Fl. Am. Bor. ii. 167. — Am. bor.
olyroides, Kunth, Enum. Pl. ii. 348. — Bras.
Onoei, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 549. — Japon.
oryzoides, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 492 = seq.
oryzoides, F. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 201. — Geront. trop.
Ottomii, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 490. — Cuba.
ovuligera, Nees, l. c. ix. (1834) 303. — Afr. trop.
ovuligera, Reichb. ex Nees, l. c. = microcarpa.
pallidiflora, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 119 = Brownei.
palmifolia, Hoffmgg. & Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 492 = paludosa.

SCLERIA :—

- paludosa, Kunth, Enum. Pl. ii. 344.—Am. trop.
 panicoides, Kunth, l. c. 348.—Am. trop.
 papillata, Willd. ex Kunth, l. c. 345 = bracteata.
 parvula, Steud. Syn. Pl. Cyp. 174 = tessellata.
 pauciflora, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 318.—Am. bor.
 pauciflora, Sauv. Fl. Cub. 183 = gracilis.
 pergracilis, Kunth, Enum. Pl. ii. 354.—Geront. trop.
 phyllomacra, Steud. Syn. Pl. Cyp. 173.—Hab. ?
 phylloptera, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 248.—Cuba.
 pilosa, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 473 = junciformis, Thw.
 pleostachya, Kunth, Enum. Pl. ii. 355.—Bras.
 Ploemii, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 513.—Java.
 plusiophylla, Steud. Syn. Pl. Cyp. 172.—Bras.
 poaeiformis, Retz. Obs. iv. 13.—Ind. or.
 poeoides, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 170.—Afr. trop.
 Poeppigii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171.—Am. trop.
 polycarpa, Boeck. in Linnaea, xxviii. (1874) 509 = margarifera.
 polyphylla, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium polyphyllum.
 porphyrorhiza, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 188.—Cuba.
 praealta, Salzm. ex Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 461 = mitis.
 pratensis, Lindl. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 121.—Am. trop.
 propinqua, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169 = tessellata.
 pterota, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268.—Ind. occ.
 pubescens, Steud. Syn. Pl. Cyp. 168.—Ins. Hongkong.
 pulchella, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 168.—Afr. trop.
 purpurascens, Benth. Fl. Hongk. 400 = Harlandi.
 purpurascens, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169 = sumatrensis.
 purpurea, Poir. Encyc. vii. 4 = lithosperma.
 purpureo-vaginata, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 513.—Ins. Philipp.
 purpureo-zonata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 258 = oligantha.
 pygmaea, R. Br. Prod. 240.—Anstral.
 pygmaea, Nees, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 313 = Rynchospira micrantha.
 pyramidalis, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 171 = Martii.
 racemosa, Boj. Hort. Maurit. 385 = Sieberi.
 racemosa, Poir. Encyc. vii. 6.—Madag.
 Radula, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 232.—China.
 reflexa, Benth. in Hook. Niger Fl. 555 = Barteri.
 reflexa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 232.—Am. trop.
 remota, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 169.—Afr. trop.
 Renggeriana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 173 = reflexa.
 reticularis, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 167.—Am. bor.
 reticularis, Muhl. Desc. Gram. 266 = Torreyana.
 reticularis, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 202 = hemitaphra.
 rigida, Kunth, Enum. Pl. ii. 355 = Lagenocarpus rigidus.
 riparia, Poepp. & Kunth, ex Kunth, l. c. 341.—Peruv.
 rugosa, R. Br. Prod. 240.—Austral.
 Rutenbergiana, Boeck. in Bremen, Abh. vii. (1880) 40.—Madag.
 salebrosa, Spreng. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 438 = pergracilis.
 scabra, Willd. Sp. Pl. iv. 315.—Venezuela.
 scabriuscula, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 544.—Mexic.
 Schiedeana, Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 489.—Mexic.
 Schiedeana, Schlecht. l. c. 494 = scabriuscula.
 Schimperiana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 466.—Abyss.
 Schweinfurthiana, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 570.—Afr. trop.
 scindens, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303 = pterota.
 scrobiculata, Mor. Syst. Verz. Zoll. 98 = chinensis.
 scrobiculata, Nees & Meyen, in Wight, Contrib. 117.—China; Malaya.

SCLERIA :—

- scrobiculata, Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. ii. 61 = hebecarpa, multifoliata.
 Selloana, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 179 = pratensis.
 Sellowiana, Kunth, Enum. Pl. ii. 350.—Bras.
 setacea, Poir. Encyc. vii. 4 = hemitaphra.
 setifera, Boeck. in Flora, xli. (1855) 648 = Schoenus axillaris.
 setigera, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 575 = sumatrensis.
 setoso-asperula, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 120 = Brownei.
 setuloso-ciliata, Boeck. l. c. lxx. (1882) 30.—Am. centr.
 Sieberi, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.—Ins. Maurit.
 silvestris, Nees, in Mart. Bras. ii. 1. 188 = sylvestris.
 simplicior, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169 = pratensis.
 Sororia, Kunth, Enum. Pl. ii. 343.—Bras.
 sphacelata, F. Muell. Fragm. ix. 20.—Austral.
 spicaeformis, Benth. in Hook. Niger Fl. 556.—Afr. trop.
 Steudeliana, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 344.—Austral.
 stipularis, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 394.—Am. trop.
 Stocksiana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 474.—Ind. or.
 stricta, Kunth, Enum. Pl. ii. 355 = Cryptangium uliginosum.
 stricta, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = Neesii.
 sumatrensis, Retz. Obs. v. 19. t. 2.—Ind. or.; Malaya.
 sylvestris, Poepp. & Kunth, in Enum. Pl. ii. 346.—Am. trop.
 tenacissima, Steud. Syn. Pl. Cyp. 175.—Am. trop.
 tenella, Griseb. Cat. Pl. Cub. 249 = distans, Liebmanni.
 tenella, Kunth, Enum. Pl. ii. 353.—Guian.
 tenuiflora, Willd. ex Kunth, l. c. = verticillata.
 tenuis, Retz. Obs. iv. 13 = lithosperma.
 tessellata, Benth. Fl. Hongk. 399 = Steudeliana.
 tessellata, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 362 = scrobiculata.
 tessellata, Willd. Sp. Pl. iv. 315.—As. et Austral. trop.
 testacea, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.—Ins. Sandvic.
 Thomsoniana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 479.—Reg. Himal.
 Thwaitesiana, Boeck. l. c. 454 = zeylanica.
 timorensis, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303 = scrobiculata.
 topazina, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = Lagenocarpus topazinus.
 Torreyana, Walp. Ann. iii. 696.—Am. bor. et austr.
 tremula, Steud. Syn. Cyp. 177 = Lagenocarpus tremulus.
 trialata, Bert. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 521 = mitis.
 trialata, Poir. Encyc. vii. 6.—Madag.
 trichopoda, Wright, ex Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 232 = Torreyana.
 triglomerata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 168.—Am. bor.
 trigonocarpa, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171 = arundinacea.
 tristis, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 370.—Bras.
 tuberculata, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 540.—Am. trop.
 uliginosa, Hochst. ex Boeck. l. c. 471 = tessellata.
 ustulata, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 168.—Afr. trop.
 vaginata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179.—Am. bor.
 variegata, Steud. l. c. 176.—Bras.
 velutina, Steud. l. c. 177 = Lagenocarpus velutinus.
 verrucosa, Willd. Sp. Pl. iv. 313.—Afr. trop.
 verticillata, Muhl. ex Willd. l. c. 317.—Am. bor.
 verticillata, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 354 = tenella.
 vestita, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 482 = hebecarpa.
 virgata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 176.—Bras.
 viridifolia, Steud. l. c. 177 = Lagenocarpus Martii.
 waigiouensis, Steud. l. c. 173 = scrobiculata.
 Warmingiana, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 152.—Bras.
 Weigeltiana, Schrad. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 504 = reflexa.
 Wichurii, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 510.—Ins. Philipp.
 Wightiana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 176 = lithosperma.
 zelanica, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = levis.
 zeylanica, Poir. Encyc. vii. 3.—Ind. or.; Malaya.

SCLEROBASIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 73 = Senecio, Tourm. (Compos.).
 rigida, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 146 = Sen. rigidus.
 Sonneratii, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 74 = Sen. Sonneratii.

SCLEROCALYX, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 145 (1844). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1083.

GYMNACANTHUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 444 (1836).
 mexicanum, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 145.—Mexic.

SCLEROCARPA, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 26, sphalm. = **Sclerocarya**, Hochst. (Anacard.).

SCLEROCARPUS, Jacq. Ic. Pl. Rar. t. 176 (1782); et in Act. Helv. ix. (1787) 84. t. 2. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 364.

ALDAMA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 14 (1824).

DICHOTOMA, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 364 (1873).

africanus, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. 17. t. 176.—Afr. trop.
 dentatus, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 164.—Mexic.

discoideus, Vathe, in Linnaea, xxxix. (1875) 495.—Afr. trop.

divaricatus, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 164.—Mexic.

exiguus, Sm. in Rees, Cycl. xxxi. n. 3.—Am. bor.
 gracilis, Sm. l. c. n. 2.—Am. bor.

Kerberi, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. (1883) 183.—Mexic.

oracilis, Steud. Nom. ed. II. ii. 543, err. typ. = gracilis.

Schiedeanus, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 164.—Mexic.

uniserialis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 364.—Mexic.

SCLEROCARYA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 1. **ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 427.

SCLEROCARPA, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 26, sphalm.

Birroea, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 1.—Abyss.

caffra, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 26.—Afr. austr.

castanea, Baker, Fl. Maurit. 63.—Ins. Mascar.
 Shakua, Baker, l. c.—Ins. Mascar.

SCLEROCEPHALUS, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 12 (1843). **ILLECEBRACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 17.

arabicus, Boiss. l. c.—Afr. bor.; Arab.; Pers.
 Aucheri, Walp. Rep. v. 75 = arabicus.

SCLEROCHAETIUM, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 511 = **Tetraria**, Beauv. (Cyperac.).

angustifolium, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 762.—Afr. austr.

giganteum, Steud. Syn. Pl. Cyp. 159 = thermale.
 involucreatum, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 511.—Afr. austr.

Koenigii, Nees, ex Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 763 = Rottboellii.

Rottboellii, Nees, in Linnaea, viii. (1833) 89; ix. (1835) 302; x. (1835-36) 198.—Afr. austr.

spirale, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 761.—Afr. austr.

thermale, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 512.—Afr. austr.

SCLEROCHITON, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 27. **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1090.

ISACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 278 (1845).

Harveyanus, Nees, in DC. Prod. xi. 279.—Afr. austr.

Vogelii, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 37.—Afr. trop.

SCLEROCHLAMYS, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 76 = **Kochia**, Roth (Chenop.).
 brachyptera, F. Muell. l. c. = K. brachyptera.

SCLEROCHLOA, Beauv. Agrost. 97 (1812). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1194.

AMBYCHLOA, Link, in Linnaea, xvii. (1843) 399. *angusta*, Nees, Fl. Afr. Austr. 381.—Afr. austr. *arenaria*, Nees, l. c. 380 = *Glyceria distans*. *articulata*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 90 = *Festuca divaricata*.

Borreri, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 370 = *Glyceria Borreri*.

dichotoma, Link, Enum. Hort. Berol. i. 90 = *Cutandia maritima*.

distans, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 370 = *Glyceria distans*.

divaricata, Beauv. Agrost. 98 = *Sphenopus Gouani*. *divaricata*, Link, Hort. Berol. ii. 273 = *Festuca divaricata*.

dura, Beauv. Agrost. 98.—Europ.; Afr. bor.; Oriens. *expansa*, Link, Hort. Berol. ii. 274 = *Sphenopus Gouani*.

hemipoa, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 93 = *Festuca hemipoa*. *loliacea*, Syme, Engl. Bot. ed. III. xi. 110. t. 1759 = *Festuca loliacea*, Huds.

loliacea, J. Woods, Tourist Fl. 411 = *Desmazeria loliacea*.

maritima, Lindl. in Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 370 = *Glyceria maritima*.

maritima, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 453 = *Cutandia maritima*.

memphitica, Nym. Syll. Suppl. 74 = *Cutandia scleropoides*.

multiculmis, Syme, Engl. Bot. ed. III. xi. 103 = *Glyceria distans*.

patens, Presl, Cyp. & Gram. Sic. 45 = *Festuca rigida*. *phillistaea*, Steud. Syn. Pl. Gram. 428, sphalm. = *Cutandia phillistaea*.

poaeformis, Link, Handb. i. 69, in syn. = *Poa violacea*.

procumbens, Beauv. Agrost. 98 = *Glyceria procumbens*. *pumila*, Steud. Syn. Pl. Gram. 428, sphalm. (= *Scleropoa pumila*).—Arab.

rigida, Beauv. Agrost. 97; et ex Panz. in Denkschr. Bot. Regensb. i. ii. (1818) 180 = *Festuca rigida*.

rigida, Parl. Fl. Palerm. i. 213 = *Festuca hemipoa*. *vestita*, De Not. Ind. Sem. Hort. Genuen (1847).—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 326 = *Festuca dichotoma*.

Zwierleinii, Lojac. in Natural. Sicil. iv. (1885) 138.—Sicil.

SCLEROCHLOA, Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 23. t. 58 (1834) = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).

SCLEROCHORTON, Boiss. Fl. Orient. ii. 968 (1872). *UMBELLIFERAE*.

Haussknechtii, Boiss. l. c.—Persia. *juncum*, Boiss. l. c. 969.—Graecia.

SCLEROCLADUS, Rafin. Sylva Tellur. 35 (1838) = **Bumelia**, Sw. (Sapot.). *tenax*, Rafin. l. c. = *B. tenax*.

SCLEROCOCCUS, Bartl. Ord. 210 (1830) = **Hedyotis**, Linn. (Rubiace.).

angustifolius, Bartl. ex DC. Prod. iv. 436 = *H. angustifolia*.

ferrugineus, Bartl. ex DC. l. c. (= *Metabolos ferrugineus*).—Ins. Philipp.

laevigatus, Bartl. ex DC. l. c. = *H. laevigata*. *lineatus*, Bartl. ex DC. l. c. 435 = *H. vestita*.

radicans, Bartl. ex DC. l. c. = *H. radicans*.

SCLEROCROTON, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 85 = **Excoecaria**, Linn. (Euphorb.).

ellipticus, Hochst. l. c.—Afr. austr. *integerrimus*, Hochst. l. c. = *E. reticulata*.

reticulatus, Hochst. l. c. = *E. reticulata*.

SCLEROLAENA, R. Br. Prod. 410 (1810). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 61.

Dissocarpus, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 75.

Kentropsis, Moq. Chenop. Enum. 83 (1840). *bicornis*, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral. ii. 47.—Austral.

biflora, R. Br. Prod. 410.—Austral. *coriacea*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 123 (sp. dub.).—Austral.

SCLEROLAENA:—

diacantha, Benth. Fl. Austral. v. 191.—Austral. *lanicuspis*, F. Muell. ex Benth. l. c. 195.—Austral.

paradoxa, R. Br. Prod. 410.—Austral. *uniflora*, R. Br. l. c.—Austral.

uniflora, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 72 = *Kochia ciliata*.

SCLEROLEIMA, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1847) 444. t. 14 = **Abrotanella**, Cass. (Compos.).

forsterioides, Hook. f. l. c. = *A. forsterioides*.

SCLEROLEPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 198. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 240.

verticillata, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxv. 365; xlviii. 155.—Am. bor.

SCLEROLEPIS, Monn. Ess. Hierac. 81 (1829) = **Rodigia**, Spreng. (Compos.).

Kalmii, Monn. l. c. (= *Pachylepis Kalmii*).—Am. bor.

SCLEROLOBIUM, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 395. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 562.

Cosymbe, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 163. *aureum*, Baill. Hist. Pl. ii. 90; Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. ii. 50.—Bras.

chrysophyllum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 60.—Bras.

densiflorum, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. ii. 51.—Bras.

denudatum, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 396.—Bras. *guianense*, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 237.—Guian.; Bras.

hippoboscum, Walp. Ann. ii. 441, sphalm. = seq. *hypoleucum*, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 236.—Bras.

macrophyllum, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 397 = *paniculatum*.

odoratissimum, Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. ii. 48.—Bras.

paniculatum, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 397.—Bras. *Poeppigianum*, Baill. Hist. Pl. ii. 91.—Bras.

rubiginosum, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1147; ex Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 123 = *paniculatum*.

rugosum, Mart. l. c. n. 1155; ex Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 237.—Bras.

sericeum, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 125 = *chrysophyllum*.

tinctorium, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 236.—Bras.

SCLEROMITRION, Wight & Arn. Prod. 412 (1834). **Hedyotis**, Linn. (Rubiace.).

angustifolium, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 172 = *H. tenelliflora*.

approximatum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 137 = *H. tenelliflora*.

caespitosum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 540 = *H. pinifolia*.

capitatum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 186 = *H. moncephala*, Miq.

coronarium, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 136 = *H. coronaria*.

crassifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 185 = *H. crassifolia*. *hispidum*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 155 = *H. hispida*.

nitidum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 137 = *H. nitida*.

paradoxum, Kurz, l. c. = *H. paradoxa*. *pauciflorum*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 187 = *H. pauciflora*.

rigidum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 136 = *H. pinifolia*.

rugosum, Kurz, l. c. 137 = *H. rugosa*. *sinense*, Miq. in Journ. Bot. Neerl. i. (1861) 108.—China.

tenelliflorum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 155 = *H. tenelliflora*.

tetrandrum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 136 = *H. macrophylla*.

tetraquetrum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 186 = *H. tenelliflora*.

SCLEROMPHALOS, Griff. Notul. iv. 96; Ic. Asiat. Pl. t. 414, f. 1 (1854) = **Withania**, Pauq. (Solan.).

SCLERONEMA, Benth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 109 = **Catostemma**, Benth. (Malvac.).

Spruceana, Benth. l. c.—Bras.

SCLERONEMA, Brongn. & Gris, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ii. (1864) 166 = **Xeronema**, Brongn. (Liliac.).

Moorii, Brongn. & Gris, l. c. 167 = *X. Moorei*.

SCLEROOLAENA, Baill. in Adansonia, x. (1872) 236. *CHLAENACEAE*.

XYLOOLAENA, Baill. Dict. ii. 2, in obs. (1879). *Richardi*, Baill. Hist. Pl. iv. 224, in nota.—Madag.

SCLEROON, Benth. in Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 65 = **Petitia**, Jacq. (Verben.).

oleinum, Lindl. l. c. = *P. oleina*.

SCLEROPHYLAX, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 18. *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 912.

STERRHYMENIA, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 230.

Arnottii, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 20.—Reg. Argent.

Cynocrambe, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 268.—Reg. Argent.

Gillesii, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 21.—Reg. Argent.

Lorentzianus, O. Hoffm. in Linnaea, xliii. (1880–82) 136.—Reg. Argent.

spinescens, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 19.—Reg. Argent.

SCLEROPHYLLUM, Gaud. Fl. Helv. v. 47 (1829) = **Phaeasium**, Cass. (Compos.).

pulchrum, Gaud. l. c. 48 = *P. lampsanoides*.

SCLEROPPOA, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 431 (1844) = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).

caspica, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 409 = *Cutandia scleropoides*.

dichotoma, Parl. Fl. Ital. i. 471 = *F. dichotoma*. *divaricata*, Parl. l. c. 470; C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 409 = *F. divaricata*.

hemipoa, Parl. l. c. 472 = *F. hemipoa*. *loliacea*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 557 = *Desmazeria loliacea*.

maritima, Parl. Fl. Ital. i. 468 = *Cutandia maritima*. *memphitica*, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 62 = *Cutandia scleropoides*.

phillistaea, Boiss. l. c. 60 = *Cutandia phillistaea*. *procumbens*, Parl. Fl. Ital. i. 474 = *Glyceria procumbens*.

pumila, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 61.—Arab. *rigida*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 431 = *F. rigida*.

stenostachya, Boiss. Fl. Orient. v. 638.—As. Min.

SCLEROPOGON, Phil. Sert. Mendoc. ii. 47 (1871). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1177.

LESOURDIA, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 102. t. 3, 4.

brevifolius, Phil. Sert. Mendoc. ii. 48.—Chili. *Karwinskianus*, Benth. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 181 = *brevifolius*.

SCLEROPTERIS, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vii. (1839) 407 = **Cirrhaea**, Lindl. (Orchid.).

flava, Scheidw. l. c.—Bras.

SCLEROPUS, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1835). —Cf. Linnaea, xi. (1837) Litt. 89 = **Amarantus**, Linn.

amaranthoides, Schrad. ll. cc. = *A. polygonoides*. *crassipes*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 271 = *A. polygonoides*.

squamulatus, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 162.—Ins. Galapag.

urceolatus, Anderss. l. c. = *A. urceolatus*?

SCLEROPYRON, Endl. Gen. Suppl. ii. 105 (1842) = seq.

SCLEROPYRUM, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 549. *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 228.

HEYDIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818). *Wallichianum*, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 550.—Ind. or.

SCLEROSCIADIUM, Koch, in DC. Coll. Mém. v. 43 (1829); Prod. iv. 140 (1830) = *Capnophyllum*, Gaertn. (Umbell.).
humile, Koch, ex DC. Coll. Mém. v. 43. t. 2.—Marocc.
nodiflorum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 59.—Afr. bor.

SCLEROSIA, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Gui. 1098 (1843), nomen. *OCHNACEAE*.
apiculata, Klotzsch, l. c.—Guian.

SCLEROSPERMA, G. Mann & H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 427. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 919.
Manni, H. Wendl. l. c.—Afr. trop.

SCLEROSTYLIS, Blume, Bijdr. 133 (1825) = *Atalantia*, Correa (Rutac.).
amyridoides, M. Roem. Syn. Hesper. 43 = A. Roxburghiana.
Arnotiana, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 109 = A. ceylanica.
atalantioides, Wight, Ic. t. 71 = A. racemosa.
atalantioides, Wight & Arn. Prod. 93 = A. buxifolia.
buxifolia, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 326 = A. buxifolia.
ceylanica, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 109 = A. ceylanica.
Hindsii, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 327 = A. Hindsii.
lanceolata, Blume, Bijdr. 134 = *Glycosmis simplicifolia*.
macrophylla, Blume, l. c. 135 = *Glycosmis pentaphylla*?
nitida, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 249 = A. nitida.
ovalifolia, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 109 = A. racemosa.
parvifolia, Wight, Ic. in textu ad t. 71 = A. racemosa.
pentaphylla, Blume, Bijdr. 135.—Java.
racemosa, Wight, Illustr. Ind. Bot. 109 = A. racemosa.
rotundifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 46 = A. ceylanica.
Roxburghiana, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 513 = A. caudata.
Roxburghii, Wight, Ic. i. t. 72 = A. caudata.
spinosa, Blume, Bijdr. 134 (Atalantiae sp.).—Java.
timoriensis, M. Roem. Syn. Hesper. 43 = *pentaphylla*.
trifoliata, Blume, Bijdr. 134 = *Glycosmis trifoliata*.
venosa, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 327 = A. Hindsii.
zeylanica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 513 = A. ceylanica.

SCLEROTHAMNUS, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 16 (1811) = *Eutaxia*, R. Br. (Legumin.).
microphyllus, R. Br. l. c. = E. empetrifolia.

SCLEROTHECA, A. DC. in DC. Prod. vii. 356 (1839). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 548.
arborea, DC. l. c. 357.—Ins. Societ.

SCLEROTHRIX, Presl, Symb. Bot. ii. 3. t. 53 (1833). *LOASEAE*, Benth. & Hook. f. i. 803.
ANCYROSTEMMA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 65. t. 272 (1845).
fasciculata, Presl, Symb. Bot. ii. 3. t. 53.—Mexic.

SCLEXOXYLON, Bertol. in Mem. Acc. Sc. Bologn. viii. (1857) 237 (Misc. Bot. xviii. 15) (1858) = *Chrysophyllum*?, Linn. (Sapot.).
edule, Bertol. ll. cc.—Afr. trop.

SCLEXOXYLON, Steud. Nom. ed. II. ii. 544 (1841) = seq.

SCLEXOXYLUM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iii. (1809) 57; et in Enum. Hort. Berol. 249 (1809) = *Myrsine*, Linn.
canariense, Willd. l. c. 59 = M. canariensis.
Manglillo, Willd. l. c. = M. Manglilla.
melanophleum, Willd. l. c. 58 = M. melanophleas.
mite, Willd. l. c. = M. mitis.
racemosum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 803 = M. racemosa.
venulosum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iii. (1809) 58 = M. melanophleas.

VOL. II.

SCOBEDIA, Labill. ex Steud. Nom. ed. I. 753 (1821).
LABIATAE?
asperifolia, Labill. ex Steud. l. c. (Quid?).—Hab.?

SCOBIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Premna*?, Linn. (Verben.).

SCOLIOCHILUS, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 118, in obs. (1872) = *Appendicula*, Blume (Orchid.).

SCOLIOPUS, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 145. t. 22 (1856). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 832.
Bigelovii, Torr. l. c.—Calif.
Hallii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 272.—Am. bor. occ.

SCOLOBUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 259 = *Thermopsis*, R. Br. (Legumin.).

SCOLOCHLOA, Link, Hort. Berol. i. 136 (1827) = *Graphephorum*, Desv. (Gramin.).
festuacea, Link, l. c. = G. festuaceum.

SCOLOCHLOA, Mert. & Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. ed. III. i. 374, 528 = *Arundo*, Tourn. (Gramin.).
arundinacea, Mert. & Koch, l. c. 530 = A. Donax.
Donax, Gaud. Fl. Helvet. i. 202 = A. Donax.
spiculosa, F. Schmidt, Reise Amurl. 201.—Reg. Amur.

SCLEROSTEMMA, Schott, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 64 (1818) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).
agreste, Schott, l. c. 67 = Scab. gramuntia.
altissimum, Schott, l. c. 82 = Scab. africana.
argenteum, Schott, l. c. 79 = Scab. ucranica.
atropurpureum, Schott, l. c. 78 = Scab. maritima.
Biebersteinianum, Schott, l. c. 75 = Scab. micrantha.
caucasicum, Schott, l. c. 84 = Scab. caucasica.
Columbarium, Schott, l. c. 64 = Scab. Columbaria.
connatum, Schott, l. c. 84 = Scab. caucasica.
isetense, Schott, l. c. 83 = Scab. isetensis.
lucidum, Schott, l. c. 66 = Scab. lucida.
pyrenaicum, Schott, l. c. 73 = Scab. pyrenaica.
rupestre, Schott, l. c. 64 = Scab. isetensis.
Scopolii, Schott, l. c. 76 = Scab. ucranica.
siculum, Schott, l. c. 74 = Scab. ucranica.

SCOLODIA, Rafin. Sylva Tellur. 128 (1838) = *Cassia*, Tourn. (Legumin.).
viminea, Rafin. l. c. = C. viminea.

SCOLODRYS, Rafin. Alsog. Am. 29 (1838) = *Quercus*, Tourn. (Cupul.).
lyrata, Rafin. l. c. = Q. lyrata.
rigida, Rafin. l. c. (Quid?).—Am. bor.

SCOLOPACIUM, Eckl. & Zeyh. Enum. 59 (1835) = *Erodium*, L'Hérit. (Geran.).
incarnatum, Eckl. & Zeyh. l. c. = E. incarnatum.

SCOLOPIA, Schreb. Gen. 335 (1789). *BIXINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 127.

ADENOGRYUS, Klotzsch, in Walp. Ann. iv. (1857) 226.

DASIANATHERA, Presl, Rel. Haenk. ii. 90. t. 66 (1831).

ERIUDAPHUS, Nees, in Eckl. & Zeyh. Enum. 271 (1835).

LIMONIA, Gaertn. Fruct. i. 278. t. 58. f. 4 (1789).

PHOBEROS, Lour. Fl. Cochinch. 317 (1790).

RHINANTHERA, Blume, Bijdr. 1121 (1826).

SCOPOLIA, Lam. Illustr. t. 860 (1798).

acuminata, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 251 = crenata.

Brownii, F. Muell. Fragm. iii. 11.—Austral.

chinensis, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 249 = crenata.

cochinchinensis, Clos, l. c. 253.—Cochinch.

coriacea, Tul. l. c. Sér. V. ix. (1868) 336.—Madag.

crassipes, Clos, l. c. Sér. IV. viii. (1857) 251 = crenata.

crenata, Clos, l. c. 250.—Ind. or.; China.

Dasyanthera, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 12.—Ins. Philipp.

elliptica, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. Suppl. 1866 (1867) 35.—As. temp. or.

foetida, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 253 = Flacourtia sumatrana.

Gaertneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 400 = Schreberi.

SCOLOPIA :—

Gerrardi, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 584.—Afr. austr.

lanceolata, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 252 = crenata.

macrophylla, Clos, l. c. 253 = rhinanthra.

Oldhamii, Hance, l. c. Sér. V. v. (1866) 206 = crenata.

Pseudo-crenata, Clos, l. c. Sér. IV. viii. (1857) 250 = crenata.

pusilla, Willd. Sp. Pl. ii. 981 = Schreberi.

rhinanthra, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 252.—Malaya.

Roxburghii, Clos, l. c. 250.—Burma; Malaya.

saeva, Hance, l. c. xviii. (1862) 217 = crenata.

Schreberi, F. F. Gmel. Syst. 793.—Zeylan.

Wightiana, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 252 = crenata.

SCOLOPOSPERMUM, Hemsli. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 144 (1881), sphalm. = SCOLOSPERMUM, Less. = *Baltimora*, Linn. (Compos.).

SCOLOSANTHUS, Vahl, Eclog. Am. i. 11. t. 10 (1796). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 107.

ANTACANTHUS, Rich. ex DC. Prod. iv. 484 (1830).

ECHINODENDRUM, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 18 (1855).

crucifer, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 67.—Cuba.

parviflorus, Wright, l. c.—Cuba.

triacanthus, DC. Prod. iv. 484 = Chomelia triacantha.

versicolor, Vahl, Eclog. Am. i. 11. t. 10.—Ind. occ.

Wrightii, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 68.—Cuba.

SCOLOSPERMA, Rafin. Sylva Tellur. 111 (1838) = *Cleome*, Linn. (Cappar.).

dendroides, Rafin. l. c. = C. dendroidea.

SCOLOSPERMUM, Less. in Linnæa, v. (1830) 152 = *Baltimora*, Linn. (Compos.).

baltimoroides, Less. l. c. t. 2. f. 19–31 = B. Scolospermum.

Fougerouxiae, DC. Prod. v. 509 = B. recta, B. Scolospermum.

SCOLYMANTHUS, Willd. ex DC. Prod. vii. 63 (1838) = *Perezia*, Lag. (Compos.).

cnicoidea, Willd. l. c. 64 = P. multiflora.

SCOLYMUS, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 237 (1737). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 504.

MYSCOLUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxv. 60 (1822).

angiospermus, Gaertn. Fruct. ii. 355. t. 157 = hispanicus.

annuus, Gerard, ex Steud. Nom. ed. I. 753 = maculatus.

congestus, Lam. Fl. Fr. ii. 116 = hispanicus.

giganteus, Roem. Hort. Turic. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 544 (Quid?).—Hab.?

grandiflorus, Desf. Fl. Atlant. ii. 240.—Afr. bor.

gymnospermus, Gaertn. Fruct. ii. 355 = maculatus.

hispanicus, Linn. Sp. Pl. 813.—Reg. Mediterr.

maculatus, Linn. l. c.—Reg. Mediterr.

paniculatus, Ucria, in Roem. Arch. i. i. (1796) 70.—Sicil.

pectinatus, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxiv. 87 = maculatus.

perennis, Gerard, ex Steud. Nom. ed. I. 753 = hispanicus.

vivax, Sauvages, ex DC. Prod. vii. 76 = hispanicus.

SCOPARIA, Linn. Syst. ed. VI. 87 (1748). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 959.

KREIDEK, Adans. Fam. ii. 225 (1763).

annua, Cham. & Schlecht. in Linnæa, vi. (1831) 375.—Mexic.

arborea, Linn. f. Suppl. 125 = Chilianthus oleaceus.

australis, Sieber, ex Cham. in Linnæa, viii. (1833) 22 = Teucrium corymbosum.

dulcis, Linn. Sp. Pl. 116.—Reg. trop.

elliptica, Cham. in Linnæa, viii. (1833) 21.—Bras.

ericacea, Cham. & Schlecht. l. c. ii. (1827) 604.—Bras.

flava, Cham. & Schlecht. l. c. 603.—Reg. Argent.

fruticosa, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 286.—Hab.?

gypsophyloides, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 394.—China.

SCOPARIA :—

multifida, G. Don, Gen. Syst. iv. 648, sphalm. = seq.
pinnatifida, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 22 = flava.
plebeia, Cham. & Schlecht. l. c. ii. (1827) 605 = flava.
procumbens, Jacq. Enum. Pl. Carib. 12 = dulcis.
ternata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 31 = dulcis.

SCOPOLA, Jacq. Obs. i. 32. t. 20 (1764) = *Scopolia*, Jacq. (Solan.).

SCOPOLIA, Adans. Fam. ii. 419 (1763) = *Ricotia*, Linn. (Crucif.).

SCOPOLIA, Forst. Char. Gen. 139. t. 70 (1776) = *Griselinia*, Forst. f. (Celastr.).
lucida, Forst. l. c. 140 = *G. lucida*.

SCOPOLIA, Jacq. Obs. i. 32. t. 20 (1764) (*Scopola*); Link, Enum. Hort. Berol. i. 178 (1821). *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 902.

ANISODUS, Link & Otto, Ic. Pl. Sel. 77. t. 35 (1824).

SCOPOLINA, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 335 (1814).

WHITLEY, D. Don, in News Lit. & Fashion, iii. 108; ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 125 (1825).

atropoides, Bercht. & Presl, Rostl. i. Solanac. 12 = *carniolica*.

Boreana, Dun. in DC. Prod. xiii. 553 = *Hyoscyamus muticus*.

carniolica, Jacq. Obs. i. 32. t. 20.—Europ.

Datura, Dun. in DC. Prod. xiii. 553 = *Hyoscyamus muticus*.

Hladnikiana, Fleischm. ex Nym. Consp. 524 = *carniolica*.

japonica, Maxim. in Bull. Acad. Péttersb. xviii. (1873) 57.—Japon.

lurida, Dun. in DC. Prod. xiii. 555.—Reg. Himal.

mutica, Dun. l. c. 552 = *Hyoscyamus muticus*.

orientalis, Dun. l. c. 554 = *Physochlaina orientalis*.

physaloides, Dun. in DC. Prod. xiii. 554.—Sibir. altaic.

praealta, Dun. l. c. = *Physochlaina praealta*.

Pseudo-physaloides, Dun. l. c. 556 = *Hyoscyamus Pseudo-physaloides*.

tangutica, Maxim. in Bull. Acad. Péttersb. xxvii. (1881) 508.—China.

trichotoma, Moench, Meth. 462 = *carniolica*.

SCOPOLIA, Lam. Illustr. t. 860 (1798), sphalm. = *Sceloparia*, Schreb. (Bixin.).

SCOPOLIA, Linn. f. Suppl. 60 (1781) = *Daphne*, Tourn. (Thymel.).

composita, Linn. f. l. c. = *D. pendula*.

involuta, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 357 = *D. involuta*.

pendula, Rafin. Fl. Tellur. iv. 106 = *D. pendula*.

SCOPOLIA, Sm. Ic. Ined. ii. t. 34 (1790) = *Toddalia*, Juss. (Rutac.).

aculeata, Sm. l. c. = *T. aculeata*.

angustifolia, Spreng. Syst. i. 779 = *T. aculeata*.

inermis, Willd. Sp. Pl. i. 1116 = *T. paniculata*.

lanceolata, Spreng. Syst. i. 779 = *T. lanceolata*.

megapotamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 91 = *T. megapotamica*.

micrantha, Blume, Bijdr. 1167 = *T. micrantha*.

micrantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 545 = *praeac.*

nitida, Willd. ex Spreng. Syst. i. 779 = *T. Willdenowii*.

paniculata, Spreng. l. c. = *T. paniculata*.

venosa, Spreng. l. c. iv. Cur. Post. 91 = *T. venosa*.

SCOPOLINA, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 335 (1814) = *Scopolia*, Jacq. (Solan.).

atropoides, Schult. l. c. 383 = *Scopolia carniolica*.

carniolica, Schur, Enum. Pl. Transs. 479 = *Scopolia carniolica*.

Hladnikiana, Frey, ex Koch, Syn. Fl. Germ. cd. II. 585 = *Scopolia carniolica*.

viridiflora, Frey, ex Koch, l. c. = *Scopolia carniolica*.

SCOPULARIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 (1834) = *Holothrix*, Rich. (Orchid.).

Burchellii, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 304 = *H. Burchellii*.

grandiflora, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 79 = *H. grandiflora*.

secunda, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 207 = *H. Scopularia*.

SCORBION, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 (1836) = *Teuerium*, Tourn. (Labiata.).

spinosum, Rafin. l. c. = *T. spinosum*.

SCORDIUM, Gilib. Fl. Lituan. i. 95 (1781); Cav. Ic. i. 19. t. 31 (1791) = *Teuerium*, Tourn. (Labiata.).

altaicum, Gilib. l. c. = *T. Scordium*.

officinale, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 443 = *T. Scordium*.

palustre, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 138 = *T. Scordium*.

scordioides, Fourr. l. c. = *T. scordioides*.

spinosum, Cav. Ic. i. 19. t. 31 = *T. spinosum*.

SCORIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = *Carya*, Nutt. (Jugland.).

alba, Rafin. l. c. = *C. alba*.

globosa, Rafin. l. c. — Am. bor.

mucronata, Rafin. l. c. = *C. sulcata*.

pyriformis, Rafin. l. c. — Am. bor.

tomentosa, Rafin. l. c. = *C. tomentosa*.

SCORIAS, Rafin. ex Endl. Gen. 1126 (1841) = *praeac.*

SCORODENDRON, Blume, Rumphia, iii. 149 (1847). *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 403.

pallens, Blume, l. c. — Ins. Timor.

SCORODOCARPUS, Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. x. (1877) 274. *OLACINEAE*.

borneensis, Becc. l. c. — Borneo.

SCORODON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160 = *Allium*, Tourn. (Liliac.).

moschatum, Fourr. l. c. = *A. moschatum*.

SCORODONIA, Adans. Fam. ii. 188 (1763) = *Teuerium*, Linn. (Labiata.).

Arduini, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 315 = *T. Arduini*.

betonicaefolia, Moench, Meth. Suppl. 133 = *T. betonicum*.

Botrys, Ser. Bull. Bot. (1830) 317 = *T. Botrys*.

cordata, Moench, Meth. 385 = *T. massiliense*.

Fontanesiana, Ser. Bull. Bot. (1830) 315 = *T. Pseudo-scorodonia*.

heteromalla, Moench, Meth. 384 = *T. Scorodonia*.

lancifolia, Moench, l. c. = *T. lancifolium*.

macrophylla, Moench, Meth. Suppl. 133 = *T. canadense*.

massiliensis, Link, Handb. i. 458 = *T. massiliense*.

Salviastrum, Link, l. c. = *T. Pseudo-scorodonia*.

sicula, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 = *T. Scorodonia*.

solitaria, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 374 = *T. Scorodonia*.

spicata, Moench, Meth. 385 = *T. byrcanicum*.

spinosa, Link, Handb. i. 458 = *T. spinosum*.

sylvestris, Link, l. c. = *T. Scorodonia*.

trivialis, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 = *T. Scorodonia*?

SCORODOSMA, Bunge, Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1846) 3; et in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1854) 309 = *Ferula*, Tourn. (Umbell.).

foetidum, Bunge, ll. cc. = *F. Assa-foetida*.

SCORODOXYLUM, Nees, in Benth. Pl. Hartw. 236. (1846) = *Ruellia*, Linn. (Acanth.).

Hartwegianum, Nees, l. c. — N. Granat.

terminale, Nees, ex Benth. Bot. Voy. Sulph. 145.—Ecuador.

SCORPAENA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 (Quid?).

SCORPIANTHES, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1838) = *Heliotropium*, Tourn. (Borag.).

lineatum, Rafin. l. c. = *H. lineatum*.

SCORPIOIDES, Gilib. Fl. Lituan. i. 20 (1781) = *Myosotis*, Linn. (Borag.).

glaber, Gilib. l. c. = *M. palustris*.

hirsutus, Gilib. l. c. = *M. intermedia*.

SCORPIOIDES, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 328 (1763) = *Scorpiurus*, Linn. (Legumin.).

muricata, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 370 = *Scorpiurus muricata*.

sulcata, Medic. l. c. = *Scorpiurus sulcata*.

vermiculata, Medic. l. c. = *Scorpiurus vermiculata*.

SCORPIURUS, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 226 (1737). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 508.

SCORPIUS, Loisel. Fl. Gall. 468 (1806).

SCORPIOIDES, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 328 (1763). *acutifolia*, Viv. Fl. Lib. Spec. 43. t. 19. f. 4 = *subvillosa*.

echinata, Lam. Encyc. i. 726 = *muricata*, *subvillosa*, *sulcata*.

echinata, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 200 = *sulcata*.

laevigata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 13. t. 718 = *muricata*.

muricata, Linn. Sp. Pl. 745.—Reg. Mediterr.

pinnata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5.—Europ. austr.

purpurea, Desf. Fl. Atlant. ii. 174.—Algeria.

subvillosa, Hochst. & Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 200 = *sulcata*.

subvillosa, Linn. Sp. Pl. 745.—Reg. Mediterr.

sulcata, Linn. l. c.—Reg. Mediterr.

sulcata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 14. t. 719 = *subvillosa*.

vermiculata, Linn. Sp. Pl. 744.—Reg. Mediterr.

scorpioides, Medic. l. c. = *C. scorpioides*.

SCORPIUS, Moench, Meth. 134 (1794) = *Genista*, Linn. (Legumin.).

anglicus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 428 = *G. anglica*.

Clusii, Moench, Meth. 134 = *G. germanica*.

falcatus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 429 = *G. falcatus*.

hispanicus, Pourr. ex Willk. & Lange, l. c. 427 = *G. hispanica*.

juniperiformis, Pourr. ex Willk. & Lange, l. c. = *G. hispanica*.

parviflorus, Pourr. ex Willk. & Lange, l. c. 425 = *G. triacanthos*.

sericeus, Pourr. ex Willk. & Lange, l. c. 426 = *G. hirsuta*.

serpyllifolius, Pourr. ex Willk. & Lange, l. c. 429 = *G. falcatus*.

spinosa, Moench, Meth. 134 = *G. germanica*.

vulgaris, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 430 = *G. Scorpius*.

SCORZONELLA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 426 = *Microseris*, D. Don (Compos.).

glauca, Nutt. l. c. = *M. leptosepala*.

laciniata, Nutt. l. c. = *M. laciniata*.

leptosepala, Nutt. l. c. = *M. leptosepala*.

nutans, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 253 = *M. nutans*.

sylvatica, Benth. Pl. Hartw. 320 = *M. sylvatica*.

SCORZONERA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 241 (1737). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 531.

ACHYROSERIS, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. (1845) 165.

FLEISCHERIA, Steud. & Hochst. ex Endl. Gen. 497 (1838).

GELASIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 33.

LASIOSPERMUM, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 34.

LASIOSPERMA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxv. 306 (1822).

PODOSPERMUM, DC. Fl. Fr. iv. 61 (1805).

acanthoclada, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 333.—Turkestan.

acaulis, Willd. Sp. Pl. iii. 1508 = *Taraxacum officinale*.

acrolasia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 378.—Turkest.; Beluchist.

acuminata, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 119.—As. Min.

africana, Poir. Encyc. Suppl. v. 114.—Afr. trop.

albicans, Cass. Notes Crit. 119.—Hispan.

albicaulis, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 40.—China.

alexandrina, Boiss. Fl. Orient. iii. 760.—Afr. bor.

alpina, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 51 = *aristata*.

alpina, Pollini, Viagg. Lag. Gard. 100 = *Candollei*.

SCORZONERA :—

ambigua, DC. Prod. vii. 126 = mollis.
ammophila, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 378.—Turkest.
ancyrifolia, DC. Prod. vii. 124 = tomentosa.
angustifolia, Asso, Syn. Stirp. Arag. 108 = graminifolia.
angustifolia, DC. Prod. vii. 120 = austriaca, Candollei.
angustifolia, Linn. Sp. Pl. 791.—Europ. austr.
angustifolia, Walld. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 128. t. 122 = villosa.
angustifolia, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 55 = humilis.
angustifolia, Wohlleb. ex Wallr. Ann. Bot. 96 = hispanica.
araneosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 62. t. 785.—Graecia.
araneosa, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 354 = mollis.
argyrea, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 26.—Caria.
aristata, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 922.—Europ. austr.
armeniaca, Boiss. Fl. Orient. iii. 760.—Armen.
aspera, Desf. in Ann. Mus. Par. i. (1802) 133. t. 9 = Hymenonema Tournefortii.
aspermia, Willd. Sp. Pl. iii. 1507 = Leontodon asperimus.
asphodeloides, Wallr. Ann. Bot. 95 = hispanica.
astrachanica, DC. Prod. vii. 118 = mollis.
Aucheri, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 92 = suberosa.
Aucheriana, DC. Prod. 125.—Mesopot.
austriaca, Balb. Misc. Alt. 24 = Candollei.
austriaca, Willd. Sp. Pl. iii. 1498.—Europ. ; As. bor.
autumnalis, Lam. Fl. Fr. ii. 82 = Leontodon autumnalis.
boetica, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 382.—Hispan.
bohémica, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i. (1791) 55 = humilis.
brevicaulis, Vahl, Symb. Bot. ii. 88 = coronopifolia.
bulbipes, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 759.—Persia.
buphthalmoides, DC. Prod. vii. 121 = Tragopogon persicus.
bupleuroides, D. Don, Prod. Fl. Nep. 162 (Quid ?)—Nepal.
caerulea, Saut. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 855 = Lactuca perennis.
caespitosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 266 = pygmaea.
calcitrapifolia, Vahl, Symb. Bot. ii. 87.—Europ.
callosa, Moris, Elench. Stirp. Sard. i. 29 = villosa.
calvescens, DC. Prod. vii. 123 = laciniata.
calyculata, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 42.—Persia.
Candollei, Vis. Fl. Dalm. ii. 106.—Dalmatia.
capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141 = Lactuca capensis.
caricifolia, Pall. Reise, iii. 756 = parviflora.
cariensis, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 24.—Caria.
cenopoleura, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 378.—Turkestan.
chondrilloides, Pourr. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1505.—Hispan.
chondrilloides, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 54.—Turkestan.
ciliata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 143 = Picridium tingitanum.
cilicica, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 94.—Cilicia.
cinerea, Boiss. l. c. Ser. I. xi. 44.—As. Min. ; Persia.
cinnata, Pall. Reise, iii. 677 = pusilla.
Clusii, Asso, Syn. Stirp. Arag. 108 = humilis.
Columnae, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825) ; Pl. Rar. 321. t. 54 = villosa.
communis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 (Quid ?)—Java.
coronopifolia, Desf. Fl. Atlant. ii. 220. t. 44.—Afr. bor.
crepioides, Poir. Encyc. vii. 25 = Sonchus crepioides.
cretica, Willd. Sp. Pl. iii. 1504.—Ins. Creta.
crispa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 234 = austriaca.
crispata, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 741 = hispanica.
crocifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 63. t. 785.—Graecia.
Cypria, Kotschy, in Unger & Kotschy, Ins. Cyp. 253 = parviflora.
dalmatica, Host, Fl. Austr. ii. 391 = villosa.
decumbens, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 386 = calcitrapifolia.
deliciosa, Guss. ex DC. Prod. vii. 118.—Sicilia.
dentata, Kit. in Linnæa, xxxii. (1863) 409 = hispanica.
denticulata, Lam. Fl. Fr. ii. 82 = hispanica.

SCORZONERA :—

dichotoma, Vahl, Symb. Bot. ii. 89 = Launaea nudicaulis.
divaricata, Auch. ex DC. Prod. vii. 125 = Aucheriana.
divaricata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 200.—Mongol.
edulis, Moench, Meth. 548 = hispanica.
elata, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 25.—As. Min.
elongata, Willd. Sp. Pl. iii. 1508 = Hymenonema Tournefortii.
ensifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 235.—Rossia ; As. bor.
ericaarpa, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 225 = hirsuta.
eriophora, DC. Prod. vii. 125.—As. Min. ; Mesopot.
eriosperma, Auch. ex DC. Prod. vii. 125 = ramosissima.
eriosperma, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 236 ; Besch. Casp. 117. n. 28.—Reg. Caucas.
eriosperma, Gouan, Illustr. 52 = hirsuta.
eriosperma, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 783 = mollis.
fasciata, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 9 = coronopifolia.
filifolia, Boiss. Fl. Orient. iii. 774.—Reg. Caucas.
fistulosa, Brot. Fl. Lusit. i. 329.—Lusitan.
floccosa, Boiss. Fl. Orient. iii. 758.—As. Min.
gagaeoides, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 95.—Beluchist.
Gebleri, Bess. ex DC. Prod. vii. 120 = austriaca.
glabra, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 11.—Reg. Ural.
glandulosa, Pourr. ex DC. Prod. vii. 183 (= Zollikofer pumila).—Hispan. ; Arab.
glastifolia, Hegetschw. Fl. Schw. ii. 157 = humilis.
glastifolia, Willd. Sp. Pl. iii. 1499 = hispanica.
glauca, Salisb. Prod. 179 = Picridium tingitanum.
graeca, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 546 = Hymenonema graecum.
graminea, Krock. Fl. Siles. ii. 11. 263 = tomentosa.
graminifolia, All. Fl. Pedem. i. 228 = aristata.
graminifolia, Auch. ex DC. Prod. vii. 121 = Tragopogon persicus.
graminifolia, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 53 = crocifolia.
graminifolia, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 263 = mollis.
graminifolia, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. I. 272 = hispanica.
graminifolia, Lag. ex DC. Prod. vii. 122 = macrocephala.
graminifolia, Linn. Sp. Pl. 791 (sp. confusa).—Sibir. ; Lusitan.
graminifolia, Portenschl. ex Vis. Fl. Dalm. ii. 107 = villosa.
graminifolia, Schur, Enum. Pl. Transs. 362 = austriaca.
graminifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 62. t. 784 = elata.
graminifolia, Tausch, ex Nym. Consp. 464 = parviflora.
grandiflora, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 457 = aristata.
halophila, Fisch. & Mey. in DC. Prod. vii. 122 = parviflora.
hemilasia, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 377.—Turkestan.
heterophylla, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 265 = mollis.
hirsuta, Linn. Mant. ii. 278.—Europ. austr.
hirsuta, Pett. ex Nym. Consp. 465 = villosa.
hispanica, Linn. Sp. Pl. 791.—Europ. austr.
hispidula, Bieb. Casp. App. 210 = Leontodon asperimus.
hispidula, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 215.—Galatia.
hispidula, Spreng. Syst. iii. 667 = Leontodon hispidulus.
Hoppeana, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 276 = aristata.
humifusa, Darracq, ex Woods, in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 120.—Hispan.
humilis, Jacq. Fl. Austr. t. 36 = austriaca.
humilis, Linn. Sp. Pl. 790.—Europ.
inaequiscapa, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 762.—Armenia.
incisa, DC. Prod. vii. 119.—Cappadoc.
intermedia, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 377 = hemilasia.
intermedia, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 387 = laciniata ?
intricata, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 9.—Persia.
ispahanica, Boiss. l. c. 7.—Persia.
Jacquiniiana, Boiss. Fl. Orient. iii. 757.—Europ. or. ; As. Min.
julia, Vest, in Flora, iii. (1820) 6 = villosa.
junceae, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 366, in syn.—Arab.

SCORZONERA :—

Kotschy, Boiss. Fl. Orient. iii. 780.—Syria ; Mesopot.
Kotschy, Boiss. l. c. 762 = mollis.
kurdica, Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II. iii. 93 = papposa.
lacera, Boiss. & Bal. l. c. v. 116.—Cilicia.
laciniata, Jacq. Fl. Austr. t. 356 = Jacquiniiana.
laciniata, Linn. Sp. Pl. 791.—Reg. Mediterr. et Caucas.
laciniata, Vahl, ex DC. Prod. vii. 123 = coronopifolia.
lanata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 237.—Graecia ; Oriens.
lanata, Schrank, Baier. Fl. ii. 306 = humilis.
lanigera, Fisch. & Mey. in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 366.—As. Min.
lanuginosa, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 9 = humilis.
lasiospora, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 118 = nervosa.
latifolia, DC. Prod. vii. 124 = nervosa.
latifolia, Vis. Fl. Dalm. ii. 106. t. 5. f. 2 = austriaca.
Lawrencii, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 124 = Microseris Forsteri.
libanotica, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 43.—Syria.
limnophila, Boiss. l. c. vii. 7.—Persia.
linarifolia, Wender. Fl. Hass. 265.—Europ.
lorea, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 263 = Jacquiniiana.
mackmeliana, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 44.—Syria.
macrocephala, DC. Prod. vii. 122.—Hispan.
macrophylla, Fisch. & Mey. in Schrenk, Enum. Pl. Nov. 39, in adnot.—Sibir.
macrorrhiza, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 32 = humilis.
macrosperma, Turcz. in DC. Prod. vii. 121.—Dahur.
Marschalliana, C. A. Mey. ex Bong. & Mey. Verz. Pfl. Saisang-Nor, 44 = stricta.
messenica, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 53. t. 30 = laciniata.
mollis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 522.—Graec. ; Oriens.
mollis, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vii. 117 = mollis.
montana, Mutel, Hist. Pl. Dauph. ii. 268 = hispanica.
multifida, Link, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 546.—Hab. ?
multiscapa, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 41.—Oriens.
muricata, Balb. Misc. 25 = laciniata.
nana, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 138.—As. Min. ; Persia.
nervosa, Lam. Fl. Fr. ii. 81 = humilis.
nervosa, Trevir. Del. Sem. Hort. Bonn. (1833).—Cf. Linnæa, x. (1836) Litt. 73.—Armen. ; Persia.
navalis, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 765.—Kurdist.
nova, Desf. ex Walp. Rep. vi. 340 = Hypochoeris glabra.
octangularis, Hort. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1506 = laciniata.
octangularis, Roth, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 546 = Jacquiniiana.
odontopleura, Boiss. Fl. Orient. iii. 766 = incisa.
orientalis, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 249 = Crepis albida.
orientalis, Linn. Syst. ed. X. 1191 = Picridium tingitanum.
ovata, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871-72) 275.—Turkest.
paniculata, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 8 = nervosa.
papposa, DC. Prod. vii. 119.—Syria ; Persia.
paradoxa, Fisch. & Mey. ex DC. l. c. = picridioides.
parviflora, Jacq. Fl. Austr. iv. 3. t. 305.—Europ. ; As. bor. et occ.
paucifida, Lam. Fl. Fr. ii. 83 = laciniata.
persepolitana, Boiss. Fl. Orient. iii. 760.—Persia.
persica, Boiss. l. c. 777 = psychrophila.
persica, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 139.—Persia.
petiolaris, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 120 = laciniata.
phaeopappa, Boiss. Fl. Orient. iii. 764 = multiscapa.
picridioides, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 6.—Persia ; Beluchist.
picroides, Linn. Sp. Pl. 792 = Picridium vulgare.
pinifolia, Gouan, Illustr. 53 = macrocephala.
pinnatifida, Lour. Fl. Cochinch. 479 = africana.
pinnatifida, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 89 = Pyrrhopappus carolinianus.
plantaginea, Gaud. Fl. Helv. v. 20 = seq.
plantaginifolia, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 27 = humilis.
plurifida, Lam. Fl. Fr. ii. 83 = calcitrapifolia.

SCORZONERA:—

- Prescottii*, Comp. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 770 = austriaca.
psychrophila, Boiss. & Haussk. ex Boiss. l. c. 777.—Persia.
pubescens, DC. Prod. vii. 122.—Sibir. altaic.
pumila, Cav. Ic. ii. 19 (= *Zollikoferia pumila*).—Hispan.; Arab.
purpurea, Linn. Sp. Pl. 791.—Europ.; As. bor.
pusilla, Pall. Reise, ii. 744.—Rossia; As. occ.
pygmaea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 61. t. 783.—Bithyn.
quitensis, Humb. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. 1. (1845) 120 (= *Achyrophora quitensis*).—Ecuador.
racemosa, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 332.—Turkest.
radians, Fisch. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) 1. Beibl. 18.—As. bor.
radiata, Fisch. ex DC. Prod. vii. 122 = praec.
radicosa, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 43.—Persia.
ramosissima, DC. Prod. vii. 125.—Persia.
resedifolia, Linn. Sp. Pl. 1198 = *Launaea chondrilloides*.
resedifolia, Retz. Obs. iii. 42 = laciniata.
rigida, Auch. ex DC. Prod. vii. 123.—As. Min.
rosea, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 127. t. 121 = purpurea.
Roylei, DC. Prod. vii. 125 = divaricata.
rumicifolia, Hort. Vindob. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 278.—Hab.?
runcinata, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 798.—Rossia.
sardoa, Moris, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 347 = villosa.
sativa, Gater. Desc. Pl. Montaub. 136 = hispanica.
scapigera, Forst. f. Prod. 91 = *Microseris Forsteri*.
scoparia, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 774 = mackmeliana.
Szowitsii, Steud. Nom. ed. II. ii. 546, in syn. = *Szowitsii*.
Seidlitzii, Boiss. Fl. Orient. iii. 775.—Armenia.
semicana, DC. Prod. vii. 119.—Assyria.
sericea, Auch. ex DC. l. c. 123.—Cappadoc.
serrulata, Viv. Fl. Lib. Spec. 49. t. 17. f. 4 = undulata, trachysperma.
sessilis, Humb. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. 1. (1845) 120 (= *Achyrophora quitensis*).—Ecuador.
stenocephala, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 6 = mollis.
Stewartii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 419.—Ind. bor. occ.
stricta, DC. Prod. vii. 122 = ensifolia.
stricta, Hornem. Hort. Hafn. ii. 750.—Reg. Cauc.; Sibir.
stylosa, Pers. Syn. ii. 361 = *Hymenonema Tournefortii*.
subaphylla, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 8.—Persia.
suberosa, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 275.—Armenia.
subulata, Lam. Fl. Fr. ii. 81 = laciniata.
sylvatica, Benth. Pl. Hartw. 388 (Index) = *Microseris sylvatica*.
syriaca, Boiss. & Blanch. Diagn. Ser. II. iii. 93 = mollis.
Szowitsii, DC. Prod. vii. 117 = mollis.
Taraxaci, Roth, Beitr. Bot. i. (1782) 120 = *Taraxacum palustre*.
taraxacifolium, Jacq. Ic. Pl. Rar. t. 160 = *Hypochoeris glabra*.
taurica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 234 = hispanica.
taurica, Janka, ex Nym. Consp. 463 = stricta.
Tenorii, Presl, Delic. Prag. 116 = laciniata.
tetuanensis, Webb, ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 551 = deliciosa.
tenuifolia, Bertol. Fl. Ital. viii. 360 = aristata.
tenuifolia, Schrad. in DC. Prod. vii. 120 = Candollei.
Thirkei, Sch. Bip. in Linnaea, xix. (1847) 314 = eriophora.
tingitana, Linn. Sp. Pl. 791 = *Picridium tingitanum*.
tomentosa, Linn. l. c. ed. II. 1112.—As. Min.
tomentosa, Pall. Reise, iii. 513 = mollis.
tomentosa, Siev. ex Ledeb. Fl. Alt. iv. 163 = stricta.
tortuosissima, Boiss. Fl. Orient. iii. 775.—Persia; Peluchist.
trachysperma, Guenther, ex Spreng. Syst. iii. 666.—Ital.
tragopogonoides, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 635.—Turkestan.
tuberosa, Pall. Reise, iii. 757.—Turkestan.
tuberosa, Walp. Rep. vi. 351, sphalm. = suberosa.

SCORZONERA:—

- turkestanica*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 333.—Turkestan.
undulata, Vahl, Symb. Bot. ii. 86 = mollis.
vaginata, Bertol. Misc. Bot. ii. 235 = lanata.
variifolia, Salisb. Prod. 179 = *Picridium vulgare*.
velutina, DC. Prod. vii. 123 = mollis.
veratrifolia, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 399.—Kurdist.
verrucosa, Boiss. Fl. Orient. iii. 764.—Cilicia.
villosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 235 = stricta.
villosa, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 97. t. 46.—Europ. austr.
virgata, DC. Prod. vii. 125 = divaricata.
SCORZONEROIDES, Moench, Meth. 549 (1794) = **Leontodon**, Linn. (Compos.).
autumnalis, Moench, l. c. = *L. autumnalis*.
SCOTANTHUS, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 172 = **Gymnopetalum**, Arn. (Cucurb.).
Porteanus, Naud. l. c. Sér. V. v. (1866) 25 = *G. quinquelobum*.
tubiflorus, Naud. l. c. Sér. IV. xvi. (1861) 173. t. 3 = *G. cochinchinense*.
Weberi, Naud. l. c. Sér. V. v. (1866) 26 = *G. Weberi*.
SCOTANUM, Adans. Fam. ii. 459 (1763) = **Ranunculus**, Tourn.
SCOTIA, Thunb. Nov. Gen. ix. 129 (1798), sphalm. = **Schotia**, Jacq. (Legumin.).
SCOTTEA, DC. Prod. ii. 118 (1825), sphalm. = seq.
SCOTTIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 268 (1812) = **Bossiaea**, Vent. (Legumin.).
angustifolia, Lindl. Bot. Reg. t. 1266 = *B. dentata*.
dentata, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 269 = *B. dentata*.
laevis, Lindl. Bot. Reg. t. 1652 = *B. dentata*.
trapeziformis, Mackay, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 126 (Quid ?).—Austral.
SCOVITZIA, Walp. Rep. ii. 420 (1843), sphalm. = **Szowitsia**, Fisch. & Mey. (Umbell.).
SCRIBAEA, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 591 = **Cucubalus**, Tourn. (Caryoph.).
baccifera, Schur, Enum. Pl. Transs. 100 = *C. baccifer*.
Cucubalus, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 591 = *C. baccifer*.
divaricata, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 96 = *C. baccifer*.
SCROBICARIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 456 (1827) = **Gynoxys**, Cass. (Compos.).
ilicifolia, Cass. l. c. = *G. ilicifolia*.
SCROFULARIA, Spreng. Fl. Hal. 178 (1806) = seq.
SCROPHULARIA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 178 (1737). **SCROPHULARI-NEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 937.
CERAMANTHE, Dum. Not. sur Scroph. 7 (1834).
TOMIEPHYLLUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 125.
VENILIA, Fourr. l. c. (1869).
adscendens, Willd. Enum. Hort. Berol. 644.—Hab.?
aestivalis, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 36.—Macedon.
affinis, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 71 = alata?
aintabensis, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 413 = xanthoglossa.
alata, Gilib. Fl. Lituan. i. 127.—Europ.; Oriens; As. bor.
alata, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 401.—Japan.
alpestris, J. Gay, ex Benth. in DC. Prod. x. 307.—Mont. Pyren.
altaica, Murr. in Comm. Gotting. (1781) 35. t. 2.—Sibir.
amgunensis, F. Schmidt, Reisen Amurl. 57.—Manchur.
amplexicaulis, Benth. in DC. Prod. x. 310.—Persia.
Anagae, Bolle, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 199.—Ins. Canar.
Ani, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 285 = variegata.
anomala, Vest, in Flora, xii. (1829) 1. Erg. 62.—Hab.?
anthemifolia, Parrot, in Engelh. & Parrot, Reise Krym, ii. 125.—Reg. Caucas.

SCROPHULARIA:—

- appendiculata*, Balb. ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 157 = auriculata.
appendiculata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 19 = trifoliata.
aquatica, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 515 = alata, Gilib.
aquatica, Linn. Sp. Pl. 620.—Europ.; Caucas.
arguta, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 342.—Afr. bor.; Ins. Canar.; Arab.
armena, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 711.—Armenia.
ascendens, Walp. Rep. iii. 176 = adscendens.
atropurpurea, Moretti, in Bibl. Ital. xii. (1818) 372 = canina.
auriculata, Asso, Syn. Stirp. Arag. 81 = oblongifolia.
auriculata, Brot. Fl. Lusit. i. 201 = trifoliata.
auriculata, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 401 = cretica.
auriculata, Linn. Sp. Pl. 620.—Hispan.
auriculata, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 446 = Scopoli.
Balbisi, Hornem. Hort. Hafn. ii. 577 = auriculata.
Balbisi, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 515 = oblongifolia.
Benthiana, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 39.—Persia.
Berthelotii, Bolle, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 202.—Ins. Canar.
betonicaefolia, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 356 = alpestris.
betonicaefolia, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 151 = Scopoli.
betonicefolia, Viv. Fl. Cors. 10 = oblongifolia.
betonicefolia, Linn. Mant. i. 87 = *S. Scorodonia*.
bicolor, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 221 = variegata.
bicolor, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 437 = canina.
biserrata, Willd. Enum. Hort. Berol. 644.—Hab.?
Boissieriana, Faub. & Spach, Illustr. iii. 30.—Persia.
Bourgaena, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 550.—Hispan.
Buergeriana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 116.—Japan.
byzantina, Penth. in DC. Prod. x. 303 = Kotschyana.
cabulica, Benth. l. c. 316.—Afghan.
caesia, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 38 = laciniata.
caesia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 438; Fl. Graec. vii. 3. t. 604 = heterophylla.
californica, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 585.—Calif.
calliantha, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 136.—Ins. Canar.
Calvertii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 152 = ilwensis.
calycina, Benth. Scroph. Ind. 18.—Reg. Himal.
calycina, Boiss. Fl. Orient. iv. 390 = chrysantha.
canescens, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. viii. (1841) 340.—Sibir. altaic.
canina, Bourg, ex Reut. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 46 = frutescens.
canina, Hoppe, ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 165 = Hoppii.
canina, Linn. Sp. Pl. 621.—Europ.; As. Min.; Afr. bor.
canina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 78. t. 598 = sphaerocarpa.
capillaris, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 397.—As. Min.
Castagneana, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 149 = Scopoli.
catariaefolia, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 36.—Lycaonia.
cechica, Opiz, Seznam, 90 = nodosa?
chamaedrifolia, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 418 = variegata.
chinensis, Linn. Mant. ii. 250; Sm. in Rees, Cycl. xxxii. sub n. 94 = *Celsia coromandeliana cum* *Salvia plebeia*.
chlorantha, Kotschy & Boiss. in Boiss. Fl. Orient. iv. 399.—Kurdistan.
chrysantha, Faub. & Spach, Illustr. iii. 26. t. 220.—Reg. Caucas.
chrysanthemifolia, Balb. ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 164 = canina.
chrysanthemifolia, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 40 = heterophylla.
chrysanthemifolia, Reichb. ex Nym. Consp. 534 = Hoppii.
chrysanthemifolia, Willd. Hort. Berol. i. 59 = canina.
cinerascens, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 16 = variegata.

SCROPHULARIA:—

- cinerea*, Dum. Not. sur Scroph. 11 = aquatica.
clandestina, Rupr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 392 = lateriflora.
Clausii, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 163. — Persia.
coccinea, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 111. — N. Mexic.
coccinea, Linn. Sp. Pl. 621 = Russelia sarmentosa.
congesta, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) i. 348, in textu = chrysantha.
cordata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = S. Scrodonia.
cordata, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 75. t. 73 = vernalis.
crassicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 37. — Persia.
crenophylla, Boiss. l. c. vii. 41. — Persia.
cretacea, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 24, nomen; et ex Spreng. Syst. ii. 788. — Sibir.
cretica, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 400. — Ins. Creta.
crithmifolia, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 447. — Hispan.
cryptophylla, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 31. — Persia.
cymigera, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 22 = alata.
Decaisniana, Presl, Bot. Perner, 91 = variegata.
deciptens, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iii. 156 = xanthoglossa.
decomposita, Royle, ex Benth. Scroph. Ind. 18 = lucida.
decora, Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 70 = sambucifolia.
decumbens, Fisch. Mey. & Avé-Lall. l. c. x. 58 = Scopoli.
dentata, Royle, ex Benth. Scroph. Ind. 19. — Reg. Himal.
depauperata, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 68 = variegata.
deserti, Delile, Fl. Egypte, 240. t. 33. f. 1. — Aegypt.; Arab.; Persia.
digitalifolia, Richt. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 23. — Persia.
divaricata, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1822) 17. — Reg. Caucas.
Durandii, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 91. — Maroc.
ebulifolia, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. ii. 77 = orientalis.
ebulifolia, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 270 = sublyrata.
Edgeworthii, Benth. in DC. Prod. x. 304. — Reg. Himal.
Ehrhartii, Stevens, in Ann. Nat. Hist. Ser. I. v. (1840) 3 = alata, Gilib.
elator, Benth. in Wall. Cat. n. 3921. — Reg. Himal.
elongata, Webb, ex A. DC. in DC. Prod. x. 593. — Ins. Canar.
expansa, Reut. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 413 = xanthoglossa.
farinosa, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 40. — Persia.
ficifolia, Pritz. Ic. Ind. i. 1010, sphalm. = seq.
filicifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10. — Graecia.
filicifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 79. t. 600 = lucida.
floribunda, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iii. 158 = canina.
fluminensis, Vell. Fl. Flum. 263; vi. t. 87 = Alectra brasiliensis.
foetida, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Nat. Genève. vi. (1828) 154. — Hab. ?
foliosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 101 = laevigata.
fontana, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 396 = Scopoli.
frigida, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 42. — Persia.
frutescens, DC. Fl. Fr. iii. 729 = ramosissima.
frutescens, Linn. Sp. Pl. 621. — Reg. Mediterr.
frutescens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 437 = laciniata.
geminiflora, Lam. Fl. Fr. ii. 336 = peregrina.
georgica, Benth. in DC. Prod. x. 305 = divaricata.
glabrata, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 341. — Ins. Canar.
glabrata, Schimp. ex Benth. in DC. Prod. x. 309 = auriculata.
glabrata, Spreng. Syst. ii. 784 = nepetaefolia.
glandulifera, Clarke, Trav. i. ed. II. App. p. xxi = Scopoli.

SCROPHULARIA:—

- glandulosa*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 238. t. 214 = Scopoli.
glauca, Decne. ex Benth. in DC. Prod. x. 310. — Persia.
glauca, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 78. t. 599 = lucida.
Gmelini, Turcz. ex Benth. in DC. Prod. x. 311 = incisa.
grandidentata, Tenore, Fl. Neap. Suppl. ii. 69 = Scopoli.
grandiflora, DC. Cat. Hort. Monsp. 143 = sambucifolia.
grandifolia, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 707. — Banat.
Grenieri, Reut. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 554. — Hispan.
Griffithii, Benth. in DC. Prod. x. 312 = lucida.
Gussonei, Nym. Consp. 534 = frutescens.
haematantha, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 415. — As. Min.
Halleri, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 219 = nodosa.
hastata, Rafin. Fl. Ludov. 44. — Am. bor.
Heldreichii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 158. — As. Min.
hemschinica, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 708 = nodosa.
Herminii, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 266. t. 53. — Lusitan.
heterophylla, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vii. 2. t. 603 = laciniata.
heterophylla, Willd. Sp. Pl. iii. 274. — Graecia.
heucheriaeflora, Schrenk. Enum. Pl. Nov. i. 25. — Soongar.
hierochuntina, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 35 = Michoniana.
himalensis, Royle, ex Benth. Scroph. Ind. 18. — Reg. Himal.
hirsuta, Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 68 = Scopoli.
hirta, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 21. — Ins. Mader.
hispanica, Coss. Notes Crit. 124 = sciaphila.
hispida, Desf. Fl. Atlant. ii. 55. — Afr. bor.
hispidula, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 157 = xanthoglossa.
Hoppii, Koch, in Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 410. — Camiol.; Ital.
humifusa, Timb. ex Nym. Consp. 534 = canina.
humilis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 396. — Hab. ?
hypericifolia, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 166. t. 5. — Mesopot.
hyssopifolia, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 418. — As. Min.
ilwensis, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 284. — As. Min.
incisa, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 418 = variegata.
incisa, Weinm. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1810) 136. — Sibir.
italica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = nodosa.
juncea, Richt. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 24. — Persia.
juratensis, Schleich. ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 164 = Hoppii.
kakudensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 87. — Japon.
Kotschyana, Benth. in DC. Prod. x. 303. — As. Min.
Kotschyi, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 256 = dentata.
lacera, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 24, nomen. — Hab. ?
laciniata, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 710 = variegata.
laciniata, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 185. t. 170. — Europ. austr.
laevigata, Vahl, Symb. Bot. ii. 67. — Afr. bor.
lanata, Fisch. ex A. DC. in DC. Prod. x. 593, nomen. — Sibir.
lanceolata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 419 = nodosa.
lancifolia, Presl, Fl. Sic. i. p. xxxv. — Sicil.
Langeana, Bolle, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 196. — Ins. Canar.
lasiocaulis, Schur, Enum. Pl. Transs. 486 = rupestris.
lateriflora, Trautv. in Bull. Acad. Pétersb. x. (1866) 396. — Reg. Caucas.
latifolia, Host, Fl. Austr. ii. 206 = vernalis.
laxa, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 154. — Graecia.

SCROPHULARIA:—

- laxiflora*, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 231 = nodosa.
lasica, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 409 = olympica.
lepidota, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 71. — As. Min.
leucoclada, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 424. — Turkestan.
libanotica, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 35 = variegata.
livida, Heldr. ex Nym. Consp. 534 = lucida.
livida, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 437 = sphaerocarpa.
longiflora, Benth. in DC. Prod. x. 313 = farinosa.
longifolia, Benth. l. c. 309. — Ins. Mader.
lucida, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 78 = rutaefolia.
lucida, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 554 = crithmifolia.
lucida, Linn. Syst. ed. X. 1114. — Europ. austr.; As. occ.; Reg. Himal.
lucida, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 78, in syn. = canina.
lunariaefolia, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 390. — As. Min.
luridiflora, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. v. 40. — Anatolia.
lutea, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 320 = vernalis.
lyrata, Willd. Enum. Hort. Berol. 645 = auriculata.
macrobotrys, Ledeb. Fl. Ross. iii. 217 = nodosa.
macrophylla, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 32. — Syria.
mandshurica, Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) i. 35. — China.
marginata, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 72. — Persia.
marilandica, Linn. Sp. Pl. 619 = nodosa.
marylandica, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1108 = altaica.
melissaefolia, Salisb. Prod. 100 = S. Scrodonia.
melissaefolia, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 331 = Scopoli.
mellifera, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 343 = sambucifolia.
mellifera, Loisel. ex Nym. Consp. 532 = trifoliata.
meridionalis, Linn. f. Suppl. 280 = Alonsoa caulialata.
meridionalis, Presl, Fl. Sic. i. p. xxxv = peregrina.
mesogitana, Boiss. Fl. Orient. iv. 407. — Lydia.
mesopotamica, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 34. — Mesopot.
Michoniana, Coss. & Kral. Cat. Pl. Syr. et Palest. 13. — Syria.
micrantha, Desv. ex Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 47 (Quid ?). — Ins. S. Doming.
micrantha, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 331 = heterophylla.
minima, Benth. in DC. Prod. x. 303 = chrysantha.
minima, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 79. — Reg. Caucas.
minor, Savi, Fl. Pisan. ii. 81 = peregrina.
Moellendorffii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 501. — China.
multicaulis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 76. — Sibir.
multifida, Lam. Fl. Fr. ii. 336 = canina.
multifida, Willd. Enum. Hort. Berol. 646 = laciniata.
murcica, Guir. ex Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 136 = sciaphila.
myriophylla, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 39. — As. Min.
Neesii, Wirtg. in Verh. Nat. Ver. Rheinl. i. (1844) 29 = aquatica.
nepetaefolia, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 407 = catariaefolia.
nepetaefolia, Presl, Delic. Prag. 73 (nepethaefolia). — Hispan.
nepetaefolia, Sm. in Rees, Cyclop. xxxii. n. 7 = Scopoli.
nervosa, Benth. in DC. Prod. x. 303. — Persia.
nitida, Richt. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien. l. (1885) 24. — Persia.
nodosa, Linn. Sp. Pl. 619. — Reg. bor. temp.
nudicaulis, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 168 = Celsia persica.
obliqua, Megg. Kanitz & Knapp, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xvi. (1866) 125. — Austria.
oblongifolia, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 418. — Ins. Corsic.
obtusifolia, Edgew. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 254. — Reg. Himal.
obtusifolia, Kit. ex A. DC. in DC. Prod. x. 593, nomen. — Hungar.
Oldhami, Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 167. — Japon.
oligantha, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 33 = Scopoli.

SCROPHULARIA :—

- Oliveriana*, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 709 = *olympica*.
Olivieri, Jaub. & Spach, *Illustr.* iii. 29. t. 222 = *nervosa*.
Olivieriana, Wydl. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. iv. (1828) 159 = *heterophylla*.
olympica, Boiss. *Diagn.* Ser. I. iv. 69.—As. Min.
orientalis, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 393 = Boissieriana.
orientalis, Ehrenb. ex Boiss. l. c. 413 = *xanthoglossa*.
orientalis, Habl. *Phys. Desc. Taur.* 164 = *rupestris*.
orientalis, Linn. *Sp. Pl.* 620.—As. Min. et bor.
oxysepala, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 398.—Persia.
pallida, Fisch. ex Sweet, *Hort. Brit.* ed. II. 392; *A. DC.* in *DC. Prod.* x. 593, nomen.—Reg. Caucas.
paniculata, Seenus, *Reise Istrien*, 67 = *peregrina*.
Pantosekii, Griseb. ex Pantoc. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 267 = *Scopolii*.
papillaris, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 90 = *S. Scorodonia*.
Patriniana, Wydl. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. iv. (1828) 159 = *incisa*.
pauciflora, Benth. *Scroph. Ind.* 17.—Reg. Himal.
pellucida, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 101 = *laevigata*.
peregrina, Linn. *Sp. Pl.* 621.—Reg. Mediterr.
persica, Benth. in *DC. Prod.* x. 314 = *subaphylla*, *xanthoglossa*, *variegata*.
petraea, Aitch. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 180.—Afghan.
physalodes, Moc. & Sesse, ex D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xv. (1827) 353 = *Melasma hispidum*.
Pinardi, Boiss. *Diagn.* Ser. I. iv. 70.—As. Min.
pinnata, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 719.—Sibir.
pinnata, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 15 = *canina*.
pinnatifida, Brot. *Fl. Lusit.* i. 292 = *canina*.
pinnatifida, Guss. *Fl. Sic. Syn.* ii. i. 129 = *frutescens*.
pisidica, Boiss. & Heldr. *Diagn.* Ser. I. xii. 33 = *alata*, *Gilib.*
polyantha, Royle, ex Benth. *Scroph. Ind.* 18.—Reg. Himal.
polybotrys, Boiss. *Diagn.* Ser. I. xii. 32.—Persia.
prasiifolia, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 416.—Persia.
procumbens, Vell. *Fl. Flum.* 264; vi. t. 89 = *Herpestis lanigera*.
pruinosa, Boiss. *Diagn.* Ser. I. xii. 38.—Persia.
puberula, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 396 = *Scopolii*.
puberula, Boiss. l. c. 418.—Persia.
pubescens, Hort. ex Sweet, *Hort. Brit.* ed. II. 392 = *canina*.
pulverulenta, Boiss. & Noé, *Diagn.* Ser. II. iii. 155.—As. Min.
pulverulenta, Fanka, in *Termész. Füzetek*, iv. (1880) 309.—Europ. austr. occ.
pumila, Adams, ex Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 215 = *minima*.
pyramidalis, Wydl. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. iv. (1828) 165 = *canina*.
pyrenaica, Benth. in *DC. Prod.* x. 306.—Mont. Pyren.
pyrrolopha, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 409 = *olympica*.
racemosa, Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 20.—Ins. Mader.
ramosissima, C. Koch, in *Linnaea*, xvii. (1843) 285 = *variegata*.
ramosissima, Loisel. *Fl. Gall.* ed. II. ii. 381.—Ins. Corsic.
ramosissima, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 331 = *canina*.
rivularis, Moris, *Stirp. Sard. Elench. App.* 8 = *aquatica*.
rostrata, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 163.—Persia.
rostrata, Hochst. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 395 = *arguta*.
rotundifolia, Host, ex Schur, *Enum. Pl. Transs.* 486 = *vernalis*.
rubricaulis, Boiss. *Diagn.* Ser. I. xii. 34 = *Michoniana*.
rugosa, Hort. Lugd. ex Wydl. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. iv. (1828) 151 = *betonicifolia*.
rugosa, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 42 = *Scopolii*.
rupestris, Bieb. ex Willd. *Sp. Pl.* iii. 274.—Reg. Caucas.
Ruprechtii, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 410.—Reg. Caucas.
rutaeifolia, Boiss. l. c. 404.—Reg. Caucas.
Samaritanii, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 400 = *aquatica*.

SCROPHULARIA :—

- sambucifolia*, Fisch. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* viii. 70 = *trifoliata*.
sambucifolia, Linn. *Sp. Pl.* 620.—Reg. Medit. occ.
saxatilis, Boeb. ex Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 221 = *rupestris*.
scabiosaefolia, Benth. in *DC. Prod.* x. 311.—Reg. Himal.; Afghan.
scariosa, Boiss. *Diagn.* Ser. I. iv. 67.—Syria.
Schousboei, Lange, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 553.—Hispan.
sciaphila, Willk. in *Bot. Zeit.* viii. (1850) 77.—Hispan.
Skellii, Spreng. *Syst.* ii. 783 = *nodosa*.
Scopolii, Loisel. *Not. Pl. Fr.* 95; *DC. Fl. Fr. Suppl.* 406 = *alpestris*.
Scopolii, Hoppe, ex Pers. *Syn.* ii. 160.—Europ. or.; As. Min.; Reg. Himal.
Scorodonia, Host, *Fl. Austr.* ii. 214 = *Scopolii*.
Scorodonia, Linn. *Sp. Pl.* 620.—Europ.; As. et Afr. bor.
scorodonifolia, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 320 = *S. Scorodonia*.
sexangularis, Moench, *Meth.* 445 = *peregrina*.
Sibthorpiana, Spreng. *Syst.* ii. 786 = *laciniata*.
silaifolia, Clarke, *Trav.* ii. 261 = *laciniata*.
sinaica, Benth. in *DC. Prod.* x. 314 = *deserti*.
sinensis, J. F. Gmel. *Syst.* 938 = *chinensis*.
Skellii, Walp. *Rep.* iii. 177, lapsu = *Skellii*.
Smithii, Hornem. *Hort. Hafn. Suppl.* 68.—Ins. Canar.
smyrnaea, Boiss. *Diagn.* Ser. I. iv. 66 = *Scopolii*.
sphaerantha, Trautv. ex Becker, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlviii. (1874) i. 213, nomen.—Reg. Caucas.
sphaerocarpa, Boiss. & Reut. *Diagn.* Ser. II. iii. 158, in textu.—As. Min.; Syria.
Stelleri, Ledeb. in *Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* iii. (1841) 98 = *multicaulis*.
Stelleriana, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 548 = *multicaulis*.
striata, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 413.—Persia.
subaphylla, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vii. 41.—Persia.
subcrispa, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 102 = *hispida*.
subhastata, Vell. *Fl. Flum.* 264; vi. t. 88 = *Stemodia subhastata*.
sublyrata, Brot. *Phyt. Lusit.* ii. 156.—Lusitan.
subverticillata, Moris, *Stirp. Sard. Elench. App.* 8 = *auriculata*.
suffruticans, Pall. ex Steud. *Nom.* ed. I. 756 = *tanaacetifolia*.
sulphurea, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 13 = *auriculata*.
sylvatica, Boiss. & Heldr. *Diagn.* Ser. II. iii. 153.—Graecia.
syriaca, Benth. in *DC. Prod.* x. 316.—Palaestin.
tagetifolia, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 401.—Syria.
tanacetifolia, Willd. *Hort. Berol.* t. 56.—Am. bor.
taurica, Hort. ex Schur, *Enum. Pl. Transs.* 485 = *Scopolii*.
taygetea, Boiss. *Diagn.* Ser. I. iv. 68.—Graecia.
tenuipes, Coss. & Dur. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 175.—Algeria.
tenuisecta, Jord. ex Nym. *Consp.* 534 = *canina*.
ternata, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 53 = *nodosa*.
thesioides, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 164.—Armenia.
Tinantii, Dum. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xiv. (1875) 110 = *S. Scorodonia*.
tnolea, Boiss. *Diagn.* Ser. I. iv. 66 = *Scopolii*.
trichopoda, Boiss. & Bal. l. c. Ser. II. iii. 156.—Cilicia.
trifoliata, Desf. *Fl. Atlant.* ii. 54 = *laevigata*.
trifoliata, Hoffmgg. & Link, *Fl. Port.* i. 267 = *auriculata*.
trifoliata, Linn. *Syst.* ed. X. 1114.—Reg. Mediterr.
umbrosa, Dum. *Prod. Fl. Belg.* 37 = *aquatica*.
umbrosa, Salzmann, ex Benth. in *DC. Prod.* x. 309 = *auriculata*.
uniflora, Richt. in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 90.—Lycia.
urticifolia, Wall. *Cat.* n. 3922.—Reg. Himal.
Urvillaei, Walp. *Ann.* v. 624 = *seq.*
Urvilleana, Decne. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. ii. (1834) 252 = *variegata*.
Urvilleana, Wydl. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. iv. (1828) 160 = *heterophylla*.
valentina, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 124.—Hispan.
varia, Bieb. *Tabl. Casp.* 58 (an seq.?).—Reg. Casp.

SCROPHULARIA :—

- variegata*, Bieb. *Beschr. Casp.* 177, *App.* n. 48; et *Fl. Taur. Cauc.* ii. 78.—As. Min.; Reg. Himal.
variegata, Reichb. ex Nym. *Consp.* 534 = *laciniata*.
verbenaeifolia, Desf. *Tabl.* ed. II. 77 = *caesia*.
verna, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 13 = *vernalis*.
vernalis, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 76 = *chrysantha*.
vernalis, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* 356 = *pyrenaica*.
vernalis, Linn. *Sp. Pl.* 620.—Europ.
versicolor, Boiss. *Diagn.* Ser. II. iii. 155.—Armenia.
verticillata, Moris, *Stirp. Sard. Elench. App.* 7.—Ins. Sardo.
viridiflora, Poir. *Voy. Barb.* ii. 194 = *sambucifolia*.
viscosa, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 391 = *Kotschyana*.
Wirtgenii, Koch, ex Opiz, *Seznam*, 90 = *nodosa*?
xanthoglossa, Boiss. *Diagn.* Ser. I. xii. 38.—As. Min.; Syria.
xyloirhiza, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 406.—Syria; Mesopot.

SCROPHULARIOIDES, Forst. f. *Prod.* 91 (1786) = **Premna**, Linn. (Verben.).
arborea, Forst. f. l. c. = *P. taitensis*.

SCUBALIA, Noronha, in *Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 (Quid?).

SCULERIA, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 51 (1836) = **Vancouveria**, Decne. (Berber.).
geminata, Rafin. l. c. = *V. hexandra*.

SCURIA, Rafin. in *Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 106 = **Carex**, Dill. (Cyperac.).

SCURRULA, Linn. *Sp. Pl.* ed. I. 110 (1753) = **Loranthus**, Linn.

amplexifolia, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 424 = *L. longiflorus*.

- Belvisii*, G. Don, l. c. 423 = *L. lanceolatus*.
bicolor, G. Don, l. c. 424 = *L. longiflorus*.
biflora, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula*?
bracteata, G. Don, l. c. 425 = *L. bracteatus*.
budleioides, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula*.
canescens, G. Don, l. c. 423 = *L. canescens*.
chinensis, G. Don, l. c. 421 = *L. chinensis*.
cinerea, Rafin. *Sylva Tellur.* 159 = *L. canescens*?
clavata, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 423 = *L. clavatus*.
cordifolia, G. Don, l. c. 421 = *L. cordifolius*.
Corynitis, G. Don, l. c. 422 = *L. Corynitis*.
curvata, G. Don, l. c. 425 = *L. curvatus*.
cylindrica, G. Don, l. c. 424 = *L. cylindricus*.
dodoneaeifolia, G. Don, l. c. 423 = *L. dodoneaeifolius*.
elastica, G. Don, l. c. 425 = *L. elasticus*.
elegans, G. Don, l. c. 424 = *L. elegans*, Wall.
elliptica, Rafin. *Sylva Tellur.* 125 = *L. tetrapetalus*.
falcata, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 424 = *L. longiflorus*.
fasciculata, G. Don, l. c. 421 = *L. fasciculatus*.
fusca, G. Don, l. c. = *L. fuscus*.
glaucula, G. Don, l. c. 423 = *L. glaucus*.
goodeniaefolia, G. Don, l. c. 425 = *L. cuneatus*.
Haenkeana, G. Don, l. c. 423 = *L. Haenkeanus*.
heterantha, G. Don, l. c. 424 = *L. heteranthus*.
incarnata, G. Don, l. c. 423 = *L. incarnatus*.
indica, G. Don, l. c. 424 = *L. longiflorus*?
Koenigiana, G. Don, l. c. 425 = *L. longiflorus*.
laevigata, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula*.
lepidota, G. Don, l. c. = *L. lepidotus*.
lobeliaeflora, G. Don, l. c. 425 = *L. cuneatus*.
longiflora, G. Don, l. c. 423 = *L. longiflorus*.
malifolia, G. Don, l. c. = *L. malifolius*.
obovata, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula*.
oleaeifolia, G. Don, l. c. 423 = *L. oleaeifolius*.
parasitica, Linn. *Sp. Pl.* 110 = *L. Scurrula*.
Pentagonia, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 423 = *L. Pentagonia*.
pentandra, G. Don, l. c. 424 = *L. pentandrus*.
philippensis, G. Don, l. c. 422 = *L. philippensis*.
praelonga, G. Don, l. c. 425 = *L. praelongus*.
pulverulenta, G. Don, l. c. 421 = *L. pulverulentus*.
Reinwardtiana, G. Don, l. c. 425 = *L. Reinwardtiana*.
Roxburghii, G. Don, l. c. 421 = *L. Scurrula*.
rufescens, G. Don, l. c. 422 = *L. rufescens*.
rufidula, G. Don, l. c. = *L. Scurrula*.
rugulosa, G. Don, l. c. = *L. rugulosus*.
sessilifolia, G. Don, l. c. = *L. sessilifolius*.
Thonningii, G. Don, l. c. = *L. Thonningii*.
turbinata, G. Don, l. c. 424 = *L. turbinatus*.

SCURRULA:—

- umbellata*, Rafin. Sylva Tellur. 125 = *Loranthus tetrandrus*.
umbellifera, G. Don, Gen. Syst. iii. 421 = *L. umbellifer*.
venosa, G. Don, l. c. 424 = *L. venosus*.
vestita, G. Don, l. c. 422 = *L. vestitus*, Wall.

SCUTELLARIA, Riv. ex Linn. Syst. ed. I (1735).

- LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1201.
 CASSIDA, Moench, Meth. 413 (1794).
 HASTIFOLIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
Adamsii, A. Ham. Monog. Scutell. 34. t. 2. f. 3 = *baicalensis*.
Adamsii, Spreng. Syst. ii. 701 = *scordiifolia*.
adenophylla, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 117. —China.
adenotricha, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 688 = *peregrina*.
africana, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 420 = *peregrina*.
agrestis, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 427. —Bras.
albida, Benth. in DC. Prod. xii. 420 = *alpina*.
albida, Linn. Mant. ii. 248. —Europ. or.; Oriens.
albo-rosea, Lem. Illustr. Hort. xvi. (1869) t. 584. —Bras.
alpina, Linn. Sp. Pl. 599. —Europ.; As. bor.
altaica, Ledeb. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 16 = *alpina*.
altissima, A. Ham. Monog. Scutell. 48 = *Columnae*.
altissima, Linn. Sp. Pl. 600. —Europ. austr.; Reg. Caucas.
amaranthina, Linden, ex Galeotti, in Journ. Hort. Prat. Sér. II. ii. 217. t. 19. f. 2. —N. Granat.
ambigua, Nutt. Gen. Am. ii. 37 = *parvula*.
angulosa, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 67. —Reg. Himal.
angustifolia, Adams, ex Benth. in DC. Prod. xii. 424, in nota = *cordifolia*.
angustifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 412. —Am. bor. occ.
antirrhinoides, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 35. —Am. bor. occ.
arabica, Faub. & Spach, Illustr. iv. 114. t. 376. —Arab.
arguta, Buckl. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 175 = *saxatilis*.
arguta, Soland. ex Coss. Notes Pl. Nouv. 172. —Hispan.
atriplicifolia, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 8. —Peruv.
aurata, Lem. Illustr. Hort. x. (1863) t. 368. —Bras.
baicalensis, Georgi, Reise, i. 223. —Sibir.; As. or.
balearica, Barc. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. vi. (1877) 399. —Ins. Balear.
barbata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 109 = *rivularis*.
bicolor, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 333 = *orientalis*.
Bolanderi, A. Gray, in Proc. Am. Akad. vii. (1868) 387. —Calif.
bonariensis, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 345 = *rumicifolia*.
brevibracteata, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, 1. (1885) 99. —Lycia.
breviflora, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 7. —Peruv.
breviflora, Turcz. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 439 = *minor*.
brevifolia, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 380. —Texas.
californica, A. Gray, l. c. 381. —Calif.
cana, Wall. Pl. As. Rar. i. 67 = *repens*.
canescens, Nutt. Gen. Am. ii. 38. —Am. bor.
cardiophylla, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 227. —Am. bor. occ.
caroliniana, Lam. Encyc. vii. 706 = *integrifolia*.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 163 = *pilosa*, Michx.
caucasica, A. Ham. in Ser. Bull. Bot. (1832) 282 = *orientalis*.
celtidifolia, A. Ham. Monog. Scutell. 27 = *angulosa*.
Chamaedrys, Shuttl. ex Benth. in DC. Prod. xii. 422 = *saxatilis*.
chorassanica, Bunge, Lab. Pers. 65. —Persia.
coccinea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 325. —N. Granat.
coerulea, Moq. & Sesse, ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 49. —Mexic.
Colebrookiana, Wall. Pl. As. Rar. i. 67 = *violacea*.

SCUTELLARIA:—

- Colebrookiana*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 54 = *discolor*.
Columnae, All. Fl. Pedem. i. 40. t. 84. f. 2. —Europ. austr.
Columnae, Host, Fl. Austr. ii. 178 = *altissima*.
commutata, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 136 = *altissima*.
compressa, A. Ham. Monog. Scutell. 29 = *alpina*.
cordifolia, Benth. in Hook. Bot. Mag. t. 4290 = *splendens*.
cordifolia, Muhl. Cat. ex Benth. in DC. Prod. xii. 422 = *versicolor*.
cordifolia, Walp. Rep. iii. 757, sphalm. = *scordiifolia*.
costaricana, H. Wendl. in Hamb. Gartenz. xix. (1863) 29. —Costa Rica.
cretacea, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 685. —Mesopot.
cretica, Linn. Sp. Pl. 600 = *Teucrium lamiifolium*.
cretica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *albida*.
cubensis, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 158. —Cuba.
cumanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 325. —Venezuela.
cuneata, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 345 = *pilosa*, Michx.
cyrtopoda, Miq. Fl. Ind. Bot. ii. 973. —Java.
daurica, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 397 = *baicalensis*.
decumbens, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 332 = *albida*.
decumbens, Sieber, ex Spreng. Syst. ii. 702 = *hirta*.
deltoidea, Rafin. Fl. Ludov. 43 (Quid?). —Am. bor.
dependens, Maxim. Prim. Fl. Amur. 219. —Japon.
depressa, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 398 = *scordiifolia*.
diffusa, Benth. in DC. Prod. xii. 421. —As. Min.; Syria.
discolor, Colebr. in Wall. Pl. As. Rar. i. 66. —Ind. or.; Burma; Java.
Drummondii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 441. —Mexic.; Texas.
dumetorum, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 400. —Mexic.
elliptica, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 173, nomen = *pilosa*, Michx.
epilobifolia, A. Ham. Monog. Scutell. 32 = *galericulata*.
Felisberti, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 77 = *purpurascens*.
filicaulis, Regel, Pl. Nov. Fedesch. 68. —Turkest.
floribunda, Benth. in DC. Prod. xii. 418 = *violacea*.
floridana, Chapm. Fl. S. U. St. 324. —Florida.
fruticosa, Desf. Tabl. ed. I. 63. —Syria; Persia.
fruticosa, Soyer-Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1796) 42. —Ins. Maurit.
galericulata, Linn. Sp. Pl. 599. —Reg. bor. temp.
gardoquioides, Benth. in DC. Prod. xii. 430 = *Perilomia gardoquioides*.
glandulosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 669. —Burma.
glechomoides, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 67. —Persia.
glutinosa, Benth. in DC. Prod. xii. 419. —Afghan.
gracilis, Nutt. Gen. Am. ii. 37 = *nervosa*.
grandiflora, Adam, ex Benth. in DC. Prod. xii. 424 = *baicalensis*.
grandiflora, Sims, Bot. Mag. t. 635 = *orientalis*.
grossa, Wall. Pl. As. Rar. i. 67. —Reg. Himal.
Guillelmi, A. Gray, in Am. Ass. Adv. Sc. xxi. (1872) 25. —Am. bor.?
Gussonii, Tenore, Fl. Nap. v. 29 = *Columnae*.
Hartwegii, Benth. Pl. Hartw. 244. —N. Granat.
hastaeifolia, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 548 = *minor*.
hastata, Rafin. Fl. Ludov. 44 (Quid?). —Am. bor.
hastifolia, Linn. Sp. Pl. 599. —Europ.; Reg. Caucas.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient. iv. 684. —Armenia.
havanensis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 25. —Cuba.
hederacea, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 10 = *dependens*?
heterophylla, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 45. —Cilicia; Syria.
heterophylla, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 345 = *rumicifolia*.
heteropoda, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 972 = *discolor*.
Heydei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 667. —Reg. Himal.
hirsuta, Kit. ex Sadl. Fl. Pest. ii. 83 = *Columnae*.
hirta, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 66. t. 583. —Graecia; Ins. Creta; Cyprus.
hirta, Sieber, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 689 = *Sieberi*.

SCUTELLARIA:—

- hirta*, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 332 = *albida*.
Horsfieldiana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 974. —Java.
humilis, R. Br. Prod. 507. —Austral.
hyssopifolia, Linn. Sp. Pl. 599 = *integrifolia*.
incana, Spreng. Fl. Hal. Mant. 44 = *canescens*.
incarnata, Vent. Choix Pl. 39. t. 39. —N. Granat.?
incurva, Wall. Pl. As. Rar. i. 67. —Burma.
indica, Blume, Bijdr. 839; D. Don, Prod. Fl. Nep. 109 = *discolor*.
indica, Linn. Sp. Pl. 600. —Japon; China; Java.
indica, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 24 = *violacea*.
integrifolia, Linn. Sp. Pl. 599. —Am. bor.
integrifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 413 = *serrata*.
japonica, Burm. f. Fl. Ind. 130 = *Plectranthus menthoides*.
japonica, Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 315 = *dependens*.
javanensis, Jungh. Java, i. 662, in adnot. —Java.
khasiana, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 669. —Reg. Himal.
lanceolaria, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 110 = *baicalensis*.
lateriflora, Linn. Sp. Pl. 598. —Am. bor.
Lehmanni, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1883) II. 726 (seq.?). —Ecuador.
Lehmanni, Regel, Gartenfl. (1884) 129. t. 1152. —N. Granat.
leucodasys, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 116. —China.
Lindeniana, Benth. in DC. Prod. xii. 421. —Venezuela.
linearis, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 66. —Reg. Himal.; Afghan.
Linnaeana, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 322. —Europ.; As. temp.; Abyss.
longifolia, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 5. —Mexic.
lupulina, Linn. Sp. Pl. 835 = *alpina*.
luridiflora, Fisch. & Mey. ex Benth. in DC. Prod. xii. 431, err. typ. = *Scrophularia luridiflora*.
luzonica, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 315. —Ins. Philipp.
macrantha, Fisch. ex Reichb. Ic. Bot. v. 52. t. 488 = *baicalensis*.
malvaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 324. —N. Granat.
microphylla, Moq. & Sesse, ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 43. —Mexic.
minor, Huds. Fl. Angl. ed. I. 232. —Europ.; As. bor.
mississippiana, Martens, in Bull. Acad. Brux. viii. 1. (1841) 66 = *versicolor*.
Mociniana, Benth. Lab. Gen. et Sp. 442. —Mexic.
mollis, R. Br. Prod. 507. —Austral.
montana, Chapm. in Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 11. —Am. bor.
Moriciniana, Carr. in Rev. Hort. (1872) 350, sphalm. = *Mociniana*.
mucida, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, 1. (1885) 48. —Persia.
multicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 61. —Persia; Afghan.
multiflora, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 6. —Austral.
mussooriensis, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 266 = *grossa*.
nana, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 100. —Am. bor. occ.
nepetaefolia, Benth. in DC. Prod. xii. 414 = *multicaulis*.
nervosa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 412. —Am. bor.
nigrescens, Spreng. Syst. ii. 702 = *albida*.
nipponica, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 377. —Japon.
nodulosa, A. Ham. Monog. Scutell. 26 = *violacea*.
Novae-Zelandiae, Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 335. —N. Zel.
nummularia, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 687 = *diffusa*.
nummulariaefolia, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 336. —Reg. Magellan.
oblonga, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 20. —Zeylan.
Oldhami, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 197. —Korea.
orbicularis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 436. —As. centr.
orientalis, Linn. Sp. Pl. 598. —Europ. austr.; Oriens.
ovalifolia, Pers. Syn. ii. 136 = *pilosa*, Michx.

SCUTELLARIA:—

- ovata*, Hill, Hort. Kew. 242 = *parvula*.
pallida, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 65 = *albida*.
pallida, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 137 = *Columnae*.
parnassica, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 688 = *peregrina*.
parviflora, Rafin. ex A. Ham. Monog. Scutell. 37 = *nervosa*.
parvula, Michx. Fl. Am. Bor. i. 12. —Am. bor.
pauciflora, Pantoë. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 286 = *galericulata*.
pectinata, Hohen. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 549 = *orientalis*.
pectinata, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. vi. (1836) 44. —Cappadoc.
pekinensis, Maxim. Prim. Fl. Amur. 476. —China.
peregrina, Linn. Sp. Pl. 599. —Europ. austr.; Oriens.
peregrina, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 24 = *rivularis*.
peregrina, Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung. 132. ii. t. 125 = *altissima*.
physocalyx, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 68. —Kokania.
Pichleri, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 47. —Persia.
pilosa, Hill, Veg. Syst. xiii. 64. —Am. bor.
pilosa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 11. —Am. bor.
pilosiuscula, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xii. 429 = *tuberosa*.
pinnatifida, A. Ham. Monog. Scutell. 16. t. 2. f. 2. —Persia.
polymorpha, A. Ham. l. c. 38 = *integrifolia*, *pilosa*, *Michx.*
pontica, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 701. —Pontus.
prostrata, Jacquem. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 733. —Reg. Himal.
pubescens, Mart. Fl. Tarn, 572 = *galericulata*.
pubescens, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 173 = *canescens*.
pulchella, Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 57 = *orientalis*.
pulchella, Hort. ex Heer, in Gartenfl. (1857) 297. t. 205. —Hab.?
pumila, Salisb. Prod. 89 = *minor*.
purpurascens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 89. —Am. trop.
pygmaea, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 345 = *parvula*.
racemosa, Pers. Syn. ii. 136 = *rumicifolia*.
radicata, Rafin. Atl. Journ. 16 (Quid?). —Am. bor.
repens, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 110. —Reg. Himal.; Burma.
reptans, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 398 = *scordiiifolia*.
resinosa, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1823) 232. —Am. bor. occ.
resinosa, S. Wats. in Bot. King's Exped. 237 = *antirrhinoides*.
rivularis, Wall. Pl. As. Rar. ii. 66. —Ind. or.; Burma; China.
robusta, Benth. in DC. Prod. xii. 418 = *violacea*.
rubicunda, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 42, nomen; et Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 56 = *peregrina*.
rugosa, Wood, in Proc. Am. Assoc. (1853) 176 = *versicolor*.
rumicifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 324. —Mexic.; Chili.
rupestris, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 60 = *hirta*.
russeliaefolia, Vatke, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 715. —Ins. Philipp.
salviaefolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 433. —Graecia.
sanguinea, Steud. Nom. ed. II. ii. 549 = *alpina*.
saxatilis, Riddell, Cat. Ohio Pl. Suppl. (1836) 14. —Am. bor.
scandens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 110 = *angulosa*.
scarlatina, Planch. & Linden, Cat. n. 10 (1855) 6; ex Lem. Illustr. Hort. iii. (1856) t. 104. —Am. centr.
scaphila, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 228. —China.
scordiiifolia, Fisch. ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 55. —Sibir.
serrata, Andr. Bot. Rep. t. 494. —Am. bor.
serrata, Spreng. Syst. ii. 703 = *canescens*.
Sibthorpii, Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 638 = *peregrina*.
Sieberi, Benth. in DC. Prod. xii. 420. —Ins. Creta et Rodos.

SCUTELLARIA:—

- Sieversii*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 394 = *orientalis*.
siphocampyloides, A. Gray, Syn. Fl. Am. ii. i. 381, sphalm. = *seq.*
Siphocampylus, Vatke, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 717 = *angustifolia*.
speciosa, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 389 = *baicalensis*.
spicata, Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 241. —Zeylan.
splendens, Link. Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Berol. i. 31. t. 13. —Mexic.
squamulosa, A. Ham. Monog. Scutell. 35 = *rivularis*.
Stocksii, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 28. —Beluchist.
sumatrana, Mig. Fl. Ind. Bat. ii. 974. —Sumatra.
supina, Linn. Sp. Pl. 538 = *alpina*.
Szovitziana, Bunge, Lab. Pers. 65. —Persia.
Tanakae, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 464. —Japon.
tenerifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxii. n. 15 = *nervosa*.
tomentosa, Bertol. Misc. Bot. ii. 11 = *fruticosa*, Desf.
Tournefortii, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 15. —Persia; Reg. Caucas.
Trianaei, Planch. & Linden, in Linden, Cat. n. 10 (1855) 6; et in Belg. Hort. vi. (1856) 232. —N. Granat.
tuberosa, Benth. Lab. Gen. et Sp. 441. —Calif.
tubiflora, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 10. —Bras.
uliginosa, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 427. —Bras.
utriculata, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. iv. II. t. 6. —Syria.
variegata, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 16 = *alpina*.
Ventenatii, Hook. Bot. Mag. t. 4271. —N. Granat.
verna, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 43 = *alpina*.
versicolor, Nutt. Gen. Am. ii. 38. —Am. bor.
Vigineixii, Marès & Vigin. Cat. Pl. Balear. 220. —Ins. Majorc.
villosa, Ell. Sketch, ii. 90. —Am. bor.
villosa, Hook. Bot. Mag. t. 4789. —Bras.
villosa, Rafin. Atl. Journ. 17 (Quid?). —Am. bor.
violacea, Heyne, ex Wall. Pl. As. Rar. i. 66. —Ind. or.; Burma; Java.
virens, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 682. —Kurdistan.
viscida, Spreng. f. Tent. Syst. Suppl. 15 = *alpina*.
viscidula, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 52. —China.
volubilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 325. —N. Granat.
Wallichiana, A. Ham. Monog. Scutell. 28. t. 2. f. 1 = *repens*.
Wightiana, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 67 = *violacea*.
Wrightii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 370. —Am. bor.
- SCUTIA, Comm. ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 362. RHAMNEAE, Benth. & Hook. f. i. 379. BLEPETALON, Rafin. Sylva Tellur. 30 (1838). arenicola, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 93. —Bras. buxifolia, Reiss. l. c. —Reg. Argent. capensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 33 = *Commersonii*. Commersonii, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 363. —As. trop.; Ins. Mascari. discolor, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 110 = *Berchemia discolor*. ferrea, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 363. —Ind. occ. ferrea, Chapm. Fl. S. U. St. 72 = *Reynosa latifolia*. indica, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 363 = *Commersonii*. laevigata, G. Don, Gen. Syst. ii. 34 = *Reynosa latifolia*. lucida, G. Don, l. c. 33 = *Commersonii*. myrtina, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) ii. 168 = *Commersonii*. natalensis, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 346 = *Commersonii*. obcordata, Bivona, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 116. —Madag. paniculata, G. Don, Gen. Syst. ii. 34 = *Celastrus paniculatus*. pauciflora, G. Don, l. c. = *Ceanothus pauciflorus*. Rheediana, Wight, Ic. t. 1071 = *Commersonii*. Sarcomphalus, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 364 = *Sarcomphalus retusus*. sphaerosperma, G. Don, Gen. Syst. ii. 34 = *Rhamnus sphaerosperma*.

- SCUTICARIA, Lindl. Bot. Reg. (1843). Misc. 14 ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 554. Dodgsoni, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) i. 9 = *Hadwenii*? Hadwenii, Hort. ex Planch. in Fl. des Serres, vii. (1851-52) 239. —Bras. Steelii, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 14. —Guian.

- SCUTINANTHE, Thw. in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 266. t. 8 = *Canarium*, Linn. (Burser.). brunnea, Thw. l. c. 267 = *C. brunneum*.

- SCUTULA, Lour. Fl. Cochinch. 235 (1790) = *Meme-cylon*, Linn. (Melastom.). scutellata, Lour. l. c. = *M. edule*. umbellata, Lour. l. c. 236 = *M. umbellatum*.

- SCYBALIUM, Schott & Endl. Melet. 3. t. 2 (1832). BALANOPHOREAE, Benth. & Hook. f. iii. 237. PHYLLOCORYNE, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1856) 51. t. 11. SPHAERORHIZON, Hook. f. l. c. 50. t. 10 (1856). depressum, Eichl. in DC. Prod. xvii. 133. —N. Granat. fungiforme, Schott & Endl. Melet. 3. t. 2. —Bras. Glaziovii, Eichl. in DC. Prod. xvii. 133. —Bras. jamaicense, Schott & Endl. Melet. 12. —Ind. occ.

- SCYNOPSOLE, Reichb. Handb. 164 (1837) = *CYNOPSOLE*, Endl. = *Balanophora*, Forst.

- SCYPHAEA, Presl, Scyph. Nov. Pl. Gen. (1829); et Symb. Bot. i. 7. t. 4 (1830) = *Mariia*, Sw. (Ternstr.). racemosa, Presl, ll. cc. = *M. racemosa*.

- SCYPHANTHUS, [D. Don, in] Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 238 (1828) = *Grammatocarpus*, Presl (Loaseae). Cumingii, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 84 = *G. Cumingii*. elegans, [D. Don, in] Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 238 = *G. volubilis*. grandiflorus, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 569 = *G. volubilis*.

- SCYPHARIA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. III. vi. (1860) 8 = *Colletia*, Comm. (Rhamn.). guayaquilensis, Miers, l. c. 9 = *Rhamnus guayaquilensis*. parviflora, Miers, l. c. 10 = *Discaria parviflora*. senticosa, Miers, l. c. 11 = *Rhamnus senticosa*. tetragona, Miers, l. c. 12 = *C. tetragona*.

- SCYPHELLANDRA, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 21 (1864). VIOLARIEAE, Benth. & Hook. f. i. 120. virgata, Thw. l. c. —Zeylan.

- SCYPHIPHORA, Gaertn. f. Fruct. iii. 91. t. 196 (1805). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 99. EPITHINIA, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) v. 12. hydrophyllacea, Gaertn. f. Fruct. iii. 91. t. 196. —Ins. Molucc. malayana, Bedd. Fl. Sylv. Anal. Gen. t. 23. f. 5. —Malay.

- SCYPHOCHLAMYS, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 14; et in Baker, Fl. Maur. 149 (1877). RUBIACEAE. revoluta, Balf. f. ll. cc. 15; 149. —Ins. Rodrig.

- SCYPHOCORONIS, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 225. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 316. viscosa, A. Gray, l. c. —Austral.

- SCYPHOGLOTTIS, Pritz. Ic. Ind. i. 1012 (1855), sphalm. = *Seaphyglottis*, Poepp. & Endl. (Orchid.).

- SCYPHOGYNE, Brongn. Voy. Coq. Bot. t. 54 (1828?). ERICACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 594. BLEPHARISPERMUM, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 709 (1839). BLEPHAROPHYLLUM, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 216. CODONOSTIGMA, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 709 (1839). COILOSTIGMA, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 234.

SCYPHOGYNE :—

- OMPHALOCARYON, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 243.
 THAMNIUM, Klotzsch, l. c. 223 (1838).
 TRISTEMON, Klotzsch, l. c. 245 (1838).
brevifolia, Benth. in DC. Prod. vii. 710.—Afr. austr.
capitata, Benth. l. c.—Afr. austr.
divaricata, Benth. l. c.—Afr. austr.
eglandulosa, Benth. l. c.—Afr. austr.
fasciculata, Benth. l. c. 709.—Afr. anstr.
inconspicua, Brongn. Voy. Coq. Bot. t. 54.—Afr. austr.
muscosa, Steud. Nom. ed. II. i. 568, in syn.=praec.
puberula, Benth. in DC. Prod. vii. 709.—Afr. austr.
urceolata, Benth. l. c.—Afr. anstr.

SCYPHONYCHIUM, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 495. **SAPINDACEAE**.
multiflorum, Radlk. l. c. 519, 545.—Bras.

SCYPHOPETALUM, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 675 (1875). **SAPINDACEAE**.
ramiflorum, Hiern, l. c. 676.—Burma.

SCYPHOSTACHYS, Thw. Ennm. Pl. Zeyl. 157 (1859). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 94.
coffeoides, Thw. l. c.—Zeylan.
pedunculatus, Thw. l. c.—Zeylan.

SCYPHOSTIGMA, M. Roem. Syn. Hesper. 80, 94 (1846) = **Turraea**, Linn. (Meliac.).
Bennetii, M. Roem. l. c. 94 = *Quivisia tetramera*.
philippinense, M. Roem. l. c. = *T. octandra*.

SCYPHOSYCE, Baill. Adansonia, xi. (1875) 293. **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 371.
Manniana, Baill. l. c.—Afr. trop.

SCYRTOCARPA, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 292 = seq.

SCYRTOCARPUS, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847) = **Symplocos**, Linn. (Styrac.).

SCYTALA, E. Mey. ex DC. Prod. vii. 12 (1833) = **Oldenburgia**, Less. (Compos.).
Papionum, E. Mey. l. c. = *O. Papionum*.

SCYTALANTHUS, Schan. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 361 = **Skytanthus**, Meyen (Apocyn.).
acutus, Schan. l. c. 362 = *Skytanthus acutus*.

SCYTALIA, Gaertn. Fruct. i. 197. t. 42 (1788) = **Nephelium**, Linn. (Sapindac.).
benghalensis, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 113 = *N. Longana*.
chinensis, Gaertn. Fruct. i. 197. t. 42. f. 3 = *N. Lit-chi*.
crinita, Raeusch. Nom. ed. III. 113; Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 386 = *N. lappaceum*.
Danura, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 274 = *Sapindus Danura*.
glabra, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8048 E = *Walsura robusta*.
informis, Raeusch. Nom. ed. III. 113 = *Euphoria informis*.
Litschi, Roxb. Hort. Beng. [28]; Fl. Ind. ii. 269 = *N. Lit-chi*.
Longan, Roxb. ll. cc. 29; 270 = *N. Longana*.
oppositifolia, Roxb. ll. cc. [88]; 273 = *N. oppositifolium*.
parviflora, Roxb. ll. cc. = *N. parviflorum*.
Ramboutan, Roxb. ll. cc. 29; 271 = *N. lappaceum*.
rimosa, Roxb. ll. cc. 29; 272 = *N. rimosum*.
rubia, Roxb. ll. cc. = *Sapindus attenuatus*.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 612 = *chinensis*.
squamosa, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 385 = *N. Lit-chi*.
trijuga, Roxb. ex DC. Prod. i. 615 = *Schleichera trijuga*.
verruculosa, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 386 = *N. Longana*.
verticillata, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 273 = *Sapindus Dannra*.
 VOL. II.

SCYTALIS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 144 (1835) = **Vigna**, Savi (Legumin.).
anomala, Vog. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 32 = *V. retusa*.
Catjang, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 145 = *V. Catjang*.
Helicopus, E. Mey. l. c. 146 = *V. glabra*.
hispida, E. Mey. l. c. = *V. hispida*.
protracta, E. Mey. l. c. = *V. triloba*.
retusa, E. Mey. l. c. 147 = *V. retusa*.
tenuis, E. Mey. l. c. 145 = *V. tenuis*, *D. Dietr.*

SCYTANTHUS, T. Anders. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1093 (1876). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1093.
laurifolius, T. Anders. l. c.—Afr. trop.

SCYTANTHUS, Hook. Ic. Pl. t. 605–625 (184) = **Hoodia**, Sweet (Asclep.).
Burkei, Hook. l. c. sub t. 625 = *H. Currori*.
Currori, Hook. l. c. t. 605–606 = *H. Currori*.
Gordonii, Hook. l. c. t. 625 = *H. Gordonii*.

SCYTANTHUS, Liebm. in Foerhandl. Skand. Naturf. 4de Mode (1844), 177 = **Cytinus**, Tourn.
Bambusarum, Liebm. l. c. 183 = *C. americanus*.

SCYTOPHYLLUM, Eckl. & Zeyh. Enum. 124 (1835) = **Elaeodendron**, Jacq. f. (Celastrin.).
angustifolium, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 472 = *E. angustifolium*.
laurinum, Eckl. & Zeyh. Enum. 124 = *Celastrus laurinus*.
obtusum, Eckl. & Zeyh. l. c. = *Celastrus laurinus*.
oleoides, Eckl. & Zeyh. l. c. = *Celastrus oleoides*.

SCZEGLEEWIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 233 = **Pterospermum**, Schreb. (Stercul.).
involutrata, Turcz. l. c. 234 = *P. obliquum*.

SCZEGLEEWIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 212 = **Symphorema**, Roxb. (Verben.).
luçonensis, Turcz. l. c. 213 = *Sym. luzonicum*.

SCZUKINIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 165 = **Swertia**, Linn. (Gentian.).
diluta, Turcz. l. c. 166 = *Sw. diluta*.

SEAFORTHIA, R. Br. Prod. 267 (1810) = **Ptychosperma**, Labill., etc. (Palm.).
angustifolia, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 314.—N. Guin.
appendiculata, Juss. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 192 = *Drymophloeus appendiculatus*.
Blumei, Juss. ex Kunth, l. c. = *Drymophloeus olivaeformis*, leprosus.
caesia, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 313 = *Pinanga caesia*.
Calapparia, Mart. l. c. = *Actinorhysis Calapparia*.
cochinchinensis, Mart. l. c. = *Pinanga cochinchinensis*.
communis, Blume, Rumphia, ii. 78 = *Drymophloeus communis*.
coronata, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 185 = *Pinanga coronata*.
costata, Mart. l. c. 313 = *Pinanga Kuhlil*.
Dicksonii, Mart. l. c. 184 = *Pinanga Dicksonii*.
disticha, Mart. l. c. = *Pinanga disticha*.
elegans, R. Br. Prod. 267 = *Ptychosperma elegans*.
elegans, Hook. Bot. Mag. t. 4961 = *Archontophoenix Cunninghamii*.
furfuracea, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 313 = *Pinanga furfuracea*.
gracilis, Mart. l. c. 184 = *Pinanga gracilis*.
inaequalis, Mart. l. c. 313 = *Pinanga inaequalis*.
jaculatoria, Mart. l. c. 314 = *Drymophloeus appendiculatus*.
Kuhlil, Mart. l. c. 185. t. 158. f. 4 = *Pinanga Kuhlil*.
latisepta, Mart. l. c. 313 = *Pinanga latisepta*.
malaiana, Mart. l. c. 183. t. 158. f. 3 = *Pinanga malaiana*.
minor, Mart. l. c. 313 = *Pinanga minor*.
montana, Blume, in Mart. l. c. 185 = *Pinanga coronata*.
olivaeformis, Mart. l. c. 314 = *Drymophloeus olivaeformis*.
oryzaeformis, Mart. l. c. 185 = *Pinanga Kuhlil*.
patula, Mart. l. c. 313 = *Pinanga patula*.

SEAFORTHIA :—

Ptychosperma, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 182. tt. 128, 129 = *Ptychosperma gracilis*.
Reinwardtiana, Mart. l. c. 183. t. 158. f. 2 = *Pinanga noxa*.
robusta, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 257 = *Rhopalostylis Baueri*.
Rumphiana, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 134 = *Pinanga ternatensis*.
salicifolia, Mart. l. c. 313 = *Pinanga salicifolia*.
saxatilis, Blume, ex Mart. l. c. 134. t. 158. f. 6 = *Drymophloeus saxatilis*.
sylvestris, Blume, l. c. 185 = *Pinanga javana*.
Veitchii, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1870) 37.—Austral.
vestiaria, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 313 = *Mischophloeus paniculatus*.

SEALA, Adans. Fam. ii. 131 (1763) = **Pectis**, Linn. (Compos.).

SEBAEA, Soland. ex R. Br. Prod. 451 (1810). **GEN-TIANEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 804.

LAGENIAS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 186 (1837).
albans, R. Br. Prod. 452.—Afr. austr.
albidiflora, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 46.—Austral.
ambigua, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 346.—Afr. austr.
aurea, R. Br. Prod. 452.—Afr. austr.
Boyeri, Griseb. Gent. Gen. et Sp. 169.—Madag.
brachyphylla, Griseb. l. c. 170.—Madag.
brasiliensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 338 = *Schultesia crenuliflora*.
capitata, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 193.—Afr. austr.
capitata, Schrad. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 52 = *congesta*.
carinata, Spreng. Syst. i. 426 = *Exacum petiolare*.
congesta, Schrad. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 52.—Afr. austr.
cordata, R. Br. Prod. 452.—Afr. austr.
crassulaefolia, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 193.—Afr. austr.
cymosa, Jarosz, Pl. Nov. Cap. 10 = *aurea*.
elongata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 184.—Afr. austr.
emirimensis, Boj. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 53 = *brachyphylla*.
gracilis, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 45 = *ovata*.
gracilis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 338 = *Schultesia gracilis*.
grandis, Steud. Nom. ed. II. ii. 550.—Afr. austr.
guianensis, Spreng. Syst. i. 426 = *Schultesia stenophylla*.
involutrata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 271.—Afr. trop.
jorullensis, Spreng. Syst. i. 426 = *Schultesia stenophylla*.
khasiana, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 428 = *aurea*.
minima, Jarosz, Pl. Nov. Cap. 11 = *aurea*.
Ohlendorffiana, Eckl. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 166 = *Belmontia Ohlendorffii*.
oldenlandioides, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 68 = *Exacum quinquenervium*.
ovata, R. Br. Prod. 452.—Austral.; N. Zel.
pallida, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 185.—Afr. austr.
pentandra, E. Mey. l. c. 184.—Afr. austr.
pnsilla, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 346.—Afr. austr.
Rutenbergiana, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 126.—Madag.
spathulata, Steud. Nom. ed. II. ii. 550.—Afr. anstr.
sulcata, Spreng. Syst. i. 426 = *Exacum pedunculatum*.
sulphurea, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 192.—Afr. austr.
tabularis, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 550 = *sulphurea*.

SEBASTIANA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 389 (1873), err. typ. = **SEBASTIANA**, Bertol. = **Chrysanthellum**, Rich. (Compos.).

SEBASTIANA, Spreng. Syst. iii. 24 (1826) = **Sebastiania**, Spreng. (Euphorb.).

SEBASTIANIA, Bertol. Lucubr. 37 (1822) = **Chrysanthellum**, Rich. (Compos.).
heterophylla, Bertol. l. c. = *C. procumbens*.

SEBASTIANIA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 118. t. 3 (1821). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 336.

ADENOBYNE, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183.

CLONOSTACHYS, Klotzsch, l. c. 185 (1841).

CNEMIDOSTACHYS, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 66. t. 40 (1824).

DITRYSINIA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).

ELACHOCROTON, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 17.

GUSSONIA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 119. t. 2 (1821).

MICROSTACHYS, A. Juss. Euph. Tent. 48. t. 15 (1824).

SAROTHRISTACHYS, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 185.

TRAGIOPSIS, Karst. in C. Koch, Wochenschr. (1859) 5.

actinostemoides, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1184 = *Gymnanthes actinostemoides*.

albicans, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 132.—Cuba.

angustifolia, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1179.—Bras.

anisodonta, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 550.—Bras.

bahiensis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1183.—Bras.

bilocularis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 374.—N. Mexic.

brachyclada, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1178.—Bras.

brachypoda, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 132.—Cuba.

brasiliensis, Spreng. Neue Entdeck. ii. 118.—Bras.

brevifolia, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183.—Bras.

chaetodonta, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 577.—Bras.

Chamaelea, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1175.—Geront. trop.

corniculata, Muell. Arg. l. c. 1168.—Bras.

daphniphylla, Muell. Arg. l. c. 1180.—Bras.

daphnoides, Muell. Arg. l. c. 1167.—Bras.

desertorum, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

dimorphocalyx, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 574.—Bras.

discolor, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1185.—Bras.

ditassoides, Muell. Arg. l. c. 1174.—Bras.

divaricata, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

echinocarpa, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 584.—Bras.

elliptica, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1181.—Jamaic.

foveata, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

Gaudichaudii, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1177.—Bras.

glandulosa, Muell. Arg. l. c. 1186 = *Gymnanthes glandulosa*.

glaucophylla, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 571.—Bras.

granatensis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1189.—N. Granat.

Grisebachiana, Muell. Arg. l. c. 1183.—Ind. occ.

guyanensis, Muell. Arg. l. c.—Guian.

hcteroica, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 708.—Bras.

hypoleuca, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1184 = *Gymnanthes hypoleuca*.

jacobinensis, Muell. Arg. l. c. 1188.—Bras.

Klotzschiana, Muell. Arg. l. c. 1178 = *Gymnanthes marginata*.

Laureola, Muell. Arg. l. c. 1180.—Bras.

ligustrina, Muell. Arg. l. c. 1165.—Am. bor.

longipes, Muell. Arg. l. c. 1184 = *Gymnanthes longipes lucida*, Muell. Arg. l. c. 1181 = *Gymnanthes lucida*.

macrocarpa, Muell. Arg. l. c. 1188.—Bras.

macrophylla, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

marginata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1166.—Bras.

SEBASTIANIA :—

membranifolia, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 579.—Bras.

mucronata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1180 = *Schottiana*.

multiramea, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 53; Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1177.—Bras.; Afr. occ.

myricifolia, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 132.—Cuba.

nervosa, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1183.—Bras.

oleoides, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 548.—Bras.

pachystachys, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1182.—Bras.

pallens, Muell. Arg. l. c. 1189 = *Gymnanthes pallens*.

Pavoniana, Muell. Arg. l. c.—Mexic.

phyllanthiformis, Muell. Arg. l. c. 1176 = *Schottiana*.

pteroclada, Muell. Arg. l. c. 1190.—Bras.

reticulata, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183.—Bras.

rhombifolia, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 590.—Bras.

Riedelii, Muell. Arg. l. c. 578.—Bras.

rigida, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1180.—Bras.

riparia, Muell. Arg. l. c. 1185 = *Excoecaria potamo-*

philica, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 713 = *Gymnanthes riparia*.

Schlechtendalliana, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1181 = *Gymnanthes riparia*.

Schottiana, Muell. Arg. l. c. 1176.—Bras.

serrata, Muell. Arg. l. c. 1179.—Bras.

serrulata, Muell. Arg. l. c. 1167.—Bras.

stipulacea, Muell. Arg. l. c. 1176.—Bras.

Treculiana, Muell. Arg. l. c. 1165.—Am. trop.

trinervia, Muell. Arg. l. c. 1182.—Bras.

vestita, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 575.—Bras.

viminea, Nees, in Flora, iv. (1821) 328 = *Gymnanthes riparia*.

virgata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1173.—Bras.

Weddelliana, Muell. Arg. l. c. 1188.—Bras.

Widgreni, Muell. Arg. l. c. 1178.—Bras.

ypamensis, Muell. Arg. l. c. 1179.—Bras.

SEBASTIANO-SCHAUERIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 158 (1847). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1098.

oblongata, Nees, l. c. 159.—Bras.

SEBEEKIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 550 (1841), sphalm. = seq.

SEBEOKIA, Neck. Elem. ii. 13 (1790) = **Gentiana**, Linn.

SEBESTEN, Adans. Fam. ii. 177 (1763) = seq.

SEBESTENA, [Dill.] Gaertn. Fruct. i. 364. t. 76. f. 1 (1788) = **Cordia**, Linn. (Borag.).

glomerata, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) sub t. 326 = *C. glomerata*.

indica, Rafin. Sylva Tellur. 38 = *C. Myxa*.

officinalis, Gaertn. Fruct. i. 364. t. 76 = *C. Myxa*.

repanda, Rafin. Sylva Tellur. 38 (Quid?).—Hab. ?

scabra, Rafin. l. c. = *C. scabra*.

senegalensis, Rafin. l. c. 39 = *C. senegalensis*.

SEBIFERA, Lour. Fl. Cochinch. 637 (1790) = **Litsea**, Lam. (Laurin.).

Balongay, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 820 = *L. ligustrina*.

glutinosa, Blanco, l. c. 819 = *L. Sebifera* ?

glutinosa, Lour. Fl. Cochinch. 638 = *L. Sebifera*.

SEBIPIRA, Mart. Reise Bras. ii. 787 (1828) = **Bowdichia**, H. B. & K. (Legumin.).

ferruginea, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 387 = *B. virgilioides*.

major, Mart. ? ex Vog. l. c. 386 = *B. virgilioides*.

SEBIZIA, Mart. ex Meissn. Gen. Comm. 376 (1843). Gen. **AMPELIDEARUM**, nondum descr.

SEBOPHORA, Neck. Elem. ii. 188 (1790) = **Myristica**, Linn.

SEBORIUM, Rafin. Sylva Tellur. 63 (1838) = **Stillingia**, Linn. (Euphorb.).

chinense, Rafin. l. c. = *Sapium sebiferum*.

nutans, Rafin. l. c. = *St. nutans*.

SECALE, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 17 (1737). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1203.

aestivum, Uspensky, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vii. (1834) 368 = *cereale* ?

anatolicum, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 76 = *cereale*.

arundinaceum, Trautv. Schilfroegen (1840), t. 1, 2; ex Steud. Syn. Pl. Gram. 347.—Hab. ?

barbatum, Moench, Meth. Suppl. 59 = *cereale*.

bromoides, Linn. Herb. ex Munro, in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 47 = *Brachypodium distachyum*.

campestre, Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 197 = *fragile*.

cereale, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 84 = *fragile*.

cereale, Linn. Sp. Pl. 84.—Oriens.

compositum, Poir. Encyc. vii. 54 = *cereale*.

cornutum, Offic. ex Nees, Duesseld. Samml. Suppl. t. 74; ex Pritz. Ic. Ind. i. 1013 = *Claviceps purpurea* (Crypt.).

creticum, Linn. Sp. Pl. 84 = *Triticum creticum*.

creticum, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. i. 449 = *cereale*.

dalmaticum, Vis. Fl. Dalm. i. 97.—Dalmat.

fragile, Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl. 93.—Europ.; As. temp.

glaucum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 268 = *fragile*.

hirtum, Poir. Encyc. vii. 55 = *Agropyron orientale*.

hybernum, Poir. l. c. 54 = *cereale*.

montanum, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825); ex ej. Fl. Sic. Prod. i. 145 = *cereale*.

orientale, Linn. Sp. Pl. 84 = *Agropyron orientale*.

orientale, Schreb. ex Roth, Nov. Pl. Sp. 59 = *Hordeum bifarium*.

prostratum, Pall. Reise, i. 485 = *Agropyron triticeum*.

pumilum, Pers. Syn. i. 109 = *Agropyron triticeum*.

pungens, Pers. l. c. 108 = *Agropyron patulum*.

reptans, Pall. Reise, i. 168 = *Agropyron triticeum*.

sibiricum, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 714.—Sibir.

spontanum, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 757 = *fragile*.

strictum, Presl, Fl. Sic. p. xlvii = *cereale*.

sylvestre, Host, Gram. iv. 7. t. 11 = *fragile*.

triflorum, Beauv. Agrost. 105, 178 (Index) = *cereale*.

vernum, Poir. Encyc. vii. 54 = *cereale*.

villosum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 46 = *Elymus europaeus*.

villosum, Linn. Sp. Pl. 84 = *Agropyron villosum*.

SECALIDIUM, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 91 = **Agropyron**, J. Gaertn. (Gramin.).

pectinatum, Schur, Enum. Pl. Transs. 807 = *A. cristatum*.

pilosum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 91 = *A. cristatum*.

SECAMONE, R. Br. in Mém. Wern. Soc. i. (1809) 55. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 746.

acutifolia, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 76.—Afr. austr.

aegyptiaca, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 75 = *Oxystelma esculentum*.

Alpini, Schult. Syst. vi. 125 = *Oxystelma esculentum*.

amygdalina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 313.—Java; Sumatra.

angustifolia, Decne. in DC. Prod. viii. 502.—Madag.

attenuata, Decne. l. c. 501 = *elliptica*.

auriculata, Blume, Bijdr. 1051.—Java.

bicolor, Decne. in DC. Prod. viii. 503.—Madag.

Blumei, Decne. l. c. 502.—Java.

buxifolia, Decne. l. c.—Madag.

canescens, Sm. in Rees, Cycl. xxxii. n. 3 = *Leptadenia reticulata*.

crassifolia, Wall. ex Decne. in DC. Prod. viii. 506 = *Genianthus crassifolius*.

elliptica, R. Br. Prod. 464.—Austral.; Ins. Philipp.

emetica, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 56.—Ind. or.

emetica, F. Muell. Fragm. v. 161 = *elliptica*.

Finlaysoni, Wight, Contrib. 61.—Siam.

frutescens, Decne. in DC. Prod. viii. 501 = *Astephanus frutescens*.

fulva, Blume, ex Decne. l. c. 506 = *Toxocarpus Blumei*.

insularis, Aliq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 557.—Ins. Sunda.

SECAMONE:—

- lanceolata, *Blume, Bijdr.* 1051.—Java.
ligustrifolia, *Decne. in DC. Prod.* viii. 502.—Madag.
lineata, *Blume, Bijdr.* 1051.—Java.
macrophylla, *Blume, l. c.* 1050.—Java.
macrostachya, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) i. 252.—Ins. Philipp.
maritima, *Blume, Bijdr.* 1050.—Java.
mauritanica, G. Don, in *Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 469 = *Tylophora laevigata*.
micrantha, *Decne. in DC. Prod.* viii. 501.—Ins. Timor.
multiflora, *Decne. l. c.*—Ins. Philipp.
myrtifolia, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 453.—Afr. trop.
obovata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 503.—Madag.
occidentalis, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 34.—Ind. occ.
oleaeifolia, *Decne. in DC. Prod.* viii. 503.—Madag.
ovata, *R. Br. Prod.* 464.—Austral.
punctulosa, *Decne. in DC. Prod.* viii. 502.—Afr. trop.
saligna, *Decne. l. c.* 503.—Ins. Mascar.
socotrana, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 79.—Ins. Socotra.
tenuifolia, *Decne. in DC. Prod.* viii. 503.—Madag.
Thouarsii, *Decne. l. c.* 502.—Madag.
Thunbergii, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 220.—Afr. austr.
timorensis, *Decne. in DC. Prod.* viii. 502.—Ins. Timor.
uniflora, *Decne. l. c.* 503.—Madag.
vestita, *Zipp. ex Span. in Linnaea*, xv. (1841) 324, nomen.—Ins. Timor.
villosa, *Blume, Bijdr.* 1050 = *Toxocarpus villosus*.

SECHIOPSIS, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V.* vi. (1866) 23. *CUCURBITACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 838.
triqueter, *Naud. l. c.* 24.—Mexic.

SECHIUM, *P. Br. Hist. Jamaic.* 355 (1756). *CUCURBITACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 837.
CHAYOTA, *Jacq. Select. Am. ed. Pict. t.* 245 (1780).
CHOCHO, *Adans. Fam.* ii. 500 (1763).
amazonicum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 57 = *Cayaponia amazonica*.
americanum, *Lam. Encyc.* vii. 50 = edule.
Chayota, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 491, in syn. = edule.
edule, *Sw. Fl. Ind. Occ.* ii. 1150.—Ind. occ.
palmatum, *Ser. in DC. Prod.* iii. 313 = *Microsechium palmatum*.
peruvianum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 56. t. 176 = *Cayaponia peruvianum*.

SECONDATIA, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 445 (1844). *APOCYNACEAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 723.
arborea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 110.—Bras.
densiflora, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 445.—Bras.
difformis, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 710, 723 = *Trachelospermum difforme*.
ferruginea, *Miers, Apocyn. S. Am.* 227 = *Echites ferruginea*.
floribunda, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 446.—Bras.
foliosa, *A. DC. l. c.*—Bras.
peruviana, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 71. t. 281.—Peruv.
Schlimiana, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxx. (1859–60) 416.—N. Granat.

SECRETANIA, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. ii. 227 (1866) = *Hyeronyma*, *Allem. (Euphorb.)*.
loranthacea, *Muell. Arg. l. c.* 228.—Guian.

SECURIDACA, *Linn. Gen. ed.* II. 347 (1742). *POLYGALEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 138.
CORYTHOLOBIUM, *Mart. ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 93.
ELSOTA, *Adans. Fam.* ii. 358 (1763).
LOPHOSTYLIS, *Hochst. in Flora*, xxv. (1842) 229.
RODSCHIEDIA, *Miq. in Linnaea*, xviii. (1844) 585.
acuminata, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 70.—Bras.
acuminata, *Schlecht. in Linnaea*, xiv. (1840) 382 = *Schlechtendalliana*.
affinis, *Bernh. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 360.—Guian.
angustifolia, *Miq. in Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 152 = *longepedunculata*.

SECURIDACA:—

- atropurpurea, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 359.—N. Granat.
bialata, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 162.—Bras.
bracteata, *A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 208.—Malacca.
brasiliensis, *Spreng. Syst.* iii. 175.—Bras.
Brownii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 30.—Jamaica.
cappariifolia, *Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 66 = *longifolia*.
complicata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 423.—Venezuela.
coriacea, *Bonpl. ex Steud. Nom. ed.* II. ii. 551 = *volubilis*.
coriacea, *Walp. Rep. i.* 247 = *Seguieria coriacea*.
corymbosa, *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xvii. (1862) 135.—N. Granat.
corymbosa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 360 = *Cumingii*.
Corytholobium, *A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 68.—Bras.
Cumingii, *Hassk. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 190.—Ins. Philipp.
dasycarpa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 359.—N. Granat.
declinata, *Vell. Fl. Flum.* 294; vii. t. 73 = *tomentosa*.
decora, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 66.—Peruv.
divaricata, *Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 25 = *rivinaefolia*.
elliptica, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 358.—Cuba.
erecta, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 27.—Ind. occ.
erecta, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 992 = *volubilis*.
erecta, *Vell. Fl. Flum.* 294; vii. t. 72 = *lanceolata*.
flexuosa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 560 = *lanceolata*.
floribunda, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 135 = *Welwitschii*.
floribunda, *Walp. Rep. i.* 247 = *Seguieria floribunda*.
Goudotiana, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xvii. (1862) 135.—N. Granat.
hebeclada, *DC. Prod.* i. 341.—Bras.
Hostmanni, *Miq. in Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 153; *Stirp. Surin. Sel.* 30.—Guian.
inappedunculata, *Hassk. Pl. Jav. Rar.* 295; *Cat. Hort. Bog. Alt.* 227 = *tavoyana*.
incrassata, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1097, nomen.—Guian.
Lamarckii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 30.—Ind. occ.
lanceolata, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 69.—Bras.
lateralis, *A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 68.—Bras.
latifolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 104 = *longifolia*.
longepedunculata, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 275.—Abyss.
longifolia, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 66.—Bras.
longifolia, *Walp. Rep. i.* 247 = *Seguieria longifolia*.
Luschathiana, *Presl, Bot. Bemerk.* 17 = *tomentosa*.
macrocarpa, *A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 63.—Bras.
macrophylla, *Walp. Rep. i.* 247 = *Seguieria macrophylla*.
macrostachya, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 560.—Ins. S. Vincent.
major, *Sagot, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 64.—Guian.
marginata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 103.—Guian.
Martiana, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. i. (1863) 559 = *volubilis*.
mollis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 421 = *volubilis*.
obcordata, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 358.—Cuba.
oblongifolia, *Benth. & Hook. f. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 586.—Afr. austr.
ovalifolia, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 68.—Bras.
paniculata, *Poir. Encyc.* vii. 52 = *volubilis*.
paniculata, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 111.—Guian.
paniculata, *Roxb. ex Wall. Cat. sub n.* 4195 = *tavoyana*.
paniculata, *Roxb. Hort. Beng.* 53; *Fl. Ind.* iii. 219 = *scandens*.

SECURIDACA:—

- parvifolia, *Spruce, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 65 = *rivinaefolia*.
parvifolia, *Walp. Rep. i.* 247 = *Seguieria parvifolia*.
pendula, *Bonpl. ex Steud. Nom. ed.* II. ii. 551 = *complicata*.
polylopha, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 360.—Bras.
pubescens, *DC. Prod.* i. 341.—Guian.
pubescens, *Seem. Bot. Voy. Herald.* 80 = *volubilis*.
pubiflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 104 = *longifolia*.
reticulata, *Presl, Bot. Bemerk.* 17 = *rivinaefolia*.
retusa, *Benth. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 210.—Bras.
retusa, *Spruce, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 67.—Bras.
rivinaefolia, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 69.—Bras.
rufescens, *Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xvii. (1862) 134.—N. Granat.
rufescens, *Sond. in Linnaea*, xxii. (1849) 546 = *tomentosa*.
scandens, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 4195 = *tavoyana*.
scandens, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 27.—Ind. occ.
scandens, *Lam. Encyc.* vii. 51 = *Lamarckii*.
scandens, *Tussac, Fl. Antill.* iv. t. 20 = *virgata*.
scandens, *Vell. Fl. Flum.* vii. t. 60 = *rivinaefolia*.
Schlechtendalliana, *Walp. Rep. i.* 246.—Mexic.
Schlimii, *Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xvii. (1862) 135.—N. Granat.
Sellowiana, *Klotzsch, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 63.—Bras.
sulcata, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1006, nomen.—Guian.
surinamensis, *Miq. in Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 153.—Guian.
sylvestris, *Schlecht. in Linnaea*, xiv. (1840) 381.—Mexic.
tavoyana, *Wall. Cat. n.* 4196.—Ind. or.; *Malaya*.
tomentosa, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 71. t. 96.—Bras.
virgata, *Macfad. Fl. Jamaic.* i. 49 = *Brownii*.
virgata, *Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk.* 17 = *volubilis*.
virgata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 104.—Ind. occ.
volubilis, *Blanco, Fl. Filip. ed. I.* 556 = *tavoyana*.
volubilis, *Linn. Sp. Pl.* 707.—Am. austr.
Welwitschii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 135.—Afr. trop.

SECURIDACA, *Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed.* VI (1752) = **Securigera**, *DC. (Legumin.)*.
legitima, *Gaertn. Fruct.* ii. 337. t. 153. f. 3 = *Securigera Coronilla*.
lutea, *Mill. Gard. Dict. ed.* VIII = *Securigera Coronilla*.
vera, *Hort. ex Steud. Nom. ed.* I. 758 = *Securigera Coronilla*.

SECURIDAEA, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 559 (err. typ.) = **Securidaca**, *Linn. (Polygal.)*.

SECURIGERA, *DC. Fl. Fr.* iv. 609 (1805). *LEGUMINOSAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 489.
BONAVERIA, *Scop. Intro.* 310 (1777), nomen prius.
SECURIDACA, *Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed.* VI (1752).
SECURILLA, *Gaertn. ex Steud. Nom. ed.* I. 228 (1821).
SECURINA, *Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 368.
atlantica, *Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov.* (1852) 41 = *Coronilla atlantica*.
Brownii, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 702, sphalm. = *Securidaca Brownii*.
Coronilla, *DC. Fl. Fr.* iv. 609.—Europ. austr.
grandiflora, *Boiss. Diagn. Ser. I.* v. 88 = *Coronilla grandiflora*.
Lamarckii, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 702, sphalm. = *Securidaca Lamarckii*.
legitima, *Desv. in Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 301 = *S. Coronilla*.
Securidaca, *supra*, i. p. 620, lapsu = *S. Coronilla*.

SECURILLA, Gaertn. ex Steud. Nom. ed. I. 228 (1821) = *Securigera*, DC. (Legumin.).
Securidaca, Gaertn. ex Steud. l. c. = *Securigera* Coronilla.

SECURINA, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 368 = *Securigera*, DC. (Legumin.).
lutea, Medic. l. c. 369 = *Securigera* Coronilla.

SECURINEGA, Comm. ex Juss. Gen. 388 (1789).
 EUPHORBACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 275.

BESSERA, Spreng. Pugill. ii. 90 (1815).
 COLMEIROA, Reut. in Mém. Soc. Phys. Genève. x. (1843) 240. t. 6.

GEBLERA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 28 (1835).

MEINECKIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 586 (1858).
 PLEIOSTEMON, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 135.

abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 256 = *Fluggea microcarpa*.

Acidothamnus, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 451. —Ind. occ.

Bailloniana, Muell. Arg. l. c. —Afr. trop.
 buxifolia, Muell. Arg. l. c. 452. —Europ. austr.

Commerstonii, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 768, nomen = durissima.

congesta, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 76. —Bras.

durissima, J. F. Gmel. Syst. 1008. —Ins. Borbon.
 elliptica, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 448. —Am. centr.

flexuosa, Muell. Arg. l. c. 450. —Ins. Philipp.

fluggeoides, Muell. Arg. l. c. —Japon.

grisea, Muell. Arg. l. c. 451. —Reg. Himal.

Hilariana, Muell. Arg. l. c. 1273. —Bras.

hysterantha, Boj. Hort. Maurit. 278 = *Phyllanthus indicus*.

japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 128 = *fluggeoides*.

Leucopyrus, Brand. Forest Fl. 456 = *Fluggea microcarpa*.

Leucopyrus, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 451 = *Fluggea Leucopyrus*.

microcarpa, Muell. Arg. l. c. 434–6, passim = *obovata*.

Muelleriana, Baill. Adansonia, vi. (1865–66) 333 = *Neoroepa buxifolia*.

nitida, Lindl. Coll. Bot. t. 9 (= *Lithoxylon Lindleyi*). —Ins. Tahiti.

nitida, Willd. Sp. Pl. iv. 761 = *durissima*.

obovata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 449 = *Fluggea microcarpa*.

phyllanthoides, Muell. Arg. l. c. 448. —Arab.

ramiflora, Muell. Arg. l. c. 449. —As. or.

Schuechiana, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 78. —Bras.

Schweinfurthii, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 411. —Ins. Socotr.

trichogynis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 447. —Madag.

virosa, Baill. Adansonia, vi. (1865–66) 334 = *Fluggea Leucopyrus*.

EDDERA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 7. t. 5 = *Breweria*, R. Br. (Convolv.).

arabica, Choisy, in DC. Prod. ix. 441. —Arab.

Bottae, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 108. t. 371. —Arab.

evolvuloides, Wight, Ic. t. 1369 = *B. evolvuloides*.

intermedia, Hochst. & Steud. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 8 = *B. intermedia* (in Addend.).

latifolia, Hochst. & Steud. l. c. = *B. latifolia*.

secundiflora, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 110. t. 372. —Arab.

virgata, Hochst. & Steud. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 8 = *B. virgata*.

SEDGWICKIA, Griff. in As. Res. xix. (1836) 98. t. 15 = *Altingia*, Noronha (Hamamel.).

cerasifolia, Griff. l. c. 99. t. 15 = *A. excelsa*.

SEDUM, Adans. Fam. ii. 248 (1763 = *Sempervivum*, Rupp. (Crassul.).

SEDUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). CRASSULACEAE, Benth. & Hook. f. i. 659.

AITHALES, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 178 (1836 ?).

ANACAMPSEOS, Haw. Syn. Pl. Succ. 111 (1812).

CEPAEA, Caesalp. ex Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 384.

ENCHYLUS, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).

LEUCOSEDEM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 384.

RHODIA, Linn. Syst. ed. I (1735).

RHODIOLA, Linn. Gen. ed. I. 318 (1737).

PROCRASSULA, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 323 (1843).

TELMISSA, Fenzl, Pugill. Pl. Syr. 14 (1842).

TETRADIIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 321 (1867).

acre, Linn. Sp. Pl. 432. —Europ.; As. bor.

acutifolium, Ledeb. Fl. Ross. ii. 187. —As. Min.

adenotrichum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 101, partim = *Griffithii*.

adenotrichum, Wall. Cat. n. 7231. —Reg. Himal.

aestivum, All. Fl. Pedem. ii. 121 = *annuum*.

actense, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 826. —Sicil.

affine, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 122 = *S. Telephium*.

aizoides, DC. Pl. Grass. t. 4 = *Sempervivum aizoides*.

aizoides, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 371. —Hab. ?

Aizoon, Linn. Sp. Pl. 430. —Sibir.

Aizoon, Sibth. Herb. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 961 = *Trachelium Jacquinii*.

albellum, Willk. in Willk. et Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 141 = *album*.

Alberti, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 299. —Turkestan.

albescens, Haw. Rev. Pl. Succ. 28 = *rupestre*.

albicans, Steud. Nom. ed. I. 753 = *S. Telephium*.

alborosum, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 33. —Japon.

album, Eichw. Beschr. Casp.-Cauc. 31 = *acutifolium*.

album, Linn. Sp. Pl. 432. —Europ.; As. bor.

Alfredi, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 7. —China.

algidum, Ledeb. Fl. Alt. ii. 194. —Turkestan.; Sibir.

alpestre, Vill. Prosp. 49; Hist. Pl. Dauph. iii. 684. —Mont. Pyren.

alsinefolium, All. Fl. Pedem. ii. 119 = *S. Cepaea*.

altaicum, G. Don, Gen. Syst. iii. 114. —Sibir.

altissimum, Poir. Encyc. iv. 634 = *nicacense*.

altum, Clarke, Trav. ii. 420 = *nicacense*.

americanum, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 324 = *ternatum*.

amplexicaule, DC. Rapp. Voy. ii. 80; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 526. —Reg. Mediterr.

Anacampseros, Linn. Sp. Pl. 430. —Europ.

anatolicum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 41 = *S. Listoniae*.

andegavense, DC. Prod. iii. 406. —Europ. austr.

Andersonii, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 184 = *hispanicum*.

andinum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 38. —Peruv.

anglicum, Huds. Fl. Angl. ed. II. 196. —Europ.

angulatum, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 717 = *album*.

angustum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 138. —China.

annuum, All. Fl. Pedem. ii. 122 = *alpestre*.

annuum, Gunn. ex DC. Prod. iii. 405 = *anglicum*.

annuum, Linn. Sp. 432. —Europ.; As. Min.; Groenl.

anopetalum, DC. Rapp. Voy. ii. 80; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 526. —Europ. austr.; As. Min.

arboresum, Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 717. —Hab. ?

arboresum, Orteg. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552 = *Crassula portulacae*.

arduennense, Callay, ex Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 126 = *S. Telephium*.

arenarium, Brot. Fl. Lusit. ii. 212 = *anglicum*.

argutum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 179. —Mont. Carpath.

aristatum, Tenore, Fl. Nap. i. 250 = *hispanicum*.

aristatum, Vill. Hist. Pl. Dauph. iv. 680. t. 45 = *anopetalum*.

armenum, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. ii. 61 = *hispanicum*.

arrigenes, Gren. ex Nym. Consp. 261 = *rupestre*.

asiaticum, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 162 = *heterodontum*.

SEDUM:—

asiaticum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 188; DC. Prod. iii. 401. —Reg. Himal.

assyriacum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 55. —Syria; Assyria.

athoma, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1621, sphalm. = *seq.*

athoum, DC. Prod. iii. 407 = *album*.

atlanticum, Pers. Syn. i. 513 = *hispidum*.

atratum, Aubry, ex DC. Prod. iii. 405 = *anglicum*.

atratum, Bast. Fl. Maine-et-Loire, 167 = *andegavense*.

atratum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1673. —Europ. med.

atratum, Lucé, Fl. Osil. 143 = *annuum*.

atratum, Willem. ex Steud. Nom. ed. I. 758 = *villosum*.

atropurpureum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 70. —Sibir.

aureum, Wirtg. ex F. Schultz, Arch. Fl. 200; et Fl. Preuss. Rheinprov. 184 = *pruinatum*.

azureum, Desf. Fl. Atlant. i. 362 = *coeruleum*, Vahl.

azureum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 222. t. 48. f. 2 = *Ewersii*.

balticum, Hartm. f. Skand. Fl. ed. IX. 128 = *album*.

Baselicis, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552, nomen. —Neapol.

Batesii, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 12. —Mexic.

Beyrichianum, Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 376. —Hab. ?

bicolor, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 45. —Venezuela.

bithynicum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 17 = *hispanicum*.

Bohuslawii, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. vii. 18. —Ross.

boloniense, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 327 = *sexangulare*.

Boryanum, DC. Prod. iii. 410. —Hispan.

Botterii, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 10. —Mexic.

Bourgaisi, Hemsl. l. c. 11. —Mexic.

bracteatum, Viv. Fl. Lib. Spec. 24. t. 8. f. 3. —Afr. bor.

brevifolium, DC. Rapp. Voy. ii. (1808) 79; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 524. —Reg. Mediterr. occ.

Brunfelsii, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 121 = *S. Telephium*.

Bulliardii, Bor. l. c. 123 = *S. Telephium*.

bupleuroides, Wall. Cat. n. 7229. —Reg. Himal.

caeruleum, Linn. Mant. ii. 241 (Quid ?). —Afr. austr.

caesium, Bor. ex Pévard, in Bull. Soc. Bot. Fr. xviii. (1871) 325. —Gallia.

caespitosum, DC. Prod. iii. 405. —Reg. Mediterr. et Cauc.

calabricum, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552, nomen. —Ital.

Callayanum, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 127 = *S. Telephium*.

callichroum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 56. —Persia.

Calvertii, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 62 = *acutifolium*.

capense, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 13. —Afr. austr.

capitatum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 222, nomen. —Reg. Himal.

cariense, Jaub. & Spach, Illustr. i. 16. t. 7 = *Listoniae*.

carinatum, Link, ex Spreng. Syst. ii. 435 = *amplexicaule*.

Carioni, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 126 = *S. Telephium*.

carpathicum, Reuss, Kvét. Slov. (1853) 162 = *S. Telephium*.

Cepaea, Linn. Sp. Pl. 431. —Europ.

cepaueum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *praece*.

cespitosum, Boiss. Fl. Orient. ii. 794 = *caespitosum*.

chrisianum, Hort. Flor. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 717 (an *Clusianum* ?) = *album*.

chrysastrum, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 6. —China.

ciliare, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 179 = *dentatum*.

Clusianum, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 516 = *album*.

coccineum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 223. t. 48. f. 3 = *quadridum*.

coerulescens, Haw. in Phil. Mag. (1825) 174 = *stenopetalum*.

coeruleum, Vahl, Symb. Bot. ii. 51. —Reg. Mediterr.

coeruleum, Webb, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 140 = *dasyphyllum*.

cognense, Muell. Arg. in Compt.-Rend. Soc. Hallér. (1854–56) 130 = *villosum*.

collinum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 24 = *rupestre*.

commutatum, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552 = *andegavense*.

SEDUM:—

complanatum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 181 = S. Telephium.
confertiflorum, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 15.—As. Min.
confertum, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 253 = S. Telephium.
confertum, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 62.—Aegypt.
confusum, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 10.—Mexic.
congestum, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 779 = crenatum.
controversum, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 125 = S. Telephium.
Cooperi, Clémenc. in Rev. Hort. (1868) 474.—Hab.?
cordifolium, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 34.—Hab.?
coriaceum, Wall. Cat. n. 7238.—Reg. Himal.
corsicum, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 202 = dasyphyllum.
corymbiferum, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 122 = S. Telephium.
Cotyledon, Jacq. f. Eclog. Pl. i. 27. t. 17 = Cotyledon caespitosa.
Cotyledon, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273 = creticum.
crassicaule, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 438 = rupestre.
crassipes, Wall. Cat. n. 7234 = asiaticum.
crenatum, Boiss. Fl. Orient. ii. 779.—Armenia.
crenulatum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 96.—Reg. Himal.
creticum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 16.—Ins. Creta.
creticum, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273.—Ins. Creta.
cristatum, Schrad. Hort. Gotting. 16 = rupestre.
cruciatum, Desf. Tabl. ed. I. 162 = monregalense.
cupressoides, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 11.—Mexic.
cyanum, Rudolph, in Mém. Acad. Pétersb. iv. (1811) 341.—Sibir.
dasyphyllum, Linn. Sp. Pl. 431.—Europ.; Afr. bor.
debile, S. Wats. in Bot. King's Exp. 102.—Am. bor. occ.
decumbens, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 142 = S. Telephium.
deficiens, Donn, Hort. Cantab. ed. VI. 126 = ternatum.
deltoidum, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxvi = stellatum.
dendroidum, Moç. & Sessé, ex DC. Prod. iii. 409.—Mexic.
dentatum, DC. Prod. iii. 403.—Reg. Cauc.
dentatum, Steph. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 549 = Stephani.
denticulatum, Donn, Hort. Cantab. ed. VIII. ex DC. Prod. iii. 403 = oppositifolium.
dioicum, Donn, l. c. ed. III. 84 = nicaeense.
dioicum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 549 = roseum, Scop.
divaricatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 108 = Sempervivum aizoides.
divaricatum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 260 = annum.
divaricatum, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 185 = sempervivoides.
divaricatum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 372.—Am. bor. occ.
divergens, S. Wats. l. c.—Am. bor. occ.
dodecandrum, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 138 = pruinatum.
dolomiticum, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 626 = nicaeense.
Douglasii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 228.—Am. bor. occ.
Douglasii, S. Wats. in Bot. Calif. i. 210 = radiatum.
drymarioides, Hance, in Seem. Journ. Bot. iii. (1865) 379.—China.
dumulosum, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 129.—China.
ebracteatum, [Moç. & Sessé] ex DC. Prod. iii. 409.—Mexic.
edule, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 560 = Cotyledon edulis.
elatinoides, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 131.—China.
elegans, Lej. Fl. Spa, i. 205 = pruinatum.
ellipticum, Miègev. Bull. Soc. Bot. Fr. xiv. (1867) 145.—Mont. Pyren.
elongatum, Ledeb. Fl. Alt. ii. 193 = roseum, Scop.
elongatum, Wall. Cat. n. 7233; Hook. f. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 98.—Reg. Himal.

SEDUM:—

engadinense, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 96.—Europ.
epidendrum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 314.—Abyss.
eriocarpum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 310; et Fl. Graec. v. 36. t. 449 = hispanicum.
erraticum ×, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 58, 96.—Europ.
erythraeum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 326.—Macedon.
erythromelanium, Fr. Braun, ex Nym. Consp. 260 = maximum.
erythrostictum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 155 = S. Telephium.
euphorbioides, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 177.—Sibir.
Ewersii, Ledeb. Fl. Alt. ii. 191.—Reg. Himal.; Sibir. altaic.
Fabaria, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 258 = S. Telephium.
Fabaria, Vilm. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 811 = spectabile.
fabarium, Hort. Angl. ex Lem. Illustr. Hort. viii. (1861) t. 271 = spectabile.
farinosum, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 31.—Ins. Mader.
fastigiatum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 98.—Reg. Himal.
filiforme, Poir. Encyc. Suppl. iv. 210 = hispidum.
fimbriatum, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 128 = Cotyledon fimbriata.
formosanum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1885) II. 134.—Ins. Formosa.
Forsteri, Haw. Syn. Pl. Succ. 117 = pruinatum.
Forsterianum, Reichb. Pl. Crit. ix. 15 = sexangulare.
Forsterianum, Sm. Engl. Bot. t. 1802 = pruinatum.
fragile, Dum. Fl. Belg. Prod. 85.—Belgium.
fruticulosum, Brot. Fl. Lusit. ii. 206 = nicaeense.
Funkii, Reichb. Fl. Germ. Excurs. Index 117, sphalm. = Sempervivum Funkii.
fuscum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 395.—Mexic.
fusiforme, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 31. t. 3. f. 1.—Ins. Mader.
galioides, All. Fl. Pedem. ii. 120. t. 65. f. 3 = S. Cepaea.
gelidum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 355.—Sibir. altaic.
Gerardianum, Wall. Cat. n. 7235; Royle, Illustr. Bot. Himal. 222 = Ewersii.
glaciale, Clarion, ex DC. Fl. Fr. iv. 393 = acre.
glanduliferum, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 519 = dasyphyllum.
glandulosum, Moris, Stirp. Sard. Elench. 20.—Ins. Sardoia.
glandulosum, Walp. Rep. v. 795 = Telephium glandulosum.
glaucum, Lam. Fl. Fr. iii. 84 = dasyphyllum.
glaucum, Mayer, ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 226 = pallidum.
glaucum, Sm. Engl. Fl. ii. 321 = rupestre.
glaucum, Walst. & Kit. Pl. Kar. Hung. ii. 198. t. 181 = hispanicum.
globiferum, Pall. Reise, i. 256 = Sempervivum globiferum.
globiferum, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 327 = brevifolium.
globulifolium, Moris, ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 269, nomen.—Europ.
gracile, DC. ex Steud. Nom. ed. I. 759 = dasyphyllum.
gracile, Haensel. ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 312.—Hispan.
gracile, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 150.—Reg. Cauc.
grandidentatum, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 124 = S. Telephium.
graniticum, Pérard, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 186 = rupestre.
granulatum, Salisb. Prod. 307 = dasyphyllum.
Greggii, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 12.—Mexic.
Griffithii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 421.—Reg. Himal.
Grisebachii, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 61.—Graecia.
guatemalense, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 11.—Guatemala.
guestphalicum, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 550 = S. Telephium.

SEDUM:—

Guertardi, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 678. t. 45 = anglicum, alpestre.
gypsicolum, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 13.—Hispan.
haematodes, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = telephioides?
haematodes, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 323 = atratum.
haematodeum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = praec.
heptapetalum, Fisch. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 138.—Rossia.
heptapetalum, Poir. Voy. Barb. ii. 169 = coeruleum, Vahl.
heterodontum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 95.—Reg. Himal.
hexangulare, J. B. Fisch. Naturg. von Livl. 498 = sexangulare.
hexangulare, Frivald. ex Nym. Consp. 264 = annum.
hexapetalum, Haw. Rev. Pl. Succ. 26.—Hab.?
Hillebrandii, Fenzl, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vi. (1856) 449 = sexangulare.
himalayanum, Wall. Cat. n. 7236 = seq.
himalense, D. Don, Prod. Fl. Nep. 212.—Reg. Himal.
hirsutum, All. Fl. Pedem. ii. 122. t. 65. f. 5.—Europ. austr.
hirsutum, Brot. Fl. Lusit. ii. 212 = anglicum.
hispanicum, DC. Fl. Fr. iv. 395 = anopetalum.
hispanicum, Linn. Cent. Pl. i. 12; Amoen. Acad. iv. 273.—Europ. austr.; As. Min.
hispidum, Desf. Fl. Atlant. i. 361.—Afr. bor. occ.
hispidum, Poir. Encyc. iv. 633 = hirsutum.
Hudsonianum, Lange.—Cf. Linnaea, xxix. (1857–58) 736 = anglicum.
humile, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 99.—Reg. Himal.
hungaricum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 208 = hispanicum.
hybridum, Linn. Sp. Pl. 431.—Sibir.
hybridum, Trautv. & C. A. Mey. in Middend. Reise, (Fl. Ochot. 40) = Middendorffianum.
hybridum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 307 = stoloniferum.
hypericifolium, Wall. Cat. n. 7237 = himalense.
ibericum, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 312 = stoloniferum.
imbricatum, Walp. Ann. i. 325; Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 101 = roseum, Scop.
incertum, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 11.—Mexic.
insulare, Moris, Enum. Sem. Hort. Taurin. (1861) 33.—Ins. Sardoia.
intermedium, Déségl. ex Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 123 = S. Telephium.
intermedium, Rupr. Fl. Ingr. 404.—Reg. Cauc.
involutum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 352.—Reg. Cauc.
Jacquini, Haw. in Phil. Mag. (1825) 174 = nicaeense.
Jaeschkei, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 240.—Reg. Himal.
japonicum, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 156.—China; Japon.
Jullianum, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 117 = S. Telephium.
kagamontanum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 137.—Japon.
kamtschaticum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vii. 54.—As. or.
kamtschaticum, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 268 = Selskianum.
Kirilowii, Regel, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 92.—Soongar.; Turkestan.
kokanicum, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 26.—Kokan.
Kotschyanum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 56.—Persia.
laconicum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 55.—Graecia; As. Min.
laconicum, Heldr. & Sart. ex Nym. Consp. 262 = acre.
lactifolium, Salisb. Prod. 307 = S. Telephium.
Lampusae, Boiss. Fl. Orient. ii. 787.—Ins. Cyprus.
lanceolatum, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 205 = stenopetalum.
latifolium, Bertol. Amoen. Ital. 366 = maximum.
laxiflorum, DC. Prod. iii. 409.—Ins. Canar.
lasicum, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 63 = crenatum.
Ledebourii, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552 = roseum, Scop.
libanoticum, Linn. Syst. ed. X. 1037 = Cotyledon serrata.
Liebmannianum, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 12.—Mexic.
lilacinum, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 535 = cyanicum.

SEDUM:—

lineare, *Thunb. Fl. Jap.* 187.—Japon.
linearifolium, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 222. t. 48. f. 1.—Reg. Himal.
linifolium, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 559 = pulchellum.
Listoniae, *Vis. in Mem. Ist. Venet.* i. 1842 (1843), 57. t. 6.—As. Min.
litoreum, *Guss. Pl. Rar.* 185. t. 37. f. 2.—Ital.; Graec.; As. Min.
lividum, *Drejer, in Fl. Dan.* t. 686 = S. Telephium.
lividum, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1877) ii. 521 = lydium.
lividum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 24.—Hab.?
Lobellii, *Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xx. (1866) 125 = S. Telephium.
lugdunense, *Nym. Consp.* 260 = S. Telephium.
lusitanicum, *Brot. Phyt. Lusit.* ii. t. 178 = nicaeense.
lusitanum, *Brot. l. c.* 220, sphalm. = praec.
luteolum, *Chaboïs. in Bull. Soc. Bot. Fr.* x. (1863) 296.—Europ.
lydium, *Boiss. Diagn. Ser. I.* iii. 17.—As. Min.
macrophyllum, *Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre*, ed. I. 811 = maximum.
magellense, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvi.—Ital.; Graec.; As. Min.
majus, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 180 = maximum.
malacophyllum, *Steud. Nom. ed. I.* 759; *Franch. Pl. Davidian.* i. (1884) 129 = Cotyledon malacophylla.
Marichalii, *Lloyd, ex Nym. Consp.* 264 = litoreum.
maritimum, *Bogusl. in Erman, Archiv.* vi. (1848) 66.—Ross.
maritimum, *Sass. Phaner. Fl. Oesels*, 55, sphalm. = maximum.
matrense, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 470.—Hungar.
Maximowiczii, *Regel, Gartenfl.* (1866) 355. t. 528; et *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 98 = S. Aizoon.
maximum, *Suter, Fl. Helvet.* i. 270.—Europ.; Reg. Cauc.
Meehani, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 105.—Am. bor.
melanantherum, *DC. Prod.* iii. 410.—Hispan.
melanoleucum, *Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 172 = caespitosum.
micranthum, *Bast. ex DC. Fl. Fr. Suppl.* 523 = album.
microstachyum, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 787.—Ins. Cyprus.
Middendorffianum, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 116.—Reg. Amur.
Millii, *Baker, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 236.—Anatolia.
minus, *Haw. in Phil. Mag.* (1825) 175 = rupestre.
miserum, *Lindl. in Bot. Reg.* (1838) Misc. 65.—Mexic.
mite, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 182 = sexangulare.
mixtum, *Linn. Syst. ed. X.* 1037.—Hab.?
modestum, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 333.—Marocc.
modestum, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 789 = hispanicum.
monregalense, *Balb. Misc. Bot.* 23. t. 6.—Europ. austr.
montanum, *Song. & Perrier, in Billotia*, i. (1864) 77 = anopetalum.
Moorcroftianum, *Wall. Cat. n.* 7228 = Sempervivum acuminatum.
moranense, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 44.—Mexic.
mucronatum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 48 = linearifolium.
multicaule, *Wall. Cat. n.* 7232; et *ex Lindl. Bot. Reg.* (1840) Misc. 58.—Reg. Himal.; China.
multiceps, *Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 171.—Alger.
multiflorum, *Boenn. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 250, nomen (Quid?).—Hab.?
mutabile, *Wender. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 553, nomen (Quid?).—Hab.?
nanum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vi. 57.—Persia.
napiferum, *Peyr. in Linnaea*, xxx. (1859–60) 50.—Mexic.
neapolitanum, *Tenore, Syll. Fl. Neap.* 536 = dasyphyllum.
nebrodense, *Gaspar. in Rendic. Acc. Nap.* i. (1842) 49 = dasyphyllum.
neglectum, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1830) 12; et *Syll. Fl. Neap.* 227 = acre.
nevadense, *Coss. Notes Crit.* 163 = villosum.

SEDUM:—

Nevii, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1858) 373.—Am. bor.
nicaeense, *All. Fl. Pedem.* ii. 122.—Reg. Mediterr.
Notarjanni, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvi.—Ital.
nudum, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 112.—Ins. Mader.
nudum, *Schousb. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 248 = brevifolium.
Nuttalianum, *Rafin. Atl. Journ.* 146 (Quid?).—Am. bor.
oblongum, *Haw. Rev. Pl. Succ.* 29 = anglicum.
obtusatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 342.—Calif.
obtusifolium, *C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc.* 150.—Reg. Cauc.
occidentale, *Bor. ex Mast. in Gard. Chron.* (1878) ii. 303 = S. Telephium.
ochroleucum, *Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph.* i. 325 = anopetalum.
ochroleucum, *Vill. l. c.* iv. 680 = nicaeense.
octogonum, *Hort. ex DC. Prod.* iii. 403 = ternatum.
Oederi, *Retz. Fl. Scand.* 85 = saxatile.
Olgae, *Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch.* 26.—Turkestan.
olympicum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* iii. 16 = magellense.
oppositifolium, *Sims, Bot. Mag.* t. 1807.—Reg. Cauc.; Persia.
oreganum, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 559.—Am. bor. occ.
orientale, *Boiss. Diagn. Ser. I.* x. 17 = hispanicum.
oxypetalum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 45.—Mexic.
pachyclados, *Aitch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 58.—Afghan.
palaestinum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* x. 18.—Syria.
pallidum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 353.—As. Min.; Persia; Ind. bor. occ.
pallidum, *Tenore, Syll. Fl. Neap.* 226 = hispanicum.
Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 355.—Mexic.
paludum, *Link, Handb.* ii. 27, sphalm. = pallidum.
palustre, *Oed. Fl. Dan.* i. 6. t. 24 = villosum.
paniculatum, *Lam. Fl. Fr.* iii. 83 = S. Cepaea.
paniculatum, *Wall. Cat. n.* 7227 = Crassula indica.
parnassicum, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II.* ii. 61 = annuum.
parvum, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 50.—Mexic.
paucidens, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 179.—Europ.
pauciflorum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 49 = linearifolium.
pectinatum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 179; *DC. Prod.* iii. 403.—Hab.?
pedicellatum, *Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp.* 13.—Hispan.
pentandrum, *Bor. Fl. Centr. Fr.* ed. II. n. 779; et ed. III. ii. 256 = villosum.
Penthorum, *Crantz, Inst.* ii. 443 = Penthorum sedoides.
perpusillum, *Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 103.—Reg. Himal.
peruvianum, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 691.—Peruv.
pilosum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 352.—Reg. Cauc.; As. Min.
populifolium, *Pall. Reise*, iii. 730.—Sibir.
porphyreum, *Kotschy, in Unger & Kotschy, Ins. Cypern*, 313.—Ins. Cyprus.
portulacoides, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 484 = ternatum.
praealtum, *A. DC. 10^{me} Not. Pl. Rar. Jard. Genève* 21.—Mexic.
procumbens, *Schrank, Baier. Fl.* i. 726.—Bavaria.
pruinatum, *Brot. Fl. Lusit.* ii. 209.—Reg. Mediterr. occ.
Przewalskii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1883) 156.—China.
Pseudo-aizoon, *Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord.* xxxi. (1877) 159 (Fl. du Tché-fou, 64) = S. Aizoon.
Pseudo-fabaria, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.* (1868) 23.—Hab.?
puberulum, *DC. Mém. Crass.* 33 = hispanicum.
pubescens, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 52.—Reg. Tunet.
pulchellum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 277.—Am. bor.
pulchrum, *DC. Prod.* iii. 403 = pulchellum.
pulligerum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 326 = dasyphyllum.
pumilum, *Benth. Pl. Hartw.* 310.—Calif.
punctatum, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 469.—Hungar.

SEDUM:—

purpurascens, *Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II.* 284 = S. Telephium.
purpureum, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 437 = S. Telephium.
pusillum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 276.—Am. bor.
pusillum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 323 = pulchellum.
pyrenaicum, *Lange.—Cf. Linnaea*, xxix. (1857–58) 735 = anglicum.
pyriforme, *Royle, ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 101 = rosulatum.
quadrifidum, *Pall. Reise*, iii. 730.—Reg. Himal.; As. arct.
quinquefidum, *Haw. Rev. Pl. Succ.* 26.—Hab.?
quitense, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 46.—Ecuador.
racemiferum, *Griseb. ex Nym. Consp.* 264 = Grisebachii.
radiatum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 193.—Calif.
radicosum, *Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I.* x. 15 (= Umbilicus platyphyllus).—Persia; Soongar.
Raji, *Lange.—Cf. Linnaea*, xxix. (1857–58) 735 = anglicum.
ramosissimum, *Franch. Pl. Davidian.* i. (1884) 128 = Cotyledon fimbriata.
recurvatum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 24 = rupestre.
reflexum, *Cutanda, Fl. Madrit.* 312 = pruinatum.
reflexum, *Frivald, ex Nym. Consp.* 261 = amplexicaule.
reflexum, *Linn. Fl. Suec. App.* 463 = rupestre.
repens, *Nym. Consp.* 260 = S. Telephium.
repens, *Schleich. ex DC. Fl. Fr. Suppl.* 525 = alpestre.
reticulatum, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* i. (1815) 107 = dasyphyllum.
retorridum, *Hort. ex Mast. in Gard. Chron.* (1878) ii. 626 = amplexicaule.
retusum, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 51.—Mexic.
rhodanense, *Nym. Consp.* 260 = S. Telephium.
rhodanthum, *A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxiii. (1862) 405.—Am. bor. occ.
Rhodiola, *DC. Fl. Fr.* iv. 386 = roseum, *Scop.*
Rhodiola, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 194 = altaicum.
Rhodiola, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 244 = elongatum.
rhodioides, *Rafin. Atl. Journ.* 146 = roseum, *Scop.*
rigidum, *Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xx. (1866) 117.—Europ.
rivulare, *Boiss. Elench.* 43 = melanantherum.
rivulare, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 327 = erythraeum.
Roborowskii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1883) 154.—China.
roseum, *Scop. Fl. Carn.* ed. II. i. 326.—Europ.
roseum, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 263.—Reg. Cauc.
rostratum, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvi = amplexicaule.
rosulatum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 48.—Reg. Himal.
rotundifolium, *Lam. Fl. Fr.* iii. 82 = S. Anacampseros.
rubellum, *Wender. Ind. Sem. Hort. Marb.* (1824); et *Steud. Nom. ed. II.* ii. 553 (Quid?).—Hab.?
rubens, *DC. Prod.* iii. 405 = pallidum.
rubens, *Haenke, in Jirasek, Beob. Riesengeb.* (1791) 114 = alpestre.
rubens, *Jacq. ex Nym. Consp.* 264 = atratum.
rubens, *Linn. Sp. Pl.* 432.—Reg. Mediterr.
rubens, *Oed. Fl. Dan.* t. 82 = anglicum.
rubens, *Pollini, Fl. Veron.* ii. 71 = hispanicum.
rubrum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 222 = Ewersii.
rufescens, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvii = nicaeense.
rupestre, *All. ex Reut. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 643 = anglicum.
rupestre, *Hacq. ex Nym. Consp.* 262 = alpestre.
rupestre, *Linn. Sp. Pl.* 431.—Europ.
rupestre, *Oed. Fl. Dan.* t. 59 = saxatile.
rupestre, *Plan. Ens. Fl. Gallega*, 221 = pruinatum.
rupestre, *Vill. Hist. Pl. Dauph.* iii. 679 = anopetalum.
sajanense, *Pall. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 183 = S. Aizoon.
Salsovitianum, *Hort. ex Mast. in Gard. Chron.* (1878) ii. 626 = nicaeense.
sanguineum, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 790.—Mesopot.
sanguineum, *Ortega, Hort. Matr. Dec.* 125.—Hispan.
sarmentosum, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1835) 104.—China.
Sartorianum, *Boiss. Diagn. Ser. II.* ii. 62 = acre.

SEDUM :—

- saxatile*, All. Fl. Pedem. ii. 121. t. 65. f. 6 = alpestre.
saxatile, DC. Fl. Fr. iv. 394 = annuum.
saxatile, Pall. Tabl. Taur. 51 = pallidum.
saxatile, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 35.—Europ.
Scheuchzeri, Schlecht. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 314 = alpestre.
Schimperi, Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 400.—Abyss.
schistosum, Lej. Fl. Spa, i. 206 = sexangulare.
Selskianum, Regel & Maack, in Tent. Fl. Ussur. 66.—Reg. Amur.
Semenovii, Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 267.—Turkestan.
semiglobosum, Boiss. & Huet, in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 397, nomen.—Armenia.
sempervivoides, Fisch. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 313.—As. Min.; Reg. Cauc.
Sempervivum, Ledeb. ex Spreng. Syst. ii. 434 = sempervivoides.
septangulare, Haw. Syn. Pl. Succ. 116 = rupestre.
serotinum, Belyneck, Fl. Namur (1855), 322.—Belgium.
servatum, Jacquem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 417 = heterodontum.
sexangulare, Linn. Sp. Pl. 432.—Europ.
sexangulare, Loisel. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 784 = acre.
sexifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 354 = hispanicum.
Shearei, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 227.—China.
Sieboldii, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 270, nomen; et ex Hook. Bot. Mag. t. 5358.—Japan.
simplex, Stend. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 790 = Steudelii.
sinuatum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 222 = trifidum.
solutum, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 827 = nicaeense.
sordidum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 142.—Japan.
sparsiflorum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 559 = Torreyi.
sparsiflorum, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 307 = oreganum?
spathulatum, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1618, sphalm. = spathulifolium.
spathulatum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 108 = S. Cepaea.
spathulifolium, Hook. Fl. Bor. Am. i. 227.—Am. bor. occ.
spectabile, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 116.—Japan.
sphaericum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 259 = brevifolium.
spicatum, [Mog. & Sessé,] ex DC. Prod. iii. 401 = Cotyledon coccinea.
spinosa, Thunb. Fl. Jap. 186; Willd. Enum. Hort. Berol. 485 = Cotyledon spinosa.
spirale, Haw. in Phil. Mag. (1825) 176 = sexangulare.
spurium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 352 = stoloniferum.
spurium, Sibth. ex Nym. Consp. 485 = Trachelium rrmelianum.
stellariaefolium, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 130 = drymarioides.
stellatum, Frivald. ex Nym. Consp. 265 = caespitosum.
stellatum, Habl. Desc. Phys. Tanr. 161 = pallidum.
stellatum, Linn. Sp. Pl. 431.—Europ. austr.
stellatum, Lour. Fl. Cochinch. 287 = Alfredi.
stellatum, Pollini, Fl. Veron. ii. 73 = Sempervivum Seguieri.
stellatum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 307 = litoreum.
stelliforme, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 365.—Arizona.
stenopetalum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 324.—Am. bor. occ.
Stephani, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 549.—Sibir.
Stendelii, Boiss. Fl. Orient. ii. 790.—Cilicia.
stoloniferum, S. T. Gmel. Reise, iii. 311. t. 35. f. 2.—As. Min.; Persia.
Stracheyi, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 96 = tibeticum.
strictum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 42 = S. Cepaea.
strictum, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 177 = algidum.

SEDUM :—

- subclavatum*, Haw. in Phil. Mag. (1831) 414 = stenopetalum?
suboppositum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 132.—China.
subtile, Debeaux, Fl. Shangh. 32 = Alfredi.
subtile, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 156.—Japan.
subulatum, Boiss. Fl. Orient. ii. 783.—Reg. Cauc.
surculosum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 248 = Monanthes atlantica.
Taeschkei, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 240, sphalm. = Jaeschkei.
Tatarinowii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 134.—China.
tectorum, Schur, Enum. Pl. Transs. 965 (Index) = annuum.
tectorum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 325 = Sempervivum tectorum.
telephioides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 277.—Am. bor.
Telephium, Linn. Sp. Pl. 430.—Europ.; As. bor.
Telephium, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 180, 181 = maximum.
tenellum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 315.—Reg. Cauc.; As. Min.
tenuifolium, DC. Prod. iii. 407, in syn. = amplexicaule.
teretifolium, Lam. Fl. Fr. iii. 84 = album.
teretifolium, [Mog. & Sessé,] ex DC. Prod. iii. 401 = Cotyledon teretifolia.
ternatum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 277.—Am. bor.
tetramerum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 454.—Reg. Cauc.
tetraphyllum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 309; Fl. Graec. v. 36. t. 448 = S. Cepaea.
Thirkeanum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 41 = S. Telephium.
thyrsoidesum, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 120 = S. Telephium.
tibeticum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 96.—Reg. Himal.
Tilingiana, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 921, sphalm. = Saxifraga Tilingiana.
Torreyi, G. Don, Gen. Syst. iii. 121.—Am. bor. occ.
tortuosum, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 10.—Mexic.
transbaikalse, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 187 = album.
trevericum, Rosbach, ex Nym. Consp. 261 = pruinatum.
trifidum, Wall. Cat. n. 7230.—Reg. Himal.
triphyllum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 540 = S. Telephium.
tristriatum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 16.—Lycania; Ins. Creta.
trullipetalum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 102.—Reg. Himal.
tuberosum, Coss. & Letourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 9.—Afr. bor.
turgidum, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 390 = album.
turgidum, Salz. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 452 = brevifolium.
umbilicoides, Regel, Gartenfl. (1877) 290; et in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 263.—Turkestan.
uniflorum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 263.—Ins. Luchu.
uniflorum, Rafin. Caratteri, 73 = S. Cepaea.
uralense, Rupr. in Hofm. Noerdl. Ural, ii. App. 11, 34.—Mont. Ural.
Urvillei, DC. Prod. iii. 408 = pallidum.
variegatum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 137.—Calif.
Verloti, Jord. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 606 = anopetalum.
vermiculare, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 337, 345.—Reg. Cauc.
verticillatum, Latour, ex DC. Prod. iii. 404 = S. Cepaea.
verticillatum, Linn. Sp. Pl. 430.—Kamtschat.
villosum, Linn. l. c. 432.—Europ.; Greenl.
villosum, Webb, Iter Hisp. 46 = dasyphyllum.
virens, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 110 = rupestre.
virescens, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 25 = rupestre.
viridulum, Haw. in Phil. Mag. (1827) 183.—Europ.
viviparum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 137.—Manchur.
vogesiacum, Nym. Consp. 260 = S. Telephium.

SEDUM :—

- vulgare*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 437; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 539 = S. Telephium.
Wallichianum, Hook. Ic. Pl. t. 604 = asiaticum.
Whitmanni, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) II. 751 = seq.?
Wightmannianum, Hort. ex Mast. l. c. = seq.?
Witmanni, Hort. l. c. 685 = hispanicum.
Wrightii, A. Gray, Pl. Wright. i. 76.—Texas.
yantaiense, Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord. xxxi. (1877) 160 (Fl. du Tchét-fou, 65).—China.

SEEMANNANTHA, Alef. in Bonplandia, x. (1862) 264 = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).
strigosa, Alef. l. c. = T. tenuis.
tenuis, Alef. l. c. = T. tenuis.

SEEMANNIA, Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 567 = **Pentagonia**, Benth. (Rubiace.).

SEEMANNIA, Regel, Gartenfl. iv. (1855) 183. t. 126. **GESNERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1000.
Benaryi, Regel, l. c. (1874) 353.—Am. trop.
silvatica, Hanst. in Linnaea, xxix. (1857-58) 540 = ternifolia.
ternifolia, Regel, Gartenfl. iv. (1855) 183. t. 126.—Peruv.

SEETZENIA, R. Br. in Denh. & Clapp. Trav. App. 231 (1826). **ZYGOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 266.
africana, R. Br. l. c.—Afr. austr.
orientalis, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835) 281.—Sind.; Afr. bor. et austr.; Arab.
prostrata, Eckl. & Zeyh. Enum. 98 = africana.

SEEZENIA, Nees, in R. Br. Verm. Bot. Schr. iv. 46 (1830), sphalm. = praec.

SEGERETIA, G. Don, Gen. Syst. ii. 28 (1832), sphalm. = **Sageretia**, Brongn. (Rhamn.).

SEGUIERA, Adans. Fam. ii. 443 (1763), sphalm. = **Seguieria**, Loeffl. (Phytol.).

SEGUIERA, Reichb. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 424 (1871) = **Combretum**, Loeffl.
nudiflora, Reichb. l. c. = C. aculeatum.

SEGUIERIA, Loeffl. Iter Hisp. 191 (1758). **PHYLO-LACCACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 83.
aculeata, Jacq. Select. Am. 170 = americana.
americana, Linn. Syst. ed. X. 1074.—Am. austr.
asiatica, Lour. Fl. Cochinch. 341.—Cochinch.
coriacea, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1839) 235.—Bras.
floribunda, Benth. l. c.—Bras.
foliosa, Benth. l. c. 236.—Guian.
guaranitica, Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent. xvi. (1883) 88.—Reg. Argent.
Langsdorffii, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 6.—Bras.
longifolia, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1839) 235.—Bras.
macrophylla, Benth. l. c.—Guian.
parvifolia, Benth. l. c.—Guian.
Vauthieri, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 7.—Bras.

SEGUINUM, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (1836) = **Dieffenbachia**, Schott (Aroid.).
maculatum, Rafin. l. c. 67 = D. Seguine.

SEHIMA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 = **Ischaemum**, Linn. (Gramin.).
insculptum, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 247 = I. laxum.
ischaemoides, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 = I. laxum.
Kotschyi, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 247 = I. laxum.

SEIDELIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 465. t. 9 (1858). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 310.
Mercurialis, Baill. l. c. 466.—Afr. austr.
pumila, Baill. l. c. = S. Mercurialis.

SEIDELLA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 310 (1880), sphalm. = praec.

SEIDLIA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. v. 1945 (1836) = *Vatica*, Linn. (Dipteroc.).
lancaefolia, Kostel. l. c. = *V. lanceafolia*.

SEIDLIA, Opiz, Natural. xi. (1826) 349 = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).
atrovirens, Opiz, l. c. = *Scirpus Holoschoenus*.
fechlii, Opiz, ex Nym. Consp. 763 = *Scirpus sylvaticus*.
radicans, Opiz, Natural. xi. (1826) 349 = *Scirpus sylvaticus*.
sylvatica, Opiz, l. c. = *Scirpus sylvaticus*.

SEIDLITZIA, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 950 (1879). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 69.
flordia, Bunge, l. c. —As. Min.; Persia.
Rosmarinus, Bunge, l. c. 951. —Arab.

SEKIKI, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 209; Phil. Bot. ii. 49 (1791) = *Saxifraga*, Tourn.
cyclaminea, Medic. ll. cc. = *Sax. sarmentosa*.
sarmentosa, Moench, Meth. Suppl. 77 = *Sax. sarmentosa*.

SELAGO, Adans. Fam. ii. 268 (1763) = *Polycnemum*, Linn. (Chenop.).

SELAGO, Linn. Syst. ed. I (1735). *SELAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1128.

KURITIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 63 (1836).
MACRIA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 245 (1840).
MANETTIA, Crantz, Inst. i. 580 (1766).
NOLIA, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 197, 554 (1841).

VORMIA, Adans. Fam. ii. 284 (1763).
WALAFRIDA, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 372 (1837).

abietina, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17. —Afr. austr.
acaulis, Herb. Russ. ex Nees, in DC. Prod. xi. 256 = *Lepidagathis cristata*.

adpressa, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 103, t. 4. —Afr. austr.

albida, Choisy, in DC. Prod. xii. 18. —Afr. austr.
angustifolia, Sieber, ex Choisy, l. c. 19 = *decipiens*.
angustifolia, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99 = *Agathelpis angustifolia*.

apiculata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 256. —Afr. austr.

appressa, Eckl. & Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *glabrata*.

arguta, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 260. —Afr. austr.

articulata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.

ascendens, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 259. —Afr. austr.

aspera, Choisy, in DC. Prod. xii. 12. —Afr. austr.

bracteata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100 = *Microdon lucidus*.

Burmanni, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 108. —Afr. austr.

canescens, Linn. f. Suppl. 284. —Afr. austr.

canescens, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 265 = *albida*.

capitata, Berg. Desc. Pl. Cap. 157 = *Microdon ovatus*.

capitata, Linn. Mant. ii. 568. —Afr. austr.

capituliflora, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 355. —Afr. austr.

cephalophora, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 256 = *nutans*.

cephalophora, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100; Fl. Cap. ed. Schult. 464. —Afr. austr.

Choisiana, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 268 = *paniculata*.

ciliata, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.

cinerascens, Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *albida*.

cinerascens, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 270 = *cinerea*.

cinerea, Eckl. & Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 18 = *witbergensis*.

cinerea, Krauss, ex Choisy, l. c. 9 = *glabrata*.

cinerea, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.

coccinea, Linn. Pl. Afr. Rar. 12; Amoen. Acad. vi. 89 = *spuria*.

coerulea, Bernh. ex Steud. Nom. ed. I. 760, nomen. —Hab. ?

coerulea, Burch. ex Krauss, in *Flora*, xxviii. (1845) 70, nomen. —Afr. austr.

comosa, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 255. —Afr. austr.

SELAGO:—

congesta, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 356. —Afr. austr.

cordata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 257 = *decumbens*.

cordata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100 = *Phyllopodium heterophyllum*.

corymbosa, Linn. Herb. ex Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 342 = *stricta*.

corymbosa, Linn. Sp. Pl. 629. —Afr. austr.

decipiens, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 270. —Afr. austr.

decumbens, Choisy, in DC. Prod. xii. 18 = *quadrangularis*.

decumbens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100. —Afr. austr.

densifolia, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 69 = *spuria*.

dentata, Poir. Encyc. vii. 57 = *spuria*.

diffusa, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. xii. 11 = *triquetra*.

diffusa, Thunb. Herb., partim, ex Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 352 = *nigrescens*.

diffusa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.

diffusa, Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 11 = *tenuis*.

distans, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 266. —Afr. austr.

divaricata, Linn. f. Suppl. 284 = *triquetra*.

Dregei, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 353. —Afr. austr.

dubia, Linn. Sp. Pl. 629 = *Agathelpis angustifolia*.

Eckloniana, Choisy, in DC. Prod. xii. 13. —Afr. austr.

elata, Choisy, l. c. 12. —Afr. austr.

elegans, Choisy, l. c. 14. —Afr. austr.

ericina, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 254. —Afr. austr.

ericoides, Linn. Mant. i. 87 = *Stilbe ericoides*.

fasciculata, Linn. l. c. 250 = *serrata*.

fruticosa, Linn. l. c. i. 87. —Afr. austr.

fruticosa, Linn. f. ex Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 351 = *Dischisma fruticosum*.

fruticosa, Thunb. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *Thunbergii*.

fruticosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 98, partim = *congesta*.

fulvomaculata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 123 = *spuria*.

geniculata, Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *articulata*.

geniculata, Linn. f. Suppl. 284. —Afr. austr.

Gillii, Hook. Bot. Mag. t. 3028 = *myrtifolia*.

glabrata, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 104. —Afr. austr.

glandulosa, Choisy, in DC. Prod. xii. 20 = *scabrida*.

glomerata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 264, partim = *Dregei*.

glomerata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.

glutinosa, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 255. —Afr. austr.

guttata, E. Mey. l. c. 259. —Afr. austr.

hamulosa, E. Mey. l. c. 257. —Afr. austr.

herbacea, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 109. —Afr. austr.

hermannioides, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 267. —Afr. austr.

heterophylla, E. Mey. l. c. 256. —Afr. austr.

heterophylla, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99 = *spuria*.

hirta, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 107 = *quadrangularis*.

hirta, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.

hispida, Choisy, in DC. Prod. xii. 10 = *stricta*.

hispida, Linn. f. Suppl. 284. —Afr. austr.

hispida, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. xii. 7 = *Dischisma capitatum*.

hyssopifolia, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 262. —Afr. austr.

incisa, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 69. —Afr. austr.

lacunosa, Klotzsch, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 255. —Afr. trop.

lanceolata, Choisy, in DC. Prod. xii. 15. —Afr. austr.

laxiflora, Choisy, l. c. 8. —Afr. austr.

leptostachya, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 266 = *geniculata*.

lobeliacea, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 69 = *herbacea*.

lucida, Vent. Jard. Malm. 26 = *Microdon lucidus*.

luxurians, Choisy, in DC. Prod. xii. 9. —Afr. austr.

lychnidea, Linn. Pl. Rar. Afr. 12; Amoen. Acad. vi. 89 = *Lyperia fragrans*.

Meyeri, Choisy, in DC. Prod. xii. 8. —Afr. austr.

SELAGO:—

micrantha, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 98. —Afr. austr.

micrantha, Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *articulata*.

minutissima, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 100, t. 3. —Afr. austr.

muralis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1129. —Madag.

myrtifolia, Reichb. Ic. Bot. Exot. iii. 10, t. 223. —Afr. austr.

nigrescens, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 352. —Afr. austr.

nutans, Rolfe, l. c. 354. —Afr. austr.

Ohlendorffiana, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1831) 6, 7. —Cf. *Linnaea*, vi. (1831) Litt. 74. —Afr. austr.

ovata, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 355 = *Microdon ovatus*.

pallida, Salisb. Prod. 93 = *spuria*.

paniculata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.

peduncularis, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 262. —Afr. austr.

philicifolia, Herb. Berol. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 10 = *cinerea*.

Pinastra, Linn. Sp. Pl. ed. II. 876 = *Stilbe vestita*.

pinica, Walp. Rep. iv. 151, sphalm. = *spinea*.

Pinguicula, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 255. —Afr. austr.

polycephala, Otto, ex Walp. Rep. iv. 164. —Afr. austr.

polygaloides, Choisy, in DC. Prod. xii. 11 = *geniculata*.

polygaloides, Linn. f. Suppl. 284 = *Microdon cylindricus*.

polystachya, Licht. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *Thunbergii*.

polystachya, Linn. Mant. ii. 250. —Afr. austr.

Prunastri, Linn. Syst. ed. X. 1117 = *Stilbe Pinastra*.

pterophylla, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 415, nomen. —Afr. austr.

pulchella, Salisb. Prod. 93 = *spuria*.

purpurea, Cels, Cat. Arb. Pl. (1817) 34, nomen (Quid ?). —Hab. ?

pusilla, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99 = *Vandellia scabra*.

quadrangularis, Choisy, in DC. Prod. xii. 15. —Afr. austr.

racemosa, Bernh. in *Flora*, xxviii. (1845) 69. —Afr. austr.

ramulosa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 124. —Afr. austr.

ramulosa, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 265 = *Meyeri*.

rapunculoides, Linn. Cent. Pl. ii. 22; Amoen. Acad. vi. 89 = *spuria*.

recurva, Choisy, in DC. Prod. xii. 19 = *fruticosa*.

recurva, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 271. —Afr. austr.

rotundifolia, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.

rotundifolia, Thunb. Herb. ex Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 354 = *Microdon lucidus*.

saxatilis, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 269. —Afr. austr.

scabrida, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.

serrata, Berg. Desc. Pl. Cap. 159. —Afr. austr.

spicata, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 14 = *spuria*.

spicata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 124 = *Microdon ovatus*.

spinea, Link, l. c. 123. —Afr. austr.

spinosa, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17 = *Stoebe aethiopica*.

spuria, Linn. Sp. Pl. 629. —Afr. austr.

spuria, Lodd. Bot. Cab. t. 391 = *cinerea*.

spuria, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. xii. 15 = *serrata*.

squarrosa, Choisy, l. c. 16. —Afr. austr.

stricta, Berg. Desc. Pl. Cap. 155. —Afr. austr.

stricta, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. ii. 11. (1824) 103 = *tephrodes*.

tenuis, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 266. —Afr. austr.

tephrodes, E. Mey. l. c. 264. —Afr. austr.

tephrodes, E. Mey. l. c., partim = *stricta*, adpressa.

teretifolia, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 124 = *spuria*.

teretifolia, Walp. Rep. iv. 154 = *Walpersii*.

teucriifolia, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17. —Afr. austr.

Thomsoni, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 402. —Afr. trop.

Thunbergii, Choisy, in DC. Prod. xii. 9. —Afr. austr.

tomentosa, Linn. Pl. Rar. Afr. 13; Amoen. Acad. vi. 90 = *Manulea tomentosa*.

SELAGO:—

trinervia, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 261.—Afr. austr.
 triquetra, *Linn. f. Suppl.* 284.—Afr. austr.
 verbenacea, *Linn. f. l. c.* 285.—Afr. austr.
 Walpersii, *Choisy, in DC. Prod.* xii. 20.—Afr. austr.
 witbergensis, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 270.—Afr. austr.
 Zeyheri, *Choisy, in DC. Prod.* xii. 19.—Afr. austr.

SELAS, Spreng. Syst. ii. 216 (1825) = *Acronychia*, Forst. (Rntac.).
lanceolatum, Spreng. l. c. = *A. laurifolia*.

SELATIMUM, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 196 (1837) = *Gentiana*, Linn.
assurgens, D. Don, l. c. = *G. guayaquilensis*.
attenuatum, D. Don, l. c. = *G. attenuata*.
coccineum, D. Don, l. c. = *G. coccinea*.
diffusum, D. Don, l. c. = *G. Selatium*.
foliosum, D. Don, l. c. = *G. Donii*.
incurvum, G. Don, l. c. = *G. incurva*.
multicaulis, D. Don, l. c. = *G. Pavonii*.
thyrsoides, G. Don, l. c. = *G. thyrsoides*.

SELBYA, M. Roem. Syn. Hesper. 89, 126 (1846) = *Aglaiia*, Lour. (Meliac.).
montana, M. Roem. l. c. 126 (= *Milnea montana*, Jack).—Sumatra.

SELENIA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. v. (1825) 132. t. 6. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 72.
aurea, Nutt. l. c.—Am. bor.
dissecta, Torr. & Gray, in *Pacif. Rail. Rep.* ii. 160. t. 1.—Calif.

SELENIPEDIUM, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3. tt. 2, 27, 44, 62, 181 (1854). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 635.
 SOLENIPEDIUM, Beer, Prakt. Orch. 310 (1854), sphalm.
 UROPEDIUM, Lindl. Orch. Linden. 28 (1846), nomen prius.

Ainsworthii x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) i. 748.
albo-pictum, Linden, Cat. n. 21 (1867) 16 (Quid?).—Hab.?
albo-purpureum x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) ii. 38.

Boissierianum, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116; iv. (1856) 217.—Peruv.
cardinale x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) ii. 488.
caricium, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Bolivia.

caudatum, Reichb. f. l. c. ii. (1854) 116; iv. (1856) 217.—Am. trop.

Chica, Reichb. f. l. c. ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3. t. 2.—Panama.

Czerwikowianum, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Peruv.

dariense, Reichb. f. in Nov. Act. Nat. Cur. xxxv. (1869) ii. 8 = longifolium.

Dominianum x, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1870) 1181.

grande x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) ii. 488.

Hartwegii, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116 = longifolium.

Hincksianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) i. 202, in nota = longifolium.

Isabelianum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 201.—Bras.

kaieteuriunum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1885) ii. 262 = Lindleyanum.

Klotzschianum, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Guian.

laevigatum, May, in Rev. Hort. (1885) 301 = Cypripedium philippense.

Lindleyanum, Reichb. f. & Warsz. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3.—Am. trop.

longifolium, Reichb. f. l. c.—Guian.

palmifolium, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Guian.

Parishii, Jolibois, in Rev. Hort. (1885) 132 = Cypripedium Parishii.

Pearcei, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xxi. (1865) 298 = caricinum.

porphyreum x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) i. 366.

Reichenbachii, Endres, ex Reichb. f. l. c. (1869) 1206 = longifolium.

reticulatum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 223 = Boissierianum.

VOL. II.

SELENIPEDIUM:—

Roezli, Reichb. f. in *Regel, Gartenfl.* (1871) 164 = longifolium.
 Schlিমii, *Linden, ex Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 277.—N. Granat.
Sedeni x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1873) 1431.
stenophyllum x, Reichb. f. l. c. (1876) i. 461.
vittatum, Reichb. f. in *Illustr. Hort.* xxiii. (1876) 57. t. 238.—Bras.
Wallisii, Reichb. f. *Otia Bot. Hamb.* 30 = caudatum.
Warszewiczianum, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3 = caudatum.

SELENOCARPAEA, Eckl. & Zeyh. Enum. 10 (1835) = *Heliophila*, Burm. f. (Crucif.).
diffusa, Eckl. & Zeyh. l. c. = *H. diffusa*.
Peltaria, Eckl. & Zeyh. l. c. = *H. flacca*.
pinnata, Eckl. & Zeyh. l. c. = *H. Peltaria*.

SELENOCERA, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 316. *RUBIACEAE*.
 secundiflora, Zipp. l. c.—Ins. Timor.

SELENOGYNE, DC. Prod. vi. 147 (1837), sphalm. = SOLENOGYNE, Cass. = *Lagenophora*, Cass. (Compos.).

SELEPSION, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48 (1836) = *Urtica*?, Tourn.

SELERANTHUS, Hill, Hort. Kew. 372 (1768), sphalm. = *Scleranthus*, Linn. (Illecebr.).

SELERIA, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 436, sphalm. = *Scleria*, Berg. (Cyperac.).

SELINOCARPUS, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 262. *NYCTAGINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 6.
angustifolius, Torr. Bot. Mex. Bound. 170.—Texas.
chenopodioides, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 262.—N. Mexic.
diffusus, A. Gray, l. c.—N. Mexic.
 Palmeri, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 6.—Mexic.

SELINON, Adans. Fam. ii. (23) (1763) = *Apium*, Tourn. (Umbell.).

SELINON, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 259 = *Selinum*, Linn.
carvifolium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 113, 134 = *Selinum Carvifolia*.

SELINOPSIS, Coss. & Dur. ex Munby, Cat. Pl. Alg. ed. II. 13 (1859), nomen = *Carum*, Rupp. (Umbell.).
foetida, Coss. & Dur. l. c.—Alger.
montana, Coss. & Dur. l. c.—Alger.

SELINUM, Linn. Gen. ed. I. 73 (1737). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 914.

ALLINUM, Neck. Elem. i. 179 (1790).

ANTHOSCIADIUM, Fenzl, in Endl. Gen. Suppl. iv. iii. 9 (1850).

CENOLOPHIUM, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. i. (1824) (Gen. Umbell.) 103.

CNIDIUM, Cusson, ex DC. Prod. iv. 152 (1830).

GNIDIUM, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 107 (1830).

HETEROPTILIS, E. Mey. ex Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 534.

HYALAENA, C. Muell. in Walp. Ann. v. 70 (1858).

HYALOLAENA, Bunge, in Mém. Sav. Étr. Pétersb. vii. (1851) 304.

LITHOSCIADIUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 730.

LOMATOCARUM, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 59 (1839).

MICRANGELIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 388.

MYLINUM, Gaud. Fl. Helv. ii. 344 (1828).

OROCOMA, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 54.

SPHENOSCIADIUM, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1866) 536.

THYSSELINUM, Adans. Fam. ii. 100 (1763).
acaule, Cav. Ic. v. 59 = *Laretia acaulis*.
acaule, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 732 = *Cymopterus glomeratus*.
acaule, Turcz. ex Bess. in *Flora*, xvii. (1834) i. Beibl. 13.—Sibir. baical.

SELINUM:—

acutangulum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 22 = *S. Carvifolia*.
alatum, Poir. Encyc. Suppl. v. 126 = *Ligusticum alatum*.

alpinum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 236 = *Seseli annuum*?

alsaticum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 17; ed. II. 155 = *Peucedanum alsaticum*.

anesorrhizum, F. Muell. Sel. Pl. Indust. Cult. [ed. II.] 225 = *Annesorhiza capensis*.

Anethum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 134 = *Peucedanum graveolens*.

Angelica, Roth, l. c. 133 = *Angelica sylvestris*.
Angelicastrum, Link, ex Spreng. Syst. i. 916 = *Angelica lancifolia*.

angulatum, Lam. Fl. Fr. iii. 419 = *S. Carvifolia*.
annuum, Steud. Nom. ed. II. ii. 572, in syn., sphalm. = *Seseli annuum*.

appianum, Pers. Syn. i. 309 = *Carum rigidulum*.
appuanum, Viv. Cat. Hort. Dinagro, 33; ex ej. Fl. Ital. Fragm. 14 = *Carum rigidulum*.

Archangelica, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = *Archangelica officinalis*.

arenosum, Crantz, ex DC. Prod. iv. 165 = *Peucedanum austriacum*.

argenteum, All. Fl. Pedem. ii. 9 = *Peucedanum involu-cratum*.

argenteum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 43; ed. II. 174 = *Peucedanum austriacum*.

aristatum, Ait. ex Link, Handb. i. 330 = *Ligusticum pyrenaicum*.

atropurpureum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = *Archangelica atropurpurea*.

austriacum, Bertol. Pl. Gen. 44; et Amoen. Ital. 137 = *Peucedanum alsaticum*.

austriacum, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 49, 220 = *Peucedanum austriacum*.

austriacum, Tenore, Fl. Nap. iii. 287 = *Peucedanum sulcatum*.

baicalense, Redowsk. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 306 = *Peucedanum baicalense*.

banaticum, Kit. in *Rochel, Pl. Banat. Index*, nomen.—Banat.

Bellardi, Balb. Cat. Hort. Taur. (1821) 51 = *Peucedanum austriacum*.

Benthami, S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 432 = *Gmelini*.

canadense, Michx. Fl. Bor. Am. i. 165.—Am. bor.

Candollei, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 55 = *tenuifolium*.

Candollii, DC. Prod. iv. 165.—Reg. Himal.

cantabrigense, Fisch. ex DC. l. c. 179 = *Peucedanum palustre*.

capitellatum, Benth. & Hook. f. ex S. Wats. in Bot. King's Exp. 126.—Am. bor.

carniolicum, Hoppe, ex Nym. Consp. 285 = *Peucedanum austriacum*.

Carvifolia, Gilib. ex DC. Prod. iv. 152 (= *Cenolophium Fischeri*).—Rossia; Reg. Cauc.

Carvifolia, Linn. Sp. Pl. ed. II. 350.—Europ.

carvifolium, Crantz, Inst. ii. 126. n. 5 = praec.

carvifolium, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 22; ed. II. 162 = *Peucedanum carvifolium*.

caucasicum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 213 = *Peucedanum caucasicum*.

cenolophioides, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 284 = *sylvestre*.

Cervaria, Linn. Sp. Pl. 1194 = *Peucedanum Cervaria*.

cervicaria, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 132 = praec.

Chabraei, DC. Prod. iv. 176, in syn. = *Peucedanum carvifolium*.

Chabraei, Rebert. & Kunth, Fl. Berol. 78 = *Monnieri*.

cicutarium, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914 = *tenuifolium*.

cnidiifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 72.—Sibir. or.

collinum, Kit. ex DC. Prod. iv. 179 = *Peucedanum baicalense*.

coniifolium, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914 = *tenuifolium*.

decipiens, Schrad. & Wendl. Sert. Hannov. i. iii. 23. t. 13 (= *Melanoselinum decipiens*).—Ins. Canar.

decussatum, [Clairv.] Man. Herb. 80 = *Peucedanum carvifolium*?

densiflorum, Salisb. Prod. 162 = *Monnieri*.

dimidiatum, DC. Fl. Fr. iv. 323 = *Seseli annuum*.
dissectum, Wall. Cat. n. 581; et ex DC. Prod. iv. 178. (sp. dub.).—Nepal.

SELINUM :—

- divaricatum*, Buch, *Beschr. Canar. Ins.* 195.—Ins. Canar.
dubium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 735 = Gmelini.
elegans, Balb. in Mém. Acad. Turin (1810), 364; Hort. Taur. Fasc. 23. t. 4 = *Peucedanum austriacum*.
frutescens, Pers. Syn. i. 309 = *decipiens*.
Galbanum, Spreng. in Schult. Syst. vi. 563 = *Peucedanum Galbanum*.
glaucum, Lam. Fl. Fr. iii. 419 = *Peucedanum Cervaria*.
glaucum, Wall. Cat. n. 580; et ex DC. Prod. iv. 179 = *Peucedanum glaucum*.
Gmelini, *Bray*, in *Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* i. II. (1818) 36.—Reg. bor.
gummiferum, Spreng. in Schult. Syst. vi. 564 = *Seseli gummiferum*.
humile, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 93 = *Peucedanum salinum*.
Imperatoria, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 42; ed. II. 174 = *Peucedanum Ostruthium*.
imperatoroides, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = *Peucedanum angustifolium*.
intermedium, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 205 = *Peucedanum palustre*.
Kingii, S. Wats. in *Bot. King's Exp.* 126.—Am. bor. occ.
Kraussianum, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—Afr. austr.
Lachenalii, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 640 = *pyrenaicum*.
lactescens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 22 = *Peucedanum palustre*.
lactescens, Lam. Fl. Fr. iii. 418 = *Peucedanum carvifolium*.
laevicaule, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 75 = *sylvestre*.
latifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 213 = *Peucedanum latifolium*.
lineare, Schumacher, Enum. Pl. Saelland. i. 95 = *sylvestre*.
lineare, Spreng. in Schult. Syst. vi. 560 = *Peucedanum austriacum*.
livonicum, Ledeb. ex DC. Prod. iv. 169 = *Angelica chaerophyllea*.
membranaceum, Vill. Cat. Jard. Strasb. t. 6 = *S. Carvifolia*.
microphyllum, Cav. Ic. v. 59 = *Mulinum microphyllum*.
Monnieri, Linn. Cent. Pl. i. 9; *Amoen. Acad.* iv. 269.—Europ.
montanum, Schleich. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 306 = *Peucedanum austriacum*.
neglectum, Láng, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 461 (Quid?).—Banat.
nigricans, Gaud. Fl. Helvet. ii. 333 = *Peucedanum austriacum*.
nigrum, Lam. Fl. Fr. iii. 420 = *Peucedanum austriacum*.
obscurem, Fisch. ex Trev. Ind. Sem. Hort. Wratisl. App. iii. (1821) [3] = *Peucedanum baicalense*.
odoratum, Bernh. ex Spreng. Sp. Umbellif. 60 = *Angelica palustris*.
Opopanax, Crantz, Class. Umbell. 63 = *Opopanax Chironium*.
Oreoselinum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 33; ed. II. 169 = *Peucedanum Oreoselinum*.
orientale, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—As. Min.; Syria.
Ostruthium, Wallr. Ann. Bot. 41 = *Peucedanum Ostruthium*.
pacificum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 140.—Am. bor. occ.
palustre, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 39; ed. II. 172 = *S. Carvifolia*.
palustre, Linn. Sp. Pl. 244 = *Peucedanum palustre*.
palustre, Thuill. Fl. Par. ed. II. 139 = *Peucedanum carvifolium*.
paniculatum, Spreng. Pugill. ii. 50 = *Peucedanum Sprengelii*.
papyraceum, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 701.—Reg. Himal.
Pastinaca, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 21; ed. II. 161 = *Peucedanum sativum*.
peregrinum, Willd. Enum. Hort. Berol. 306 = *Carum rigidulum*.
peucedanoides, Brot. Phyt. Lusit. ii. 196. t. 167 = *Peucedanum lancifolium*.

SELINUM :—

- peucedanoides*, Desf. Tabl. ed. II. 142 = *Peucedanum involucreatum*.
Peucedanum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 30; ed. II. 167; Roth, Tent. Fl. Germ. i. 133 = *Peucedanum officinale*.
podolicum, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 392 = *Peucedanum carvifolium*.
polymorphum, Spreng. Pugill. ii. 50 = *Peucedanum austriacum*.
pratense, Spreng. Fl. Ital. 92. t. 2 = *sylvestre*.
proliferum, Cav. Ic. v. 58 = *Mulinum proliferum*.
Pseudo-carvifolia, All. Fl. Pedem. ii. 9 = *S. Carvifolia*.
pubescens, Moench, Meth. 80 = *Angelica sylvestris*.
pyrenaicum, Gouan, *Illustr.* ii. t. 5.—Mont. Pyren.
rablense, Spreng. Pugill. ii. 51 = *Peucedanum austriacum*.
ramosissimum, Wall. Cat. n. 578 = *Peucedanum ramosissimum*.
Razulii, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = *Angelica Razulii*.
rigidulum, Viv. Fl. Ital. Fragm. i. 14. t. 15 = *Carum rigidulum*.
Rochelii, Heuff. ex Rochel, Bot. Reise Banat, 78 = *Silaus carvifolius*.
scabrum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 147 = *Xatardia scabra*.
Schizonekii, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 205 = *Peucedanum palustre*.
Seguirei, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 224 = *S. Carvifolia*.
Seguieri, Jacq. Hort. Vindob. i. 24. t. 61 = *Ligusticum Seguieri*.
sibiricum, Retz. Obs. ii. 16 (= *Peucedanum selinoides*).—Sibir.
sylvestre, Pourr. ex Nym. Consp. 283 = *Angelica sylvestris*.
spinosum, Cav. Ic. v. 59 = *Mulinum spinosum*.
spinulifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 73 = *Peucedanum Cervaria*.
stellatum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 185 = *Pleurospermum stellatum*.
striatum, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—Reg. Himal.
sublactescens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 21 = *Peucedanum palustre*.
suffruticosum, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—Afr. austr.
sulcatum, Bertol. Fl. Ital. iii. 367 = *Peucedanum sulcatum*.
sylvestre, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 47; ed. II. 177 = *Angelica sylvestris*.
sylvestre, Linn. Sp. Pl. 244.—Europ.
sylvestre, Oed. Fl. Dan. t. 412 = *Peucedanum palustre*.
tenuifolium, Salisb. Prod. 162 = *S. Carvifolia*.
tenuifolium, Wall. Cat. n. 579; et ex DC. Prod. iv. 181.—Reg. Himal.
terebinthinaceum, Fisch. ex Trev. Ind. Sem. Hort. Wratisl. App. iii. (1821) [3] = *Peucedanum terebinthaceum*.
terebinthinum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 266. t. 95 = *Cymopterus terebinthinus*.
turfosum, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 223 = *sylvestre*.
Tysselinum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 35; ed. II. 170 = *Peucedanum palustre*.
uliginosum, Link, ex Steud. Nom. ed. I. 762 = *Laserpitium peucedanoides*.
uniovittatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 735 = Gmelini.
vaginatum, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 700.—Reg. Himal.
venetum, Spreng. Sp. Umbellif. 73 = *Peucedanum venetum*.
verticillare, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = *Peucedanum verticillare*.

SELKIRKIA, Hemsl. Bot. Challenger, i. III. 47 (1884). **BORAGINEAE**.
Berteri, Hemsl. l. c. 48.—Ins. J. Fernand.**SELLIERA**, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1799) 41. t. 5. f. 2; et Ic. v. 49. t. 474 (1799). **GOODE-NOVIEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 539.
exigua, F. Muell. *Fragm.* iii. 142.—Austral.
fasciculata, J. Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 211.—N. Zel.**SELLIERA** :—

- herpystica*, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 598 = *radicans*.
radicans, Cav. in *Anal. Hist. Nat.* i. (1799) 41. t. 5. f. 2; Ic. v. 49. t. 474.—Austral.
repens, De Vriese, in *Verh. Haarl.* x. (1854) 162 = *radicans*.

SELLIERIA, J. Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 211 = *praec.***SELLOA**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 265. t. 395 (1820). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 361.

- FEAEA, Spreng. Syst. iii. 362 (1826).
linearis, DC. *Prod.* v. 612 (an *Spilanthus* sp.?).—Reg. Argent.
plantaginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 266. t. 395.—Mexic.

SELLOA, Spreng. Nov. Prov. Hort. Hal. 36 (1818) = **Gymnosperma**, Less. (Compos.).
capensis, Spreng. Syst. iii. 496 = *Denekia capensis*.
glutinosa, Spreng. Nov. Prov. Hort. Hal. 36 = *Baccharis glutinosa*.
nudata, Nutt. in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* v. (1822) 300 = *Flaveria linearis*.**SELLOWIA**, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. v. p. xxxi. 407 (1819) = **Ammannia**, Linn. (Lythrar.).
uliginosa, Roth, l. c. = *A. pentandra*.**SELLUNIA**, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 358 = **Vicia**, Tourn. (Legumin.).
lunata, Alef. l. c. 359 = *V. lunata*.**SELNORITION**, Rafin. Sylva Tellur. 160 (1838) = **Rubus**, Tourn. (Rosac.).
canadensis, Rafin. l. c. = *R. canadensis*.
caesius, Rafin. l. c. = *R. caesius*.
obovalis, Rafin. l. c. = *R. hispidus*.
saxatilis, Rafin. l. c. = *R. saxatilis*.**SELONIA**, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) i. 457 = **Eremurus**, Bieb. (Liliac.).
soogdiana, Regel, l. c. 458 = *E. soogdiana* (in Addend.).**SELWYNIA**, F. Muell. *Fragm.* iv. 153 (1864). **MENISPERMACEAE**.
laurina, F. Muell. l. c.—Austral.**SELYSIA**, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 735 (1881). **CUCURBITACEAE**.
cordata, Cogn. l. c. 736.—N. Granat.
prunifera, Cogn. l. c.—Peruv.**SEMARILLA**, Rafin. Sylva Tellur. 146 (1838) = **Celastrus**, Linn.
bicolor, Rafin. l. c.—Hab. ?**SEMARILLARIA**, Ruiz & Pav. Prod. 54. t. 9 (1794) = **Paullinia**, Linn. (Sapind.).
acutangula, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 93 = *P. acutangula*.
alata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 340 = *P. alata*.
Cururu, Ruiz & Pav. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 556 = *Serjania nodosa*.
enneaphylla, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 341 = *P. enneaphylla*.
nitida, Ruiz & Pav. l. c. 339 = *P. neglecta*.
obovata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 93 = *P. obovata*.
subrotunda, Ruiz & Pav. l. c. 92 = *P. subrotunda*.**SEMECARPOS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *seq.***SEMECARPUS**, Linn. f. Suppl. 285 (1781). **ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 424.
acuminata, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 76.—Zeylan.
acuminata, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 271; Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 75 = *S. Cassuvium*.
albescens, Kurz, l. c. xl. (1871) II. 51.—Burma.
Anacardium, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 217 = *pubescens*.
Anacardium, Blume, Bijdr. 1156 = *heterophylla*.
Anacardium, Linn. f. Suppl. 182.—As. et Austral. trop.

SEMECARPUS:—

arvensis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 484.—Ins. Aru.
 atra, Vieill. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvi. (1861) 71 = *Oncocarpus vitiensis*.
 auriculata, *Bedd. Fl. Sylv.* ii. t. 232.—Ind. or.
 australiensis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 482.—Austral.
 Balansae, *Engl. l. c.* 484.—N. Caled.
 caesia, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 189 = heterophylla.
 Cassuvium, *Roxb. Hort. Beng.* 22; *Fl. Ind.* ii. 85; *Spreng. Syst.* i. 936.—Burma; Malaya.
 cochinchinensis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 489.—Cochinch.
 coriacea, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 76.—Zeylan.
 cuneata, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 493 (sp. dub.).—Zeylan.
 cuneifolia, Kurz, in *Pegu, Rep. A.* 42 = pandurata.
 cuneifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 22; *Fl. Ind.* ii. 86 = *S. Anacardium*.
 cuneiformis, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 220 = microcarpa.
 Forstenii, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 188.—Ins. Molucc.
 fulvinervis, *Blume, l. c.* 189.—Borneo.
 Gardneri, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 76, 410.—Zeylan.
 glauca, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 478.—Borneo.
 Grahonii, Wight, *l. c.* 235 = *Holigarna Grahamii*.
 grandifolia, *Wall. Cat. n.* 985 = *Campnosperma Griffithii*.
 heterophylla, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 187.—Java.
 heterophylla, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 35 = albescens.
 insularum, *Seem. Fl. Vit.* 50.—N. Guin.
 Kurzii, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 489.—Ins. Nicobar.
 laevigata, *Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 35.—Zeylan.
 latifolia, *Pers. Syn.* i. 324 = *S. Anacardium*.
 longifolia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 188.—Ins. Timor.
 lurida, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 34.—Malacca.
 mangifera, Wight & Arn. in *Edinb. N. Phil. Journ.* xv. (1833) 177, in obs., sphalm. = *S. Anacardium*.
 marginata, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 77.—Zeylan.
 microcarpa, *Wall. Cat. n.* 989.—Burma.
 monogyna, *Soyer-Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 25 (Quid?).—Ins. Maurit.
 Moonii, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 77.—Zeylan.
 neocaledonica, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 482.—N. Caled.
 nicobarensis, *Engl. l. c.* 480.—Ins. Nicobar.
 nigroviridis, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 76, 410.—Zeylan.
 oblongifolia, *Thw. l. c.* 76 = obscura.
 obovata, *Moon, Cat. Pl. Ceyl.* 22, nomen; *Thw. l. c.* 77.—Zeylan.
 obscura, *Thw. l. c.* 76.—Zeylan.
 obscura, *Thw. l. c.* 410, partim = Walkeri.
 pandurata, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) ii. 209.—Burma.
 parvifolia, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 77.—Zeylan.
 Perrottetii, *March. Rév. Anacard.* 169.—Ins. Celebes.
 philippinensis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 481.—Ins. Philipp.
 pubescens, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 77.—Zeylan.
 Roxburghii, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 188.—Borneo.
 scabrida, *Blume, l. c.* 189.—Borneo.
 subpanduraeformis, *Wall. Cat. n.* 987.—Ind. or.
 subpeltata, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 75.—Zeylan.
 subracemosa, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) ii. 304.—Burma.
 Thwaitesii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 31 = pubescens.
 travancorica, *Bedd. Fl. Sylv.* ii. t. 232.—Ind. or.
 vitiensis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 483 = *Oncocarpus vitiensis*.
 Walkeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 33.—Zeylan.
 zeylanica, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 189 = obscura?

SEMEIANDRA, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 291. t. 59 (1839). *ONAGRARIACEAE*, Benth. & *Hook. f. i.* 791.
 grandiflora, *Hook. & Arn. l. c.*—Mexic.

SEMEIOCARDIUM, *Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xvii. (1858) 245 = *Polygala*, Linn.
 Arriensii, *Zoll. l. c.*—Java.
 glaucescens, *Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 151 = *P. triphylla*.
 Hamiltonii, *Hassk. l. c.* = *P. triphylla*.
 hyalinum, *Hassk. l. c.* = *P. triphylla*.

SEMEIONOTIS, *Schott, in Wien. Zeitschr.* iii. (1829) 804; *ex Endl. in Linnaea*, vi. (1831) Litt. 55 = *Dalbergia*, Linn. (*Legumin.*).
 floribunda, *Schott, l. c.* (Quid?).—Bras.

SEMELE, *Kunth, in Abh. Akad. Berl.* (1842) 49. *LILIACEAE*, Benth. & *Hook. f. iii.* 765.
 AMPHION, *Salisb. Gen. Pl. Fragm.* 66 (1866).
 androgyna, *Kunth, Enum. Pl. v.* 277.—Ins. Canar.

SEMENOVIA, *Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) ii. 78. *UMBELLIFERAE*.
 transiliensis, *Regel & Herd. l. c.* 79.—Turkestan.

SEMETOR, *Rafin. Sylva Tellur.* 69 (1838) = *Aspalathus*, Linn. (*Legumin.*).
 arborea, *Rafin. l. c.* = *A. arborea*.

SEMIOPSIS, *Zumag. Fl. Pedem.* i. 249 (1849) = *Alnus*, *Tourn. (Cupul.)*.
 viridis, *Zumag. l. c.* 250 = *A. viridis*.

SEMILTA, *Rafin. Sylva Tellur.* 63 (1838) = *Croton*, Linn. (*Euphorb.*).
 altheaeifolia, *Rafin. l. c.* = *C. altheaeifolius*.

SEMIAMISIA, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 25. *VACCINIACEAE*, Benth. & *Hook. f. ii.* 569.
 Karsteniana, *Klotzsch, l. c.* 26.—Venezuela.
 speciosa, *Klotzsch, l. c.* 25.—Ecuador.

SEMNOS, *Rafin. Sylva Tellur.* 161 (1838) = *Chilianthus*, *Burch. (Logan.)*.
 paniculata, *Rafin. l. c.* = *C. oleaceus*.

SEMONVILLEA, *J. Gay, in Bull. Féruss.* xviii. (1829) 412. *FICOIDEAE*, Benth. & *Hook. f. i.* 859.
 DITROCHE, *E. Mey. ex DC. Prod.* xiii. ii. 19 (1849).
 chenopodioides, *J. Gay, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. ii. 19 = pterocarpa.
 fenestrata, *Fenzl, in Nov. Stirp. Dec.* 42.—Afr. austr.
 portulacoides, *Mus. Par. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. ii. 20 = *Limeum viscosum*.
 pterocarpa, *J. Gay, in Bull. Féruss.* xviii. (1829) 412.—Afr. trop.
 punctata, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 556 = pterocarpa.

SEMPERVIVUM, *Rupp. ex Linn. Syst. ed. I* (1735). *CRASSULACEAE*, Benth. & *Hook. f. i.* 660.
 AEONIUM, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* i. 184. t. 28 (1836?).
 AICHRYSON, *Webb & Berth. l. c.* 181. t. 27 (1836?).
 GREENOVIA, *Webb & Berth. l. c.* 198. t. 36 (1836?).
 JOVIBARBA, *Opiz, Seznam*, 54 (1852).
 SEDUM, *Adans. Fam.* ii. 248 (1763).
 abyssinicum, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 30; *et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 315.—Abyss.
 acuminatum, *Jacquem. Voy. Bot.* 63. t. 74. f. 1.—Reg. Himal.
 acuminatum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* iii. (1853) 28 = glaucum.
 adoxum, *Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 40 = tectorum.
 affine, *Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont*, vi. (1864) 269.—Europ.
 africanum, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. n. 7.—Afr. austr.
 agriostaphis, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* i. 216 (Index), nomen.—Ins. Canar.
 aizoides, *Lam. Encyc.* iii. 290.—Ins. Madera.
 alatum, *Scheele, in Flora*, xxvi. (1843) 453.—Europ.
 albidum, *Schnittsp. & C. B. Lehm. l. c.* xxxviii. (1855) 4.—Hab.?
 album, *Edgw. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 49 = sedoides.
 Allionii, *Nym. Consp.* 260 = hirtum.

SEMPERVIVUM:—

alpestre, *Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont*, vi. (1864) 308 = montanum.
 alpinum, *Griseb. & Schenk, in Linnaea*, xxv. (1852) 600 = arvernense.
 ambiguum, *Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont*, vi. (1864) 271.—Europ.
 angustifolium, *A. Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol.* III. xv. (1870) 267.—Tyrol.
 annum, *C. Sm. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins.* 154.—Ins. Canar.
 anomalum, *Hort. ex Baker, in Gard. Chron.* (1879) ii. 107 = pumilum?
 anomalum, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 17 = *Sedum amplexicaule*.
 arachnoideum, *Linn. Sp. Pl.* 465.—Europ. austr.
 arboreum, *Linn. l. c.* 464.—Reg. Mediterr.
 arenarium, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. I. 833.—Europ. austr.
 arenarium, *Stev. ex Baker, in Gard. Chron.* (1874) ii. 104 = ruthenicum.
 armenum, *Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II.* ii. 60 = globiferum.
 arvernense, *Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Vasc. Fr.* 179.—Gallia.
 assimile, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* iii. (1853) 19.—Transsylv.
 atlanticum, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 454.—Marocc.
 aureum, *C. Sm. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn.* 61.—Ins. Canar.
 austriacum, *Nym. Consp.* 260 = hirtum.
 balsamiferum, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* i. 192.—Ins. Canar.
 barbatum, *Hornem. Suppl. Hort. Hafn.* 61 = caespitosum.
 barbatum, *C. Sm. Hort. Berol.* 37; *ex Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 20.—Ins. Canar.
 barbulatorum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* iii. (1853) 91 = arachnoideum.
 beugesiacum, *Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 30 = tectorum.
 bifurcum, *W. Baxt. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 673, nomen.—Ins. Canar.
 blandum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* iii. (1853) 29.—Transsylv.
 Boissieri, *Hort. ex Baker, in Gard. Chron.* (1879) ii. 39.—Hab.?
 Boutignyanum, *Billot & Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem.* 263, 302 = arvernense.
 brachiatum, *Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont*, vi. (1864) 267.—Europ.
 brachycaulon, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* i. 216 (Index) (Quid?).—Ins. Canar.
 bracteatum, *Viv. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 556, nomen.—Afr. bor.
 Brassaii, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 229 = patens.
 Braunii, *Funk, ex Koch, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft* 67.—Europ. austr.
 Braunii, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 190 = globiferum.
 breviamum, *Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 36 = tectorum.
 brevistylum, *Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont*, vi. (1864) 264.—Europ.
 bulbosum, *Soland. ex Webb & Berth. Phyt. Canar.* i. 202 = *Monanthes brachycaulon*.
 caespitosum, *C. Sm. Hort. Berol.* 38; *ex Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 20.—Ins. Canar.
 calcaratum, *Hort. ex Baker, in Gard. Chron.* (1874) ii. 386.—Hab.?
 calcareum, *Jord. Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 26.—Europ. austr.
 californicum, *Hort. ex Baker, in Gard. Chron.* (1874) ii. 103 = calcareum.
 calyciforme, *Haw. Suppl. Pl. Succ.* 69 = aureum.
 campaniforme, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 229 = globiferum.
 canariense, *Linn. Sp. Pl.* 464.—Ins. Canar.
 cantalicum, *Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 41 = tectorum.
 cappadocicum, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 797 = globiferum.
 caucasicum, *Rupr. ex Boiss. l. c.* 796.—Reg. Cauc.
 cebennense, *Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr.* i. 313 = arvernense.
 celsicaule, *Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 33 = tectorum.
 Chavini, *Lagg. in Bull. Soc. Murith.* ii. (1873) 32.—Helvet.

SEMPERVIVUM:—

- chrysanthum, *Hochst. ex Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 400.—Abbyss.
- ciliare*, Haw. Rev. Pl. Succ. 64 = caespitosum.
- ciliatum*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 183 = tectorum.
- ciliatum*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 27 = globiferum.
- ciliatum*, Sims, Bot. Mag. t. 1978 = caespitosum.
- ciliatum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 508.—Ins. Canar.
- claviculatum*, Sieber, ex DC. Prod. iii. 414, nomen.—Hab.?
- Clusianum*, Tenore, Fl. Nap. iv. 268 = montanum.
- collinum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 39 = tectorum.
- columnare*, Jord. & Fourr. l. c. 45 = tectorum.
- Comollii*, Kotschy, Fl. Berg. 100 = glaucum.
- compactum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 289 = tectorum.
- complanatum*, A. DC. in Lem. Jard. Fleur. i. (1851) Misc. 35.—Ins. Canar.
- constrictum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 43 = tectorum.
- corymbosum*, Jord. & Fourr. l. c. 44 = tectorum.
- crassifolium*, Salisb. Prod. 308 = tectorum.
- cruentum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 186.—Ins. Canar.
- cuneatum*, Webb & Berth. l. c. 197.—Ins. Canar.
- cuspidatum*, Haw. Misc. Nat. 186 = Umbilicus spiruosus.
- debile*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. ii. (1852) 18.—Europ. occ.
- decoloratum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 30 = tectorum.
- Delasoeii*, C. B. Lehm. & Schnittsp. in Ber. Offenb. Ver. Naturk. i. (1860) 33.—Hab.?
- densum*, C. B. Lehm. & Schnittsp. l. c. 56.—Hab.?
- dichotomum*, DC. Pl. Rar. Genève, 78 t. 21 = annuum.
- dicanoclodon*, Jord. & Fourr. Pl. Brev. Nov. fasc. ii. 42 = tectorum.
- divaricatum*, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 326 = punctatum.
- dodrantale*, Willd. Enum. Hort. Berol. 508.—Ins. Canar.
- Doellianum*, C. B. Lehm. in Flora, xxxiii. (1850) 449 = arachnoideum.
- dolomitum*, Facc. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. iv. (1854) 56 = Funkkii.
- dumosum*, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 328.—Ins. Mader.
- elegans*, Lagg. in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 50.—Helvet.
- erubescens*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 42 = arvernense.
- Fauconnetti*, Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 298 = arachnoideum.
- fimbriatum*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 144. t. 43 = sedoides.
- fimbriatum*, Schnittsp. & C. B. Lehm. in Flora, xxxviii. (1855) 17.—Tyrol.
- flagelliforme*, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 20.—Sibir.
- foliosum*, C. Sm. Hort. Berol. 38; ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 19 = Smithii.
- Fontanae* x, Bruegg. in Cat. Hort. Turic. xii. (1864).—Europ.
- frigidum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 310 = montanum.
- frutescens*, Haw. in Phil. Mag. (1827) 125.—Ins. Canar.
- Funkkii*, F. Braun, ex Koch, in Flora, xv. (1832) 4. t. 1.—Europ. austr.
- Funkii*, Lej. ex Nym. Consp. 258 = Schnittspahni.
- glandulosum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 148.—Ins. Mader.
- glaucum*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13.—Tyrol.
- globiferum*, Linn. Sp. Pl. 464.—Europ. or.; As. Min.
- globiferum*, Wulf. in Jacq. Fl. Austr. v. 50. t. 40 = Wulfeni.
- glutinosum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 147.—Ins. Mader.
- Goochia*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 190.—Ins. Canar.
- grandiflorum*, Haw. Rev. Pl. Succ. 66 = globiferum.
- Greenii*, Baker, in Gard. Chron. (1877) II. 230.—Hab.?
- Guillemotii*, Lamotte, in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 457.—Gallia.
- Hausmanni*, Auersd. ex Nym. Consp. 259 = arachnoideum.

SEMPERVIVUM:—

- Haworthii, Hort. Angl. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 253, nomen; et ex Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 193.—Ins. Canar.
- Heerianum* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 97.—Europ.
- heterotrichum*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853) 83.—Europ. or.
- Heuffelii*, Schott, l. c. ii. (1852) 18 = patens.
- Hillebrandtii*, Schott, l. c. = patens.
- himalayense*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 145. t. 43 = acuminatum.
- hirtellum*, Schott, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1857) 171 = arenarium.
- hirtum*, Jacq. Fl. Austr. i. 10. t. 12 = globiferum.
- hirtum*, Linn. Cent. Pl. i. 12; Amoen. Acad. iv. 273.—Europ. austr.
- hirtum*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 334 = patens.
- hispanicum*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 136 = Sedum amplexicaule.
- hispanicum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 508.—Hispan.
- holochrysum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 194.—Ins. Canar.
- hybridum* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 93.—Europ.
- hybridum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 180 = caespitosum.
- juratense*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 28 = montanum.
- Kochii*, Facc. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. iv. (1854) 57 = arenarium.
- kopaonikense*, Panč. Fl. Princ. Serbie, (1874) 314; ex ej. Elem. Fl. Bulg. 30.—Serbia.
- laetevirens*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 37 = tectorum.
- Laggeri*, Schnittsp. ex Nym. Consp. 259 = arachnoideum.
- Lamottei*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, (1859) 86 = tectorum.
- latifolium*, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 208.—Ins. Canar.
- latifolium*, Salisb. Prod. 308 = canariense.
- laetareticum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 296 = arachnoideum.
- laxum*, Haw. Rev. Pl. Succ. 65.—Ins. Canar.
- Legrandi*, F. Schultz, in Flora, l. (1867) 469 = arvernense.
- leptopetalum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 43 = tectorum.
- lesurinum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 282 = arvernense.
- leucanthum*, Panč. Elem. Fl. Bulg. 30.—Europ.
- Lindleyi*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 189.—Ins. Canar.
- lineolare*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 69 = barbatum.
- longifolium*, Schnittsp. ex Lagg. in Flora, xli. (1858) 659, nomen.—Hab.?
- Lowe*, Paiva, in Journ. Bot. v. (1867) 21 = Monanthes brachycaulon.
- luxurians*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 34 = tectorum.
- macranthum*, Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 559 = arachnoideum.
- Maitrea*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 273 = tectorum.
- majus*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 213 = tectorum.
- marmoreum*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 329 = tectorum.
- Masferrerii*, Hillebr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 137.—Ins. Canar.
- Mettenianum*, Schnittsp. & C. B. Lehm. in Flora, xxxviii. (1855) 4 = tectorum.
- micranthes*, Webb, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 556 (sp. dub.).—Ins. Canar.
- minimum*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 136, 138 = arvernense.
- minutum*, Pourr. ex Nym. Consp. 258 = tectorum.
- modestum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 38 = tectorum.
- Mogridgei*, De Smet, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 6610.—Europ. austr.
- molle*, Vis. Sem. Hort. Patav. (1841) 3; ex Walp. Rep. ii. 264.—Afr. trop.
- Monanthes*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 149 = Monanthes polyphylla.
- montanum*, Linn. Sp. Pl. 465.—Europ. med.
- montanum*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 152 = caucasicum.
- montanum*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 335 = tectorum.

SEMPERVIVUM:—

- monticolum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 37 = tectorum.
- monticolum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 306, partim = montanum.
- mucronatum*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 49.—Reg. Himal.
- multiflorum*, Jacquem. Voy. Bot. 61 = Crassula indica.
- Murithii*, Lagg. in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 49.—Helvet.
- mutabile*, W. Schlecht. ex Breit, Hort. Breit. 472.—Ins. Creta.
- Neilreichii*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 19 = arenarium.
- obovatum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 32 = tectorum.
- oligotrichum*, Baker, in Gard. Chron. (1879) II. 166.—Tyrol.
- Paivae*, Lowe, in Hook. Bot. Mag. t. 5593.—Ins. Canar.
- pallenscens*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 40 = tectorum.
- pallidum*, Jord. & Fourr. l. c. 33 = tectorum.
- paniculatum*, Soland. ex Lowe, Man. Fl. Mad. i. 337 = arboreum.
- parviflorum*, C. B. Lehm. & Schnittsp. in Ber. Offenb. Ver. Naturk. v. (1864) 55.—Hab.?
- parvulum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 38 = tectorum.
- patens*, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) I. 315.—Banat.
- patina*, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 322 = glandulosum.
- pauciflorum*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1879) II. 107 = pumilum?
- penninum*, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 15.—Helvet.
- piliferum*, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 27 = arachnoideum.
- Pittonii*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 19.—Styria.
- Pomelii*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 303.—Gallia.
- praestabile*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 28 = tectorum.
- pruinatum*, Spreng. Syst. ii. 169 = Sedum pruinaum.
- Pseudo-arachnoideum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 294 = arachnoideum.
- pulchellum*, Walp. Rep. ii. 935.—Hab.?
- pulverulentum*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 325 = arvernense.
- pumilum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 381.—Reg. Cauc.
- punctatum*, C. Sm. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 155.—Ins. Canar.
- purpurascens*, Schott, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 796 = tectorum.
- pygmaeum*, Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 559 = arachnoideum.
- pygmaeum*, C. Sm. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 155.—Ins. Canar.
- pyrenaicum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 44 = tectorum.
- pyrenaicum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 284.—Europ.
- racemosum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 44 = tectorum.
- Reginae-Amaliae*, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 796 = tectorum.
- Requieni*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 572 = tectorum.
- retusum*, Haw. in Phil. Mag. (1827) 125.—Ins. Canar.
- rhaeticum* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 95.—Europ.
- rhodanicum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 31 = tectorum.
- rigidum*, Jord. & Fourr. l. c. 35 = tectorum.
- robustum*, Jord. & Fourr. l. c. 32 = tectorum.
- roseum*, Hut. ex Nym. Consp. 259 = fimbriatum.
- rubellum*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 14.—Europ. austr.
- rubicundum*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 67 = blandum.
- rupicolum*, Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xv. (1870) 270.—Europ.
- ruthenicum*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 289; Schnittsp. & C. B. Lehm. in Flora, xxxviii. (1855) 5.—Europ. or.

SEMPERVIVUM:—

- sabaudum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 29 = tectorum.
sanguineum, *Jeand. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* iii. (1875-76) 558 = arachnoideum.
saxosum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 36 = tectorum.
Schlehani, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853) 12 = glaucum.
Schnittspahni, Lagg. in *Flora*, xli. (1858) 659.—Europ.
Schottii, Baker, in Gard. Chron. (1874) II. 103 = glaucum.
Schottii, C. B. Lehm. & Schnittsp. in Ber. Offenb. Ver. Naturk. i. (1860) 35.—Hab.?
sediforme, Jacq. Hort. Vindob. i. 35. t. 81 = Sedum nicaeense.
sedoides, J. F. Gmel. Syst. 769 = praec.
sedoides, Jacquem. Voy. Bot. 63. t. 74. f. 2.—Reg. Himal.
Seguieri, DC. Prod. iii. 414.—Ital.
seusanum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 35 = tectorum.
simense, Hochst. ex Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 399 = Cotyledon simensis.
Simsii, Sweet, Hort. Suburb. Lond. 230 = caespitosum.
Smithii, Sims, Bot. Mag. t. 1980.—Ins. Canar.
soboliferum, Fleisch. & Lindem. Fl. Ostseeprov. 171 = hirtum.
soboliferum, Sims, Bot. Mag. t. 1457 = globiferum.
spathulatum, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 60 = barbatum.
speciosum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 265.—Europ.
sphaeroideum, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1876) I. 603.—Ins. Canar.
spinulosum, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 17, nomen.—Helvet.
stellatum, Pollini, Fl. Veron. ii. 114 = Seguieri.
stellatum, Sm. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 251.—Ins. Mader.
stenopetalum, Schnittsp. & C. B. Lehm. in Flora, xxxviii. (1855) 18.—Hab.?
stramineum, Baker, in Gard. Chron. (1874) II. 104.—Hungar.
stramineum, Nym. Consp. 260 = patens.
strepsicladum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 187.—Ins. Canar.
subvillosum, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 331.—Ins. Mader.
tabulaeforme, Haw. Suppl. Pl. Succ. 69.—Ins. Mader.
tectorum, Eichw. Besch. Casp.-Cauc. 31 = Braunii.
tectorum, Linn. Sp. Pl. 464.—Europ.; Oriens.
tenuifolium, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 335 = Sedum amplexicaule.
Theobaldi ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 97.—Europ.
Thomasii, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 17.—Helvet.
Tissieri, Lagg. l. c. ii. (1873) 32.—Helvet.
tomentosum, C. B. Lehm. & Schnittsp. in Flora, xxxix. (1856) 57 = arachnoideum.
tortuosum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 148.—Ins. Canar.
transylvanicum, Baker, in Gard. Chron. (1874) II. 104 = globiferum.
trifurcum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 41 = tectorum.
triste, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1879) II. 39.—Hab.?
undulatum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 197.—Ins. Canar.
urbicum, Lindl. Bot. Reg. t. 1741 = holochrysum.
urbicum, C. Sm. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 60.—Ins. Canar.
uviferum, Webb, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 556, nomen.—Ins. Canar.
valesiaceum, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 15.—Helvet.
validum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 31 = tectorum.
vellavum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 280 = arvense.
venustum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 29 = tectorum.
Verloti, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 275 = Pomelii.

SEMPERVIVUM:—

- vermiculare*, Gueldenst. Reisen, i. 102; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 190 (Quid?).—Transcauc.
villosum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 148.—Ins. Canar.
villosum, Lindl. Bot. Reg. t. 1553 = Lindleyi.
violascens, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 34 = tectorum.
Webbianum, Hort. ex C. B. Lehm. & Schnittsp. in Flora, xxxix. (1856) 57 = arachnoideum.
Widderi, C. B. Lehm. & Schnittsp. in Ber. Offenb. Ver. Naturk. i. (1860) 36.—Hab.?
Wulfeni, Hoppe, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 386.—Austria.
Youngianum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 197.—Ins. Canar.
Zelevori, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 245.—Serbia.

SENACIA, Comm. ex DC. Prod. i. 347 (1824) = **Pittosporum**, Banks.
nepalensis, DC. l. c. = P. floribundum.

SENACIA, Lam. Illustr. ii. 95 (1793). 'Genus delendum.'
 —Cf. Benth. & Hook. f. i. 360.
elliptica, Lam. l. c. 96 = Celastrus dubius.
glaucal, Lam. l. c. 97 = Elaeodendrum glaucum.
lanceolata, Lam. l. c. 96 = Celastrus lanceolatus.
Maytenus, Lam. l. c. = Maytenus Boaria.
octogona, Lam. l. c. = Maytenus octogona.
undulata, Lam. l. c. = Pittosporum Senacia.

SENAPEA, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 22. f. 381 (1775).
 Genus ignotum.
guianensis, Aubl. l. c. 22.—Guian.

SENCKENBERGIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 413 (1800) = **Lepidium**, Linn. (Crucif.).
ruderalis, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. 433 = L. ruderale.

SENEBIERA, DC. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. (1799) 140. tt. 8, 9. **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 967.

CARARA, Medic. Pflanzengatt. i. 34 (1792).
 CORONOPUS, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1735), nomen prius; Gaertn. Fruct. ii. 293 (1791).
 COTYLISCUS, Desv. Journ. Bot. iii. (1813) 164, 175.

EUDISTEMON, Rafin. Med. Fl. ii. 219 (1830).
 NASTURTIOLUM, Medic. Pflanzengatt. i. 82 (1792).
australis, Hook. f. Fl. Antarct. 241.—Patagon.

coronopoda, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = S. Coronopus.

Coronopus, Poir. Encyc. vii. 76.—Cosmop.
didyma, Pers. Syn. ii. 185 = pinnatifida.

diffusa, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 557, nomen.—Chili.

dubia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 76 = Lepidium Humboldtii.

Figariana, Parl. Giorn. Bot. Ital. i. r. (1844) 308.—Aegypt.?

Heleniana, DC. Syst. ii. 523 = pinnatifida?

incisa, Willd. Enum. Hort. Berol. 668 = pinnatifida.

integrifolia, DC. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. (1799) 144. t. 8.—China; Afric.; Austral.

lepidioides, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 245.—Alger.

linoides, DC. Syst. ii. 522 = integrifolia.

mexicana, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 276 = Lepidium virginicum.

nilotica, DC. Syst. ii. 527.—Aegypt.

pectinata, DC. l. c. 523 = pinnatifida.

pinnatifida, DC. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. (1799) 144 t. 9.—Cosmop.

Raddii, Walp. Rep. ii. 764.—Aegypt.

rhytidocarpa, Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 506.—Patagon.

serrata, Poir. Encyc. vii. 76.—Reg. Argent.

squamata, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 156 = S. Coronopus.

supina, Thore, Ess. Chl. Land. 275.—Gallia.

violacea, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 282.—Alger.

SENECIASTRUM, Heist. Syst. 7 (1748) (Quid?).

SENECILLIS, Gaertn. Fruct. ii. 453, t. 173 (1791) = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

carpathica, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 5 = *glaucal*, Schott.

filiformis, Spreng. ex Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702 = Euryops trifurcatus.

glaucal, Gaertn. Fruct. ii. 453.—Sibir.

glaucal, Ledeb. Fl. Alt. iv. 113 = Senecio altaicus.

glaucal, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 5 = Transsylv.

heterophylla, Schur, Enum. Pl. Transs. 342 = *glaucal*, Schott.

Jacquemontiana, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 90. t. 98 = Senecio Jacquemontianus.

purpurata, Gaertn. Fruct. ii. 453 = Cineraria purpurata.

Schmidtii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvi. (1871) 222 = Senecio Schmidtii.

SENECIO. [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. 251 (1735); Gen. ed. I. 251 (1737). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 446.

ACLEIA, DC. Prod. vi. 340 (1837).

ADENOTRICHIA, Lindl. Bot. Reg. t. 1190 (1828).

ADONIGERON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404.

AETHEOLAENA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 450 (1827).

ANECIO, Neck. Elem. i. 28 (1790).

ASPELINA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xli. 166 (1826).

BETHENCOURTIA, Choisy, in Buch, Besch. Canar. Ins. 148 (1825).

BRACHYPAPPUS, Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1855) 119.

BRACHYRHYNCHOS, Less. Syn. Comp. 392 (1832).

BRANICIA, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 476.

CACALIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 834 (1753).

CARDERINA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 272 (1825).

CENTROPAPPUS, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 124.

CINERARIA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1242 (1762), partim.

CISSAMPELOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 102 (1856).

CLADOPOGON, Sch. Bip. in Ind. Sem. Hort. Hamb. (1852) 8; ex Lehm. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. (1853) 359.

DANAA, Colla, in Mem. Acc. Torin, xxxviii. (1835) 27. t. 28.

DELAIRIA, Lem. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 379.

DORIA, Thunb. Nov. Gen. xii. 162 (1800).

DOROBAEA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 453 (1827).

ERYTHROCHAETE, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 188 (Fam. Nat. Fl. Jap. ii. 64).

EUDORUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 165; et in Dict. Sc. Nat. xv. 525 (1819).

FARFUGIUM, Lindl. in Gard. Chron. (1857) 4.

FAROBAEA, Schrank, ex Colla, Hort. Ripul. App. iii. 36, in nota (1829); et iv. 19. t. 9 (1831).

HAPLOSTICHA, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 193.

HERBICHA, Zawadski, in Guill. Arch. Bot. i. (1832) 450; et Enum. Pl. Galic. 198 (1835).

HOPPEA, Reichb. in Flora, vii. (1824) 245.

HUBERTIA, Bory, Voy. i. 334. t. 14 (1804).

JACOBAEA, Thunb. Fl. Cap. Prod. Praef. (1794).

JACOBANTHUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 403.

KLEINIA, Haw. Syn. Pl. Succ. 312 (1812).

LACHANODES, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 332.

LEUCOSERIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404.

LIGULARIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 198.

MADACARPUS, Wight, Ic. t. 1152 (1846).

MADARACTIS, DC. Prod. vi. 322 (1837).

MESADENIA, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 247.

MESOGRAMMA, DC. Prod. vi. 304 (1837).

MESONEURIS, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 661.

METACANTHUS, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 280.

METAZANTHUS, Meyen, Reise, i. 356 (1834).

MICROCHAETE, Benth. Pl. Hartw. 209 (1845).

SENECIO :—

- MOERKENSTEINIA, Opiz, Seznam, 66 (1852).
 OBAEJACA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 270 (1825).
 ODONTOTRICHUM, Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1832) 311.
 PENTACALIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 461 (1827).
 PENTANTHUS, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 32.
 PERICALIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 459 (1827).
 PERICALIS, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. tt. 103, 106 (1835-60).
 PITHOSILLUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. xli. 164 (1826).
 PLADAROXYLON, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1055 (1870).
 PSACALUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 461 (1820).
 ROLDANA, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 10 (1825).
 RUGELIA, Shuttlew. in Chapm. Fl. S. U. St. 246 (1860).
 SCIADIOSERIS, Kunze, in Bot. Zeit. ix. (1851) 349.
 SCLEROBASIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 73.
 SENEICILLIS, Gaertn. Fruct. ii. 453. t. 173 (1791).
 SENEICUNCULUS, Opiz, Seznam, 90 (1852).
 SYNARTHURUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. li. 457 (1827).
 SYNEILESIS, Maxim. Prim. Fl. Amur. 165 (1859).
 SYNOSMA, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 247.
 TEPHROSERIS, Schur, Enum. Pl. Transs. 343 (1866).
 TRAVERSIA, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 163 (1864).
 WILLKOMMIA, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 357 (1879).
 abadianus, DC. Prod. vi. 423.—Peruv.
 abietinus, Willd. ex Wedd. Chlor. And. i. 100, 101.—N. Granat.
 abrotanifolius, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1242 = S. Jacobaea.
 abrotanifolius, Gouan, Hort. Monsp. 440 = adonidifolius.
 abrotanifolius, Linn. Sp. Pl. 869.—Europ.
 abrotanoides, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 397 = pinnatifidus.
 abruptus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 159.—Afr. austr.
 abyssinicus, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 27, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 438.—Abyss.
 acanthifolius, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. & Zél. 46.—Patagon.
 acanthifolius, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 714 = S. Cineraria.
 acaulis, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1861) 52.—Chili.
 acaulis, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.
 acerifolius, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 235.—Mexic.
 achilleaeifolius, DC. Prod. vi. 396.—Afr. austr.
 aconitifolius, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii. 155.—China.
 Actinella, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 87.—Arizona.
 actinoleucus, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Victoria, viii. (1867) 40.—Afr. austr.
 acuminatus, Wall. Cat. n. 3107.—Reg. Himal.
 acutangulus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 235.—Guatemala.
 acutidentatus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 436 = picridifolius.
 acutifolius, DC. Prod. vi. 402.—Afr. austr.
 adamantinus, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. v. (1838) 97.—Bras.
 adenodontus, DC. Prod. vi. 378.—Madag.
 adenophylloides, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.
 adenophyllus, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 282.—Peruv.
 adenostyloides, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 486.—Japon.
 adenotrichius, DC. Prod. vi. 416.—Chili.
 adfinis, Less. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 363 = erubescens, Ait.
 adnatus, DC. Prod. vi. 388.—Afr. austr.

SENECIO :—

- adonidifolius, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 566; ed. II. ii. 239.—Europ.
 adscendens, Boj. ex DC. Prod. vi. 378.—Madag.
 adscendens, DC. l. c. 423 = andinus.
 aegyptius, Linn. Sp. Pl. 867.—Aegypt.
 aethnensis, Jan, ex DC. Prod. vi. 345.—Ital.
 affinis, DC. l. c. 385 = albanensis.
 africanus, Hort. ex Poir. Encyc. Suppl. v. 129 = Gynura haematophylla.
 agapatensis, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.
 Aitonianus, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 386 = Cineraria canescens.
 aizoides, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
 akrabatensis, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 312.—Turkestan.
 alatus, Wall. Cat. n. 3114.—Reg. Himal.
 alatus, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 633 = lampsanoides.
 albanensis, DC. Prod. vi. 385.—Afr. austr.
 albens, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.
 albicans, Pers. Syn. ii. 438 = lanatus.
 albicaulis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 344.—Patagon.
 albicaulis, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702 = polymorphus.
 albidus, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 398 = grandiflorus.
 albiflorus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Chili.
 albifolius, DC. Prod. vi. 389.—Afr. austr.
 albo-dentatus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lviii. (1881) 144 = S. Calaliaster.
 albolanatus, Phil. Fl. Atac. 32.—Chili.
 albo-lutescens, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
 alcornis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 334.—Chili.
 Alciope, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500 = Alciope lanata.
 algens, Wedd. Chlor. And. i. 104.—Bolivia.
 Almeidae, Phil. Fl. Atac. 33.—Chili.
 aloides, DC. Prod. vi. 402.—Afr. austr.
 alpester, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 202 = seq.
 alpestris, DC. Prod. vi. 360.—Europ.
 alpestris, Gaud. Fl. Helv. v. 296 = Fuchsii.
 alpinus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 190 = bracteolatus, Hook. f.
 alpinus, Linn. f. Suppl. 371 = lyratifolius.
 alpinus, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 164.—Europ.
 alsophilus, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 2.—Chili.
 altaicus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Sibir. altaic.
 altissimus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = S. Doria.
 amabilis, DC. Prod. vi. 406.—Afr. austr.
 amabilis, Vell. Fl. Flum. viii. t. 107 = brasiliensis.
 Ambavilla, Pers. Syn. ii. 436.—Ins. Borbon.
 ambiguus, DC. Prod. vi. 356.—Ital.
 ambraceus, Turcz. ex DC. l. c. 348.—China.
 ambrosioides, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 322 = brasiliensis.
 americanus, DC. Prod. vi. 310.—N. Granat.
 ammophilus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 193 = californicus.
 ammophilus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 748.—Chili.
 amoenus, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 443 = Werneria africana.
 amphibolus, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 361.—Reg. Caucas.
 amphibolus, Wedd. Chlor. And. i. 109.—Bolivia.
 amplexens, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 240.—Am. bor.
 amplexicaulis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 181.—Ecuador.
 amplexicaulis, Wall. Cat. n. 3139.—Reg. Himal.
 amplifolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
 amplus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 195.—Chili.
 ampullaceus, Hook. Bot. Mag. t. 3487.—Texas.
 amygdalifolius, F. Muell. Fragm. i. 232.—Austral.
 Anacampserotis, DC. Prod. vi. 374.—Austral.
 anacephalus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 208.—Reg. Argent.

SENECIO :—

- analogus, DC. Prod. vi. 366 = chrysanthemoides.
 Anampoza, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 191.—Madag.
 Andersoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 204.—Burma.
 Andersoni, Hook. f. Fl. Antarct. 312.—Patagon.
 andicola, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 91.—Ecuador.
 andinus, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi.—Peruv.
 andinus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. vii. (1841) 409 = S. Serra, Hook.
 Andrieuxii, DC. Prod. vi. 430.—Mexic.
 andryalooides, DC. l. c. 420 = crassifolius.
 anethifolius, A. Cunn. in DC. l. c. 371.—Austral.
 angavonensis, Boj. ex DC. l. c. 377.—Madag.
 angulatus, Linn. f. Suppl. 369.—Afr. austr.
 angulifolius, DC. Prod. vi. 431.—Mexic.
 angulosus, Wall. Cat. n. 3117 = densiflorus.
 angustifolius, Forst. f. Prod. 91 = lautus.
 angustifolius, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 526 = anethifolius.
 angustifolius, Wall. ex DC. Prod. vi. 367 = saxatilis.
 angustifolius, Willd. Sp. Pl. iii. 1973.—Afr. austr.
 angustilobus, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 418 = anethifolius.
 angustissimus, Phil. l. c. xxviii. (1856) 746.—Chili.
 anomalus, DC. Prod. vi. 310.—Graecia.
 anonymus, Wood, Am. Bot. Flor. 187.—Am. bor.
 Antennaria, Wedd. Chlor. And. i. 106.—Peruv.; Bolivia.
 Anteuphorbium, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.
 anthemidiphyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 177.—Chili.
 anthemifolius, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 376.—Afr. austr.
 anthemifolius, Sieber, ex Steud. Nym. ed. II. ii. 558 = delphinifolius.
 anthemoides, Steud. l. c.—Ind. or.
 anthoraefolius, Presl, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 243 = praealtus.
 Antismae, Benth. Pfl. Hartw. 210.—N. Granat.
 antucensis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 747.—Chili.
 apargiaefolius, Walp. l. c. xiv. (1840) 309 = Erechites arguta.
 apenninus, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 252 = S. Doronicum.
 apiculatus, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 128.—Venezuela.
 appendiculatus, DC. Prod. vi. 376.—Ins. Maurit.
 appendiculatus, Poir. Encyc. vii. 102 = auriculatus, Vahl.
 appendiculatus, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 327.—Ins. Canar.
 apuanus, Tausch, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 851.—Europ.
 apulus, Tenore, ex Nym. Consp. 357 = crassifolius.
 aquaticus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 332 = praealtus.
 aquaticus, Hill, Veg. Syst. ii. 120; Huds. Fl. Angl. ed. I. 317.—Europ.
 aquaticus, Loisel. Fl. Gall. ii. 566; et ed. II. ii. 240; Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 178 = erraticus.
 aquifoliaceus, DC. Prod. vi. 394.—Afr. austr.
 arabicus, Linn. Mant. i. 114.—Aegypt.; Arab.
 arachnoideus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 739.—Chili.
 arachnoideus, Sieber, ex DC. Prod. vi. 357 = lanatus, Scop.
 arachnoideus, Wall. Cat. n. 3163 = araneosus.
 arachnolomus, Wedd. Chlor. And. i. 104.—Peruv.
 araneosus, DC. Prod. vi. 364.—Ind. or.; Java.
 araneosus, E. Mey. ex DC. l. c. 391 = arnicaeflorus.
 araucanus, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 158.—Chili.
 arborescens, Steetz, in Seem. Bot. Voy. Herald, 162. t. 31.—Panama.
 arbutifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 182.—Peruv.
 arcticus, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 44.—As. bor. or.
 Arechavaletae, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 310.—Uruguay.
 arenarius, Bieb. in Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 129 = praealtus.
 arenarius, Lange, ex Nym. Consp. 356 = erucifolius.

SENECIO:—

arenarius, Salzm. ex DC. Prod. vi. 345 = *crassifolius*.
arenarin, Thunb. Prod. Pl. Cap. 158.—Afr. austr.
argaeus, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 100.—As. Min.
argentens, Kunze, ex DC. Prod. vi. 415.—Chili.
argentinus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 307, in obs.—Reg. Argent.
argillosus, Baker, l. c. 310.—Uruguay.
argophylloides, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 189.—Reg. Argent.
argophyllus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 747.—Chili.
argunensis, Debeaux, Fl. Tché-Fon, 85 = *ambraceus*.
argunensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) II. 18.—China.
argutus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 183.—Mexic.
argutus, A. Rich. Fl. N. Zél. 258 = *Erechtites arguta*.
Aristianus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 181.—Chili.
arizonicus, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 87.—Arizona.
Arleguianus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 190.—Chili.
armenius, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 143. t. 398.—Armenia.
armenicus, Ledeb. Fl. Ross. ii. 634, sphalm. = *praealtus*.
armoracifolius, Burch. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 316 = *icoglossus*.
arnicaeflorus, DC. Prod. vi. 390.—Afr. austr.
arnicoides, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 32 = *plantagineus*.
arnicoides, Wall. Cat. n. 3138.—Reg. Himal.
Arnottianus, DC. Prod. vi. 367 = *neelgherryanus*.
Arnotti, Hook. f. Fl. Antarct. 314.—Patagon.
aromaticus, Gilib. Exerc. Bot. in Schola Princip. Univ. Viln. 14.—Lithuan.
aronicoides, DC. Prod. vi. 426.—Calif.
Arrabidae, Steud. Nom. ed. II. ii. 558 = *brasiliensis*.
artemisiaefolius, Gilib. Exerc. Bot. in Schola Princip. Univ. Viln. 14.—Lithuan.
artemisiaefolius, Pers. Syn. ii. 435 = *adonidifolius*.
articulatus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.
asarifolius, Boj. ex DC. Prod. vi. 330 = *Fanjasia reticulata*.
Aschenbornianus, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 698.—Mexic.
asclepiadeus, DC. Prod. vi. 422.—Am. austr.
Aspelina, DC. l. c. 436.—Amer.
asper, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 196 = *rosmarinifolius*.
aspericaulis, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 174.—Chili.
asperulus, DC. Prod. vi. 386.—Afr. austr.
asplenifolius, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 207.—Reg. Argent.
assuayensis, DC. Prod. vi. 422.—Am. austr.
assuayensis, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 97 = *nevadensis*.
Atkinsoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 207 = *S. Ligularia*.
Atkinsoniae, F. Muell. Fragm. v. 88 = *Erechtites Atkinsoniae*.
atlanticus, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 58 = *vernalis*.
atlanticus, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 706.—Alger.
atriplicifolius, Hook. Fl. Bor. Am. i. 332.—Am. bor.
attenuatus, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 531, nomen.—Bolivia.
Ancheri, DC. Prod. vi. 361.—Graec.; Bithyn.
aurantiacus, Less. in Linnaea, ix. (1834) 191; DC. l. c. = *campestris*.
aurantiacus, Reichb. Ic. Fl. Germ. xvi. 44. t. 982 = *palustris*.
auratus, DC. l. c. 348.—Siberia.
aureus, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1243 = *paludosus*.
aureus, Linn. Sp. Pl. 870.—Am. bor.
aureus, Wall. Cat. n. 3113 = *densiflorus*.
auricomus, Link. ex DC. Prod. vi. 354 = *caespitosus*, Brot.
Auricula, Bourg. ex Coss. Notes Crit. 169.—Hispan.
auriculatus, Burm. f. Fl. Ind. 181.—Java.
auriculatus, Desf. Fl. Atlant. ii. 272 = *auritus*.
auriculatus, Poepp. ex DC. Prod. vi. 417 = *glabratns*.

SENECIO:—

auriculatus, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 558 = *alpinus*.
auriculatus, Vahl, Symb. Bot. i. 72. t. 18.—Arab.
auriculatus, Wall. Cat. n. 3115 = *rufinervis*.
aurinitens, Schur, Enum. Pl. Transs. 350 = *S. Jacobaea*.
auritus, Willd. Sp. Pl. iii. 1982.—Afr. bor.
Austinae, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 93.—Calif.
australis, Willd. Sp. Pl. iii. 1981 = *lautus*.
axillaris, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 333.—Mexic.
axillaris, Vell. Fl. Flum. viii. t. 112.—Bras.
ayapatensis, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 314, in obs. sphalm. = *agapatensis*.
ayapatensis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 206 = *trichocodon*.
baccharidifolius, DC. Prod. vi. 414.—Chili.
baccharoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 186 = *Gynoxys baccharoides*.
Badaroi, Moris, ex Badaro, in Brugnat. Giorn. Fis. Dec. II. vii. (1824) 367 = *delphinifolius*.
bahioides, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 336.—Chili.
Balansae, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 317 = *Paraguay*.
Balansae, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 32 = *nebrodensis*.
Balbisiannus, DC. Prod. vi. 360.—Europ.
Balbisiannus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 445 = *campestris*.
baldensis, Poir. Encyc. vii. 109 = *alpinus*, S. Doronicum.
balsamicus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 499.—Chili.
Balsamitae, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1998 = *aureus*.
Banksii, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 146.—N. Zel.
Barba-Johannis, DC. Prod. vi. 430.—Mexic.
barbareaefolius, Krock. Fl. Siles. ii. II. 421 = *er-raticus*.
barbareaefolius, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 244 = *aquaticus*.
barbareaefolius, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 90.—Afr. austr.
barbatus, DC. Prod. vi. 406.—Afr. austr.
barbatus, [D.] Don, ex Hook. et Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 334.—Reg. Argent.
barbellatus, DC. Prod. vi. 388.—Afr. austr.
barckhausiaefolius, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 101.—Graecia.
barkhausioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 86 = *georgianus*.
Barrelieri, Gouan, Illustr. 68 = *S. Doronicum*.
Barrelieri, Hoppe, ex DC. Prod. vi. 354 = *nemorensis*.
bathurstianus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 = *Erechtites arguta*.
bayonnensis, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 34 = *nemorensis*.
Bedfordii, F. Muell. Cat. Hort. Melb. (1858) 26 = *Bedfordia salicina*.
Beecheyanus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499 = *sessilifolius*.
Behrianus, Sond. & F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 527.—Austral.
belbeysius, Delile, Fl. Egypte, 270.—Aegypt.
belbeyticus, Poir. Encyc. Suppl. v. 229 = *praec.*
belenensis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 192 = *Reg. Argent.*
belgaumensis, C. B. Clarke, Comp. Ind. 200.—Ind. or.
bellidifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 175.—Mexic.
bellidifolius, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 439 = *abyssinicus*.
bellidioides, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 144.—N. Zel.
Bellis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 369.—Afr. austr.
belophyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 164.—Chili.
benaventianus, Remy, l. c. 141.—Chili.
Bentharii, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 206.—Reg. Argent.
Bentharii, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 96 = *Humboldtianus*.
Bergianus, E. Mey, ex DC. Prod. vi. 400 = *rosmarinifolius*.
Bergii, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iii. (1879) 357.—Reg. Argent.

SENECIO:—

Berlandieri, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498; *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 236.—Mexic.
Berterianus, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 32.—Chili.
betonicaefolius, DC. Prod. vi. 422.—Am. austr.
betsiliensis, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 170.—Madag.
Bhot, C. B. Clarke, Comp. Ind. 187.—Reg. Himal.
Biafrae, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 420.—Afr. trop.
bicolor, Balb. Cat. Hort. Tanr. (1804) 42 = *Gynura haematophylla*.
bicolor, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = *Gynura bicolor*.
bicolor, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1859) 22, 30.—Cf. Linnaea, xxx. (1859–60) 759.—Ital.; Graec.
bidentatus, Willd. Sp. Pl. iii. 1976.—Afr. austr.
Bidwillii, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 150.—N. Zel.
bifistulosus, Hook. f. l. c. 144.—N. Zel.
biflorus, Burm. f. Fl. Ind. 181.—Java.
biflorus, Vahl, Symb. Bot. i. 72.—Arab.
Bigelovii, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 111.—Am. bor. occ.
Billardieri, F. Muell. Cat. Hort. Melb. (1858) 26 = *Bedfordia linearis*.
bipinnatifidus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 32 = *Berterianus*, *sinuatifolius*.
bipinnatus, DC. Prod. vi. 397 = *foeniculoides*.
bipinnatus, Less. Syn. Comp. 391.—Afr. austr.
blattarioides, DC. Prod. vi. 393.—Afr. austr.
Blumeanus, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = *Gynura aurantiaca*.
Blumei, DC. Prod. vi. 334, in syn. = *araneosus*.
bogotensis, Spreng. Syst. iii. 556.—N. Granat.
bohemicus, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 253 = *paludosus*.
Boissieri, DC. Prod. vii. 300.—Hispan.
Boivini, Klatt, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xviii. (1873) 375.—Ins. Maurit.
Bojeri, DC. Prod. vi. 37.—Madag.
Bojeri, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 202 = *Biafrae*.
Bolanderi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 362.—Calif.
boliviensis, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 531, nomen.—Bolivia.
Bolusii, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1456.—Afr. austr.
bonariensis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 340.—Reg. Argent.
Bonplandianus, DC. Prod. vi. 421.—Ecuador.
Boryanus, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = *Gynura auriculata*.
borysthenicus, Andr. ex DC. Prod. vi. 351 = *praealtus*.
Boscianus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Carolina.
Boutoni, Baker, Fl. Maurit. 178.—Ins. Rodriguez.
Bowenkampi, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 500.—Chili.
brachyatus, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 344, in obs. = *erucifolius*.
brachychaetus, DC. Prod. vi. 362.—Europ.; As. bor.
brachycodon, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 319.—Bras.
brachyglossus, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 525.—Austral.
brachyglossus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 87 = *glutinosus*, Thunb.
brachylaenus, DC. Prod. vi. 370 = *Cunninghamii*.
brachylepis, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 162.—Chili.
brachylobus, Phil. l. c. 156.—Chili.
brachypodus, DC. Prod. vi. 403.—Afr. austr.
brachyrhynchoides, DC. l. c. 383 = *hastulatus*.
bracteatus, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. iii. 36 = *macedonicus*.
bracteolatus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 347.—Reg. Argent.
bracteolatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 339.—Reg. Himal.
bracteosus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 189.—Chili.
brasiliensis, Less. in Linnaea, vi. (1831) 249.—Bras.
brasiliensis, Spreng. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 303 = *Pohlil*.

SENECIO :—

- breviculus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 398.—Chili.
 breviscapus, *DC. Prod.* vi. 418.—Chili.
 Bridgesii, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 57.—Chili.
 Brunonianus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 337.—Chili.
 bryoniaefolius, *Harv. in Harv. in Sond. Fl. Cap.* iii. 404.—Afr. austr.
 Buchanani, *Armstr. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 339 = elaeagnifolius.
 Buglossa, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 157.—Chili.
 Buimalia, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 178.—Reg. Himal.
 bulbiferus, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xix. (1874) 485.—China; Japon.
 bulbinefolius, *DC. Prod.* vi. 402.—Afr. austr.
 bulbosus, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = Gynura auriculata.
 bullatus, *Benth. Pl. Hartw.* 208.—Ecuador.
 Bungei, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xvi. (1883) 313.—Turkestan.
 bupleuriformis, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 696 = bupleuroides.
 bupleuroides, *DC. Prod.* vi. 387.—Afr. trop. et austr.
 Burchellii, *DC. l. c.* 401.—Afr. austr.
 Burtoni, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 202.—Afr. trop.
 bustillosianus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 155.—Chili.
 buxifolius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 188 = Gynoxys buxifolia.
 byzantinus, *Linn. Sp. Pl.* 871.—Turc.
 byzantinus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 2009 = paludosus.
 cacaliaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = S. Ligularia.
 cacaliaeformis, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 43. t. 977. f. 1–9 = L. Ligularia.
 Calciaster, *Blanco, Fl. Filip. ed. II.* 441 = Gynura angulosa.
 Calciaster, *Guss. ex DC. Prod.* vi. 354 = sarracenicus.
 Calciaster, *Lam. Fl. Fr.* ii. 132.—Gallia.
 caladioides, *Fisch. ex Spreng. Nov. Prov.* 37 = Erechites praealta.
 cachinalensis, *Phil. Fl. Atac.* 33.—Chili.
 caducifolius, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 94 = ledifolius.
 caespitosus, *Brot. Fl. Lusit.* i. 390.—Lusitan.
 caespitosus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 741.—Chili.
 cakilefolius, *DC. Prod.* vi. 408.—Afr. austr.
 calamifolius, *Hook. Bot. Mag.* t. 4011 = scaposus.
 calcaris, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 184.—Mexic.
 calicicola, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 283.—Peruv.
 Caledoniae, *Schlecht. ex DC. Prod.* vi. 373.—N. Caled.
 californicus, *DC. l. c.* 426.—Calif.
 callosus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
 calocephalus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 237.—Guatemala.
 calocephalus, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 58.—Chili.
 calophyllus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 237 = albo-lutescens.
 calthaefolius, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 350.—Reg. Himal.
 calthaefolius, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xvi. (1871) 220, 221.—Manchur.
 Calverti, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iii. 32 = viscosus.
 Calverti, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 393 = mollis.
 calvoscens, *Moris & De Not. Fl. Ins. Caprar.* 74. t. 1.—Ital.
 campanulatus, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 531, nomen.—Bolivia.
 campester, *Slehdz.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiv. (1884) 32 = seq.
 campestris, *DC. Prod.* vi. 361.—Europ.; As. bor.
 campestris, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1861) 295, 332 = lugens, Hookeri.
 camporum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 423 = adamantinus.
 campylodes, *DC. Prod.* vi. 370 = scandens.
 canabinaefolius, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 341 = brasiliensis.

SENECIO :—

- canadensis, *Linn. Sp. Pl.* 869 = artemisiaefolius.
 canaliculatus, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 378.—Madag.
 canalipes, *DC. l. c.* 405.—Afr. austr.
 canalipes, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 220 = angulatus.
 cancellatus, *DC. Prod.* 435.—Ins. S. Doming.
 Candelariae, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 108.—Costa Rica.
 candidans, *Wall. Cat. n.* 3123.—Ind. or.
 candidans, *DC. Prod.* vi. 412.—Ins. Falkland.
 candidus, *DC. l. c.* 355.—Sicilia.
 Candolleanus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 345.—Patagon.
 Candolleanus, *Wall. Cat. n.* 3119.—Reg. Himal.
 canescens, *Bernh. ex DC. Prod.* vi. 414 = erucifolius.
 cannabifolius, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 242 = palmatus.
 cantabricus, *Willk. in Flora*, xxxiv. (1851) 745 = pyrenaicus.
 canus, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 333. t. 116.—Am. arct.
 canus, *Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 118 = leucophyllus.
 capillaris, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 468.—Ins. Sandvic.
 capillifolius, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 123.—Tasman.
 capitatus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 559; *Andrae, in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 310.—Reg. Carpath. et Caucas.
 Cappa, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 179 = densiflorus.
 cappadocicus, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 398.—Cappadoc.
 caracasanus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 331.—Venezuela.
 Cardamine, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, viii. (1881) 98.—Am. bor.
 cardaminefolius, *DC. Prod.* vi. 382.—Afr. austr.
 cardiophyllus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 237 = ovatifolius, *Sch. Bip.*
 carduiifolius, *Desf. Cat. Hort. Par. ed. III.* 177 = Erechites praealta.
 caricifolius, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 345.—Patagon.
 cariansis, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 398.—As. Min.
 carniolicus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1993.—Europ.
 carnosus, *Lam. Fl. Fr.* ii. 131 = S. Doria.
 carnosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 382.—Chili.
 carnosus, *Presl, Fl. Sic.* p. xxviii = aethnensis.
 carnosus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158 = elegans.
 carnulentus, *DC. Prod.* vi. 372 = lautus.
 carolinianus, *Spreng. Syst.* iii. 559 = lobatus.
 carpathicus, *Herbich, Addit. Fl. Galic.* 43 = abrotanifolius.
 carpetanus, *Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov.* 59.—Hispan.
 carroënsis, *DC. Prod.* vi. 396.—Afr. austr.
 carthagenensis, *DC. l. c.* 420.—Am. austr.
 casapaltensis, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 47.—Peruv.
 caspicus, *Less. in Linnaea*, ix. (1834) 170 = racemosus.
 cassinioides, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 163.—N. Zel.
 Castagneanus, *DC. Prod.* vi. 354.—Turc.
 castaneaefolius, *DC. l. c.* 425.—Venezuela.
 caucasicus, *DC. l. c.* 348.—Reg. Caucas.
 caudatus, *DC. l. c.* 384.—Afr. austr.
 caulopteris, *DC. l. c.* 388.—Afr. austr.
 cedrosensis, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1895) 194.—Calif.
 Centropappus, *F. Muell. Cat. Hort. Melb.* (1858) 26.—Austral.
 ceratophylloides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 206 = chilensis.
 ceratophyllus, [D.] Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 332 = chilensis.
 ceratophyllus, *Nees, in Neuwied, Reise Nord-Am.* ii. 48 = aureus.
 cerberianus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 185.—Chili.
 cernuus, *A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxiii. (1862) 239.—Am. bor.
 cernuus, *Linn. f. Suppl.* 370 = Gynura cernua.
 cervariaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
 Cervi-cornis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 497.—Chili.

SENECIO :—

- cervilingua, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 125 = formosus.
 chamaeccephalus, *Wedd. l. c.* 132.—Chili?
 chamaedrifolius, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 247 = nigrescens.
 chamaemelifolius, *DC. Prod.* vi. 383 = diffusus.
 chamomillaefolius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1865) II. 349.—Chili.
 Cheesemani, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* t. 1201 = myrianthos.
 cheiranthifolius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 176.—Mexic.
 chenopodiifolius, *DC. Prod.* vi. 364.—Reg. Himal.
 chenopodioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 179.—Mexic.
 chiapensis, *Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 238.—Mexic.
 chilensis, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 248.—Chili.
 chiloensis, *Phil. l. c.* xxix. (1857–58) 2.—Chili.
 chinensis, *DC. Prod.* vi. 363 = scandens.
 Chionogeton, *Wedd. Chlor. And.* i. 91.—N. Granat.
 chionopappus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50.—Ind. or.
 chordifolius, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6216.—Afr. austr.
 Chrysactis, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 237.—Mexic.
 chrysanthemifolius, *Bivona, Pl. Sic. Cent.* ii. 52 = aethnensis.
 chrysanthemifolius, *DC. Prod.* vi. 345 = coronopifolius.
 chrysanthemifolius, *Moretti, in Bibl. Ital.* xii. (1818) 374 = praecaltus.
 chrysanthemifolius, *Poir. Encyc.* vii. 96 = squalidus.
 chrysanthemoides, *DC. Prod.* vi. 365.—Reg. Himal.
 chrysanthemoides, *Schrank, Baier. Fl.* ii. 386 = squalidus.
 Chrysocoma, *Meerb. Afbeeld.* t. 39 = paniculatus.
 chrysocomoides, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 346.—Patagon.
 chrysoplepis, *Phil. Fl. Atac.* 32.—Chili.
 cicatricosus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
 cicutarius, *Stev. ex DC. Prod.* vi. 349 = palmatus.
 ciliatus, *Walt. Fl. Carol.* 208 = Erigeron canadensis.
 cilicicus, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iii. 37.—As. Min.
 ciliolatus, *DC. Prod.* vi. 374.—Austral.
 Cineraria, *DC. l. c.* 355.—Reg. Mediterr.
 Cinerariae, *Spreng. Syst.* iv. Cur. Post. 346 = praecaltus.
 cinerarioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 183.—Mexic.
 cinerarioides, *A. Rich. Sert. Astrol.* 128 = australis.
 cinerarioides, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 68 = crucifolius.
 cinerarius, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 134 = S. Cineraria.
 cinerascens, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 191.—Afr. austr.
 cinereus, *Colla, in Mem. Acc. Torin.* xxxviii. (1835) 33.—Chili.
 cinereus, *Moretti, Elench. Sem. Hort. Tic.* (1829) ; ex DC. Prod. vi. 436 = Moretti.
 cirsiifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1845) 499.—Mexic.
 cirsioides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 238 = roseus.
 cissampelinus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
 cladobotrys, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 644.—Reg. Caucas.
 clarenceanus, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 14.—Afr. trop.
 clarioneaefolius, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 156.—Chili.
 Clarkianus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 362.—Calif.
 Clausenii, *Decne. in Rev. Hort.* Sér. IV. iv. (1855) 181.—Bras.
 claviseta, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 60 = Decaisnei.
 clematoides, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 442.—Abyss.
 Clevelandi, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, x. (1883) 87.—Calif.
 cliviculus, *Wedd. Chlor. And.* i. 130.—Bolivia.
 clivorum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xvi. (1871) 220, 221.—China; Japon.
 Clusianus, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 44. t. 980 = alpestris.
 Clusii, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498 = Doronicum hirsutum.
 cochlearifolius, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 379.—Madag.
 Colensoi, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 147.—N. Zel.

SENECIO:—

coleophyllus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 90.—Afr. austr.
 collinus, DC. Prod. vi. 420.—Peruv.
 colpodes, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. v. (1838) 98.—Bras.
 columbaria, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 208 = calocephalus, Poepp. & Endl.
 Commersonii, Spreng. Syst. iii. 554 = Faujasia pinifolia. commutatus, Heller, Fl. Wirceb. ii. 293; Spenn. Fl. Friburg. ii. 525 = Fuchsii.
 comosus, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55. nomen.—Peruv.
 compactus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xii. (1880) 395.—N. Zel.
 concolor, DC. Prod. vi. 407.—Afr. austr.
 concolor, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 362 = speciosus.
 confertus, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 441.—Abyss.
 congestus, DC. Prod. vi. 363 = palustris.
 consanguineus, DC. l. c. 381.—Afr. austr.
 controversus, F. Schultz, ex Nym. Consp. 353 = nemorensis.
 conyzaeifolius, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 303.—Bras.
 conyzoides, DC. Prod. vi. 412.—Ins. S. Doming.
 coquimbensis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 749.—Chili.
 cordato-rotundus, Steud. Nom. ed. II. ii. 559.—Chili.
 cordatus, Koch, in Flora, xvii. (1834) 614 = alpinus.
 cordatus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 411.—Am. bor.
 cordatus, Wall. Cat. n. 3109 = tetranthus.
 cordifolius, [Clairv.] Man. Herb. 241.—Europ.
 cordifolius, Link, Handb. i. 748 = alpinus.
 cordifolius, Linn. f. Suppl. 372.—Afr. austr.
 cordovensis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 238.—Mexic.
 coriaceus, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 195.—Oriens.
 Cornu-cervi, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 482.—Afr. austr.
 coronatus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 369 = lasiorhizus.
 coronopifolius, Burm. f. Fl. Ind. 181 = javanicus.
 coronopifolius, Desf. Fl. Atlant. ii. 273.—Europ.; Oriens; As. bor.; Afr. bor.
 coronopifolius, Willd. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 514 = gallicus.
 coronopodiphyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 156.—Chili.
 Coronopus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 413 = californicus.
 corsicus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 = Doronicum corsicum.
 corymbiferus, DC. Prod. vi. 402.—Afr. austr.
 corymbosus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 205 = pachycarpus.
 corymbosus, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 135 = incanus.
 corymbosus, Wall. Cat. n. 3121.—Ind. or.
 Cotyledonis, DC. Prod. vi. 402.—Afr. austr.
 Covi, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 150.—Chili.
 crambefolius, Boiss. & Kotschy, in Boiss. Fl. Orient. iii. 396 = eriospermus.
 crassicaulis, Brongn. in Rev. Hort. Sér. III. i. (1847) 87.—Mexic.
 crassiflorus, DC. Prod. vi. 412.—Am. austr.
 crassifolius, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 53. t. 868 = vernalis.
 crassifolius, Willd. Sp. Pl. iii. 1982.—Europ.
 crassiusculus, DC. Prod. vi. 401.—Afr. austr.
 crassulaefolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
 crassulus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 54.—Am. bor. occ.
 crassus, Vell. Fl. Flum. viii. t. 111 = Erechtites valerianaeifolia.
 crenatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 158.—Afr. austr.
 crenulatus, DC. Prod. vi. 385.—Afr. austr.
 crepidifolius, DC. l. c. 425.—Peruv.
 crepidioides, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 155 = Gynura crepidioides.
 crinitus, Bertol. in Opusc. Sc. Bologn. (1817) i. 234 = delphinifolius.
 crispatus, DC. Prod. vi. 359.—Europ.
 crispus, Kitt. Taschenb. ed. II. 588; Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 202 = crispatus.
 VOL. II.

SENECIO:—

crispus, Phil. Fl. Atac. 33.—Chili.
 crispus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 157.—Afr. austr.
 cristatus, Thunb. l. c. = rosmarinifolius.
 crithmifolius, A. Rich. Sert. Astrol. 116 = lautus.
 crithmifolius, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 163 = Inula crithmoides.
 crithmoides, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 347.—Chili.
 croaticus, Walldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 153 = S. Cacaliaster.
 croceus, DC. Prod. vi. 359 = crispatus.
 cruceifolius, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 120, in syn., sphalm. = erucifolius.
 cruciatus, Linn. f. Suppl. 371 = juniperinus.
 cruentus, DC. Prod. vi. 410.—Ins. Canar.
 cruentus, Roth, in Roem. Arch. i. iii. (1798) 44.—Hab.?
 crymophilus, Wedd. Chlor. And. i. 95.—N. Granat.
 cryptcephalus, Sch. Bip. ex Wedd. l. c. 90 = repens.
 cucullatus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 331.—Venezuel.
 culcitoides, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55; et in Lechl. Berb. Am. Austr. 57, nomen.—Peruv.
 Culcitium, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 200.—Chili.
 Cumingii, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 338.—Chili.
 Cumingii, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 330 = Arnica cordifolia vel latifolia.
 cuneatus, Hook. f. Fl. Antarct. 318.—Patagon.
 cuneifolius, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 126.—Bras.
 cuneifolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
 Cunninghamii, DC. Prod. vi. 371.—Austral.
 curvatus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 190.—Madag.
 curvidens, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.
 cuspidatus, DC. Prod. vi. 419 = chilensis.
 cydoniaefolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 560.—Chili.
 cygnorum, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 483 = ramosissimus.
 Cymbalaria, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 530 = aureus.
 cymbalariaefolius, Less. Syn. Comp. 391.—Afr. austr.
 cymbalariaoides, Buek, Ind. Cand. ii. p. vi; Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 412 = aureus.
 cymosus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 170.—Chili.
 cypraeifolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 560, sphalm. = oxyriaefolius.
 Cyri, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 362 = racemosus.
 dahuricus, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 19 = palmatus.
 dahuricus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—As. or.; Japon.
 dalmaticus, Vis. Fl. Dalm. ii. 69, in syn. = S. Jacobaea.
 Daltoni, F. Muell. Fragm. vi. 27.—Austral.
 Dalzellii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 201.—Ind. or.
 Danai, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 142.—Peruv.
 Danyaussii, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 48 = Laseguei.
 daphnoides, Poir. Encyc. Suppl. v. 133 = S. Hubertia.
 Darwinii, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 333.—Patagon.
 davuricus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 250 = dahuricus.
 dealbatus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 747.—Chili.
 debilis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 400.—Afr. austr.
 debilis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 408 = aureus.
 debilis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 752.—Chili.
 Decaisnei, DC. Prod. vi. 342.—Afr. bor.; Oriens.
 decurrens, DC. l. c. 388.—Afr. austr.
 deferens, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 193.—Reg. Argent.
 Delessertii, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = Gynura bicolor?
 delphinifolius, Reichb. Pl. Crit. iv. 29 = erucifolius.
 delphinifolius, Vahl, Symb. Bot. ii. 91. t. 45.—Reg. Mediterr.

SENECIO:—

deltoides, Less. Syn. Comp. 392.—Afr. austr.
 deltophyllus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 487.—China.
 demissus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1870) ii. 181.—Chili.
 densiflorus, Martens, in Bull. Acad. Brux. viii. (1841) 67 = lobatus.
 densiflorus, Wall. Cat. n. 3116.—Reg. Himal.
 dentatus, Jacq. Coll. v. 150. t. 6. f. 2.—Afr. austr.
 dentatus, Wall. Cat. n. 3112 = Wallichii.
 denticulatus, DC. Prod. vi. 416.—Am. austr.
 denticulatus, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 791 = vulgaris.
 denudatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 179 = nudicaulis.
 Deppeanus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 239.—Mexic.
 depressus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 342.—Chili.
 desertorum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 239.—Mexic.
 desiderabilis, Vell. Fl. Flum. viii. t. 108 = ellipticus.
 desideratus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 318 = ellipticus.
 desideratus, DC. Prod. vi. 413.—Patagon.
 desmatus, Klatt, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 511.—Madag.
 desquamatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 58; ex DC. Prod. vi. 346 = gallicus.
 Diazii, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1862) ii. 399.—Chili.
 dichrous, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Bras.
 diclinus, Wedd. Chlor. And. i. 107.—Peruv.
 dictyophyllus, Benth. Pl. Hartw. 43.—Mexic.
 difficilis, Dufour, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 428. t. 11 = gallicus.
 diffusus, Linn. f. Suppl. 371.—Afr. austr.
 digitalifolius, DC. Prod. vi. 397.—Afr. austr.
 Diodon, DC. l. c. 399.—Afr. austr.
 diosmoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 210.—Peruv.
 discifolius, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873) 100.—Afr. trop.
 discolor, Boj. ex DC. Prod. vi. 379 = hypargyreaus.
 discolor, DC. Prod. vi. 412.—Jamaic.
 discolor, Desf. Tabl. ed. I. 104 = Gynura haematophylla.
 disjectus, Wedd. Chlor. And. i. 115.—Peruv.
 divaricatus, Linn. Sp. Pl. 866 = Gynura divaricata.
 divergens, F. Schultz, ex Nym. Consp. 355 = erraticus.
 diversifolius, Dum. Fl. Belg. Prod. 66 = Kickxii.
 diversifolius, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 375 = polymorphus.
 diversifolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 495.—Chili.
 diversifolius, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 437 = Gynura crepidioides.
 diversifolius, Wall. Cat. n. 3128.—Reg. Himal.
 Doeringii, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iii. (1879) 358.—Reg. Argent.
 Dombeyanus, DC. Prod. vi. 418.—Am. austr.
 Donianus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 332.—Chili.
 doratophyllus, Benth. Pl. Hartw. 87.—Guatemala.
 Doria, Kickx, Fl. Brux. 283 = Kickxii.
 Doria, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 48 = macrophyllus.
 Doria, Linn. Syst. ed. X. 1215.—Europ. austr.; Oriens.
 doriaeformis, DC. Prod. vi. 352.—As. Min.; Syria.
 doroniciflorus, DC. l. c. 385 = albanensis.
 doroniciflorus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 338 = Selloi.
 Doronicum, Linn. Syst. ed. X. 1215.—Europ.
 Doronicum, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 745 = Lagascanus.
 Douglasii, DC. Prod. vi. 429.—Calif.
 dracunculoides, DC. l. c. 400.—Afr. austr.
 Dregeanus, DC. l. c. 407.—Afr. austr.
 dryadeus, Sieber, ex DC. l. c. 374 = australis.
 drymophilus, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 69 = Gynura Pseudo-china.
 dryophyllus, Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 283.—Peruv.
 dubius, Beck, Bot. N. & M. St. 200 = tomentosus.
 dubius, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 342 = pedunculatus.

SENECIO :—

- dubius, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 112.—As. bor. et centr.
dubius, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159
 = *Gynura dubia*.
dumetorum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii.
 (1848) 422.—Bras.
dunensis, *Dum. Fl. Belg. Prod.* 66.—Belgium.
Duriae, *J. Gay, Ann. Sc. Nat. Sér. II.* vi. (1836) 346.
 —Hispan.
ecalyculatus, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
 159 = *Emilia sonchifolia*.
echinatus, *DC. Prod.* vi. 411.—Ins. Canar.
Ecklonianus, *DC. Prod.* vi. 384 = *spiraeifolius*.
Edgeworthii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 346.—Ind.
 or.
Eightisii, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii.
 (1841) 332.—Patagon.
elaegnifolius, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 150. t. 41.—
 N. Zel.
elator, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 560 = *multiflorus*, *DC.*
elatoides, *Wedd. Chlor. And.* i. 101.—N. Granat.
elatus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 180.—Peruv.
elbrusensis, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 410.—Persia.
elegans, *Linn. Sp. Pl.* 869.—Afr. austr.
elegans, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult.* 685 = *arenarius*.
Elliotii, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 443 = *aureus*.
ellipticus, *DC. Prod.* vi. 420.—Bras.
elodes, *Boiss. ex DC. l. c.* vii. 301.—Hispan.
elongatus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 529 = *aureus*.
emilioides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 304.—
 Bras.
emilioides, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
 158.—Afr. trop.
emirrensis, *DC. Prod.* vi. 377.—Madag.
emodensis, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50 =
S. Ligularia.
Encelia, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 204.—Chili.
Endlicheri, *DC. Prod.* vi. 373.—Austral.
erechthitoides, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 171.—
 Madag.
eremophilus, *Phil. Fl. Atac.* 32.—Chili.
eremophilus, *Richards. in Frankl. 1st Journ. App. ed.*
 II. 31.—Am. bor.
ericaefolius, *Benth. Pl. Hartw.* 208.—Ecuador.
eriobasis, *DC. Prod.* vi. 388.—Afr. austr.
eriocladus, *Wedd. Chlor. And.* i. 131.—Peruv.
eriophyton, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 159.—
 Chili.
eripus, *Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii.
 116.—Hispan.
eriospermus, *DC. Prod.* vi. 358.—As. Min.
eristhalifolius, Sch. Bip. ex *Baker, in Mart. Fl. Bras.*
 vi. III. 321.—Bras.
erodiifolius, *DC. Prod.* vi. 381 = *repandus*.
erosus, *Linn. f. Suppl.* 370.—Afr. austr.
erosus, *Wedd. Chlor. And.* i. 228.—Bolivia.
eraticus, *Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec.* iii. 62.—Europ.;
 Oriens.
erraticus, *Willk. in Flora*, xxxiv. (1851) 744 =
aquaticus.
erubescens, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 190.—Afr. austr.
erubescens, *Panč. Elem. Fl. Bulg.* 41.—Europ.
erucaefolius, *Kunze, in Flora*, xxix. (1846) 655 =
praealtus.
erucaefolius, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 110 = *S. Jacobaea*.
erucaeformis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 180.—
 Chili.
erucifolius, *Linn. Fl. Suec.* ed. II. 291.—Europ.; As.
 bor.
erysimoides, *DC. Prod.* vi. 382.—Afr. austr.
eubaeus, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II.* iii. 36.—
 Graec.
eudorus, *DC. Prod.* vi. 352.—Hab.?
eupatorioides, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702.—
 Afr. austr.
euriopoides, *DC. Prod.* vi. 396.—Afr. austr.
eurycephalus, *Torr. & Gray, ex A. Gray, in Mem.*
Am. Acad. N. S. iv. (1849) 109.—Calif.
evacoides, Sch. Bip. in *Bonplandia*, iv. (1856) 55,
 nomen.—Peruv.
exaltatus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii.
 (1841) 410 = *lugens*.
exilis, *Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy.*
Astrol. et Zél. 50 = *patagonicus*, *Hook. & Arn.*
eximius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 239 =
callosus.
expansus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 394.—
 Afr. austr.

SENECIO :—

- expansus*, *Wedd. Chlor. And.* i. 107.—Bolivia.
exsertus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—
 Madag.
exsquameus, *Brot. Fl. Lusit.* i. 388 = *gallicus*.
Exul, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 174.—
 China.
Fadyenii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 382.—Jamaic.
falklandicus, *Hook. f. Fl. Antarct.* 316.—Ins. Falkland.
farfaraefolius, *Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II.* iii. 33.
 —As. Min.
farfaraefolius, Sch. Bip. ex *C. Koch & Fint. Wochenschr.*
 i. (1858) 212; *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xix.
 (1874) 483.—Japon.
farfarus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 239 = *tussi-*
laginoides.
Farfugium, *C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr.*
 i. (1858) 209 = *Kaempferi*.
farinaceus, Sch. Bip. ex *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i.
 443.—Abyss.
farinifer, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii.
 (1841) 331.—Chili.
Farrisii, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 250.—
 Peruv.
fasciculatus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii.
 (1841) 344.—Chili.
fasciculatus, *Wall. ex DC. Prod.* v. 439 = *Laggera*
flava.
fastigiatus, *A. Gray, Pl. Wright.* ii. 99 = *Douglasii*.
fastigiatus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii.
 (1841) 410.—Am. bor. occ.
fastigiatus, *Schwein. ex Ell. Sketch.* ii. 331 = *aureus*.
faugasioides, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 170.—
 Madag.
Fendleri, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* iv. (1849)
 108.—N. Mexic.
ferulifolius, *Stokes, Bot. Mat. Med.* iv. 216 = *adonidi-*
folius.
ficoides, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr.
 austr.
filaginoides, *DC. Prod.* vi. 413.—Chili.
filifolius, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 278 = *umbellatus*.
filifolius, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 399.—
 Afr. austr.
filifolius, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii.
 (1841) 414 = *Douglasii*.
filipes, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 11.
 87 = *matricariaefolius*.
Finlaysonianus, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl.
 Aethiop. 159 = *Gynura sarmentosa*.
Fischeri, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 =
Erechtites praealta.
Fischerianus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 560.—Armenia.
fistulosus, *Poepp. ex DC. Prod.* vi. 418.—Chili.
flabellatus, *Viv. App. Fl. Cors. Prod.* 6 = *delphini-*
folius.
flaccidifolius, *Wedd. Chlor. And.* i. 113.—Peruv.
flaccidus, *Bolle, in Bonplandia*, viii. (1860) 134.—Ins.
 Canar.
flaccidus, *Less. in Linnaea*, v. (1830) 161.—Mexic.
flaccidus, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 110 = *Erechtites*
preanthoides.
flagellisetus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 191
 = *brasiliensis*.
flammeus, *DC. Prod.* vi. 362.—Dahuria.
flavus, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii.
 319. t. 107 = *Decaisnei*.
flexicaulis, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 74
 = *scandens*.
flexuosus, *Clarke, Trav. ed. II.* i. Add. p. xxi.—
 Thracia.
flexuosus, *Less. Syn. Comp.* 392.—Ins. Maurit.
flexuosus, *Wall. Cat. n.* 3110 = *scandens*.
floccidus, *Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy.*
Astrol. et Zél. 50 = *patagonicus*.
flociferus, *DC. Prod.* vi. 426 = *Malacothrix obtusa*.
floccosus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 350 = *S. Jacobaea*.
focculidens, Sch. Bip. ex *Wedd. Chlor. And.* i. 127.—
 Venezuela.
flocoso-araneosus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 560 =
andinus.
floribundus, *Wall. Cat. n.* 3111 = *triligulatus*.
floridanus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—
 Am. bor.
flosculosus, *Gilib. Fl. Lituan.* i. 198 = *vulgaris*.
flosculosus, *Jord. Cat. Jard. Dijon* (1848), 30 = *S.*
Jacobaea.
fluminensis, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 560.—Bras.

SENECIO :—

- fluviatilis*, *Wallr. in Linnaea*, xiv. (1840) 64 = *sarra-*
cenicus.
foeniculaceus, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xlix = *lividus*.
foeniculoides, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii.
 395.—Afr. austr.
foetens, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159
 = *Gynura nepalensis*.
foliosus, *Colm. Catal. Pl. Cataluña*, 87 = *jacobaeoides*.
foliosus, *Salzm. ex DC. Prod.* vi. 351.—Afr. bor.
fontanus, *Wallr. in Linnaea*, xiv. (1840) 353 = *nemo-*
rensis.
Forbesii, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii.
 420.—Afr. trop.
formosus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 177.—
 Mexic.
Forskählii, *Baill. Hist. Pl.* viii. 308 = *odorus*.
Forsteri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 494.—
 Chili.
Forsteri, *Schlecht. in DC. Prod.* vi. 373 = *Brachyglottis*
Forsteri.
Fradini, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 61 = *leucanthemi-*
folius, *Poir.*
fragrans, *Fisch. ex Spreng. Syst.* iv. Cur. Post. 302.—
 Sibir.
fragrans, *Lehm. ex Spreng. l. c.* iii. 518 = *Erigeron*
fragrans.
fragrans, *Riddell, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 444
 = *Douglasii*.
Fremontii, *Torr. & Gray, l. c.* 445.—Am. bor.
Fresenii, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
 160.—Afr. bor.
frigidus, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 239.—Sibir.;
 Am. arct.
frigidus, *Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich.* vii. 28
 (an praec. f.)—Sibir.
frigidus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 561 = *linifolius*, *Linn.*
frondosus, *Tausch, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 245
 = *nemorensis*.
fruticosus, *Vell. Fl. Flum.* viii. t. 109.—Bras.
fruticulosus, *Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod.* ii. 178.—
 Ins. Creta.
Fuchsii, *C. C. Gmel. Fl. Bad.* iii. 444.—Europ.
fuliginosus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 186 =
Gynoxis fuliginosa.
Funckii, Sch. Bip. ex *Wedd. Chlor. And.* i. 125.—
 Venezuela.
furfuraceus, *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 400 =
farfaraefolius, *Boiss. & Kotschy*.
Fussii, *Andrae, in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 310.—
 Hungar.
gabonicus, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*
 iii. 421.—Afr. trop.
gaffatensis, *Vatke, in Linnaea*, xxxix. (1875) 505 =
vulgaris.
Galeottii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 239.—
 Mexic.
Gallerandianus, *Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii.
 (1855) 365.—Alger.
gallicus, *Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph.* i. 371; iii.
 230.—Europ.
gamolepoides, Sch. Bip. in Journ. Bot. i. (1863) 236.
 —Guian.
Gardneri, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 202.—Zeylan.
Gaudichaudianus, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 98.—
 Austral.
Gayanus, *DC. Prod.* vi. 414.—Chili.
geifolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Reg.
 Caucas.
Geissei, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1865) II. 348.—
 Chili.
gelidus, *Wedd. Chlor. And.* i. 95.—N. Granat.
geniculatus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 561.—Afr. austr.
georgianus, *DC. Prod.* vi. 371.—Austral.
Gerardi, *Gren. & Godr. Fl. Fr.* ii. 122 = *S. Doronicum*.
Gerardi, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 380.—
 Afr. austr.
gerberaeifolius, Sch. Bip. ex *Hemsl. Biol. Centr. Am.*
Bot. ii. 240.—Mexic.
Germani, *Phil. in Linnaea*, xxix. (1857–58) 1.—Chili.
germanicus, *Wallr. Sched. Crit.* 476 = *nemorensis*.
Ghiesbreghtii, *Hort. Hal. ex Regel, Ind. Sem. Hort.*
Petrop. (1860) 36 = *grandifolius*.
gibbosus, *DC. Prod.* vi. 355.—Ital.
Gibsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 347.—Ind. or.
giganteus, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 273. t. 234.—Alger.
Gigas, *Vatke, in Linnaea*, xxxix. (1875) 506.—Afr.
 trop.

SENECIO:—

Gilberti, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 1. 208.—Anstral.
 Gilliesianus, *Hieron. in Bol. Acad. Nat. Córdoba*, iii. (1879) 356.—Chili.
 Gilliesii, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 343.—Chili.
 Gilliesii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1870) II. 182 = Gilliesianus.
glabellus, DC. *Prod.* vi. 360 = campestris.
glabellus, *Poir. Encyc.* vii. 102 = lobatus.
glaber, [Clairv.] *Man. Herb.* 240 = Adenostyles viridis.
glaber, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 248.—Chili.
glaber, *Ucria*, in *Roem. Arch.* i. i. (1796) 70 = squalidus.
glaberrimus, DC. *Prod.* vi. 403.—Afr. austr.
glaberrimus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 351 = S. Doronicum.
glabratus, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 32.—Chili.
glabrescens, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498 = *Erechtites quadridentata*.
glabrifolius, DC. *Prod.* vi. 406.—Afr. austr.
glacialis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498 = *Doronicum glaciale*.
glacialis, *Wedd. Chlor. And.* i. 113.—Bolivia.
glandulosus, A. Cunn. ex DC. *Prod.* vi. 295 = *Erechtites quadridentata*?
glandulosus, [D.] *Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 334.—Chili.
glareosus, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 531, nomen.—Bolivia.
glastifolius, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 147. t. 39.—N. Zel.
glastifolius, *Linn. f. Suppl.* 372.—Afr. austr.
glaucescens, DC. *Prod.* vi. 395 = *achilleaeifolius*.
glaucescens, *Spreng. Syst.* iii. 561 = *squalidus*.
glaucus, DC. *Prod.* vi. 344 = *leucanthemifolius*, *Poir.*
glaucus, *Linn. Sp. Pl.* 868.—Afr. bor.
Glaziovii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 305.—Bras.
glomeratus, *Desf. Tabl. ed. II.* 124 = *Erechtites arguta*?
glutiniarius, DC. *Prod.* vi. 381.—Afr. austr.
glutinosus, E. Mey. ex DC. l. c. 381 = praec.
glutinosus, *Roth, Catalecta*, fasc. ii. 109.—Hab.?
glutinosus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 347 = viscosus.
glutinosus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158.—Afr. austr.
Gmelini, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 645.—Sibir. altaic.
gnaphalodes, *Sieber, Reise Kreta*, i. 352.—Ins. Creta.
gnidioides, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 742.—Chili.
Godmanii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 240.—Guatemala.
Goeringii, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 126, nomen.—Java.
gonocaulos, DC. *Prod.* vi. 425.—Am. austr.
gonocladus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
goyazensis, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 421.—Bras.
graciliflorus, DC. *Prod.* vi. 365.—Reg. Himal.
gracilipes, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 142.—Peruv.
gracilis, Arn. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. i. (1836) 349 = *zeylanicus*.
gracilis, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 529.—Am. bor.
Grahami, *Benth. Pl. Hartw.* 18 = S. Barba-Johannis.
Grahami, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 347.—Ind. or.
gramineus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 372.—Afr. austr.
graminicolus, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 698 = *crenatus*.
graminifolius, *Jacq. Misc.* ii. 322 = *paniculatus*.
graminifolius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1865) II. 330.—Chili.
granatensis, *Boiss. Voy. Bot. Espagne*, ii. 334 = *Boissieri*.
grandidentatus, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 636 = *erucifolius*.
grandiflorus, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 280.—Afr. austr.
grandiflorus, *Hoffmgg. & Link, Fl. Port.* ii. 307. t. 100 = S. Doria.
grandifolius, *Less. in Linnaea*, v. (1830) 162.—Mexic.
grandis, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 422.—Bras.
grandissimus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 354 = *sarracenicus*.
graveolens, *Wedd. Chlor. And.* i. 111.—Bolivia.

SENECIO:—

Grayanus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 241.—Mexic.
 Grayi, *Parry, ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 67, in nota = S. Soldanella.
 Greenei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* x. (1874) 75.—Calif.
 Gregorii, *F. Muell. Rep. Babb. Exped.* 14.—Austral.
 Greyii, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 148. t. 38.—N. Zel.
 Griffithii, *Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 193.—Reg. Himal.
grindeliaefolius, DC. *Prod.* vi. 416.—Chili.
Grisebachii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 313.—Reg. Argent.
guatemalensis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Guatemala.
guineensis, *Sch. Bip. l. c.* = *Gynura cernua*.
gunmifer, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 331 = *phagnaloides*.
Gundelius, C. Koch, in *Linnaea*, xxiv. (1851) 364 = *armenius*.
gynoxoides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 306.—Bras.
gynoxoides, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 78 = *Gynoxys albiflora*.
gypsophilus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 498.—Chili.
Haastii, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 159.—N. Zel.
hadiensis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 149.—Arab.
haematophyllus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 875 = *Gynura haematophylla*.
Haenkei, DC. *Prod.* vi. 413.—Chili.
hakeaeifolius, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura Pseudo-china*.
halimifolius, *Linn. Sp. Pl.* 871.—Afr. austr.
Haloragis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 172.—Chili.
hamamelidifolius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 179 (hamamelifolius).—Ecuador.
Hamiltonianus, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura Pseudo-china*.
Hartwegi, *Benth. Pl. Hartw.* 18.—Mexic.
hastatus, *Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb.* v. (1838) 99.—Bras.
hastatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 353, in nota = *sagittatus*.
hastatus, *Linn. Sp. Pl.* 868.—Afr.
hastatus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1987 = *hastulatus*.
hastifolius, *Less. Syn. Comp.* 392 = *cymbalarifolius*.
hastulatus, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 1218.—Afr. austr.
Haworthii, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.
Haworthii, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 561.—Afr. austr.
hebespermus, DC. *Prod.* vii. 301.—Mesopot.
hebetatus, *Wedd. Chlor. And.* i. 114.—Peruv.
Hectori, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* v. (1873) 348.—N. Zel.
hederaefolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 241.—Mexic.
Heldreichii, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vi. 95.—Graec.
helianthemoides, *Wedd. Chlor. And.* i. 115.—Boliv.
helichrysoides, F. Muell. in *Trans. Vict. Inst.* i. (1855) 39 = *georgianus*.
Hellerii, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 333.—Mexic.
helodes, *Benth. Pl. Hartw.* 42.—Mexic.
heracleifolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 241.—Mexic.
Herbichia, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 561 = *abrotanifolius*.
Heritierii, DC. *Prod.* vi. 409.—Ins. Canar.
Hervaloira, *Link, ex Nym. Consp.* 354 = *caespitosus*, *Brot.*
heteroclinius, DC. *Prod.* vi. 380 = *abruptus*.
heterogamus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 242.—Costa Rica.
heterophyllus, DC. *Prod.* vi. 414 = *pilquensis*.
heterophyllus, *Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 355 = *littoreus*.
heterophyllus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 157 = *abruptus*.
heteroschizus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 325.—Bras.
heterotrichius, DC. *Prod.* vi. 419.—Bras.
bewrensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 346.—Ind. or.
Heyneanus, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura nitida*.
hieracifolius, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. lxxiii = *arabicus*.
hieracifolius, *Linn. Sp. Pl.* 866 = *Erechtites praealta*.

SENECIO:—

hieracioides, DC. *Prod.* vi. 384.—Afr. austr.
Hieracium, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 202.—Chili.
Hieronymii, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 205.—Reg. Argent.
himalensis, *Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 78.—Reg. Himal.
Hindsii, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 488 = *scandens*.
hirsutulus, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 163.—Chili.
hirsutus, [Clairv.] *Man. Herb.* 240 = *Adenostyles albidula*.
hirtellus, DC. *Prod.* vi. 401.—Afr. austr.
hirtifolius, DC. l. c. 394.—Afr. austr.
hispidulus, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 92 = *Erechtites hispidula*.
hispidulus, A. Rich. l. c. t. 34 = *odoratus*.
Hochstetteri, *Sch. Bip. ex Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) I. *Intell.* 27, nomen; et ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 435.—Abyss.
Hohenackeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 345.—Ind. or.
Hohenackeri, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen; *Wedd. Chlor. And.* i. 131.—Peruv.
holophyllus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 147.—Chili.
homogynefolius, *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 400 = *farfaraefolius*, *Boiss.*
Hookeri, *Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrolab. et Zél.* 50 = *patagonicus*, *Hook. & Arn.*
Hookeri, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 438.—Am. bor.
Howellii, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, viii. (1881) 98 = *canus*.
huachucanus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 54.—Arizona.
Hualtata, *Bert. ex DC. Prod.* vi. 417.—Chili.
Hubertia, *Pers. Syn.* ii. 436.—Ins. Borbon.
Humboldtianus, DC. *Prod.* vi. 421.—Ecuador.
humilis, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 271. t. 233.—Sicil.; Afr. bor.
humilis, *Duby, ex Nym. Consp.* 357 = *crassifolius*.
humillimus, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen; *Wedd. Chlor. And.* i. 104. t. 19 B.—Peruv.
Huntii, *F. Muell. Enum. Pl. Chath. Isl.* 23. t. 3.—N. Zel.
hybridus, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* (1863) t. 394 = *cruentus*.
hydrophilus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 411.—Am. bor. occ.
hydrophilus, *Hoffmgg. & Link, ex Nym. Consp.* 356.—Lusitan.
hyemalis, *Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 514 = *leucanthemifolius*, *Poir.*
hyoseridifolius, *Wedd. Chlor. And.* i. 108.—Peruv.
hypargyraeus, DC. *Prod.* vi. 379.—Madag.
hypochionaeus, *Boiss. Diagn. Ser. I.* iv. 14.—As. Min.
hypocherideus, DC. *Prod.* vi. 386.—Afr. austr.
hypoleucus, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* iii. 672.—Austral.
hypsobates, *Wedd. Chlor. And.* i. 91.—N. Granat.
hypsochilus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 382.—Chili.
icoglossus, DC. *Prod.* vi. 420.—Bras.
ignobilis, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 299 = *Erechtites ignobilis*.
ilicifolius, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 281 = *lyratus*.
ilicifolius, *Less. Syn. Comp.* 392 = *Gynoxys ilicifolia*.
ilicifolius, *Linn. Sp. Pl.* 871 (Quid?).—Afr. austr.
ilicifolius, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158.—Afr. austr.
illapelinus, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 153.—Chili.
illinitus, *Phil. l. c.* xxviii. (1856) 750.—Chili.
imbricatifolius, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 96.—N. Granat.
imbricatus, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 421.—Bras.
immunis, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 278 = *paludosus*.
imoleus, *Boiss. & Heldr. ex Orph. in Bull. Congr. Bot. Pétersb.* 1869 (1870) 128, sphalm. = *tmoleus*.
imparipinnatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 333 = *lobatus*.
inaequidens, DC. *Prod.* vi. 401 = *pellucidus*.
inaequilobus, *Sch. Bip. ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 410 = *paucilobus*.
inacoenus, DC. *Prod.* vi. 382 = *glutinosus*, *Thunb.*
incanus, *Boeber, in Pall. N. Nord. Beitr.* vi. 262 = *erucifolius*.

SENECIO:—

incanus, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 515 = leucophyllus.
incanus, Linn. Sp. Pl. 869.—Europ.
incanus, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 166 = carniolicus.
incarnatus, Lowe, ex DC. Prod. vi. 344 = crassifolius.
incertus, DC. l. c. 433.—Afr. austr.
incisus, Presl, Fl. Sic. p. xxviii = squalidus.
incisus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 158.—Afr. austr.
incomptus, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 143 = *Erechtites quadridentatus*.
incomptus, DC. Prod. vi. 386.—Afr. austr.
inconstans, DC. l. c. 382 = repandus.
incrassatus, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. i. 473 = leucanthemifolius, Poir.
incrassatus, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) reimp. 16.—Ins. Mader.
infestus, Salisb. Prod. 197 = S. Jacobaea.
inops, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 101.—Cappadoc.
inornatus, DC. Prod. vi. 385.—Afr. austr.
insignis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 242.—Mexic.
insularis, Benth. Fl. Austral. iii. 666.—Austral.
intactus, Moench, Meth. 568 = arabicus.
integerrimus, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 238 = crassulus.
integerrimus, Nutt. Gen. Am. ii. 165.—Am. bor.
integrifolius, [Clairv.] Man. Herb. 241 = spathulæfolius.
integrifolius, Hook. Fl. Bor. Am. i. 334 = Hookeri.
integrifolius, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 202 = campestris?
integrifolius, Nutt. Gen. Am. ii. 165 = canus.
intermedius x, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 109.—Europ.
intermedius, Wight, Ic. t. 1135 = scandens.
involutus, DC. Prod. vi. 422.—Peruv.
iodopappus, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen (jodopappus); Wedd. Chlor. And. i. 116. t. 20 B.—Peruv.
isatideus, DC. l. c. 387.—Afr. austr.
Iserni, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 499.—Chili.
Jacobaea, Brot. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 120 = foliosus.
Jacobaea, D. Don, Prod. Fl. Nep. 179 = chrysanthemoides.
Jacobaea, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 676 = praealtus.
Jacobaea, Linn. Sp. Pl. 870.—Europ.; As. bor.
Jacobaea, Losc. & Pard. Ser. Inconf. 52 = jacobaeoides.
jacobaeoides, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 119.—Hispan.
jacobaeiformis, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 182.—Chili.
Jacquemontianus, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 350.—Reg. Himal.
Jacquinianus, Reichb. Pl. Crit. iii. 80 = nemorensis.
jagensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 561.—Chili.
jamaicensis, DC. Prod. vi. 412 = Gynoxys incana.
japonicus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Japon.
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 315 = Gynura pinnatifida.
jathrophoides, Sch. Bip. l. c. 498.—Mexic.
javanicus, Willd. Sp. Pl. iii. 1984.—Java.
Julieti, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 496.—Chili.
juncus, J. F. Gmel. Syst. 1624, sphalm. = lanceus.
juncus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 407.—Afr. austr.
Jungei, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 149.—Chili.
juniperinus, Linn. f. Suppl. 371.—Afr. austr.
Jurgenseni, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 242.—Mexic.
jurineaeifolius, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 99.—As. Min.
Kaempferi, DC. Prod. vi. 363.—Japon.
Kalmii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 126 = lugens.
Kalmii, Less. in Linnaea, vi. (1831) 244 = palustris.
Kalmii, Nutt. Gen. Am. ii. 165 = artemisiaefolius.
kamtshaticus, Ledeb. Fl. Ross. ii. 636 = palmatus.
kermesinus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 242.—Mexic.
Kickxii, Steud. Nom. ed. II. ii. 562.—Belgium.
Kingii, Hook. f. Antarct. 314.—Patagon.
kirghisicus, DC. Prod. vi. 362 = racemosus.

SENECIO:—

Kirilowii, Turcz. ex DC. Prod. vi. 361 = campestris.
Kleinia, Less. in Linnaea, vi. (1831) 252; Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 321.—Ins. Canar.
kleinioides, Oliver & Hiern, in Oliver Fl. Trop. Afr. iii. 421.—Afr. trop.
Kochii, Ledeb. Fl. Ross. ii. 643 = crispatus.
Kolenatianus, C. A. Mey. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. vi. 34.—Reg. Caucas.
korintjiana, Boerl. in Veth, Midden-Sumatra, iv. 11. Flora, 20 = sumatranus.
Kotschyianus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 93.—Persia.
Krameri, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 406.—Japon.
Kraussii, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 698.—Afr. austr.
Kunthianus, Wall. Cat. n. 3118.—Reg. Himal.
Kurzii, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 341.—Burma.
lacerus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 32 = coronopifolius.
lacinatus, Bertol. in Desv. Journ. Bot. ii. (1813) 76 = nebrodensis.
lacinatus, DC. Prod. vi. 411 = Swartzianus.
lacinatus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 470 = S. Jacobaea.
lacinatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 339, sphalm. = *laciniosus*, Wall.
lacinatus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 175.—Ecuador.
lacinatus, Schousb. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 120 = foliosus.
lacinifolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 562 = lacinatus.
laciniosus, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. i. (1836) 350 = tenuifolius.
laciniosus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 744.—Chili.
laciniosus, Wall. Cat. n. 3124 = chrysanthemoides.
lactescens, Brot. Fl. Lusit. i. 391 = Crepis foetida.
laetus, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 74 = chrysanthemoides.
laevicaulis, DC. Prod. vi. 414.—Chili.
laevigatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 159.—Afr. austr.
Lagascanus, DC. Prod. vi. 357.—Hispan.
Laggeri, Nym. Consp. 356 = incanus.
lagopus, Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 119. t. 18.—N. Zel.
lampsanoides, DC. Prod. vi. 348.—Reg. Caucas.
lanatus, Burm. ex DC. l. c. 389 = verbascifolius.
lanatus, DC. l. c. 422.—N. Granat.
lanatus, Lec. & Lamotte, Cat. Auv. 232 = Gerardi.
lanatus, Linn. Syst. ed. X. 1216 = populifolius.
lanatus, Linn. f. Suppl. 370 = Cineraria tomentosa.
lanatus, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 165.—Europ.
lanceolatus, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 26.—Afr. austr.
lanceolatus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 440 = S. Serra.
lanceus, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 194.—Afr. austr.
lancifolius, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 89.—Afr. austr.
Landbeckii, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 151.—Chili.
lanifer, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 312 = vernonioides.
laniger, Boj. ex DC. Prod. vi. 379 = adenodontus.
lanigerus, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 26.—Afr. austr.
lanuginosus, [D.] Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 332 = Donianus.
lanuginosus, Spreng. Syst. iii. 565.—Hab.?
laricifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 185.—Peruv.
Laseguei, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 48.—Reg. Magellan.
lasiorhizoides, Sch. Bip. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 370 = seq.
lasiorhizus, DC. Prod. vi. 387.—Afr. austr.
Lastarianus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 146.—Chili.
latiflorus, Wedd. Chlor. And. i. 125.—N. Granat.
latifolius, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 145.—N. Zel.
latifolius, DC. Prod. vi. 387 = barbellatus.
latronum, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. iii. 402 = racemosus.
laurifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 185 = Gynoxys laurifolia.
lautus, Soland. ex Forst. f. Prod. 91, nomen; et ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 145.—Austral.

SENECIO:—

lautus, Willd. Sp. Pl. iii. 1981 = oligocephalus?
lavandulaefolius, Wall. Cat. n. 3130.—Ind. or.
Lawii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 201.—Ind. or.
laxiflorus, Viv. Fl. Lib. Spec. 55. t. 11. f. 3 = gallicus.
laxifolius, f. Buch. in Trans. N. Z. Inst. ii. (1870) 89.—N. Zel.
laxus, DC. Prod. vi. 380.—Afr. austr.
Layneae, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 87 = fastigiatus.
lazicus, Boiss. & Bal. in Boiss. Fl. Orient. iii. 400.—As. Min.
Lechleri, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 494.—Reg. Magellan.
Lechleri, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen = cymosus.
Ledebourii, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Sibir.
ledifolius, DC. Prod. vi. 421.—N. Granat.
legionensis, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861) 81.—Hispan.
leiocarpus, DC. Prod. vi. 390 = albanensis.
leiophyllus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 209.—Chili.
Lemmoni, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 220.—Arizona.
leontodontifolius, Boj. ex DC. Prod. vi. 376 = Bojeri.
Leontodontis, DC. l. c. 386.—Afr. austr.
leptocarpus, DC. l. c. 372 = pectinatus.
leptolobus, DC. l. c. 419 = pinnatus.
leptophyllus, DC. l. c. 400.—Afr. austr.
leptophyllus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 345 = valparadisiensis.
leptoschizus, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. v. (1838) 99.—Bras.
Lessingianus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 198.—Ind. or.
Lessingii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 56.—Afr. austr.
Lessoni, F. Muell. Cat. Hort. Melb. (1858) 26 = seq.
Lessonianus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 = *Erechtites arguta*.
Lessonianus, Steud. Nom. ed. II. ii. 562 = australis.
Leucadendron, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 448.—Ins. St. Helena.
leucanthemifolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 495.—Chili.
leucanthemifolius, Poir. Voy. Barb. ii. 238.—Reg. Mediterr.
leuciscus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1870) ii. 181.—Chili.
leucoglossus, F. Muell. Fragm. ii. 15.—Austral.
leucoglossus, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 393 = actinoleucus.
leucomallus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 141.—Terr. Magellan.
leucomallus, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 148.—Chili.
leucopappus, Boj. ex DC. Prod. vi. 331, in syn.—Madag.
leucophyllus, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 144.—Mont. Pyren.
leucophyton, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 738.—Chili.
leucostachys, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 307, in obs.—Patagon.
Levingii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 301.—Reg. Himal.
Leyboldi, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 493.—Chili.
libanoticus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 407 = doriaeformis.
Ligularia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 349.—Reg. Himal.
lilacinus, Jacq. f. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 24.—Hab.?
lilacinus, Schrad. Blumenbachia, 39. t. 4. f. 1.—Afr. austr.
limbardioides, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 347.—Patagon.
limbardioides, Hook. & Arn. l. c. 333 = Arnottii.
linariaefolius, Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 400 = debilis, Harv.
linariaefolius, Poepp. ex DC. Prod. vi. 414; Wedd. Chlor. And. i. 133.—Chili.
Lindenii, Sch. Bip. ex Wedd. l. c. 101.—N. Granat.
linearifolius, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 31. t. 29 = argenteus.
linearifolius, A. Rich. Sert. Astrolab. 129 = australis,

SENECIO:—

linearilobus, *Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb.* v. (1838) 99.—Bras.
linearilobus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 346 = platycodon.
linearis, *DC. Prod.* vi. 375.—Ins. Maurit.
lineatus, *DC. l. c.* 395.—Afr. austr.
lineolatus, *DC. l. c.* 427 = sinuatus.
Lingua, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 130.—Ins. Maurit.
linifolius, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 202.—Reg. Himal.
linifolius, *DC. Prod.* vi. 400, in syn. = rosmarinifolius.
linifolius, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 150 = biflorus, *Vahl.*
linifolius, *Linn. Syst. ed. X.* 1215.—Hispan.
linifolius, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult.* 678, excl. syn. = filifolius.
linoides, *DC. Prod.* vi. 397.—Afr. austr.
littoralis, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* v. (1825) 104.—Ins. Falkland.
littoralis, *Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél.* 51 = Andersoni.
littoralis, *Poepp. ex DC. Prod.* vi. 417 = sinuatilobus.
littoralis, *Scop. Fl. Carn. ed. II.* ii. 162 = *Inula viscosa*.
littoreus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158.—Afr. austr.
lividus, *Linn. Sp. Pl.* 867.—Reg. Mediterr.
lividus, *Nolte, Novit. Fl. Holsat.* 72 = sylvaticus.
lividus, *Sm. Engl. Bot. t.* 2515 = viscosus.
lobatus, *Pers. Syn. ii.* 436.—Am. bor.
lobelioides, *DC. Prod.* vi. 382.—Afr. austr.
longepenicillatus, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 97 = nevadensis.
longidentatus, *DC. Prod.* vi. 428 = triangularis.
longiflorus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499; *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 421.—Afr. trop. et anstr.
longifolius, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 279 = rosmarinifolius.
longifolius, *Labill. ex DC. Prod.* vi. 374 = anstralis.
longifolius, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 1222.—Afr. austr.
longilobus, *Benth. Pl. Hartw.* 18 = Douglasii.
longipes, *Hook. f. Fl. Antarct.* 314.—Patagon.
longiradiatus, *Trautv. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 37 = amphibolus, *C. Koch.*
longiscapus, *Boj. in DC. Prod.* vi. 376.—Madag.
Lopezii, *Boiss. Elench.* 60.—Hispan.
Lorentii, *Hochst. in Lorent, Wanderungen*, 330 = armenius.
Lorentzii, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 193.—Reg. Argent.
Loureiroi, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 160 = *Gynura pinnatifida*.
lucidus, *DC. Prod.* vi. 411.—Ind. occ.
ludens, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 199.—Ind. or.
lugens, *Richards. in App. Frankl. Journ.* ed. II. 31.—Am. arct.
luridus, *Phil. Fl. Atac.* 33.—Chili.
luridus, *Salisb. Prod.* 196 = japonicus.
Lyallii, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 146.—N. Zel.
lycopersicifolius, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura lycopersicifolia*.
lycopifolius, *Desf. Tabl. ed. II.* 124 = erucifolius.
lyratifolius, *Reichb. Pl. Crit.* ii. 24.—Europ.
lyratipartitus, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 439 = *Cineraria Schimperii*.
lyratus, *DC. Prod.* vi. 380, excl. syn. = expansus, *Harv. Vahl.*
lyratus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 148 = auriculatus, *Vahl.*
lyratus, *Linn. f. Suppl.* 369.—Afr. austr.
lyratus, *Michx. Fl. Bor. Am. ii.* 120 = lobatus.
lyratus, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) II. 16 = resedifolius.
macedonicus, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 221.—Graecia.
macquariensis, *DC. Prod.* vi. 372 = lautus.
macranthus, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 205 = japonicus.
macranthus, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 126.—Austral.
macrobotrys, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 243.—Mexic.
macrocephalus, *DC. Prod.* vi. 407.—Afr. austr.
macrodonatus, *DC. l. c.* 373 = australis.
macroglossus, *DC. l. c.* 404.—Afr. austr.
macropappus, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 436.—Abyss.
macrophyllus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 308.—Europ. or.; Reg. Caucas.

SENECIO:—

macrophyllus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 178 = bogotensis.
macropodus, *DC. Prod.* vi. 403 = angulatus.
macrothizus, *Wedd. Chlor. And.* i. 108.—Peruv.
macrosperrus, *DC. Prod.* vi. 385.—Afr. austr.
macrothiz, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. 308.—Bras.
macrothiz, *Kunze, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl. i.* (1843) 281.—Chili.
madagascariensis, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 130.—Madag.
maderensis, *DC. Prod.* vi. 409.—Ins. Madera.
madrensis, *A. Gray in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 55.—Mexic.
magellanicus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 343 = *Culcitium magellanicum*.
magellensis, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1857).—*Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xii. (1859) 78.—Ital.
magnificus, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 418.—Austral.
Mairetianus, *DC. Prod.* vi. 430.—Mexic.
maldonadensis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. 312.—Bras.; Uruguay.
malvaefolius, *DC. Prod.* vi. 410.—Ins. Azor.
Mandonianus, *Wedd. Chlor. And.* i. 228.—Bolivia.
Mannii, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 14.—Afr. trop.
marginatus, *Linn. f. Suppl.* 370.—Afr. austr.
marginatus, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult.* 680, partim = lanceus.
maritimus, *Linn. f. Suppl.* 369.—Afr. austr.
maritimus, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1479 = *S. Cineraria*.
Marmorae, *Moris, Stirp. Sard. Elench.* ii. 6 = crassifolius.
Mathewii, *Wedd. Chlor. And.* i. 114.—Peruv.
matricariaefolius, *DC. Prod.* vi. 383.—Afr. austr.
mauritanicus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 62 = leucanthemifolius, *Poir.*
mauritanus, *Soyer-Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 52.—Ins. Maurit.
medicinalis, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 745.—Chili.
medius, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 386.—Hungar.
medullosus, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.
megacephalus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 410.—Am. bor. occ.
megaglossus, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 419.—Anstral.
megalophron, *Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 407 = doriaeformis.
megapotiamicus, *Buek, Ind. ad DC. Prod.* ii. p. vi = brasiliensis.
megapotamicus, *Spreng. Syst.* iii. 547 = pinnatus.
melanolepis, *DC. Prod.* vi. 424.—Peruv.
membranifolius, *DC. l. c.* 381 = repandus.
mendocinensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 362.—Calif.
mendocinus, *Phil. Sert. Mendoc. Alt.* 24.—Chili.
mesembryanthemoides, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 378.—Madag.
Meyeri, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 25.—Austral.
micaniaeformis, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 562, sphalm. = *mikaniaeformis*.
micranthus, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 97.—Hab. ?
Microchaeta, *Wedd. Chlor. And.* i. 100.—N. Granat.
microdon, *Wedd. Chlor. And.* i. 102.—Ecuador.
microdonatus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 271.—Madag.
microglossus, *DC. Prod.* vi. 395.—Afr. austr.
microphyllus, *Phil. in Linnaea*, xxix. (1857-58) 1.—Chili.
microphyllus, *Spreng. Syst.* iii. 556, sphalm. = macrophyllus.
micropifolius, *DC. Prod.* vi. 413.—Chili.
microsperrus, *DC. l. c.* 391.—Afr. austr.
Mikaniae, *DC. l. c.* 405 = deltoideus.
mikaniaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Peruv.
mikaniaeformis, *DC. Prod.* vi. 405 = deltoideus.
mikanioides, *Otto, ex Walp. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xiii. (1845) 42.—Afr. austr.
Millefolium, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 444.—Am. bor.
minimus, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 130 = *Erechtites minima*.

SENECIO:—

minutus, *DC. Prod.* vi. 346.—Hispan.
miser, *Hook. f. Fl. Antarct.* 314.—Reg. Magell.
Mishmi, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 203.—Reg. Himal.
mississippianus, *DC. Prod.* vi. 427 = lobatus.
mixtus, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 112. t. 36 = *Erechtites mixta*.
modestus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 745.—Chili.
modestus, *Wedd. Chlor. And.* i. 105.—Peruv.
moharensis, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 446.—Calif.
Molinae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 497.—Chili.
mollis, *DC. Prod.* vi. 358 = cappadocicus.
mollis, *Poepp. ex DC. l. c.* 417 = sinuatilobus.
mollis, *Willd. Sp. Pl.* iii. 2011.—As. Min.; Persia.
moluccanus, *Roxb. Hort. Beng.* [101]; *Fl. Ind.* iii. 433 = *Gynura bicolor* ?
mongolicus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50.—Mongolia.
monocephalus, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* i. (1850) 107; iv. (1853) 41 = abrotanifolius.
Monroi, *Hook. f. Fl. N. Zel.* ii. 333.—N. Zel.
montanus, *Hoppe, ex Nym. Consp.* 356 = nebrodensis.
montanus, *Lam. Fl. Fr.* ii. 130 = *S. Doronicum*.
montanus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1989 = nebrodensis.
montevicensis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. 311. 307.—Uruguay.
monticola, *DC. Prod.* vi. 384.—Afr. austr.
Monttianus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 158.—Chili.
Moreliae, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 243.—Mexic.
Moretii, *Buek, Ind. ad DC. Prod.* ii. p. vi.—Hab. ?
Mortoni, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 208.—Reg. Himal.
mucronatus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1974.—Afr. austr.
mucronulatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 701 = purpureus.
Muehlenbergii, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Am. bor.
Muelleri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 359.—N. Zel.
Muelleri, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1863) 31.—Austral.
mulgediifolius, *Schau. in Linnaea*, xix. (1847) 733.—Mexic.
multangularis, *Tausch, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 253 = nebrodensis.
multibracteatus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 192.—Madag.
multibracteatus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 361.—Afr. austr.
multicaulis, *DC. Prod.* vi. 398.—Afr. austr.
multicaulis, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 58.—Chili.
multicaulis, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 105 = *Erechtites arguta*.
multidentatus, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 243.—Mexic.
multifidus, *Domb. ex DC. Prod.* vi. 416 = glaber.
multifidus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1986 = tenuifolius.
multiflorus, *DC. Prod.* vi. 410.—Ins. Canar.
multiflorus, *Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar.* ii. 325 (an praec. ?)—Ins. Canar.
multifoliosus, *Klatt, in Ann. Sc. Nat. Sér. V.* xviii. (1873) 375.—Ins. Borbon.
multilobatus, *Torr. & Gray, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* iv. (1849) 109.—Am. bor. occ.
multinervis, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.
multivenius, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 109.—Costa Rica.
munitus, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 278 = paludosus.
muricatus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 159.—Afr. austr.
murorum, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 149.—Chili.
mysotidifolius, *Benth. in Enum. Pl. Hueg.* 66 = *Millotia tenuifolia*.
myrianthos, *Cheesm. in Trans. N. Z. Inst.* vii. (1875) 348.—N. Zel.
myriocephalus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. 319.—Bras.
myriocephalus, *Sch. Bip. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 441.—Abyss.
myriophyllus, *Phil. Fl. Atac.* 33.—Chili.
myrrhifolius, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 159 = arenarius.

SENECIO:—

- Myrsinites, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 211.—Ecuador.
nanus, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 443 = *Werneria africana*.
napeaeifolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
napellifolius, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 244.—Mexic.
napifolius, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 243 = *erucifolius*.
nataiensis, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 700.—Afr. austr.
Neaci, DC. Prod. vi. 413.—Chili.
nebrodensis, DC. Fl. Fr. iv. 162 = *lividus*.
nebrodensis, Gilib. ex Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1242 = *vernalis*.
nebrodensis, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1217.—Europ. austr.; Afr. bor.
neelgherryanus, DC. in Wight, Contrib. 23.—Ind. or.
neglectus, Desv. Obs. Pl. Andeg. 129 = *S. Jacobaea*.
neglectus, A. Rich. Fl. N. Zél. 258 = *lautus*.
nemophilus, Dum. Fl. Belg. Prod. 66 = *Fuchsii*.
nemorensis, Linn. Sp. Pl. 870.—Europ. austr.; As. bor.
nemorensis, Lorey & Duret, Fl. Côte-d'Or, i. 474 = *Fuchsii*.
memorosus, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 30 = *S. Jacobaea*.
neo-mexicanus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1888) 55.—Am. bor. occ.
nepalensis, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = *Gynura nepalensis*.
neriifolius, Baill. Hist. Pl. viii. 308 = *S. Kleinia*.
nervatus, Reichb. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 302.—Afr. austr.
nevadensis, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 60 = *linifolius*, Linn.
nevadensis, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 97.—Venezuela.
nigrescens, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 32.—Chili.
nikoënsis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 182.—Japon.
nilagerensis, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 337 = *Notonia Walkeri*.
nilgheryanus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 341 = *neelgherryanus*.
nitidus, DC. Prod. vi. 421.—Ecuador.
nitidus, Less. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 379 = *isatidens*.
nitidus, Mérat, Fl. Par. Addit. (1845) 495 = *S. Jacobaea*.
nitidus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 742.—Chili.
niveus, Wall. Cat. n. 3143 = *Gerbera nivea*.
niveus, Willd. Sp. Pl. iii. 1974.—Afr. austr.
Noëanus, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xiv. (1856) 231.—Mesopot.?
nubigenus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 174.—Ecuador.
nudicaulis, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 179.—Reg. Himal.
nudicaulis, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = *Gynura Pseudo-china*.
nudiussculus, DC. Prod. vi. 384.—Afr. austr.
nutans, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.
Nuttallii, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Am. bor.
oaxacanus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 244.—Mexic.
obliquus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 507 = *S. Cacaliaster*.
oblongifolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 563.—Chili.
obovatus, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1999 = *aureus*.
obscurus, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 638.—Sibir.
obscurus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) II. 20 = *nemorensis*.
obtusatus, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 530 = *aureus*.
obtusatus, Wall. Cat. n. 3133.—Reg. Himal.; Burma.
ochrocarpus, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 416.—Afr. trop.
ochroleucus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 340 = *rhodaster*, fistulosus.
octoglossus, DC. Prod. vi. 354 = *nemorensis*.
octolepis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 204.—Reg. Argent.
octophyllus, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 531, nomen.—Bolivia.

SENECIO:—

- odontopterus*, DC. Prod. vi. 406.—Afr. austr.
odoratus, Hornem. Hort. Hafn. ii. 809.—Austral.
odorus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Arab.
ocderiaefolius, DC. Prod. vi. 391.—Afr. austr.
Oerstedianus, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 109.—Costa Rica.
Oldhamianus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvi. (1871) 219.—China.
oleaeifolius, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 305 = *trixoides*.
oleosus, Vell. Fl. Flum. viii. t. 104 = *Selloi*.
Olgae, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 45.—Turkestan.
oliganthus, DC. Prod. vi. 390.—Afr. austr.
oliganthus, Spreng. Syst. v. 636 (Index) = *S. Vulneraria*.
oligocephalus, DC. Prod. vi. 373.—Austral.
oligolepis, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 94.—Persia.
oligoleucus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 311.—Reg. Argent.
oligophyllus, Baker, l. c. 317.—Bras.
olympicus, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 13.—As. Min.
oporinus, Willd. Sp. Pl. iii. 2003 = *lanceus*.
opuntiaefolius, DC. Prod. vi. 435 (sp. dub.).—Am. bor.
orbicularis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 376.—Afr. austr.
oreophyton, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 158.—Chili.
organensis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 77; Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 127.—Bras.
orientalis, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 221 = *macedonicus*.
orientalis, Mill. Gard. Dict. cd. VIII. n. 10 = *coriaceus*.
orientalis, Pachy, Voy. Marm. t. 97 = *macedonicus*?
orientalis, Tenore, Fl. Nap. ii. 222 = *S. Doronicum*.
orientalis, Willd. Sp. Pl. iii. 2006.—As. Min.; Persia.
orizabensis, Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 244.—Mexic.
oronocensis, DC. Prod. vi. 423.—Venezuel.
Othonnae, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 308.—Serbia; Reg. Caucas.; Persia.
othonnaeflorus, DC. Prod. vi. 386.—Afr. austr.
othonnaeoides, A. Cunn. ex DC. l. c. v. 398 = *Minuria Cunninghamii*.
otiphyllus, A. Cunn. ex DC. l. c. vi. 371 = *odoratus*.
Otites, Kunze, ex DC. l. c. 417.—Chili.
otophorus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvi. (1871) 219.—Japon.
otophorus, Wedd. Chlor. And. i. 98.—N. Granat.
otopterus, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 192.—Reg. Argent.
ovalifolius, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 208.—Chili.
ovalis, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = *Gynura auriculata*.
ovatifolius, Boiss. Fl. Orient. iii. 406.—Armenia.
ovatifolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
ovatus, Willd. Sp. Pl. iii. 2004 = *Fuchsii*.
ovirensis, DC. Prod. vi. 360 = *alpestris*.
oxyodontus, DC. l. c. 392.—Afr. austr.
oxyphyllus, DC. l. c. 419.—Bras.
oxyriaefolius, DC. l. c. 405.—Afr. austr.
paarlensis, DC. l. c. 383.—Afr. austr.
pachycarpus, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 349.—Reg. Himal.
pachyphyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 147.—Chili.
pachyphyllus, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 410.—N. Zél.
Pallasii, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 = *Doronicum altaicum*.
pallens, Boj. ex DC. Prod. vi. 377 = *emirnensis*.
pallens, Wall. Cat. n. 3132 = *nudicaulis*.
pallidus, Vell. Fl. Flum. viii. t. 105.—Bras.
palmaris, Lapeyr. Suppl. Hist. Pl. Pyr. 134 = *leucophyllus*.
palmaris, Less. Syn. Comp. 392 = *S. Syncelesis*.
palmaris, Pall. Reise, iii. 321.—Sibir.; Ins. Sachalin.
palmeris, C. Sm. ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 148.—Ins. Canar.
Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 80.—Calif.
paludicola, Steud. Nom. ed. II. ii. 563.—Bras.
paludosus, Linn. Sp. Pl. 870.—Europ.; As. bor.
palustris, Hook. Fl. Bor. Am. i. 334.—Reg. bor. temp.
palustris, Vell. Fl. Flum. viii. t. 110 = *paludicola*.

SENECIO:—

- pamplonensis*, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 94 = *ledifolius*.
panduratus, DC. Prod. vi. 383 = *hastulatus*.
panduratus, Less. Syn. Comp. 392 = *erosus*, Linn. f.
pandurifolius, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 380.—Afr. austr.
pandurifolius, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 48.—Mingrelia.
paniculatus, Berg. Desc. Pl. Cap. 227.—Afr. austr.
paniculatus, Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 400 = *debilis*, Harv.
papaverifolius, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 437 = *picridifolius*.
papillaris, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.
papillosus, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 301.—Tasman.
paposanus, Phil. Fl. Atac. 32.—Chili.
papposus, Less. in Linnaea, vi. (1831) 244 = *lugens*.
papyraceus, DC. Prod. vi. 410.—Ins. Canar.
paradoxus, Hoppe, ex Willd. Sp. Pl. iii. 1989 = *nebrodensis*.
Paralias, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 750.—Chili.
parasiticus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 244.—Mexic.
Parkeri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 191.—Madag.
Parnassi, Boiss. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient. iii. 412.—Graec.
Parryi, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 103.—Am. bor. occ.
parviflorus, All. Fl. Pcdem. i. 200. t. 38. f. 8 = *incanus*.
parvilobus, DC. Prod. vi. 396.—Afr. austr.
patagonicus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 344.—Patagon.
patagonicus, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 159.—Patagon.
patens, DC. Prod. vi. 423.—Ecuador.
patulus, Burm. ex DC. l. c. 404 = *deltoides*.
paucidentatus, DC. l. c. 414.—Chili.
pauciflorus, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 171.—Madag.
pauciflorus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 176. t. 365 = *S. Vulneraria*.
pauciflorus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 529 = *aureus*.
pauciflorus, Thunb. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 392 = *grandiflorus*.
paucifolius, DC. Prod. vi. 403.—Afr. austr.
paucifolius, S. G. Gmel. It. i. 171 = *S. Doria*.
paucijugus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 323.—Bras.
pauciligulatus, A. Rich. Sert. Astrolab. 121. t. 38 = *australis*.
paucilobus, DC. Prod. vi. 352.—Persia.
paulensis, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. v. (1838) 98.—Bras.
pauperculus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 120 = *aureus*.
Pearcei, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 157.—Chili.
pectinatus, DC. Prod. vi. 372.—Austral.
pectinatus, D. Don, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 323 = *pinnatus*.
pedicularifolius, DC. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 563 = *spiraefolius*.
pedicularifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 173.—Ecuador.
peduncularis, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 224 = *vernalis*.
peduncularis, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 74.—Reg. Himal.
peduncularis, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702 = *polymorphus*.
pedunculatus, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 277.—Armen.
peguanus, DC. Prod. vi. 365.—Burma.
pellitus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 143.—Peruv.
pellucidinervis, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 319.—Bras.
pellucidus, DC. Prod. vi. 380.—Afr. austr.
peltatus, DC. l. c. 405 = *oxyriaefolius*.
peltiferus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 245.—Mexic.
peltiformis, DC. Prod. vi. 405 = *oxyriaefolius*.
pendulus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Arab.

SENECIO:—

penicillatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—
Ins. Borbon.
penninervius, *DC. Prod.* vi. 395.—Afr. austr.
pentaphyllus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 744.—
Chili.
Pentlandianus, *DC. Prod.* vi. 421.—Bolivia.
perdicoides, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 149.—N. Zel.
peregrinus, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 205.—
Reg. Argent.
Perralderianus, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862)
173 = atlanticus.
Perrottetianus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*,
xv. (1882) 329.—Ind. or.
Perrottetii, *DC. Prod.* vi. 343.—Afr. trop.
persicaefolius, Ram. in *Bull. Soc. Philom.* ii. (1799—
1801) 146. t. 11. f. 3 = *Toumefortii*.
persicaefolius, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 123 = australis.
persicifolius, *Burm. ex DC. Prod.* vi. 395 = lineatus.
persicifolius, *Linn. Pl. Afr. Rar.* 20; *Amoen. Acad.*
vi. 100.—Afr. austr.
persicus, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vi. 94.—Persia.
persicus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = taraxa-
cifolius.
Persoonii, De Not. *Repert. Fl. Ligust.* 229 = incanus.
peruvianus, *Pers. Syn.* ii. 436.—Peruv.
Petasitis, *DC. Prod.* vi. 431.—Am. austr.
petiolaris, *DC. l. c.* 434.—Afr. austr.
petiolaris, Less. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 357 =
Lessingii.
Petitianus, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 442.—Afr.
trop.
petraeus, *Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov.* 59.—
Hispan.
petraeus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882)
330.—Am. bor. occ.
peucedanifolius, *Linn. f. Suppl.* 372 = paniculatus.
phagnaloides, *DC. Prod.* vi. 415.—Chili.
phalacrocarpus, *Hance, in Journ. Bot.* xix. (1881)
151.—China.
phalacrolaenus, *DC. Prod.* vi. 393 = incisus.
Philippicus, *Regel & Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop.*
(1857) 43.—Chili.
Philippii, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 134.—
Chili.
phylicaeifolius, *Poepp. ex DC. Prod.* vi. 415.—Chili.
phyllomorphus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564 = pilquensis.
Pickeringii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861)
142.—Peruv.
picridifolius, *DC. Prod.* vi. 386.—Afr. austr.
Picridis, S. Schau. in *Linnaea*, xix. (1847) 733.—
Mexic.
Pierotii, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 182 =
campestris.
pilosiusculus, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 203 = saxa-
tilis.
pilquensis, *Buek, Ind. ad DC. Prod.* ii. p. vi.—Chili.
pimpinellaefolius, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv.
174.—Am. austr.
pinceus, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 702.—Afr.
austr.
pinetorum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 245.—
Mexic.
pinguiculus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 62 = crassi-
folius.
pinguifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—
Afr. anstr.
pinifolius, *Lam. Encyc.* iii. 263; *Spreng. Syst.* iii. 554.
—Afr. austr.
pinifolius, *Pers. Syn.* ii. 436 = *Faujasia pinifolia*.
pinifolius, *Willd. ex Wedd. Chlor. And.* i. 101 =
abietinus.
pinnatifidus, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 198 = Hohen-
ackeri, *Hook. f.*
pinnatifidus, *DC. Prod.* vi. 397, excl. syn. = foeni-
culoides.
pinnatifidus, Less. *Syn. Comp.* 391.—Afr. austr.
pinnatifidus, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 117 = lautus.
pinnatilobatus, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856)
55, nomen.—Peruv.
pinnatipartitus, *Sch. Bip. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii.
412.—Abyss.
pinnatisectus, *DC. Prod.* vi. 427.—Mexic.
pinnatulus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564 = Burchellii.
pinnatulus, *Stend. l. c.* = pinnulatus.
pinnatus, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 131.—Bras.
pinnatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499 =
Othonnae.

SENECIO:—

pinnulatus, Sieber, ex Harv. & Sond. *Pl. Cap.* iii. 405
= crassiusculus.
pinnulatus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 157.—Afr. austr.
pisidicus, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iii. 35 = Castagne-
anus.
Pissisi, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 151.—Chili.
Pithosillum, *DC. Prod.* vi. 375.—Ins. Maurit.
Placillae, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564.—Chili.
plantagineus, *Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin.*
xxxviii. (1835) 32.—Chili.
platanifolius, *Benth. Pl. Hartw.* 43.—Mexic.
plattensis, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii.
(1841) 413 = aureus.
platycodon, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 307.—
Reg. Argent.; Chili.
platylepis, *DC. Prod.* vi. 371.—Austral.
platyphyllus, *DC. l. c.* 352.—Reg. Caucas.
plebeius, *Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel.*
i. 142 = *Erechtites arguta*.
plebeius, *DC. Prod.* vi. 379 = laevigatus.
plumbeus, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S.* viii.
(1862) 515.—Cuba.
Poeppigii, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii.
(1841) 342.—Chili.
Pohlui, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III.
303.—Bras.
polifolius, *Linn. Syst. ed. XIII.* 632 = populifolius.
pollicaris, *DC. ex Boj. Hort. Maurit.* 188 = *Faujasia*
flexuosa.
polyanthemoides, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) C97
= pterophorus.
polyanthemus, *DC. Prod.* vi. 391 = juniperinus.
polycephalus, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 197.—Ind. or.
polycephalus, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 630 = vernalis.
polylepis, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 536,
nomen.—Bolivia.
polymerus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv.
(1882) 332.—Venezuel.
polymorphus, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 702.—
Afr. austr.
polyodon, *DC. Prod.* iv. 386.—Afr. austr.
polyphlebus, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S.* viii.
(1862) 515.—Cuba.
polyphyllus, *Kunze, ex DC. Prod.* vi. 415.—Chili.
polyphyllus, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 119 =
Schultzii, *Wedd.*
polyrhizus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883)
192.—Madag.
populifolius, *Burm. ex DC. Prod.* vi. 389 = verbasci-
folius.
populifolius, *DC. l. c.* 409.—Ins. Canar.
populifolius, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 1224 = halimi-
folius.
porophylloides, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 154.
—Chili.
Portalesianus, *Remy, l. c.* 175.—Chili.
portulacoides, *Remy, l. c.* 163.—Chili.
potamogetonifolius, *Sch. Bip. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc.*
Chil. 183, nomen.—Chili.
potosianus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv.
(1882) 331.—Bolivia.
Pottii, *Armstr. in Trans. N. Z. Inst.* iv. (1872) 290.—
N. Zel.
praecaltus, *Bertol. in Opusc. Sc. Bologn.* iii. (1819) 183.
t. 7.—Europ.
praecox, *DC. Prod.* vi. 431.—Mexic.
praeruptorum, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66)
530.—Bolivia.
pratensis, *DC. Prod.* vi. 360 = campestris.
pratensis, *Phil. in Linnaea*, xxx. (1859-60) 194.—
Chili.
pratensis, *Richt. in Klett & Richt. Fl. Leipz.* 692 =
aquaticus.
pratensis, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x.*
(1859) 61 = S. Jacobaea.
prenanthiflorus, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 448.—Ins.
S. Helena.
prenanthifolius, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65)
159.—Chili.
prenanthoides, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 96 = *Erechtites*
prenanthoides.
primulifolius, F. Muell. in *Hook. Kew Journ.* ix.
(1857) 300.—Tasmania.
prionites, *MacOwan, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881)
392.—Afr. austr.
procerus, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 219.—Serbia:
Graec.

SENECIO:—

procerus, *Salisb. Prod.* 197 = sarracenicus.
procumbens, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 17.—
Mexic.
proteus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 140.—Chili.
prunifolius, *Wedd. Chlor. And.* i. 102.—N. Granat.
Przewalskii, *Maxim. in Bull. Acad. Petersb.* xxvi.
(1880) 493.—Mongolia.
psammophilus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 189.
—Reg. Argent.
Pseudo-arnica, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 240.—Am.
arct.; Sibir.
Pseudo-china, *Andr. Bot. Rep. t.* 291 = speciosus.
Pseudo-china, *Linn. Sp. Pl.* 867 = *Gynura Pseudo-*
china.
Pseudo-discoideus, *Sch. Bip. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc.*
Chil. 183, nomen.—Chili.
Pseudo-doronicum, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 351 =
S. Doronicum.
Pseudo-elegans, Less. *Syn. Comp.* 391 = elegans.
Pseudo-longifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844)
699 = longifolius.
Pseudo-sceptum, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564 = spiraei-
folius.
Pseud-otites, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 191.—
Reg. Argent.
Pseudo-vernalis, *Zabel, ex Nym. Consp.* 357 = vernalis.
psychrophilus, *Wedd. Chlor. And.* i. 112.—Boliv.
ptarmicaefolius, *Bory, Voy.* iii. 110.—Ins. Borbon.
pterocarpus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564, sphalm. =
pterophorus.
pteroneurus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—
Marocc.
pterophorus, *DC. Prod.* vi. 389.—Afr. austr.
pteropogon, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 207.—
Reg. Argent.
puberulus, *DC. Prod.* vi. 380.—Afr. austr.
pubigerus, *Linn. Pl. Afr. Rar.* 21; *Amoen. Acad.*
vi. 101.—Afr. austr.
pugioniformis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.
—Hab.?
pulchellus, *DC. Prod.* vi. 421.—N. Granat.
pulchellus, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 187 =
Gynoxys pulchella.
pulcher, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841)
337.—Bras.; Uruguay.
pularioides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 312.—
Bras.
pullus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882)
333.—Mexic.
pumilus, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 130 = *Erechtites*
arguta?
punduahensis, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.*
159 = *Gynura angulosa*.
pungens, *DC. Prod.* vi. 421.—Peruv.
purpuratus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 741.—
Chili.
purpureo-viridis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi.
(1885) 419.—Madag.
purpureus, *Linn. Syst. ed. X.* 1214.—Afr. austr.
purpureus, *Soyer-Willems, in Usteri, Ann. Bot.* xviii.
(1796) 51 = *Gynura cernua*.
Purshianus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii.
(1841) 412 = canus.
pusillus, *Guss. ex DC. Prod.* vi. 341 = pygmaeus.
pusillus, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 99 = *Erechtites arguta*.
pyncanthus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 740.—
Chili.
pygmaeus, *DC. Prod.* vi. 341.—Sicil.
pyramidatus, *DC. l. c.* 402.—Afr. austr.
pyrenaicus, *Gren. & Godr. Fl. Fr.* ii. 124.—Mont.
Pyren.
pyrifolius, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III.
318 = ellipticus.
pyroglossus, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv.
(1842) 386 = campestris.
pyrophilus, *Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch.*
Neerl. Indie, ii. (1845) 266.—Java.
pyrrhopappus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 =
amplexicaulis, *Wall.*
quadridentatus, *Labill. Nov. Holl. Pl.* ii. 48. t. 194 =
Erechtites quadridentata.
Quartinianus, *Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.*
157 = abyssinicus.
quercifolius, *Pourr. ex Steud. Nom. ed. I.* 765 =
aquaticus.
quercifolius, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158 = ilicifolius,
Thunb.

SENECIO :—

quillotensis, *Phil. in Linnaea*, xxix. (1857-58) 3.—Chili.
 quinquangulatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.
quinqueflorus, DC. *Prod.* vi. 396 = bipinnatus.
 quinqueligulatus, *Winkl. in Del. Sem. Hort. Petrop.* (1881) 15.—Turkestan.
 quinquelobus, DC. *Prod.* vi. 404.—Afr. austr.
 quinquelobus, *Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 209.—Reg. Himal.
 quinquenervius, *Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 391.—Afr. austr.
 quinquedentatus, *Boiss. ex DC. Prod.* vii. 300.—Hispan.
Rabani, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 202 = saxatilis.
 racemosus, DC. *Prod.* vi. 358.—Rossia; Reg. Caucas.; As. bor.
 racemosus, *Wall. Cat. n.* 3140 = S. Ligularia.
 radicans, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
radiolatus, F. Muell. *Enum. Pl. Chath. Isl.* 24. t. 4 = lautus.
 radulaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
 ramentaceus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 305.—Bras.
 ramosissimus, DC. *Prod.* vi. 371.—Austral.
 ramosus, *Wall. Cat. n.* 3129.—Reg. Himal.
 rancagnensis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 169.—Chili.
 rancoensis, *Sch. Bip. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil.* 183, nomen.—Chili.
 raphanifolius, *Wall. Cat. n.* 3125 = diversifolius, *Wall. rapifolius, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 409.—Am. bor.
 rapistroides, DC. *Prod.* vi. 346 = vernalis.
 rariflorus, C. Koch, in *Linnaea*, xvii. (1843) 47 = Othonnae.
 reclinator, *Linn. f. Suppl.* 369 = paniculatus.
 recurvatus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 184.—Peruv.
 Reedi, *Phil. in Anal. Univ.* (1870) II. 182.—Chili.
 reflexus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 182.—Ecuador.
 regionontanus, DC. *Prod.* vi. 429 = Douglasii.
 regularis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1844) 695 = littoreus.
 Reinoldi, *Endl. ex Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 734 = rotundifolius.
 Renardi, *Winkl. in Trautv. Regel, Maxim. & Winkl. Decas. Pl. Nov.* 6.—Turkestan.
 renifolius, *Porter & Coulter, Fl. Colorado*, 83.—Colorado.
 renifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50.—Reg. Caucas.
 reniformis, *Wall. Cat. n.* 3141 = Cremanthodium reniforme.
 repandus, *Hook. f. ex C. Muell. in Walp. Ann.* v. 341 = Brachyglottis repanda.
 repandus, *Thunb. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 357, partim = Lessingii.
 repandus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158.—Afr. austr.
 repens, *Baill. Hist. Pl.* viii. 308 = succulentus, *Sch. Bip.*
 repens, DC. *Prod.* vi. 423.—Ecuador.
 repens, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 507 = erucifolius.
 repens, *Stokes, Bot. Mat. Med.* iv. 212 = sarracenicus.
 reptans, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) i. 207.—Afr. austr.
 resectus, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 378.—Madag.
 resedifolius, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 243.—Reg. arct.
 reticulatus, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 199 = Grahami.
 reticulatus, DC. *Prod.* vi. 431.—Mexic.
 retortus, *Benth. in Hook. Ic. Pl.* t. 1114.—Afr. austr.
 retrorsus, DC. *Prod.* vi. 387 = barbellatus.
 retusus, *Wall. Cat. n.* 3142.—Reg. Himal.
 rhizocephalus, A. Gray, *ex Wedd. Chlor. And.* i. 129.—Peruv.
 rhizocephalus, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) i. 210.—Ecuador; N. Granat.
 rhodaster, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 216.—Bras.
 rhombifolius, *Bolle, in Bonplandia*, vii. (1859) 296.—Ins. Canar.
 rhombifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499 = platyphyllus.

SENECIO :—

rhomboides, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 377.—Afr. austr.
 rhyncholaenus, DC. *Prod.* vi. 397.—Afr. austr.
 Richardianus, DC. l. c. 374 = australis.
 Richii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 142.—Peruv.
 Riddellii, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 444 = Douglasii.
 rigens, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 1224 = Othonna parviflora.
 rigescens, *Jacq. Coll.* v. 150. t. 6. f. 1 = rosmarinifolius.
 rigidus, *Linn. Sp. Pl.* 872.—Afr. austr.
 ringens, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564 = Othonna parviflora.
 riparius, DC. *Prod.* vi. 377.—Madag.
 riparius, *Salisb. Prod.* 197 = S. Doria.
 riparius, *Wallr. Sched. Crit.* 482 = paludosus.
 rivularis, DC. *Prod.* vi. 359 = crispatus.
 rivularis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 191.—Chili.
 robertiaefolius, DC. *Prod.* vi. 384.—Afr. austr.
 Roborowskii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 487.—China.
 robustus, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* vi. (1874) 243.—N. Zel.
 robustus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50.—Sibir.
 Rochelianus, *Fuss, Fl. Transs.* 353 = S. Doronicum.
 Rodriguezii, *Willk. ex Rodrig. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* iii. (1874) 36.—Ins. Balear.
 Roldana, DC. *Prod.* vi. 431.—Mexic.
 rosellatus, *Boj. ex DC. l. c.* 377.—Madag.
 roseus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
 rosmarinifolius, *Linn. f. Suppl.* 369.—Afr. austr.
 rostellatus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564, sphalm. = rosellatus.
 rotundifolius, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 149.—N. Zel.
 rotundifolius, *Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr.* 517 = S. Doronicum.
 rotundifolius, *Stokes, Bot. Mat. Med.* iv. 215 = aureus.
 Royleanus, DC. *Prod.* vi. 366 = graciliflorus.
 rubens, *Jacq. Hort. Vindob.* iii. 50 = Gynura cernua.
 rubescens, S. Moore, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 228.—China.
 rudbeckiaefolius, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 283.—Peruv.
 ruderalis, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 355 = pellucidus.
 rudis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 88 = leontodontis.
 Rueppellii, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 157 = coronopifolius.
 rufescens, DC. *Prod.* vi. 413.—Chili.
 rufinervis, DC. l. c. 369.—Reg. Himal.
 Rugelia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 54.—Am. bor.
 rumicifolius, *MacOwan & Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 392 = trullaefolius.
 runcinatus, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 410 = Erechites runcinata.
 rupestris, *Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung.* ii. 136 = nebrodensis.
 rupicola, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 119 = lautus.
 Rusbyi, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, ix. (1882) 64.—N. Mexic.
 rutaceus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 751.—Chili.
 ruthenensis, *Maz. & Timb. Note Nouv. Senecio*, 3 = S. Doronicum.
 sabulosus, DC. *Prod.* vi. 422.—Ecuador.
 Sadleri, *Láng, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 245 = paludosus.
 Sagitta, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 483.—China.
 sagittarius, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = Gynura Sagittaria.
 sagittatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Ross.; As. or.
 sagittifolius, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 315.—Reg. Argent.
 salicetorum, *Godr. Fl. Lorr. ed. I.* ii. 11 = sarracenicus.
 salicifolius, *Pers. Syn.* ii. 436.—Ins. Borbon.
 salicifolius, *Wallr. Sched. Crit.* 478 = Fuchsii.
 salignus, DC. *Prod.* vi. 430.—Mexic.
 salsus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 190.—Reg. Argent.

SENECIO :—

saltensis, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 338.—Reg. Argent.
 salviifolius, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 160, nomen.—Afr. trop.
 Sandersoni, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 365.—Afr. austr.
 sandwicensis, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 526.—Ins. Owahu.
 Sanguisorbae, DC. *Prod.* vi. 427.—Mexic.
 saracenicus, *Auct. ex Nym. Consp.* 353 = nemorensis.
 saracenicus, *Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I.* 390 = sarracenicus.
 sarcobasis, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 300 = Gynura sarcobasis.
 sarcophyllus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 740.—Chili.
 sarcophyllus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 565.—Chili.
 sarmentosus, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = Gynura sarmentosa.
 sarracenicus, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iii. 443 = Fuchsii.
 sarracenicus, *Linn. Sp. Pl.* 871.—Europ.; Sibir.
 Sartorii, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 247.—Mexic.
 Savatieri, *Franch. Pl. Davidian.* i. (1884) 175 = Oldhamianus.
 saxatilis, *Wall. Cat. n.* 3131.—Ind. or.
 saxicolus, *Wedd. Chlor. And.* i. 131.—Peruv.
 saxifragoides, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 144.—N. Zel.
 scaber, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1977 = rigidus.
 scabriusculus, DC. *Prod.* vi. 396 = pinnulatus.
 scabrosus, *Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 147 = Banksii.
 scandens, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 178.—Reg. Himal.
 scandens, DC. *Prod.* vi. 404 = mikanioides.
 scandens, *Juss. ex DC. l. c.* 326 = Gynoxys cordifolia.
 scandens, *Wall. Cat. n.* 3120 = S. Buimalia.
 scanorensis, *Linn. ex Steud. Nom. ed. I.* 765 = erucifolius.
 scapiger, *Sieber, in Spreng. Syst.* iii. 559 = Brachycome scapigera.
 scapulosus, DC. *Prod.* vi. 403.—Afr. austr.
 Scheuchzeri, *Gaud. Fl. Helv.* v. 294 = gallicus.
 Schimperii, *Sch. Bip. ex Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 27, nomen; *et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 435.—Abyss.
 Schkuhrii, DC. *Prod.* vi. 359 = crispatus.
 Schlechtendahl, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 322 = brasiliensis.
 Schmidtii, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* i. 246.—Japon.
 Schultesii, *Hochst. ex Field. & Gardn. Sert. Pl.* t. 59, sphalm. = seq.
 Schultzei, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 444.—Abyss.
 Schultzei, *Wedd. Chlor. And.* i. 119.—Chili.
 Schumannianus, S. Schau. in *Linnaea*, xx. (1847) 698.—Mexic.
 Schweinitzianus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 413 = lobatus.
 sciadophilus, *Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér.* III. ii. (1844) 119.—N. Zel.
 sclerophyllus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 247.—Mexic.
 scoparius, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 389.—Afr. austr.
 Scopoli, *Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I.* ii. 380 = lanatus, *Scop.*
 scopulorum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. Pl.* iii. 58.—Chili.
 scorpioides, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498 = Doronicum scorpioides.
 scorzoneraefolius, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 282.—Peruv.
 scorzoneroides, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 146 = Lyallii.
 Scotti, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 841.—Ins. Socotra.
 Scrobicaria, DC. *Prod.* vi. 422 = Gynoxys ilicifolia.
 scrobicarioides, DC. l. c. 430.—Mexic.
 scytophyllus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 181.—Ecuador.
 sechellensis, *Baker, Fl. Mauriti.* 178.—Ins. Seychelles.
 sectilis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 190.—Reg. Argent.
 Seemannii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald*, 311 = Hartwegi.

SENECIO:—

Segethi, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 156.—Chili.
segmentatus, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 1483.—Afr. austr.
Selloi, *DC. Prod.* vi. 419.—Bras.
sementatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 331.—N. Granat.
seminudus, Bory, in *Ann. Gén. Sc. Phys.* i. (1819) 303. t. 12 = *Erechtites praealta*.
semperflorens, Stokes, *Bot. Mat. Med.* iv. 210 = *vulgaris*.
sempervivus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.—Arab.
sepium, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.
serenensis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 171.—Chili.
Serra, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 333.—Am. bor. occ.
Serra, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 68.—Natal.
serrulataefolius, *Weinm. in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 176 = *glastifolius*, *Linn. f.*
serruloides, *DC. Prod.* vi. 395.—Afr. austr.
serratus, *MacOwan & Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 392 = *incomptus*.
serratus, *Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 366 = *Leontodontis*.
serrulatus, *DC. Prod.* vi. 401.—Afr. austr.
serruloides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 89.—Afr. austr.
sessilifolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 247.—Mexic.
sessilifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = *Werneria nana*.
sessilis, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158 = *halimifolius*.
sessilis, *Vell. Fl. Flum.* viii. t. 106 = *adamantinus*.
setulosus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 330.—N. Granat.
sibiricus, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 206 = *S. Ligularia sibiricus*, *Linn. f. Suppl.* 370.—Sibir. altaic.
siculus, Jan, ex *DC. Prod.* vi. 351 = *erucifolius*.
Sieberianus, *DC. Prod.* vi. 373.—Austral.
Sieboldii, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = *Kaempferi*.
Siegfriedi, *x*, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 106.—Europ.
Simonsii, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 188.—Reg. Himal. simplicissimus, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 377.—Madag.
sinuatidens, *Peterm. in Flora*, xxvii. (1844) 474 = *aquaticus*.
sinuatilobus, *DC. Prod.* vi. 417.—Chili.
sinuatus, *Gilib. Hist. Pl. Europ.* ii. 245 = *vernalis*.
sinuatus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 180.—Mexic.
sisymbriifolius, *DC. Prod.* vi. 382.—Afr. austr.
sisymbriiformis, *DC. l. c.* 366 = *chrysanthemoides*.
Skinneri, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 247.—Guatemala.
skirrhodon, *DC. Prod.* vi. 401.—Afr. austr.
Smithii, *DC. l. c.* 412.—Reg. Magellan.
sneeuwbergensis, *Bolus, in Hook. Ic. Pl.* t. 1067.—Afr. austr.
socialis, *Wedd. Chlor. And.* i. 109.—Peruv.
solanoides, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 702 = *incertus*.
solanoides, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159.—Abyss.
Soldanella, A. Gray, in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 67.—Am. bor. occ.
solidagineus, *Spreng. Syst.* iii. 552 = *seq.*
solidaginoides, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 284 = *halimifolius*.
sonchifolius, *Moench, Meth. Suppl.* 231 = *Emilia sonchifolia*.
sonchoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 178.—Peruv.
sonchoides, *Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb.* lviii. (1881) 145 = *Vukotinovic*.
Sonneratii, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 565.—Afr. austr.
soongaricus, *Schrenk, Enum. Pl. Nov.* 62.—Soongar.
sophoides, *DC. Prod.* vi. 382.—Afr. austr.
Soratae, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.
sparsiflorus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 565, sphalm. = *seq.*
sparsifolius, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 378.—Madag.
spartioides, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 438 = *Douglasii*.
spathulaefolius, *DC. Prod.* vi. 362.—Europ.
spathulaefolius, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. vii. 154 = *campestris*.
spethulatus, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 125.—Austral.

VOL. II.

SENECIO:—

spatulifolius, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* i. ed. II. (1873) 56 = *fastigiatus*.
speciosus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1991.—Afr. austr.
spectabilis, *Wall. Cat. n.* 3127 = *chrysanthemoides*.
spicatus, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 304, nomen.—Hab.?
spinescens, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
spinosus, *DC. Prod.* vi. 420.—Peruv.
spiraeifolius, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 159.—Afr. austr.
squalidus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 306 = *vernalis*.
squalidus, *Linn. Sp. Pl.* 869.—Europ.
squalidus, *Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 366 = *coronopifolius*.
squalidus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1991 = *gallicus*.
squamosus, *DC. Prod.* vi. 376.—Ins. Borbon.
squamosus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158 = *pubigerus*.
squarrosus, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 107 = *Erechtites hispidula*.
Stauntonii, *DC. Prod.* vi. 363.—China.
Stetzii, *Bolle, in Bonplandia*, vii. (1859) 296.—Ins. Canar.
Stenactis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = *amplexicaulis*, *Wall.*
stenocephalus, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 408.—Reg. Caucas.
stenocephalus, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xvi. (1871) 218.—China; Japon.
stenophyllus, *Bert. ex DC. Prod.* vi. 448 = *Robinsonia gracilis*.
stenophyllus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 743.—Chili.
stenopteris, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 193.—Reg. Argent.
Stenbergianus, *DC. Prod.* vi. 425.—Peruv.
Steudelii, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 440.—Abyss.
steudeloides, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 157.—Afr. bor.
Stewartiae, *Armstr. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 339.—N. Zel.
stigophlebius, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 321.—Bras.
stipulatus, *Vell. Fl. Flum.* viii. t. 113 = *fluminensis*.
stipulatus, *Wall. Cat. n.* 3122 = *scandens*.
stipulatus, *Wall. Cat. n.* 3126 = *chrysanthemoides*.
stoechadiformis, *DC. Prod.* vi. 429 = *Douglasii*.
striatifolius, *DC. l. c.* 387.—Afr. austr.
striatus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 157 = *Osteospermum Bidens*.
strictus, *Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 529 = *gracilis*.
strictus, *DC. Prod.* vi. 343 = *Perrottetii*.
suaveolens, *Ell. Sketch*, ii. 328.—Am. bor.
suaveolens, *Gilib. Hist. Pl. Europ.* ii. 245 = *erucifolius*.
subalpinus, *Koch, in Flora*, xvii. (1834) 614.—Europ. austr.
subarachnoideus, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 127.—N. Granat.
subaraneosus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Java.
subcandidus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 141.—Peruv.
subcordatus, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 330 = *Faujasia flexuosa*.
subcorymbosus, *Rupr. ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 405 = *amphibolus*, C. Koch.
subdecurrens, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.
subdentatus, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 110 = *coronopifolius*.
subdentatus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 748.—Chili.
subensiformis, *DC. l. c.* 363 = *campestris*.
sublobatus, *DC. Prod.* vi. 310 = *S. Roldana*.
subnebrodensis, *Sink. in Termész. Füzetek*, v. (1881) 51.—Europ.
subnudus, *DC. Prod.* vi. 405 = *oxyriaefolius*.
subnudus, *DC. l. c.* 428 = *aureus*.
subpeltatus, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald*, 311.—Mexic.
subpeltatus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 565 = *oxyriaefolius*.
subradiatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.
subscandens, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 434.—Abyss.
subsessilis, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 415.—Afr. trop.

SENECIO:—

subsinnuatus, *DC. Prod.* vi. 401.—Afr. austr.
subulatus, [D.] *Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 330.—Chili; Patagon.
subumbellatus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1861) 64 = *thermarum*.
subverticillatus, *DC. Prod.* vi. 430 = *Andrieuxii*.
succulentus, *DC. l. c.* 402.—Afr. austr.
succulentus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 149 = *Inula crithmoides*.
succulentus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.
sudeticus, *DC. Prod.* vi. 359 = *crispatus*.
sulcatus, *DC. l. c.* 384 = *crispus*, *Thunb.*
sumatranus, *Martelli, in Nouv. Giorn. Bot. Ital.* xv. (1883) 301.—Sumatr.
surculosus, *MacOwan, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 480.—Afr. austr.
Swartzianus, *Buek, Ind. ad DC. Prod.* ii. p. vi.—Jamaic.
Swartzii, *DC. Prod.* vi. 411.—Jamaic.
Sweetii, *Heynh. Nom.* ii. 656 = *Cineraria pulchella*.
sylvanum, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen = *Bolivia*.
sylvaticus, *Gueldenst. Reisen*, ii. 56; ex *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 630 = *vernalis*.
sylvaticus, *Linn. Sp. Pl.* 868.—Europ.; As. bor.
sylvaticus, *Nestl. ex DC. Prod.* vi. 353 = *Fuchsii*.
sylvestris, *Grindel. Bot. Taschenb.* 254 = *sylvaticus*.
Synneilesis, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* i. 249.—Japon.
syrmensis, *Kit. ex Nym. Consp.* 357 = *vernalis*.
Tabacon, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 91.—Venez.; Ecuador.
tabidus, *Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 141 = *Erechtites prenanthoides*.
tabularis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 248.—Mexic.
tabularis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500 = *Alciopie tabularis*.
talinoideus, *Sch. Bip. l. c.* 499.—Afr. austr.
tamoides, *DC. Prod.* vi. 403.—Afr. austr.
tampicanus, *DC. l. c.* 427.—Mexic.
tampicanus, A. Gray, *Pl. Wright.* ii. 89 = *multilobatus*.
tanacetoides, *Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) 12 = *graciliflorus*.
tanacetoides, *Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 394.—Afr. austr.
tanguticus, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 486.—China.
taraxacifolius, *DC. Prod.* vi. 348.—Reg. Caucas.; Persia.
tasconensis, *Martr. in Soc. Sc. Tarn-et-Garonne* (1853); (*Pl. Crit. Tarn.*) 27 = *erucifolius*.
Tasna, *Welw. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 120 = *foliosus*.
tataricus, *Less. in Linnaea*, ix. (1834) 192 = *auratus*.
taxifolius, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 133 = *S. Ambavilla*.
taygeteus, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I.* vi. 95.—Graec.
Tchihatchewi, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 293 = *mollis*.
Teddiei, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 420.—Afr. trop.
telephifolius, *Jacq. Fragm. i.* t. 1. f. 3 = *maritimus*.
tenellus, *DC. Prod.* vi. 379.—Afr. austr.
Teneriffae, *Sch. Bip. ex Bolle, in Bonplandia*, yiii. (1860) 133 = *vulgaris*.
tenuicaulis, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.
tenuiculus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 565.—Chili.
tenuiflorus, *Sieber, ex DC. Prod.* vi. 296 = *Erechtites quadridentata*.
tenuifolius, *Burm. f. Fl. Ind.* 181.—Ind. or.; Java.
tenuifolius, *DC. Prod.* vi. 398 = *adonidifolius*.
tenuifolius, *Jacq. Fl. Austr.* iii. 42 = *erucifolius*.
tenuilobus, *DC. Prod.* vi. 398 = *umbellatus*.
tenuiscapus, *Boj. ex DC. l. c.* 378.—Madag.
tephrosioides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 92.—Ecuador.
teretifolius, *DC. Prod.* vi. 420.—Ecuador.
tetrandrus, *Buch-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3129.—Reg. Himal.
tetranthus, *DC. Prod.* vi. 370.—Reg. Himal.
thapsoides, *DC. l. c.* vii. 301.—Graec.
theaeifolius, *Benth. Pl. Hartw.* 210.—N. Granat.
thermarum, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 153.—Chili.

5 U

SENECIO:—

- thianschanicus, *Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 311.—As. centr.
 thinophilus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 500.—Chili.
 Thomasii, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 332.—Mexic.
 Thomsoni, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 205.—Reg. Himal.
 Thunbergianus, *Schrad. Blumenbachia*, 41. t. 4. f. 2.—Afr. austr.
 Thunbergii, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 379.—Afr. austr.
 Thurberi, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 68.—N. Mexic.
 thurifer, *Bert. ex DC. Prod.* vi. 448 = Robinsonia thurifera.
 thyrsoides, *DC. l. c.* 406.—Afr. austr.
 thyrsoides, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III.* 386 = Fischerianus.
 thyrsophorus, *C. Koch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 362 = racemosus.
 tibeticus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 340.—Tibet. occ.
 tillandsiaefolius, *Poepp. ex DC. Prod.* vi. 415 = argenteus.
 tmoleus, *Boiss. Diagn. Ser. I.* iv. 13 = Castagneanus.
 Tocomali, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) ii. 383.—Chili.
 tolimensis, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 98, 99.—N. Granat.
 toluceanus, *DC. Prod.* vi. 428.—Mexic.
 tomentosus, [Clairv.] *Man. Herb.* 240 = Adenostyles candidissima.
 tomentosus, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 200 = Edgeworthii.
 tomentosus, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 507 = S. Doronicum.
 tomentosus, *Host, Fl. Austr.* ii. 476 = paludosus.
 tomentosus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 119.—Am. bor.
 tomentosus, *Rohde, ex DC. Prod.* vi. 356 = leucophyllus.
 tomentosus, *Salisb. Prod.* 196 = cinerascens.
 tortuosus, *DC. Prod.* vi. 392.—Afr. austr.
 Tournefortii, *Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr.* 516.—Mont. Pyren.
 trackycarpus, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 702 = incertus.
 trachylaenus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 358.—Afr. austr.
 transilvanicus, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* x. (1859) 208 = sarracenicus.
 transylvanicus, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iii. 34 = S. Doronicum.
 trapezuntinus, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 393.—Armenia.
 Traversii, *F. Muell. in Trans. Bot. Soc. Edinb.* vii. (1861) 154 = bellidioides.
 tredicinquamosus, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 700 = angulatus.
 triangularis, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 332. t. 115.—Am. arct.
 Trianii, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 332.—N. Granat.
 trichocaulon, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 315.—Bras.
 trichocodon, *Baker, l. c.* 314.—Paraguay.
 tricuspidatus, *Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct.* 317 = Darwinii.
 tricuspidatus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 346.—Chili.
 tridentatus, *DC. Prod.* vi. 424.—Peruv.
 trifidus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 346.—Chili.
 triflorus, *Linn. Sp. Pl.* 867 = aegyptius.
 trifurcatus, *Less. Syn. Comp.* 392.—Reg. Magellan.
 triligulatus, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 178.—Reg. Himal.
 trilobus, *Linn. Sp. Pl.* 868 = lividus.
 trineurus, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1862) 514.—Cuba.
 triodon, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 749.—Chili.
 tripartitus, *DC. Prod.* vi. 418 = brasiliensis.
 tripartitus, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 114 = lautus.
 triplinervius, *DC. Prod.* vi. 395.—Afr. austr.
 triplipartitus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 566 = lautus.
 triquet, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 251.—Afr. austr.
 tristis, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 739.—Chili.
 trixoides, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 421.—Bras.

SENECIO:—

- Troncosi, *Phil. Fl. Atac.* 32.—Chili.
 tropaeolifolius, *MacOwan, ex F. Muell. in Journ. Bot.* v. (1867) 242.—Afr. austr.
 trullaefolius, *MacOwan, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 392.—Afr. austr.
 truncatus, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3137 = nudicaulis.
 truncatus, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 507 = S. Jacobaea.
 tschabanicus, *C. Koch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 370.—Oriens.
 tuberosus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 375 = incertus.
 tuberosus, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 434.—Abyss.
 Turczaninowii, *DC. Prod.* vi. 360.—Dahuria.
 Turczaninowii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xix. (1874) 488 (cum cit. falsa) = aconitifolius.
 Tussilaginins, *Less. Syn. Comp.* 392.—Ins. Canar.
 tussilaginoides, *Heynh. Nom.* ii. 656 = S. Tussilaginins.
 tussilaginoides, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.
 tussilaginoides, *Walt. Fl. Carol.* 208 = aureus.
 Tweediei, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 339.—Reg. Argent.
 tymphrestus, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II.* vi. 99 = viscosus.
 Ualtata, *Bert. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 566 = S. Hualtata.
 uliginosus, *DC. Prod.* vi. 348 = gallicus.
 uliginosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 501.—Chili.
 umbellatus, *Linn. Pl. Afr. Rar.* 21; *Amoen. Acad.* vi. 101.—Afr. austr.
 umbrosus, *Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung.* iii. 232. t. 210.—Hungar.
 uncinellus, *DC. Prod.* vi. 368 = densiflorus.
 undulatus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 157.—Afr. austr.
 uniflorus, *All. Fl. Pedem.* i. 200. t. 17.—Europ.
 uniflorus, *Retz. Obs.* iii. 42 = Gynura cernua.
 Unionis, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 440.—Abyss.
 uniserialis, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 126, nomen.—Malaya.
 uspallatensis, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 335.—Chili.
 ustulatus, *DC. Prod.* vi. 380 = littoreus.
 vaccinioides, *Wedd. Chlor. And.* i. 99.—N. Granat.
 vagans, *Wall. Cat. n.* 3108.—Reg. Himal.
 vaginaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxxviii. (1855) 117.—Reg. Magellan.
 vaginatus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 331 = littoralis.
 vagus, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 46.—Austral.
 valerianaefolius, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 127.—Bras.
 valerianifolius, *Wolf, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1825); *ex Reichb. Ic. Bot. Exot.* i. 59 = Erechtites valerianaefolia.
 vallestis, *DC. Prod.* vi. 421.—Peruv.
 valparadisicus, *Colla, in Mem. Acc. Torin.* xxxviii. (1835) 32 = glabratus.
 valparadisensis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 157.—Chili.
 variabilis, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 700 = erubescens, *Ait.*
 varicosus, *Linn. f. Dec.* i. 9. t. 5.—Aegypt.
 variegatus, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 536, nomen.—Bolivia.
 variifolius, *DC. Prod.* vi. 393 = lyratus.
 velleioides, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vi. 374.—Austral.
 venosus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 379.—Afr. austr.
 venustus, *Ait. Hort. Kew. ed. I.* iii. 192 = grandiflorus.
 verbascifolius, *Burm. Fl. Cap. Prod.* 26.—Afr. austr.
 verbascifolius, *Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrolab. et Zél.* 47 = Smithii.
 verbenaefolius, *Jacq. Hort. Vindob.* i. 2. t. 3 = aegyptius.
 vernalis, *Hoppe, ex DC. Prod.* vi. 351 = nebrodensis.
 vernalis, *Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung.* i. 23. t. 24.—Europ. austr.; Oriens.
 vernicosus, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 94.—Venezuel.; N. Granat.
 vermonioides, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 312.—Bras.
 vernonioides, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 701 = erubescens, *Ait.*

SENECIO:—

- vernus, *Bivona, Sicul. Pl. Cent.* i. 73. t. 5 = leucanthemifolius, *Poir.*
 vernus, *DC. Prod.* vi. 430 = salignus.
 vernus, *Urv. in Mém. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 366 = vernalis.
 verrucosus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 332.—N. Granat.
 verrucosus, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 77 = Gynoxys verrucosa.
 verticillatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 331.—Peruv.
 vestitus, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 282.—Afr. austr.
 vestitus, *Sweet, ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 566 = Haworthii, *Steud.*
 villosus, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* ii. 715 = palustris?
 vimineus, *DC. Prod.* vi. 400.—Afr. austr.
 vimineus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 401.—Afr. austr.
 violaceus, *Wall. Cat. n.* 3134 = nudicaulis.
 virgatus, *Linn. Pl. Afr. Rar.* 20; *Amoen. Acad.* vi. 101.—Afr. austr.
 Virgaurea, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 484.—China.
 viridulus, *Martr. Pl. Crit. Tam.* 27 = erucifolius.
 viscidulus, *Scheele, in Linnaea*, xviii. (1844) 480 = sylvaticus.
 viscosissimus, *Colla, in Mem. Acc. Torin.* xxxviii. (1835) 33 = glaber.
 viscosus, *Linn. Sp. Pl.* 868.—Europ.; As. Min.
 viscosus, *Webb, Iter Hisp.* 40 = Durieui.
 Visianus, *Papaf. ex Vis. Fl. Dalm.* ii. 72. t. 8.—Dalmat.
 vitellinus, *Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 286 = Gynura vitellina.
 vittarifolius, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 377.—Madag.
 Volckameri, *Sch. Bip. in Doell. Rhein. Fl.* 470 = arenarius.
 Volckmanni, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 152.—Chili.
 volubilis, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 226.—Peruv.
 Vukotinovici, *Schloss. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxi. (1881) 5.—Europ. austr.
 vulcanicus, *Boiss. Diagn. Ser. I.* xi. 31.—Persia.
 vulcanicus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 746.—Chili.
 vulgaris, *Linn. Sp. Pl.* 867.—Europ. (Cosmop. inquil.).
 Vulneraria, *DC. Prod.* vi. 428.—Mexic.
 Walkeri, *Arn. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. i. (1836) 349 = araneosus.
 Walkeri, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 167 = Notonia Walkeri.
 Wallichii, *DC. Prod.* vi. 364.—Reg. Himal.
 Walteri, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Am. bor.
 Warszewiczii, *A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. App.* (1851) 13.—Cf. *Linnaea*, xxv. (1852) 298.—Guatemala.
 Wartmanni x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 106.—Europ.
 Websteri, *Hook. f. Fl. Antarct.* 317.—Reg. Magellan.
 werneriaefolius, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 54.—Am. bor. occ.
 wernerioides, *Wedd. Chlor. And.* i. 128.—Peruv.
 Weylii x, *Vatke, in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xiv. (1872) 48.—Hab.?
 Whippleanus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 54.—Calif.
 Wightianus, *DC. Prod.* vi. 370 = scandens.
 Wightii, *Benth. ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 197 = saxatilis.
 xerophilus, *Phil. Fl. Atac.* 32.—Chili.
 Yakla, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 204 = amplexicaulis, *Wall.*
 Zahlbruckneri, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxviii-xxiv. (1880) 106 (Quid?).—Europ.
 Zeyheri, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 89.—Afr. austr.
 zeylanicus, *DC. Prod.* vi. 365.—Zeylan.
 zimapanicus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 248.—Mexic.
 Zollingerianus, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 160 = Gynura mollis.
 zosteriaefolius, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 342.—Chili.
 Zuccarinii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xix. (1874) 486.—Japon.

SENECIUNCULUS, Opiz, Seznam, 90 (1852) = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
viscosus, Opiz, l. c. = *Senecio viscosus*.

SENEFELDERA, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 29. **EUPHORBACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 332.
angustifolia, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 184 = *multiflora*.
dodecandra, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 529.—Bras.
grandifolia, Baill. Etud. Gén. Euph. 536. t. 9 = *multiflora*.
inclinata, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 530.—Bras.
latifolia, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 184 = *multiflora*.
multiflora, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 29.—Bras.

SENEGA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 128 (1839) = **Polygala**, Linn.
officinalis, Spach, l. c. 129 = *P. Senega*.

SENEGALIA, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838) = **Acacia**, Willd. (Legumin.).
retusa, Rafin. l. c. = *A. Senegal*.
tricantha, Rafin. l. c. = *A. glaucophylla*.

SENEICO, Hill, Hort. Kew. 25 (1768), sphalm. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

SENFTEMBERGIA, Klotzsch & Karst. ex Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 460 = **Langsdorffia**, Mart. (Balanoph.).
Moritziana, Klotzsch & Karst. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. iv. II. 10 = *L. hypogaea*.

SENITES, Adans. Fam. ii. 39. (1763) = **Zeugites**, Schreb. (Gramin.).

SENKEBERGIA, Neck. Elem. i. 366 (1790) = **Justicia**, Houst. (Acanth.).
debilis, Rafin. Sylva Tellur. 70 = *J. debilis*.

SENKENBERGIA, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 711. **NYCTAGINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 5.
LINDENIA, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 357.
TINANTIA, Mart. & Gal. l. c. xi. I. (1844) 240.
annulata, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 711.—Mexic.
Coulteri, Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. iii. 6.—Mexic.
erecta, Benth. & Hook. f. l. c.—Am. bor. occ.
gypsophiloides, Benth. & Hook. f. l. c. = *annulata*.
stricta, Benth. & Hook. f. l. c. 1217, sphalm. = *erecta*.

SENNA, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VIII. (1768) = **Cassia**, Tourn. (Legumin.).
Absus, Roxb. Fl. Ind. ii. 340 = *C. Absus*.
acutifolia, Link. Handb. ii. 140; Batka, in Proc. Linn. Soc. ii. (1854) 282 = *C. acutifolia*.
alata, Roxb. Fl. Ind. ii. 349 = *C. alata*.
alexandrina, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *C. Sophora*.
angustifolia, Batka, in Proc. Linn. Soc. ii. (1854) 283 = *C. angustifolia*.
arborescens, Roxb. Fl. Ind. ii. 345 = *C. glauca*.
aurata, Roxb. l. c. 342 = *C. laevigata*.
auriculata, Roxb. l. c. 349 = *C. auriculata*.
bicapsularis, Roxb. l. c. 342 = *C. bicapsularis*.
dimidiata, Roxb. l. c. 352 = *C. Kleinii*.
esculenta, Roxb. l. c. 346 = *C. Sophora*.
exigua, Roxb. l. c. 339 = *C. Absus*.
glauca, Roxb. l. c. 351 = *C. montana*.
Hookeriana, Batke, in Bot. Zeit. xxi. (1863) 264 = *C. adenensis*.
italica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *C. obovata*, acutifolia.
lanceolata, Link. Handb. ii. 140 = *C. Sophora*.
marylandica, Link. l. c. = *C. marylandica*?
obovata, Link. l. c.; Batka, in Proc. Linn. Soc. ii. (1854) 281 = *C. obovata*.
obtusata, Roxb. Fl. Ind. ii. 344 = *C. obovata*.
obtusata, Link. Handb. ii. 140 = *C. obovata*.
occidentalis, Link. l. c.; Roxb. Fl. Ind. ii. 343 = *C. occidentalis*.
officinalis, Gaertn. Fruct. ii. 312 = *C. Sophora*.

SENNA :—
officinalis, Roxb. Fl. Ind. ii. 346 = *Cassia angustifolia*.
orientalis, Walp. Rep. i. 816 = *C. occidentalis*.
ovalifolia, Batka, Monog. Senn. 35, 50. t. 4 = *C. holosericea*.
prostrata, Roxb. Fl. Ind. ii. 352 = *C. pumila*.
pubescens, Mart. Vers. Monog. Sennesbl. (1857) 61 = *tomentosa*.
purpurea, Roxb. Fl. Ind. ii. 342 = *C. Sophora*.
riparia, Rafin. Med. Fl. i. 94 = *C. marylandica*.
sensitiva, Roxb. Fl. Ind. ii. 353 = *C. mimosoides*.
Sophora, Roxb. l. c. 347 = *C. Sophora*.
speciosa, Roxb. l. c. = *C. glauca*.
sumatrana, Roxb. l. c. = *C. siamea*.
tenella, Roxb. l. c. 354 = *C. mimosoides*.
tomentosa, Batka, in Proc. Linn. Soc. ii. (1854) 283; et Bot. Zeit. xii. (1854) 115 = *C. holosericea*.
Tora, Roxb. Fl. Ind. ii. 340 = *C. Tora*.
toroides, Roxb. l. c. 341 = *C. Tora*.

SENNEBIERA, Willd. Enum. Hort. Berol. 668 = **Senecbiera**, DC. (Crucif.).

SENEFELDERA, Endl. Gen. Suppl. ii. 88 (1842) = **SENEFELDERA**, Mart. (Euphorb.).

SENRA, Cav. Diss. ii. 83, 104. t. 35. f. 3 (1786). **MALVACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 207.
DUMREICHERA, Hochst. in Flora, xxi. (1838) i. Intell. 26.
SERRAEA, Spreng. Syst. iii. 78 (1826).
arabica, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 48 = *incana*.
incana, Cav. Diss. ii. 83.—As. et Afr. trop.
nubica, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 49 = *incana*.

SENRAEA, Willd. Sp. Pl. iii. 695 (1800) = **Senra**, Cav. (Malvac.).

SENSITIVA, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838) = **Mimosa**, Linn. (Legumin.).
pudica, Rafin. l. c. = *M. pudica*.

SENTIS, F. Muell. Fragm. iv. 47 (1863) = **Pholidia**, R. Br. (Myopor.).
rhynchocarpha, F. Muell. l. c. 48 = *P. divaricata*.

SEPTACANTHUS, Wight, Ic. t. 1527 (1850), sphalm. = **LEPTACANTHUS**, Nees = **Strobilanthes**, Blume (Acanth.).

SEPTAS, Linn. Pl. Afr. Rar. 10 (1760); Amoen. Acad. vi. 87 (1764) = **Crassula**, Dill.
capensis, Linn. II. cc. = *C. Septas*.
globifera, Eckl. & Zeyh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 357 = *C. Saxifraga*.
globifera, Sims, Bot. Mag. t. 1472 = *C. Septas*.
trichotoma, Lam. Illustr. ii. 409.—Afr. austr.
Umbella, Haw. Syn. Pl. Succ. 62 = *C. Umbella*.

SEPTAS, Lour. Fl. Cochinch. 392 (1790) = **Herpestis**, Gaertn. f. (Scrophul.).
repens, Lour. l. c. = *H. Monnieria*.

SEPTILIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 68 (1836) = **Herpestis**, Gaertn. f. (Scrophul.).
repens, Rafin. l. c. = *H. Monnieria*.

SEPTINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = **Cinnamomum**?, Tourn. (Laurin.).

SEPTIS, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 272 (1884), err. typ. = **SEPTAS**, Lour. = **Herpestis**, Gaertn. f. (Scrophul.).

SEQUOIA, Endl. Syn. Conif. 197 (1847). **CONIFERAE**, Benth. & Hook. f. iii. 429.
CONDYLOCARPUS, Salisb. ex Lamb. Gen. Pin. ed. 8vo. 120, sub t. 64 (1832).
GIGANTABIES, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 77 (1866).
WASHINGTONIA, Winsl. in Calif. Farm. (Sept. 1854); ex Hook. Kew Journ. vii. (1855) 29.
WELLINGTONIA, Lindl. in Gard. Chron. (1853) 823.
gigantea, Endl. Syn. Conif. 198 = *sempervirens*.
gigantea, Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 222; Deene in Bull. Soc. Bot. Fr. i. (1854) 70, 71; Torr. ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xviii. (1854) 287.—Calif.

SEQUOIA :—
pyramidata, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 211 = *sempervirens*.
Rafinesquei, Carr. l. c. 213 = *Picea sitchensis*?
religiosa, Presl, Epim. Bot. 237 = *sempervirens*.
sempervirens, Endl. Syn. Conif. 198.—Calif.
taxifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 194 = *sempervirens*.
Wellingtonia, Seem. in Bonplandia, iii. (1855) 27; vi. (1858) 343 = *gigantea*.

SERANGIUM, W. Wood, ex Salisb. Gen. Pl. Fragm. 5 (1866) = **Monstera**, Adans. (Aroid.).

SERAPHYTA, Fisch. & Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. viii. (1840) 24. **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 523.
multiflora, Fisch. & Mey. l. c. 25.—Mexic.

SERAPIAS, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 271 (1737). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 620.
HELLEBORINE, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 274 (1742), partim; Pers. Syn. ii. 512 (1807).
ISIAS, De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. vi. (1844) 413.
abortiva, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 205 = *Limodorum abortivum*.
aculeata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = *Eulophia aculeata*.
alba, Salisb. Prod. 8 = *Cephalanthera pallens*.
anthropophora, Jundz. Fl. Lithuan. 267 = *Aceras anthropophora*.
aphylla, Vell. Fl. Flum. ix. t. 57 (Spirantheos sp.).—Bras.
athensis, Hocquart, Fl. Jemmape, 236 = *Epipactis microphylla*.
athensis, Lej. Fl. Spa. ii. 196 = *Orchis Morio*.
atrorubens, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. II. 182 = *Epipactis atrorubens*.
autumnalis, Poir. ex Steud. Nom. ed. I. 766 = *Pterostylis cucullata*.
biflora, Vell. Fl. Flum. ix. t. 50 (Spirantheos sp.).—Bras.
brevibracteata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *S. Lingua*.
camschatea, Steud. Nom. ed. I. 766 = *Neottia camschatica*.
capensis, Linn. Mant. ii. 293 = *Eulophia barbata*.
Caravata, Aubl. Pl. Gui. ii. 816 = *Elleanthus Caravata*.
coccinea, Vell. Fl. Flum. ix. t. 48 = *Spiranthes colorata*, N. E. Br.
congesta, Vell. l. c. t. 54 (Spirantheos sp.).—Bras.
convallarioides, Steud. Nom. ed. I. 766 = *Listera cordata*.
cordata, Steud. l. c. = *Listera cordata*.
cordigera, Bertol. Fl. Ital. ix. 603, partim = *neglecta*.
cordigera, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 370 = *longipetala*.
cordigera, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 367 = *S. Pseudo-cordigera*.
cordigera, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1345 —Europ. austr.; Afr. bor.
cucullata, Pers. Syn. ii. 513 = *Eriochylus autumnalis*.
Damasonium, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Cephalanthera pallens*.
ensifolia, Murr. Syst. ed. XIV. 815 = *Cephalanthera ensifolia*.
epidendraea, Retz. Obs. vi. 65 = *Eulophia virens*.
Epigogium, Steud. Nom. ed. I. 766, sphalm. = *Epipogon aphyllum*.
erecta, Thunb. Fl. Jap. 27 = *Cephalanthera pallens*.
falcata, Thunb. l. c. 28 = *Cephalanthera falcata*.
fasciculata, Vell. Fl. Flum. ix. t. 53 (Spirantheos sp.).—Bras.
flava, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 119 = *Corymbis flava*.
Fontanae x, Rigo & Goiran, in Nouv. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883) 32 = *purpurea*.
Gavila, Pav. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 567 = *Chloraea Pavonii*.
glabra, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 552 = *S. Lingua*.
grandiflora, Linn. Syst. ed. XII. 594 = *Cephalanthera pallens*.
grandiflora, Oed. Fl. Dan. t. 506 = *Cephalanthera ensifolia*.
Helleborine, Linn. Sp. Pl. 949 = *Cephalanthera ensifolia*, *Epipactis latifolia*.
hirsuta, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 551 = *S. Pseudo-cordigera*.
intermedia x, Forest. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 265.—Europ.
lancifera, St. Amans, Fl. Agen. 378 = *S. Pseudo-cordigera*.

SERAPIAS:—

- lancifolia*, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. II. 409 = *Cephalanthera pallens*.
lancifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 567, sphalm. = *lancifera*.
latifolia, Huds. Fl. Angl. ed. I. 341 = *Epipactis latifolia*.
latifolia, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 811 = *Epipactis atrorubens*.
laxiflora, Chaub. in Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 62 = *S. Pseudo-cordigera*.
laxiflora, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xiii-xiv. 13 = *occultata*.
Lingua, Bertol. Amoen. Ital. 202 = *S. Pseudo-cordigera*.
Lingua, Linn. Sp. Pl. 950.—Europ. austr.
Lingua, Merl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 567 = *cordigera*.
Lingua, Savi, Fl. Pisan. ii. 304 = *neglecta*.
Loeselii, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. II. 181 = *Liparis Loeselii*.
Lonchophyllum, Linn. f. Suppl. 405 = *Cephalanthera pallens*.
longiflora, Asso, Syn. Stirp. Arag. 131 = *Epipactis palustris*.
longifolia, Huds. Fl. Angl. ed. I. 341 = *Epipactis palustris*.
longifolia, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 202 = *Cephalanthera ensifolia*.
longipetala, Pollini, Fl. Veron. iii. 30 = *S. Pseudo-cordigera*.
lutea, Comm. ex Pers. Syn. ii. 513 = *Chloraea Gaudichaudii*.
melaleuca, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = *Disa melaleuca*.
memoralis, Salisb. Prod. 8 = *Epipactis latifolia*.
microphylla, Ehrh. Beitr. iv. 42 = *Epipactis microphylla*.
neglecta, De Not. Prosp. Fl. Ligust. 55.—Ital.; Corsic.
neglecta x, Forest. ex Nym. Consp. 690.—Europ.
Neotria, Rausch. Nom. ed. III. 261, sphalm. = seq.
Neottia, J. F. Gmel. Syst. 59 = *Spiranthes orchidioides*.
Nidus-avis, Steud. Nom. ed. I. 766 = *Neottia Nidus-avis*.
nigra, Gueldenst. Reisen, ii. 56; ex Ledeb. Fl. Ross. 88 iv. (Quid?).—Ross. austr.
nitida, Vell. Fl. Flum. ix. t. 52. (*Spirantheos* sp.).—Bras.
nivea, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 52 = *Cephalanthera ensifolia*.
occultata, f. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 119.—Europ. austr.
ochroleuca, Steud. Nom. ed. I. 766 = *Cephalanthera pallens*.
ovalis, Rich. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 54 = *cordigera*.
ovata, Steud. Nom. ed. I. 766 = *Listera ovata*.
oxyglottis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 130 = *S. Pseudo-cordigera*.
oxyglottis, Willd. Sp. Pl. iv. 71 = *S. Lingua*.
pallens, Jundz. Fl. Lithuan. 268 = *Cephalanthera pallens*.
pallida, Wahlenb. Fl. Carpat. 291 = *Cephalanthera pallens*.
palustris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3; Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 204 = *Epipactis palustris*.
parviflora, Parl. in Giorn. Sc. Lett. Sicil. lix. (1837) 66 = *occultata*.
patens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = *Disa tenuifolia*.
pedicellata, Thunb. l. c. = *Eulophia aculeata*.
polyaden, Vell. Fl. Flum. ix. t. 56. (*Spirantheos* sp.).—Bras.
polystachya, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 119 (= *Chloidia vernalis*).—Jamaic.
porrifolia, Steud. Nom. ed. I. 767 = *Microtis porrifolia*.
Pseudo-cordigera, Moric. Fl. Venet. 374.—Europ. austr.
pubescens, Steud. Nom. ed. I. 767 = *Ponthieva glandulosa*.
pumila, Vell. Fl. Flum. ix. t. 55 (*Spirantheos* sp.).—Bras.
purpurea x, Doumenj. Suppl. Herb. (1851) 54.—Gallia.
purpurea, Poir. Illustr. iii. 306 = *Bletia verecunda*.
reflexa, Pers. Syn. ii. 513 = *Chiloglottis diphylla*.
regularis, Forst. f. Prod. 59 = *Thelymitra longifolia*.
repens, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 53 = *Goodyera repens*.
Roselliniana x, Goiran, in Nouv. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883) 83 = *Tommasinii*.
rubra, Linn. Syst. ed. XII. 594 = *Cephalanthera rubra*.
Salassia, Steud. Nom. ed. I. 767 = *Liparis purpurascens*.
speciosa, J. F. Gmel. Syst. 59 = *Spiranthes colorata*.

SERAPIAS:—

- spiralis*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 201 = *Spiranthes autumnalis*.
stricta, Welw. ex Woods, in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 116 = *occultata*.
sylvestris, Murr. ex Steud. Nom. ed. I. 766, 767 = *Epipactis viridiflora*.
tabularis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = *Cymbidium tabulare*.
Todari, Tineo, Pl. Rar. Sicil. 12.—Sicil.
tomentosa, Vell. Fl. Flum. ix. t. 51 (*Spirantheos* sp.).—Bras.
Tommasinii x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xv. (1865) 231.—Ital.; Istria.
tota-alba, Gilib. Exercit. ii. 493 = *Cephalanthera ensifolia*.
triloba x, Dupuy, ex Noul. Fl. Pyr. Suppl. 33.—Gallia.
triloba x, Lloyd, Fl. Loire-Inf. ed. I. 255.—Gallia.
triloba, Viv. Fl. Ital. Fragg. 11, t. 12. f. 1.—Istria; Ital.
ventricosa, Vell. Fl. Flum. ix. t. 47 (*Spirantheos* sp.).—Bras.
viridiflora, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. II. 182 = *Epipactis viridiflora*.
viridis, Vell. Fl. Flum. ix. t. 49 (*Spirantheos* sp.).—Bras.
Xiphophyllum, Linn. f. Suppl. 404 = *Cephalanthera ensifolia*.

SERENA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 20 (1836) = **Haemanthus**, Tourn. (Amaryll.).
carnea, Rafin. l. c. = *H. carneus*.
lancifolia, Rafin. l. c. = *H. lanceaefolius*.

SERENAEAE, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 926 (1883), sphalm. = seq.

SERENOA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1228, 926 (1883). **PALMAE**, Benth. & Hook. f. ll. cc. serrulata, Hook. f. ll. cc.—Am. bor.

SEREREA, Rafin. Sylva Tellur. 107 (1838) = **Bignonia**, Tourn.
heterophylla, Rafin. l. c. = *B. Kerere*.

SERGILUS, Gaertn. Fruct. ii. 409. t. 174 (1791) = **Baccharis**, Linn. (Compos.).
scoparius, Gaertn. l. c. = *B. scoparia*.

SERIANA, Linn. Syst. ed. I (1735); Willd. Sp. Pl. ii. 464 (1799), sphalm. = seq.

SERIANIA, Plum. [Gen. t. 35] ex Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. II. (1794) 125 = **Serjania**, Plum. (Sapind.).

SERIANTHES, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 84, in nota = **Albizzia**, Durazz. (Legumin.).

SERIANTHES, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 225. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 599. calycina, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 600.—N. Caled.
grandiflora, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 225, partim.—Malacc.; Ins. Philip.
myriadenia, Planch. ex Benth. l. c. v. (1846) 108.—Ins. Pacif.
tenuiflora, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 599.—Hab.?
vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 485.—Ins. Fiji.

SERICANDRA, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838) = **Albizzia**, Durazz. (Legumin.).
fulibrissin, Rafin. l. c. = *A. Julibrissin*.
lophantha, Rafin. l. c. = *A. lophantha*.
pennata, Rafin. l. c. = *Acacia pennata*.

SERICOBONIA, Linden & André, Illustr. Hortic. xxii (1875) 39. t. 198 = **Jacobinia**?, Moric. (Acanth.).
igneae x, Linden & André, l. c.

SERICOCARPUS, Nees, Gen. et Sp. Aster. 148 (1833). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 270. **OLIGACTIS**, Rafin. Fl. Tellur. ii. 44 (1836).
californicus, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 90.—Calif.
Collinsii, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 302 = *tortifolius*.

SERICOCARPUS:—

- conyzoides*, Nees, Gen. et Sp. Aster. 150.—Am. bor.
oregonensis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 302 = *rigidus*.
rigidus, Lindl. in DC. Prod. v. 261.—Am. bor. occ.
solidagineus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 149.—Am. bor.
tortifolius, Nees, l. c. 151.—Am. bor.
Woodhousii, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 457 = *Bigelowia Wrightii*.

SERICOCOMA, Fenzl, in Endl. Gen. Suppl. iii. 33 (1842). **AMARANTACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 30.

angustifolia, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30.—Afr. austr.
avolans, Fenzl, in Linnaea, xvii. (1843) 328.—Afr. austr.

Bainesii, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 31.—Afr. trop.

capensis, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 307.—Afr. austr.
capitata, Moq. l. c. 308 = *Calicorema capitata*.
chrysurus, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 547 (err. typ. 447).—Afr. austr.

denudata, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30.—Afr. trop.

pallida, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 70.—Afr. trop.

pungens, Fenzl, in Linnaea, xvii. (1843) 326.—Afr. austr.

remotiflora, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30.—Afr. austr.

somalensis, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 70 = *Chionoethrix somalensis*.

trichinioides, Fenzl, in Linnaea, xvii. (1843) 324.—Afr. austr.

Welwitschii, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30.—Afr. trop.

SERICODES, A. Gray, Pl. Wright. i. 28. (in Smithson. Contrib. iii.) (1852). **ZYGOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 265.
Greggii, A. Gray, Pl. Wright. i. 28.—Mexic.

SERICOGRAPHIS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 107 ((1847) = **Jacobinia**, Moric. (Acanth.).

acuminata, Nees, l. c. 109.—Bras.
Aschenborniana, Nees, in DC. Prod. xi. 362 = *J. Aschenborniana*.

aurantiaca, Linden, Cat. n. 17 (1862) 6.—Mexic.

californica, A. Gray, in Bot. Mex. Bound. 125 = *J. californica*.

caripensis, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 637 = *Dianthera secunda*.

Clausseniana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 111.—Bras.

colorata, Nees, in Benth. Pl. Hartw. 148.—Peruv.

cordata, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 108.—Bras.

Ghiesbreghtiana, Nees, in DC. Prod. xi. 730 = *J. Ghiesbreghtiana*.

haplostachya, Nees, l. c. 362 = *Aschenborniana*.

heterophylla, Nees, l. c. 365 = *J. heterophylla*.

hirsuta, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 112.—Bras.

incana, Nees, in DC. Prod. xi. 361 = *J. incana*.

macrophylla, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 149 = *J. macrophylla*.

Mohintli, Nees, in DC. Prod. xi. 361 = *J. Mohintli*.

mollis, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 149.—Mexic.

monticola, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 111 = *J. monticola*.

neglecta, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 151.—Mexic.

palustris, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 110.—Bras.

parabolica, Nees, l. c. 111.—Bras.

pauciflora, Nees, l. c. 110.—Bras.

polita, Nees, l. c. 109 = *J. polita*.

rigida, Nees, l. c. 108 = *Dianthera rigida*.

scandens, Nees, l. c. 109.—Bras.

Sellowiana, Nees, l. c. 111 = *J. Sellowiana*.

squarrosa, Nees, in DC. Prod. xi. 364 = *Dianthera nodosa*.

tinctoria, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 150. t. 3. f. 15, 16 = *J. tinctoria*.

verrucosa, Oerst. l. c. 150.—Mexic.

vestita, Nees, in DC. Prod. xi. 364.—Peruv.

SERICOLA, Rafin. Sylva Tellur. 93 (1838) = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melastom.).
brachiata, Rafin. l. c. 94 = *M. holosericea*.

SERICOMA, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 73, sphalm. = *Sericocoma*, Fenzl (Amarant.).

SERICOSPORA, Nees, in DC. Prod. xi. 444 (1847). Genus dubium *ACANTHACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1071. *crinita*, Nees, l. c.—Ind. occ.

SERICOSTOMA, Stocks, in Wight, Ic. iv. ii. 14. t. 1377 (1848). *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 861. *albidum*, Franch. in Revoil, Comal. 46.—Afr. trop. Kotschy, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 861.—Persia. *parviflorum*, Walp. Ann. iii. 135, sphalm.=seq. *pauciflorum*, Stocks, in Wight, Ic. iv. ii. 15. t. 1377.—Sind.

SERICOTHECA, Rafin. Sylva Tellur. 152 (1838) = *Spiraea*, Linn. (Rosac.). *argentea*, Rafin. l. c.=*Sp. argentea*.

SERICROSTIS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825) = *Muehlenbergia*, Schreb. (Gramin.).

SERICURA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 2 = *Pennisetum*, Rich. (Gramin.). *elegans*, Hassk. l. c.=*P. macrostachyum* *japonica*, Steud. in Flora, xxix. (1846) 20 = *Phragmites communis*.

SERIDIA, Juss. Gen. 173 (1789) = *Centaurea*, Linn. (Compos.). *Adami*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = *C. solstitialis*. *aspera*, Sweet, l. c. = *C. aspera*. *auriculata*, Sweet, l. c. = *C. Seridis*. *cruenta*, Sweet, l. c. = *C. cruenta*? *ferox*, Sweet, l. c. = *C. ferox*. *glomerata*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 499 = *C. glomerata*. *Isnardi*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = *C. aspera*? *latifolia*, Sweet, l. c. = *C. Seridis*. *longifolia*, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 141, sphalm. = *C. sonchifolia*. *megacephala*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 499 = *C. Seridis*. *melitensis*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = *C. melitensis*. *microcephala*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 499 = *aspera*. *napifolia*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = *C. napifolia*. *polyacantha*, Sweet, l. c. = *C. polyacantha*. *praetermissa*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 97 = *C. aspera*. *prolifera*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = *C. glomerata*. *pullata*, Sweet, l. c. = *C. pullata*. *romana*, Sweet, l. c. = *C. romana*. *sicula*, Sweet, l. c. = *C. sicula*? *solstitialis*, Sweet, l. c. = *C. solstitialis*. *sonchifolia*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218; Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 499 = *C. sonchifolia*. *sphaerocephala*, Webb, Iter Hisp. 33 = *C. sphaerocephala*. *straminea*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = *C. glomerata*. *sulphurea*, Sweet, l. c. = *C. sulphurea*?

SERIGROSTIS, Steud. Nom. ed. II. ii. 568 (1841), sphalm. = **SERICROSTIS**, Rafin. = *Muehlenbergia*, Schreb. (Gramin.).

SERINGEA, F. Muell. Fragm. x. 96 (1877) = seq.

SERINGIA, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 442. tt. 16, 17. *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 226. **ACTINOSTIGMA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1859) i. 259. **GAYA**, Spreng. Syst. i. 535, 971 (1825). *adenolasia*, F. Muell. Fragm. x. 96.—Austral. *corollata*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 350 = *Keraudrenia Hookeriana*. *grandiflora*, F. Muell. Fragm. i. 142 = *Keraudrenia integrifolia*. *Hillii*, F. Muell. Census, 16 = *Keraudrenia Hillii*. *Hookeri*, F. Muell. Fragm. ii. 5 = *Keraudrenia Hookeriana*. *integrifolia*, F. Muell. l. c. = *Keraudrenia integrifolia*. *lanceolata*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 349 = *Keraudrenia lanceolata*.

SERINGIA :—

microphylla, F. Muell. Fragm. ii. 5 = *Keraudrenia hermanniaefolia*. *nephrosperma*, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 15 = *Keraudrenia nephrosperma*. *platyphylla*, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 443.—Austral. *velutina*, F. Muell. Fragm. ii. 5 = *Keraudrenia integrifolia*.

SERINGIA, Spreng. Anleit. ii. 694 (1818); Syst. i. 441 (1825) = *Ptelidium*, Thou. (Celastr.). *lanceolata*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 45 = *Harpullia cupanioides*. *ovata*, Spreng. Syst. i. 441 = *P. ovatum*.

SERINIA, Rafin. Fl. Ludov. 149 (1817) = *Krigia*, Schreb. (Compos.). *cespitosa*, Rafin. l. c. = *K. virginica*.

SERIOLA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 (1763) = *Hypochoeris*, Linn. (Compos.). *aethnensis*, Linn. l. c. = *H. aethnensis*. *albicans*, Tineo, Pl. Rar. Sicil. i. (1817) 20 = *H. Achyrophorus*. *Alliatae*, Bivona, Sic. Pl. Cent. ii. 57 = *H. Achyrophorus*. *andina*, Poepp. ex DC. Prod. vii. 92 = *H. andina*. *apargioides*, Less. Syn. Comp. 131 (= *Achyrophorus Lessingii*).—Chili. *brasiliensis*, Less. Syn. Comp. 131 = *H. brasiliensis*. *commutata*, Less. l. c. = *Rodigia commutata*. *cretensis*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 = *H. cretensis*. *depressa*, Viv. Fl. Cors. Prod. App. ii. 4 = *H. aethnensis*. *glauca*, Tineo, Pl. Rar. Sicil. i. (1817) 19 = *H. Achyrophorus*. *hieracioides*, Raeusch. Nom. ed. III. 228, nomen.—Afr. bor. *hispida*, Moench, Meth. 543 = *H. aethnensis*. *hyoseroides*, Nym. Syll. 55 = *Leontodon creticus*. *incana*, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 42.—Am. austr. *laevigata*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 = *H. Achyrophorus*. *petiolaris*, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 31 = *H. petiolaris*. *pubescens*, Link. Handb. i. 794, sphalm. = seq. *rubescens*, Tineo, Pl. Rar. Sicil. i. (1817) 21 = *H. Achyrophorus*. *scabra*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 568, nomen.—Hab. ? *taraxacifolia*, Salzm. in Flora, iv. (1821) 111 = *H. radicata*. *taraxacoides*, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 30 = *H. Scorzonerae*. *taraxacoides*, Loisel. Fl. Gall. ed. I. i. 530. t. 18 = *H. taraxacoides*. *tenuiflora*, Nym. Syll. 55 = *H. tenuiflora*. *tenuifolia*, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 31 = *H. tenuifolia*. *Tweedii*, Hook. & Arn. in Hook. l. c. = *H. brasiliensis*. *uniflora*, Bivona, Sic. Pl. Cent. ii. 55 = *H. taraxacoides*. *urens*, All. Fl. Pedem. i. 230. t. 29. f. 1 = *H. aethnensis*. *urens*, Lam. Illustr. iii. 235 = *Crepis aspera*. *urens*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 = *H. cretensis*. *urens*, Viv. Prod. Fl. Cors. 14 = *H. aethnensis*.

SERIPHIMUM, Linn. Sp. Pl. ed. I. 928 (1753) = *Stoebe*, Linn. (Compos.). *adpressum*, DC. Prod. vi. 263 = *St. adpressa*. *aethiopicum*, Steud. Nom. ed. I. 767 = *St. aethiopia*. *alopecuroides*, Lam. Encyc. i. 271 = *St. alopecuroides*. *ambiguum*, Murr. Syst. ed. XIII. 665 = *St. artemisioides*. *asperum*, Pers. Syn. ii. 501 = *Helichrysum ericaefolium*. *candicans*, Mundt, ex Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 282 = *St. phlaeoides*. *capitatum*, Less. Syn. Comp. 352 = *St. capitata*. *cernuum*, Pers. Syn. ii. 501 = *Elytropappus Rhinocerotis*. *cinereum*, Berg. Desc. Pl. Cap. 340 = *St. artemisioides*. *cinereum*, Linn. Sp. Pl. 982 = *St. cinerea*. *corymbiferum*, Linn. Mant. i. 119 = *St. gomphrenoides*.

SERIPHIMUM :—

distichum, Lam. Encyc. i. 271 (= *Trichogyne seriphoides*).—Afr. austr. *ericoides*, Pers. Syn. ii. 500 = *Disparago ericoides*. *fasciculatum*, Pers. l. c. 501 (= *Trichogyne seriphoides*).—Afr. austr. *flagineum*, DC. Prod. vi. 263 = *Stoebe flaginea*. *flavescens*, DC. l. c. = *St. spiralis*. *fusum*, Linn. Sp. Pl. 928 = *St. fusca*. *gnaphaloides*, Linn. Mant. i. 481 = *St. gomphrenoides*. *gomphrenoides*, Lam. Encyc. i. 272 = *St. gomphrenoides*. *incanum*, Lam. l. c. 271 = *St. incana*. *indicum*, Pers. Syn. ii. 501 = *St. incana*. *juniperifolium*, Lam. Encyc. i. 272 = *St. aethiopia*. *laricifolium*, Lam. l. c. 271 (= *Trichogyne laricifolia*).—Afr. austr. *nervigerum*, DC. Prod. vi. 263 = *St. nervigera*. *niveum*, Pers. Syn. ii. 501 = *Helichrysum niveum*. *passerinoides*, Lam. Encyc. i. 271 = *St. passerinoides*. *perotrichoides*, Less. Syn. Comp. 352 = *St. capitata*. *phleoides*, DC. Prod. vi. 262 = *St. phlaeoides*. *phylicoides*, Pers. Syn. ii. 500 = *St. phylicoides*. *phyllostachyum*, DC. Prod. vi. 262 = *St. phlaeoides*. *plumosum*, Linn. Sp. Pl. 928 = *St. cinerea*. *prostratum*, Lam. Encyc. i. 273 = *St. prostrata*. *reflexum*, Pers. Syn. ii. 501 (= *Trichogyne reflexa*).—Afr. austr. *Rhinocerotis*, Pers. l. c. = *Elytropappus Rhinocerotis*. *scabrum*, Pers. l. c. 500 = *Elytropappus glandulosus*. *squarrosus*, Forst. ex DC. Prod. vi. 262 = *St. cinerea*. *tenuifolium*, Salisb. Prod. 212 = *St. cinerea*. *tomentosum*, Moç. ex DC. Prod. vi. 264 = *Olearia Forsteri*? *uniflorum*, Moç. ex DC. l. c. v. 77 = *Vernonia salicifolia*. *vermiculatum*, DC. Prod. vi. 263 = *St. artemisioides*. *virgatum*, Pers. Syn. ii. 501 = *St. cinerea*.

SERIS, Less. in Linnaea, v. (1830) 253. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 492. *amplexifolia*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 456.—Bras. *angustifolia*, Gardn. l. c. 457 = *Trichocline angustifolia*. *denticulata*, DC. Prod. vii. 20 = *Trichocline polymorpha*. *discoidea*, Less. in Linnaea, v. (1830) 255.—Bras. *polymorpha*, Gardn. in Hook. Ic. Pl. t. 501 = *Trichocline arenaria*. *polymorpha*, Less. in Linnaea, v. (1830) 254 = *Trichocline polymorpha*. *polyphylla*, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 354.—Bras. *vaginata*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 456 = *amplexifolia*.

SERIS, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 139 = *Onoseris*, DC. (Compos.). *onoseroides*, Willd. l. c. = *O. Isotypus*.

SERISSA, Comm. ex Juss. Gen. 209 (1789). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 138. **DEMOCRITEA**, DC. Prod. iv. 540 (1830). **DYSODA**, Lour. Fl. Cochinch. 145 (1790). *capensis*, Thunb. Nov. Gen. 131 = *Plectronia ventosa*. *ceylanica*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 150 = *Saprosma ceylanicum*. *corymbosa*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 3 = *Saprosma corymbosum*. *Democratea*, Baill. Hist. Pl. vii. 386.—China. *fetida*, Lam. Illustr. ii. 211.—China; Japon. *fragrans*, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 50 = *Saprosma fragrans*. *Gardneri*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 150 = *Saprosma indicum*. *glomerata*, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 50 = *Saprosma indicum*. *japonica*, Thunb. Nov. Gen. 132 = *fetida*. *myrtifolia*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 164 = *Randia densiflora*, angatensis. *pinnata*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 163 = *Gardenia obscura*. *scabrida*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 151 = *Saprosma scabridum*. *ternata*, Kurz, Andam. Rep. App. A. 40 = *Saprosma ternatum*. *Wightii*, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 50 = *Saprosma ceylonicum*.

SERJANIA, Plum. [Gen. 34, t. 35 (SERJANIA)] ex Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. II. (1794) 125. *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 393. *acapulcensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 108 = emarginata.

acoma, Radlk. *Monog. Serj.* 127.—Bras.

aculeata, Radlk. l. c. 146.—Bras.

acuminata, Radlk. l. c. 347.—Bras.

acuta, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 349.—Panama.

acutidentata, Radlk. *Monog. Serj.* 232.—Bras.

acutifolia, Willd. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 215 = oxyphylla.

adusta, Radlk. *Monog. Serj.* 156.—Venezuela.

albopunctata, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 44 = subdentata.

altissima, Radlk. *Monog. Serj.* 125.—Peruv.

Ampelopsis, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 350.—N. Granat.

amplifolia, Radlk. *Mong. Serj.* 223.—N. Granat.

angustifolia, Hartw. Hort. Carlsruhan. (1825) 260 = mexicana.

angustifolia, Willd. *Sp. Pl.* ii. 466.—Ind. occ.

apiculata, Wright?, ex Radlk. *Monog. Serj.* 52, 110 = sinuata.

aquatica, Vell. *Fl. Flum.* 24; i. t. 53.—Bras.

Arnottiana, Walp. Rep. i. 412, sphalm. = Laruotteana.

atrolineata, Wright, in Sawv. *Fl. Cub.* 24.—Cuba.

australis, Spreng. Syst. ii. 248 = Dodonaea pinnata.

baramensis, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1180 = membranacea.

bigonioides, Klotzsch, l. c. = caracasana.

brachycarpa, A. Gray, ex Radlk. *Monog. Serj.* 259.—Texas.

brachyphylla, Radlk. l. c. 345.—N. Granat.

brachystachya, Radlk. l. c. 310.—Mexic.

bracteosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 585 = caracasana.

brevipes, Benth. Bot. Voy. Sulph. 76.—Ecuador.

californica, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 222.—Calif.

Cambessedean, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 214.—Mexic.

caracasana, Seem. Bot. Voy. Herald, 93 = mucronulata.

caracasana, Willd. *Sp. Pl.* ii. 465.—Am. centr.

cardiospermoides, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 418.—Mexic.

chartacea, Radlk. *Monog. Serj.* 114.—Guian.

circumvallata, Radlk. l. c. 345.—N. Granat.

cirrhiiflora, Sieber, ex Radlk. l. c. 352 = Urvillea ulmacea.

cissoïdes, Radlk. l. c. 294.—Bras.

clematidea, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 349.—N. Granat.

clematidifolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 361.—Bras.

comata, Radlk. *Monog. Serj.* 131.—Bras.

communis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 362.—Bras.

confertiflora, Radlk. *Monog. Serj.* 117.—Bras.

cornigera, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 267.—Panama.

corrugata, Radlk. *Monog. Serj.* 131.—Bras.

crassifolia, Radlk. l. c. 225.—Bolivia.

crassinervis, Radlk. l. c. 200.—Cuba.

crenata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 168.—Cuba.

crenata, Juss. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 112, in obs. = subdentata.

cubensis, La Sagra, Hist. Econ. Polit. Cuba (1831), 353 = diversifolia.

cuneolata, Radlk. *Monog. Serj.* 128.—Ind. occ.

curassavica, Radlk. l. c. 311.—Ind. occ.

cuspidata, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 356.—Bras.

cystocarpa, Radlk. in Fest. Meth. Bot. Syst. (1883) 32.—Mexic.

dasyclados, Radlk. *Monog. Serj.* 300.—N. Granat.

decemstriata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 223.—Reg. Argent.

deflexa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 337.—Bras.

deltoides, Radlk. *Monog. Serj.* 332.—Peruv.

dentata, Radlk. l. c. 144.—Bras.

dibotrya, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 35, t. 242.—Peruv.

SERJANIA :—

diffusa, Radlk. *Monog. Serj.* 302.—Bolivia.

divaricata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 168 = scatenis.

divaricata, Schum. in Skrivt. Naturf. Selsk. Kjoeb. iii. II. (1794) 126 = mexicana.

diversifolia, Radlk. *Monog. Serj.* 136 = lupulina.

Dombeiana, Juss. ex Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 364 = caracasana.

dubia, Spreng. Syst. ii. 247 = lucida.

dumicola, Radlk. *Monog. Serj.* 111.—Bolivia.

dura, Radlk. l. c. 134.—Bras.

elegans, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 358.—Bras.

elegans, Mart. in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 92 = corrugata.

emarginata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 109.—Mexic.

equestris, Macfad. Fl. Jamaic. i. 156.—Jamaic.

erecta, Radlk. *Monog. Serj.* 160.—Bras.

eucardia, Radlk. l. c. 121.—Bras.

exarata, Radlk. l. c. 166.—Bras.

faveolata, Radlk. l. c. 145.—Bras.

filicifolia, Radlk. l. c. 287.—Ind. occ.

floribunda, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 348 = mexicana.

foveata, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 108.—Tucuman.

fulta, Griseb. l. c. = glabrata.

fusculifolia, Radlk. *Monog. Serj.* 221.—Bras.

glabrata, Benth. Pl. Hartw. 115 = mucronulata.

glabrata, Griseb. ex Radlk. *Monog. Serj.* 165 = membranacea.

glabrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 110.—Peruv.

glutinosa, Radlk. *Monog. Serj.* 126.—Bras.

goniocarpa, Radlk. l. c. 309.—Mexic.

gracilis, Radlk. l. c. 134.—Bras.

grammatophora, Radlk. l. c. 258.—Hab. ?

grandiflora, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 360.—Bras.

grandiflora, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 79, partim = caracasana.

grandifolia, Sagot, ex Radlk. *Monog. Serj.* 166.—Guian.

grandis, Seem. Bot. Voy. Herald, 92.—Panama.

Grayii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 206, sphalm. = seq.

Grosii, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 42 (sphalm. 58).—Mexic.

Guarumina, Mart. in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 91 = cuspidata.

Guaruminea, Walp. Rep. i. 413, sphalm. = praec.

hamuligera, Radlk. *Monog. Serj.* 339.—Bras.

hebecarpa, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 192.—Bras.

heterophylla, DC. Prod. i. 604 = mexicana.

hirsuta, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 367.—Bras.

ichthyctona, Radlk. *Monog. Serj.* 230.—Bras.

ilicifolia, Tausch, ex Opiz, in Oestr. Bot. Wochenbl. i. (1851) 339 = sinuata.

impressa, Radlk. *Monog. Serj.* 323.—Mexic.

incisa, Torr. Bot. Mex. Bound. 47.—Mexic.; Texas.

inebrians, Radlk. *Monog. Serj.* 346.—Costa Rica.

inflata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 36.—Peruv.

inflata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 337 = cystocarpa.

insignis, Radlk. *Monog. Serj.* 331.—Mexic.

lamprophylla, Radlk. l. c. 233.—Bras.

lanceolata, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 356 = Urvillea ulmacea.

Laruotteana, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1317, sphalm. = seq.

Laruotteana, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 368.—Bras.

laxiflora, Radlk. *Monog. Serj.* 135.—Bras.

leptocarpa, Radlk. l. c. 112.—Bras.

lethalis, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. i. 206, 235.—Bras.

longipes, Radlk. *Monog. Serj.* 256.—Ecuador.

lucida, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 123 = diversifolia.

lucida, Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. II. (1794) 128.—Ins. S. Doming.

lupulina, Benth. Bot. Voy. Sulph. 76 = Paullinia velutina.

lupulina, Griseb. Cat. Pl. Cub. 44 = crassinervis.

lupulina, Schum. in Skrivt. Nat. Selsk. iii. II. (1794) 127.—Ind. occ.

SERJANIA :—

macrococca, Radlk. *Monog. Serj.* 270.—Mexic.

macrostachya, Radlk. l. c. 135.—Bras.

Mansiana, Mart. in Flora, xxii. (1839) I. Beibl. 9.—Bras.

marginata, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. v. 44.—Bras.

mariquitensis, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 347 = caracasana.

megalocarpa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1858) i. 396 = Toulisia megalocarpa.

membranacea, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 105.—Guian.

meridionalis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 366.—Bras.; Uruguay.

meridionalis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 79 = hebecarpa.

mexicana, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = Paullinia velutina.

mexicana, Willd. *Sp. Pl.* ii. 465.—Am. centr.

micrantha, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1180 = oblongifolia.

mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 108.—Peruv.

mollis, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 345 = grandis.

mollis, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 45 (sphalm. 61) = mexicana.

monogyna, Hoffmg. ex Schlecht. l. c. 30 (sphalm. 55) = Paullinia monogyna.

Moritziana, Schlecht. l. c. 44 (sphalm. 60) = Urvillea ulmacea.

mucronulata, Radlk. *Monog. Serj.* 232.—Ecuador.

multiflora, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 365.—Bras.

nigricans, Radlk. *Monog. Serj.* 336.—Bras.

nitidula, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 191 = caracasana.

nodosa, Radlk. *Monog. Serj.* 341.—Ind. occ.

noxia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 363.—Bras.

nutans, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 36, t. 242.—Peruv.

oblongifolia, Radlk. *Monog. Serj.* 219.—Guian.

obtusidentata, Radlk. l. c. 233.—Bras.

orbicularis, Radlk. l. c. 292.—Bras.

Ossana, DC. Prod. i. 603 = diversifolia.

Ossana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 396 = subdentata.

ovalifolia, Radlk. *Monog. Serj.* 218.—Bras.

oxypetala, G. Don, Gen. Syst. i. 659, sphalm. = oxyphylla.

oxyphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 112.—Peruv.

oxytoma, Radlk. *Monog. Serj.* 234.—Bras.

paleata, Radlk. l. c. 130.—Bras.

paludosa, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 368.—Bras.

paniculata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 123 = equestris.

paniculata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 111, t. 441.—Mexic.

paniculata, Poepp. ex Presl, Bot. Bemerk. 25 = subdentata.

paniculata, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = mexicana.

paniculata, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 348 = insignis.

paradoxa, Radlk. *Monog. Serj.* 133.—Bras.

parviflora, DC. Prod. i. 604 (sphalm.) = parvifolia.

parvifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 113.—Peruv.

paucidentata, DC. Prod. i. 603.—Bras.

paucidentata, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = rhombea.

pedicellaris, Radlk. *Monog. Serj.* 124.—Guian.

perulacea, Radlk. l. c. 227.—Bras.

pinnatifolia, Radlk. l. c. 226.—Bras.

piscatoria, Radlk. l. c. 340.—Bras.

platycarpa, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 192.—Bras.

plicata, Radlk. *Monog. Serj.* 167.—Mexic.

Plumeriana, Spreng. Syst. ii. 247 = sinuata.

polyphylla, Bert. ex Colla, Hort. Ripul. 101 = filicifolia.

polyphylla, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 568.—Guian.

polyphylla, Willd. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 215; Radlk. *Monog. Serj.* 179 = lucida.

polystachya, Radlk. l. c. 276.—Mexic.

pubescens, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 3 = rhombea.

SERJANIA:—

- pubescens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 110 = mexicana.
pubescens, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = *Paullinia velutina*.
purpurascens, Radlk. Monog. Serj. 335.—Bras.
pyramidata, Radlk. l. c. 155.—Peruv.
racemosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 413 = *triquetra*.
racemosa, Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. ii. (1794) 127.—Am. centr.
racemosa, Seem. in Bonplandia, v. (1857) 74 = *goniocarpa*.
Regnellii, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 41 (sphalm. 57).—Bras.
reticulata, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 359.—Bras.
rhombica, Radlk. Monog. Serj. 324.—Venezuela.
rigida, Radlk. l. c. 283.—Bolivia.
rubens, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 63 = *reticulata*.
rubicaulis, Benth. ex Radlk. Monog. Serj. 254 = seq.
rubifolia, Klotzsch, ex Trev. in Bot. Zeit. v. (1847) 393.—Peruv.
rufa, Radlk. Monog. Serj. 324.—Peruv.
Salzmanniana, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 46 (sphalm. 62).—Bras.
Salzmanniana, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = *acuta*.
samydea, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 3.—N. Granat.
samydea, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 346 = *rhombica*.
scatens, Radlk. Monog. Serj. 213.—Mexic.
Schiedeana, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 44 (sphalm. 60).—Mexic.
scopulifera, Radlk. Monog. Serj. 229.—Bras.
Seemanni, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 346.—Panama.
Selloiana, Klotzsch, ex Trev. in Bot. Zeit. v. (1847) 393 = *Laruttea*.
serrata, Radlk. Monog. Serj. 293.—Bras.
setulosa, Radlk. l. c. 337.—Mexic.
sinuata, Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 159 = *Urvillea uniloba*.
sinuata, Presl, Bot. Bemerk. 25 = *Urvillea ulmacea*.
sinuata, Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. ii. (1794) 126.—Ins. S. Doming.
sordida, Radlk. Monog. Serj. 272.—Mexic.
spectabilis, Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. ii. (1794) 127 = mexicana.
sphaerococca, Radlk. Monog. Serj. 153.—Peruv.
sphenocarpa, Radlk. l. c. 269.—Mexic.
squarrosa, Radlk. l. c. 115.—Peruv.
stans, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 405 = *Toulicia stans*.
stenopterygia, Radlk. Monog. Serj. 110.—Bras.
striata, Radlk. l. c. 280.—Peruv.
subdentata, Juss. ex Poir. Encyc. v. 102.—Cuba.
subimpunctata, Radlk. Monog. Serj. 123.—Bras.
subtripplinervis, Radlk. l. c. 273.—Mexic.
sufferruginea, Radlk. l. c. 299.—Peruv.
tenuifolia, Radlk. l. c. 220.—Bras.
tenuis, Radlk. l. c. 98.—Bras.
thoracoides, Radlk. l. c. 170.—Bras.
tinctoria, Sandifort, Elench. Lugd. Bat. (1822) 31.—Java.
trachygona, Radlk. Monog. Serj. 327.—Mexic.
trichomisca, Radlk. l. c. 114.—Bras.
triquetra, Radlk. l. c. 305.—Mexic.
tristis, Radlk. l. c. 293.—Bras.
triternata, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = *trachygona*.
triternata, Willd. Sp. Pl. ii. 466 = *lucida*.
velutina, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 357, t. 75.—Bras.
velutina, Herb. ex Radlk. Monog. Serj. 305 = *triquetra*.
vesicosa, Radlk. l. c. 277.—Mexic.

SEROPHYTON, Benth. Bot. Voy. Sulph. 52 (1844) = *Argithamnia*, Sw. (Euphorb.).
Drummondii, Benth. l. c. 53 = *A. mercurialina*.
lanceolatum, Benth. l. c. 52 = *A. lanceolata*.
pilosissimum, Benth. l. c. 53 = *A. pilosissima*.

SERPAEA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 296 = *Oyedeae*, DC. (Compos.).
oblonga, Gardn. l. c. 395 = *Aspilula oblonga*.
ovata, Gardn. l. c. 296 = *O. ovata*.
rotundifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 208 = *O. rotundifolia*.

SERPICULA, Linn. Mant. i. 16 (1767). *HALORAGAE*, Benth. & Hook. f. i. 675.
EPILITHES, Blume, Bijdr. 734 (1826).
LAUREMBERGIA, Berg. Desc. Pl. Cap. 350 (1767).
brasilensis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 250.—Bras.
brevipes, Wight & Arn. Prod. 338 = *indica*.
capensis, Raensch. Nom. ed. III. 271 = *repens*.
Epilithes, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 110.—Java.
hirsuta, Wight & Arn. Prod. 338 = *indica*.
indica, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 123, partim.—Ind. or.
indica, Thw. l. c., partim = *zeylanica*.
javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 1090.—Java.
repens, Linn. Mant. i. 124.—Afr. austr.
rubicunda, Burch. Trav. i. 37 = *repens*.
serpyllifolia, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 30 (err. typ. 26) = *repens*.
thymifolia, Burm. l. c.—Afr. austr.
veronicaefolia, Bory, Voy. iii. 174.—Ins. Borbon.
zeylanica, Arn. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 431.—Zeylan.

SERPICULA, Linn. f. Suppl. 416 (1781), partim = *Hydrilla*, Rich. (Hydrochar.).
verticillata, Linn. f. l. c. = *H. ovalifolia*.

SERPICULA, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 33 (1817) = *Eloidea*, Michx. (Hydrochar.).
canadensis, Eaton, Man. (1833) 336 = *E. canadensis*.
occidentalis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 33 = *E. canadensis*.
verticillata, Rostk. & Schmidt, Fl. Sedin. 370 = *E. canadensis*.

SERPILLARIA, Heist. Syst. 6 (1748) (Quid?).

SERPYPHILLUM, Tourn. ex Rupp. Jen. ed. Hall. 234 (1745) = *Thymus*, Linn. (Labi.).
angustifolium, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 133 = *T. Serpyllum*.
Chamaedryas, Fourr. l. c. = *T. Serpyllum*.
citri-odora, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. ii. 80 = *T. Serpyllum*.
lanuginosum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 133 = *T. Serpyllum*.
vulgare, Fourr. l. c. = *T. Serpyllum*.

SERRA, Cav. Diss. ii. 83 (1786), sphalm. = *Senra*, Cav. (Malvac.).

SERRAEA, Spreng. Syst. iii. 78 (1826) = *Senra*, Cav. (Malvac.).
incana, Spreng. l. c. = *Senra incana*.
rupestris, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 163 = *Senra incana*.

SERRAFALCUS, Parl. Rar. Pl. Sic. ii. 14 (1840); Pl. Nov. 75 (1842) = *Bromus*, Linn. (Gramin.).
alopecuroides, Parl. Fl. Ital. i. 399 = *B. Alopecurus*.
arduennensis, Crép. Man. Bot. Belg. ed. I. 211 = *B. arduennensis*.
arvensis, Godr. Fl. Lorr. ed. I. iii. 185 = *B. arvensis*.
Cavanillesii, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 101 = *B. molliformis*.
Chiapporanius, De Not. ex Parl. Fl. Ital. i. 394 = *B. patulus*.
commutatus, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 374; Godr. Fl. Lorr. ed. I. iii. 184 = *B. racemosus*.
contortus, Parl. in Giorn. Bot. i. i. (1844) 326 = *B. Alopecurus*.
divaricatus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 97 = *B. secalinus*.
hordeaceus, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 590 = *B. racemosus*?
Hughi, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1866) 33 = *B. intermedius*.
intermedius, Parl. Rar. Pl. Sic. ii. 17 = *B. intermedius*.
lanceolatus, Parl. l. c. 18 = *B. macrostachys*.
Lloydianus, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 591 = *B. molliformis*.
macrostachys, Parl. Fl. Ital. i. 397 = *B. macrostachys*.
massiliensis, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. III. iv. (1860) 391 = *P. massiliensis*.
molliformis, F. Schultz, Arch. Fl. 320 = *B. molliformis*.
mollis, Parl. Rar. Pl. Sic. ii. 16 = *B. mollis*.
neglectus, Parl. Fl. Ital. i. 391 = *B. racemosus*.

SERRAFALCUS:—

patulus, Parl. Fl. Ital. i. 394 = *Bromus patulus*.
racemosus, Parl. Rar. Pl. Sic. ii. 14 = *B. racemosus*.
scoparius, Parl. l. c. 19 = *B. scoparius*.
secalinus, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 374; Godr. Fl. Lorr. ed. I. iii. 182 = *B. secalinus*.
squarrosus, Bab. l. c. 375 = *B. squarrosus*.
velutinus, Parl. Rar. Pl. Sic. ii. 16 = *B. racemosus*.

SERRARIA, Burm. Afr. 204. t. 99 (1737) = *Serruria*, Salisb. (Proteac.).

SERRATULA, Dill. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 475.

CRUPINASTRUM, Schur. in Ber. Bot. Rundsch. (1853) 37; ex ej. Enum. Pl. Transs. 411.

KLASEA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 17 (1825); et xli. 321.

MASTRUCIUM, Cass. l. c. (1825).

PEREUPHORA, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 173 (1826).

PSILOSANTHUS, Neck. Elem. i. 69 (1790).

STEMMACANTHA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 12.

acaulis, DC. Diss. Comp. ii. 31 = *Centaurea chamaerhaponticum*.

acutifolia, Poir. Encyc. vi. 554 = *Lucilia acutifolia*.

alata, Desf. Tabl. ed. II. 168 = *Jurinea alata*.

alata, S. T. Gmel. Reise, i. 155. t. 35. f. 2; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 733 (= *Cirsium elodes*?).—Reg. Caucas.

alata, Poir. Encyc. vi. 553 = *Jurinea cyanoides*.

alata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 213 = *Saussurea japonica*.

alata, C. A. Mey. ex Rupr. Sert. Tiansch. 56.—Turkest.

albescens, Wall. Cat. n. 2918 = *Saussurea albescens*.

albida, DC. ex Pers. Syn. ii. 391 = *Heterocoma albida*.
Alcalae, Coss. Notes Crit. 40.—Hispan.

alpina, Linn. Sp. Pl. 816 = *Saussurea* sp. variae.

altissima, DC. Prod. vi. 671 = *Vernonia altissima*.

altissima, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 761, in nota = *coronata*.

amara, Linn. Sp. Pl. 819 = *Saussurea amara*.

amara, Pall. Reise, i. 500 = *Centaurea Picris*.

ambigua, DC. Diss. Comp. ii. 30 = *Jurinea ambigua*.

angulata, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 453.—Soongar.

angustifolia, Willd. Sp. Pl. iii. 1642 = *Saussurea alpina*.

anthelmintica, Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 405 = *Vernonia anthelmintica*.

apiculata, Poir. Encyc. Suppl. v. 43 = *Stachelina apiculata*.

arborescens, Lam. Fl. Fr. ii. 40 = *Stachelina arborescens*.

arguta, Fisch. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 156 = *tinctoria*.

arvensis, Linn. Sp. Pl. 820 = *Cnicus arvensis*.

aspera, Link. Enum. Hort. Berol. ii. 297.—Nepal.

atriplicifolia, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 475.—*Dahuria*.

autaretica, Poir. Encyc. vi. 563 = *Cnicus heterophyllus*.

babylonica, Linn. Syst. ed. X. 1199 = *Centaurea babylonica*.

bachtarica, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 587.—Persia.

Barrelieri, Dufour, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 156 = *pinnatifida*.

Behen, Lam. Illustr. iii. 242. t. 666 = *Centaurea cerinthifolia*.

bifrons, Pers. Syn. ii. 391 = *Chronopappus bifrons*.

blanda, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 549 = *Jurinea arachnoidea*.

Bocconi, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825); Tenore, Succ. Rel. Viagg. Abruzzo, 84 = *Jurinea humilis*.

boetica, Boiss. ex DC. Prod. vii. 306.—Hispan.

caespitosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 569, sphalm. = *Saussurea taraxacifolia*.

campestris, Schweigg. ex DC. Prod. vi. 671 = *Cnicus arvensis*.

canariensis, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 370.—Ins. Canar.

carniolica, Poir. Encyc. vi. 563 = *Cnicus rufescens*.

caroliniana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *Vernonia oligophylla*.

carthamoides, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 407 = *Saussurea affinis*.

SERRATULA:—

carthamoides, Poir. Encyc. vi. 561 = *Centaurea carthamoides*.
caspia, Pall. Reise, ii. 743 (= *Karelinia caspia*).—Reg. Casp.
caspica, Willd. Sp. Pl. iii. 1643 = praec.
caucasica, Boiss. Fl. Orient. iii. 590.—Reg. Caucas.
caulescens, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 251 = *Centaurea Cossoniana*.
centauroides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 264 = radiata.
centauroides, Linn. Sp. Pl. 820.—Sibir.
cerinthefolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 567.—Syria; Persia.
cernuus, Poir. Encyc. vi. 560 = *Carduus cernuus*.
chaetocarpa, Ledeb. Fl. Alt. iv. 42 = *Jurinea chaetocarpa*.
Chamaepeuce, Linn. Sp. Pl. 819 = *Cnicus Chamaepeuce*.
chinensis, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 228.—China.
cichoracea, DC. Prod. vi. 670.—Ital.
ciliata, Vahl, Symb. Bot. i. 67; Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 267 = *Cnicus arvensis*.
cinerea, Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 406 = *Vernonia cinerea*.
cirsioides, Tenore, Succ. Rel. Viagg. Abruzzo, 85.—Europ. austr.
complanata, Schweigg. in Hagen, Chlor. Bor. 303 = *Cnicus arvensis*.
complicata, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 400, sphalm. = praec.
compta, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 508 = *Liatris spicata*.
conica, Lam. Fl. Fr. ii. 40 = *Stachelina dubia*.
conifera, Brot. Phyt. Lusit. i. 67. t. 31 = *Leuzea conifera*.
cordata, Cass. in Dict. Sc. Nat. I. 468 = *cerinthefolia*.
coriacea, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 668.—Armen.; Persia.
coronaria, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 345 = coronata.
coronata, DC. Fl. Fr. iv. 85 (excl. desc.); Suppl. 458 = tinctoria.
coronata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1144.—Sibir.
corymbosa, Poir. Encyc. vi. 559 = *Vernonia corymbosa*.
crupina, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 38 = *Crupina vulgaris*.
cyanoides, DC. Diss. Comp. ii. 30 = *Jurinea cyanoides*.
cyanoides, Gaertn. Fruct. ii. t. 162 = *Jurinea mollis*.
cynarifolia, Poir. Encyc. vi. 561 = *Centaurea carthamoides*.
cynaroides, DC. Fl. Fr. iv. 87 = *Cnicus cynaroides*.
cynoglossifolia, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 381 = *Saussurea serrata*.
daurica, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. ix. (1834) 251 = *Saussurea crassifolia*.
decurrens, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1811) 4 = *Saussurea japonica*.
dentata, Poir. Encyc. vi. 562 = *Carthamus dentatus*.
depressa, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 52.—Kokan.
depressa, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 61 = *Jurinea depressa*.
discolor, Poir. Encyc. vi. 565 = *Cnicus altissimus*.
discolor, Willd. Sp. Pl. iii. 1641 = *Saussurea discolor*.
dissecta, Ledeb. Fl. Alt. iv. 40.—Sibir. altaic.
dissecta, Steph. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) II. 46 = *Saussurea japonica*.
divaricata, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 37 = *Volutarella divaricata*.
dubia, Brot. Fl. Lusit. i. 350 = *Stachelina dubia*.
dubia, Scop. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 569 (Quid?).—Am. bor.
echinocephala, Poir. Encyc. vi. 561 = *Cnicus echinocephalus*.
elegans, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 138 = *Liatris elegans*.
elegans, Stev. in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 414. t. 37 = *Jurinea elegans*.
fasciculata, Poir. Encyc. vi. 560 = *Lachnospermum ericifolium*.
flavescens, Poir. l. c. 562.—Hispan.
flexicaulis, Rupr. Sert. Tiansch. 57.—Turkest.
foliosa, Hill, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 570 (Quid?).—Am. bor.
frigida, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) II. 37 = *Saussurea alpina*.
fruticosa, Lam. Illustr. iii. 242 = *Stachelina fruticosa*.

SERRATULA:—

furcata, Spreng. ex DC. Prod. vi. 563 = *Tricholepis furcata*.
glandulifera, Turcz. ex DC. l. c. 670.—Rossia.
glaucia, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 560.—Reg. Caucas.; Sibir.
glaucia, Linn. Sp. Pl. 818 = *Vernonia noveboracensis*.
Gmelini, Ledeb. ex DC. Prod. vi. 668.—Sibir.
Gmelini, Tausch, in Flora, xi. (1828) II. 485 = radiata.
gnaphaloides, Poir. Encyc. vi. 559 = *Helipterum gnaphaloides*.
gossypiphora, D. Don, Prod. Fl. Nep. 168.—Reg. Himal.
gracilis, Hill, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 570 (Quid?).—Am. bor.
graecca, Spreng. Syst. iii. 388 = *Jurinea glycacantha*.
Griffithii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 49 = *Volutarella divaricata*.
hastata, Poir. Encyc. vi. 557 = *Vernonia atriplicifolia*.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient. iii. 589.—Persia.
heleniifolia, Sch. Bip. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xv. 47.—Europ. centr.
heterophylla, Desf. Tabl. ed. I. 93.—Europ.; Reg. Caucas.
heterophylla, Vill. Cat. Strasb. 198 = radiata.
humilis, Desf. Fl. Atlant. ii. 244 = *Jurinea humilis*.
ilicifolia, Poir. Encyc. vi. 558 = *Gynoxys ilicifolia*.
imbricata, Poir. l. c. 559 = *Metalasia uniflora*.
incana, Gmel. It. i. 155 = *Cnicus arvensis*.
indica, Klein, ex Willd. Sp. Pl. iii. 1642 = *Goniocaulon glabrum*; *Tricholepis glaberrima*.
indica, Russ. ex Wall. Cat. n. 2985 F = *Echinops echinatus*.
indivisa, Poir. ex DC. Prod. vi. 667 = tinctoria.
inermis, Gilib. Fl. Lituan. i. 183 = tinctoria.
inermis, Poir. Encyc. vi. 564 = *Cnicus centauroides*.
integrifolia, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 277.—Siles.
isophylla, Claus, in Beitr. Pfl. Russ. Reich. viii. 118, 301.—Ross. med.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 305 = *Saussurea japonica*.
Kitaibelii, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 329 = heterophylla.
Kotschyi, Boiss. Fl. Orient. iii. 590.—Kurdist.
lanata, Poir. Encyc. vi. 565 = *Cnicus arvensis*.
latifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 96.—Persia.
Laxmanni, Fisch. ex DC. Prod. vi. 669 = glauca.
leucantha, DC. l. c. 670 = flavescens.
leucocephala, Poir. Encyc. vi. 565 = *Cnicus leucocephalus*.
liatroides, Adams, ex DC. Prod. vi. 532 = *Saussurea pycnocephala*.
linearifolia, DC. Diss. Comp. ii. 29 = *Jurinea linearifolia*.
lucida, Poir. Encyc. vi. 555 (= *Cirsium lucidum*).—Hab.?
lyrata, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 129 = *Jurinea alata*.
lyratifolia, Scheele, in Linnaea, xviii. (1844) 481.—Reg. Caucas.
lyratifolia, Schrenk, Enum. Pl. Nov. i. 45.—Sibir. altaic.
macrocephala, Bertol. Fl. Ital. viii. 604.—Ital.
macrocephala, Wall. Cat. n. 2904 = *Jurinea macrocephala*.
macrophylla, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 570 (Quid?).—Hab.?
marginata, Tausch, in Flora, xi. (1828) 484 = Gmelini.
marilandica, Crantz, Inst. i. 259 = glauca.
media, Poir. Encyc. vi. 564 = *Cnicus medius*.
melanocheila, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 589.—Persia.
mollis, Cav. Ic. i. 62. t. 90. f. 1 = *Jurinea humilis*.
mollis, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 408 = *Jurinea mollis*.
mollis, Wallr. Sched. Crit. 452 = praec.?
Monardi, Dufour, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 155 = *Jurinea Monardi*.
montana, Poir. Encyc. vi. 564 = *Cnicus montanus*.
monticola, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 364 = macrocephala.
mucronata, Desf. Fl. Atlant. ii. 243 = flavescens.
multicaulis, Wall. Cat. n. 2897 = *Saussurea affinis*.
multiflora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 617 = *Vernonia chinensis*.
multiflora, Linn. Sp. Pl. 817 = *Jurinea linearifolia*.
multiflora, Lour. Fl. Cochinch. 483.—China.

SERRATULA:—

multiflora, Pall. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) 20 = *Saussurea serrata*.
nemorum, Lavy, Orig. 13; ex DC. Prod. vi. 671 (Quid?).—Hab.?
nitens, Spreng. Syst. iii. 389 = *Centaurea nitens*.
nitida, Bess. Enum. Pl. Volh. 32 = heterophylla.
nitida, Fisch. ex Spreng. Syst. iii. 390.—Rossia; Sibir.
nivea, Wall. Cat. sub n. 2898 = *Saussurea deltoidea*.
noveboracensis, Linn. Sp. Pl. 818 = *Vernonia noveboracensis*.
nudicaulis, DC. Fl. Fr. iv. 86.—Gallia; Hispan.
numidica, Poir. Encyc. vi. 555 (= *Cirsium numidicum*).—Afr. bor.
oleracea, Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. ii. (1770) 465 = *Cnicus oleraceus*.
oligocephala, DC. Prod. vi. 669.—As. Min.; Syria.
orientalis, Poir. Encyc. vi. 565 = *Galactites tomentosa*.
pallida, DC. Prod. vi. 670.—Reg. Himal.
palustris, Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. ii. (1770) 465 = *Cnicus palustris*.
pannonica, Spreng. Syst. iii. 389 = *Cnicus pannonicus*.
parviflora, Poir. Encyc. vi. 554 = *Saussurea serrata*.
pauciflora, Poir. l. c. 563 = *Cnicus heterophyllus*.
pectinata, Turcz. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlii. (1870) I. 94 = *centauroides*.
pedunculata, Pers. Syn. ii. 391 = *Vernonia pedunculata*.
phrygia, Karamysch. in Linn. Amoen. Acad. vii. 456.—Ross.
Picris, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 546 = *Centaurea Picris*.
pilosa, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 138 = *Liatris spicata*.
pilosa, Bosc. ex DC. Prod. v. 63, sphalm. = *Vernonia angustifolia*.
pinnata, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. ii. 454 = tinctoria.
pinnata, Poir. Encyc. Suppl. v. 43 = *Jurinea pinnata*.
pinnatifida, Desf. Tabl. ed. I. 93 = radiata.
pinnatifida, Poir. Encyc. vi. 561.—Hispan.
Pollichii, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 145 = *Jurinea cyanoides*.
polyclonos, DC. Diss. Comp. 30 = *Jurinea polyclonos*.
polygyna, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 457 = *Laggera purpurascens*.
praecalta, Linn. Sp. Pl. 818 = *Vernonia noveboracensis*.
procumbens, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) II. 165.—As. centr.
propinqua, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 25 = flavescens.
pulchella, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 676 = *Jurinea pulchella*.
pulchella, Sims, Bot. Mag. t. 2589 = *Saussurea japonica*.
pumila, Thore, ex DC. Prod. vi. 667 = tinctoria.
pungens, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 416 = atriplicifolia.
pungens, Poir. Encyc. vi. 566 = *Cnicus pungens*.
purpurata, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) II. 20 = *Saussurea serrata*.
pygmaea, Jacq. Fl. Austr. v. 20 = *Saussurea pygmaea*.
quinquefolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 264.—Reg. Caucas.
radiata, Bieb. l. c. iii. 545.—Europ.; Reg. Caucas.
rhapontica, DC. Fl. Fr. iv. 87 = *Centaurea Rha-ponticum*.
rosmarinifolia, Nym. Consp. 401 = *Stachelina dubia*.
runcinata, Demid. ex DC. Prod. vi. 537 = *Saussurea runcinata*.
salicifolia, Linn. Sp. Pl. 817 = *Saussurea salicifolia*.
salicina, Pall. Reise, iii. 682 = *Jurinea linearifolia*.
salina, Pall. Reise, iii. 314 = *Saussurea crassifolia*.
salisburgensis, Poir. Encyc. vi. 564 = *Cnicus rivularis*.
salsa, Pall. Reise, ii. 444; Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 266 = *Saussurea crassifolia*.
salsa, Spreng. Fl. Hal. Mant. 49 = praec.?
scariosa, Linn. Sp. Pl. 818 = *Liatris scariosa*.
scordioidea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = seq.
Scordium, Lour. Fl. Cochinch. 483.—China.
semiserrata, Willd. ex DC. Prod. v. 33 = *Vernonia serratuloides*.
serrata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 213 = *Saussurea serrata*.
setosa, Willd. Sp. Pl. iii. 1645 = *Cnicus arvensis*.
simplex, DC. Diss. Comp. ii. 30 = *Jurinea mollis*.
sogdiana, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 367.—Turkest.
sonchifolia, Bess. ex Rochel, Pl. Banat. Rar. (Index) (Quid?).—Panat.

SERRATULA :—

- speciosa*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 138 = *Liatris elegans*.
spicata, Linn. Sp. Pl. 819 = *Liatris spicata*.
spinosa, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 217.—Reg. Byzant.
spinosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 184 = *Cnicus arvensis*.
spinosa, Poir. ex DC. Prod. v. 475 = *Iphiona juniperifolia*.
spinulosa, Franch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xvi. (1883) 329.—Turkestan.
squalida, Steph. ex DC. Prod. vi. 537 = *Saussurea alata*.
squarrosa, Linn. Sp. Pl. 818 = *Liatris squarrosa*.
Stelleria, Steph. ex DC. Prod. vi. 534 = *Saussurea elongata*.
stoechadifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 266 = *Jurinea staechadifolia*.
subacaulis, Poir. Encyc. vi. 550 = *Jurinea humilis*.
subulata, Poir. l. c. 558 = *Iphiona juniperifolia*.
suffruticosa, Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 510, sphalm. = seq.
suffruticulosa, Schrenk. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* iii. (1845) 110.—Soongaria.
tenuifolia, Bong. in *Bull. Sc. Acad. Pétersb.* viii. (1841) 340.—Sibir. altaic.
thracica, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 178 = *Centaurea monacantha*.
Tilesii, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 562 = *Saussurea alpina*.
tincta, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 476 = *Jurinea linearifolia*.
tinctoria, Linn. Sp. Pl. 816.—Europ.
tinctoria, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 183 = *Saussurea affinis*.
tomentosa, Hoffm. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 762 = *Jurinea staechadifolia*.
transylvanica, Spreng. Syst. iii. 388 = *Jurinea mollis*.
Trautvetteriana, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 321.—Turkestan.
tuberosa, Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. ii. (1770) 465 = *Cnicus tuberosus*.
uniflora, Poir. Encyc. vi. 560 ; Spreng. Syst. iii. 388 = *Centaurea monantha*.
uniflosculosa, Poir. Encyc. Suppl. v. 43 = *Stachelina uniflosculosa*.
varia, Hill, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 570 (Quid ?).—Am. bor.
vicifolia, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 586.—Persia.
Vulpii, Fisch.-Ooster, in Flora, xxxvii. (1854) 98 = *macrocephala*.
Wolffii, Andrae, in Bot. Zeit. xiii. (1855) 321 = *coronata*.
xeranthemoides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 265.—Rossia ; Reg. Caucas.

SERRRESIA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 179. *INCERT. SEDIS*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. i. 970.
asarifolia, Montr. l. c. 180.—N. Caled.

SERRONIA, Gaudich. in Deless. Ic. Sel. iii. 54. t. 90 (1837) = *Piper*, Linn.
acuminata, Moric. Pl. Nouv. Am. 86. t. 57 = *P. corcovadense*.
Jaborandi, Gaudich. & Guill. in Deless. Ic. Sel. iii. 54 = *P. Jaborandi*.

SERRULATA, DC. Prod. v. 63 (1836), sphalm. = **Serratula**, Dill. (Compos.).

SERRURIA, Salisb. Parad. Lond. sub t. 67 (1807). *PROTEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 170.
 HOLDERLINIA, Neck. Elem. i. 106 (1790).
 SERRARIA, Burm. Afr. 264. t. 99 (1737).
abrotanifolia, Knight, Prot. 79.—Afr. austr.
acrocarpa, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 113.—Afr. austr.
adscendens, R. Br. l. c. 127.—Afr. austr.
adscendens, Drège, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 287 = *saxicola*.
aemula, Knight, Prot. 89.—Afr. austr.
Aitoni, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 114.—Afr. austr.
albicans, Roem. & Schult. Syst. iii. 378.—Afr. austr.
Andrewsii, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 79 = *phylicoides*, odorata.
anemonefolia, Knight, Prot. 83.—Afr. austr.
anethifolia, Knight, l. c. 84.—Afr. austr.

VOL. II.

SERRURIA :—

- arenaria*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 117.—Afr. austr.
arenaria, Knight, Prot. 87 = *emarginata*.
argentiflora, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 297 = *triternata*.
artemisiaefolia, Knight, Prot. 80.—Afr. austr.
barbigera, Knight, l. c. 90.—Afr. austr.
Bergii, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 220.—Afr. austr.
Brownii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 290.—Afr. austr.
Burmanni, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 310 = *fasciflora*.
callosa, Knight, Prot. 80.—Afr. austr.
candicans, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 130.—Afr. austr.
candicans, Roem. & Schult. Syst. iii. 378 = *Nivenia concava*.
chlamydfiora, Knight, Prot. 91.—Afr. austr.
ciliata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 123.—Afr. austr.
collina, Knight, Prot. 86.—Afr. austr.
colorata, Buek, ex Drège, Zwei Pfl. Docum. 109, 221.—Afr. austr.
colorata, Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 286 = *cygnea*.
commutata, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 79 = *triplicato-ternata*.
compar, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 129.—Afr. austr.
concinna, Knight, Prot. 88.—Afr. austr.
congesta, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 123 = *millefolia*.
crithmifolia, Knight, Prot. 83 ; R. Br. l. c. 132.—Afr. austr.
cyanea, Drège, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 286 = *cygnea*.
cyanoidea, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 117 = *pulchella*.
cygnea, R. Br. l. c. 113.—Afr. austr.
decipiens, R. Br. l. c. 129.—Afr. austr.
decumbens, R. Br. l. c. 126.—Afr. austr.
delphinifolia, Knight, Prot. 82.—Afr. austr.
diffusa, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 115.—Afr. austr.
Dregei, Meissn. in DC. Prod. xiv. 289.—Afr. austr.
elevata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 114.—Afr. austr.
elongata, R. Br. l. c. 132 = *crithmifolia*.
elumbis, Knight, Prot. 83.—Afr. austr.
emarginata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 348.—Afr. austr.
erecta, Meissn. in DC. Prod. xiv. 298.—Afr. austr.
eriocephala, Steud. Nom. ed. II. ii. 571 = *squarrosa*.
fallax, Knight, Prot. 90.—Afr. austr.
fasciflora, Knight, l. c. 85.—Afr. austr.
flagellaris, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 127.—Afr. austr.
flagellifolia, Knight, Prot. 84.—Afr. austr.
flava, E. Mey. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 287.—Afr. austr.
florida, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 126.—Afr. austr.
florida, Knight, Prot. 92.—Afr. austr.
foeniculacea, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 122.—Afr. austr.
foeniculacea, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 294 = *glomerata*.
foliosa, Knight, Prot. 89.—Afr. austr.
frondosa, Knight, l. c. 85.—Afr. austr.
fucifolia, Knight, l. c. 81.—Afr. austr.
furcellata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 118.—Afr. austr.
glaberrima, R. Br. l. c. 112.—Afr. austr.
glomerata, R. Br. l. c. 128.—Afr. austr.
gracilis, Knight, Prot. 81.—Afr. austr.
gremiflora, Knight, l. c. 88.—Afr. austr.
helvola, Steud. Nom. ed. II. ii. 571 = *cygnea*.
heterophylla, Meissn. in DC. Prod. xiv. 284.—Afr. austr.
hirsuta, Berg. ex Meissn. l. c. 290 = *Brownii*.
hirsuta, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 120.—Afr. austr.
hirsuta, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 289 = *scoparia*.
hyemalis, Knight, Prot. 84.—Afr. austr.
incrassata, Buek, ex E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 98.—Afr. austr.
Kraussii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 296.—Afr. austr.

SERRURIA :—

- linearis*, Knight, Prot. 82.—Afr. austr.
millefolia, Knight, l. c. 79.—Afr. austr.
montana, Knight, l. c. 80.—Afr. austr.
multifida, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 74 = *Aitoni*.
nervosa, Meissn. in DC. Prod. xiv. 290.—Afr. austr.
nitida, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 124.—Afr. austr.
Niveni, R. Br. l. c. 121.—Afr. austr.
odorata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 348.—Afr. austr.
parilis, Knight, Prot. 91.—Afr. austr.
peduncularis, Knight, l. c. 81.—Afr. austr.
pedunculata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) = *artemisiaefolia*.
phylicoides, R. Br. l. c. 126 = *barbigera*.
pilosa, Roem. & Schult. Syst. iii. 378.—Afr. austr.
pinnata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 116.—Afr. austr.
plumosa, Meissn. in DC. Prod. xiv. 291.—Afr. austr.
pulchella, Knight, Prot. 89.—Afr. austr.
quinquemestris, Knight, l. c. 87.—Afr. austr.
rangiferina, Knight, l. c. 86.—Afr. austr.
rostellaris, Knight, l. c. 88.—Afr. austr.
Roxburghii, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 130.—Afr. austr.
rubricaulis, R. Br. l. c. 128.—Afr. austr.
saxicola, Buek, ex E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 76.—Afr. austr.
scariosa, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 118.—Afr. austr.
scariosa, Drège, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 285 = *furcellata*.
scoparia, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 119.—Afr. austr.
simplicifolia, R. Br. l. c. 115.—Afr. austr.
sphaerocephala, Steud. Nom. ed. II. ii. 571 = *hirsuta*, *pedunculata*, *scariosa*.
squarrosa, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 124.—Afr. austr.
Stilbe, R. Br. l. c. 120.—Afr. austr.
subcorymbosa, Meissn. in DC. Prod. xiv. 285.—Afr. austr.
Thunbergi, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 79 = *pilosa*.
tomentosa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 76.—Afr. austr.
tridentata, D. Dietr. Syn. Pl. i. 520 = *triternata*.
trilophia, Knight, Prot. 90.—Afr. austr.
triplicato-ternata, Roem. & Schult. Syst. iii. 378.—Afr. austr.
triternata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 131 = *antheifolia*.
vallis, Knight, Prot. 78.—Afr. austr.
vestita, Buek, ex E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 104.—Afr. austr.
villosa, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 122.—Afr. austr.
zanthophylla, Knight, Prot. 86.—Afr. austr.
Zeyheri, Meissn. in DC. Prod. xiv. 297.—Afr. austr.

SERSALISIA, R. Br. Prod. 529 (1810) = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
cotinifolia, F. Muell. Fragm. v. 161 = *Hormogyne cotinifolia*.
galactoxylon, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 279 = *L. galactoxylon*.
glabra, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 327 = *Sideroxylon Richardi*.
laurifolia, A. Rich. Sert. Astrolab. 84. t. 31 = *Sideroxylon Richardi*.
obovata, R. Br. Prod. 529 = *Sideroxylon Brownii*.
sericea, R. Br. l. c. 530 = *L. sericeum*.

SERTIFERA, Lindl. ex Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 63. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 591.
purpurea, Reichb. f. l. c. 64.—Ecuador.
virgata, Reichb. f. l. c.—Peruv.

SERTULA, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Trifolium**, Linn. (Legumin.).

SERTUERNERA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 36. t. 136 (1826) = **Pfaffia**, Mart. (Amarant.).
glauca, Mart. l. c. 37. t. 136 = *P. glauca*.
guianensis, Klotzsch, in Rich. Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 933, nomen.—Guian.

SERTUERNERA :—

iresinoides, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 48. t. 138 = *Gomphrena iresinoides*.
luzulaeflora, Mart. l. c. 39 = *Gomphrena luzulaeflora*.
paraguayensis, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. vi. (1878) 40; Contrib. 92.—Paraguay.
Schomburgkii, Klotzsch, in Rich. Schomb. Faun. Fl. Brit. Gu. 933, nomen.—Guian.

SESAMELLA, Reichb. Consp. 186. (1828) = *Astrocarpus*, Neck. (Resed.).
spathulata, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 130 = *A. Clusii*.
Tournefortii, Reichb. l. c. = *A. Sesamoides*.

SESAMOIDES, Tourm. ex Reichb. Consp. 186 (1828) = *Astrocarpus*, Neck. (Resed.).

SESAMOPTERIS, DC. ex Meissn. Gen. 298; Comm. 206 (1840) = *Sesamum*, Linn. (Pedal.).
alata, DC. ex Meissn. Gen. Comm. 206 = *Sesamum capense*.
pentaphylla, DC. Prod. ix. 251 = *Sesamum capense*.
radiata, DC. ex Meissn. Gen. Comm. 206 = *Sesamum radiatum*.

SESAMOTHAMNUS, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 49. t. 18. *PEDALINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1058.
benguellensis, Welw. l. c. 50.—Afr. trop.

SESAMUM, Adans. Fam. ii. 213 (1763) = *Martynia*, Linn. (Pedal.).

SESAMUM, Linn. Coroll. Gen. 11 (1737). *PEDALINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1058.
ANTHADENIA, Van Houtte, Fl. des Serres, ii. (Apr. 1846) 10. t. 6.
DYSOSMON, Rafin. Fl. Ludov. 48 (1817).
GANGILA, Bernh. in Linnaea, xvi. (1842) 42.
SESAMOPTERIS, DC. ex Meissn. Gen. 298; Comm. 206 (1840).
SIMSIMUM, Bernh. in Linnaea, xvi. (1842) 42.
africanum, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1866) 34 = *indicum*?
alatum, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 284 = *capense*.
angolense, Welw. Apont. 588; et in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 51.—Afr. trop.
auriculatum, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 275.—Ins. Creta.
brasilense, Vell. Fl. Flum. 264; vi. t. 90.—Bras.
calycinum, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 52.—Afr. trop.
capense, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17.—Afr. austr.
edule, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 769 = *indicum*.
gracile, Endl. in Linnaea, vii. (1832) 10. t. 3 = *capense*.
indicum, Linn. Sp. Pl. 634.—Reg. trop. (cult.).
javanicum, Burm. f. Fl. Ind. 133 = *Artanema sesamoides*.
laciniatum, Klein, ex Willd. Sp. Pl. iii. 359.—Ind. or.
laciniatum, Willd. l. c., partim = *trifoliatum*?
luteum, Retz, Obs. vi. 31 = *indicum*.
macranthum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 131.—Afr. trop.
occidentalis, Heer & Regel, Ind. Sem. Hort. Turic. (1842); ex DC. Prod. ix. 250 = *indicum*.
oleiferum, Moench, Meth. Suppl. 174 = *indicum*.
orientale, Linn. Sp. Pl. 634 = *indicum*.
orientale, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 275 = *auriculatum*.
pentaphyllum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 50, 54; et ex DC. Prod. ix. 251 = *capense*.
prostratum, Retz, Obs. iv. 28.—Ind. or.
pterospermum, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *capense*.
radiatum, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 282.—Afr. trop.
rigidum, Peyr. in Sitzb. Acad. Wien, Math.-Nat. xxxviii. (1860) 572.—Afr. trop.
rostratum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 43 = *capense*.
trifoliatum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3.—Ind. or.

SESBAN, Adans. Fam. ii. 327 (1763) = seq.

SESBANA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 330 (1812) = seq.

SESBANIA, Scop. Introd. 308 (1777). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 502.

AGATI, Adans. Fam. ii. 376 (1763); Desv. Journ. Bot. i. (1813) 119. t. 4.
DARWINIA, Rafin. Fl. Ludov. 106 (1817).
DAUBENTONIA, DC. Mém. Lég. 285 (1825).
GLOTTIDIUM, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 119. t. 1.
MONOPLECTRA, Rafin. Fl. Ludov. 106 (1817).
RESUPINARIA, Rafin. Sylva Tellur. 115 (1838).
aculeata, Poir. Encyc. vii. 128; Pers. Syn. ii. 316.—Cosmop. trop.
aegyptiaca, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5655 B = *aculeata*.
aegyptiaca, Poir. Encyc. vii. 128; Pers. Syn. ii. 316.—Geront. trop.
affinis, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1819); ex DC. Prod. ii. 265 = *aculeata*.
arabica, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 572.—Arab.
australis, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 36 = *aculeata*.
bispinosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 572 = *aculeata*.
brachycarpa, F. Muell. Fragm. xi. 32.—Austral.
Candira, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5655 C = *aculeata*.
cannabina, Poir. Encyc. vii. 130; Pers. Syn. ii. 316 = *aculeata*.
cassioidea, G. Don, Gen. Syst. ii. 240.—Ecuador.
Cavanillesii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 342.—Am. bor.; Mexic.
cinerascens, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 134.—Afr. trop.
coccinea, Poir. Encyc. vii. 127 = *grandiflora*.
cochinchinensis, DC. Prod. ii. 266.—Cochinch.
disperma, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 485 = *platycarpa*.
dubia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 268. t. 660 = *Coursetia dubia*.
dubia, Steud. Nom. ed. II. ii. 572 = *exasperata*.
exasperata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 534.—Am. trop.
ferruginea, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 31 = *Milletia ferruginea*.
filiformis, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 133 = *aegyptiaca*.
filiformis, Hochst. ex Baker, l. c. 135 = *leptocarpa*.
fusca, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 300 = *Aeschynomene fusca*.
geminiflora, Schrad. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 572 (Quid?).—Hab.?
gracilis, Schrad. Cat. Sém. Gotting. 1819; ex DC. Prod. ii. 265.—Hab.?
grandiflora, Poir. Encyc. vii. 127; Pers. Syn. ii. 316.—Ind. or.; Malaya; Austral.
guianensis, Klotzsch, in Rich. Schomb. Faun. Fl. Brit. Gu. 1199, nomen.—Guian.
javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 288.—Java.
leptocarpa, DC. Prod. ii. 265.—Afr. trop.
longifolia, DC. l. c.—Mexic.
macrocarpa, Muhl. ex Rafin. Fl. Ludov. 137; et Ell. Sketch, ii. 221.—Am. bor.
macroptera, Micheli, in Mém. Soc. Phys. Genève. xxviii. (1883) vii. n. 14.—Paraguay.
marginata, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 43.—Am. trop.
mossambicensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 45 = *aculeata*.
multijuga, Schweinf. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 133 = *aegyptiaca*.
muricata, Macfad. Fl. Jamaica. i. 257 = *aculeata*.
occidentalis, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 200 = *aculeata*.
occidentalis, Poir. Encyc. vii. 129; Pers. Syn. ii. 316.—Ind. occ.
pachycarpa, DC. Prod. ii. 265 = *aegyptiaca*.
paludosa, Jacq. Hort. Vindob. ex DC. Prod. ii. 265 = *aculeata*.
peruviana, G. Don, Gen. Syst. ii. 240.—Peruv.
picta, Lindl. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 184 = *occidentalis*.
picta, Poir. Encyc. vii. 129; Pers. Syn. ii. 316 = *aegyptiaca*.
platycarpa, Pers. l. c.—Am. bor.
polyphylla, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 288.—Java.
procumbens, Wight & Arn. Prod. 215.—Ind. or.
pubescens, DC. Prod. ii. 265.—Guian.
punctata, DC. l. c. = *aegyptiaca*.
punicea, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 43.—Reg. Argent.
sericea, DC. Prod. ii. 266.—Ind. occ.

SESBANIA :—

sericea, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 244; et ex Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 300 = *præc.*?
sericea, Welw. Apont. 585 = *pubescens*.
simpliciuscula, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. ii. 213.—Austral.
sphaerocarpa, Welw. Apont. 590; et ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 135.—Afr. trop.
stricta, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1834).—Cf. *Linnaea*, x. (1836) Litt. 111.—Ind. or.
tetraptera, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 136.—Afr. trop.
Thurberi, S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 258.—Am. bor. occ.
tomentosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 286.—Mexic.
triflora, Span. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 346, nomen.—Ins. Timor.
uliginosa, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 129 = *aculeata*.
vesicaria, Ell. Sketch, ii. 222 = *platycarpa*.
virgata, Poir. Encyc. vii. 129; Pers. Syn. ii. 316 = *Coursetia virgata*.

SESELI, Linn. Gen. ed. I. 80 (1737). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 901.

BUBON, Linn. Gen. ed. I. 339 (1737).
DELA, Adans. Fam. ii. 499 (1763).
DETHAWIA, Endl. Gen. 775 (1839).
GALBANOPHORA, Neck. Elem. i. 175 (1790).
HIPPOMARATHRUM, Hall. in Rupp. Fl. Jen. ed. II. 280 (1745).
LIBANOTIS, Riv. ex Hall. Enum. Helv. ii. 450 (1742).
LOMATOPODIUM, Fisch. et Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iii. (1845) 305.
MARATHRUM, Link, Handb. i. 348 (1829).
SCAPHESPERMUM, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 58.
STENOCELIUM, Ledeb. Fl. Alt. i. 297 (1829).
TELEOPHUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 353 (1867).
WALLROTHIA, Spreng. Pugill. ii. 52 (1815).
Aegopodium, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 215 = *Aegopodium Podagraria*.
algens, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 104.—Austral.
alpinum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 236 = *Carum Lomatocarpum*.
Ammi, Savi, Due Cent. Fl. Etrusc. 71 = *Apium Ammi*.
Ammi, Steud. Nom. ed. II. ii. 572 = *Carum ammoides*.
ammoides, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 285 = *Apium Ammi*.
ammoides, Jacq. Hort. Vindob. t. 52 = *Carum copticum*.
ammoides, Linn. Sp. Pl. 260 = *Carum ammoides*.
Amomum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 213 = *Sison Amomum*.
annuum, Linn. Sp. Pl. 260.—Europ.
annuum, Pall. Tabl. Taur. 49; Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 235 = *tortuosum*.
arenarium, Bieb. l. c. iii. 242 = *campestre*.
aristatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 359 = *Ligusticum pyrenaicum*.
articulatum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 91; ed. II. 205 = *S. Hippomarathrum*.
aspergillifolium, Bogusl. in Erman, Archiv. vi. (1848) 63.—Rossia.
asperum, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 550.—Afr. austr.
athamantoides, C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Alt. i. 342.—Sibir. altaic.
atlanticum, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 87 = *glaucum*.
bengalense, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. ii. 94 = *Oenanthe benghalensis*.
bienne, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 88; ed. II. 204 = *annuum*.
bitermatum, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 627, in syn., *sphalm.* = *tritermatum*.
Bocconi, Guss. Adnot. Cat. Pl. Boccad. (1821) 12.—Sicil.
brevicaule, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. 1 = *annuum*.
buchtormense, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. 1. (1824) 111.—Sibir.
Bunius, Vill. Prosp. 24; Hist. Pl. Dauph. ii. 586 = *Carum Bunius*.
caespitosum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 200.—Bithynia.
caffrum, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 533 = *Annesorhiza caffra* (in Addend.).
campestre, Bess. Enum. Pl. Volh. 44.—Europ. or.

SESELI:—

- cantabricum, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.* (1855) 27.—*Cf. Linnaea*, xxviii. (1856) 363.—Hispan.
 carinatum, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 461.—Europ. austr.
Carum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 215 = *Carum Carvi*.
Carvi, Spreng. in Schult. Syst. vi. 414 = *Carum Carvi*.
Carvifolia, Linn. Sp. Pl. 260 = *Selinum Carvifolia*.
carvifolium, Vill. Prosp. 24; Hist. Pl. Dauph. ii. 586 = *præc.*
cervariaefolium, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 145 = *Athamanta cervariaefolia*.
cespitosum, Spreng. in Schult. Syst. vi. 843 = *caespitosum*.
chaerophylloides, Hort. ex DC. Prod. iv. 146 = *varium*.
chaerophylloides, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51.—Afr. austr.
coloratum, Ehrh. Beitr. v. 179 = *annuum*.
condensatum, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 37.—Sibir.
connatum, Walp. Rep. ii. 402, sphalm. = *coronatum*.
coronatum, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 336.—Sibir. altaic.
corsicum, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 130; Link, Enum. Hort. Berol. i. 283 = *Carum ammoides*.
corymbosum, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 29.—As. Min.
crassifolium, Hort. ex DC. Prod. iv. 147 = *Pallasii*.
creticum, *Presl, Bot. Bemerck* 74 (Quid?).—Ins. Creta.
crithmifolium, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 962.—Archip. Graec.
cuneifolium, *Bieb. Besch. Casp.* 159; *Fl. Taur. Cauc.* i. 236.—Reg. Caucas.
curvifolium, J. F. Gmel. Syst. 489, sphalm. = *Selinum Carvifolia*.
daucifolium, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 693 = *Selinum Monnieri*.
decipiens, *Ledeb. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 467 = *varium*.
defoliatum, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 343.—Sibir. altaic.
denudatum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* i. (1844) 298.—Persia.
dichotomum, *Pall. Tabl. Taur.* 49; *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 235.—Tauria.
dioicum, Dufour, ex DC. Prod. iv. 104 = *Trinia Dufouri*.
dioicum, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 579 = *Trinia vulgaris*.
divaricatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 732 = *Musenium divaricatum*.
dubium, Schk. Handb. i. 217 = *Selinum sylvestre*.
elatum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 375; *Gouan, Illustr.* 16. t. 8.—Europ. austr.
elatum, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 467 = *osseum*.
elatum, Thuill. Fl. Par. 118 = *varium*.
Falcaria, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 208 = *Falcaria vulgaris*.
Fedtschenkoanum, *Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch.* 30.—Turkestan.
ferulaceum, Stev. ex DC. Prod. iv. 147 = *annuum*.
ferulaefolium, Poir. Encyc. vii. 135 = *Ligusticum pyrenaicum*.
filifolium, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 203.—Balkan.
filifolium, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51 = *Oenanthe filiformis*.
filiforme, Gilib. Fl. Lituan. ii. 36 = *Carum Bunius*.
foeniculifolium, Poir. Encyc. vii. 137 = *Carum copiticum*.
fragile, *Gouan, Illustr.* 15.—Europ.
Gilliesii, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 354 = *Carum copiticum*?
glabratum, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 274 = *tenuifolium*.
glabratum, Willd. ex Schult. Syst. vi. 406 (= *Rumia seseloides*).—Sibir. altaic.
glaucescens, Jord. ex Nym. Consp. 297 = *montanum*.
glaucum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 234.—Europ. austr.; Reg. Cauc.
glaucum, Jacq. Fl. Austr. ii. 27 = *osseum*.
glaucum, Lam. Fl. Fr. iii. 436 = *Trinia vulgaris*.
glaucum, Linn. Sp. Pl. 260 = *montanum*.
glaucum, Pett. ex Nym. Consp. 297 = *Tommasinii*.
globiferum, *Vis. in Flora*, xiii. (1830) 50.—Dalmatia.
Gouani, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 294 = *Pimpinella Gouani*.
gracile, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* ii. 122. t. 117.—Transsylv.
granatense, *Willk. in Bot. Zeit.* v. (1847) 431.—Hispan.
graveolens, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 340.—Rossia.

SESELI:—

- graveolens*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 215 = *Apium graveolens*.
gummiferum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 29 = *corymbosum*.
gummiferum, Less. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 273 = *Lessingianum*.
gummiferum, *Pall. ex Sm. Exot. Bot.* ii. 121.—Tauria.
Hallii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 288 = *Carum Hallii*.
Harveyanum, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 104.—Austral.
heterophyllum, *Janka, in Linnaea*, xxx. (1859–60) 572.—Europ. or.
Hippomarathrum, *Jacq. Enum. Stirp. Vindob.* 52, 224.—Europ.
Hippomarathrum, *Pall. Tabl. Taur.* 49; et ex *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 235 = *petraeum*.
hispidum, Bess. Cat. Hort. Crem. (1812); ex Schult. Syst. vi. 407 (Quid?).—Hab.?
hypoleucum, *Meissn. ex Krauss, in Flora*, xxvii. (1844) 431.—Afr. austr.
indicum, *Wight & Arn. Prod.* 371.—Ind. or.
intricatum, *Boiss. Elench.* 48.—Hispan.
inundatum, Crantz, Cl. Umb. Emend. 91 = *Apium inundatum*.
juncum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 200 = *Sclerorchorton juncum*.
Ledebourii, G. Don, Gen. Syst. iii. 308 = *S. Hippomarathrum*.
Lehmannianum, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 967.—Turkestan.
leiocarpum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 263. t. 93 = *Peucedanum leiocarpum*.
Lessingianum, *Turcz. ex Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 429.—Sibir. altaic.
leucospermum, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* i. 92. t. 89.—Hungar.
Libanotis, *Koch, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 111.—Europ.; Oriens.
libanotum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *præc.*
littorale, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 724 = *tortuosum*.
Lobelianum, Hornem. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 467 = *elatum*.
Lobelianum, *Hort. Dorpat.* (1819) ex *Schult. Syst.* vi. 407; *Bess. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 248 (Quid?).—Europ. austr.
lucanum, *Barbazita, in Atti Ist. Incorr. Nap.* vii. (1847) 34.—Italia.
lucidum, [Nutt.] Fr. Cat. (1813) n. 78, nomen; ex Nutt. Gen. Am. i. 195 = *Musenium divaricatum*.
macedonicum, *Benth. & Hook. f. ex Baill. Hist. Pl.* vii. 192.—Reg. Mediterr.
macrophyllum, *Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch.* 31.—Turkestan.
Malyi, *Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxi. (1881) 37.—Europ. austr.
Meum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 212 = *Meum athamanticum*.
Meyeri, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 956 = *Ferula Meyeri*.
montanum, Linn. Sp. Pl. 259.—Europ.
montanum, *Pall. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 274 = *tenuifolium*.
montanum, Vis. Fl. Dalm. iii. 42 = *Tommasinii*.
multicaule, *Jacq. Hort. Vindob.* ii. 59 = *montanum*.
Mutellina, Steud. Nom. ed. I. 530, 771 = *Ligusticum Mutellina*.
nanum, *Dufour, Lettres Mont. Maudit.* 363.—Mont. Pyren.
natalense, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 550.—Afr. austr.
nitidum, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 36 = *athamantoides*.
nodiflorum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 213 = *Apium nodiflorum*.
Nuttalli, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 287.—Mexic.
oligophyllum, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 359.—Macedon.
Olivieri, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* i. (1844) 298.—Persia.
osseum, *Crantz, Stirp. Austr.* ed. I. fasc. iii. 92; ed. II. 207.—Europ.
Pallasii, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 130.—Rossia.
parmassicum, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. II. vi. 80.—Graecia.
patens, *Gueldenst. Reisen*, i. 108, 190.—Cf. Schult. Syst. vi. 401 = *tortuosum*.

SESELI:—

- petraeum*, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 235.—Reg. Caucas.
peucedanifolium, Bess. Ennm. Pl. Volh. 44 = *rigidum*.
peucedanifolium, Mérat, Fl. Par. 115 = *montanum*.
pimpinelloides, Linn. Sp. Pl. 259 = *Carum rigidulum*.
pimpinelloides, Spreng. Syst. i. 885 = *Peucedanum carvifolium*.
polyphyllum, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1825) 12. n. 25.—Italia.
pratense, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 96; ed. II. 209 = *Silaua flavescens*.
proliferum, Brocchi, in Bibl. Ital. xxviii. (1822) 218 = *Trinia vulgaris*.
proliferum, Spreng. Pugill. ii. 57 = *rigidum*.
promonense, Vis. Fl. Dalmat. iii. t. 29 = *varium*.
puberulum, DC. Prod. iv. 147 = *tortuosum*.
pumilum, All. ex DC. l. c. 104 = *Trinia vulgaris*.
pumilum, Linn. Syst. ed. X. 962 = *Trinia Kitaibelii*.
purpurascens, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 177.—Balkan.
purpureum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 35 = *annuum*.
pusillum, Brot. Fl. Lusit. i. 457 = *Carum ammoides*.
pyrenaicum, Linn. Sp. Pl. 261 = *Selinum pyrenaicum*.
pyrenaicum, *Siev. in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 324 (sp. dub.).—Soongaria.
quinquefolium, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811); ex Schult. Syst. vi. 407 (Quid?).—Hab.?
radicosum, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 30 = *Olivieri*.
rigidum, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* ii. 156. t. 146.—Europ. or.
saxifragum, Linn. Sp. Pl. 261 = *Carum Bunius*.
saxifragum, Scholler, Fl. Barb. 307 = *Selinum sylvestre*.
scabriusculum, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 461 = *carinatum*.
scariosum, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 361.—Sibir. altaic.
segetum, Crantz, Cl. Umb. Emend. 91 = *Carum segetum*.
selinoides, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 130 = *Selinum sylvestre*.
selinoides, *Jacq. Enum. Stirp. Vindob.* 51, 227 = *Silaua flavescens*.
sessiliflorum, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* iii. (1845) 307.—Soongaria.
sibiricum, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 693.—Reg. Himal.
sibiricum, Garcke, Fl. Deutschl. ed. I. 139; *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 36. t. 1916; Boiss. Fl. Orient. ii. 967 = *S. Libanotis*.
Sibthorpii, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 711 (= *Libanotis Candollei*).—Europ.
simplex, Poir. Encyc. vii. 137 = *annuum*.
Sisarum, Crantz, Cl. Umb. Emend. 92 = *Sium Sisarum*.
striatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51 = *Peucedanum collinum*.
strictum, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 338.—Sibir. altaic.
stylare, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 60 = *Sclerorchorton juncum*.
Tachiroei, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* ii. 373.—Japon.
tauricum, Link, ex Spreng. Syst. i. 884 = *tortuosum*.
tenuifolium, *Ledeb. Ic. Pl. Alt.* i. t. 97.—Sibir. altaic.
tenuisectum, *Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch.* 31.—Turkestan.
teres, Moench, Meth. 88 = *elatum*.
tomentosum, *Vis. Stirp. Dalm. Rar.* 6. t. 3.—Dalmatia.
Tommasinii, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 34. t. 2045.—Dalmat.; Graec.
tortuosum, Boeber, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 275 = *campestre*.
tortuosum, Linn. Sp. Pl. 260.—Europ. austr.; As. Min.
tortuosum, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 300 = *annuum*.
tortuosum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 200 = *Johrenia graeca*.
transsilvanicum, Schur, Enum. Pl. Transs. 257 = *varium*.
trilobum, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 694.—Ind. or.
triternatum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 197 = *Peucedanum triternatum*.
Turbith, Linn. Cent. Pl. ii. 14; Amcen. Acad. iv. 310 = *Athamanta Matthioli*.
Turbith, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xx = *Carum ammoides*.

SESELI :—

vaginatum, Ledeb. Fl. Alt. i. 336.—Dahur.
varium, Trev. Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1818) 6 =
 glaucum.
venosum, Hoffm. Deutschl. Fl. 144 = *Selinum sylvestre*.
verticillatum, Crantz, Cl. Umb. Emend. 92 = *Carum*
verticillatum.
verticillatum, Desf. Fl. Atlant. i. 260 = *Carum am-*
moides.
verticillatum, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xxi. 37 = *Carum*
gracum.
vulgatum, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 279 = *Carum*
Lomatocarum.
Webbii, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 57 =
Foeniculum tortuosum.
zeylanicum, Herb. Rottl. ex C. B. Clarke, in Hook. f.
 Fl. Brit. Ind. ii. 684 = *Pimpinella Heyneanum*.

SESLERA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881)
 171 = seq.

SESLERIA, Nutt. Gen. Am. i. 64 (1818) = *Buchloë*,
 Engelm. (Gramin.).
dactyloides, Nutt. l. c. 65 = *B. dactyloides*.

SESLERIA, Scop. Fl. Carn. ed. I. 63 (1760).

GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1181.
 DIPTYCHUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 81 (1867).
 PSILATHERA, Link, Hort. Berol. i. 121 (1827).
alba, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 56. t. 72 = *argentea*.
albicans, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 216.—
 Mont. Carpat.
americana, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 296.—Am.
 bor.
Arduini, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 573 =
coerulea.
argentea, Savi, Bot. Etrusc. i. 68.—Europ. austr.; As.
 Min.
autumnalis, F. Schultz, Arch. Fl. 318 = *argentea*.
Bielzii, Griseb. in Wieg. Archiv, xxv. (1852) 361, in
 syn. = *rigida*.
Bielzii, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i.
 (1850) 109; iv. (1853) 84 = *coeruleans*.
brevifolia, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. 1813
 (1814) 269 = *coerulea*.
calcaria, Pers. Syn. i. 72 = *cocrulea*.
capitata, Schur, Enum. Pl. Transs. 743 = *coeruleans*.
caucasica, Scheele, in Flora, xxvii. (1844) 55 = *phle-*
oides.
coeruleans, Frivald. in Flora, xix. (1836) 438.—Trans-
 sylv.; Banat.
coerulea, Arduin. Animad. ii. 18. t. 6. f. 3-5.—Europ.
cristata, [Clairv.] Man. Herb. 23 = *coerulea*?
cylindrica, DC. Syn. Gall. 134; Fl. Fr. Suppl. 279 =
argentea.
disticha, Pers. Syn. i. 72 = *Oreochloa disticha*.
dura, Kunth, Rév. Gram. i. 110 = *Sclerochloa dura*.
echinata, Lam. Illustr. i. 198; Host, Gram. Austr. iii.
 6. t. 8 = *Echinaria capitata*.
elongata, Host, l. c. ii. 69. t. 97 = *argentea*.
filifolia, Heuff. ex Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv,
 xviii. (1852) 361 = *coeruleans*.
filifolia, Hoppe, in Flora, xvii. (1834) 384 = *tenuifolia*.
flexuosa, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii.
 (1852) 91 = *coeruleans*.
gracilis, Schur, l. c. iv. (1853) 84 = *tenuifolia*.
Haynaldiana, Fuss, Fl. Transs. 717 (1866) = *coeruleans*.
Haynaldiana, Schur, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,
 vi. (1856) 207 = *rigida*.
Heuffleriana, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv.
 (1853) 84.—Europ.
Heuffleriana, Schur, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vi.
 (1856) 207 = *coeruleans*.
interrupta, Vis. Fl. Dalmat. i. 87 = *tenuifolia*.
juncifolia, Suffren, Cat. Pl. Frioul, 113 = *tenuifolia*.
lagopodioides, Spreng. Pugill. ii. 22 = *Aeluropus pubes-*
cens.
leucocephala, DC. Fl. Fr. iii. 76 = *sphaerocephala*.
macrocephala, Link, Handb. i. 81, sphalm. = *microce-*
phala.
marginata, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 442 = *coeru-*
lans.
microcephala, DC. Fl. Fr. iii. 76 = *tenella*.
mollis, Spreng. Syst. i. 329 = *Triraphis mollis*.
mutica, Badaro, in Brugn. Giorn. Fis. Dec. II. vii.
 (1824) 363 = *coerulea*.
nitida, Heldr. ex Nym. Consp. 796 = *Heuffleriana*.
nitida, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 21 = *phleoides*.

SESLERIA :—

nitida, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. x. = *argentea*.
ovata, Kern. Sched. Fl. Exsicc. i. 109 = *tenella*.
pallescentis, Hartm. ex Kunth, Enum. Pl. i. 322 =
argentea.
pedemontana, Reut. in Boiss. & Reut. Pugill. 127 =
Oreochloa pedemontana.
permixta, Schur, Enum. Pl. Transs. 744 = *coeruleans*.
phleoides, Stev. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 604.—As.
 Min.; Persia.
polyathera, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 399 =
phleoides.
Pseudo-rigida, Schur, Enum. Pl. Transs. 745 =
rigida.
Pumilio, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 34 = *Triraphis*
Pumilio.
pungens, Spreng. l. c. i. 329 = *Triraphis pungens*.
quitensis, Spreng. l. c. = *Festuca quadridentata*.
rigida, Heuff. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140³.—
 Banat.
rigida, Schur, Enum. Pl. Transs. 743 = *coeruleans*.
robusta, Pavai, in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 214
 = *transilvanica*.
robusta, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 1 =
argentea.
Sadleriana, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii.
 (1882) 309; et in Termesz. Füzetek, viii. (1884) 28
 = *transilvanica*.
sphaerocephala, Arduin. Animad. ii. 20. t. 7.—Europ.
 alp.
spicata, Spreng. Pugill. ii. 21 = *Elytrophorus articu-*
latus.
subacaulis, Bal. ex Boiss. Fl. Orient. v. 566 = *Ammo-*
chloa subacaulis.
tenella, Host, Gram. Austr. ii. 71. t. 100.—Europ.
 alp.
tenella, Schur, Enum. Pl. Transs. 746 = *rigida*.
tenuifolia, Schrad. Fl. Germ. i. 272.—Europ. austr.
tenuifolia, Schur, Enum. Pl. Transs. 746 = *rigida*.
transilvanica, Schur, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,
 vi. (1856) 205.—Transsylv.
transsilvanica, Schur, Enum. Pl. Transs. 745 = *Heuf-*
leriana.
vaginalis, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. iv. 130 =
coeruleans.
vallesiaca, Beauv. ex Steud. Nom. ed. I. 339, 772 =
Festuca ovina.
variegata, [Clairv.] Man. Herb. 23 = *Koeleria setacea*.

SESEQUICELLA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862)

255 = *Callirhoe*, Nutt. (Malvac.).
alceoides, Alef. l. c. 256 = *C. alceoides*.
digitata, Alef. l. c. = *C. digitata*.
involuta, Alef. l. c. = *C. involuta*.
macrohiza, Alef. l. c. = *C. alceoides*.
Papaver, Alef. l. c. = *C. Papaver*.
pedata, Alef. l. c. = *C. pedata*.
triangulata, Alef. l. c. = *C. triangulata*.

SESSEA, Ruiz & Pav. Prod. 21. t. 33 (1794). SO-

LANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 905.
atrovirens, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 904.—Peruv.
corymbosa, Goudot, in Phil. Mag. iii. (1828) 132.—
 N. Granat.
dependens, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 9. t. 116.—
 Peruv.
Dombeyi, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 596.—Peruv.
petiolaris, Spreng. Syst. i. 584.—Peruv.
stipulata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 9. t. 115.—Peruv.
vestita, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846)
 155.—N. Granat.

SESSLERIA, Spreng. Pugill. ii. 21 (1815), sphalm. =
Sesleria, Scop. (Gramin.).

SESTINIA, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 40 (1844) = *Hyme-*
nocrater, Fisch. & Mey. (Labiata).
calycina, Boiss. l. c. 41 = *H. calycinus*.

SESTINIA, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. iii. 55 (1843)
 = *Wendlandia*, Bartl. (Rubiaceae).
ligustroides, Boiss. & Hohen. l. c. = *W. Kotschy*.

SESTOCHILOS, Breda, Orch. Kuhl & Hass. [t. 3]
 (1827) = *Bulbophyllum*, Thou. (Orchid.).
uniflorum, Breda, l. c. = *B. Lobbi*.

SESUVIUM, Linn. Syst. ed. X. 1058 (1759). FI-

COIDEAE, Benth. & Hook. f. i. 855.
 PSAMMANTHE, Hance, in Walp. Ann. ii. 659
 (1852).
 PYXIPOMA, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. ii. (1838)
 293.
acutifolium, Miq. in Hoerv. & De Vriese, Tijdschr. x.
 (1843) 75.—Guian.
brevifolium, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 233 =
S. Portulacastrum.
congense, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 586.—
 Afr. trop.
crithmoides, Welw. Apont. 586.—Afr. trop.
crystallinum, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 586.—
 Afr. trop.
digynum, Welw. ex Oliver, l. c.—Afr. trop.
Edmonstonei, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847)
 221.—Ins. Galapag.
edule, Wight, ex Wall. Cat. n. 6836 D = *S. Portula-*
castrum.
longifolium, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort.
 Berol. 521 = *S. Portulacastrum*.
mescmbrianthemoides, Wawra, in Sitzb. Akad. Wien,
 Math.-Nat. xxxviii. (1860) 564.—Afr. trop.
mesembryanthemoides, Welw. Apont. 557 = *S. Portula-*
castrum.
microphyllum, Willd. Enum. Hort. Berol. 521.—Cuba.
Ortega, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 36 =
S. Portulacastrum.
parviflorum, DC. Prod. iii. 453 = *S. Portulacastrum*.
pedunculatum, Pers. Syn. ii. 39 = *S. Portulacastrum*.
pentandrum, Ell. Sketch, i. 556 = *S. Portulacastrum*?
Portulaca, Crantz, Inst. i. 136 = seq.
Portulacastrum, Linn. Syst. ed. X. 1058.—Reg. trop.
quadrifidum, F. Muell. Rep. Babb. Exp. 9.—Austral.
repens, Willd. Enum. Hort. Berol. 521 = *S. Portula-*
castrum.
revolutifolium, Colla, ex Ces. in Atti Soc. Acc. Sc.
 Nap. v. (1873) n. vii. 10.—Reg. Argent.
revolutifolium, Ortega, Hort. Matr. Dec. 19 = *S. Portu-*
lacastrum.
revolutum, Pers. Syn. ii. 39 = *S. Portulacastrum*.
sessile, Pers. l. c. = *S. Portulacastrum*.
sessiliflorum, Domb. ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv.
 ii. 310 = *S. Portulacastrum*.
spatulatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 87 =
microphyllum.
verrucosum, Rafin. New Fl. Am. iv. 16 = *S. Portula-*
castrum?

SETACHINA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 518 (1867) =
Centaurea, Linn. (Compos.).
amara, Dulac, l. c. = *C. amara*.
Calcitrapa, Dulac, l. c. 519 = *C. Calcitrapa*.
collina, Dulac, l. c. 520 = *C. collina*.
Cyanus, Dulac, l. c. = *C. Cyanus*.
fimbriata, Dulac, l. c. 519 = *C. Jacca*.
microptilon, Dulac, l. c. = *C. nigra*.
montana, Dulac, l. c. = *C. montana*.
nigra, Dulac, l. c. = *C. nigra*.
nigrescens, Dulac, l. c. = *C. nigrescens*.
solstitialis, Dulac, l. c. 520 = *C. solstitialis*.
sylvatica, Dulac, l. c. = *C. Scabiosa*.

SETARIA, Beauv. Fl. Owar. ii. 80 (1807). GRAMI-

SETARIA:—

barbata, Kunth, Rév. Gram. i. 47 = *Panicum prostratum*.
Berteroviana, Schult. Mant. ii. 276, in obs. = *corrugata*?
biconvexa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 555.—Ins. Trinit.
brachiata, Kunth, Rév. Gram. i. 47.—Bras.
Brownii, Desv. Opusc. 81, in obs. = *Panicum gracile*.
californica, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. ed. II. (1873) 26 (sp. dub.).—Calif.
canescens, Kunth, Rév. Gram. i. 47.—Ind. or.
caudata, Roem. & Schult. Syst. ii. 495 = *setosa*.
cenchroides, Roem. & Schult. l. c. = *Pennisetum setosum*.
cernua, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 111.—Ecuador.
chlorantha, Schur, Enum. Pl. Transs. 723 = *viridis*.
chrysantha, Heynh. Nom. ii. 661 = *glauca*.
cirrosa, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 504.—Mexic.
comosa, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 468.—Ins. Philipp.
compacta, Schur, Enum. Pl. Transs. 967 (Index) = *italica*.
composita, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 111 = *macrostachya*.
compressa, Kunth, Rév. Gram. i. 46; Ennm. Pl. i. 150 = *Pennisetum compressum*.
conglomerata, Fries, ex Schlecht. in Linnaea, xxxi. (1861-62) 491.—Hab.?
corrugata, Schult. Mant. ii. 276.—Cuba.
Crus-ardeae, Kunth, Enum. Pl. i. 155 = *Panicum Crus-ardeae*.
cylindrica, Schult. Mant. ii. 277 = *setosa*.
dasyura, Hort. Hal. ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853) 463.—Ind. or.
decipiens, C. Schimp. ex Nym. Consp. 787 = *viridis*.
dioica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 19 = *Pennisetum adoëense*.
disticha, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 112 = *Panicum pilosum*.
effusa, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 504.—Mexic.
Elliotiana, Schult. Mant. ii. 279 = *Cenchrus Elliotii*.
elongata, Spreng. in Schult. l. c. 280.—Am. bor.
erubescens, Beauv. Agrost. 51; Roem. & Schult. Syst. ii. 491 = *Pennisetum erubescens*.
erythroperma, Hornem. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 29 = *italica*.
erythroperma, Spreng. Syst. i. 304 = *italica*, *viridis*?
excurrens, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 275.—Japan.
falcifolia, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 504.—Mexic.
Fieldingii, C. Muell. in Bot. Zeit. xix. (1861) 323.—Ind. or.
flava, Kunth, Rév. Gram. i. 46 = *glauca*.
flavida, Hornem. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 29 = *italica*.
floriana, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 138.—Ins. Galapag.
floribunda, Spreng. Syst. i. 305 = *verticillata*.
geniculata, Beauv. Agrost. 51; Roem. & Schult. l. c. ii. 491.—Mexic.
geniculata, Sieber, ex Kunth, Rév. Gram. i. 50 = *Pennisetum Sieberi*.
germanica, Beauv. Agrost. 51. t. 13 = *italica*.
glauca, Beauv. Agrost. 51.—Europ.; As. temp.
glauca, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 109 = *penicillata*, J. Presl.
globularis, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 314 = *italica*.
globulifera, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 307 = *Panicum globuliferum*.
gracilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 109.—N. Granat.
gracilis, Spreng. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. (1835) 226 = P. Onurus.
granosa, Desv. Opusc. 79.—Bras.
Grisebachii, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 504.—Mexic.
helvola, Roem. & Schult. Syst. ii. 491 = *glauca*.
hirsuta, Kunth, Rév. Gram. i. 47.—Ind. or.
hirta, Kunth, l. c.—Ind. or.
hirtella, Schult. Mant. ii. 276 = *Oplismenus undulatifolius*.
Hochstetteri, Kunth, in Linnaea, xix. (1847) 380.—Nubia.
humifusa, Dum. Obs. Gram. Belg. 139 = *glauca*.
imberbis, Roem. & Schult. Syst. ii. 891 = *viridis*.
impressa, Kunth, Enum. Pl. i. 154.—Bras.

SETARIA:—

intermedia, Roem. & Schult. Syst. ii. 489 = *verticillata*.
interrupta, Desv. Opusc. 80.—Bras.
italica, Beauv. Agrost. 51.—Reg. trop. et subtrop. (cult.).
italica, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 467 = *Panicum sanguinale*.
Itieri, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1849); ex Steud. Syn. Pl. Gram. 51.—Aegypt.
japonica, Pynaert, in Fl. des Serres, xiv. (1861) 7 = *italica*?
Jurgensenii, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 505.—Mexic.
lachnea, Kunth, Enum. Pl. i. 154 = *setosa*.
laevigata, Schult. Mant. ii. 275.—Am. bor.
laevis, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 505.—Mexic.
leiophylla, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. i. 154.—Bras.
lenis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 468.—Java.
leucophylla, D. Dietr. Syn. Pl. i. 293 = *Panicum leiophyllum*.
Liebmanni, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 505.—Mexic.
longicauda, Desv. Opusc. 77.—Bras.
longiflora, Desv. l. c. 81, in obs. = *Chamaeraphis paradoxa*.
longifolia, Link, Hort. Berol. i. 220.—Hab.?
longipila, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 505.—Mexic.
longiseta, Beauv. Fl. Owar. ii. 81. t. 110.—Afr. trop.
luxurians, Spreng. Syst. i. 305.—Ind. or.
macrochaeta, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 574 = *Pennisetum adoëense*.
macrochaeta, Schult. Mant. ii. 274 = *italica*.
macrochaeta, Spreng. Syst. i. 305.—Ind. or.
macrophylla, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 550.—Afr. trop.
macrostachya, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 53 = *composita*.
macrostachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 110.—As. et Austral. trop.
magna, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 554.—Ind. occ.
maritima, Roem. & Schult. Syst. ii. 492 = *italica*.
mauritanica, Spreng. l. c. i. 305 = *Panicum plicatum*.
maxima, Desv. Opusc. 78.—Bras.
megapotaamica, Spreng. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. (1835) 226 = *setosa*.
Melinis, Link, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 574 = *italica*.
Meyeri, Kunth, Rév. Gram. i. 47 = *Panicum pilosum*.
multiseta, Dum. Obs. Gram. Belg. 138 = *setosa*.
muricata, Beauv. Agrost. 51; Roem. & Schult. Syst. ii. 495 = *Panicum Crus-galli*.
nana, Dum. Obs. Gram. Belg. 139 = *viride*.
nubica, Link, Hort. Berol. i. 220 = *verticillata*.
ocreata, Spreng. Syst. i. 305.—Ind. occ.
Onurus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 555.—Am. trop.
paniculifera, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 505.—Mexic.
panis, Jessen, Deutschl. Graes. 248 = *italica*.
penicillata, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 247.—Chili.
penicillata, Nees, in Wall. Cat. n. 8640 = *glauca*, *viridis*.
penicillata, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 314.—Mexic.
Pennisetum, Roem. & Schult. Syst. ii. 494 = *Panicum pilosum*.
persica, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 29 = *italica*.
pilifera, Desv. Opusc. 81.—Am.
pilifera, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 33 = *Panicum javanicum*.
pilosa, Kunth, Rév. Gram. i. 47 = *Panicum pilosum*.
Poiretiana, Kunth, l. c.—Bras.
polygonata, Kunth, l. c. = *Panicum pilosum*.
polystachya, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 339.—Texas.
polystachya, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 277 = *macrostachya*.
Pseudo-verticillata, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 505.—Mexic.
Pseudo-verticillata, Hort. Vindob. ex Schlecht. in Linnaea, xxxi. (1861-62) 491 = *conglomerata*.
pumila, Roem. & Schult. Syst. ii. 891 = *glauca*.
pumila, Schult. Mant. ii. 274.—Hab.?
purpurascens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 110; Opiz, Boehm. Gew. (1823) 12 = *imberbis*.
purpurea, Beauv. Agrost. 51; Roem. & Schult. Syst. ii. 488.—Peruv.
pyramidata, Desv. Opusc. 78.—Am. trop.
rariflora, Mikan, ex Spreng. Neue Entdeck. ii. 78 = *setosa*.

SETARIA:—

rariflora, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 313.—Mexic.
refracta, F. Muell. Fragm. iii. 147 = *Plagiosetum refractum*.
respicens, Walp. Ann. iii. 721 = *verticillata*.
Rottleri, Spreng. Syst. i. 304 = *verticillata*.
rubicunda, Dum. Obs. Gram. Belg. 139 = *italica*.
rubiginosa, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 467.—Ins. Philipp.
sagittifolia, Walp. Ann. iii. 721.—Afr. trop.
scabrifolia, Kunth, Rév. Gram. ii. t. 212.—Bras.
scandens, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 279.—Bras.
Schiedeana, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 505.—Mexic.
Schraderi, Kunth, Rév. Gram. i. 47 = *Panicum pilosum*.
sciuroidea, C. Muell. in Bot. Zeit. xix. (1861) 316.—Ind. or.
semirugosa, Kunth, Enum. Pl. i. 152.—Mexic.
sericea, Beauv. Agrost. 51; Roem. & Schult. Syst. ii. 488.—Ind. or.
setosa, Beauv. l. c.; Roem. & Schult. l. c. 494.—Reg. trop.
stipaeulmis, C. Muell. in Bot. Zeit. xix. (1861) 323.—Bras.
streptobotrys, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 506.—Mexic.
stricta, Kunth, Rév. Gram. i. 47 = *Panicum Kunthii*.
subcordata, Kunth, l. c. = *Panicum prostratum*.
sulcata, Raddi, Agrost. Bras. 50.—Mexic.
tejucensis, Kunth, Enum. Pl. i. 150 = *glauca*.
tenacissima, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 279 = *scandens*.
tenax, Desv. Opusc. 78.—Guian.
tenella, Desv. l. c. 77.—Peruv.
Teysmanni, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 468.—Java.
tomentosa, Kunth, Rév. Gram. i. 47.—Ind. or.
Trinii, Kunth, Enum. Pl. i. 151 = *scandens*.
umbrosa, Beauv. Agrost. 51 = *Panicum prostratum*.
uniseta, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 506.—Mexic.
vaginata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 33.—Bras.
Ventenatii, Kunth, Rév. Gram. i. 251. t. 37 = *glauca*.
verticillata, Beauv. Agrost. 51.—Cosmop.
verticilliformis, Dum. Fl. Belg. 150 = *verticillatum*.
villosa, Beauv. Agrost. 51 = *viride*.
violacea, Hornem. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 29 = *italica*.
viridis, Beauv. Agrost. 51.—Cosmop.
viscidula, Desv. Opusc. 80.—Ins. Maurit.
vulpina, Beauv. Agrost. 51 = *Pennisetum cenchroides*.
vulpiseta, Raddi, Agrost. Bras. 49 = *macrostachya*.
vulpiseta, Roem. & Schult. Syst. ii. 495.—Am. trop.
Wienmanni, Roem. & Schult. l. c. 490 = *viridis*.

SETHIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 175, in nota (1821) = *Erythroxyllum*, P. Br. (Lineae).
acuminata, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. i. (1836) 324 = E. lucidum.
erythroxyloides, Wight, Illustr. i. 136 = E. lanceolatum.
indica, DC. Prod. i. 576 = E. monogynum.
Kunthiana, Wall. Cat. n. 6849 = E. Kunthianum, Kurz.
lanceolata, Wight, Illustr. i. 136 = E. lanceolatum.
magnoliaefolia, G. Don, Gen. Syst. i. 633 = E. magnoliaefolium.
microphylla, G. Don, l. c. = E. microphyllum.
oblonga, Wight, Ic. t. 97, sphalm. = *Salacia oblonga*.
obtusifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 54 = E. obtusifolium.

SEUBERTIA, Kunth, Enum. Pl. iv. 475 (1843) = *Brodiaea*, Sm. (Liliac.).
crocea, Wood, in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1868) 172 = B. crocea.
laxa, Kunth, Enum. Pl. iv. 475 = B. laxa.

SEUBERTIA, H. C. Wats. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 602 = *Bellis*, Tourn. (Compos.).
azorica, H. C. Wats. l. c. = B. azorica.

SEUTERA, Reichb. Consp. 131 (1828) = *Vince-toxicum*, Moench (Asclep.).
maritima, Decne. in DC. Prod. viii. 590 = V. palustre.

SEVADA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 154 (1849) = *Suaeda*, Forsk. (Chenop.).
Schimperi, Moq. l. c. = *Suaeda baccata*.

SEVERINIA, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1840) 3 = *Atalantia*, Correa (Rutac.).
buxifolia, Tenore, l. c. = *A. buxifolia*.

SEWERZOWIA, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 580 = *Astragalus*, Tourn. (Legumin.).
turkistanica, Regel & Schmalh. l. c. 581 = *A. Schmalhauseni*.

SEXILIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 87 (1836) = *Polygala*, Linn.
missurica, Rafin. l. c. 89 = *P. missurica*.
verticillata, Rafin. l. c. 87 = *P. verticillata*.

SEYMERIA, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 736 (1814).
SCROPHULARINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 971.
AFZELIA, J. F. Gmel. Syst. 927 (1791).
auriculata, Spreng. Syst. ii. 810 = *Gerardia auriculata*.
bipinnatisecta, Seem. Bot. Voy. Herald, 323. t. 59. — Am. bor. occ.
decurva, Benth. in DC. Prod. x. 512. — Mexic.
heterophylla, Rafin. New Fl. Am. ii. 68 = *pectinata*.
Jacksoni, Ell. Sketch, ii. 123, in obs. = *pectinata*.
macrophylla, Nutt. Gen. Am. ii. 49 — Am. bor.
pectinata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 737. — Am. bor.
pinnatifida, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 458. — Mexic.
scabra, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 118. — Texas.
tenuifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 737. — Am. bor.
virgata, Benth. in DC. Prod. x. 511. — Mexic.

SEYMOURIA, Sweet, Geran. iii. t. 206 (1830) = *Pelargonium*, L'Hérit. (Geran.).
asarifolia, Sweet, l. c. = *P. asarifolium*.
Heritieri, Sweet, l. c. sub t. 206 = *P. dipetalum*.

SGNGONIUM, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 178, err. typ. = *Syngonium*, Schott (Aroid.).

SHAKUA, Boj. Hort. Maurit. 82 (1837) = *Spondias*, Linn. (Anacard.).
excelsa, Boj. l. c. 82, nomen. — Madag.
minor, Boj. l. c. — Madag.
pubescens, Boj. l. c. = *Spondias pubescens*, Baker.

SHALLONIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266 = *Gaultheria*, Kalm (Eric.).
serrulatum, Rafin. l. c. = *G. Shallon*.

SHAWIA, Forst. Char. Gen. 95. t. 48 (1776) = *Olearia*, Moench (1802) (Compos.).
aculeata, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 174 = *O. ramulosa*.
affinis, Sch. Bip. l. c. = *O. heleophila*.
albida, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. albida*.
alpina, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. persoonioides*.
arborescens, Sch. Bip. l. c. 172 = *O. nitida*.
argophylla, Baill. Hist. Pl. viii. 299 = *O. argophylla*.
argyrophylla, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 173 = *O. argophylla*.
aspera, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. strigosa*.
avicenniaefolia, Raoul, Choix Pl. Nouv. Zél. 19. t. 13 = *O. avicenniaefolia*.
axillaris, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 172 = *O. axillaris*.
brachyglossa, Sch. Bip. l. c. = *O. axillaris*.
candidissima, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. axillaris*.
capitellata, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. axillaris*.
chrysophylla, Sch. Bip. l. c. = *O. chrysophylla*.
chrysotricha, Sch. Bip. l. c. 174 (= *Eurybia chrysotricha*). — Austral.
ciliata, Sch. Bip. l. c. = *O. ciliata*.
corymbosa, DC. Prod. vi. 264 = *O. Forsteri*.
cuneifolia, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 174 = *O. pimelioides*.
Cunninghamii, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. Cunninghamii*.
cydoniaefolia, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. cydoniaefolia*.
Dampieri, Sch. Bip. l. c. = *O. axillaris*.
decurrens, Sch. Bip. l. c. = *O. decurrens*.
dentata, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. ilicifolia*.
elaephila, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. heleophila*.
epileia, Sch. Bip. l. c. = *O. ramulosa*.
ericoides, Sch. Bip. l. c. = *O. ramulosa*.
erubescens, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. myrsinoides*.

SHAWIA:—
floribunda, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 175 = *Olearia floribunda*.
furfuracea, Raoul, ex Sch. Bip. l. c. 173 = *O. furfuracea*.
glandulosa, Sch. Bip. l. c. = *O. glandulosa*.
glutinosa, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. glutinosa*.
gracilis, Sch. Bip. l. c. (= *Eurybia gracilis*). — Austral.
Gunniana, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. stellulata*.
hygrophila, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. hygrophila*.
imbricata, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. imbricata*.
ledifolia, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. ledifolia*.
Lehmanniana, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. heleophila*.
lepidophylla, Sch. Bip. l. c. = *O. lepidophylla*.
leptophylla, Sch. Bip. l. c. 175 (= *Eurybia leptophylla*). — Austral.
linearifolia, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. axillaris*.
linifolia, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. glutinosa*.
lyrata, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. stellulata*.
microphylla, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. ramulosa*.
muricata, Sch. Bip. l. c. = *O. muricata*.
myrsinoides, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. myrsinoides*.
nummularifolia, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. nummularifolia*.
obcordata, Sch. Bip. l. c. = *O. obcordata*.
oligantha, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. axillaris*.
paniculata, Forst. Char. Gen. 95. t. 48 = *O. Forsteri*.
paucidentata, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 174 = *O. paucidentata*.
persoonioides, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. persoonioides*.
pimeleoides, Sch. Bip. l. c. = *O. pimeleoides*.
pinifolia, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. pinifolia*.
propinqua, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. ramulosa*.
ramosissima, Sch. Bip. l. c. = *O. ramosissima*.
ramulosa, Sch. Bip. l. c. = *O. ramulosa*.
rosmarinifolia, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. rosmarinifolia*.
rudis, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. rudis*.
salicina, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. stellulata*.
scabra, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. rudis*.
Solandri, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. Solandri*.
Steezii, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. heleophila*.
strigosa, Sch. Bip. l. c. = *O. strigosa*.
subrepanda, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. stellulata*.
tenuifolia, Sch. Bip. l. c. 174 = *O. tenuifolia*.
virgata, Sch. Bip. l. c. 175 = *O. virgata*.
viscosa, Sch. Bip. l. c. 173 = *O. viscosa*.

SHEADENDRON, Bertol. f. in Mem. Acc. Bologn. ii. (1850) 574. t. 40 = *Combretum*, Linn.
butyrosom, Bertol. f. l. c. 572 = *C. butyrosom*.
molle, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 76 = *C. holosericum*.
pisoniaeflorum, Klotzsch, l. c. = *C. pisoniaeflorum*.

SHEARERIA, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 227. t. 165. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 1234.
nana, S. Moore, l. c. — China.
Polii, Franch. l. c. xvi. (1878) 257. t. 198 = *nana*.

SHEFFIELDIA, Forst. Char. Gen. 17. t. 9 (1776) = *Samolus*, Linn. (Primul.).
incana, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 40. t. 54 = *Samolus repens*.
repens, Forst. Char. Gen. 18 = *Samolus repens*.

SHEPHERDIA, Nutt. Gen. Am. ii. 240 (1818).
ELAEAGNACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 204.
LEPTARGYREIA, Schlecht. in DC. Prod. xiv. 607 (1857).
argentea, Hort. ex Schlecht. in DC. Prod. xiv. 609 = *Elaeagnus argentea*.
argentea, Nutt. Gen. Am. ii. 240. — Am. bor.
canadensis, Nutt. l. c. 241. — Am. bor.
rotundifolia, Parry, in Am. Natural. ix. (1875) 350. — Am. bor. occ.

SHERARDA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 176 = *Sherardia*, Dill. (Rubiace.).

SHERARDIA, Adans. Fam. ii. 198 (1763) = *Stachytarpheta*, Vahl (Verben.).

SHERARDIA, Dill. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 151.
HEXODONTICARPUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 467 (1867).

SHERARDIA:—
arvensis, Linn. Sp. Pl. 102. — Europ.; As. temp.
erecta, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ii. 14. t. 116 = *Galium verticillatum*.
foetida, Lam. Encyc. iv. 326 = *Putoria calabrica*.
foetidissima, Cyrill. Char. Comm. (1784) 54 = *Putoria calabrica*.
fruticosa, Linn. Sp. Pl. 103 = *Hedyotis Adscensionis*.
minuta, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 727 = *Galium verticillatum*.
muralis, Linn. Sp. Pl. 103 = *Galium murale*.
muralis, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 727 = *Galium verticillatum*.
muralis, Stev. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 276 = *Galium recurvatum*.
neglecta, Guep. ex Nym. Consp. 335 = *arvensis*.
pusilla, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélo. 10. t. 16. f. 1 = *Galium Boryanum*.
umbellata, Gilib. Exercit. i. 26 = *arvensis*.

SHERBOURNIA, G. Don, in Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1323 (1855).
RUBIACEAE.
AMARALIA, Welw. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 90 (1873).
foliosa, G. Don, in Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1322. — Afr. trop.

SHOREA, Roxb. in Gaertn. f. Fruct. iii. 48. t. 186 (1805).
DIPTEROCARPEAE, Benth. & Hook. f. i. 193.
PARASHOREA, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 65.
PENTACME, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 626 (1868).
SAUL, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 84 (1834).
acuminata, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 305. — Malacca.
assamica, Dyer, l. c. 307. — Assam.
bracteolata, Dyer, l. c. 305. — Malacca.
brevipetiolaris, Thw. ex Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 205 (*Balanocarpus* sp.). — Zeylan.
camphorifera, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 616. — Sumatra.
costata, J. S. Presl, Rostl. ii. 66 = *Dryobalanops aromatica*.
Dyerii, Thw. ex Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 204. — Zeylan.
eximia, Scheff. in Flora, liii. (1870) 247; et in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 349. — Sumatra.
floribunda, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 60. — Burma.
furfuracea, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 488. — Sumatra.
gratissima, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 307. — Singapore.
Guiso, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 34. — Ins. Philipp.
Helferi, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) ii. 100. — Burma.
hypochra, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 242. — Cambodia.
laccifera, Heyne, ex Wall. Cat. n. 967 = *S. Talura*.
laurifolia, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 575 = *S. Talura*.
lepidia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 32. — Sumatra.
leprosula, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 487. — Sumatra.
leucobotrya, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 215 = *obtus*.
lissophylla, Thw. Enum. Pl. Zeylan. 402. — Zeylan.
longisperma, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 618. — Penang.
lucida, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 487. — Sumatra.
macroptera, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 308. — Malaya.
Malaanonan, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 34. — Ins. Philipp.
Mangachapoi, Blume, l. c. — Ins. Philipp.
Martiniana, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxii. (1871) 408. — Borneo.
Mayapis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 33. — Ins. Philipp.
nervosa, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, i. 119. — Burma.
nitens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 488. — Sumatra.
oblongifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 36. — Zeylan.
obtus, Wall. Cat. n. 966. — Burma.
ovalis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 33. — Borneo.
palembanica, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 487. — Sumatra.
parvifolia, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 305. — Malacca.

SHOREA:—

- penicillata*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 630 = *S. Tumbuggaia*.
Pierrei, Hance, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 302.—Cambodia.
Pinanga, Scheff. in *Flora*, liii. (1870) 247; et in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 350.—Malaya.
purpurea, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 632, sphalm. = *furfurea*.
reticulata, Thw. ex Dyer, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 307.—Zeylan.
robusta, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 628 = *floribunda*.
robusta, Gaertn. f. *Fruct.* iii. 48. t. 186.—Ind. or.
robusta, Roth, Nov. Pl. Sp. 221 = *S. Talura*.
Roxburghii, G. Don, Gen. Syst. i. 813 = *S. Talura*.
Schefferiana, Hance, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 303.—Borneo.
selanica, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 33.—Molucca.
sericea, Dyer, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 306.—Malacca.
siamensis, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 214.—Burma; Siam.
squamata, Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 193.—Malaya.
stellata, Dyer, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 304.—Burma.
stipularis, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 36.—Zeylan.
suavis, Wall.—Cf. Dyer, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 304 = *siamensis*.
sublacunosa, Scheff. in *Flora*, liii. (1870) 247; et in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 350 = *eximia*.
subpeltata, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 487.—Sumatra.
Talura, Roxb. *Hort. Beng.* [93]; *Fl. Ind.* ii. 618.—Ind. or.
trinervia, Banks, ex Gaertn. f. *Fruct.* iii. 51 = *Dipterocarpus turbinatus*.
Tumbuggaia, Roxb. *Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 617.—Ind. or.

SHORTIA, Torr. & Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* xlii. (1842) 48; et *Ser. II.* xlv. (1868) 402. *DIA-PENSIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 620.
californica, Sisley, ex Carr. *Rev. Hort.* (1883) 41, cum. fig. (Compos.).—Am. bor.
galacifolia, Torr. & Gray, in *Am. Journ. Sc.* xlii. (1842) 48.—Am. bor.
uniflora, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvi. (1871) 225.—Japon.

SHULTZIA, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 356 = **SCHULTZIA**, Rafin. = **Obolaria**, Linn. (Gentian.).

SHURIA, Hort. ex Hérincq, L'Hortic. Franç. Sér. II. ii. (1861) 159 = **Achimenes**, P. Br. (Gesner.).
mexicana, Hort. ex Hérincq, l. c.—Mexic.

SHUTEREIA, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève*. vi. (1833) 486 (Conv. Or. 103) = **Hewittia**, Wight (Convolv.).
bicolor, Choisy, l. c. = *H. bicolor*.

SHUTERIA, Wight & Arn. *Prod.* 207 (1834). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 529.
africana, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 190.—Afr. trop.
densiflora, Benth. in *Miq. Pl. Jungh.* 232 = *vestita*.
ferruginea, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 182.—Reg. Himal.
glabrata, Wight & Arn. *Prod.* 207 = *vestita*.
hirsuta, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 182.—Reg. Himal.
involuta, Wight & Arn. *Prod.* 207 = *vestita*.
rotundifolia, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. i. 221.—Java.
suffulta, Benth. in *Miq. Pl. Jungh.* 232.—Burma.
trisperma, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 51.—Japon.
vestita, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 267 = *Glycine javanica*.
vestita, Wight & Arn. *Prod.* 207.—Ind. or.

SHUTTLEWORTHIA, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 575 (1841), sphalm. = seq.

SHUTTLEWORTHIA, Meissn. *Gen.* 290 (1846) = **Verbena**, Linn.
Berterii, Meissn. *Gen. Comm.* 198 = *V. Berterii*.
Diceras, Meissn. l. c. = *V. sulphurea*.
dissecta, Walp. *Rep.* iv. 12 = *V. dissecta*.

SHUTTLEWORTHIA:—

- pulchella*, Meissn. *Gen. Comm.* 198 = *Verbena tenera*.
Ruiziana, Walp. *Rep.* iv. 12 = *V. clavata*.
Selloi, Walp. l. c. 13 = *V. erinoides*.
sulphurea, Meissn. *Gen. Comm.* 198 = *V. sulphurea*.
tenera, Walp. *Rep.* iv. 14 = *V. tenera*.

SIAGONANTHUS, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* i. 40. t. 69 (1835) = **Ornithidium**, Salisb. (Orchid.).
multicaulis, Poepp. & Endl. l. c. = *O. multicaule*.

SIAGONARRHEN, Mart. ex J. A. Schmidt, in *Mart. Fl. Bras.* viii. 146 (1858) = **Hyptis**, Jacq. (Labill.).
subcanus, Mart. ex J. A. Schmidt, l. c. = *H. leucophylla*.

SIALODES, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 329 (1835) = **Galenia**, Linn. (Ficoid.).
glauca, Eckl. & Zeyh. l. c. = *G. glauca*.

SIBALDIA, Linn. *Fl. Lapp.* 77 (1737), sphalm. = **SIBALDIA**, Linn. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

SIBANGAEA, Oliver, in *Hook. Ic. Pl.* xv. t. 1411 (1883). *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1223.
arborescens, Oliver, l. c.—Afr. trop.

SIBBALDA, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, viii. (1881) 177 = seq.

SIBBALDIA, Linn. *Sp. Pl. ed. I.* 284 (1753) = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
adpressa, Bunge, in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 428.—Sibir. altaic.
altaica, Linn. f. *Suppl.* 191 = *Chamaerhodos altaica*.
californica, Spreng. *Syst. iv. Cur. Post.* 341 = *P. multijuga*.
congesta, D. Dietr. *Syn. Pl.* ii. 1020 = *P. multijuga*.
cuneata, Hornem. *Ind. Sem. Hort. Hafn.* (1842) et (1845).—Cf. Kunze, in *Linnaea*, xx. (1847) 59; Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 44 = *P. Sibbaldi*.
erecta, Linn. *Sp. Pl.* 284 = *Chamaerhodos erecta*.
Fragariastrum, Turcz. ex *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 33 = *adpressa*.
grandiflora, Pall. ex *Schult. Syst.* vi. 770 = *Chamaerhodos grandiflora*.
octopetala, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 2 = *P. Sibbaldi*.
parviflora, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* ii. (1799) 125. t. 5. f. 2 = *P. Sibbaldi*.
polygyna, Willd. ex *Schult. Syst.* vi. 770 = *Chamaerhodos erecta*.
potentilloides, Cambess. in *Jacquem. Voy. Bot.* 54 = *P. micropetala*.
procumbens, Linn. *Sp. Pl.* 284 = *P. Sibbaldi*.
purpurea, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 208. t. 40. f. 3 = *P. purpurea*.
sabulosa, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 575 = *Chamaerhodos sabulosa*.
semiglabra, C. A. Mey. in *Beitr. Pfl. Russ. Reich.* vi. 44.—Reg. Caucas.
tetrandra, Bunge, *Verz. Suppl. Fl. Alt.* 25 = *P. tetrandra*.

SIBERTIA, Steud. *Syn. Pl. Gram.* in obs. (1855), sphalm. = **LIBERTIA**, Lej. = **Bromus**, Linn. (Gramin.).

SIBIRAEA, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 116, in obs. 213 = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
laevigata, Maxim. l. c. 215 = *Spiraea laevigata*.

SIBTHORPIA, Linn. *Diss. Chen.* 38 (1751); *Amoen. Acad.* iii. 21 (1756). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 959.
DISANDRA, Linn. f. *Suppl.* 32 (1781).
HORNEMANNIA, Benth. in *DC. Prod.* x. 428 (1846).
WILLICHIA, Mutis, ex *Linn. Mant.* ii. 553 (1771).
africana, Linn. *Sp. Pl.* 631.—Oriens.
europaea, Linn. l. c.—Europ. occ.
evolvulacea, Linn. f. *Suppl.* 288 = *Dichondra repens*.
nectarifera, Wedd. *Chlor. And.* ii. 111.—Bolivia.
parvifolia, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. ii. (1845) 25 = *pichinchensis*.
peregrina, Linn. *Sp. Pl.* 631.—Ins. Maurit.
pichinchensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 390. t. 175.—Mexic.; Andes.
pichinensis, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 575, sphalm. = *praeac*.

SIBTHORPIA:—

- pinnata*, Benth. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 288.—Nepal.
prostrata, Salisb. *Prod.* 94 = *europaea*.
retusa, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 391. t. 177 = *pichinchensis*.

SIBTORPIA, Scop. *Introd.* 178 (1777), err. typ. = *praeac*.

SIBURATIA, Thou. *Gen. Nov. Madag.* 12 (1806) = **Maesa**, Forsk. (Myrsin.).

SICANA, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 180. t. 8. *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 829.
excisa, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 112 = *Cayaponia excisa*.
odorifera, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 181.—Peruv.

SICELIUM, P. Br. *Hist. Jamaic.* 144 (1756) = **Cococypselum**, P. Br. (Rubiace.).

SICKINGIA, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 445. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 34.

ARARIBA, Mart. in *Sitzb. Akad. Muench.* (1860) 323.
cordifolia, Hook. f. in *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 34.—N. Granat.
Erythroxylon, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 446.—N. Granat.
longifolia, Willd. l. c. 447.—Venezuela.
orinocensis, Spreng. *Syst. i.* 622 = *Platycarpum orinocense*.
pisoniaeformis, Baill. *Adansonia*, xii. (1879) 307.—Bras.

SICKLERA, M. Roem. *Syn. Hesper.* 34, 49 (1846) = **Murraya**, Linn. (Rutac.).
longifolia, M. Roem. l. c. 49 = *M. longifolia*.

SICKLERA, Sendtn. in *Flora*, xxix. (1846) 194 (err. typ. 178) = **Brachistus**, Miers (Solan.).
cuspidata, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 502.—N. Granat.
solanacea, Sendtn. in *Flora*, xxix. (1846) 195 (err. typ. 179) = *B. solanaceus*.
tetrandra, A. Br. & Bouché, in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) App. 10.—Venezuela.

SICKMANNIA, Nees, in *Linnaea*, ix. (1834) 292 = **Ficinia**, Schrad. (Cyperac.).
radiata, Nees, l. c. = *F. radiata*.

SICYDIUM, Schlecht. in *Linnaea*, vii. (1832) 388; A. Gray, in *Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 194. *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 833.
TRICERATIA, A. Rich. *Ess. Fl. Cub.* 614. t. 44 (1845).

coriaceum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* iii. 906.—N. Granat.
diffusum, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 112.—Bras.
gracile, Cogn. l. c. 113. t. 36.—Bras.
Lindheimeri, A. Gray, in *Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 194 = *Maximowiczia Lindheimeri*.
monospermum, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 114. t. 36. f. 1.—Bras.
Schiedeanum, Schlecht. in *Linnaea*, vii. (1832) 388.—Bras.
tamnifolium, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* iii. 905 = *Schiedeanum*.
tenellum, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvi. (1861) 167. t. 1 A = *Maximowiczia tripartita*.
tripartitum, Naud. l. c. 166 = *Maximowiczia tripartita*.

SICYOCARPUS, Boj. *Hort. Maurit.* 214 (1837) = **Marsdenia**, R. Br. (Asclep.).
verrucosus, Boj. l. c. = *M. verrucosa*.

SICYOIDES, Tourn. ex *Medic. Phil. Bot.* i. 36 (1789) = **Sicyos**, Linn. (Cucurb.).
angulata, Medic. l. c. = *Sicyos angulata*.

SICYOMORPHA, Miers, in *Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 410. *CELASTRINEAE*.
nervosa, Miers, l. c. 412.—Peruv.
peruviana, Miers, l. c. 411.—Peruv.
pruinosa, Miers, l. c. (Hippocrateae sp.).—Panama.

SICYOS, Linn. Syst. ed. I (1735). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 837.
BADEROA, Bert. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 324.
BRYONIASTRUM, Heist. Syst. 10 (1748).
SICYOIDES, Tourn. ex Medic. Phil. Bot. i. 36 (1789).
acuta, Rafin. Fl. Ludov. 113 = *angulata*.
Andreana, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xlix. (1880) 200. — Ecuador.
angulata, Berg. Desc. Pl. Cap. 352 = *Kedrostis nana*.
angulata, Forst. f. Prod. 368 = *australis*.
angulata, Linn. Sp. Pl. 1013. — Am. bor.
australis, Endl. Prod. Fl. Norf. 67. — Ins. Norfolk.
Baderoa, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 324 = *bryoniaefolia*.
bogotensis, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 874. — N. Granat.
Bourgaeana, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. vi. (1866) 22 = *microphylla*.
bryoniaefolia, Moris, Enum. Sem. Hort. Taur. (1831); et in Mem. Acad. Torin. xxxvii. (1834) 106. t. 6. — Chili.
cucamerina, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 652. t. 82. — Ins. Sandvic.
depauperata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. vi. (1866) 23 = *parviflora*.
Deppei, G. Don, Gen. Syst. iii. 34 = *microphylla*.
edulis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 32 = *Sechium edule*.
eremocarpa, Peyr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 56 = *Echinocystis gemella*.
eremocarpa, Schau. l. c. xx. (1847) 722 = *Cyclanthera eremocarpa*.
fretensis, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 473 = *australis*.
fusiformis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 108. t. 34. — Bras.
Galeottii, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 883. — Mexic.
Garcini, Burm. f. Fl. Ind. 211 (err. typ. 311) = seq. ?
Garcini, Linn. Mant. ii. 297 = *Blastania Garcini*.
glandulosa, Poir. Encyc. vii. 155 = *Bowlesia oppositifolia*.
glandulosa, Roem. Syn. Pepon. 105 = *microphylla*.
gracillima, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 886. — Peruv.
Gunnii, Hook. f. ex Cogn. l. c. 875 = *australis*.
gymnacantha, Griseb. ex Cogn. l. c. 803 = *Echinocystis torquata*.
hederiaefolia, Walp. Rep. ii. 204 = seq.
hederifolia, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 450 = *Gynostemma hederiaefolium*.
Helleri, Peyr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 56 = *Microsechium ruderales*.
Kunthii, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 888. — Peruv.
laciniata, Descourt. Fl. Antill. v. 103 = *Sechium dule*.
laciniata, Linn. Sp. Pl. i. 1013. — Ind. occ.
laevis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 648. — Peruv.
lobata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 217 = *Echinocystis lobata*.
longisetosa, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 882. — Ecuador ?
macrocarpa, Cogn. l. c. 893. — Ecuador.
macrophylla, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 651. t. 81. — Ins. Sandvic.
malvifolia, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 147. — Reg. Argent.
Martii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 109. — Bras.
Maximowiczii, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 895. — Ins. Sandvic.
microcarpa, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 167. — Ins. Sandvic.
microphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 119. — Mexic.
montana, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 147 = *Warmingii*.
montana, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 53. t. 172. — Peruv.
muricata, Galeotti, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 839 = *Cyclanthera ribiflora*.
oregana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 542 = *Echinocystis oregana*.
oxyantha, Wall. Cat. n. 6683 = *Actinostemma tenerum*.
pachycarpa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 83. — Ins. Sandvic.
palmata, Moç. & Sesse, ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 111 = *Microsechium palmatum*.

SICYOS :—
palmatiloba, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 891. — Ecuador.
parviflora, A. Gray, Pl. Wright. ii. 62 = *laciniata*.
parviflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 119 = *Kunthii*.
parviflora, Willd. Sp. Pl. iv. 626. — Ecuador.
parvifolia, A. Gray, ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. vi. (1866) 22 = *laciniata*.
peltata, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = *Cocculus glaucescens*.
pentandra, Wall. Cat. n. 6682 = *Natsiatum herpeticum*.
polyacanthosa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 107. — Bras.
quinquelobata, Cogn. l. c. 109. — Bras.
Remyana, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 898. — Ins. Sandvic.
scaberrima, Mart. & Gal. ex Peyr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 57 = *Microsechium ruderales*.
Schimperi, Naud. in Schweinf. & Aschers. App. Beitr. Fl. Aethiop. 268 = *australis*.
subcorymbosa, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 887. — Bolivia.
trifoliata, Linn. Sp. Pl. 1013 = *Vitis acidula*.
triquetra, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 309 = *Sechiopsis triquetra*.
villosa, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 223. — Ins. Galapag.
vitifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 292 = *microphylla*.
vitifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 626. — Mexic.
Warmingii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 108. — Bras.

SICYOSPERMA, A. Gray, Pl. Wright. ii. 62 (in Smithson. Contrib. v.) (1853). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 837.
gracile, A. Gray, l. c. — N. Mexic.

SIDA, Linn. Syst. ed. I (1735). *MALVACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 203.
DIADESMA, Rafin. New Fl. Am. i. 41 (1836).
DICTYOCARPUS, Wight, in Madr. Journ. Sc. v. (1837) 309; et in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 169.
FLEISCHERIA, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 236 (1844).
LAMARKIA, Medic. Phil. Bot. i. 28 (1789).
MALVELLA, Jaub. & Spach, Illustr. v. 47. t. 444 (1855 ?).
MALVINDA, Dill. ex Medic. Malv. 23 (1787).
abscissa, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 117 = *serrata*.
abutilifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12. — Am. austr.
abutilifolia, Moench, ex Steud. Nom. ed. I. 773 = *Abutilon Avicennae*.
abutiloides, Jacq. Obs. i. 17. t. 7 = *Abutilon Jacquinii*.
abutiloides, Macfad. Fl. Jamaic. i. 86 = *Abutilon indicum*.
Abutilon, Linn. Sp. Pl. 685 = *Abutilon Avicennae*.
abyssinica, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 859 (= *Abutilonis* sp.). — Abyss.
acaulis, Cav. Ic. v. 13. t. 422. f. 2 = *Malvastrum Cavanillesii*.
acerifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 21. — Mexic.
acerifolia, Medic. Malv. 21 = *Hibiscus Solandra*.
acerifolia, Zuccagni, in Roem. Collect. 148 = *Anoda hastata*.
acrantha, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 203. — Bras.
acuminata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = *Abutilon longicuspe*.
acuminata, DC. Prod. i. 462. — Ins. S. Doming.
acuta, Burm. f. Fl. Ind. 147. — Am. centr.
acutangula, Steud. Nom. ed. II. ii. 576 = *Abutilon intermedium*.
acutifolia, Steud. l. c. — Abyss.
adscendens, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 182. — Bras.
affinis, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 285 = *spinosa*.
affinis, Spreng. Syst. iii. 121 = *Abutilon rivulare*.
africana, Beauv. Fl. Owar. ii. 87 = *cordifolia*.
aggregata, Presl, Rel. Haenk. ii. 106. — Reg. trop.
alata, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 356. — Mexic.
alba, Cav. Diss. i. 22 = *rhombifolia*.
alba, Linn. Sp. Pl. ed. II. 960 = *spinosa*.
albida, Willd. Enum. Hort. Berol. 722 = *Abutilon indicum*.
alcaeoides, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 44 = *Callirhoe alcaeoides*.
alnifolia, Linn. Sp. Pl. 684 = *spinosa*.

SIDA :—
alpestris, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 186 = *paniculata*.
althaeafolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 101 = *cordifolia*.
ambigua, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 576. — Hab. ?
americana, Linn. Sp. Pl. ed. II. 963 = *Abutilon indicum*.
amoena, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 247. — Bras.
amoena, Wall. Cat. n. 1848 = *Abutilon fruticosum*.
amoena, Weinm. in Syll. Ratisb. i. (1824) 12. — China.
amplexicaulis, Lam. Encyc. i. 7 = *Abutilon crispum*.
amplexicaulis, Vell. Fl. Flum. 279; vii. t. 21 = *Wissadula rostrata*.
amplexifolia, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 469 = *Abutilon crispum vel amplexifolium*.
amplissima, Linn. Sp. Pl. 685 (*Wissadula* sp.). — Am. trop.
angulata, Vell. Fl. Flum. 277; vii. t. 11. — Bras.
angulosa, Boj. Hort. Maurit. 34 = *Abutilon intermedium*.
angustifolia, Lam. Encyc. i. 4 = *spinosa*.
angustifolia, Medic. Beobacht. (1783) 193 (Quid ?). — Hab. ?
angustifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *rhombifolia*.
angustissima, Miq. Stirp. Surin. Sel. 102 = *linifolia*.
angustissima, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 179. — Bras.
angusturensis, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 104 = *Hibiscus affinis*.
anomala, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 177. t. 33. — Am. trop.
anthemidifolia, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 356 = *Malvastrum anthemidifolium*.
arabica, J. F. Gmel. Syst. 1049 = *supina*.
arborea, Linn. f. Suppl. 397; L'Hérit. Stirp. Nov. 131. t. 63 = *Abutilon arboreum*.
arborescens, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 60. — Bras.
Arbuscula, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 171 = *rhombifolia*.
arguta, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 206 = *verruculata*.
arguta, Presl, Rel. Haenk. ii. 106. — Mexic.
arguta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 101 = *ulmifolia*.
aristata, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 116 = *cordifolia*.
Arnottiana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857. — Chili.
Arnottiana, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 154 = *Abutilon crispum*.
Arrabidae, Steud. Nom. ed. II. ii. 576 = *truncata*.
ascendens, Auct. = *adscendens*.
asiatica, Linn. Cent. Pl. ii. 26; Amoen. Acad. iv. 324 = *Abutilon indicum*.
asiatica, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 548 = *Abutilon Sonneratianum*.
asiatica, Wall. Cat. n. 1852 D = *Abutilon muticum*.
atropurpurea, Blume, Bijdr. 77 = *Abutilon auritum*.
atropurpurea, Moris, in Mem. Acc. Torin. xxxvi. (1833) 182 (aa praec. ?). — Java.
astrosanguinea, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. t. 136 = *paniculata*.
aurantiaca, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 185. t. 35. — Bras.
aurea, G. Don, Gen. Syst. i. 497 = *Gaya aurea*.
aurea, Lodd. Bot. Cab. t. 1842 (*Abutilonis* sp.). — Ind. or.
aurita, Hornem. ex Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 73; Wall. Cat. n. 1860 = *Abutilon auritum*.
australis, Hort. Berol. ex Presl, Bot. Bemerk. 20 = *Abutilon polyandrum*.
Balbisiana, DC. Prod. i. 460 = *acuta*.
balica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 141 = *veronicaefolia*.
Bastardia, DC. Prod. i. 467 = *Bastardia viscosa*.
Bedfordiana, Hook. Bot. Mag. t. 3392 = *Abutilon Bedfordianum*.
begonioides, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 3 = *veronicaefolia*.
bella, Steud. Nom. ed. II. ii. 576 = *Abutilon elegans*.
Beloëre, L'Hérit. Stirp. Nov. 130 = *Abutilon indicum*.
Berlandieri, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 197 = *acuta* ?
Berteriana, Balb. ex DC. Prod. i. 460 = *glomerata*.
Berteriana, Spreng. Syst. iii. 110 = *acuta*.
Berthae, F. Muell. Fragm. v. 103 = *Plagianthus Berthae*.
betonicaefolia, Balb. ex DC. Prod. i. 463 = *supina*.
betonicaefolia, Pav. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 106 = *spinosa*.

SIDA :—

- betulaefolia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 576 = Malvastrum tricuspidatum.
betulaefolia, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 74.—Bras.
betulina, Hornem. Hort. Hafn. ii. 646.—Am. austr.
betulina, Lag. ex Spreng. Syst. iii. 111 = acuta.
bibracteolata, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 856 = Abutilon mexicanum.
bicallosa, Rafin. Fl. Ludov. 91 (Quid?).—Am. bor.
bicolor, Cav. Ic. iv. 6. t. 311.—Mexic.
bicuspidata, J. F. Gmel. Syst. 1050 = spinosa.
bidentata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 68 = Abutilon bidentatum.
biflora, Cav. Diss. i. 37. t. 9. f. 1 = Abutilon ibarrene? bihamata, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 54.—Bras.
biloba, Herb. Hook. ex Secm. Fl. Vit. 15.—Polynes.
bivalvis, Cav. Diss. i. 13. t. 11. f. 2 = Bastardia bivalvis.
bonariensis, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 120.—Reg. Argent.
borbonica, Cav. Diss. i. 9. t. 10. f. 2 = cordifolia.
Boriara, Wall. Cat. n. 1872 = spinosa.
borussica, Meyen, Reise, ii. 31 = Malvastrum borussicum.
brachyantha, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 858 (Anodae sp.).—Am. austr.
brachypetala, DC. Prod. i. 460 = acuta.
brachystemon, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. i. 459.—Mexic.
bracteolata, DC. Prod. i. 460 = glomerata vel Malvastrum tricuspidatum.
brasila, Schrank, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 203 = acuta.
brasiliensis, Cav. Diss. i. 37. t. 34. f. 1.—Bras.
breviflora, Steud. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 177 = urens.
brevipes, DC. Prod. i. 467 = Bastardia viscosa.
buettneriaca, Klotzsch, in Bot. Zeit. iv. (1846) 102, nomen = micrantha.
byssina, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 70 = cordifolia.
californica, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 233 = Sidalcea californica.
callifera, Griseb. Cat. Pl. Cub. 24.—Cuba.
calycina, Cav. Diss. i. 9. t. 8. f. 2 = veronicaefolia?
calyptrata, Cav. l. c. 55 = Gaya calyptrata (in Addend.).
calyxhymenia, J. Gay, in DC. Prod. i. 462.—Austral.
campestris, Benth. Pl. Hartw. 113.—Ecuador.
campi, Vell. Fl. Flum. 278; vii. t. 19 = linifolia.
canariensis, Willd. Sp. Pl. iii. 755 = rhombifolia.
candicans, DC. Prod. i. 466 = Gaya calyptrata (in Addend.).
canescens, Cav. Diss. i. 23 = rhombifolia.
capensis, Cav. l. c. t. 12. f. 3; ii. 49 = acuta?
capensis, DC. Prod. i. 461 = rhombifolia.
capensis, Eckl. & Zeyh. Enum. 40; Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 167.—Afr. austr.
capillaris, Cav. Diss. i. 10 = paniculata.
capitata, Linn. Sp. Pl. 685 = Malachra capitata.
cardanisea, Rafin. Fl. Ludov. 90 (Quid?).—Am. bor.
cardiophylla, F. Muell. Fragm. viii. 242.—Austral.
carnea, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 853 = Abutilon carneum.
carnea, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. i. 473 (Kosteletzkyae sp.).—Mexic.
carpinifolia, Bourg. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 74 = rhombifolia.
carpinifolia, Linn. f. Suppl. 307 = acuta.
carpinoides, DC. Prod. i. 461 = Malvastrum tricuspidatum.
Castelneana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 44 (Malvastrum sp.).—Reg. Argent.
caudata, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 52.—Bras.
centrata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 259 = Anoda hastata.
ceratocarpa, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 154 = Abutilon ceratocarpum.
chaetodontata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 199 = veronicaefolia.
chilensis, Spreng. Syst. iii. 109 = Cristaria betonicaefolia.
chinensis, Retz. Obs. iv. 29 = rhombifolia.
chlorophis, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 577 (Quid?).—Ind. or.
ciliaris, Linn. Syst. ed. X. 1145.—Am. bor.; Ind. occ.
ciliosa, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 19 = cordifolia.
circinata, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 119.—Bras.
cistiflora, Blume, Bijdr. 77 = Abutilon Sonneratianum?

VOL. II.

SIDA :—

- cistiflora*, L'Hérit. Stirp. Nov. 127. t. 61 = Abutilon mollissimum.
cistoides, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = Abutilon mollissimum.
clandestina, Phil. Fl. Atac. 12 (Malvastrum sp.).—Chili.
cleisocalyx, F. Muell. Fragm. x. 73.—Austral.
coccinea, DC. Prod. i. 465 = Malvastrum coccineum.
Collaei, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 853 = Abutilon elegans.
collina, Schlecht. in Linnaea, xi. (1834) 364.—Mexic.
compacta, C. Gay, Fl. Chil. i. 329 = Malvastrum compactum.
compacta, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 54.—Reg. Argent.
compressa, DC. Prod. i. 462; Wall. Cat. n. 1866 = rhombifolia.
concinna, Phil. Fl. Atac. 12.—Chili.
conferta, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 207 = cordifolia.
conferta, Salzm. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 177 = urens.
confertiflora, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 856 = Abutilon confertiflorum.
congensis, D. Dietr. l. c. 859 = urens.
contracta, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 204 = Wissadula rostrata.
corchorifolia, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1857).—Hab.?
cordifolia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 124 = Abutilon indicum.
cordifolia, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 44 = potentilloides.
cordifolia, Linn. Sp. Pl. 684.—Reg. trop.
cordilleriana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857 = Cristaria Haenkeana.
cornuta, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 724.—Am. austr.
coromandelina, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = Malvastrum tricuspidatum.
coronata, Scop. Delic. Insubr. iii. 1 = Abutilon indicum.
corrugata, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 13.—Austral.
corylifolia, Wall. Cat. n. 1865.—Burma.
corynocarpa, Wall. Cat. n. 1870 = rhombifolia.
costata, Schlecht. in Linnaea, xi. (1834) 365.—Mexic.
crassifolia, L'Hérit. Stirp. Nov. 125. t. 60 = Abutilon Jacquinii.
crenata, G. Don, Gen. Syst. i. 492.—Afr. trop.
crenatiflora, Pers. Syn. ii. 247 = Anoda parviflora?
crenatiflora, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 217 = Anoda crenatiflora.
crispa, Linn. Sp. Pl. 685 = Abutilon crispum.
crispifolia, Cav. Ic. v. 11. t. 419 (Sphaeralceae sp.).—Am. austr.
cristata, Linn. Sp. Pl. 685 = Anoda lavateroides.
cryptioperata, F. Muell. Fragm. iii. 4.—Austral.
cryptopetala, F. Muell. l. c. ii. 11 = Abutilon cryptopetalum.
cubensis, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 851 = Gaya occidentalis (in Addend.).
cuneifolia, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 165.—Texas.
cuneifolia, Roxb. Fl. Ind. iii. 170 = Schimperiana.
cuneifolia, Roxb. Hort. Beng. 50 = Melochia corchorifolia.
debilis, G. Don, Gen. Syst. i. 499 = urens.
decagyna, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 307 = cordifolia.
decipiens, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 54 = Malvastrum campanulatum.
decumbens, A. St. Hil. & Naud. l. c. 51.—Bras.
deflexa, Cav. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1803) 337 (sp. dub.).—Cuba.
delphinifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 235 = Sidalcea malvaeflora.
deltoidea, Hornem. Enum. Pl. Hort. Hafn. (1807) 36 = Anoda triangularis vel hastata.
densiflora, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 155.—Am. austr.
densiflora, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 66 = urens.
denticulata, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1833) 182 = Abutilon fruticosum.
denudata, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 100 (Anodae sp.).—Bras.
depauperata, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 232 = Abutilon depauperatum.
depressa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 69 = Malvastrum scoparium.
diantha, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 856 = Abutilon dianthum.

SIDA :—

- dictyocarpa*, F. Muell. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 103 (Plagianthi sp.).—Austral.
Diellii, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 162 = rotundifolia.
diffusa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 257.—Reg. trop.
digitata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 259 = Callirhoe digitata.
Dilleniana, Willd. Sp. Pl. iii. 764 = Anoda lavateroides.
dioica, Cav. Diss. v. 278. t. 132 = Napaea dioica.
diploscypha, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 234 = Sidalcea diploscypha.
discissa, Bertol. in Mem. Soc. Ital. Moden. xxiii. (1844) 305. t. 5 = Abutilon discissum.
discolor, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 250 = Plagianthus sidoides.
dissecta, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 235 = Malvastrum coccineum.
dissecta, Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = Cristaria dissecta.
disticha, Cav. Ic. v. 12. t. 432 = Gaya calyptrata (in Addend.).
divergens, Benth. Bot. Voy. Sulph. 69 = Wissadula divergens.
diversifolia, Spreng. Syst. iii. 116 = Hibiscus Solandra.
Dombeyana, DC. Prod. i. 463 = veronicaefolia.
Doniana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857 = Abutilon indicum.
dubia, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 50.—Bras.
dumosa, Backhouse, ex Walp. Ann. ii. 158 = Abutilon Fraseri.
dumosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 101 = pyramidata.
echinata, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 120.—Ecuador.
echinocarpa, F. Muell. Fragm. xi. 62.—Austral.
ecornis, Vell. Fl. Flum. 278; vii. t. 16 = Abutilon pauciflorum.
elata, Macfad. Fl. Jamaica. i. 87 = Abutilon giganteum.
elegans, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxv. (1831) 155 = Abutilon elegans.
elegans, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 852 = bella.
Ellioti, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 231.—Am. bor.
elliptica, Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = Abutilon ellipticum.
elongata, Blume, Bijdr. 76 = veronicaefolia.
emarginata, Willd. Sp. Pl. iii. 757 = ulmifolia.
Endlicheriana, Presl, Rel. Haenk. ii. 111 = glutinosa.
erecta, Macfad. Fl. Jamaica. i. 80 = spinosa.
eriantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = Cristaria eriantha.
erosa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 203 = ciliaris vel rhombifolia.
erubescens, Schrank, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 577 (Quid?).—Am. trop.?
esculenta, Steud. l. c. = Abutilon esculentum.
Eteromischos, Cav. Diss. ii. 55 = Abutilon indicum.
excelsior, Cav. l. c. i. 27. t. 5. f. 3 = Wissadula rostrata.
exstipularis, Cav. l. c. ii. 56. t. 14. f. 2 = Abutilon stipulare.
fallax, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 306 = rotundifolia.
fasciculata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 231 = anomala.
fasciculata, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 113 = glutinosa.
fasciculiflora, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 140 = glutinosa.
ferruginea, DC. Prod. i. 468 (Wissadulae sp.).—Peruv.
fibulifera, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 45 = corrugata.
filicaulis, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 232 = diffusa.
filiformis, A. Cunn. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 361 = corrugata.
filiformis, Jacq. Obs. Bot. ii. 23 = Abutilon crispum.
filiformis, Moric. Pl. Am. Rar. i. 10. t. 8; ex Bull. Ferrussac, xxiii. (1830) 79 = diffusa.
filipes, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 164.—Texas.
flavescens, Cav. Diss. i. 14.—Bras.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 258 = paniculata.
fluminensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = pilosa, Vell.
fluviatilis, Vell. Fl. Flum. 278; vii. t. 18 (Abutilonis sp.).—Bras.
foetida, Cav. Diss. vi. 349 = Bastardia viscosa.
foliosa, Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 340 = acuta?
Forsteri, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 182 = rhombifolia.

5 Y

SIDA:—

- fragrans*, L'Hérit. Stirp. Nov. 111. t. 53 (Bastardiae sp.).—Ins. S. Doming.
Fraseri, Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austr. 368 = *Abutilon Fraseri*.
frutescens, Cav. Diss. i. 12. t. 10. f. 1 = *acuta*.
frutescens, DC. Prod. i. 461 = *rhombifolia*.
fruticosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 18 = *Pavonia Typhalea*.
fulva, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 176 = *ciliaris*.
Garckeana, Polak. in Linnaea, xli. (1877) 551 = *acuta*.
Gaudichaudiana, G. Don, Gen. Syst. i. 497 = *Gaya Gaudichaudiana*.
Gaya, DC. Prod. i. 466 = *Gaya hermannioides*.
geminiflora, DC. l. c. 470 = *Abutilon ibarrense*.
geniculata, Roxb. Hort. Beng. 50, nomen.—'Am.'
geraniifolia, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857 = *Cristaria geraniifolia*.
geranioides, DC. Prod. i. 474 = *Abutilon geranioides*.
Ghisbreghtiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 200 = *Lindeniana*.
gigantea, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 8. t. 141 = *Abutilon giganteum*.
glabra, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 14 = *ulmifolia*.
glabra, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 90 = *acuta*.
glandulifera, Benth. Bot. Voy. Sulph. 69 = *pyramidata*.
glandulosa, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 58 = *spinosa*.
glaucula, Cav. Ic. i. 8. t. 11 = *Abutilon muticum*.
glaucophylla, Spreng. Syst. iii. 109 = *Cristaria glaucophylla*.
glechomaefolia, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 852 = *Abutilon glechomaefolium*.
globiflora, Hook. Bot. Mag. t. 2821 (*Abutilonis* sp.).—Ins. Maurit.
glochidiata, Regel, in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 338.—As. temp.
glomerata, Cav. Diss. i. 18. t. 2. f. 6.—Am. trop.
glutinosa, Cav. l. c. 16. t. 2. f. 8; Roxb. Hort. Beng. [97]; Fl. Ind. iii. 172.—Am. et As. trop.; Ins. Mascar.
gracilis, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = *Abutilon fruticosum*.
gracilis, Ell. Sketch, ii. 159 = *Elliotii*.
gracilis, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 111.—Ind. occ.
gracilis, Salisb. Prod. 382 = *Abutilon crispum*.
graminifolia, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 111.—Guian.
grandiflora, Poir. Encyc. Suppl. i. 31 = *Abutilon arboreum*.
grandiflora, Walp. Ann. i. 103 = *Malva grandiflora*.
grandifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 724 = *Abutilon mollissimum*.
graveolens, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 179 = *Abutilon graveolens*.
Greveana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 504 = *Abutilon intermedium*.
Grevilliana, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 154 = *Abutilon Grevillianum*.
grewioides, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 71.—Ind. bor. occ.; Afr. trop.
grossulariaefolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 326 = *Malvastrum coccineum*.
Guichenotiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = *Abutilon Guichenotianum*.
Guilleminiana, Steud. l. c. = *Abutilon indicum*?
guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 307 = *Abutilon asiaticum*?
Haenkeana, Presl, Rel. Haenk. ii. 104 = *rhombifolia*.
hamulosa, Salzmann, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 76 = *cordifolia*.
hastata, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 190. t. 34. f. 2.—Bras.
hastata, Sims, Bot. Mag. t. 1541 = *acerifolia*.
hastata, Willd. Sp. Pl. iii. 763 = *Anoda hastata*.
hederacea, Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. iv. (1849) 23 = *obliqua*.
hederaceifolia, Cav. Diss. i. 8. t. 9. f. 3 = *veronicaefolia*.
herbacea, Cav. l. c. 19. t. 13. f. 1 = *cordifolia*.
hermanniaefolia, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 117.—Mexic.
hermannioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 258 = *jamaicensis*.
hernandioides, L'Hérit. Stirp. Nov. 121. t. 58 = *Wissadula rostrata*.

SIDA:—

- heterocarpa*, Engelm. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 163 = *spinosa*.
heterophylla, Cav. Ic. v. 12. t. 421 = *Cristaria heterophylla*.
heterophylla, Klein, ex Spreng. Syst. iii. 116 = *Hibiscus Solandra*.
heterosperma, Hochst. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 182 = *Wissadula rostrata*.
heterosperma, Vis. in Linnaea, xvi. (1842) Litt. 113.—Afr. bor.
heterotricha, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 171 = *Abutilon timoriense*.
hibisciformis, Bertol. Fl. Guatim. 28.—Guatemala.
Hilaireana, Steud. Nom. ed. II. ii. 577 = *Abutilon carneum*.
Hilariana, Presl, Rel. Haenk. ii. 107 = *pyramidata*.
Hilariana, Walp. Rep. i. 317 = *prostrata vel flavescens*.
hirsuta, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9.—Hab.?
hirsuta, Vell. Fl. Flum. 279; vii. t. 20 = *megalantha*.
hirsutissima, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 850 (Bastardiae sp.).—Mexic.
hirsutissima, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11 = *glomerata*.
hirta, Lam. Encyc. i. 7 = *Abutilon hirtum*.
hirta, Wall. Cat. n. 1852 B, 1858 G = *Abutilon graveolens*.
hirta, Wall. Cat. n. 1855 = *glutinosa*.
hispida, Bert. ex DC. Prod. i. 463 = *supina*.
hispida, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 452 = *Malvastrum angustum*.
Hoheri, Hook. Ic. Pl. sub t. 565-566 = *Hoheria populnea*.
holosericea, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 112 = *cordifolia*.
hondensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 260 = *rhombifolia*.
Hookeri, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 856 = *Abutilon albidum*.
Hookeri, Steud. Nom. ed. II. ii. 578.—Chili.
Hookeriana, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 242.—Austral.
Hulseana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 233 = *Abutilon Hulseanum*.
Humboldtii, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 848 = *paniculata*.
humilis, Cav. Diss. v. 277 = *veronicaefolia*.
humillima, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 12 = *corrugata*.
hyssopifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 109 = *spinosa*.
ibarrensis, DC. Prod. i. 470 = *Abutilon ibarrense*.
imberbis, DC. l. c. 469 = *Abutilon crispum*.
inaequalis, Link & Otto, Ic. Pl. Sel. 75. t. 34 (*Abutilonis* sp.).—Bras.
incana, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 204 = *Abutilon incanum*.
incarnata, Spreng. Syst. iii. 115 = *Anoda punicea*.
incerta, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 51 = *rhombifolia*?
inclusa, Benth. Fl. Austral. i. 197.—Austral.
indica, Cav. Diss. i. 33. t. 7. f. 10 = *Abutilon crispum*.
indica, Linn. Cent. Pl. ii. 26; Amoen. Acad. iv. 323 = *Abutilon indicum*.
integerrima, Hook. Bot. Mag. t. 4360 = *Abutilon integrum*.
integrifolia, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 183 (*Abutilonis* sp.).—N. Caled.
intermedia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 188. t. 34. f. 1 = *macrodon*.
interrupta, Balb. ex DC. Prod. i. 464.—Am. trop.
interstans, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 383 = *corrugata*.
intricata, F. Muell. ex Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 12.—Austral.
involuta, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 162 = *anomala*.
Jacquini, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 855 = *Abutilon Jacquini*.
jamaicensis, Linn. Syst. ed. X. 1145.—Am. trop.
jamaicensis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *Malvastrum tricuspidatum*.
jamaicensis, Vell. Fl. Flum. vii. t. 10 = *acuta*.
jatrophioides, L'Hérit. Stirp. Nov. 117. t. 56.—Peruv.
javensis, Cav. Diss. i. 10 = *veronicaefolia*.
Julianae, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Abutilon Julianae*.
juncea, Banks & Soland. ex Steud. Nom. ed. I. 774; ed. II. ii. 578.—Hab.?
Jussiacana, DC. Prod. i. 463 = *veronicaefolia*.

SIDA:—

- Keerlena*, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Abutilon floribundum*.
Kohautiana, Walp. Rep. i. 320 = *rhombifolia*.
Kotschyi, Hochst. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 188 = *Abutilon fruticosum*.
Kunthiana, Presl, Rel. Haenk. ii. 106.—Mexic.
lanceolata, Retz. Obs. iv. 28 = *acuta*.
lasiolepta, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 20 = *Abutilon crispum*.
Lawrenciana, F. Muell. Vict. Pl. i. 162 = *Plagianthus spicatus*.
laxiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Wissadula rostrata*.
leiophloia, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 241 = *Hookeriana*.
leiophylla, Spreng. Syst. iii. 121.—Porto Rico.
lepida, F. Muell. Fragm. vi. 168.—Austral.
lepidota, A. Gray, Pl. Wright. i. 18; ii. 21.—N. Mexic.
Leschenaultiana, DC. Prod. i. 468 = *Wissadula rostrata*.
leucanthema, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 852 = *Abutilon leucanthemum*.
leucopetala, F. Muell. Fragm. ii. 12 = *Abutilon leucopetalum*.
lignosa, Cav. Diss. i. 28. t. 6. f. 2 = *Abutilon Jacquini*.
Lindeniana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 200.—Mexic.
Lindheimeri, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 213.—Texas.
linearifolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 180.—Bras.
linearifolia, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 303 = *linifolia*.
linearis, Cav. Ic. iv. 6. t. 312. f. 1 = *spinosa*.
lineata, Vell. Fl. Flum. 280; vii. t. 25 (*Abutilonis* sp.).—Bras.
linifolia, Cav. Diss. i. 14. t. 2. f. 1.—Am. et Afr. trop.
Loucheitis, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 50 = *rhombifolia*.
longicuspid, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 69 = *Abutilon longicuspe*.
longipes, A. Gray, Pl. Wright. i. 19; ii. 21.—N. Mexic.
longipes, Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 167 = *rhombifolia*.
longipes, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222 = *capensis*.
Luciana, DC. Prod. i. 468 = *Wissadula rostrata*.
Luschnathiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 578.—Bras.
macrantha, Steud. l. c. = *Abutilon macranthum*.
macrodon, DC. Prod. i. 464.—Bras.
macrophylla, Hilsenb. & Boj. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 504 = *Abutilon intermedium*.
macrophylla, Wall. Cat. n. 1851 D = *Abutilon polyandrum*.
macropoda, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 193.—Austral.
macropodon, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Abutilon macropodum*.
macrotrisa, James, in Long's Exped. ii. 121 = *Callirhoe alcaeoides*.
macrostipula, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 171 = *Abutilon Guichenotianum*.
maculata, Bert. ex DC. Prod. i. 463 = *acuminata*.
maculata, Cav. Diss. i. 20. t. 3. f. 7 = *cordifolia*.
maderensis, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 35 = *rhombifolia*.
Magdaleneae, DC. Prod. i. 467 = *Bastardia viscosa*.
malacophylla, Link & Otto, Ic. Pl. Sel. 67. t. 30 = *Pavonia velutina*.
malvacea, Vell. Fl. Flum. 277; vii. t. 13 = *Pavonia sepium*.
malvaeflora, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 326 = *Sidalcea malvaeflora*.
malvaeflora, Lindl. in Bot. Reg. t. 1036 = *Sidalcea campestris*.
malvaeflora, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 474 = *Sidalcea malvaeflora*.
Malvaviscus, [Moç. & Sesse,] ex DC. l. c. 459 = *Anoda punicea*.
maritima, Miq. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 79 = *Plagianthus spicatus*.
Martiana, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 187 = *aurantiaca*.
Mathewsii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 565 = *veronicaefolia vel Melochia pyramidata*.
maura, Endl. Fl. Suedeseinseln, 182.—Ins. Marian.
mauritanica, Jacq. Misc. ii. 352 = *Abutilon Avicennae*.
megalantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 (*Abutilonis* sp.).—Bras.
megalorrhiza, Phil. Fl. Atac. 11 (*Malvastris* sp.).—Chili.

SIDA:—

- megapotamica*, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 19 = *Abutilon megapotamicum*.
Mendanha, Vell. Fl. Flum. 279; vii. t. 23 (*Abutilonis* sp.?).—Bras.
meridionalis, Salisb. Prod. 382 = *Abutilon indicum*.
mexicana, Scop. Delic. Insubr. i. 22.—Mexic.
Meyeniana, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 307.—Ins. Sandvic.
micans, Cav. Diss. i. 19. t. 3. f. 1 = *cordifolia*.
micrantha, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 190.—Bras.
micrantha, Schrank, in Syll. Ratish. ii. (1828) 72 (sp. diversa).—Bras.
microphylla, Cav. Diss. i. 22. t. 12. f. 2 = *rhombifolia*.
microphylla, DC. Prod. i. 461.—Ind. or.; Polynes.
microsperma, Cav. Diss. i. 29. t. 13. f. 4 = *Abutilon microspermum*.
Milleri, DC. Prod. i. 472 = *spinosa vel rhombifolia*.
minor, Macfad. Fl. Jamaic. i. 79 = *spinosa*.
Migneliana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 259.—Bras.
Mociniana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 858 (*Kosteletzkya* sp.).—Mexic.
modesta, Phil. Fl. Atac. 12 (*Malvastris* sp.).—Chili.
mollicoma, Willd. Enum. Hort. Berol. 725 = *Abutilon mollicomum*.
mollis, Herb. Banks, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 76 = *cordifolia*.
mollis, Orteg. Hort. Matr. Dec. 65 = *Abutilon molle*.
mollis, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 111 = *glomerata*.
molissima, Cav. Diss. ii. 49. t. 14. f. 1 = *Abutilon molissimum*.
montana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 854 = *Abutilon montanum*.
montana, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 56 = *Abutilon crispum*.
morifolia, Cav. Diss. i. 9. t. 1. f. 1 = *veronicaefolia*.
mucronulata, DC. Prod. i. 461 = *Malvastrum tricuspidatum*.
multicaulis, Cav. Diss. i. 10. t. 1. f. 6 = *veronicaefolia*.
multifida, Cav. l. c. i. 25 = *Cristaria multifida*.
multiflora, Cav. l. c. 18. t. 3. f. 3 = *cordifolia*.
multiflora, Jacq. Obs. Bot. ii. 23 = *paniculata*.
multiflora, Pers. Syn. ii. 243 = *Wissadula nudiflora*.
muricata, Cav. Ic. vi. 78. t. 597. f. 2 = *ciliaris*.
mutica, Delile, Illustr. Fl. Egypt. 60. n. 45 = *Abutilon muticum*.
myriantha, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 179.—N. Granat.
mysorensis, Herb. Madr. ex Wight & Arn. Prod. 59 = *glutinosa*.
Napaea, Cav. Diss. v. 277. t. 132. f. 1 = *Napaea dioica*.
neelgerrensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Abutilon neilgherrense*.
neglecta, Passerini, Select. Sem. Hort. Parmen. (1847).—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 180.—Hab.?
nematopoda, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 382 = *corrugata*.
nemoralis, G. Don, Gen. Syst. i. 497 = *Abutilon crispum*.
nervosa, DC. Prod. i. 465 = *glutinosa*.
nervosa, Wall. Cat. n. 1853 = *veronicaefolia*.
nubigena, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 307 (*Malvastris* sp.).—Peruv.; Bolivia.
nudiflora, L'Hérit. Stirp. Nov. 123. t. 59 = *Wissadula nudiflora*.
nutans, L'Hérit. l. c. 119^{bis}, t. 57 = *Gaya calyptata* (in Addend.).
obliqua, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 462 = *bicolor*.
obliqua, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 233.—Am. bor.
obovata, Wall. Cat. n. 1864 = *rhombifolia*.
obtus, Cav. Diss. i. 34. t. 9. f. 2 = *Abutilon umbellatum*.
obtus, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 161 = *acuta*.
occidentalis, Linn. Cent. Pl. ii. 26; Amoen. Acad. iv. 324 = *Gaya occidentalis* (in Addend.).
oculata, Lowe, Fl. Mader. 592.—Ins. Canar.
olens, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 1874 = *glutinosa*.
oligophylla, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 858 (*Hibisci* sp.).—Ins. Timor.
olyantha, D. Dietr. l. c. 854 (*Abutilonis* sp.?).—Bras.
opaca, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 19 = *Pavonia hastata*.

SIDA:—

- orbiculata*, DC. Prod. i. 471 = *Abutilon indicum*.
oregana, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 234 = *Sidalcea malvaeflora*.
orientalis, Cav. Diss. i. 21. t. 12. f. 1 = *rhombifolia*.
orientalis, DC. Prod. i. 461 = *acuta*.
Ortega, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Anoda crenatiflora*.
ostreaefolia, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 49 = *rhombifolia*.
ovalis, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. v. 1867.—Pernv.
ovata, Cav. Diss. vi. 350 = *supina*.
ovata, G. Don, Gen. Syst. i. 492 = *acuta*.
ovata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 124.—Arab.
oxycarpa, F. Muell. Fragm. ii. 12 = *Abutilon oxycarpum*.
oxyphylla, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 465 (*Abutilonis* sp.).—Mexic.
oxyphylla, Wall. Cat. n. 1850 = *Abutilon polyandrum*.
paoniaeflora, Hook. Bot. Mag. t. 4170 = *Abutilon paoniaeflorum*.
palmata, Cav. Diss. i. 20.—Peruv.
palmata, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. t. 547 = *jatrochoides*.
palmata, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 472 = *acrifolia*.
paniculata, Linn. Syst. ed. X. 1145.—Am. trop.
paniculata, Salzm. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 187 = *Wissadula hirsuta*.
pannosa, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = *Abutilon glaucum*.
pannosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 565 = *glutinosa*.
parassiaefolia, Hook. Ic. Pl. t. 385 = *Malvastrum parassiaefolium*.
parviflora, Willd. Enum. Hort. Berol. 726 = *Anoda parviflora*.
parvifolia, DC. Prod. i. 461 = *microphylla*.
patens, Andr. Bot. Rep. t. 571 (*Abutilonis* sp.?).—Abyss.
patens, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 851 (*Wissadulae* sp.).—Bras.
patula, Pers. Syn. ii. 243 = *glomerata*.
pauciflora, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 851 = *Wissadula hirsuta*.
paucifolia, DC. Prod. i. 472 (*Hibisci* sp.).—Ins. Timor.
pedata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 259 = *Callirhoe digitata*.
pedicularifolia, Meyen, Reise, i. 460 = *Malvastrum pediculariaefolium*.
peduncularis, DC. Prod. i. 469 = *Abutilon pedunculare*.
pedunculata, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. i. 193 = *corrugata*.
pellita, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 263 = *cordifolia*.
pellita, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 115 = *paniculata*.
pentacarpos, Roxb. ex Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 78 (*Abutilonis* sp.).—Ind. or.
periplocifolia, Linn. Sp. Pl. 684 = *Wissadula rostrata*.
periplocifolia, Macfad. Fl. Jamaic. i. 85 = *Wissadula divergens*.
periptera, Sims, Bot. Mag. t. 1644 = *Anoda punicea*.
permollis, Willd. Enum. Hort. Berol. 728 = *Abutilon permolle*.
permutata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 67.—Abyss.
Perrottetiana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 855 = *Abutilon fruticosum*.
persica, Burm. ex Cav. Diss. i. 35 = *Abutilon polyandrum*.
peruviana, Cav. l. c. 36 = *Abutilon arborenm*.
petiolaris, DC. Prod. i. 470 = *Abutilon petiolare*.
petrophila, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 381.—Austral.
phaeotricha, F. Muell. l. c. 382 = *virgata*.
philippica, DC. Prod. i. 463 = *rhombifolia*.
phlebococca, Griseb. Cat. Pl. Cub. 25 = *micrantha*.
phyllanthos, Cav. Diss. v. 276. t. 127. f. 4 = *Malvastrum phyllanthos*.
physaloides, Presl, Rel. Haenk. ii. 105 = *macrodon*.
physocalyx, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 163 = *hastata*.
physocalyx, F. Muell. Fragm. iii. 3.—Austral.
pichinchensis, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 115 = *Malvastrum pichinchense*.
picta, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 154 = *Abutilon striatum*.
pilosa, Cav. Diss. i. 9. t. 8 = *supina vel veronicaefolia*.
pilosa, L'Hérit. Stirp. Nov. 130 = *Abutilon graveolens*.

SIDA:—

- pilosa*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 17 = *Melochia venosa*.
pilosa, Retz. Obs. ii. 23 = *veronicaefolia*.
pilosa, Vell. Fl. Flum. 280; vii. t. 26 (*Abutilonis* sp.).—Bras.
pimpinellifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *spinosa*.
pinnata, Cav. Ic. v. 13. t. 422. f. 1 = *Malvastrum pinnatum*.
planicaulis, Cav. Diss. i. 24. t. 3 = *Malvastrum tricuspidatum*.
planicaulis, DC. Prod. i. 461 = *acuta*.
planiflora, Cav. Diss. i. 32. t. 7. f. 4 = *Abutilon Avicennae*.
platycalyx, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 197.—Austral.
pleiantha, F. Muell. ex Benth. l. c. 195.—Austral.
plumosa, Cav. Diss. i. 7 = *ciliaris*.
Pohlana, Presl, Rel. Haenk. ii. 108.—Peruv.
polyandra, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 173 = *Abutilon polyandrum*.
polyantha, Schlecht. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 204 = *Wissadula rostrata*.
polycarpa, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 855 = *Abutilon indicum*.
polycarpa, C. Sm. in Tuckey, Congo, 250 = *Abutilon muticum*.
polystachia, Vell. Fl. Flum. 279; vii. t. 22 = *Abutilon ramiflorum*, *Wissadula rostrata*.
populifolia, Lam. Encyc. i. 7 = *Abutilon indicum*.
portoricensis, Spreng. Syst. iii. 114.—Porto Rico.
potentilloides, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 178.—Bras.
Presliana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 856 = *Abutilon Haenkeanum*.
procumbens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 101 = *supina*.
prostrata, Cav. Diss. i. 13 = *flavescens*.
prostrata, G. Don, Gen. Syst. i. 490 = *acuta*.
Pseudo-abutilon, Desf. ex Steud. Nom. ed. I. 774; ed. II. ii. 579.—Hab.?
pterosperma, L'Hérit. Stirp. Nov. 119. t. 57 = *Cristaria multifida*.
pubescens, Cav. Diss. i. 33. t. 7. f. 6 = *Abutilon indicum*.
pulchella, Willd. Enum. Hort. Berol. 724; Bonpl. Desc. Pl. Rar. Malm. 5. t. 2 = *Plagianthus pulchellus*.
pulcherrima, Hort. Turic. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 579 (Quid?).—Hab.?
pulchra, Bert. ex Colla, Hort. Rip. 129. t. 34 (*Abutilonis* sp.).—Ecuador.
pungens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 263 = *cordifolia*.
purpurascens, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 206 = *Abutilon esculentum*.
purpurea, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 239 (*Kosteletzkya* sp.?).—Porto Rico.
pusilla, Cav. Diss. i. 6. t. 1. f. 4; v. 127. f. 1 = *spinosa*.
pygmaea, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 238 = *Malvastrum pygmaeum*.
pyramidata, Cav. Diss. ii. 11. t. 1. f. 10; vi. t. 194. f. 1.—Ind. occ.
quaternata, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 60; et in Syll. Ratish. ii. (1823) 73.—Bras.
quinqueangulata, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857 = *seq.*
quinqueloba, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 459 = *Anoda hastata*.
quinenervia, Duchass. ex Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 176.—Panama.
racemiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Abutilon racemosum*.
racemosa, Burm. f. Fl. Ind. 148 = *glutinosa*.
racemosa, Vell. Fl. Flum. 278; vii. t. 15 = *Wissadula rostrata*.
radiata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 965 = *Malachra radiata*.
radicans, Cav. Diss. i. 8 = *veronicaefolia*.
radiciflora, Presl, Rel. Haenk. ii. 104 (*Malvastris* sp.).—Peruv.
ramiflora, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 852 = *Abutilon ramiflorum*.
ramosa, Cav. Diss. i. 28. t. 6. f. 1 = *Abutilon ramosum*.
ramosa, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 120 = *diffusa*.
ramosissima, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 853 = *Abutilon ramosissimum*.
recisa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 203 = *rhombifolia*.
reclinans, Kunze, in *Linnaea*, xvii. (1843) 579 = *veronicaefolia*.

SIDA:—

- reflexa*, Cav. Diss. i. 36. t. 7; vi. t. 195. f. 1 = *Abutilon reflexum*.
Regelii, Hort. ex Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. 95, nomen. —Hab. ?
repanda, Roth, Nov. Pl. Sp. 328 = *acuta*.
repens, Cav. Diss. i. 7 = *veronicaefolia*.
reticulata, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 60; et in Syll. Ratisb. ii. (1828) 72 (*Wissadula* sp.).—Bras.
retrofracta, DC. Prod. i. 467 = *Bastardia viscosa*.
retrorsa, L'Hérit. Stirp. Nov. 133. t. 64 = *Abutilon reflexum*.
retusa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 961 = *rhombifolia*.
retusa, Wight, ex Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 323 = *spinosa*.
retusifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 527 = *rhombifolia*.
Retzii, J. F. Gmel. Syst. 1042 = *veronicaefolia*.
rhombifolia, Linn. Sp. Pl. 684.—Amphig. trop.
rhomboidea, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 178 = *rhombifolia*.
ribifolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 183. t. 34.—Bras.
Ricini, Spreng. Syst. iii. 116 = *palmata*.
ricinoides, L'Hérit. Stirp. Nov. 115. t. 55 = *palmata*.
rigida, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 856 = *Abutilon rigidum*.
riparia, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 65 = *rhombifolia*.
rivularis, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 854 = *Abutilon rivulare*.
rosea, Link & Otto, Ic. Pl. Sel. 71. t. 32 = *Abutilon esculentum*.
rostrata, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 306 = *Wissadula rostrata*.
rosula, Meyen, ex Wedd. Chlor. And. ii. 278 = *Malvastrum borussicum*.
rotundifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 79.—Ins. Sandvic.
rotundifolia, Lam. Encyc. i. 5 = *cordifolia*.
rotundifolia, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 145.—Java.
rubifolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 183.—Bras.
rubra, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 848 = *micrantha*.
rubra, Tenore, Cat. Ort. Nap. (1813) 96 = *Anoda punicea*.
runderata, Macfad. Fl. Jamaica. i. 80 = *rhombifolia*.
rufescens, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 185 = *urens* ?
rufinervis, Steud. Nom. ed. II. ii. 578 = *Abutilon rufinerve*.
rugosa, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 304 = *acuta*.
rupestris, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 241 = *Hoo-keriana*.
sabeana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862), 449 = *Melochia pyramidata*.
salicifolia, Forst. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 158 = *microphylla*.
Saltii, Steud. Nom. ed. II. ii. 579.—Abyss.
salviaefolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 110 = *rhombifolia vel spinosa*.
Saxifraga, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 116 = *Malvastrum phyllanthos*.
scabra, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 305 = *spinosa*.
scabrida, Wight & Arn. Prod. 57 = *rhombifolia*.
Schimperiana, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 66.—Ind. or; Afr. trop.
Schlechtendahlia, Steud. Nom. ed. II. ii. 579 = *Abutilon erosum*.
Schmitzii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 565.—Mexic.
Schrankii, DC. Prod. i. 472 = *acuta*.
scoparia, Lour. Fl. Cochinch. 414 = *acuta*.
scoparia, Vell. Fl. Flum. 277; vii. t. 12 = *rhombifolia*.
Sellowiana, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iv. (1836) 9 = *Abutilon Sellowianum*.
semicrenata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 202 = *rhombifolia*.
semidentata, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 51.—Bras.
sericea, Cav. Desc. 165 = *Abutilon mollicomum*.
sericea, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = *jamaicensis*.
serrata, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 111.—Venezuela.
sertum, Nutt. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 163 = *rotundifolia*.
Sessei, Lag. Gen. et Sp. Nov. 21 (*Abutilonis* sp.).—Mexic.

SIDA:—

- sessiliflora*, G. Don, Gen. Syst. i. 499 = *urens*.
sessiliflora, Hook. Bot. Mag. t. 2857 = *Abutilon crispum*.
sessilis, Vell. Fl. Flum. 280; vii. t. 27 = *Abutilon crispum*.
setifera, Presl, Rel. Haenk. ii. 105.—Mexic.
Sherardiana, Benth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 101, in obs.—Europ. austr.; Oriens.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 1048 = *chinensis*.
Sonneratiana, Cav. Diss. i. 29. t. 6. f. 4 = *Abutilon Sonneratianum*.
sordida, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 120 = *Bastardia viscosa*.
sparmannioides, Steud. Nom. ed. II. ii. 579 = *Abutilon ramosum*.
speciosa, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 119 = *Abutilon esculentum*.
Spenceriana, F. Muell. in Wing's South. Sc. Record (April 1885).—Austral.
spicata, Cav. Diss. i. 24. t. 8. f. 1 = *Gaya occidentalis* (in Addend.).
spiciflora, DC. Prod. i. 468 = *Wissadula spicata*.
spinifex, [Mog. & Sesse], ex DC. Prod. i. 472 = *acerifolia*.
spinosa, Linn. Sp. Pl. 683.—Amphig. trop.
spinosa, E. Mey. ex C. Muell. in Walp. Ann. vii. 394 = *capensis*.
spiraefolia, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 49 = *acuta*.
spodochroma, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 383 = *corrugata*.
Stauntoniana, DC. Prod. i. 460 = *acuta*.
stellata, Cav. Diss. i. 27 = *Wissadula rostrata*.
stellata, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 171 = *Sphaeralcea angustifolia*.
Steudelii, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857 (*Cristariae* sp.).—Chili.
stipularis, D. Dietr. i. c. 855 = *Abutilon auritum*.
stipulata, Cav. Diss. i. 22. t. 3. f. 10 = *acuta*.
stipulata, Chapm. Fl. S. U. St. 55 = *rhombifolia*.
stolonifera, Salzm. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 199 = *decumbens*.
striata, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 852 = *Abutilon striatum*.
stylosa, Baxt. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 673, nomen (Quid ?).—Sibir. altaic.
subcordata, Span. in Linnaea, xv. (1841) 172.—Ins. Timor.
subcuneata, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 184.—Bras.
subdistans, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 50.—Bras.
suberosa, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 853 = *Bastardia bivalvis*.
suberosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 775 = *Anoda triangularis*.
suberosa, L'Hérit. Stirp. Nov. 113. t. 54 = *cordifolia*.
suborbicularis, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 53.—Bras.
subsessilis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1863) 1. 199.—Bras.
subspicata, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 195.—Austral.
subtriloba, DC. Prod. i. 466 = *Gaya subtriloba*.
sulphurea, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 23 = *obliqua*.
sundaica, Blume, Bijdr. 78 = *Wissadula rostrata*.
sundaica, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 141 = *veronicaefolia*.
sundensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 259 = *Wissadula rostrata*.
supina, L'Hérit. Stirp. Nov. 109^{bis}, t. 52.—Am. trop.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 469 = *rhombifolia*.
Swartzii, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 847 = *ulmifolia*.
sylvatica, Cav. Diss. ii. 56; v. 276. t. 133. f. 2 (*Abutilonis* sp.).—Peruv.
tasmanica, Hook. f. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 412 = *Plagianthus pulchellus*.
tenax, Buch.-Ham. ex Wight & Arn. Prod. 59 = *glutinosa*.
tenax, Salisb. Prod. 382 = *Abutilon Avicennae*.
tenuicaulis, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 232 = *spinosa*.
terminalis, Cav. Diss. i. 29. t. 6. f. 7 = *Abutilon terminale*.

SIDA:—

- ternata*, Linn. f. Suppl. 307.—Afr. austr.
tetracocca, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 859 = *Wissadula rostrata*.
thyrsiflora, Miq. Pl. Jungh. 287.—Java.
tiliaefolia, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1808); ex DC.
Prod. i. 470 = *Abutilon Avicennae*.
timoriensis, DC. i. c. 468 = *Abutilon timoriense*.
tomentella, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 553.—Bras.
tomentosa, Cav. Desc. 164 = *crassifolia*.
tomentosa, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 178 = *Abutilon muticum*.
tomentosa, Vell. Fl. Flum. 277; vii. t. 14 = *cordifolia*.
tomentosa, Wall. Cat. n. 1852 = *Abutilon graveolens*.
tragiacefolia, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 164.—Texas.
triangularis, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 725 = *hastata*, *Anoda triangularis*.
trichoda, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 856 = *Abutilon crispum*.
trichopoda, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 384 = *corrugata*.
trichosperma, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857 = *Abutilon calycinum*.
tricuspidata, Cav. Diss. i. 30 = *Abutilon Jacquinii*.
tricusps, Desf. Tabl. ed. II. 171.—Hab. ?
tridentata, Cav. Ic. iv. 6 = *ciliaris*.
triflora, Vell. Fl. Flum. 280; vii. t. 24 = *Abutilon esculentum*.
triloba, Cav. Diss. i. 11. t. 1. f. 11; v. t. 131. f. 1; Thunb. Prod. Pl. Cap. 117.—Afr. austr.
triloba, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 67 = *permutata*.
trinerwia, Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 339 = *rhombifolia*.
triquetra, Linn. Sp. Pl. ed. II. 963 = *Abutilon triquetrum*.
trisecta, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 857 (*Cristariae* sp.).—Chili.
tristis, Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 271 = *jamaicensis*.
trislucata, Jacq. Enum. Pl. Carib. 26 = *Abutilon triquetrum*.
trivialis, Macfad. Fl. Jamaica. i. 78 = *acuta*.
truncata, Cav. Diss. i. 35. t. 6. f. 7 = *cordifolia*.
truncata, L'Hérit. Stirp. Nov. 107 = *ulmifolia* ?
truncata, Vell. Fl. Flum. 278; vii. t. 17.—Bras.
truncatula, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 548 = *rhombifolia*.
truncatula, J. F. Gmel. Syst. 1049 = *truncata*.
tubulosa, A. Cunn. ex Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austr. 390 = *Abutilon tubulosum*.
ulmifolia, Cav. Diss. i. 15. t. 2. f. 4.—Am. trop.
ulmifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 79 = *Meyeniana*.
ulmifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *acuta*.
ulmifolia, Retz. Obs. iii. 37 = *spinosa*.
ulmifolia, Spreng. Syst. iii. 113 = *Gaya occidentalis* (in Addend.).
ulmifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 49 = *Malvastrum tricuspidatum*.
umbellata, Linn. Syst. ed. X. 1145 = *Abutilon umbellatum*.
umbellifera, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 853 = *praec.*
unidentata, D. Dietr. i. c. 858 = *Anoda lanceolata*.
unilocularis, L'Hérit. Stirp. Nov. 117. bis, t. 56 = *veronicaefolia*.
urens, Linn. Syst. ed. X. 1145.—Afr. et Am. trop.
urticaefolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 189 = *flavescens*.
urticaefolia, Wight & Arn. Prod. 59 = *glutinosa*.
Velloziana, Steud. Nom. ed. II. ii. 579 = *cordifolia*.
velutina, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 115 = *cordifolia*.
venosa, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 33 = *Abutilon venosum*.
venusta, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 364 = *filipes* ?
veronicaefolia, Lam. Encyc. i. 5.—Am. trop.
verruculata, DC. Prod. i. 473.—Bras.
verticillata, Cav. Diss. i. 13. t. 1. f. 12 = *urens*.
Vescoana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 504.—Madag.
vesicaria, Cav. Diss. ii. 55. t. 14. f. 3 = *Abutilon indicum*.

SIDA:—

- vestita*, Steud. Nom. ed. II. ii. 579 = cordifolia.
viarum, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 182.—Bras.
villosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6.—Am. austr.
villosa, Wall. Cat. n. 1856 C = Abutilon muticum.
viminea, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 202 = linifolia.
virgata, Cav. Ic. i. 53. t. 73 = Abutilon virgatum.
virgata, Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 361.—Austral.
viridis, A. St. Hil. & Naud. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 175 = glomerata.
viscidula, Blume, Bijdr. 76 = glutinosa.
viscidula, Klotzsch, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 580 = Luschnathiana.
viscosa, Linn. Syst. ed. X. 1145 = Bastardia viscosa.
viscosa, Macfad. Fl. Jamaica. i. 84 = Bastardia bivalvis.
vitellina, Hoffmgg. Preisv. Pfl. viii. Nachtr. 33; ex Walp. Rep. i. 315.—Java.
vitifolia, Cav. Ic. v. 12. t. 428 = Abutilon vitifolium.
Vogelii, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 231 = acuta.
Wallichii, Steud. Nom. ed. II. ii. 580 = Abutilon polyandrum.
waltheriaefolia, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 19 = cordifolia.
Weinmanni, Heynh. Nom. ii. 663 (Quid?).—China.
Wightiana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 845 = glutinosa.
Willdenowii, D. Dietr. l. c. 847 = glutinosa.
Zollingeriana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 141.—Java.
Zuccagnii, Spreng. Syst. iii. 121 = Anoda hastata.

SIDALCEA, A. Gray, ex Benth. Pl. Hartw. 300

- (1848); et in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 18.
MALVACEAE, Benth. & Hook. f. i. 201.
asprella, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 78.—Am. bor. occ.
atacosa, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862), 449 = Sphacralcea Fendleri.
californica, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 18.—Calif.
calycosa, M. Jones, in Am. Natural. xvii. II. (1883) 875.—Calif.
campestris, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 76.—Calif.
candida, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 20, 24.—N. Mexic.
delphinifolia, A. Gray, ex Benth. Pl. Hartw. 300 = malvaeflora.
diploscypha, A. Gray, ex Benth. l. c.—Calif.
glaucescens, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 77.—Am. bor. occ.
Hartwegii, A. Gray, ex Benth. Pl. Hartw. 300.—Calif.
hirsuta, A. Gray, Pl. Wright. i. 16.—Calif.
humilis, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 20 = malvaeflora.
malachroides, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 332.—Calif.
malvaeflora, A. Gray, ex Benth. Pl. Hartw. 300.—Am. bor. occ.
malvaeflora, A. Gray, Pl. Wright. i. 16, partim = neo-mexicana.
malvaeflora, S. Wats. in Bot. King's Exped. 46, partim = glaucescens.
neo-mexicana, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 23.—N. Mexic.
nodosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 566.—Peruv.
oregana, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 20 = malvaeflora.
peruviana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 566.—Peruv.
spicata, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 76.—Calif.
sulcata, Curran, ex Greene, l. c. 79 = calycosa.
tenella, Greene, l. c. i. (1884) 7 = Hartwegii.
triloba, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1863) 1. 566.—Chili.
vitifolia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 332.—Calif.

SIDE, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 =

- Sida*, Linn. (Malvac.).
abutila, St. Lag. l. c. = Abutilon Avicennae.
phyllantha, St. Lag. l. c. = Malvastrum phyllanthos.

- SIDERANTHUS**, [Nutt.] in Fras. Cat. (1813) nn. 80, 81; et ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 227 (1826) = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
integrifolius, [Nutt.] l. c. n. 80 = Chrysopsis villosa.
pinnatifidus, [Nutt.] l. c. n. 81 = A. spinulosus.
spinulosus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 227 = A. spinulosus.
villosus, Sweet, l. c. = Chrysopsis villosa.

- SIDERASIS**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 67 (1836) = **Tradescantia**, Linn. (Commel.).
acaulis, Rafin. l. c. = T. fuscata.

SIDERITIS, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 171 (1737).

- LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1205.
BURGSDORFIA, Moench, Meth. 392 (1794).
EMPEDOCLEA, Rafin. Caratteri, 78 (1810).
FRACASTORA, Adans. Fam. ii. 505 (1763).
FRANCASTORA, Steud. Nom. ed. II. ii. 580, in syn. (1841), sphalm.
HESIODIA, Moench, Meth. 391 (1794).
LEUCOPHAR, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 99, 168, 172 (1835-60).
MARRUBIASTRUM, Tourn. ex Moench, Meth. 391 (1794).
NAVICULARIA, Heist. ex Adans. Fam. ii. 188 (1763).
aegyptiaca, Pers. Syn. ii. 117 = Stachys rosea.
alopecuroides, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 413 = Stachys alopecuroides.
alpina, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 328 = hyssopifolia.
ambigua, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 163 = libanotica.
angustifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 18. n. 231 = Lagascana.
angustifolia, Lam. Encyc. ii. 168.—Hispan.
approximata, Gasp. ex Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 191 = romana.
arborescens, Salz. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 579.—Hispan.
argosphaeculus, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 80.—Ins. Canar.
arguta, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 32 = libanotica.
atlantica, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 120 = hyssopifolia.
baetica, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 18.—Hispan.
Balansae, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 35.—As. Min.
Balansae, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 256; xxii. (1875) 65 = Cossoniana.
Bourgaena, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iv. 34 = lencantha.
Bourgaei, Boiss. Fl. Orient. iv. 712 = libanotica.
brutia, Tenore, Fl. Nap. ii. 16 = sicula.
bullata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 306 = Sphacele bullata.
calycantha, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 393 = Stachys lavandulaefolia.
canariensis, Linn. Sp. Pl. 574.—Ins. Canar.
candicans, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 289.—Ins. Mader.
candida, Salisb. Prod. 79 = candicans.
cassia, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 76, sphalm. = Stachys cassia.
Cavanillesii, Lag. Gen. et Sp. Nov. 18 = scordioides.
chamaedrifolia, Cav. Ic. iv. 1. t. 301 = hirsuta.
chamaedrifolia, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 99 = hyssopifolia.
chamaedryoides, Duf. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 455 = scordioides.
ciliata, Thunb. Fl. Jap. 245.—Japon.
cilicica, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 29.—Cilicia.
condensata, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 71.—As. Min.
Cossoniana, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 622.—Marocc.
crenata, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 331 = hyssopifolia.
cretica, Boiss. Fl. Orient. iv. 708 = syriaca.
cretica, Linn. Sp. Pl. 574.—Ins. Creta.
cretica, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 400 = theezans.
crispata, Willd. Enum. Hort. Berol. 606.—Hispan.
curvidens, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 100.—Lycia.
dasygnaphala, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 80.—Ins. Canar.
decumbens, Moench, Meth. 390 = sicula.

SIDERITIS:—

- decumbens*, Sieber, ex Benth. in DC. Prod. xii. 440 = pullulans.
decumbens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 95 = Stachys Lamarckii.
Dendro-chahorra, Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 285.—Ins. Canar.
deserti, Noé, ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 472 = Marrubium deserti.
discolor, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 330; Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 285 = macrostachyos.
distans, Willd. Sp. Pl. iii. 66 = taurica.
dura, Benth. Lab. Gen. et Sp. 576 = taurica.
ebracteata, Asso, Mant. Stirp. Arag. 171 = montana.
elegans, Murr. in Comm. Gotting. (1778) 92. t. 4 = lanata.
Endressii, Willk. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 276 = hirsuta.
errata, Walp. Rep. iii. 851, sphalm. = serrata.
erythrantha, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 70.—As. Min.
fetida, Poir. Encyc. Suppl. ii. 382 = scordioides.
florida, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iv. 31 = scardica.
foetens, Benth. Lab. Gen. et Sp. 581 = arborescens.
foetens, Clemente, ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 18 = lasiantha.
foetida, Desf. Tabl. ed. I. 59 = scordioides.
fragrans, Costa, ex Willk. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 289.—Hispan.
fruticulosa, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 328 = scordioides.
Funkiana, Willk. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 282 = angustifolia.
georgica, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 694 = taurica.
glacialis, Boiss. ex Willk. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 276.—Hispan.
glaucosa, Cav. Ic. ii. 68. t. 185.—Hispan.
gomeracea, Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 286.—Ins. Canar.
gracilis, Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. xxi. (1885) 98.—Lycia.
grandiflora, Salz. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 577.—Hispan.; Marocc.
Guillonii, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. VII. iv. (1872) 382 = hyssopifolia.
Guyoniana, Boiss. & Reut. Pugill. 98.—Afr. bor.
heraclea, Col. ex Benth. in DC. Prod. xii. 447 = Stachys heraclea.
hirsuta, Eichw. Besch. Casp.-Cauc. 24 = montana.
hirsuta, Gouan, Fl. Monsp. 85 = Stachys recta.
hirsuta, Linn. Sp. Pl. 575.—Reg. Mediterr.
hirsuta, Sieber, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 536 = Stachys italica.
hirta, Roth, in Usteri, Ann. Bot. x. (1794) 48 = scordioides.
hirtula, Brot. Fl. Lusit. i. 161 = hyssopifolia.
hispanica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = hirsuta.
hololeuca, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 69.—As. Min.
hyssopifolia, Georgi, Besch. Russ. Reich. v. 1081 = Stachys recta.
hyssopifolia, Linn. Sp. Pl. 575.—Europ. austr.
hyssopifolia, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 331 = scordioides.
ilicifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 606 = fragrans.
incana, Benth. in DC. Prod. xii. 444 = scordioides.
incana, Hahl. Besch. Taur. 148 = taurica.
incana, Linn. Sp. Pl. ed. II. 802.—Hispan.
infernalis, Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 286.—Ins. Canar.
integrifolia, Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 137, nomen = hyssopifolia.
junceae, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 459 = lasiantha.
jurana, Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 137, nomen = hyssopifolia.
Lagascana, Willk. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 282.—Hispan.
lanata, Linn. Amoen. Acad. iv. 459.—Graec.; As. Min.
lanata, Steud. & Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 446 = remota.
lasiantha, Fuss. ex Pers. Syn. ii. 117.—As. Min.
lavandulacea, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 458 = incana.
leucantha, Cav. Ic. iv. 2. t. 304.—Hispan.

SIDERITIS :—

- libanotica, *Labill. Ic. Pl. Syr. Dec.* iv. 13. t. 8.—As. Min.; Syria.
linearifolia, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 507 = angustifolia.
linearifolia, Bourg. ex Nym. *Consp.* 584 = arborescens.
linearifolia, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 18 = pungens.
linearifolia, Lam. *Encyc.* ii. 168 = *Stachys recta*?
linearifolia, Willd. ex Benth. in *Linnaea*, xi. (1837) 331 = scordioides.
linearifolia, Willk. in Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* ii. 458 = Lagascana.
litoralis, Timb. ex Nym. *Consp.* 584 = hirsuta.
longicaulis, Jord. & Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 136, nomen = hyssopifolia.
lucida, J. Gay, ex Nym. *Consp.* 584 = hyssopifolia.
lurida, J. Gay, ex Benth. in *DC. Prod.* xii. 443.—Hispan.
lycaonica, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* iv. 35.—Lycaonia.
Lyciae, Boiss. & Heldr. *l. c.* Ser. I. xii. 70.—Lycia.
macrostachyos, Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 381.—Ins. Canar.
maculata, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 81 = *Stachys recta*.
marmorea, Bolle, in *Bonplandia*, viii. (1860) 285.—Ins. Canar.
Massoniana, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 573.—Ins. Mader.
microstegia, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 712 = libanotica.
montana, Linn. *Sp. Pl.* 575.—Reg. Mediterr.; Oriens.
montana, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* vi. 42. t. 551 = remota.
mucronata, Sieber, ex Benth. in *DC. Prod.* xii. 440 = pullulans.
mutica, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 706 = romana.
nemausensis, Jord. & Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 137 = hirsuta.
nepetaeifolia, Willd. ex Benth. in *Linnaea*, xi. (1837) 329 = *Stachys nepetaefolia*.
nervosa, Desf. ex Steud. *Nom. ed. I.* 775, 836 = *Micromeria graeca*.
nigricans, Lam. *Encyc.* ii. 168 = lanata.
ochroleuca, Noël, ex Willk. in *Bot. Zeit.* xvii. (1859) 282.—Algeria.
Ocymastrum, Linn. *Syst. ed. X.* 1098; Gouan, *Hort. Monsp.* 278 = *Stachys hirta*.
oleaeifolia, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 4.—Ins. Creta.
orphila, Jord. & Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 137, nomen = hyssopifolia.
ovata, Cav. *l. c.* i. 36. t. 48.—Peruv.
pallida, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 95 = *Stachys rosmarinifolia*.
paniculata, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 307 = *Sphacele paniculata*.
parvifolia, Lam. *Illustr.* iii. 63. t. 505. f. 2.—Hab.?
patula, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 411 = scordioides.
peloponnesiaca, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* iv. 32 = theezans.
perfoliata, Linn. *Sp. Pl.* 575.—As. Min.; Syria.
peruviana, Willd. ex Benth. in *Linnaea*, xi. (1837) 330 (*Salviae* sp.).—Hab.?
Peyrei, Timb. in *Mém. Acad. Toul. Sér. VII.* iv. (1872) 383 = scordioides.
phleoides, Lange, ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* ii. 459 = lasiantha.
phlomifolia, Salisb. *Prod.* 79 = canariensis.
phlomidoides, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* iv. 33.—Cappadoc.
pisidica, Boiss. & Heldr. *l. c.* Ser. I. xii. 72.—As. Min.
plumosa, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 95 = *Stachys integrifolia*.
prostrata, Zuccagni, in *Roem. Collect.* 144.—Hab.?
provincialis, Jord. & Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 137 = hirsuta.
pullulans, Vent. *Jard. Cels.* t. 98.—Syria.
punctata, C. Sm. in *Tuckey, Congo*, 251, nomen.—Ins. Canar.
pungens, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 579.—Hispan.
purpurea, Talbot, in *Benth. l. c.* 742.—Ins. Ion.
pyrenaica, Endr. ex Nym. *Consp.* 584 = hirsuta.
pyrenaica, Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 383 = hyssopifolia.
Raeseri, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* iv. 30.—Graccia.

SIDERITIS :—

- remota*, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 322.—Ins. Samos.
remotiflora, Jord. & Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 136, nomen = hyssopifolia.
rhytidea, Spreng. *Syst. v.* 644 (Index) = hololeuca.
rigida, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 27 (Quid?).—Java.
romana, Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* v. 1081 = montana.
romana, Linn. *Sp. Pl.* 575.—Reg. Mediterr.
rosea, Desf. in *Ann. Mus. Par. x.* (1807) 302. t. 24 = *Stachys rosea*.
rotundifolia, Willd. ex Benth. in *Linnaea*, xi. (1837) 331 = hirsuta.
rugosa, Poir. *Encyc. Suppl.* ii. 383 = hololeuca.
rugosa, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 95 = *Stachys Burckellii*.
rugosa, Willd. ex Benth. in *Linnaea*, xi. (1837) 330 = *Sphacele bullata*.
ruscinoensis, Timb. in *Mém. Acad. Toul. Sér. VII.* iv. (1872) 380 = hyssopifolia.
saetabensis, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 125 = angustifolia.
salviaefolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 307 = *Sphacele salviaefolia*.
scardica, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 144.—Macedon.
scordioides, Koch, *Syn. Fl. Germ. ed. I.* 570 = hyssopifolia.
scordioides, Linn. *Syst. ed. X.* 1098.—Europ. austr.
sericea, Pers. *Syn. ii.* 118 = incana.
serrata, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 18 = spinosa.
sicula, Ucria, in *Roem. Archiv.* i. i. (1796) 69.—Europ. austr.
sipylea, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 32.—As. Min.
soluta, Clos, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvi. (1861) 81.—Ins. Canar.
spathulata, Lam. *Fl. Fr.* ii. 377 = romana.
spinosa, Benth. *Cat. Pl. Pyr.* 121 = scordioides.
spinosa, Lam. *Encyc.* ii. 169.—Hispan.; Afr. bor.
stachydioides, Willk. in *Bot. Zeit.* viii. (1850) 78.—Hispan.
stricta, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* xii. 72.—As. Min.
stricta, Jord. & Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 137, nomen = hyssopifolia.
subspinosa, Cav. *l. c.* iii. 5 = spinosa.
suffruticosa, Mill. ex Benth. in *DC. Prod.* xii. 444 = incana.
syriaca, Bory & Chaub. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 711 = theezans.
syriaca, Linn. *Sp. Pl.* 574.—Oriens.
syriaca, Pall. ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 43 = taurica.
taurica, Willd. *Sp. Pl.* iii. 66.—As. Min.; Reg. Caucas.
teucrifolia, Delile, *Fl. Aeg. Illustr.* 65.—Aegypt.
theezans, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* vii. 58.—Graecia.
tomentosa, Pourr. in *Mém. Acad. Toul.* iii. (1788) 328 = hirsuta.
tomentosa, Ucria, in *Roem. Archiv.* i. i. (1796) 69.—Sicil.
Tragoriganum, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 18 = incana.
trinervia, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 81 = *Stachys annua*.
vestita, Boiss. *Diagn. Ser. II.* iv. 33 = glacialis.
villosa, Coss. & Ball, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 255; xxii. (1875) 65.—Marocc.
virgata, Desf. *Fl. Atlant.* ii. 15. t. 125 = incana.
viridifolia, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 411 = hyssopifolia.
- SIDERODENDRON**, Roem. & Schult. *Syst.* iii. 10, 185 (1818) = seq.
- SIDERODENDRUM**, Schreb. *Gen.* 71 (1789) = *Ixora*, Linn. (Rubiaceae).
ferreum, J. F. Gmel. *Syst.* 242 = *I. ferrea*.
floribundum, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 24 = *I. floribunda*.
laxiflorum, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 235 = *I. laxiflora*.
macrophyllum, Benth. *l. c.* 234 = *I. macrophylla*.
multiflorum, Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v.* (1834) 184 = *Myonima multiflora*.
paniculatum, Willd. ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iv. (1829) 26 = *Psychotria cordifolia*.
triflorum, Vahl, *Eclog. Am.* i. 10 = *I. ferrea*.

SIDEROXYLOIDES, Jacq. *Stirp. Am.* 19. t. 175. f. 9 (1768) = *Ixora*, Linn. (Rubiaceae).
ferreum, Jacq. *l. c.* = *I. ferrea*.

SIDEROXYLON, [Dill.] Linn. *Syst. ed. I* (1735); Hort. Cliff. 69 (1737). *SAPOTACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 655.

- DECATELES*, Rafin. *Sylva Tellur.* 35 (1838).
MASTICHODENDRON, R. Hedw. *Gen.* 116 (1806).
OLIGOtheCA, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 174 (1844).
ROBERTSIA, Endl. *Gen.* 740 (1839).
ROEMERIA, Thunb. *Nov. Gen.* ix. 130 (1798), pro parte.
XANTOLIS, Rafin. *Sylva Tellur.* 35 (1838).
Acouma, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 184 = obovatum, Gaertn. f.
arboresum, Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 536 = *Sarcosperma arboresum*.
argenteum, Pierre, ex Burck, in *Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 16.—Java.
argenteum, Spreng. *Syst. i.* 666 = Brownii.
argenteum, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 36.—Afr. austr.
armatum, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 138 = tomentosum.
arhemicum, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. *Census*, 91.—Austral.
assamicum, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 537.—Assam.
atrovirens, Lam. *Encyc.* i. 245 = inerme.
atrovirens, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 11 = inerme, Mysine mitis.
attenuatum, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 178 = ferrugineum.
australe, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. *Census*, 92.—Austral.
avenium, Burck, in *Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 16.—Ins. Banca.
Balitbitan, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 130.—Ins. Philipp.
bancanum, Burck, in *Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 10.—Ins. Banca.
Bilitbitan, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 186, sphalm. = S. Balitbitan.
Bojerianum, A. DC. *l. c.* 179.—Ins. Mascar.
borbonicum, A. DC. *l. c.*—Ins. Borbon.
borneense, Burck, in *Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 15.—Borneo.
Boutonianum, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 179.—Ins. Mascar.
brevipes, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 502.—Afr. trop.
Brownii, F. Muell. *Census*, 92.—Austral.
Brownlessianum, F. Muell. *Fragm.* viii. 111.—Austral.
cantonense, Lour. *Fl. Cochinch.* 122.—China.
carolinense, Sargent, *Rep. For. N. Am.* (U. S. St. 10th Census, ix.) 101 = *Bumelia tenax*.
celebicum, Pierre, ex Burck, in *Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 8.—Ins. Celebes.
chartaceum, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. *Census*, 91.—Austral.
chrysophylloides, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 123 = *Bumelia tenax*.
chrysophyllum, De Vriese, *Pl. Ind. Bat. Or.* 59.—Java.
cinereum, Boj. *Hort. Maurit.* 197; Wall. *Cat. n.* 4157 = Bojerianum.
cinereum, Lam. *Encyc.* i. 244.—Ins. Borbon.
confertum, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 86.—Cuba.
Corsanii, Boj. ex Baker, *Fl. Maurit.* 193 = *Boutonianum*.
costatum, F. Muell. *Census*, 92.—Austral.
crassipedicellatum, Mart. & Eichl. ex Miq. in *Mart. Fl. Bras.* vii. 57.—Bras.
cuneatum, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 181 = obovatum, Gaertn. f.
cuspidatum, A. DC. *l. c.* 183.—Guian.
cylindrocarpon, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 72. t. 282.—Bras.; Peruv.
cymosum, Linn. f. *Suppl.* 152 = *Olinia cymosa*.
cyrtobotryum, Mart. ex Miq. in *Mart. Fl. Bras.* vii. 57.—Bras.
decandrum, Linn. *Mant.* i. 48 = *Bumelia lycioides*.
decumbens, J. F. Gmel. *Syst.* 1626, sphalm. = praec.
densiflorum, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 503.—Afr. trop.
dentatum, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 6.—Afr. anstr.
dictyonereum, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1862) 517.—Ind. occ.

SIDEROXYLON:—

- diospyroides, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 502.—Afr. trop.
 Duclitan, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 129.—Ins. Philipp.
 dulcificum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 183.—Afr. trop.
Dulitan, *A. DC. l. c.* 185, sphalm.=S. Duclitan.
durum, *Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 56 = cuspidatum.
egense, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 182 = rugosum.
elegans, *A. DC. l. c.* 183.—Guian.
ellipticum, *Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 56 = cuspidatum.
euphlebum, *F. Muell. Census*, 92.—Austral.
ferrugineum, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 266. t. 55.—As. trop.; Ins. Seychelles.
fimbriatum, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 76.—Ins. Socotr.
firmum, *Pierre, ex Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 17.—Ins. Banca.
floribundum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 399.—Ind. occ.
foetidissimum, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 15.—Ind. occ.
Gamblei, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 538.—Reg. Himal.
Gardnerianum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 182.—Bras.
glabrescens, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 580.—Ins. Banca.
grandiflorum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 180.—Ins. Mascar.
grandifolium, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 343.—Ind. or.; Burma.
guadalupense, *Spreng. Syst.* i. 666.—Ins. Guadalup.
guyanense, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 182.—Guian.
Hookeri, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 537.—Reg. Himal.
Howeanum, *F. Muell. Census*, 92.—Austral.
imbricarioides, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 180.—Ins. Maurit.
indicum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 13.—Malaya.
inermis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 204.—Arab.
inermis, *Krauss, ex A. DC. in DC. Prod.* xiv. 634 = Colpoon compressum.
inermis, *Linn. Sp. Pl.* 192.—Afr. austr.
javense, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 14.—Java.
laeve, *Walt. Fl. Carol.* 100 = Bumelia lycioides.
lanceolatum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 14.—Ins. Banca.
lanuginosum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 122 = Bumelia lanuginosa.
laurifolium, *Comm. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 180 = imbricarioides.
laurifolium, *Lam. Encyc.* i. 244 = Myrsine melanophleos.
Lessertii, *Baker, Fl. Maurit.* 194.—Ins. Maurit.
lingense, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 15.—Malaya.
longifolium, *Boj. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 180.—Ins. Maurit.
longistylum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 502.—Afr. trop.
lucidum, *Soland. ex Lam. Encyc.* i. 246.
lyciifolium, *Salisb. Prod.* 139 = Bumelia lycioides.
lycioides, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 279 = Bumelia lycioides.
lycioides, *Wangenh. ex Steud. Nom. ed. I.* 776 = 'Illicis aut Prinos species.'—Am. bor.
macrophyllum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 20.—Borneo.
Maingayi, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 536.—Malacca.
malaccense, *C. B. Clarke, l. c.* 537.—Malacca.
Manglilla, *Lam. Encyc.* i. 244 = Myrsine Manglilla.
Marmulana, *C. Sm. in Tuckey, Congo*, 252 = seq.
Marmulano, *Banks, ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 22.—Ins. Mader.
Mastichodendron, *Jacq. Coll.* 2. t. 17. f. 5.—Ind. occ.
Mastichodendrum, *Balb. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 99 = Myrsine laeta.
melanophleos, *Linn. Mant.* i. 48 = Myrsine melanophleos.
mexicanum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 296.—Mexic.
micranthum, *Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 54 = elegans.
microcarpum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 17.—Ins. Amboin.

SIDEROXYLON:—

- Mirmulans*, *Buch, Besch. Canar. Ins.* 193 = S. Marmulano.
mite, *Linn. Syst. ed. XII.* 178 = Myrsine mitis.
mite, *Sims, Bot. Mag.* t. 1858 (Illicis sp.).—Afr. austr.
mite, *Willd. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 97 = Myrsine melanophleos.
moluccanum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 19.—Ins. Gebeh.
multiflorum, *Lam. Illustr.* ii. 43 (non Sapotacea).—Afr. austr.
myrsinoides, *Benth. & Hook. f. ex F. Muell. Census*, 92.—Austral.
nervosum, *Wall. Cat.* n. 4159.—Burma.
nigricans, *Dum.-Cours. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 186 = Myrsine mitis.
nigrum, *Gaertn. f. Fruct.* iii. 123 = Dipholis salicifolia.
nigrum, *Soland. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 186 = Myrsine salicifolia.
nitidum, *Blume, Bijdr.* 675.—Java.
nitidum, *Lam. Illustr.* ii. 42 = lucidum.
nodosum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 12.—Java.
obovatum, *Burck, l. c.* 11.—Java.
obovatum, *Gaertn. f. Fruct.* iii. 125.—Hab. ?
obovatum, *Griff. Notul.* iv. 290 = ferrugineum.
obovatum, *Lam. Illustr.* ii. 42.—Ind. occ.
oppositifolium, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 2 = foetidissimum.
orichalcium, *Zipp. in Alg. Konst- en Letter-bode* (1829) i. 297, nomen; et ex *Mackl. Bijdr. Nat. Wetensch.* v. (1830) 178.—N. Guin.
oxyedrum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 580.—Sumatra.
Pacurero, *Loefl. It.* 204.—Venezuela.
pallidum, *Spreng. Syst.* i. 666 = S. Mastichodendron.
parviflorum, *Boj. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 184.—Ins. Maurit.
parvifolium, *F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 124.—Ins. Philipp.
pauciflorum, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 15.—Ins. S. Doming.
pauciflorum, *Lam. Illustr.* ii. 42 = Dipholis salicifolia.
pentagonum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 185.—Ins. Dominic.
Pohlmanianum, *Benth. & Hook. f. ex F. Muell. Census*, 91.—Austral.
pomiforme, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 182.—Jamaic.
puberulum, *A. DC. l. c.* 179.—Ins. Mascar.
punctatum, *Lam. Illustr.* ii. 42 = Myrsine floribunda.
reclinatum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 122 = Bumelia tenax.
regium, *Wall. Cat.* n. 4156 = grandifolium, Dichopsis polyantha.
revolutum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 503.—Afr. trop.
Richardi, *F. Muell. Census*, 92.—Austral.
rigidum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 18.—Ins. Celebes.
robustum, *Mart. & Eichl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 56.—Bras.
rufum, *Mart. & Eichl. l. c.* 52.—Bras.
rugosum, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 501.—Bras.
rugosum, *Wall. Cat.* n. 4158 = Wallichianum.
salicifolium, *Gaertn. f. Fruct.* iii. 124. t. 202 = Dipholis salicifolia.
Sapota, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 15 = Achras Sapota.
sericeum, *Ait. Hort. Kew. ed. I.* i. 262 = Lucuma sericea.
sericeum, *Walt. Fl. Carol.* 100 = Bumelia tenax.
spectabile, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 10.—Sumatra.
spinosum, *Linn. Sp. Pl.* 193 = Argania Sideroxylon.
spinosum, *Willd. Sp. Pl.* i. 1091 = Flacourtia sepiaria.
Spruceanum, *Mart. & Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 53.—Bras.
strigosum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 11 = Bumelia strigosa.
sundaicum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 9.—Ins. Sundaic.
tenax, *Linn. Mant.* i. 48 = Bumelia tenax.
tenax, *Walt. Fl. Carol.* 100 = Bumelia lanuginosa.
Teysmannianum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 19.—Malaya.
tomentosum, *Roxb. Pl. Corom.* i. 28. t. 28.—Ind. or.
tomentosum, *Wall. Cat.* n. 4153 = assamicum, Isonandra Wightiana.
undulatum, *Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 12.—Ins. Banca.

SIDEROXYLON:—

- venulosum, *Mart. & Eichl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 52.—Bras.
Vrieseanum, *Pierre, ex Burck, in Ann. Jard. Buitenz.* v. (1885) 18.—Ins. Batjan.
Wallichianum, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 28.—Ins. Penang.
Wightianum, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 196. t. 41 = Isonandra Wightiana.
Wightianum, *Wall. Cat.* n. 4154 = Isonandra lanceolata.
xerocarpum, *Benth. & Hook. f. ex F. Muell. Census*, 91.—Austral.

SIDEROXYLUM, *Salisb. Prod.* 138 (1796) = praec.

SIEBERA, *J. Gay, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iii.* (1827) 343. *COMPOSITAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 464.
FLEUROTIA, *Reichb. Nom.* 90 (1841).
Gayana, *Cass. in Dict. Sc. Nat. lix.* 126 = pungens.
pungens, *J. Gay, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iii.* (1827) 343.—As. Min.; Syria; Persia.

SIEBERA, *Hoppe, in Flora, ii.* (1819) 24 = **Arenaria**, *Rupp. (Caryoph.)*.
argentea, *Steud. Nom. ed. I.* 777; ed. II. ii. 582 = *A. aretioides*.
cherlerioides, *Hoppe, in Flora, ii.* (1819) 24 = *A. aretioides*.

SIEBERA, *Presl, in Oken, Isis, xxi.* (1828) 275 = **Anredera**, *Juss. (Chenop.)*.
baselloides, *Presl, l. c.* = *A. spicata*.

SIEBERA, *Reichb. Consp.* 145 (1828) = **Platysace**, *Bunge (Umbell.)*.
Billardieri, *Benth. Fl. Austral. iii.* 356.—Austral.
cirrosa, *Benth. l. c.* 354 = *P. cirrosa*.
commutata, *Benth. l. c.* 355.—Austral.
compressa, *Benth. l. c.* 352.—Austral.
deflexa, *Benth. l. c.* 355.—Austral.
dissecta, *Benth. l. c.* 354.—Austral.
effusa, *Benth. l. c.* 355 = *P. trachymenioides*.
ericoides, *Benth. l. c.* 356.—Austral.
haplosciadia, *Benth. l. c.* 353.—Austral.
heterophylla, *Benth. l. c.* 354.—Austral.
juncea, *Benth. l. c.* 353.—Austral.
linearifolia, *Benth. l. c.* 356.—Austral.
Stephensonii, *Benth. l. c.* 357.—Austral.
tenuissima, *Benth. l. c.* 354.—Austral.
valida, *Benth. l. c.* 355 = *P. valida*.

SIEBERIA, *Spreng. Anleit. ii.* 282 (1817) = **Habenaria**, *Willd. (Orchid.)*.
albida, *Spreng. l. c.* = *H. albida*.
bifolia, *Spreng. l. c.* = *H. bifolia*.
nigra, *Spreng. l. c.* = *H. nigra*.
viridis, *Spreng. l. c.* = *H. viridis*.

SIEBOLDIA, *Heynh. Nom.* ii. 644 (1846) = **Simethis**, *Kunth (Liliac.)*.
bicolor, *Heynh. l. c.* = *Sim. bicolor*.

SIEBOLDIA, *Hoffmgg. Preisv.* (1842) Nachtr. 28.—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 281 = **Clematis**, *Dill. (Ranunc.)*.
bicolor, *Hoffmgg. ex Heynh. Nom.* ii. 665 = *C. florida*.
florida, *Hoffmgg. ex Heynh. l. c.* = *C. florida*.
japonica, *Hoffmgg. Preisv.* (1842) Nachtr. 28.—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 282 = *C. japonica*.

SIEGESBECKIA, *Linn. Hort. Cliff.* 412 (1737); *Gen. ed. I.* 352 (1737) (Sigesbeckia); *Gled. in Mém. Acad. Berl.* v. (1749) 131. *COMPOSITAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 359.

LIMNOGENNETON, *Sch. Bip. in Walp. Rep.* vi. 146 (1846).
MINYRANTHES, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1851) L. 180.

SCHUHRIA, *Moench, Meth.* 566 (1794) (Schuhria).
TRIMERANTHES, *Cass. in Dict. Sc. Nat. lix.* 237 (1829).
abyssinica, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 372.—Afr. trop.
agrestis, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 45. t. 256 = *flosculosa*.
brachiata, *Roxb. Hort. Beng.* 62; *Fl. Ind.* iii. 439 = *orientalis*.
caspia, *Fisch. & Mey. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 285 = *orientalis*.
cordifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 283 = *orientalis*.

SIEGESBECKIA :—

dichotoma, Schkr. Handb. iii. 144 = *flosculosa*.
droseroides, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 235; et in Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 203 = *orientalis*.
emimensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 188.—Madag.
flosculosa, L'Hérit. Stirp. Nov. 37. t. 19.—Peruv.
glutinosa, Wall. Cat. n. 3182 = *orientalis*.
gracilis, DC. Prod. v. 496 = *orientalis*.
iberica, Willd. Sp. Pl. iii. 2220 = *orientalis*.
jorullensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 284 = *orientalis*.
laciniata, Poir. Encyc. vii. 158 = *Verbesina virginica*.
Mandonii, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 81; et in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 534, nomen.—Bolivia.
melanolepis, Sch. Bip. II. cc., nomen.—Bolivia.
microcephala, DC. Prod. v. 496 = *orientalis*.
occidentalis, Linn. Sp. Pl. 900 = *Verbesina occidentalis*.
orientalis, Linn. l. c.—Cosmop. trop.
portoricensis, Bert. ex DC. Prod. v. 546 = *Eleutheranthera ovata*.
serrata, DC. l. c. 496 = *orientalis*.
triangularis, Cav. Ic. iii. 27 = *orientalis*.
trinervata, Moench, Meth. 582 = *Verbesina occidentalis*.

SIEGLINGIA, Bernh. Syst. Verz. Erf. 20, 44 (1800) = **Triodia**, R. Br. (1810) (Gramin.).
decumbens, Bernh. l. c. = *T. decumbens*.

SIEMSSSENIA, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 467 (1845) = **Podolepis**, Labill. (Compos.).
capillaris, Steetz, l. c. = *P. Siemsssenia*.

SIERUELA, Rafin. Sylva Tellur. 112 (1838) = **Cleome**, Linn. (Cappar.).
viscosa, Rafin. l. c. = *C. monophylla*.

SIEVEKINGIA, Reichb. f. Beitr. Syst. Pl. 3 (1871). Genus dubium **ORCHIDEARUM**.—Cf. Benth. & Hook. f. iii. 477.
suavis, Reichb. f. l. c.—Costa Rica.

SIEVERSIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 397 = **Geum**, Linn. (Rosac.).
adnata, G. Don, Gen. Syst. ii. 527 = *G. elatum*.
albiflora, Hook. f. Fl. Antarct. 9. t. 7 = *G. parviflorum*.
andicola, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 636 = *G. Lechlerianum*.
anemonoides, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 398 = *G. anemonoides*.
atlantica, G. Don, Gen. Syst. ii. 527 = *G. sylvaticum*.
calthifolia, D. Don, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 425 = *G. calthifolium*.
caroliniana, G. Don, Gen. Syst. ii. 528 = *G. album*.
ciliata, G. Don, l. c. = *G. triflorum*.
congesta, R. Br. in Parry's 1st Voy. App. 276 = *G. calthifolium*.
dilatata, R. Br. l. c. = *G. calthifolium*.
dryadoides, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ii. (1843) 125 = *G. anemonoides*.
elata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 207. t. 39. t. 1 = *G. elatum*.
geoides, Spreng. Syst. ii. 543 = *Coluria potentilloides*.
glacialis, R. Br. in Parry's 1st Voy. App. 276 = *G. glaciale*.
humilis, R. Br. l. c. = *G. Rossii*.
humilis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 207 = *G. elatum*.
karatavica, Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 309 = *G. karatavicum*.
micropetala, Nym. Syll. 273 = *G. micropetalum*.
montana, R. Br. in Parry's 1st Voy. App. 276 = *G. montanum*.
paradoxa, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) 576. t. 22. f. 7-10 = *Fallugia paradoxa*.
Peckii, R. Br. in Parry's 1st Voy. App. 276 = *G. radiatum*.
radiata, R. Br. l. c. = *G. radiatum*.
reptans, R. Br. l. c. = *G. reptans*.
rosea, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June, 1831) 193 = *G. triflorum*.
Rossii, R. Br. in Parry's 1st Voy. App. 276 = *G. Rossii*.

SIEVERSIA :—

rotundifolia, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 4 = *Geum calthifolium*.
silenifolia, Fisch. ex F. Schmidt, Reisen Amurl. 39 = *G. anemonoides*.
triflora, R. Br. in Parry's 1st Voy. App. 276 = *G. triflorum*.

SIGESBECKIA, Linn. Gen. ed. I. 352 (1737), etc. = **Siegesbeckia**, Linn. (Compos.).

SIGILLARIA, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 261; et in Am. Monthly Mag. (1819) 357 = **Smilacina**, Desf. (Liliac.).
ciliata, Rafin. Atl. Journ. 151 = *Sm. racemosa*.
multiflora, Rafin. Med. Fl. ii. 83 = *Sm. racemosa*?

SIGMATOPHYLLUM, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1587 (1840) = **Stigmaphyllon**, A. Juss. (Malpig.).

SIGMATOSTALIX, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 769. **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 565.
aurosanguinea, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 68.—Peruv.
brachycion, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 336.—Reg. Argent.
dilatata, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 16.—N. Granat.
graminea, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 769.—Peruv.
malleifera, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) II. 360.—N. Granat.
picta, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 859.—Ecuador.
radicans, Reichb. f. l. c.—Bras.
reversa, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 103.—N. Granat.
Wallisii, Reichb. f. l. c.—N. Granat.

SIGMODOSTYLES, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 93 = **Rhynchosia**, Lour. (Legumin.).
villosa, Meissn. l. c. 94 = *R. sigmodos*.

SILAMNUS, Rafin. Sylva Tellur. 60 (1838) = **Cephalanthus**, Linn. (Rubiace.).
procumbens, Rafin. l. c. 61 = *C. procumbens*.

SILAUS, Bernh. Syst. Verz. Erf. 116 (1800). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 910.
GASPARINIA, Bertol. Fl. Ital. iii. 614 (1837).
alatus, Link, Handb. i. 329 = *Ligusticum alatum*.
alpestris, Bess. in Schult. Syst. vi. p. xxxvi.—Ross. austr.; Sibiria.
Besseri, DC. Prod. iv. 161 = *alpestris*.
carvifolius, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 125.—Banat.; As. Min.
flavescens, Bernh. Syst. Verz. Erf. 174.—Europ.
Gasparrinii, Nym. Syll. 154 = *carvifolius*.
Gilbertii, Bess. ex Eichw. Skizze, 156.—Rossia.
gracilis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Péttersb. vii. (1851) 301.—Turkestan.
longifolius, Ledeb. Fl. Alt. i. 323.—Sibir.
Matthioli, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. i. (1824) = *tenuifolius*.
meoides, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 362 = *Carum graecum*.
peucedanoides, Boiss. Fl. Orient. ii. 974 = *carvifolius*.
peucedanoides, DC. Prod. iv. 161 = *Eulophus peucedanoides*.
pratensis, Bess. in Schult. Syst. vi. p. xxxvi = *flavescens*.
serotinus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 471 = *tenuifolius*.
tenuifolius, DC. 3^{me} Not. Pl. Rar. Jard. Genève. 23.—Hungar.
virescens, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 301 = *carvifolius*.

SILENANTHE, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 300 = **Silene**, Linn. (Caryoph.).
Zawadzkii, Griseb. & Schenk, l. c. = *Silene Zawadzkii*.

SILENE, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 132 (1737). **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 147.
ATOCION, Adans. Fam. ii. 254 (1763).
BEHENANTHA, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 130.

SILENE :—

CARPOPHORA, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 139. t. 32 (1862).
CHEIROPETALUM, E. Fries, Ind. Sem. Hort. Upsal. (1857); ex Urban, Addit. Ind. Sem. Hort. Berol. (1881) 11.
DIPLOGAMA, Opiz, Seznam, 38 (1852).
ELISANTHE, Reichb. Nom. 206 (1841).
HELIOSPERMA, Reichb. Nom. 206 (1841); et Ic. Fl. Germ. vi. t. 277 (1844).
KALERIA, Adans. Fam. ii. 506 (1763).
LEPTOSILENE, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 344.
MUSCIPULA, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 125 (1745).
OBERNA, Adans. Fam. ii. 255 (1763).
ONCERUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 255 (1867).
OTTES, Adans. Fam. ii. 255 (1763).
PETROCOMA, Rupp. Fl. Cauc. 200 (1869).
PETROSILENE, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 344.
SILENANTHE, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 300.
VISCAPULA, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 373 (1742).
acarpophora, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 172 = *coniflora*.
acaulis, Linn. Sp. Pl. ed. II. 603.—Reg. bor. et arct.
acuta, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222 = *Burchellii*.
acutifolia, Link, ex Rohrb. Monog. Silene, 141.—Lusitan.
adhaerens, Ehrenb. ex Rohrb. l. c. 162 = *linearis*.
adscendens, Lag. Gen. et Sp. Nov. 15.—Hispan.
adusta, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 360 = *corrugata*.
aegyptiaca, Linn. f. Suppl. 241 = Afr. bor.; Syria.
aethiopica, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 13.—Afr. austr.
aetolica, Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 239.—Graecia.
afghanica, Rohrb. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. ii. 5.—Afghan.
affinis, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 72.—Sinai.
affinis, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 417 = *micropetala*.
agrestina, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 6 = *gallica*.
agrigentina, Lojac. in Natural. Sicil. ii. (1883) 295 = *fruticosa*.
Agrostemma, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 8 = *S. Psammitis*.
alba, Muhl. ex Rohrb. Monog. Silene, 87 = *nivea*.
albescens, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 28 = *ericalcinea*.
Allamanni, Oth, in DC. Prod. i. 379 = *laciniata*.
alophila, Clemente, ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 15 = *adscendens*.
Almolae, J. Gay, ex Coss. Notes Crit. ii. 31.—Hispan.
alpestris, Jacq. Fl. Austr. i. 60. t. 96.—Europ. or.
alpestris, Willd. ex Nym. Consp. 92 = *rupestris*.
alpina, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 648 = *acaulis*.
alpina, Pall. Reise, iii. 34; Tabl. Taur. 51 = *alpestris*.
alpina, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 177; iii. (1852) 85; iv. (1853) 12 = *seq.?*
alpina, Thomas, Cat. Pl. Suiss. (1837) 45 = *S. Cucubalus*.
alsinoides, Pourr. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 114.—Hispan.
alsinoides, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 6 = *Saponaria ocyroides*.
altaica, Oth, in DC. Prod. i. 374 = *turgida*.
altaica, Pers. Syn. i. 497.—Sibir.
amana, Boiss. Fl. Orient. i. 634.—Syria.
ambigua, Cambess. ex Soyer-Willem. in Mém. Acad. Nancy, 1850 (1851), 158; Willk. Ic. et Desc. Pl. Hisp. i. 42. t. 28 = *glaucosa*.
ambigua, Salisb. Prod. 302 = *S. Behen*.
ambigua, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 576 = *tenuis*.
amblevana, Lej. Fl. Spa, i. 199 = *nutans*.
ammophila, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 82.—Ins. Crete.
amoena, Hill, Veg. Syst. xiii. 55 = *maritima*.
amoena, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2] in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *cretica*.
amoena, Hort. ex Fenzl, l. c. [9] = *nocturna*, *antirrhina*, *gallica*.
amoena, Huds. Fl. Angl. ed. I. 164 = *S. Cucubalus*.
amoena, Linn. Sp. Pl. 417 = *tenuis*.
amoena, Linn. l. c. ed. II. 596 = *maritima*.
amphorina, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 330 = *colorata*.

SILENE:—

ampullata, Boiss. *Diagn.* Ser. I. i. 26.—As. Min.
amurensis, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 209 = *italica*.
anastomosans, Lag. Gen. et Sp. Nov. 15 = *picta*.
andicola, Gill. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 147 =
Saponaria andicola.
andryalaefolia, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 331.—
 Alger.
angistoma, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. i. 622 =
persica.
anglica, Linn. Sp. Pl. 416 = *gallica*.
angustifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 337 = *petraea*.
angustifolia, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1568 = *clandestina*.
angustifolia, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 500 = *S. Cucu-*
balus.
angustifolia, Poir. Voy. Barb. ii. 164 = *Tunica*
compressa.
angustissima, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 95, in obs.
 = *S. Cucubalus*.
anisoloba, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad.
Petersb. ii. (1844) 198.—As. centr.
annulata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2, 9]; in Del.
Sem. Hort. Vindob. (1851).—Hab.?
annulata, Thore, Chlor. Land. 173 = *cretica*.
anomala, Duf. ex Rohrb. Monog. Silene, 118 =
apetala.
antelopum, Steud. Nom. ed. II. i. 450, in syn. =
S. Cucubalus.
antirrhina, Hort. Madr. ex Otth, in DC. Prod. i. 378
 = *rubella*.
antirrhina, Linn. Sp. Pl. 419.—Am. bor.
apetala, Host, Fl. Austr. i. 532 = *nocturna*.
apetala, Willd. Sp. Pl. ii. 307.—Europ. austr.; Persia.
aprica, Turcz. in Linnaea, x. (1836) Litt. 102.—
 Sibir. or.; China.
arabica, Boiss. Fl. Orient. i. 593 = *affinis*.
araxina, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875)
 278.—Armenia.
Arbuscula, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. i. 612 =
spergulifolia.
arenaria, Desf. Fl. Atlant. i. 354 = *nicaeensis*.
arenaria, Ehrenb. ex Rohrb. Monog. Silene, 231 =
Gypsophila hirsuta.
arenarioides, Desf. Fl. Atlant. i. 355 = *clandestina*.
arenicola, Presl, Fl. Sic. 153 = *nicaeensis*.
arenosa, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 712.—As.
 Min.; Oriens.
argaea, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i.
 (1854) 36.—Cappadoc.
argentea, Ledeb. Fl. Ross. i. 311.—As. Min.
argillosa, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 44
 = *rubella*.
arguta, Boiss. & Buhse, in Boiss. Fl. Orient. i. 642 =
peduncularis.
arguta, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 8.—As. Min.
Aristidis, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 330.—Alger.
armena, Boiss. *Diagn.* Ser. I. i. 29.—As. Min.
armeniaca, Rohrb. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1867)
App. ii. 5; Monog. Silene, 209.—Armenia.
Armeria, Asso, Syn. Stirp. Arag. 54 = *rubella*.
Armeria, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 339 = *compacta*.
Armeria, Linn. Sp. Pl. 420.—Europ. austr.
Armeria, Pall. Ind. Taur. 51 = *Saponaria glutinosa*.
articulata, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 696 =
fuscata.
articulata, Viv. Pl. Lib. Spec. 23. t. 12. f. 1 = *gallica*.
arvatica, Lag. in Varied. Cienc. ii. IV. (1805) 212 =
ciliata.
arvensis, Losc. Trat. Pl. Arag. 31 = *S. Muscipula*.
arvensis, Salisb. Prod. 301 = *gallica*.
aspera, A. Br. ex Aschers. Fl. Brandenb. i. 85 =
Lychnis Coeli-rosa.
aspera, Hort. ex Rohrb. Monog. Silene, 118 = *apetala*.
asphaltica, Kotschy, ex Rohrb. l. c. 105 = *setacea*.
Asterias, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 168.—Banatus.
atlantica, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii.
 (1855) 307.—Alger.
atocia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1980)
 134 = *S. Atocion*.
atocioides, Boiss. *Diagn.* Ser. I. v. 83.—As. Min.
Atocion, Murr. Syst. ed. XIII. 421 = *aegyptiaca*.
Aucheriana, Boiss. *Diagn.* Ser. I. i. 27.—Peruv.
auriculaefolia, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 332 =
mollissima.
auriculata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 292.—
 Ital.; Graec.
austriaca, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 583 =
alpestris.

VOL. II.

SILENE:—

axillaris, Leavenw. in Am. Journ. Sc. Ser. I. vii.
 (1824) 62 = *Cuphea viscosissima*.
azurea, Hort. Piln. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 95,
 nomen.—Hab.?
babylonica, Boiss. & Noé, *Diagn.* Ser. II. i. 71 = *rubella*.
baccifera, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 192 = *Cucubalus*
baccifer.
baicalensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842)
 575 = *tenuis*.
Balansae, Boiss. *Diagn.* Ser. II. vi. 31.—Cappadoc.
Baldwinii, Nutt. Gen. Am. i. 238.—Am. bor.
barbata, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 820 =
pendula.
bassanensis, Sternb. Reise Rhet. Alp. 40 = *italica*.
Bastardi, Bor. ex Lloyd, Fl. Ouest Herbor. (1876-77),
 4; et in Bull. Soc. Dauph. (1880) 254 = *maritima*.
Baumgarteni, Schott & Kotschy, ex Rohrb. Monog.
 Silene, 145 = *dinarica*.
Behen, Linn. Sp. Pl. 418.—Graecia; As. Min.
Behen, Wirzén, Enum. Pl. Offic. Fenn. 36 = *S.*
Cucubalus.
bella, Clark, Trav. i. 746 = *compacta*.
bellidifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 33.—Afr. austr.
bellidifolia, Jacq. Hort. Vindob. iii. 44. t. 81 = *ves-*
pertina.
bellidifolia, Thunb. Prod. Pl. Cap. 81 = *ornata*.
bellidioides, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 125 =
bellidifolia.
Bergeri, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = *noctiflora*.
Bergeri, Schott, ex Spreng. Syst. ii. 411 = *echinata*.
Biafrae, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 183.
 —Afr. trop.
biappendiculata, Ehrh. ex Rohrb. in Bot. Zeit. xxv.
 (1867) 82.—Aegypt.
bicolor, Frivald. ex Rohrb. Monog. Silene, 158 = *rigidula*.
bicolor, Moench, Meth. 706 = *nocturna*.
bicolor, Reichb. Pl. Cult. t. 72 = *picta*.
bicolor, Thore, Ess. Chlor. Land. 174 = *portensis*.
bifida, Retz. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 37
 = *colorata*.
biflora, Willd. ex Rohrb. Monog. Silene, 124 = *ciliata*.
bipartita, Desf. Fl. Atlant. i. 352 = *colorata*.
bipartita, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = *vespertina*.
bohémica, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. i. fasc. 6 =
gallica.
Boissieri, J. Gay, ex Coss. Notes Crit. ii. 32.—Hispan.
Boissieri, Tineo, ex Rohrb. Monog. Silene, 115 =
colorata.
Bolanderi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868)
 330 = *Hookeri*.
Borderi, Jord. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xii.
 (1866) 445 = *elegans*.
Boryi, Boiss. Elench. 19.—Hispan.
brachiata, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 94 =
S. Cucubalus.
brachyantha, Schott, ex Rohrb. Monog. Silene, 213 =
saxatilis.
brachyantha, Schur, ex Nym. Consp. 86 = *S. Cucu-*
balus.
brachycarpa, Boiss. & Bal. *Diagn.* Ser. II. vi. 29.—As.
 Min.
brachypetala, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del.
 Sem. Hort. Vindob. (1851) = *apetala*.
brachypetala, Rob. & Cast. ex DC. Fl. Fr. Suppl. 607
 = *nocturna*.
brachystachys, Webb, *Fragm. Fl. Aethiop.* 34.—Nubia.
bracteata, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 200 =
olympica.
bracteosa, Bertol. Fl. Ital. vi. 627 = *S. Muscipula*.
brahuica, Boiss. Fl. Orient. i. 615.—Afghan.
brevicaulis, Boiss. *Diagn.* Ser. I. i. 34.—Cataonia.
Bridgesii, Rohrb. Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App.
 ii. 5.—Calif.
Broussonetiana, Schott, ex Webb & Berth. Phyt.
 Canar. i. 141 = *nutans*.
bryoides, Jord. Pugill. Pl. Nov. 30 = *acaulis*.
buglossifolia, Sm. in Rees, Cyclop. xxxii. [n. 44] =
italica.
bupleuroides, Heldr. ex Boiss. *Diagn.* Ser. I. viii. 90 =
caramanica.
bupleuroides, Ledeb. ex Boiss. Fl. Orient. i. 639 =
longiflora.
bupleuroides, Linn. Sp. Pl. 421.—As. Min.
bupleuroides, Schang. ex Bunge, Verz. Alt. 31 = *tennis*.
Burchellii, Otth, in DC. Prod. i. 374.—Afr. austr.

SILENE:—

byzantina, Castagne, ex Boiss. Fl. Orient. i. 627 =
S. Fabaria.
caesarea, Boiss. & Bal. *Diagn.* Ser. II. vi. 31.—As.
 Min.
caesia, Jan, Elench. 7; Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod.
 i. 294; Fl. Graec. v. t. 417 = *italica*.
caesia, Sieber, ex Boiss. Fl. Orient. i. 632 = *Sieberi*.
caespitosa, Salisb. Prod. 302 = *acaulis*.
caespitosa, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812)
 262.—Reg. Caucas.
caffra, Fenzl, in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222, nomen;
 et ex C. Muell. in Walp. Ann. vii. 276.—Afr. austr.
californica, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.
 Ser. II. iii. (1855) 83.—Calif.
calycina, Presl, Fl. Sic. 155.—Sicil.
calycina, Salzm. ex Rohrb. Monog. Silene, 99 = *tri-*
dentata.
calyculata, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 56 =
dianthoides.
Cambessedesii, Boiss. & Reut. Pugill. Nov. Pl. (1852)
 18 = *littorea*.
Campanula, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 248 =
elegans.
Campanula, Pers. Syn. i. 500.—Italia.
campanulata, Saut. in Flora, xiii. (1830) 485 =
S. Cucubalus.
campanulata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875)
 341.—Calif.
cana, Otth, in DC. Prod. i. 382 = *italica*.
canariensis, Willd. in Spreng. Neue Entdeck. iii. 60
 (nom. fals.?) = *corrugata*?
candicans, Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876)
 321.—Syria.
Candollii, Jord. ex Guss. Enum. Pl. Inar. 37 = *gallica*.
canescens, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = *gallica*, *Lychnis sylvestris*.
canescens, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv; Fl. Nap. i.
 236. t. 39 = *colorata*.
canopica, Boiss. Fl. Orient. i. 596 = *biappendiculata*.
canopica, Delile, Fl. Aeg. III. 88; ex Spreng. Syst. ii.
 406 = *villosa*.
cantabrica, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 5 =
gallica.
capensis, Otth, in DC. Prod. i. 379.—Afr. austr.
capillipes, Boiss. & Heldr. *Diagn.* Ser. II. v. 55.—
 Cilicia.
capitellata, Boiss. *Diagn.* Ser. I. i. 25.—As. Min.
cappadocica, Boiss. & Heldr. l. c. viii. 86.—As. Min.
caramanica, Boiss. & Heldr. l. c. 90.—As. Min.
cariensis, Boiss. l. c. i. 40.—Caria.
carnea, Salisb. Prod. 301 = *fruticosa*.
carnosa, Moench, Meth. Suppl. 306 = *nocturna*.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 142 (err. typ. 241) =
pensylvanica.
caryophylloides, Otth, in DC. Prod. i. 369.—As.
 Min.
caspica, Pers. Syn. i. 497.—Reg. Caucas.; Turkest.
cassia, Boiss. *Diagn.* Ser. I. viii. 78.—Syria.
Catesbaei, Walt. Fl. Carol. 141 = *virginica*.
catholica, Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 85.—Europ.
 austr.
catholica, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.
 iii. 665 = *italica*.
caucasica, Boiss. Fl. Orient. i. 622.—Reg. Caucas.
Ceccariana, Boiss. & Heldr. *Diagn.* Ser. II. i. 78 =
linifolia.
cephalantha, Boiss. Fl. Orient. i. 613.—Armenia.
cephallenia, Heldr. Fl. Céph. 26.—Ins. Ceph.
cephalonica, Schimp. & Wiest, ex Rohrb. Monog.
 Silene, 81 = *S. Fabaria*.
cerastiifolia, Boiss. Fl. Orient. i. 626 = *odontopetala*.
cerastoides, All. Fl. Pedem. ii. 79 = *gallica*.
cerastoides, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = *disticha*.
cerastoides, Linn. Sp. Pl. 417.—Reg. Mediterr.
cernua, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 623 = *Bur-*
chellii.
cernua, Thunb. Prod. Pl. Cap. 81 = *clandestina*.
cespitosa, Stev. = *caespitosa*.
chaetodonta, Boiss. *Diagn.* Ser. I. i. 39.—Syria;
 Persia.
chamarensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv.
 (1842) 578 = *tenuis*.
cheiranthifolia, Salzm. ex Rohrb. Monog. Silene, 102 =
obtusifolia.
cheiranthifolia, Schott, in Oken, Isis (1818), 821 =
micropetala.

5 Z

SILENE:—

cheiranthoides, Poir. Encyc. vii. 176 = pensylvanica.
chia, Spreng. Syst. ii. 409 = gallica.
chilensis, Cham. & Schlecht. ex Rohrb. Monog. Silene, 97 = gallica.
chirensis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 44.—Abyss.
chloraefolia, Sm. Pl. Ic. Ined. i. 13. t. 13.—As. Min.; Persia.
chlorantha, Ehrh. Beitr. vii. 144.—Europ.; Tauria.
chlorantha, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7, 9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = disticha.
chloropetala, Rupr. Fl. Caucas. 195.—Reg. Caucas.
Choalettii, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 169.—Alger.
chromodonta, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. i. 71.—Thessalia.
ciliata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = obtusiloba, vespertina.
ciliata, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 329.—Gallia.
ciliata, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 304 = discolor.
ciliata, Willd. Sp. Pl. ii. 692 = colorata.
cinerea, Desf. Fl. Atlant. i. 335.—Alger.
cirtensis, Pomel. Nouv. Mat. Fl. Atl. 328 = cinerea.
cisplatensis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 163.—Bras.
clandestina, Duby, Bot. Gall. 77 = cretica.
clandestina, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = antirrhina, apetala.
clandestina, Jacq. Coll. Suppl. 111.—Afr. austr.
clavaecarpa, Rochel, ex Rohrb. Monog. Silene, 220 = italica.
clavata, Moench, Meth. 706 = vallesia.
clavicaarpa, Rochel, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 821 = italica.
Clusii, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = gallica.
Clusii, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 583 = ceras-toides.
coarctata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = disticha.
coarctata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 15 = cerastoides.
coccinea, Moench, Meth. Suppl. 306 = virginica.
Coeli-rosa, A. Br. in Flora, xxvi. (1843) 373 = Lychnis Coeli-rosa.
colorata, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 334 = Friwald-skyana.
colorata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = gallica.
colorata, Poir. Voy. Barb. ii. 163.—Reg. Mediterr.
colorata, Schousb. ex Hornem. Hort. Hafn. i. 412 = obtusifolia.
commelinaefolia, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 35.—As. Min.; Persia.
commuta, 'Bert.' ex Nym. Consp. 88 = maritima.
commutata, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 499 = S. Cucubalus.
commutata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1859) 66 = nutans.
comollina, Ser. Fl. Gard. iii. (1849) 337.—Austria.
compacta, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 60; et ex Hornem. Hort. Hafn. i. 417.—Europ. or.; As. Min.
congesta, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 175 = Roemerii.
congesta, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = disticha.
congesta, Panč. ex Rohrb. Monog. Silene, 199 = Sendtneri.
congesta, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 583 = gallica, disticha.
congesta, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 300.—Graecia.
conica, Geners. ex Rohrb. Monog. Silene, 97 = gallica.
conica, Hampe, in Flora, xx. (1837) 226 = subconica.
conica, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = conoidea.
conica, Linn. Sp. Pl. 418.—Europ.; Oriens.
conifera, Steud. Nom. ed. II. ii. 583, sphalm. = seq.
confiora, Nees, ex Otth, in DC. Prod. i. 371.—Syria; Persia.
conoidea, Huds. Fl. Angl. ed. II. 189 = conica.
conoidea, Linn. Sp. Pl. 418.—Europ.; Oriens.
conringiaefolia, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 136, nomen.—Podolia.
Constantia, Eckl. & Zeyh. Enum. 32.—Afr. austr.

SILENE:—

Constantia, Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = clandestina.
cordata, Link. Handb. ii. 244, sphalm. = seq.
cordifolia, All. Fl. Pedem. ii. 82. t. 23. f. 3.—Pedemont.
coronaria, Clairv. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 826 = Lychnis coronaria.
corrugata, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 301.—Marocc.
corsica, DC. Fl. Fr. iv. 756 = succulenta.
corsica, Hort. Erf. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 428 = fruticosa.
corsica, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = nocturna.
corymbifera, Bertol. Fl. Ital. iv. 591 = S. Muscipula.
costata, Otth, in DC. Prod. i. 376 = clandestina.
Coulteriana, Otth, l. c. 368 = S. Cucubalus.
crassicaulis, Willk. & Costa, in Linnaea, xxx. (1859-60) 91.—Hispan.
crassifolia, Linn. Sp. Pl. 597.—Afr. austr.
crassifolia, Thore, Promen. Gascogne, 53, 54 = Thorci.
crassifolia, Thunb. Prod. Pl. Cap. 81 = Thunbergiana.
crassipes, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 8.—Syria.
cretacea, Fisch. in Spreng. Syst. ii. 405.—Sibir.
cretica, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = disticha, Cuphea procumbens.
cretica, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1070 = pendula.
cretica, Linn. Sp. Pl. 420.—Europ. austr.
crispa, Moench, Meth. 706 = pendula.
crispa, Poir. Encyc. vii. 162 = rubella.
crispata, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) i. 315, in textu = S. Cucubalus.
croatica, Waldst. & Kit. ex Rohrb. Monog. Silene, 140 = Waldsteinii.
cruentata, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 8 = gallica.
cryptantha, Viv. Fl. Lib. Spec. 23.—Lybia.
Cserei, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 345 = S. Fabaria.
Cucubalus, Wibel, Prim. Fl. Werth. 241.—Europ.; Afr. bor.; Reg. Himal.
cuneifolia, J. F. Gmel. Syst. 714 = gallica.
cuprea, Hort. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. iii. 52 = nutans.
cuspidata, Leveillé, in Demid. Voy. Russ. MÉR. ii. 234, sphalm. = Erysimum cuspidatum.
cylindriflora, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 171 = subconica.
cylindriflora, Kotschy, ex Rohrb. Monog. Silene, 90 = juvenalis.
cylindriflora, Otth, in DC. Prod. i. 371 = conoidea.
Czerei, Boiss. Fl. Orient. i. 629 = S. Fabaria.
dagestanica, Rupr. Fl. Cauc. 194.—Reg. Caucas.
dahurica, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 53.—Dahuria.
dalmatica, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 430 = Waldsteinii.
damascena, Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II. vi. 34 = palaestina.
dasyphylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 577 = tenuis.
decipiens, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 357.—Marocc.
decipiens, Barc. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. viii. (1879) 340.—Ins. Majorc.
decumbens, Bivona, Cent. Sic. Pl. i. 75 = colorata.
decumbens, Salzmann, ex Rohrb. Monog. Silene, 117 = glauca.
decumbens, Schreb. ex DC. Prod. i. 369 = procumbens.
delicatula, Bertol. Fl. Ital. iv. 624 = sedoides.
delicatula, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 41.—Cilicia.
delphica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 73 = congesta.
densiflora, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 303 = S. Otites.
depressa, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 826 = dinarica.
depressa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 336.—Reg. Caucas.
dianthifolia, J. Gay, in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 193.—Cilicia.
dianthifolia, Otth, in DC. Prod. i. 373 = altaica.
dianthoides, Pers. Syn. i. 500.—As. Min.
dianthoides, Schimp. ex Rohrb. Monog. Silene, 178 = chloraefolia.
dichotoma, Ehrh. Beitr. vii. 144.—Europ.
dichotoma, Gilib. Fl. Lituan. ii. 169 = noctiflora.
diffusa, Forsk. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 584 = Forskolei.
diffusa, Otth, in DC. Prod. i. 373 = colorata.
Dilleniana, Schott, ex Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 264.—Gallia.

SILENE:—

Dillenii, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = cretica.
dinarica, Spreng. Syst. ii. 405.—Transsylv.
dioica, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vii. 6 = conoidea.
discolor, Retz. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 38 = nutans.
discolor, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 292; Fl. Graec. v. 8. t. 410.—As. Min.
distachya, Brot. Fl. Lusit. ii. 189 = colorata.
distans, Otth, in DC. Prod. i. 370.—Hab. ?
disticha, Willd. Enum. Hort. Berol. 476.—Reg. Mediterr. occ.
distycha, Webb, Iter Hisp. 63 = gallica.
diurna, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 217 = Lychnis dioica.
diurniflora, Kunze, in Linnaea, xvii. (1843) 578 = undulata, Ait.
divaricata, Clemente, ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 15.—Hispan.
divaricata, Ehrenb. ex Rohrb. Monog. Silene, 178 = chloraefolia.
divaricata, Otth, in DC. Prod. i. 153 = fuscata.
divaricata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 293; Fl. Graec. v. 10. t. 414 = dichotoma.
diversifolia, Otth, in DC. Prod. i. 378 = rubella.
Dorrii, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. iii. (1863) 44 = Menziesii.
Douglasii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 88.—Am. bor. occ.
Douglasii, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = glauca.
Drummondii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 377 = Scouleri.
Drummondii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 89.—Am. bor. occ.
Drummondii, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = glauca.
dschabanica, C. Koch, ex Rohrb. Monog. Silene, 180 = armena.
dubia, Herb. ex Rohrb. l. c. 217 = nutans.
Duriaei, Spach, ex Rohrb. l. c. 116 = colorata.
Durieu, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = vespertina.
echinata, Jaub. & Spach, Illustr. i. 8 = squamigera.
echinata, Kotschy, ex Rohrb. Monog. Silene, 172 = crassipes.
echinata, Otth, in DC. Prod. i. 380.—Graecia.
echinosperma, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 78.—Graecia.
Echinus, Boiss. & Heldr. l. c. Ser. II. v. 56.—Pisidia.
Eckloniana, Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 126.—Afr. austr.
effusa, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 59, nomen.—Hab. ?
effusa, Otth, in DC. Prod. i. 370 = S. Otites.
Ehrenbergiana, Rohrb. in Bot. Zeit. xxv. (1867) 83.—Syria.
elata, Otth, in DC. Prod. i. 370 = chlorantha.
elegans, Brot. Fl. Lusit. ii. 185.—Lusitan.
Elisabethae, Jan, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 822.—Ital.
elongata, Bell. Osserv. Bot. 60 = acaulis.
elongata, Forsk. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 584 (Quid ?).—Aegypt.
Engelmanni, Rohrb. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. ii. 5 = Bridgesii.
eranthema, Wibel, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. 556 = stricta.
eremitica, Boiss. Fl. Orient. i. 644.—Persia.
eremophila, Bien. ex Boiss. Fl. Orient. i. 594 = colorata.
erigens, Willd. ex Rohrb. Monog. Silene, 155 = rubella.
eriocalycina, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 28.—Mesopot.
eriphora, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 408 = colorata.
eriphylla, Fur. ex Nym. Consp. 87.—Syria.
euxina, Rupr. Fl. Cauc. 184 = dichotoma.
exaltata, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 333 = S. Otites.
exaltata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = noctiflora.
exaltata, Nees, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 814, in obs. = colorata.
expansa, Hort. ex Rohrb. Monog. Silene, 211 = longipetala.
exscapa, All. Fl. Pedem. ii. 83 = acaulis.
exsudans, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 76 = microsperma.
fabaeifolia, Schott, ex Rohrb. Monog. Silene, 81 = S. Fabaria.

SILENE:—

Fabaria, Bertol. Fl. Ital. iv. 627 = *S. Cucubalus*.
Fabaria, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 293; Fl. Graec. v. 11. t. 415.—Sicil.; Creta.
falcata, Sibth. & Sm. Fl. cc. i. 301; 25. t. 436.—Bithyn.
Falconeriana, Royle, Illustr. Bot. Himal. 79. t. 20. f. a.—Reg. Himal.
fullax, Willk. Pl. Haloph. 107 = *ramosissima*.
fasciculata, Boiss. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient. i. 613 = *brachycarpa*.
Fenzlii, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 30.—Cilicia.
filiformis, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) 549 = *inaperta*.
filiformis, Otth, in DC. Prod. i. 376 = *picta*.
fimbriata, Baldw. ex Ell. Sketch. i. 515 = *Baldwinii*.
fimbriata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *S. Cucubalus*.
fimbriata, Sims, Bot. Mag. t. 908.—Reg. Caucas.
firma, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. 11. (1843) 166 = *aprica*.
Fischeri, Steud. Nom. ed. II. ii. 584 = *S. Cucubalus*.
fissa, Salisb. Prod. 302 = *Cucubalus baccifer*.
fissipetala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) 11. 371.—China.
fitulosa, G. Don, Gen. Syst. i. 405 = *italica*.
flammulacifolia, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 43.—Abyss.
flavescens, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 131. t. 175.—Hungar.; Banat.
foetida, Link, ex Spreng. Syst. ii. 406.—Lusitan.
foetida, Pourr. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 114, nomen.—Hispan.
foliosa, Maxim. Prim. Fl. Amur. 53.—Manchuria.
foliosa, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) 11. 559 = *macrostyla*.
fontana, Tenore, Fl. Nap. App. i. 26 = *quadrifida*.
Forskohlei, Steud. Nom. ed. II. ii. 584.—Aegypt.
Fortunei, Vis. Ind. Sem. Hort. Patav. (1847).—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 181.—China.
Fortunii, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *noctiflora*.
Friwaldskyana, Hampe, in Flora, xx. (1837) 227.—Thracia.
frutescens, Bieb. Besch. Casp. 175 = *altaica*?
fruticosa, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 974 = *altaica*.
fruticosa, Linn. Sp. Pl. 417.—Graecia; Sicilia.
fruticosa, Salz. ex Rohrb. Monog. Silene, 226 = *velutina*.
fruticulosa, Dietr. ex Otth, in DC. Prod. i. 381 = *caspica*.
fruticulosa, Fenzl, ex Rohrb. Monog. Silene, 128 = *dianthifolia*.
fruticulosa, Sieber, ex Otth, in DC. Prod. i. 376.—Ins. Creta.
fulgida, Kotschy, ex Rohrb. Monog. Silene, 103 = *palaestina*.
fuscata, Link, ex Brot. Fl. Lusit. ii. 187.—Reg. Mediterr.
gallica, Hort. Par. ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 212 = *reflexa*.
gallica, Linn. Sp. Pl. 417.—Oriens.
Gallinyi, Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *squamigera*.
Gallinyi, Heuff. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 815 = *trinervia*.
Gebleriana, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 91.—Soongar.
geminiflora, Willd. Enum. Hort. Berol. 472 = *obtusifolia*.
geniculata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14.—Gallia.
geniculata, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 328 = *ciliata*.
germana, J. Gay, ex Coss. Notes Crit. ii. 31 = *Boissieri*.
getula, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 329.—Alger.
gibraltaria, Boiss. Elench. 20 = *mollissima*.
gigantea, Linn. Sp. Pl. 418.—Reg. Mediterr.
Giraldii, Guss. Ennm. Pl. Inar. 36. t. 1. f. 2 = *gallica*.
glabra, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 1147, sphalm. = *Sagina glabra*.
glandulosa, Bertol. Fl. Ital. vi. 626 = *gallica*.
glandulosa, Hampe, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 302 = *plutonica*.
glareosa, Jord. Pugill. Pl. Nov. 31 = *S. Cucubalus*.
glauca, Hort. Par. ex Rohrb. Monog. Silene, 118 = *apetala*.
glauca, Lag. Elench. Hort. Matr. (1808); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 15.—Reg. Mediterr. occ.
glauca, Salisb. Prod. 302 = *S. Armeria*.
glauca, Sm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 584 = *S. Cucubalus*.

SILENE:—

glauca, Zea, ex Poir. Encyc. Suppl. v. 153 = *crassipes*.
glaucofolia, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *apetala*.
glaucofolia, Lag. in Varied. Cienc. ii. iv. (1805) 213 = *Lychnis pyrenaica*.
glaucophylla, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 641.—Hispan.
glomerata, C. Gay, Fl. Chil. i. 259 = *gallica*.
glutinosa, Duf. ex Cambess. in Mém. Mus. Par. xiv. (1827) 219 = *rubella*.
glutinosa, Pers. Syn. i. 498 = *catholica*.
glutinosa, Rohrb. Monog. Silene, 80, sphalm. = *plutonica*.
glutinosa, Zois, in Sitzb. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 80 = *eriphylla*.
goniocalyx, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 31.—Persia.
gonocalyx, Boiss. l. c. 38 = *crassipes*.
gracilis, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 145 = *longicaulis*.
gracilis, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *apetala*.
gracillima, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 679.—Japan.
graeaca, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. i. 36.—Graecia.
graeaca, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *conoidea*.
graeaca, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 865 = *pendula*.
Graefferi, Guss. Pl. Rar. Sic. 170. t. 34 = *ciliata*.
graminea, Vis. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 52 = *vallesia*.
graminifolia, Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 32 = *Marschallii*.
graminifolia, Ledeb. Fl. Alt. ii. 143 = *turgida*.
graminifolia, Otth, in DC. Prod. i. 368 = *tenuis*.
grammatocalyx, Fenzl, ex Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 82 = *macrodonata*.
grata, Donnersm. Adumbr. Pl. 28 = *reticulata*.
graveolens, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 242 = *ramosissima*.
Grayi, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 291.—Calif.
Greggii, A. Gray, Pl. Wright. ii. 17 = *laciniata*.
Griffithii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 76.—Reg. Himal.
grisea, Boiss. l. c. Ser. I. viii. 88.—Syria.
Guicciardii, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 32 = *Marschallii*.
Guilelmi-Waldemari, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 140 = *tenuis*.
gymnotheca, Panč. ex Nym. Consp. 92 = *fruticulosa*.
Gysophila, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 184 = *repens*.
gypsophiloides, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 45 = *repens*.
Haenkeana, Presl, Rel. Haenk. ii. 19 = *gallica*.
halopetala, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *S. Saxifraga*.
halophila, Link, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 650 = *littorea*.
halophila, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 406.—Hispan.
Heldreichii, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 81.—As. Min.
Hellmanni, Claus, in Beitr. Pfl. Russ. Reich. viii. 289.—Rossia.
Heuffleri, Hausm. ex Nym. Consp. 87 = *eriphylla*.
hirsuta, Lag. in Varied. Cienc. ii. iv. (1805) 212.—Reg. Mediterr. occ.
hirsuta, Poir. Voy. Barb. ii. 163 = *vespertina*.
hirsuta, Presl, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 23 = *gallica*.
hirsuta, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 356 = *disticha*.
hirsutissima, Otth, ex DC. Prod. i. 372 = *hirsuta*.
hirta, Willd. Hort. Berol. t. 23 = *sericea*.
hispanica, Jacq. Fragm. 47 = *colorata*.
hispanica, Otth, in DC. Prod. i. 369 = *littorea*.
hispida, Desf. Fl. Atlant. i. 348 = *vespertina*.
hispida, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *gallica*.
hispida, Hort. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 476; et Poir. Encyc. Suppl. v. 151 = *disticha*.
hispida, Salz. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 358 = *hirsuta*?
Hochstetteri, Rohrb. in Bot. Zeit. xxv. (1867) 81.—Abyss.
Hoefftiana, Fisch. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 215.—Reg. Caucas.
Hohenackeri, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 75 = *Ancheriana*.
holopetala, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 142.—Sibir. altaica.
Honigbergeri, Fenzl, in Endl. & Fenzl, Sert. Cabul. 3.—Afghan.

SILENE:—

Hookeri, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *glauca*.
Hookeri, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 192.—Am. bor. occ.
Hornemanni, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *Lychnis dioica*.
Hornemanni, Steud. Nom. ed. II. ii. 584.—Europ. austr.
humilis, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 215.—Reg. Caucas.
Hussoni, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 76.—Arabia; Aegypt.
iberica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 335 = *dichotoma*.
iconia, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 85 = *Marschallii*.
ignobilis, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) 549 = *S. Behen*.
imbricata, Desf. Fl. Atlant. i. 349. t. 98.—Afr. bor.
inamoena, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *apetala*.
inaperta, DC. Fl. Fr. iv. 750 = *rubella*.
inaperta, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *annulata*, *linicola*.
inaperta, Linn. Sp. Pl. 419.—Reg. Mediterr. occ.
inaperta, Sibth. & Sm. Fl. Graec. v. 14 = *multicaulis*.
incarnata, Lodd. Bot. Cab. t. 41 = *pensylvanica*.
inclusa, Hornem. Hort. Hafn. i. 413 = *nocturna*.
incompta, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 330 = *Bridgesii*.
inconspicua, Roem. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 585.—Cf. Rohrb. Monog. Silene, 228 (Quid?).—Hab.?
incurvifolia, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 391.—Sibir.
indica, Roxb. Hort. Beng. 34; Fl. Ind. ii. 446 = *Lychnis indica*.
inflata, Sm. Fl. Brit. 467 = *S. Cucubalus*.
infracta, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 237 = *nutans*.
insubrica, Gaud. Fl. Helvet. iii. 173 = *italica*.
insularis, W. Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. xxi. (1885) 94.—Ins. Karpathos (prope Rhodon).
integrifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 585, sphalm. ? = *seq.*
integripetala, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélo. 27.—Graecia.
intrusa, Wight & Arn. Prod. 42 = *colorata*.
involuta, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. Suppl. 210. n. 47.—Turcia.
isipirensis, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 55 = *lazica*.
italica, Pers. Syn. i. 498.—Reg. Mediterr.; Oriens.
italica, Pollini, Fl. Veron. ii. 61 = *nutans*.
italica, Viv. Fl. Cors. 6 = *Salzmanni*.
japonica, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 689.—Japan.
jenisea, Poir. Encyc. Suppl. v. 154 = *tenuis*.
jenisea, Steph. ex Bunge, Verz. Alt. 30.—Sibir. altaica.
jenisensis, Willd. Enum. Hort. Berol. 473 = *jenisea*.
jucunda, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 8 = *gallica*.
juncea, Roth, Catalect. i. 54 = *longiflora*.
juncea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 295 = *picta*.
juniperina, Kunth, ex Rohrb. Monog. Silene, 193 = *Urvillei*.
juvenalis, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1836) 23.—As. Min.
Kaulfussii, Spreng. Pugill. ii. 64 = *rupestris*.
Keiskei, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 77 = *repens*.
khasyana, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 253.—Reg. Himal.
Kitaibelii, Vis. Fl. Dalm. iii. 169 = *Waldsteinii*.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 40 = *microperma*.
Kowalenskyi, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) 1. 322 = *arenosa*.
Kremeri, Soyer-Willem. & Godr. in Mém. Soc. Sc. Acad. Nancy, 1850 (1851) 165.—Alger.
kunawarensis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 79.—Reg. Himal.
Kuschakewiczii, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 246.—Turkestan.
lacera, Sims, Bot. Mag. t. 2255 = *fimbriata*.
laciniata, Cav. Ic. vi. 44. t. 564.—Am. bor. occ.
laconica, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. vi. 34.—Graecia.
laeta, A. Br. in Flora, xxvi. (1843) 373; Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 220.—Reg. Mediterr. occ.
laeta, Ehrenb. ex Rohrb. Monog. Silene, 150 = *Reuteriana*.

SILENE:—

laevigata, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 295; *Fl. Graec.* v. 13. t. 418.—Ins. Cyprus.
Lagascacae, Boiss. in Welw. It. Lusit. 490 = apetal.
lagenocalyx, Fenzl, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 587.—Persia.
lagunensis, C. Sm. ex Link, in Buch, *Beschr. Canar.* Ins. 154 = nutans.
lanceolata, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 111.—Ins. Sandvic.
lanuginosa, Bertol. in Desv. *Journ. Bot.* ii. (1813) 76 = auriculata.
lasiantha, C. Koch, in *Linnaea*, xv. (1841) 712 = Marshallii.
lasiopetala, Fenzl, Pugill. *Pl. Nov. Syr.* 8 = Marshallii.
lasiostyla, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 79 = S. Psammitis.
latiflora, Link, in Schrad. *Neue Journ.* ii. 1. (1807) 99, sphalm. = *laxiflora*.
latifolia, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 647 = S. Armeria.
latifolia, Hornem. *Suppl. Hort. Hafn.* 49 = Horne-manni.
latifolia, Poir. *Voy. Barb.* ii. 165.—Afr. bor.
laxa, Boiss. & Kotschy, in Boiss. *Fl. Orient.* i. 638.—Armenia.
laxiflora, Brot. *Fl. Lusit.* ii. 188 = hirsuta.
lazica, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 35.—Reg. Caucas.
Ledebourii, Heynh. *Nom.* ii. 667 = pygmaea.
legionensis, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = vespertina, nocturna.
legionensis, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 14.—Hispan.
Lemmonii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* x. (1875) 342.—Calif.
lepta, J. Gay, in Boiss. *Fl. Orient.* i. 602 = micro-sperma.
leptoclada, Boiss. *Fl. Orient.* i. 647.—Lycia.
leptopetala, Schrenk, in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* ii. (1844) 198.—Soongar.
Lerchenfeldiana, Baumg. *Enum. Stirp. Trans.* i. 398.—Transsylyv.; Banat.
leucifolia, Orsini, ex Rohrb. *Monog. Silene*, 229 = multicaulis.
leucophaea, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 297; *Fl. Graec.* v. 17. t. 431 = nicaeensis.
leucophylla, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 29.—Arab.
leyseroides, Boiss. l. c. 41 = arenosa.
libanotica, Boiss. l. c. viii. 89.—Syria.
ligulata, Viv. *Fl. Lib. Spec.* 24. t. 12. f. 3.—Tripoli.
linaccola, Wibel, ex Spreng. *Syst.* ii. 412, sphalm. = seq.
linaeola, Wibel, ex Otth, in DC. *Prod.* i. 379, sphalm. = stricta.
linearifolia, Otth, l. c. 374 = petraea.
linearis, Decne. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* iii. (1835) 276.—Arab.
linearis, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 51 = S. Cucubalus.
lineata, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 37.—Persia.
linicola, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iv. 304.—Europ.
linifolia, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = gallica.
linifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. v.* 23. t. 433.—Graecia.
linifolia, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 473 = clandestina.
linoides, Otth, in DC. *Prod.* i. 384 = linifolia.
linoides, Soleir. ex Rohrb. *Monog. Silene*, 165 = inaperta.
lithophila, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 167.—Soongar.
litigiosa, Schrenk, in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* ii. (1844) 198 = supina.
littoralis, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 31 = gallica.
littoralis, Plan. Ens. Fl. Gallega, 123 = hirsuta.
littoralis, Pourr. in *Mém. Acad. Toul.* iii. (1788) 329 = nicaeensis.
littorea, Brot. *Fl. Lusit.* ii. 186.—Hispan.
littorea, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = gallica.
livida, Wierzb. ex Rohrb. *Monog. Silene*, 219 = italica.
livida, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 474 = nutans.
Loeflingiana, Bernh. ex Godr. *Inflo. Gen. Silene*, 34 = longicaulis.
Loiseleurii, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* i. 220.—Gallia.
longicaulis, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = annulata.
longicaulis, Pourr. ex Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 15.—Hispan.

SILENE:—

longicilia, Otth, in DC. *Prod.* i. 377 = nutans.
longiflora, Bory, in *Ann. Gén. Sc. Phys.* iii. (1820) 14 = Boryi.
longiflora, Ehrh. *Beitr.* vii. 144.—Europ. or.; Oriens.
longifolia, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 1576 = nutans.
longipetala, Vent. *Jard. Cels*, 83. t. 83.—As. Min.; Syria.
lurida, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 585 = nutans.
lusitanica, Linn. *Sp. Pl.* 416 = gallica.
lusitanica, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 290 = vespertina.
Lyallii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* x. (1875) 342.—Am. bor. occ.
lychnidea, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 213.—Reg. Caucas.
lychnidiflora, Otth, in DC. *Prod.* i. 375 = cretica.
lycia, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 90 = rhynchocarpa.
lydia, Boiss. l. c. i. 37.—As. Min.
macroclada, Boiss. l. c. viii. 84 = S. Otites.
macrodonata, Boiss. l. c. i. 37.—Graecia.
macropetala, Spreng. *Syst.* ii. 414 = longipetala.
macrophylla, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 15.—Reg. Caucas.
macrophylla, Spreng. ex Rohrb. *Monog. Silene*, 81 = S. Fabaria.
macrorhiza, J. Gay, ex Rohrb. l. c. 142 = foetida.
macrosolen, Steud. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 44.—Abyss.
macrostemma, Schrank, in *Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 46.—Galatia.
macrostyla, Maxim. *Prim. Fl. Amur.* 54.—Reg. Amur.
makmeliana, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 89 = chlorae-folia.
makmeliana, Boiss. & Buhse, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 639 = longiflora.
Mandalisci, Parl. in L'Occhio (1839), n. VIII. 61; ex Bertol. *Fl. Ital.* iv. 609 = sericea.
marginata, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 536 = S. Cucubalus.
marginata, Schott, in *Syll. Ratisb.* i. (1824) 210 = gallica.
maritima, Host, *Fl. Austr.* i. 528 = S. Cucubalus.
maritima, With. *Bot. Arr. Brit. Pl.* ed. III. ii. 414.—Europ.
Marshallii, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 214.—Reg. Caucas.; Oriens.
masmenaea, Boiss. *Diagn. Ser. II.* v. 57.—As. Min.
matutina, Presl, *Fl. Sic.* 149 = nocturna.
mauritanica, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 328.—Alger.
mauritanica, Pott, ex Rohrb. *Monog. Silene*, 84 = maritima.
Maximowicziana, Rohrb. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 680.—Japon. (cult.).
megaspilaea, Boiss. & Heldr. ex Rohrb. *Monog. Silene*, 140 = multicaulis.
melandroides, Lange, in Kjoeb. *Vidensk. Meddel.* (1877-78) 233.—Hispan.
melandryiformis, Maxim. *Prim. Fl. Amur.* 54 = aprica.
melanophylla, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 24 = dianthoides.
mellifera, Boiss. & Reut. *Diagn. Pl. Nov. Hisp.* 9.—Hispan.
membranea, Poir. *Encyc.* vii. 165 = noctiflora.
Menziesii, Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 90. t. 30.—Am. bor. occ.
mexicana, Moç. & Sesse, ex Otth, in DC. *Prod.* i. 379 = laciniata.
Meyeri, Fenzl, ex Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 38 = depressa.
micrantha, Link, ex Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 15 = micropetala.
microloba, Schott, Nym. & Kotschy, *Analect. Bot.* 59 = S. Cucubalus.
micropetala, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 146 = cerastoides.
micropetala, Lag. in *Varied. Cienc.* ii. iv. (1805) 213.—Hispan.
micropetala, Roem. ex Schrank, *Pl. Rar. Hort. Monac.* i. t. 39; et in *Syll. Ratisb.* i. (1824) 212 = disticha.
micropetala, Tenore, *Fl. Nap.* v. 344 = gallica.
microphylla, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 33.—Persia.
microphylla, DC. *Prod.* i. 372, sphalm. = *micropetala*, Roem.
microsperma, Fenzl, in Russeg. *Reise*, ii. 916 = linearis.

SILENE:—

microsperma, Fenzl, Pugill. *Pl. Nov. Syr.* 9.—Syria.
miniata, Rafin. *Ann. Nat.* 12 (Quid ?)—Am. bor.
minutiflora, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov.* fasc. i. 4.—Hispan.
mixta, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = S. Armeria, gallica.
Mociniana, DC. *Prod.* i. 382 = laciniata.
modesta, Boiss. & Blanche, *Diagn. Ser. II.* vi. 33 = chaetodontata.
modesta, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov.* fasc. i. 5 = gallica.
mogadorensis, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 55 = corrugata ?
mollis, Hornem. Hort. Hafn. i. 418 = flavescens.
mollissima, Frivald. ex Rohrb. *Monog. Silene*, 204 = gigantea.
mollissima, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [9]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = annulata, cretica.
mollissima, Otth, in DC. *Prod.* i. 382 = italica.
mollissima, Pers. *Syn.* i. 498 = velutina.
mollissima, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 298.—Reg. Mediterr. occ.
molopica, Fenzl, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 578 = coniflora.
monachorum, Vis. ex Nym. *Consp.* 87 = quadriden-tata.
monantha, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* x. (1875) 340 = Douglasii.
montana, Arrond. in *Bull. Soc. Polym. Morb.* (1863) 58; et in *Cat. Pl. Morb.* 15 = maritima.
montana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* x. (1875) 343.—Am. bor. occ.
Montbretiana, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 26.—Armenia.
Moorcroftiana, Wall. *Cat. n.* 626.—Reg. Himal.
Morisi, Todaro, *Ind. Sem. Hort. Panorm.* (1872) 39; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* v. (1873) 158.—Italia.
multicaulis, Boiss. *Fl. Orient.* i. 651 = clavata.
multicaulis, Durand. in *Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.* Ser. II. iii. (1855); ex S. Wats. *Bibliog. Ind. N. Am.* Bot. i. 108 = Bridgesii.
multicaulis, Guss. *Pl. Rar.* 172. t. 35.—Europ. austr.
multicaulis, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 192, 675 = Douglasii.
multifida, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 34 = Griffithii.
multifida, Rohrb. *Monog. Silene*, 88 = fimbriata.
multiflora, Pers. *Syn.* i. 497.—Hungar.; Sibir.
Mundiana, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 32.—Afr. austr.
muricata, Host, ex Fenzl, *Adv. Bot.* [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = squamigera.
Muscipula, Linn. *Sp. Pl.* 420.—Reg. Mediterr.
Muscipula, Otth, in DC. *Prod.* i. 379 = stricta.
Mussini, Hornem. Hort. Hafn. i. 415 = catholica.
mutabilis, Linn. *Cent. Pl.* ii. 16; Amoen. *Acad.* iv. 314 = nocturna.
mutabilis, Siev. in *Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 229.—Rossia.
mutica, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = disticha.
myloptera, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov.* fasc. i. 8 = gallica.
nana, Cambess. ex Nym. *Consp.* 96 = littorea.
nana, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 169.—Persia; Turkest.
nardifolia, Boiss. & Huet, *Diagn. Ser. II.* v. 56 = caryophylloides.
natalensis, Buching. ex Krauss, in *Flora*, xxvii. (1844) 292 = crassifolia.
nebrodensis, Jan, ex Rohrb. *Monog. Silene*, 219 = italica.
neglecta, Tenore, *Prod. Fl. Neap. App.* v. 13; et in *Linnaea*, iii. (1828) Litt. 99 = reflexa.
nemoralis, Waldst. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* iii. 271. t. 249 = italica.
Nentwichii, Frivald. ex Rohrb. *Monog. Silene*, 198 = Roemeri.
nevadensis, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 721.—Hispan.
nicaeensis, All. *Misc. Taur.* v. (1770-73) 88 (niceensis); *Fl. Pedem.* ii. 81.—Reg. Mediterr.
nicaeensis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, i. (1826) 41 = verecunda.
nicaeensis, Hort. ex Fenzl, *Adv. Bot.* [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = gallica.
Niederi, Heldr. in Boiss. *Diagn. Ser. II.* vi. 32.—Graecia.

SILENE:—

nitida, Lag. Gen. et Sp. Nov. 15 = fruticosa.
nivalis, Rohrb. Monog. Silene, 142. — Transylv.
nivea, Muhl. Cat. ex DC. Prod. i. 377. — Am. bor.
noctolens, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 141. —
 Ins. Canar.
noctiflora, Linn. Sp. Pl. 419. — Europ.; Oriens.
nocturna, Linn. l. c. 416. — Reg. Mediterr.
nocturna, Pall. Tabl. Taur. 50; et ex Georgi,
 Besch. Russ. Reich. iv. 974 = dichotoma.
nocturna, Schimp. ex Rohrb. Monog. Silene, 119 =
 colorata.
nodulosa, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 31. — Persia.
nodulosa, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 6 = pauciflora.
norwegica, Pers. Syn. i. 500 = acaulis.
Notarisii, Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1838) 346 =
 multicaulis.
novissima, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. ii. 586 (Quid ?).
 — Hab. ?
nubigena, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1862) II. 378. —
 Chili.
nudicaulis, Ehrenb. ex Rohrb. Monog. Silene, 105 =
 biappendiculata.
nutans, Linn. Sp. Pl. 417. — Europ.; As. bor.
nyctantha, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = clandestina.
nyctantha, Willd. Enum. Hort. Berol. 472 = nocturna.
oblongifolia, Otth, in DC. Prod. i. 369 = rubella.
obtusifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 473. — Reg.
 Mediterr. occ.
occidentalis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875)
 343. — Calif.
occitanica, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 6 =
 gallica.
ocimoides, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 184 = italica.
odontopetala, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 9. — As.
 Min.; Syria.
odoratissima, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 148. —
 Turkestan; Sibir.
Oldhamiana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii.
 187 = aprica.
oleracea, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 95 = S.
 Cucubalus.
Olgae, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch.
 14. — Turkestan.
Olgae, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869–70) 687. —
 Manchuria.
oligantha, Bess. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 321 = depressa.
oligantha, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 75 =
 radicata.
Oliveriana, Boiss. ex Rohrb. Monog. Silene, 105 =
 biappendiculata.
Oliveriana, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = gallica.
Oliveriana, Otth, in DC. Prod. i. 373 = colorata.
olympica, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 24. — As. Min.
olympica, Panč. ex Rohrb. Monog. Silene, 139 =
 fruticulosa.
oppositifolia, S. G. Gmel. ex J. F. Gmel. Syst. 717 =
 conica.
orchidea, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = nocturna.
orchidea, Linn. f. Suppl. 241 = aegyptiaca.
Oreades, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 92 =
 S. Saxifraga.
oregana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 343.
 — Am. bor. occ.
oreophila, Boiss. Fl. Orient. i. 617. — Cappadoc.
orientalis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10. — Oriens.
ornata, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 96. — Afr. austr.
Orphanidis, Boiss. Fl. Orient. i. 651. — Graecia.
Orsiniana, Reichb. ex Cesati, Stirp. Ital. i. 8 = multi-
 caulis.
Otites, Sm. Fl. Brit. ii. 469; Pers. Syn. i. 497. —
 Europ.; Oriens.
otitis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134
 = praec.
Ouensae, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 55,
 nomen. — Afr. bor.
ovata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 316. — Am. bor.
oxydonta, C. & W. Barbey, Herbor. au Levant, 121.
 t. 11. — Palaest.
pachyphylla, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2, 7]; in Del.
 Sem. Hort. Vindob. (1851) = gallica, obtusifolia.
palaestina, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 80. — Palaestin.
palinotricha, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. i. 621. — Persia.
pallida, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv.
 (1853) 12 = longiflora.

SILENE:—

pallidiflora, Link. ex Rohrb. Monog. Silene, 118 =
 apetala.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 124.
 — Calif.
pamphylica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 81 =
 macrodonta.
paniculata, Ehrenb. ex Rohrb. Monog. Silene, 195 =
 stenobotrys.
paniculata, Otth, in DC. Prod. i. 382 = italica.
panormitana, Parl. ex Bertol. Fl. Ital. iv. 610 =
 cretica.
papillosa, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 39. — As. Min.
paradoxa, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 246 = nutans.
paradoxa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1673. — Europ. austr.
Parishii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882)
 366. — Calif.
parnassica, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. viii. 91 =
 fruticulosa.
parviflora, Boiss. Fl. Orient. i. 607. — Reg. Caucas.
parviflora, Hampe, in Flora, xx. (1837) 233 = Roemerii.
parviflora, Moench, Meth. 708 = cretica.
parviflora, Pers. Syn. i. 497 = S. Otites.
parviflora, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1831) 1.
 Beibl. 8 = jenisea.
parviflora, Zea, ex Poir. Encyc. Suppl. v. 150 =
 littorea.
parvifolia, Otth, in DC. Prod. i. 376 = disticha.
parvula, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 7 =
 gallica.
patens, Peete, in Engl. Bot. Suppl. t. 2748 = italica.
patula, Desf. Fl. Atlant. i. 356 = italica.
patula, Lag. in Anal. Cienc. Nat. (1802); ex Duf. in
 Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 242 = rubella.
pauciflora, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 537 (Quid ?).
 — Europ.
pauciflora, Ledeb. Fl. Ross. i. 306. — Ross. arct.; Sibir.
pauciflora, Salz. ex Otth, in DC. Prod. i. 382. —
 Ins. Corsic.; Sardoia.
pauciflora, Ucria, in Roem. Arch. i. 1. (1796) 68 =
 viridiflora.
pectinata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 344.
 — Calif.
pedicellata, Boiss. Fl. Orient. i. 608 = S. Otites.
pedicellata, Poir. Encyc. Suppl. v. 150 = italica.
peduncularis, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 30. — Persia.
pelidna, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = nocturna, Lychnis dioica.
pelidna, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 821; Ic. Fl. Germ.
 iii. 53 = nutans.
pendula, Linn. Sp. Pl. 418. — Reg. Mediterr.
pendula, Salz. ex Willk. Ic. et Desc. Pl. Hisp. i. 49
 = littorea.
pensylvanica, Michx. Fl. Bor. Am. i. 272. — Am. bor.
pentelica, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 74 = sedoides.
perfoliata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = S. Schafta.
perfoliata, Otth, in DC. Prod. i. 384 = chloraefolia.
permixta, Jord. Pugill. Pl. Nov. 32 = nocturna.
pernoctans, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = noctiflora, S. Schafta.
pernoctans, Link. ex Spreng. Syst. ii. 408 = colorata.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 27. — Persia.
Persoonii, Schott, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 823 =
 S. Cucubalus.
Petalozsae, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 87 = cappadocica.
petraea, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. (1805) 58.
 — Reg. Caucas.
petraea, Ledeb. & Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824)
 211 = pygmaea.
petraea, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 178. t. 164
 = S. Saxifraga.
pharnaceifolia, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 9. — Cilicia.
phrygia, Boiss. Fl. Orient. i. 644. — As. Min.
physalodes, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 83. — Palestin.
physocalyx, Ledeb. Fl. Ross. i. 321 = odontopetala.
picta, Desf. Tabl. ed. I. 159 = portensis.
picta, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort.
 Vindob. (1851) = nocturna, vespertina.
picta, Pers. Syn. i. 498. — Reg. Mediterr.
picta, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 816 = Reichenbachii.
pilosa, Hort. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 476 =
 disticha.
pilosa, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii.
 652 = colorata.
pilosa, Spreng. Syst. ii. 411 = italica.
pilosellaefolia, Chan. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826)
 41 = Burchellii.

SILENE:—

piloselloides, G. Don, Gen. Syst. i. 404 = Burchellii.
pinetorum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 75. —
 Ins. Creta.
pinguis, Vahl, ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 49 =
 nocturna.
pittodes, Bien. ex Boiss. Fl. Orient. i. 606 = chaeto-
 donta.
platyota, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882)
 366. — Calif.
platyoteta, Otth, in DC. Prod. i. 383 = pensylvanica.
plicata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 366
 = Thurberi.
plutonica, Naud. ex C. Gay, Fl. Chil. i. 258. — Chili.
Pollinii, Nym. Syll. 232 = nutans.
polygama, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 536 = S. Saxifraga.
polygonoides, Pers. Syn. i. 500. — Ins. Naxos.
polyphylla, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 397 =
 nutans.
polyphylla, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 338 = spargulaefolia.
polyphylla, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = noctiflora.
polyphylla, Linn. Sp. Pl. 420 = portensis.
polyphylla, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 609 = inaperta.
polytrichoides, Zumb. Fl. Pedem. ii. 269; et Cur. Post.
 p. iv. — Pedem.
pompeopolitana, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient. i. 595.
 — Cilicia.
porrigens, Gouan, ex Linn. Syst. ed. XII. 230 =
 Gypsophila porrigens.
portensis, Frivald. ex Rohrb. Monog. Silene, 167 =
 cretica.
portensis, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = gallica.
portensis, Linn. Sp. Pl. 420. — Hispan.
Pourretii, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem.
 Hort. Vindob. (1851) = noctiflora.
Pourretii, Poir. Encyc. Suppl. v. 151 = ciliata.
praecox, Hort. Par. ex Rohrb. Monog. Silene, 118 =
 apetala.
pratensis, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 216 = Lychnis
 dioica.
primulaeflora, Eckl. & Zeyh. Enum. 32. — Afr. austr.
procumbens, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del.
 Sem. Hort. Vindob. (1851) = vespertina.
procumbens, Murr. in Comm. Gotting. 1784, 1785
 (1786), 83. t. 2. — Sibir.
prostrata, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 406 = halophila.
pruinosa, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 23 = supina.
psammica, Boiss. ex Rohrb. Monog. Silene, 110 =
 discolor.
Psammitis, Link. in Spreng. Nov. Prov. 39. — Afr. bor.
Pseudo-atocion, Desf. Fl. Atlant. i. 353. — Afr. bor.
Pseudo-atocion, Guss. Pl. Rar. 180 = fuscata.
Pseudo-behen, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 36 = S. Behen.
Pseudo-behen, Schur, ex Nym. Consp. 88 = S. Cucu-
 balus.
Pseudo-linum, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 750 =
 rubella.
Pseudo-otites, Bess. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 819
 = S. Otites.
pteropleura, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 18 =
 stricta.
ptolemaica, Ehrenb. ex Rohrb. Monog. Silene, 105 =
 biappendiculata.
puberula, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. vi.
 (1842) 221 = colorata.
puberula, Boiss. Fl. Orient. i. 636. — Armenia.
puberula, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 94
 = S. Cucubalus.
pubescens, Loisel. Fl. Gall. 727 = sericea.
pudibunda, Hoffmgg. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.
 817 = quadridentata.
pulchra, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 675 = laciniata.
pumila, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)
 135 = seq.
Pumilio, Wulf. in Jacq. Fl. Austr. v. 26; Sturm,
 Deutschl. Fl. Heft 22. — Europ. alp.
punctata, Bubani, ex Nym. Consp. 92 = elegans.
pungens, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 32. — As. Min.
purpurea, Knowl. & Westc. Flor. Cab. i. (1837) 87 =
 compacta.
pusilla, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 235 =
 quadridentata.
pygmaea, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. (1805)
 59. — Europ.
pygmaea, Herd. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 44 =
 gallica.

SILENE:—

pygmaea, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = noctiflora.
pygmaea, Less. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 323 = *caspica*.
pyrenaica, Pourr. ex Rohrb. Monog. Silene, 115 = *colorata*.
pyriformis, Dur. ex Coss. & Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 221 = *glaucula*.
quadridentata, DC. Fl. Fr. iv. 748 = *quadrifida*.
quadridentata, Pers. Syn. i. 500. — Europ. austr.
quadrifida, Georgi, Reise, i. 215. — Sibir. baical.
quadrifida, Linn. Syst. ed. X. 1032. — Europ.
quadrifida, Otth, in DC. Prod. i. 378 = *nutans*.
quadriloba, Turcz. ex Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 167 = *viscosa*.
quinquevulnera, Linn. Sp. Pl. 416 = *gallica*.
racemosa, Otth, in DC. Prod. i. 384 = *dichotoma*.
Kaddeana, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 472. — Armenia.
radicans, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 168 = *odoratissima*.
radicosa, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 24. — Graecia.
Ramburiana, Webb, Iter Hisp. 64 = *Boryi*.
ramosa, G. Don, Gen. Syst. i. 409 = *ramosissima*.
ramosa, Otth, in DC. Prod. i. 380 = *sedoides*.
ramosissima, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 93. t. 24 = Boissieri.
ramosissima, Desf. Fl. Atlant. i. 354. — Afr. bor.
ramosissima, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 599 = *sedoides*.
ramosissima, Willk. Pl. Haloph. 108 = *divaricata*.
recta, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 623 = *clandestina*.
reflexa, Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 86. — Europ. austr.
reflexa, Hort. Taur. ex Rohrb. Monog. Silene, 94 = *dichotoma*.
reflexa, Moench, Meth. 705 = *gallica*.
regia, Sims, Bot. Mag. t. 1724. — Am. bor.
Reichenbachii, Vis. Fl. Dalm. iii. 169. — Dalmat.
Reinholdii, Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 238 = *S. Behen*.
Reinwardtii, Roth, Catal. fasc. iii. 42 = *picta*.
remotiflora, Vis. Fl. Dalm. iii. 166. — Dalmat.
repens, Boiss. Fl. Orient. i. 614 = *tenuis*.
repens, Patr. in Pers. Syn. Pl. i. 500. — Reg. Caucas.; Sibir. or.
Requienii, Otth, in DC. Prod. i. 381. — Graecia.
reticulata, Desf. Fl. Atlant. i. 350. t. 99. — Alger.
reticulata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *cretica*.
reticulata, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 426 = *picta*.
retroflexa, Steud. Nom. ed. I. 780; ed. II. ii. 587 = *aegyptiaca*.
Reuteriana, Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II. v. 54. — Syria.
rhodopea, Janka, in Termész. Füzetek, ii. (1878) 28. — Thracia.
rhynchocarpa, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 33. — As. Min.
rigida, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 252. — Syria.
rigidula, Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 79 = *echinosperma*.
rigidula, Linn. Cent. Pl. ii. 16; Amocn. Acad. iv. 313 = *cerastoides*.
rigidula, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 299. — Graecia.
rimarum, J. Gay, ex Tchihat. Asie Min. Bot. i. 200. — Cilicia.
Roemerii, Frivald. in Flora, xix. (1836) 439. — Banat.
Roeseri, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 77 = *ciliata*.
rosea, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *vespertina*.
rosea, Hort. ex Vilma. Fl. Pl. Terre, ed. II. 865 = *pendula*.
Rosella, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 7 = *gallica*.
rostrata, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 244 = *cerastoides*.
rosulata, Sayer-Willem. & Godr. Expl. Sc. Algér. t. 82; et in Mém. Soc. Sc. Nancy, 1850 (1851), 184 = *mollissima*.
rotundifolia, Nutt. Gen. Am. i. 288. — Am. bor.
Royenii, Pers. Syn. i. 497 = *viscosa*.
rubella, Bory, ex Rohrb. Monog. Silene, 94 = *graeca*.
rubella, Hort. ex Vilma. Fl. Pl. Terre, ed. I. 821 = *colorata*.

SILENE:—

rubella, Linn. Sp. Pl. 419. — Reg. Mediterr.; Mesopot.
rubella, Suffren, Cat. Pl. Frioul, 141 = *cretica*.
rubens, Vest, in Flora, iv. (1821) 150 = *nutans*.
rubescens, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 572 (Index), sphalm. = *praec.*
rubicunda, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 195 = *pennsylvanica*?
rudbarica, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 36 = *Aucheriana*.
rugosa, Pers. Syn. i. 498 = *Lychnis Coeli-rosa*.
rupestris, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 77 = *alpestris*.
rupestris, Linn. Sp. Pl. 421. — Europ.
rupestris, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 295 = *chromodonta*.
rupicola, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 95 = *S. Cucubalus*.
rupicola, Huet, ex Rohrb. Monog. Silene, 138 = *S. Saxifraga*.
ruthenica, Otth, in DC. Prod. i. 370 = *tatarica*.
sabuletorum, Duby, Bot. Gall. 1025 = *vespertina*.
sabuletorum, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1850) = *gallica*.
sabuletorum, Link, in Spreng. Nov. Prov. 39 = *hirsuta*.
sachalinensis, F. Schmidt, Reisen Amurl. 116. — Ins. Sachalin.
sahendica, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 38 = *olympica*.
sajanensis, Less. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 307 = *tenuis*.
salsa, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 77 = *arenosa*.
Salzmanni, Badaro, ex Moretti, in Brugnati. Giorn. ix. (1826) 78. — Europ. austr.
Salzmanni, Otth, in DC. Prod. i. 381 = *velutina*.
Saponaria, Cav. ex Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 244 = *glaucula*.
Saponaria, Fries, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 671 = *Saponaria officinalis*.
saponariaefolia, Láng & Szovits, ex Rohrb. Monog. Silene, 81 = *S. Fabaria*.
saponariaefolia, Schott, ex Bess. Enum. Pl. Volh. 46 = *S. Cucubalus*.
sarawachanica, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 14. — Turkestan.
sardoa, Moris, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 813, in obs. = *gallica*.
Sargentii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 290. — Am. bor. occ.
Sartorii, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. v. 53. — Ins. Cyclad.
Sassiana, Bertol. Fl. Ital. iv. 609 = *fuscata*.
saxatilis, Sims, Bot. Mag. t. 689; Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 338. — As. Min.; Persia.
saxicola, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 641 = *Lychnis Lagascae*.
saxicola, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1882) 43. — Hispan.
Saxifraga, Auct. ex Nym. Consp. 92 = *fruticulosa*.
Saxifraga, Linn. Sp. Pl. 421. — Europ.
Saxifraga, [Orsini], in Cappello, Opusc. Sc. 287, nomen = *multicaulis*.
scabra, Bertol. Fl. Ital. iv. 614 = *inaperta*.
scabra, Fisch. ex Swcet, Hort. Brit. cd. III. 66 = *S. Cucubalus*.
scabra, Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 683. — Hungar.
scabrida, Sayer-Willem. & Godr. Expl. Sc. Algér. t. 81; et in Mém. Soc. Sc. Nancy, 1850 (1851), 167. — Alger.
scabridula, Boiss. Fl. Orient. i. 643 = *armena*.
scabriflora, Brot. Fl. Lusit. ii. 184 = *pendula*.
sepusiensis, Waldst. & Kit. ex Steud. Nom. ed. I. 780 (*stepusiensis*) (Quid?). — Hungar.
Schafta, Gmel. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xii. (1838) 397. — Reg. Caucas.
Schimperia, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 31 = *chlorae-folia*.
Schimperia, Hochst. ex Rohrb. Monog. Silene, 120 = *Hochstetteri*.
schirensis, Rohrb. l. c. 106, sphalm. = *chirensis*.
schizolepis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 370. — Mexic.
Schlosseri, Vukot. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 382. — Austria.
Schottiana, Schur, Enum. Pl. Transs. 103 = *S. Cucubalus*.

SILENE:—

Schweinfurthii, Rohrb. in Bot. Zeit. xxv. (1867) 82. — Nubia.
sciatica, Otth, in DC. Prod. i. 372 = *gallica*.
sclerocarpa, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 245 = *cerastoides*.
Scouleri, Hook. Fl. Bor. Am. i. 88. — Am. bor. occ.
secunda, Steud. Nom. ed. II. ii. 587 = *tatarica*.
secundiflora, Otth, in DC. Prod. i. 375 = *glaucula*.
sedoides, Jacq. Coll. Suppl. 112. t. 14. f. 1. — Reg. Mediterr.
segetalis, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 241 = *rubella*.
Semenovii, Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxix. (1866) i. 536. — As. centr.
semiglabra, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 7 = *gallica*.
Sendtneri, Boiss. Fl. Orient. i. 608. — Banat.
sericea, All. Fl. Pedem. ii. 81. t. 79. f. 3. — Europ. austr.
sericea, Bertol. Amoen. Ital. 27 = *colorata*.
sericea, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *disticha*, *vespertina*, *S. Cucubalus*.
serpyllifolia, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 780 (Quid?). — Hab.?
scrulata, Boiss. Fl. Orient. i. 643. — Lycia.
seruncensis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 209. — Alger.
sessiliflora, Poir. Encyc. Suppl. v. 154 = *dichotoma*.
setabensis, Duf. ex Rohrb. Monog. Silene, 117 = *glaucula*.
setacea, Otth, in DC. Prod. i. 372 = *discolor*.
setacea, Viv. Fl. Lib. Spec. 23. — Afr. bor.; Mesopot.
setifolia, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) i. Beibl. 8 = *jenisea*.
sibirica, Pers. Syn. i. 497. — Sibir.
sibirica, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 212 = *noctiflora*?
Sibthorpiana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 815, in textu = *dichotoma*.
sicula, Bertol. ex Rohrb. Monog. Silene, 153 = *fuscata*.
sicula, Cyrilli, ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 46 = *sedoides*?
sicula, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *lactea*.
sicula, Ker-Gawl. ex Rohrb. Monog. Silene, 115 = *colorata*.
sicula, Presl, Fl. Sic. i. 155 = *italica*, *cretica*.
sicula, Ucria, in Roem. Arch. i. i. (1796) 68 = *italica*.
siderophila, Boiss. & Gaill. in Boiss. Fl. Orient. i. 594 = *palaestina*.
Sieberi, Fenzl, in Russeg. Reise, ii. 912 = *Fenzlii*.
Sieberi, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 8. — Graecia; Ins. Creta.
Siegeri, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 400 = *nivalis*.
silvestris, Schott, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 812 = *gallica*.
simplicicorona, Mutel, Fl. Fr. i. 148, 169 = *fuscata*.
sinaica, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 25 = *odontopetala*.
sisianica, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 36. — Reg. Caucas.
Smithii, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 77 = *S. Saxifraga*.
Smithii, J. F. Gmel. Syst. 714 = *chlorae-folia*.
sobolifera, Schott, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 820 = *repens*.
solanantha, Trautv. in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 421. — Reg. Caucas.
Spaldingii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 344. — Am. bor. occ.
spathulaefolia, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 31 = *nutans*.
spathulata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 341 = *pygmaea*.
spathulata, Schur, ex Nym. Consp. 90 = *nutans*.
spathulata, Willd. ex Rohrb. Monog. Silene, 156 = *aegyptiaca*.
speciosa, Paxt. Mag. Bot. x. (1843) 219 = *laciniata*.
spergulifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 305. — Armen.
spergulifolia, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 174 = *supina*.
spergulifolia, Reichb. ex Nym. Consp. 90 = *nutans*.
spergulifolia, Schur, Enum. Pl. Transs. 101 = *saxatilis*.
spicata, DC. Fl. Fr. iv. 759 = *nocturna*.
spicata, Ehrh. ex Rohrb. in Bot. Zeit. xxv. (1867) 82. — Afr. or.

SILENE:—

spinescens, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 299.—Graecia.
splendens, Boiss. *Fl. Orient.* i. 631.—Phrygia.
squamigera, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 38.—As. Min.; Syria.
ssahendica, Rohrb. Monog. Silene, 198, sphalm. = *sahendica*.
ssojutica, Less. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 308 = *repens*.
staminea, Bertol. *Fl. Ital.* iv. 585 = Roemeria.
staticifolia, Fenzl, ex Rohrb. Monog. Silene, 180 = *armena*.
staticifolia, C. Koch, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 639 = *bupleuroides*.
staticifolia, Pourr. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 114 = *legionensis*.
staticifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 301 = *longiflora*.
stellata, Ait. *Hort. Kew.* ed. II. iii. 84.—Am. bor.
stellata, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 245; *Fl. Pyr.* 250. t. 91 = *ciliata*.
stellerioides, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 193 = *Menziesii*.
stenobotrys, Boiss. & Haussk. in Boiss. *Fl. Orient.* i. 611.—Syria.
stenopetala, Ledeb. ex Sweet, *Hort. Brit.* ed. III. 66, nomen.—Sibir.
stenophylla, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 240 = *inaperta*.
stenophylla, Ledeb. *Fl. Ross.* i. 306 = *tenuis*.
stenophylla, Plan. Ens. *Fl. Gallega*, 121 = *maritima*.
stentoria, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 9 = *caryophylloides*.
stepusiensis, Steud. Nom. ed. I. 780; ed. II. ii. 587, sphalm. = *scepusiensis*.
Stevenii, Spreng. Cat. Sem. Hal. ex Steud. l. c. ed. II. ii. 587 (Quid?).—Rossia?
Stracheyi, Edgew. in Hook. *Fl. Brit. Ind.* i. 221.—Reg. Himal.
striata, Ehrenb. ex Rohrb. in Bot. Zeit. xxv. (1867) 83.—Syria.
stricta, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 246 = *S. Muscipula*.
stricta, Linn. *Cent. Pl.* ii. 17; *Amoen. Acad.* iv. 314.—Europ. austr.
stricta, Spreng. Syst. ii. 412 = *linicola*.
struthioloides, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 109.—Ins. Sandvic.
stylosa, Bunge, in Ledeb. *Fl. Alt.* ii. 144.—Sibir. altaic.
stylosa, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *S. Cucubalus*.
suaveolens, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 168 = *Griffithii*.
suavis, Schrad. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 66 = *vespertina*?
subacaulis, Vill. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 587 = *acaulis*.
subconica, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 334.—Thracia.
subnutans, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 78 = *nutans*.
suboccultata, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 5 = *gallica*.
subspathulata, Schur, Enum. Pl. Transs. 102 = *chlorantha*.
subulata, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 33 = *stentoria*.
subulata, Heldr. ex Boiss. *Diagn. Ser. II.* v. 56 = *S. Echinus*.
subvinosa, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1838) 12 = *nicaeensis*.
succulenta, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* p. lxvi; *Delile, Fl. Aegypt. Desc.* 89.—Aegypt.; Syria.
suffrutescens, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 340 = *caspica*.
suffruticosa, Desf. ex Webb, Iter Hisp. 64 = *fruticosa*, *velutina*.
suffruticosa, Pall. Reise, ii. 522 = *altaica*.
supina, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 338.—Reg. Caucas.
swertiaefolia, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 32 = *chloraeifolia*.
sylvestris, Reichb. *Fl. Germ. Excurs. Index*, 121 = *silvestris*.
syriaca, Reut. Cat. Gr. Jard. Genève. (1857) 4.—Cf. Linnaea, xxxix. (1857-58) 724 = *picta*.
tachtensis, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 239.—Turkestan.
tatarica, Pers. Syn. i. 497.—Europ. or.; As. occ.
Tatarinowii, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) ii. 562.—China.
taurica, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 66 (Quid?).—Tauria.

SILENE:—

tegedensis, Boiss. Elench. 20 = *Boryi*.
tenella, Hnet, ex Schenk, Ind. Sem. Hort. Wirceb. (1861) = *quadrifida*.
tenella, C. Koch, ex Rohrb. Monog. Silene, 191 = *petraea*.
tenella, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 216.—Reg. Caucas.
tenerrima, J. & C. Presl, Delic. Prag. 217 = *hirsuta*.
Tenoreana, Colla, Herb. Pedem. i. 328; ex Soyer-Willem. & Godr. in Mém. Soc. Sc. Nancy, 1850 (1851) 141 = *S. Cucubalus*.
tenuiflora, Guss. Pl. Rar. Sic. 177 = *cretica*.
tenuiflora, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *cretica*.
tenuifolia, Otth, in DC. Prod. i. 379 = *tenuis*.
tenuis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 575 = *jenisea*.
tenuis, Willd. Enum. Hort. Berol. 474.—Reg. Himal.; Sibir.
tergestina, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 6 = *gallica*.
thebana, Orph. ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 627.—Graecia.
thessalonica, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* i. 74 = *flavescens*.
Thirkeana, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 56 = *dichotoma*.
Thorei, Duf. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 84.—Gallia.
Thunbergiana, Eckl. & Zeyh. Enum. 32.—Afr. austr.
Thunbergiana, Krauss, ex Rohrb. Monog. Silene, 122 = *primulaeflora*.
Thunbergii, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 87 = *undulata*.
Thurberi, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 343.—N. Mexic.
thymifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 292.—Ins. Cyprus.
thysanodes, Fenzl, in Endl. Nov. Stirp. Dec. 39.—Am. austr.
Tilingi, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 99 = *californica*.
tincta, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 174 = *Friwaldskyana*.
tmolea, J. Gay, in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 200.—Lydia.
tomentosa, Otth, in DC. Prod. i. 383 = *mollissima*.
Tommasinii, Vis. in Flora, xii. (1829) i. Erg. 12 = *sedoides*.
tragacantha, Fenzl, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 621.—Persia.
transsilvanica, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 22; x. (1860) 181 = *nutans*.
tricuspidata, Desf. Tabl. ed. II. 184, nomen = *gallica*, *disticha*.
tridentata, Desf. *Fl. Atlant.* i. 349.—Reg. Mediterr. occ.
tridentata, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 758 = *gallica*.
trifida, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 588.—Hab.
trinervia, Fenzl, Adv. Bot. [2]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *squamigera*.
trinervia, Sebast. & Mauri, Fl. Rom. 152.—Europ. austr.
trinervis, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 252 = *dichotoma*.
tristis, Salisb. Prod. 301 = *undulata*, Ait.
Tuba, Ehrenb. ex Rohrb. Monog. Silene, 130 = *Boryi*.
tubiflora, Duf. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 370 = *colorata*.
tunicoides, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 34.—Lycia.
turbinata, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 506 = *rubella*.
turgida, Bieb. ex Bunge, Verz. Alt. 23.—Sibir. altaic.
turgida, Schrenk, ex Rohrb. Monog. Silene, 187 = *tenuis*.
turkestanica, Regel, in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 436.—Turkestan.
Uhdeana, Rohrb. Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. ii. 2.—Mexic.
umbellata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 170 = *S. Armeria*.
undulaefolia, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 65 = *fuscata*.
undulata, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 96.—Afr. anstr.
undulata, Moench, Meth. 707.—Hab.?
undulata, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 660 = *rubella*.
undulatifolia, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *gallica*.
undulatifolia, Moris, Stirp. Sard. Elench. 8 = *fuscata*.
Ungerii, Fenzl, in Unger, Reise Griechenl. 136; Boiss. *Fl. Orient.* i. 601.—Ins. Ithaca.

SILENE:—

uniflora, Bertol. *Fl. Ital.* iv. 632 = *S. Cucubalus*?
uniflora, Roth, in Usteri, Ann. Bot. x. (1794) 46; et in Catalect. fasc. i. 52 = *maritima*.
unilocularis, Schrank, Baier. Fl. i. 712 = *Arenaria spathulata*?
Urvillii, Schott, ex Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 304.—Ins. Cos; Lydia.
vallesia, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 27 = *paradoxa*.
vallesia, Linn. Syst. ed. X. 1032.—Europ.
vallesia, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 215 = *caucasica*.
vallesia, Pollini, Fl. Veron. ii. 58 = *Elisabethae*.
vallesiaca, Link, Handb. ii. 244 = *nicaeensis*.
variegata, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* viii. 82.—Graecia.
variegata, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *S. Armeria*.
velutina, Hort. ex Fenzl, l. c. = *annulata*, *gallica*.
velutina, Pourr. ex Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 324.—Ins. Corsic.
velutinoides, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 208.—Alger.
venosa, Aschers. Fl. Brandenb. i. 86 = *S. Cucubalus*.
verecunda, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 344.—Calif.
vernalis, Poepp. ex Rohrb. Monog. Silene, 97 = *gallica*.
verticillata, Otth, in DC. Prod. i. 370 = *spargullifolia*.
vesicaria, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 822 = *S. Cucubalus*.
vesiculifera, J. Gay, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 586.—Cilicia.
vespertina, Curt. Bot. Mag. t. 677 = *colorata*.
vespertina, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *S. Cucubalus*.
vespertina, Retz. Obs. iii. 31.—Reg. Mediterr.; Afr. bor.
vestita, Soyer-Willem. & Godr. in Expl. Sc. Algér. t. 81; et in Mém. Soc. Sc. Nancy, 1850 (1851), 154 = *micropetala*.
villipensa, Kunze, in Ind. Sem. Hort. Lips. (1845); et in Flora, xxii. (1846) 641 = *portensis*, *inaperta*.
vilis, Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1845) = *portensis*.
vilis, Fenzl, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 596 = *apetala*.
vilis, Kunze, ex Nym. Consp. 95 = *inaperta*.
villosa, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 90 = *S. Psammitis*.
villosa, Cambess. in Mém. Mus. Par. xiv. (1827) 221. t. 41.—Hispan.
villosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 88.—Aegypt.
villosa, Forsk. l. c. 210 = *gallica*.
villosa, Holl. ex Rohrb. Monog. Silene, 112 = *littorea*.
villosa, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *obtusifolia*, *vespertina*.
villosa, Moench, Meth. 708 = *nicaeensis*.
virginica, Benth. Pl. Hartw. 299 = *californica*.
virginica, Linn. Sp. Pl. 419.—Am. bor.
virginica, Rafin. ex DC. Prod. i. 333 = *pensylvanica*.
virginica, Willd. Sp. Pl. ii. 702 = *pensylvanica*?
viridella, Link, Handb. ii. 242 = *nutans*.
viridiflora, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 319 = *chlorantha*.
viridiflora, Kotschy, ex Rohrb. Monog. Silene, 214 = *amana*.
viridiflora, Linn. Sp. Pl. ed. II. 597.—Europ. austr.
viscaginoides, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 49 = *tenuis*.
viscaginoides, Otth, in DC. Prod. i. 368 = *jenisea*.
viscariaefolia, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 30 = *bupleuroides*.
viscariaefolia, Bourg. ex Rohrb. Monog. Silene, 179 = *longiflora*.
viscida, Moench, Meth. 708 = *noctiflora*.
viscida, Spreng. Pugill. ii. 65 = *alpestris*.
viscosa, Pers. Syn. i. 497.—Europ.; As. bor.
viscosa, Schleich. Cat. Pl. Helv. 33 = *italica*.
viscosissima, Rochel, ex Rohrb. Monog. Silene, 220 = *italica*.
viscosissima, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxvi = *nicaeensis*.
Vivianii, Steud. Nom. ed. II. ii. 588 = *setacea*.
wolgensis, Spreng. Syst. ii. 413 = *wolgensis*.
vulgaris, Garcke, Fl. Deutschl. ed. IX. 64 = *S. Cucubalus*.
Waldsteinii, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 179.—Europ. austr.
Wallichiana, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 139 = *S. Cucubalus*.
Webbiana, Wall. Cat. n. 627.—Reg. Himal.
Willdenowii, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 51 = *Thorei*.
Willkommiana, J. Gay, ex Coss. Notes Crit. ii. 32 = *divaricata*.

SILENE:—

wolgensis, *Bess. ex Spreng. Ind. Sem. Hort. Hal.* (1818) 6; *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 140 (an seq.?).—Europ. or. *wolgensis*, Oth. in DC. Prod. i. 370 = *S. Otites*. Wrightii, *A. Gray, Pl. Wright.* ii. 17.—N. Mexic. xcranthema, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 67; *Fl. Cors. Sp. Nov.* 7.—Ins. Corsic. *Zawadskii*, Hort. ex Fenzl, Adv. Bot. [7]; in Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) = *S. Cucubalus*. *Zawadskii*, *Herbich, in Zawad. Fl. Galic.* 191.—Bucovina.

SILENOPSIS, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 237 = *Lychnis*, Tourn. (Caryoph.). *Lagascae*, Willk. l. c. = *L. Lagascae*.

SILER, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 60 (1767); ed. II. 185 (1769). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 908.

AGASYLLIS, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 259.

BRADLAIEA, Neck. Elem. i. 169 (1790). *alpinum*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 229 = trilobum.

aquilegifolium, Gaertn. Fruct. i. 92. t. 22 = trilobum. caucasicum, *Spreng. Sp. Umbellif.* 90. — Reg. Caucas.

Chironium, Crantz, Cl. Umb. Emend. 69 = *Opoponax Chironium*.

divaricatum, *Benth. & Hook. f. Gen.* i. 909.—Sibir. baical.

gallicum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 65; ed. II. 188 = *Laserpitium gallicum*.

lancifolium, Hoffm. & Link, Fl. Port. ii. t. 109 = *Peucedanum lancifolium*.

lancifolium, Mcench, Meth. 85 = *Laserpitium Siler montanum*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 60; ed. II. 185 = *Laserpitium Siler*.

salsum, Spreng. Sp. Umbellif. 90 = *Peucedanum redivivum*.

trilobum, *Crantz, Stirp. Austr.* ed. I. fasc. iii. 62; ed. II. 186.—Oriens.

SILQUARIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 78 (1775) = *Cleome*, Linn. (Cappar.).

arabica, Rafin. Sylva Tellur. 111 = *C. arabica*. *glandulosa*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 78 = *C. arabica*.

SILQUASTRUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 317 (1763) = *Cercis*, Linn. (Legumin.).

Arbor-fudae, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 339 = *C. Siliquastrum*.

canadense, Medic. l. c. = *C. canadensis*. *cordatum*, Moench, Meth. 54 = *C. canadensis*.

orbiculatum, Moench, l. c. = *C. Siliquastrum*.

SILLYBUM, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 104 (1844), sphalm. = *Silybum*, Vaill. (Compos.).

SILOXERUS, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 57. t. 209 (1806) = *Angianthus*, Wendl. (Compos.).

humifusus, Labill. l. c. 58 = *A. humifusus*.

SILPHION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *Silphium*, Linn. (Compos.).

asteriscum, St. Lag. l. c. = *Silphium Asteriscus*.

SILPHIOSPERMA, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 433 (1845) = *Brachycome*, Cass. (Compos.).

collinum, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 483 = *B. collina*.

glandulosum, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 433 = *B. glandulosa*.

perpusillum, Steetz, l. c. = *B. collina*.

SILPHIUM, Linn. Coroll. Gen. 16 (1737). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 350.

albiflorum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 4.—Texas.

arborescens, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. n. 4.—Mexic.

aspermum, *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 99.—Am. bor. occ.

Asteriscus, Hornem. Hort. Hafn. 854 = *Berlandiera tomentosa*.

Asteriscus, Linn. Sp. Pl. 920.—Am. bor. *atropurpureum*, Retz. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2334 = trifoliatum.

SILPHIUM:—

betonicaefolium, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 99 = *Berlandiera texana*.

brachiatum, *Gattinger, in Coult. Bot. Gaz.* ix. (1884) 192.—Am. bor.

compositum, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 145.—Am. bor. *conjunctum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 933 = perfoliatum.

connatum, Linn. Mant. ii. 574 = perfoliatum. *dentatum*, Ell. Sketch, ii. 468 = *S. Asteriscus*.

dissectum, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 157.—Am. bor. ? *doronicifolium*, *Kunze, Del. Sem. Hort. Lips.* (1846) 4; et in *Linnaea*, xx. (1847) 20.—Afr. austr.

edule, Baill. Hist. Pl. viii. 306 = *Polymnia edulis*. *elatum*, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 579 = compositum.

equatoriale, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 350 = *Wedelia equatorialis*.

erythrocaulon, Bernh. ex Spreng. Syst. iii. 630 = perfoliatum.

glaucum, Weinm. Hort. Dorpat. 143; ex DC. Prod. v. 571, in obs.—Am. bor.

gracile, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 653.—Texas.

gummiferum, Ell. Sketch, ii. 460 = *laciniatum*. *helianthoides*, Linn. Sp. Pl. 920 = *Heliopsis laevis*.

Hornemannii, Schrad. ex DC. Prod. v. 514 = perfoliatum. *integrifolium*, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 146.—Am. bor.

laciniatum, Linn. Sp. Pl. 919.—Am. bor. *laciniatum*, Walt. Fl. Carol. 217 = compositum.

laeve, *Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 244.—Am. bor.

laevigatum, Ell. Sketch, ii. 465 = trifoliatum. *laevigatum*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 578 = integrifolium.

lanceolatum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 341 = *S. Asteriscus*.

latifolium, Hill, Hort. Kew. 11.—Am. bor. *nudicaule*, M. A. Curt. in Bost. Journ. Nat. Hist. i. (1837) 127 = compositum.

Nuttallianum, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 216 = *Berlandiera lyrata*.

patulum, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 578 = *Berlandiera tomentosa*.

perfoliatum, Linn. Syst. ed. X. 1232.—Am. bor. *peristenium*, Rafin. Atl. Journ. 146 (Quid?).—Am. bor.

petiolatum, Poir. Encyc. Suppl. v. 157 = perfoliatum. *pinnatifidum*, Ell. Sketch, ii. 462 = *terebinthinaceum*.

platypterum, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 350 = *Verbesina platyptera*.

Pseudo-laciniatum, Fras. ex DC. Prod. v. 512 = compositum.

pumilum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 183 = *Berlandiera tomentosa*.

quadrangulum, Hedw. in Roem. Arch. iii. (1803) 123 = perfoliatum.

quercifolium, DC. Prod. v. 513.—Hab. ? *Radula*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 341 = *aspermum*.

reniforme, Rafin. ex Nutt. l. c. 342 = compositum. *reticulatum*, Moench, Meth. 606 = *S. Asteriscus*.

reticulatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 579 = *Berlandiera tomentosa*.

reticulatum, Rafin. Atl. Journ. 148 = praec. ? *rigidum*, Moench, Meth. Suppl. 258.—Hab. ?

scaberrimum, Ell. Sketch, ii. 466.—Am. bor. *scabrum*, Moench, Meth. 606 = perfoliatum.

scabrum, Walt. Fl. Carol. 217 = *S. Asteriscus*. *sinuatum*, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 577 = compositum.

solidaginoides, Linn. Sp. Pl. 920 = *Heliopsis laevis*. *speciosum*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 341 = integrifolium.

spicatum, Poir. Encyc. Suppl. v. 157 = *laciniatum*. *subcaule*, Nutt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 301 = *Berlandiera subcaulis*.

terebinthinaceum, Ell. Sketch, ii. 463 = compositum. *terebinthinaceum*, Jacq. Hort. Vindob. i. 16.—Am. bor.

ternatum, Retz. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2333 = trifoliatum.

ternifolium, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 146 = trifoliatum. *Tetragonotheca*, Gaertn. Fruct. ii. 444. t. 171. f. 2 = *Tetragonotheca helianthoides*.

tetragonum, Moench, Meth. 606 = perfoliatum. *tomentosum*, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 579 = *Berlandiera tomentosa*.

SILPHIUM:—

trachopus, Rafin. Herb. 24; *Atl. Journ.* 178.—Am. bor.

trifoliatum, Linn. Sp. Pl. 920.—Am. bor. *trilobatum*, Linn. Syst. ed. X. 1232 = *Wedelia carnosia*.

SILVAEA, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 211 (1836) = *Trigostemon*, Blume (Euphorb.).

Hookeriana, Baill. Etud. Gén. Euph. 342 = *T. semperflorens*.

semperflorens, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 211 = *T. semperflorens*.

SILVAEA, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 84 (1864) = *Endiandra*, R. Br. (Laurin.).

Navalium, Meissn. l. c. = *E. Navalium* (in Addend.).

SILVAEA, Phil. Fl. Atac. 21. t. 1 C (1860). *PORTULACAEAE*, Benth. & Hook. f. i. 159.

amarantoides, Phil. l. c. 22.—Chili. *celosioides*, Phil. l. c.—Chili.

corrigioloides, Phil. l. c.—Chili. *pschphylla*, Phil. l. c. 21.—Chili.

SILVIA, Allem. Diss. Rio Janeiro (1845).—Cf. Bot. Zeit. xii. (1854) 454 = *Endiandra*, R. Br. (Laurin.).

Navalium, Allem. l. c. = *E. Navalium* (in Addend.).

SILVIA, Benth. in DC. Prod. x. 513 (1846). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 972.

prostrata, Benth. in DC. Prod. x. 513.—Mexic. *serpyllifolia*, Benth. l. c.—Mexic.

SILVIA, Vell. Fl. Flum. 55 (1825); i. t. 149 (1827) = *Escobedia*, Ruiz & Pav. (Scrophul.).

curialis, Vell. ll. cc. = *E. scabrifolia*.

SILVIANTHUS, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1048 (1868). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 64.

bracteatus, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1048.—Reg. Himal.

SILYBON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144 = seq.

SILYBUM, Vaill. ex Adans. Fam. ii. 116 (1763); Gaertn. Fruct. ii. 378. t. 162 (1791). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 470.

MARIANA, Hill, Veg. Syst. iv. 19 (1762), nomen prius.

atriplicifolium, Fisch. Ind. Hort. Petrop. (1824); ex DC. Prod. vi. 663 = *Serratula atriplicifolia*.

cernuum, Gaertn. Fruct. ii. 378. t. 162. f. 2 = *Carduus cernuus*, Steud.

cernuum, Ledeb. Fl. Alt. iv. 43 = *Carduus stenolepis*. *eburneum*, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 366.—Afr. bor.

hispanicum, Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Arag. ed. Willk. 56 = *eburneum*.

intermedium, Willk. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1869) 6.—Hab. ?

leucanthum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 83 = *S. Marianum*.

maculatum, Moench, Meth. 555 = *S. Marianum*. *Mariae*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 436 = *S. Marianum*.

Marianum, Gaertn. Fruct. ii. 378. t. 168.—Europ. *pygmaeum*, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 469 = *S. Marianum*.

squarrosus, Tausch, in Flora, xix. (1836) 396 = *Carduus cernuus*, Steud.

SILYMBRIUM, Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. ii. (1770) 480, sphalm. = *Sisymbrium*, Linn. (Crucif.).

SIMABA, Aubl. Pl. Gui. i. 400. t. 153 (1775). *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 308.

ARUBA, Aubl. Pl. Gui. i. 293. t. 115 (1775). *HOMOLOLEPIS*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 575.

PHYLLOSTEMA, Neck. Elem. ii. 301 (1790). *ZWINGERA*, Schreb. Gen. ii. 802 (1791).

africana, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 381 = *Quassia africana*.

angustifolia, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 371 = *guianensis*?

Aruba, A. St. Hil. ex DC. Prod. i. 734 = *guianensis*.

SIMABA :—

- bahiensis*, Moric. in Mém. Soc. Phys. Genève. vii. (1886) 251 = ferruginea ?
bicolor, Zucc. in Abh. Akad. Muench, i. (1829–30) 353.—Mexic.
Blanchetii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 444 = ferruginea.
Cedron, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 566.—Am. trop.
crustacea, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 211.—Bras.
cuneata, A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 138.—Bras.
cuspidata, Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 212.—Bras.
ferruginea, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 129; Pl. Rem. Brés. i. 127.—Bras.
floribunda, A. St. Hil. l. c. 129; 126.—Bras.
foetida, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 370 = guianensis ?
glabra, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 218.—Bras.
glandulifera, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 169.—Bras.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 400. t. 153.—Am. trop.
indica, Baill. Hist. Pl. iv. 440 = Samadera indica.
insignis, A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 137 = glandulifera.
laevis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 10.—Bras.
longifolia, Casar. l. c. 9 = glandulifera.
maiana, Casar. l. c. 10.—Bras.
multiflora, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) t. 27 = guianensis ?
nigrescens, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 213.—Bras.
obovata, Spruce, ex Engl. l. c. 210.—Bras.
orinocensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 18. t. 514.—Venezuela.
quassioidea, D. Don, Prod. Fl. Nep. 248 = Pterasma quassioidea.
salubris, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 219.—Bras.
suaveolens, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 129; Pl. Rem. Brés. 128.—Bras.
subcymosa, A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 137.—Bras.
suffruticosa, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 213.—Bras.
trichilioides, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 565, partim = S. Cedron.
trichilioides, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 129; Pl. Rem. Brés. 129.—Bras.
undulata, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 136.—Afr. trop.
Warmingiana, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 217.—Bras.

SIMARUBA, Aubl. Pl. Gui. ii. 859. t. 331, 332 (1775) (Simarouba); DC. in Ann. Mus. Par. xvii. (1811) 423. *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 309.

- amara*, Aubl. l. c. 860.—Am. trop.
amara, Hayne, Arzn. Gew. ix. 15 = glauca.
antisiphilitica, Mart. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 225 = versicolor.
excelsa, DC. in Ann. Mus. Par. xvii. (1811) 424 = Pterasma excelsa.
glauca, DC. l. c.—Am. trop.
laevis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 49.—Cuba.
medicinalis, Endl. Mediz. 528 = glauca.
monophylla, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1387.—Guian.
officinalis, DC. in Ann. Mus. Par. xvii. (1811) 423 = amara.
officinalis, Macfad. Fl. Jamaica. i. 198 = glauca.
versicolor, A. St. Hil. Pl. Us. Bras. t. 5.—Bras.

SIMBLOCLINE, DC. Prod. v. 297 (1836) = *Diplostephium*, H. B. & K. (Compos.).
Haenkei, DC. l. c. = D. Haenkei.

SIMBULETA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 115 (1775) = *Anarrhinum*, Desf. (1800) (Scrophul.).
arabica, Poir. in Dict. Sc. Nat. xlix. 244 = A. arabicum.
Forskählii, J. F. Gmel. Syst. 242 = A. arabicum.

SIMETHIS, Kunth, Enum. Pl. iv. 618 (1843).
LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 784.
MORGAGNIA, Bubani, in Nouv. Ann. Sc. Nat. Bologn. ix. (1843) 92.

VOL. II.

SIMETHIS :—

- POGONELLA*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 70 (1866).
PUBILARIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27 (1836), nomen prius.
SIEBOLDIA, Heynh. Nom. ii. 664 (1846).
bicolor, Kunth, Enum. Pl. iv. 618.—Europ.
planifolia, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 222 = bicolor.
SIMIRA, Aubl. Pl. Gui. i. 170. t. 65 (1775) = *Psychotria*, Linn. (Rubiace.).
nitida, Poir. Encyc. vii. 196 = P. nitida.
Palicourea, Poir. l. c. = Palicourea guianensis.
tinctoria, Aubl. Pl. Gui. i. 170 = P. parviflora, Willd.

SIMIRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 28 (1836) = *Scilla*, Linn. (Liliac.).
japonica, Rafin. l. c. = Sc. japonica.

SIMMONDSIA, Nutt. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 400. t. 16. *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 265.
BROCCIA, Mauri, in Tenore, Cat. Ort. Napoli (1845), 80.
californica, Nutt. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 400. t. 16.—Calif.
pabulosa, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1859) 21 = californica.

SIMOCHILUS, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 236.
ERICACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 593.
ANOMALANTHUS, CODONANTHEMUM, MACROLINUM, OCTOGONIA, PACHYCALYX, PLAGIOSTEMON, SYNDESMANTHUS, THAMNUS, THORACOSPERMA, Klotzsch, l. c. 230–242.
barbiger, Klotzsch, l. c. 237.—Afr. austr.
bicolor, Benth. in DC. Prod. vii. 703.—Afr. austr.
carneus, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 236.—Afr. austr.
depressus, Benth. in DC. Prod. vii. 704.—Afr. austr.
Ecklonianus, Benth. l. c. 705.—Afr. austr.
glabellus, Benth. l. c. 704.—Afr. austr.
glaber, Benth. l. c. 705.—Afr. austr.
hirsutus, Benth. l. c. 704.—Afr. austr.
hispidus, Benth. l. c. 705.—Afr. austr.
Klotzschianus, Benth. l. c. 703.—Afr. austr.
multiflorus, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 236.—Afr. austr.
oblongus, Benth. in DC. Prod. vii. 705.—Afr. austr.
obovatus, Benth. l. c. 703.—Afr. austr.
patens, Benth. l. c. 704.—Afr. austr.
pubescens, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 236.—Afr. austr.
quadrifidus, Benth. in DC. Prod. vii. 703.—Afr. austr.
quadriflorus, Steud. Nom. ed. II. ii. 589, sphalm. = praec.
submuticus, Benth. in DC. Prod. vii. 704.—Afr. austr.

SIMONISIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 144. t. 23 (1847) = *Beloperone*, Nees (Acanth.).
asclepiadea, Nees, l. c. 145.—Bras.
Riedeliana, Nees, l. c. = B. Riedeliana.
rosea, Nees, l. c. 144 = B. rosea.

SIMPBITUM, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 101 (1768) = *Symphytum*, Tourn. (Borag.).

SIMPLOCARPUS, F. Schmidt, Reisen Amurl. 178 (1868), sphalm. = *Symplocarpus*, Salisb. (Aroid.).

SIMPLOCOS, Lex. in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 22 (1824), sphalm. = *Symplocos*, Linn. (Styrac.).

SIMSIA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 152 = *Stirlingia*, Endl. (Proteac.).
abrotanoides, F. Muell. Census, 66 = St. abrotanoides.
anethifolia, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 153 = St. tenuifolia.
latifolia, R. Br. Prot. Nov. 9 = St. latifolia.
simplex, F. Muell. Census, 66 = St. simplex.
tenuifolia, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 152 = St. tenuifolia.
teretifolia, F. Muell. Census, 66 = St. teretifolia.

SIMSIA, Pers. Syn. ii. 478 (1807) = *Encelia*, Adans. (Compos.).
amplexicaulis, Pers. l. c. = E. amplexicaulis.
auriculata, DC. Prod. v. 577 = E. mexicana.
calva, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 228 = E. calva.
canescens, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 85 = E. eriocephala.
cordata, Cass. in Dict. Sc. Nat. lix. 137 = E. cordata.
Dombeyana, DC. Prod. v. 578.—Peruv. ?
exaristata, A. Gray, Pl. Wright. ii. 87 = E. exaristata.
ficifolia, Pers. Syn. ii. 478 = E. foetida.
frutescens, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 89 = E. frutescens.
grandiflora, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 92 = E. grandiflora.
heterophylla, DC. Prod. v. 577 = E. heterophylla.
heterophylla, Pers. Syn. ii. 478 = Echinacea heterophylla.
hispidula, Cass. in Dict. Sc. Nat. lix. 137 = E. hispidula.
Kunthiana, Cass. l. c. = E. heterophylla.
lagascaeformis, DC. Prod. v. 577 = E. lagascaeformis.
lagascaeformis, A. Gray, Pl. Wright. i. 107 = E. exaristata.
pastoensis, Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ix. (1858) 40.—N. Granat.
polycephala, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 93 = E. polycephala.
pubescens, Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ix. (1858) 40.—N. Granat.
sanguinea, A. Gray, Pl. Wright. i. 107 = E. sanguinea.
scaposa, A. Gray, l. c. ii. 88 = E. scaposa.
subaristata, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 84 = E. subaristata.

SIMSIMUM, Bernh. in Linnaea, xvi. (1842) 42 = *Sesamum*, Linn. (Pedal.).
rostratum, Bernh. l. c. = Sesamum capense.

SINAPI, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 194 (1867) = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).
pinnipartitum, Dulac, l. c. = B. Cheiranthos.

SINAPIDENDRON, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 36 = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).
angustifolium, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 30 = B. frutescens.
frutescens, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 37 = B. frutescens.
glaucum, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 267.—Ins. Cap. Virid.
gracile, Webb, in Hook. Niger Fl. 99. t. 1.—Ins. Cap. Virid.
rupestre, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 37 (= *Sinapis rupestris*).—Ins. Mader.
salicifolium, Lowe, l. c. = B. frutescens.
Vogelii, Webb, in Hook. Niger Fl. 100. t. 2.—Ins. Cap. Virid.

SINAPIS, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).
abyssinica, A. Br. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 34.—Hab. ?
adpressa, Schloss. & Vukot. Fl. Croat. 237 = B. adpressa.
alba, Linn. Sp. Pl. 668 = B. alba.
Allionii, Jacq. Hort. Vindob. ii. 79 = B. oleracea.
alpina, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 590 = Conringia alpina.
amplexicaulis, DC. Syst. ii. 610.—Alger.
angustifolia, DC. l. c. 624 = B. frutescens.
apula, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxix = Diplotaxis apula.
aristidis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 358.—Alger.
arvensis, Linn. Sp. Pl. 668 = B. Sinapistrum.
arvensis, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 678 = Raphanus Raphanistrum.
assurgens, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1847) 7 = Diplotaxis pachypoda.
auriculata, DC. Syst. ii. 611 (pl. cult.).—Hab. ?
baetica, Boiss. Elench. 11 = B. boetica.
benghalensis, Roxb. ex DC. Syst. ii. 198 = Nasturtium indicum.
bipinnata, Desf. Fl. Atlant. ii. 97 = Rapistrum bipinnatum.
bracteata, Steud. Nom. ed. II. ii. 590, sphalm. = seq.
bracteolata, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 42 = B. bracteolata.
brassicata, Linn. Syst. ed. XII. 231 = B. juncea.
Burmanni, Eckl. ex Zeyh. Enum. 7 = retrorsa.
campestris, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 88.—Europ.

SINAPIS:—

- campestris*, Jacq. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 590 = *Brassica juncea*.
caspiaca, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 217 = *B. Tournefortii*.
cernua, Poir. Encyc. iv. 342 = *B. juncea*.
cernua, Thunb. Fl. Jap. 261 = *B. nigra*.
Cheiranthus, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iv. 717 = *B. Cheiranthos*.
chelonifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 590, nomen (Quid?).—Hab.?
chinensis, Linn. Mant. i. 95 = *B. juncea*.
Choulettiana, Coss. & Dur. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 295 = *procumbens*.
circinnata, Desf. Fl. Atlant. ii. 96 = *pubescens*.
communis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = *B. campestris*.
crassifolia, Rafin. Caratteri, 78 = *Diplotaxis pendula*.
cuneifolia, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 121 = *B. juncea*.
dichotoma, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 179 = *B. campestris*.
dissecta, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20 = *B. dissecta*.
divaricata, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 123 = *Nasturtium indicum*.
elongata, Spach, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 590; Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 308 = *B. elongata*.
Eruca, [Clairv.] Man. Herb. 220 = *Eruca sativa*.
erucoides, Linn. Cent. Pl. ii. 24; Amoen. Acad. iv. 322 = *Diplotaxis erucoides*.
erysimoides, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 123 = *B. nigra*.
exotica, Hort. ex DC. Syst. ii. 638 = *Eruca sativa*.
flexuosa, Poir. in Lam. Encyc. iv. 341 = *B. hispida*.
foliosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 688 = *B. alba*.
frutescens, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 404 = *B. frutescens*.
geniculata, Desf. Fl. Atlant. ii. 98 = *B. adpressa*.
glauca, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 118 = *B. campestris*.
Gorraea, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4790 = *B. sinapoides* (in Addend.).
Harra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 118 = *Diplotaxis pendula*.
hastata, Desf. Tabl. ed. II. 151 = *Diplotaxis virgata*.
heterophylla, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20 = *B. adpressa*.
hispanica, Banks, ex DC. Prod. i. 230 = *B. adpressa*.
hispanica, Lag. ex DC. Syst. ii. 632 = *Diplotaxis catholica*.
hispanica, Linn. Sp. Pl. 669 = *Erucaria tennifolia*.
hispanica, Thuill. Fl. Par. ed. II. 343 = *Sisymbrium hispanicum*.
hispida, Balb. Misc. Bot. 33 = *B. Sinapistrum*.
hispida, Schousb. Vextr. Marokko, 196 = *B. hispida*.
incana, Linn. Cent. Pl. i. 19; Amoen. Acad. iv. 280 = *B. adpressa*.
incana, Thuill. Fl. Par. ed. II. 343 = *B. nigra*.
indurata, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 168.—Alger.
inflexa, Walp. Rep. i. 186; D. Dietr. Syn. Pl. iii. 725 = *B. incana*.
integrifolia, [Vahl, in] West, Ste-Croix, 296; Willd. Hort. Berol. 14. t. 14 = *B. juncea*.
integrifolia, Walp. Rep. i. 187 = *B. incana*?
japonica, Thunb. Fl. Jap. 262 = *B. juncea*.
juncea, Linn. Sp. Pl. 668 = *B. juncea*.
Kaber, DC. Syst. ii. 617 = *B. campestris*.
laevigata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 18 = *retrorsa*.
laevigata, Linn. Cent. Pl. i. 20; Amoen. Acad. iv. 281 = *B. juncea*.
laevigata, Pall. Tabl. Taur. 54 = *B. elongata*.
laevigata, Poir. Encyc. iv. 345 = *auriculata*.
lanceolata, DC. Syst. ii. 611 = *B. juncea*.
leptopetala, DC. l. c. 610 = *B. leptopetala*.
longirostris, Boiss. ex Amo, Fl. Iber. vi. 472 = *B. longirostra*.
maritima, All. Fl. Pedem. i. 264 = *Sisymbrium austriacum*.
mesopotamica, Spreng. in Schrad. Journ. ii. 1800 (1801), 199 = *Moricandia arvensis*.
millefolia, Jacq. Coll. i. 41 = *Sisymbrium millefolium*.
monensis, Bab. Man. Brit. Bot. ed. II. 25 = *B. monensis*.
montana, Bourg. ex Nym. Consp. 47 = *B. Cheiranthos*.
muralis, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 128 = *Diplotaxis muralis*.

SINAPIS:—

- Napus*, Brot. Fl. Lusit. i. 586 = *Brassica campestris*.
nasturtiifolia, Poir. in Lam. Encyc. iv. 346 = *B. Erucastrum*.
nigra, Forsk. ex DC. Syst. ii. 612 = *B. juncea*.
nigra, Linn. Sp. Pl. 668 = *B. sinapoides* (in Addend.).
nudicaulis, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20 = *B. oxyrrhina*.
Nuttalliana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 551.—Hab.?
oleracea, Presl, Delic. Prag. 18 = *B. juncea*.
Oliveriana, DC. Syst. ii. 609 = *Sisymbrium panonicum*.
orgyalis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 217 = *B. sinapoides* (in Addend.).
orientalis, Linn. Cent. Pl. i. 19; Amoen. Acad. v. 280 = *B. Sinapistrum*.
oxyrrhina, Coss. Notes Crit. 26 = *B. oxyrrhina*.
paniculata, Boiss. Fl. Orient. i. 390 = *B. adpressa*.
panormitana, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 244.—Sicilia.
parviflora, Lippi, ex Delile, Fl. Aeg. Illustr. 67, nomen.—Aegypt.
patens, Roxb. ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 139 = *Nasturtium indicum*.
patens, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 124 = *B. juncea*.
pekinensis, Lour. Fl. Cochinch. 400 = *B. campestris*.
pendula, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222, nomen.—Afr. austr.
philaeana, Delile, Fl. Egypte, 243 = *Morettia canescens*.
polymorpha, Geners. ex Schult. Obs. Bot. 133.—Hab.?
procumbens, Poir. Encyc. Suppl. iv. 12.—Afr. bor.
prostrata, Roxb. Hort. Beng. 48.—China.
pubescens, Linn. Mant. i. 95.—Europ. austr.
pusilla, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 125 = *Nasturtium montanum*.
pyrenaica, Linn. Sp. Pl. ed. II. 934 = *Sisymbrium austriacum*.
pyrenaica, Spielm. ex Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 329 (an praec.?).—Mont. Pyren.
radicata, Desf. Fl. Atlant. ii. 98 = *B. fruticulosa*.
ramosa, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 179 = *B. juncea*.
Rapa, Brot. Fl. Lusit. i. 586 = *B. campestris*.
Raphanistrum, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 225 = *Raphanus Raphanistrum*.
recurvata, All. Fl. Pedem. i. 265 = *B. Cheiranthos*.
retrofracta, Bess. ex Steud. Nom. ed. I. 782 = *B. Sinapistrum*.
retrofracta, Burch. ex DC. Syst. ii. 609.—Afr. austr.
rubella, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 86, 125, 141, 221 = *Chorispora tenella*.
rugosa, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 122 = *B. juncea*.
rupestris, Steud. Nom. ed. II. ii. 591.—Ins. Mader.
Schkuhriana, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 20 = *B. Sinapistrum*.
Schlosseri, Heuff. ex Nym. Consp. 47 = *B. Sinapistrum*.
setigera, J. Gay, ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 76 = *B. setigera*.
sicula, Bertol. Fl. Ital. vii. 169 = *B. boetica*.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 989 = *B. juncea*?
subbipinnatifida, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20.—Hispan.
subularia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 34, nomen.—Hab.?
taurica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 450 = *B. adpressa*.
taurica, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 51 = *B. Sinapistrum*.
tenella, Moench, Meth. 253 = *B. juncea*.
tenuifolia, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 128 = *Diplotaxis tenuifolia*.
tetraëdra, J. & C. Presl, Delic. Prag. 19 = *Erysimum cuspidatum*.
timoriana, DC. Syst. ii. 616 = *B. juncea*.
torosa, Gilib. Fl. Lituan. ii. 69 = *B. Sinapistrum*.
torulosa, Pers. Syn. ii. 207 = *B. nigra*.
Tournefortii, All. Fl. Pedem. i. 265 = *B. Cheiranthos*.
trilocularis, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. iii. 121 = *B. trilobularis*.
tripinnata, Burch. Trav. i. 318 = *Sisymbrium tripinnatum*.
tuberosa, Poir. in Lam. Encyc. iv. 346 = *B. campestris*.
turgida, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 67.—Aegypt.
turgida, Pers. Syn. ii. 207 = *B. sinapoides* (in Addend.).
ucranica, Czern. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 312.—Rossia.
villosa, Méral, Fl. Par. 215; ed. II. ii. 311 = *B. sinapoides* (in Addend.).
virgata, Cav. Desc. 428 = *Diplotaxis virgata*.
virgata, J. & C. Presl, Delic. Prag. 19 = *B. juncea*.
zeylanica, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 591, nomen (Quid?).—Hab.?

SINAPISTRUM, Medic. Phil. Bot. i. 108 (1789) = *Gynandropsis*, DC. (Cappar.).
pentaphyllum, Medic. l. c. = *G. pentaphylla*.

SINAPISTRUM, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 343 (1838) = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).
arvensis, Spach, l. c. 345 = *B. oleracea*, *arvensis*, *Conringia orientalis*, *Eruca sativa*.

SINAPISTRUM, Tourn. ex Hall. in Rupp. Fl. Jen. 269 (1745) = *Cleome*, Linn. (Cappar.).
decandrum, Moench, Meth. 250 = *C. graveolens*.
giganteum, Moench, l. c. = *C. gigantea*.
lanatum, Moench, l. c. = *C. arabica*.
violaceum, Moench, Meth. Suppl. 83 = *C. graveolens*.
viscosum, Moench, l. c. = *C. viscosa*.

SINAPODENDRON, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 325, sphalm. = *SINAPIDENDRON*, Lowe = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).

SINCARPIA, Tenore, in Mem. Soc. Ital. Moden. xxii. (1841) 230 = *Synearpia*, Tenore (Myrtac.).

SINCLAIREA, Sch.-Bip. in Flora, xxxvi. (1853) 34 = seq.

SINCLAIRIA, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 433 (1841) = *Liabum*, Adans. (Compos.).
andromachioides, Sch.-Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 231 = *L. andromachioides*.
discolor, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 433 = *L. discolor*.

SINDORA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 287 (1860).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 584.
ECHINOCALYX, Benth. in Benth. & Hook. f. Gcn. i. 584 (1865).
cochinchinensis, Baill. *Adansonia*, x. (1871) 104.—Cochinch.
siamensis, Teysm. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 86 = *Wallichii*.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 288.—Sumatra.
velutina, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 269.—Malacca.
Wallichii, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1017-18.—Singapore; Malacca.

SINGANA, Aubl. Pl. Gui. i. 574. t. 230 (1775). Genus dubium *LEGUMINOSARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. i. 465.
MYLOSOPHORA, Neck. Elem. ii. 280 (1790).
STERBECKIA, Schreb. Gen. i. 360 (1789).
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 574.—Guian.

SINGLINGIA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 19, sphalm. = *SIEGLINGIA*, Bernh. = *Triodia*, R. Br. (Gramin.).

SINISTROPHORUM, Schrank, ex Endl. Gen. 882 (1840) = *Camelina*, Crantz (Crucif.).

SINNINGIA, Nees, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. vi. (1825) 297. *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1004.

BIGLANDULARIA, Seem. in Gard. Chron. (1868) 738.
LIGERIA, Decne. in Rev. Hort. (1848) 463.
ROSANOWIA, Regel, Gartenfl. xxi. (1872) 33. t. 712.
STENOASTRA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853-56) 205.

TAPEINOTES, DC. Prod. vii. 544 (1839).
TAPINA, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 59. t. 225. f. 1 (1829).

calycina, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 241 = *Pentarrhaphia calycina*.
Carolinae, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1004.—Bras.
floribunda, Hort. Par. ex A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartens. xvi. (1848) 232.—Hab.?
gloxiniiflora, Scheidw. l. c. xv. (1847) 225.—Mexic.
guttata, Lindl. Bot. Reg. t. 1112.—Bras.
Helleri, Lindl. l. c. t. 997 = *Pentarrhaphia calycina*.
Helleri, Nees, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. vi. (1825) 297.—Bras.
Lindleyi, Schau. in Flora, xvii. (1834) 642 = *Pentarrhaphia calycina*.
punctata, Ysabeau, in Journ. Hort. Prat. vii. (1850) 331.—Bras.

SINNINGIA :—

sanguinea, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 132, nomen (Quid ?).—Hab. ?
speciosa, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 91.—Bras.
velutina, Hook. Bot. Mag. t. 4212 = Helli.
velutina, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1112.—Bras.
villosa, Lindl. l. c. tt. 1112, 1134.—Bras.
Youngeana ×, Marnock, ex Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 51.

SIOJA, Buch.-Ham. ex Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 82 (1836) = **Cardiopteris**, Wall. (Olacin.).
sanguinaria, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 8033 = *C. lobata*.

SIOLMATRA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 458. **CUCURBITACEAE**.
brasiliensis, Baill. l. c.—Bras.

SION, Adans. Fam. ii. 498 (1763) = **Sium**, Tourn. (Umbell.).

SIONA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 67 (1866) = **Dichopogon**, Kunth (Liliac.).
fimbriata, Salisb. l. c. = *D. Sieberianus* ?

SIPANEA, Aubl. Pl. Gui. i. 147. t. 56 (1775). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 52.
PTYCHODEA, Willd. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 168.

VIRECTA, Linn. f. Suppl. 17 (1781).
angustifolia, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 276 = *Virecta multiflora* ?
biflora, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 168.—Am. trop.

carnea, Neumann, in Rev. Hort. Sér. II. ii. (1843-44) 445.—Am. austr.
dichotoma, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 397 = *pratensis*.
elatior, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 276 = *Virecta procumbens* ?
erythraeoides, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 242.—Bras.
glomerata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 398.—Venezuela.

limnophila, Spruce, ex Hook. f. in Hook. Ic. Pl. sub t. 1050 = *Limnosipanea Spruceana*.
palustris, Seem. Bot. Voy. Herald, 136 = *Limnosipanea palustris*.
pratensis, Aubl. Pl. Gui. i. 147. t. 56.—Guian.
radicans, Endl. Atakt. Bot. 7. t. 7 = *biflora*.
trichantha, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 293 = *pratensis*.

SIPANIA, Seem. Bot. Voy. Herald, 136 (1853) = **Limnosipanea**, Hook. f. (Rubiace.).

SIPARUNA, Aubl. Pl. Gui. ii. 864. t. 333 (1775). **MONIMIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 144.

CITROSMA, Ruiz & Pav. Prod. 134. t. 29 (1794).
LEONIA, Mutis, ex Kunth, Syn. Pl. i. 462 (1822).
alternifolia, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 656.—Bras.
amazonica, Mart. ex A. DC. l. c. 653.—Bras.
amplifolia, A. DC. l. c. 649.—N. Granat.
andina, A. DC. l. c. 648.—Mexic.
apicifera, A. DC. l. c. 652.—Ecuador.

Apiosyce, A. DC. l. c. 645.—Bras.
aspera, A. DC. l. c.—Peruv.
asperula, A. DC. l. c. 647.—Bras.
auriculata, A. DC. in Journ. Bot. iii. (1865) 219.—Peruv.

bifida, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 652.—Bras.
brasiliensis, A. DC. l. c. 656.—Bras.
budleiaefolia, A. DC. l. c. 652.—Ecuador.
camporum, A. DC. l. c. 654.—Bras.
cauliflora, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 69.—Panama.
chiridota, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 649.—N. Granat.

cristata, A. DC. l. c. 655.—Bras.
cujabana, A. DC. l. c. 644.—Bras.
cuspidata, A. DC. l. c. 655.—Guian.
deciapiens, A. DC. l. c. 643.—Guian.
discolor, A. DC. l. c. 656.—Am. trop.
echinata, A. DC. l. c. 652.—N. Granat.
eriocalyx, A. DC. l. c. 646.—Peruv.
erythrocarpa, A. DC. l. c. 643.—Bras.
estrellensis, A. DC. l. c. 644.—Bras.
foliosa, A. DC. l. c. 650.—Bras.

SIPARUNA :—

fulva, A. DC. in Journ. Bot. iii. (1865) 219.—Peruv.
gesnerioides, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 646.—N. Granat.

glabra, A. DC. l. c. 656.—Bras.
glabrescens, A. DC. l. c. 648.—Ind. occ.
Goudotiana, A. DC. l. c. 651.—N. Granat.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. ii. 865. t. 333.—Guian.
hispida, A. DC. in Journ. Bot. iii. (1865) 219.—Peruv. ; Boliv.

Holtonii, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 652.—N. Granat.
Kunthii, A. DC. l. c. 649.—N. Granat.
Lagopus, A. DC. l. c. 648.—N. Granat.
lanceolata, A. DC. l. c. 644.—Bras.
laurifolia, A. DC. l. c. 651.—N. Granat.
lepidota, A. DC. l. c.—N. Granat.
limoniodora, A. DC. l. c. 646.—Peruv.
Lindenii, A. DC. l. c. 656.—Bras.
macrophylla, A. DC. l. c. 646.—N. Granat.
micrantha, A. DC. in Journ. Bot. iii. (1865) 219.—Bras.

mollicoma, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 653.—Bras.
mollis, A. DC. l. c.—N. Granat.
muricata, A. DC. l. c. 651.—Peruv.
Mutisii, A. DC. l. c. 650.—N. Granat.
neglecta, A. DC. l. c. 647.—Peruv.
nicaraguensis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 69.—Nicaragua.

oblongifolia, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 656.—Peruv.
obovata, A. DC. l. c. 644.—Bras.
ovalis, A. DC. l. c. 650.—Peruv.
panamensis, A. DC. in Journ. Bot. iii. (1865) 219.—Panama.

paniculata, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 656.—Bras.
pauciflora, A. DC. l. c.—Panama.
pellita, A. DC. l. c. 645.—Bolivia.
petiolaris, A. DC. l. c. 651.—N. Granat.
Poeppigii, A. DC. l. c. 653.—Bras.
polyantha, A. DC. l. c. 646.—Bolivia.
radiata, A. DC. l. c. 656.—Peruv.

Reginae, A. DC. l. c. 654.—Bras.
riparia, A. DC. l. c. 647.—Mexic.
rupestris, A. DC. l. c. 645.—Bras.
sessiliflora, A. DC. l. c. 647.—N. Granat.
Sprucei, A. DC. in Journ. Bot. iii. (1865) 219.—N. Granat.
suaveolens, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 647.—Peruv.
subinodora, A. DC. l. c. 649.—Peruv.
Thea, A. DC. l. c. 657.—Bras.
thecaphora, A. DC. l. c. 657.—Peruv.
tomentosa, A. DC. l. c.—Peruv.
Trianaei, A. DC. in Journ. Bot. iii. (1865) 219.—N. Granat.

SIPHANTHERA, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 102. t. 84, 85 (1827). **MELASTOMACEAE**, [Benth. & Hook. f. i. 739].

MEISNERIA, DC. Prod. iii. 114 (1828).
arenaria, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 193.—Bras.

cordata, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 103. t. 84.—Bras.
discolor, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 194.—Bras.
gracilis, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 537 = *cordata*, Miqueliana.

Hostmannii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 199.—Guian.
microlidioides, Cogn. l. c. 194.—Guian.
Miqueliana, Cogn. l. c. 197.—Bras.
paludosa, Cogn. l. c. 191.—Bras.
pusilla, Cogn. l. c. 197.—Bras.
robusta, Cogn. l. c. 195.—Bras.
subtilis, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 105. t. 85. f. 2.—Bras.
tenera, Pohl, l. c. i. 104. t. 85. f. 1.—Bras.
villosa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 192.—Bras.

SIPHAULAX, Rafin. Fl. Tellur. iii. 74 (1836) = **Nicotiana**, Linn. (Solan.).
glabra, Rafin. l. c.—Hab. ?

SIPHIDIA, Reichb. Handb. 173 (1837), sphalm. = seq.

SIPHISIA, Rafin. Med. Fl. i. 62 (1828) = **Aristolochia**, Tourn.
angustifolia, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 603 = *A. saccata*.
glabra, Rafin. Med. Fl. i. 65 = *A. macrophylla*.

SIPHISIA :—

Griffithii, Klotzsch, ex Duch. in DC. Prod. xv. i. 437 = *Aristolochia Griffithii*.
macrophylla, Aschers. Fl. Brandenb. i. 598 = *A. macrophylla*.

platanifolia, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 603 = *A. platanifolia*.

reticulata, Klotzsch, l. c. 604 = *A. reticulata*.
saccata, Klotzsch, l. c. 603 = *A. saccata*.
sericea, Klotzsch, l. c. = *A. sericea*, Benth.
Sipho, Klotzsch, l. c. 602 = *A. macrophylla*.
Sipho, Rafin. Med. Fl. i. 62 = *A. Sipho*.
Thwaitesii, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 604 = *A. Thwaitesii*.
tomentosa, Rafin. Med. Fl. i. 62, 65 = *A. tomentosa*.
tripteris, Rafin. l. c. 62 = *A. tripteris*.

SIPHOCAMPYLUS, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 104. tt. 169-177 (nec t. 168) (1831). **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 547.

BYRSANTHES, Presl, Prod. Monog. Lobel. 41 (1836).
CANONANTHUS, G. Don, Gen. Syst. iii. 718 (1834).
CREMOCHILUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 174.

LOBELIA, Presl, Prod. Monog. Lobel. 33 (1836).
acuminatus, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 424 = *Lobelia acuminata*.

amoenus, Planch. in Fl. des Serres, vi. (1850-51) 273. t. 619 = *villosulus*.

Andropogon, G. Don, Gen. Syst. iii. 703 = *Centropogon Andropogon*.

angustiflorus, Schlecht. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58, nomen.—Peruv.

asper, Benth. Pl. Hartw. 213.—N. Granat.

attenuatus, A. DC. in DC. Prod. vii. 398.—Peruv.

ayavacensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 63 = *umbellatus*.

barbatus, G. Don, Gen. Syst. iii. 701 = *Centropogon barbatus* (in Addend.).

Benthamianus, Walp. Rep. vi. 379.—N. Granat.

Berterianus, G. Don, Gen. Syst. iii. 703 = *Centropogon Berterianus*.

beslerioides, G. Don, l. c. 702 = *Centropogon beslerioides*.

betulaefolius, G. Don, l. c. 703.—Bras.

bicolor, G. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 389 = *Lobelia laxiflora*.

biserratus, A. DC. in DC. Prod. vii. 397.—Peruv.

bracteatus, Decne. ex Linden, Cat. n. 5. (1850) 7.—N. Granat.

brevidens, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 84.—Am. subtrop.

campanulatus, A. DC. in DC. Prod. vii. 401.—Ecuador.

canescens, A. DC. l. c. 402.—Mexic.

canus, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 106. t. 169 = *macropodus*.

Caoutchouc, G. Don, Gen. Syst. iii. 701.—N. Granat.

cardiophyllus, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 110. t. 173 = *corymbiferus*.

Cavanillesianus, G. Don, Gen. Syst. iii. 702 = *biserratus*.

cernuus, Griseb. Cat. Pl. Cub. 159.—Cuba.

Chamissonianus, A. DC. in DC. Prod. vii. 407 = *Westinianus*.

chimaphilophyllus, Schlecht. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58, nomen.—Peruv.

cirsiifolius, G. Don, Gen. Syst. iii. 703 = *Lobelia cirsiifolia*.

coccineus, Hook. Bot. Mag. t. 4178 = *Centropogon coccineus*.

coleoides, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 733.—Costa Rica.

Columnae, G. Don, Gen. Syst. iii. 701.—N. Granat.

comosus, G. Don, l. c. 702.—Mexic.

convolvulaceus, G. Don, l. c. 703.—Bras.

cordifolius, Benth. Pl. Hartw. 213 = *Benthamianus*.

cordifolius, Otto & Dietr. Allg. Gartens. xii. (1844) 371.—Hab. ?

corymbiferus, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 112. t. 175.—Bras.

corymbiflorus, Warsz. in C. Koch, Wochenschr. vii. (1864) 60 = *Centropogon Warszewiczii*.

corymbosus, Steud. Nom. ed. II. ii. 59, sphalm., in syn. = *praec.*

Costaricae, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 731.—Costa Rica.

crenatifolius, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 107. t. 170.—Bras.

cubensis, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 63.—Cuba.

decumbens, Fuss. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 397.—Ins. S. Doming.

SIPHOCAMPYLUS :—

- densiflorus, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 18.—N. Granat.
 denticulosus, *Planch. l. c.* 19.—N. Granat.
 dependens, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 704.—Peruv.
 divaricatus, *Benth. Pl. Hartw.* 138.—Peruv.
 Dombeyanus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 406.—Peruv.
 domingensis, *A. DC. l. c.* 397.—Ins. S. Doming.
 duploserratus, *Cham. in Linnaea*, viii. (1833) 201 = Westinianus.
 duploserratus, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 114. t. 177.—Bras.
 Eichleri, *Kanitz, in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 148.—Bras.
 elegans, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 19.—N. Granat.
 ellipticus, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 724.—Am. austr.
 erianthus, *Benth. Pl. Hartw.* 139 = *Centropogon erianthus* (in Addend.).
 eximius, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 16.—N. Granat.
 ferrugineus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 701.—N. Granat.
 fimbriatus, *Regel, Gartenfl.* xvii. (1868) 355. t. 600; et in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1868) 84 = *longepedunculatus*.
 floccosus, *Planch. ex Linden, Cat. n.* 5. (1850) 7.—N. Granat.
 foetidus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 702.—N. Granat.
 foliosus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 201.—Reg. Argent.
 fulgens, *Lebas, in Rev. Hortic.* (1872) 118.—Hab. ?
 Funckeanus, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 19.—N. Granat.
 fuscus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 704.—Peruv.
 giganteus, *G. Don, l. c.* 702.—Ecuador.
 glabratus, *G. Don, l. c.* 702.—N. Granat.
 glandulosus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4331.—N. Granat.
 grandidentatus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 407.—Mexic.
 grandis, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 702 = *Centropogon grandis*.
 guatemalensis, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 730 = *Centropogon cordifolius*.
 Gutierrezii, *Planch. & Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857) 155.—Am. centr.
 Hallianus, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 732.—Ecuador.
 hamatus, *H. Wendl. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xviii. (1850) 138.—Bras.
 Hartwegi, *Benth. Pl. Hartw.* 139 = *Centropogon Hartwegi* (in Addend.).
 hirtus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 702 = *Centropogon hirtus*.
 hispidus, *Benth. Pl. Hartw.* 214.—N. Granat.
 Humboldtianus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 398.—Peruv.
 imbricatus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 703.—Bras.
 Jamesianus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 402.—Ecuador.
 Kraussii, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed.* III. 424 = *Lobelia Kraussii*.
 laciniatus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 704.—Peruv.
 laevigatus, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 34.—N. Granat.
 Lamarckii, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 397.—Ins. S. Doming.
 lanatus, *Benth. Pl. Hartw.* 214.—N. Granat.
 lanceolatus, *Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov.* 132, nomen. (Quid ?).—Hab. ?
 lantanifolius, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 399.—Venezuela.
 lasianthus, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 36.—N. Granat.
 Lindleyi, *Lem. Jard. Fleur.* ii. (1852) t. 142.—N. Granat.
 longepedunculatus, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 109. t. 172.—Bras.
 longipes, *Van Houtte, ex Regel, Gartenfl.* (1854) 3; *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 733 = *Centropogon longipes*.
 lycioides, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 703.—Bras.
 macranthus, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 105. t. 168 = *Centropogon surinamensis*.
 macrophyllus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 704.—Peruv.
 macropodus, *G. Don, l. c.* 702.—Bras.
 macrostemon, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 403.—Bras.
 manettiaeflorus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4403.—N. Granat. ?
 Matthiaei, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 405.—Peruv.

SIPHOCAMPYLUS :—

- microstoma, *Hook. Bot. Mag.* t. 4286.—N. Granat.
 microstoma, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851) t. 44 = *Lindleyi*.
 mollis, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 36.—Venezuela.
 mollis, *Regel, in Flora*, xxxiii. (1850) 353.—Guatemala.
 Mutisianus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 703.—N. Granat.
 nemoralis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 201.—Reg. Argent.
 nitidus, *De Jonghe, ex C. Morr. in Ann. Soc. Hort. Gand*, ii. (1846) 319. t. 78.—Cuba.
 nitidus, *Hort. ex Hook. Bot. Mag.* sub t. 4403 = *manettiaeflorus*.
 nitidus, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 110. t. 174.—Bras.
 niveus, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 732.—N. Granat.
 odontosepalus, *Vatke, l. c.* 729.—N. Granat.
 Orbignianus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 405.—Bolivia.
 patens, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 159.—Cuba.
 penduliflorus, *Decne. ex Planch. in Fl. des Serres*, viii. (1852–53) 35. t. 763.—Venezuela.
 pendulifolius, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 398.—Peruv.
 persicifolius, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed.* III. 424 = *Lobelia persicifolia*.
 peruvianus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 401.—Peruv.
 polyphyllus, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 36.—N. Granat.
 popayanensis, *Benth. Pl. Hartw.* 213 = *Centropogon popayanensis* (in Addend.).
 prunifolius, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 401.—Am. austr.
 psilophyllus, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 113. t. 176.—Bras.
 pubescens, *Benth. Pl. Hartw.* 139.—Peruv.
 pulchellus, *Planch. & Linden, Cat. n.* 10 (1855) 7.—N. Granat.
 Purdieanus, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 18.—N. Granat.
 Regelii, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 732.—Costa Rica.
 resinosus, *Schlecht. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 58, nomen.—Peruv.
 reticulatus, *Klotzsch & Karst. ex Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 728.—Venezuela.
 retrorsus, *Vatke, l. c.* 724.—Am. austr.
 revolutus, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* xxx. (Apr. 1841) 429.—Hab. ?
 rosmarinifolius, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 704.—Peruv.
 rugosus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 399.—Peruv.
 rugosus, *Poit. in Rev. Hortic. Sér. II.* i. (1842) 186.—Hab. ?
 scaber, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 399 = *longepedunculatus*.
 scabrifolius, *Schlecht. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 58, nomen.—Peruv.
 scandens, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 703.—Peruv.
 Sceptum, *Decne. ex Linden, Cat. n.* 5. (1850) 7.—N. Granat.
 Schlimmianus, *Planch. in Fl. des Serres*, vi. (1850–51) 34.—N. Granat.
 Sellowianus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 407 = *Westinianus*.
 sessilifolius, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 731.—N. Granat.
 spectabilis, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 702 = *Centropogon surinamensis*.
 subcarnosus, *Benth. Pl. Hartw.* 138.—Ecuador.
 surinamensis, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 702 = *Centropogon surinamensis*.
 Thomesianus, *Moric. Pl. Nouv. Am.* 142. t. 85 = *imbricatus*.
 thysanopetalus, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 731.—Costa Rica.
 umbellatus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 702.—Peruv.
 verbascifolius, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 402.—Peruv.
 verticillatus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 703.—Bras.
 villosulus, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 108. t. 171.—Bras.
 virgatus, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 398.—Peruv.
 volubilis, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 703.—Venezuela.
 Warmingii, *Kanitz, in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 148.—Bras.
 Warszewiczii, *Regel, in Schweiz. Zeitschr. Gartenb.* (1850) 131; *ex Walp. Ann.* v. 390.—Guatemala.
 Westianus, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 702 = seq.
 Westinianus, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 115.—Bras.
- SIPHOCODON**, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 175. **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 560.
 spartioides, *Turcz. l. c.* 176.—Afr. austr.

- SIPHOMERIS**, Boj. Hort. Maurit. 170 (1837) = **Lecontea**, A. Rich. (Rubiaceae).
 argentifolia, Boj. l. c. 171 = *L. argentea*.
 foetens, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 229.—Afr. trop.
 Lingun, Boj. Hort. Maurit. 170 = *L. Bojeriana*.

- SIPHONACANTHUS**, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ix. 45. t. 1 (1847) = **Ruellia**, Linn. (Acanth.).
 densus, Nees, l. c. 47 = *R. densa*.
 diffusus, Nees, l. c. 46.—Bras.
 erythropus, Nees, l. c. 47.—Bras.
 pubens, Nees, l. c. 46.—Bras.
 repens, Nees, l. c. 47 (= *Stephanophysum Baikiei*).—Bras.
 rubiginosus, Nees, l. c. 46.—Bras.
 villosus, Nees, l. c. = *R. villosa*.

- SIPHONANDRA**, Klotzsch, in *Linnaea*, xxiv. (1851) 24 = **Ceratostema**, Juss. (Vaccin.).
 elliptica, Klotzsch, l. c. = *C. ellipticum*.

- SIPHONANDRA**, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) I. 581 = **Chiococca**, Linn. (Rubiaceae).
 mexicana, Turcz. l. c. 582.—Mexic.

- SIPHONANTHUS**, Linn. Gen. ed. II. 526 (1742) = **Clerodendron**, Linn. (Verben.).
 angustifolia, Willd. Sp. Pl. i. 606 = *C. Siphonanthus*.
 hastata, Roxb. Hort. Beng. 46; *Fl. Ind.* iii. 67 = *C. hastatum*.
 indica, Linn. Sp. Pl. 109 = *C. Siphonanthus*.

- SIPHONANTHIUS**, Schreb. ex *Baill. Etud. Gén. Euph.* 324 (1858) = **Hevea**, Aubl. (Euphorb.).
 elasticus, Schreb. ex *Baill. l. c.* 326 = *H. guianensis*.

- SIPHONEUGENA**, Berg, in *Linnaea*, xxvii. (1854) 344 = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).
 aromatica, Berg, l. c. 345; et in *Mart. Fl. Bras.* xiv. 1. 379 = *E. aromatica*, *Sond.* (in Addend.).
 densiflora, Berg, l. c. = *Bras.*
 Widgreniana, Berg, l. c. = *Bras.*

- SIPHONIA**, Benth. Pl. Hartw. 84 (1841) = **Lindenia**, Benth. (Rubiaceae).
 rivalis, Benth. l. c. = *L. rivalis*.

- SIPHONIA**, Rich. in *Schreb. Gen.* 656 (1791) = **Hevea**, Aubl. (Euphorb.).
 apiculata, Spruce, ex *Baill. Adansonia*, iv. (1863–64) 285 = *H. lutea*.
 brasiliensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 171 = *H. brasiliensis*.
 Cahuchu, Rich. ex *Willd. Sp. Pl.* iv. 567 = *H. guianensis*.
 discolor, Spruce, ex *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 369 = *H. discolor*.
 elastica, Pers. Syn. ii. 588 = *H. guianensis*.
 guyanensis, Juss. ex *Baill. Etud. Gén. Euph.* 326 = *H. guianensis*.
 Kunthiana, *Baill. l. c.* = *H. brasiliensis*.
 lutea, Spruce, ex *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 370 = *H. lutea*.
 pauciflora, Spruce, ex *Benth. l. c.* = *H. pauciflora*.
 rigidifolia, Spruce, ex *Benth. l. c.* 371 = *H. rigidifolia*.
 Spruceana, *Benth. l. c.* 370 = *H. Spruceana*.

- SIPHONIDIUM**, Armstr. in *Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 340. **SCROPHULARINEAE**.
 longiflorum, *Armstr. l. c.* 341.—N. Zel.

- SIPHONIOPSIS**, Karst. *Fl. Columb.* i. 139. t. 69 (1860 ?) = **Cola**, Schott (Stercul.).
 monoica, Karst. l. c. = *C. acuminata* ?

- SIPHONODON**, Griff. in *Calc. Journ. Nat. Hist.* iv. (1844) 246. t. 14. **CELASTRINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 370.
 ASTROGYNE, Wall. ex *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 629 (1875).
 australis, *Benth. Fl. Austral.* i. 403.—Austral.
 celestrineus, *Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist.* iv. (1844) 247.—Burma; Malaya.

SIPHONOGLOSSA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 159 (1854). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1110.
longiflora, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. 328.—Am. bor. occ.
nummularia, S. Moore, in *Fourn. Bot.* xviii. (1880) 40.—Afr. austr.
pilosella, Torr. Bot. Mex. Bound. 124.—Arizona.
ramosa, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 160. t. 5.—Mexic.

SIPHONOGYNE, Cass. in Dict. Sc. Nat. 1. 493 (1827) = **Eriocephalus**, Linn. (Compos.).

SIPHONOSTEGIA, Benth. in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 203. t. 44 (1835). *SCROPHULARIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 975.
LESQUEREUXIA, Boiss. & Reut. in Boiss. Diagn. Ser. II. xii. 43 (1853).
PRISMATANTHUS, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 203 (1835).
chinensis, Benth. in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 203. t. 44.—China.
laeta, S. Moore, in *Fourn. Bot.* xviii. (1880) 5.—China.
syriaca, Boiss. Fl. Orient. iv. 471.—Cilicia.

SIPHONOSTEMA, Griseb. in Lechl. Berb. Am. austr. 58 (1857) = **Ceratostema**, Juss. (Vaccin.).
costatum, Griseb. l. c. = C. *costatum*.
myrtifolium, Griseb. l. c. = C. *myrtifolium*.

SIPHONOSTOMA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 570 (1876), sphalm. = *præc.*

SIPHONYCHIA, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 173 (1838). *ILLECEBRACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 16.
americana, Torr. & Gray, l. c.—Am. bor.
diffusa, Chapm. Fl. S. U. St. 47.—Am. bor.
erecta, Chapm. l. c.—Am. bor.
Rugellii, Chapm. l. c.—Am. bor.

SIPHOSTIGMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 16 (1836) = **Cyanotis**, D. Don (Commel.).
cristata, Rafin. l. c. = C. *cristata*.

SIPHOTOMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 22 (1836) = **Hymenocallis**, Salisb. (Amaryll.).
calathina, Rafin. l. c. = H. *calathina*?

SIPHOTOXIS, Boj. ex Benth. in DC. Prod. xii. 457 (1848) = **Achyrosperrum**, Blume (Labiata).
rosea, Boj. ex Benth. l. c. 458 = A. *fruticosum*.

SIPHOTRIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 50 (1836) = **Renealmia**, Linn. f. (Scitam.).
squamosa, Rafin. l. c. = R. *exaltata*.

SIPHYALIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 17 (1836) = **Polygonatum**, Tourn. (Liliac.).
nitida, Rafin. l. c. = P. *oppositifolium*.

SIPONIMA, A. DC. in DC. Prod. viii. 246 (1844), sphalm. = **CIPONIMA**, Aubl. = **Symplocos**, Linn. (Styrac.).

SIRAITOS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 (1836) = **Chamaelirium**, Willd. (Liliac.).
aquaticus, Rafin. l. c. 27 = C. *carolinianum*.

SIRIUM, Linn. Mant. ii. 145 (1771) = **Santalum**, Linn.
myrtifolium, Linn. l. c. 200; Roxb. Pl. Corom. i. t. 2 = Sant. album.

SISARUM, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 97 (1763) = **Pimpinella**, Linn. (Umbell.).
Germanorum, Schur, Enum. Pl. Transs. 248 = *Sium latifolium*.
macrophyllum, Schur, l. c. = *Sium latifolium*.

SISIMBRYUM, [Clairv.] Man. Herb. 218 (1811), sphalm. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucif.).

SISMONDAEA, Delponte, in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xiv. (1854) 394 = **Dioscorea**, Plum.
dioscoreoides, Delponte, l. c. = D. *piperifolia*?

SISON, Linn. Coroll. Gen. 5 (1737). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 892.

ALACOSPERMUM, Neck. Elem. i. 167 (1790).
acaule, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 592 = *Peucedanum creticum*.

aegopodioides, Spreng. Syst. i. 886 = *Smymium aegopodioides*.

alpinum, Sieber, Reise Kreta, i. 472; ii. 317 = *Peucedanum creticum*.

Ammi, Herb. Madr. ex Wall. Cat. sub n. 7208 = *Ammi indicum*.

Ammi, Jacq. Hort. Vindob. t. 200 = *Carum copticum*.

Ammi, Linn. Sp. Pl. 252 = *Apium leptophyllum*?

Ammi, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 132 = *Carum ammoides*.

Amomum, Linn. Sp. Pl. 252.—Europ.; As. Min.

amomum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *præc.*

Anisum, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 260 = *Pimpinella Anisum*.

arvense, Brot. Fl. Lusit. i. 424 = *Carum segetum*.

aureum, Spreng. in Schult. Syst. vi. 410 = *Thaspium aureum*.

bulbosum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 169 = *Erigenia bulbosa*.

canadense, Linn. Sp. Pl. 252 = *Cryptotaenia canadensis*.

capense, Spreng. Sp. Umbellif. 111 = *Pimpinella capensis*.

capillaceum, Spreng. Syst. i. 887 = *Apium leptophyllum*, *Discopleura capillacea*.

carvifolium, Bert. ex DC. Prod. iv. 116 = *Carum flexuosum*.

carvifolium, Wall. Cat. n. 591 = *Vicatia conifolia*.

cernuum, Salisb. Prod. 165 = *Carum segetum*.

conifolium, Wall. ex DC. Prod. iv. 243 = *Vicatia conifolia*.

crinitum, Pall. in Act. Acad. Petrop. ii. (1779) 250. t. 7 = *Schultzia crinita*.

cuneifolium, Steud. Nom. ed. II. ii. 592, sphalm. = *carvifolium*.

divaricatum, Spreng. Sp. Umbellif. 113 = *Apium divaricatum*, *Carum Bunius*.

diversifolium, Wall. Cat. n. 592; et ex DC. Prod. iv. 110 = *Carum diversifolium*.

erectum, Salisb. Prod. 165 = S. *Amomum*.

exaltatum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 21.—Syria.

fasciculatum, Pohl, ex DC. Prod. iv. 105 = *Apium Ammi*.

flexuosum, Dum. Fl. Belg. 78 = *Conopodium denuatum*.

flexuosum, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. lxvii = *Carum flexuosum*.

Gussonianum, Balb. ex DC. Prod. iv. 83 = *Petagnia saniculaefolia*.

Gussonii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 118 = *Petagnia saniculaefolia*.

Haenkei, Presl, ex DC. Prod. iv. 105 = *Apium Ammi*.

heterophyllum, Moench, Meth. 97 = S. *Amomum*.

integerrimum, Spreng. Syst. i. 887 = *Pimpinella integrima*.

inundatum, Linn. Sp. Pl. 253 = *Apium inundatum*.

laciniatum, L'Hérit. ex DC. Prod. iv. 105 (= *Helosciadium laciniatum*).—Peruv.

lateriflorum, Bertol. Fl. Ital. iii. 283 = *Apium Ammi*.

majus, Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 429 = *Ammi majus*.

marginatum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 168 = *Peucedanum ternatum*.

nodiflorum, Brot. Fl. Lusit. i. 423 = *Apium nodiflorum*.

peregrinum, Spreng. in Schult. Syst. vi. 409 = *Carum peregrinum*.

Podagraria, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 260 = *Aegopodium Podagraria*.

proliferum, Broch. ex DC. Prod. iv. 116 = *Carum flexuosum*.

pumilum, Brot. Fl. Lusit. i. 425 = *Ammi pumilum*.

pusillum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 168 = *Apium divaricatum*.

ranunculaefolium, Presl, ex DC. Prod. iv. 111 (= *Helosciadium ranunculaefolium*).—Chili.

rotundifolium, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 260 = *Pimpinella rotundifolia*.

rubricaulis, Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 429 = *Discopleura capillacea*.

Ruta, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 7 = *Apium graveolens*.

salsum, Linn. f. Suppl. 181 = *Peucedanum redivivum*.

segetum, Linn. Sp. Pl. 252 = *Carum segetum*.

Sieberianum, DC. Prod. iv. 111 = *Peucedanum creticum*

SISON :—

sylvaticum, Brot. Fl. Lusit. i. 423 = *Physospermum commutatum*.

tenerum, Wall. Cat. n. 593 = *Pimpinella tenera*.

Thomasii, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. lxvii = *Pimpinella Thomasii*.

trifidum, Burm. ex DC. Prod. iv. 106 = *Apium graveolens*.

trifoliatum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 168 = *Thaspium aureum*.

trinervium, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 184.—Nepal.

verticillato-inundatum, Thore, Ess. Chl. Land. 101 = *Carum inundatum*.

verticillatum, Linn. Sp. Pl. 253 = *Carum verticillatum*.

verticillatum, Pall. Reise, iii. 513 = *Peucedanum redivivum*.

SISYMBRELLA, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 422 (1838) = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).

aspera, Spach, l. c. 426 = *Sisymbrium asperum*.

sylvestris, Spach, l. c. 425 = *Nasturtium sylvestre*.

SISYMBRION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 113, 135 = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).

alliarium, St. Lag. l. c. = S. *Alliaria*.

SISYMBRIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 199 (1737). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 77.

ALLIARIA, Adans. Fam. ii. 418 (1763).

ARABIDOPSIS, Schur, Enum. Pl. Transs. 55. (1866).

CHAMAEPILIUM, Wallr. Sched. Crit. i. 376 (1822).

DESCURAINIA, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 72 (1835-60).

DISCUREA, Schur, Enum. Pl. Transs. 54 (1866).

DRABOPSIS, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 253.

ERYSIMUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 418 (1763).

HUGUENINIA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 691 (1832).

IRIO, Linn. Syst. ed. I (1735).

KIBERA, Adans. Fam. ii. 417 (1763).

LEPTOBASIS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 198 (1867).

LEPTOCARPAEA, DC. Syst. ii. 201 (1821).

MAREZIA, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 228 (1874).

NORTA, Adans. Fam. ii. 417 (1763).

PACHYPODIUM, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 75 (1835-60).

PILOSELLA, Kostel. Hort. Prag. 104 (1844).

ROBESCHIA, Hochst. ex Fourn. Thèse Crucif. 146 (1865).

SISYMBRELLA, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 422 (1838).

SOPHIA, Linn. Syst. ed. I (1735); Adans. Fam. ii. 417 (1763).

TONGUEA, Endl. Gen. 1419 (1841).

TRICHOLOBOS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 290.

VALARUM, Schur, Enum. Pl. Transs. 54 (1866).

VANDEALE, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 331.

absinthoides, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 680 = S. *Sophia*.

abyssinicum, Fourn. Thèse Crucif. 71.—Abyss.

acaule, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 593, nomen.—Ins. Corsic.

acre, Lam. Fl. Fr. ii. 520 = *Diplotaxis tenuifolia*.

aculeolatum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 75 = *Malcomia aculeolata*.

acutangulum, DC. Fl. Fr. iv. 670 = *austriacum*.

acuticarpum, M. E. Jones, in Am. Natural. xvii. 11. (1883) 875.—Mexic.

adpressum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 367.—Turkestan.

adpressum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 303.—Ecuador.

aegyptium, Juss. ex DC. Syst. ii. 630 = *Diplotaxis pendula*.

affine, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 44 = *austriacum orientale*.

album, Pall. Reise, iii. 739 = *Smelowskia cinerea*.

alliaceum, Fourn. Thèse Crucif. 114, in syn. = seq.

Alliaria, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 26.—Europ.; Oriens; Reg. Himal.

alpestre, F. Muell. Fragm. vii. 20 = *Blennodia alpestris*.

alpinum, Fourn. Thèse Crucif. 131 = *Braya alpina*.

alpinum, Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. ii. (1770) 481 = *strictissimum*.

altissimum, Asso, Syn. Stirp. Arag. 86 = *Assoanum*.

altissimum, Linn. Sp. Pl. 659.—Europ.

SISYMBRIUM:—

amarum, Salisb. Prod. 270 = *Nasturtium officinale*.
amphibium, Huds. Fl. Angl. ed. II. 296, partim = *Nasturtium palustre*.
amphibium, Linn. Sp. Pl. 657 = *Nasturtium amphibium*.
amplexicaule, Desf. Fl. Atlant. ii. 81 (= *Sinapis amplexicaulis*).—Alger.
amplexicaule, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 61.—Peruv.
amplexicaule, Jan, ex Fourn. Thèse Crucif. 142 = *Moricandia arvensis*.
amplexicaule, Phil. Fl. Atac. 8.—Chili.
anceps, Wahlenb. Fl. Upsal. 223 = *Nasturtium anceps*.
andinum, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 665.—Chili.
angustifolium, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 9.—Turkestan.
anomalum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 289.—Bolivia.
antarcticum, Fourn. Thèse Crucif. 65.—Reg. Magellan.
apenninum, Bubani, ex Fourn. Thèse Crucif. 99 = *Zanonii*.
apetalum, Lour. Fl. Cochinch. 400 = *Nasturtium indicum*.
aquaticum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *Nasturtium amphibium*.
arabidoides, Hook. Fl. Bor. Am. i. 63 = *Arabis lyrata*.
arcticum, Fourn. Thèse Crucif. 58.—Sibir. arct.
arenosum, Linn. Fl. Suec. ed. II. 233 = *Arabis petraea*.
arenosum, Linn. Sp. Pl. 658 = *Arabis arenosa*.
argutum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222 = capense.
Arnottianum, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 138.—Chili.
arundanum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 30.—Hispan.
arundanum, Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 802 = *granatense*.
asperum, Linn. Sp. Pl. 659.—Europ. austr.
asperum, Pall. Reise, iii. 740 = *Dontostemon pectinatus*.
asperum, Schimp. ex Boiss. Fl. Orient. i. 226 = *Malcomia aculeolata*.
Assoanum, Losc. & Pard. Ser. Inconf. ed. I. 6.—Hispan.
athrocarpum, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 59.—Peruv.
atomarium, Adans. ex DC. Syst. ii. 484 = *Dontostemon integrifolius*.
atriplicifolium, Fisch. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) 1. Beibl. 7, nomen.—Reg. baical.
atrovirens, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 72 = *Nasturtium indicum*.
auriculatum, A. Gray, Pl. Wright. i. 8.—Texas.
austriacum, Jacq. Fl. Austr. iii. 35.—Europ. med.
axillare, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 162.—Reg. Himal.
Barbarea, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 54; ed. II. 52 = *Barbarea vulgaris*.
Barbarea, Seguiet, ex Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 329 = *praece*.
Barbarea, All. Auct. Pedem. 19 = *Barbarea praecox*.
Barbarea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 921 = *Barbarea plantaginea*.
barbareaefolium, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 67 = *Nasturtium palustre*.
Barrelieri, Linn. Sp. Pl. ed. II. 919 = *Diploxia Barrelieri*.
Barrelieri, Thuill. Fl. Par. ed. II. 334 = *Diploxia muralis*.
Belangerii, Fourn. Thèse Crucif. 141, 149.—Persia.
bellidifolium, Poir. Encyc. vii. 220 = *Arabis Commer-sonii*.
Berlandieri, Fourn. Thèse Crucif. 105.—Mexic.
Berteroanum, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 666.—Chili.
binerve, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 189 = *Malcomia nana*.
Blennodia, F. Muell. Fragm. vii. 20 = *Blennodia canescens*.
Boissieri, Nym. Consp. 44.—Lusit.; Hisp.
bonariense, Poir. Encyc. vii. 205 = *Nasturtium bonariense*.
Boryi, Nym. Consp. 44 = *pinnatifidum*.
Bourgaeum, Fourn. Thèse Crucif. 55.—Ins. Teneriff.

SISYMBRIUM:—

brachycarpon, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 744 = *canescens*.
brachycarpon, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 323 = *incisum*?
brachylobum, Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 593, nomen; Herb. Berol. ex Fourn. Thèse Crucif. 143 = *Boissieri*.
brachypetalum, C. A. Mey. in Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 88 = *altissimum*.
brachypodum, F. Muell. Fragm. vii. 20 = *Blennodia brevipes*.
brassicaceforme, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 129.—Sibir.
brevicaule, Wibel, Prim. Fl. Werth. 348 = *Diploxia viminea*.
brevipes, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 154 = *nudum*.
Bungei, Steud. Nom. ed. II. ii. 593 = *Dontostemon dentatus*.
Burchellii, DC. Syst. ii. 472.—Afr. austr.
Burchellii, Eckl. & Zeyh. Enum. 5 = *capense*.
burgundiacum, Hort. Taur. ex DC. Syst. ii. 601 = *Brassica Cheiranthos*.
bursifolium, Gouan, Illustr. 42 = *pinnatifidum*.
bursifolium, Linn. Cent. Pl. ii. 24; *Amoen. Acad.* iv. 322.—Europ. austr.
bursifolium, Patr. ex DC. Syst. ii. 194 = *Nasturtium bursifolium*.
bursifolium, Pourr. ex Nym. Consp. 44 = *Boissieri*.
cabulicum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 161 = *pumilum*.
caeruleum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 73 = *Arabis arenosa*.
californicum, S. Wats. in Bot. King's Exped. 23 = *incisum*.
calycinum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 289.—Bolivia.
canescens, Benth. Pl. Hartw. 9 = *incisum*.
canescens, Griseb. ex Fourn. Thèse Crucif. 65 = *antarcticum*.
canescens, Nutt. Gen. Am. ii. 68.—Am. bor. et austr. capense, Thunb. Prod. Pl. Cap. 109.—Afr. austr.
capillaceum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 72 = *Nasturtium palustre*.
cardaminefolium, Gilib. l. c. 70 = *Nasturtium officinale*.
cardaminoides, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 34.—Austral.
carnosulum, Phil. Fl. Atac. 7 = *stenophyllum*.
cartilagineum, Pall. ex DC. Syst. ii. 471 = *juncum*.
catholicum, Boeber, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 258 = *Diploxia tenuifolia*.
catholicum, Linn. Mant. i. 93 = *Diploxia catholica*.
ceratophyllum, Desf. Fl. Atlant. ii. 82 = *Nasturtium ceratophyllum*.
cheiranthoides, Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 429; Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 27 = *Erysimum cheiranthoides*.
Cheiranthus, Trautv. l. c. iv. (1876) 108 = *Erysimum lanceolatum*, altaicum.
chrysanthum, Jord. Diagn. i. 148 = *austriacum*.
ciliolatum, Fourn. Thèse Crucif. 129.—Peruv.
cinereum, Desf. Fl. Atlant. ii. 83. t. 157 = *Ammosperma cinerea*.
cinereum, Nutt. ex Fourn. Thèse Crucif. 63 = *Cumingianum*.
clandestinum, Hort. Berol. ex Spreng. Nov. Prov. 29 = *Nasturtium clandestinum*.
coeruleum, Auct. = *caeruleum*.
colchaguense, Wedd. ex Fourn. Thèse Crucif. 134.—Chili.
Columnae, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 157 = *heteromallum*.
Columnae, Jacq. Fl. Austr. iv. 12 = *orientale*.
compressum, Moench, Meth. Suppl. 83 = *austriacum*.
confertum, Stev. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 304 = *polyceratium*.
confusum, Fourn. Thèse Crucif. 95.—Afr. austr.
confusum, Fanka, in Termész. Füzetek, viii. (1884) 31.—Hungar.
contortum, Cav. Desc. 436.—Hispan.
contortuplicatum, DC. Syst. ii. 483 = *Malcomia contortuplicata*.
contortuplicatum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 190 = *Malcomia Ledebourii*.
corniculatum, Cav. Desc. 437.—Hispan.
corniculatum, Lam. Fl. Fr. ii. 520 = *polyceratium*.
coronopifolium, Desf. Fl. Atlant. ii. 82 = *Nasturtium coronopifolium*.

SISYMBRIUM:—

corymbosum, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 666.—Chili.
Coulteri, Hems. Diagn. Pl. Nov. 18.—Mexic.
crassifolium, Cav. Desc. 437.—Hispan.
crassipes, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 500 = *Erysimum crassipes*.
crithmifolium, Roth, Nov. Pl. Sp. 325 (err. typ. 225) = *Heliophila crithmifolia*.
Cumingianum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 38.—Chili.
Cumingii, Presl, Bot. Bemerk. 9 = *praece*.
curvipes, F. Muell. Fragm. vii. 20 = *Blennodia curvipes*.
curvisilium, Bertol. Misc. Bot. ii. 13. t. 10 = *Malcomia torulosa*.
curvisilium, Hook. Fl. Bor. Am. i. 61 = *Nasturtium curvisilium*.
dahuricum, Turcz. ex Fourn. Thèse Crucif. 97.—Dahuria.
damascenum, Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II. vi. 11.—Syria.
dareaefolium, Poepp. ex Fourn. Thèse Crucif. 63, in syn. = *Cumingianum*.
decipiens, Bunge, in *Linnaea*, xviii. (1844) 505.—Turkestan.
deflexum, Harv. ex Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 66, sphalm. = *reflexum*.
Delilei, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 71 = *Malcomia pygmaea*.
deltoideum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 163.—Reg. Himal.
dentatum, All. Fl. Pedem. i. 275. t. 57. f. 3 = *pinnatifidum*.
dentatum, Torr. in Short, Pl. Kentucky, Suppl. iii. 338; ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 47 = *Arabis dentata*.
derelictum, Jord. Diagn. i. 150 = *austriacum*.
diffusum, A. Gray, Pl. Wright. i. 8.—Texas.
dissectum, Nutt. ex Fourn. Thèse Crucif. 143 = *Nasturtium palustre*.
diversifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 450 = *Nasturtium amphibium*.
domingense, Poir. Encyc. Suppl. v. 161 = *Nasturtium pyrenaicum*.
Doumetianum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 70.—Afr. bor.
dubium, Pers. Syn. ii. 199 = *Nasturtium indicum*.
eckartsbergense, Willd. Sp. Pl. iii. 502 = *austriacum*.
Edwardsii, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 59 = *Eutrema Edwardsii*.
eglandulosum, DC. Syst. ii. 485 = *Dontostemon dentatus*.
elatum, C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 14.—Armenia.
eremigenum, F. Muell. Fragm. ii. 143 = *Blennodia eremigera*.
erosum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222 = *Brassica strigosa*.
erucaefolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 74 = *S. Irio*.
erucastrifolium, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 107 = *Erysimum erucastrifolium*.
Erucastrum, Gouan, Illustr. 42 = *Diploxia muralis*.
Erucastrum, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 234 = *Brassica Erucastrum*.
erucoides, Desf. Fl. Atlant. ii. 83 = *Diploxia erucoides*.
Erysimastrum, Lam. Fl. Fr. ii. 521 = *S. Irio*, orientale.
erysimifolium, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 329 = *austriacum*.
erysimoides, Desf. Fl. Atlant. ii. 84. t. 158.—Reg. Medit.; Afr. trop.; Arab.
exacoides, DC. Syst. ii. 463 = *Malcomia exacoides*.
exasperatum, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 3.—Afr. austr.
falcatum, Fourn. Thèse Crucif. 135.—Abyssin.
fastigiatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1870) ii. 670.—Chili.
filicifolium, Georgi, Besch. Russ. Reich. Nachtr. 287 = *Leptaleum filifolium*.
filifolium, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 155, in obs. = *Blennodia filifolia*.
filifolium, Willd. Sp. Pl. iii. 495 = *Leptaleum filifolium*.
filiforme, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 197 = *S. Irio*.
filiformum, Poir. Encyc. vii. 208 = *Leptaleum filifolium*.
flavissimum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 382 = *Smelowskia flavissima*.

SISYMBRIUM:—

- flexuosum*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 197 = orientale.
fluviatile, Vell. Fl. Flum. 271; vi. t. 109 = Nasturtium officinale.
foliosum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 160.—Reg. Himal.
foliosum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 10.—Chili.
fragile, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 288.—Peruv.
frutescens, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 139.—Chili.
fugax, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20.—Hispan.
Gaillardoti, Boiss. Fl. Orient. i. 214, in syn. = pumilum.
Galeottianum, Fourn. Thèse Crucif. 59.—Mexic.
gallicum, Schleich. ex Soyer-Willems. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 116 = Brassica Cheiranthos.
gallicum, Willd. Enum. Hort. Berol. 678 = S. Irio.
gangeticum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4777 = Nasturtium indicum.
gariepinum, Burch. ex DC. Syst. ii. 472.—Afr. austr.
Gayanum, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 122 = leptocarpum.
gelidum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 501 = Erysimum gelidum.
geraniifolium, Poir. Encyc. vii. 218 = Cardamine geraniifolia.
glabrum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 44 = S. Irio.
glaciale, Forst. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) 32 = Cardamine glacialis.
glaucescens, Jord. Diagn. i. 144 = austriacum.
glaucum, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 93.—Am. bor.
glaucum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. I. 784, nomen (Quid ?).—Hab.?
gracile, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 288.—Bolivia.
granatense, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 24.—Hispan.
grandiflorum, Molina, Sagg. Chil. ed. II. 292 = Cardamine glacialis.
grandiflorum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 290 (= *Eudema grandiflora*).—Am. austr.
Griffithianum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 23.—Afghan.
halophilum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 143.—Sibir. altaic.
Harra, Steud. Nom. ed. I. 784 = Diplotaxis pendula.
Hartwegianum, Fourn. Thèse Crucif. 66 = incisum.
hastatum, Phil. Ser. Mendoc. Alt. 2.—Chili.
hesperidiflorum, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 22 = Hesperis leucoclada.
heteromallum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 132.—Sibir. altaic.
heterophyllum, Forst. f. Prod. 46 = Cardamine debilis.
hieracifolium, Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 27 = Erysimum hieracifolium.
himalaicum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 160.—Reg. Himal.
hirsutum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 74 = Loeselii.
hirsutum, Host, ex Fourn. Thèse Crucif. 76 = supinum.
hirsutum, Lag. ex DC. Syst. ii. 478 = runcinatum.
hirtulum, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 240.—Turkestan.
hirtum, Host, Fl. Austr. ii. 261 = Brassica Erucastrium.
hispanicum, Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 799 = contortum.
hispanicum, Jacq. Coll. i. 69; Ic. Pl. Rar. i. 12. t. 124.—Hispan.
hispidulum, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 63.—N. Granat.
hispidum, Moench, Meth. Suppl. 83 = Loeselii.
hispidum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1870) II. 670.—Chili.
hispidum, Poir. Encyc. Suppl. v. 161 = Nasturtium palustre.
hispidum, Vahl, Symb. Bot. ii. 77 = Diplotaxis pendula.
hispidum, Willd. ex DC. Syst. ii. 480 = Malcomia torulosa?
Hookeri, Fourn. Thèse Crucif. 120.—Reg. Himal.
Hueti, Boiss. Fl. Orient. i. 957.—Armenia.
humifusum, J. Vahl, in Fl. Dan. t. 2297 = Arabis lyrata.
humile, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 137.—Reg. Himal.; As. et Am. bor.
hungaricum, Lumn. Fl. Poson. 282 = altissimum.
hybridum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 331 = Nasturtium palustre.

SISYMBRIUM:—

- ibericum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 108 = Erysimum ibericum.
imbricatifolium, Wedd. ex Fourn. Thèse Crucif. 132.—Chili.
incanum, Bernh. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 38 = canescens.
incisum, Engelm. ex A. Gray, in Mem. Acad. N. S. iv. (1849) 8.—Am. bor. occ.
indicum, Linn. Mant. i. 93 = Nasturtium indicum.
indicum, Walt. Fl. Carol. 174 = Nasturtium amphibium.
integrifolium, Boeber, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 260 = junceum.
integrifolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 72 = Cochlearia amphibia.
integrifolium, Linn. Sp. Pl. 660 = Dontostemon integrifolius.
intermedium, Hose, in Usteri, Ann. Bot. xxi. (1797) 37.—Europ.
Irio, Crantz, ex Steud. Nom. ed. I. 784 = orientale.
Irio, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 253 = heteromallum.
Irio, Linn. Sp. Pl. 659.—Europ.; As. et Afr. bor.
Irio, Wibel, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 694 = Diplotaxis viminea.
irioides, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 76 = S. Irio.
Iris, Retz, Fl. Scand. 126, sphalm. = S. Irio.
islandicum, Oed. Fl. Dan. t. 409 = Nasturtium palustre.
jacobaeifolium, Berger, ex Vill. Cat. Strasb. 259 = Brassica Erucastrium.
Jacquemontii, Fourn. Thèse Crucif. 111.—Ind. or.
junceum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 114.—Europ. or.; As. et Am. bor.
junceum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 61 = linifolium.
Kahikir, Mart. ex Spreng. Syst. ii. 901.—Hab.?
Kochii, Petri, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1868) 24.—Hab.?
kokanicum, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 9.—Turkestan.
Korolkowi, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 240.—Turkestan.
Kralikii, Fourn. Thèse Crucif. 74 = S. Irio.
kurawurensense?—Cf. *runawurensense*.
laevigatum, Willd. Sp. Pl. iii. 500 = Diplotaxis tenuifolia.
Lagasciae, Amo, Fl. Iber. vi. 529.—Hispan.
lasiocarpum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 162.—Reg. Himal.
lasiocarpum, F. Muell. Fragm. vii. 20 = Blennodia lasiocarpa.
lasiolobum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 24.—America?
latifolium, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 679 = S. Irio.
laxiflorum, Boiss. Elench. 9.—Hispan.
Lechleri, Fourn. Thèse Crucif. 129.—Chili.
leiocarpum, Jord. Diagn. i. 139 = officinale.
leptocarpum, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 139.—Chili.
leptopetalum, Rafn. Fl. Ludov. 84 (Quid ?).—Am. bor.
leptophyllum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 500 = Erysimum leptophyllum.
Limosella, Fourn. Thèse Crucif. 132.—Mont. Altai.
lineare, DC. Syst. ii. 464 = junceum.
linifolium, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 91.—Am. bor.
lippizense, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 161 = Nasturtium lippizense.
litorale, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 667.—Chili.
Loeselii, Linn. Cent. Pl. i. 18; Amoen. Acad. iv. 279.—Europ.; Oriens; Reg. Himal.
Loeselii, Nym. Syll. 194, partim = Assoanum.
Loeselii, Thuill. Fl. Par. ed. II. 335 = orientale.
longepedunculatum, Fourn. Thèse Crucif. 59 (excl. syn.) = incisum.
Lucae, F. Muell. Census, 5.—Austral.
Ludovicianum, Nutt. ex Hook. Journ. Bot. i. (1834) 191 = Cardamine ludoviciana.
lyratum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17.—Afr. austr.
lyratum, Meissn. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 32 (= *Sinapis retrorsa*).—Afr. austr.
macroloma, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 368.—Alger.
macrophyllum, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 129 = Cumingianum.
macrostachyum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 9 (sp. dub.).—Chili.

SISYMBRIUM:—

- magellanicum*, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 243.—Reg. Magell.
malcolmioides, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 431.—Alger.
Mandonii, Fourn. Thèse Crucif. 109.—Boliv.
matthioides, Wedd. ex Fourn. l. c. 144 = Mathewsia matthioides.
maximum, Hochst. ex Fourn. l. c. 72 = S. Irio.
mexicanum, Sesse, ex Spreng. Syst. ii. 882 = Nasturtium palustre.
Meyeri, Ledeb. Fl. Ross. i. 184 = Malcomia Ledebourii.
Meyeri, Steud. Nom. ed. II. ii. 594 = Dontostemon micranthus.
micranthum, Roth, Nov. Pl. Sp. 324 = Nasturtium micranthum.
micranthum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 44, nomen (Quid ?).—Hab.?
millefolium, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 391.—Ins. Teneriff.
minus, Lam. Fl. Fr. ii. 517 = Diplotaxis muralis.
minutiflorum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 158.—Reg. Himal.
molle, Jacq. Coll. i. 68 = pumilum.
mollissimum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 140.—Reg. Himal.; Sibir.
monanthos, Viv. Fl. Lib. Spec. 68 = Morisia hypogaea.
monense, Gilib. Elem. ii. 184; ex DC. Syst. ii. 601 = Brassica Cheiranthos.
monense, Linn. Sp. Pl. ed. I. 658 = Brassica monensis.
monense, Linn. l. c. ed. II. 918 = Diplotaxis saxatilis.
monense, Thuill. Fl. Par. ed. II. 333 = Diplotaxis muralis.
monense, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 350. t. 39 = Brassica repanda.
montanum, E. Mey. ex Presl, Bot. Bemerk. 9 = capense.
montivagum, Jord. Diagn. i. 146 = austriacum.
multifidum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 75 = S. Sophia.
multifidum, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 904 = junceum.
multisiliquosum, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. ii. 50 = austriacum.
murale, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 112 = Diplotaxis saxatilis.
murale, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 43 = Diplotaxis viminea.
murale, Linn. Sp. Pl. 658 = Diplotaxis muralis.
muricatum, Willd. ex DC. Syst. ii. 485 = Dontostemon pectinatus.
myriophyllum, H. B. & K. ex DC. l. c. 477.—Ecuador.
nanum, DC. Syst. ii. 486 = Malcomia nana.
nanum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 281 = Braya versicolor.
nasturtiifolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 71 = Nasturtium sylvestre.
nasturtioides, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 115, in obs. = Blennodia nasturtioides.
Nasturtium, Muhl. Cat. 60 = Thelypodium pinnatifidum.
Nasturtium, Thunb. Fl. Jap. 260 = seq.
Nasturtium aquaticum, Linn. Sp. Pl. 657 = Nasturtium officinale.
nebrodense, Poir. Encyc. Suppl. v. 161 = Lepidium nebrodense.
niagarense, Fourn. Thèse Crucif. 85 = officinale.
nitidulum, Lag. ex Spreng. Syst. ii. 901 = erysimoides.
nitidum, Zea, ex Desf. Tabl. ed. II. 153 = erysimoides.
niveum, Phil. Fl. Atac. 8.—Chili.
Novae-Zelandiae, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 11.—N. Zel.
nubigenum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 290 (= *Eudema nubigena*).—Ecuador.
nudum, Boiss. Fl. Orient. i. 214.—Persia.
Nuttallii, Colla, Herb. Pedem. i. 206. n. 29 = Cumingianum.
obtusangulum, Auch. ex Fourn. Thèse Crucif. 91 = altissimum.
obtusangulum, Schleich. Cat. 48; ex Willd. Sp. Pl. iii. 504 = Brassica Erucastrium.
officinale, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 26.—Europ.; Afr. bor.
officinatum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 54; ed. II. 52 = praec.
oliganthum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 289.—Bolivia.

SISYMBRIUM:—

- Orbignyanum, *Fourn. Thèse Crucif.* 107.—Bolivia. orientale, *Linn. Cent. Pl.* ii. 24; *Amoen. Acad.* iv. 322.—Europ.; Oriens; Reg. Himal. orophilum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i.* (1864) 288.—Bolivia.
- Pallasii*, Spreng. Syst. ii. 901 = junceum.
- pallidum*, Jord. Diagn. i. 145 = austriacum.
- Palmeri, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 19.—Mexic.
- palustre*, Garsault, Fig. Pl. t. 550; ex DC. Syst. ii. 197 = Nasturtium amphibium.
- palustre*, Leyss. Fl. Hal. 166 = Nasturtium palustre.
- paniculatum*, Steph. ex Fourn. Thèse Crucif. 145 = Arabis incarnata.
- pannonicum*, Badaro, in Moretti, in Brugnati. Giorn. ix. (1826) 74 = orientale.
- pannonicum*, Jacq. Coll. i. 70 = altissimum.
- Parra, *Linn. Mant.* ii. 255 = Brassica sabularia.
- Parryi, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 19.—Mexic.
- parviflorum*, Lam. Fl. Fr. ii. 519 = S. Sophia.
- parvifolium*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 667.—Chili.
- patens, Moench, *Meth.* 251 (sp. dub.).—Hab. ?
- patulum, *Fourn. Thèse Crucif.* 104.—Mexic.
- pauciflorum, *Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 93.—Am. bor.
- pectinatum*, Fisch. ex DC. Syst. ii. 485 = Dontostemon pectinatus.
- pendulum*, Desf. Fl. Atlant. ii. 82. t. 156 = Diplotaxis pendula.
- pendulum*, Lag. ex DC. Syst. ii. 629 = Diplotaxis Lagascana.
- perenne*, Steud. Nom. ed. II. ii. 594 = Dontostemon perennis.
- perfoliatum*, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 188 = Conringia clavata.
- persicum*, Schrad. ex Spreng. Nov. Prov. 39 = S. Sophia.
- peruvianum, DC. Syst. ii. 477.—Peruv.
- petraeum*, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 359 = Arabis petraea.
- petraeum*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 668.—Chili.
- Peyroussianum*, Nym. Consp. 44 = pinnatifidum.
- Piasezkii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvi. (1880) 421.—China.
- pilosissimum, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 369.—Turkestan.
- pimpinellifolium*, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 129 = Cumingianum.
- pinnatifidum, DC. Fl. Fr. iv. 667.—Europ.
- pinnatifidum*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 118 = S. Irio.
- pinnatum, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 125.—Chili.
- planisiliquum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 159 = Conringia planisiliqua.
- polyceratum, *Linn. Sp. Pl.* 658.—Europ. austr.; As. Min.
- polyspermum, *Fourn. Thèse Crucif.* 103.—Mexic.
- polystachyum, *Colla, Herb. Pedem.* i. 206 (sp. dub.).—Italia.
- polystachyum*, Hort. ex Tausch, in Flora, xix. (1836) 410 = Halimolobos patula.
- praecox, *Colla, Herb. Pedem.* i. 205 (sp. dub.).—Italia.
- Preauxianum, *Webb. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii.* (1840) 137.—Ins. Canar.
- primulaefolium*, Thoms. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 18 = Eutrema primulaefolium.
- procumbens, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* vii. (1885) 67.—Austral.
- propinquum*, Jord. Diagn. i. 148 = austriacum.
- Pseudo-Sophia*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 24 = S. Sophia.
- pulchellum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 501 = Erysimum rupestre.
- Pumilio, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 64.—Afr. trop.
- pumilum*, Lam. Fl. Fr. ii. 516 = Diplotaxis viminea.
- pumilum*, Spach, ex Fourn. Thèse Crucif. 96 = scholare.
- pumilum*, Steph. ex Willd. Sp. Pl. iii. 507.—Oriens; As. med.
- pusillum*, Vill. Fl. Delph. 69; Hist. Pl. Dauph. iii. 341 = Nasturtium palustre.
- pusillum*, Wedd. ex Fourn. Thèse Crucif. 131.—Chili.
- pygmaeum*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 91 = linifolium ?
- pygmaeum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 60 = Cheiranthus pygmaeus.

SISYMBRIUM:—

- pyrenaicum*, Linn. Syst. ed. X. 1132 = Nasturtium pyrenaicum.
- pyrenaicum*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 341 = austriacum.
- ramosum*, *Fourn. Thèse Crucif.* 140.—Persia.
- ramulosum*, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 67.—Aegypt.
- ramulosum*, Poir. Encyc. Suppl. v. 161 = S. Irio.
- Reboudianum*, Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1857); et in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 726 = S. Irio.
- Redowskii*, Weinm. ex Steud. Nom. ed. I. 785 = Erysimum Redowskii.
- reflexum*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 101. t. 29 = Arabis Holboellii.
- reflexum*, Nutt. in Fourn. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 183.—Am. bor. occ.
- Relangerii*, Fourn. Thèse Crucif. 141, sphalm. = Belangerii.
- Remyanum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i.* (1864) 290.—Ecuador.
- repandum*, Poir. Encyc. vii. 209 = Diplotaxis saxatilis.
- repandum*, Willd. Sp. Pl. iii. 497 = Brassica repanda.
- reticulatum*, Tratt. Arch. t. 350; ex Fritz. Ic. Ind. i. 1039 (sp. dub.).—Hab. ?
- rhodonense*, Degland, ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 95 = austriacum.
- Richardii, F. Muell. Census, 5.—Austral.
- Richardsoni*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 30 = canescens.
- rigidulum*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835) 272 = altissimum.
- rigidulum*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20 = erysimoides.
- rigidum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 439 = Malcomia torulosa.
- Robesetti, *Steud. Nom.* ed. II. ii. 594.—Arab.
- Roripa*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 25 = Nasturtium amphibium.
- rudemale*, Jord. Diagn. i. 138 = officinale.
- runawurens*, Royle, ex Fourn. Thèse Crucif. 122 (recte *runawurens* ?) = rupestre.
- runcinatum*, Lag. ex DC. Syst. ii. 478.—Reg. Mediterr. et Cauc.; Oriens.
- rupestre*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 33.—Reg. Himal.
- rupestre*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 290 = Eutrema Humboldtii.
- rupestricolum*, Jord. Diagn. i. 142 = austriacum.
- sagittatum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 390 = Alyssopsis deflexa.
- sagittatum*, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 139.—Chili.
- salsugineum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 159 = Conringia persica.
- salsugineum*, Pall. Reise, ii. 740.—Sibir.
- salsugineum*, Schlecht. ex DC. Syst. ii. 220 = toxophyllum.
- salsuginosum*, Willd. Sp. Pl. iii. 507 = salsugineum.
- salsum*, Georgi, Reise, i. 224; ex Ledeb. Fl. Ross. i. 185 = salsugineum.
- saxatile*, Lam. Fl. Fr. ii. 517 = Diplotaxis saxatilis.
- Schaffneri, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 19.—Mexic.
- Schimperi*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 76; Presl, Bot. Bemerk. 9 = S. Sophia.
- Schimperi*, J. Gay, ex Fourn. Thèse Crucif. 124 = pumilum.
- scholare*, Fourn. l. c. 96.—Hab. ?
- scorpiuroides*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 74 = Malcomia torulosa.
- Scorpiurus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 227.—Alger.
- septaecum*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 289.—Bolivia.
- septulatum*, DC. Syst. ii. 471 = altissimum.
- serratum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 109 = Lepidium rudemale.
- setosum*, Ledeb. ex Spreng. Syst. ii. 902 = Brassica Tournefortii.
- Sewerzowi, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xliii. (1870) i. 274.—Turkestan.
- Sieversianum*, Redowsk. ex DC. Syst. ii. 485 = Dontostemon dentatus.
- siliquosum*, Fourn. Thèse Crucif. 133.—As. bor.
- simplex*, Viv. Fl. Lib. Spec. 36. t. 16. f. 2 (Diplotaxis sp.).—Afr. bor.
- simplicissimum*, S. T. Gmel. Reise, iii. 303. t. 31. f. 1 = Thalianum.
- simplicissimum*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 382 = Arabis perfoliata.
- sinapifolium*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = Nasturtium indicum.
- Sinapios*, Retz. Obs. iii. 37 = altissimum.

SISYMBRIUM:—

- Sinapis*, Burm. f. Fl. Ind. 140, excl. syn. = Nasturtium indicum.
- Sinapistrum*, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 52 = altissimum.
- sinapoides*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 112 = austriacum.
- sinuatum*, Nutt. ex Fourn. Thèse Crucif. 146 (Nasturtium sp. ?)—Am. bor.
- solidagineum*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 64.—N. Granat.
- Sophia*, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 127 = Cumingianum.
- Sophia*, A. Gray, in Proc. Acad. Philad. (1863) 57, partim = incisum.
- Sophia*, Linn. Sp. Pl. 659.—Reg. temp.
- Sophia*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 440 = canescens.
- sophioides*, Fisch. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 61. t. 20 = S. Sophia.
- spathulaefolium*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 60.—Peruv.
- spathulatum*, Poir. Encyc. vii. 221 = Arabis spathulata.
- spectabile*, Hook. & Thoms. ex Fourn. Thèse Crucif. 121.—Reg. Himal.
- spurium*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 785, nomen.—(Quid ?).
- stenophyllum*, Gill. ex Hook. & Arn. in Bot. Misc. iii. (1833) 139.—Chili.
- stenophyllum*, Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1856) 475 = Lechleri.
- stigmatosum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 595.—Arab.
- stoloniferum*, J. & C. Presl, Fl. Čech. 137 = Nasturtium amphibium.
- streptocarpum*, Fourn. Thèse Crucif. 58.—Mexic.
- strictissimum*, Linn. Sp. Pl. 660.—Europ. med.
- strictissimum*, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 115 = junceum.
- strictum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 161.—Reg. Himal.
- strictum*, Phil. Fl. Atac. 7 = Cumingianum.
- strigosum*, Thunb. Herb. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 24, 32 = capense, Brassica leptopetala.
- strigosum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 109 = Brassica strigosa.
- subbipinnatifidum*, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 72 (= *Sinapis subbipinnatifida*).—Hispan.
- subhastatum*, Edgew. ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 157 = S. Irio.
- subhastatum*, Hornem. Enum. Pl. Hort. Hafn. (1807) 37; Willd. Enum. Hort. Berol. 679 = orientale.
- subspinescens*, Bunge, Arb. Nat. Ver. Riga, i. II. (1847) 151.—Reg. Casp.; Soongar.
- subulatum*, Fourn. Thèse Crucif. 72.—Abyss.
- succicum*, Nym. Consp. 44.—Europ. bor.
- suffruticosum*, Fourn. Thèse Crucif. 132.—Chili.
- supinum*, Asso, Mant. 173 = runcinatum.
- supinum*, Linn. Sp. Pl. 657.—Europ. med.
- sylvestre*, Burm. ex DC. Syst. ii. 472 = lyratum.
- sylvestre*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17 = Diplotaxis tenuifolia.
- sylvestre*, Linn. Sp. Pl. 657 = Nasturtium sylvestre.
- sylvestre*, Mohr, ex Bab. in Journ. Linn. Soc. xi. (1870) 293 = Nasturtium palustre.
- tanacetifolium*, Linn. Sp. Pl. 659.—Europ.
- tanacetifolium*, Walt. Fl. Carol. 174 = Nasturtium tanacetifolium.
- taraxacifolium*, DC. Fl. Fr. iv. 670 = austriacum.
- tenuifolium*, Geners. Elench. Scepus. n. 613; ex Wahlenb. Fl. Carp. 201 = altissimum.
- tenuifolium*, Linn. Cent. Pl. i. 18; Amoen. Acad. iv. 279 = Diplotaxis tenuifolia.
- tenuifolium*, Pall. ex Spreng. Syst. ii. 901 = junceum.
- tenuifolium*, Salisb. Prod. 270 = S. Sophia.
- tenuissimum*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 382 = S. Sophia.
- tenuissimum*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 9 = Cumingianum.
- teres*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 93 = Nasturtium tanacetifolium.
- terrestre*, Wahlenb. Fl. Lappon. 179 = Nasturtium amphibium.
- terrestre*, With. Arr. Brit. Pl. ed. III. iii. 582 = Nasturtium palustre.
- tetragonum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 350 = Conringia orientalis.
- tetromallum*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 135, sphalm. = heteromallum.

SISYMBRIUM:—

- Thalianum, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. vii.* (1826) 399.—Reg. temp.
 Thomsoni, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc. v.* (1861) 161.—Reg. Himal.
 tibeticum, *Fourn. Thèse Crucif.* 128.—Reg. Himal.
 Tilesii, *Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v.* (1815) 548 = *Arabis petraea*.
 Tilingii, *Fourn. Thèse Crucif.* 133.—Sibir.
 Tillieri, *Bell. ex Willd. Sp. Pl. iii.* 497 = *austriacum*.
 titicacense, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.* (1843) 249.—Peruv.
 tomentosum, *Stev. ex DC. Syst. ii.* 210 = *Arabis incarnata*.
 torulosum, *Desf. Fl. Atlant. ii.* 84. t. 159 = *Malcolmia torulosa*.
 Tournefortii, *Schleich. ex Fourn. Thèse Crucif.* 146 = *Brassica Erucastrum*.
 toxophyllum, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii.* 142.—As. bor.
 trinerve, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 595, sphalm. = *binerve*.
 tripinnatum, *DC. Syst. ii.* 475.—Afr. austr.
 tristectum, *F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i.* (1855) 114 = *Blennodia trisecta*.
 truncatum, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 197 = *S. Alliaria*.
 tuberosum, *Lag. ex DC. Syst. ii.* 254 = *Cardamine tuberosa*.
 Turczaninowii, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i.* 26.—Afr. austr.
 turritopsis, *C. Muell. in Walp. Ann. vii.* 135, sphalm. = *sagittatum*.
 uniflorum, *Fourn. Thèse Crucif.* 133.—Reg. Himal.
 valentinum, *Juss. ex DC. Syst. ii.* 636 = *Diplotaxis saxatilis*.
 valentinum, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 920 = *Brassica valentina*.
 vernum, *Fourn. Thèse Crucif.* 127.—Reg. Caucas.
 versicolor, *Fourn. l. c.* 141 = *Braya versicolor*.
 Villarsii, *Jord. Diagn. i.* 143 = *austriacum*.
 villosum, *Lag. ex Spreng. Syst. ii.* 902 = *runcinatum*.
 villosum, *Moench, Meth.* 251 = *orientale*.
 vimineum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii.* 112 = *Diplotaxis saxatilis*.
 vimineum, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 919 = *Diplotaxis viminea*.
 vineale, *Gater. Desc. Pl. Montaub.* 120 = *Diplotaxis viminea*.
 virgatum, *Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i.* 93.—Am. bor.
 Virletii, *Fourn. Thèse Crucif.* 62.—Mexic.
 Volckmanni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1870) 11. 669.—Chili.
 volgensis, *Bieb. ex Fourn. Thèse Crucif.* 97.—Rossia.
 vulgare, *Pers. Syn. ii.* 196 = *Nasturtium sylvestre*.
 Wallichii, *Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v.* (1861) 158.—Reg. Himal.
 Walteri, *Ell. Sketch. ii.* 146 = *Nasturtium tanacetifolium*.
 Waltheri, *Crantz, Stirp. Austr. ed. II.* 51 = *orientale*.
 Weddellii, *Fourn. Thèse Crucif.* 104.—Boliv.
 Zanonii, *Caruel, in Atti Soc. Sc. Nat. Milan. v.* (1863) 149 (= *Erucastrum Zanonii*).—Italia.
 Zanonii, *J. Gay, in Bull. Soc. Bot. Fr. vii.* (1860) 881 = *pinnatifidum*.
 Zeae, *Spreng. Syst. ii.* 904 = *erysimoides*.

SISYNDITE, *E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i.* 354 (1860). *ZYGOPHYLLEAE*, *Benth. & Hook. f. i.* 265.
spartea, *E. Mey. ex Sond. l. c.*—Afr. austr.

SISYRANTHUS, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 197 (1837). *ASCLEPIADEAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 779.
imberbis, *Harv. Thes. Cap. ii.* 11. t. 116.—Afr. austr.
virgatus, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 197.—Afr. austr.

SISYRINCHIUM, *Eckl. Top. Verz.* 16 (1827) = *Aristea*, *Soland. (Irid.)*.
inundatum, *Eckl. l. c.* = *A. melaleuca*.
melaleucum, *Eckl. l. c.* = *A. melaleuca*.
pusillum, *Eckl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi.* (1877) 111 = *A. pusilla*.
spirale, *Eckl. Top. Verz.* 16 = *A. spiralis*.

VOL. II.

SISYRINCHIUM, *Linn. Gen. ed. I.* 273 (1737).

- IRIDEAE*, *Benth. & Hook. f. iii.* 698.
BERMUDIANA, *Adans. Fam. ii.* 60 (1763).
ECHTHRONEMA, *Herb. in Lindl. Bot. Reg.* (1843) Misc 85.
ERIPHILEMA, *Herb. l. c.* (1843).
GLUMOSIA, *Herb. l. c.* (1843).
HYDASTYLUS, *Dryand. ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 310.
OLSYNIUM, *Rafin. New Fl. Am. i.* 72 (1836).
PANEGUIA, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 34 (1836).
POGADELPHA, *Rafin. l. c.* 29 (1836).
SOUZA, *Vell. Fl. Flum.* 273 (1825).
acaule, *Klatt, in Linnaea, xxxiv.* (1865–66) 736 = *Solenomelus acaulis*.
acre, *H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii.* (1867) 206.—Ins. Sandvic.
acuminatum, *Herb. in Lindl. Bot. Reg.* (1843) Misc. 84 = *angustifolium*.
adenocarpum, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 595.—Chili.
adenostemon, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857–58) 62 = *cuspidatum*.
adscendens, *Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil.* 281 = *graminifolium*.
affine, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x.* 11. (1843) 111.—Mexic.
alatum, *Hook. Ic. Pl. t.* 219.—Am. trop.
albidum, *Rafin. Atl. Journ.* 17 = *S. Bermudiana*.
altissimum, *Tenore, in Atti 3^a Riun. Sc. Ital.* (1841) 504 = *palmifolium*.
anceps, *Cav. Diss. vi.* 345. t. 190. f. 2 = *angustifolium*.
andinum, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857–58) 62 = *Chamelum andinum*.
angustifolium, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n.* 2.—Am. bor.; Hibern.
aphyllum, *Spreng. Syst. i.* 166 = *Bobartia aphylla*.
arenarium, *Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 3* = *cuspidatum*.
ascendens, *Poepp. l. c.* 4 = *graminifolium*.
asperulum, *Phil. in Linnaea, xxxiii.* (1864–65) 252 = *juncum*.
aurantiacum, *Griseb. in Goett. Abh. xxiv.* (1879) 327 = *monostachyum*.
aurantiacum, *Zuccagni, in Roem. Collect.* 145 = *Homeria collina*.
aureum, *Vell. Fl. Flum. ix.* t. 69.—Bras.
avenaceum, *Klatt, in Linnaea, xxxi.* (1861–62) 373.—Bras.
azureum, *Phil. Fl. Atac.* 50.—Chili.
Bakeri, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii.* (1882) 378 = *trinerve*.
bellum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xii.* (1877) 277 = *angustifolium*.
Bermudiana, *Linn. Sp. Pl.* 954, partim.—Ins. Bermud.
Bermudiana, *Linn. l. c.*, partim = *angustifolium*.
Berteroanum, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857–58) 58 = *leucanthum*, *Colla*.
Berteroi, *Steud. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi.* (1877) 117 = *chilense*.
Berteroi, *Steud. ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii.* 1. 537 = *iridifolium*.
biflorum, *Griseb. in Goett. Abh. xxiv.* (1879) 328.—Reg. Argent.
bogotense, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i.* 323.—N. Granat.
brevifolium, *Klotzsch, ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii.* 1. 538 = *incurvatum*.
bulbosum, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n.* 3 = *Eleutherine plicata*.
californicum, [*Dryand. in*] *Hort. Kew. ed. II. iv.* 135.—Am. bor. occ.
capitatum, *Pers. Syn. i.* 49 = *Eleutherine plicata*.
Cervantesii, *E. Mey. ex Presl, Rel. Haenk. i.* 117.—Mexic.
chilense, *Hook. Bot. Mag. t.* 2786.—Am. trop.
Clarazii, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi.* (1884) 235 = *monostachyum*.
coerulescens, *F. Muell. Fragm. vii.* 91 = *Libertia caerulea*.
coeruleum, *Vell. Fl. Flum. ix.* t. 66.—Bras.
colchaguense, *Phil. in Linnaea, xxxiii.* (1864–65) 253 = *juncum*.
collinum, *Cav. Diss. vi.* 346 = *Homeria collina*.
Comes, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 595.—Bras.
commutatum, *Klatt, in Hamb. Gartenz. xvi.* (1860) 164.—Bras.
congestum, *Klatt, in Linnaea, xxxi.* (1861–62) 98 = *palmifolium*?

SISYRINCHIUM:—

- convolutum*, *Klatt, in Linnaea, xxxiv.* (1865–66) 735 = *californicum*.
convolutum, *Nocca, Ticin. Hort. Pl. Select. i. t.* 1.—Am. trop.
crenatum, *Vell. Fl. Flum. ix.* t. 67 = *Trimezia lurida*.
cultrifolium, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 27 (Quid?).—Java.
Cunningii, *Penny, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii.* 673, nomen.—Chili.
cuspidatum, *Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 3*.—Chili.
cyaneum, *Lindl. Bot. Reg. t.* 1090 = *Orthrosanthus multiflorus*.
dasyacarpum, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857–58) 61 = *graminifolium*.
depauperatum, *Phil. l. c.* = *leucanthum*, *Colla*.
dichroum, *Poepp. ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii.* 1. 537 = *iridifolium*.
Douglasii, *A. Dietr. Sp. Pl. ii.* 504 = *grandiflorum*.
elatum, *Seub. ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii.* 1. 544 = *palmifolium*.
elegans, [*DC. in*] *Red. Lil. t.* 171 = *Homeria collina*.
elegans, *Willd. Sp. Pl. iii.* 577 = *Homeria elegans*.
excisum, *Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i.* (1853) 447 = *S. Bermudiana*.
fasciculatum, *Klatt, in Linnaea, xxxi.* (1861–62) 97.—Uruguay; Paraguay.
fernandezianum, *Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 595.—Ins. J. Fernand.
filifolium, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v.* (1825) 101.—Ins. Falkland.
filiforme, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 421 = *filifolium*.
filiforme, *Rafin. Atl. Journ.* 178 (Quid?).—Am. bor.
filiforme, *Spreng. Syst. i.* 166 = *Bobartia filiformis*.
filiforme, *Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 595 = *juncum*.
fimbriatum, *Domb. ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii.* 1. 537 = *iridifolium*.
flavidum, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii.* (1863) 50. t. 3 = *californicum*.
flavum, *Hoffmegg. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 595 = *convolutum*.
flavum, *Miers, ex Steud. l. c.* = *Solenomelus chilensis*.
flexuosum, *Lindl. in Bot. Reg. sub t.* 1067 = *cuspidatum*.
flexuosum, *Phil. in Linnaea, xxxiii.* (1864–65) 251.—Chili.
flexuosum, *Spreng. Syst. i.* 167 = *Hexaglottis longifolia*.
floribundum, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857–58) 59 = *juncum*.
fluminense, *Vell. Fl. Flum. ix.* t. 68 = *Trimezia lurida*.
formosum, *F. Muell. Fragm. vii.* 91 = *Libertia formosa*.
frigidum, *Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 1* = *Chamelum andinum*.
galaxioides, *Gomes, in Mem. Acad. Lisboa, iii.* (1812) Mem. dos Corresp. 99 = *Trimezia lurida*.
Gaudichaudii, *A. Dietr. Sp. Pl. ii.* 505 = *filifolium*.
geniculatum, *Herb. in Lindl. Bot. Reg.* (1843) Misc. 84 = *angustifolium*.
giganteum, *Tenore, Cat. Ort. Nap.* (1845) 96 = *palmifolium*.
gladiatum, *Spreng. Syst. i.* 166 = *Bobartia gladiata*.
glaucophyllum, *Penny, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii.* 601, nomen.—Am. bor.
Glaziovii, *Baker, in Journ. Bot. xiv.* (1876) 268.—Bras.
gracile, *Klotzsch, ex Baker, l. c.*—Bras.
gracile, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857–58) 60 = *juncum*.
gramineum, *Lam. Encyc. i.* 408; *Curt. Bot. Mag. t.* 464 = *angustifolium*.
graminifolium, *Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 596 = *chilense*.
graminifolium, *Lindl. in Bot. Reg. t.* 1067.—Chili.
grandiflorum, *Cav. Diss. vi.* 345 = *Tigridia lutea*.
grandiflorum, *Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. t.* 1364.—Am. bor. occ.
grandiflorum, *Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 4* = *Calydorea speciosa*.
guttatum, *Moris, Enum. Hort. Taur.* (1833) 30.—Chili.
Hartwegii, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi.* (1877) 119, nomen = *tenuifolium*.
hirtellum, *Penny, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii.* 673, nomen.—Am. bor.

SISYRINCHIUM:—

- homomallum*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 378 = *angustifolium*?
- Huisma*, Domb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 120 = *sessiliflorum*.
- Illmu*, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 110 = *Conanthera bifolia*.
- incurvatum*, Gardn. in Hook. Ic. Pl. t. 513.—Bras.
- iridifolium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 324.—Am. trop.
- iridioides*, Curt. Bot. Mag. t. 94 = *S. Bermudiana*.
- ixioides*, Forst. f. Prod. 61 = *Libertia ixioides*.
- Jamesoni*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 269.—Ecuador.
- juncum*, E. Mey. in Presl, Rel. Haenk. i. 118.—Reg. Andin.
- juncifolium*, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 85 = *juncum*?
- junciforme*, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 2 = *juncum*.
- laterale*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 269.—Bolivia.
- latifolium*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 17 = *Eleutherine plicata*.
- laxum*, Otto, ex Sims, Bot. Mag. t. 2312 = *iridifolium*.
- Lechleri*, Steud. ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 535 = *chilense*.
- leucanthum*, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxix. (1836) 18.—Chili; Reg. Argent.
- leucanthum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 596.—Chili.
- libertioides*, Steud. & Hochst. ex Steud. l. c.—Chili.
- lineatum*, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 143 = *californicum*.
- longistylum*, Lem. in Fl. des Serres, iii. (1847) t. 255 = *Solenomelus chilensis*.
- lutescens*, Lodd. Bot. Cab. t. 1870 = *striatum*.
- luteum*, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 596 = *tinctorium*.
- luteum*, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 177 = *convolutum*.
- Luzula*, Klotzsch, ex Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 89, 376.—Bras.
- macranthum*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 326.—Reg. Argent.
- macrocarpum*, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 71.—Reg. Argent.
- macrocephalum*, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan. 1833) 176 = *palmifolium*.
- maculatum*, Hook. Bot. Mag. t. 3197 = *graminifolium*.
- majale*, Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Hort. Berol. 24. t. 10 = *graminifolium*.
- majus*, Redhead, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 209 = *Iris Sisyrinchium*.
- Mandoni*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 269.—Bolivia.
- Marchio*, Steud. Nom. ed. II. ii. 596 = *alatum*.
- marginatum*, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 83 = *palmifolium*.
- micranthemum*, Pers. Syn. i. 50 = *seq.*
- micranthum*, Cav. Diss. vi. 345. t. 191. f. 2.—Peruv.
- minus*, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 263 = *angustifolium*.
- minutiflorum*, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 71.—Reg. Argent.
- monostachyum*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 268.—Reg. Argent.
- Moritzianum*, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 378 = *Orthrosanthus chimboracensis*.
- mucronatum*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 33 = *angustifolium*.
- multicaule*, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 704 = *chilense*.
- multiflorum*, Lem. Illustr. Hort. vi. (1859) t. 221.—Am. bor.
- multiflorum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 596 = *Orthrosanthus multiflorus*.
- narcissoides*, Cav. Diss. vi. 347. t. 191. f. 3 = *Symphystemon narcissoides*.
- nervosum*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 251.—Chili.
- nigricans*, C. Gay, Fl. Chil. vi. 20 = *striatum*.
- Nunna*, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 596.—Chili.
- Nuno*, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxix. (1836) 17. t. 51.—Chili.
- Nuttallii*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 395 = *S. Bermudiana*.

SISYRINCHIUM:—

- Occissapungum*, Ruiz, ex Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 379 = *Orthrosanthus chimboracensis*.
- odoratissimum*, Lindl. Bot. Reg. t. 1283 = *Symphystemon odoratissimus*.
- pachyrhizum*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 269.—Bras.
- palmifolium*, Cav. Diss. vi. 348 = *Eleutherine plicata*.
- palmifolium*, Linn. Mant. i. 122, excl. syn.—Am. austr.
- paniculatum*, R. Br. Prod. 305 = *Libertia paniculata*.
- patagonicum*, Phil. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 117, nomen.—Patagon.
- Pearcei*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 251.—Chili.
- pedunculatum*, Gill. ex Hook. Bot. Mag. t. 2965 = *Solenomelus chilensis*.
- Philippi*, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 89 = *juncum*.
- piliferum*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 379.—Paraguay.
- plicatum*, Spreng. Syst. i. 167 = *Eleutherine plicata*.
- polystachyum*, F. Muell. Census, 114 = *Orthrosanthus polystachyus*.
- Proregia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 596.—Bras.
- pubescens*, Cham. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 596 = *iridifolium*.
- pulchellum*, R. Br. Prod. 305 = *Libertia pulchella*.
- pumilum*, Hook. f. Fl. Antarct. t. 129 = *Tapeinia magellanica*.
- pusillum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 323.—Ecuador.
- pygmaeum*, Klotzsch, ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 282 = *tenuifolium*.
- quinquevulnerum*, Domb. ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 536 = *chilense*.
- racemosum*, Pers. Syn. i. 49 = *palmifolium*.
- ramosum*, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 84 = *angustifolium*, *chilense*.
- restioides*, Spreng. Syst. i. 166.—Am. trop.
- reticulatum*, Auct. ex Pers. Syn. i. 50 = *striatum*.
- rigidum*, Lehm. in Hamb. Gartenz. vi. (1850) 415 = *tinctorium*.
- roseum*, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 85; Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 60 = *juncum*.
- scabriusculum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 596.—Chili.
- scabrum*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 58 = *juncum*.
- scabrum*, Schlecht. & Cham. l. c. vi. (1831) 57 = *chilense*.
- Schaffneri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 160.—Mexic.
- scirpeum*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 59 = *juncum*.
- scirpiforme*, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 2 = *juncum*.
- secundiflorum*, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 91.—Bras.
- Segethi*, Phil. l. c. xxix. (1857–58) 61 = *Solenomelus Lechleri*.
- Sellowianum*, Klatt, l. c. xxxi. (1861–62) 375.—Uruguay.
- Sellowii*, Klotzsch, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 119 = *pachyrhizum*.
- sertiflorum*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 309 = *striatum*.
- sessiliflorum*, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 47 = *Libertia caerulea*.
- sessiliflorum*, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 2.—Chili.
- setaceum*, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 85.—Reg. Argent.
- spathaceum*, Pers. Syn. i. 50 = *Bobartia indica*.
- speciosum*, Hook. Bot. Mag. t. 3544 = *Calydorea speciosa*.
- spicatum*, Cav. Ic. ii. 2 = *striatum*.
- spicatum*, Seub. ex Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861–62) 377 = *Orthrosanthus spicatus*.
- striatum*, Sm. Ic. Pict. t. 9.—Chili; Reg. Argent.
- sulcatum*, Gill. ex Hook. Ic. Pl. t. 218 = *vaginatum*.
- tenuifolium*, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 691.—Mexic.
- teres*, Rafin. Atl. Journ. 148 (Quid?).—Am. bor.
- tinctorium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 324.—Reg. Andin.; Mexic.
- tingens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 596 = *tinctorium*.
- tolucense*, Peyr. in Linnaea, xxx. (1859–60) 18.—Mexic.
- triflorum*, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 61.—Hab.?
- trinerve*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 267.—Bolivia.
- triquetrum*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 596 = *convolutum*.

SISYRINCHIUM:—

- unguiculatum*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 326.—Reg. Argent.
- uniflorum*, C. Gay, ex Phil. in Linnaea, xxxix. (1857–58) 63 = *chilense*.
- unispathaceum*, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 737.—Bolivia.
- vaginatum*, Spreng. Syst. i. 166.—Am. trop.
- Weirii*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 268.—Bras.
- xiphioides*, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 4 = *Calydorea speciosa*.

SISYRRINCHIUM, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 46 (1830), sphalm. = *praeac*.

SITANION, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 103 = **Elymus**, Linn. (Gramin.).
elymoides, Rafin. l. c. = *E. Sitanion*.

SITILIAS, Rafin. New Fl. Am. iv. 85 (1836) = **Pyrropappus**, DC. (Compos.).
caroliniana, Rafin. l. c. = *P. carolinianus*.

SITOCODIUM, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 27 (1866) = **Camassia**, Lindl. (Liliac.).
esculentum, Salisb. l. c. = *C. esculenta*.

SITODIUM, Banks, ex Gaertn. Fruct. i. 344. tt. 71, 72 (1788) = **Artocarpus**, Forst. (Urtic.).
cauliflorum, Gaertn. l. c. 345. tt. 71, 72 = *A. integrifolia*.

SITOSPELOS, Adans. Fam. ii. 36 (1763) = **Elymus**, Linn. (Gramin.).

SIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. iii. 893.

Berula, Hoffm. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 44 (1822).

MAUCHARTIA, Neck. Eiem. i. 172 (1790).

Amomum, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. i. 336 = *Sison Amomum*.

angustifolium, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1672 = *erectum*.

angustifolium, Thunb. Prod. Pl. Cap. 50 = *Thunbergii*.

annuum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 128 = *Seseli annuum*.

Apium, Roth, l. c. = *Apium graveolens*.

aquaticum, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 259 = *latifolium*.

aromaticum, Lam. Fl. Fr. iii. 458 = *Sison Amomum*.

asperum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51 = *Seseli asperum*.

Berula, J. F. Gmel. Syst. 482 = *latifolium*.

Berula, Gouan, Fl. Monsp. 218 = *erectum*.

brevifolium, Hort. ex DC. Prod. iv. 124 = *S. Sisarum*.

Bulbocastanum, Spreng. in Schult. Syst. vi. 538 = *Carum Bulbocastanum*.

bulbosum, Poir. Encyc. Suppl. i. 622 = *Erigenia bulbosa*.

bulbosum, Thore, in Desv. Journ. Bot. i. (1808) 193 = *Carum inundatum*.

Burchellii, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. ii. 68.—Ins. S. Helena.

californicum, Baill. Hist. Pl. vii. 181, 182.—Calif.

canadense, Lam. Encyc. i. 407 = *Cryptotaenia canadensis*.

Carsonii, Durand, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 196.—Am. bor. occ.

Carum, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 24 = *Carum Carvi*.

Carvi, Bernh. Syst. Verz. Erf. 173 = *Carum Carvi*.

Cicuta, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 24 = *Cicuta virosa*.

cicutae folium, Schrank, Baier. Fl. i. 558.—Reg. bor. temp.

cicutarium, W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 639, nomen = *cicutae folium*.

Cordiennii, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 404 = *Silaus carvifolius*.

crassipes, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 120 = *Apium crassipes*.

crinitum, Poir. Encyc. Suppl. i. 622 = *Schultzia crinita*.

crispum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = *Ceratopteris thalictroides* (Crypt.).

cuneifolium, Boiss. Fl. Orient. ii. 1150, sphalm. = *lanceifolium*.

Cymnosma, Basin. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. ii. (1844) 204.—Reg. Casp.

decumbens, Thunb. Fl. Jap. 118.—Japon.

SIUM:—

- denticulatum*, Baldw. ex Ell. Sketch, i. 354 = *Peucedanum ternatum*.
Douglasii, DC. Prod. iv. 125 = *Conium maculatum* ?
erectum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 103. —Europ.; Caucas.
Falcaria, Linn. Sp. Pl. 252 = *Falcaria vulgaris*.
falcatum, Dubois, Méthod. ed. I. 442; ed. II. 407 =
Falcaria vulgaris.
Ferula, Raesch. Nom. ed. III. 81 = *erectum*.
ferulaefolium, Spreng. Sp. Umbellif. 95 = *Carum*
ferulaefolium.
filifolium, Steud. Nom. ed. II. ii. 596 = *Peucedanum*
teretifolium.
filifolium, Thunb. Prod. Pl. Cap. 50 = *Oenanthe fili-*
formis.
gallabatense, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 273 =
Thunbergii.
gracum, Guss. ex Spreng. Syst. i. 914 = *Ferula*
nudicaulis.
gracum, Linn. Sp. Pl. 252 = *Bonannia resinifera*.
gracum, Lour. Fl. Cochinch. 179 = *decumbens*.
grandiflorum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 50 (= *Levi-*
sticum grandiflorum). —Afr. austr.
graveolens, Vest. Man. Bot. 517 = *Apium graveolens*.
helenianum, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1032. —Ins.
S. Helena.
Hippomarathrum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 128 = *Seseli*
Hippomarathrum.
hispidum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51 = *Carum hispidum*.
incisum, Pers. Syn. i. 316 = *erectum*.
intermedium, DC. Fl. Fr. iv. 302 = *Carum inundatum*.
intermedium, Tenore, Fl. Nap. iii. 310 = *Apium*
nodiflorum.
inundatum, Lam. Fl. Fr. iii. 460 = *Apium inundatum*.
japonicum, Thunb. Fl. Jap. 118. —Japan.
javanicum, Blume, Bijdr. 881 = *Falcaria javanica*.
laciniatum, Blume, l. c. = *Falcaria laciniata*.
lancifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 230. —Reg.
Caucas.
lancifolium, Schrank, Baier. Fl. i. 556 = *latifolium*.
latifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 225 = *lancifolium*.
latifolium, Biegel. Fl. Bost. 69 = *Apium lineare*.
latifolium, Linn. Sp. Pl. 251. —Europ.; Am. bor.
latijugum, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii.
 683. —Reg. Himal.
latissimum, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 274, in obs.
 = *latifolium*.
limosum, Moris, ex DC. Prod. iv. 104 = *Apium*
crassipes.
lineare, Michx. Fl. Bor. Am. i. 167 = *Apium lineare*.
lobatum, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 22 = *Heracleum*
nepalense.
longifolium, J. & C. Presl, Fl. Čech. 65 = *latifolium*.
longifolium, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 194 = *Peuce-*
danum ternatum.
luteum, Spreng. Sp. Umbellif. 92 = *Muretia tanaicensis*.
marginatum, Poir. Encyc. Suppl. i. 622 = *Peucedanum*
ternatum.
medium, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix.
 Suppl. 19. —Sibir. alt.; Soongar.
napiforme, Schult. Syst. vi. 539 = *Carum ferulaefolium*.
Ninsi, Linn. Sp. Pl. 25 (Quid ?). —China.
Ninsi, Thunb. Fl. Jap. 118 = *Aralia quinquefolia*.
nipponicum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii.
 (1873) 286. —Japan.
nodiflorum, Linn. Sp. Pl. 251 = *Apium nodiflorum*.
nodiflorum, Oed. Fl. Dan. t. 247 = *erectum*.
nudicaule, Lam. Encyc. i. 407 = *Peucedanum redivivum*.
oppositifolium, Kit. ex Schult. Oester. Fl. ed. II.
 i. 495. —Hungar.
paniculatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51 = *Rhyticarpus*
rugosus.
patulum, Thunb. l. c. = *Selinum snfruticosum*.
peucedanoides, Spreng. Sp. Umbellif. 92 = *Muretia*
tanaicensis.
Podagraria, [Weber, ex] Wigg. Prim. Fl. Holsat.
 24 = *Aegopodium Podagraria*.
podolicum, Bess. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 479
 = *lancifolium*.
podolicum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 473
 = *S. Sisarum*.
pusillum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 611 =
erectum.
pusillum, Poir. Encyc. Suppl. i. 622 = *Apium divari-*
catum.
radiatum, Viv. Fl. Lib. Spec. 16. t. 9. f. 2 = *Apium*
nodiflorum.
repens, Jacq. Fl. Austr. iii. 34 = *Apium nodiflorum*.

SIUM:—

- repens*, Linn. f. Suppl. 181 = *Apium repens*.
rigidius, Linn. Sp. Pl. 251; Walt. Fl. Carol. 114 =
Peucedanum ternatum.
rigidum, Hill, Veg. Syst. vi. 34 = *præc.* ?
rugosum, Rafin. Med. Fl. ii. 264; Atl. Journ. 151 =
Apium lineare.
saxifragum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 128 = *Carum*
Bunius.
segetum, Lam. Fl. Fr. iii. 458 = *Carum segetum*.
siculum, Linn. Sp. Pl. 252 = *Kundmannia sicula*.
Silaus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 129 = *Silaus flavescens*.
simense, J. Gay, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 324 =
Pimpinella simensis.
sisaroidium, DC. Prod. iv. 124 = *lancifolium*.
Sisarum, Linn. Sp. Pl. 251. —As. or.
stoloniferum, Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 77 = *Apium*
nodiflorum.
suave, Walt. Fl. Carol. 115 = *Apium lineare*.
sulcatum, Pers. Syn. i. 316 = *latifolium*.
tenuifolium, Muhl. Cat. 30 = *Apium lineare*.
teretifolium, Ell. Sketch, i. 354 = *Peucedanum tereti-*
folium.
Thunbergii, DC. Prod. iv. 125. —Afr. austr.
tortuosum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 128 = *Seseli*
annuum.
tricuspidatum, Ell. Sketch, i. 354 = *Peucedanum*
ternatum.
trifoliatum, Poir. Encyc. Suppl. i. 622 = *Thaspium*
aureum.
triterenatum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 57 =
Ligusticum acutilobum.
triterenatum, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 22 = *Pimpinella*
Heyneana.
verrucosum, J. Gay, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i.
 324 = *Pimpinella simensis*.
verticillatum, Lam. Fl. Fr. iii. 460 = *Carum verti-*
cillatum.
verticillatum, Pett. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 474
 = *Carum ammoides*.
villosum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51 = *Annesorhiza*
villosa.
virens, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 597 = *Selinum*
sylvestre.
virescens, Spreng. Sp. Umbellif. 94 = *Silaus carvi-*
folius.
Visnaga, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 106 = *Ammi*
Visnaga.
vulgare, Bernh. Syst. Verz. Erf. 173 = *Aegopodium*
Podagraria.
vulgare, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 259 =
latifolium.

SIUMIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 31 (1836) = *Apium*,
 Tourn. (Umbell.).
heterophylla, Rafin. l. c. = *A. lineare*.

SIXALIX, Rafin. Fl. Tellur. iv. 95 (1836) = *Scabiosa*,
 Tourn. (Dipsac.).
daucoides, Rafin. l. c. 96 = *Sc. daucoides*.

SIZYGIUM, Duch. in Orb. Dict. viii. 554 (1849), sphalm.
 = SYZYGIUM, Gaertn. = *Eugenia*, Michx. (Myrtic.).

SKAPHIUM, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 357 (1860)
 = *Xanthophyllum*, Roxb. (Polygal.).
lanceatum, Miq. l. c. —Sumatra.

SKIDANTHERA, Rafin. Sylva Tellur. 60 (1838) =
Elaeocarpus, Burm. (Tiliac.).
dentata, Rafin. l. c. = *E. dentatus*.

SKILLA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 13 (1836) = *Seilla*, Linn.
 (Liliac.).

SKIMMI, Adans. Fam. ii. 364 (1763) = seq.

SKIMMIA, Thunb. Nov. Gen. 57 (1783). *RUTA-*
CEAE, Benth. & Hook. f. i. 302.
ANQUETILLA, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 161.
 t. 161 (1848 ?).
LAUREOLA, M. Roem. Syn. Hesper. 74 (1846).
SKIMMI, Adans. Fam. ii. 364 (1763).
Foremanni, Hort. ex H. Knight, in Flor. & Pomol.
 (1881) 70 = *japonica*.
fragrans, Carr. in Rev. Hort. (1869) 258 =
japonica ?

SKIMMIA:—

- fragrantissima*, Hort. ex T. Moore, in Proc. Linn.
 Soc. (1866-67) 7 = *japonica*.
intermedia, Carr. in Rev. Hort. (1870) 200 =
japonica.
japonica, Lindl. in Gard. Chron. (1852) 183; et
 Fortune, l. c. 739 (non seq.). —China.
japonica, Thunb. Nov. Gen. 58. —Japan.
Laureola, Sieb. & Zucc. ex Walp. Rep. v. 405. —
 Reg. Himal.
oblata, T. Moore, in Gard. Chron. (1864) 962 =
japonica.
rubella, Carr. in Rev. Hort. (1874) 311. —China.
Veitchii, Carr. l. c. (1869) 259. —Japan.

SKINNERA, Forst. Char. Gen. 57. t. 29 (1776) =
Fuchsia, Plum. (Onagrar.).
antarctica, Forst. ex A. DC. in DC. Prod. xvii. 295
 (= *Blackwellia antarctica*, Gaertn.). —Hab. ?
coccinea, Moench, Meth. Suppl. 270 = *F. coccinea*.
excorticata, Forst. Char. Gen. 58 = *F. excorticata*.
 SKINNERIA, Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève. vi.
 (1833) 487 (Conv. Or. 105. t. 6) = *Ipomoea*, Linn.
 (Convolv.).
caespitosa, Choisy, ll. cc. = *I. linifolia*.

SKIOPHILA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853-55)
 207 = *Episcia*, Mart. (Gesner.).
melittifolia, Hanst. l. c. = *E. melittifolia*.
pulchella, Hanst. l. c. = *Tussaca pulchella*.

SKIRRHOPHORUS, DC. ex Lindl. Introd. Nat. Syst.
 ed. II. 260 (1836) = *Angianthus*, Wendl. (Compos.).
Cunninghami, DC. Prod. vi. 150 = *A. Cunning-*
hamii.
demissus, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851)
 149 = *A. demissus*.
Drummondii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv.
 (1851) i. 188 = *A. Drummondii*.
eriocarpus, F. Muell. Fragm. iii. 156 = *Gnephosis*
eriocarpa ?
eriocephalus, Hook. f. ex A. Gray, in Hook. Kew
 Journ. iii. (1851) 148 = *A. eriocephalus*.
mucronulatus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv.
 (1851) ii. 72 = *A. pygmaeus*.
Muellerianus, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 483 =
A. strictus.
phyllocephalus, F. Muell. Fragm. iii. 159 = *A. phyllo-*
cephalus.
Preissianus, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 439 =
A. Preissianus.
pygmaeus, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851)
 148 = *A. pygmaeus*.
strictus, A. Gray, l. c. 149 = *A. strictus*.

SKIRROPHORUS, C. Muell. in Walp. Ann. v. 263
 (1859), sphalm. = *præc.*

SKIZIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 32 (1836) = *Wurmbea*,
 Thunb. (Liliac.).
pumila, Rafin. l. c. = *W. capensis*.

SKOFITZIA, Hassk. & Kanitz, in Oestr. Bot. Zeitschr.
 xxii. (1872) 147 = *Tradescantia*, Linn. (Commel.).
boliviana, Hassk. & Kanitz, l. c. = *T. ambigua*.

SKOINOLON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 27 (1836) =
Schoenocaulon, A. Gray (Liliac.).

SKOLEMORA, Arruda, in Koster, Trav. Braz. 498
 (1816). (Quid ?).
pernambucensis, Arruda, l. c. —Bras.

SKYTALANTHUS, Endl. Gen. Suppl. iii. 75 (1843)
 = seq.

SKYTANTHUS, Meyen, Reise, i. 376 (1834).
APOCYNACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 704.
HABSBURGIA, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 36 (1843).
NERIANDRA, A. DC. in DC. Prod. viii. 422 (1844).
SCYTALANTHUS, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix.
 Suppl. i. (1843) 361.
acutus, Meyen, Reise, i. 376. —Chili.
hancorniaefolius, Miers, Apocyn. S. Am. 109. —
 Bras.
havanensis, Miers, l. c. 110 = *Cameraria havanensis*
 (in Addend.).
Martianus, Miers, l. c. —Bras.

SLACKIA, Griff. Itin. Notes, 187 (1848) = *Decaisnea*, Hook. f. & Thoms. (Berber.).
insignis, Griff. l. c. = *D. insignis*.

SLACKIA, Griff. Notul. iv. 158 (1854). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1017.
Griffithii, C. B. Clarke, in *DC. Monog. Phan.* v. 188. —Burma.

SLACKIA, Griff. Notul. iii. 162 (1854) = *Iguanura*, Blume (Palmae).
geonomiformis, Griff. l. c. = *I. geonomaeformis*.

SLADENIA, Kurz, in *Journ. Bot.* xi. (1873) 194. *TERNSTROEMIACEAE*.
celastrifolia, Kurz, l. c. —China.

SLATERIA, Desv. *Journ. Bot.* i (1808) 243 = *Ophiopogon*, Ker-Gawl. (Haemod.).
coerulea, Siebold, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 143 = *O. japonicus*.
Jaburan, Siebold, in *Verh. Bat. Gen.* xii. (1830) 15 = *O. Jaburan*.
japonica, Desv. *Journ. Bot.* i. (1808) 244 = *O. japonicus*.
repens, Siebold, in *Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 15 = *Liriope spicata*.

SLEVOGTIA, Reichb. *Consp.* 133 (1828) = *Enicostema*, Blume (Gentian.).
maritima, Dalz. in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 137 = *E. littorale*.
occidentalis, Griseb. in *DC. Prod.* ix. 66 = *E. littorale*.
orientalis, Griseb. l. c. = *E. littorale*.
verticillata, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 532 = *E. littorale*.

SLOANA, Linn. *Gen. ed.* I. 153 (1737) = seq.

SLOANEA, Linn. *Hort. Cliff.* 210 (1737). *TYLIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. i. 238.
ABLANIA, Aubl. *Pl. Gui.* 585. t. 234 (1775).
ADENOBASIMUM, Presl, *Symb. Bot.* i. 39. t. 27 (1830).
BLONDEA, Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 100.
DASYCARPUS, Oerst. in *Kjoch. Vidensk. Meddel.* (1857) 27.
DASYNEMA, Schott, in *Spreng. Syst.* iv. App. 408 (1827).
FORGETINA, Bocquill. ex Baill. *Adansonia*, vii. (1866) 49.
FOVEOLARIA, Meissn. *Gen. Comm.* 28 (1836).
OXYANDRA, Reichb. *Handb.* 303 (1837).
TRICHOCARPUS, Schreb. *Gen.* 366 (1789).
alnifolia, Mart. in *Flora*, xx. (1837) ii. *Beibl.* 94. —Bras.
amygdalina, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1860) 165. —Cuba.
Aubletii, Sw. *Fl. Ind. Occ.* ii. 940 = *sinemariensis*.
australis, F. Muell. *Fragm.* iv. 91 = *Echinocarpus australis*.
Berteriana, Choisy, ex *DC. Prod.* i. 516. —Ins. S. Doming.
brevipes, Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 68. —Bras.
castanocarpa, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xvii. (1862) 345 = *multiflora*.
corymbiflora, *DC. Prod.* i. 516. —Afr. trop.
cuneifolia, Mart. in *Flora*, xx. (1837) ii. *Beibl.* 94. —Bras.
curatellifolia, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1860) 164. —Cuba.
dentata, Linn. *Sp. Pl.* 512. —Bras.; Guian.
durissima, Spruce, ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 65. —Bras.
egensis, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xii. (1881) 329 = *pubescens*, Benth.
emarginata, Linn. *Sp. Pl.* 512 = *Achras Sapota*?
Fendleriana, Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 70. —Venezuela.
floribunda, Spruce, ex Benth. l. c. 66. —Bras.
grandiflora, Sm. in *Rees, Cycl.* xxxiii. n. 2 = *dentata*.
guianensis, Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 69 = *cuneifolia*.
hirsuta, Planch. ex Benth. l. c. 70 = *monosperma*.
jamaicensis, Hook. *l. c.* Pl. tt. 693-96. —Jamaic.
Langii, A. Muell. *Fragm.* v. 28. —Austral.

SLOANEA:—

laurifolia, Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 70. —Bras.
laxiflora, Spruce, ex Benth. l. c. 65. —Venezuela.
longiseta, Wright, ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 30. —Cuba.
Macbrydei, F. Muell. *Fragm.* vi. 170. —Austral.
macrophylla, Spruce, ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 67. —Bras.
Massoni, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 82. —Ind. occ.
microcarpa, Planch. ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 69 = *cuneifolia*.
monosperma, Benth. l. c. 70 = *ochrocarpa*.
monosperma, Vell. *Fl. Flum.* 225; v. t. 100. —Bras.
multiflora, Karst. *Fl. Columb.* ii. 31. t. 116. —N. Granat.
nitida, G. Don, *Gen. Syst.* i. 555. —Guian.
obtusa, Planch. ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 68. —Bras.
ochrocarpa, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xii. (1882) 329. —Bras.
oppositifolia, Spruce, ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 70. —Bras.
paniculata, Spruce, ex Benth. l. c. 66. —Bras.
paradisearum, F. Muell. *Papuan Pl.* i. 84. —N. Guin.
parviflora, Planch. ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 68. —Guian.
Plumerii, Aubl. *Pl. Gui.* i. 535 = *dentata*.
Plumieri, G. Don, *Gen. Syst.* i. 555 = *praec.*
pubescens, Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 69. —Bras.
pubescens, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xii. (1882) 329. —Bras.
pubiflora, Planch. & Linden, ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 67. —N. Granat.
pulverulenta, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xii. (1882) 329 = *monosperma*.
Purdiaei, Griseb. ex Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 653, in obs. —Ind. occ.
quadrivalvis, Seem. *Bot. Voy. Herald*, 85. t. 15. —Am. centr.; Bras.
riparia, Planch. ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 69. —Bras.
rufa, Planch. ex Benth. l. c. 68. —Guian.
Schomburgkii, Spruce, ex Benth. l. c. 66. —Guian.
sinemariensis, Aubl. *Pl. Gui.* i. 534. t. 212. —Guian.; Ind. occ.
stipitata, Spruce, ex Benth. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 68. —Venezuel.
synandra, Spruce, ex Benth. l. c. 66. —Bras.
Woollsi, F. Muell. *Fragm.* vi. 171. —Austral.

SLOANIA, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, viii. (1881) 175 = *praec.*

SLOETIA, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 291, nomen; Kurz, in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1864) 167. t. 13. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 365.
eusideroxylon, Kurz, in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1864) 167 = *S. Sideroxylon*.
Sideroxylon, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 291, nomen; Kurz, l. c. —Malaya.

SLOTERIA, Auct. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 597 (1841), sphalm. = *Slateria*, Desv. (Haemod.).

SMEATHMANNIA, [Soland.] R. Br. in Tuckey, Congo, 439 (1818); et in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1821) 220. *PASSIFLOREAE*, Benth. & Hook. f. i. 812.

BUELOWIA, Schum. & Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* 246 (1827).
decandra, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1881) 304. —Afr. trop.
emarginata, Lem. *Jard. Fleur.* i. (1851) *Misc.* 71. —Afr. trop.
illustris, Endl. ex Walp. *Rep.* ii. 218. —Afr. trop.
laevigata, Soland. ex R. Br. in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1821) 221. —Afr. trop.
media, R. Br. l. c. = *pubescens*.
pubescens, Soland. ex R. Br. l. c. —Afr. trop.
rosea, Lem. *Jard. Fleur.* i. (1851) *Misc.* 71. —Afr. trop.

SMEGMADERMOS, Ruiz & Pav. *Prod.* 144. t. 31 (1794) = *Quillaja*, Molina (Rosac.).
emarginata, Ruiz & Pav. *Syst. Veg.* 288 = *Q. Saponaria*.

SMEGMARIA, Willd. *Sp. Pl.* iv. 1123 (1806) = *SMEGMADERMOS*, Ruiz & Pav. = *Quillaja*, Molina (Rosac.).
emarginata, Willd. l. c. = *Q. Saponaria*.

SMEGMATHAMNIUM, Fenzl, ex Reichb. *l. c.* Fl. Germ. vi. t. 244 (1844) = *Saponaria*, Linn. (Caryoph.).
bellidifolium, Reichb. l. c. = *Sap. bellidifolia*.
luteum, Reichb. l. c. = *Sap. lutea*.

SMELOPHYLLUM, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 330. *SAPINDACEAE*.
capense, Radlk. l. c. 331. —Afr. austr.

SMELOWSKIA, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 165 (1831). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 79.
alpina, C. A. Mey. l. c. 170, in obs. = *Hutchinsia alpina*.
annua, Rupr. *Sert. Tiansch.* 39. —Turkestan.
asplenifolia, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 285 = *cinerea*.
bifurcata, Turcz. l. c. (1838) 88; xv. (1842) 286 = *cinerea*.
brevicaulis, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 597 = *Hutchinsia alpina*.
californica, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* vi. (1865) 520 = *Sisymbrium incisum*.
calycina, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 170. —As. et Am. arct.
cinerea, G. A. Mey. l. c. 171. —Sibir.
cordifolia, Walp. *Rep.* ii. 761 = *Eutrema cordifolium*.
flavissima, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 156. —Soongar.
Fremontii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 123. —Calif.
integrifolia, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 168 = *Eutrema alpestre*.
parviflora, Walp. *Rep.* ii. 761 = *Eutrema Edwardsii*.

SMILACINA, Desf. in *Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 51. t. 9. *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 770.
ASTERANTHEMUM, Kunth, *Enum. Pl.* v. 151 (1850).
JOCASTE, Kunth, l. c. 154 (1850).
MEDORA, Kunth, l. c. 155 (1850).
NEOLEXIS, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 64 (1866).
POLYGONASTRUM, Moench, *Meth.* 637 (1794).
SIGILLARIA, Rafin. in *Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 261.
STYRANDRA, Rafin. l. c. (1819) 102.
TOVARIA, Neck. *Elem.* ii. 190 (1790), nomen prius.
alpina, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 380 = *Clintonia alpina*.
amoena, H. Wendl. in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xviii. (1850) 137 = *paniculata*.
amplexicaulis, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 58 = *racemosa*.
anomala, C. Sm. in Tuckey, Congo, 249. —Cf. Steud. *Nom. ed.* II. ii. 598, nomen (Quid?). —Ins. Cap. Virid.
Bertolonii, Kunth, *Enum. Pl.* v. 151 = *flexuosa*.
bifolia, Schult. f. *Syst.* vii. 307 = *Maianthemum Convallaria*.
bootanensis, Griff. *l. c.* Pl. Asiat. t. 279 = *fusca*.
borealis, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* tt. 1155, 1403 = *Clintonia umbellata*, *borealis*.
canadensis, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 233 = *Maianthemum Convallaria*.
ciliata, Desf. in *Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 53. t. 9 = *racemosa*.
cordifolia, Becker, *Fl. Frankf.* i. 136 = *Maianthemum Convallaria*.
dahurica, Turcz. ex Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 38; et in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 102; xxvii. (1854) ii. 110. —Dahur.; Japon.
dilatata, Nutt. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 563 = *Maianthemum Convallaria*.
divaricata, Wall. *Cat. n.* 4202 = *fusca*.
Eschscholtziana, Andr. & Bess. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 564 = *Maianthemum Convallaria*.
flexicaulis, Wender. in *Schrift. Marb.* ii. (1831) 249 = *ciliata*?
flexuosa, Bertol. in *Nov. Comm. Acad. Bonon.* iv. (1840) 411. t. 39. —Guatemala.
flexuosa, Hook. *l. c.* Pl. t. 529 = *praec.*?
Forskäliana, Schult. f. *Syst.* vii. 304. —Arab.
fusca, Wall. *Pl. As. Rar.* iii. 37. t. 257. —Reg. Himal.

SMILACINA:—

- hirta*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 276 = japonica.
japonica, A. Gray, in Perry, *Jap. Exped.* ii. 321.—
 Japon.
latifolia, Nutt. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv.
 (1875) 579 = racemosa.
laxiflora, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 368.—
 Guatemala.
macrophylla, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. 11.
 (1842) 387 = scilloidea.
nervulosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 368.
 —Mexic.
oleracea, Hook. f. & Thoms. ex Baker, in Journ.
 Linn. Soc. xiv. (1875) 569.—Reg. Himal.
pallida, Royle, Illustr. Bot. Himal. 380 = purpurea.
paniculata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. 11.
 (1842) 388.—Mexic.
purpurea, Wall. Pl. As. Rar. ii. 38. t. 144.—Reg.
 Himal.
racemosa, Desf. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 51.—
 Am. bor.
ramosa, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 131, nomen.—
 Sibir.
Salvini, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 368.—
 Guatemala.
scilloidea, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. 11.
 (1842) 388.—Mexic.
sessilifolia, Nutt. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv.
 (1875) 566.—Am. bor. occ.
stellata, Desf. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 52.—Am.
 bor.
streptopoides, Ledeb. Fl. Ross. iv. 128 = Streptopus
 roseus.
thyrsoides, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 368.
 —Mexic.
trifolia, Desf. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 52.—
 Sibir.; Am. arct.
umbellata, Desf. l. c. 53 = Clintonia umbellata.
uniflora, Menz. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 175. t. 190
 = Clintonia uniflora.
yessoensis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 523 =
 dahurica.

SMILAX, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).

- LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 763.
COPROSMA, Kunth, Enum. Pl. v. 263 (1850).
NEMEXIA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).
PARILLAX, Rafin. Med. Fl. U. St. ii. 264 (1828).
PLEIOSMILAX, Seem. Journ. Bot. vi. (1868) 193.
 t. 8.
acanthophylla, Vell. Fl. Flum. x. t. 114 = lappacea.
aculeata, Vell. l. c. t. 110.—Bras.
acuminata, Willd. Sp. Pl. iv. 779.—Ind. or.
acutifolia, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 449.—
 Mexic.
aequatorialis, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 141.—
 Bras.
alba, Bertol. Misc. Bot. xvi. 24. t. 2.—Am.
alba, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 250.—Am. bor.
Alpini, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 67 =
 S. Bona-nox.
anceps, Willd. Sp. Pl. iv. 782.—Ins. Mascari.
angustifolia, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 67.
 —Costa Rica.
aristolochiaefolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—
 Mexic.
aristolochiaefolia, Willd. Sp. Pl. iv. 786 = hastata.
aspera, DC. Organogr. ii. 262 = rotundifolia, Linn.
aspera, Linn. Sp. Pl. 1028.—Europ.; Oriens; Ind. or.
aspericaulis, Wall. Cat. n. 5129.—Reg. Himal.;
 Malaya.
aspero-variabilis, Pers. Syn. ii. 618 = S. Bona-nox.
Assumptionis, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 132.—
 Am. trop.
auriculata, Chapm. Fl. S. U. St. 245 = Beyrichii.
auriculata, Walt. Fl. Carol. 245.—Am. bor.
australis, R. Br. Prod. 293.—Austral.
australis, A. Cunn. ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i.
 215 = Rhipogonum discolor.
Balbisiiana, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 586 = celastroides.
Balbisiiana, Kunth, Enum. Pl. v. 183.—Ind. occ.
balearica, Burnat & Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar. 12,
 61 = aspera.
barbata, Wall. Cat. n. 5125.—Malaya.
bauginioides, Kunth, Enum. Pl. v. 243.—Cochin-
 china.
Benthamiana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 114.—
 Am. trop.

SMILAX:—

- bermudensis*, Duham. Arb. ed. Nov. i. 241 = S.
 Bona-nox.
Berterii, Spreng. Syst. ii. 102.—Ins. S. Doming.
Beyrichii, Kunth, Enum. Pl. v. 207.—Am. bor.
biflora, Siebold, ex Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad.
 Wetensch. II. ii. (1868) 87.—Japon.
Blancoi, Kunth, Enum. Pl. v. 262.—Ins. Philipp.
Blumei, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 202.—Malaya.
Bona-nox, Linn. Sp. Pl. 1030.—Carolina; Georg.
borbonica, Hort. Petrop. ex A. DC. in DC. Monog.
 Phan. i. 169 = anceps.
borneensis, A. DC. l. c. 202.—Borneo.
Botterii, A. DC. l. c. 89.—Mexic.
bracteata, Presl, Rel. Haenk. i. 131.—Ins. Philipp.
brasiliensis, Spreng. Syst. ii. 100.—Bras.
caduca, Ell. Sketch, ii. 701 = Walteri.
caduca, Linn. Sp. Pl. 1030 = rotundifolia.
caduca, Lour. Fl. Cochinch. 622 = incerta.
calaris, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 132, sphalm. =
 scalaris.
californica, A. Gray, in Bot. Calif. ii. 186.—Calif.
calophylla, Wall. Cat. n. 5131.—Malaya.
calophylla, Wall. l. c., partim = singaporensis.
campestris, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 15.—Bras.
canariensis, H. C. Wats. in Godman, Azor. 227, partim
 = excelsa.
canariensis, Willd. Sp. Pl. iv. 784.—Ins. Canar.
Candelariae, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 70.—
 Costa Rica.
canellaefolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10.—
 Jamaic.
capitata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 49 =
 aspera.
catalonica, Poir. Encyc. vi. 467 = aspera.
celastroides, Kunth, Enum. Pl. v. 184.—Jamaic.
celebra, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 18.—Malaya.
cercidifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 733.—Am. bor.
China, Duham. Arb. ed. Nov. i. 239 = anceps.
China, S. T. Gmel. Reise, iii. 52. t. 6 = excelsa.
China, Linn. Sp. Pl. 1029.—China; Cochinch.; Japon.
China, Vell. Fl. Flum. x. t. 105, 106 = fluminaensis.
China, Walt. Fl. Carol. 245 = Walteri.
ciliata, Steud. ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 74 =
 rotundifolia.
cinnamomea, Desf. ex A. DC. l. c. 146.—Guian.
cissoides, Mart. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 8.
 —Bras.
cognata, Kunth, Enum. Pl. v. 175.—Mexic.
collina, Kunth, l. c. 261.—Ind. or.
columnifera, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.
 49 = macrophylla.
corbularia, Kunth, Enum. Pl. v. 262.—Cochinch.
corcovadensis, Kunth, l. c. 226 = nitida.
cordato-ovata, Balb. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.
 i. 152 = populnea.
cordato-ovata, Mus. Par. ex A. DC. l. c. 122 =
 havanensis.
cordato-ovata, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.
 (1792) 113.—Guian.
cordifolia, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 778.
 —Mexic.; Ind. occ.
coriacea, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii.
 (1883) 120.—Porto Rico.
coriacea, Spreng. Syst. ii. 103.—Ins. S. Doming.
coriifolia, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 112.—
 Bras.
Costaricae, Vatke, in Linnaea, xl. (1876) 223 =
 mexicana.
cumanensis, Bert. ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i.
 209 = coriacea, Spreng.
cumanensis, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv.
 783.—Am. trop.
cumanensis, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831)
 48 = mexicana.
cumanensis, Spreng. Syst. ii. 102 = celastroides.
cuspidata, Duham. Arb. ed. Nov. i. 242.—Guian.
Davidiana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 104.—
 China.
decipiens, Spreng. Pugill. ii. 91.—Ind. or.
densiflora, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 88.—
 Mexic.
dentata, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 774 =
 havanensis.
discolor, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 454.—
 Mexic.
divaricata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 795 = Dioscorea
 myriantha.

SMILAX:—

- divaricata*, Soland. ex H. C. Wats. in Hook. Lond.
 Journ. Bot. iii. (1844) 608.—Ins. Azor.
domingensis, Hohen. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.
 i. 89 = Botterii.
domingensis, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831)
 48 = Schlechtendalii.
domingensis, Spreng. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.
 i. 152 = populnea.
domingensis, Willd. Sp. Pl. iv. 783.—Ins. S. Doming.
dulcis, Desf. Tabl. ed. I. 218 = glycyphylla.
Ehrenbergiana, Kunth, Enum. Pl. v. 174.—Ins. S.
 Doming.
elastica, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 22.—Bras.
elegans, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 107 =
 parvifolia.
elegans, Wall. Cat. n. 5117.—Reg. Himal.
elliptica, R. Br. Prod. 293 = australis.
elliptica, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 58 =
 zeylanica.
Engelmanniana, Kunth, Enum. Pl. v. 221 = rotun-
 difolia.
erythrocarpa, Kunth, l. c. 234.—Mexic.
eucalyptifolia, Kunth, l. c. 230.—Peruv.
excelsa, Duham. Arb. ed. Nov. i. 236 = mauritanica.
excelsa, Linn. Sp. Pl. 1029.—Reg. Caucas.; Oriens.
extensa, Wall. Cat. n. 5126 A = myosotiflora.
extensa, Wall. l. c. B.—Penang.
febrifuga, Kunth, Enum. Pl. v. 201.—Peruv.
ferox, Wall. Cat. n. 5119 = S. China.
ficifolia, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 21.—Bras.
fistulosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 796.—Ins. Philipp.
flavescens, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 58 =
 salutaris.
flexuosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 367, sphalm.
 = Smilacina flexuosa.
floribunda, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 58 =
 cuspidata.
floribunda, Kunth, Enum. Pl. v. 229.—Peruv.
fluminensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 598.—Bras.
fulgens, Wall. Cat. n. 5122 = aspera.
Gaudichaudiana, Kunth, Enum. Pl. v. 252 = Hetero-
 smilax Gaudichaudiana.
gemina, Vell. Fl. Flum. x. t. 113.—Bras.
glabra, Roxb. Hort. Beng. 72; Fl. Ind. iii. 792.—
 Reg. Himal.; China.
glauca, Mart. Reise Bras. i. 283 = brasiliensis.
glauca, Walt. Fl. Carol. 245.—Am. bor.
glaucocarpos, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 450.
 —Mexic.
glaucophylla, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise,
 45 = parvifolia.
globifera, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 281.—
 Guian.
globulifera, Splitg. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.
 i. 119 = Hostmanniana.
glycyphylla, Sm. in White's Voy. 230. t. 24.—Austral.
glycyphylla, Hassk. in Flora, xxv. (1842) 11. Beibl. 4 =
 leucophylla.
goyazana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 112.—
 Bras.
Goudotiana, A. DC. l. c. 172.—Madag.
grandifolia, Buckl. in Am. Journ. Sc. Sér. I. xlv. (1843)
 171 = hispida.
grandifolia, Poepp. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.
 i. 142 = Poeppigii.
grandifolia, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 16;
 et cf. Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 73.—
 Bras.
grandifolia, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 648 = macro-
 phylla.
grandis, Wall. ex Voigt, l. c. 649 = macrophylla.
Griffithii, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 198.—
 Burma?
guianensis, Vitm. Summ. Veg. v. 422 = megalophylla.
hastata, Jacq. Enum. Pl. Carib. 33; Select. Am. 262.
 —Ins. S. Doming.
hastata, Willd. Sp. Pl. iv. 782 = S. Bona-nox.
havanensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 586 = ilicifolia.
havanensis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 33; Select. Am.
 262.—Cuba.
hawaiiensis, Seem. Fl. Vit. 309 = sandwicensis.
hederaefolia, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. v. 209 =
 S. Bona-nox.
hederaefolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 =
 S. Pseudo-china.
Helferi, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 176.—
 Burma; Malaya.

SMILAX:—

- herbacea, *Linn. Sp. Pl.* 1030.—Am. bor.; Japon.
 herbacea, Thunb. *Fl. Cap.* ed. Schult. 341 = Tel-faireana.
 heterophylla, *Rafin. in Med. Repos. N. York*, v. (1808) 359; *et in Desv. Journ. Bot.* i. (1808) 226.—Am. bor.
 higoënsis, *Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch.* II. ii. (1868) 88.—Japon.
 Hilariana, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 131.—Bras.
 hispida, *Muhl. Cat.* 92; ed. II. 97.—Am. bor.
 Hohenackeri, *Kunth, Enum. Pl.* v. 240 = zeylanica.
 hongkongensis, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 420 = *Heterosmilax Gaudichaudiana*.
 Hookeri, *Kunth, Enum. Pl.* v. 162 = glabra.
 horrida, *Desf. Tabl. ed. I.* 21 = S. Bona-nox.
 Hostmanniana, *Kunth, Enum. Pl.* v. 170.—Guian.
 Houstoniana, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 598 = spinosa.
 humilis, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n.* 11 = herbacea.
 hypoglaucia, *Benth. Fl. Hongk.* 369.—Ins. Hongkong.
 ilicifolia, *Kunth, Enum. Pl.* v. 171.—Cuba.
 incerta, *Kunth, l. c.* 263.—Cochinch.
 indica, *Burm. f. Fl. Ind.* 213 (err. typ. 313) = zeylanica.
 inermis, *Walt. Fl. Carol.* 244 = herbacea.
 insignis, *Kunth, Enum. Pl.* v. 200.—Peruv.
 invenusta, *Kunth, l. c.* 234.—Mexic.
 irrorata, *Benth. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 114 = Benthamiana.
 irrorata, *Hohen. ex A. DC. l. c.* 156 = Schomburgkiana.
 irrorata, *Mart. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 10.—Bras.
 Jacquinii, *Kunth, Enum. Pl.* v. 254 = hastata.
 jalapensis, *Schlecht. in Linnaea*, xviii. (1844) 451.—Mexic.
 Japicanga, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 6.—Bras.
 japonica, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1857) 412 = S. China.
 javensis, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 175.—Java.
 Klotzschii, *Kunth, Enum. Pl.* v. 245.—Java.
 Korthalsii, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 48.—Borneo.
 Kraussiana, *Meissn. in Flora*, xxviii. (1845) 312.—Afr. austr.
 laevis, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 129 = excelsa.
 laevis, *Wall. Cat. n.* 5116.—Malaya; China.
 lanceafolia, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 792.—Reg. Himal.; China.
 lanceolata, *Burm. f. Fl. Ind.* 213 (err. typ. 313) = glabra.
 lanceolata, *Engelm. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 76 = rotundifolia, *Linn.*
 lanceolata, *Linn. Sp. Pl.* 1031.—Am. bor.
 lanceolata, *Ruiz, ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 147 = insignis.
 lanceolata, *Walt. Fl. Carol.* 245 = hastata.
 lappacea, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 777.—Venezuela.
 larvata, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 19.—Bras.
 lasioneuron, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 173. t. 187 = herbacea.
 latifolia, *Blanco, Fl. Filip. ed. II.* 548 = vicaria.
 latifolia, *R. Br. Prod.* 293 = australis.
 latifolia, *Hassk. in Flora*, xxv. (1842) II. Beibl. 4 (nomen delendum).—Java.
 latifolia, *Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 12.—Ins. Mader.
 laurifolia, *Drège, ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 212 = *Asparagus crispus*.
 laurifolia, *Hohen. ex A. DC. l. c.* 188 = zeylanica.
 laurifolia, *Linn. Sp. Pl.* 1030.—Am. bor.
 laurifolia, *Poepp. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 99 = lanceolata.
 laurifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 793 = prolifera.
 laurina, *Kunth, Enum. Pl.* v. 248 = prolifera.
 Lessertiana, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 173.—Madag.
 leucophylla, *Blume, Enum. Pl. Fav.* i. 18.—Malaya.
 ligustrifolia, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 63.—N. Caled.
 longifolia, *Lem. Illustr. Hort.* xiv. (1867) t. 521 = salicifolia.
 longifolia, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 113 = papyracea.

SMILAX:—

- longifolia, *Wats. Dendrol.* ii. t. 110 = herbacea.
 lutescens, *Vell. Fl. Flum. x. t.* 109 = ramiflora.
 luzonensis, *Presl, Rel. Haenk.* i. 131 = Helferi?
 Macabucha, *Duch. ex Vidal & Garcia, Cat. Sem.* Manila, 14 = seq.?
 Macalucha, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 383, nomen.—Ins. Philipp.
 macrocarpa, *Blume, Enum. Pl. Fav.* i. 19.—Java.
 macrophylla, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 586, partim = populnea.
 macrophylla, *Poepp. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 142 = Poeppigii.
 macrophylla, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 793.—Ind. or.
 macrophylla, *Willd. Sp. Pl.* iv. 786 = megalophylla.
 macropoda, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 115.—Bras.
 maculata, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 796 = aspera.
 marginulata, *Mart. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 16 = campestris.
 mauritanica, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 367 = aspera.
 mauritanica, *Poir. Voy. Barb.* ii. 263.—Mauritan.
 mauritanica, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 322 = pendulina.
 maypurensis, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 776.—Am. trop.
 medica, *Bott. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 89 = Botteii.
 medica, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 390 = S. Bona-nox.
 medica, *Petz. Arbor. Muscav.* 740 = tamnoides.
 medica, *Schlecht. & Cham. in Linnaea*, vi. (1831) 47.—Mexic.
 megacarpa, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 186.—Malaya.
 megalophylla, *Duham. Arb. ed. Nov.* i. 244.—Ind. occ.
 melastomifolia, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxiii. [n. 5].—Ins. Sandvic.
 menispermoidea, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 108 = elegans.
 mexicana, *Griseb. ex Kunth, Enum. Pl.* v. 167.—Mexic.
 micrantha, *Blume, Enum. Pl. Fav.* i. 18 = *Heterosmilax japonica*.
 micropoda, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 58 = lanceafolia.
 Milleri, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 599 = aristolochiaefolia.
 Minarum, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 113.—Bras.
 minutiflora, *A. DC. l. c.* 109.—Reg. Himal.
 modesta, *A. DC. l. c.* 185.—Java.
 mollis, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 785.—Mexic.
 montana, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 15 = campestris.
 montevidensis, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 599, nomen (Quid?).—Reg. Argent.
 moranensis, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 389.—Mexic.
 Morsaniana, *Kunth, Enum. Pl.* v. 241 = Kraussiana.
 mossambicensis, *Gärcke, in Peters, Reise Mossamb.* Bot. 518 = Kraussiana.
 multiflora, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 390.—Mexic.
 myosotiflora, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 65.—Java.
 Myrtillus, *A. DC. l. c.* 106.—Reg. Himal.
 Nageliana, *A. DC. l. c.* 184.—Java.
 narcotica, *Buch-Ham. ex Wall. Cat. n.* 5099 = *Dioscorea daemona*.
 nigra, *Willd. Sp. Pl.* iv. 773 = aspera.
 nilagirensis, *Steud. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 167 = aspera.
 nipponica, *Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch.* II. ii. (1868) 87 = herbacea.
 nitida, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 9.—Bras.
 obliqua, *Spreng. Pugill.* ii. 91.—Ind. or.
 obliquata, *Duham. Arb. ed. Nov.* i. 242.—Peruv.
 oblongata, *Hort. Petrop. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 160 = grandifolia.
 oblongata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 59.—Ind. occ.
 oblongifolia, *Pohl, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 13.—Bras.
 obtusa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 175.—Am. trop.
 ocreata, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 191 = Roxburghiana.
 odontoloma, *Mart. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 18.—Bras.

SMILAX:—

- odoratissima, *Blume, Enum. Pl. Fav.* i. 19.—Java.
 officinalis, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 6 = procera.
 officinalis, *Herb. Lucaean. ex Kunth, Enum. Pl.* v. 227 = salutaris.
 officinalis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 271.—N. Granat.
 officinalis, *Poepp. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 150 = papyracea.
 Oldhami, *Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch.* II. ii. (1868) 86.—Japon.
 orbiculata, *Labill. Sert. Nov. Caled.* 18. t. 23.—N. Caled.
 orbiculata, *Vieill. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 65, partim = purpurata.
 ornata, *Lem. Illustr. Hort.* xii. (1865) t. 439.—Mexic.
 orthoptera, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 192 = Roxburghiana.
 ovalifolia, *A. DC. l. c.* 199 = prolifera.
 ovalifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 794 = macrophylla.
 ovata, *Duham. Arb. ed. Nov.* i. 242 = havanensis.
 ovata, *Ell. Sketch.* ii. 698 = Beyrichii.
 ovata, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 249.—Am. bor.
 oxyphylla, *Kunth, Enum. Pl.* v. 239 = laevis.
 oxyphylla, *Wall. Cat. n.* 5128.—Reg. Himal.
 pallescens, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 198.—Reg. Himal.
 pandurata, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 251 = S. Bona-nox.
 paniculata, *Herb. Desv. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 156 = Schomburgkiana.
 papyracea, *Duham. Arb. ed. Nov.* i. 242.—Guian.
 papyracea, *Spruce, ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 153 = Spruceana.
 parviflora, *Wall. Cat. n.* 5118.—Reg. Himal.
 peduncularis, *Muhl. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 786 = herbacea.
 peguana, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 62.—Burma.
 pekingensis, *A. DC. l. c.* 108.—China.
 pendulina, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. i. (1833) 12 = latifolia.
 perfoliata, *Blume, Enum. Pl. Fav.* i. 18 = Blumei.
 perfoliata, *Lour. Fl. Cochinch.* 622.—Cochinch.
 phyllobola, *Mart. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 21, partim.—Bras.
 phyllobola, *Mart. ex Griseb. l. c.*, partim = Riedeliana, Selloana.
 picta, *Hort. ex C. Koch, Dendrol.* ii. II. 337 = aspera.
 pirarensis, *Kunth & Rich. Schomb. ex Kunth, Enum. Pl.* v. 165.—Guian.
 platycentron, *Schlecht. in Linnaea*, xviii. (1844) 452 = S. Bona-nox.
 plurifurcata, *A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 65.—N. Caled.
 Poeppigii, *Kunth, Enum. Pl.* v. 192.—Am. trop.
 Pohlana, *Kunth, l. c.* 228 = procera.
 Poirerii, *Kunth, l. c.* 261 = havanensis.
 polyacantha, *Wall. Cat. n.* 5127.—Ins. Penang.
 polyantha, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 8.—Bras.
 populnea, *Kunth, Enum. Pl.* v. 192.—Ins. S. Doming.
 procera, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 6.—Bras.
 prolifera, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 795.—Ind. or.
 prolifera, *Wall. Cat. n.* 5124 = Roxburghiana.
 pruinosa, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 14.—Bras.
 Pseudo-china, *Bert. ex Kunth, Enum. Pl.* v. 183 = Balbiana.
 Pseudo-china, *Blanco, Fl. Filip. ed. I.* 795 = Blancoi.
 Pseudo-china, *Descourt, Fl. Antill.* vii. 47. t. 462 (Quid?).—Ind. occ.
 Pseudo-china, *Herb. Madr. ex Wall. Cat. n.* 5130 = zeylanica.
 Pseudo-china, *Linn. Sp. Pl.* 1031.—Am. bor.; Ind. occ.
 Pseudo-china, *Lour. Fl. Cochinch.* 623 = corbularia.
 Pseudo-china, *Mart. & Gal. ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 87 = moranensis.
 Pseudo-china, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 792 = collina.
 Pseudo-china, *Schiede, ex A. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 84 = cordifolia.
 Pseudo-china, *Sieber, ex A. DC. l. c.* 170 = Tel-faireana.
 Pseudo-sarsa, *Vis. Sem. Hort. Pat.* (1839).—Cf. *Linnaea*, xiv. (1840) Litt. 188 = S. Bona-nox.
 Pseudo-syphilitica, *Kunth, Enum. Pl.* v. 188.—Bras.
 pteropus, *Miq. Journ. Bot. Néerl.* i. (1861) 89 = S. China.

SMILAX:—

- pubens*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 67 = *S. Bona-nox*.
pubera, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 238 = *pumila*.
puberula, Kunth, Enum. Pl. v. 193 = *pumila*.
pulverulenta, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 238 = *herbacea*.
pumila, Walt. Fl. Carol. 244.—Am. bor.
Purampui, Ruiz, ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 159 = *febrifuga*.
purpurata, Forst. f. Prod. 70.—N. Caled.
Purtrampui, Ruiz, ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 97 = *eucalyptifolia*.
quadrangularis, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 775 = *rotundifolia*, Linn.
quadrata, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 183.—Reg. Himal.; Burma.
quinquenervia, Vell. Fl. Flum. x. t. 108.—Bras.
ramiflora, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 7.—Bras.
reticulata, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 58 = *lanceolata*.
retusa, Roxb. Hort. Beng. 72; Fl. Ind. iii. 793 = *macrophylla*.
Redeliana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 141.—Bras.
rigida, Russ. ex Stend. Nom. ed. I. 788 = *aspera*.
rigida, Wall. Cat. n. 5120.—Reg. Himal.
riparia, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 55.—China.
Ripogonum, Forst. f. Prod. 70 = *Rhipogonum scandens*.
robusta, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 12.—Bras.
rotundifolia, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii. (1883) 120.—Porto Rico.
rotundifolia, Linn. Sp. Pl. 1030.—Am. bor.
Roxburghiana, Wall. Cat. n. 5115.—Reg. Himal.
Roxburghiana, Wall. l. c., partim = *aspericaulis*.
Roxburghii, Kunth, Enum. Pl. v. 552 = *macrophylla*.
rubens, Wats. Dendrol. t. 108.—Am. bor.
rubens, Willd. ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 78 = *S. Bona-nox*.
rubiginosa, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 14 = *campestris*.
rubra, Link, in Buch. Besch. Canar. Ins. 140 = *canariensis*.
rubra, Willd. Ennm. Hort. Berol. 1015 = *Tamus communis*.
rufescens, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 9.—Bras.
Ruiziana, Kunth, Enum. Pl. v. 200.—Peruv.
sagittaeifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 1799 = *aspera*.
sagittata, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 58 = *aspera*.
salicifolia, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 19.—Bras.
salutaris, Kunth, Enum. Pl. v. 227.—Bras.
sandwicensis, Kunth, l. c. 253.—Ins. Sandvic.
santaremensis, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 115.—Bras.
Sarsaparilla, Linn. Sp. Pl. 1029, partim (sp. dub.).—Am. bor.
Sarsaparilla, Linn. l. c., partim = *glauca*.
scabriuscula, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 783.—Am. austr.
scalaris, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 16 = *campestris*.
Schiedeana, Kunth, Enum. Pl. v. 236 = *cordifolia*.
Schlechtendalii, Kunth, l. c. 224.—Mexic.
Schomburgkiana, Kunth, l. c. 187.—Guian.
Sebeana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 149 = *S. China*.
Selloana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 154.—Bras.
semiamplexicaulis, Boj. Hort. Maurit. 353 = *Telfaireana*.
sentiosa, Kunth, Enum. Pl. v. 209 = *S. Bona-nox*.
setosa, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 610 = *barbata*.
Shuttleworthii, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1876) I. 35.—Hab. ?
Sieboldi, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. II. ii. (1868) 87.—Japon.
Sieboldii, Hort. Bog. ex Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 32, nomen (Quid ?).—Japon.
singaporensis, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 177.—Singapore.
siphilitica, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 780.—Am. austr.
solanifolia, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 161.—Am. trop.
spicata, Vell. Fl. Flum. x. t. 111.—Bras.
spicata, Vell. l. c. t. 112 = *Dioscorea marginata*.

SMILAX:—

- spinescens*, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 83 = *australis*.
spinosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8.—Mexic.
spinosa, Poir. Encyc. vi. 467 = *havanensis*.
spinulosa, Sm. in Rees, Cycl. xxxiii. [n. 9] = *glauca*.
Sprengelii, Kunth, Enum. Pl. v. 207 = *rotundifolia*.
Spruceana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 153.—Bras.
staminea, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 11.—Bras.
stans, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 170.—Japon.
stenopetala, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 412.—Japon.
stenophylla, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 130.—Bras.
stipulacea, Boj. Hort. Maurit. 352.—Hab. ?
subaculeata, Spreng. Syst. ii. 102.—Am. trop.
subinermis, Presl, Rel. Haenk. i. 132 = *eucalyptifolia*.
subpubescens, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 69.—Mexic.
subsessiliflora, Duham. Arb. ed. Nov. i. 243 = *salutaris*.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xvii. (1843) 63 = *cumanensis*.
sylvatica, Kunth, Enum. Pl. v. 234 = *cordifolia*.
sylvatica, Kunth, l. c., partim = *moranensis*.
syphilitica, Auct. vide *siphilitica*.
syphilitica, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 20 = *S. Pseudo-syphilitica*.
syphilitica, Hort. Berol. ex Kunth, Enum. Pl. v. 190 = *Sarcococca pruniformis* ?
syphilitica, Mart. Herb. ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 134 = *irrorata*.
syphilitica, Mart. Reise Bras. iii. 1280 = *papyracea*.
syringoides, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 11 = *fluminensis*.
Talbotiana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 152.—Guian.
tamniifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 238 = *tamnoides*.
tamnoides, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 485 = *S. Bona-nox*.
tamnoides, Linn. Sp. Pl. 1030.—Am. bor.
Telfaireana, Wall. Cat. n. 5121 A.—Ins. Maurit.
Telfaireana, Wall. l. c. B = *Heterosmilax Gaudichaudiana*.
tetragona, Linn. f. Suppl. 427 = *aspera*.
tetragona, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. ii. (1842) 390 = *rotundifolia*.
tetragona, Seub. Fl. Azor. 24 = *excelsa*.
Thomsoniana, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 104 = *S. China*.
tijucensis, A. DC. l. c. 94.—Bras.
timorensis, A. DC. l. c. 189.—Ins. Timor.
timorensis, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 479, nomen (Quid ?).—Ins. Timor.
tomentosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 272.—N. Granat.
trifurcata, Seem. Fl. Vit. 309.—Ins. Fiji.
trinervula, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. II. ii. (1868) 87.—Japon.
triplinervia, Griseb. Cat. Pl. Cub. 251 = *mollis*.
triplinervia, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 784.—Venezuela.
tuberculata, Presl, Rel. Haenk. i. 132.—Ecuador.
umbellata, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 5130 = *zeylanica*.
umbellata, Vell. Fl. Flum. x. t. 107.—Bras.
umbellifera, Herb. Heyne, ex Wall. Cat. n. 5124 = *prolifera*.
undulata, Pohl, ex A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 135.—Bras.
vaginata, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 169. t. 169.—Reg. Himal.
variabilis, Pers. Syn. ii. 618 = *aspera*.
variegata, Walt. Fl. Carol. 244 = *S. Bona-nox*.
verrucosa, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 17.—Bras.
vicaria, Kunth, Enum. Pl. v. 262.—Ins. Philipp.
Villandia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5123 (sp. dub.).—Ind. or.
viminea, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 13.—Bras.
virginiana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9.—Jamaic.
virosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5099 = *Dioscorea daemona*.
viscidifolia, Duham. Arb. ed. Nov. i. 243.—Ins. S. Doming.

SMILAX:—

- vitiensis*, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 204.—Ins. Fiji.
Wagneriana, A. DC. l. c. 143.—Panama.
Wallichii, Kunth, Enum. Pl. v. 246 = *Roxburghiana* ?
Wallichii, Steud. Nom. ed. II. ii. 599 = *rigida*.
Walteri, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 249.—Am. bor.
Watsoni, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 414 = *herbacea*.
Wightii, A. DC. in DC. Monog. Phan. i. 174.—Ind. or.
xalapensis, Kunth, Enum. Pl. v. 258 = *jalapensis*.
zeylanica, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 17 = *Klotzschii*.
zeylanica, Linn. Sp. Pl. 1029.—Ind. or.; Malaya.
zeylanica, Wight, l. c. t. 2057-58 = *Wightii*.
Zollingeri, Kunth, Enum. Pl. v. 241 = *zeylanica*.

SMIRNOWIA, Bunge, in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 339. **LEGUMINOSAE**.
turkestana, Bunge, l. c.—Turkestan.

SMITHIA, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 496. t. 13 (1789).

- LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 516.
DAMAPANA, Adans. Fam. ii. 323 (1763).
KOTSCHYA, Endl. Stirp. Nov. Dec. 4 (1839).
PETAGNANA, J. F. Gmel. Syst. 1078 (1791).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 203 = *sensitiva*.
aeschynomeneoides, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 153.—Afr. trop.
aspera, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 343 = *Aeschynomene indica*.
Bernieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1884) 415.—Madag.
bigemina, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 208.—Ind. or.
bigeminata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 395 = *Zornia diphylla*.
blanda, Hohen. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 150 = *salsuginea*.
blanda, Wall. Cat. n. 5669.—Ind. or.
capitata, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 208.—Ind. or.
capitata, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 121 = *geminiflora*.
capitulifera, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 152.—Afr. trop.
Chamaecrista, Benth. in Miq. Pl. Jungh. 211.—Madag.
ciliata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 201. t. 35. f. 2.—Reg. Himal.
coerulescens, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie, iii. (1846) 76.—Java.
conferta, Sm. in Rees, Cycl. xxxiii. n. 2 = *geminiflora*.
cristata, Wight, ex Wight & Arn. Prod. 218 = *Geissaspis cristata*.
dichotoma, Dalz. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 150 = *salsuginea*.
disperma, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 599 = *Geissaspis cristata*.
domingensis, Balb. ex DC. Prod. ii. 321 = *Aeschynomene pleuronervia*.
elaphroxylon, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 404 = *Herminiera elaphroxylon*.
geminiflora, Roth, Nov. Pl. Sp. 352.—Ind. or.; Malaya; Austral.
gracilis, Benth. in Linnaea, xxiv. (1851) 642.—Ind. or.
Grandidieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 404.—Madag.
grandis, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 151.—Reg. Himal.
hirsuta, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 135 = *blanda*.
hispidissima, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie, iii. (1846) 76 = *geminiflora*.
japonica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 389.—Japon.
javanica, Benth. in Miq. Pl. Jungh. 211.—Java.
Kotschyi, Benth. l. c.—Afr. trop.
laxiflora, Benth. l. c. = *purpurea*.
martincensis, Spreng. Syst. iii. 323.—Ins. Martinic.
nodulosa, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 153.—Afr. trop.
paniculata, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 330 = *blanda*.
pumila, Royle, ex Wight & Arn. Prod. 220 = *ciliata*.
purpurea, Hook. Bot. Mag. t. 4283.—Ind. or.

SMITHIA :—

- pyncantha, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 150.—Ind. or.
racemosa, Heyne, in Wall. Cat. n. 5670 = *blanda*.
salsuginea, *Hance, in Journ. Bot. vii.* (1869) 208.—China.
sensitiva, *Ait. Hort. Kew. ed. I. iii.* 496.—As. et Afr. trop.
sensitiva, Wight & Arn. Prod. 220 = *geminiflora*.
sensitiva, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 6 = *javanica*.
setulosa, *Dalz. in Hook. Kew Journ. iii.* (1851) 208.—Ind. or.
spicata, Spreng. Neue Entdeck. ii. 160 (nom. delend.).—Afr. trop.
strigosa, *Benth. in Miq. Pl. Jungh.* 211.—Madag.; Afr. trop.
strobilantha, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 154.—Afr. trop.

SMITHIA, J. F. Gmel. Syst. 388 (1791) = **Humbertia**, Lam. (Convolv.).
Thouinia, J. F. Gmel. l. c. 388 = *H. madagascariensis*.

SMITHIA, Scop. Introd. 322 (1777) = **Clusia**, Linn. (Guttif.).

SMODINGIUM, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222 (1843), nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 523 (1859–60). **ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 422.
Andrieuxii, Baill. Adansonia, xi. (1874) 182 = *Pseudosmodingium Andrieuxii*.
argutum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 222, nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 523.—Afr. austr.
Virletii, Baill. Adansonia, xi. (1874) 182 = *Pseudosmodingium Virletii*.

SMYRNIOPSIS, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 72 = **Smyrnum**, Tourn. (Umbell.).
Aucherii, Boiss. l. c.—As. Min.; Persia.
cachroides, Boiss. Fl. Orient. ii. 928.—Syria; Mesopot.
syriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 51.—Syria.

SMYRNIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 81 (1737). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 885.

- ANOSMIA*, Bernh. in Linnaea, vii. (1832) 608.
 SMYRNIOPSIS, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 72.
acuminatum, Sm. in Rees, Cycl. xxxiii. n. 8 = *Thaspium aureum*.
aegopodioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v.* 16.—Mexico.
aegyptiacum, Linn. Cent. Pl. i. 10; Amoen. Acad. iv. 270 = *connatum*?
americanum, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 989 = *Eulophus americanus*.
apiifolium, Willd. Sp. Pl. i. 1468.—Ins. Creta.
atropurpureum, Lam. Encyc. iii. 667 = *Thaspium trifoliatum*.
aureum, Linn. Sp. Pl. 262 = *Thaspium aureum*.
barbinode, Muhl. Cat. 32; et ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 196 = *Thaspium barbinode*.
cicutarium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 239 = *Eleutherospermum grandifolium*.
connatum, Boiss. & Kotschy, in Unger & Kotschy, Ins. Cypern, 309.—As. Min.; Syria.
cordatum, Walt. Fl. Carol. 114 = *Thaspium trifoliatum*.
cordifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 64.—Persia; Assy.
creticum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *apiifolium*.
Dioscoridis, Spreng. Sp. Umbellif. 25 = *perfoliatum*.
Dodonaei, Spreng. l. c. 24 = *rotundifolium*.
heterophyllum, DC. Prod. iv. 110, sphalm. = *Sison Amomum*.
integerrimum, Linn. Sp. Pl. 263 = *Pimpinella integririma*.
laserpitoides, Crantz, Cl. Umb. Emend. 73 = *Prangos ferulacea*.
laterale, Thunb. Prod. Pl. Cap. 51 = *Apium graveolens*.
lineare, Benth. Pl. Hartw. 83 = *Eulophus peucedanoides*.
luteum, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 166, nomen = *Thaspium aureum*.
maritimum, Salisb. Prod. 168 = *S. Olusatrum*.
Matthioli, Presl, Delic. Prag. 127 = *rotundifolium*.

SMYRNIUM :—

- nodiflorum*, All. Fl. Pedem. ii. 23. t. 72 = *Trochiscanthus nodiflora*.
nudicaule, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 238 = *Physospermum commutatum*.
nudicaule, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 196 = *Peucedanum nudicaule*.
Olusatrum, Linn. Sp. Pl. 262.—Europ.; Reg. Mediterr.
Orphanidis, Boiss. Fl. Orient. ii. 925.—Graecia.
perfoliatum, Linn. Sp. Pl. 262.—Europ. austr.; Reg. Cauc.
ramosum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 289 = *rotundifolium*.
rotundifolium, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Reg. Mediterr.
trifoliatum, Muhl. Cat. 31; Nutt. Gen. Am. i. 195 = *Thaspium trifoliatum*.
vulgare, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 525 = *S. Olusatrum*.

SMYTHEA, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 255; x. (1862) 35. **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 375.
calpicarpa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 301.—Burma.
ново-гуине́нсий, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 14.—N. Guin.
pacifica, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 255; x. (1862) 35. t. 9.—Ins. Fiji.

SOALA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 437 (1837) = **Cyathocalyx**, Champ. (Anonac.).
litoralis, Blanco, l. c. = *C. zeylanicus*.

SOARESIA, Allem. in Rev. Braz. i. (1857) 210; et in Arch. Palest. Sc. Rio Jan. (1858) 142 = **Clarisia**, Ruiz & Pav. (Urtic.).
nitida, Allem. ll. cc.—Bras.

SOARESIA, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 376. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 236.
velutina, Sch. Bip. l. c. 377.—Bras.

SOBERBAEA, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1129 (1840), sphalm. = **Sowerbaea**, Sm. (Liliac.).

SOBISO, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 (1836) = **Salvia**, Tourn. (Labiata).
japonica, Rafin. l. c. = *Salvia japonica*.

SOBOLEWSKIA, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 421 (1819); et Cent. Pl. Kar. ii. t. 59 (1832). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 95.
 MACROSPORUM, DC. Syst. ii. 575, in obs. (1821).
clavata, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 348.—As. Min.
lithophila, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 421; et Cent. Pl. Kar. ii. t. 59.—Tauria; Reg. Caucas.
lithophila, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 347 = *clavata*.
stylosa, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 41 = *Physalidium stylosum*.

SOBRALIA, Ruiz & Pav. Prod. 120. t. 26 (1794). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 590.

- CYATHOGLOTTIS*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 55. t. 94 (1835).
amplexicaulis, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 233 (al. gen.).—Peruv.
aurantiaca, Linden & Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 278.—N. Granat.
biflora, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 232 (al. gen.).—Peruv.
Bletiae, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 713.—Panama.
bletioides, Brongn. ex Decne. in Rev. Hort. Sér. III. i. (1847) 421, cum tab. = *Bletia hyacinthina*.
candida, Reichb. f. in Fl. des Serres, viii. (1852–53) 247.—Peruv.
Caravata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 177 = *Elleanthus Caravata*.
Cattleya, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) i. 72.—N. Granat.
chlorantha, Hook. Bot. Mag. t. 4682 = *macrophylla*.
chrysantha, Lindl. Fol. Orch. Sobr. 3.—N. Granat.
chrysoleuca, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 179.—Bolivia.
citrina, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. (Orch. Opusc.) 21 = *Cattleya citrina*.

SOBRALIA :—

- crocea*, Reichb. f. in Fl. des Serres, viii. (1852–53) 247.—Peruv.
decora, Batem. Orch. Mex. et Guat. t. 26.—Guatemala.
dichotoma, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 232.—Peruv.
D'Orbignyana, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 179.—Bolivia.
Elisabethae, Rob. Schomb. in Verh. Befoerd. Gartenb. Preuss. xv. (1841) 137. tt. 1, 2.—Guian.
Fenzliana, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 714.—Nicaragua.
fimbriata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 54.—Peruv.
fragrans, Lindl. in Gard. Chron. (1853) 598.—N. Granat.
Galeottiana, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 30.—Mexic.
gloriosa, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 178.—Ecuador.
Klotzscheana, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 815.—Peruv.
labiata, Warsz. & Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 714.—Panama.
lepida, Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am. 68.—Costa Rica.
leucoxantha, Reichb. f. l. c.—Costa Rica.
Liliastrum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 177, 432.—Guian.; Bras.
Lindleyana, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 713.—Costa Rica.
macrantha, Lindl. Sert. Orch. sub t. 29.—Mexic.
macrophylla, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 713.—Panama.
Mandonii, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 175.—Bolivia.
paludosa, Linden, Cat. n. 6 (1851) 8.—N. Granat.
paradisica, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 816.—N. Granat.
porphyrocharis, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 177.—Ecuador.
rigidissima, Linden, ex Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 278.—N. Granat.
Roezlii, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 178.—N. Granat.
rosea, Lindl. Fol. Orch. Sobr. 2 = *glauca*.
rosea, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 54. t. 93.—Peruv.; N. Granat.
roseo-alba, Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am. 7.—Am. centr.
Ruckeri, Linden & Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 278.—N. Granat.
Ruckeri, Linden, ex Lindl. Fol. Orch. Sobr. 3 = *rosea*.
scopulorum, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 176.—Bolivia.
sessilis, Hook. Bot. Mag. t. 4570 = *decora*.
sessilis, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 3. t. 17.—Guian.
setigera, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 54.—Peruv.
stenophylla, Lindl. Fol. Orch. Sobr. 2.—Guian.
suaveolens, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) i. 622.—Panama.
violacea, Linden, ex Lindl. Orchid. Linden. 26.—Venezuela.
Warszewiczii, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 714.—Panama.

SOBREYRA, Ruiz & Pav. Prod. 109. t. 23 (1794) = **Enhydra**, Lour. (Compos.).
oblonga, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 197 = *E. oblonga*.
sessiliflora, Ruiz & Pav. l. c. = *E. Sobreyra*.

SOBRYA, Pers. Syn. ii. 473 (1807) = *praeac*.

SOCOTORA, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 77. **APOCYNACEAE**.
aphylla, Balf. f. l. c.—Ins. Socotr.

SOCRATEA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 263. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 900.
durissima, H. Wendl. in Bonplandia, viii. (1860) 103.—Nicaragua.
elegans, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 264.—N. Granat.
exorrhiza, H. Wendl. in Bonplandia, viii. (1860) 103.—Mexic.
fusca, Karst. Fl. Columb. i. 109. t. 54 = *Dictyocaryum fuscum*.
Orbignyana, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 264.—N. Granat.
philonotia, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 900 = *exorrhiza*.

SOCRATESIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 22 = **Cavendishia**, Lindl. (Vaccin.).
melastomoides, Klotzsch, l. c. = *C. melastomoides*.

SODA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 145 = **Salsola**, Linn. (Chenop.).
inermis, Fourr. l. c. = *Salsola Soda*.

SODADA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 81 (1775) = **Capparis**, Tourn.
decidua, Forsk. l. c.; Delile, Fl. Egypt. 74. t. 26 = *C. aphylla*.

SODIROA, André, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 167. **BROMELIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 668.
caricifolia, André, l. c. — *N. Granat*.
graminifolia, André, l. c. — *N. Granat*.

SOEMMERINGIA, Mart. Diss. Soemmer. (1828) 27. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 516.
psittacorrhyncha, Webb, in Hook. Niger Fl. 123 = *Geissaspis lupulina*.
semperflorens, Mart. Diss. Soemm. (1828) 28. — Bras.

SOGALGINA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 31 = **Tridax**, Linn. (Compos.).
balbisoides, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlix. 398 = *T. balbisoides*.
dentata, Lilja, in Linnaea, xvii. (1848) 110 = *T. trilobata*?
trilobata, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlix. 397 = *T. trilobata*.

SOGALIGNA, Steud. Nom. ed. I. 788 (1821), sphalm. = *praec*.

SOHREA, Steud. Nom. ed. I. 788 (1821), sphalm. = **Shorea**, Roxb. (Dipteroc.).

SOJA, Moench, Meth. 153 (1794) (Soia) = **Glycine**, Linn. (Legumin.).
angustifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 223 = *G. Soja*.
hamata, Miq. l. c. 224 = *G. pendula* (in Addend.).
hispidia, Moench, Meth. 153 = *G. Soja*.
japonica, Savi, in Pisa, Nuov. Giorn. Litt. viii. (1824) 113; (Mem. Phas. ii. 16) = *G. Soja*.
javanica, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5528 = *G. javanica*.
viridis, Savi, Cose Bot. 9. — Hab.?
Wightii, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5530 = *G. javanica*.

SOKOLOFIA, Rafin. Alsog. Am. 14 (1838) = **Salix**, Tourn.
rupestris, Rafin. l. c. 15 = *Salix nigricans*.

SOLAENACANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 122 = **Ruellia**, Linn. (Acanth.).
longiflorus, Oerst. l. c. = *R. longiflora*.

SOLANANDRA, Pers. Syn. ii. 215 (1807), sphalm. = **SOLENANDRIA**, Beauv. = **Galax**, Linn. (Diapens.).

SOLANDRA, Linn. Syst. ed. X. 1269 (1759) = **Hydrocotyle**, Tourn. (Umbell.).
capensis, Linn. l. c. = *H. Solandra*.

SOLANDRA, Murr. in Comm. Gotting. vi. 1783-84 (1785), 20. t. 1 = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).
aculeata, Poir. Encyc. vii. 225 = *H. ficulneus*.
lobata, Murr. in Comm. Gotting. vi. 1783-84 (1785), 20 = *H. Solandra*.
spinosa, Poir. in Dict. Sc. Nat. xlix. 406 = *H. ficulneus*.
squamea, Poir. Encyc. vi. 225 = *Lagunaria Patersonii*.
ternata, Cav. Diss. v. 279. t. 136. f. 2 = *H. ternatus*.

SOLANDRA, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 300. t. 11. **SOLANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 901.
SWARTZIA, J. F. Gmel. Syst. 360 (1791).
grandiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 100 = *hirsuta*.
grandiflora, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 300. t. 11. — Am. trop.
guttata, D. Don, in Bot. Reg. t. 1551. — Mexic.
herbacea, Hort. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 544 = *Datura ceratocaula*.
hirsuta, Dun. l. c. 535. — Bras.

VOL. II.

SOLANDRA:—

laevis, Hook. Bot. Mag. t. 4345 = *longiflora*.
longiflora, Tussac, Fl. Antill. ii. 49. t. 12. — Ind. occ.
longipes, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 159 = *Dyssochroma longipes*.
macrantha, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 533 = *grandiflora*.
minor, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 433. — Ins. Dominic.
nitida, Zuccagni, in Roem. Collect. 128 = *grandiflora*.
oppositifolia, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 15 = *Fagraea ceilanica*.
platantha, Walp. Ann. iii. 152 = *Portlandia platantha*.
scandens, Willd. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 160 = *grandiflora*.
viridiflora, Sims, Bot. Mag. t. 1948 = *Dyssochroma viridiflora*.

SOLANOIDES, Tourn. ex Moench, Meth. 307 (1794) = **Rivina**, Plum. (Phytolac.).
laevis, Moench, l. c. = *R. humilis*.
pubescens, Moench, l. c. = *R. humilis*.
undulata, Moench, Meth. Suppl. 106 = *R. humilis*.

SOLANUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). **SOLANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 888.
ANDROCERA, Nutt. Gen. Am. i. 129 (1818).
AQUARTIA, Jacq. Enum. Pl. Carib. 12 (1760).
CERANTHERA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176.

CLIOCARPUS, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. iv. (1849) 141.
DIAMONON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 76 (1836).
DULCAMARA, Moench, Meth. 514 (1794).
NORMANIA, Lowe, Man. Fl. Mad. ii. 70 (1868).
NYCTERIUM, Vent. Jard. Malm. 85. t. 85 (1803).
PSEUDOCAPSICUM, Medic. Phil. Bot. i. 122 (1789).
PSOLANUM, Neck. Elem. ii. 60 (1790).

abyssinicum, Jacq. ex Vitm. Summa Pl. i. 492 = *marginatum*.
acanthifolium, Aubl. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 255 = *stramonifolium*.
acanthifolium, Hort. ex Dun. l. c. 215 = *S. Juripeba*.
acanthifolium, Hort. Par. ex Dun. l. c. 260 = *torvum*.
acanthifolium, Leman, ex Dun. l. c. 200 = *jamaicense*.
acanthifolium, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 14 = *fuscum*, Linn.
acanthocalyx, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 232. — Afr. trop.

acanthocarpum, Poit. in Rev. Hort. (1867) 290. — Cochinchina.
acanthodes, Hook. f. Bot. Mag. t. 6283. — Bras.
acanthoideum, Drège, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 364. — Afr. austr.
acerifolium, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 41. — *N. Granat*.

acerosum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 61. — Bras.
acetosaefolium, Lam. Illustr. ii. 24; Encyc. iv. 306 = *trilobatum*.
acicular, Sw. in Roem. & Schult. Syst. iv. 647. — Bras.

acropterum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 437. — Ind. occ.
aculeastrum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 366. — Afr. austr.
aculeatissimum, Jacq. Coll. i. 100. — As. et Am. trop.
aculeatissimum, Moench, Meth. 475. — Hab.?
aculeatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = seq.

aculeiger, Moric. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 301. — Bras.
aculeolatum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. i. (1845) 143. — Mexic.

acuminatum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 139 = *apodum*.
acuminatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 34. t. 159. — Peruv.

acutangulum, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58. — Peruv.

acutifolium, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 440 = *nigrum*.

acutifolium, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 33. t. 162. f. b. — Peruv.

acutilobum, Dun. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 772. — Bras.

adelense, Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa, 345. — Abyss.

adenophorum, F. Muell. Fragm. ii. 162. — Austral.

SOLANUM:—

adenotrichum, Dun. Hist. Solan. 236. — Bras.
adhaerens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669 = *scabrum*.
adoense, Hochst. ex A. Br. in Flora, xxiv. (1841) 1. 278. — Abyss.

adscendens, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 17. — Bras.
adulterinum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 2616 = *verbascifolium*.
aegyptiacum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 45 = *nigrum*.
aethiopicum, Jacq. Hort. Vindob. i. 4. t. 12. — Hab.?
aethiopicum, Linn. Cent. Pl. ii. 10; Amoen. Acad. iv. 307. — As. et Afr. trop.

aethiopoidea, Cav. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669 (Quid?). — Hab.?
affine, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 168. — Cuba.

affine, Sendtn. in Mart. Fl. Bras. x. 63 = *jatrophaefolium*.
africanum, Dun. Hist. Solan. 238. — Africa.

africanum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 26 = *crassifolium*.
Azelii, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 363. — Afr. trop.
aggerum, Dun. l. c. 103. — Afr. austr.

aggregatum, Jacq. Coll. iv. 124. — Ind. occ.; Afr. trop.
agglutinatum, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 48. — Bras.

agrarium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 69. — Bras.
agreste, Brouss. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669 (Quid?). — Hab.?

agreste, Roth, Nov. Pl. Sp. 130 = *indicum*.
agrimoniaefolium, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 25 = *Lycopersicum agrimoniaefolium*.

Ahlbergi, Dun. l. c. 372. — Bras.
alatum, Dun. l. c. 234 = *decurrens*.

alatum, Moench, Meth. 474 = *nigrum*.
alatum, Seem. & Schmidt, in Flora, xxvii. (1844) 497 = *robustum*.

albicaule, Kotschy, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 204. — Afr. trop.

albidum, Dun. Hist. Solan. 206. — Peruv.

albiflorum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 202. — Chili.

album, Lour. Fl. Cochinch. 129. — Ins. Molucc.; Cochinch.

album, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = *S. Melongena*.

aligerum, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 301. — Mexic.

allogonum, Bernh. l. c. viii. (1833) 252 = *Saracha allogona*.

aloysiaefolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 73. — Bolivia.

Alphonsi, Dun. l. c. 69. — Chili.

alpinum, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Ind. ii. (1845) 571. — Java.

alternato-pinnatum, Steud. Nom. ed. II. ii. 600. — Bras.

amarantoides, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 55. — Bras.

amazonium, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 71. — Mexic.

ambiguum, Dun. Solan. Syn. 32. — Ins. Martinic.

amblophyllum, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 231. — Peruv.

amblycalycinum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = seq.

amblycalyx, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 371 = *ericalyx*.
amblymerum, Dun. l. c. 294. — Austral.

ambrosiacum, Vell. Fl. Flum. 90; ii. t. 131. — Bras.

americanum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *nigrum*.

amicorum, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 227. — Ins. Pacif.

amictum, Moric. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 263. — Mexic.

amoenum, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 300 = *torvum*.

amplexicaule, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 14. — Bras.

amygdalifolium, Steud. Nom. ed. II. ii. 600. — Bras.

anacampocarpum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 59. — Java.

anacanthum, Dun. l. c. 183. — Mexic.

anceps, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 36. t. 169. — Peruv.

Andreanum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 498. — *N. Granat*.

Andrieuxi, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 165. — Mexic.

Anghivi, Boj. ex Dun. l. c. 31 = seq.

Anguivi, Herb. Lamb. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 308 = *occidentale*.

SOLANUM:—

Anguivi, Hook. Exot. Fl. t. 199 = indicum.
Anguivi, Lam. Illustr. ii. 23 (an praec. ?).—Madag.
angulatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 36 = quitoense.
angulosum, Heyne, ex Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 42 = bigeminatum.
Angurium, Dun. Hist. Solan. 243.—Mexic.
angustiflorum, Mart. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 107.—Bras.
angustifolium, Lam. Illustr. ii. 18.—Reg. Argent.
angustifolium, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = *S. Angurium*.
angustifolium, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 33 = pulverulentum.
anisophyllum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 52.—Peruv.
anoacanthum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 66.—Bras.
anomalum, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 126.—Afr. trop.
anonaefolium, Dun. Solan. Syn. 15.—N. Granat.
anoplocadum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 346.—Mexic.
anthropophagorum, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 258; x. (1862) 274. t. 14 = *S. Uporo*.
apalophyllum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 42.—Peruv.
apiculatum, Dun. l. c. 99 = madagascariense.
apiculatum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 84.—Bras.
apocynifolium, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 213.—Madag.
apodum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 139.—Bras.
appendiculatum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 5.—Mexic.
appendiculatum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. i. (1845) 135 = Galeotti.
Aquaria, Dun. Hist. Solan. 187.—Ins. S. Doming.
aquaticum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. Suppl. 152.—Hab. ?
arabicum, Dun. Hist. Solan. 240.—Arab.
Aracatscha, Bess. Cat. Pl. Hort. Crem. (1816) 135; et ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669 = tuberosum.
arborescens, Moench, Meth. 474 = bonariense.
arborescens, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 20.—Venezuela.
arcuatum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 60.—Bras.
ardisioides, Blume, Bijdr. 696.—Java.
arenarium, Schur, Enum. Pl. Transs. 477 = nigrum.
arenarium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 26.—Bras.
argenteum, Blanch. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 135 = Swartzianum.
argenteum, Dun. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 755.—Bras.
argenteum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2610 = giganteum.
argillicolum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 236.—Bras.
argyrantha, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iii. 161.—Hab. ?
armatum, R. Br. Prod. 446.—Austral.
armatum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 47 = arabicum.
Arrabida, Steud. Nom. ed. II. ii. 660 = Cyphomandra Velloziana.
Arrebuta, Vell. Fl. Flum. 89; ii. t. 127 = aculeatisimum, Jacq.
artense, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 245.—N. Caled.
asarifolium, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 10.—Venezuela.
aspero-lanatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 39 = lanatum.
asperum, Hornem. ex Walp. Rep. iii. 49 = nigrum.
asperum, Pers. Syn. i. 229 = lanatum.
asperum, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 107 = *S. Radula*.
asperum, Sieber, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 107 = callicarpaefolium.
asperum, Vahl, Eclog. Am. ii. 17.—Am. trop.
asphananthum, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 220.—Madag.
assimile, Frivald. in Flora, xix. (1836) 439 = *S. Dulcamara*.
asterigerum, Bertol. in Mém. Acad. Sc. Bologn. ix. (1858) 167 (Misc. Bot. xix. 3).—China.
astrocormum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 339.—Am. trop.
asteroideum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = astroites.
astrophorum, Mart. in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 79.—Bras.

SOLANUM:—

astroites, Forst. f. Prod. 89 = nigrum.
astroites, Jacq. Eclog. 97. t. 65.—Am. austr.
astrophorum, Jan, Elench. 4 = sosomeum.
athroanthum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 208.—Java.
atriplicifolium, Desp. ex Dun. Solan. Syn. 12 = nigrum.
atriplicifolium, Gill. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 386.—Am. austr.
Atropo, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 124 = Thonningianum.
atropurpureum, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 200.—Bras.
atroanguineum, Hort. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 243 = atropurpureum.
atroviolaceum, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 410.—Java.
atrovirens, Dun. Hist. Solan. 243.—Ind. or.
aturensis, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 32.—Venezuela.
aurantiacum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 55.—Bras.
aureum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 16.—Ecuador.
aureum, Sw. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 602 = Swartzianum.
aureum, Thunb. Pl. Bras. Dec. ii. 20 = Ahlbergi.
auriculatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 246.—As. trop.
auriculatum, Mart. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 115 = granuloso-leprosum.
austro-caledonicum, Seem. in Journ. Bot. i. (1863) 209.—Ins. Pacif.
aviculare, Forst. f. Prod. 18.—Austral.; N. Zel.
axilliflorum, Dun. Hist. Solan. 238.—Mexic.
baccatum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 601 = bonariense.
bahamense, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 46 = glabratum.
bahamense, Linn. Sp. Pl. 188.—Ind. occ.
bahamense, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 24 = verbascifolium.
Balbisi, Boj. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 326 = Richardi.
Balbisi, Dun. Hist. Solan. 232. t. 3 = sisymbriifolium.
Baencks, Vand. Fasc. Pl. 10, sphalm. = seq.
Banksianum, Dun. Hist. Solan. 242 (Banksianum).—Bras.
barbadense, Crantz, Inst. ii. 374 = Rivina humilis.
barbisent, Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 51.—Ind. or.
Bassovia, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 754.—Bras.
Bassovia, Mart. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 406 = Bassovia Richardi.
Bauerianum, Endl. Prod. Fl. Norf. 54.—Ins. Norfolk.
bejarensis, Moric. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 330 = rostratum.
Belfort, Vand. Fasc. Pl. 11 = paniculatum.
Belfortianum, Dun. Hist. Solan. 242 = paniculatum.
benguelense, Peyr. in Sitzb. Akad. Wien, Math.-Nat. xxxviii. (1860) 575.—Afr. trop.
Benthami, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 101.—Mexic.
Berterianum, Dun. l. c. 167.—Ins. S. Doming.
Berterii, Hort. Par. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 601.—Chili.
Besseri, Weinm. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 593 = nigrum.
Besserianum, Weinm. Elench. Hort. Pawlowsk. (1824) 100 = praec.
betaceum, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1799) 44; Ic. t. 524 = Cyphomandra betacea.
biceps, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 341.—Bras.
bicolor, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1254 = Swartzianum, argenteum.
bicolor, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 661 = verbascifolium.
bicorne, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 232.—Am. trop.
bifidum, Dun. l. c. 122.—N. Granat.
bifidum, Dun. l. c. 341 = biceps.
bifissum, Vell. Fl. Flum. 86; ii. t. 111 = biceps.
bifissum, Vell. l. c. 90; ii. t. 129.—Bras.
biflorum, R. Br. Prod. 445 = dianthophorum.
biflorum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 96 = pachypetalon.
biflorum, Lour. Fl. Cochinch. 129.—Malaya; China.
bifolium, Aubl. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 149 = leucocarpon.
bifomifolium, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 32. t. 162.—Peruv.

SOLANUM:—

bifurcum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 24, nomen.—Abyss.
bigeminatum, Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 42.—Ind. or.
bimense, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 642.—Ins. Sunda.
bipatens, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 209.—Bras.
blattarioides, Koen. ex Dun. l. c. 127 = pubescens.
Blodgettii, Chapm. Fl. S. U. St. 349.—Florida.
Blumei, Nees, ex Blume, Bijdr. 696.—Java.
boerhaviaefolium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 48.—Bras.
bogotense, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 121.—N. Granat.
Boisseri, Dun. l. c. 188.—Guian.
Bojeri, Dun. l. c. 344.—Afr. trop.
boldoense, Dun. & A. DC. l. c. 679.—Cuba.
boliviense, Dun. l. c. 43.—Bolivia.
bombense, Banks, ex Dun. l. c. 271 = stenorchis.
bombense, Jacq. Enum. Pl. Carib. 15 = glabrum.
bonariense, Linn. Sp. Pl. 185.—Reg. Argent.
Botchianum, Dun. Hist. Solan. 239.—Bras.
Botelho, Vand. Fasc. Pl. 10 = praec.
brachyacanthum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 32.—N. Granat.
brachyantherum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 522.—Chili.
brachybotryon, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 212.—Guian.
brachylobum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 71.—Peruv.
brachypodon, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 411 = Bassovia brachypoda.
brachystachys, Dun. l. c. 128.—Mexic.
bracteatum, Thunb. in Act. Gorenk. (1812); ex ej. Fl. Cap. ii. 57.—Afr. austr.
brancaefolium, Jacq. Eclog. 14. t. 7 = sisymbriifolium.
brasilianum, Dun. Solan. Syn. 48.—Bras.
brevdens, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 521.—Chili.
brevifolium, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 22.—Ecuador.
brevipes, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 203.—Bras.
brevipilosum, Dun. l. c. 199.—Guian.
brevipilum, Dun. Hist. Solan. 191. t. 21 = jamaicense.
Bridgesii, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 203.—Chili.
Brownii, Dun. Hist. Solan. 201 = violaceum.
Brucei, Delile, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 282 = adoense.
buddleiaefolium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 83.—Bras.
buddleiaefolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 115 = granuloso-leprosum.
Bulbocastanum, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 749.—Mexic.
bullato-rugosum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 236 = cyanocarpium.
bullatum, Vell. Fl. Flum. 84; ii. t. 104.—Bras.
bumeliaefolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 292.—Madag.
Burchellii, Dun. l. c. 291.—Afr. austr.
Bustilloi, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 24.—Chili.
byrsinum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 511 = havanense, Jacq.
Caavurana, Vell. Fl. Flum. 86; ii. t. 112.—Bras.
cabiliense, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 713 = marginatum.
caeruleum, Vell. Fl. Flum. 86; ii. t. 110 = indigoferum.
caesium, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 254.—Reg. Argent.
cajanumense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 47 = Cyphomandra cajanumensis.
Caldasii, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 6.—Ecuador.
calicinum, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 747.—Mexic.
californicum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 86 = umbelliferum.
Calleryanum, Dun. l. c. 178 = biflorum.
callicarpaefolium, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 10.—Am. trop.
callicarpum, Hort. Berol. ex A. Br. l. c. = Karstenii, A. Br. & Bouché.

SOLANUM:—

calophyllum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) 11. 403.—Chili.
calvefactum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 226 = lanceae-folium.
calycinum, Hort. ex Dun. l. c. 431 = *Saracha procumbens*.
calycinum, Moq. & Sesse, ex Dun. Solan. Syn. 10 = calicinum.
calycinum, Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 60 = pubescens.
calygnaphalum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 31 = gnaphaloides.
campaniforme, Roem. & Schult. Syst. iv. 662.—Bras.
campanulatum, R. Br. Prod. 446.—Austral.
campanulatum, Willd. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 22 = campaniforme.
campechiense, Banks, ex Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 251 = aculeatissimum, Jacq.
campechiense, Hort. Par. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 260 = torvum.
campechiense, Linn. Sp. Pl. 187.—Am. trop.
campechiense, Linn. l. c., partim = fuscum, Linn.
campylacanthum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 24, nomen; Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 336.—Abyss.
campylocladum, Dun. l. c. 173.—Mexic.
canarium, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 236 = trilobatum.
candicans, Dun. Solan. Syn. 23.—Peruv.
candidum, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 73.—Mexic.
canescens, Blume, Bijdr. 701 = indicum.
canescens, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 440 = nigrum.
canescens, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 343 = mexicanum.
canescens, Rich. ex Dun. l. c. 107 = *S. Radula*.
cano-cinereum, Dun. l. c. 213.—Guian.
capense, Linn. Syst. ed. X. 935; Linn. f. Suppl. 147.—Afr. austr.
capoerum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 112.—Bras.
Capsicastrum, Link. ex Schau. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i (1833) 228.—Bras.
capsicoides, Hort. Par. ex Lam. Illustr. ii. 21 = aculeatissimum, Jacq.
capsicoides, Mart. in Flora, xxi. (1838) 11. Beibl. 78.—Bras.
caracasana, Roem. & Schult. Syst. iv. 664 = *Cyphomandra caracasana*.
cardiophyllum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 89 = holdoense.
cardiophyllum, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 70.—Mexic.
cardiospermum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 (Quid?).—Java.
cardiiforme, F. Muell. Fragm. ii. 163.—Austral.
carene, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 105.—Arab.
Carl. Molina, Sagg. Chile, 132.—Chili.
caribaeum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 48.—Ind. occ.
caripense, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 8.—Venezuela.
carolinense, Linn. Sp. Pl. 187.—Am. bor.
caroliniense, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 21 = amazonium.
cataphractum, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. iv. 459.—Austral.
catombelense, Peyr. in Sitzb. Akad. Wien, Math.-Nat. xxxviii. (1860) 576.—Afr. trop.
caudatum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 140.—Peruv.
caulorhizum, Dun. l. c. 181 = biflorum.
Cavanillesii, Dun. l. c. 61 = pinnatum.
cearensis, Dun. l. c. 90.—Bras.
dechicum, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 94 (Quid?).—Bohem.
celastroides, Sendt. ex Mart. in Flora, xxiv. (1841) 11. Beibl. 86 = *Bassovia lucida*.
cerasiferum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 365.—Afr. bor.
cerinum, Hort. Dresd. ex Otto, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 8 = villosum, Willd.
cernuum, Vell. Fl. Flum. 84; ii. t. 103.—Bras.
Cervantesii, Lag. Gen. et Sp. Nov. 10.—Mexic.
cestrifolium, Jacq. ex Weinw. Elench. Hort. Pawlowsk. (1824) 100; et in Spreng. Syst. i. 680 = nigrum.
cestrifolium, Willd. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 186 = seq.
cestrophyllum, Dun. l. c.—Hab. ?
chaecanthum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 190.—Cuba.

SOLANUM:—

chaetacanthum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 186.—Bras.
chenopodiifolium, Dun. l. c. 44.—Reg. Argent.
chenopodium, F. Muell. Fragm. ii. 165.—Austral.
chenopodioides, Hort. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 55 = atriplicifolium.
chenopodioides, Lam. Illustr. ii. 18 = nigrum.
chinense, Dun. Hist. Solan. 240 = indicum.
chloranthum, DC. Pl. Rar. Gard. Genév. t. 13.—Reg. Argent.
chloranthum, Poepp. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 103 = Poeppigianum.
chloranthum, Salzm. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 236 = argillicolm.
chloranthum, Spreng. Syst. i. 682 = Sprengelii.
chlorocarpum, Schur, Enum. Pl. Transs. 478 = nigrum.
chloroleucum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 279.—Bras.
chloropetalon, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 291.—Mexic.
chlorophloeum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = umbellatum, Mill.
chrysacanthum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 330.—Mexic.
chrysobotrys, Hort. Berol. ex Walp. Rep. iii. 100 = *Lycopersicum peruvianum*.
chrysophyllum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 25.—Ecuador.
chrysotrichum, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 304.—Mexic.
ciliare, Willd. Enum. Hort. Berol. 237 = aculeatissimum, Jacq.
ciliatum, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 643 = nematosepalum.
ciliatum, Lam. Illustr. ii. 21 = aculeatissimum, Jacq.
ciliolatum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 1. (1845) 140.—Mexic.
cinereus, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 343 = mexicanum.
cinereum, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62 = *Saltianum*.
cinereum, R. Br. Prod. 446.—Austral.
cinnamomeum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 44.—Bras.
cirrhum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 9. (cyrrhum).—Venezuela.
citrifolium, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 662.—N. Granat.
citrullifolium, A. Br. in Ind. Sem. Hort. Friburg. (1849); ex Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 356 = heterodoxum.
cladotrichodes, Mart. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 28 = megalochiton.
cladotrichum, Dun. Hist. Solan. 236.—Bras.
cladotrichum, Mart. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 223 = paratyense.
clathratum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 35.—Am. trop.
Claussenii, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 271.—Bras.
claviceps, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 221.—Reg. Argent.
coagulans, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 47 = incanum, Linn.
coagulans, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 35. t. 469 = schoenbrunnense.
coagulans, Schimp. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 370 = marginatum.
coarensis, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 19.—Bras.
coccineum, Hort. Par. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 310 = indicum.
coccineum, Jacq. Misc. ii. 329 = tomentosum, Linn.
coeruleum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = cyanocarpium.
collinum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 36 = *Commerstonii*.
columbianum, Dun. l. c. 33 = *tuberosum*.
Comitis, Dun. l. c. 345.—Java.
comitum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = prae.
Commerstonii, Dun. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 746.—Reg. Argent.
commutatum, Spreng. Pugill. i. 18 = *Lycopersicum peruvianum*.
compactum, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1872) 641 = *S. Pseudo-capsicum*.
conanthum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 127 = pubescens.
conavum, Lindl. in Bot. Reg. (1842) Misc. 57.—Chili.
concinnum, Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 36.—Bras.

SOLANUM:—

concisum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 327.—Peruv.
confertum, Dun. l. c. 142 = *indigoferum*.
confine, Dun. l. c. 137.—Peruv.
congenise, Link. Enum. Hort. Berol. i. 187.—Afr. trop.
congestiflorum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 92.—Chili.
congestum, Vell. Fl. Flum. 82; ii. t. 90 (*Lycii* sp.).—Bras.
conglobatum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 112.—Bras.
conicum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 38. t. 172. f. b.—Peruv.
conicum, Vell. Fl. Flum. 83; ii. t. 96 = *Cyphomandra sciadostylis*.
coniodes, Mor. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 64 = *Chamaesaracha sordida*.
conocarpum, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 748.—Ind. occ.
convolvuliforme, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = seq.
Convolvulus, Sendt. in Mart. Fl. Bras. 48.—Bras.
cordatum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 47.—Arab.
cordatum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 396 = *Cyphomandra splendens*.
cordifolium, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 764.—Bras.
coriaceum, Dun. Hist. Solan. 197.—Guian.
coriaceum, Hook. Bot. Mag. t. 2703 = *havanense*, Jacq.
corifolium, F. Muell. Fragm. ii. 166 = *discolor*.
cormanthum, Vell. Fl. Flum. 86; ii. t. 113.—Bras.
corniculatum, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 45.—Bras.
conifolium, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 21.—N. Granat.
comigerum, André, in Rev. Hort. (1868) 33.—Afr. trop.
comigerum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 75.—Bras.
cornutum, Hort. Monsp. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 329 = *rostratum*.
cornutum, Lam. Illustr. ii. 25.—Mexic.
coronatum, Vell. Fl. Flum. 82; ii. t. 92 = *sambuciflorum*.
coronopideum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = seq.
Coronopus, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 64 = *Chamaesaracha coronopus*.
cortex-virens, Dun. l. c. 372 = *umbellatum*, Mill.
corymbiferum, J. F. Gmel. Syst. 384 = *corymbosum*.
corymbosum, Herb. Banks, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 347 = *macrophyllum*.
corymbosum, Jacq. Coll. i. 78.—Peruv.
corymbosum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = *verbascifolium*.
corymbosum, Wight, ex Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 48 = *vagum*.
cosmeticum, Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa, 340, nomen.—Abyss.
Cotoneaster, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 158 = *Orbig-nianum*.
cotopaxense, Dun. l. c. 139.—Ecuador.
Coxi, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 200.—Chili.
crassiflorum, Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 20 = *S. Caavurana*.
crassifolium, Lam. Illustr. ii. 16.—Afr. austr.
crassifolium, Ortega, Hort. Matr. Dec. 117 = *Cyphomandra betacea*.
crassifolium, Salisb. Prod. 133 = *macrocarpon*.
crassipetalum, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 256.—Reg. Himal.
crassipetalum, Wight, ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 231 = *denticulatum*.
crenato-dentatum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 54 = *nigrum*.
Crepini, Heurck, Obs. Bot. 89.—Afr. trop.
crinitipes, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 317.—N. Granat.
crinitum, Lam. Illustr. ii. 20.—Guian.
crispum, Bert. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 92 = *congestiflorum*.
crispum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 31. t. 158.—Chili.
croceum, Dun. Hist. Solan. 241 = *jamaicense*.
crotonifolium, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 18.—Am. austr.
crotonoides, Lam. Illustr. ii. 24.—Ind. occ.
crotonoides, Michx. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 260 = *torvum*.

SOLANUM:—

- crotonoides*, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 101 = lanceaeefolium.
cryptolobum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 63.—Hab.?
cryptopodium, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 227, sphalm. = cyrtopodium.
cubense, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 379, nomen.—Cuba.
cumanense, Schlecht. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 662 = sylvaticum.
Cumingii, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 363 = S. Melongena.
cuneatum, Moench, Meth. 476 = indicum.
cuneifolium, Dun. Hist. Solan. 193 = jamaicense.
cuneifolium, Hort. Avens. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 53 = nigrum.
cuneifolium, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 623 = Willdenovianum.
Cunninghamii, Benth. Fl. Austral. iv. 465.—Austral.
cupulatum, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 231 = bigeminatum.
curvispinum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 265.—Bras.
cuspidatum, Dun. l. c. 111 = cinnamomeum.
cuspidatortia, Dun. l. c. 231 = Poeppigianum.
cutacense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 38.—Peruv.
cyananthum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 316.—Bras.
cyanocarphium, Blume, Bijdr. 700.—Java.
cyathocalyx, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 65.—Peruv.
cydoniaefolium, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 209.—Hab.?
cylindricum, Vell. Fl. Flum. 87; ii. t. 119 = Cyphomandra cylindrica.
cyosum, Banks, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 73 = viride.
cyosum, Ortega, Hort. Matr. Dec. 12 = macrophyllum.
cyosum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 31. t. 160 = corymbosum.
cynanchoideis, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 82 = jasmnoides.
cyrtopodium, Dun. l. c. 195.—Chili.
Dallachii, Benth. Fl. Austral. iv. 456.—Austral.
darfurensis, Delile, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 204 = albicaule.
dasyphyllum, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 126.—Afr. trop.
dasyopodum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = seq.
dasyopus, Drège, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 161.—Afr. austr.
daturaefolium, Dun. l. c. 261.—Bras.
dealbatum, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 52 = elaeagnifolium.
debile, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 74.—Bras.
decendentatum, Roxb. Hort. Beng. 16; Fl. Ind. i. 565 = biflorum.
decemfidum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 173 = lentum.
decipiens, Opiz, in Bercht. & Opiz, Oekon. Fl. Boehm. iii. 24 (Quid?).—Bohemia.
decompositifolium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 88.—Bras.
decorticans, Sendt. l. c. 47.—Bras.
decorticutum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 135 = praec.
decorum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 83.—Bras.
decurrens, Balb. in Mém. Acad. Turin (1810), 360 = sisymbriifolium.
decurrens, Banks, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 200 = jamaicense.
decurrens, Vell. Fl. Flum. 89; ii. t. 126.—Bras.
decurrens, Wall. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 50 = nigrum.
defensum, F. Muell. Fragm. v. 193.—Austral.
delagoënsis, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 349.—Afr. trop.
Delilei, Dun. l. c. 81.—Mexic.
demerarensis, Dun. l. c. 257 = stramonifolium.
demissum, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 70 = tuberosum.
densevestitum, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 456.—Austral.
densiflorum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 208 = athroanthum.
densiflorum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 1. (1845) 141.—Mexic.

SOLANUM:—

- densiflorum*, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 93 = piluliferum.
denticulatum, Blume, Bijdr. 697.—Ind. or.; Malaya.
denticulatum, Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 41 = subtruncatum.
depauperatum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 227.—Bras.
Deppei, Hort. ex Dun. l. c. 52 = nigrum.
Desvauxii, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 26.—Ind. occ.
diantherum, Vell. Fl. Flum. 83; ii. t. 99 = concinnum.
dianthophorum, Dun. Hist. Solan. 183.—Austral.
dibrachiatum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 59.—Peruv.
dichotomum, Lour. Fl. Cochinch. 129.—China.
dichotomum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 1. (1845) 138 = Martensii.
dichotomum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 233 = bicornue.
dichotomum, Rich. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 757 = uniflorum.
dichotomum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 34 = riparium.
dichotomum, Vand. Fasc. Pl. 9 = Vandellianum.
dichroandrum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 86.—Venezuela.
dichrophyllum, Dun. l. c. 48 = alpinum.
dictyotum, Roem. & Schult. Syst. iv. 661.—Hab.?
didymanthum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 289.—Afr. austr.
didymum, Dun. Hist. Solan. 236.—Bras.
diffusum, Link, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 601 = Linkianum.
diffusum, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 568 = xanthocarpum.
diffusum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 37. t. 171. f. b.—Peruv.
diffusum, Vell. Fl. Flum. 83; ii. t. 98 = nigrum.
diflorum, Vell. l. c. 84; ii. t. 102 = S. Capsicastrum.
Dilleni, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 393 = nigrum.
dimidiatum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 102.—Bras.
diphyllum, Banks, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 170 = retrofractum.
diphyllum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 63 = microcarpum.
diphyllum, Linn. Sp. Pl. 184.—Am. trop.
diphyllum, Osbeck, Voy. i. 328; et ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 96 = biflorum.
discolor, R. Br. Prod. 445.—Austral.
discolor, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 111 = leucodendron.
dispar, Loisel. ex Dun. l. c. 69 = aviculare.
distichophyllum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 35.—Bras.
distichum, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 122.—Afr. trop.
divaricatum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 125 = didymum.
divaricatum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 1. (1845) 136.—Mexic.
divergens, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 411 = Bassovia leptopoda.
diversiflorum, F. Muell. Fragm. vi. 146.—Austral.
diversifolium, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 8 = Cyphomandra caracasana.
diversifolium, Schlecht. in Linnaea, xix. (1846) 297.—Mexic.
Dombeyi, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 162.—Peruv.
domingense, Dun. l. c. 80.—Ins. S. Doming.
domingense, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 665 = insulanum.
Donianum, Walp. Rep. iii. 54 = bahamense.
Douglasii, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 48 = nigrum.
Douvillei, Moric. ex Dun. l. c. 271.—Bras.
Dregei, Dun. l. c. 288.—Afr. austr.
Dregei, Presl, Bot. Bemerk. 101 = aculeastrum.
dryadeum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 196.—Bras.
dubium, Dun. Hist. Solan. 240 = jamaicense.
dubium, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1833) 166.—Arab.
Dulcamara, Linn. Sp. Pl. 185.—Europ.; As. et Afr. bor.
dulcamaroides, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 751 = macrantherum.
dulcamaroides, Rich. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 87 = pyrifolium.
dulcamarum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = S. Dulcamara.

SOLANUM:—

- dumetorum*, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 112 = rufescens.
dumetorum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 662.—Hab.?
Dunalium, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 448. t. 58.—Ins. Molucc.
duplo-sinuatum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 233.—Afr. trop.
eccremocarpum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 225.—Bras.
Echegarayi, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, ix. (1881) 58.—Reg. Argent.
echidnaeforme, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 324.—Bras.
echinatum, R. Br. Prod. 447.—Austral.
echinatum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 173 = lentum.
echinatum, Rich. ex Dun. l. c. 317 = crinitum.
echinocarpum, Bredem. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 659.—Venezuela.
echinocaulon, Moric. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 316 = cyananthum.
Edmonstonei, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 201.—Ins. Galapag.
edule, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 125 = S. Melongena.
edule, Vell. Fl. Flum. 88; ii. t. 121 = sisymbriifolium.
Edwardi, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846); ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 107.—Cuba.
elachophyllum, F. Muell. Fragm. ii. 164.—Austral.
elaegnifolium, Cav. Ic. iii. 22. t. 243.—Am. trop.
elaegnifolium, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 602 = obtusifolium.
elatum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 186.—Hab.?
elegans, Dun. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 769 = cinereum.
elegans, Vell. Fl. Flum. 83; ii. t. 95 = Cyphomandra Velloziana.
ellipticum, R. Br. Prod. 446.—Austral.
ellipticum, Vell. Fl. Flum. 84; ii. t. 100 = Cyphomandra elliptica.
elongatum, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 611 = virgatum.
Endlicheri, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 67.—Peruv.
enneodonton, Delile, ex Dun. l. c. 257 = robustum.
enoplocalyx, Dun. l. c. 222.—Peruv.
ensifolium, Dun. l. c. 186.—Mexic.
eremanthum, Dun. l. c. 129.—Bras.
eremophilum, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 432.—Austral.
erianthum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 96 = verbascifolium.
ericalyx, Dun. Hist. Solan. 237.—N. Granat.
ericalyx, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 124 = trichocalyx.
eriocarpum, Dun. l. c. 131 = gnaphalocarpum.
eriphorum, Dun. l. c. 249 = barbisetum.
eriphyllum, Dun. Solan. Syn. 30 = lasiophyllum, Dun.
erosum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 83 = indicum.
erythracanthum, Boj. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 201.—Madag.
erythraeum, Dun. Hist. Solan. 238 = nigrum.
erythrocarpon, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 109 = nigrum.
Eschweillerianum, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 642 = Blumei.
esculentum, Drège, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 367 = subexarmatum.
esculentum, Dun. Hist. Solan. 208. t. 3 = S. Melongena.
esculentum, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 119 = tuberosum.
Esenbeckii, Steud. Nom. ed. II. ii. 602 = pubescens.
esuriale, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 43.—Austral.
etuberosum, Lindl. Bot. Reg. t. 1712.—Chili.
euacanthum, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 37.—Chili.
euracanthum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 257 = robustum.
evonymoides, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 81.—Chili.
evonymoides, Sendt. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 87.—Bras.
exasperatum, Drège, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 104.—Afr. austr.

SOLANUM :—

- excelsum, *A. St. Hil. Voy. Distr. Diam.* i. 104.—Bras.
excelsum, Salisb. *Prod.* 133 = bonariense.
 extraaxillare, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1154, nomen.—Guian.
farinosum, Wall. *Cat. n.* 2610 = giganteum.
fasciatum, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 664; Steud. *Nom.* ed. II. ii. 602, sphalm. = fuscum, *Roem. & Schult. ? fasciculatum*, Mart. in *Flora*, xxi. (1838) Beibl. II. 81 = *Bassovia lucida*.
fasciculatum, F. Muell. *Fragm.* i. 123 = simile.
fasciculatum, Vell. *Fl. Flum.* 85; ii. t. 106 = *Bassovia fasciculata*.
fastigiatum, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 235.—Mexic.
Fendleri, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxii. (1856) 285 = tuberosum.
Fendleri, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 130.—Panama.
fernandezianum, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 23.—Chili.
ferocissimum, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 58.—Austral.
ferox, Burm. f. *Fl. Ind.* 56 = xanthocarpum?
ferox, Jungh. ex Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 650 = indicum.
ferox, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 267.—As. trop.
ferox, Mill. ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 299 = tomentosum.
ferrugineum, Jacq. *Hort. Schoenb.* iii. 46. t. 334 = torvum.
Feuillei, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 70.—Chili.
ficifolium, Ortega, *Hort. Matr.* Dec. 116 = torvum.
ficifolium, Pav. ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 350 = *Zuccagnianum*.
Fieldingi, Moric. ex Dun. l. c. 188.—Bras.
filiforme, Pav. ex Dun. l. c. 431 = *Saracha alata*.
filiforme, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 31. t. 159.—Peruv.
filipes, Dnn. in *DC. Prod.* xiii. i. 138 = rivulare.
fitulosum, Dnn. ex Poir. *Encyc. Suppl.* iii. 749 = nigrum.
flaccidum, Vell. *Fl. Flum.* 87; ii. t. 115.—Bras.
flagellare, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 68.—Bras.
flagelliferum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 213.—Madag.
flagrans, Tenore, *Sem. Ort. Bot. Nap.* (1839) 12; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xiii. (1840) 381 = inaequale.
flavescens, Dun. *Solan. Syn.* 42 = hirtum.
flavidum, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 227 = *elaegnifolium*.
flavum, Kit. in *Schult. Oestr. Fl. ed. II.* ii. 394 = nigrum.
flexicaule, Benth. *Bot. Voy. Sulph.* 141.—Am. austr.
flexuosum, Banks, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 170 = retrofractum.
flexuosum, Heyne, ex Nees, in *Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 42 = bigeminatum.
flexuosum, Pav. ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 173 = campylocladum.
flexuosum, Vahl, *Eclog. Am.* i. 22 = lanceaefolium.
flexuosum, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 662 — Ins. S. Doming.
floccosum, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 133 = pachimatum.
floccosum, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 141 = Hartwegi.
floccosum, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 337, nomen.—Ins. Timor.
floribundum, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 92 = congestiflorum.
floribundum, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 63.—Bras.
floridanum, Shutt. ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 306 (sp. dub.).—Florida.
fluminense, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 602 = *Cyphomandra sciadostylis*.
foetidum, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 33 = *S. Caavurana*.
foetidum, Rottb. in *Act. Lit. Univ. Hafn.* i. (1778) 287 = *Rottboellianum*.
foetidum, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 39. t. 165. f. b.—Peruv.
foliosum, Link, in *Buch, Besch. Canar. Ins.* 144 = *Lycopersicum Humboldtii*.
Fontanesianum, Dun. in *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 777.—Bras.
Fontanesianum, Schrank, *Pl. Rar. Hort. Monac.* t. 18 = nigrum, tectum.
formosum, Humb. & Bonpl. ex Dun. *Solan. Syn.* 35.—Venezuela.
formosum, Weinm. *Cat. Hort. Dorpat.* (1810) 145 = *sismibrifolium*.

SOLANUM :—

- Forskålii, *Dun. Hist. Solan.* 237.—Arab.
 Forsteri, *Seem. in Journ. Bot.* i. (1863) 207.—Ins. Pacif.
 fossarum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 145.—Bras.
 fragile, Wedd. *Chlor. And.* ii. 105 = atriplicifolium.
 fragile, Wright, ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 189.—Cuba.
 fragrans, Hook. *Bot. Mag.* t. 3684 = *Cyphomandra fragrans*.
 fraxinifolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 39.—N. Granat.
 fructu-tecto, Cav. *lc.* iv. 5 = tectum.
 frutescens, A. Br. & Bouché, in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) App. 9.—Venezuela.
 fruticosum, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 18 = bahamense.
 fugax, Bert. ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 170 = sylvaticum.
 fugax, Jacq. *Coll.* iv. 123.—Am. austr.
 fulum, Schrank, ex Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 49.—Bras.
 fulvum, Hiern, ex Warm. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 49.—Bras.
 furcatum, *Dun. in Poir. Encyc. Suppl.* iii. 750.—Peruv.
 furfuraceum, R. Br. *Prod.* 446.—Austral.
 fuscum, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 268.—Am. centr.; Ind. occ.
 fuscum, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 872 (Index).—Am. austr.
 fuscum, Heyne, ex Wall. *Cat. n.* 2622 B = trilobatum.
 galeatum, André, in *Rev. Hortic.* (1862) 331.—Austral.
 Galeotti, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 82.—Mexic.
 Gardneri, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 69.—Bras.
 Gaudichaudi, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 60.—Chili.
 Gayanum, Phil. f. *Cat. Pl. Vasc. Chil.* 228.—Chili.
 gemellum, Mart. ex Sendt. in *Fl. Bras.* x. 28 = didymum.
 geminatum, Vahl, *Eclog. Am.* i. 21.—Guian.
 geminiflorum, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, v. (1830) 112 = *Schlechtendalianum*.
 geminiflorum, Drège, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 289 = didymanthum.
 geminiflorum, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 142.—Mexic.
 geminifolium, Schlecht. in *Linnaea*, viii. (1833) 255 = *Schlechtendalianum*.
 geminifolium, Thonn. in *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 121.—Afr. trop.
 geniculatum, Drège, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 105.—Afr. austr.
 genistoides, Dun. l. c. 85 = umbelliferum.
 Germaini, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 23.—Chili.
 giftbergense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 288.—Afr. austr.
 giganteum, Jacq. *Coll.* iv. 125.—Ind. or.
 Gilo, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xviii. *Fis.* (1820) 410.—Bras.
 Gilo, Requier, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 360 = integrifolium.
 glabellum, Dun. l. c. 142 = indigoferum.
 glaberrimum, Dun. in *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 747 = aviculare.
 glabratum, *Dun. Solan. Syn.* 49.—Arabia.
 glabrescens, Schrank, ex Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 39 = rufescens.
 glabrum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 102.—Mexic.
 glandulosum, Banks, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 166 = guianense, *Dun.*
 glandulosum, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 35. t. 167.—Peruv.
 glandulosum, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 52 = japurense.
 glaucescens, Bacle, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 100 = glaucum.
 glaucescens, Zuccar. in *Abh. Akad. Muench.* ii. (1831-36) 325.—Mexic.
 glaucophyllum, Desf. *Cat. Pl. Hort. Par. ed. III.* 396 = glaucum.
 glaucum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 100; Bertol. *Misc. Bot.* xii. 46.—Bras.
 Glaziovii, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 47.—Bras.
 globiferum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 251.—Ins. Martinic.
 glomuliflorum, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 24.—Bras.

SOLANUM :—

- glutinosum, *Dun. in Poir. Encyc. Suppl.* iii. 79.—Mexic.
 gnaphalocarpum, Vell. *Fl. Flum.* 82; ii. t. 91.—Bras.
 gnaphaloides, Pers. *Syn.* i. 223.—Peruv.
 gomphodes, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 339.—Bras.
 gomphoidellum, Moric. ex Dun. l. c. 215.—Bras.
 gonocladum, *Dun. l. c.* 93.—Bolivia.
 gossypinum, *Dun. l. c.* 208.—Bras.
 Gouakai, *Dun. l. c.* 177 = denticulatum.
 Goudoti, *Dun. l. c.* 158.—Peruv.
 gracile, Moric. ex Dun. l. c. 238 = litocladum.
 gracile, Otto, ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 673; *Dun. l. c.* 54.—Am. trop.
 gracile, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 13 = Endlicheri.
 graciliflorum, *Dun. ex Poir. Encyc. Suppl.* iii. 763.—Java.
 gracilipes, Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 113. t. 119.—Ind. bor. occ.
 gracillimum, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 36.—Bras.
 grandiflorum, Desf. *Hist. Arb.* i. 169 = macrophyllum.
 grandiflorum, Hort. ex Steud. *Nom. ed. I.* 791 = bonariense.
 grandiflorum, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 35. t. 168.—Peruv.
 grandiflorum, Sieber, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 325 = Richardi.
 grandiflorum, Vahl, ex Dun. l. c. 313 = dasyphyllum.
 granuloso-leprosum, *Dun. l. c.* 115.—Mexic.
 graveolens, Bunbury, in *Proc. Linn. Soc.* i. (1841) 110.—Bras.
 greviaefolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 119.—Bras.
 grossedentatum, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 101.—Abyss.
 guaraniticum, A. St. Hil. in *Mém. Mus. Par.* xii. (1825) 321.—Bras.
 guianense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 166.—Guian.
 guianense, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1154, nomen.—Guian.
 guineense, Hill, *Veg. Syst.* ix. 34, sphalm. = guineense, Linn.
 guineense, Lam. *Illustr.* ii. 18 = nigrum.
 guineense, Linn. *Sp. Pl.* 184 = aggregatum.
 Gula, Buch.-Ham. in *Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 267 = xanthocarpum.
 Gussonei, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 380 = cestrophyllum?
 haematocladum, *Dun. l. c.* 230.—Bolivia.
 hainanense, Hance, in *Journ. Bot.* vi. (1868) 331.—China.
 haitense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 167.—Ins. S. Doming.
 Hartwegi, Benth. *Pl. Hartw.* 68.—Mexic.
 hastatum, Mart. ex Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 61.—Bras.
 hastifolium, Hochst. ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 284.—Afr. trop.
 havanense, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 15; Linn. *Mant.* i. 47.—Am. trop.
 havanense, Vell. *Fl. Flum.* 82; ii. t. 94.—Bras.
 hebecarpum, Salz. ex Sendt. in *Fl. Bras.* x. 41.—Bras.
 hebephorum, Humb. & Bonpl. ex Dun. *Solan. Syn.* 7.—Peruv.
 hedjazense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 292.—Arab.
 heliotropifolium, *Dun. l. c.* 117 = Sellovianum.
 hendecandraefolium, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1154, nomen.—Guian.
 Herbertianum, Paxt. *Mag. Bot.* v. (1838) 269.—Hab.?
 Hermannii, *Dun. Hist. Solan.* 212 = sodeum.
 Hernandesii, *Dun. in Poir. Encyc. Suppl.* iii. 771.—Mexic.
 heteracanthum, *Dun. l. c.* 773 = *S. Melongena*.
 heterandrum, Juss. in *Ann. Mus. Par.* iii. (1804) 120, in textu = cornutum.
 heterandrum, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 156; ii. 731. t. 7.—Am. bor.
 Heteranthera, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 663 = cotopaxense.
 heteroclitum, Sendt. in *Flora*, xxix. (1846) 193.—Guatemala.
 heterodoxum, Andrieux, ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 330 = chrysacanthum.
 heterodoxum, *Dun. Hist. Solan.* 235. t. 25.—Mexic.
 heterogonum, Hort. ex Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 52 = nigrum.
 heteromorphum, *Dun. l. c.* 80.—Bras.
 heterophyllum, Balb. ex Dun. l. c. 260 = torvum.

SOLANUM:—

heterophyllum, Lam. Illustr. ii. 22 = *S. Juripeba*.
heterophyllum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 664 = *Cyphomandra caracasana*.
heterotricum, Dun. Hist. Solan. 192. t. 20 = *jamai-cense*.
Heudeloti, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 205.—Afr. trop.
hexandrum, Steud. Nom. ed. II. i. 87, sphalm. = *rostratum*.
hexandrum, Vell. Fl. Flum. 88; ii. t. 122 = *maroniense*.
Heynii, Roem. & Schult. Syst. iv. 669 = *indicum*.
hierochunticum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 369 = *incanum*.
Hildebrandtii, A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1874) 8.—Afr. trop.
himalense, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 300 = *indicum*.
Hindsianum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 39 = *elaeagni-folium*.
hirsutum, Balb. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 198 = *cordifolium*.
hirsutum, Dun. Hist. Solan. 158 = *nigrum*.
hirsutum, Herb. Peurari, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 252 = *stramonifolium*.
hirsutum, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 109 = *carolinense*.
hirsutum, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 571 = *ferox*.
hirtulum, Steud. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 44.—Abyss.
hirtum, Vahl, Symb. Bot. ii. 40.—Ins. Trinitat.
hispidum, Pers. Syn. i. 228.—Peruv.
Hoffmanseggii, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 112.—Bras.
Hohenackeri, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 87 = *Wightii*.
Hookerianum, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 9 = *havanense*, Jacq.
horridissimum, Hort. Par. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 59 = *aculeatissimum*, Jacq.
horridum, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 763.—Austral.: Timor.
horridum, Salisb. Prod. 134 = *aculeatisimum*, Jacq.
Hostmanni, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 184.—Guian.
Houstonii, Dun. Hist. Solan. 243.—Mexic.
Hovei, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 311.—Ind. or.
Humboldti, Dun. l. c. 216.—Mexic.
Humboldtii, Willd. Hort. Berol. i. 27 = *Lycopersicum esculentum*.
humifusum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 237.—Bras.
humile, Bernh. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 236 = *nigrum*.
humile, Lam. Illustr. ii. 23 = *rigescens*.
humile, Salisb. Prod. 134 = *nigrum*.
hybridum, Dun. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 441 = *inclusum*.
hybridum, Jacq. Hort. Vindob. ii. 51. t. 113.—Afr. trop.
hyemale, Salisb. Prod. 133 = *S. Pseudo-capsicum*.
hygrophilum, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 254.—Mexic.
hyporhodium, A. Br. & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 10.—Austral.
hystricinum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *seq.*
Hystrix, R. Br. Prod. 446.—Austral.
Hystrix, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 295 = *armatum*.
igneum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 270.—Ind. occ.
ilicifolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 190.—Bras.
imamense, Dun. l. c. 85.—Madag.
immane, Hance, ex Walp. Ann. iii. 165 = *ferox*.
inimite, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 32 = *tuberosum*.
impediens, Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 162.—Bras.
inaequale, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 26.—Hab. ?
inaequale, Presl, Bot. Bemerck. 101 = *lanceaefolium*.
inaequale, Vell. Fl. Flum. 87; ii. t. 116.—Bras.
inamoenum, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 228 = *tetrandrum*.
incanum, Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 395 = *nigrum*.
incanum, Linn. Sp. Pl. 188; Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 45.—Afr. occ.; As. or.
incanum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 369 = *pyriforme*.
incanum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 40 = *albidum*.
incanum, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 39.—N. Guin.

SOLANUM:—

incarceratum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 40. t. 176.—Am. trop.
incertum, Dun. Hist. Solan. 155 = *nigrum*.
incisum, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 251.—Reg. Argent.
inclusum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 441.—Ind. occ.
incompletum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 311.—Ins. Pacif.
incurvum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 34. t. 164.—Peruv.
indecum, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 121.—Cuba.
indicum, Linn. Sp. Pl. 187.—Reg. trop.
indicum, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 570 = *S. Melongena*.
indigoferum, A. St. Hil. in Mer. & De Lens, Dict. Mat. Méd. vi. 416.—Bras.
inflatum, Hornem. Hort. Hafn. i. 221 = *sisymbri-folium*.
inodorum, Vell. Fl. Flum. 85; ii. t. 107.—Bras.
inops, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 55.—Mexic.
insanum, J. B. Fisch. Livl. 202; ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 189 (Quid ?)—Ross.
insanum, Linn. Mant. i. 46 = *S. Melongena*.
insidiosum, Mart. in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 79.—Bras.
insigne, Lowe, in Journ. Hort. Soc. N. S. i. (1866) 178; Man. Fl. Mad. ii. 84.—Ins. Mader.
insulanum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 373.—Ins. S. Doming.
integerrimum, Dun. Hist. Solan. 236.—Bras.
integrifolium, Poir. in Lam. Encyc. iv. 301.—As. et Afr.
intermedium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 311 = *Hovei*.
intermedium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 22.—Bras.
involutum, Blume, Bijdr. 701.—Malaya
involutum, Kurz, For. Fl. Brit. Burm. ii. 224 = *barbisetum*.
iodotrichum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 81.—Bolivia.
Ipomoea, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 50.—Bras.
ipomoeum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *praece*.
Isabelli, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 153.—Reg. Argent.
isodynamum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 33.—Bras.
Izquierdi, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 522.—Chili.
Jacquemonti, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 287 = *gracilipes*.
Jacquinii, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 651 = *sarmentosum*.
Jacquinii, Willd. Sp. Pl. i. 1041 = *xanthocarpum*.
jamaicense, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. 17; Sw. Fl. Ind. Occ. i. 454.—Am. trop.
Jamesii, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 227.—Am. bor. occ.
japonicum, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. (1868) 420 = *Rantonnetii*.
japurense, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 174.—Bras.
jasminifolium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 13.—Bras.
jasminoides, Paxt. Mag. Bot. viii. (1841) t. 5.—Bras.
jatrophaefolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 246.—Bras.
javanicum, Dun. l. c. 176 = *biflorum*.
javitense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 42 = *monachophyllum*.
jubatum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 132 = *cernuum*.
jubatum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669 = *cyananthum*.
Jubeba, Vell. Fl. Flum. 89; ii. t. 124 = *paniculatum*, *insidiosum*.
Juciri, Mart. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 110 = *alternato-pinnatum*.
judaicum, Bess. Fl. Galic. i. 183 = *nigrum*.
judaicum, Hackel, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 53 = *Tauschii*.
juglandifolium, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 6.—N. Granat.
julocrotonoides, Klotzsch, ex Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1154, nomen.—Guian.
Junghuhnii, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 649 = *indicum*.
Juripeba, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 107.—Am. trop.
Juripeba, Vell. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 603 = *pycnanthemum*.
Jussiaei, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 767.—Bras.
kaitisis, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 157.—Ind. or.

SOLANUM:—

Karstenii, A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 10.—Venezuela.
Karstenii, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 151.—N. Granat.
khassianum, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 234.—Reg. Himal.
Kieseritzkii, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 113.—Reg. Cauc.
Kitaibeli, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 395 = *nigrum*.
Krauseanum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 204.—Chili.
Kraussianum, Buching. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 831 = *nigrum*.
laciniatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 247 = *aviculare*.
laciniatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 40 = *nemorense*.
lacteum, Vell. Fl. Flum. 82; ii. t. 93.—Bras.
lacunarium, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 18.—Austral.
laetum, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 315.—Hab. ?
laetum, Miq. Stirp. Surin. Sel. 135.—Guian.
laeve, Dun. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 751.—Ind. or.
laevigatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 32 = *laevigatum*.
lagenarium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 368.—Hab. ?
Lalandi, Dun. l. c. 210.—Bras.
Lamberti, Dun. l. c. 263.—Mexic.
lanaevestitum, Dun. l. c. 273.—Bras.
lanatum, Dun. Hist. Solan. 205.—Peruv.
lanceaefolium, Jacq. Coll. ii. 286.—Am. trop.
lanceaefolium, Salisb. Prod. 134 = *bahamense*.
lanceolatum, Cav. Ic. iii. 23. t. 245.—Mexic.
lanceolatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 33 = *patulum*.
Landbeckii, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 204.—Chili.
laniflorum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 69.—Bras.
lanigerum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 273.—Bras.
Lantana, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 36.—Bras.
lantanum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *praece*.
lanuginosum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 25.—Ecuador.
lasiantherum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 48.—Peruv.
lasianthum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 204.—N. Granat.
lasiocarpum, Dun. Hist. Solan. 222; Blume, Bijdr. 701 = *ferox*.
lasiophyllum, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 764.—Austral.
lasiophyllum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 25.—N. Granat.
lasiopodium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 679.—N. Granat.
latiflorum, Dun. l. c. 388 = *Cyphomandra calycina*.
latifolium, Dun. l. c. 353 = *repandum*.
latifolium, Poir. in Lam. Encyc. iv. 303.—Am. austr.
laurifolium, Deless. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 80 = *domingense*.
laurifolium, Dun. Hist. Solan. 165. t. 8 = *Riedlei*.
laurifolium, Hort. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 373 = *Linkii*.
laurifolium, Linn. f. Suppl. 148.—Am. austr.
laurifolium, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 20 = *subinerme*.
laurifolium, Sieber, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 115 = *verbascifolium*.
laurinum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 5.—Afr. austr.
laurinum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 154.—Bras.
laxiflorum, Dun. l. c. 234 = *viridipes*.
laxiflorum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 21.—Bras.
laxum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 124 = *megalochiton*.
laxum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 279 = *S. Dulcamara*.
laxum, Spreng. Syst. i. 684.—Reg. Argent.
Leiboldianum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 314 = *vellereum*.
leiophyllum, Benth. Pl. Hartw. 146.—Peruv.
leiophyllum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 141 = *inaequale*.
lentum, Cav. Ic. iv. 4. t. 308.—Am. trop.
lentum, Kunth, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 173 = *campylocladum*.
leontopodium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 38.—Bras.
lepidotum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 17.—N. Granat.
leprosum, Ortega, Hort. Matr. Dec. 115 = *elaeagni-folium*.
leptanthum, Dun. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 747.—Am. trop.
leptocaulon, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 40.—Bolivia.

SOLANUM:—

leptophyllum, F. Muell. *Fragm.* ii. 164 = *parvifolium*.
leptopodium, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 411 = *Bassovia leptopoda*.
leptopodium, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 57.—Peruv.
leptostachys, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 306.—Bras.
leucocarpon, Dun. in Poir. *Encyc. Suppl.* iii. 756.—Am. trop.
leucodendron, Sendt. in Mart. *Fl. Bras.* x. 43.—Bras.
leucophaeum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 290.—Afr. austr.
leucophyllum, Dun. l. c. 126 = *leontopodium*.
leucosporum, Dun. l. c. 99.—Guian.
levigatum, Dun. *Solan. Syn.* 20 = *triste*.
Leycesterianum, Savi, ex Delile, *Hort. Monsp. Ic. Pict.* vii. t. 682.—Mexic.
Lhotskianum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 248.—Bras.
Lichtensteinii, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 238.—Afr. austr.
ligustrinum, Lodd. *Bot. Cab.* t. 1963 = *crispum*.
Lima, Banks, ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 107 = *S. Radula*.
Lindheimerianum, Scheele, in *Linnaea*, xxi. (1848) 766 = *triquetrum*.
lineatum, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 31.—Peruv.
linifolium, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 152 = *spissifolium*.
Linkianum, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 601.—Bras.
Linkii, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 408.—Hab.?
Linsecumii, Buckl. in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1862 (1863) 6 = *Chamaesaracha sordida*.
lithophilum, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 434 = *ellipticum*.
litocladum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 238.—Bras.
littorale, Raab, in *Flora*, ii. (1819) 414 = *S. Dulcamara*.
lividum, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 188.—Madag.
lividum, Willd. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 310 = *indicum*.
Lobelii, Tenore, Ind. Sem. *Hort. Neap.* (1851); et in *Atti R. Ist. Incorr. Nap.* viii. (1855) 328 = *integri-folium*.
longepedunculatum, Bert. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 171 = *retrofractum*.
longiflorum, Vahl, *Eclog. Am.* i. 20.—Guian.
longifolium, Dun. *Hist. Solan.* 163.—Hab.?
longifolium, Pav. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 186 = *ensifolium*.
longipes, Dun. l. c. 85.—Afr. austr.
longum, Roxb. *Hort. Beng.* 16; *Fl. Ind.* i. 567 = *S. Melongena*.
loxense, Humb. & Bonpl. ex Dun. *Solan. Syn.* 16.—Ecuador.
lucidum, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 137 = *brachystachys*.
lucidum, Moric. *Pl. Nouv. Am.* 26. t. 18 = *Bassovia lucida*.
ludovicianum, Rafin. *Fl. Ludov.* 45 (Quid?).—Am. bor.
Lundianum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 270.—Bras.
luridum, Dun. l. c. 88 = *flaccidum*.
luridum, Pav. ex Dun. l. c. 113.—Mexic.
luridum, Salisb. *Prod.* 134 = *Lycopersicum esculentum*.
Lusitanicum, Dun. *Hist. Solan.* 238.—Lusitan.
luteiflorum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 64 = *Physalis lobata*.
luteolum, Pers. *Syn.* i. 221; Dun. *Hist. Solan.* 168.—Peruv.
luteoliflorum, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. i. 233, sphalm. = *luteiflorum*.
luteo-virescens, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 238 = *arcuatum*.
luteo-virescens, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iv. 177 = *nigrum*.
luteum, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 3 = *nigrum*.
lycioides, Domb. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 162 = *Dombeyi*.
lycioides, Linn. *Mant.* i. 46.—Peruv.
lycioides, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 41. t. 177 = *candicans*.
lyocarpum, A. St. Hil. *Voy. Distr. Diam.* i. ii. 333.—Bras.
lycoctonum, Hort. Panorm. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 103 = *Cervantesii*.
lycopersicoides, Dun. l. c. 38.—Bolivia.
Lycopersicum, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 134 = *Lycopersicum philippinarum*.
Lycopersicum, Linn. *Sp. Pl.* 185 = *Lycopersicum esculentum*.

SOLANUM:—

lyratum, Thunb. *Fl. Jap.* 92 = *S. Dulcamara*.
lysimaichoides, Wall. in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 257.—Ind. or.
macaonense, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 264 = *torvum*.
Maccai, Bert. ex Dun. l. c. 260 = *torvum*.
Maccai, Dun. in Poir. *Encyc. Suppl.* iii. 771.—Guian.
macilentum, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 105.—Abyss.
macracanthum, A. Rich. l. c. 106.—Abyss.
macranthemum, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 596, sphalm. = seq.
macrantherum, Dun. *Solan. Syn.* 16.—Am. trop.
macranthum, Bert. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 167 = *haitense*.
macranthum, Dun. *Solan. Syn.* 43.—Bras.
macranthum, Hook. *Bot. Mag.* t. 4138 = *maroniense*.
macranthum, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1867) 132, cum ic. = *Wrightii*.
macranthum, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 143 = *porphyranthum*.
macrobotryon, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 277 = *pelliceum*.
macrocalyx, Dun. l. c. 337.—Bras.
macrocarpon, Linn. *Mant.* ii. 205.—Ins. Mascar.
macrocarpon, Molina, *Sagg. Chile*, ed. II. 282.—Chili.
macrocarpon, Pav. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 352 = *quitoense*.
macrodon, Wall. *Cat. n.* 2621 = *pachypetalon*.
macronema, Sendt. in Mart. *Fl. Bras.* x. 88.—Bras.
macrophyllum, Hort. ex Dun. *Hist. Solan.* 199. t. 17.—Mexic.
macropus, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 134 = *bullatum*.
madagascariense, Dun. l. c. 99.—Madag.
Maglia, Schlecht. *Hort. Hal.* 6.—Chili.
magnifolium, F. Muell. *Fragm.* vi. 27.—Austral.
malacoxylon, Sendt. in Mart. *Fl. Bras.* x. 52.—Reg. Argent.
mammiforme, Robin, *Voy. Louis.* iii. 398 (Quid?).—Am. bor.
mammosum, Herb. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 260 = *torvum*.
mammosum, Linn. *Sp. Pl.* 187.—Am. trop.
mammosum, Lour. *Fl. Cochinch.* 162 = *stramonifolium*.
mammosum, Pav. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 140 = *caudatum*.
Mandonis, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 78.—Bolivia.
Manoelii, Moric. *Pl. Nouv. Am.* 27 = *paniculatum*.
marginatum, Linn. *f. Suppl.* 147.—Afr. trop.
Mariannae, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 307.—Bras.
maritimum, Meyen, ex Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 384.—Chili.
maroniense, Poit. in *Ann. Soc. Hort. Par.* vii. (1830) 155.—Bras.
Marsilianum, Tenore, *Cat. Orto Bot. Nap.* (1845) 96 = *inaequale*.
Martensii, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 140.—Mexic.
Martii, Dun. l. c. 399 = *Cyphomandra Fraxinella*.
Martii, Sendt. in Mart. *Fl. Bras.* x. 41.—Bras.
Martinisi, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 73.—Peruv.
Martiusianum, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 604 = *aculeatissimum*, Jacq.
mauritanum, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 134 = *verbascifolium*.
mauritianum, Scop. *Delic. Insub.* iii. 16 = *auriculatum*.
mauritanum, Willd. ex Roth, *Nov. Sp. Pl.* 131 = *sisymbriifolium*.
megalochiton, Mart. in *Flora*, xxi. (1838) II. *Beibl.* 63.—Bras.
megalochitonium, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 135 = *praec.*
megalonychium, St. Lag. l. c. 135 = seq.
megalonychium, St. Lag. l. c. viii. (1881) 161, 203 = seq.
megalonyx, Sendt. in Mart. *Fl. Bras.* x. 92.—Bras.
melanandrum, Moric. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 241.—Bras.
melancholicum, Salz. ex Dun. l. c. 200.—Bras.
melaniferum, Moric. ex Dun. l. c. 43 = *muricatum*.
melanocarpum, Dun. l. c. 355 = *S. Melongena*.
melanocarpum, Hort. ex Rev. *Hortic.* (1877) 291 = *Wallisii*.
melanocerasum, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 237 = *nigrum*.
melanospermum, F. Muell. *Fragm.* ii. 163.—Austral.

SOLANUM:—

melanoxylon, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 188.—Hab.?
Melongena, Linn. *Sp. Pl.* 186.—Geront. trop.
Melongena, Wall. *Cat. n.* 2628 = *sarmentosum*.
melongenium, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 135 = *S. Melongena*.
membranaceum, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 216 = *bigeminatum*.
membranaceum, Wall. *Cat. n.* 2625 = *laeve*.
membranaceum, Wight, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 231 = *denticulatum*.
membranifolium, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 77.—Hab.?
memphiticum, J. F. Gmel. *Syst.* 385; Mart. *Hort. Erlang.* (1814) 63 = *nigrum*.
mendax, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 61.—Peruv.
mendocianum, Gill. ex Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 387 = *atriplicifolium*.
mendocinum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1862) 11. 403.—Chili.
Menziesii, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 159.—Calif.
metrobtryon, Dun. l. c. 276.—Bras.
mexicanum, Dun. ex Poir. *Encyc. Suppl.* iii. 770.—Mexic.
mexicanum, Hill, *Veg. Syst.* ix. 39 = *modestum*?
mexicanum, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 663 = *modestum*.
micracanthos, Lam. *Illustr.* ii. 24.—Am. trop.
micranthum, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 710 = *micracanthos*.
micranthum, Hort. Monsp. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 430 = *Saracha Zuccagniana*.
micranthum, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 663 = *triste*.
microcalyx, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1154, nomen.—Guian.
microcarpum, Cerv. ex Lag. *Gen. et Sp.* Nov. 10 = *Cervantesii*.
microcarpum, Pav. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 72 = *leptanthum*.
microcarpum, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 40.—Aegypt.
microphyllum, Dun. *Hist. Solan.* 187.—Ins. S. Doming.
microphyllum, Pav. ex Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 86 = *umbelliferum*.
microspermum, Dun. *Solan. Syn.* 12.—Hab.?
Milleri, Jacq. *Coll.* iv. 209 = *capense*.
Milnei, Seem. in *Journ. Bot.* i. (1863) 210.—N. Hebrid.
minax, Mart. ex Sendt. in Mart. *Fl. Bras.* x. 71 = *maroniense*.
miniatum, Bernh. ex Willd. *Enum. Hort. Berol.* 236 = *nigrum*.
minutiflorum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 58 = *nigrum*.
mite, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 38. t. 173. f. a.—Peruv.
mitlense, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 314.—Mexic.
Mocinianum, Dun. l. c. 164 = *Mozinianum*.
modestum, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 663.—Mexic.
Moenchii, Dun. *Hist. Solan.* 242.—Hab.?
moestum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 284.—Afr. austr.
molle, Bert. ex Dun. l. c. 185 = *persicaefolium*.
molle, Burm. *f. Fl. Cap. Prod.* 5.—Afr. austr.
molle, Humb. & Bonpl. ex Dun. *Solan. Syn.* 28.—N. Granat.
molle, Schrank, *Pl. Rar. Hort. Monac.* t. 81 = *aculeatissimum*, Jacq.
mollissimum, Blume, *Bijdr.* 698 = *biflorum*.
monachophyllum, Humb. & Bonpl. ex Dun. *Solan. Syn.* 33.—Venezuela.
monadelphum, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 42.—Peruv.
monanthos, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 406 = *Bassovia lucida*.
monanthum, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 608 = *Mozinianum*.
monocarpum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 146 = *glomuliflorum*.
monodynamum, Dun. l. c. 131 = *gnaphalocarpum*.
monodynamum, Vis. Sem. *Hort. Patav.* (1841) 3 = *tricolor*.
montanum, Linn. *Sp. Pl.* 186.—Peruv.
montanum, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 32 = *tuberiferum*.
montevicense, Spreng. *Syst.* i. 684.—Reg. Argent.
monticolum, Dun. in DC. *Prod.* xiii. i. 161.—Afr. austr.
Moricandi, Dun. l. c. 319 = *stagnale*.
moschatum, J. & C. Presl, *Delic. Prag.* 77 = *nigrum*.
mossambicensis, Klotzsch, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 235.—Afr. trop.

SOLANUM :—

Mozinianum, *Dun. ex Poir. Encyc. Suppl.* iii. 757.—Mexic.
Mullus, Hort. Monsp. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 331 = heterodoxum.
 multiangulatum, *Vell. Fl. Flum.* 91; ii. t. 133.—Bras.
multifidum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 96 = biflorum.
multifidum, Lam. Illustr. ii. 17 = senecioides.
multifidum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 37. t. 171.—Peruv.
multiflorum, Roth, Nov. Pl. Sp. 130 = indicum.
 multinervium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 127.—Mexic.
 muricatum, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 250.—Peruv.; Chili.
muricatum, Bert. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 150 = rancaguense.
 murinum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 29.—Bras.
 Myosotis, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 102.—Bras.
myosotodeum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = praec.
 myoxotrichum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 426.—Madag.
myriacanthum, Dun. Hist. Solan. 218. t. 19 = aculeatissimum, Jacq.
 myrtifolium, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1431.—Am. austr.
Naraita, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2619 B = spirale.
 narense, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 18.—Am. austr.
 Nava, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 123.—Ins. Canar.
Neesianum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 175 = bigeminatum.
Neesianum, D. Dietr. Syn. Pl. i. 697 = pubescens.
Neesianum, Wall. ex Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 42 = subtruncatum.
neglectum, Bert. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 170 = sylvaticum.
neglectum, *Dun. Hist. Solan.* 177.—Ind. occ.
 Nelsoni, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 123.—Ins. Sandvic.
Nelsonii, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 337 = indicum.
 nematopus, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 93.—Bras.
 nematosepalum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 643.—Java.
 nemophilum, *F. Muell. Fragm.* ii. 161.—Austral.
 nemorensis, *Dun. Hist. Solan.* 194.—Peruv.
nicotianaefolium, Lag. Gen. et Sp. Nov. 10 = glutinosum.
 nigrescens, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 140.—Mexic.
 nigricans, *Mart. & Gal.* l. c. 134.—Mexic.
 nigrum, *Acerb. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 59 = pruinatum.
 nigrum, Leschen. ex Dun. l. c. 177 = denticulatum.
 nigrum, Linn. Sp. Pl. 186.—Amphigaea.
 nigrum, Tausch, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 53 = Tauschii.
 nilagiricum, *Schlecht. in Linnaea*, xxvi. (1853–55) 484.—Ind. or.
 Nilghiry, Noton, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 259 = giganteum.
 nitens, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 220.—Madag.
 nitens, *Opiz, in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm.* ii. 21.—Bohemia.
 nitidum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 127 = multinervium.
 nitidum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 33. t. 163.—Peruv.
 niveum, All. ex Vitm. Summa Pl. i. 492 = marginatum.
 niveum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 36; Vahl, Symb. Bot. ii. 41 = giganteum.
 noctiflorum, Hort. Aven. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 34 = stoloniferum.
 nodiflorum, Desv. ex Dun. l. c. 46 = Desvauxii.
 nodiflorum, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. 288. t. 326 = nigrum.
 Nolitangere, *Salzm. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 320.—Bras.
 nossibeense, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 329.—Madag.
 novemlobum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 70.—Chili.
 novo-granatense, *Dun. l. c.* 680.—N. Granat.
 nudum, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 20 = triste.

SOLANUM :—

nutans, Poepp. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 137 = urceolatum.
nutans, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 34. t. 166. f. a.—Am. trop.
 nyctaginoides, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 172.—Mexic.
 oaxacanum, *Dun. l. c.* 204.—Mexic.
 obliquum, Bert. ex Dun. l. c. 393 = Cyphomandra betacea.
 obliquum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 35. t. 165. f. a = Cyphomandra obliqua.
 oblitum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 126.—Peruv.
 oblongifolium, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 14.—N. Granat.
 oblongum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 34.—Peruv.
 obovatum, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 21.—Ecuador.
 obscurum, Sieber, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 224 = micracanthos.
 obscurum, Vahl, Symb. Bot. ii. 41 = S. Juripeba.
 obtusifolium, Hartw. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 95 = torvum.
 obtusifolium, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 26.—Mexic.
 obtusifolium, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 113 = amazonium.
 obtusifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 11 = Zuccagnianum.
 obtusilobum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 294 = amblymerum.
 obtusilobum, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 142.—Mexic.
 occidentale, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 308.—Amer.
 ochrandrum, *Dun. l. c.* 110.—Bras.
 ochranthum, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 6.—Ecuador.
 ochroleucum, Bast. in Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 20 = nigrum.
 ochroneurum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 186.—Bras.
 ochrophyllum, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 50.—Peruv.
 odoriferum, *Vell. Fl. Flum.* 85; ii. t. 108.—Bras.
 Oldfieldii, Carr. in Rev. Hortie. (1883) 497 = Commersoni.
 Oldfieldii, *F. Muell. Fragm.* ii. 161.—Austral.
 oleraceum, *Dun. ex Poir. Encyc. Suppl.* iii. 750 = nigrum.
 oleraceum, *Vell. Fl. Flum.* 89; ii. t. 125 = alternatopinnatum.
 oligacanthum, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 19.—Austral.
 oliganthum, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 8.—Am. austr.
 oliganthum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 182 = Linkii.
 oocarpum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 106.—Bras.
 opacum, *A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) App. 8.—Austral.
 oporinum, Willd. Enum. Hort. Berol. 238 = macrophyllum.
 oppositifolium, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 35 = urceolatum.
 opuliflorum, Portenschl. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 326 = sisymbriifolium.
 orbiculatum, *Dun. in Poir. Encyc. Suppl.* iii. 762 = parvifolium.
 Orbignianum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 34.—Bras.
 organorum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 229 = schizandrum.
 organum, Lapeyr. ex Dun. l. c. 171 = virgatum.
 orinocense, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 42.—Venezuela.
 Osbeckii, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 179 = biflorum.
 Otites, *Dun. l. c.* 39.—Venezuela.
 ovalifolium, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 37.—N. Granat.
 oviferum, Salisb. Prod. 134 = S. Melongena.
 ovigerum, *Dun. Hist. Solan.* 210 = S. Melongena.
 ovoideum, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 647 = ferox.
 oxycarpum, *Schiede, in Schlecht. Hort. Hal.* i. 5. t. 3.—Mexic.
 pachimatum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 133.—Bras.
 pachycalyx, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 92.—Afr. trop.
 pachypetalon, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 72.—Nepal.

SOLANUM :—

paleatum, Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 42 = cernuum.
 palinacanthum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 245.—Bras.
 palmetorum, *Dun. l. c.* 282.—Arab.
 Palqui, *Molina, Sagg. Chile*, ed. II. 282.—Chili.
 paludosum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 57 = nigrum.
 paludosum, *Moric. Pl. Nouv. Am.* 29. t. 20.—Bras.
 palustre, Poepp. ex Walp. Rep. iii. 39 = Caldasii.
 panamense, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* ii. 128.—Panama.
 panduraeforme, *Drège, ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 370.—Afr. austr.
 panduriforme, *Dun. l. c.* 346 = anoplocladum.
 paniculatum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 267.—Bras.
 Papa, Valenzuela, ex Palacio, in Mém. Mus. Par. ii. (1815) 340 = Valenzuelae.
 papilionaceum, *Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. Suppl.* 153; ex Walp. Rep. iii. 78 = giganteum.
 papillosum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 37 = cladotrichum.
 paposanum, Phil. Fl. Atac. 42 = phyllanthum.
 paradoxum, Schott, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 462 = Athenaea Martiana.
 paraguariense, *Dun. l. c.* 376.—Paraguay.
 parasiticum, *Blume, Bijdr.* 697.—Java.
 paratyense, *Vell. Fl. Flum.* 90; ii. t. 130.—Bras.
 Parmentieri, *Molina, ex Walp. Rep.* iii. 38 = tuberosum.
 parviflorum, Cav. Ic. iii. 19 = polyacanthos.
 parviflorum, Moris, ex Badaro, in Brugnat. Giorn. Fis. Dec. II. vii. (1824) 364 = nigrum.
 parviflorum, Usteri, Ann. Bot. vi. (1793) 61 = corymbosum.
 parvifolium, *R. Br. Prod.* 446.—Austral.
 parvifolium, Steud. Nom. ed. I. 794 = igneum.
 patellare, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 53.—Peruv.
 patens, *Lowe, Man. Fl. Mad.* ii. 74.—Ins. Mader.
 patulum, *Pers. Syn.* i. 223.—Peruv.
 patulum, Roth, Catalect. fasc. ii. 23 = nigrum.
 pauciflorum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 104 = dryadeum.
 pauciflorum, *Vahl, Eclat. Am.* i. 20.—Ins. Martinic.
 Pavoni, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 226.—Mexic.
 pectinatum, A. Cunn. ex Benth. Pl. Austral. iv. 459 = cataphractum.
 pectinatum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 250 = mammosum.
 pectinatum, Gill. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. (1843) 385 = pinnatum.
 pedunculare, *Schlecht. in Linnaea*, xix. (1847) 305.—Mexic.
 pedunculatum, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 662.—Hab. ?
 pelliceum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 82.—Bras.
 pendulipes, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 271.—Bras.
 pendulum, Link, ex Steud. Nom. ed. I. 794 = pensile.
 pendulum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 39. t. 174. f. a.—Peruv.
 pendulum, Schott, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 76 = odoriferum.
 pensile, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 50.—Bras.
 pentadactylon, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 72.—Ins. Trinit.
 pentapetaloides, Boj. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 85 = imamense.
 pentapetaloides, *Roxb. Hort. Beng.* 17, nomen; et ex *Hornem. Suppl. Hort. Hafn.* 27.—Bras.
 pentapetalum, Hort. Calc. ex Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 197 = praec. ?
 Pentlandi, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 51.—Peruv.
 perianthomega, *Vell. Fl. Flum.* 87; ii. t. 118 = megalochiton.
 persicaefolium, *Dun. Hist. Solan.* 185.—Ind. occ.
 persicaefolium, *Mart. in Flora*, xxi. (1838) II. Beibl. 78 = amygdalifolium.
 persicum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 662 = S. Dulcamara.
 peruvianum, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. t. 337 = Lycopersicum peruvianum.
 peruvianum, Linn. Sp. Pl. 186 = Lycopersicum peruvianum ?
 petrophilum, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 433.—Austral.
 pharmacum, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 234.—Afr. trop.
 phaseoloides, *Polak. in Linnaea*, xli. (1877) 585.—Costa Rica.

SOLANUM:—

Pseudo-glabrescens, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Guï.* 1154, nomen.—Guian.
Pseudo-lycopersicum, Jacq. Hort. Vindob. i. 4 = *Lycopersicum esculentum*.
Pseudo-melongena, Tenore, *Cat. Sem. Hort. Neap.* (1851) ; *et in Atti R. Ist. Incorr. Nap.* viii. (1855) 323.—Hab. ?
Pseudo-quina, A. St. Hil. *Pl. Us. Brés.* t. 21.—Bras.
Pseudo-saponaceum, Blume, *Bijdr.* 702 = *torvum*.
Pseudo-undatum, Blume, l. c. 699 = *S. Melongena*.
Pseudo-villosum, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 477 = *nigrum*.
psychotrioides, Humb. & Bonpl. *ex Dun. Solan. Syn.* 21.—N. Granat.
pteleaeifolium, Sendt. in *Mart. Fl. Bras.* x. 15.—Bras.
pteroacaulon, Reichb. *ex Nym. Consp.* 526 = seq.
pteroacaulum, Dun. *Hist. Solan.* 153 = *nigrum*.
pterocladum, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 44.—Peruv.
pteropodium, Humb. & Bonpl. *ex Dun. Solan. Syn.* 14.—Ecuador.
ptychanthum, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 54 = *nigrum*.
puberulum, Nutt. *ex Seem. in Journ. Bot.* i. (1863) 207.—Ins. Pacif.
puberulum, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857–58) 22.—Chili.
pubescens, Heyne, *ex Walp. Rep.* iii. 83 = *indicum*.
pubescens, Roxb. *Hort. Beng.* 16 ; *Fl. Ind.* i. 564 = *verbascifolium*.
pubescens, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 36 = *luteoalbum*.
pubescens, Willd. *Phyt. i.* 5.—Ind. or.
pubigerum, Dun. *Hist. Solan.* 160. t. 6 = *Cervantesii*.
pulchellum, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 18 = *esuriale*.
pulchellum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1873) 523.—Chili.
pulchrum, Dun. in *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 750.—Bras.
pulverulentum, Linn. *Syst. ed. X.* 935 = *tomentosum*.
pulverulentum, Nutt. *ex Seem. in Journ. Bot.* i. (1863) 208 = *puberulum*, Nutt.
pulverulentum, Pers. *Syn.* i. 223.—Peruv.
pulverulentum, Salisb. *Prod.* 133 = *auriculatum*.
pulvinare, Scheff. in *Ann. Jard. Buitenz.* i. (1876) 39.—N. Guin.
pumilum, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 287 = *carolinense*.
punctulatum, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 122.—Jamaic.
pungetium, R. Br. *Prod.* 446.—Austral.
pungetium, Sieber, *ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 296 = *armatum*.
puniceum, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iv. 176 = *nigrum*.
purpureum, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 372.—Hab. ?
pycnanthemum, Mart. in *Flora*, xx. (1837) II. *Beibl.* 120.—Bras.
pygmaeum, Cav. *Ic. v.* 23. t. 439. f. 2.—Reg. Argent.
Pyracantha, Sm. *Exot. Bot.* ii. 9 = *Richardi* ?
pyracanthos, Boj. *ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 325 = *Richardi*.
pyracanthum, Jacq. *Hort. Schoenb.* iv. 36 ; *Lam. Illustr.* n. 2364.—Afr. trop.
pyrethrifolium, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 250.—Reg. Argent.
pyrifolium, Lam. *Illustr.* ii. 19.—Ind. occ.
pyriforme, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 368 = *Ins. Barb.*
pyriforme, Poir. *Encyc.* iv. 291 = *Lycopersicum pyriforme*.
pyrrhocarpum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 383.—Chili.
quadrangulare, Linn. *f. Suppl.* 147.—Afr. austr.
quadriflorum, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 139.—Mexic.
quadrilobatum, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 72 = *ferox*.
quadriloculatum, F. Muell. *Fragm.* ii. 161.—Austral.
quadripartitum, Dun. in *DC. Prod.* xiii. i. 72.—Bolivia.
quercifolium, Banks, *ex Dun.* l. c. 345 = *S. Poka*.
quercifolium, Linn. *Sp. Pl.* 185.—Peruv.
quercifolium, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 16 = *Houstonii*.
quercifolium, Poepp. *ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 70 = *runcinatum*.
quercifolium, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* ii. 36 = *radicans*, Linn. *f.*

quercifolium, Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 121.—Afr. trop.
quinquangulare, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669.—Venezuela.
quitense, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 67 = repandum.
quitense, Hort. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 318 = maroniense.
quitense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 35 = seq.
quitoense, Lam. Illustr. ii. 16.—Peruv.
racemiflorum, Dun. Hist. Solan. 147.—Am. austr.
racemosum, Jacq. Enum. Pl. Carib. 15.—Ind. occ.
racemosum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 28 = ericalyx.
racemosum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = indicum.
radiatum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 53.—N. Granat.
radicans, Hill, Veg. Syst. ix. 40 (Quid?).—Peruv.
radicans, Linn. f. Dec. 1. t. 10.—N. Granat.
Radula, Vahl, Eclog. Am. ii. 16.—Am. trop.
radulatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = prae.
ramosissimum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 144.—Bras.
ramosum, Lam. Encyc. iv. 281, sphalm. = racemosum.
ramulosum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 45.—Bras.
rancagense, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 150.—Chili.
rancaguinum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 523.—Chili.
Rantonetii, Carr. in Rev. Horticult. (1868) 420, err. typ. = seq.
Rantonnetii, Carr. ex Lescuy. in Hérincq, L'Horticult. Franç. Sér. II. i. (1859) 197.—Reg. Argent.
rariflorum, Steud. Nom. ed. II. ii. 605 = Linkii.
receptum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. i. 46.—Mexic.
reclinatum, L'Hérit. ex Pers. Syn. i. 225 = aviculare.
recurvum, Hoffing. Verz. Pf. 113 = lividum.
recurvum, Poir. Encyc. Suppl. iii. 754 = incurvum.
reflexiflorum, Moric. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 213.—Bras.
reflexum, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 81 = aculeatissimum, Jacq.
refractifolium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 31.—Bras.
refractum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 304.—Mexic.
Regnelii, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 54.—Bras.
Reichenbachii, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880-82) 330.—Abyss.
Reineggeri, Opiz, in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm. iii. 11. p. xix.—Bohemia.
Renggeri, Schlecht. Hort. Hal. fasc. i. 6.—Paraguay.
Renschii, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880-82) 328.—Afr. trop.
repandum, Forst. f. Prod. 18.—Ins. Pacif.
repandum, F. Muell. Fragm. vi. 145 = Dallachii.
repandum, Vell. Fl. Flum. 88; ii. t. 123 = variabile.
repens, Dun. Hist. Solan. 239.—Bras.
repens, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = nigrum.
repens, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 39 = appendiculatum.
reptans, Bunb. in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 110.—Bras.
Requieni, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 363.—Hab.?
reticulatum, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 764 = crotonoides.
reticulatum, Juss. ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 132 = Vellozianum.
reticulatum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 661 = dictyotium.
retroflexum, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 50 = nigrum.
retrofractum, Vahl, Eclog. Am. i. 21.—Am. trop.
revolutum, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 26.—Bras.
rhamnoides, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 100.—Bolivia.
rhinocerothis, Blume, Bijdr. 695 = nigrum.
rhytidandrum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 85.—Bras.
Richardi, Dun. Solan. Syn. 45.—Ins. Martinic.
Richardi, Sieber, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 254 = hirtum.

SOLANUM:—

Riedlei, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 109.—Ind. occ.
 rigescens, *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 19. t. 42.—Afr. austr.
 rigidum, *Lam. Illustr.* ii. 23.—Hab.?
 riparium, *Pers. Syn.* i. 221.—Am. trop.
 ripense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 680.—Venezuela.
 rivulare, *Dun. l. c.* 304=rubetorum.
 rivulare, *Mart. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 25.—Bras.
 robustum, *H. Wendl. in Flora*, xxvii. (1844) 784.—Bras.
 Rodschiedii, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 111 = *S. Juripeba*.
 Roemerianum, *Scheele, in Linnaea*, xxi. (1848) 767 = elaeagnifolium.
 Rossii, *Knowl. & Westc. Flor. Cab.* ii. (1838) 141.—Mexic.
 rostratum, *Dun. Hist. Solan.* 234.—Mexic.
 rostratum, *L'Hérit. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 328 = cornutum.
 Rothelium, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 605, sphalm. = *S. Botelhanum*.
 Rothii, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 383, nomen.—Hab.?
 Rotboellianum, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 668.—Guian.
 rotundifolium, *Moric. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 301 = Nelsoni.
 Roxburghii, *Dun. ex D. Don. Prod. Fl. Nep.* 96 = biflorum.
 Roxburghii, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 57 = nigrum.
 rubetorum, *Dun. l. c.* 304.—Afr. austr.
 rubiginosum, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 17. t. 13.—Am. trop.
 rubrum, *Drège, ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 77 = quadrangulare.
 rubrum, *Linn. Syst. ed. XII.* 173.—Hab.?
 rubrum, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4* = nigrum.
 rubrum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 26 = Blumei.
 rude-pannum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 264.—Mexic.
 ruderales, *Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil.* 229.—Chili.
 ruderales, *Salisb. Prod.* 133 = *S. Dulcamara*.
 rufescens, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 228 = sideroxanthum.
 rufescens, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 39.—Bras.
 rufum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 213 = brachybotryon.
 rufum, *Rich. ex Dun. l. c.* 229 = rubiginosum.
 rufum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 91.—Bras.
 rugosum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 108.—Bras.
 rugosum, *Rich. ex Poir. Encyc. Suppl.* iii. 755 = Bassovia Richardi.
 Rumphii, *Dun. Hist. Solan.* 157 = nigrum.
 runcinatum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 36.—Peruv.; Chili.
 runcinatum, *Wendl. Bot. Beobacht.* 43 = pyracanthum.
 rupestre, *F. W. Schmidt, Fl. Boëm.* ii. 96 = *S. Dulcamara*.
 rupicolum, *Boj. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 85 = imamense.
 rupicola, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 100.—Bras.
 sabeanum, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1862 (1863) 6 = sisymbriifolium.
 Sadae, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 203.—Chili.
 Sagraeanum, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 124.—Cuba.
 salicifolium, *Phil. Sert. Mendoc. Alt.* 37.—Chili.
 salignum, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 663 = cirrhosum.
 Saltianum, *Roem. & Schult. l. c.* 669.—Abyss.
 salviaefolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 187.—Bras.
 salvifolium, *Lam. Illustr.* ii. 14 = *S. Radula*.
 Salzmanni, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 206 = paludosum.
 sambuciflorum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 38.—Bras.
 Sanctae-Catharinae, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 109.—Nicaragua.
 Sanctae-Crucis, *Dun. l. c.* 274.—Bolivia.
 Sanctae-Nevadae, *Dun. & A. DC. l. c.* 678.—Venezuela.
 sanctum, *Jan, ex Dun. l. c.* 260 = torvum.
 sanctum, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 269 = incanum, *Linn.*
 sanctum, *Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 605 = dubium.
 sandwicense, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 92.—Ins. Sandvic.
 sandwichense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 268 = praec.

SOLANUM:—

sandwichianum, *Dun. l. c.* 311 = incompletum.
 sanguineum, *Hort. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 243 = atropurpureum.
 saponaceum, *Dun. Hist. Solan.* 206.—Peruv.
 saponaceum, *Hook. Bot. Mag. t.* 2697 = elaeagnifolium.
 saponaceum, *Welw. Apont.* 588.—Afr. trop.
 sarmentosum, *Lam. Illustr.* ii. 24 = lanceaefolium.
 sarmentosum, *Nees, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 58.—Malaya.
 sarmentosum, *Pav. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 87 = macrantherum.
 sarrachoides, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 18.—Bras.
 sativum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 360 = *S. Melongena*.
 scaberrimum, *Dun. l. c.* 349 = asterophorum.
 scabridum, *Dun. l. c.* 253.—N. Granat.
 scabrum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 41 = Humboldtii.
 scabrum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 45 = racemiflorum.
 scabrum, *Lam. Illustr.* ii. 18 = muricatum.
 scabrum, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6* = nigrum.
 scabrum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 39 = saponaceum.
 scabrum, *Vahl, Eclog. Am.* i. 22.—Am. austr.
 scabrum, *Zuccagni, in Roem. Collect.* 133 = Zuccagnianum.
 scandens, *Comm. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 88 = pyrifolium.
 scandens, *Linn. Pl. Surin.* 5; *Amoen. Acad.* viii. 253 = *S. Convolvulus*?
 scandens, *Linn. f. Suppl.* 147.—Guian.
 scandens, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 19* = axilliflorum.
 scandens, *Moq. & Sesse, ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 87 = macrantherum.
 scandens, *Neck. Delic. Gallo-Belg.* i. 119; *Lam. Fl. Fr.* ii. 257 = *S. Dulcamara*.
 scandens, *Schomb. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 84 = pensile.
 scandens, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 47 = scabrum.
 Schiedeum, *Schlecht. in Linnaea*, xix. (1847) 295 = Hartwegi.
 Schimperianum, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 24; *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 94.—Abyss.
 Schiruschuna, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 32* (Quid?)—Ind. or.
 schizandrum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 85.—Bras.
 schizopodium, *Sendt. l. c.* 46.—Bras.
 Schlechtendalianum, *Walp. Rep.* iii. 61.—Mexic.
 Schneideri, *Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil.* 229 = Alphonsi.
 schoenbrunnense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 365.—Hab.?
 Schomburgkii, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 55.—Am. trop.
 Schrankii, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 606.—Bras.
 Schreberianum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 85.—Bras.
 Schuchii, *Sendt. l. c.* 101.—Bras.
 Schultesii, *Opiz, in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm.* iii. 24.—Bohemia.
 sclareaefolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 118 = cladotrichum.
 Seaforthianum, *Andr. Bot. Rep.* t. 504.—Am. trop.
 Seedi, *Horne, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 369.—Ins. Fiji.
 Sellovianum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 38.—Bras.
 Sellowii, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 134.—Bras.
 semiarmatum, *F. Muell. Fragm.* ii. 163.—Austral.
 sempervirens, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 88.—Guian.
 sempervirens, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 25* = aggregatum.
 Sendnerianum, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 75.—Peruv.
 senecioides, *Domb. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 65.—Peruv.
 senegambicum, *Dun. l. c.* 194.—Afr. trop.
 sepicula, *Dun. l. c.* 283.—Arab.
 septemlobum, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Péttersb.* ii. (1835) 122.—China.
 sericeum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 33. t. 161.—Peruv.
 sericeum, *Vell. Fl. Flum.* 83; ii. t. 97 = cinnamomeum.
 serpentinum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 26; *Desf. Cat. Hort. Par. ed. III.* 115, 397 = *S. Melongena*?
 serratifolium, *A. DC. in DC. Prod.* xiii. i. 680.—Bras.
 serratum, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 136 = *Physalis minima*.
 serratum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 146 = serratifolium.
 sessile, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 35. t. 167.—Peruv.

SOLANUM:—

sessiliflorum, *Dun. Solan. Syn.* 43.—Bras.
 Shanesii, *F. Muell. Fragm.* vi. 144.—Austral.
 sideroxanthum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 228.—Bras.
 sideroxyloides, *Schlecht. in Linnaea*, viii. (1833) 253.—Mexic.
 Sieberi, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 56.—Ins. Trinit.
 Sieberianum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 107 = callicarpaefolium.
 Silarium, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 2627 = torvum.
 simile, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 19.—Austral.
 simplex, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 272.—Bras.
 sinuatum, *Boiss. Diagn. Ser. I. xi.* 135.—Arab.
 sinense, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 137 = tuberosum.
 singuliflorum, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 606 = *S. Pseudocapsicum*.
 sinuatifolium, *Vell. Fl. Flum.* 91; ii. t. 132 = aculeatissimum, *Jacq.*
 sinuatum, *Ait. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 673.—Hab.?
 sinuatum, *Salisb. Prod.* 134 = sodomium.
 sinuatum, *Willd. Sp. Pl.* i. 1043 = tectum.
 Sisleyanum, *Lambertye, in Rev. Hort.* (1868) 470.—Reg. Argent.
 sisymbriifolium, *Lam. Illustr.* ii. 25.—Am. bor.; Mexic.
 sodomium, *Drège, Zwei Pfl. Docum.* 147; et ex *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 367 = aculeastrum.
 sodomium, *Hort. ex Dun. l. c.* 365 = schoenbrunnense.
 sodomium, *Linn. Sp. Pl.* 187.—Geront. calid.
 sodomium, *Russ. ex Nees, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 55 = indicum.
 solitudinum, *Delile, ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 285.—Aegypt.
 somalense, *Franch. in Révoil, Comali*, 47.—Afr. trop.
 somniculentum, *Kunze, ex Schlecht. in Linnaea*, xix. (1847) 306.—Mexic.
 sordidum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 53. t. 4.—Bras.
 speciosum, *Dun. Hist. Solan.* 179.—Ind. occ.
 speciosum, *Hort. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 52 = nigrum.
 spectabile, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 606 = bifissum.
 sphaerocarpum, *Moric. Pl. Nouv. Am.* 31 = aculeatissimum, *Jacq.*
 spinatum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 26 (Quid?)—Java.
 spinosissimum, *Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 74, nomen.—Hab.?
 spiraeoides, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 157.—Chili.
 spirale, *Roxb. Hort. Beng.* 16; *Fl. Ind.* i. 564.—Reg. Himal.; Burma.
 spissifolium, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 33.—Bras.
 sporodotrichum, *F. Muell. in Melb. Chemist* (Oct. 1882).—Austral.
 Sprengelii, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 372.—Bras.
 Sprucei, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 67.—Peruv.
 spurium, *Balb. Cat. Hort. Taur.* (1813) 73 = *Lycopersicum pyriforme*.
 spurium, *J. F. Gmel. Syst.* 384 = *Lycopersicum esculentum*.
 squamulosum, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845) 140.—Mexic.
 stagnale, *Moric. Pl. Nouv. Am.* 34. t. 23.—Bras.
 stamineum, *Steud. in Flora*, xxvi. (1843) 764 = *S. Juripeba*.
 Stauntonii, *Dun. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 96 = biflorum.
 stellatum, *Jacq. Coll.* iii. 254.—Am. austr.
 stellatum, *Moench, Meth.* 475 = *Moenchii*.
 stellatum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 40 = hispidum.
 stelligerum, *Sm. Exot. Bot.* ii. 57.—Austral.
 stenandrum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. i. 270 = stenorchis.
 stenandrum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 68.—Bras.
 stenolobum, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 69.—Peruv.
 stenopetalum, *A. Br. in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) App. 8 = nigrum.
 stenophyllum, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 15.—Peruv.

SOLANUM:—

- stenorchideum*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = seq.
stenorchis, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 270.—Am. austr.
stephanodes, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 290.—Mexic.
stipulaceum, Brouss. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669 (Quid?).—Hab.?
stipulaceum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 662.—Bras.
stipulatum, Vell. Fl. Flum. 87; ii. t. 117 = rivulare.
stoloniferum, Schlecht. & Bouché, in Verh. Ver. Preuss. Gartenb. ix. (1833) 319. t. 2.—Mexic.
stoloniferum, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 255 = oxycarpum.
stramonifolium, Dun. Hist. Solan. 222 = ferox.
stramonifolium, Jacq. Misc. ii. 298.—Cosmop. trop.
stramonifolium, Lam. Illustr. ii. 22 = torvum.
stramonifolium, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 346 = anoplocladum.
stramonifolium, Hort. ex Benth. in Maund, Botanist, iv. [1839] sub t. 192 = vestitum.
strictum, Zuccagni, in Roem. Collect. 132 = nigrum.
strigosum, Vand. Fasc. Pl. 10.—Bras.
sturtianum, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 19.—Austral.
Styleanum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 44.—Chili.
styracifolium, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 663 = S. Juripeba.
suaveolens, Boj. Hort. Maurit. 239 = Bojeri.
suaveolens, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 14.—Mexic.
subarmatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 240.—Ind. occ.
subbiflorum, Ortega, Hort. Matr. Dec. 118 = capense.
subcordatum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 102.—Bras.
subenervium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 104.—Chili.
subexarmatum, Dun. l. c. 367.—Afr. austr.
suberme, Jacq. Enum. Pl. Carib. 15.—Ind. occ.
sublentum, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 53.—Bras.
sublobatum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 664.—Reg. Argent.
subrepandum, Desf. Tabl. ed. I. 222.—Am. trop.
subscandens, Vell. Fl. Flum. 90; t. 128.—Bras.
subseriatum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 212.—N. Granat.
subsessile, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 964, nomen.—Guian.
subspatulatum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 45.—Bras.
subtruncatum, Wall. Cat. n. 2620.—Reg. HIMAL.
subumbellatum, Vell. Fl. Flum. 85; ii. t. 105.—Bras.
subviscidum, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 35.—Bras.
suffruticosum, Schousb. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 1236 = nigrum.
sulcatum, Reusch. Nom. ed. III. 60.—Am. trop.?
supinum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 289.—Afr. austr.
surattense, Burm. f. Fl. Ind. 57 = virginianum.
surinamense, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 103 = canocinereum.
surinamense, Steud. in Flora, xxvi. (1843) 764.—Guian.
Swartzianum, Roem. & Schult. Syst. iv. 602.—Bras.
sycocarpum, Mart. & Sendt. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 85 = Cyphomandra sycocarpa.
sycophanta, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 357.—Venezuela.
sylvaticum, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 24.—Am. austr.
sylvestre, Audub. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 32 = tuberosum.
symphysicaulis, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 106.—Mexic.
synantherum, Sendt. in Flora, xxix. (1846) 178.—Guatemala.
syringaeifolium, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 10.—Chili.
tabacifolium, Vell. Fl. Flum. 81; ii. t. 89 = auriculatum.
tabacifolium, Salz. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 261.—Bras.
Tagore, J. F. Gmel. Syst. 383, sphalm. = S. Tegore.
taitense, Vathek, in Linnaea, xliii. (1880-82) 327.—Afr. trop.

SOLANUM:—

- tampicense*, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 284.—Mexic.
tarapotense, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 38.—Peruv.
Tauschii, Opiz, in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm. iii. 20.—Bohemia.
tectum, Pers. Syn. i. 227.—Mexic.
Tegore, Aubl. Pl. Gui. i. 212. t. 84 = Cyphomandra Tejore.
tejuense, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 248.—Bras. tenue, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 13.—Bras.
tenuiflorum, Steud. Nom. ed. II. ii. 606 = nigrum.
tenuifolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 87.—N. Granat.
tenuissimum, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 67.—Bras.
terminale, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 45.—Arab.
terminale, Vell. Fl. Flum. 84; ii. t. 101 = isodynamum.
ternatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 38. t. 172.—Peruv.
tetramerum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 681.—Cuba.
tetrandrum, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 55 = ardisioides.
tetrandrum, R. Br. Prod. 445.—Austral.
tetrathecum, F. Muell. Fragm. ii. 165.—Austral.
tetricum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 205.—Bras.
tettense, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 237.—Afr. trop.
texanum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 359 = integrifolium?
texanum, Hort. ex Tenore, in Atti R. Ist. Incorr. Nap. viii. (1855) 328 = integrifolium.
texense, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 227 = elaeagnifolium.
thelopodium, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 46.—Bras.
thomasiaefolium, Sendt. l. c. 74.—Bras.
Thonningianum, Jacq. f. Ecol. i. 123.—Afr. trop.
Thouinii, C. C. Gmel. Cat. Hort. Carlsr. 254 = sisymbriifolium.
thymifolium, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 664.—Reg. Argent.
tinctorium, Welw. Apont. 590 = nodiflorum.
tolimense, Wedd. Chlor. And. ii. 106.—N. Granat.
Tomatillo, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 229.—Chili.
tomentellum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 236.—Afr. trop.
tomentosum, Herb. Hasselt, ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 654 = S. Melongena.
tomentosum, Linn. Sp. Pl. 188.—Am. bor.; Afr. austr.
tomentosum, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 229.—Chili.
Topiro, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 10.—Am. austr.
Torreyi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1862) 44.—Am. bor. occ.
torvum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2627 = stramonifolium.
torvum, Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 113 = Hartwegi.
torvum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 47.—Cosmop. trop.
toxicarium, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 107 = stramonifolium.
trachyphyllum, Humb. in Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 18.—N. Granat.
triangulare, Lam. Illustr. ii. 18 = nigrum.
tribulosum, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 711.—Mexic.
trichocalyx, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 679.—Bras.
trichocarpum, Miq. Stirp. Surin. Sél. 134.—Guian.
tricolor, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 756.—Mexic.
tricuspidatum, Rich. ex Dun. in Poir. l. c. iii. 771.—Guian.
tridynamum, Dun. in Poir. l. c. 776.—Mexic.
triferum, Poepp. ex Schlecht. Hort. Hal. i. 6.—Peruv.
triflorum, Nutt. Gen. Am. i. 128.—Am. bor. occ.
trifoliatum, Burm. f. Fl. Ind. 57. f. 3 = Triphasia Aurantiola.
trifolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 68.—Ecuador.
trifurcum, Dun. l. c. 272.—Bolivia.
trilobatum, Linn. Sp. Pl. 188; ed. II. 270.—As. trop.
trilobatum, Linn. II. cc., partim = capense.
trilobatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = S. Melongena.
tripartitum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 72.—Bolivia.
triphyllum, Vell. Fl. Flum. 88; ii. t. 120 = pruniifolium.
triquetrum, Cav. Ic. iii. 30. t. 259.—Mexic.
trisetum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 36.—Ins. Mader.
triste, Glocker, ex Dun. l. c. 147 = acuminatum.

SOLANUM:—

- triste*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 15.—Am. trop.
Trongium, Poir. in Lam. Encyc. iv. 308 = S. Melongena.
Trutel, Jacq. ex Steud. Nom. ed. I. 796 = triste.
tuberculatum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 66 = conicum.
tubcriferum, Dun. l. c. 63.—Mexic.
tuberosum, Bert. ex Walp. Rep. iii. 39 = etuberosum.
tuberosum, Linn. Sp. Pl. 185.—Am. bor. et austr.
tuberosum, Poepp. ex Walp. Rep. iii. 39 = S. Maglia.
tubiflorum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 318 = maroniense.
tucumanense, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 254.—Reg. Argent.
Tweedianum, Hook. Bot. Mag. t. 3385.—Reg. Argent.
uliginosum, Blume, Bijdr. 695 = nigrum.
ulmoides, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 130.—Mexic.
umbellatum, Banks, ex Dun. l. c. 200 = jamaicense.
umbellatum, Dun. l. c. 62.—Ins. S. Doming.
umbellatum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 27.—Mexic.
umbellatum, Willd. ex Roem. & Schult. iv. 662 = sylvaticum.
umbelliferum, Eschsch. in Mem. Acad. Pétersb. (1821-22) 283.—Calif.
umbelliferum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. vii. 12 = nigrum.
umbrosium, Balb. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 185 = persicaefolium.
umbrosium, Bert. ex Dun. l. c. 185 = bahamense.
umbrosium, Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn. 33.—Am. austr.
umbrosium, Vahl, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 259 = anomalum.
uncinatum, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64, nomen.—Abyss.
uncinatum, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 200 = Schrankii.
uncinellum, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 15.—Bras.
undatifolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 104.—Bras.
undatum, Bouton, ex Dun. l. c. 366 = sodomeum.
undatum, Lam. Illustr. ii. 22 = S. Melongena.
undatum, Walsh, Not. xi. 310; ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 338 = lycocarpum.
undecimangulare, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 669 = platyphyllum.
undulatum, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 138.—Bras.
undulatum, Poir. Encyc. iv. 301 = S. Melongena.
ungens, Weinm. in Flora, iv. (1821) 27.—Bras.
unguiculatum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 102.—Abyss.
uniflorum, Dun. in Poir. Encyc. Suppl. iii. 757.—Ins. S. Doming.
uniflorum, Meyen, ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 388 = elaeagnifolium.
uniflorum, Sesse, ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 10 = Mozinianum.
uniflorum, Vell. Fl. Flum. 86; ii. t. 114 = S. Pseudo-capsicum.
Uporo, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 138.—Ins. Tahiti.
urceolatum, Pers. Syn. i. 223.—Peruv.
urens, Bonhomme, ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 311.—Ins. S. Vincent.
urticans, Dun. l. c. 324.—Bolivia.
utile, Klotzsch, in Allg. Gartenz. xvii. (1849) 315 = tuberosum.
uvariaefolium, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 88 = flaccidum.
vacciniifolium, Dun. l. c. 160 = havanense, Jacq.
vagum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2624.—Ind. or.
Vaillantii, Dun. Solan. Syn. 38.—Hab.?
Valadares, Vand. Fasc. Pl. 10 = spectabile.
valdiviense, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 195.—Chili.
Valenzuelac, Palacio, in Mem. Mus. Par. ii. (1815) 340.—N. Granat.
Vandellianum, Dun. Hist. Solan. 241.—Bras.
Vanheurckii, Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 85.—Peruv.
variabile, Mart. in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 80.—Bras.
variegatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 32 = muricatum.
vellereum, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 302.—Mexic.
velleum, Sw. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 648 (an seq.?).—Bras.

SOLANUM :—

velleum, *Thunb. Pl. Bras. Dec.* ii. 21.—Bras.
 Vellozianum, *Dun. Hist. Solan.* 236.—Bras.
 velutinum, *Dun. in Poir. Encyc. Suppl.* iii. 766.—
 Guian.
 venosum, *Humb. & Bonpl. ex Dun. Solan. Syn.* 19.—
 N. Granat.
 venosum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras. x.* 27 = brachy-
 stachys.
 venustum, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) 10 =
 Scaphothianum.
 Verae-crucis, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 607 = amazonium.
 verbascifolium, *Banks, ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 271
 = stenorchis.
 verbascifolium, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 30 =
 asperum.
 verbascifolium, *Linn. Sp. Pl.* 184.—Amphig. trop.
 vernicatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838), *Misc.* 74.—Reg.
 Argent.
 verrucosum, *Schlecht. Hort. Hal.* i. 3. t. 2 = tuberosum.
 vesum, *F. Muell. in Trans. Vict. Inst.* i. (1855) 69 =
 aviculare.
 Vespertilio, *Ait. Hort. Kew. ed. I. i.* 252.—Ins. Canar.
 vespertilionium, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon.* vii.
 (1880) 135 = praec.
 vestissimum, *Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 322.—Vene-
 zuela.
 vestitum, *Benth. in Maund, Botanist.* iv. [1839] t. 192.
 —Mexic.
 vestitum, *Nutt. ex Seem. Fl. Vit.* 174 = Nelsoni.
 vestitum, *Salzm. ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 324 =
 polytrichum.
 viarium, *Dun. l. c.* 240.—Bras.
 viliflorum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras. x.* 46.—Bras.
 villosissimum, *Zuccagni, in Roem. Collect.* 132 =
 mammosum.
 villosum, *F. G. Dietr. Vollst. Lexic. Gaertn.* ix. 341 =
 tectum.
 villosum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 47 = Forskålili.
 villosum, *Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n.* 2; *Lam.*
Illustr. ii. 18 = nigrum.
 villosum, *Moench, Meth.* 474.—Hab.?
 villosum, *Opiz, ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 51 =
 decipiens.
 villosum, *Willd. Prod. Fl. Berl.* 87.—Europ.; As.; Afr.
 Vincentii, *Delile, ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 310 =
 indicum.
 violaceum, *Blume, Cat. Gew. Buitenz.* 55 = Blumei.
 violaceum, *R. Br. Prod.* 445.—Austral.
 violaceum, *DC. ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 359 =
 S. Melongena.
 violaceum, *Hort. ex Dun. l. c.* 334 = tridynamum.
 violaceum, *Ortega, Hort. Matr. Dec.* 56; *Jacq. Fragm.*
 82 = indicum.
 violaeifolium, *Schott, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post.*
 403.—Bras.
 virescens, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78)
 39 = rufescens.
 virgatum, *Endl. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x.* 13 =
 Endlicheri.
 virgatum, *Lam. Illustr.* ii. 14.—Ins. Canar.; Ind. occ.
 virginianum, *Jacq. Ic. Pl. Rar.* ii. 11. t. 332 =
 xanthocarpum.
 virginianum, *Linn. Sp. Pl.* 187.—Am. bor.
 virginianum, *Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 331 =
 heterodoxum.
 virginianum, *Pers. Syn.* i. 227 = nigrum.
 virginianum, *Russ. ex Wall. Cat. n.* 2613 D =
 indicum.
 virginicum, *Linn. Mant.* ii. 340 = virginianum?
 viride, *R. Br. Prod.* 445.—Austral.
 viride, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 478 = nigrum.
 viride, *Soland, ex Forst. f. Pl. Escul.* 72 = S. Uporo.
 viridescens, *Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 391 =
 nigrum.
 viridiflorum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 38. t. 173. f. b =
 Cyphomandra viridiflora.
 viridiflorum, *Schlecht. in Linnaea, xix.* (1847) 292 =
 aculeatissimum, *Jacq.*
 viridifolium, *Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 73 = viride.
 viridipes, *Dun. l. c.* 234.—Bras.
 viscidissimum, *Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch.*
Nedrl. Ind. ii. (1845) 571.—Java.
 viscidum, *Schweigg. Enum. Pl. Hort. Regiom.* 67 =
 sisymbriifolium.
 viscosissimum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras. x.* 14.—Bras.
 viscosum, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 10 = sisymbriifolium.
 viscosum, *Moench, Meth. Suppl.* 179.—Hab.?

SOLANUM :—

viscosum, *Salzm. ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 206 =
 paludosum.
 vitense, *Seem. in Fourn. Bot.* i. (1863) 206; *Fl. Vit.*
 176.—Ins. Fiji.
 vitocense, *Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 176.—Peruv.
 volubile, *Sw. Fl. Ind. Occ.* i. 458 = scabrum.
 volubile, *Thib. ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 220 =
 ambiguum.
 vulgare, *Hegetschw. Fl. Schw.* 219 = nigrum.
 vulgatum, *Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 607 =
 nigrum.
 Wallisii, *Carr. in Rev. Hort.* (1877) 291.—Peruv.
 Warmingii, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-
 78) 44.—Bras.
 Warszewiczii, *Hort. ex Lambertye, in Rev. Hort.*
 (1865) 429.—Hab.?
 Wightii, *Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.*
Ind. iv. 234 = torvum.
 Wightii, *Nees, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 51.—
 Ind. or.
 Wildianum, *Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 607.—
 Hab.?
 Willdenovianum, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 427.—Ind.
 occ.
 Willdenowii, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 661 = Zucca-
 gnianum.
 woahense, *Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 268 = sandwi-
 cense.
 Wrightii, *Benth. Fl. Hongk.* 243.—Bolivia.
 xanthacanthum, *Willd. ex Walp. Rep.* vi. 601 =
 sisymbriifolium.
 xanthocarpum, *Schrad. & Wendl. Sert. Hanov.* i. 8.
 t. 2.—Geront. trop.
 Xanti, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 90.—
 Calif.
 xylopiæifolium, *Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 179.—
 N. Granat.
 xylorhagodes, *Schrank, in Denkschr. Akad. Muench.*
 vii. (1821) 241 (Quid?)—Europ.
 xylostoideum, *Moric. ex Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 158
 = Orbignianum.
 Zanoni, *Gouan, Illustr.* 7.—Europ. austr.
 zanzibarensis, *Vatke, in Linnaea, xliii.* (1880-82) 326.
 —Afr. trop.
 zeylanicum, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 136 = ferox.
 zeylanicum, *Scop. Delic. Insub.* i. 1 = S. Melongena.
 Zollingeri, *Dun. in DC. Prod. xiii.* i. 176 = biflorum.
 Zuccagnianum, *Dun. Hist. Solan.* 149. t. 11.—Hab.?

SOLARIA, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857-58) 72.
LILIACEAE, *Benth. & Hook. f.* iii. 805.
 SYMEA, *Baker, in Saund. Kefug. Bot.* t. 260 (1871).
 miersioides, *Phil. in Linnaea, xxix.* (1857-58) 72.—
 Chili.

SOLDANELLA, *Linn. Syst. ed. I* (1735). **PRIMU-**
LACEAE, *Benth. & Hook. f.* ii. 633.

GOLIA, *Adans. Fam.* ii. 231 (1763).
 affinis, *Cree, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 673 =
 montana.
 alpina, *Linn. Sp. Pl.* 144.—Europ. alp.
 alpina, *F. W. Schmidt, Fl. Boëm.* ii. 49 = montana.
 Clusii, *Gaud. Fl. Helv.* ii. 76 = pusilla.
 Clusii, *F. W. Schmidt, Fl. Boëm.* ii. 50 = alpina.
 crenata, *Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.*
Suppl. i. 600.—Hab.?
 crenata, *Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*
 iii. 94 = Schizocodon soldanelloides.
 Ganderi, *Hut. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 122
 = minima.
 hybrida x, *Kern. l. c.* xxv. (1875) 160.—Europ.
 media x, *Bruegg, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II.
 xxiii-xxiv. (1880) 100.—Europ.
 minima, *Hoppe, ex Sturm, Deutschl. Fl.* Heft 20.—
 Europ. med.
 minima, *Hoppe, in Flora, i.* (1818) 14 = pusilla.
 montana, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 192.—Bohem.;
 Transsylv.
 pusilla, *Baumg. Enum. Stirp. Transs.* i. 138.—
 Transsylv.
 pyrolaeifolia, *Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot.* 16
 = alpina.
 sinuata, *Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*
 iii. 94 = Schizocodon soldanelloides.
 villosa, *Darracq, in Ann. Soc. Linn. Bord.* vi. Mélang.
 2; *ex Gren. & Godr. Fl. Fr.* ii. 461 = montana.

SOLDEVILLA, *Lag. in Varied. Cienc.* ii. iv. (1805) 37
 = **Hispidella**, *Barnad. (Compos.)*.
 setosa, *Lag. l. c.* 38 = *H. hispanica*.

SOLEA, *Spreng. in Schrad. Journ. Bot.* iv. (1800) 192 =
Ionidium, *Vent. (Violar.)*.

alba, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 97 = I. album.
 anomala, *Spreng. Syst. i.* 804 = I. anomalum.
 atropurpurea, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 98 = I. atro-
 purpureum.
 bicolor, *Spreng. l. c.* 97 = I. bicolor.
 bigibbosa, *Spreng. l. c.* 98 = I. bigibbosum.
 brevicaulis, *Spreng. l. c.* = I. brevicaule.
 buxifolia, *Spreng. Syst. i.* 804 = I. buxifolium.
 Calceolaria, *Spreng. l. c.* 805 = I. Ipecacuanha.
 calycina, *Spreng. l. c.* 804 = I. calycinum.
 capensis, *Spreng. l. c.* = I. capense.
 circacoides, *Spreng. l. c.* = I. circacoides.
 communis, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 97 = I. com-
 mune.
 concolor, *Ging. in DC. Prod. i.* 306 = I. concolor.
 enneasperma, *Spreng. Syst. i.* 804 = I. heterophyllum.
 erecta, *Spreng. l. c.* = I. heterophyllum.
 glutinosa, *Spreng. l. c.* = I. commune.
 guaranitica, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 98 =
 I. commune.
 heterophylla, *Spreng. Syst. i.* 804 = I. heterophyllum.
 Ipecacuanha, *Spreng. l. c.* 805 = I. Ipecacuanha.
 Itoubou, *Spreng. l. c.* = I. Ipecacuanha.
 lanata, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 97 = I. lanatum.
 linifolia, *Spreng. Syst. i.* 803 = I. linifolium.
 longifolia, *Spreng. l. c.* = I. strictum.
 microphylla, *Spreng. l. c.* = I. glutinosum.
 monopetala, *Spreng. l. c.* 400 = I. filiforme.
 montana, *Zipp. ex Span. in Linnaea, xv.* (1841) 167 =
 I. heterophyllum.
 nana, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 98 = I. album.
 oppositifolia, *Spreng. Syst. i.* 803 = I. oppositifolium.
 parietarifolia, *Spreng. l. c.* 804 = I. oppositifolium.
 parvifolia, *Spreng. l. c.* = I. glutinosum.
 parvifolia, *Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii.* i. 374 =
 praec.
 Poaya, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 97 = I. Poaya.
 riparia, *Spreng. Syst. i.* 803 = I. oppositifolium.
 scariosa, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 97 = I. brevicaule.
 setigera, *Spreng. l. c.* = I. setigerum.
 stricta, *Spreng. Pugill.* i. 22 = I. concolor.
 stricta, *Spreng. Syst. i.* 803 = I. strictum.
 sylvatica, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 97 = I. commune.
 urticaefolia, *Spreng. l. c.* 98 = I. circacoides.
 verbenacea, *Spreng. Syst. i.* 803 = I. verbenaceum.
 verticillata, *Spreng. in Schrad. Journ. Bot.* iv. (1800)
 192 = I. polygalaeifolium.
 viscidula, *Spreng. Syst. i.* 803 = I. oppositifolium.

SOLEIROLIA, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 504 (1826)
 = **Helxine**, *Req. (Urtic.)*.
 corsica, *Gaudich. l. c.* = *H. Soleirolia*.

SOLENA, *Lour. Fl. Cochinch.* 514 (1790) = **Melothria**,
Linn. (Cucurb.).
 heterophylla, *Lour. l. c.* = *M. heterophylla*.

SOLENA, *Willd. Sp. Pl.* i. 961 (1797) = **Posoqueria**,
Aubl. (Rubiaceae).
 armata, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 800 = *Basanacantha*
armata.
 Bowieana, *D. Dietr. l. c.* 801 = *Randia macrantha*.
 calycina, *D. Dietr. l. c.* 799 (*Basanacantha* sp.)—
 Bras.
 capitata, *D. Dietr. l. c.* 800 = *Randia capitata*.
 decora, *D. Dietr. l. c.* 799 = *P. latifolia*.
 dumetorum, *D. Dietr. l. c.* = *Randia dumetorum*.
 echinocarpa, *D. Dietr. l. c.* = *Randia echinocarpa*.
 fasciculata, *D. Dietr. l. c.* 800 = *Randia fasciculata*.
 ferox, *D. Dietr. l. c.* = *Randia ferox*.
 floribunda, *D. Dietr. l. c.* = *Randia dumetorum*.
 genipaeiflora, *D. Dietr. l. c.* 801 = *Randia genipae-*
iflora.
 gracilis, *Rudge, Pl. Gui.* i. 27. t. 41 = *P. gracilis*.
 havanensis, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 799 = *P. havanensis*.
 horrida, *D. Dietr. l. c.* 800 = *Randia horrida*.
 Humboldtiana, *D. Dietr. l. c.* = *Basanacantha Hum-*
boldtiana.
 latifolia, *Rudge, Pl. Gui.* i. 26. t. 40 = *P. latifolia*.
 longiflora, *Willd. Sp. Pl.* i. 961 = *P. longiflora*.
 longispina, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 799 = *Randia dume-*
torum.

longistyla, D. Dietr. Syn. Pl. i. 801 = *Macrosphyra longistyla*.

macrantha, D. Dietr. l. c. = *Randia macrantha*.
maculata, D. Dietr. l. c. = *Randia maculata*, DC.
madagascariensis, D. Dietr. l. c. = *Randia madagascariensis*.

multiflora, D. Dietr. l. c. 800 = *Randia longiflora*.
Mussaenda, D. Dietr. l. c. 801 = *Randia Mussaenda*.

nitida, D. Dietr. l. c. 800 = *Randia nitida*.
nutans, D. Dietr. l. c. 799 = *Randia dumetorum*.

obovata, D. Dietr. l. c. = *Randia obovata*.
parviflora, D. Dietr. l. c. 800 = *Randia parviflora*.

pubescens, D. Dietr. l. c. 799 = *Randia pubescens*.
Randia, D. Dietr. l. c. = *Randia aculeata*.

revoluta, D. Dietr. l. c. = *Posoqueria latifolia*.
rigida, D. Dietr. l. c. 800 = *Randia fasciculata*.

rotundifolia, D. Dietr. l. c. 799 = *Randia rotundifolia*.
Ruiziana, D. Dietr. l. c. 801 = *Randia Ruiziana*.

scandens, D. Dietr. l. c. 800 = *Randia longiflora*.
sinensis, D. Dietr. l. c. = *Randia sinensis*.

speciosa, D. Dietr. l. c. 801 = *Randia speciosa*, DC.
stricta, D. Dietr. l. c. 800 = *Hyptianthera stricta*.

Talanganiana, D. Dietr. l. c. 801 = *Madag.*
tetracantha, D. Dietr. l. c. 800 = *Basanacantha heteracantha*.

tetrandra, D. Dietr. l. c. = *Randia tetrandra*.
triflora, D. Dietr. l. c. = *Randia triflora*.

Trinitatis, D. Dietr. l. c. 799 = *P. Trinitatis*.
uliginosa, D. Dietr. l. c. = *Randia uliginosa*.

SOLENACANTHUS, C. Muell. in Walp. Ann. v. 638 (1858), sphalm. = **SOLENACANTHUS**, Oerst. = **Ruellia**, Linn. (Acanth.).

SOLENACHNE, Steud. Syn. Pl. Gram. 12 (1854) = **Spartina**, Schreb. (Gramin.).

phalaroides, Steud. l. c. = *Spartina ciliata*.

SOLENANDRA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 620 (1876), sphalm. = **SOLENANDRIA**, Beauv. = **Galax**, Linn. (Diapens.).

SOLENANDRA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 43 (1873). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c. ixoroides, Hook. f. in Hook. l. c. Pl. t. 1150.—Cuba.

SOLENANDRIA, Beauv. ex Vent. Jard. Malm. t. 69 (1803) = **Galax**, Linn. (Diapens.).
cordifolia, Beauv. ex Vent. l. c. = *G. aphylla*.

SOLENANTHA, G. Don, Gen. Syst. ii. 39 (1832) = **Hymenanthera**, R. Br. (Violar.).
spinosa, G. Don, l. c. = *H. dentata*?

SOLENANTHUS, Ledeb. Ic. Fl. Ross. t. 26 (1828); Fl. Alt. i. 193 (1829). **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 848.

CERINTHOPSIS, Kotschy, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 849 (1876).

TRACHELANTHUS, Kunze, in Bot. Zeit. viii. (1850) 665.

amplifolius, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 126.—Syria.
angustifolius, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 28.—Sibir.
apenninus, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1838) 306.—Europ.

baicalensis, DC. & A. DC. in Prod. x. 166 = *Craniospermum subvillosum*.

Biebersteinii, DC. l. c. 165.—Tauria.
brachystemon, Fisch. & Mey. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1838) 306.—Reg. Casp.

cerinthoides, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 127.—Persia.
circinatus, Ledeb. Fl. Alt. i. 194.—Soongar.; Sibir.

conglobatus, A. DC. in DC. Prod. x. 166 = *Tournefortii*.

coronatus, Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 59.—Turkestan.
dubius, Fisch. & Mey. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1838) 306 = *Biebersteinii*.

ericalycinus, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 156.—Reg. Caucas.

hirsutus, Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 60.—Turkestan.
kokanicus, Regel, l. c. 89.—Turkestan.

lanatus, A. DC. in DC. Prod. x. 165.—Armenia.
mollissimus, DC. & A. DC. in Prod. x. 166.—Persia.

nigricans, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 29.—Sibir.
Olgae, Regel & Smirnow, ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 59, 60.—Turkestan.

petiolaris, DC. Prod. x. 164.—Mesopot.; Persia.

SOLENANTHUS:—

rumicifolius, Boiss. Pl. Or. Nov. Dec. ii. 9 = *petiolaris*.
tenuiflorus, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. ii. (1844) 194.—Soongar.

Tournefortii, DC. Prod. x. 164.—As. Min.; Persia.

SOLENANTHUS, Steud. teste Klatt, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 159 = **Acidantha**, Hochst. (Irid.).

SOLENARIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 112 (1867) = **Gagea**, Salisb. (Liliac.).

fistulosum, Dulac, l. c. = *G. Liotardi*.
luteum, Dulac, l. c. = *G. fascicularis*.

SOLENIDIUM, Lindl. Orch. Linden. 15 (1846). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 564.

racemosum, Lindl. l. c. —N. Granat.

SOLENIPEDIUM, Beer, Prakt. Orch. 310 (1854), sphalm. = **Selenipedium**, Reichb. f. (Orchid.).

SOLENISIA, DC. Prod. vii. 737 (1839) = **Styphelia**, Sm. (Epacrid.).

elegans, DC. l. c. 738 = *Styph. tenuiflora*.
pulchella, Stschégel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) 1. 3 = *Styph. Leucopogon*.

SOLENISIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 607 (1841), sphalm. = *præc.*

SOLENIXORA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1880) 242. **RUBIACEAE**.

Pervilleana, Baill. l. c. 243.—Madag.

SOLENOCARPUS, Wight & Arn. Prod. 171 (1834). **ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 422.

indica, Wight & Arn. l. c. —Ind. or.

SOLENOGYNE, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 493 (1827) = **Ericecephalus**, Linn. (Compos.).

SOLENOGYNE, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 174 (1828) = **Lagenophora**, Cass. (Compos.).

bellidioides, Cass. l. c. 175 = *L. Solenogyne*.
bellioides, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 480 = *L. Emphysopus*.

brachycomoides, F. Muell. Fragm. v. 63 = *L. Solenogyne*.

SOLENOMELUS, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 122; et Trans. Linn. Soc. xix. (1842) 95. t. 8. **IRI-DEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 700.

CRUCKSHANKSIA, Miers, Trav. ii. 529 (1826), nomen.
LECHLERA, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 53 (1857).

PHAIOPHLEPS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 29 (1836).
acaulis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 121.

—Reg. Andin.
andinus, Baker, l. c. = *Chamelum andinum*.

biflorus, Baker, l. c. = *Symphyostemon odoratissimus*.
Chamelum, Baker, l. c. = *Chamelum luteum*.

chilensis, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 122; et in Trans. Linn. Soc. xix. (1842) 96.—Chili.

chimboracensis, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 380 = *Orthrosanthus chimboracensis*.

frigidus, Klatt, l. c. = *Chamelum andinum*.
gladioloides, Klatt, l. c. = *Orthrosanthus chimboracensis*.

Lechleri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 121.

—Reg. Andin.
nigricans, Baker, l. c. —Chili.

punctatus, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 122; et in Trans. Linn. Soc. xix. (1842) 96 = *chilensis*.

spicatus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 380 = *Orthrosanthus spicatus*.

SOLENOPHORA, Benth. Pl. Hartw. 68 (1840). **GESNERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1005.

ARCTOCALYX, Fenzl, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848) 305.

HIPPODAMIA, Decne. in Rev. Hort. (1848) 464.
coccinea, Benth. Pl. Hartw. 68.—Mexic.

Endlicheriana, Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 314.—Mexic.

guttata, Decne. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1005 = *Endlicheriana*.

insignis, Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 314.—Mexic.

obscura, Hanst. l. c. 315.—Mexic.

SOLENOPSIS, Presl, Prod. Monog. Lobel. 32 (1836) =

Laurentia, Michx. (Campan.).
Bivonaeana, Presl, l. c. = *L. tenella*.

canariensis, Presl, l. c. = *L. canariensis*.
Dregeana, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 290 = *L. Dregeana*.

Laurentia, Presl, Prod. Monog. Lobel. 32 = *L. Michelii*.

minuta, Presl, l. c. = *L. minuta*.
Salzmänniana, Presl, l. c. = *L. Michelii*.

tenella, Steud. Nom. ed. II. ii. 61, in syn. = *L. tenella*.

SOLENOSPERMUM, Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 168. **CELASTRINEAE**.

javanicum, Zoll. l. c. 169.—Java.

SOLENOSTEMMA, Hayne, Arzn. Gew. ix. t. 38 (1825). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 749.

ARGELIA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 331. t. 11 G.

Argel, Hayne, Arzn. Gew. ix. t. 38.—Nubia.

SOLENOSTEMON, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 271 (1827). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1175.

ocymoides, Schum. & Thonn. l. c. —Afr. trop.

SOLENOSTIGMA, Endl. Prod. Fl. Norf. 41 (1833) = **Celtis**, Tourn. (Urtic.).

angustifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 412 = *C. angustifolia*.

brevinerve, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 67 = *C. paniculata*.

consimile, Blume, l. c. 68 = *C. Wightii*.
Djungiel, Blume, l. c. 69 = *C. Djungiel*.

Hasseltii, Blume, l. c. 68 = *C. Hasseltii*.
latifolium, Blume, l. c. 67 = *C. latifolia*.

laurifolium, Blume, l. c. 68 = *C. laurifolia*.
mauritanum, Blume, l. c. 67 = *C. mauritiana*.

pacificum, Blume, l. c. = *C. pacifica*.
paniculatum, Endl. Prod. Fl. Norf. 42 = *C. paniculata*.

philippinensis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 67 = *C. philippinensis*.

rigescens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 411 = *C. rigescens*.
strychnoides, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 67 = *C. philippinensis*.

sumatranum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 411 = *C. sumatrana*.

Wightii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 68 = *C. Wightii*.

Zippelii, Blume, l. c. 67 = *C. Zippelii*.

SOLENOSTIGMA, Klotzsch, ex Walp. Rep. iii. 125 (1844–45) = **Retzia**, Thunb. (Solan.).

Kraussii, Klotzsch, ex Walp. l. c. = *R. capensis*.

SOLENOSTYLES, Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 97 (1867). **ACANTHACEAE**.

aurantiaca, Hort. ex Pasq. l. c. (Quid?).—Hab.?

SOLENOTHECA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 371 = **Tagetes**, Linn. (Compos.).

tenella, Nutt. l. c. 372 = *T. tenuifolia*?

SOLENOTINUS, Spach, Hist. Vég. Phan. viii. 305 (1839) = **Viburnum**, Linn. (Caprifol.).

erubescens, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 295 = *V. erubescens*.

foetens, Oerst. l. c. 294 = *V. foetens*.

nervosus, Oerst. l. c. 295 = *V. nervosum*.

SOLENOTUS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 266 = **Astragalus**, Tourn. (Legumin.).

adsurgens, Stev. l. c. 267 = *A. adsurgens*.
albicaulis, Stev. l. c. xxix. (1856) II. 144 = *A. albicaulis*.

angarensis, Stev. l. c. iv. (1832) 266 = *A. angarensis*.
asper, Stev. l. c. 267 = *A. asper*.

bayonnensis, Stev. l. c. = *A. bayonnensis*.
brachypus, Stev. l. c. xxix. (1856) II. 144 = *A. brachypus*.

canadensis, Stev. l. c. iv. (1832) 267 = *A. canadensis*.
candidissimus, Stev. l. c. xxix. (1856) II. 144 = *A. candidissimus*.

cognatus, Stev. l. c. = *A. cognatus*.
dealbatus, Stev. l. c. iv. (1832) 267 = *A. dealbatus*.

SOLENOTUS:—

- elongatus*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 267 = *Astragalus elongatus*.
fruticosus, Stev. l. c. 266 = *A. fruticosus*.
Gebleri, Stev. l. c. xxix. (1856) ii. 144 = *A. Gebleri*.
glaber, Stev. l. c. iv. (1832) 267 = *A. glaber*.
gyzensis, Stev. l. c. 266 = *A. gyzensis*.
humifusus, Stev. l. c. 267 = *A. humifusus*.
hypoglottis, Stev. l. c. = *A. hypoglottis*.
hyrcanus, Stev. l. c. xxix. (1856) ii. 144 = *A. hyrcanus*.
lasioglottis, Stev. l. c. iv. (1832) 267 = *A. lasioglottis*.
leontinus, Stev. l. c. = *A. leontinus*.
macrourus, Stev. l. c. xxix. (1856) ii. 144 = *A. macrourus*.
odoratus, Stev. l. c. iv. (1832) 267 = *A. odoratus*.
pallescens, Stev. l. c. = *A. pallescens*.
podocarpus, Stev. l. c. xxix. (1856) ii. 144 = *A. podocarpus*.
purpureus, Stev. l. c. iv. (1832) 267 = *A. purpureus*.
rariflorus, Stev. l. c. xxix. (1856) ii. 144 = *A. rariflorus*.
resupinatus, Stev. l. c. = *A. fragrans*.
Schelichowii, Stev. l. c. = *A. Schelichowii*.
scoparius, Stev. l. c. = *A. scoparius*.
semibilocularis, Stev. l. c. iv. (1832) 267 = *A. semibilocularis*.
stenophyllus, Stev. l. c. 266 = *A. stenophyllus*.
uliginosus, Stev. l. c. 267 = *A. uliginosus*.
unifultus, Stev. l. c. = *A. unifultus*.
vesicarius, Stev. l. c. = *A. vesicarius*.
virgatus, Stev. l. c. 266 = *A. virgatus*.
xerophilus, Stev. l. c. xxix. (1856) ii. 144 = *A. xerophilus*.

SOLIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Premna*, Linn. (Verbenac.).

SOLIDAGO, [Vaill.] Linn. Syst. ed. I (1735). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 256.

- AMPHIRAPHIS, DC. Prod. v. 343 (1836).
 APLACTIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 42 (1836).
 CHRYSOMA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 67.
 DASTORIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 43 (1836).
 DECTIS, Rafin. l. c. (1836).
 DORIA, Adans. Fam. ii. 124 (1763).
 EUTHAMIA, Ell. Sketch, ii. 391, in syn. (1824).
 LFIOLIGO, Rafin. Fl. Tellur. ii. 42 (1836).
 LEPIACTIS, Rafin. l. c. 43 (1836).
acaulis, Spreng. Syst. iii. 543 = *Liabum acaule*.
alata, Wall. ex DC. Prod. vi. 368 = *Senecio alatus*.
alba, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 26 = *bicolor*.
aliena, Spreng. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 9 = *Leucopsis Tweediei*.
alpestris, Waldst. & Kit. in Willd. Sp. Pl. iii. 218 = *S. Virgaurea*.
alpina, Linn. Sp. Pl. 880 = *Senecio alpinus*.
alpina, Salisb. Prod. 199 = *minuta*.
altissima, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 212 = *rugosa*.
altissima, Linn. Sp. Pl. 878 = *canadensis*.
altissima, Michx. Fl. Am. Bor. ii. 118 = *pilosa*.
ambigua, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 217 = *S. Virgaurea*?
amplexicaulis, Martens, in Bull. Acad. Brux. viii. (1841) 8 = *Riddellii*.
amplexicaulis, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 218. — *Am. bor.*
angulata, Mart. Hort. Erlang. (1814) 180 = *patula*.
angulosa, Wall. ex DC. Prod. vi. 369 = *Senecio densiflorus*.
angusta, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 204 = *petiolaris*.
angustifolia, Ell. Sketch, ii. 388 = *stricta*.
angustifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *Senecio sarraценicus*.
anisata, Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit. 348, nomen. — *Am. bor.*
arborescens, A. Cunn. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 148 = *Senecio glastifolius*, Hook. f.
arborescens, Forst. f. Prod. 56 = *Olearia nitida*.
arcuata, Tausch, in Flora, xi. (1828) 498 = *canadensis*.
arenaria, Hort. Par. ex Poir. Encyc. Suppl. v. 461 = *S. Virgaurea*.
argentea, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 99 = *caesia*.
argentea, Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit. 348 = *puberula*.

SOLIDAGO:—

- arguta*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 213. — *Am. bor.*
arguta, Spreng. Syst. iii. 540 = *caesia*.
arguta, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 214 = *juncea*.
aspera, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 212 = *rugosa*.
asperata, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 538 = *patula*.
asperata, Soland. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 153 = *rugosa*.
asperula, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 403 = *rugosa*?
asperula, Juss. ex DC. Prod. v. 337 = *rigida*.
aurea, Spreng. Syst. iii. 542 (sp. dub.). — *Nepal.*
axillaris, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 542 = *caesia*.
axillaris, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 581 = *S. Virgaurea*.
azorica, Hochst. in Seubert, Fl. Azor. 31. t. 10 = *sempervirens*.
bicolor, Linn. Mant. i. 114. — *Am. bor.*
Bigelovii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 80. — *Am. bor.*
bonariensis, D. Don, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 11 = *microglossa*.
Boottii, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 97. — *Am. bor.*
Bosciana, Moretti, ex DC. Prod. v. 333 = *rugosa*.
brachyphylla, Chapm. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 218 = *Boottii*.
Buckleyi, Torr. & Gray, l. c. 198. — *Am. bor.*
caesia, Linn. Sp. Pl. 879. — *Am. bor.*
californica, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 328. — *Am. bor. occ.*
cambrica, Huds. Fl. Angl. ed. I. 319 = *S. Virgaurea*.
canadensis, Linn. Sp. Pl. 878. — *Am. bor.*
canescens, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 117 = *Olearia Cunninghamii*.
cantonensis, Lour. Fl. Cochinch. 501 = *S. Virgaurea*.
capitata, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1865) i. 395 = *S. Virgaurea*.
carinata, Schrad. in DC. Prod. v. 337 = *sempervirens*.
carcosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 20 = *sempervirens*.
carpathica, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 852 = *S. Virgaurea*.
ceylanica, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 347 = *Microglossa zeylanica*.
Chapmani, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 80. — *Florida*.
chilensis, Meyen, Reise, i. 311 = *microglossa*.
chinensis, Spreng. ex DC. Prod. v. 342 = *Senecio vagans*.
chrysantha, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 643. — *Europ.*
ciliaris, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2056 = *juncea*.
cinerascens, Schwin. ex Ell. Sketch, ii. 375 = *memoralis*.
Cleliae, DC. Prod. v. 331 = *elliptica*.
compacta, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 73 = *multiradiata*.
conferta, Hort. Par. ex Poir. Encyc. viii. 469 = *memoralis*.
conferta, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 27. — *Am. bor.*
confertiflora, DC. Prod. v. 339. — *Am. bor.*
confertiflora, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vii. 57 = *humilis*.
confertiflora, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 102 = *squarrosa*.
confinis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 191. — *Calif.*
coquimbana, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 138 = *microglossa*.
cordata, Short & Peter, in Trans. Journ. Med. xxviii. (1836) 599 = *Brachychaeta cordata*.
cordifolia, Moench, Meth. 599 = *Aster cordifolius*.
corymbosa, Ell. Sketch, ii. 378. — *Am. bor.*
corymbosa, Hort. ex Poir. Encyc. Suppl. v. 461 = *S. Virgaurea*.
corymbosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 328 = *multiradiata*.
cuneifolia, Roxb. in Beats. Tracts St. Helena, App. 324 = *Commidendron spurium*.
Curtisii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 200. — *Am. bor.*
cuspidata, Wall. Cat. n. 3244 = *Inula cuspidata*.
cylindrica, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 600. — *Am. bor.*
Cymbalaria, Moench, Meth. Suppl. 249 = *Aster Cymbalariae*.
decemflora, DC. Prod. v. 332 = *memoralis*.
decemflora, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 223 = *S. Radula*.

SOLIDAGO:—

- decurrens*, Lour. Fl. Cochinch. 501 = *S. Virgaurea*.
deflexa, Moench, Meth. 599 = *serotina*.
densiflora, Wall. Cat. n. 1821 = *Senecio densiflorus*.
diffusa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 159 = *Bigelowia diffusa*.
discoidea, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 195. — *Am. bor.*
domingensis, Spreng. Syst. iii. 639. — *Ins. S. Doming.*
Doronicum, Linn. Sp. Pl. 880 = *Senecio Doronicum*.
Drummondii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 217. — *Am. bor.*
dubia, Schult. Obs. Bot. 178. — *Hab.?*
dubia, Scop. Delic. Insub. ii. 19 = *elliptica*?
elata, Ell. Sketch, ii. 389 = *petiolaris*.
elata, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 543 = *sempervirens*.
elata, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 5 = *elongata*.
Elliotii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 218. — *Am. bor.*
elliptica, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 214. — *Am. bor.*
elliptica, Ell. Sketch, ii. 376 = *Elliotii*.
elongata, Hort. Par. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 153 = *Elliotii*.
elongata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 327. — *Am. bor. occ.*
eminens, Bischoff, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 157 = *canadensis*.
erecta, DC. Prod. v. 340 = *bicolor*.
erecta, Ell. Sketch, ii. 385 = *speciosa*.
erecta, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 542. — *Am. bor.*
erecta, Nutt. Gen. Am. ii. 161 = *petiolaris*.
fistulosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 19 = *pilosa*.
flabellata, Schrad. ex Spreng. Syst. iii. 540 = *caesia*.
flabelliformis, Wendl. ex DC. Prod. v. 336. — *Hab.?*
flavovirens, Chapm. Fl. S. U. St. 211. — *Florida*.
flexicaulis, Linn. Sp. Pl. 879 = *latifolia*.
flexuosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 203 = *S. Virgaurea*.
floribundus, Wall. Cat. n. 3111 = *Senecio triligulatus*.
foliosa, Boj. ex DC. Prod. vi. 377 = *Senecio riparius*.
foliosa, Hill, Hort. Kew. 22. — *Am. bor.*
fragrans, Hort. Par. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 156 = *serotina*.
fragrans, Willd. Enum. Hist. Berol. Suppl. 59 = *elliptica*.
Frankii, Hochst. & Steud. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 152 = *patula*.
fruticosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 32. — *Mexic.*
fuscata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 402. — *Am. bor.*
Gattingeri, Chapm. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 156. — *Am. bor.*
genistoides, Bertol. Misc. Bot. vii. 37 = *stricta*.
gigantea, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 211 = *serotina*.
gigantea, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 2, partim = *lepidia*.
glaberrima, Martens, in Bull. Acad. Brux. viii. (1841) 68 = *missouriensis*.
glabra, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 402 = *serotina*.
glabra, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 22 = *sempervirens*.
glauca, S. G. Gmel. ex DC. Prod. v. 342 (= *Senecillus glauca*). — *Sibir.*
glomerata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 117. — *Am. bor.*
glutinosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 328 = *confertiflora*.
gonoclada, DC. Prod. v. 334 = *odora*.
gracilis, Hill, Hort. Kew. 22. — *Am. bor.*
gracilis, Hort. Par. ex Poir. Encyc. viii. 476; Schrad. Hort. Gotting. ex DC. Prod. v. 336 = *caesia*.
gracillima, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 215. — *Florida*.
graminifolia, Salisb. Prod. 199 = *lanceolata*, Linn.
grandiflora, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 403 = *littoralis*?
grandiflora, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 359 = *rigida*.
graveolens, Lam. Fl. Fr. ii. 145 = *Inula graveolens*.
Guiradonis, A. Gray, in Bot. Calif. i. 319, partim = *spectabilis*.
Guiradonis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 543. — *Calif.*
heterophylla, Nutt. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 148 = *multiradiata*.
heterotricha, Wall. Cat. n. 3225 = *Inula eupatorioides*.
hieracioides, Spreng. Syst. iii. 543 = *Liabum hieracioides*.
hirsuta, L'Hérit. ex DC. Prod. v. 330 = *canadensis*.
hirsuta, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 103 = *bicolor*.

SOLIDAGO:—

- hirsutissima*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = canadensis.
hirta, Willd. Enum. Hort. Berol. 891 = rugosa.
hispida, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2063 = bicolor vel nemoralis.
Houghtoni, Torr. & Gray, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 211.—Am. bor.
humilis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 402 = rugosa.
humilis, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 543.—Am. bor.
humilis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 16 = canadensis.
incana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 221.—Am. bor.
integerrima, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 24 = sempervirens.
integrifolia, Desf. Tabl. ed. I. 103 = sempervirens.
integrifolia, Roxb. in Beats. Tracts St. Helena App. 323 = Melanodendrum integrifolium.
juncea, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 213.—Am. bor.
juncea, DC. Prod. v. 334 = Boottii.
laevigata, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 215 = sempervirens.
lanata, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 4 = bicolor.
lancastricensis, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 38 = S. Virgaurea?
lanceolata, Bosc, ex DC. Prod. v. 334 = odora.
lanceolata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 27.—Afr. austr.
lanceolata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 502 = occidentalis.
lanceolata, Linn. Mant. i. 114.—Am. bor.
lanceolata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 116 = tenuifolia.
lancifolia, Chapm. Fl. S. U. St. 209.—Am. bor.
lapponica, With. Arr. Brit. Pl. ed. III. iii. 728 = S. Virgaurea.
lateriflora, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 211 = ulmifolia.
lateriflora, Linn. Sp. Pl. 879 = Aster diffusus.
lateriflora, Rafin. ex DC. Prod. v. 335 = caesia.
lateriflora, Willd. Sp. Pl. iii. 2057 = elliptica.
latifolia, Linn. Sp. Pl. 879.—Am. bor.
latifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = S. Virgaurea.
latissimifolia, Mill. l. c. n. 14 = elliptica.
laxa, Tausch, ex Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 254 = S. Virgaurea.
Leavenworthii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 223.—Am. bor.
leiocarpa, DC. Prod. v. 339 = macrophylla.
lepida, DC. l. c.—Am. bor.
leptocephala, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 226.—Am. bor.
Leucadendron, Forst. ex Spreng. Syst. iii. 539 = Senecio Leucadendron.
Leucadendron, Willd. Sp. Pl. iii. 2054 = Senecio prenanthiflorus.
leucanthemifolia, Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 673.—Hab.?
limonifolia, Pers. Syn. ii. 449 = sempervirens.
Lindeniana, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 46.—Cuba.
Lindheimeriana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 599.—Texas.
linearifolia, DC. Prod. v. 341 = microglossa.
linifolia, Linn. Sp. Pl. 881 = Senecio linifolius, Linn.
linoides, Soland. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 150 = stricta.
linoides, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 216 = neglecta.
lithospermifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 891 = sempervirens.
littoralis, Savi, ex Pers. Syn. ii. 450.—Europ. austr.
livida, Willd. Enum. Hort. Berol. 891 = caesia?
longifolia, Schrad. Hort. Gotting. ex DC. Prod. v. 330 = canadensis.
macrophylla, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 305 = latifolia.
macrophylla, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 542.—Am. bor.
macrophylla, Schloss. & Vukot. Syll. Fl. Croat. 54 = S. Virgaurea.
macrorrhiza, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hsp. ii. 39 = S. Virgaurea.
marginella, DC. Prod. v. 332 = microglossa.
Marshalli, Rothr. in Wheeler, Rep. Bot. 146.—Mexic.
marylandica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10.—Am. bor.
mexicana, Berland. ex DC. Prod. v. 332 = velutina.
mexicana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 104 = paniculata.
mexicana, Linn. Sp. Pl. 879 = sempervirens.
microglossa, DC. Prod. v. 332.—Reg. Argent.

SOLIDAGO:—

- minor*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4; Brot. Fl. Lusit. i. 382 = S. Virgaurea.
minuta, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1235.—Europ. austr.
minuta, Thore, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hsp. ii. 39 = S. Virgaurea.
missouriensis, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 32.—Am. bor.
mollis, Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1836) 5 = nemoralis.
mollis, Rothr. in Wheeler, Rep. Bot. 146 = canadensis.
montana, Hill, Veg. Syst. ii. 107 (Quid?).—Gallia.
montana, Poir. Encyc. viii. 474 = S. Virgaurea.
monticola, Chapm. Fl. S. U. St. 209.—Am. bor.
monticola, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 324 = S. Virgaurea.
Muhlenbergii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 214 = arguta.
multiflora, Desf. Tabl. ed. I. 103 = ulmifolia.
multiradiata, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 218.—Am. bor.
multiradiata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 328 = macrophylla.
nana, Nutt. l. c. 327.—Am. bor. occ.
narbonensis, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 329.—Gallia.
neglecta, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 213.—Am. bor.
nemoralis, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 213.—Am. bor.
nepalensis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 177 = S. Virgaurea.
nitida, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 210.—Am. bor.
nitidula, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 10 = microglossa.
noveboracensis, Linn. Sp. Pl. 880 = Aster tataricus?
noveboracensis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 23 = sempervirens.
nudiflora, Viv. Fl. Lib. Spec. 68; Fl. Cors. Sp. Nov. 15 = S. Virgaurea.
nutans, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 402 = canadensis.
obliqua, Moench, Meth. Suppl. 248 = sempervirens.
obovata, Bertol. Misc. Bot. vii. 36 = puberula.
occidentalis, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 226.—Am. bor. occ.
occitanea, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 581 = S. Virgaurea.
odora, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 214.—Am. bor.
odora, Chapm. Fl. S. U. St. 213, partim = Chapmani.
odora, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 45, partim = microglossa.
odora, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 118 = tortifolia.
ohioensis, Riddell, Syn. Fl. West. U. St. 57.—Am. bor. occ.
palmata, Pall. Reise, iii. 439 = Senecio palmatus.
paniculata, DC. Prod. v. 340.—Mexic.
parviflora, Rafin. Ann. Nat. 14 = rupestris.
patagonica, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 137.—Patagon.
patula, Muhl. in Willd. Sp. Pl. iii. 2059.—Am. bor.
pauciflora, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 359.—Am. bor.
pauciflosculosa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 116.—Am. bor.
petiolaris, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 216.—Am. bor.
petiolaris, A. Gray, in Bot. Mex. Bound. 79 = Bigelovii.
petiolaris, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 145, partim = californica.
petiolaris, Less. in Linnaea, vi. (1831) 502 = spathulata.
petiolaris, Muhl. Cat. 79 = speciosa.
petiolata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 29 (Quid?).—Am. bor.
pilosa, Mill. l. c. n. 9 = rugosa.
pilosa, Walt. Fl. Carol. 207.—Am. bor.
Pitcheri, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 101 = serotina.
plantaginea, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 402 = elliptica.
polifolia, Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit. 348.—Am. bor.
polyglossa, DC. Prod. v. 332 = microglossa.
praecox, Moench, Meth. 599 = canadensis.
procera, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 211 = canadensis.
pubens, M. A. Curt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 198 = Curtisii.
puberula, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 502 = californica.

SOLIDAGO:—

- puberula*, DC. Prod. v. 333 = nemoralis.
puberula, Nutt. Gen. Am. ii. 162.—Am. bor.
pubescens, Ell. Sketch, ii. 381 = puberula.
pubescens, Wall. Cat. n. 3228 = S. Virgaurea.
pubescens, Walp. Rep. ii. 960 = Curtisii.
pulverulenta, Nutt. Gen. Am. ii. 161 = puberula.
pumila, Crantz, Inst. i. 326 = minuta.
pumila, Pers. Syn. ii. 450 = S. Virgaurea.
pumila, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 210.—Am. bor.
puncticulata, DC. Prod. v. 332 = odora.
pygmaea, Bertol. in Nov. Comm. Bologn. v. (1842) 215, t. 17. f. 1 = S. Virgaurea.
pyramidalis, Moench, Meth. Suppl. 248.—Hab.?
pyramidata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 537 = pilosa.
Radula, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 102.—Am. bor.
recurvata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 28 = rugosa.
recurvata, Willd. Enum. Hort. Berol. 889.—Am. bor.
reflexa, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 211 = canadensis.
repens, D. Don, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 11 = microglossa.
reticulata, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 520 = S. Virgaurea.
retrorsa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 117 = odora.
retrorsa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 539 = tortifolia.
retusa, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 27 = Nidorella foliosa.
Riddellii, Frank, in Riddell, Syn. Fl. West U. St. 57.—Am. bor. occ.
rigida, Linn. Sp. Pl. 880.—Am. bor.
rigidula, Bosc, ex DC. Prod. v. 333 = rugosa.
rosmarinifolia, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 167 = Olearia rosmarinifolia?
rotundifolia, DC. Prod. v. 339 = S. Radula.
rotundifolia, Roxb. in Beats. Tracts St. Helena App. 324 = Psiadia rotundifolia.
rubricaulis, Wall. Cat. n. 3223 = Inula rubricaulis.
rugosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 25.—Am. bor.
rupestris, Rafin. Ann. Nat. 14.—Am. bor.
salicifolia, Salisb. Prod. 199 = stricta.
salicifolia, Wall. ex DC. Prod. v. 343 = Microglossa albescens.
salicina, Ell. Sketch, ii. 389 = patula.
Sarothrae, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 540 = Gutierrezia Euthamiae.
Saulii, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 324, in obs. = S. Virgaurea.
scaberrima, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 221 = S. Radula.
scabra, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835-36) 97 = patula.
scabra, Muhl. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 224 = canadensis.
scabra, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2059 = rugosa.
scabrida, DC. Prod. v. 331.—Mexic.
Schraderi, DC. l. c. 336 = caesia.
scrophularifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12.—Am. bor.
semiflosculosa, Walp. Rep. ii. 589, in syn. = pauciflosculosa.
sempervirens, A. Gray, in Bot. Calif. i. 319 = confinis.
sempervirens, Linn. Sp. Pl. 878.—Am. bor.
sempervirens, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 119, partim = speciosa.
Sera, J. F. Gmel. Syst. 1236 = serotina.
serotina, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 211.—Am. bor.
serotina, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 97 = missouriensis.
serotina, Retz. Obs. ii. 26 (Quid?).—Am. bor.
serratifolia, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 324, in obs. = S. Virgaurea.
serratifolia, Gilib. Fl. Litan. i. 202 = Senecio paludosus.
Shortii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 222.—Am. bor.
sibirica, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 39, nomen.—Sibir.
simplex, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 163.—Mexic.
sparsiflora, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 58.—Am. bor. occ.
spathulata, DC. Prod. v. 339.—Mexic.
speciosa, Nutt. Gen. Am. ii. 160.—Am. bor.
spectabilis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 193.—Am. bor.
sphacelata, Rafin. Ann. Nat. (1820) 14 = Brachychaeta cordata.
spiciformis, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 202 = spathulata.

SOLIDAGO:—

- spithamea, *M. A. Curt. ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii. (1842) 42.*—Am. bor.
spuria, Forst. in *Comm. Gotting. ix. (1789) 68*=*Commidendrum spurium*.
squarrosa, *Muhl. Cat. 79; Nutt. Gen. Am. ii. 161.*—Am. bor.
squarrosa, *Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 102*=*petiolaris*.
stricta, *Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 216.*—Am. bor.
stricta, *Hook. Fl. Bor. Am. ii. 4*=*humilis, uliginosa*.
stricta, *Less. in Linnaea, vi. (1831) 502*=*elongata*.
stricta, *Moench, Meth. Suppl. 249.*—Hab.?
suaveolens, *J. F. Gmel. Syst. 1235.*—Hab.?
tardiflora, *Moench, Meth. 599*=*sempervirens*.
tenuifolia, *Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 540.*—Am. bor.
Terrae-Novae, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 206.—Am. bor.
thyrsoides, *E. Mey. Pl. Labrad. 63*=*macrophylla*.
Polmiceana, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 151.—Am. bor. occ.
tortifolia, *Ell. Sketch, ii. 377.*—Am. bor.
Tournefortii, *Tausch, in Flora, xi. (1823) 500*=*canadensis*.
uliginosa, *Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 101.*—Am. bor.
ulmifolia, *Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 97*=*Drummondii*.
ulmifolia, *Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2060.*—Am. bor.
urticaefolia, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 30*=*Calea urticaefolia*.
valesiaca, *Bor. ex Déségl. in Feuilles Jeunes Nat. viii. (1877) 18*=*S. Virgaurea*.
velutina, *DC. Prod. v. 332.*—Mexic.
varia, *Hill, Hort. Kew. 21 (Quid?).*—Am. bor.
vena, M. A. Curt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 205.—Am. bor.
verrucosa, *Schrad. Hort. Gotting. 12. t. 6*=*elliptica vel arguta*.
villosa, *Ell. Sketch, ii. 372*=*villosa*.
villosa, *Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 537*=*rugosa*.
viminea, *Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 215*=*sempervirens*.
viminea, *Bosc, ex DC. Prod. v. 341*=*bicolor*.
Virga, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 570*=*S. Virgaurea*.
Virga-aurea, *Auct.*=*S. Virgaurea*.
virgata, *Michx. Fl. Bor. Am. ii. 117*=*stricta*.
virgata, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 70*=*S. Virgaurea*.
Virgaurea, *Bigel. Fl. Bost. ed. II. 306 (excl. var.)*=*macrophylla*.
Virgaurea, *Linn. Sp. Pl. 880.*—Reg. bor. temp.
virginiana, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11*=*rugosa*.
viscosa, *Lam. Fl. Fr. ii. 144*=*Inula viscosa*.
viscosa, *Schrad. Sert. Hannov. 12*=*Psidium glutinosa*.
vulgaris, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2; Lam. Fl. Fr. ii. 145*=*S. Virgaurea*.
vulneraria, *Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 9, nomen*=*microglossa*.
Wrightii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 80.*—Texas.
zeylanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 257*=*ceylanica*.

SOLIERA, Clos, in *C. Gay. Fl. Chil. iv. 489. t. 53 (1849)*. **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1187. *pulchella*, Clos, l. c.—Chili.

SOLIVA, Ruiz & Pav. *Prod. 113. t. 24 (1794)*. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 430.
GYMNOSTYLES, Juss. in *Ann. Mus. Par. iv. (1804) 258. t. 61*.
acaulis, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 326 (araulis).*—Reg. Argent.
aculeata, *Ruiz & Pav. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 185*=*Plagiocheilus solivaeformis*.
alata, *DC. Prod. vi. 143*=*sessilis*.
anthemifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 102.*—Am. austr.; Austral.
aphanes, *Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 54, nomen.*—Peruv.
Barclayana, *DC. Prod. vi. 143*=*sessilis*.
daucifolia, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 403*=*sessilis*.
dioica, *Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr. 53.*—Chili.
lusitanica, *Less. Syn. Comp. 268*=*nasturtiifolia*.
mexicana, *DC. Prod. vi. 143*=*Cotula pygmaea*.
microloma, *Phil. in Anai. Univ. Chil. (1865) ii. 331.*—Chili.

SOLIVA:—

- minuta*, Sweet, *Hort. Brit. ed. II. 317*=*Cotula pygmaea*.
Mutisii, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 302.*—N. Granat.
nasturtiifolia, *DC. Prod. vi. 142.*—Reg. Argent.
pedicellata, *Ruiz & Pav. Syst. Veg. 215*=*Cotula pygmaea?*
pedunculata, *Ruiz & Pav. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 609, sphalm.*=*praec.*
pterosperma, *Less. Syn. Comp. 268*=*sessilis*.
pygmaea, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 303*=*Cotula pygmaea*.
radiata, *Poepp. ex DC. Prod. vii. 288*=*Blennosperma chilense*.
sessilis, *Ruiz & Pav. Prod. 113. t. 24; Syst. Veg. 215.*—Am. bor. et austr.
stoionifera, *Loud. Hort. Brit. 364*=*nasturtiifolia*.
tenella, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 128*=*Cotula australis*.
triniifolia, *Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 202.*—Reg. Argent.
urbica, *Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 7*=*nasturtiifolia*.
valdiviana, *Phil. l. c. xxxiii. (1864–65) 168.*—Chili.

SOLIVAEA, Cass. in *Dict. Sc. Nat. xxix. 177 (1823)*=*praec.*

SOLLYA, Lindl. *Bot. Reg. (1830) t. 1466*. **PITTO-SPOREAE**, Benth. & Hook. f. i. 133.
XEROSOLLYA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 362*.
angustifolia, *Lindl. Bot. Reg. sub t. 1466*=*Billardiera scandens*.
Drummondii, *C. Morr. in Belg. Hort. iv. (1854) 196. t. 33. f. 3–8*=*heterophylla?*
fusiformis, *Hort. ex Payer, Organog. t. 34*=*heterophylla*.
heterophylla, *Lindl. Bot. Reg. t. 1466.*—Austral.
linearis, *Lindl. l. c. (1839) Misc. 83*=*heterophylla*.
parviflora, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 361.*—Austral.
salicifolia, *Marnock, Flor. Mag. iv. (1839–40) 62, 136. t. 44. f. 2*=*heterophylla?*

SOLMSIA, Baill. *Adansonia, x. (1871) 37*. **TILI-ACEAE**.
calophylla, *Baill. l. c. 38.*—N. Caled.
chrysophylla, *Baill. l. c.*—N. Caled.

SOLORI, Adans. *Fam. ii. 327 (1763)*=**Dalbergia**, Linn. (*Legumin.*).

SOLSTITIARIA, Hill, *Veg. Syst. iv. 21 (1762)*=**Centaurea**, Linn. (*Compos.*).
flava, *Hill, Herb. Brit. i. 77*=*C. solstitialis*.
melitensis, *Hill, Hort. Kew. 62*=*C. melitensis*.
solstitialis, *Hill, l. c.*=*C. solstitialis*.

SOLTMANNIA, [Klotzsch], ex *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 132*=**Miconia**, Ruiz & Pav. (*Melastom.*).
splendens, *Klotzsch, ex Naud. l. c.*=*M. mexicana*.

SOMERA, Salisb. *Gen. Pl. Fragm. 26 (1866)*=**Scilla**, Linn. (*Liliac.*).
italica, *Salisb. l. c. 27*=*Scilla italica*.

SOMERAUERA, Hoppe, in *Flora, ii. (1819) 26*=**Arenaria**, Rupp. (*Caryoph.*).
quadrifaria, *Hoppe, l. c.*=*A. aretioides*.
quadrifida, *Reichb. Ic. Fl. Germ. v. t. 204*=*praec.*

SOMMEA, Bory, in *Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 94. t. 87*=**Acicarpa**, Juss. (*Calycer.*).
Calcitrapa, *Bory, l. c.*=*A. spathulata*.

SOMMERA, Schlecht. in *Linnaea, ix. (1834) 602*. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 79.
arborescens, *Schlecht. l. c.*—Mexic.
grandis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 326*=*arborescens*.

SOMMERAUERA, Endl. *Ench. 505 (1841)*, sphalm.=**SOMERAUERA**, Hoppe=**Arenaria**, Rupp. (*Caryoph.*).

SOMMERFELDTIA, Schum. in *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 331 (1827)*=**Drepanocarpus**, G. F. W. Mey. (*Legumin.*).
obovata, *Schum. l. c.*=*D. lunatus*.

SOMMERFELTIA, Less. *Syn. Comp. 189 (1832)*. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 275.
spinulosa, *Less. l. c. 190.*—Bras.

SOMMERINGIA, Lindl. *Veg. Kingd. 554 (1847)*, sphalm.=**Soemmeringia**, Mart. (*Legumin.*).

SOMMERA, Benth. & Hook. f. *Gen. iii. 909 (1883) err. typ.*=*seq.*

SOMMIERIA, Becc. *Malesia, i. (1877) 66*. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 909.
elegans, *Becc. l. c. 68.*—N. Guin.
leucophylla, *Becc. l. c. 67.*—N. Guin.

SOMPHOXYLON, Eichl. in *Flora, xlvii. (1864) 396*; et in *Mart. Fl. Bras. xiii. 1. 205. t. 37 (1864)*.
Genus dubium MENISPERMACEARUM.—Cf. Benth. & Hook. f. *Gen. i. 959*.
Wulschlagelii, *Eichl. ll. cc.*—Guian.

SONCHIDIUM, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl. 6 (1874)*=**Sonchus**, Tourn. (*Compos.*).
maritimum, *Pomel, l. c. 7*=*Sonchus maritimus*.
palustre, *Pomel, l. c.*=*Sonchus palustris*.

SONCHOS, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 171*=**Sonchus**, Tourn. (*Compos.*).

SONCHOSERIS, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 102*=**Sonchus**, Tourn. (*Compos.*).
arvensis, *Fourr. l. c. 103*=*Sonchus arvensis*.
decora, *Fourr. l. c. 102*=*Sonchus decorus*.
maritima, *Fourr. l. c.*=*Sonchus maritimus*.
palustris, *Fourr. l. c. 103*=*Sonchus palustris*.

SONCHUS, [Tourn.] *Linn. Syst. ed. I (1735)*. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 528.

ATALANTHUS, Don, in *Edinb. N. Phil. Journ. (1828–29) 311*.

SONCHIDIUM, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl. 6 (1874)*.
SONCHOSERIS, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 102*.

TRACHODES, D. Don, in *Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 182*.

abbreviatus, *Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 146*=*congestus*.

acanthifolius, [Clairv.] *Man. Herb. 231*=*Lactuca Plumieri*.

acanthoides, *Steud. Nom. ed. II. ii. 610*=*Lactuca Plumieri*.

acaulis, *Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iv. 12*=*congestus*.

acidus, *Schousb. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1511.*—Marocc.

acuminatus, *Bigel. Fl. Bost. ed. II. 290*=*Lactuca alpina*.

acuminatus, *Willd. Sp. Pl. iii. 1521*=*Lactuca canadensis*.

adscendens, *Boj. ex DC. Prod. vi. 303*=*Emilia adscendens*.

agrestis, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 110*=*Erechtites praecalta*.

albanus, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 59*=*Lactuca racemosa*.

alpestris, [Clairv.] *Man. Herb. 231*=*Lactuca alpina*.

alpinus, *Linn. Sp. Pl. 794*=*Lactuca alpina*.

altissimus, *Vahl, ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 431*=*congestus*.

amboinensis, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 610*=*Emilia flammea*.

amplexicaulis, *Gueldenst. Reisen, ii. 209; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 836.*—Rossia.

angustifolius, *Desf. Fl. Atlant. ii. 225*=*fruticosus*.

angustifolius, *Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 326*=*maritimus*.

angustissimus, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 203.*—Afr. trop.

aquatilis, *Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 330*=*maritimus*.

arborescens, *Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 549*=*tenerrimus*.

arbores, *DC. Prod. vi. 189.*—Ins. Canar.

arvensis, *Linn. Sp. Pl. 793.*—Europ.; As. bor.

asper, *Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 125*=*oleraceus*.

asper, *Hill, Herb. Brit. i. 47; Vill. Hist. Fl. Dauph. iii. 158.*—Cosmop.

SONCHUS:—

asper, Wulf. ex DC. Prod. vii. 190 = *Picris hieracioides*.
australis, Hort. ex Trev. Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1818) 6 = *longifolius*.
azureus, Ledeb. Fl. Alt. iv. 138 (= *Mulgedium azureum*).—Sibir.
balthicus, Fries, ex Link, Handb. i. 784, in syn. = *maritimus*.
biennis, Moench, Meth. 545 = *Lactuca floridana*.
Bipontini, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 160 = *lactucoides*.
Bocconi, Jan. Cat. 658; ex DC. Prod. vii. 183 = *chondrilloides*.
Bollei, Sch. Bip. ex Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 298 = *gorgadensis*.
Bourgeauii, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 446.—Ins. Canar.
brachylobus, Webb & Berth. l. c. 438.—Ins. Canar.
brachyotus, DC. Prod. vii. 186 = *arvensis*.
brasilienis, Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 293 = *Erechtites praealta*.
Broussonetii, Desf. Tabl. ed. II. 101 = *congestus*.
Brunneri, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 459.—Afr. trop.
bupleurifolius, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 797.—Armenia.
calciaefolius, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 241 (= *Mulgedium calciaefolium*).—Reg. Cauc.
caeruleus, Sm. Fl. Brit. 815 = *Lactuca alpina*.
californicus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 361 = *Malacothrix saxatilis*.
calyculatus, Roxb. ex DC. Prod. vii. 140 = *Lactuca Heyneana*.
canadensis, Froel. in Usteri, Ann. Bot. i. (1791) 29 = *Lactuca macrophylla*.
canadensis, Linn. Sp. Pl. 793 = *Lactuca alpina*.
Candolleanus, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 110 = *Launaea chondrilloides*.
capensis, Schlecht. Hort. Hal. (1850) 7.—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 211.—Afr. austr.
capitatus, Spreng. Syst. iii. 650 = *Launaea glomerata*.
carolinianus, Walt. Fl. Carol. 192 = *asper*.
Cassinianus, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 112 (= *Zollia kofera Cassiniana*).—Aegypt.
caucasicus, Biehl. Cent. Pl. Rar. 12. n. 31; et ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 88.—Reg. Cauc.
caucasicus, Spreng. Fl. Hal. Mant. i. 49.—Reg. Cauc.
cervicornis, Nym. Syll. 38 = *Launaea spinosa*.
cervicornis, Willk. Ind. Sem. Hort. Prag. (1875).—Hab.?
chinensis, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 33, nomen; et ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 65.—China.
chondrilloides, Desf. Fl. Atlant. ii. 226.—Alger.
chondrilloides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 67 = *Picridium vulgare*.
chuquitensis, Meyen, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 294 = *congestus*.
cichoraceus, Moench, Meth. Suppl. 222 = *Lactuca Plumieri*.
ciliatus, Lam. Fl. Fr. ii. 87 = *oleraceus*.
ciliatus, Perr. ex DC. Prod. vii. 177 = *Lactuca goraënsis*.
coeruleus, Auct. = *caeruleus*.
congestus, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 136.—Ins. Canar.
cordifolius, Desf. Tabl. ed. I. 87 = *Lactuca macrophylla*.
cornutus, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 610, nomen; Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 459.—Afr. trop.
crassifolius, Pourr. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1509.—Hispan.
crepioides, Sm. in Rees, Cycl. xxxiii. n. 24.—Afr. bor.
crispus, Poir. Encyc. Suppl. iii. 289.—Ins. Canar.
crisulatus, Sch. Bip. in Pollichia, xxii–xxiv. (1866) 318 (= *Dubyaea crisulata*).—Austral.
crocifolius, Hort. ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 449 = *asper*.
Cumbulus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3251 = *arvensis*.
cuspidatus, Blume, Bijdr. 888.—Java.
cyaneus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 164 = *Lactuca hastata*.
Daltonii, Webb, in Hook. Niger Fl. 144. t. 15.—Ins. Cap. Virid.
decorus, Cast. Cat. Pl. Env. Marseille, 91.—Hispan.

VOL. II.

SONCHUS:—

dentatus, Banks, ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 23 = *ustulatus*.
dentatus, Ledeb. Fl. Alt. iv. 141.—Sibir. altaic.
dichotomus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 240 = *Picridium dichotomum*.
dichotomus, Savi, Cose Bot. 10 = *Launaea nudicaulis*.
divaricatus, Buch, Besch. Canar. Ins. 147 = *nudicaulis*.
divaricatus, Desf. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 212 = *Launaea nudicaulis*.
divaricatus, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 610 = *Picridium dichotomum*.
Dregeanus, DC. Prod. vii. 184.—Afr. austr.
dulosus, Fisch. & Mey. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 414.—Hab.?
Ecklonianus, DC. Prod. vii. 184.—Afr. austr.
elongatus, Kunze, ex Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal. (1849) 7.—Hab.?
eriopus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 247.—Ind. or.
eryngioides, DC. Prod. vii. 185 = *asper*.
erythropappus, Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 293 = *Erechtites valerianaefolia*.
exaltatus, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 659 (Beitr. Fl. Hercyn. 289) = *arvensis*?
fallax, Wallr. Ann. Bot. 98; Sched. Crit. 432 = *asper*.
ferox, Wall. Cat. n. 3248 = *asper*.
flexuosus, Ledeb. Hort. Dorpat. Suppl. i. 5.—Reg. Cauc.
floridanus, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 116 = *Lactuca alpina*.
floridanus, Linn. Sp. Pl. 794 = *Lactuca floridana*.
floridanus, Lour. Fl. Cochinch. 480 = *Lactuca brevirostris*.
floridanus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 85, partim = *Lactuca acuminata*.
fragilis, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 372.—Afr. bor. occ.
frondosus, Salisb. Prod. 180 = *congestus*.
fruticosus, Jacq. Coll. i. 13 = *congestus*.
fruticosus, Linn. f. Suppl. 346.—Ins. Mader.
fruticosus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = *Centratherum frutescens* (in Addend.).
gibbosus, Savi, Fl. Ital. i. 47.—Italia.
glaber, Gilib. Fl. Lituan. i. 242 = *oleraceus*.
glaber, Schult. Obs. Bot. 162 = *arvensis*.
glaber, Thunb. Prod. Pl. Cap. 139 = *asper*.
glandulosus, Schur, Enum. Pl. Transs. 371 = *arvensis*.
glaucescens, Ford. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 75. t. 5.—Reg. Mediterr.
glaucus, Thunb. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 135.—Hab.?
glutinosus, Lam. Fl. Fr. ii. 88 = *Hieracium glutinosum*.
goraënsis, Lam. Encyc. iii. 397 = *Lactuca goraënsis*.
goraënsis, Less. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 610 = *Prenanthes alata*.
gorgadensis, Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 298.—Ins. Canar.
graeus, Reut. ex E. Weiss, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 45 = *glaucescens*.
gramineus, Boj. ex DC. Prod. vi. 303 = *Emilia graminea*.
gummifer, Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 146.—Ins. Canar.
hantonienis, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 278 = *arvensis*?
hastatus, Less. in Linnaea, vi. (1831) 99 = *Prenanthes alata*.
hastatus, Wall. Cat. n. 3250 = *Lactuca hastata*.
hieracioides, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 240.—Hispan.
hispanicus, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 9 = *Picridium tingitanum*.
hispidulus, Bové, ex DC. Prod. vii. 182 = *Picridium tingitanum*.
hispidus, Gilib. Fl. Lituan. i. 241 = *arvensis*.
hispidus, Ledeb. Fl. Alt. iv. 140 (= *Mulgedium hispidum*).—Sibir.
Hochstetteri, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 160 = *Lactuca goraënsis*.
Hotha, C. B. Clarke, Comp. Ind. 276.—Burma.
hyoseridifolius, Hornem. Hort. Hafn. ii. 752 = *ustulatus*.
hypochaeroides, Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal. (1850) 7.—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 212.—Hab.?
infestus, Poepp. ex DC. Prod. vii. 185 = *asper*.
integrius, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 528.—Afr. austr.
intermedius, Jan, ex DC. Prod. vii. 182 = *Picridium intermedium*.

SONCHUS:—

intermedius, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 434, cum. cit. falsa = *arvensis*.
intermedius, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 234 (Quid?).—Europ.
italicus, Spreng. Syst. iii. 651 = *tenerimus*.
Jacquini, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 147 = *congestus*.
javanicus, Spreng. Syst. iii. 648 = *Prenanthes javanica*.
lacerus, Willd. Sp. Pl. iii. 1513 = *oleraceus*.
lacinatus, T. Moore, in Flor. & Pom. (1871) 138.—Hab.?
lactucoides, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 114 (Enum. Pl. Chin. Bor. 40) = *Lactuca tatarica*.
lactucoides, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 467.—Abyss.
laevigatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 54.—Ins. Mader.
laevis, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 158 = *oleraceus*.
laevis, Schur, Enum. Pl. Transs. 371 = *arvensis*.
lampsanoides, Lam. Fl. Fr. ii. 90 = *Crepis lampsanoides*.
laponicus, Froel. in Usteri, Ann. Bot. i. (1791) 26, in textu = *Lactuca floridana*?
leptocephalus, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 281.—Ins. Canar.
leucodon, Fisch. & Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 832 = *Launaea nudicaulis*.
leucophaeus, Willd. Sp. Pl. iii. 1520 = *Lactuca alpina*.
libycus, Spach, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 823 = *fruticosus*.
littoralis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 274 = *maritimus*.
longifolius, Trev. Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1818) 6; et in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 197.—Hab.?
longifolius, Wall. Cat. n. 3251 = *arvensis*.
ludovicianus, Nutt. Gen. Am. ii. 125 = *Lactuca ludoviciana*.
luxurians, Schrad. ex Steud. Nom. ed. I. 799 = *Launaea macrophylla*.
lyratus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 53 = *laevigatus*.
macranthus, Poir. Encyc. Suppl. iii. 289 = *congestus*.
macrophyllus, Willd. Sp. Pl. iii. 1519 = *Lactuca macrophylla*.
macrotus, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312 = *oleraceus*.
malayanus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 113.—Java.
maritimus, Echeand. ex Losc. & Pard. Ser. Inconf. ed. I. 64 = *palustris*.
maritimus, Linn. Syst. ed. X. 1192.—Europ.; Reg. Mediterr.
maritimus, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 843 = *Lactuca sibirica*.
maritimus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 96 = *arvensis*.
massaviensis, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 160 = *Heterochaena massaviensis*.
mauritanicus, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 70.—Alger.
melanolepis, Fresen. in Mus. Senckenb. iii. (1839) 76.—Abyss.
Metzianus, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 396 = *Crepis acaulis*.
montanus, Lam. Encyc. iii. 401 = *Lactuca alpina*.
multiflorus, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 145 = *Lactuca alpina*.
nanus, Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 528.—Afr. austr.
nigricans, Tausch, in Flora, xii. (1829) 35.—Ital.
nitidus, Vill. Prosp. 33; Hist. Pl. Dauph. iii. 160 = *arvensis*.
Novae-Zelandiae, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 528.—N. Zel.
nudicaulis, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 427.—Aegypt.
Nymanii, Tineo & Guss. in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 860 = *arvensis*.
occidentalis, Spreng. Neue Entdeck. ii. 143 = *Erechtites praealta*.
oleraceus, Linn. Sp. Pl. 794.—Cosmop.
oleraceus, Wall. Cat. n. 3252 F = *asper*.
oreophilus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 114.—Java.
orixensis, Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 402 = *arvensis*.
oxyspermus, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 658 (Beitr. Fl. Hercyn. 288) = *tenerimus*?
pallesens, Panč. Elench. Crna Gora, 55.—Monte-negr.

6 E

SONCHUS:—

pallidus, Torr. Compend. Fl. N. St. 279 = *Lactuca alpina*.
pallidus, Willd. Sp. Pl. iii. 1521 = *Lactuca canadensis*.
paludosus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 836 = *palustris*.
palustris, Linn. Sp. Pl. 793.—Europ.; As. Min.
paniculatus, Moq. & Sesse, ex DC. Prod. vii. 191.—Mexic.
parviflorus, Lej. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 274 = *oleraceus*.
pauciflorus, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 171.—Madag.
pauciflorus, Echeand. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 240 = *maritimus*.
pectinatus, DC. Rapp. Voy. ii. 78 = *tenerimus*.
pendulus, Webb, ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 421 = *Prenanthes pendula*.
pennsylvanicus, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 611 (Quid?).—Am. bor.?
pentaphyllus, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 160 = *Lactuca taraxacifolia*.
perfoliatus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 836 (Quid?).—Rossia.
picroides, Lam. Encyc. iii. 398 = *Picridium vulgare*.
picroides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 68 = *Picridium intermedium*.
pinnatifidus, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 78 = *acidus*.
pinnatifidus, Lag. ex DC. Prod. vii. 182 = *Picridium tingitanum*.
pinnatus, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 116.—Ins. Mader.
platylepis, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 433.—Ins. Canar.
Plumerianus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 171 = seq.
Plumerii, St. Lag. l. c. = seq.
Plumieri, Linn. Syst. ed. X. 1192 = *Lactuca Plumieri*.
Plumieri, Pané. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. ix. (1860) 173 (= *Mulgedium Panticii*).—Europ. austr.
polyodon, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 431 = *congestus*.
pratensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 968 (Index), sphalm. = *arvensis*.
prenanthoides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 242 (= *Mulgedium prenanthoides*).—Reg. Cauc.
prenanthoides, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 459.—Afr. trop.
pulchellus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 502 = *Lactuca pulchella*.
pustulatus, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 242.—Hispan.
quercifolius, Desf. Fl. Atlant. ii. 225. t. 213.—Afr. bor.
racemosus, Lam. Encyc. iii. 400 = *Lactuca alpina*.
radiatus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 279, sphalm. = seq.
radicatus, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 116.—Ins. Mader.; Teneriff.
rarifolius, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 460.—Afr. trop.
reflexus, Lag. Elench. 15; ex ej. Gen. et Sp. Nov. 24 = *Launaea nudicaulis*.
reversus, E. Mey. ex DC. Prod. vii. 186 = *oleraceus*.
rivularis, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 194.—Chili.
robustus, Wall. Cat. n. 3249 = *Lactuca hastata*.
roseus, Bess. in Spreng. Syst. iii. 651 = *oleraceus*.
Royleanus, DC. Prod. vii. 184 = *oleraceus*.
runcinatus, Vent. ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 434.—Ins. Canar.
sagittatus, Moench, Meth. 544 = *palustris*.
Schimperi, A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1857) App. 1 = *oleraceus*.
Schmidianus, C. Koch, l. c. (1853) App. 12 = *oleraceus*.
Schweinfurthii, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 458.—Afr. trop.
scorzoneraeformis, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 (= *Zollikoferia pumila*).—Hispan.; Arab.
serratus, Perr. ex DC. Prod. vii. 138 = *Lactuca taraxacifolia*.
sespedalis, Gilib. Fl. Lituan. i. 241 = *palustris*.
setosus, Ehrenb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 414 (Quod?).—Hab.?
shzuciniatus, Turcz. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) 1. 189 = *arvensis*.
sibiricus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 240 = *Lactuca racemosa*.

SONCHUS:—

sibiricus, Linn. Sp. Pl. 795 = *Lactuca sibirica*.
sibiricus, Richards. App. Frankl. 1st Voy. ed. II. 30 = *Lactuca pulchella*.
simplicissimus, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 = *crassifolius*.
Spachii, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 307.—Nubia.
spicatus, Lam. Encyc. iii. 401 = *Lactuca alpina*.
spinusos, DC. Prod. vii. 189 = *Launaea spinosa*.
spinusos, Lam. Fl. Fr. ii. 86 = *asper*.
spinusos, Marès, Cat. Pl. Ins. Baléar. 172.—Ins. Baléar.
spinulosus, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 292 = *asper*.
squamosus, Lam. Fl. Fr. ii. 87 = *Picridium vulgare*.
squarrosus, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 147 = *fruticosus*.
subacaulis, Dum.-Cours. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 611 (Quid?).—Hab.?
sulphureus, Boiss. Fl. Orient. iii. 796 = *asper*.
sundaicus, Blume, Bijdr. 888.—Java.
taraxacifolius, Spreng. Syst. iii. 649 = *Lactuca intybacea*.
taraxacifolius, Willd. Sp. Pl. iii. 1511 = *Lactuca taraxacifolia*.
tataricus, Linn. Mant. ii. 572 = *Lactuca tatarica*.
tenax, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 278 (Quid?).—Sibir.
tener, Salisb. Prod. 179 = seq.
tenerimus, Linn. Sp. Pl. 794.—Reg. Mediterr.
tenerimus, Schur, Enum. Pl. Transs. 371 = *oleraceus*.
tenuifolius, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 438 = *tenerimus*.
tigrinus, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xiv. (1856) 231.—Mesopot.
tingitanus, Lam. Encyc. iii. 397 = *Picridium tingitanum*.
tomentosus, Palau, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 249 = *Crepis albida*.
torulosus, Savi, Fl. Ital. i. t. 15 = *gibbosus*.
tuberosus, Murr. Syst. ed. XIII. 594; Linn. f. Suppl. 346 = *Lactuca tuberosa*.
uliginosus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 238 = *arvensis*.
umbellatus, E. Mey. ex DC. Prod. vii. 185 = *asper*.
umbellifer, Thunb. Prod. Pl. Cap. 139 = *oleraceus*.
ustulatus, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 22.—Ins. Mader.
vaginatus, Hort. Erf. ex Steud. Nom. ed. I. 799.—Hab.?
virgatus, Desf. ex Steud. l. c. 655, 799 = *Prenanthes virgata*.
volkynicus, Bess. ex Nym. Consp. 433 = *Lactuca tatarica*.
Wallichianus, DC. Prod. vii. 185; et in Deless. Ic. Sel. iv. t. 97 = *arvensis*.
Webbii, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 444.—Ins. Canar.
Wightianus, DC. Prod. vii. 187 = *arvensis*.
zacanthoides, DC. l. c. 184 = *oleraceus*.

SONDARIA, Dennst. Schlusss. Hort. Malab. 31 (1818).
RHAMNEAE?
cranganorensis, Dennst. l. c. (Quid?).—Ind. or.

SONDERA, Lehm. Pugill. viii. 44 (1844) = **Drosera**, Linn.
macrantha, Lehm. l. c. = *D. macrantha*.
Preissii, Lehm. l. c. 45 = *D. Preissii*.

SONERILA, Roxb. Hort. Beng. [5] (1814); Fl. Ind. i. 176 (1832). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 753.
acaulis, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 46 = *Wallichii*.
affinis, Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 307 = *zeylanica*.
affinis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 109 = *Brunonis*.
amabilis, Bedd. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 76, nomen.—Ind. or.
amabilis, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) ii. 53.—Reg. Himal.
angustata, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 76.—Zeylan.
angustifolia, Roxb. Hort. Beng. [5]; Fl. Ind. i. 178 = *maculata*.
arguta, R. Br. in Wall. Cat. n. 4095.—Reg. Himal.
Arnottiana, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 108 = *Wightiana*.
axillaris, Wight, Ic. t. 1058 = *versicolor*.
begoniaefolia, Blume, in Flora, xiv. (1831) 490 = *moluccana*.
Bensoni, Hook. f. Bot. Mag. t. 6049.—Ind. or.
biflora, Zoll. & Mor. Syst. Vers. Zoll. 11.—Java.

SONERILA:—

brachyandra, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 320 = *tenera*.
Brandisiana, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) ii. 53.—Burma.
Brunonis, Wight & Arn. Prod. 321.—Ind. or.
bullata, Griff. Notul. iv. 675 = *Driessenia bullosa*.
bullosa, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 73, sphalm. = *praece*.
ceylanica, Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 307 = *zeylanica*.
elegans, Hook. Bot. Mag. t. 4978 = *speciosa*.
elegans, Wight, Spicil. Neilgh. i. 57. t. 67.—Ind. or.
emaculata, Roxb. Hort. Beng. [5]; Fl. Ind. i. 178 = *maculata*.
erecta, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 7.—Burma; Malaya.
firma, Thw. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 75, nomen = *Gardneri*.
Fordi, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1457.—China.
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 107.—Zeylan.
glaberrima, Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 307 = *zeylanica*.
grandiflora, R. Br. in Wall. Cat. n. 4099.—Ind. or.
Griffithii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 539.—Malacca.
Guneratnei, Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 208 = *linearis*.
Hartwegi, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 76, sphalm. = seq.
Harveyi, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 107.—Zeylan.
Helferi, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 540.—Burma.
Hendersoni, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1874) ii. 83; et ex Fourn. Illustr. Hort. xxiii. (1876) 11. t. 230 = *margaritacea*.
heterophylla, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 16.—Malaya.
heterostema, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 326 = *obliqua*.
hirsutula, Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 307.—Zeylan.
Hookeriana, Arn. l. c. 308 = *zeylanica*.
insignis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 11.—Sumatra.
Junghuhniana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 566.—Sumatra.
khasiana, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 539.—Reg. Himal.
Kurzii, C. B. Clarke, l. c. = *amabilis*.
laeviuscula, Zoll. & Mor. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 564.—Malaya.
lanceolata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 107.—Zeylan.
linearis, Hook. f. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 76.—Burma.
maculata, Roxb. Hort. Beng. [5]; Fl. Ind. i. 177.—Reg. Himal.
magnifica, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 320.—Sumatra.
Mamei, Linden, in Illustr. Hort. xxiii. (1876) 146. t. 254 = *margaritacea*.
margaritacea, Lindl. in Gard. Chron. (1854) 727.—Burma.
moluccana, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 182.—Malaya.
Naudiniana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 565 = *Sarco-pyramis nepalensis*.
nudiscapa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) ii. 78, 77.—Burma.
obliqua, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 250.—Malaya.
orbiculata, Lindl. in Journ. Hort. Soc. viii. (1853) 56 = *speciosa*.
paradoxa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 321 = *moluccana*.
pauciflora, Blume, in Flora, xiv. (1831) 491 = *heterophylla*.
pedunculosa, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 109.—Zeylan.
picta, Griff. Notul. iv. 676 = *maculata*.
picta, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 249. t. 52.—Burma; Sumatra.
pilosula, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 108.—Zeylan.
pumila, Thw. l. c. 109 = *zeylanica*.
Rheedii, Wall. Cat. n. 4096; Wight & Arn. Prod. 321.—Ind. or.
rhombofolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 108 = *zeylanica*.
robusta, Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 308.—Zeylan.
rostrata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 108 = *zeylanica*.
Rottleri, Wall. Cat. n. 4097 = *stricta*, *pedunculosa*.
rotundifolia, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. II. xxii. (1861) 74; et in Trans. Linn. Soc. xxv. (1865) 216.—Ind. or.

SONERILA :—

- scapigera*, *Dalz. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 672.—Ind. or.
secunda, *R. Br. in Wall. Cat. n.* 4094.—Burma.
solanoides, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xv. (1851) 324 = *speciosa*.
speciosa, *Zenker, in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* vi. (1830) 151.—Ind. or.
squarrosa, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* i. 182.—Reg. Himal.
stricta, *Hook. Bot. Mag.* t. 4394.—Burma.
tenella, *Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III.* i. (1864) 46 = *Arnottiana*.
tenera, *R. Br. in Wall. Cat. n.* 4098, *partim* = *stricta*.
tenera, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 215. t. 45. f. 2.—Ind. or.; China; Ins. Philipp.
tenuifolia, *Blume, in Flora,* xiv. (1831) 491.—Malaya.
Teysmanniana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 320.—Sumatra.
tomentella, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 109.—Zeylan.
travancorica, *Bedd. Ic. Pl. Ind. Or.* i. 33.—Ind. or.
versicolor, *Wight, Ic.* t. 1057.—Ind. or.
violaeifolia, *Hook. f. ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 77.—Ind. or.
Wallichii, *Benn. Pl. Jav. Rar.* 215.—Ind. or.
Wightiana, *Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 307.—Ind. or.
zeylanica, *Wight & Arn. Prod.* 322 (err. typ. 332).—Zeylan.; Borneo.

SONINNIA, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iii. 1691 (1834), *sphalm.* = **SONNINIA**, *Reichb. = Diplolepis*, *R. Br. (Asclep.)*.

SONNERATIA, *Linn. f. Suppl.* 38 (1781). **LYTHRARIACEAE**, *Benth. & Hook. f.* i. 784.

- AUBLETIA*, *Gaertn. Fruct.* i. 379. t. 78 (1788).
BLATTI, *Adans. Fam.* ii. 88 (1763).
CHIRATIA, *Montr. in Mém. Acad. Lyon,* x. (1860) 202.
KAMBALA, *Rafin. Sylva Tellur.* 19 (1838).
MYCOSTYLIS, *Rafin. l. c.* (1838).
acida, *Benth. Fl. Austral.* iii. 301 = *alba*.
acida, *Linn. f. Suppl.* 252.—Ind. or.; Malaya.
alba, *Griff. Notul.* iv. 652 = *Griffithii*.
alba, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxiii. n. 2.—Geront. trop.
apetala, [*Buch.-Ham.*] in *Syme, Embassy*, ed. II. iii. 313.—Ind. or.; Burma.
evenia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 337.—Ins. Tinor.
Griffithii, *Kurz, Pegu For. Rep. App. B.* 54; *For. Fl. Brit. Burma*, i. 527.—Burma.
lanceolata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 337.—Borneo.
mossambicensis, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* Bot. 66. t. 12 = *alba*.
neglecta, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 338 = *Griffithii*.
obovata, *Blume, l. c.* 337.—Java.
ovalis, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848) 198.—Java.
Pagatpat, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 424; *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 336.—Malaya.
punctata, *J. F. Gmel. Syst.* 675 = *Clausena Wampi*.

SONNINIA, *Reichb. Consp.* 131 (1828) = **Diplolepis**, *R. Br. (Asclep.)*.

Menziesii, *Decne. in DC. Prod.* viii. 589 = *D. Menziesii*.
vomitaria, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iii. 1091 = *D. Menziesii*.

SONZAYA, *Marchand, in Baill. Adansonia*, viii. (1867-68) 64. **BURSERACEAE**.
australiana, *Marchand, l. c.* 71.—Austral.

SOPHANDRA, *Meissn. Gen. Comm.* 152; et in *Ind.* (1840), *sphalm.* = **LOPHANDRA**, *D. Don = Erica*, *Tourn.*

SOPHIA, *Linn. Pl. Surin.* n. 86 (1775); *Amoen. Acad.* viii. 259 = *Pachira*, *Aubl. (Malvac.)*.
carolina, *Linn. l. c.* = *P. aquatica*.

SOPHIA, *Linn. Syst. ed. I* (1735); *Adans. Fam.* ii. 417 (1763) = **Sisymbrium**, *Tourn. (Crucif.)*.
Lobelii, *Rupr. Fl. Cauc.* 88 = *Sis. Sophia*.
multifida, *Gilib. Exercit.* i. 243 = *Sis. Sophia*.
vulgaris, *Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon,* N. S. xvi. (1868) 332 = *Sis. Sophia*.

SOPHOCLESIA, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 29. **VACCINIACEAE**, *Benth. & Hook. f.* ii. 576.
apophysata, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 143 = *Findlaya apophysata*.
cordifolia, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 29.—N. Granat.
majus, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 576.—Ind. occ.; Peruv.
nummulariaefolia, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 30.—N. Granat.
ovata, *Klotzsch, l. c.*—N. Granat.
subscandens, *Klotzsch, l. c.*—N. Granat.

SOPHONODON, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 592 (1859), *sphalm.* = **Siphonodon**, *Grif. (Celastr.)*.

SOPHORA, *Linn. Gen. ed. I* 125 (1737). **LEGUMINOSAE**, *Benth. & Hook. f.* i. 555.

- AGASTIANIS*, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 85 (1836).
BROUSONETIA, *Orteg. Hort. Matr.* Dec. 61. t. 7 (1798).
DERMATOPHYLLUM, *Scheele, in Linnaea*, xxi. (1848) 458.
EDWARDSIA, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* ix. (1808) 298. t. 26.
GOEBELIA, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 628 (1872).
PATRINIA, *Rafin. in Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 97.
PSEUDOSOPHORA, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 122 (1830).
RADIUSA, *Reichb. Consp.* 148 (1828).
STYPHNOLOBUM, *Schott. in Wien. Zeitschr.* iii. (1830) 844; ex *Endl. in Linnaea*, vi. (1831) Litt. 54.
VIBEXIA, *Rafin. Atl. Journ.* 144 (1832).
ZANTHYRSIS, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 84 (1836).
acuminata, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 250.—Reg. Himal.
acuminata, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 75.—'Am.'
affinis, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 390.—Am. bor. occ.
alba, *Linn. Syst. ed. XII.* 287 = *Baptisia alba*.
albicans, [*Jaume St. Hil.*] in *Duham. Arb.* ed. Nov. iii. 86 = *alopecuroides*.
alopecuroides, *Linn. Sp. Pl.* 373.—As. Min.; Reg. Himal.
alpina, *Pall. Astragal.* 121. t. 90. f. 1 = *Thermopsis corgouensis*.
angustifolia, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. 11. (1843) 118 = *flavescens*.
arenicola, *Nees, in Flora*, iv. (1821) 297 = *tomentosa*.
argentea, *Pall. in Nov. Act. Petrop.* x. (1797) 373. t. 8 = *Ammodendron Sieversii*.
argentea, *Salisb. Prod.* 328 = *Podalyria myrtillifolia*.
arizonica, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 135.—Am. bor. occ.
aurea, *Ait. Hort. Kew. ed. I.* ii. 44 = *Calpurnia lasiogyne*.
australis, *Linn. Syst. ed. XII.* 287 = *Baptisia australis*.
biflora, *Houtt. Handleid.* v. 8. t. 24. f. 1 = *Podalyria calyptata*.
biflora, *Linn. Syst. ed. X.* 1015 = *Podalyria myrtillifolia*.
biflora, *Retz. Obs.* i. 36 = *Podalyria argentea*.
bifolia, *Pall. Astragal.* 124. t. 91 = *Ammodendron Sieversii*.
buxifolia, *Retz. Obs.* i. 35 = *Podalyria buxifolia*.
calyptata, *Retz. l. c.* 36 = *Podalyria calyptata*.
capensis, *Linn. Mant.* i. 67 = *Virgilia capensis*.
chinensis, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 162, *nomen.*—China.
chrysophylla, *Seem. Fl. Vit.* 66.—Polynes.
coerulea, *Moench, Meth.* 69 = *Baptisia australis*.
cordata, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 79 = *Podalyria Burchellii*, *cordata*.
crassifolia, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 285.—Java.
crassifolia, [*Jaume St. Hil.*] in *Duham. Arb.* ed. Nov. iii. 87 = *tomentosa*.
cuneifolia, *Steud. Nom. ed. I.* 799 = *Podalyria cuneifolia*.
denudata, *Bory, Voy.* ii. 399.—Ins. Borbon.

SOPHORA :—

- fabacea*, *Pall. Astragal.* 122. t. 90. f. 2 = *Thermopsis fabacea*.
flavescens, *Ait. Hort. Kew. ed. I.* ii. 43.—Sibir.
Fraseri, *Benth. Fl. Austral.* ii. 274.—Austral.
galegoides, *Pall. Astragal.* 118. t. 88 = *flavescens*.
galioides, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 141 = *Cyclopia galioides*, *genistoides*.
genistaefolia, *Salisb. Prod.* 328 = *seq.*
genistoides, *Linn. Sp. Pl.* 373; *Burm. f. Prod. Fl. Cap.* 12 = *Cyclopia genistoides*.
glabra, *Hassk. in Flora*, xxv. (1842) II. Beibl. 47 = *tomentosa*.
glabra, *Moench, Meth. Suppl.* 22 = *flavescens*.
glauca, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 98.—Ind. or.
glauca, *Salisb. Prod.* 328 = *Baptisia alba*.
Griffithii, *Stocks, in Hook. Kew Journ. Bot.* iv. (1852) 147 = *Keyserlingia Griffithii*.
havanensis, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 20 = *tomentosa*.
heptaphylla, *Linn. Sp. Pl.* 373.—Zeylan.; China.
heptaphylla, *Wight, Ic.* t. 1155 = *Wightii*.
hirsuta, *Ait. Hort. Kew. ed. I.* ii. 46 = *Podalyria cordata*.
Houghiana, *Wall. Cat. n.* 5336 B = *mollis*.
inhambanensis, *Kotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 26 = *tomentosa*.
intermedia, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 612 (Quid ?).—Hab. ?
interrupta, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 90.—Ind. or.
Jabandas, *Montr. in Mém. Acad. Lyon,* x. (1860) 196.—N. Caled.
japonica, *Linn. Mant.* i. 68.—Japon.; China.
Jaubertii, *Spach, ex Jaub. et Spach, Illustr.* iv. 45 = *alopecuroides*.
juncea, *Schrad. Sert. Hannov.* 9. t. 3 = *Viminaria denudata*.
kentukea, *Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II.* vi. 56 (Quid ?).—Am. bor.
Kronei, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 219 = *flavescens*.
lanceolata, *Walt. Fl. Carol.* 135 = *Baptisia lanceolata*.
linearifolia, *Griseb. in Gott. Abh.* xxiv. (1879) 110.—Reg. Argent.
littoralis, *Schrad. in Goett. Gel. Anz.* i. (1821) 709 = *tomentosa*.
lupinoides, *Linn. Sp. Pl.* 374 = *Thermopsis lanceolata*.
macrocarpa, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxiii. n. 6 = *tetraptera*.
macrosperma, *DC. Prod.* ii. 96 = *seq.*
meosperma, [*Jaume St. Hil.*] in *Duham. Arb.* ed. Nov. iii. 86, 87 = *flavescens*.
microphylla, *Ait. Hort. Kew. ed. I.* ii. 43 = *tetraptera*.
microphylla, *Meyen, Reise,* i. 407 = *Zuccagnia microphylla*.
mollis, *R. Grak. in Wall. Cat. n.* 5335.—Reg. Himal.; China.
mollis, *Span. in Linnaea*, xv. (1841) 189 = *glauca*.
monosperma, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 66 = *Ormosia dasycarpa*.
Moorcroftiana, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 249.—Reg. Himal.; China.
mutabilis, *Salisb. Prod.* 328 = *Podalyria cordata*.
myrtillifolia, *Retz. Obs.* i. 36 = *Podalyria myrtillifolia*.
nitens, *Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 266.—Afr. austr.
nitens, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 201 = *tomentosa*.
nitida, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxiii. n. 7.—Ins. Borbon.
obliqua, *Pers. Syn.* i. 452 = *Piptadenia moniliformis*.
occidentalis, *Linn. Syst. ed. X.* 1015 = *tomentosa*.
oligophylla, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 254.—Afr. trop.
orientalis, *Pall. Reise*, ii. 505 = *alopecuroides*.
oroboides, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 142 = *Virgilia capensis*.
pachycarpa, *Schrenk, ex C. A. Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. 89.—Soongar.
pallida, *Salisb. Prod.* 328 = *alopecuroides*.
pedunculata, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 79 = *Podalyria argentea*.
pentaphylla, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* ix. (1826) 407.—Peruv.
perfoliata, *Walt. Fl. Carol.* 135 = *Baptisia perfoliata*.
platycarpa, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xviii. (1873) 398.—Japon.

SOPHORA :—

- prostrata, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 395.—N. Zel.
 pubescens, *Tausch, in Flora*, xvii. (1834) 489.—Hab. ?
retusa, Pers. Syn. i. 452 = *denudata*.
Retzii, J. F. Gmel. Syst. 665 = *Podalyria argentea*.
rhynchocarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 110.—Reg. Argent.
robinoides, *Walp. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* vii. (1839) 337.—Ind. or.
robusta, *Roxb. Hort. Beng.* [31], nomen = *Ormosia robusta*.
rotundifolia, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 138; *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 79 = *Podalyria myrtillifolia*.
secundiflora, *Lag. ex DC. Cat. Hort. Monsp.* (1813) 148.—Mexic.
sempervirens, *Engelm. in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 178 = *speciosa*.
senegalensis, *Deless. ex DC. Prod.* ii. 168 = *Tephrosia obcordata*.
sericea, *Andr. Bot. Rep.* t. 440 = *Podalyria sericea*.
sericea, [*Jaume St. Hil.*] in *Duham. Arb.* ed. Nov. iii. 86 = *nitida*.
sericea, *Nutt. Gen. Am.* i. 280.—Am. bor.
sinica, *Rosier, in Journ. Phys.* xiv. (1779) 248 = *japonica*.
songarica, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* iii. (1845) 307.—Soongar.
sororia, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v.* (1866) 210 = *flavescens*.
speciosa, *Benth. in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 178 = *secundiflora*.
speciosa, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 82 = *arizonica*.
stenophylla, *A. Gray, in Ives, Rep. Colorado River, Bot.* 10.—Mexic.
sylvatica, *Burch. Trav.* ii. 146; *DC. Prod.* ii. 98 = *Calpurnia sylvatica*.
ternata, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 79 = *Aspalathus ferruginea*.
tetraptera, *J. Mill. Ic. Pl. t.* 1.—N. Zel.; *Chili*.
tiloensis, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* i. i. 125 = *heptaphylla*.
tinctoria, *Linn. Sp. Pl.* 373 = *Baptisia tinctoria*.
tomentosa, *Linn. l. c.*—Reg. calid.
trifolia, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 612, *sphalm.* = *seq.*
trifoliata, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 79 = *Argyrolobium sericeum*.
triphylia, *Sweet, Hort. Brit. ed. I.* 107, in syn., *sphalm.* = *praece*.
velutina, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1185 = *glaucosa*.
vicifolia, *Salisb. Prod.* 328 = *Virgilia capensis*.
vicifolia, *Hance, in Journ. Bot.* xix. (1881) 209.—China.
villosa, *Walt. Fl. Carol.* 134 = *Baptisia villosa*.
violacea, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 94.—Zeylan.
violacea, *Zipp. ex Span. in Linnaea*, xv. (1841) 192 = *Aeschynomene atropurpurea*.
Wightii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 250.—Ind. or.
zambesiaca, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 253.—Afr. trop.

SOPHOROCAPNOS, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) i. 570 = *Corydalis*, *Vent. (Papav.)*.
pallida, *Turcz. l. c.* 571 = *C. pallida*.

SOPHRONANTHE, *Benth. in Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 445 (1836) = *Gratiola*, *Rupp. (Scrophul.)*.
floridana, *Walp. Rep.* iii. 298 = *G. floridana*.
hispidata, *Benth. in Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 445 = *G. subulata*.

SOPHRONIA, *Licht. ex Roem. & Schult. Syst.* i. 482 (1817) = *Lapeyrouisia*, *Pourr. (Irid.)*.
caespitosa, *Licht. l. c.*—Afr. austr.
caespitosa, *Spreng. Syst.* iii. 147, in syn. = *Klattia partita*.

SOPHRONIA, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1129 (1828) = **SOPHRONITIS**, *Lindl. (Orchid.)*.
cernua, *Lindl. l. c.* = *Sophronitis cernua*.
modesta, *Lindl. l. c.* sub t. 1147 = *Sophronitis cernua*.

SOPHRONITIS, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1147 (1828).
ORCHIDEAE, *Benth. & Hook. f. iii.* 535.
LOPHOGLOTIS, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 49 (1836).
SOPHRONIA, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1129 (1828).

SOPHRONITIS :—

- cernua*, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1147.—Cf. t. 1129.—Bras.
coccinea, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 465 = *grandiflora*.
grandiflora, *Lindl. Sert. Orch.* (1838) t. 5. f. 2.—Bras.
Hoffmannseggii, *Reichb. ex Hoffmgg. in Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 286 = *cernua*.
isopetala, *Hoffmgg. Verz. Orch.*—Cf. *Bot. Zeit.* i. (1843) 834 = *cernua*.
militaris, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 465 = *grandiflora*.
modesta, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1147 = *cernua*.
nutans, *Hoffmgg. in Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 286 = *cernua*.
pterocarpa, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* iii. (1853) 11.—Bras.
purpurea, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) i. 462 = *grandiflora*.
rosea, *Hort. ex Gostling, in Gard. Chron.* (1884) i. 243 = *grandiflora*.
Rossiteriana, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 77.—Bras.
violacea, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) Misc. 18.—Bras.
Wittigiana, *Rodrig. in Rev. Hort.* (1878) 24; *ex ej. Orch. Nov.* ii. 159.—Bras.

SOPUBIA, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 88 (1825). **SCROPHULARINEAE**, *Benth. & Hook. f.* ii. 970.

- GERDARIA*, *Presl, Bot. Bemerk.* 91 (1844).
LOPHANTHERA, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 58 (1836).
RAPHIDOPHYLLUM, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) 666.
RHAPHIDOPHYLLUM, *Benth. in DC. Prod.* x. 521 (1846).
cana, *Harv. Thes. Cap.* ii. 29.—Afr. austr.
delphinifolia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 560.—Ind. or.
Dregeana, *Benth. in DC. Prod.* x. 522.—Afr. austr.
filiformis, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 560.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 314.—Afr. trop.
karaguensis, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 123.—Afr. trop.
kituensis, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 313.—Afr. trop.
obtusifolia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 560.—Madag.
ramosa, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 27.—Afr. trop.
scabra, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 560.—Afr. austr.
scopiformis, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 313.—Afr. trop.
simplex, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 27.—Afr. austr.
stricta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 427.—Madag.
stricta, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 559.—Ind. or.; *Malaya*.
trifida, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 88.—Ind. or.; *Nepal*.
triphylia, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 220.—Madag.

SORAMIA, *Aubl. Pl. Gui.* i. 552. t. 219 (1775) = **DoLIOCARPUS**, *Roland. (Dillen.)*.
guianensis, *Aubl. l. c.* = *D. Soramia*.

SORANTHE, *Salisb. in Knight, Prot.* 71 (1809) = **SOROCEPHALUS**, *R. Br. (1810) (Proteac.)*.
ciliatiflora, *Knight, Prot.* 72 = *Soroc. lanatus*.
clavigera, *Knight, l. c.* 73.—Afr. austr.
glanduligera, *Knight, l. c.* 71 = *Soroc. imbricatus*.
montana, *Knight, l. c.* 73.—Afr. austr.
pinifolia, *Knight, l. c.* 72.—Afr. austr.
rupestris, *Knight, l. c.*—Afr. austr.
tenuifolia, *Knight, l. c.* = *Soroc. tenuifolius*.

SORANTHUS, *Ledeb. Ic. Pl.* i. 20. t. 82 (1829); *Fl. Alt.* i. 344 (1829) = **Ferula**, *Tourn. (Umbell.)*.
Meyeri, *Ledeb. Il. cc.* = *F. Meyeri*.

SORBARIA, *A. Br. in Aschers. Fl. Brandenb.* 177 (1864) = **SPIRAEEA**, *Linn. (Rosac.)*.
grandiflora, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 223 = *Sp. grandiflora*.
Kirilowi, *Maxim. l. c.* 225 = *Sp. sorbifolia*.
Lindleyana, *Maxim. l. c.* 224 = *Sp. sorbifolia*.
sorbifolia, *A. Br. in Aschers. Fl. Brandenb.* 177 = *Sp. sorbifolia*.

SORBUS, [*Tourn.*] *Linn. Syst. ed. I.* (1735) = **Pyrrus**, *Tourn. (Rosac.)*.
alandica, *Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland*, 19.—Suecia.
alnifolia, *C. Koch, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 249 = *Crataegus alnifolia*.
alpina, *Heynh. Nom.* ii. 684 = *P. Chamaemespilus* ?
ambigua, *Michalet, Bot. Jura*, 156 = *P. Chamaemespilus*.
Amelanchier, *Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc.* ii. 53; *ed. II.* 90 = *Amelanchier vulgaris*.
americana, *Marsh. Arbust.* 145; *Willd. Enum. Hort. Berol.* 520 = *P. americana*.
Arbuscula, *Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl.* v. 164 = *P. Aucuparia*.
arbutifolia, *Heynh. Nom.* i. 772 = *P. arbutifolia*.
Aria, *Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc.* ii. 46; *ed. II.* 86* = *P. Aria*.
Aria, *Wimm. ex Nym. Consp.* 242 = *P. Chamaemespilus*.
arioides, *Michalet, Bot. Jura*, 156 = *P. intermedia*.
atrovirens, *Hort. ex C. Koch, Dendrol.* i. 194 = *P. rotundifolia*.
Aucuparia, *Linn. Sp. Pl.* 477 = *P. Aucuparia*.
Aucuparia, *Poir. Encyc.* vii. 234, partim = *P. americana*.
Aucuparia, *Stell. in Pall. Fl. Nord. Beitr.* ii. 300 = *P. sambucifolia*.
auriculata, *Pers. Syn.* ii. 38 = *P. pinnatifida*.
betulaefolia, *Schau. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xvii. (1849) 84 = *P. betulaefolia*.
Chamaemespilus, *Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc.* ii. 40; *ed. II.* 83* = *P. Chamaemespilus*.
corymbosa, *C. Koch, Hort. Dendrol.* 176 = *P. communis*.
crataegifolia, *Wenzig, in Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 295 = *P. crataegifolia*.
crenata, *Schau. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xvii. (1849) 84 = *P. vestita* ?
Cydonia, *Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc.* ii. 57; *ed. II.* 93 = *P. Cydonia*.
densiflora, *Heynh. Nom.* ii. 684 = *P. densiflora*.
depressa, *Heynh. l. c.* i. 772 = *P. arbutifolia*.
domestica, *Linn. Sp. Pl.* 477 = *P. Sorbus*.
edulis, *C. Koch, ex Kirch. in C. Koch & Fint. Wochenschr.* ii. (1859) 382 = *P. Aria*.
fennica, *Kalm, ex Fries, Summa Veg. Scand.* 42 = *P. pinnatifida*.
fennica, *C. Koch, Dendrol.* i. 194 = *P. intermedia*.
flabellifolia, *Schau. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xvii. (1849) 84 = *P. Aria*.
florentina, *Nym. Syll.* 266 = *P. crataegifolia*.
floribunda, *Heynh. Nom.* i. 773 = *P. arbutifolia*.
foliolosa, *Spach, Hist. Vég. Phan.* ii. 96 = *P. foliolosa*.
foliosa, *Wenzig, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 75; *Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x.* (1874) 159, *sphalm.* = *P. foliolosa*.
fruticosa, *Steud. Nom. ed. I.* 800 = *P. Chamaemespilus*.
glabra, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 233 = *P. glabra*.
glabrata, *Hort. Vrat. ex Kirch. in C. Koch & Fint. Wochenschr.* ii. (1859) 382 = *P. Aria*.
gracilis, *Wenzig, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 74; *Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x.* (1874) 159 = *P. sambucifolia*.
graeca, *Lodd. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 612 = *P. Aria*.
grandifolia, *Heynh. Nom.* i. 773 = *P. arbutifolia*.
heterophylla, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 628 = *P. spuria*.
Hostii, *Heynh. Nom.* ii. 685 = *P. Aria*.
humifusa, *S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* 290 = *P. americana*.
hybrida, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 684 = *P. pinnatifida*.
intermedia, *Pers. Syn. Pl.* ii. 38 = *P. intermedia*.
japonica, *Siebold, in Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 67 = *P. japonica*.
kamunensis, *Schau. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xvii. (1849) 84 = *P. lanata*.
lanata, *Schau. l. c.* = *P. lanata*.
lanuginosa, *Key. in Schult. Oester. Fl. ed. II.* ii. 50 = *P. Aucuparia*.
latifolia, *Pers. Syn.* ii. 38 = *P. rotundifolia*.
Malus, *Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc.* ii. 57; *ed. II.* 93 = *P. Malus*.
melanocarpa, *Heynh. Nom.* i. 773 = *P. arbutifolia*.
micrantha, *Hort. Angl. ex Dum.-Cours. Bot. Cult.* v. 464 = *P. americana*.

SORBUS:—

- microcarpa*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 341 = *Pyrus americana*.
microphylla, Wenzig, in Linnaea, xxxviii. (1874) 76; Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. (1874) 159 = *P. microphylla*.
Mougeoti, Godr. & Soyer-Willem. in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 447 = *P. intermedia*.
nivea, Steud. Nom. ed. II. ii. 612 = *P. Aria*.
oblongifolia, Reichb. ex Nym. Consp. 242 = *P. Aria*.
obtusata, Heynh. Nom. ii. 685 = *P. obtusata*.
pubens, Heynh. l. c. i. 773 = *P. arbutifolia*.
praemorsa, Nym. Syll. 265 = *P. Aucuparia*.
pumilus, Rafin. Med. Fl. ii. 265 = *P. americana*.
purpurea, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 318 = *P. Chamaemespilus*.
Pyrus, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 56; ed. II. 93 = *P. communis*.
riparia, Rafin. New Fl. Am. iii. 15 = *P. americana*.
rivularis, Heynh. Nom. i. 773 = *P. rivularis*.
rupicola, Nym. Consp. 242 = *P. Aria*.
sabauda, Nym. l. c. = *P. Chamaemespilus*.
sambucifolia, M. Roem. Syn. Rosifl. 139 = *P. sambucifolia*.
scandica, Fries, Fl. Halland. 83 = *P. intermedia*.
sikkimensis, Wenzig, in Linnaea, xxxviii. (1874) 58 = *P. sikkimensis*.
sitchensis, M. Roem. Syn. Rosifl. 139 = *P. sambucifolia*.
speciosa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 190 = *P. Aucuparia*.
spuria, Pers. Syn. ii. 38 = *P. spuria*.
subfusca, Boiss. Fl. Orient. ii. 658 = *P. subfusca*.
subserrata, Opiz, in Flora, vii. (1824) i. Beil. 83 = *P. Aucuparia*.
syriensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 585 = *P. syriensis*.
tianschanica, Rupr. Sert. Tiansch. 46 = *P. tianschanica*.
Tommasinii, Fleischm. Fl. Krain. 206 = *P. torminalis*.
Toringo, De Vriese, in Tuinbouw-Fl. iii. (1856) t. ad p. 368 = *P. Sieboldi*.
torminalis, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 45; ed. II. 85* = *P. torminalis*.
trilobata, Heynh. Nom. i. 773 = *P. trilobata*.
ursina, Schau. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvii. (1849) 84 = *P. foliosa*.
variolosa, Schau. l. c. = *P. Pashia*.
vestita, Lodd. Cat. (1836); Schau. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvii. (1849) 84 = *P. vestita*.

SOREMA, Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46 = *Noiana*, Linn. (Convolv.).

- acuminata*, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 370 = *N. acuminata*.
atriplicifolia, Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46 = *N. atriplicifolia*.
bracteosa, Phil. Fl. Atac. 43.—Chili.
cordata, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 351 = *N. cordata*.
elegans, Phil. Fl. Atac. 43.—Chili.
glutinosa, Phil. l. c. 44.—Chili.
lanceolata, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 498 = *N. lanceolata*.
linearis, Miers, l. c. 499 = *N. linearis*.
littoralis, Miers, l. c. 370 = *N. littoralis*.
longifolia, Miers, l. c. 498 = *N. longifolia*.
paradoxa, Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46 = *N. paradoxa*.
parviflora, Phil. Fl. Atac. 44.—Chili.
petiolata, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 207.—Chili.

SORGHUM, Linn. Syst. ed. I (1735) (*Sorgum*); Moench, Meth. 207 (1794). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1135.

- BLUMENBACHIA, Koel. Gram. Gall. et Germ. 28 (1802).
album, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 836 = vulgare.
anomalum, Desv. Opusc. 72.—Am. calid. ?
Arduini, Jacq. Eclog. Gram. 25. t. 18 = vulgare ?
asperum, Beauv. Agrost. 131 = *Danthonia papillosa*.
arundinaceum, Roem. & Schult. Syst. ii. 813 = halepense.
avenaceum, Beauv. Agrost. 131 = *Danthonia curvifolia*.
avenaceum, Chapm. Fl. S. U. St. 583 = *Chrysopogon avenaceus*.
Balansae, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 277, in obs.—Paraguay.
barbatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 238 = *Tristachya barbata*.

SORGHUM:—

- bicolor*, Moench, Meth. 207 = vulgare.
cafferorum, Beauv. Agrost. 131 = vulgare.
campanum, Tenore & Guss. in Atti Acc. Sc. Nap. v. (1843) 303 = vulgare.
canescens, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 277.—Bras.
capillare, Beauv. Agrost. 131; Roem. & Schult. Syst. ii. 840 = *Andropogon capillaris*.
caucasicum, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 476 = *Andropogon intermedius*.
cernuum, Willd. Enum. Hort. Berol. 1036 = vulgare.
commune, Beauv. Agrost. 131 = vulgare.
Crupina, Link. Hort. Berol. i. 246 = halepense.
cubanicus, Schult. Mant. ii. 519 (Index) = *Holcus cubanicus*.
decolor, Beauv. Agrost. 131 = halepense.
decolorans, Roem. & Schult. Syst. ii. 838 = halepense.
Dora, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 560.—Ind. occ.
Drummondii, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 393 = vulgare.
dubium, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 443 = halepense.
elongatum, Beauv. Agrost. 131 = *Chrysopogon elongatus*.
flavum, Beauv. l. c. = seq.
fulvum, Beauv. l. c. 164 = *Andropogon serratus*.
fusum, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 503 = *Andropogon serratus*.
giganteum, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 181 = halepense.
glycychylum, Passer. in Hamb. Gartenz. xiii. (1857) 33 = halepense.
halepense, Pers. Syn. i. 101.—Reg. calid.
intrans, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 541 = *Andropogon intrans*.
Junghuhnii, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 753 = *Andropogon serratus*.
Minarum, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 276 = *Chrysopogon stipoides*.
muticum, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 612 = *Andropogon serratus*.
nerosum, Bess. ex Schult. Mant. ii. Add. II. 669 = vulgare.
nigricans, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 837 = vulgare.
nigrum, Roem. & Schult. l. c. = vulgare.
nitidum, Pers. Syn. i. 101 = *Andropogon serratus*.
nutans, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 584 = *Chrysopogon nutans*.
pallidum, Beauv. Agrost. 131 = *Chrysopogon pallidus*.
parviflorum, Beauv. l. c. 132 = *Chrysopogon violascens*.
parviflorum, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 12 = *Chrysopogon nutans*.
pauciflorum, Chapm. in Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 20.—Florida.
plumosum, Beauv. Agrost. 132 = *Andropogon australis*.
purpureo-sericeum, Schweinf. & Aschers. Beitr. Fl. Aethiop. 310 = *Andropogon purpureo-sericeus*.
pyramidale, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 836 = vulgare.
Quartianum, Schweinf. & Aschers. Beitr. Fl. Aethiop. 310 = *Andropogon Quartianus*.
rubens, Willd. Enum. Hort. Berol. 1036 = vulgare.
saccharatum, Host, Gram. Austr. iv. t. 48 = *Oplismenus undulatifolius*.
saccharatum, Moench, Meth. 207 = vulgare.
Schreberi, Tenore, Fl. Neap. Syll. App. iv. p. iv. = halepense.
secundum, Chapm. Fl. S. U. St. 583.—Florida.
serratum, Roem. & Schult. Syst. ii. 839 = *Panicum serratum*.
setifolium, Roem. & Schult. l. c. 840 = *Andropogon setifolius*.
striatum, Beauv. Agrost. 132.—Hab. ?
subglabrescens, Schweinf. & Aschers. Beitr. Fl. Aethiop. 310 = vulgare.
Thonizii, Hort. Berol. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 98, nomen.—Hab. ?
timorense, Buese, ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Reinw. 103 = *Andropogon australis*.
tropicum, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 359 = *Andropogon serratus*.
truchmenorum, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 442 = vulgare ?
usorum, Nees, Fl. Afr. Austr. 87 = vulgare.
versicolor, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 563.—Afr. trop.
vulgare, Pers. Syn. i. 101.—Reg. trop. et sub-trop.

SORGUM, Linn. Syst. ed. I (1735) = praec.

SORIA, Adans. Fam. ii. 421 (1763) = *Euclidium*, R. Br. (Crucif.).
syriaca, Desv. ex Steud. Nom. ed. I. 126, 800 = *E. syriacum*.

SORIDIUM, Miers, in Proc. Linn. Soc. ii. (1850) 74; et in Trans. Linn. Soc. xxi. (1852) 49. t. 6 = *Sciaphila*, Blume (Triurid.).
Spruceanum, Miers, ll. cc. 75; 50.—Bras.

SORINDEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 23 (1806).
ANACARDIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 419.

DUPUISIA, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 148. t. 38 (1832).

africana, C. Sm. in Tuckey, Congo, 12.—Afr. trop.
aurantiodora, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 391 = *Mauria aurantiodora*.

Biringo, March. Rev. Anacard. 167 = *Mauria Biringo*.
calabarensis, March. l. c. = *Trichoscypha Mannii*.
elongata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 205.—Madag.
falcata, March. Rev. Anacard. 167 = *Euroschinus falcatus*.

ferruginea, March. l. c. = *Mauria ferruginea*.
glaberrima, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 391 = *Mauria Biringo*.

glaberrima, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 245 = *madagascariensis*.

heterandra, March. Rev. Anacard. 165 = *madagascariensis*.

heterophylla, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 286.—Afr. trop.

heterophylla, March. Rev. Anacard. 167 = *Mauria heterophylla*.

juglandifolia, Planch. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 440.—Afr. trop.

longifolia, Oliver, l. c. 442 = *Trichoscypha longifolia*.

lucens, March. Rev. Anacard. 167 = *Trichoscypha lucens*.

macrophylla, Planch. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 442.—Afr. trop.

madagascariensis, DC. Prod. ii. 80.—Madag.

Mannii, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 441 = *Trichoscypha acuminata*.

ovalifolia, March. Rev. Anacard. 167 = *Mauria ovalifolia*.

patens, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 441 = *Trichoscypha patens*.

pinnata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 331 = *madagascariensis*.

puberula, March. Rev. Anacard. 167 = *Mauria heterophylla*.

simplicifolia, March. l. c. = *Mauria simplicifolia*.

suaveolens, March. l. c. = *Mauria suaveolens*.

trimera, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 441.—Afr. trop.

venulosa, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 391 = *Mauria suaveolens*.

SOROCEA, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 473. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 378.

PSEUDOSOROCEA, Baill. Adansonia, xi. (1875) 296.

affinis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 150.—Panama.

amazonica, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 111.—Am. trop.

Celsiana, Heynh. Nom. ii. 685, nomen.—Bras.

Guilleminiana, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 74.—Am. trop.

Hilariana, Bur. in DC. Prod. xvii. 254 = seq.

Hilarii, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 71.—Bras.

Houllettiana, Gaudich. l. c. t. 74.—Am. trop.

ilicifolia, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 114.—Am. trop.

Klotzschiana, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 212.—Bras.

macrophylla, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 73.—Am. trop.

mexicana, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 335 = *Trophis mexicana*.

muriculata, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 113.—Am. trop.

pubivena, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 150.—Guatemala.

racemosa, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 72.—Am. trop.

Uriamem, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 113.—Am. trop.

SOROCEPHALUS, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 139. *PROTEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 171.

SORANTHE, Salisb. in Knight, Prot. 71 (1809), nomen prius.

SOROCEPHALUS :—

- diversifolius*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 143.—Afr. austr.
diversifolius, Drège, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 301 = *Nivenia* Drègei.
Drègei, Buek, in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 117, 222; et ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 305.—Afr. austr.
imberbis, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 140.—Afr. austr.
imberbis, Klotzsch, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 304 = *scabridus*.
imbricatus, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 142.—Afr. austr.
intermedius, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 305 = *Drègei*.
lanatus, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 142.—Afr. austr.
nivalis, Mund, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 304 = *scabridus*.
phylicoides, Meissn. l. c.—Afr. austr.
salsoloides, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 140.—Afr. austr.
scabridus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 303.—Afr. austr.
setaceus, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 140.—Afr. austr.
spatalloides, R. Br. l. c. 141.—Afr. austr.
spatalloides, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 305 = *lanatus*.
tenuifolius, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 141.—Afr. austr.
verticillatus, Roem. & Schult. Syst. iii. 391 = *Leucadendron verticillatum*.

SOROSTACHYS, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; Syn. Pl. Cyp. 71 (1856) = **Cyperus**, Michx. *kyllingoides*, Steud. ll. cc. = *C. leucocephalus*.

SOTOR, Fenzl, in Ber. 21ste Versamml. Deutsch. Naturf. 1843 (1844) 168 = **Kigelia**, DC. (1845) (Bignon.). *aethiopum*, Fenzl, l. c. = *K. pinnata*.

SOTULARIA, Rafin. Sylva Tellur. 98 (1838) = **Lagerstroemia**, Linn. (Lythrar.). *malabarica*, Rafin. l. c. = *L. hirsuta*.

SOUARI, Endl. Gen. 1076 (1840), sphalm. = **SAOUARI**, Aubl. = **Caryocar**, Linn. (Ternstr.).

SOUBEYRANIA, Neck. Elem. i. 365 (1790) = **Barleria**, Linn. (Acanth.).

SOULAMEA, Lam. Encyc. i. 449 (1783). *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 313.

CARDIOPHORA, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 14. **CARDIOPHORA**, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 216.

amara, Lam. Encyc. i. 449.—Malaya.
cardiophora, Baill. *Adansonia*, x. (1871-72) 344.—N. Caled.

fraxinifolia, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 244.—N. Caled.

Muelleri, Brongn. & Gris, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. iii. (1865) 231.—N. Caled.

Pancheri, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 243.—N. Caled.

terminalioides, Baker, Fl. Mauriti. 42.—Ins. Seychelles.

tomentosa, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 243.—N. Caled.

trifoliata, Baill. *Adansonia*, x. (1871-72) 344.—N. Caled.

SOULANGIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 377. t. 10. f. 3 = **Phyllica**, Linn. (Rhamn.).

arbores, G. Don, Gen. Syst. ii. 43 = *P. nitida*.
arborescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 136 = *P. paniculata*.

axillaris, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 378 = *P. axillaris*.

buxifolia, Brongn. l. c. 378 = *P. buxifolia*.
cordata, Brongn. l. c. = *P. buxifolia*.

dioica, G. Don, Gen. Syst. ii. 43 = *P. dioica*.
epacridifolia, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vii. (1839) 387.—Afr. austr.

glauca, Hort. ex A. Dietr. l. c. 388.—Hab. ?
hirsuta, Eckl. & Zeyh. Enum. 136 = *P. axillaris*.

ledifolia, Eckl. & Zeyh. l. c. = *P. ledifolia*.
lutescens, Eckl. & Zeyh. l. c. = *P. lutescens*.

SOULANGIA :—

marifolia, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 348 = *Phyllica paniculata*.

microphylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 135 = *P. microphylla*.

myrtifolia, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vii. (1839) 381 = *P. paniculata*.

oleaeifolia, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 378 = *P. oleaeifolia*.

oppositifolia, Reiss. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 79 = *Nesiota elliptica*.

orientalis, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 115 = *P. orientalis*.
paniculata, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 378 = *P. paniculata*.

parviflora, Presl, Bot. Bemerk. 38 = *P. rosmarinifolia*.

pedicellata, G. Don, Gen. Syst. ii. 42 = *P. villosa*.
pinca, Eckl. & Zeyh. Enum. 136 = *P. villosa*, axillaris.

plumosa, Presl, Bot. Bemerk. 38 = *P. ambigua*.
reclinata, G. Don, Gen. Syst. ii. 42 = *P. reclinata*, Wendl.

rosmarinifolia, Harv. Gen. S. Afr. Pl. 62 = *P. rosmarinifolia*.

rubra, Hort. ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vii. (1839) 381 = *P. paniculata*.

rubra, Lindl. Bot. Reg. t. 1498 = *P. rubra*.
subcanescens, Presl, Bot. Bemerk. 38 = *P. cryptandroides*.

thymifolia, Brongn. in Ann. Sc. Sér. I. x. (1827) 378 = *P. thymifolia*.

thymifolia, Presl, Bot. Bemerk. 38.—Afr. austr.
Willdenowiana, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vii. (1839) 386 = *P. Willdenowiana*.

SOULEYETIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 19 (1844-49) = **Pandanus**, Rumph.

freycinetioides, Gaudich. l. c. = *P. freycinetioides*.

SOUROUBEA, Aubl. Pl. Gui. i. 244. t. 97 (1775) = **Ruyschia**, Jacq. (Ternstr.).

amazonica, Delp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. i. (1869) 275 = *R. amazonica*.

Aubletii, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 119 = *R. Souroubea*.

auriculata, Delp. in Att. Soc. Ital. Sc. Nat. Milan. xii. (1869) 180 = *R. Souroubea*.

bahiensis, Delp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. i. (1869) 276 = *R. bahiensis*.

bicolor, Delp. l. c. = *R. bicolor*.

corallina, Delp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. i. (1869) 276 = *R. corallina*.

crassipes, Wittm. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 254 = *R. crassipes*.

exauriculata, Delp. in Att. Soc. Ital. Sc. Nat. Milan. xii. (1869) 180 = *R. clusiaefolia* (in Addend.).

guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 244. t. 97 = *R. Souroubea*.

lepidota, Delp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. i. (1869) 276 = *R. lepidota*.

Meyeri, Delp. l. c. 275 = *R. Souroubea*.

pilcata, Delp. l. c. 258, 275 = *R. pilophora*.

pilophora, Wittm. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 254 = *R. pilophora*.

Spitziana, Delp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. i. (1869) 275 = *R. Spixiana*.

SOUTHWELLIA, Salisb. Parad. Lond. t. 69 (1807) = **Sterculia**, Linn.

angustifolia, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 77 = *St. Balanphas*.

Balanphas, Spach, Hist. Vég. Phan. iii. 508 = *St. Balanphas*.

Blumii, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 77 = *St. Blumei*.

coccinea, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 104 = *St. coccinea*.

cordifolia, Spach, Hist. Vég. Phan. xiv. 402 = *St. cordifolia*.

longifolia, Rafin. Sylva Tellur. 73 = *Cola acuminata* ?

nobilis, Salisb. Parad. Lond. t. 69 = *St. nobilis*.

parviflora, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 104 = *St. parviflora*.

Roxburghiana, Spach, Hist. Vég. Phan. xiv. 402 = *St. Roxburghii*.

Tragacanthae, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 77 = *St. Tragacanthae*.

urceolata, Spach, Hist. Vég. Phan. xiv. 402 = *St. urceolata*.

versicolor, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 77 = *St. versicolor*.

SOUZA, Vell. Fl. Flum. 273 (1825); vii. t. 2 (1827) = **Sisyrinchium**, Linn. (Irid.).

Comes, Vell. l. c. = *Sis. Comes*.
Marchio, Vell. l. c. t. 1 = *Sis. alatum*.

Proregia, Vell. l. c. 274. t. 3 = *Sis. Proregia*.

SOWERBAEA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1800) 218. **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 797.

alliacea, F. Muell. Fragm. vi. 180.—Austral.
americana, Spreng. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 381 = *Milla macrostemon*.

junceae, Sm. in Trans. Linn. Soc. v. (1800) 159.—Austral.

laxiflora, Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 10; *Swan River App.* 58.—Austral.

SOYA, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 113 = **SOJA**, Moench = **Glycine**, Linn. (Legumin.).

SOYAUXIA, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1393 (1882). **PASSIFLOREAE**.

gabonensis, Oliver, l. c.—Afr. trop.

SOYERA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881). 171 = seq.

SOYERIA, Monn. Ess. Hierac. 75 (1829) = **Crepis**, Vaill. (Compos.).

alpestris, Mutel, Fl. Fr. ii. 223 = *C. alpestris*.

alpina, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 327 = *Lactuca alpina*.

aurea, Mutel, Fl. Fr. ii. 223, 418 = *C. aurea*.

blattarioides, Monn. Ess. Hierac. 76 = *C. blattarioides*.
chrysantha, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1331 = *C. chrysantha*.

crocifolia, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 322 = *C. crocifolia*.

grandiflora, Monn. Ess. Hierac. 76 = *C. grandiflora*.

hieracioides, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 321 = *C. hieracioides*.

hyoseridifolia, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 442 = *C. hyoseridifolia*.

lampsanoides, Monn. Ess. Hierac. 77 = *C. lampsanoides*.

lapsanoides, Mutel, Fl. Fr. ii. 223 = *praec.*

lyrata, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 322 = *C. lyrata*.

montana, Monn. Ess. Hierac. 75 = *C. montana*.

paludosa, Godr. Fl. Lorr. ii. 72 = *C. paludosa*.

praemorsa, Mutel, Fl. Fr. ii. 224 = *C. praemorsa*.

pyrenaica, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 322 = *C. blattarioides*.

serbica, Sch. Bip. l. c. = *C. viscidula*.

sibirica, Monn. Ess. Hierac. 77 = *C. sibirica*.

viscidula, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1332 = *Hieracium praecalum*.

SOYMIDA, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 250. t. 22. f. 26. **MELIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 338.

febrifuga, Fuss. l. c. 251, t. 22. f. 26.—Ind. or.

roupaliifolia, Schweinf. Reliq. Kotschy. 37.—Afr. trop.

SPACHEA, A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 19. t. 31 (1837). **MALPIGHIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 255.

MECKELIA, Mart. ex A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. (1840) 326, in syn.

elegans, A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 19.—Guian.

littoralis, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 328.—Ind. occ.

ossana, A. Juss. l. c. 327.—Ind. occ.

parviflora, A. Juss. l. c. 326.—Ind. occ.

perforata, A. Juss. l. c. 329.—Ind. occ.

tenuifolia, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 9.—Guian.

tricarpa, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 329.—Bras.

SPACHIA, Lilja, in Traedgardtidning, (1840) 62; ex Linnaea, xv. (1841) 262 = **Fuchsia**, Linn. (Onagr.).

SPADACTIS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 510 (1827) = **Atractylis**, Linn. (Compos.).

flava, Cass. l. c. = *A. flava*.
radiciflora, Cass. l. c. = *A. radiciflora*.

SPADONIA, Less. Syn. Comp. 99 (1832) = **Moquinia**, DC. (Compos.).
cinerea, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 109 = *M. polymorpha*.
paniculata, Less. Syn. Comp. 100 = *M. paniculata*.
polymorpha, Less. l. c. 99 = *M. polymorpha*.
racemosa, Less. l. c. 100 = *M. racemosa*.

SPADOSTYLES, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81 = **Pultenaea**, Sm. (Legumin.).
Bentharii, Endl. Nov. Stirp. Dec. 3 = *P. humilis*.
concolor, Endl. l. c. 24 = *P. villosa*.
Cunninghami, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81 = *P. ternata*.
Huegelii, Endl. Nov. Stirp. Dec. 3 = *P. humilis*.
ramulosa, Endl. l. c. 25 = *P. villosa*.
Sieberi, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81 = *P. euchila*.
ternata, F. Muell. First Gen. Rep. 12 = *P. ternata*.

SPAENDONCEA, Desf. in Dec. Phil. vii. 259 (1796 ?); ex Usteri, Neue Ann. Bot. xiii. (1796) 15 = **Cadia**, Forsk. (Legumin.).
tamarindifolia, Desf. l. c. 18 = *C. purpurea*.

SPALANTHUS, Walp. Rep. ii. 68 (1843), sphalm. = **SPHALANTHUS**, Jack = **Quisqualis**, Rumph. (Combret.).

SPALLANZANIA, DC. Prod. iv. 406. (1830) = **Mussaenda**, DC. (Rubiace.).
corymbosa, DC. l. c. = Madag.

SPALLANZANIA, Neck. Elem. ii. 79 (1790) = **Gustavia**, Linn. (Myrtac.).

SPALLANZANIA, Pollini (Hort. Veron. Pl. Nov. 10), in Brugnat. Giorn. Fis. ix. (1816) 28 = **Agrimonia**, Linn. (Rosac.).
agrimonoides, Pollini, ll. cc. = *A. Eupatoria*.

SPANANTHE, Jacq. Coll. iii. 247 (1789). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 876.
angulosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 171 = *paniculata*.
Huanaca, Lag. Amen. Nat. ii. 93 = *Huanaca Cavanillesii*.
paniculata, Jacq. Coll. iii. 247.—Reg. Andin.
saniculaefolia, Spreng. in Schult. Syst. vi. 357 = *Diposis saniculaefolia*.
setosa, Moench, Meth. Suppl. 34 = *paniculata*.
sinuata, Spreng. Syst. i. 878 = *Hydrocotyle acutifolia*.

SPANIOPTILON, Less. Syn. Comp. 10 (1832) = **Cnicus**, Linn. (Compos.).
lineare, Less. l. c. = *C. linearis*.

SPANIZIUM, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 180 (1843) = **Saponaria**, Linn. (Caryoph.).
ocymoides, Griseb. l. c. = *Sap. prostrata*.

SPANOGHEA, Blume, Rumphia, iii. 173 (1850) **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 406.
connata, F. Muell. in Tarns. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 26 = *Nephelium connatum*.
ferruginea, Blume, Rumphia, iii. 173.—N. Guin.
glabra, Blume, l. c. 174.—Ins. Timor.
nepheleoides, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 25; Vict. Pl. i. 227 = *Nephelium leiocarpum*.

SPANOTRICHUM, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 291 (1837) = **Osmites**, Linn. (Compos.).
pinnatifidum, E. Mey. ex DC. l. c. = *O. pinnatifida*.

SPARATTANTHELIUM, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 40. **COMBRETACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 690.
amazonum, Mart. l. c. 42.—Bras.
bororum, Mart. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. iii. (1841) 302.—Bras.
botocudorum, Mart. l. c. 301. t. 10. f. 2; t. 11. f. 1.—Bras.
cordatum, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. II. 294.—Bras.
tarapotatum, Meissn. l. c.—Bras.
tupinambazum, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 41.—Bras.
tupiniquorum, Mart. l. c. 40.—Bras.

SPARATTOSPERMA, Mart. ex DC. in Meissn. Gen. 300; Comm. 208 (1840). **BIGNONIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1041.
lithontripticum, Mart. in DC. Prod. ix. 203.—Bras.
psammophilum, Mart. l. c.—Bras.

SPARATTOSYCE, Bur. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xi. (1869) 379. t. 6. **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 369.
dioica, Bur. l. c. 380.—N. Caled.

SPARAXIS, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 225. **IRIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 708.
ANACTORION, Rafin. Fl. Tellur. iv. 34 (1836).
albiflora, Eckl. Top. Verz. 28 = *bulbifera*.
anemoneflora, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 225 = *Ixia anemoneaeflora*.
atropurpurea, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 99 = *Dierama pulcherrimum*.
atropurpurea, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle. xv. (1882) 389 = *grandiflora*.
bicolor, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 225 = *Synnotia bicolor*.
blanda, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 398 = *tricolor*.
bulbifera, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 226.—Afr. austr.
cana, Eckl. Top. Verz. 28.—Afr. austr.
cuprea, Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867–68) 378 = *Streptanthera cuprea*.
fimbriata, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 226 = *grandiflora*.
fragrans, Ker-Gawl. l. c. 225 = *Ixia fragrans*.
galeata, Ker-Gawl. l. c. = *Synnotia galeata*.
grandiflora, Ker-Gawl. l. c.—Afr. austr.
Griffini, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 398 = *tricolor*.
Jauberti, Lodd. ex Fenzl, Del. Sem. Hort. Vindob. (1855), sphalm. = seq.
Jaubertii, Eckl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 164 = *Freesia refracta*.
lacera, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 226 = *grandiflora*.
Liliago, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 398 = *grandiflora*.
lineata, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 131 = *grandiflora*.
lutea, Eckl. Top. Verz. 28.—Afr. austr.
luteo-violacea, Eckl. l. c. 27 = *Synnotia variegata*.
Meleagris, Eckl. l. c.—Afr. austr.
miniata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 389.—Afr. austr.
orchidiflora, Lodd. Bot. Cab. t. 1099.—Afr. austr.
pendula, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1482; Lindl. Bot. Reg. t. 1360 = *Dierama ensifolium*.
pulcherrima, Hook. f. Bot. Mag. t. 5555 = *Dierama pulcherrimum*.
reflexa, Villet, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 610, nomen.—Afr. austr.
stellaris, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 383 = *grandiflora*.
Thouberti, Hort. ex Klatt, in Gartenfl. (1874) 289 = *Freesia Leichtlini*.
tricolor, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 225.—Afr. austr.
versicolor, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 160 = *tricolor*.
violacea, Eckl. Top. Verz. 27.—Afr. austr.
Wattii, Harv. Gen. S. Afr. Pl. 330 = *Synnotia variegata*.

SPARGANION, Adans. Fam. ii. 471 (1763) = seq.

SPARGANIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). **TYPHACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 955.
PLATANARIA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 39 (1821).
affine, Schnitz. Typh. 27 = *simplex*.
alpinum, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 375, nomen = *simplex*.
americanum, Nutt. Gen. Am. ii. 203 = *angustifolium*.
angustifolium, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 189.—Am. bor.; Austral.
Borderi, Focke, in Bremen, Abh. v. (1877) 409.—Europ.
boreale, Laest. ex Beurl. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhand. ix. (1852) 192 = *simplex*.
californicum, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1884) 11.—Calif.
carinatum, Falc. in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 18, nomen (Quid ?).—Cashmir.
emersum, Rehm. in Verh. Nat. Ver. Bruenn, x. 1871 (1872) 80 = *simplex*.
erectum, Linn. Sp. Pl. 971 = *ramosum*.

SPARGANIUM:—

erectum, Wahlenb. Fl. Suec. ii. 604 = *simplex*.
eurycarpum, Engelm. in A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 481, partim = *angustifolium*.
fluitans, Fries, in Bot. Notiser (1849), 14, in obs.—Europ.
Friesii, Beurl. l. c. (1854), 136 = *natans*.
glomeratum, Laest. ex Beurl. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhand. ix. (1852) 192 = *fluitans*.
gramineum, Georgi, Reise, i. 232 (Quid ?).—Rossia.
gramineum, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 297 = *minimum*.
hyperboreum, Laest. ex Beurl. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhand. ix. (1852) 192.—Island.; Scand. bor.
lanceolatum, Georgi, Reise, i. 233 = *natans*.
longifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 103 = *natans*.
minimum, Fries, Summa Veg. Scand. 68, 560.—Europ.
natans, Fries, in Bot. Notiser (1849), 13; (1852), 92 = *erectum*.
natans, Linn. Sp. Pl. 971.—Europ.
natans, Oed. Fl. Dan. t. 260 = *minimum*.
neglectum, Beeby, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 26, 193.—Europ.
oligocarpon, Ångstr. in Bot. Notiser (1853), 149.—Scand.
pubescens, Poir. Voy. Barb. ii. 254.—Afr. bor.
ramosum, Curt. Fl. Loud. fasc. v. t. 66.—Europ.; Sibir.; Am. bor.; Ind. or.
rectum, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 377 = *ramosum*.
rostratum, Larss. Fl. Werml. (1859) 260 = *minimum*.
simplex, Huds. Fl. Angl. ed. II. 401.—Europ.; Sibir.; Am. bor.
simplex, Muhl. Cat. ed. I. 82; ed. II. 87 = *angustifolium*.
stoloniferum, Buch-Ham. in Wall. Cat. n. 4990 = *ramosum*.
tenuifolium, Poir. Voy. Barb. ii. 254.—Afr. bor.
trifidum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 723 = *ramosum*.
vaginatum, Larss. Fl. Werml. (1859) 259 = *simplex*.

SPARGANOPHORUS, Vaill. ex Crantz, Inst. i. 261 (1766); Gaertn. Fruct. ii. 395. t. 165 (1791). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 223.
ATHENAEA, Adans. Fam. ii. 121 (1763).
STRUCHIUM, P. Br. Hist. Jamaic. 312. t. 34 (1756).
africanus, Steud. Nom. ed. I. 801 = *Vaillantii*.
ageratoides, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 = *Ageratum corymbosum*.
Ethulia, Crantz, Inst. i. 261 = *Ethulia conyzoides*.
fasciatus, Lam. Illustr. i. 670; Encyc. vii. 302 = *Vaillantii*.
fasciculatus, Steud. Nom. ed. I. 801, sphalm. = *praec.*
fuscatus, Steud. l. c. ed. II. ii. 614, sphalm. = *praec.*
obtusifolius, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 = *Ageratum conyzoides*.
sonchifolius, Spreng. Syst. iii. 458 = *Cephalopappus sonchifolius*.
Struchium, Poir. Encyc. vii. 302 = *Vaillantii*.
Vaillantii, Crantz, Inst. i. 261.—Ind. occ.
verticillata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 95 = *Sclerolepis verticillata*.

SPARMANNIA, Buchoz, Pl. Nouv. Découv. t. 1 (1779) = **Rehmannia**, Libosch. (1835) (Scrophul.).
sinensis, Buchoz, l. c. = *R. chinensis*.

SPARMANNIA, Linn. f. Suppl. 41 (1781). **TILIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 235.
abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 29, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 79.—Abyss.
acerifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 614 = *africana*.
africana, Linn. f. Suppl. 265.—Afr. austr.
discolor, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 102.—Madag.
palmata, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 66 = *Entelea palmata*.
palmata, E. Mey. ex Presl, Bot. Bemerk. 19.—Afr. austr.
rugosa, Bivona?, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 70 (Quid ?).—Afr. austr.
subpalmata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 101.—Madag.

SPARTHOTHAMNUS, Buek, Ind. ad DC. Prod. iii. 442 (1858), sphalm. = **Spartothamnus**, A. Cunn. (Verben.).

SPARTIANTHUS, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 223 (1822) = *Spartium*, Linn. (Legumin.).
americanus, Steud. Nom. ed. II. ii. 614 = *Spartium junceum*.
junceus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 223 = *Spartium junceum*.

SPARTIDIUM, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 173 (1874) = *Genista*, Linn. (Legumin.).
Saharae, Pomel, l. c. = *G. Saharae*.

SPARTINA, Schreb. Gen. 43 (1789). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1107.
CHAUVINIA, Steud. Syn. Pl. Gram. 362 (1855).
LIMNETIS, Pers. Syn. i. 72 (1805).
PONCELETTIA, Thunb. Fl. Trist. Acugn. 36 (1811).
SOLENACHNE, Steud. Syn. Pl. Gram. 12 (1854).
TRACHYNOTIA, Michx. Fl. Bor. Am. i. 63 (1803).
TRISTANIA, Poir. Encyc. Suppl. iv. 526, in obs. (1816).
alterniflora, Loisel. Fl. Gall. 719; ed. II. i. 41 = stricta.
arundinacea, Carmich. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 504.—Ins. Trist. Acuna; Amst.
bahiensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 474, in syn.—Bras.
brasilensis, Raddi, Agrost. Bras. 211.—Bras.
capensis, Nees, Fl. Afr. Austr. 260.—Afr. austr.
ciliata, Kunth, Rev. Gram. i. 94.—Am. austr.
coarctata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. ii. (1840) 110 = ciliata.
cynosuroides, Roth, Catalect. fasc. iii. 10; Willd. Enum. Hort. Berol. 80 = Schreberi.
densiflora, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 14.—Chili.
dissitiflora, Steud. Syn. Pl. Gram. 215.—Bras.
Duriaei, Parl. Fl. Ital. i. 230 = versicolor.
fasciculata, Beauv. Agrost. 25.—Am. austr.
foliosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. ii. (1840) 114 = stricta.
geniculata, Beauv. Agrost. 25.—Java.
glabra, Muhl. Desc. Gram. i. 54.—Am. bor.
glabriuscula, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 18, nomen.—Java.
Gouini, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 509.—Mexic.
gracilis, Hook. ex Chapm. Fl. S. U. St. 556.—Florida.
gracilis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. ii. (1840) 110.—Am. bor.
humilis, [Willd. ex] Link, Jahrb. i. III. (1820) 93 = *Bouteloua ovata*.
juncea, Willd. Enum. Hort. Berol. 81.—Am. bor.
junciformis, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 238.—Am. bor.
laevigata, Bosc, ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 92.—Am. bor.
leiantha, Benth. Bot. Voy. Sulph. 56.—Mexic.
patens, Muhl. Desc. Gram. 55.—Am. bor.
pectinata, Bosc, ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 92.—Am. bor.
phleoides, Roth, Neue Beytr. i. 101 = *Heleochloa schoenoides*.
polystachya, Willd. Enum. Hort. Berol. 81, in obs.—Am. bor.
pubera, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 18, nomen.—Java.
pumila, Roth, Catalect. fasc. iii. 10.—Am. bor.
pungens, Beauv. Agrost. 25 = stricta.
Schreberi, J. F. Gmel. Syst. 123.—Am. bor.
stricta, Roth, Neue Beytr. i. 101.—Europ.; Am. bor. et austr.
Townsendi, H. & J. Groves, in Bot. Exch. Club Rep. 1880 (1881), 37 = stricta.
versicolor, Fabre, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 123. t. 3.—Gallia.

SPARTIUM, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 218 (1737). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 483.

SPARTIANTHUS, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 223 (1822).
acanthoclodon, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 266 = *Genista acanthoclada*.
acutifolium, Lindl. Bot. Reg. t. 1974 = *junceum*.
aetnense, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. ii. [18] = *Genista aethnensis*.
affine, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 296.—Ins. Canar.
albicans, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 64 (= *Teline canariensis*).—Ins. Canar.
album, Desf. Fl. Atlant. ii. 132 = *Cytisus albus*.

SPARTIUM:—

alpinum, Host, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 615, nomen = *Laburnum alpinum*?
ambiguum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 295.—Ins. Canar.
americanum, Meyen, Reise, i. 445 = *junceum*.
amoenum, Salisb. Prod. 330 = *Cytisus linifolius*.
angulatum, Linn. Sp. Pl. 709 = *Genista parviflora*.
angulatum, Rafin. Préc. Découv. 37 = *Cytisus scoparius*.
angulosum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 79 = *Cytisus scoparius*.
apetalum, Labill. ex Steud. Nom. ed. I. 801 = *Genista apetalata*.
aphyllum, Pall. Reise, iii. 742 = *Eremosparton aphyllum*.
aragonense, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 434 = *Genista cinerea*.
arborescens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10 = *Brya Ebenus*.
arborescens, Desf. Fl. Atlant. ii. 131 = *Cytisus arboreus*.
argenteum, Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 615, nomen (Quid?).—Ins. Canar.
aspalatoides, Desf. Fl. Atlant. ii. 136 = *Genista aspalatoides*.
biflorum, Desf. l. c. 133. t. 179 = *Cytisus Fontangesii*.
Bovei, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 297 = *Genista monosperma*.
capense, Linn. Pl. Afr. Kar. 14; Amoen. Acad. vi. 91 = *Rafnia opposita*.
capitatum, Barnado, ex Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 61 = *Genista umbellata*.
capitatum, Cav. l. c. 63 = *Genista clavata*.
cinereum, Vill. Prosp. 40 = *Genista cinerea*.
Clusii, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 290. t. 16. f. 3 = *Genista monosperma*.
complicatum, Gouan, Hort. Monsp. 356 = *Adenocarpus grandiflorus*?
complicatum, Linn. Sp. Pl. 709 = *Adenocarpus intermedius*.
congestum, Willd. Enum. Hort. Berol. 744 = *Cytisus congestus*.
contaminatum, Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 261 = *Indigofera filifolia*.
contaminatum, Linn. Mant. ii. 268 = *Lebeckia contaminata*.
corsicum, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 440 = *Genista corsica*.
creticum, Desf. Tabl. ed. I. 185 = *Anthyllis Hermanniae*.
Cupani, Spreng. Syst. iii. 177 = *Genista Cupani*.
cuspidatum, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 56 = *Genista hirsuta*.
cuspidosum, Burch. Trav. i. 348 = *Lebeckia psiloloba*.
cytisoides, Linn. f. Suppl. 320 = *Lebeckia cytisoides*.
dalmaticum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 266 = *Genista aristata*.
decumbens, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 11 = *Cytisus decumbens*.
dispermum, Willd. in Roem. & Usteri, Mag. iv. 11^{tes} St. (1790) 35 = *Cytisus albus*.
dubium, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 295 = *Genista monosperma*.
Duriaei, Spach, l. c. 289. t. 16. f. 2.—Afr. bor.
ellipticum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 177 = *Genista elliptica*.
ephedroides, Spreng. l. c. iv. Cur. Post. 266 = *Genista ephedroides*.
erinaceoides, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 441 = *Genista aspalatoides*.
ferox, Poir. Voy. Barb. ii. 206 = *Genista ferox*.
filifolium, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 461 = *Viminaria denudata*.
fragrans, Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 801, 802 = *Cytisus fragrans*.
Gasparinii, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825) 11 = *Genista ephedroides*.
glabrum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *Cytisus scoparius*.
gracile, Salisb. Prod. 329 = *Genista monosperma*.
grandiflorum, Brot. Fl. Lusit. ii. 80 = *Cytisus grandiflorus*.
grandiflorum, Salisb. Prod. 329 = *Genista sphaerocarpa*.
gymnopterum, Viv. App. Fl. Cors. Prod. 6 = *Genista ephedroides*.
Halleri, Auct. ex Lam. Encyc. ii. 618 = *Cytisus decumbens*.
heterophyllum, L'Hérit. Stirp. Nov. 183. t. 87 = *Genista ferox*.

SPARTIUM:—

hirsutum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *Cytisus Milleri*.
hispanicum, Spreng. Syst. iii. 177 = *Genista hispanica*.
horridum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vii. 69. t. 674 = *Genista acanthoclada*.
horridum, Vahl, Symb. Bot. i. 51 = *Genista horrida*.
humile, Salisb. Prod. 330 = *Genista germanica*.
infestum, Presl, Delic. Prag. 33 = *Genista infesta*.
interruptum, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 58 = *Genista triacanthos*.
japonicum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 43.—Japon.
junceum, Linn. Sp. Pl. 708.—Geront. temp.
Laburnum, Cav. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 615 = *Laburnum vulgare*.
lanigerum, Desf. Fl. Atlant. ii. 135 = *Calycotome villosa*.
lanigerum, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 269 (Quid?).—Syria.
lasiocarpum, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 460 = *Cytisus patens*.
linifolium, Desf. Fl. Atlant. ii. 134. t. 181 = *Cytisus linifolius*.
lusitanicum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *Cytisus grandiflorus*.
microcarpum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 292. t. 16. f. 5.—Ins. Canar.
microphyllum, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 63 = *Adenocarpus foliolosus*.
molle, Cav. l. c. 67 = *Genista mollis*.
monospermum, Linn. Sp. Pl. 708 = *Genista monosperma*.
monospermum, Viv. Fl. Lib. Spec. 39 = *Genista Raetam*.
multicaule, Hort. ex Lam. Encyc. ii. 617 = *Genista multicaulis*.
multiflorum, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 21 = *Cytisus albus*.
nitens, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 177 = *Genista nitens*.
nubigenum, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 13 = *Cytisus fragrans*.
nudum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 176 = *Genista nuda*.
odoratissimum, D. Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 615 = *junceum*.
odoratum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 275 = *junceum*.
Osyris, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 433 = *Genista ramosissima*.
ovatum, Berg. Desc. Pl. Cap. 197 = *Rafnia cuneifolia*.
parviflorum, Vent. Jard. Cels. 87 = *Genista parviflora*.
patens, Murr. Syst. ed. XIII. 535 = *Cytisus patens*.
persicum, Willd. Sp. Pl. iii. 931 = *Crotalaria furfuracea*.
pilosum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 303 = *Genista pilosa*.
pinastriifolium, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 20 = *Lebeckia sepiaia*.
procerum, Willd. Enum. Hort. Berol. 743 = *Cytisus procerus*.
pungens, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 225 = *Cytisus pungens*.
purgans, Linn. Syst. ed. XII. 474 = *Cytisus purgans*.
pusillum, Salisb. Prod. 330 = *Genista anglica*.
radiatum, Barnado, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 423 = *Genista Barnadesii*.
radiatum, Linn. Sp. Pl. 708 = *Genista radiata*.
radiatum, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 419 = *Genista horrida*.
Raetam, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 288. t. 16. f. 1 = *Genista Raetam*.
ramosissimum, Desf. Fl. Atlant. ii. 132. t. 178 = *Genista ramosissima*.
rhodorrhizoides, Walp. Rep. ii. 840 = *scmperflorens*.
rigidum, Viv. Fl. Lib. Spec. 40. t. 17. f. 1 = *Calycotome villosa*.
rostratum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 293.—Ins. Canar.
rostratum, Spreng. Syst. iii. 177 = *Genista triacanthos*.
sagittale, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 302 = *Genista sagittalis*.
scoparium, Linn. Sp. Pl. 709 = *Cytisus scoparius*.
Scorpius, Linn. l. c. 708 = *Genista Scorpius*.
semperflorens, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 294. t. 16. f. 10.—Ins. Canar.
sepiarium, Linn. Amoen. Acad. vi. 91 = *Lebeckia sepiaia*.
sericeum, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 12 = *Genista sericea*.
sericeum, Presl, ex Steud. Nom. ed. I. 802 = *Genista infesta*.

SPARTIUM :—

- sericeum*, Vent. Choix, 17 = *Genista clavata*.
sessilifolium, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 266 =
Genista sessilifolia.
sophoroides, Berg. Desc. Pl. Cap. 198 = *Hypocalyptus*
obcordatus.
sphaerocarpum, Desf. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér.
 III. ii. (1844) 244 = *Genista numidica*.
sphaerocarpum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 402 =
Genista cinerea.
sphaerocarpum, Linn. Mant. ii. 571 = *Genista sphaero-*
carpa.
spinosum, Asso, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.
 iii. 430 = *Genista Scorpius*.
spinosum, Brot. Fl. Lusit. ii. 85 = *Calycotome villosa*.
spinosum, Linn. Sp. Pl. 709 = *Calycotome spinosa*.
stylolum, Spreng. Syst. iii. 176 = *Genista stylosa*.
supranulium, Linn. f. Suppl. 319 = *Cytisus fragrans*.
terminale, Salisb. Prod. 330 = *Cytisus canariensis*.
thebaicum, Delile, Fl. Egypt. 250. t. 37. f. 1 = *Crotala-*
ria thebaica.
tinctorium, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 302 = *Genista*
tinctoria.
tricuspidatum, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801)
 57 = *Genista tricuspidata*.
tridens, Cav. l. c. 59 = *Genista tridens*.
triquetrum, Steud. Nom. ed. I. 802 = *Genista triquetra*,
Lam.
trispermum, Sm. in Rees, Cycl. xxxii. n. 5 = *Genista*
aethnensis.
umbellatum, L'Hérit. Stirp. Nov. 183 = *Genista*
umbellata.
valentinum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 176 = *Genista*
valentina.
villosum, Poir. Voy. Barb. ii. 207 = *Calycotome villosa*.
villosum, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 51 = *Cytisus*
creticus.
virgatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 11 = *Genista*
virgata.
Webbii, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843)
 291. t. 16. f. 2 = *Genista monosperma*.

SPARTOCYSUS, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii.
 457 (1880), sphalm. = seq.

SPARTOCYTISUS, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii.
 49 (1840) = *Cytisus*, Linn. (Legumin.).
albus, Webb & Berth. l. c. 45 = *C. albus*.
filipes, Webb & Berth. l. c. 52 = *C. filipes*.
nubigenus, Webb & Berth. l. c. 50 = *C. fragrans*.
purgans, Webb & Berth. l. c. 45 = *C. purgans*.
sessilifolius, Webb & Berth. l. c. = *C. sessilifolius*.
triflorus, Webb & Berth. l. c. = *C. triflorus*.

SPARTOTAMNUS, Webb & Berth. ex Presl, Bot.
 Bemerk. 138 (1844) = *Cytisus*, Linn. (Legumin.).
albus, Presl, l. c. = *C. albus*.
sessilifolius, Presl, l. c. = *C. sessilifolius*.

SPARTOTHAMNUS, A. Cunn. in Loud. Hort.
 Brit. Suppl. 600 (1830), nomen; et ex Walp. Rep.
 vi. 694 (1846-47). *VERBENACEAE*, Benth. &
 Hook. f. ii. 1141.
juncus, A. Cunn. II. cc.—Austral.
puberulus, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, ii.
 (1882) 55, in obs.—Austral.
teucriiflorus, F. Muell. l. c. 55.—Austral.

SPARTOTHAMNUS, Walp. Ann. i. 221 (1848), sphalm.
 = **SPARTOTAMNUS**, Webb & Berth.

SPARTUM vel **SPARTIUM**, Heist. Syst. 12 (1748) =
Nardus, Linn. (Gramin.).

SPATALANTHUS, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I.
 t. 300 (1829) = **Romulea**, Maratt. (Irid.).
speciosus, Sweet, l. c. (= *Trichonema monadelphum*).—
 Afr. austr.

SPATALLA, Salisb. Parad. Lond. sub t. 67 (1807)
PROTEACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 172.
abietina, Roem. & Schult. Syst. iii. 397 = *curvifolia*.
barbigera, Knight, Prot. 76.—Afr. austr.
bombycina, Knight, l. c.—Afr. austr.
bracteata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 146.
 Afr. austr.
brevifolia, R. Br. l. c. 151.—Afr. austr.
caudaeiflora, Knight, Prot. 75.—Afr. austr.

VOL. II.

SPATALLA :—

- caudata*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 150 =
caudaeiflora.
colorata, Meissn. in DC. Prod. xiv. 308.—Afr. austr.
curvifolia, Knight, Prot. 77.—Afr. austr.
ericaefolia, Knight, l. c. 74.—Afr. austr.
gracilis, Knight, l. c. 77.—Afr. austr.
incurva, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 149 =
procera.
laxa, R. Br. l. c. 146 = *gracilis*.
longifolia, Knight, Prot. 77.—Afr. austr.
mollis, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 144.—
 Afr. austr.
nana, Knight, Prot. 76.—Afr. austr.
nivea, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 145.—
 Afr. austr.
parilis, Knight, Prot. 75.—Afr. austr.
pedunculata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 144
 = *curvifolia*.
polystachya, R. Br. l. c. 148.—Afr. austr.
polystachya, Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 308 =
sericea.
procera, Knight, Prot. 76.—Afr. austr.
prolifera, Knight, l. c. 75; R. Br. in Trans. Linn.
 Soc. x. (1810) 147.—Afr. austr.
propinqua, R. Br. l. c. 150.—Afr. austr.
pyramidalis, R. Br. l. c. 148 = *parilis*.
ramulosa, R. Br. l. c. 145.—Afr. austr.
ramulosa, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 308 =
sericea.
sericea, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 147.—
 Afr. austr.
squamata, Meissn. in DC. Prod. xiv. 310.—Afr. austr.
Thunbergii, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 150.
 —Afr. austr.
thyrsiflora, Knight, Prot. 74.—Afr. austr.

SPATANTHUS, Juss. in Dict. Sc. Nat. xxiv. 239 (1822)
 = **Spathanthus**, Desv. (Rapat.).

SPATELLARIA, Reichb. Consp. 189 (1828) = **SPATHU-**
LARIA, A. St. Hil. = **Amphirox**, Spreng. (Violar.).

SPATHANDRA, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i.
 313. t. 71 (1832) = **Memecylon**, Linn. (Melastom.).
caerulea, Guill. & Perr. l. c. = *M. Spathandra*.
fascicularis, Planch. ex Benth. in Hook. Niger Fl. 357
 = *M. fasciculare*.
memecyloides, Benth. l. c. = *M. Vogelii*.

SPATHANDUS, Steud. Nom. ed. II. ii. 615 (1841),
 sphalm. = **Spathanthus**, Desv. (Rapat.).

SPATHANTHEUM, Schott, in Bonplandia, vii.
 (1859) 164. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 989.

GAMOCHLAMYS, Baker, in Gard. Chron. (1876) 164.
heterandrum, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 989; N. E.
 Br. in Gard. Chron. (1883) II. 70.—Hab.?
Orbignyana, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 165.
 —Bolivia.

SPATHANTHUS, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.
 xiii. (1828) 45. t. 4. *RAPATEACEAE*, Benth. &
 Hook. f. iii. 859.
unilateralis, Desv. l. c.—Guian.

SPATHE, P. Br. Hist. Jamaic. 187 (1756) = **Spathelia**,
 Linn. (Simarub.).
simplex, Crantz, Inst. ii. 464 = *Spathelia simplex*.

SPATHELIA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 386 (1763). *SIMA-*
RUBEAE, Benth. & Hook. f. i. 315.

SPATHE, P. Br. Hist. Jamaic. 187 (1756).
glabrescens, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v.
 (1846) 581.—Jamaic.
ramosa, Mart. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 52 =
Discophora guianensis.
rhoifolia, DC. Prod. ii. 84.—Mexic.
simplex, Linn. Sp. Pl. ed. II. 386.—Jamaic.
vernica, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v.
 (1846) 581.—Cuba.

SPATHESTIGMA, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 204
 (1836) = **Adenosma**, R. Br. (Scrophul.).
glutinosum, Hook. & Arn. l. c. = *A. grandiflorum*.

SPATHICARPA, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 146.
 t. 77. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 989.
Bridgesii, Schott, in Bonplandia, vi. (1858) 124, nomen
 = *Spathanthemum Orbignyana*.
cornuta, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 34.
 —Bras.
Gardneri, Schott, in Bonplandia, vi. (1858) 124 =
sagittifolia.
hastifolia, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 147. t. 77.—Am.
 trop.
lanceolata, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 531.—
 Paraguay.
longicuspis, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 87 =
sagittifolia.
platyspatha, Schott, l. c. = *sagittifolia*.
sagittifolia, Schott, l. c. vi. (1858) 124.—Bras.
Tweediana, Schott, l. c.—Bras.

SPATHIOSTEMON, Blume, Bijdr. 621 (1825) =
Homonoia, Lour. (Compos.).
javense, Blume, l. c. 622 = *H. riparia*.
salicinum, Hassk. Hort. Bog. Desc. 41 = *H. riparia*.

SPATHIPHYLLOPSIS, Teysm. & Binn. in Tijdschr.
 Nederl. Ind. xxv. (1863) 400 = **Spathiphyllum**,
 Schott (Aroid.).
Minahassae, Teysm. & Binn. l. c. = *Spathiphyllum*
commutatum.

SPATHIPHYLLUM, Schott, Melet. i. 22 (1832).
AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 997.

AMOMOPHYLLUM, Engl. in Gard. Chron. (1877) I.
 139.

HYDNOSTACHYON, Liebm. in Kjoeb. Vidensk.
 Meddel. (1849) 24.

LEUCOCHLAMYS, Poepp. ex Engl. in DC. Monog.
 Phan. ii. 230 (1879).

MASSOWIA, C. Koch, in Bot. Zeit. x. (1852) 277.

SPATHIPHYLLOPSIS, Teysm. & Binn. in Tijdschr.
 Nederl. Ind. xxv. (1863) 400.

amazonicum, Spruce, ex Engl. in DC. Monog. Phan.
 ii. 278 = *Urospatha sagittaeifolia*.

atrovirens, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858)
 179.—Costa Rica.

Beccarii, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879)
 268.—N. Guin.

blandum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857)
 159.—Guian.

Bonplandii, Schott, l. c. 158 = *candicans*.
brevirostre, Schott, Aroid. i. 2.—Mexic.

candicans, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 85.
 t. 295.—Am. trop.

candidum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1878) II. 783.
 —N. Granat.

Candolleana, Schott, Prod. Aroid. 429.—Guian.

cannaefolium, Schott, Aroid. i. 1. t. 1 = *candicans*.
cannaeforme, Engl. in Mart. Fl. Bras. iii. II. 103.

t. 16. f. 3 = *candicans*.
caudatum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 85.
 t. 296 = *Urospatha caudata*.

cochlearispathum, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 221.
 —Mexic.

commutatum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii.
 (1857) 158.—Ins. Philipp.

cuspidatum, Schott, l. c.—Guian.

Fendleri, Schott, l. c. 159 = *Friedrichsthalii*.
floribundum, N. E. Br. in Gard. Chron. (1878) II. 783.

—N. Granat.

Friedrichsthalii, Schott, Aroid. i. 2. t. 4.—Am. centr.

fulvovirens, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii.
 (1858) 179; Prod. Aroid. 427.—Costa Rica.

Gardneri, Schott, Aroid. i. 2. t. 3.—Bras.

Glaziovii, Engl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1880) 358.
 —Bras.

heliconiaefolium, Schott, Aroid. i. 2. tt. 5, 6 =
cochlearispathum.

Humboldtii, Schott, l. c. t. 2 = *Candolleana*.
hybridum x, N. E. Br. in Gard. Chron. (1883) I. 500.

lancaefolium, Schott, Melet. i. 22.—Venezuel.

lanceolatum, C. Koch, Berl. Allg. Gartenz. (1857) 174
 = *Friedrichsthalii*.

Lechlerianum, Schott, Prod. Aroid. 425.—Peruv.

Liebmanni, Schott, Aroid. i. 2 = *cochlearispathum*.
longirostre, Schott, l. c. = *cochlearispathum*.

Minahassae, Regel, Gartenfl. xix. (1870) I. t. 637 =
commutatum.

Ortgiesi, Regel, l. c. 39; (1872) 292. t. 738.—Mexic.

SPATHIPHYLLUM :—

- Patini, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1878) II. 788.—N. Granat.
 phrynifolium, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 159.—Panama.
 sagittaeifolium, Schott, Melet. i. 22 = *Urospatha sagittaeifolia*.
 sagittifolium, Spruce, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 279 = *Urospatha Spruceana*.
 Schomburgkii, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 158 = *Candollecanum*.
 Wallisi, Regel, *Gartenfl.* (1877) 323. t. 920; et in *Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 640.—N. Granat. vel Venezuela.
 Wallisii, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1875). i. 558 = *Stenospermation popayanense*.
 Wendlandii, Schott, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. (1858) 179; *Prod. Aroid.* 432.—Costa Rica.

- SPATHIUM**, Edgew. in *Journ. As. Soc. Beng.* xi. (1842) 145 = *Aponogeton*, Thunb. (Naiad.).
 crispum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 694 = *A. crispum*.
 echinatum, Voigt, l. c. = *A. echinatum*.
 microphyllum, Voigt, l. c. = *A. microphyllum*.
 monostachyum, Edgew. in *Journ. As. Soc. Beng.* xi. (1842) 148 = *A. monostachyon*.
 undulatum, Edgew. l. c. 145 = *A. crispum*.

- SPATHIUM**, Lour. *Fl. Cochinch.* 217 (1790) = *Saururus*, Linn. (Piperac.).
 chinense, Lour. l. c. = *Saur. Loureiri*.

- SPATHODEA**, Beauv. *Fl. Owar.* i. 46. t. 27 (1805). **BIGNONIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1045.
 acuminata, Klotzsch, in Peters, Reise Mosamb. Bot. 191 (*Dolichandrone* sp.).—Afr. trop.
 adenantha, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 222.—Afr. trop.
 adenophylla, DC. *Prod.* ix. 206 = *Heterophragma adenophyllum*.
 alternifolia, R. Br. *Prod.* 472.—Austral.
 amoena, A. DC. in DC. *Prod.* ix. 208 = *Stereospermum hypostictum*.
 arcuata, Wight, l. c. t. 1340 = *Dolichandrone falcata*.
 atrovirens, Spreng. *Syst.* ii. 835 = *Dolichandrone falcata*.
 bracteosa, DC. *Prod.* ix. 208 = *Macfadyena bracteosa*.
 campanulata, Beauv. *Fl. Owar.* i. 47. tt. 27–28.—Afr. trop.
 campanulata, Euch.-Ham. ex DC. *Prod.* ix. 206 = *Dolichandrone stipulata*.
 Candolleana, Mart. ex DC. l. c. 207.—Bras.
 Cauda-felina, Hance, in *Journ. Bot.* x. (1872) 257 = *Dolichandrone Cauda-felina*.
 Coito, DC. *Prod.* ix. 204 = *Macfadyena Coito*.
 comosa, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 222 = *Bignonia comosa*.
 consanguinea, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1158, nomen.—Guian.
 corymbosa, Vent. Choix, 40. t. 40 = *Macfadyena corymbosa*.
 crispa, Bur. Monog. Bign. t. 27 = *Dolichandrone Lawii*.
 crispa, Dalz. & Gibs. Bomb. *Fl.* 160 = *Dolichandrone arcuata*.
 crispa, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 222 = *Dolichandrone falcata*.
 crispa, Wall. Cat. n. 6515 = *Dolichandrone crispa*.
 Diepenhorstii, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 754 = *Dolichandrone Rheedii*.
 Dolichandra, Steud. Nom. ed. II. ii. 616 = *Macfadyena Dolichandra*.
 falcata, Brand. Forest. *Fl.* 350 = *Dolichandrone Lawii*.
 falcata, Wall. Cat. n. 6517 = *Dolichandrone falcata*.
 Fenzliana, Walp. *Rep.* vi. 513.—Guian.
 filiformis, DC. *Prod.* ix. 209.—Austral.
 flavifolia, Miq. *Stirp. Surin. Sel.* 124.—Guian.
 fraxinifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 147.—Am. austr.
 gigantea, Blume, *Bijdr.* 761 = *Stereospermum hypostictum*.
 glandulosa, Blume, l. c. 762 = *Stereospermum glandulosum*.
 grandiflora, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 326 = *Dolichandrone Rheedii*.
 heterophylla, R. Br. *Prod.* 472.—Austral.

SPATHODEA :—

- hispidia, DC. *Prod.* ix. 205 = *Macfadyena hispidia*.
 ignea, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 77 = *Mayodendron igneum*.
 ilicifolia, Seem. in *Bonplandia*, vii. (1859) 246 = *Tabebuia dentata*.
 indica, Pers. *Syn.* ii. 173 = *Oroxylon indicum*.
 Jenischii, Sond. in *Hamb. Gartenz.* iv. (1848) 370.—Afr. trop.
 Kohautiana, Walp. *Rep.* vi. 513 = *Bignonia Unguis-cati*.
 laevis, Beauv. *Fl. Owar.* i. 48. t. 29.—Afr. trop.
 laurifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 146 = *Macfadyena laurifolia*.
 Lobbii, Teysm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 413 = *Stereospermum hypostictum*.
 longiflora, Vent. in *Mém. Inst. Par.* (1807) 20; Pers. *Syn.* ii. 173 = *Dolichandrone Rheedii*.
 Loureiriana, DC. *Prod.* ix. 209 = *Dolichandrone Rheedii*.
 lutea, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 461 = *Dolichandrone lutea*.
 luzonica, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 350 = *Dolichandrone Rheedii*.
 macroloba, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 565.—Sumatra.
 magnolioides, Cham. in *Linnaea*, vii. (1832) 659 = *Tabebuia magnolioides*.
 Mansoana, DC. *Prod.* ix. 209 = *Tabebuia Mansoana*.
 mollis, Sond. in *Linnaea*, xxii. (1849) 561 = *Macfadyena mollis*.
 montana, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 236 = *Zeyheria montana*.
 nilotica, Seem. in *Journ. Bot.* iii. (1865) 333 = *campanulata*.
 obovata, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 147 = *Macfadyena obovata*.
 obtusifolia, Cham. in *Linnaea*, vii. (1832) 660 = *Tabebuia leucoxyla*.
 orinocensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 147 = *Macfadyena orinocensis*.
 ovata, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1158, nomen.—Guian.
 pentandra, Hook. *Bot. Mag.* t. 3681 = *Oroxylon indicum*.
 Pisoniana, DC. *Prod.* ix. 209 = *Tabebuia Pisoniana*.
 platypoda, DC. l. c. 204 = *Macfadyena platypoda*.
 podopogon, DC. l. c. 205.—Cuba.
 portoricensis, Bello, in *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 293.—Porto Rico.
 puberula, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 192 (*Dolichandrone* sp.).—Afr. trop.
 Rheedii, Spreng. *Syst.* ii. 835 = *Dolichandrone Rheedii*.
 rostrata, Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 326 = *Dolichandrone Rheedii*.
 Roxburghii, Spreng. *Syst.* ii. 835 = *Heterophragma Roxburghii*.
 Schomburgkii, DC. *Prod.* ix. 207.—Guian.
 serrulata, DC. l. c. 206.—Siam.
 serrulata, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 154 = *prae.*
 speciosa, Brongn. *Herb. Gén. Amat.* t. 4; ex C. Morr. in *Ann. Soc. Bot. Gand*, v. (1849) 213. t. 260.—Bras.
 stipulata, Wall. Pl. As. Rar. iii. 20. t. 238 = *Dolichandrone stipulata*.
 suaveolens, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1047, sphalm. = *Stereospermum suaveolens*.
 tenuifolia, Boj. Hort. Maurit. 219; et ex DC. *Prod.* ix. 208 = *zanzibarica*.
 tomentosa, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 462 = *Dolichandrone tomentosa*.
 tulipifera, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 223 = *campanulata*.
 uncinata, Spreng. *Syst.* ii. 835.—Ind. occ.
 uncinata, Spreng. l. c. = *Macfadyena uncinata*.
 velutina, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 90 = *Dolichandrone stipulata*.
 vernicosa, Cham. in *Linnaea*, vii. (1832) 661.—Bras.
 xylocarpa, T. Anders. ex Brand. Forest *Fl.* 349 = *Stereospermum xylocarpum*.
 zanzibarica, Boj. ex DC. *Prod.* ix. 208 (= *Dolichandrone* sp.).—Afr. trop.

- SPATHODITHYROS**, Hassk. in *Flora*, xlix. (1866) 211 = *Commelina*, Linn.
 suffruticosus, Hassk. *Commel. Ind.* 11 = *C. suffruticosa*.

- SPATHOGLOTTIS**, Blume, *Bijdr.* 400 (1825). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 511.
 PAXTONIA, Lindl. *Bot. Reg.* (1838) t. 60.
 affinis, De Vriese, *Illustr. Orch.* t. 15.—Java.
 angustifolia, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 512 = *plicata*.
 aurea, Lindl. in *Journ. Hort. Soc.* v. (1850) 34.—Malaya.
 Deplanchei, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 86.—N. Caled.
 Fortuni, Lindl. *Bot. Reg.* (1845) t. 19 = *pubescens*.
 Handingiana, Par. & Reichb. f. *Otia Bot. Hamb.* 45.—Burma.
 ixioides, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 3745.—Reg. Himal.
 khasyana, Griff. *Notul.* iii. 323 = *pubescens*.
 lilacina, Griff. l. c. = *plicata*.
 Lobbii, Reichb. f. in *Walp. Ann.* vi. 455.—Burma.
 pacifica, Reichb. f. in *Seem. Fl. Vit.* 300.—Ins. Pacif.
 parvifolia, Lindl. *Bot. Reg.* (1845) sub t. 19 = *pubescens*.
 Paulinae, F. Muell. *Fragm.* vi. 95.—Austral.
 Petri, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) II. 392.—Ins. Pacif.
 plicata, Blume, *Bijdr.* 401. t. 76.—Malaya.
 plicata, Griff. *Notul.* iii. 325 = *aurea*.
 pubescens, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 3744.—Reg. Himal.; China.
 spicata, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 9 = *plicata*.
 tomentosa, Lindl. *Bot. Reg.* (1845) sub t. 19.—Ins. Philipp.
 trivalvis, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 3742 = *Acriopsis javanica*.
 unguiculata, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 512 = *Calanthes striata*.
 Vieillardii, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 85.—N. Caled.
- SPATHOLOBUS**, Hassk. in *Flora*, xxv. (1842) II. Beibl. 52. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 535.
 DREBBELIA, Zoll. in *Nat. en Gencesk. Arch. Neêrl. Indie*, iii. (1846) 79.
 acuminatus, Benth. in *Miq. Pl. Jungh.* 238.—Burma; Malaya.
 africanus, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 188.—Afr. trop.
 crassifolius, Benth. in *Miq. Pl. Jungh.* 238.—Ind. or.; Malaya.
 ferrugineus, Benth. l. c.—Java.
 gyrocarpus, Benth. l. c.—Malaya.
 littoralis, Hassk. in *Flora*, xxv. (1842) II. Beibl. 52.—Java.
 macropterus, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 303.—Sumatra.
 purpureus, Benth. ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 194.—Ind. or.
 Roxburghii, Benth. in *Miq. Pl. Jungh.* 238.—Ind. or.; Burma.
 scandens, Blume, ex Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. r. 204 = *ferrugineus*.
- SPATHOSCAPHE**, Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 29 = *Chamaedorea*, Willd. (Palm.).
 Arenbergiana, Oerst. l. c. 30 = *C. Arenbergiana*.
- SPATHOTECOMA**, Bur. Monog. Bign. 49 (1864) = *Newbouldia*, Seem. (Bignon.).
- SPATHULA**, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 163 = *Iris*, Tourn.
 foetidissima, Fourr. l. c. = *I. foetidissima*.
- SPATHULARIA**, DC. *Prod.* iv. 40 (1830), err. typ. = *SPATULARIA*, Haw. = *Saxifraga*, Linn.
- SPATHULARIA**, A. St. Hil. in *Mém. Mus. Par.* xi. (1824) 491. t. 24, et Pl. Rem. Brés. 317. t. 28 (1824) = *Amphirrhex*, Spreng. (Violar.).
 longifolia, A. St. Hil. ll. cc. 492. t. 24; 318. t. 28 = *A. longifolia*.
- SPATHYEMA**, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 352 = *Symplocarpus*, Salisb. (Aroid.).
 angusta, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 13 = *seq.?*
 foetida, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 352 = *Sym. foetidus*.
 lanceolata, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 13 = *prae.?*
 latifolia, Rafin. l. c. = *prae.?*

SPATULARIA, Haw. Saxifr. Enum. 47 (1821) = *Saxifraga*, Linn.
Clusii, Haw. l. c. 48 = *Sax. Clusii*.
leucanthemifolia, Haw. l. c. = *Sax. Clusii*.
stellaris, Haw. l. c. 49 = *Sax. stellaris*.

SPATULIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 83 (1836) = *Lathyrus*, Tourn. (Legumin.).
angustifolia, Rafin. l. c. (= *Orob. sessilifolius*).—
 Graecia; As. Min.

SPECKLINIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 8 (1830) = *Pleurothallis*, R. Br. (Orchid.).
acuminata, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1797 = *P. acuminata*.

atropurpurea, Lindl. l. c. = *P. atropurpurea*.
ciliaris, Lindl. l. c. (1835) Misc. 31 = *P. villosa*.
corniculata, Steud. Nom. ed. II. ii. 489, in syn. = *P. corniculata*.

dichotoma, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 52.—
 Peruv.

elegans, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1797 = *P. elegans*.
emarginata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 8 (excl. syn.) = *P. emarginata*.

flexuosa, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 52 = *P. flexuosa*.

floribunda, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 9 = *P. floribunda*.
graminea, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 51.—
 Peruv.

hypophylla, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1869) 26.
 —Am. trop.

Lanceola, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 8 = *P. Lanceola*.
linearis, Lindl. l. c. 9 = *P. linearis*.

Miqueliana, H. C. Focke, in Tijdschr. Wetensch. ii.
 (1849) 199 = *P. Miqueliana*.

obovata, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 86 = *P. obovata*.

orbicularis, Lindl. l. c. (1838) Misc. 31 = *P. orbicularis*.

plantaginea, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 51.
 t. 89 = *P. plantaginea*.

pusilla, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1797 = *P. pusilla*.
retusa, Lindl. l. c. = *P. retusa*.

scariosa, Lindl. l. c. = *P. scariosa*.

sertularioides, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 8 = *P. sertularioides*.

violacea, Lem. Jard. Fleur. iii. (1853) Misc. 18.—Bras.

SPECULARIA, Heist. Syst. 8 (1748). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 562.

APENULA, Neck. Elem. i. 234 (1790).

CAMPYLOCERA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 257.

DYSMICODON, Nutt. l. c. (1843).

LEGOSIA, Durand, Fl. Bourg. i. 37; ii. 26 (1782).

PENTAGONIA, Vent. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 298 (1841).

TRIODALLUS, A. DC. in DC. Prod. vii. 491 (1839).

TRIODANIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 67 (1836).

SPECULUM, Hall. in Rupp. Fl. Jen. 31 (1745).

SPECULUM-VENERIS, Gerard. ex Meissn. Gen. Comm. 364 (1840?).

arvensis, Montand. Guide Bot. 156 = *S. Speculum*.

biflora, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 17;

A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 82.—Am. bor. et austr.

californica, Vathek, in Linnaea, xxxviii. (1874) 714 = *biflora*.

castellana, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1854) 25 = *falcata*.

coa, A. DC. Monog. Camp. 350 = *pentagonia*.

cordata, Heynh. Nom. ii. 689 = *S. Speculum*.

falcata, A. DC. Monog. Camp. 345.—Reg. Mediterr.

ghilanensis, A. DC. l. c. 350.—Persia.

hirsuta, Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 616 = *S. Speculum*.

hirta, Nym. Consp. 483 = *S. Speculum*.

hybrida, A. DC. Monog. Camp. 348.—Europ.; Afr. bor.

leptocarpa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 82.—Am. bor. occ.

Lindheimeri, Vathek, in Linnaea, xxxviii. (1874) 713.—Am. bor. occ.

Linsecornia, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861

(1862) 460 = *leptocarpa*.

ovata, Vathek, in Linnaea, xxxviii. (1874) 713 = *biflora*.

pentagonia, A. DC. Monog. Camp. 344.—As. Min.

perfoliata, A. DC. l. c. 351.—Am. bor. et austr.

SPECULARIA :—

Speculum, A. DC. l. c. 346.—Europ.; Reg. Mediterr.
stricta, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 279 = *S. Speculum*.

vulgaris, Kitt. Taschenb. ed. II. 483 = *hybrida*?

vulgaris, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1860)

62, 135 = *S. Speculum*.

SPECULUM, Hall. in Rupp. Fl. Jen. 31 (1745) = *praec.*

SPECULUM-VENERIS, Gerard. ex Meissn. Gen. Comm. 364 (1840 ?) = *praec.*

SPEIRANTHA,* Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 562. *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 771.

convallarioides, Baker, l. c. 563.—China.

SPEIRANTHES, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 47 (1844),
 sphalm. = *Spiranthes*, Rich. (Orchid.).

SPEIREMA, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 27 = *Pratia*, Gaudich. (Campan.).

montanum, Hook. f. & Thoms. l. c. = *P. montana*.

SPEIRODELA, S. Wats. in Bot. Calif. ii. 190 (1880),
 sphalm. = *SPIRODELA*, Schleid. = *Lemna*, Linn.

SPENCERIA, Trimen, in Journ. Bot. xvii. (1879) 97. *ROSACEAE*.

ramalana, Trimen, l. c.—China.

SPENNERA, Mart. ex DC. Prod. iii. 115 (1828) = *Aciotis*, D. Don (Melastom.).

acuminifolia, Mart. ex DC. l. c. 116 = *A. acuminifolia*.

acuminifolia, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 37 = *A. Martiana*.

acutiflora, Mart. l. c. xxii. (1839) I. Beibl. 58 = *A. acutiflora*.

alata, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856),
 125 = *A. purpurascens*.

annua, Mart. ex DC. Prod. iii. 115 = *A. annua*.

anomala, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 274 = *A. dichotoma*.

appendicularioides, Steud. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 218 = *Aciisanthera recurva*.

aquatica, Mart. ex DC. Prod. iii. 116 = *Nepsera aquatica*.

asphaltis, Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 101 = *Nepsera aquatica*.

brachybotrya, DC. Prod. iii. 115 = *A. brachybotrya*.

caulialata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 149 = *A. caulialata*.

chaetodonta, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *seq.*

choetodon, DC. Prod. iii. 117 = *Oxymeris chaetodon*.

circaeifolia, DC. l. c. 116 = *A. circaeifolia*.

circaeoides, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 297 = *A. purpurascens*.

circaeoides, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 116 = *A. circaeifolia*.

dichotoma, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 295 = *A. dichotoma*.

dysophylla, Benth. l. c. 296 = *A. dysophylla*.

ferruginea, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 142 = *A. brachybotrya*.

fragilis, DC. Prod. iii. 115 = *A. fragilis*.

glandulosa, DC. l. c. 117 (= *Pleroma glandulosum*).—Guian.

grandifolia, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 273 = *A. purpurascens*.

hydrophila, Miq. Comm. Phytog. 75 = *Nepsera aquatica*.

hygrophila, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 36, sphalm. = *praec.*

indecora, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 296 = *A. laxa*.

indecora, DC. Prod. iii. 116 = *A. indecora*.

indecora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 147 = *A. polystachya*.

Kappleri, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 268 = *A. dichotoma*.

Kappleriana, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 146 = *A. laxa*.

lanceifolia, Steud. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 475 = *A. fragilis*.

latifolia, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 296.—Guian.

SPENNERA :—

latifolia, DC. Prod. iii. 115 = *Aciotis latifolia*.

laxa, DC. l. c. 116 = *A. laxa*.

longifolia, Mart. ex DC. l. c. 115 = *A. longifolia*.

martinicensis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 147 = *A. discolor*.

ornata, Miq. Stirp. Surin. Sel. 56. t. 13 = *A. annua*.

paludosa, Mart. ex DC. Prod. iii. 115 = *A. paludosa*.

panicularis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 148. t. 5. f. 1 = *A. caulialata*.

parviflora, Benth. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 79 = *Macrocentrum cristatum*.

pellucida, DC. Prod. iii. 115 = *A. purpurascens*.

pendulifolia, DC. l. c. 116 = *A. pendulifolia*.

polystachya, DC. l. c. = *A. polystachya*.

quintuplinervia, Miq. Stirp. Surin. Sel. 57 = *Clidemia japurensis*.

rostellata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 143 = *A. rostellata*.

rubricaulis, Mart. ex DC. Prod. iii. 115 = *A. rubricaulis*.

rubricaulis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 144 = *A. purpurascens*.

Sieberi, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 720 = *Nepsera aquatica*.

sileniflora, DC. Prod. iii. 116 = *A. sileniflora*.

sphaeranthera, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 142 = *A. sphaeranthera*.

tetraptera, Miq. Comm. Phytog. 76. t. 10. f. E = *A. dysophylla*.

uliginosa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 144 = *A. uliginosa*.

viscida, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 296 = *A. indecora*.

viscida, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 720 = *A. laxa*.

viscosa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 146 = *A. viscosa*.

SPENOCARPUS, Wall. Cat. p. 236 (1831?) = *Magnolia*, Linn.

SPENOTOMA, G. Don, Gen. Syst. iii. 774 (1834),
 sphalm. = SPHENOTOMA, R. Br. = *Dracophyllum*, Labill. (Ericac.).

SPEIRANSKIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 388 (1858). *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 305.

tuberculata, Baill. l. c. 389.—China.

SPERGELLA, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. p. lxx (1827) = *Sagina*, Linn. (Caryoph.).

glabra, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 794 = *Sagina glabra*.

glandulifera, Schur, Enum. Pl. Transs. 109 = *Sagina nodosa*.

macrocarpa, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 26 = *Sagina Linnaei*.

nodosa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 795 = *Sagina nodosa*.

nuriensis, Vayr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xi. (1882) 67.—Hispan.

Saginella, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 26.—Helvet.

saginoides, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 794 = *Sagina Linnaei*.

saxatilis, Schur, Enum. Pl. Transs. 109 = *Sagina Linnaei*.

subulata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 794 = *Sagina subulata*.

SPERGULA, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 133 (1737). *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 152.

ARENARIA, Adans. Fam. ii. 256 (1763).

aestivosa, Koen. ex Wall. Cat. n. 6963 = *Bergia aestivosa*.

affinis, Hook. Ic. Pl. t. 266 = *Colobanthus Billardieri*.

apetala, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 112. t. 142 = *Colobanthus Billardieri*.

arenarioides, Ser. in DC. Prod. i. 395.—Mexic.

arvensis, Linn. Sp. Pl. 440.—Europ.

caespitosa, Pritz. Ic. Ind. 1055, sphalm. = *Arenaria caespitosa*.

canadensis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Spergularia rubra*.

Cerviana, D. Dietr. l. c. = *Arenaria Cerviana*.

Chieusseana, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 206 = *arvensis*.

ciliaris, Brot. Fl. Lusit. ii. 215.—Lusitan.

decandra, Gilib. Fl. Lituan. ii. 156 = *arvensis*.

SPERGULA :—

- decumbens*, Ell. Sketch, i. 523 = *Sagina decumbens*.
droseroides, Brot. Fl. Lusit. ii. 215 = *Drosophyllum lusitanicum*.
falcata, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 16.—Am. bor.
filipensis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Spergularia media*.
fontinalis, D. Dietr. l. c. 1597 = *Stellaria crassifolia*.
geniculata, Pers. Syn. i. 522 = *arvensis*.
glabra, Willd. Sp. Pl. ii. 821 = *Sagina glabra*.
glandulosa, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 298 = *Sagina nodosa*.
glutinosa, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Holosteum umbellatum*.
grandis, Pers. Syn. i. 522 = *Spergularia grandis*.
humifusa, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 173 = *Sagina humifusa*.
imbricata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1599 = *Arenaria imbricata*.
indica, Royle, Illustr. Bot. Himal. 464 = *pentandra*?
japonica, Sw. ex Steud. Nom. ed. I. 802 = *Sagina Linnæi*.
laevis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1599 = *Spergularia levis*.
laricina, Lightf. Fl. Scot. i. 244 = *Sagina subulata*.
laricina, Linn. Sp. Pl. 441.—Sibir.
leptophylla, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Arenaria leptophylla*.
levis, Steud. Nom. ed. II. ii. 617 = *Spergularia levis*.
linicola, Bor. ex Nym. Consp. 122 = *arvensis*.
marina, Bartl. & Wendl. f. Beitr. Bot. ii. 64 = *Spergularia salina*.
marina, Dufour, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 617 = *Spergularia rubra*.
maxima, Dufour, ex Steud. l. c. = *Spergularia rubra*.
maxima, Weihe, in Arch. des [Deutschens] Apotheker-Ver. viii. (1824) 51; et in Boenn. Prod. Fl. Monast. 136 = *arvensis*.
media, Bartl. & Wendl. f. Beitr. Bot. ii. 64 = *Spergularia media*.
micrantha, Bunge, ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 183 = *Sagina Spergella*.
Morisonii, Bor. in Duch. Rev. Bot. ii. (1847) 424 = *vernalis*.
nivalis, Lindbl. in Phys. Sällsk. Tidskr. (1838) 128; ex Fries, Mant. iii. 31 = *Sagina nivalis*.
nodosa, Linn. Sp. Pl. 440 = *Sagina nodosa*.
nodosa, Walt. Fl. Carol. 142 (err. typ. 241) = *Sagina decumbens*.
pallida, Salisb. Prod. 298.—Afr. austr.
palustris, Pers. Syn. i. 522 = *Sagina nodosa*.
pentandra, Linn. Sp. Pl. 440.—Europ.
pentandra, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 567 = *vernalis*.
pilifera, DC. Fl. Fr. iv. 774 = *Sagina glabra*.
pilifera, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 756 = *Sagina subulata*.
prostrata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Polycarpacea prostrata*.
Pseudomorisonii, Iverus, in Bot. Notiser (1875), 81 = *arvensis*.
pumila, Rafin. Fl. Ludov. 93.—Am. bor.
purpurea, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Spergularia purpurea*.
racemosa, D. Dietr. l. c. 1599 = *Spergularia media*.
radicans, D. Dietr. l. c. 1598 = *Spergularia rubra*.
refracta, Dethard. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 567 = *arvensis*.
repens, Zúmag. Fl. Podem. ii. 286 = *Sagina glabra*.
rimarum, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 348.—Hispan.
rubra, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Spergularia rubra*.
rupestris, D. Dietr. l. c. = *Arenaria bonariensis*.
sabuletorum, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 119 = *Sagina sabuletorum*.
saginoides, All. Fl. Pedem. i. 118. t. 64. f. 1 = *Sagina glabra*.
saginoides, Linn. Sp. Pl. 441 = *Sagina Spergella*.
saginoides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 276 = *Sagina decumbens*.
saginoides, Retz. ex Steud. Nom. ed. I. 803 = *Sagina subulata*.
saginoides, Vahl, ex Nym. Consp. 121 = *Sagina nivalis*.
salina, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Spergularia rubra*.
sativa, Boenn. Prod. Fl. Monast. 135 = *arvensis*.
saxatilis, Nyland. Animadv. Distrib. Pl. Fenn. 85 = *Sagina Linnæi*.
saxatilis, Wimm. Fl. Schles. (1832) 193 = *Sagina Spergella*.
segetalis, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 657 = *Spergularia segetalis*.

SPERGULA :—

- semidecandra*, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 339 = *Sagina Spergella*.
serrata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 271 = *Bergia capensis*.
stricta, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xx. (1799) 229 = *Arenaria stricta*.
subulata, Benth. Fl. Austral. i. 160, in syn., sphalm. = *Colobanthus subulatus*.
subulata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 93 = *Sagina decumbens*.
subulata, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1789) 45. t. 1. f. 3 = *Sagina subulata*.
succulenta, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Polycarpon succulentum*.
vernalis, Willd. Fl. Berol. Prod. 158.—Gallia.
villosa, Pers. Syn. i. 522 = *Spergularia villosa*.
viscosa, Lag. in Varied. Cienc. ii. iv. (1805) 213.—Hispan.
viscoso-pubescent, Loisel. ex D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1598 = *Spergularia viscoso-pubescent*.
vulgaris, Boenn. Prod. Fl. Monast. 135 = *arvensis*.

SPERGULARIA. J. & C. Presl, Fl. Čech. 94 (1819).

- CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 152.
ALSINELLA, Hornem. Nom. 33 (1827).
BALARIA, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 180. t. 111 (1829).
BUDA, Adans. Fam. ii. 507 (1763); Dum. Fl. Belg. 110 (1827).
CORION, Mitch. in Act. Nat. Cur. viii. (1748) App. 208, nomen prius.
DELIA, Dum. Fl. Belg. 110 (1827).
FASCICULUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 245 (1867).
HYMENOgonium, Rich. ex Lebel, in Mém. Soc. Sc. Cherb. xiv. (1868) 30.
LEPIONUM, Wahlb. Fl. Gothob. 45 (1820).
MELARGYRA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 81 (1836).
STIPULARIA, Haw. Syn. Pl. Succ. 103 (1812).
TISSA, Adans. Fam. ii. 507 (1763).
akkensis, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 55, nomen.—Maroc.
alpina, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 706 = *rubra*.
amurensis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 205 = *rubra*.
anceps, Walp. Ann. i. 83 = *rubra*.
andina, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 234.—Reg. Andin.
arvensis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 179 = *Spergularia arvensis*.
atheniensis, Heldr. & Sart. ex Nym. Consp. 123 = *diandra*.
azorica, Lebel, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xiv. (1869) 47; Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 166 = *media*.
Bourgaei, Lebel, l. c. 42.—Ins. Canar.
brevifolia, Walp. Ann. i. 83 = *rubra*.
brevinodis, Kunze, ex Kindb. Monog. Lepig. 34 = *grandiflora*.
campestris, Aschers. Fl. Prov. Brandenb. 94 = *rubra*.
campestris, Nym. Consp. 123 = *diandra*.
campestris, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 165.—Hispan.
canadensis, G. Don, Gen. Syst. i. 426 = *media*.
canariensis, Lebel, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xiv. (1869) 46.—Ins. Canar.
capensis, Heynh. Nom. ii. 689 = *media*.
capillacea, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 163.—Hispan.
Cerviana, G. Don, Gen. Syst. i. 426 = *Arenaria Cerviana*.
confertiflora, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 425.—Ins. J. Fernand.
depauperata, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 231.—Chili.
diandra, Boiss. Fl. Orient. i. 733.—Graecia.
diandra, Coss. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 164 = *rubra*.
diandra, Guir. ex Willk. l. c. 165 = *campestris*.
Dillenii, Lebel, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xiv. (1869) 43 = *salina*.
echinosperma, Čelak. in Arch. Naturw. Land. Boehm. iv. (1881) 867 = *rubra*.
exilis, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. ii. 166.—Sibir.
fallax, Lowe, in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 289.—Ins. Mader.
fascicularis, Nym. Consp. 122 = *media*.
fimbriata, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. i. 94.—Ins. Canar.
firma, Kunze, ex Kindb. Monog. Lepig. 34.—Chili.
floribunda, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 230.—Chili.

SPERGULARIA :—

- gamostyla*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 202.—Alger.
glandulosa, Heynh. Nom. ii. 689 = *Arenaria glandulosa*.
glutinosa, G. Don, Gen. Syst. i. 426 = *Holosteum limiflorum*.
grandiflora, Poepp. ex Kindb. Monog. Lepig. 34.—Chili.
grandis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 177.—Bras.
heterosperma, Heldr. ex Nym. Consp. 122 = *salina*.
heterosperma, Lebel, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xiv. (1869) 45.—Sicil.
laevis, Auct. = *levis*.
laxiflorum, Walp. Ann. i. 83 = *rubra*.
leiosperma, F. Schmidt, Reisen Amurl. 131 = *salina*.
leptophylla, G. Don, Gen. Syst. i. 425.—Mexic.
levis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 176.—Bras.
Liebmanniana, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 241.—Chili.
lignosa, Rohrb. l. c. 244 = *Arenaria lignosa*.
longicaulis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 203 = *media*.
longipes, Nym. Consp. 123 = *rubra*.
macrocarpa, Presl, Kel. Haenk. ii. 9 = *grandis*.
macrorrhiza, Heynh. Nom. ii. 689; Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 276.—Ins. Corsic.
macrotheca, Heynh. l. c.—Calif.; Chili.
marginata, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 106 = *media*.
marginata, Kitt. Taschenb. ed. II. 1003 = *præc.*?
marina, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 213; Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 165 = *media*.
maxima, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 69 = *Spergularia arvensis*.
media, Presl, Fl. Sic. p. xvii, nomen; et ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 213.—Europ.
mexicana, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 22.—Mexic.
miquelonensis, Lebel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 58.—Terra nova (Newfoundl.).
molluginea, G. Don, Gen. Syst. i. 425.—Mexic.
Munbyana, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 203.—Alger.
neglecta, Syme, Engl. Bot. ed. III. ii. 129. t. 255.—Europ.
nicaeensis, Sarato, ex Lebel, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xiv. (1868) 37 = *purpurea*.
pallida, G. Don, Gen. Syst. i. 425.—Afr. austr.
patens, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient. i. 733 = *diandra*.
pentandra, G. Don, Gen. Syst. i. 425.—Europ.
platensis, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. ii. (1839) 272, in obs.—Bras.
platycaulis, Bartl. ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 271 = *grandis*.
polyphylla, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 232 = *rubra*.
prostrata, G. Don, Gen. Syst. i. 425 = *Polycarpacea prostrata*.
purpurea, G. Don, l. c.—Hispan.
racemosa, G. Don, l. c. 426 = *media*.
radicans, Presl, Delic. Prag. 64 = *rubra*.
ramosa, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 178 = *media*.
remotiflora, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 424.—Chili.
rubra, J. & C. Presl, Fl. Čech. 94.—Europ.
rupestris, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 176 = *villosa*.
rupestris, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 9 = *rubra*.
rupestris, Lebel, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 166.—Europ.
rupestris, Lebel, Rech. Pl. Manche, 1848; et in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xiv. (1869) 39 = *rupicola*.
rupicola, Lebel, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. vii. (1860) 274.—Europ.
salina, J. & C. Presl, Fl. Čech. 95.—Europ.
salsuginea, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. ii. 166 = *diandra*.
segetalis, G. Don, Gen. Syst. i. 425; Link, Handb. ii. 259; Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. ii. 166.—Europ.
semidecandra, Kitt. Taschenb. ed. II. 1003 = *Cerastium semidecandrum*?
Spergula, G. Don, Gen. Syst. i. 426 = *media*.
sperguloides, Heynh. Nom. ii. 690 = *diandra*.
succulenta, G. Don, Gen. Syst. i. 425 = *Polycarpon succulentum*.
tenuifolia, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 205 = *diandra*.
uliginosa, Pomel, l. c. 204 = *media*.
villosa, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 178.—Bras.

SPERGULARIA:—

urbica, Nym. Consp. 122 = *salina*.
viscosa, G. Don, Gen. Syst. i. 425 = *Spergula viscosa*.
viscoso-pubescentis, Loisel. ex G. Don, l. c. 426 (sp. dub.).
 —Ins. Corsic.

SPERGULASTRUM, Michx. Fl. Bor. Am. i. 275 (1803)
 = *Stellaria*, Linn. (Caryoph.).
gramineum, Michx. l. c. 276 = *St. longifolia*.
lanceolatum, Michx. l. c. 275 = *St. borealis*.
lanuginosum, Vahl, l. c. = *Arenaria lanuginosa*.

SPERGULUS, Brot. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 618 (1841)
 = *Drosophyllum*, Link (Droser.).
droseroides, Brot. ex Steud. l. c. = *D. lusitanica*.

SPERLINGIA, Vahl, in Skrivt. Nat. Selsk. Kiøbenh. vi.
 (1810) 112 = *Hoya*, R. Br. (Asclep.).
opposita, Vahl, l. c. 114 = *H. Rumphii*.
verticillata, Vahl, l. c. 113 = *H. verticillata*.

SPERMABOLUS, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.
 178 (1866). *MAGNOLIACEAE*.
fruticosus, Teijsm. & Binn. l. c. —Ins. Molucc.

SPERMACHITON, Llanos, Fragm. 25 (1851) = *Sporo-*
bolus, R. Br. (Gramin.).
involutum, Llanos, l. c. = *Eriochloa punctata*.

SPERMACOCE, Dill. ex Linn. Syst. ed. I (1735).

RUBIACEAE, Benth & Hook. f. ii. 145.
BIGELOVIA, Spreng. Syst. i. 366 (1825).
BORRERIA, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 79. t. 1
 (1818).
CHENOCARPUS, Neck. Elem. i. 202 (1790).
CHLOROPHYTUM, Pohl, ex DC. Prod. iv. 540 (1830).
COVOLIA, Neck. Elem. i. 201 (1790).
DIPHHRAGMUS, Presl, Bot. Bemerck. 80 (1844).
GALIANTHA, Griseb. ex Lorentz, Veget. Nord. Entre
 Rios, 72 (1828), nomen; et in Goett. Abh. xxiv.
 (1879) 156.
GRUHLMANIA, Neck. Elem. i. 202 (1790).
HYPODEMATICUM, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 348
 (1847).
JURGENSIA, Rafin. Sylva Tellur. 146 (1838).
TARDAVEL, Adans. Fam. ii. 145 (1763).
TESSIERA, DC. Prod. iv. 574 (1830).
aculeata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 531 =
tenella.
adscendens, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 132
 = *Mitracarpum Fischeri*.
adscendens, Pav. ex DC. Prod. iv. 569 = *Richardsonia*
adscendens.
adscendens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 532. —
Madag.
affinis, Pohl, ex DC. Prod. iv. 546 = *diffusa*.
alata, Aubl. Pl. Gui. i. 60. —Guian.
ampliata, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873)
 88. —Afr. trop.
angustifolia, Wall. Cat. n. 835 = *stricta*.
apiculata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 531 =
tenella.
aquatica, Vell. Fl. Flum. 50; i. t. 128. —Bras.
arenosa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 564 = *Diodia arenosa*.
articularis, Linn. f. Suppl. 119 = *hispida*.
articularis, Pohl, ex DC. Prod. iv. 564 = *Diodia*
hyssopifolia.
aspera, Aubl. Pl. Gui. i. 59 = *latifolia*.
aspera, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 58. —Mexic.
aspera, Vahl, Eclog. Am. i. 10 = *ocymoides*.
asperifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i.
 (1844) 132. —Mexic.
assurgens, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 60. t. 92 = *laevis*.
assurgens, Spreng. Syst. i. 402 = *tenuior*.
aturensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 345. —
Venezuela.
auriculata, F. Muell. Fragm. iv. 42. —Austral.
avana, Wall. Cat. n. 828 = *hispida*.
barbata, Lam. Illustr. i. 274 = *Diodia rigida*.
Bartlingiana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 58 =
latifolia.
bogotensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 347 =
Diodia bogotensis.
brachystema, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. iii. 439. —
Austral.
brasiliensis, Spreng. Syst. i. 402 = *tenella*?
breviflora, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 442. —
Austral.

SPERMACOCE:—

Brunonis, Wall. Cat. n. 822 = *Knoxia brachycarpa*.
Burmanni, DC. Prod. iv. 555 (Quid ?). —Ind. or.
buruensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 261. —
Ins. Sunda.
caerulea, Pohl, ex DC. Prod. iv. 552. —Bras.
calyptera, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834)
 267 = *Gaillonia calycoptera*.
capitata, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. iv. 567 =
Crusea calocephala.
capitata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 61. —Peruv.
capitata, Willd. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii.
 346 = *tenella*.
capitellata, Spreng. Neue Entdeck. iii. 46 = *obscura*.
capitellata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 530 =
laevis.
Cephalotes, Willd. l. c. 531 = *Mitracarpum villosum*.
chaetocephala, DC. Prod. iv. 554. —Afr. trop.
Chapmanii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 27 =
tenuior.
ciliaris, Pav. ex DC. Prod. iv. 564 = *Diodia arenosa*.
coccinea, Pav. ex DC. l. c. 567 = *Crusea coccinea*.
coerulea, Auct. = *caerulea*.
coerulescens, Aubl. Pl. Gui. i. 57. t. 19. f. 2. —Guian.
commutata, Schult. Mant. iii. 208 = *Diodia maritima*.
compacta, Hochst. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 134,
 nomen; et ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii.
 239. —Afr. trop.
compressa, Afzel. ex Hiern, l. c. 235. —Afr. trop.
compressa, Wall. Cat. n. 6187 = *Anotis Wightiana*.
conferta, Schott, ex DC. Prod. iv. 563 = *Diodia*
conferta.
cornifolia, Fisch. ex Nees, Hor. Phys. Berol. 50 =
capitata.
corymbosa, Burm. f. Fl. Ind. 33 = *Burmanni*.
corymbosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 149 = *procumbens*.
corymbosa, Roth, Nov. Pl. Sp. 98 = *Knoxia Heyneana*.
corymbosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 60. —Peruv.;
 Bras.; Boliv.
costata, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 370 =
Hedyotis vestita.
crassifolia, Hort. ex DC. Prod. iv. 573 = *Mitrocarpum*
stylosum.
cristata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 530 =
Hedyotis vestita.
cymosa, Spreng. Syst. i. 403. —Bras.
debilis, Benth. Fl. Austral. iii. 441. —Austral.
decidua, Bosc, ex DC. Prod. iv. 556 = *Diodia rigida*?
declinata, Pav. ex DC. l. c. 562 = *Diodia villosa*.
decurrens, Vell. Fl. Flum. 50; i. t. 130. —Bras.
denticulata, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.
 i. (1843) 353. —Ins. Philipp.
dibrachiata, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873)
 87. —Afr. trop.
dichotoma, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 348 =
Diodia glabra.
dichotoma, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 618 =
tenuior.
diffusa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 343 = *Mitracarpum*
villosum.
diffusa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 544. —Bras.
diodina, Michx. Fl. Bor. Am. i. 82 = *Diodia teres*.
discolor, E. Mey. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. II. (1825)
 786 = *Mitracarpum Humboldtianum*.
distans, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 344. —
Mexic.
divergens, Pohl, ex DC. Prod. iv. 568 = *Richardsonia*
grandiflora.
diversifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 341. —
Mexic.
domingensis, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 72 = *ocymoides*.
echioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 344 =
laevis.
elliptica, Thunb. Pl. Bras. Dec. iii. 28. —Bras.
elongata, Pohl, ex DC. Prod. iv. 547 = *capitata*.
ericacifolia, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 281
 = *Anthospermum Lichtensteinii*.
erioclada, DC. Prod. iv. 557. —Peruv.
exserta, Benth. Fl. Austral. iii. 441. —Austral.
exserta, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 368 =
Knoxia corymbosa.
fasciculata, Pohl, ex DC. Prod. iv. 547 = *tenella*.
ferruginea, A. St. Hil. Pl. Us. Bras. t. 13 = *capitata*.
filifolia, Perr. & Lepr. ex DC. Prod. iv. 540 = *Octodon*
filifolium.
filiformis, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 234. —
 Afr. trop.
filina, Wall. Cat. n. 830 = *stricta*.

SPERMACOCE:—

Fischeri, Link, Enum. Hort. Berol. i. 132 = *Mitro-*
carpum Fischeri.
flagellaris, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 532 =
stricta.
flagelliformis, Poir. Encyc. vii. 314 = *stricta*.
flavescens, Pohl, ex DC. Prod. iv. 548 = *S. Poaya*.
flexuosa, Lour. Fl. Cochinch. 79. —China.
frigida, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 531 =
Mitrocarpum Humboldtianum.
fruticosa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 541 = *verticillata*.
Galeopsidis, DC. l. c. 554. —Afr. trop.
galioides, Pohl, ex DC. l. c. 573 = *Staelia galioides*.
Gardneri, Wall. Cat. n. 834 = *stricta*.
gentianoides, A. St. Hil. Pl. Us. Bras. sub t. 12. p. 3 =
S. Poaya.
glabra, Michx. Fl. Bor. Am. i. 82. —Am. bor. et austr.
glabra, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 368 =
Hedyotis glabra.
globosa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 547 = *capitata*.
globosa, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 73 = *verti-*
cillata.
gracilis, Pohl, ex DC. Prod. iv. 545 = *Mitracarpum*
villosum.
gracilis, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 61. t. 92 = *ocymoides*.
gracillima, Pohl, ex DC. Prod. iv. 559. —Bras.
graminifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 58 =
verticillata.
grandiflora, Spreng. Neue Entdeck. iii. 45 = *Diodia*
rigida.
Haenkeana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 59 =
verticillata.
havanensis, Jacq. Stirp. Am. ed. II; ex J. F. Gmel.
 Syst. 234 = *Machaonia microphylla*?
hebecarpa, DC. Prod. iv. 553. —Am. trop.
hebecarpa, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873)
 89 = *Ruelliae*.
hedyotide, DC. Prod. iv. 555 = *Hedyotis fruticosa*.
hexagona, Willd. Sp. Pl. i. 569 = *sexangularis*.
hexandra, Rich. Hist. Nat. Ipec. 13, 31 = *Richardsonia*
pilosa.
hexangularis, Aubl. Pl. Gui. i. 61 = *sexangularis*.
hirsuta, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 531 =
Richardsonia pilosa.
hirta, Linn. Sp. Pl. ed. II. 148 = *Mitracarpum*
villosum.
hirta, Pav. ex DC. Prod. iv. 567 = *Crusea calocephala*.
hirta, Rottl. in Ges. Naturf. Fl. Neue Schr. iv. (1803)
 95 = *hispida*.
hirta, Sw. Obs. Bot. 45 = *ocymoides*.
hirta, Willd. Sp. Pl. i. 571 = *laevis*.
hispida, Linn. Sp. Pl. 102. —Geront. trop.
hispida, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 59 =
Hedyotis Auricularia.
Holmiana, Schult. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 618 =
strigosa.
humifusa, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 530. —
N. Granat.
hyssopifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 342 =
Diodia hyssopifolia.
hyssopifolia, Pers. Syn. i. 123 = *verticillata*.
hyssopifolia, Sm. in Abbot, Insects Georgia, i. 75.
 t. 38; et in Rees, Cyclop. xxxiii. [n. 7]. —Guian.;
 Georgia.
inaperta, F. Muell. Fragm. iv. 43. —Austral.
inconspicua, Bartl. ex DC. Prod. iv. 557. —Peruv.
insularis, Spreng. Syst. i. 104 = *Hedyotis glabra*.
involuta, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 105 = *Crusea*
rubra.
Kleinii, Steud. Nom. ed. II. ii. 618 = *stricta*.
Kotschyana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873)
 88. —Afr. trop.
laeta, Salisb. Prod. 60 = *verticillata*.
laevicaulis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 260. —
Java.
laevigata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 59. —
Mexic.
laevigata, F. Muell. Fragm. iv. 41. —Austral.
laevis, Lam. Illustr. i. 273. t. 94. f. 2. —Am. trop.
laevis, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 368 =
Knoxia brachycarpa.
laevis, Spreng. Syst. i. 401 = *ocymoides*.
lanceolata, Frank, ex Presl, Bot. Bemerck. 86 =
Hedyotis Frankii.
lanceolata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 132 = *tenuior*.
lanigera, Pohl, ex DC. Prod. iv. 574. —Bras.
lasiantha, Rafin. Fl. Ludov. 76. —Am. bor.
lasiocarpa, R. Br. in Wall. Cat. n. 832 = *stricta*.

SPERMACOCE:—

- lateralis*, Pohl, ex DC. Prod. iv. 568 = *Richardsonia grandiflora*.
latifolia, Aubl. Pl. Gui. i. 55. t. 19.—Guian.
latifolia, Pohl, ex DC. Prod. iv. 549 = *S. Poaya*.
lavandulaefolia, Pohl, l. c. 548 = *tenella*.
leptoloba, Benth. Fl. Austral. iii. 440.—Austral.
leucadea, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 237, sphalm. = seq.
leucodea, Hochst. in Flora, xxv. (1842) l. Beibl. 134, nomen.—Afr. trop.
linearis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 343 = *Diodia hyssopifolia*.
lineata, Blume, Bijdr. 947 = *Knoxia lineata*.
lineata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 134 = *Hedyotis lineata*.
lineata, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 369 = *Hedyotis Auricularia*.
linifolia, Nees, Hor. Phys. Berol. 49 = *Neesiana*.
linifolia, Vahl, Eclog. Am. i. 8 = *laevis*.
linoides, Pohl, ex DC. Prod. iv. 548 = *tenella*.
lithospermoides, Bartl. ex DC. l. c. 574.—Mexic.
longicaulis, R. Br. in Wall. Cat. n. 826 = *hispida*.
longiflora, D. Dietr. Syn. Pl. i. 475 = *longifolia*, Aubl.
longiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 346.—Mexic.
longifolia, Aubl. Pl. Gui. i. 58. t. 21.—Guian.
longifolia, Bartl. ex DC. Prod. iv. 552 = *tenuior*.
longifolia, L'Hérit. ex DC. l. c. 542.—Jamaic.
longiseta, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 59.—Mexic.
longiseta, Pohl, ex DC. Prod. iv. 546 = *tenella*.
lutescens, Pohl, ex DC. l. c. 547 = *tenella*.
macrantha, Reinw. ex Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 269.—Ins. Molucc.
macrophylla, Hassk. Cat. Hor. Bog. Alt. 107 = *stricta*.
marginata, Benth. Fl. Austral. iii. 440.—Austral.
megapotaamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 40 = *Mitracarpum Sellowianum*.
membranacea, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. iii. 441.—Austral.
Meyeniana, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 353.—Ins. Philipp.
microcephala, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 29.—Cuba.
microphylla, Pohl, ex DC. Prod. iv. 546 = *ocymoides*.
minima, Pohl, ex DC. l. c. 560 = *verticillata*.
mitracarpoides, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 261.—Java.
mucronata, Nees, Hor. Phys. Berol. 49 = *verticillata*.
multicaulis, Benth. Fl. Austral. iii. 440.—Austral.
muriculata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 44 = *scaberrima*.
muriculata, DC. Prod. iv. 554 = *stricta*.
mutilata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 43 = *hispida*.
nana, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 369.—Ins. 'Honimoo'.
natalensis, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 555.—Afr. austr.
Neesiana, Schult. Mant. iii. 209.—Bras.
neglecta, Schott, ex DC. Prod. iv. 573 = *Mitracarpum Sellowianum*.
oaxacana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 59 = *verticillata*.
obscura, DC. Prod. iv. 556.—Ind. occ.
ocymifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 530 = *Diodia rigida*?
ocymoides, Burm. f. Fl. Ind. 34.—Cosmop. trop.
ocymoides, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6185 = *stricta*.
Oldenlandiae, DC. Prod. iv. 557.—Chili.
oronocensis, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 531 = *tenella*.
ovalifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 59 = *ocymoides*.
palmetorum, DC. Prod. iv. 553.—Afr. trop.
papuana, F. Muell. Papuan Pl. i. 27.—N. Guin.
parviflora, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 59; A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. 11. 34 = *ocymoides*.
parviflora, Salisb. Prod. 60 = *tenuior*.
patula, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 59 = *ocymoides*.
pauciflora, Vell. Fl. Flum. 50; i. t. 131.—Bras.
peruviana, Pers. Syn. i. 124 = *corymbosa*.
philippensis, Spreng. Syst. i. 401.—Ins. Philipp.
phylocephala, DC. Prod. iv. 553.—Afr. trop.
Phytuma, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 235.—Afr. trop.
pilosa, DC. Prod. iv. 553.—Afr. trop.
Poaya, A. St. Hil. Pl. Us. Bras. t. 12.—Bras.

SPERMACOCE:—

- podocephala*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 73; Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 60; A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. 11. 34 = *verticillata*.
pogostoma, Benth. Fl. Austral. iii. 440.—Austral.
polycephala, Bartl. ex DC. Prod. iv. 558.—Mexic.
polygonifolia, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 381.—Bras.
polyphylla, Vell. Fl. Flum. 50; i. t. 129.—Bras.
portoricensis, Balb. ex DC. Prod. iv. 552.—Ind. occ.
procera, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 60 = *tenella*.
procumbens, Linn. Syst. ed. XII. 115 (*Hedyotis* sp.?).
 —Ind. or.
prostrata, Aubl. Pl. Gui. i. 58. t. 22 = *ocymoides*.
psyllioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 346 = *tenella*.
pumila, Pohl, ex DC. Prod. iv. 543.—Bras.
purpureo-caerulea, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. iii. 442 = *laevigata*.
pusilla, Pohl, ex DC. Prod. iv. 544, in syn.—Bras.
pusilla, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 379 = *stricta*.
pygmaea, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 72 = *verticillata*.
radiata, Sieber, ex DC. Prod. iv. 543, in syn.—Afr. trop.
radicans, Aubl. Pl. Gui. i. 58. t. 20. f. 4.—Guian.
radicans, Willd. ex Spreng. Syst. i. 405 = *Diodia maritima*.
Radula, Spreng. Neue Entdeck. ii. 144 = *Diodia sarmentosa*.
Radula, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 531 = *Diodia Radula*.
ramisparsa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 544, in syn. = *ocymoides*.
ramosa, Wall. Cat. n. 831 = *ocymoides*.
ramosissima, R. Br. in Wall. Cat. n. 829 = *hispida*.
reclinata, Nees, Hor. Phys. Berol. 50 = *verticillata*.
reflexa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 573 = *Staelia reflexa*.
remota, Lam. Illustr. i. 273 = *tenuior*.
richardsonioides, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 73.—Cuba.
rigida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 342 = *Diodia rigida*.
rigida, Salisb. Prod. 60 = *hispida*.
riparia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 355 = *glabra*.
rotata, Poit. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 275 = *ocymoides*.
Roxburghiana, Schult. Mant. iii. 199 = *Knoxia brachycarpa*.
Roxburghiana, Wall. Cat. n. 6186 = *ocymoides*.
Roxburghii, Spreng. Syst. i. 404 = *Knoxia brachycarpa*.
rubra, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 3 = *Crusea rubra*.
rubra, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) ii. 199.—Hab.?
rubricaulis, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 71.—Cuba.
rubrostipulata, Pohl, ex DC. Prod. iv. 547 = *tenella*.
Ruelliae, DC. l. c. 554.—Afr. trop.
Ruelliae, T. Thoms. in Speke, Journ. App. 636 = *ampliata*.
scaberrima, Bartl. ex DC. Prod. iv. 557 = *eriodclada*.
scaberrima, Blume, Bijdr. 946.—Malaya.
scabra, Willd. Sp. Pl. i. 572 = *hispida*.
scabrada, Pohl, ex DC. Prod. iv. 548 = *latifolia*.
scandens, Aubl. Pl. Gui. i. 61.—Guian.
semierecta, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 371.—Sumatra.
senensis, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 236.—Afr. trop.
serpyllifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 532.—Madag.
serrulata, Beauv. Fl. Owar. i. 39. t. 23 = *Diodia sarmentosa*.
setosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 60.—Mexic.
setosa, Willd. ex DC. Prod. iv. 564 = *Diodia rigida*.
sexangularis, Aubl. Pl. Gui. i. 61. t. 22. f. 8.—Guian.
sexangularis, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 619 = *laevis*.
simplex, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 73.—Jamaic.
sparsa, Pohl, ex DC. Prod. iv. 568 = *Richardsonia grandiflora*.
sphaerostigma, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873) 88, in nota = *ampliata*.
spinosa, Jacq. Enum. Pl. Carib. 12; Select. Am. 21.—Am. bor.
spinosa, Loefl. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 349 = *Diodia sarmentosa*.
spinulosa, Lam. Illustr. i. 275 = *spinosa*.

SPERMACOCE:—

- squarrosa*, Poepp. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 363 = *Mitracarpum squarrosum*.
stachydea, DC. Prod. iv. 554.—Afr. trop.
stellata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 530 = *verticillata*.
stenophylla, F. Muell. Fragm. iv. 43.—Austral.
stricta, Linn. f. Suppl. 120; Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 370.—Geront. trop.
stricta, F. Muell. Fragm. iv. 41 = *brachystema*.
stricta, Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 200 = *ocymoides*.
strictissima, Pohl, ex DC. Prod. iv. 547 = *tenella*.
strigosa, Hiill, Veg. Syst. vii. 35 (Quid?).—Ital.; Hispan.
strigosa, Linn. Syst. ed. X. 890 = *Diodia prostrata*.
strigosa, Sims, Bot. Mag. t. 1558 = *Crusea rubra*.
strigosa, Thunb. Pl. Bras. Dec. iii. 29.—Bras.
strumphioides, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 73.—Cuba.
stylosa, Link, Enum. Hort. Berol. i. 132 = *Mitracarpum stylosum*.
subulata, Pav. ex DC. Prod. iv. 543 = *Crusea subulata*.
suffrutescens, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 40. t. 322 = *laevis*.
suffruticosa, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. iii. 443.—Austral.
suffruticosa, Hill, Veg. Syst. vii. 35 (Quid?).—Europ. austr.
suffruticosa, Loefl. It. Hisp. 201.—Am. trop.
suffruticosa, Spreng. Syst. i. 400 = *laevis*.
sumatrensis, Retz. Obs. iv. 23 = *Knoxia corymbosa*.
sumatrensis, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 366 = *Knoxia sumatrensis*.
tenella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 345.—Bras.
tenera, R. Br. in Wall. Cat. n. 833 = *ocymoides*.
tenera, Pohl, ex DC. Prod. iv. 543, in syn.—Bras.
tenuior, Linn. Sp. Pl. 102 (excl. syn. Dill.).—Am. trop.
tenuior, Linn. l. c., partim = *glabra*.
tenuior, Pav. ex DC. Prod. iv. 547 = *tenella*.
tenuis, Pohl, ex DC. Prod. iv. 543, in syn.—Bras.
tenuissima, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 234.—Afr. trop.
teres, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 367 = *Knoxia corymbosa*.
terminalis, Vell. Fl. Flum. 51; i. t. 132 = *tenella*.
tetracocca, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 132 = *Crusea allococca*.
tetragona, Hort. Berol. ex DC. Prod. iv. 553 = *laevis*.
tetraquetra, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 29.—Cuba.
thymocephala, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 72 = *verticillata*.
tomentosa, Vell. Fl. Flum. 51; i. t. 133 = *tenella*.
triandra, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 134 = *stricta*.
tubularis, R. Br. in Wall. Cat. n. 836 = *hispida*.
vaginata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 531 = *laevis*.
verticillata, Linn. Sp. Pl. 102.—Afr. et Am. trop.
verticillata, Vell. Fl. Flum. i. t. 127 = *tenella*.
villosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 29 = *Mitracarpum villosum*.
virgata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 61.—Mexic.
virgata, Link, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 281, 531 = *Mitracarpum villosum*.
virginiana, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) t. 14. f. 3 = *Diodia virginiana*.
- SPERMADICTYON, Roxb. Pl. Corom. iii. 32. t. 236 (1819) = *Hamiltonia*, Roxb. (Rubiace.).
azureum, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 225 = *H. suaveolens*.
mysorensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 619 = *H. suaveolens*.
pilosum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 73 = *H. pilosa*.
scabrum, Spreng. l. c. = *H. suaveolens*.
suaveolens, Roxb. Pl. Corom. iii. 32. t. 236 = *H. suaveolens*.
- SPERMATURA, Reichb. Consp. 141 (1828) = *Osmorhiza*, Rafin. (Umbell.).
- SPERMAULAXEN, Rafin. Fl. Tellur. iii. 13 (1836); New Fl. Am. iii. 41 (1836) = *Polygonum*, Tourn.
dichotomus, Rafin. ll. cc. 14; 42 (= *P. dichotomus*).—Am. bor.
- SPERMAXYRON, Steud. Nom. ed. II. ii. 619 (1841) = seq.

SPERMXYRUM, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 84. t. 233 (1806) = *Olaex*, Linn.
aphyllum, DC. Prod. i. 532 = *O. aphylla*.
Phyllanthi, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 84. t. 233 = *O. Phyllanthi*.
strictum, DC. Prod. i. 532 = *O. stricta*.

SPERMODON, Beauv. ex Lestib. Essai Fam. Cyp. 27 (1819) = *Rynchospora*, Vahl (Cyperac.).
confinis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 119. — Bras.
curvulus, Nees, l. c. = *R. tenuis*.
edentulatus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = *R. jun-ciformis*.
eximius, Nees, in Seem. Bot. Voy. Herald, 222 = *R. eximia*.
filiformis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 118 = *R. longispicata*.
setaceus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = *R. tenerima*.

SPERMOLEPIS, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 577; et in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ii. (1864) 136. MYRTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 710.
gummifera, Brongn. & Gris, ll. cc. 578; 137. — N. Caled.
rubiginosa, Brongn. & Gris, ll. cc. — N. Caled.

SPERMOLEPIS, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) = *Apium*, Tourn. (Umbell.).
divaricata, Rafin. l. c. = *A. divaricatum*.

SPERMOPHYLLA, Neck. Elem. i. 24 (1790) = *Ursinia*, Gaertn. (Compos.).

SPHACELE, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289 (1829). LABIATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1193.
 PHYTOXIS, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 145, 290 (1810).
acuminatum, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 238. — Reg. Argent.
alpina, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 36. — Costa Rica.
bullata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 568. — N. Granat.
calycina, Benth. l. c. 568. — Calif.
campanulata, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289. — Chili.
clinopodioides, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 273. — Reg. Argent.
coerulea, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1865) 934 (Quid?). — Am. trop.
conferta, Benth. Pl. Hartw. 244. — N. Granat.
cordifolia, Benth. in DC. Prod. xii. 257. — Peruv.
floribunda, Benth. l. c. 254. — Hab. ?
hastata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 341. — Ins. Sandvic.
hastata, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 238. — Reg. Argent.
lamiifolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 570. — Peruv.
Lindleyi, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289 (Lindley). — Chili.
mexicana, S. Schau. in Linnaea, xx. (1847) 707. — Mexic.
mutica, Benth. Pl. Hartw. 145. — Peruv.
paniculata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 568. — Ecuador.
parviflora, Benth. in DC. Prod. xii. 256. — N. Granat.
Radula, Benth. l. c. 257. — Peruv.
salviaefolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 567. — N. Granat.
speciosa, A. St. Hil. ex Benth. l. c. 570. — Bras.
subhastata, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289. — Chili.
tenuiflora, Benth. in DC. Prod. xii. 257. — N. Granat.
tomentosa, Benth. Lab. Gen. et Sp. 569. — Peruv.

SPHACOPHYLLUM, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1135 (1873). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 339.
Bojeri, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1135. — Madag.
Kirkii, Oliver, l. c. t. 1451. — Afr. trop.

SPHAENODESMA, Schau. in DC. Prod. xi. 622 (1847), sphalm. = *Sphenodesme*, Jack (Verben.).

SPHAERALCEA, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 209 (1825). MALVACEAE, Benth. & Hook. f. i. 204.
 ANISODONTEA, Presl, Bot. Bemerk. 18 (1844).
 MALOCOPSIS, Walp. Ann. i. 104 (1848).
 MALVEOPSIS, Presl, Bot. Bemerk. 19 (1844).
 MELIPHEA, Zucc. in Abh. Akad. Muench. ii. (1847) 359.

SPHAERALCEA:—

PHYMOSIA, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 49 (1825).
 SPHAEROMA, Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 352.
abutiloides, G. Don, Gen. Syst. i. 465. — Ins. Baham.; Carolina.
acerifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 228. — Am. bor.
argustifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 465. — Mexic.
Berteroana, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 23 = obtusiloba.
bonariensis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 92. — Reg. Argent.
chilensis, C. Gay, Fl. Chil. i. 293. — Chili.
choapina, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 26 = velutina.
cisplatina, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 210. — Am. trop.
collina, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 24 = obtusiloba.
coquimbana, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 680 = obtusiloba.
Dregeana, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 165. — Afr. austr.
elegans, G. Don, Gen. Syst. i. 465. — Afr. austr.
Emoryi, Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 23. — Am. bor. occ.
Fendleri, A. Gray, Pl. Wright. i. 21. — Am. bor. occ.
flicaulis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 113 = *Sida diffusa*.
floribunda, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 25 = obtusiloba.
floribunda, Walp. Rep. ii. 789. — Mexic.
Galeottii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 186 = umbellata.
Gayana, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 23 = obtusiloba.
glabrata, Phil. l. c. 22 = chilensis.
hastulata, A. Gray, Pl. Wright. i. 17. — N. Mexic.
incana, Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 23. — Am. bor. occ.
lactea, Spach, Hist. Vég. Phan. iii. 354 = *Malvastrum vitifolium*.
Lindheimeri, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 162. — Texas; Mexic.
longispala, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 255. — Am. bor. occ.
mendocina, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1862) ii. 392; et in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 24. — Chili.
miniata, A. Gray, Gen. Illustr. ii. 70. t. 127 = *Fendleri*.
miniata, Spach, Hist. Vég. Phan. iii. 352 = *cisplatina*.
Munroana, Spach, l. c. 353. — Am. bor. occ.
nutans, Scheidw. ex Planch. in Fl. des Serres, vii. (1851–52) 221. — Guatemala?
obtusiloba, G. Don, Gen. Syst. i. 465. — Chili.
pedata, Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 23. — Am. bor. occ.
rhombifolia, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 92 = *cisplatina*.
rivularis, Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 23 = *acerifolia*.
rosea, G. Don, Gen. Syst. i. 465 = umbellata.
rupestris, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 26 = obtusiloba.
sessiliflora, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 679. — Chili.
stellata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 228 = *angustifolia*.
sulphurea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 113. 125. — Calif.
triflora, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 135. — Java.
umbellata, G. Don, Gen. Syst. i. 465. — Mexic.
valparidisea, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 23, in syn. = obtusiloba.
velutina, Presl, Rel. Haenk. ii. 124. — Chili.
vitifolia, Benth. & Hook. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 114 = umbellata.
Wrightii, A. Gray, Pl. Wright. ii. 21. — Mexic.

SPHAERANTHOIDES, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 456 (1836) = *Pterocaulon*, Eil. (Compos.).

SPHAERANTHUS, Vaill. ex Linn. Coroll. Gen. 18 (1737). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 294.
 OLIGOLEPIS, Cass. ex DC. Prod. v. 370, in syn. (1836).
 POLYCEPHALOS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 154 (1775).
 SPRUNERA, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 134, 145.

SPHAERANTHUS:—

abyssinicus, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 411 = *suaveolens*.
africanus, Burm. f. Fl. Ind. 185. t. 60. f. 2 = *Dichrocephala latifolia*.
africanus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1314. — Geront. trop.
africanus, Wall. Cat. n. 3179, partim = *indicus*.
alatus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 635 = *indicus*.
amaranthoides, Burm. f. Fl. Ind. 186. — Ind. or.
angustifolius, DC. Prod. v. 370. — Afr. trop.
angustifolius, Sch. Bip. ex Oliver & Hiern, in Fl. Trop. Afr. iii. 333, 334 = *suaveolens*, Steetzii.
chinensis, Linn. Mant. i. 119 = *Athrosisma laciniatum*.
cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. 510 = *africanus*.
cotuloides, DC. Prod. v. 370. — Madag.
crispus, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 322, nomen. — Ins. Timor?
elongatus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 636 = *Pterocaulon cylindrostachyum*.
erectus, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie, ii. (1845) 233. — Java.
glaber, DC. Prod. v. 370 = *africanus*.
globosus, Wall. ex DC. l. c. 369 = *africanus*.
gracilis, Oliver, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 400. — Afr. trop.
hirtus, Willd. Sp. Pl. iii. 2395 = *indicus*.
indicus, Gaertn. Fruct. ii. 413. t. 164. f. 5 = *suaveolens*.
indicus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1877) ii. 183 = *africanus*.
indicus, Linn. Sp. Pl. 927. — Geront. trop.
integrifolius, Linn. f. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 30 = *Myriactis nepalensis*.
Kirkii, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 333. — Afr. trop.
Kotschyi, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 308 = *suaveolens*.
laciniatus, Wall. Cat. n. 3184 = *Athrosisma laciniatum*.
laevigatus, Wall. ex DC. Prod. v. 369 = *africanus*.
microcephalus, Vathek, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 326 = *sphenocleoides*.
microcephalus, Willd. Sp. Pl. iii. 2395 = *africanus*.
molliis, Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 446 = *indicus*.
mossambiquensis, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 421 = *indicus*.
nubicus, Sch. Bip. ex Schnizl. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 134, 145. — Afr. trop.
ovalis, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 413. — Ind. or.
paniculatus, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 211 = *africanus*.
peduncularis, DC. Prod. v. 370. — Afr. austr.
peguensis, Kurz, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 97. — Burma.
polycephalus, Oliver & Hiern, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873) 95. t. 59. — Afr. trop.
senegalensis, DC. Prod. v. 370 = *africanus*.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 1280 = *chinensis*.
sphenocleoides, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 333. — Afr. trop.
Steetzii, Oliver & Hiern, l. c. 334. — Afr. trop.
strobiliferus, Boiss. & Noë, Diagn. Ser. II. iii. 6. — Mesopot.
suaveolens, DC. Prod. v. 370. — Afr. bor.
zeylanicus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3180 = *amaranthoides*, peguensis.

SPHAERIDIOPHORA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 494 (1865), sphalm. = seq.

SPHAERIDIOPHORUM, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 125. t. 6 = *Indigofera*, Linn. (Legumin.).
abyssinicum, Jaub. & Spach, Illustr. v. 102 = *I. linifolia*.
linifolium, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 125. t. 6 = *I. linifolia*.

SPHAERINE, Herb. Amaryll. 106. tt. 12, 13, 16, 18 (1837) = *Bomarea*, Mirb. (Amaryll.).
angustipetala, Benth. Pl. Hartw. 260 = *B. angustipetala*.
brevis, Herb. Amaryll. 108. t. 18. f. 1 = *B. brevis*.
coccinea, Herb. l. c. 106. t. 16. f. 1 = *B. coccinea*.
distichophylla, Herb. l. c. 107. t. 12. f. 3, 4 = *B. distichophylla*.
linifolia, Kunth, Enum. Pl. v. 786 = *B. linifolia*.
nervosa, Herb. Amaryll. 108. t. 13. f. 1 = *B. nervosa*.
secundifolia, Herb. l. c. 107. t. 12. f. 1, 2 = *B. secundifolia*.

SPHAERITIS, Eckl. & Zeyh. Enum. 299 (1837) = **Crassula**, Dill.
biconvexa, Eckl. & Zeyh. l. c. 300 = *C. biconvexa*.
incana, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. incana*.
margaritifera, Eckl. & Zeyh. l. c. 299 = *C. margaritifera*.
muricata, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. cymosa*.
paucifolia, Eckl. & Zeyh. l. c. 300 = *C. trachysantha*.
puberula, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. subaphylla*.
setigera, Eckl. & Zeyh. l. c. 301 = *C. tomentosa*.
stenophylla, Eckl. & Zeyh. l. c. 299 = *C. cymosa*.
subaphylla, Eckl. & Zeyh. l. c. 300 = *C. subaphylla*.
tomentosa, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. tomentosa*.
trachysantha, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. trachysantha*.
typica, Eckl. & Zeyh. l. c. 299 = *C. cymosa*.

SPHAERIUM, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Coix**, Linn. (Gramin.).

SPHAEROCARDAMUM, S. Schau. in Linnaea, xx. (1847) 720. **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 83.
nesliaeforme, S. Schau. l. c. —Mexic.

SPHAEROCARPOS, J. F. Gmel. Syst. 9 (1791) = **Globba**, Linn. (Scitum.).
Hura, J. F. Gmel. l. c. = *G. versicolor*.

SPHAEROCARPUS, Steud. Nom. ed. II. ii. 620 (1841), sphalm. = SPHENOCARPUS, Rich. = **Laguncularia**, Gaertn. (Combret.).

SPHAEROCARYA, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 371 (1824) = **Pyrularia**, Michx. (Santal.).
edulis, Wall. l. c. = *P. edulis*.
leprosa, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 34 = *Strombosia ceylanica*.
moschifera, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 245 = *P. moschifera*.
vestita, Wall. Cat. n. 7207 = *P. edulis*.
Wallichiana, Wight & Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xv. (1833) 180 = *Scelopryum Wallichianum*.

SPHAEROCARYUM, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 620 (1841) = **Isachne**, R. Br. (Gramin.).
elegans, Nees, ex Steud. l. c. = *I. pulchella*.

SPHAEROCEPHALA, Hill, Veg. Syst. iv. 48 (1762) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

SPHAEROCEPHALUS, Lag. ex DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 67 = **Nassauvia**, Juss. (Compos.).
Lagasciae, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 389 = *N. Lagasciae*.

SPHAEROCEPHALUS, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Echinops**, Linn. (Compos.).

SPHAEROCHLOA, Beauv. ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828) 47. t. 5 = **Eriocaulon**, Linn.
compressa, Beauv. ex Desv. l. c. = *E. compressum*.
quinqangularis, Beauv. ex Desv. l. c. = *E. quinqangularis*.

SPHAEROCLINIUM, Sch. Bip. Tanacet. 20 (1844) = **Matricaria**, Tourn. (Compos.).
nigellaefolium, Sch. Bip. l. c. = *M. nigellaefolia*.

SPHAEROCODON, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 772 (1876). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
natalense, Benth. in Hook. Ic. Pl. sub t. 1190. —Afr. austr.
obtusifolium, Benth. l. c. t. 1190. —Afr. austr.

SPHAEROCOMA, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 16. t. 15. **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 154.
Aucherii, Boiss. Fl. Orient. i. 739. —Persia.
Hookeri, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 16. —Arab.

SPHAERODENDRON, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 33. t. 26 = **Cussonia**, Thunb. (Araliac.).
angolense, Seem. l. c. 34. t. 26 = *C. angolensis*.

SPHAEROGYNE, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 331 = **Tococa**, Aubl. (Melastom.).
cinnamomea, Linden, in Belg. Hort. xv. (1865) 101 (Quid ?). —Costa Rica.
imperialis, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1869) 587; (1872) 7 = seq. ?
imperialis, Linden, in Illustr. Hort. xxiv. (1877) 109. t. 284 (Quid ?). —Peruv.
latifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 331 = *T. platyphylla*.

SPHAEROLOBIUM, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 509. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 469.
HUGELROEA, Steud. Nom. ed. II. i. 778 (1840).
ROEA, Hueg. Enum. Pl. Hueg. 34 (1837).

acuminatum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 32 = medium.
alatum, Benth. l. c. —Austral.
crassirameum, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 28 = macranthum.
daviesioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 266. —Austral.
Drummondii, Turcz. l. c. 267 = macranthum.
euchilus, Benth. Fl. Austral. ii. 67. —Austral.
foliosum, F. Muell. Fragm. i. 166 = nudiflorum.
fornicatum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 32. —Austral.
gracile, Benth. Fl. Austral. ii. 64. —Austral.
grandiflorum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 32. —Austral.
linophyllum, Benth. Fl. Austral. ii. 64. —Austral.
macranthum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 213. —Austral.
medium, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 14. —Austral.
medium, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 58 = fornicatum.
minus, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 108. t. 138 = vimincum.
nudiflorum, Benth. Fl. Austral. ii. 64. —Austral.
pulchellum, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 28 = macranthum.
racemosum, Benth. Fl. Austral. ii. 65. —Austral.
scabrusculum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 214. —Austral.
stenopterum, Meissn. l. c. i. 57 = alatum.
vimineum, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 509. —Austral.

SPHAEROMA, Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 352 = **Sphaeralcea**, A. St. Hil. (Malvac.).
angustifolium, Schlecht. l. c. 353 = *Sphaeralcea angustifolia*.
floribundum, Schlecht. l. c. = *Sphaeralcea floribunda*.
Julii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 166. —Afr. austr.
miniaturum, Garcke, in Bot. Zeit. xi. (1853) 847, in obs. = *Sphaeralcea cisplatina*.
prostrata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 166. —Afr. austr.
rosea, Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 352 = *Sphaeralcea umbellata*.
umbellatum, Schlecht. l. c. = *Sphaeralcea umbellata*.

SPHAEROMERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 401 = **Tanacetum**, Tourn. (Compos.).
argentea, Nutt. l. c. 402 = *T. Nuttallii*.
capitata, Nutt. l. c. = *T. capitatum*.

SPHAEROMORPHEA, DC. Prod. vi. 140 (1837). **COMPOSITAE**, [Benth. & Hook. f. ii. 430.]
Centipeda, DC. l. c. = *Centipeda orbicularis*.
petiolaris, DC. l. c. = *Epaltis australis*.
Russelliana, DC. l. c. —Ind. or.

SPHAEROPHORA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 179. f. 36 (1850) = **Morinda**, Linn. (Rubiace.).
gemella, Blume, l. c. = *M. gemella*.
glomerata, Blume, l. c. = *M. glomerata*.

SPHAEROPHORA, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 402 = **Eremanthus**, Less. (Compos.).
bicolor, Sch. Bip. l. c. 403 = *E. bicolor*.

SPHAEROPHYSA, DC. Mém. Lég. 288 (1825). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 504.
caspica, DC. Prod. ii. 271 = *salsula*.
Kotschyana, Boiss. Fl. Orient. ii. 197. —Cappadoc.

SPHAEROPHYSA :—
microphylla, Jaub. & Spach, Illustr. i. 126. t. 64 = *Colutea triphylla*.
pyncorrhiza, Benth. & Hook. f. Gen. i. 504 = *Astragalus pyncorrhizus*.
salsula, DC. Prod. ii. 271. —Reg. Casp.; As. bor.

SPHAEROPUS, Boeck. in Flora, lvi. (1873) 89 = **Seleria**, Berg. (Cyperac.).
pygmaeus, Boeck. l. c. 90 = *Sc. pygmaea*.

SPHAERORHIZON, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1856) 50. t. 10 = **Seybaliu**, Schott (Balanoph.).
curvatum, Hook. f. l. c. 50 = *Sc. depressum*.
depressum, Hook. f. l. c. t. 10 = *Sc. depressum*.

SPHAEROSACME, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 429 (1824) = **Amoora**, Roxb. (Meliac.).
decandra, Wall. Cat. n. 1276 = *A. decandra*.
fragrans, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 135 = *A. decandra*.
laxa, Wall. Cat. n. 4894 = *A. cucullata*.
nepalensis, M. Roem. Syn. Hesper. 98 = *A. decandra*.
paniculata, Wall. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 37 = *A. cucullata*.
polystachya, Wall. Cat. n. 1277 = *A. Rohituka*.
Rohituka, Wall. l. c. n. 1278 = *A. cucullata*.
spectabilis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 142 = *A. spectabilis*?
spicata, Wall. Cat. n. 4895 = *A. Rohituka*.

SPHAEROSCHOENUS, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. 97 (1843) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).
Wallichii, Nees, l. c. = *R. Wallichiana*.

SPHAEROSEPALUM, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 321. **GUTTIFERAE**.
alternifolium, Baker, l. c. —Madag.

SPHAEROSICYOS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 824 (1867). **CUCURBITACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
LAGENARIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 8, partim.
Meyeri, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 532 = *sphaericus*.
sphaericus, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 824; Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 466. —Afr. trop. et austr.

SPHAEROSPORA, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 725 = **Acidanthera**, Hochst. (Irid.).
exscapa, Klatt, l. c. = *A. tubulosa*.
flexuosa, Klatt, l. c. 726 = *A. flexuosa*.
gigantea, Klatt, l. c. xxxiv. (1865-66) 690 = *A. bicolor*.

SPHAEROSPORA, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 398 (1827) = **Gladiolus**, Tourn. (Irid.).
imbricata, Sweet, l. c. ed. II. 501 = *G. segetum*.
segetum, Sweet, l. c. ed. I. 398 = *G. segetum*.
triphylla, Sweet, l. c. ed. II. 501 = *G. triphyllus*.

SPHAEROSTACHYS, Miq. Syst. Pip. 375 (1843) = **Piper**, Linn.
Humboldtii, Miq. l. c. 376 = *P. piluliferum*.

SPHAEROSTEMA, Blume, Bijdr. 22 (1825) = **Schizandra**, Michx. (Magnol.).
axillare, Blume, l. c. 22 = *Schiz. axillaris*.
Blumiana, Griff. Notul. iv. 714. t. 651. f. 2; 654 = *Schiz. axillaris*?
elongatum, Blume, Bijdr. 23 = *Schiz. elongata*.
grandiflorum, Blume, Fl. Jav. Schiz. 17 = *Schiz. grandiflora*.
grandiflorum, Wall. Cat. n. 4985 = *Schiz. elongata*.
japonicum, A. Gray, in Mem. Acad. Am. N. S. vi. (1858) 380 = seq. ?
japonicum, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. 80 = *Schiz. chinensis*.
propinquum, Blume, Fl. Jav. Schiz. 16, in obs. = *Schiz. propinqua*.
pyrifolium, Blume, l. c. 16. t. 4. —Java.

SPHAEROSTEMMA, Reichb. Conspl. 86 (1828), sphalm. = *praec.*

SPHAEROSTIGMA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. (1835) 49 = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.). *alyssoides*, Walp. Rep. ii. 78 = *Oe. alyssoides*. *andinum*, Walp. l. c. 79 = *Oe. andina*. *bistorta*, Walp. l. c. 77 = *Oe. bistorta*. *Boothii*, Walp. l. c. = *Oe. Boothii*. *Chamissonis*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 49 = *Oe. dentata*. *cheiranthifolium*, Fisch. & Mey. l. c. 50 = *Oe. cheiranthifolia*. *contortum*, Walp. Rep. ii. 78 = *Oe. strigulosa*. *dentatum*, Walp. l. c. = *Oe. dentata*. *divaricatum*, C. Gay, Fl. Chil. ii. 328. —Chili. *epilobioides*, Walp. Rep. ii. 78 = *Oe. epilobioides*. *guaraeflorum*, Walp. l. c. = *Oe. guaraeflora*. *heterophyllum*, C. Gay, Fl. Chil. ii. 327 = *Oe. heterophylla*, Steud. *hirtum*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 50 = *Oe. hirta*. *micranthum*, Walp. Rep. ii. 77 = *Oe. micrantha*. *minimum*, Heynh. Nom. ii. 692 = *Oe. hirta*. *minutiflorum*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 50 = *Oe. minutiflora*. *paradoxum*, C. Gay, Fl. Chil. ii. 329 = *Oe. micrantha*. *parvulum*, Walp. Rep. ii. 78 = *Oe. strigulosa*. *ramosissimum*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 68. —Chili. *spirale*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 50 = *Oe. cheiranthifolia*. *strigulosum*, Fisch. & Mey. l. c. = *Oe. strigulosa*. *tenuifolium*, C. Gay, Fl. Chil. ii. 327 = *Oe. chilensis*. *viridescens*, Walp. Rep. ii. 77 = *Oe. cheiranthifolia*.

SPHAEROSTYLIS, Baill. Etud. Gén. Euph. 466. t. 21 (1858). **EUPHORBACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 327. *Tulasneana*, Baill. l. c. 467. —Madag.

SPHAEROTELE, Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Berol. 95. t. 38 (1841) = **Urceolina**, Reichb. (Amaryll.). *coccinea*, Link, Klotzsch & Otto, l. c. = *U. miniata*.

SPHAEROTELE, Presl, Rel. Haenk. i. 119. t. 16 (1827) = **Stenomesson**, Herb. (Amaryll.). *peruviana*, Presl, l. c. 120. t. 16. —Peruv.

SPHAEROTHALAMUS, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 156. **ANONACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 28. *insignis*, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 156. —Borneo.

SPHAEROTHECA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 605 = **Conobea**, Aubl. (Scrophul.). *scoparioides*, Cham. & Schlecht. l. c. 606 = *C. scoparioides*.

SPHAEROTHELE, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 733 (1883) = **SPHAEROTELE**, Presl = **Stenomesson**, Herb. (Amaryll.).

SPHAEROTHYLAX, Bisch. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 426. t. 1. **PODOSTEMACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 113. *ANASTROPHEA*, Wedd. in DC. Prod. xvii. 78 (1873). *algiformis*, Bisch. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 426. —Afr. austr.

SPHAERULA, W. Anders. ex Hook. f. Fl. Antarct. 268 (1847) = **Acaena**, Linn. (Rosac.).

SPHAERULARIA, Heist. Syst. 9 (1748) = **Rapistrum**, Tourn. (Crucif.).

SPHALANTHUS, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) vii. 55 = **Quisqualis**, Linn. (Combret.). *confertum*, Jack, l. c. = *Q. densiflora*. *ovatifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 621, sphalm. = praec.

SPHALLEROCARPUS, Bess. ex DC. Mém. Ombell. 60 (1829); Prod. iv. 230 (1830) = **Conopodium**, Koch (Umbell.). *Cyminum*, Bess. ex DC. l. cc. = *C. Cyminum*. *longilobus*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 432 = *Chaerophyllum Sphallerocarpus*.

SPHANELLOPSIS, Steud. ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 137 = **Adelobotrys**, DC. (Melastom.). *ciliata*, Steud. ex Naud. l. c. = *A. ciliata*.

VOL. II.

SPHEDAMNOCARPUS, Planch. ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 256 (1862). **MALPIGHIACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c. *angolensis*, Planch. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 279. —Afr. trop. *madagascariensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 110. —Madag.

SPHENANDRA, Benth. in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 445 (1836). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 945. *viscosa*, Benth. in Lindl. Introd. Nat. Syst. ii. 445. —Afr. austr.

SPHENANTHA, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 416 = **Cucurbita**, Tourn. *scabra*, Schrad. l. c. = *C. radicans*. *scandens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 621 = *C. radicans*.

SPHENANTHERA, Hassk. in Versl. Kon. Akad. Wetensch. iv. (1855) 139 = **Begonia**, Tourn. *erosa*, Hassk. ex Klotzsch, in Bot. Zeit. xv. (1857) 182 = *B. erosa*. *multangula*, Klotzsch, l. c. 181 = *B. multangula*. *robusta*, Hassk. in Versl. Kon. Akad. Wetensch. iv. (1855) 139 = *B. robusta*.

SPHENDAMNOCARPUS, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1813) 110, sphalm. = **Sphedamnocarpus**, Planch. (Malpig.).

SPHENISTA, Rafin. Sylva Tellur. 90 (1838) = **Hirtella**, Linn. (Rosac.). *peruviana*, Rafin. l. c. 91 = *H. Cosmibuena*.

SPHENOCARPUS, Rich. Anal. Fr. 92 (1808) = **Laguncularia**, Gaertn. (Combret.).

SPHENOCARPUS, Wall. Cat. p. 236, sub n. 975 (1832 ?) = **Magnolia**, Linn.

SPHENOCLEA, Gaertn. Fruct. i. 113. t. 24 (1788). **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 560. *GAERTNERA*, Retz. Obs. vi. 24 (1791). *PONGATIUM*, Juss. Gen. 423 (1789). *RAPINIA*, Lour. Fl. Cochinch. 127 (1790). *Pongatium*, DC. Prod. vii. 548 = *zeylanica*. *zeylanica*, Gaertn. Fruct. i. 113. t. 24. —Cosmop. trop.

SPHENODESMA, Griff. Notul. iv. 176 (1854) = seq.

SPHENODESME, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) i. 19. **VERBENACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1159. *BRACHYNEMA*, Griff. Notul. iv. 176 (1854). *DECADONTIA*, Griff. l. c. 175 (1854). *ROSCOEAE*, Roxb. Cat. Hort. Beng. 46 (1814), nomen. *SPHAENODESMA*, Schau. in DC. Prod. xi. 622 (1847). *VITICASTRUM*, Presl, Bot. Bemerk. 147 (1844). *acuminata*, Wight, Ic. t. 1476 = pentandra. *barbata*, Schau. in DC. Prod. xi. 623. —Malaya. *eryciboides*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) ii. 76. —Burma. *ferruginea*, Wight, Ic. t. 1474 = *barbata*. *Griffithiana*, Wight, l. c. iv. iii. 14. —Burma. *grossa*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 254 = *eryciboides*. *Jackiana*, Schau. in DC. Prod. xi. 622 = pentandra. *Jackiana*, Wight, Ic. t. 1477 = *Griffithiana*. *microstylis*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 600. —Burma. *paniculata*, C. B. Clarke, l. c. —Ind. or. *pentandra*, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) i. 19. —Ind. or.; Malaya. *triflora*, Wight, Ic. t. 1478. —Malaya. *unguiculata*, Schau. in DC. Prod. xi. 622. —Reg. Himal.; Burma. *Wallichiana*, Schau. l. c. = pentandra.

SPHENOGYNE, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 142 (1813) = **Ursinia**, Gaertn. (Compos.). *abrotanifolia*, R. Br. l. c. 143 = *U. abrotanifolia*. *adonitifolia*, DC. Prod. v. 682 = *U. anthemoides*. *anethifolia*, Less. Syn. Comp. 243. —Afr. austr. *anethoides*, DC. Prod. v. 685. —Afr. austr. *anthemoides*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 142 = *U. anthemoides*. *anthemoides*, E. Mey. ex DC. Prod. v. 689 = *U. paradoxa*.

SPHENOGYNE :—

brachyloba, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 21. —Afr. austr. *brachypoda*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 140. —Afr. austr. *brevifolia*, DC. Prod. v. 685 = *discolor*. *calendulaeflora*, DC. l. c. 682. —Afr. austr. *chamaemeloides*, DC. l. c. 685. —Afr. austr. *chamomillaefolia*, DC. l. c. 687. —Afr. austr. *chrysanthemoides*, Less. Syn. Comp. 242 = *Ursinia chrysanthemoides*. *ciliaris*, DC. Prod. v. 687. —Afr. austr. *concolor*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 142. —Afr. austr. *coronopifolia*, Less. Syn. Comp. 244. —Afr. austr. *crithmifolia*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 142 = *U. crithmifolia*. *crocea*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1090 = *U. speciosa*. *dentata*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 143 = *U. dentata*. *discolor*, Less. Syn. Comp. 243. —Afr. austr. *Dregeana*, DC. Prod. v. 683. —Afr. austr. *Eckloniana*, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 64. —Afr. austr. *elegans*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1090 = *U. speciosa*. *filipes*, E. Mey. ex DC. Prod. v. 687; et in Drège, Zwei Pfl. Docum. 223. —Afr. austr. *foeniculacea*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 238 = *U. foeniculacea*. *gracilis*, DC. Prod. v. 685 = *punctata*. *grandiflora*, DC. l. c. = *U. crithmifolia*. *heterodonta*, DC. l. c. 687. —Afr. austr. *hispida*, DC. l. c. 683. —Afr. austr. *incisa*, DC. l. c. 688. —Afr. austr. *Kraussii*, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 674 = *chamomillaefolia*. *leptoglossa*, DC. Prod. v. 687. —Afr. austr. *leucanthemoides*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 238 = *U. leucanthemifolia*. *macropoda*, DC. Prod. v. 683. —Afr. austr. *microcephala*, DC. l. c. 682 = *U. anthemoides*. *natalensis*, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 674 = *U. foeniculacea*. *nudicaulis*, Less. Syn. Comp. 243. —Afr. austr. *odorata*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 142 = *U. odorata*. *paleacea*, Less. Syn. Comp. 244 = *U. paleacea*. *pallida*, DC. Prod. v. 682 = *U. foeniculacea*. *pauciloba*, DC. l. c. 686. —Afr. austr. *peduncularis*, E. Mey. ex DC. l. c. 683 = *sericea*. *pilifera*, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 604; Less. Syn. Comp. 244 = *U. pilifera*. *pinnata*, Less. l. c. 243 = *U. filiformis*. *punctata*, Less. l. c. —Afr. austr. *pusilla*, DC. Prod. v. 682. —Afr. austr. *quinquepartita*, DC. l. c. 686. —Afr. austr. *rigidula*, DC. l. c. 685. —Afr. austr. *scapiformis*, DC. l. c. 684. —Afr. austr. *scariosa*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 142 = *U. scariosa*. *sericea*, Less. Syn. Comp. 243. —Afr. austr. *serrata*, DC. Prod. v. 688 = *U. serrata*. *setigera*, DC. l. c. 684 = *U. dentata*. *Sonneratii*, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 205 = *U. serrata*. *speciosa*, Hort. ex Knowles & Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 131 = *U. speciosa*. *subflosculosa*, E. Mey. ex DC. Prod. v. 686; et in Drège, Zwei Pfl. Docum. 223 = *U. paleacea*. *subhirsuta*, DC. Prod. v. 683. —Afr. austr. *tenuifolia*, DC. l. c. 687 = *U. tenuifolia*. *tridentata*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 149. —Afr. austr. *trifida*, Less. Syn. Comp. 244. —Afr. austr. *trifurca*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 147. —Afr. austr. *triloba*, DC. Prod. v. 687 = *trifida*. *tripartita*, DC. l. c. 686. —Afr. austr. *versicolor*, DC. l. c. 681. —Afr. austr. *versicolor*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1090 = *U. speciosa*.

SPHENOPUS, Trin. Fund. Agrost. 135 (1820). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1185. *divaricatus*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 45 = *Gouani*. *Gouani*, Trin. Fund. Agrost. 135. —Reg. Mediterr.

6 G

SPHENOSCIADIUM, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1835) 536 = *Selinum*, Linn. (Umbell.).
capitellatum, A. Gray, l. c. 537 = *Selinum* capitellatum.

SPHENOSTEMON, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1875) 53. *ILICINEAE*.
Balansae, Baill. l. c. 54; et *Adansonia*, xi. (1875) 307.—N. Caled.
pachycladum, Baill. ll. cc.—N. Caled.

SPHENOSTIGMA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 124. *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 694.
CARDIOSTIGMA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 129.
angustifolium, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 363.—Bras.
caeruleum, Klatt, l. c.—Bras.
geniculatum, Klatt, l. c.—Bras.
gracile, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 695.—Bras.
lineare, Benth. & Hook. f. l. c. (Cypellae sp.).—Venezuela.
longispathum, Benth. & Hook. f. l. c.—Mexic.
Sellowianum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 124.—Bras.
umbellatum, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 363.—Bras.

SPHENOSTYLIS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 148 (1835) = *Vigna*, Savi (Legumin.).
angustifolia, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 33 = *V. angustifolia*.
marginata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 148 = *V. marginata*.

PHENOTOMA, Sweet, Fl. Austral. t. 44 (1828) = *Dracophyllum*, Labill. (Epacrid.).
capitatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1515 = *D. capitatum*.
dracophylloides, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 335 = *D. phlogiflorum*.
Drummondii, F. Muell. Census, 109 = *D. Drummondii*.
gracile, Sweet, Fl. Austral. t. 44 = *D. gracile*.
parviflorum, F. Muell. Census, 109 = *D. parviflorum*.
squarrosa, G. Don, Gen. Syst. iii. 785 = *D. squarrosus*.

SPHERANTHUS, Hill, Veg. Syst. ii. 113 (1761), sphalm. = *Sphaeranthus*, Vaill. (Compos.).

SPHINCTANTHUS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1118 (1876). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.
Griffithii, Benth. l. c.; et in Hook. Ic. Pl. t. 1205.—Reg. Himal.

SPHINCTANTHUS, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 212. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 84.
CONOSIPHON, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 27. t. 23 [1842]; Endl. Gen. Suppl. ii. 54 (1842).
longiflorus, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 503.—Cuba.
rupestris, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 212.—Guian.

SPHINCTEROSTIGMA, Schott, Melet. 20 (1832) = *Philodendron*, Schott (Aroid.).
bipinnatifidum, Schott, l. c. = *P. bipinnatifidum*.

SPHINCTEROSTOMA, Stschégl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 22 = *Andersonia*, R. Br. (Epacrid.).
axilliflorum, Stschégl. l. c. = *A. colosseae*.
echinocephalum, Stschégl. l. c. 23 = *A. patricia*.

SPHINCTOLOBIUM, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 417 = *Lonchocarpus*, H. B. & K. (Legumin.).
floribundum, Vog. l. c. 419 = *L. subglaucens*.
glaucens, Miq. Stirp. Surin. Sel. 19 = *Muellera moniliformis*.
nitidum, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 419 = *L. nitidus*.
virgilioides, Vog. l. c. 418 = *L. virgilioides*.

SPHINCTOSTOMA, Benth. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 772 (1876) = *Marsdenia*, R. Br. (Asclep.).

SPHINGIUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 65 (1835) = *Melolobium*, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
canaliculatum, E. Mey. l. c. 66 = *M. alpinum*.
canescens, E. Mey. l. c. 67 = *M. canescens*.
decumbens, E. Mey. l. c. = *M. decumbens*.
campolobum, E. Mey. l. c. 66 = *M. adenoides*.
microphyllum, E. Mey. l. c. 67 = *M. microphyllum*.
spicatum, E. Mey. l. c. 66 = *M. cernuum*.
velutinum, E. Mey. l. c. 67 = *M. candicans*.
viscidulum, E. Mey. l. c. 66 = *M. viscidulum*.

SPHONDYLANTHA, Endl. Gen. 1195 (1841) = SPONDYLANTHA, Presl = *Vitis*, Tourn. (Ampel.).

SPHONDYLASTRUM, Reichb. Nom. 169 (1841) = *Myriophyllum*, Ponted. (Halorag.).

SPHONDYLUM, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 100 (1763) = *Heracleum*, Linn. (Umbell.).
alpinum, Scop. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 622 = *H. alpinum*.
asperum, Hoffm. Gen. Umbellif. ed. I. 134 = *H. asperum*.
austriacum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 204 = *H. austriacum*.
Branca, Scop. l. c. = *H. Sphondylium*.
conforme, Moench, Meth. 83 = *H. flavescens*.
decipiens, Hoffm. Gen. Umbellif. ed. I. 134 = *H. pyrenaicum*.
giganteum, Hoffm. l. c. 133 = *H. villosum*.
gummiferum, Hoffm. l. c. 135 = *H. pubescens*, asperum.
longifolium, Hoffm. l. c. 134 = *H. Sphondylium*.
marginatum, Hoffm. l. c. = *H. villosum*.
Panaces, Gaertn. Fruct. i. 86, t. 21. f. 4 = *H. Panaces*.
pubescens, Hoffm. Gen. Umbellif. ed. I. 133 = *H. pubescens*.
speciosum, Hoffm. l. c. 134 = *H. villosum*.
subvillosum, Hoffm. l. c. 133 = *H. villosum*.
villosum, Hoffm. l. c. = *H. villosum*.
vulgare, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 520 = *H. Sphondylium*.

SPHONDYLOCOCCA, Willd. ex Schult. Syst. vi. p. lxx. 799 (1820) = *Bergia*, Linn. (Elatin.).
malabarica, Willd. l. c. 799.—Ind. or.

SPHONDYLOCOCCUM, Schau. in DC. Prod. xi. 640 (1847) = *Callicarpa*, Linn. (Verben.).

SPHRAGIDIA, Thw. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 269, t. 10 = *Cyclostemon*, Blume (Euphorb.).
zeylanica, Thw. l. c. 270 = *C. macrophyllus*.

SPHYROSPERMUM, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 4. t. 8 (1835). *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 576.
buxifolium, Poepp. & Endl. l. c.—Peruv.
cordifolium, Benth. Pl. Hartw. 222 = *Sophoclesia cordifolia*.
longifolium, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 5.—Peruv.
majus, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58, nomen; et Fl. Brit. W. Ind. 143 = *Sophoclesia major*.
myrtifolium, Hook. Ic. Pl. t. 112.—Peruv.
Roraimae, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 36.—Guian.

SPICILLARIA, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1830) 252 = *Petunga*, DC. (Rubiace.).
Leschenaultii, A. Rich. l. c. = *P. Roxburghii*.

SPICIVISCUM, Engelm. in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 58 = *Phoradendron*, Nutt. (Loranth.).
polygynum, Karst. Fl. Columb. i. 73. t. 36 = *P. polygynum*.

SPICULAEA, Lindl. Swan River App. 56 (1839) = *Drakaea*, Lindl. (Orchid.).
ciliata, Lindl. l. c. = *D. ciliata*.

SPIELMANNIA, Cuss. ex Juss. in Dict. Sc. Nat. lv. 328 (1828) = *Trinia*, Hoffm. (Umbell.).

SPIELMANNIA, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. iii. Phys. (1775) 196. t. 15 = *Oftia*, Adans. (Myopor.).
africana, Willd. Sp. Pl. iii. 321 = *O. africana*.
decurrens, Moench, Meth. 479 = *O. africana*.

SPIELMANNIA, —
desertorum, Eckl. & Zeyh. ex Schau. in DC. Prod. xi. 526 = *Oftia revoluta*.
jasminum, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. iii. Phys. (1775) 196. t. 15 = *O. africana*.
revoluta, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 274 = *O. revoluta*.

SPIESIA, Neck. Elem. iii. 13 (1790) = *Astragalus*, Tourn. (Legumin.).

SPIGELIA, Linn. Gen. ed. I. 361 (1737). *LOGANIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 790.
ARAPABACA, Adans. Fam. ii. 225 (1763).
CANALA, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 62. t. 142 (1831).
COELOSTYLIS, Torr. & Gray, ex Endl. Nov. Stirp. Dec. 33 (1839).
HEINZELMANNIA, Neck. Elem. i. 371 (1790).
MONTIRA, Aubl. Pl. Gui. ii. 637. t. 257 (1775).
aenea, Lem. Illustr. Hort. (1857) Misc. 52.—Am. centr.
ambigua, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 116.—Cuba.
Anthelmia, Linn. Sp. Pl. 149.—Am. trop.
asperifolia, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 260.—Bras.
Beyrichiana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 203.—Bras.
Blanchetiana, A. DC. in DC. Prod. ix. 4.—Bras.
brachystachya, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 261.—Bras.
Coulteriana, Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 90.—Mexic.
Flemmingiana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 203.—Bras.
fruticulosa, Lam. Illustr. i. 474.—Guian.
gentianoides, Chapm. ex A. DC. in DC. Prod. ix. 5.—Florida.
glabrata, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 127. t. 193.—Bras.
gracilis, A. DC. in DC. Prod. ix. 6 = *spartioides*.
hamelioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 185 (hamelioides).—N. Granat.
hedytidea, A. DC. in DC. Prod. ix. 7.—Mexic.
Humboldtiana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 200.—Am. trop.
humilis, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 240.—Bras.
insignis, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 259.—Bras.
japonica, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 108 = *Ophiorrhiza japonica*.
laevigata, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 263.—Bras.
laurina, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 204.—Bras.
laurina, A. DC. in DC. Prod. ix. 4, partim = *glabrata*.
linarioides, A. DC. l. c. 6.—Bras.
Lindheimeri, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 108.—Am. bor. occ.
loganioides, A. DC. in DC. Prod. ix. 4.—Florida.
longiflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 376.—Mexic.
Lonicera, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *marilandica*.
Lundiana, A. DC. in DC. Prod. ix. 3.—Bras.
macrophylla, A. DC. l. c. 8.—Bras.
marilandica, Linn. Syst. ed. XII. 734.—Am. bor.
Martiana, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 15.—Bras.
mexicana, A. DC. in DC. Prod. ix. 7.—Mexic.
multispica, Steud. in Flora, xxvi. (1843) 764 = *S. Anthelmia*.
nervosa, Steud. l. c. = *S. Anthelmia*.
Olfersiana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 206.—Bras.
oppositifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 307 = *S. Anthelmia*.
pauciflora, A. DC. in DC. Prod. ix. 7 = *pusilla*.
pauciflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 376.—Mexic.
peduncularis, D. Dietr. Syn. Pl. i. 681 = *pedunculata*.
pedunculata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 185.—N. Granat.
platyphylla, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 256 = *splendens*.
polita, Prog. l. c. 259.—Bras.
polystachya, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1082, nomen; et ex Prog. l. c. 265.—Guian.
pulchella, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 128. t. 194.—Bras.

SPIGELIA :—

- pulverulenta*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 126. t. 192 = Olfersiana.
pusilla, Mart. l. c. 130.—Bras.
quadrifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 307 = marilandica.
rubiaefolia, A. DC. in DC. Prod. ix. 8 = Schlechtendalana.
scabra, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 202.—Bras.
scabrella, Benth. Pl. Hartw. 45.—Mexic.
Schlechtendalana, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 129.—Bras.
Schomburgkiana, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 240 = Humboldtiana.
Schomburgkiana, A. DC. in DC. Prod. ix. 8 = Flemmingiana.
Selloi, Spreng. Syst. iv. Cnr. Post. 59 = seq.
Sellowiana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 205.—Bras.
spartioides, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 14.—Bras.
spartioides, Griseb. ex Wright, in Sauv. Fl. Cub. 117 = sphagnicola.
speciosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 186. t. 224.—Mexic.
sphagnicola, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 116.—Cuba.
sphagnicola, Wright, l. c. 74, err. typ. = praec.
splendens, Hort. Wendl. ex Hook. Bot. Mag. t. 5268.—Mexic. ; Guatemala.
stenophylla, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 260.—Bras.
stipularis, Prog. l. c. 262.—Bras.
texana, A. DC. in DC. Prod. ix. 5.—Texas.

SPILACRON, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 238 (1827) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
crupinoides, Cass. l. c. 239 = **C. arenaria**.

SPILANTHES, Jacq. Enum. Pl. Carib. 8 (1760).

- COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 380.
ACMELLA, Rich. in Pers. Syn. ii. 472 (1807).
ATHRONIA, Neck. Elem. i. 32 (1790).
CERUCHIS, Gaertn. ex Schreb. Gen. 543 (1791).
MENDEZIA, DC. Prod. v. 532 (1836).
PYRETHRUM, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. iii. Phys. (1775) 237. t. 18.
SPILANTHUS, Linn. Mant. ii. 475 (1771).
abyssinica, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 26, nomen; et A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 415 = **S. Acmeila**.
Acmeila, Murr. Syst. ed. XIII. 610.—Cosmop. trop. et subtrop.
affinis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 317 = **arnicoides**.
africana, DC. Prod. v. 623 = **S. Acmeila**.
alba, L'Hérit. Stirp. Nov. 7. t. 4.—Peruv.
alpestris, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 185.—Reg. Argent.
anactina, F. Muell. Fragm. v. 63.—Borneo; Austral.
arborea, Forst. f. in Comm. Gotting. ix. 1787–88 (1789) 66 = **Petrobium arboreum**.
arnicoides, DC. Prod. v. 620.—Bras.
Arrayana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 408 = **S. Acmeila**.
atriplicifolia, Houtt. Handleid. x. 536; Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 37 = **Dichrocephala latifolia**.
atriplicifolia, Linn. Syst. ed. XII. iii. 236 = **Isocarpha atriplicifolia**.
Beccabunga, DC. Prod. v. 622.—Mexic.
bicolor, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 192.—Mexic.
blepharicarpa, DC. Prod. v. 621 = **arnicoides**.
brasiliensis, Spreng. Syst. iii. 444 = **S. Acmeila**.
caespitosa, DC. Prod. v. 622.—Bras.
calva, DC. in Wight, Contrib. 19 = **S. Acmeila**.
caulirhiza, DC. Prod. v. 623 = **S. Acmeila**.
ciliata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 208.—Am. austr.
commutata, C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 14.—Am. bor.
costata, Benth. in Hook. Niger Fl. 436 = **S. Acmeila**.
crocata, Sims, Bot. Mag. t. 1627 = **Verbesina crocata**.
debilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 210 = **S. Acmeila**.
diffusa, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 214.—Ins. Galapag.
diffusa, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 50.—Peruv.

SPILANTHES :—

- doronicoïdes*, DC. Prod. v. 620 = **arnicoides**.
ecliptoides, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 407 = **Jaegeria hirta**.
exasperata, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. 15. t. 584.—Venezuela.
fimbriata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 208.—N. Granat.
fusca, Hort. Par. ex Lam. Encyc. i. 416 = **S. Acmeila**.
grandiflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 185 = **S. Acmeila**.
grandifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 80.—Java.
grandis, DC. Prod. v. 622 = **arnicoides**.
helenioides, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 317 = **arnicoides**.
hirta, Steud. Nom. ed. II. ii. 622.—Am. austr.
insipida, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28; Select. Am. 215. t. 126. f. 2.—Cuba.
intermedia, DC. Prod. v. 624.—Am.
javanica, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 123, nomen.—Malaya.
Karvinskiana, DC. Prod. v. 623.—Mexic.
leiocarpa, DC. l. c. 626.—Peruv.
leptophylla, DC. l. c. 621 = **arnicoides**.
leucantha, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 210.—Ecuador.
lobata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 622 = **S. Acmeila**.
longifolia, DC. Prod. v. 621 = **arnicoides**.
Lundii, DC. l. c. 622 = **S. Acmeila**.
Macraei, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 317.—Chili.
macroglossa, F. Muell. Fragm. v. 63 = **S. Acmeila**.
macropoda, DC. Prod. v. 621 = **arnicoides**.
macropoda, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 71.—Venezuela.
Mandonii, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 529.—Bolivia.
Mariannae, DC. Prod. v. 623 = **S. Acmeila**.
mauritianica, DC. l. c. 625 = **S. Acmeila**.
melampodioides, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 407 = **S. Acmeila**.
melissaeifolia, Salisb. Prod. 186 = **S. Acmeila**.
multiflora, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 306, nomen (Quid ?).—Hab. ?
Mutisii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 209.—Am. austr.
nitida, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 28.—Mexic.
Nuttallii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 356 = **repens**.
oleracea, Linn. Syst. ed. XII. 534 = **S. Acmeila**.
paniculata, Wall. Cat. n. 3186 = **S. Acmeila**.
papposa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 193.—Mexic.
parvifolia, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 100.—Costa Rica.
peregrina, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 622 = **S. Acmeila**.
Poeppigii, DC. Prod. v. 622.—Chili.
portoricensis, Spreng. Syst. iii. 444.—Porto Rico.
Pseudo-acmeila, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 150 = **Perityle microglossa**.
Pseudo-acmeila, Murr. Syst. ed. XIII. 610 = **S. Acmeila**.
Pseudo-gummifera, Forst. f. ex DC. Prod. v. 502 = **Petrobium arboreum**.
pusilla, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 317 = **stolonifera**.
radicans, Jacq. Coll. iii. 229 = **exasperata**.
radicans, Schrad. Cat. Hort. Gotting. (1831) 5; ex Prod. v. 624.—Hab. ?
ramosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 193.—Mexic.
repens, Hort. Par. & Berol. ex C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 14 = **commutata**.
repens, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 131.—Am. bor.
repens, Spreng. ex DC. Prod. v. 625 = **urens**.
rhombifolia, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 323, nomen.—Ins. Timor.
rugosa, Blume, ex DC. Prod. v. 625.—Java.
salivaria, Murr. in Comm. Gotting. vi. (1785) 3. t. 1 = **alba**.
Salzmanni, DC. Prod. v. 623 = **S. Acmeila**.
sessilifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 193 = **Jaegeria hirta**.
sessilis, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 50.—Peruv.
sphaerocephala, DC. Prod. v. 621 = **arnicoides**.
stenophylla, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 317 = **arnicoides**.

SPILANTHES :—

- stolonifera*, DC. Prod. v. 621.—Bras.
subhirsuta, DC. l. c. 622.—Mexic.
tenella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 211 = **S. Acmeila**.
tetrandra, Roxb. in Beats. Tracts St. Helena, App. 325 = **Petrobium arboreum**.
tinctoria, Lour. Fl. Cochinch. 484 = **Adenostemma viscosum**.
uliginosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 110 = **S. Acmeila**.
urens, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28; Select. Am. 214. t. 126. f. 1.—Am. trop.
wedeloides, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 318 = **Eclipta elliptica**.

SPILANTHUS, Linn. Mant. ii. 475 (1771) = **praec.**

SPILOCARPUS, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) Misc. 79. **BORAGINEAE**.
gracilis, Lem. l. c.—Cuba.

SPILOXENE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 44 (1866) = **Hypoxis**, Linn. (Amaryll.).
pavonina, Salisb. l. c. = **H. stellata**.
stellata, Salisb. l. c. = **H. stellata**.

SPINACEA, Schur, Enum. Pl. Transs. 574 (1866) = **seq.**

SPINACHIA, Hill, Hort. Kew. 421 (1768) = **seq.**

SPINACIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 53.
divaricata, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 623, nomen = **Atriplex lenticularis**.
domestica, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 481 = **oleracea**.
fera, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1493 = **Atriplex lenticularis**.
fera, Pall. Reise, i. 496 = **Atriplex rosea**.
glabra, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = **oleracea**.
inermis, Moench, Meth. 318 = **oleracea**.
littoralis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 33 (Quid ?).—Ind. occ.
minor, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 311 = **tetrandra**.
oleracea, Linn. Sp. Pl. 1027.—Ubique cult.
sessiliflora, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 537 = **oleracea**.
spinosa, Moench, Meth. 318 = **oleracea**.
tetrandra, Roxb. Hort. Peng. 72; Fl. Ind. iii. 771 = **oleracea**.
tetrandra, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 417.—Reg. Cauc.

SPINGULA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 (Quid ?).

SPINIFEX, Linn. Mant. ii. 163 (1771). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1109.
IXALUM, Forst. f. Prod. 92 (1786).
alterniflorus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 96 = **longifolius**.
dealbatus, Nees & Meyen, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 623, nomen.—China.
elegans, Buess, in De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 113.—Ins. Sundaic.
fragilis, R. Br. Prod. 198.—**longifolius**.
hirsutus, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 81. tt. 230, 231.—Austral.; Ins. Pacif.
inermis, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 292 = **hirsutus**.
longifolius, R. Br. Prod. 198.—Austral.
paradoxus, Benth. in Hook. Ic. Pl. tt. 1243, 1244.—Austral.
sericeus, R. Br. Prod. 198 = **hirsutus**.
squarrosus, Linn. Mant. ii. 300.—Ind. or.

SPINOVITIS, Romanet, in Compt. Rend. Par. xcii. (1881) 1096 = **Vitis**, Tourn. (Ampel.).
Davidi, Romanet, l. c. = **V. Labrusca**.

SPIRACANTHA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 28. t. 313 (1820). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 237.
cornifera, Steud. Nom. ed. II. ii. 623, sphalm. = **seq.**
cornifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 29.—N. Granat.
denticulata, Ernst, in Flora, lvii. (1874) 213.—Venezuela.

SPIRADICLIS, Blume, Bijdr. 975 (1876). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 62.
PLEOTHECA, Wall. Cat. n. 6215 (1831 ?).
bifida, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 310.—Reg. Himal.
caespitosa, Blume, Bijdr. 975.—Burma; Java.
cylindrica, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 62.—Reg. Himal.

SPIRAEA, Linn. Syst. ed. I (1735). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 611.

ALIPENDULA, Neck. Elem. ii. 89 (1790).
ARUNCUS, Linn. Gen. ed. I. 310 (1737).
AWAYUS, Rafin. Sylva Tellur. 151 (1838).
BASILIMA, Rafin. New Fl. Am. iii. 75 (1836); Sylva Tellur. 152 (1838).
CHAMAEBATIARIA, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 225.
DRYMOPOGON, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 124 (1745).
ELEIOSINA, Rafin. Sylva Tellur. 150 (1838).
ERIOGNIA, Hook. Fl. Bor. Am. i. 255. t. 88 (1833).
FILIPENDULA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 145 (1737).
HOLODISCUS, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 253.
LUETKEA, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 130. t. 2.
SCHIZONOTUS, Lindl. ex Wall. Cat. n. 703 (1830).
SERICOTHECA, Rafin. Sylva Tellur. 152 (1838).
SIBIRAEA, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 116, in obs.
SORBARIA, A. Br. ex Aschers. Fl. Brandenb. 177 (1864).
THECANISIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 38 (1836); Sylva Tellur. 152 (1838).
ULMARIA, [Tourn.] Hill, Hort. Kew. 213 (1768).
acutifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 540 = hypericifolia.
adiantifolia, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 642 = vacciniifolia.
alba, Du Roi, Harbk. Baumz. ii. 430 = salicifolia.
alpestris, G. Don, Gen. Syst. ii. 519.—Sibir.
alpina, Pall. Fl. Ross. i. 1. 35, 78.—Sibir.
altaica, Pall. Reise, ii. 739 = laevigata.
altaiensis, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xv. (1771) 554. t. 29. f. 2 = laevigata.
ambigua, Pall. Fl. Ross. i. 1. 36, in obs. = hypericifolia.
amena, Rafin. New Fl. Am. iii. 65 = salicifolia.
americana, Steud. Nom. ed. I. 805 = S. Aruncus.
amoena, Spae, in C. Morr. Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) 281. t. 72 = bella.
amurensis, Maxim. Prim. Fl. Amur. 90 (= *Physocarpa amurensis*).—Manchuria.
angustifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = S. Filipendula.
angustifolia, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xiii. (1845) 249.—Hab.?
angustiloba, Turcz. ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 71 = lobata.
aquilegifolia, Pall. Reise, iii. 734 = hypericifolia.
arctica, Hort. ex Lavall. Enum. Arb. Segrez. 80 = dasyantha.
arcuata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 325.—Reg. Himal.
argentea, W. Baxt. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 674 = nutans.
argentea, Benth. Pl. Hartw. 82 = discolor.
argentea, C. Koch, Dendrol. i. 328 = media.
argentea, Linn. f. Suppl. 261.—N. Granat.
argunensis, Ledeb. Fl. Ross. ii. 18 = palmata, Pall.
arguta, Hoffmgg. Verz. Pfl. 114 = salicifolia.
arguta ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 494.
ariaefolia, Sm. in Recs. Cycl. xxxiii. n. 16 = discolor.
Aruncus, Linn. Sp. Pl. 490.—Reg. bor. temp.
Aruncus, Thunb. Fl. Jap. 211 = Astilbe japonica.
astilboides, T. Moore, in Gard. Chron. (1880) ii. 114; Carr. in Rev. Hort. (1884) 432 = S. Aruncus.
banatica, Janka, ex Just. Jahresb. iv. 1061 = ulmifolia.
barbata, Wall. Cat. n. 705 = Astilbe rivularis.
belgica, Dum. Fl. Belg. Prod. 98.—Belgium.
bella, Sims, Bot. Mag. t. 2426.—Reg. Himal.
Besseriana, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 194.—Podolia.
bethlehemensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 313 = salicifolia.
betulaefolia, Wats. Dendrol. Brit. i. t. 67 = corymbosa.
betulifolia, Pall. Fl. Ross. i. 1. 33. t. 16.—As. et Am. bor.
Billardii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 312 = salicifolia.

SPIRAEA :—

blanda ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 496.
Blumei, G. Don, Gen. Syst. ii. 518.—Japon.
Boursieri, Carr. in Rev. Hort. (1859) 520. f. 108.—Calif.
brachybotrys, Lange, in Bot. Tidsskr. xiii. (1882) 26 = canescens.
bracteata, Rafin. New Fl. Am. iii. 67.—Sibir.
bracteata ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 496.
brahuica, Boiss. Fl. Orient. ii. 690.—Ind. bor. occ.; Beluchist.
brumalis, Lange, in Bot. Tidsskr. xiii. (1882) 28. (an hybr. ?)—Hab.?
bullata, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 204.—Japon.
caerulescens, Poir. Encyc. vii. 350 = cantoniensis?
caespitosa, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 418.—Am. bor. occ.
californica, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 140 = Vauquelinia Torreyi.
callosa, Thunb. Fl. Jap. 209 = japonica.
callosa, Wall. Cat. n. 707 = bella.
camtschatica, Pall. Fl. Ross. i. 1. 41.—Kamtschat.; Ins. Aleut.
cana, Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 252. t. 227.—Europ. austr.
canadensis, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 805, nomen (Quid ?)—Am. bor.?
canescens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 227.—Reg. Himal.
cantonensis, Lour. Fl. Cochinch. 322.—China.
capitata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 342 = Neillia opulifolia.
carnea, Steud. Nom. ed. I. 805 = salicifolia.
caroliniana, Marsh. Arbust. 146 = Neillia opulifolia.
carpinifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 540 = salicifolia.
ceanothifolia, Hornem. Hort. Hafn. ii. 466 = corymbosa.
chamaedrifolia, Blume, Bijdr. 1114 = Blumei.
chamaedrifolia, Cambess. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. i. (1824) 362 = media.
chamaedrifolia, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 326 = gracilis.
chamaedrifolia, Jacq. Hort. Vindob. ii. 66. t. 140 = ulmifolia.
chamaedrifolia, Thunb. Fl. Jap. 210 = cantoniensis.
chamaedryfolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 2 = betulifolia.
chamaedryfolia, Linn. Sp. Pl. 489.—Europ. or.; As. bor.
chinensis, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 193 = dasyantha.
ciliata, Rafin. New Fl. Am. iii. 66 = salicifolia.
cinerea ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 494.
coerulescens, Auct. = *caerulescens*.
conferta ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 495.
confusa, Regel & Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1857) 57 = media.
contorta, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 129 = S. Ulmaria.
coristantha ×, Schroed. in Gard. Chron. (1882) ii. 108.
corymbosa, Rafin. Préc. Découv. 36.—Am. bor.
corymbosa, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 512 = cantoniensis.
crataegifolia, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 40 = corymbosa.
crenata, Bess. ex DC. Prod. ii. 543 = Besseriana.
crenata, Cav. Desc. 503 = flabellata.
crenata, Linn. Sp. Pl. 489.—Europ. or.; As. bor.
crenata, Muhl. Cat. 51 = salicifolia.
crenata, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 392 = hypericifolia.
crenata, Thunb. Fl. Jap. 210 = Thunbergii.
crenifolia, C. A. Mey. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. vi. 43.—Rossia.
cuneifolia, Borkh. Handb. Forstbot. ii. 1455 = salicifolia.
cuneifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 67 = Douglasii?
cuneifolia, Wall. Cat. n. 699 = canescens.
cuneifolia, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 624, nomen (Quid ?)—Hab.?
cuspidata, Hoffmgg. Verz. Pfl. 114, nomen.—Hab.?
dahurica, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 190.—As. bor.
dasyantha, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 97.—China.

SPIRAEA :—

daurica, Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 624, nomen (Quid ?)—Dahuria.
daurica, Rafin. New Fl. Am. iii. 69 = chamaedryfolia.
decumbens, Koch, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 62.—Austria.
denticulata, Rafin. New Fl. Am. iii. 71 = crenata.
denudata, J. & C. Presl, Fl. Čech. 101 = S. Ulmaria.
digitata, Willd. Sp. Pl. ii. 1061 = palmata, Pall.
discolor, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 342.—Am. bor.
Douglasii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 172.—Am. bor. occ.
dubia, Steud. Nom. ed. II. ii. 624.—Sibir.
dumosa, Nutt. ex Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 217 = discolor.
elliptica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
eximia, Hort. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 106 = salicifolia.
expansa, Wall. Cat. n. 702 = bella.
fastigiata, Wall. l. c. n. 708 = bella.
ferruginea, Rafin. New Fl. Am. iii. 63 = tomentosa.
Filipendula, Linn. Sp. Pl. 490.—Europ.; As. bor.
filipendulina, Hort. ex Vilms. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1091 = S. Filipendula.
fissa, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 73 = discolor.
flabellata, Bertol. ex Guss. Pl. Rar. 205.—Ital.
flexuosa, Fisch. ex Cambess. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. i. (1824) 365 (err. typ. 265) = chamaedryfolia.
flexuosa, Rafin. New Fl. Am. iii. 64 = salicifolia.
flexuosa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 627 = decumbens.
floribunda, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 306 = sorbifolia.
foliosa, Poir. Encyc. vii. 353 = media.
Fortunei, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 35. t. 871 = japonica.
Foxii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 329 = japonica.
Gieseleriana ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 495.
glabrata, Lange, in Bot. Tidsskr. xiii. (1882) 29 = japonica?
glauca, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 26 = S. Ulmaria.
glauca, Wall. Cat. sub n. 707 = bella.
glomerata, Rafin. New Fl. Am. iii. 63 = tomentosa.
gracilis, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 200.—Reg. Himal.
grandiflora, Hook. Bot. Mag. t. 4795 = Exochorda grandiflora.
grandiflora, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
grandiflora, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 194; Lodd. Bot. Cab. t. 1988 = salicifolia.
Hacquetii, Fenzl, ex C. Koch, in Regel, Gartenfl. (1854) 400 = lancifolia.
heterophylla, Rafin. New Fl. Am. iii. 65 = salicifolia.
Hookeri, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 332 = bella.
Hookeriana, Rafin. New Fl. Am. iii. 73 = salicifolia.
Humanni, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 325 = cantoniensis.
Humboldtii, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1884) i. 827.—Hab.?
Humboldtii, Spae, in C. Morr. Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) 311.—Hab.?
hydrangeaefolia, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1877) i. 245 = splendens.
hypericifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 392 = crenata.
hypericifolia, Linn. Sp. Pl. 489; DC. Fl. Fr. Suppl. 645.—Rossia; As. temp.
hypericifolia, Marsh. Arbust. 146 = salicifolia.
incarnata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 311 = salicifolia.
incisa, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 627; et in Rev. Hort. (1875) 160 = chamaedryfolia.
incisa, Thunb. Fl. Jap. 213 = Stephanandra flexuosa.
indica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
inflexa, Hort. ex C. Koch, in Regel, Gartenfl. (1854) 405.—Hab.?
integrifolia, Pall. Reise, iii. 317 = laevigata.
italica, Rafin. New Fl. Am. iii. 72 = hypericifolia?
japonica, Cambess. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. i. (1824) 389 = Kerria japonica.
japonica, Linn. f. Suppl. 262.—Reg. Himal.; China; Japon.
japonica, Makoy, Cat. (1836) 36; ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. v. (1837) 211 = Astilbe japonica.

SPIRAEA:—

- japonica*, Rafin. New Fl. Am. iii. 71 = Thunbergii.
japonica, Siebold, ex Blume, Bijdr. 1114 = cantoniensis.
kamaonensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 331 = bella.
kamtschatica, Auct. = camtschatica.
kamtschatica, Wall. Cat. n. 704 = vestita.
Kirilowii, Regel & Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 81 = sorbifolia.
laciniata, Rafin. New Fl. Am. iii. 71, in obs. = crenata.
laevigata, Linn. Mant. ii. 244. — Sibir.
lanata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
lanceolata, Borck. Handl. Forstbot. ii. 1457 = salicifolia.
lanceolata, Comm. ex Poir. Encyc. vii. 354 = cantoniensis.
lancifolia, Hoffmgg. Preisverz. Pfl. viii. (1825) Nachtr. 44; ex Walp. Rep. ii. 50. — Europ.
lasiocarpa, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 536 = crenifolia.
latifolia, Borck. Handb. Forstbot. ii. 1871 = salicifolia.
laxiflora, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 60 = vacciniifolia.
leucantha, Lange, in Bot. Tidsskr. xiii. (1882) 30, adnot. = japonica?
Lindleyana, Wall. Cat. n. 703 = sorbifolia.
lobata, Jacq. Hort. Vindob. i. 38. — Am. bor.
longigemmis, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 205. — China.
lucida, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 172 = betulifolia.
magellanica, Poir. Encyc. vii. 350 (sp. dub.). — Reg. Magellan.
media, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 342 = chamaedryfolia.
media, F. Schmidt, Oestr. Baumz. i. 53. t. 54. — As. bor.
Menziesii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 173 = Douglasii.
mexicana, Schiede, in Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1857) 58. — Mexic.
micrantha, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 325. — Reg. Himal.
micropetala ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 495.
Millefolium, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 83. t. 5. — Calif.
mollis, C. Koch & Bouché, in Regel, Gartenfl. (1854) 404. — Sibir.
mongolica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 467. — China.
monogyna, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 194 = Neillia Torreyi.
montana, Hort. ex C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 12 = bella.
multifida, Ledeb. Fl. Ross. ii. 19 = pectinata.
multiflora ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 494.
nepalensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 331, 332 = bella, canescens.
nepalensis, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 202, nomen (Quid?). — Nepal.
nervosa, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 331 = dasyantha.
Nicoudiertii, Bosse, Handb. Blumenz. ed. II. iv. 624 = crenata.
nicoviensis, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 40 = crenifolia.
nivea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
Nobleana, Hook. f. Bot. Mag. t. 5169 = Douglasii.
nutans, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 332, 333 = canescens.
nutans, Royle, ex Stend. Nom. ed. II. ii. 624 (sp. dub.). — Ind. or.
oblongata, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1831) 254 = chamaedryfolia.
oblongifolia, Ledeb. Fl. Ross. ii. 13, partim = hypericifolia.
oblongifolia, Regel, ex Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 183 = alpina.
oblongifolia, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 261. t. 235 = media.
obovata, Rafin. ex DC. Prod. ii. 544 = salicifolia.
obovata, Waldst. & Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 541 = hypericifolia.
obtusiloba, Opiz, Seznam, 100, in syn. = S. Ulmaria.

SPIRAEA:—

- occidentalis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 192. — Am. bor. occ.
odorata, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 589 = S. Ulmaria.
opulifolia, Linn. Sp. Pl. 489 = Neillia opulifolia.
opulifolia, Pall. Reise, iii. 230 = trilobata.
orbicularis, Hoffmgg. Verz. Pfl. 114 = hypericifolia.
ostryfolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 69 = betulifolia.
ovalifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
ovata, Rafin. New Fl. Am. iii. 65 = salicifolia.
ovata, Van Houtte, ex Regel, Gartenfl. (1852) 229. — Hab.?
oxyodon ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 495.
pachystachys, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 314 = Douglasii.
Pallasii, G. Don, Gen. Syst. ii. 520 = grandiflora.
palmata, Murr. Syst. ed. XIII. 393 = lobata.
palmata, Pall. Reise, iii. 735. — Sibir.; China.
palmata, Thunb. Fl. Jap. 212. — Japon.
palustris, Salisb. Prod. 364 = S. Ulmaria.
paniculata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = S. Aruncus.
paniculata, Willd. Sp. Pl. ii. 1055; G. Don, Gen. Syst. ii. 520 = salicifolia.
parvifolia, Benth. Pl. Hartw. 36. — Mexic.
parvifolia, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bologn. Ser. II. iv. (1864) 312 = gracilis.
parvifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 63 = tomentosa.
pauciflora, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 414 = Neillia opulifolia.
pectinata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 417. — Am. bor. occ.
pikoviensis, Bess. Enum. Pl. Volh. 46 = crenifolia.
pilosa, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 282. — Turkestan.
pinnata, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 76 = Weinmannia Blumei, Planch.
pinnata, Moench, Meth. 663 = sorbifolia.
pinnifolia, Walp. Rep. ii. 50, sphalm. = prunifolia.
procumbens, Kirch. in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 358 = betulifolia?
prostrata, Maxim. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 184. — China.
prostrata, Schur, Enum. Pl. Transs. 181 = ulmifolia.
pruinosa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
prunifolia, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 131. — Japon.
pubescens, Cav. Desc. 504. — Hab.?
pubescens, DC. Fl. Fr. Suppl. 546 = S. Filipendula.
pubescens, Lindl. in Journ. Hort. Soc. ii. (1847) 157 = dasyantha.
pubescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 190. — China.
pulchella, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 60 = bella?
pulverulenta, Rafin. New Fl. Am. iii. 71 = crenata.
quingueloba, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 47 = S. Ulmaria.
racemosa ×, Schroed. in Gard. Chron. (1882) 11. 108.
Reevesiana, Lindl. Bot. Reg. (1844) t. 10 = cantoniensis.
Regeliana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 314 = Douglasii.
repens, Rafin. New Fl. Am. iii. 70 = betulifolia.
reticulata, Rafin. l. c. 72 = hypericifolia?
rhamnifolia, Wall. Cat. n. 700 = vaccinifolia.
rhodoclada, Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot. 26. — Hispan.
ribifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 414 = Neillia opulifolia.
rosea, Rafin. New Fl. Am. iii. 62 = tomentosa.
rotundifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 327 = trilobata.
rotundifolia, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 72. — Reg. Himal.
Roxburghiana, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 197 = cantoniensis.
ruberrima, Regel, Gartenfl. iii. (1854) 398 = bella.
rupestris, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 326 = Blumei.
ruscifolia, Hort. ex C. Koch, l. c. 333 = canescens.
salicifolia, Linn. Sp. Pl. 489. — Reg. bor. trop.
salicifolia, Schang. in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 36 = chamaedryfolia.
sanssouciana, C. Koch, Berl. Allg. Gartenz. (1857) 214 = Douglasii.
sawranica, Bess. Enum. Pl. Volh. 59 = crenata.

SPIRAEA:—

- saxatilis*, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) 1. Beibl. 11. — Sibir. baical.
Schinabecki ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 495.
Schrenkiana, C. A. Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 96 = Spiraeanthus Schrenckianus.
sericea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 591 = media.
serratifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 333 = canescens.
siöirica, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 624 = hypericifolia.
sibirica, Rafin. New Fl. Am. iii. 64 = salicifolia.
sorbifolia, Linn. Sp. Pl. 490. — Reg. Himal.; As. bor.
sororia, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 600 = corymbosa.
speciosa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 325 = cantoniensis.
speciosa, Fungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 41. — Java.
splendens, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1877) 1. 245; (1883) 11. 12. — Hab.?
stellata, Wall. Cat. sub n. 707 = bella.
stipulacea, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 343 = Gillenia stipulacea.
stipulata, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 542 = Gillenia stipulacea.
subcordata, Lenné & C. Koch, in Regel, Gartenfl. (1854) 402. — Am. bor.
syringaeiflora, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 329 = japonica.
tenuissima, Carr. in Rev. Hortic. (1867) 140. — Hab.?
thalictroides, Pall. Fl. Ross. i. 1. 34. t. 18 = hypericifolia.
Thunbergii, Siebold, ex Blume, Bijdr. 1115. — China; Japon.
thyrsiflora, C. Koch, Dendrol. i. 307 = Neillia thyrsiflora.
tobolskia, Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 202, nomen. — Sibir.
tomentosa, Linn. Sp. Pl. 489. — Am. bor.
tomentosa, Rafin. New Fl. Am. iii. 62 = Douglasii.
trifoliata, Linn. Sp. Pl. 490 = Gillenia trifoliata.
triloba, Murr. Syst. ed. XIII. 393 = seq.
trilobata, Linn. Mant. ii. 224. — Sibir.; China.
triternata, Wall. Cat. n. 706 = S. Aruncus.
tuberosa, Salisb. Prod. 364 = S. Filipendula.
Ulmaria, Linn. Sp. Pl. 490. — Europ.; As. bor.
ulmarioides, Bory, Voy. Souterr. 124 = S. Ulmaria.
ulmifolia, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 349. t. 22. — Europ. or.; Sibir.
undulata, Borkh. Versuch Forstbot. Beschr. Holzart. 65 = salicifolia.
unguiculata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 315 = S. Ulmaria.
uralensis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 149 = hypericifolia.
uratensis, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 107. — Mongol.
vaccinifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 227. — Reg. Himal.
vaccinifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 1403 = gracilis.
Vanhouttei ×, Zabel, in Wittm. Garten-Zeit. iii. (1884) 496.
venusta, Hort. ex Otto & A. Dietr. Allg. Gartenz. xiii. (1845) 250. — Hab.?
venustula, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 16 = vaccinifolia.
versifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 68 = chamaedryfolia.
vestita, Wall. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 521. — Reg. Himal.
virgata, Rafin. New Fl. Am. iii. 72 = salicifolia.
vulgaris, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 588 = S. Filipendula.
Zuccarinii, Siebold, ex Miq. Ann. Bot. Mus. Lugd. Bat. iii. 32 = japonica.

SPIRAEANTHEMUM, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 666. t. 83 (1854). **SAXIFRAGEAE**, Benth. & Hook. f. i. 650.
austroraledonicum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 74; et in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 374. — N. Caled.
caledonicum, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 910, sphalm. = praec.
densiflorum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 74; et in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 374. — N. Caled.

SPIRAEANTHEMUM:—

- Graeffei, *Seem. Fl. Vit.* 111.—Ins. Fiji.
 Katakata, *Seem. in Bonplandia*, x. (1862) 36, nomen;
 et l. c.—Ins. Fiji.
 Macgillivrayi, *Seem. Fl. Vit.* 111.—Ins. N. Hebrid.
 samoëse, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* 667. t. 83.
 —Ins. Samoa.
 undulatum, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* ix.
 (1865) 342.—N. Caled.
 vitiense, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* 669. t. 83.
 —Ins. Fiji.

SPIRAEANTHUS, Maxim. in Act. Hort. Petrop.
 vi. (1879) 226. **ROSACEAE**.
 Schrenckianus, *Maxim. l. c.* 227.—Sibir. altaic.

SPIRAEOPSIS, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 719 (1855).
SAXIFRAGEAE, Benth. & Hook. f. i. 653.
 DIRHYNCHOSIA, Blume, *Mél. Bot.*; ex Flora, xli.
 (1858) 254.
 celebica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 719.—Ins. Celebes.

SPIRAGYNE, Neck. *Elem.* ii. (1790) 14 = **Gentiana**,
 Tourm.

SPIRALEPIS, D. Don, in *Mem. Wern. Soc.* v. (1826)
 551 = **Leontonyx**, Cass. (Compos.).
 declinata, D. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 340 = **Helichrysum** declinatum.
 glomerata, D. Don, in *Mem. Wern. Soc.* v. (1826) 552
 = **L. coloratus**.
 modesta, G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 340 = **Helip-
 terum gnaphaloides**.
 rotundifolia, D. Don, in *Mem. Wern. Soc.* v. (1826)
 552 = **Helichrysum rotundifolium**.
 squarrosa, D. Don, l. c. 551 = **L. tomentosus**.
 tincta, D. Don, l. c. 552 = **L. tomentosus**.

SPIRANTHERA, Boj. *Hort. Maurit.* 226 (1837) =
Ipomoea, Linn. (Convolv.).
 peltata, Boj. l. c. = **I. peltata**.
 pentaphylla, Boj. l. c. = **I. pentaphylla**.
 Turpethum, Boj. l. c. = **I. Turpethum**.

SPIRANTHERA, Hook. *Bot. Mag.* sub t. 3523
 (1836) = **Pronaya**, Hueg. (Pittosp.).
 Fraseri, Hook. l. c. = **P. elegans**.

SPIRANTHERA, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 31 (1836) =
Eustrephus, R. Br. (Liliac.).
 ovata, Rafin. l. c. = **E. latifolius**.

SPIRANTHERA, A. St. Hil in *Bull. Soc. Philom.*
 (1823) 130. **RUTACEAE**, Benth. & Hook. f. i.
 283.
 TERPNANTHUS, Nees & Mart. in *Nov. Act. Nat.*
 Cur. xi. (1823) 152. t. 19.
 odoratissima, A. St. Hil. in *Bull. Soc. Philom.* (1823)
 130.—Bas.

SPIRANTHES, Rich. in *Mém. Mus. Par.* iv. (1818)
 50. **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 596.
 ARISTOTELEA, Lour. *Fl. Cochinch.* 522 (1790).
 CYCLOPOGON, Presl, *Rel. Haenk.* i. 93. t. 13 (1827).
 CYCLOPTERA, Endl. *Ench.* 113 (1841).
 DOTHILIS, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 60 (1836).
 GYROSTACHIS, Pers. *Syn.* ii. 511 (1807), nomen
 prius.
 HELICTONIA, Ehrh. *Beitr.* iv. 148 (1789).
 IBIDIUM, Salisb. in *Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 291.
 MONUSTES, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 87 (1836).
 NARICA, Rafin. l. c. (1836).
 SACOILA, Rafin. l. c. 86 (1836).
 SARCOGLOTTIS, Presl, *Rel. Haenk.* i. 95. t. 15
 (1827).
 SAUROGLOSSUM, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1618 (1833).
 STENORYNCHUS, Rich. in *Mém. Mus. Par.* iv. (1818)
 59.
 STRATEUMA, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 89 (1836).
 SYNASSA, Lindl. *Bot. Reg.* sub t. 1618 (1833).
 actinophila, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 286.—Bras.
 acutata, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.* 84.
 —Bras.
 aestivalis, Oakes, *Cat. Verm. Pl.* 28 = latifolia, *Torr.*
 aestivalis, *Rich. in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 58.—
 Europ.; Afr. bor.
 africana, Lindl. in *Bot. Reg.* sub t. 823 = **Habenaria**
 spiralis.

SPIRANTHES:—

- aguacatensis, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 214.
 —Costa Rica.
 albescent, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 186 = micrantha.
 Alleanii, *Rodrig. l. c.* ii. 288 = picta?
 alpestris, *Rodrig. l. c.* i. 184.—Bras.
 amoena, *Spreng. Syst.* iii. 708 = australis.
 apiculata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 474.—Ind. occ.
 aprica, *Lindl. l. c.* 469.—Bras.
 argirifolia, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 183.—Bras.
 Arrabidae, *Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1884)
 94.—Bras.
 assurgens, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 66.—
 Guatemala.
 aurantiaca, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 300.—
 Mexic.
 australis, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823.—As. temp. et
 trop.; Australas.
 autumnalis, *Rich. in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 59.—
 Europ.; As. temp.
 balanophorostachya, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot.*
Hamb. 84.—Bras.
 Beckii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 472 = gracilis.
 bicolor, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 641.—Ind. occ., Bras.
 bicolor, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823.—Ins. Trinit.
 bonariensis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 475.—Bras.;
 Reg. Argent.
 bracteosa, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1934.—Bras.
 brevifolia, *Chapm. Fl. S. U. St.* 462.—Am. bor.
 brevibras, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 471.—Am. bor.
 calophylla, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 182.—Bras.
 camporum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 473.—Uruguay.
 ceracifolia, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 285.—Bras.
 cerina, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 20.—Guatemala.
 cernua, *Fleisch. & Lindem. Fl. Deutsch. Ostseeprov.*
 309 (Quid?)—Europ.
 cernua, *Rich. in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 59.—Am. bor.
 chilensis, A. Rich. in C. Gay, *Fl. Chil.* v. 475.—Chili.
 chloreaeformis, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat.*
 Sér. III. iii. (1845) 33.—Mexic.
 chloroleuca, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 181.—Bras.
 chlorops, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 20.—Bolivia.
 cinnabarina, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 300.—
 Mexic.
 colorans, *Hemsl. l. c.*, sphalm. = seq.
 colorata, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1883) i. 210.—
 Mexic.
 colorata, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 47.—Java.
 comosa, *Reichb. f. in Linnaea*, xviii. (1844) 408.—
 Mexic.
 congesta, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823.—Sibir.
 costaricensis, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 214.
 —Costa Rica.
 crispata, *Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll.* 89 = australis.
 cuculligera, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.*
 85.—Bras.
 cuspidata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 471.—Bras.
 decipiens, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 203 = **Goodyera**
 Menziesii.
 densa, A. Rich. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. xv. (1841)
 79 = australis.
 diaphana, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 12.—Mexic.?
 dilatata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 474.—Uruguay.
 diuretica, *Lindl. in Quart. Journ. R. Inst. N. S. i.*
 (1827) 54.—Chili.
 elata, *Rich. in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 59.—Am.
 trop.
 Eldorado, *Linden & Reichb. f. in Bot. Zeit.* xv.
 (1857) 157.—Bras.
 ensifolia, *Reichb. f. in Bonplandia*, iv. (1856) 211.—
 Am. centr.
 epiphyta, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 189.—Bras.
 Esmeralda, *Linden & Reichb. f. in Hamb. Gartenz.*
 xviii. (1862) 36.—Bras.
 Eugenii, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.* 84.
 —Bras.
 euphobia, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xli. (1883) 13.—Bras.
 flexuosa, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823 = australis.
 Funckiana, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III.
 iii. (1845) 32.—Mexic.
 Galeottiana, A. Rich. l. c.—Mexic.
 Gardneri, *Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842)
 190 = **Stenoptera ananassocomos**.
 gemmipara, *Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. I.* 257 = **Roman-
 zoffiana**.
 glauca, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 88 = autumnalis.
 gracilis, *Beck, Bot. N. & M. St.* 343; *Hook. Fl. Bor.*
 Am. ii. 202. t. 203.—Am. bor.

SPIRANTHES:—

- gracilis, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 47 = **Chlorosa**
 gracilis.
 graminea, *Lindl. in Benth. Pl. Hartw.* 25.—Am. bor.;
 Mexic.
 grandiflora, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1043 = picta.
 grandis, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 47.—Java.
 gutturosa, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 67.—
 Am. centr.
 hemichroa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 473.—Am. centr.
 hirta, *Lindl. l. c.* 476.—Peruv.
 homologastra, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot.*
Hamb. 84.—Bras.
 Hostmanni, *Reichb. f. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.*
 640.—Ins. Trinit.; Guian.
 hyemalis, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III.
 iii. (1845) 32.—Mexic.
 hypnophila, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 187.—Bras.
 hystera, *Rodrig. l. c.* 188.—Bras.
 icmadophila, *Rodrig. in Rev. Engenh.* 144; ex eod.
Orch. Nov. ii. 286.—Bras.
 inaequilatera, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 7.
 t. 110.—Peruv.
 indica, *Lindl. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 625 = australis.
 lanuginosa, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat.*
 Sér. III. iii. (1845) 32.—Mexic.
 latifolia, A. Rich. & Gal. l. c.—Mexic.
 latifolia, *Torr. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 467.—Am.
 bor.
 laxiflora, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 88 = tortilis.
 Lindleyana, *Lindl. Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. Hort.*
Berol. 26. t. 11.—Am. austr.
 lineata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 471.—Bras.
 lithophila, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 190.—Bras.
 Llaveana, *Lindl. in Benth. Pl. Hartw.* 73.—Mexic.
 lobata, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 11.—Mexic.
 longepetiolata, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 67.
 —Costa Rica.
 longibracteata, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 185.—Bras.
 longifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 476; *Hassk. Cat.*
Hort. Bog. Alt. 47.—Java.
 longilabris, *Lindl. l. c.* 467.—Am. bor.
 longispicata, A. Rich. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. xv.
 (1841) 78 = australis.
 lupulina, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 301.—
 Mexic.
 luteo-alba, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III.
 iii. (1845) 32.—Mexic.
 macrantha, *Reichb. f. in Linnaea*, xix. (1847) 378.—
 Bras.
 macrophylla, *Spreng. Syst.* iii. 708 = **Herminium con-
 gestum**.
 macropoda, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 186.—Bras.
 macrostachya, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 8.
 t. 110 a-k = **Stenoptera peruviana**.
 madrensis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 301.—
 Mexic.
 Mandonii, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 21.—Bolivia.
 margaritifera, *Linden & Reichb. f. in Gard. Chron.*
 (1866) 219 = **S. Esmeralda**.
 mechoacana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 301.—
 Mexic.
 micrantha, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 183.—Bras.
 minutiflora, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 11.—
 Peruv.
 minutiflora, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III.
 iii. (1845) 32.—Mexic.
 monophylla, *Spreng. Syst.* iii. 709 = **Herminium grami-
 neum**.
 montana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 301.—
 —Guatemala.
 montana, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat.*
 Sér. III. iii. (1845) 32.—Mexic.
 multiflora, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 287.—Bras.
 neuroptera, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.*
 85 = simplex.
 Novae-Zelandiae, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 243 =
 australis.
 novofriburgensis, *Reichb. f. in Wawra, Bot. Ergeb.*
Maxim. Bras. 148.—Bras.
 Nuil, *Rich. in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 59 =
 diuretica.
 ochracea, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III.
 iii. (1845) 33.—Mexic.
 odorata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 467.—Am. bor.
 oestivalis, *Boiss. Fl. Orient.* v. 91, sphalm. = aestivalis.
 oestifera, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.*
 86.—Bras.

SPIRANTHES:—

- orchioides, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 252.—Am. trop.
 ornithocephala, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 288.—Bras.
 orthosepala, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.* 85.—Bras.
 ovalis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 466.—Texas.
 paraguayensis, *Reichb. f. in Linnaea*, xxv. (1852) 230.—Paraguay.
 parasitica, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii. (1845) 32.—Mexic.
 parviflora, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 47.—Java.
 parviflora, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823 = australis.
 pauciflora, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii. (1845) 32; *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 302.—Mexic.
 Pavonii, *Reichb. f. in Bonplandia*, iv. (1856) 211.—Peruv.
 peruviana, *Presl, Rel. Haenk.* i. 93.—Peruv.
 Petola, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 47 = *Macodes Petola*.
 picta, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823.—Am. trop.
 plantaginea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 468.—Peruv.
 plantaginea, *Spreng. Syst.* iii. 708 = *Microstylis congesta*.
 plantaginea, *Torr. Fl. N. York*, ii. 284 = latifolia, *Torr. polyantha*, *Reichb. f. in Linnaea*, xviii. (1844) 408.—Mexic.
 porrifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 467.—Calif.
 prasophylla, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 65.—Guatemala.
 Preslii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 470.—Peruv.
 pterygantha, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.* 86.—Bras.
 pubens, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii. (1845) 33.—Mexic.
 pubescens, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 185 = bicolor, *Griseb. pudica*, *Lindl. Coll. Bot. t. 80*; *Spreng. Syst.* iii. 708 = australis.
 pusilla, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 722.—Sumatra.
 pyramidalis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 473.—Guatemala.
 quadridentata, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823.—Gnlan.
 ramentacea, *Lindl. in Ann. Nat. Hist. Ser. I.* iv. (1840) 384.—Mexic.
 Romanzoffiana, *Cham. & Schlecht. in Linnaea*, iii. (1828) 32.—As. bor. or.; Am. bor.; Hibern.
 rosulata, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) Misc. 60.—Guatemala.
 rufescens, *Fisch. ex Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 107, in syn.—Bras.
 rupestris, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 474.—Reg. Argent.
 rupestris, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 189.—Bras.
 saccata, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii. (1845) 32.—Mexic.
 sagittata, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.* 85.—Bras.
 saltensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 338.—Reg. Argent.
 sancta, *Reichb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamb.* 85.—Bras.
 sarcoglossa, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii. (1845) 31.—Mexic.
 sceptrodes, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 214.—Guatemala.
 Schaffneri, *Reichb. f. in Linnaea*, xxviii. (1856) 382.—Mexic.
 Scopulariae, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 11.—Venezuela.
 sellilabris, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 338.—Reg. Argent.
 simplex, *A. Gray, Bot. N. U. St.* ed. V. 506.—Am. bor.
 simplex, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 641.—Ind. occ.
 Smithii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1868) 842.—Costa Rica; Am. centr.
 speciosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 475.—Peruv.
 speciosa, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 252.—Cuba.
 spiralis, *C. Koch, in Linnaea*, xxii. (1849) 290 = autumnalis.
 strateumatica, *Lindl. in Bot. Reg.* sub t. 823 = *Zeuxine sulcata*.
 Stylites, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 178.—China.
 sulphurea, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 302.—Mexic.
 tenuis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 466.—Guian.
 Thelymitra, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 66.—Guatemala.

SPIRANTHES:—

- tortilis, *Beck, Bot. N. & M. St.* 343 = gracilis.
 tortilis, *Rich. in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 59.—Ind. occ.
 transversalis, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii. (1845) 32.—Mexic.
 trilineata, *Lindl. in Benth. Pl. Hartw.* 94.—Guatemala.
 truncata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 470.—Bras.
 uliginosa, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 190.—Bras.
 umbrosa, *Rodrig. l. c.* 188.—Bras.
 unalascensis, *Spreng. Syst.* iii. 708 = *Herminium congestum*.
 vaginata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 472.—Peruv.
 vernalis, *Engelm. et A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 236.—Am. bor.
 villosa, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 8.—Bras.
 violacea, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii. (1845) 32.—Mexic.
 Warmingii, *Reichb. f. & Warm. Otia Bot. Hamb.* 84.—Bras.
 Weirii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1870) 923.—Bras.
 Wightiana, *Lindl. in Wall. Cat. n.* 7378 = australis.

SPIRANTHOS, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 56 = praec.

SPIRASTIGMA, *L'Hérit. ex Schult. f. Syst.* vii. p. lxx (1830) = *Pitcairnia*, *L'Hérit. (Bromel.)*.

SPIREA, *Pall. Reise*, ii. App. 44 (1777), sphalm. = *Spiraea*, *Linn. (Rosac.)*.

SPIREMA, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xv. (1875) 10, sphalm. = *SPEIREMA*, *Hook. f. & Thoms. = Pratia*, *Gaudich. (Campan.)*.

SPIRIDANTHUS, *Fenzl, in Endl. Gen. Suppl.* ii. 105 (1842) = *Monolopia*, *DC. (Compos.)*.

SPIRILLUS, *J. Gay, in Compt. Rend. Acad. Sc.* xxxviii. (1854) 703 = *Potamogeton*, *Tourn. (Naiad.)*.

SPIROCARPUS, *Opiz, Seznam*, 93 (1852) = *Medicago*, *Tourn. (Legumin.)*.
minus, *Opiz, l. c.* = *M. minima*.

SPIROCHAETA, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) i. 166 = *Elephantopus*, *Linn. (Compos.)*.
Funchii, *Turcz. l. c.* 167.—N. Granat.

SPIROCONUS, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1851) i. 576 = *Trichodesma*, *R. Br. (Borag.)*.
glaucus, *Stev. l. c.* 577 = *T. molle*.

SPIRODELA, *Schleid. in Linnaea*, xiii. (1839) 391 = *Lemna*, *Linn.*
atropurpurea, *Montand. Guide Bot.* 309 = *L. polyrrhiza*.
oligorhiza, *Hegelm. Lemnac.* 147 = *L. oligorrhiza*.
polyrrhiza, *Schleid. in Linnaea*, xiii. (1839) 392 = *L. polyrrhiza*.

SPIROLOBA, *Rafin. Sylva Tellur.* 119 (1838) = *Pithecolobium*, *Mart. (Legumin.)*.
bigemina, *Rafin. l. c.* = *P. bigeminum*.
fastuosa, *Rafin. l. c.* = *Inga fastuosa*.
Unguis, *Rafin. l. c.* = *P. Unguis-cati*.

SPIROLOBIUM, *Orb. Sert. Patag.* t. 13 (1839) = *Prosopis*, *Linn. (Legumin.)*.
australe, *Orb. l. c.* 13 = *P. strombulifera*.

SPIRONEMA, *Hochst. in Flora*, xxv. (1842) 226 = *Clerodendron*, *Linn. (Verben.)*.
myricoides, *Hochst. l. c.* = *C. myricoides*.

SPIRONEMA, *Lindl. in Bot. Reg.* (1840) t. 47. *COMMELINACEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 854.
fragrans, *Lindl. l. c.*—Mexic.
orthandrum, *Lindb. in Act. Soc. Sc. Fenn.* x. (1871) 127. t. 4 = *fragrans*.
Robbinsii, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 158 = *Callisia repens*.
Warszewiczianum, *Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 302 = *Tradescantia Warszewicziana*.

SPIRONEMA, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 92 (1836) = *Cassytha*, *Linn. (Laurin.)*.
aphylla, *Rafin. l. c.* 93 = *C. filiformis*?

SPIROPODIUM, *F. Muell. Fragm.* i. 33 (1858) = *Pluchea*, *Cass. (Compos.)*.
baccharoides, *F. Muell. l. c.* 34 = *P. baccharoides*.

SPIRORHYNCHUS, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 159. *CRUCIFERAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 95.
sabulosus, *Kar. & Kir. l. c.* 160.—Soongar.

SPIROSPATHA, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 8 (1836) = *Homalomena*, *Schott (Aroid.)*.
occulta, *Rafin. l. c.* = *H. aromatica*.

SPIROSPERMUM, *Thou. Nov. Gen. Madag.* 19 (1806). *MENISPERMACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 39; 962.
penduliflorum, *DC. Syst.* i. 515.—Madag.

SPIROSTACHYS, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 106 = *Excoccaria*, *Linn. (Euphorb.)*.
africanus, *Sond. l. c.* = *E. africana*.
madagascariensis, *Baill. Etud. Gén. Euph.* 522 = *E. madagascariensis*.

SPIROSTACHYS, *Ung.-Sternb. Vers. Syst. Salic.* 100 (1866) = *Heterostachys*, *Ung.-Sternb. (Chenop.)*.
Ritteriana, *Ung.-Sternb. l. c.* = *H. Ritteriana*.

SPIROSTACHYS, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. ix.* (1874) 125. *CHENOPODIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 63.
occidentalis, *S. Wats. l. c.*—Am. bor. occ.
patagonica, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 86.—Reg. Argent.
vaginata, *Griseb. l. c.* 85.—Reg. Argent.

SPIROSTALIS, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 51 (1836) = *Thalia*, *Linn. (Scitam.)*.
biflora, *Rafin. l. c.* = *T. dealbata*.

SPIROSTEMON, *Griff. Notul.* iv. 80 (1858) = *Parsonsia*, *R. Br. (Apocyn.)*.
spiralis, *Griff. l. c.* = *P. spiralis*.

SPIROSTIGMA, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 83 (1847). *ACANTHACEAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 1077.
hirsutissima, *Nees, l. c.* 84.—Bras.

SPIROSTYLIS, *Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 271 = *Willdenowia*, *Thunb. (Restiac.)*.
Ecklonii, *Nees, l. c.* = *W. Lucaeana*.

SPIROSTYLIS, *Presl, in Schult. f. Syst.* vii. p. xvii, 163 (1829) = *Loranthus*, *Linn.*
Haenkei, *Presl, l. c.* 163 = *L. spirostylis*.
interruptus, *Blume, l. c.* 1731 = *L. interruptus*.

SPIROTHEROS, *Rafin. in Ser. Bull. Bot.* i. (1830) 221 = *Heteropogon*, *Pers. (Gramin.)*.
melanocarpus, *Rafin. l. c.* = *H. acuminatus*.

SPIROTROPIS, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 113. *LEGUMINOSAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 557.
Candollei, *Tul. l. c.*—Guian.
longifolia, *Baill. Hist. Pl.* ii. 364 = *Candollei*.

SPITZELIA, *Sch. Bip. in Flora*, xvi. (1833) 725 = *Pieris*, *Linn. (Compos.)*.
aegyptiaca, *Sch. Bip. l. c.* 727 = *P. pilosa*.
Aparine, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 268.—Alger.
aspera, *Pomel, l. c.* 15.—Alger.
atlantica, *Coss. ex Ball. in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 537 = *P. atlantica*.
aviorum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 16 = *S. Saharae*.
coronopifolia, *Sch. Bip. in Flora*, xviii. (1835) 658 = *P. radicata*.
cupuligera, *Dur. in Duch. Rev. Bot.* ii. (1846) 431 = *P. pilosa*.
getula, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 267 = *S. Saharae*.

SPITZELIA :—

- lyrata*, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 397 = *S. Saharæ*.
lyrata, Sch. Bip. in Flora, xviii. (1835) 658 = *Picris radicata*.
radicata, Coss. & Kral. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 367 = *P. radicata*.
Saharæ, Coss. & Kral. l. c. 397.—Afr. bor.
Sieberi, Sch. Bip. in Flora, xvii. (1834) 474 = *P. radicata*.
tuberosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 268.—Alger.
Willkommii, Sch. Bip. ex Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 42 = *P. Willkommii*.

- SPIXIA, Leandr. Sacram. in Denkschr. Akad. Muench. vii. 1818-1820 (1821) 231. t. 13 = *Pera*, Mutis (Euphorb.).
barbinervis, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 180, nomen = *P. obovata*.
cinerea, Poepp. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 434, nomen = *P. tomentosa*.
distichophylla, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 30 = *P. distichophylla*.
glabrata, Mart. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 434 = *P. ferruginea*.
grandiflora, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 179, nomen = *P. obovata*.
heteranthera, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. vii. 1818-20 (1821) 242, in obs. = *P. obovata*.
Leandri, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 30 = *P. obovata*.
lucida, Poepp. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 434, nomen = *P. ferruginea*.

- SPIXIA, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 80 (1819) = *Centratherum*, Cass. (Compos.).
violacea, Schrank, l. c. = *C. intermedium*.

- SPLITGERBERA, Miq. Comm. Phytog. 133. t. 14 (1840) = *Boehmeria*, Jacq. (Urtic.).
denudata, C. Gay, Fl. Chil. v. 362 = *B. excelsa*.
japonica, Miq. Comm. Phytog. 139. t. 14 = *B. biloba*.
macrostachya, Wight, Ic. t. 1977 = *B. platyphylla*.

- SPODIAS, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 247 (1844), sphalm. = *Spondias*, Linn. (Anacard.).

- SPODIOPOGON, Trin. Fund. Agrost. 192. t. 17 (1820). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1126. *ISCHAEMOPOGON*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 560 (1864).
albidus, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 66.—Ind. or.
angustifolius, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 300.—Ind. or.; China; Ins. Philipp.
arcuatus, Nees, Fl. Afr. Austr. 97 = *Ischaemum fasciculatum*, Hook.
aureus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 273.—Ins. Lu Chu.
Blumii, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = Ind. or.; Malaya.
Byronis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 301.—Ins. Sandvic.
chordatus, Trin. l. c. 302 = *Blumii*.
ciliaris, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 625 = *Ischaemum ciliare*.
conjugatus, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 706 = *Ischaemum conjugatum*.
cuspidatus, Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Blumii*.
depressus, Nees, ex Steud. l. c.—Ind. or.
foliatus, Fourn. ex Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. III. 257 = *Erianthus saccharoides*.
inaequalivalvis, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 625, nomen.—China.
geniculatus, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 706 = *Ischaemum aristatum*.
ischaemoides, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 274.—Ins. Bonin.
laniger, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *angustifolius*.
latifolius, Nees, Agrost. Bras. 360 = *Ischaemum latifolium*.
Lehmanni, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 91 = *Pollinia Lehmanni*.
notopogon, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *angustifolius*.

SPODIOPOGON :—

- obliquivalvis*, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 185 = *Ischaemum ciliare*.
petiolaris, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 301 = *Pollinia Lehmanni*.
pilosus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Andropogon pilosus*.
pogonanthus, Boiss. Fl. Orient. v. 457.—Phrygia.
scrobiculatus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Ischaemum ciliare*.
semisagittatus, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 706 = *Ischaemum semisagittatum*.
sibiricus, Trin. Fund. Agrost. 192.—China; Sibir.
vaginatus, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 520 = *Erianthus saccharoides*.
villosus, Nees, in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 242 = *Ischaemum ciliare*.
zeylanicus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 377 = *Ischaemum ciliare*.

- SPONDIAS, Linn. Gen. ed. I. 365 (1737). *ANACARDIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 426.
CHRYSOMELON, Forst. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 374, in syn. (1854).
CYTHERAEEA, Wight & Arn. Prod. 173 (1834).
EVIA, Comm. ex Juss. Gen. 373 (1789).
MONBIN, Plum. ex Adans. Fam. ii. 342 (1763).
POUPARTIA, Comm. ex Juss. Gen. 372 (1789).
SHAKUA, Boj. Hort. Maurit. 82 (1837).
WARMINGIA, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 281 (1874).
WIRTGENIA, Jungh. ex Hassk. in Flora, xxvii. (1844) 624, partim.
acida, Blume, in Flora, vii. (1824) 291 = *dulcis*.
acida, Soland. ex Benth. Fl. Austral. i. 492 = *Pleiogynium Solandri*.
acuminata, Roxb. Hort. Beng. 34; Fl. Ind. ii. 453 (sp. dub.).—Ind. or.
amara, Lam. Encyc. iv. 261 = *mangifera*.
angolensis, O. Hoffm. in Linnaea, xliii. (1880-82) 125 = *Pseudospondias microcarpa*.
aurantiaca, Schum. & Thonn. Besk. Guin. Pl. 225 = *lutea*.
axillaris, Roxb. Hort. Beng. 34; Fl. Ind. ii. 453 = *lutea*.
Birrea, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 152. t. 41 = *Sclerocarya Birroea*.
borbonica, Baker, Fl. Maurit. 62.—Ins. Maurit.
brasilensis, Mart. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 244 = *lutea*.
Chakoua, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 63 = *Sclerocarya castanea*.
Cirouella, Tussac, Fl. Antill. iii. 37 = *purpurea*.
crispula, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856), 119 = *purpurea*.
cytherea, Sonner. Voy. Ind. iii. 242 = *dulcis*.
cytherea, Tussac, Fl. Antill. iii. t. 28 = *lutea*.
dubia, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 153 = *lutea*.
dulcis, Forst. f. Prod. 34.—Cosmop. trop.
Edmonstonei, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 230 = *Bursera graveolens*.
elliptica, Rottb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 23 = *Buchanania latifolia*.
falcata, Meissn. in Flora, xxvii. (1844) 349 = *Harpephyllum caffrum*.
fragrans, Pav. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 247 = *dulcis*.
glabra, Engl. l. c. 572 (Index) = *lutea*.
graveolens, Macfad. Fl. Jamaic. i. 228 = *lutea*.
guianensis, Klotzsch, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 277 = *Tapirira guianensis*.
longifolia, Roxb. Hort. Beng. 34; Fl. Ind. ii. 453.—Ins. Maurit.
lucida, Salisb. Prod. 172 = *lutea*.
lutea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 613.—Cosmop. trop.
lutea, Royen, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 234 = *dulcis*.
macrocarpa, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 375. t. 78 = *dulcis*.
macrophylla, Klotzsch, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 277 = *Tapirira guianensis*.
macrophylla, Wall. Cat. n. 8480 = *mangifera*.
mangifera, Willd. Sp. Pl. ii. 751.—As. trop.
maxima, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 572 (Index) = *lutea*.
microcarpa, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 151 = *Pseudospondias microcarpa*.

SPONDIAS :—

- Mombin*, Jacq. Select. Am. 138 = *lutea*.
Mombin, Linn. Sp. Pl. ed. I. 371 = *purpurea*.
Myrobalanus, Jacq. Stirp. Am. t. 88 = *purpurea*.
Myrobalanus, Linn. Syst. ed. X. 1036 = *lutea*.
Myrobalanus, Vell. Fl. Flum. 197; iv. t. 185 = *venulosa*.
Oghigee, G. Don, Gen. Syst. ii. 79 = *Odina acida*.
paniculata, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 173 = *mangifera*.
parviflora, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, xiv. (1840) 295 = *Tapirira guianensis*.
pinnata, Kurz, in Pegu Rep. A. 44 = *mangifera*.
pleiogyna, F. Muell. Fragm. iv. 78 = *Pleiogynium Solandri*.
Pseudo-myrobalanus, Tussac, Fl. Antill. iv. 97 = *lutea*.
pubescens, Baker, Fl. Maurit. 62.—Ins. Maurit.
pubescens, Borton, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 626.—Ins. Maurit.
purpurea, Linn. Sp. Pl. ed. II. 613.—Am. trop.
rugosa, Klotzsch, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 277 = *Tapirira guianensis*.
simplicifolia, Rottb. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 187 = *Buchanania Lanza*.
sinensis, Lour. ex Steud. Nom. ed. I. 306, nomen (Quid ?).—China.
Solandri, Benth. Fl. Austral. i. 492 = *Pleiogynium Solandri*.
surinamensis, Klotzsch, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 277 = *Tapirira guianensis*.
therebintoides, Royen, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 234 = *dulcis*?
tuberosa, Arruda, in Koster, Trav. Braz. 496 (sp. dub.).—Bras.
venulosa, Mart. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 245.—Bras.
viridiflora, Fée, Cat. Méthod. Pl. Strasb. (1836) 110 (sp. dub.).—Bras.
Wirtgenii, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 247 = *Odina Wodier*.
Zanzee, G. Don, Gen. Syst. ii. 79 = *Pseudospondias microcarpa*?

- SPONDIOIDES, Smeath. ex Lam. Encyc. iii. 23 (1789) = *Cnestis*, Juss. (Connar.).
ferrugineum, Smeath. ex DC. Prod. ii. 87 = *C. ferruginea*.
pruriens, Smeath. ex Lam. Encyc. iii. 23 = *C. corniculata*.
villosa, Smeath. l. c. 24 = *Agelaca villosa*.

- SPONDOGONA, Rafin. Sylva Tellur. 35 (1838) = *Dipholis*, A. DC. (1844) (Sapot.).
nitida, Rafin. l. c. = *D. salicifolia*.

- SPONDYLANTHA, Presl, Rel. Haenk. ii. 35. t. 53 (1834) = *Vitis*, Tourn. (Ampel.).
aphylla, Presl, l. c. = *V. sicyoides*.

- SPONDYLOCOCCOS, Mitch. in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 218 = *Callicarpa*, Linn. (Verben.).

- SPONDYLOCOCCUS, Reichb. Consp. 212 d (1828) = *SPONDYLOCCA*, Willd. = *Bergia*, Linn. (Elatin.).

- SPONGOSTEMMA, Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. 24 (1826) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).

- SPONGOTRICHUM, Nees, Gen. et Sp. Ast. 176 (1833) = *Olearia*, Moench (Compos.).
glandulosa, Nees, l. c. 175, 176 = *O. glandulosa*.

- SPONIA, Comm. ex Lam. Encyc. iv. 139 (1796) = *Trema*, Lour. (Urtic.).
acuminatissima, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 410.—Sumatra.
affinis, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 329 = *T. orientalis*.
africana, Planch. l. c. 320 = *T. africana*.
amboinensis, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. amboinensis*.
Andaresa, Comm. ex Lam. Encyc. iv. 139 = *T. orientalis*.

SPONIA :—

- Andersonii*, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 336 = *Parasponia Andersonii*.
angustifolia, Planch. l. c. 326 = *Trema angustifolia*.
annulata, Teyssm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 408 = *Gironniera subaequalis*.
argentea, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 323 = *T. argentea*.
argentea, Seem. Bot. Voy. Herald, 413 = *T. amboinensis*.
aspera, Decne. in Nonv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. aspera*.
Blancoi, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 327 = *T. Blancoi*.
bracteolata, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 87 = *T. bracteolata*.
Burmanni, Planch. in DC. Prod. xvii. 200 = *T. amboinensis*.
canescens, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. micrantha*.
carinata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 215 = *T. carinata*.
Chichilea, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 334 = *T. Chichilea*.
Commersonii, Decne. ex Planch. l. c. 317 = *T. orientalis*.
crassifolia, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 610 = *Celtis occidentalis*.
crassifolia, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 340 = *T. micrantha*.
discolor, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. discolor*.
glabrescens, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 317 = *T. glabrescens*.
glomerata, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 87 = *T. glomerata*.
Griffithii, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 324 = *T. amboinensis*.
grisea, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 340 = *T. micrantha*.
guineensis, Planch. in DC. Prod. xvii. 197 = *Celtis guineensis*.
Hochstetteri, Planch. l. c. 198. — Abyss.
ilicifolia, Kurz, in Flora, lv. (1872) 448 = *Aphananthe philippinensis*.
imbricata, Planch. in DC. Prod. xvii. 199 = *T. imbricata*.
integerrima, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 144. — Panama.
laevigata, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 610 = *Celtis mississippiensis*.
Lamarckiana, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. Lamarckiana*.
Lima, Decne. l. c. = *T. Lima*.
lucida, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 17. — Java.
macrophylla, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. macrophylla*.
macrophylla, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 331 = *T. carinata*.
micrantha, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. micrantha*.
mollis, Decne. l. c. = *T. mollis*.
morifolia, Planch. in DC. Prod. xvii. 196 = *T. morifolia*.
nitens, Hook. f. ex Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 325 = *T. nitens*.
nudiflora, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 223 = *Aphananthe aspera*.
occidentalis, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 610 = *Celtis occidentalis*.
orientalis, Blume, ex Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 328 = *T. amboinensis*.
orientalis, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. orientalis*.
orientalis, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 259 = *Parasponia Andersonii*.
pallida, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 215 = *T. pallida*.
pendula, Span. in Linnaea, xv. (1841) 343 = *Celtis timorensis*.
peruviana, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 536 = *T. carinata*.
politoria, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 326 = *T. politoria*.
pubigera, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 216 = *T. pubigera*.
pumila, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 610 = *Celtis occidentalis*.
rigida, Decne. in Nonv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 98 = *T. rigida*.
VOL. II.

SPONIA :—

- rigida*, Zoll. ex Planch. in DC. Prod. xvii. 181 = *Celtis cinnamomea*.
riparia, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *Trema riparia*.
rostrata, Span. in Linnaea, xv. (1841) 343, nomen (Quid ?). — Ins. Timor.
rufescens, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 334 = *T. rufescens*.
rugosa, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. rugosa*.
Sampsoni, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 242 = *T. timorensis*.
scaberrima, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 217 = *T. scaberrima*.
Schiedeana, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 335 = *T. micrantha*.
sinensis, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *Celtis sinensis*.
Solenostigma, Steud. Nom. ed. II. ii. 626 = *Celtis paniculata*.
stipellata, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii. (1883) 109. — Porto Rico.
strigosa, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 320 = *T. strigosa*.
strychnifolia, Teyssm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 392 = *Celtis laurifolia*.
subserata, Kurz, in Flora, lv. (1872) 448 = *Gironniera reticulata*.
tahitensis, Nadeaud, Enum. Pl. Tahiti, 42 = *Parasponia Andersonii*.
tetrandra, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 294 = *Celtis tetrandra*.
timorensis, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498 = *T. timorensis*.
tomentosa, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 336 = *T. amboinensis*.
trinervia, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 498. — Ins. S. Doming.
velutina, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 327 = *T. amboinensis*.
Vieillardii, Planch. in DC. Prod. xvii. 201. — N. Caled.
virgata, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 316 = *T. timorensis*.
viridis, Planch. l. c. 319 = *T. aspera*.
Wightii, Planch. l. c. 322 = *T. orientalis*.
Willdenowiana, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 610 = *Celtis japonica*.

SPORAEOLUS, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 17 (1844), sphalm. = *Sporobolus*, R. Br. (Gramin.).

SPORADANTHUS, F. Muell. ex J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. vi. (1874) 340; x. (1878) App. 41 = *Lepyrodia*, R. Br. (Restiac.).
Traversii, F. Muell. ex J. Buch. ll. cc. = *L. Traversii*.

SPORLEDERA, Bernh. in Linnaea, xvi. (1842) 41 = *Ceratotheca*, Endl. (Pedalin.).
Kraussiana, Bernh. l. c. 42 = *C. Kraussiana*.
triloba, Bernh. l. c. = *C. triloba*.

SPOROBOLUS, R. Br. Prod. 169 (1810). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1148.

AGROSTICULA, Raddi, Agrost. Bras. 33. t. 1. f. 2 (1823).

BENNETIA, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 220.
CRYPTOSTACHYS, Stend. Syn. Pl. Gram. 181 (1855).
DIACHYRIUM, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 256.
HELEOCHLOA, Beauv. Agrost. 23 (1812).
SPERMACHITON, Llanos, Fragn. 25 (1851).
TRIACHYRUM, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 19.

VILFA, Beauv. Agrost. 16. t. 5. f. 8 (1812).
actinocladius, F. Muell. Fragn. viii. 140. — Austral.
aeneus, Kunth, Enum. Pl. i. 213. — Bras.
affinis, Kunth, Rév. Gram. i. 68. — Am. austr.
affinis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 396. — Abyss.
airoides, Torr. in Marcy, Rep. 300. — Am. bor. occ.
albicans, Nees, Fl. Afr. Austr. 154. — Afr. austr.
alpicola, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 395. — Abyss.
angustifolius, A. Rich. l. c. 396. — Abyss.
angustus, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 88 = indicus.
arabicus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 47. — Arab.; Ind. or.

SPOROBOLUS :—

- arenaceus*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 89 = *asperifolius*.
arenarius, Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot. Fl. xvi. (1869) 294 = *pungens*.
argutus, Kunth, Enum. Pl. i. 215. — Bras.
arundinaceus, Vasey, Cat. Gr. U. St. 43 = *Arctagrostis latifolia*.
asper, Kunth, Rév. Gram. i. 68. — Am. bor.
asperifolius, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 141. — Am. occ. bor. et austr.
atrovirens, Kunth, Rév. Gram. i. 68. — Mexic.
blephariphyllus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 398. — Abyss.
brevifolius, Nees, Fl. Afr. Austr. 160 = *tenellus*.
Buckleyi, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 128. — Texas.
caespitosus, Kunth, Rév. Gram. ii. 423. t. 125. — Ins. Adscens.
capensis, Kunth, Enum. Pl. i. 212. — Afr. austr.
capillaris, Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 25 = *pulchellus*.
Carmichaeli, Kunth, Rév. Gram. i. 68 = *Agrostis Carmichaeli*.
centrifugus, Nees, Fl. Afr. Austr. 158. — Afr. austr.
ciliatus, F. S. Presl, in Rel. Haenk. i. 242. — Mexic.
commutatus, Kunth, Enum. Pl. i. 214 = *coromandelianus*.
compressus, Kunth, l. c. 217. — Am. bor.
confertiflorus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 397. — Abyss.
confertus, F. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 142. — Ins. Cap. Virid.
consimilis, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 140. — Abyss.
coromandelianus, Link, Hort. Berol. i. 89, in nota; Kunth, Rév. Gram. i. 68. — As. et Afr. trop.
cryptandrus, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 576. — Am. bor.
cuspidatus, Wood, Am. Bot. & Flor. 385; Scribner, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 63. — Am. bor.
depauperatus, Scribner, l. c. — Am. bor.
depauperatus, Torr. ex Hems. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 546 = *plumbeus*.
diander, Beauv. Agrost. 26. — As. et Austral. trop.
diffusissimus, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 90 = *airoides*.
discosporus, Nees, Fl. Afr. Austr. 158. — Afr. austr.
domingensis, Kunth, Enum. Pl. i. 214. — Ind. occ.
Drummondii, Vasey, Cat. Gr. U. St. 44. — Am. bor.
durus, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 18. t. 4. — Ins. Adscens.
effusus, Desv. Opusc. 60. — Bras.
elongatus, R. Br. Prod. 170 = *indicus*.
eminens, F. S. Presl, in Rel. Haenk. i. 242. — Mexic.
fastigiatus, F. S. Presl, l. c. 241. — Peruv.
festivus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 398. — Abyss.
filiculmis, Vasey, Cat. Gr. U. St. 44. — Am. bor.
fimbriatus, Nees, Fl. Afr. Austr. 156. — Afr. austr.
floridanus, Chapm. Fl. S. U. St. 550. — Florida.
gaditanus, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 125 = *pungens*.
Gigas, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 376. — Java.
glaucofolius, Hochst. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 133, nomen: et ex Steud. Syn. Pl. Gram. 154. — Nubia; Sind.
gracillimus, Vasey, Cat. Gr. U. St. 44. — Am. bor.
heterolepis, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 576. — Am. bor.
heterolepis, Lapham, in Trans. Wisconsin St. Agric. Soc. iii. 1853 (1854) 426, sphalm. = *praece*.
humifusus, Kunth, Rév. Gram. i. 67. — Mexic.
humilis, F. S. Presl, in Rel. Haenk. i. 241. — Ins. Philipp.
indicus, R. Br. Prod. 170. — Anstral.
insulanus, Parl. in Atti 8^{va} Riun. Sc. Ital. 586. — Ins. Cap. Virid.
insularis, Hook. Niger Fl. 187, sphalm. = *praece*.
ioclados, Nees, Fl. Afr. Austr. 161. — Afr. austr.; Ind. or.
Jacquemontii, Kunth, Rév. Gram. ii. 427. t. 127. — Ind. occ.
Jonesii, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 297. — Calif.
juncus, Kunth, Rév. Gram. i. 68. — Am. bor.
Lamarckii, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 4 = *indicus*.
leptostachys, Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1881) 30. — Afr. trop.

SPOROBOLUS—

- Lindleyi*, Benth. Fl. Austral. vii. 623 = pallidus.
littoralis, Kunth, R v. Gram. i. 68 = glaucifolius?
longifolius, Wood, Class Book (1861), 775 = asper?
Ludwigii, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 118.—Afr. austr.
mangaloricus, Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 24 = minutiflorus.
marginatus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 397.—Abyss.
Matrella, Nees, Fl. Afr. Austr. 152.—Afr. austr.
minor, Kunth, Enum. Pl. i. 212 = indicus.
minutiflorus, Link, Hort. Berol. i. 88.—Ind. or.
minutus, Link, l. c.—Abyss.
Muehlenbergii, Kunth, R v. Gram. i. 68.—Am. bor.
myrianthus, Benth. in Hook. Niger Fl. 565.—Afr. trop.
nervosus, Hochst. in Flora, xxxviii. (1855) 202.—Abyss.
noterophilus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 546.—Mexic.
orientalis, Kunth, Enum. Pl. i. 211.—Ind. or.
pallidus, Benth. Fl. Austral. vii. 623, in obs., sphalm. = arabicus.
pallidus, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 187.—Austral.
panicoides, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 399.—Abyss.
parviflorus, Kunth, R v. Gram. i. 68.—Austral.
pellucidus, Hochst. in Flora, xxxviii. (1855) 201.—Abyss.
phyllotrichus, Hochst. l. c.—Abyss.
piliferus, Kunth, Enum. Pl. i. 211.—Ind. or.; China.
plumbeus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 546.—Mexic.
pulchellus, R. Br. Prod. 170.—Austral.; Ind. or.
pungens, Kunth, R v. Gram. i. 68.—Reg. Mediterr.
purgans, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 773 (Index), sphalm. = praec.
purpurascens, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 5.—Am. trop.
pyramidalis, Beauv. Fl. Owar. ii. 36.—Afr. trop.
ramosissimus, Kunth, R v. Gram. i. 269. t. 46.—Am. trop.
ramulosus, Kunth, l. c. 68.—Am. bor. occ.
repens, J. S. Presl, in Rel. Haenk. i. 241.—Mexic.
rigens, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 295.—Chili.
robustus, Kunth, R v. Gram. ii. 425. t. 126.—Afr. trop.
Rueppellianus, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 139.—Abyss.
rupestris, Kunth, R v. Gram. i. 267. t. 45.—Bras.
sarmentosus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 295.—Reg. Argent.
scaber, Phil. Fl. Atac. 54.—Chili.
scoparius, J. S. Presl, in Rel. Haenk. i. 243.—Ins. Philipp.
serotinus, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 577.—Am. bor.
spicatus, Kunth, R v. Gram. i. 67.—Afr. bor.; Ind. or.
Sprengelii, Kunth, l. c. 68.—Bras.
stachydanthus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 394.—Abyss.
subinclusus, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 49.—Chili.
subtilis, Kunth, R v. Gram. ii. 421. t. 124.—Madag.
subtilis, F. Muell. Fragm. viii. 140 = pallidus.
tenacissimus, Beauv. Agrost. 26 = indicus.
tenellus, Kunth, Enum. Pl. i. 215.—Afr. austr.
tremulus, Kunth, R v. Gram. i. 67 = virginicus.
tricholepis, Coult. Man. Rocky Mount. Bot. 411.—Am. bor.
truncatellus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 159.—Guian.
vaginaeflorus, Vasey, Cat. Gr. U. St. 45.—Am. bor.
verticillatus, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 101.—Ins. Philipp.
villosus, Hochst. ex Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. 11. 234 = Panicum amplexicaule.
villosus, Kunth, R v. Gram. i. 68.—Guian.
virginicus, Kunth, l. c. 67.—Cosmop. trop.
Wolfii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 52.—Colorado.
Wrightii, Munro, ex Vasey, Cat. Gr. U. St. 26, nomen.—Am. bor.
- SPORTELLA**, Hance, in Journ. Bot. xv. (1877) 207 = *Crataegus*, Tourn. (Rosac.).
atalantoides, Hance, l. c. = C. Pyracantha.

SPRAGUEA, Torr. in Smithson. Contrib. vi. (Pl. Fr mont.) (1854) 4. t. 1. *PORTULACAEAE*, Benth. & Hook. f. i. 158.
paniculata, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 187. f. 56.—Am. bor. occ.
umbellata, Torr. in Smithson. Contrib. vi. (1854) 4.—N. Mexic.

SPREKELIA, Heist. Syst. 5 (1748); Desc. Brunsvig. 19 (1753). *AMARYLLIDAEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 724.
Cybister, Herb. in Bot. Reg. (1840). t. 33 = Hippeastrum Cybister.
formosissima, Herb. App. [Bot. Reg.] 35.—Mexic.
glaucous, Lindl. Bot. Reg. (1840). Misc. 49 = formosissima.
Heisteri, Trew, ex Kunth, Enum. Pl. v. 507 = formosissima.
Karwinskii, M. Roem. Syn. Ens. 144 = formosissima.
ringens, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) 133. t. 60 = formosissima.

SPRENGALIA, 'Andr.' ex Steud. Nom. ed. II. ii. 626 (1841), sphalm. = *Sprengelia*, Sm. (Epacrid.).

SPRENGELIA, Schult. Obs. Bot. 134 (1809) = *Melhanian*, Forsk. (Stercul.).
modesta, Schult. l. c. = M. abyssinica.

SPRENGELIA, Sm. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1794) 260; Tracts, 269. t. 2 (1798). *EPACRIDAEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 617.
POIRETIA, Cav. Ic. iv. 25. t. 343 (1797).
PONCELETIA, R. Br. Prod. 554 (1810).
Andersoni, F. Muell. Fragm. vi. 64 = *Andersonia sprengelioides*.
aristata, F. Muell. l. c. 63 = *Andersonia aristata*.
brachyanthera, F. Muell. l. c. 61 = *Andersonia brachyanthera*.
brachynema, F. Muell. l. c. = *Andersonia heterophylla*.
brachyota, F. Muell. l. c. 62 = *Andersonia parvifolia*.
brevifolia, F. Muell. l. c. 61 = *Andersonia brevifolia*.
coerulea, F. Muell. l. c. 64 = *Andersonia coerulea*.
colossea, F. Muell. l. c. 63 = *Andersonia colossea*.
depressa, F. Muell. l. c. = *Andersonia depressa*.
incarnata, Sm. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1794) 260; Tracts, 272. t. 2.—Austral.
involuta, F. Muell. Fragm. vi. 62 = *Andersonia involuta*.
latiflora, F. Muell. l. c. 61 = *Andersonia latiflora*.
macrantha, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 273 = *incarnata*.
macronema, F. Muell. Fragm. viii. 51.—Austral.
micrantha, F. Muell. l. c. vi. 61 = *Andersonia micrantha*.
montana, R. Br. Prod. 555 = *incarnata*.
parvifolia, F. Muell. Fragm. vi. 62 = *Andersonia parvifolia*.
patricia, F. Muell. l. c. 79 = *Andersonia patricia*.
Ponceletia, F. Muell. l. c. i. 39.—Austral.
ponceletioides, Sond. in Linnaea, xxvi. (1853–55) 254.—Austral.
propinqua, A. Cunn. ex DC. Prod. vii. 768 = *incarnata*.
spirophylla, F. Muell. Fragm. vi. 62 = *Andersonia grandiflora*.

SPRINGALIA, DC. Prod. vii. 768 (1839), err. typ. = praec.

SPRINGIA, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Pl. Nov. 142 (1871) = *Ichnocarpus*, R. Br. (Apocyn.).
indica, Heurck & Muell. Arg. l. c. 143 = *I. ovatifolius*.

SPRUCEA, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 230. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 43.
rubescens, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 230.—Bras.

SPRUNIRA, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 42; xxv. (1842) 1. Beibl. 134, 145 = *Sphaeranthus*, Linn. (Compos.).
alata, Sch. Bip. ll. cc. = *Sphaer. nubicus*.

SPRUNNERA, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 954 (1843) = *Codonoccephalum*, Fenzl (Compos.).
inuloides, Sch. Bip. l. c. = C. inuloides.

SPYRIDIDIUM, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 24 (1837). *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. i. 382.
STENODISCUS, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 295.

bifidum, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 432.—Austral.
coactilifolium, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 291.—Austral.
complicatum, F. Muell. Fragm. iii. 78.—Austral.
cordatum, Benth. Fl. Austral. i. 430.—Austral.
diffusum, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 288 = *vexilliferum*.
divaricatum, Benth. Fl. Austral. i. 427.—Austral.
eriocephalum, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 24.—Austral.
globulosum, Benth. Fl. Austral. i. 429.—Austral.
Gunnii, Benth. l. c.—Tasman.
halmaturinum, F. Muell. ex Benth. l. c. 432.—Austral.
Lawrencii, Benth. l. c. 430.—Tasman.
leucophractum, F. Muell. Fragm. iii. 77 = *Stenanthemum leucophractum*.
microcephalum, Benth. Fl. Austral. i. 434.—Austral.
obovatum, Benth. l. c. 429.—Tasman.
oligocephalum, Benth. l. c. 433.—Austral.
parvifolium, F. Muell. Fragm. iii. 79.—Austral.
pauciflorum, Benth. Fl. Austral. i. 432.—Austral.
phlebophyllum, F. Muell. ex Benth. l. c. 430.—Austral.
phyllicoides, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 286 = *vexilliferum*.
prostratum, Reiss. l. c. 284 = *eriocephalum*.
pumilum, F. Muell. Fragm. ix. 137.—Austral.
rotundifolium, F. Muell. l. c. iv. 25.—Austral.
scryphaceum, F. Muell. l. c. iii. 80.—Austral.
spadiceum, Benth. Fl. Austral. i. 428.—Austral.
spatulatum, F. Muell. ex Benth. l. c. 430.—Austral.
Stuarti, Reiss. & F. Muell. in Linnaea, xxix. (1857–58) 290 = *coactilifolium*.
subochreatum, Reiss. l. c. 287.—Austral.
thymifolium, Reiss. l. c. 289 = *coactilifolium*.
tridentatum, Benth. Fl. Austral. i. 427.—Austral.
ulicinum, Benth. l. c. 434.—Tasman.
uncinatum, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 289 = *eriocephalum*.
vexilliferum, Reiss. l. c. 285.—Austral.
villosum, Benth. Fl. Austral. i. 432.—Austral.
Waterhousii, F. Muell. Fragm. iii. 83 = *Stenanthemum Waterhousii*.
westringiaefolium, Benth. Fl. Austral. i. 431.—Austral.

SQUAMARIA, Riv. ex Linn. Gen. ed. I. (1737) 183 = *Lathraea*, Linn. (Orobanch.).
Orobanch, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 438 = L. Squamaria.

SQUAMATAXUS, [Nelson], Senilis, Pinaceae, 168 (1866) = *Saxegothaea*, Lindl. (Conif.).
Albertiana, [Nelson], l. c. = Sax. conspicua.

SQUAMMARIA, Riv. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = *SQUAMARIA*, Riv. = *Lathraea*, Linn. (Orobanch.).

SQUILLA, Steinh. in Ann. Sc. Nat. S r. II. vi. (1836) 276 = *Urginea*, Steinh. (Liliac.).
anthericoides, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 2 = U. anthericoides.
insularis, Jord. & Fourr. l. c. = U. Scilla.
littoralis, Jord. & Fourr. l. c. = U. Scilla.
maritima, Steinh. in Ann. Sc. Nat. S r. II. vi. (1836) 279 = U. Scilla.
numidica, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 1 = U. Scilla.
Pancration, Steinh. in Ann. Sc. Nat. S r. II. vi. (1836) 279 = U. Scilla.
sphaeroidea, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 1 = U. Scilla.

SRUTANTHUS, Pritz. Ic. Ind. i. 1061 (1855), sphalm. = seq.

SRUTHANTHUS, DC. Prod. iv. 671 (1830), sphalm. = *STRUTHANTHUS*, Mart. = *Loranthus*, Linn.

STAAVIA, Dahl, Obs. Bot. 15 (1787). *BRUNIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. i. 672.
ASTROCOMA, Neck. Elem. i. 112 (1790).
LEVISANUS, Schreb. Gen. i. 149 (1789).
STAVIA, Thunb. Nov. Gen. vii. 108 (1792).

STAAVIA :—

- adenandraefolia*, Eckl. & Zeyh. Enum. 141.—Afr. austr.
capitella, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 323 = *adenandraefolia*.
ciliata, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 380.—Afr. austr.
ciliata, Eckl. & Zeyh. Enum. 141 = *adenandraefolia*.
Dregeana, Presl, Bot. Bemerk. 39 = *radiata*.
glaucescens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 223, nomen = *glutinosa*.
globosa, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 322 = *ciliata*.
glutinosa, Dahl, Obs. Bot. 17.—Afr. austr.
nuda, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 379.—Afr. austr.
nuda, Eckl. & Zeyh. Enum. 141 = *adenandraefolia*.
pinifolia, Willd. in Denkschr. Akad. Muench. i. (1809) 133 = *radiata*.
radiata, Dahl, Obs. Bot. 15.—Afr. austr.
rupestris, Eckl. & Zeyh. Enum. 141 = *adenandraefolia*.
Zeyheri, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 323.—Afr. austr.

- STABEROHA**, Kunth, Enum. Pl. iii. 442 (1841). *RESTIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1034.
distachya, Kunth, l. c. 444.—Afr. austr.
imbricata, Kunth, l. c. 442 = Afr. austr.
stenoptera, Kunth, l. c. 443 = *imbricata*.

- STACHIS**, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 255 (1768) = *Stachys*, Tourn. (Labiata).

- STACHYACANTHUS**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 65 (1847). Genus dubium *ACANTHACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1071.
Riedelianus, Nees, l. c. 66.—Bras.

- STACHYANTHUS**, DC. Prod. v. 84 (1836) = *Eremanthus*, Less. (Compos.).
argyrophyllus, Mart. & Zucc. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 168 = E. Martii.
Martii, DC. Prod. v. 84 = E. Martii.

- STACHYARRHENA**, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1068 (1870). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 80.
longifolia, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. sub t. 1068.—Bras.
spicata, Hook. f. l. c. t. 1068.—Bras.

- STACHYCEPHALUM**, Sch. Bip. ex Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1102 (1872). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 344.
argentinum, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 188.—Reg. Argent.
mexicanum, Sch. Bip. ex Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1102.—Mexic.

- STACHYCHRYSUM**, Boj. Hort. Maurit. 114 (1837) = *Piptadenia*, Benth. (Legumin.).
pterospermum, Boj. l. c. = P. chrysostachys.

- STACHYCRATER**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) l. 464 = *Osmelia*, Thw. (Samyd.).
philippinus, Turcz. l. c. 465 = O. philippinensis.
zeylanicus, Turcz. l. c. xxxvi. (1863) l. 609 = O. Gardneri?

- STACHYOBIMUM**, Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 785 = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).
aureum, Reichb. f. l. c. = D. binoculare.

- STACHYOCNIDE**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 227. t. 55 (1856) = *Pouzolzia*, Gaudich. (Urtic.).
luzonica, Blume, l. c. 228. t. 55 = P. macrura.

- STACHYOPHORBE**, Liebm. in Overs. Dansk. Vidensk. Selsk. (1846) 8 = *Chamaedorea*, Willd. (Palm.).
cataractarum, Liebm. l. c. = C. cataractarum.
Deckeriana, Klotzsch, in Otto & Dietrich. Allg. Gartenz. xx. (1852) 364 = C. Deckeriana.
montana, Liebm. in Overs. Dansk. Vidensk. Selsk. (1846) 8 = *oreophila*.
pygmaea, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 10 = C. pygmaea.

- STACHYOPOGON**, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 49 (1862) = *Aletris*, Linn. (Haemod.).
pauciflorus, Klotzsch, l. c.—Reg. Himal.
spicatus, Klotzsch, l. c.—Reg. Himal.

- STACHYS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1208.

- AMBLEIA*, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 166 (1840), nomen.
ASPASIA, E. Mey. ex Pfeiff. Nom. i. 295 (1873).
BETONICA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); et Gen. ed. I. 171 (1737).
BONAMYA, Neck. Elem. i. 316 (1790).
ERIOSTACHYS, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 588 (1840).
ERIOSTOMUM, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 105. t. 7 (1809).
GALEOPSIS, Moench, Meth. 397 (1794).
OLISIA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 166 (1840).
ORTOSTACHYS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 136.
TETRAHITUM, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 103 (1809).
TRIXAGO, Hall. Hist. Stirp. Helv. 101 (1768); Moench, Meth. 398 (1794).
TRIXELLA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 135.
ZIETENIA, Gled. Syst. 185 (1764).
abrotanifolia, Boiss. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient. iv. 732 = *angustifolia*.
acerosa, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 57.—Persia.
aculeolata, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 18.—Afr. trop.
acutifolia, Bory & Chaub. Expéd. Mor. 168 = *germanica*.
acutifolia, Link, in Linnaea, ix. (1834) 575 = *graeca*.
adenocalyx, C. Koch, l. c. xxi. (1848) 691 = *annua*.
aegyptiaca, Pers. Syn. ii. 124 = *affinis*.
aethiopica, Linn. Mant. i. 82.—Afr. austr.
affinis, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 51 = *palustris*.
affinis, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1833) 91.—Aegypt.; Arab.
agraria, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 100.—Texas; Mexic.
agraria, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 408 = *bullata*.
ajugoides, Benth. in Linnaea, vi. (1831) 80.—Calif.
alba, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *germanica*.
albans, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 387.—Calif.
albicaulis, Bert. ex Benth. in DC. Prod. xii. 473 = *grandidentata*.
albicaulis, Lindl. Bot. Reg. t. 1558.—Chili.
aleurites, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 79.—Pamphylia.
alopeucros, Benth. Lab. Gen. et Sp. 531.—Europ.
alpina, Linn. Sp. Pl. 581.—Europ.; Reg. Cauc.
altissima, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 101 = *italica*.
ambigua, Sm. Engl. Bot. t. 2089 = *sylvatica*.
angustifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 51.—Europ. austr. or.
angustifolia, Gilib. Fl. Lituan. i. 80 = *palustris*.
anisochila, Vis. & Panč. in Mem. Ist. Venet. xv. (1870) 13.—Serbia; Herceg.
annua, Linn. Sp. Pl. ed. II. 813.—Europ.; Reg. Cauc.
annua, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 410 = *recta*.
annua, Walt. Fl. Carol. 161 = *aspera*.
arabica, Hornem. Hort. Hafn. 554.—Syria.
arenaria, Vahl, Symb. Bot. ii. 64.—Reg. Mediterr. occ.
argentea, Tausch, in Flora, xiv. (1831) 217 = *germanica*.
argilacea, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 118 = *Duriaci*.
argolica, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 83 = *Swainsoni*.
armena, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 694 = *Marrubium cephalanthum*.
Artemisiae, Lour. Fl. Cochinch. 365 = *Leonurus sibiricus*.
arvensis, Linn. Sp. Pl. ed. II. 814.—Gronit. temp. bor.
arvensis, Walt. Fl. Carol. 162 = *aspera*.
aspera, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 5.—Am. bor.
atherocalyx, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 691 = *recta*.
Aucherii, Benth. in DC. Prod. xii. 487.—Persia.
aurea, Benth. l. c. 492.—Afr. austr.

STACHYS :—

- austriaca*, Heynh. Nom. ii. 697 = *palustris*.
baicalensis, Fisch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 543 = *palustris*.
Balansae, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 722.—As. Min.
Balbisii, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 110 = *pubescens*.
Ballota, Kuntze, Taschen-Fl. Leipz. 112 = *Ballota nigra*.
ballotaeformis, Vatke, in Bot. Zeit. xxxiii. (1875) 448 = *Benthamiana*.
barbata, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 336 = *heraclea*.
barbigera, Viv. Fl. Cors. App. ii. 4 = *heraclea*.
Benthamiana, Boiss. Fl. Orient. iv. 734.—Persia.
betaefolia, Pers. Syn. ii. 124.—Hab. ?
Betonica, Benth. Lab. Gen. et Sp. 532.—Europ.; As. Min.
Betonica, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. iv. 264 = *annua*.
Betonica, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 411 = *recta*.
betonicaeflora, Rupr. Sert. Tiansch. 66.—Turkestan.
betonicaefolia, Desf. in Ann. Mus. Par. x. (1807) 304 = *spinulosa*.
betonicaefolia, Pers. Syn. ii. 124 = *heraclea*.
betonicifolia, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 366 = *betonicaeflora*.
biennis, Hort. Hafn. ex Benth. in DC. Prod. xii. 464 = *lanata*.
biennis, Roth, in Ustcri, Ann. Bot. xiv. (1795) 27 = *germanica*.
biflora, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 155 (sp. dub.).—Calif.
Bigelovii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 371.—Texas; Am. bor.
bithynica, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 28 = *germanica*.
Bodeana, Bunge, Lab. Pers. 71 = *tomentosa*.
bogotensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 309.—N. Granat.
bombicina, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 79.—Syria.
boraginoides, Benth. Lab. Gen. et Sp. 540 = *Lindenii*.
boraginoides, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 100.—Mexic.
brachiata, Boj. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 547.—Madag.
brachyclada, Noé, ex Coss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 226; et in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 583 = *annua*.
Brantii, Benth. in DC. Prod. xii. 463.—Kurdistan.
Brantii, Huet, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 722 = *Huetii*.
brasiliensis, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 550 = *arvensis*.
Bridgesii, Benth. l. c. 546.—Chili.
Bufonia, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 295 = *recta*.
bullata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 547.—Calif.
Burchellii, Benth. l. c. 561.—Afr. austr.
burgsdorffoides, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 85.—Syria; Mesopot.
byzantina, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 686 = *lanata*.
caffra, E. Mey. ex Benth. in DC. Prod. xii. 495.—Afr. austr.
californica, Benth. l. c. 469.—Calif.
calycantha, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 393 = *lavandulaefolia*.
canariensis, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. 11. t. 108 = *sylvatica*.
candida, Benth. Lab. Gen. et Sp. 547, partim = *mollis*.
candida, Bory & Chaub. Expéd. Mor. 167. t. 19.—Graecia.
candidissima, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 19.—Chili.
canescens, Bory & Chaub. Expéd. Mor. 167. t. 18.—Graecia.
capensis, Presl, Bot. Bemerk. 100.—Afr. austr.
cardinalis, Kunze, in Bot. Zeit. ii. (1844) 645 = *coccinea*, Jacq.
cassia, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 74.—Macedon.; Syria.
caucasica, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 693 = *iberica*.
Chamaesideritis, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 41 = *citrina*.
Chamissonis, Benth. in Linnaea, vi. (1831) 80.—Calif.
chinensis, Bunge, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 544.—China.
chontica, Hook. f. Fl. Antarct. 336.—Chili.

STACHYS:—

chrysantha, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I. vii.* 56.—Graecia.
ciliaris, Boiss. l. c. xii. 78 = libanotica.
ciliata, Dougl. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 539.—Am. bor. occ.
cilicica, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II. iv.* 42 = annua.
cinerea, Hort. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 536 = germanica.
circinata, L'Hérit. *Stirp. Nov.* 51. t. 26.—Hispan.; Afr. bor.
citrina, Boiss. & Heldr. ex Benth. in DC. *Prod.* xii. 490.—Graecia; As. Min.
coccinea, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 156 = bullata.
coccinea, Jacq. *Hort. Schoenb.* iii. 18. t. 284.—Texas; Mexic.
coccinea, Ortega, *Hort. Matr. Dec.* 20.—Cuba.
coerulea, Burch. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 558.—Afr. austr.
congesta, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 324 = iberica.
cordata, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 80 = sylvatica.
cordata, Riddell, *Suppl. Cat. Ohio Pl.* 15.—Am. bor.
cordato-folia, Gilib. *Exercit. i.* 91 = sylvatica.
cordifolia, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 685.—Oriens.
corsica, Pers. *Syn.* ii. 36.—Reg. Mediterr.
crenata, Rafin. *Fl. Ludov.* 42 (Quid ?).—Am. bor.
cretica, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab. p.* xxviii = orientalis.
cretica, Linn. *Sp. Pl.* 581 = germanica, alpina.
cretica, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* vi. 47. t. 558.—Graec.; As. Min.; Syria.
cretica, Sieber, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 718 = Tournefortii.
crispa, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 58 (Quid ?).—Gallia.
cuneata, Banks, ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 560.—Afr. austr.
curviflora, Tausch, in *Flora*, xiv. (1831) 216 = alpina.
Cydni, Kotschy, ex Tchihatch. *Asie Min. Bot.* ii. 173, nomen.—As. Min.
dasyanthos, Heldr. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 721 = Heldreichii.
dasyanthos, Rafin. *Préc. Découv.* 39.—Sicil.
debilis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 234.—Madag.
debilis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 309.—Ecuador.
decumbentata, Forst. f. *Prod.* 91 = Leucas flaccida.
decumbens, Pers. *Syn.* ii. 123 = mollissima.
decumbens, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 318 = recta.
decumbens, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 41 = pubescens.
delphinensis, Jord. *Cat. Jard. Bot. Grenoble* (1853), 12; et in F. Schultz, *Arch. Fl. Fr. et Allem.* 322 = recta.
densiflora, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 532.—Europ. austr.
denticulata, Burch. ex Benth. l. c. 560.—Afr. austr.
deserti, Benth. in DC. *Prod.* xii. 494 = rugosa.
diffusa, Schweigg. *Enum. Pl. Hort. Regiom.* 69 = arenaria.
discolor, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 533.—Reg. Cauc.
distans, Benth. in DC. *Prod.* xii. 472.—Syria.
divaricata, Viv. *Fl. Cors. App.* 2 = hirta.
diversifolia, Boiss. *Diagn. Ser. I. xii.* 80.—Syria.
Dregeana, Benth. in E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 240.—Afr. austr.
Drummondii, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 551.—Texas; Mexic.
Durandiana, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 256.—Maroc.
Duriaei, Noé, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 583.—Afr. bor.
Ehrenbergii, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 721.—Syria.
elata, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 687 = spectabilis.
elliptica, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 308.—Ecuador.
elliptica, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 193.—Chili.
elliptica, Poepp. ex Benth. in DC. *Prod.* xii. 473 = grandidentata.
elongata, Hort. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 536 = germanica.
erecta, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 691 = recta.
eriantha, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 549.—Mexic.
eriroleuca, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 305.—Alger.

STACHYS:—

excelsa, Hort. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 536 = germanica.
excelsa, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. 11. (1844) 194 = Keerlii.
flavescens, Benth. in E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 241.—Afr. austr.
floccosa, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 739.—Reg. Himal.
floribunda, Montbr. & Auch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* vi. (1836) 51 = pumila.
floridana, Shuttll. ex Benth. in DC. *Prod.* xii. 478.—Florida.
fluminensis, Vell. *Fl. Flum.* 241; vi. t. 1 = Leucas martinicensis.
Foeniculum, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 407 = Lophanthus anisatus.
foetida, Gueldest. ex Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 413 = sylvatica.
foetida, Vitm. in *Colla. Herb. Pedem.* iv. 449.—Hab. ?
foliosa, Benth. in E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 241 = rugosa.
foliosa, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 366 = betonicaeflora.
fragilis, Vis. *Fl. Dalm.* ii. 207, in obs. t. 16. f. 1 = recta.
fruticulosa, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 51.—Reg. Cauc.; Persia.
fusca, Moench, *Meth. Suppl.* 136 = alpina.
Galeottii, Martens, in *Bull. Acad. Brux.* xi. 11. (1844) 192.—Mexic.
garana, Boiss. *Diagn. Ser. I. xii.* 76 = cretica.
gariepina, Benth. in DC. *Prod.* xii. 493.—Afr. austr.
germanica, Linn. *Sp. Pl.* 581.—Europ.; Afr. bor.
Gilliesii, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 740.—Chili.
glabra, Riddell, *Suppl. Cat. Ohio Pl.* 16 = aspera.
glaucescens, Mussin. ex Spreng. *Syst.* ii. 736 = sylvatica.
glutinosa, Linn. *Sp. Pl.* 581.—Reg. Mediterr.
glutinosa, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 409 = recta.
graciliflora, Presl, *Bot. Bemerck.* 100.—Afr. austr.
graeca, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I. xii.* 77.—Graecia.
Grahami, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 551 = agraria.
grandidentata, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1080.—Chili.
grandiflora, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 533.—As. Min.; Persia.
grandiflora, Host, *Fl. Austr.* ii. 169 = menthaefolia.
grandifolia, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 239.—Afr. austr.
Guyoniana, Noé, ex Munby, *Cat. Pl. Alger.* 24, nomen.—Alger.
Hauscknechtii, Vatke, in *Bot. Zeit.* xxxiii. (1875) 461 = Kotschy.
Haynaldi, Janka, ex Nym. *Consp.* 580 = angustifolia.
Heldreichii, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 721.—Graec.; Byzant.
heraclea, All. *Fl. Pedem.* i. 31. t. 84.—Europ. austr.
heraclea, Botan. Graec. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 723 = graeca.
heraclea, Webb, ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 624 = germanica.
heterophylla, Moench, *Meth. Suppl.* 135 = germanica.
Hildebrandtii, Vatke, in *Linnaea*, xliii. (1880–82) 95.—Afr. trop.
hirsuta, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 308.—Mexic.
hirta, Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. v. 1086 = arenaria.
hirta, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 813.—Reg. Mediterr.
hirtula, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 305 = hirta.
hispanica, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 6 = germanica ?
hispidula, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 407 = aspera.
hi-pidula, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 66.—Afr. austr.
Huetii, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 722.—Armenia.
humifusa, Burch. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 547.—Afr. austr.
hybrida x, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii–xxiv. (1880) 102.—Europ.
hydrophila, Boiss. *Diagn. Ser. I. xii.* 81.—Syria.
hypoleuca, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 197 = palaestina.
hypoleuca, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 688 = spectabilis.

STACHYS:—

hyssopifolia, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 4.—Am. bor.
hyssopifolia, Vahl, ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 559 = rugosa.
hyssopoides, Burch. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 558.—Afr. austr.
iberica, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 51.—As. Min.; Syria.
inflata, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 562.—Mesopot.; Persia.
inscripta, Reichb. *IC. Bot. Exot.* i. 28. t. 40 = hirta.
integrifolia, Vahl, ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 562.—Afr. austr.
intermedia, Ait. *Hort. Kew. ed. I. ii.* 301 = germanica.
intermedia, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* p. xxxiv = heraclea.
italica, Benth. ex Nym. *Consp.* 577, partim = dasyanthos.
italica, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 3.—Reg. Mediterr.
italica, Orph. ex Nym. *Consp.* 578 = cretica.
italica, Reichb. ex Nym. l. c. = Janiana.
Iva, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 143.—Macedon.
ixodes, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 738.—Persia.
Janiana, Ces. *Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital.* 318.—Europ.
japonica, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 111.—Japon.
jugalis, Burch. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 562 = rugosa.
Keerlii, Benth. l. c. 551.—Mexic.
Kotschy, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I. v.* 32.—Kurdistan.
Kraussii, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 66.—Afr. austr.
kurdica, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I. v.* 31 = subnuda.
labiosa, Bertol. *Fl. Ital.* vi. 166 = subcrenata.
laetevirens, Kotschy & Boiss. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 734 = viscosa.
Lamarckii, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 562.—Afr. austr.
lamiiflora, Rupr. *Sert. Tiansch.* 67.—As. centr.
lamioides, Benth. *Pl. Hartw.* 244.—N. Granat.
lanata, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. II. fasc. iv. 267 = germanica.
lanata, Jacq. *IC. Pl. Rar.* i. 11. t. 107.—Byzant.; Reg. Cauc.; Persia.
lanata, Moench, *Meth.* 397 = palaestina.
lasiantha, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 628, sphalm. = dasyanthos.
latifolia, Ait. *Hort. Kew. ed. I. ii.* 303 = circinata.
lavandulaefolia, Vahl, *Symb. Bot.* i. 42.—Reg. Cauc.; As. Min.; Persia.
laxa, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 179.—Persia.
lavica, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 745 = pubescens.
leucoglossa, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 140 = recta.
libanotica, Benth. in DC. *Prod.* xii. 462.—Syria.
Lindenii, Benth. l. c. 467.—Mexic.
linearifolia, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 692 = recta.
linearis, Burch. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 559 = rugosa.
longespicata, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 725.—As. Min.; Syria.
longiflora, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II. iv.* 39.—Cilicia.
longifolia, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 533.—Reg. Cauc.
longifolia, Bert. ex Steud. *Nom. ed. II. ii.* 628 = sideritoides.
longifolia, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1818) 356, nomen (sphalm. Staely longifolia) (Quid ?).—Am. bor.
lunata, Pall. *Fl. Ross. (Index Tomi ii. I.)*.—Rossia.
lusitanica, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélop.* 37 = graeca.
lusitanica, Steud. *Nom. ed. I.* 806 = germanica.
Lyallii, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 548.—Madag.
lycopsiformis, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 692 = setifera.
macedonica, D. Don, ex Steud. *Nom. ed. II. ii.* 628; et ex Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 143 = mollis.
macilenta, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 240.—Afr. austr.
Macraei, Benth. in *Linnaea*, vi. (1831) 78.—Chili.

STACHYS:—

macrocheilos, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 30 = fruticulosa.
macrosperma, Boiss. l. c. xii. 84 = arabica.
major, Uspensky, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vii. (1834) 376, nomen.—Rossia.
maritima, Linn. Mant. i. 82.—Europ. austr.
maritima, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 324 = pubescens.
marrubiifolia, Viv. Fl. Cors. App. 2.—Ins. Corsic.; Afr. bor.
mauritanica, Pers. Syn. ii. 123 = Anisomeles malabarica.
Maweana, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 626.—Marocc.
mediterranea, Vell. Fl. Flum. 241; vi. t. 2 = Leonotis nepetaefolia.
melissaefolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 538.—Reg. Himal.
menthaefolia, Vis. in Flora, xii. (1829) i. Erg. 14.—Dalmat.
menthoides, Kotschy & Boiss. in Fl. Orient. iv. 727.—Armenia.
mersinaea, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 37 = cretica.
messeniaca, Boiss. in DC. Prod. xii. 475.—Graecia.
mexicana, Benth. Lab. Gen. et Sp. 541.—Mexic.
Meyeni, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 520.—Chili.
Meyenii, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 875.—Peruv.
Mialhesii, Nol. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 584.—Alger.
micrantha, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 275.—Reg. Argent.
micrantha, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 690 = annua.
modica, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 292.—China.
mollis, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 335; et in DC. Prod. xii. 475.—Marocc.
mollissima, Willd. Hort. Berol. 60. t. 60.—Graecia.
Montbretii, Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 48 = orientalis.
mucronata, Sieber, ex Spreng. Syst. ii. 733.—Ins. Creta.
multicaulis, Benth. in DC. Prod. xii. 486.—Persia.
multiflora, Benth. l. c. 492.—Afr. austr.
natalensis, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 65.—Afr. austr.
nepetaefolia, Cav. Desc. 74.—Hab. ?
nepetifolia, Desf. Tabl. ed. I. 60, nomen; et ex Pers. Syn. ii. 123.—Mexic.
nervosa, Gater. Desc. Pl. Montaub. 107 = annua.
neurocalycina, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 85.—Syria.
nigricans, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 238.—Afr. austr.
nitens, Yanka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 597.—Europ. austr.
nivea, Benth. in DC. Prod. xii. 461, in syn. = discolor.
nivea, Labill. Ic. Pl. Syr. iii. 5. t. 3.—Syria.
nova, Sadler, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 319 = germanica.
numidica, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 117 = circinata.
nutans, Benth. Lab. Gen. et Sp. 561.—Afr. austr.
Nuttallii, Shutt. ex Benth. in DC. Prod. xii. 469 = cordata.
obliqua, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 142 = orientalis.
oblongifolia, Wall. Cat. n. 2076; Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 64.—Ind. or.
obscura, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 43 = arabica.
obtusata, Boiss. Fl. Orient. iv. 720 = germanica.
obtusirena, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 57.—Persia.
ochroleuca, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 192.—Chili.
ochroleuca, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 119 = Duriaei.
officinalis, Franch. Fl. Loir-et-Cher, 483 = S. Betonica.
oligantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 233.—Madag.
olympica, Poir. Encyc. Suppl. v. 226 = lanata.
orientalis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxviii = affinis.
orientalis, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 536 = germanica.
orientalis, Linn. Sp. Pl. 582 = alpina.
orientalis, Vahl, Symb. Bot. ii. 64.—Europ. or.; As. Min.
palaestina, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1674.—Syria.

STACHYS:—

palaestina, Vahl, Symb. Bot. ii. 64 = affinis.
pallida, Salisb. Prod. 83 = circinata.
palustris, Linn. Sp. Pl. 580.—Reg. bor. temp.
palustris, Walt. Fl. Carol. 162 = hyssopifolia.
paniculata, Benth. in DC. Prod. xii. 485 = Sideritis lanata.
pannonica, Láng, ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 291 = germanica.
Parolinii, Vis. in Mem. Ist. Venet. i. 1842 (1843) 46. t. 4.—Graecia.
parviflora, Benth. in DC. Prod. xii. 490.—Ind. bor. occ.; Afghan.
parvifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 193.—Mexic.
patens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 88 = Hyptis verticillata.
patula, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 142 = recta.
pauciflora, Benth. Lab. Gen. et Sp. 560 = affinis.
pauciflora, Vis. in Mem. Ist. Venet. i. 1842 (1843) 46. t. 2. f. 2 = orientalis.
penicillata, Heldr. & Sart. ex Nym. Consp. 577 = Heldreichii.
penicillata, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 37 = germanica.
persepolitana, Boiss. l. c. Ser. I. vii. 56.—Persia.
persica, S. G. Gmel. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 94.—Persia.
peruviana, Domb. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 551.—Peruv.
phlomidoides, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 41 = heraclea.
pilifera, Benth. in DC. Prod. xii. 487.—Persia.
pilosa, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 48.—Am. bor.
pilosissima, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 194.—Mexic.
Pinardi, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 29.—Caria.
pinetorum, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 36.—Cilicia.
pisidica, Boiss. & Heldr. l. c. Ser. I. xii. 75 = germanica.
plebeia, Vatke, in Bot. Zeit. xxxiii. (1875) 449 = Benthamiana.
plumosa, Benth. in DC. Prod. xii. 492 = aurea.
plumosa, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 139 = recta.
Poiretii, Tenore, Syll. Fl. Neap. 538 = marrubiifolia.
polystachya, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxiv = germanica.
Prattenii, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 100.—Calif.
procumbens, Lam. Fl. Fr. ii. 385 = recta.
procumbens, Poepp. ex Benth. in DC. Prod. xii. 473 = grandidentata.
procumbens, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 336 = pubescens.
prostrata, Lag. ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. II. (1823) 455 = arenaria.
pubescens, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxiv.—Europ. austr.; Oriens.
pulchella, Salisb. Prod. 83 = aethiopica.
pulchra, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 119 = Duriaei.
pumila, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 255.—Syria.
pungens, [Soland. in] Rnss. l. c. = italica.
purpurea, Poir. Encyc. Suppl. v. 227 = arenaria.
pycnantha, Benth. Pl. Hartw. 331.—Calif.
pycnostachya, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 408 = albens.
quadridentata, Bert. ex Benth. in DC. Prod. xii. 473 = Macraei.
ramosissima, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 50.—Mesopot.
ramosissima, Rochel, Pl. Banat. Rar. 26, nomen; et Bot. Reise Bannat, 82 = recta.
recta, Linn. Mant. i. 82.—Europ. austr.; Reg. Cauc.
recta, Parol. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. i. 1842 (1843) 47 = Parolinii.
recta, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 324 = angustifolia.
Reinerti, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 720 = germanica.
repens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 194.—Mexic.
repens, Schur, Enum. Pl. Transs. 538 = setifera.
revoluta, Rafn. Atl. Journ. 148 (Quid ?)—Am. bor.
Riederi, Benth. in Linnaea, vi. (1831) 570 = ciliata.

STACHYS:—

rigida, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xii. 472 = bullata.
rosea, Boiss. Fl. Orient. iv. 725.—Oriens.
rosea, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 300 = germanica.
rosmarinifolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 559 = rugosa.
Rothrockii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 82.—N. Mexic.
rotundifolia, Moc. & Sesse, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 548.—Mexic.
rubra, Donn, Hort. Cantab. ed. IV. 136 = arenaria.
rugosa, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 303.—Afr. austr.
rugosa, Lam. Illustr. iii. 66. t. 509. f. 3 = Lamarckii.
rupestris, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 49.—Cilicia.
rupicola, Boj. ex Benth. in DC. Prod. xii. 477.—Madag.
Salisii, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 92 = marrubiifolia.
Salviae, Lindl. Bot. Reg. t. 1226 = Sphacele Lindleyi.
salviaefolia, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxiv; Fl. Nap. ii. 25 = italica.
satureioides, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 51.—Syria; Mesopot.
saxicola, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 257.—Marocc.
scaberula, Vatke, in Bot. Zeit. xxxiii. (1875) 462.—Reg. Himal.
scardica, Griseb. Reise Rumel. ii. 263 = graeca.
Schiedeana, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 398.—Mexic.
Schimperi, Vatke, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 330.—Abyss.
scordifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 616 = arenaria.
scordioides, Desf. Tabl. ed. I. 219 = mollis.
scordioides, Poir. Encyc. vii. 373.—Afr. bor.
scyronica, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 31 = Swainsoni.
segetum, Hagen, Chloris Boruss. 218 = palustris.
serbica, Panč. ex Nym. Consp. 579, nomen.—Serbia.
sericea, Cav. Desc. 75.—Chili.
sericea, Ledeb. Fl. Ross. iii. 412 = persica.
sericea, Wall. Pl. As. Rar. i. 64.—Reg. Himal.; As. bor.
serrata, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 500.—Chili.
serrulata, Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 549.—Afr. austr.
sessiliflora, Rafn. Atl. Journ. 148 (Quid ?)—Am. bor.
sessilifolia, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 239.—Afr. austr.
setifera, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 94.—As. Min.; Persia; Afghan.
sibirica, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 109 = germanica.
sideritoides, Gill. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 740.—Chili.
sideritoides, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 692 = recta.
Sideritis, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 375 = recta.
Sieberi, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 685 = Tournefortii.
Sieboldi, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 112.—Japan.
spathulata, Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 559.—Afr. austr.
speciosa, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 235 = Gardoquia elliptica.
spectabilis, Choisy, ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. II. (1823) 457.—Armen.; Persia.
sphaerodonta, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 233.—Madag.
spinosa, Linn. Sp. Pl. 581.—Ins. Creta.
spinulosa, Herb. Madrit. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 441 = heraclea.
spinulosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 410.—Europ. austr. or.
splendens, Wall. Pl. As. Rar. i. 64 = melissaefolia, sericea.
Spreitzenhoferi, Heldr. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 344.—Ins. Cerigo.
Spruneri, Boiss. in DC. Prod. xii. 488.—Graecia.
stenophylla, Spreng. Nov. Prov. 40 = recta ?
stenostachya, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 41 = iberica.
subcrenata, Vis. in Flora, xii. (1829) i. Erg. 15.—Dalmatia.
sublanata, Fleischm. ex Nym. Consp. 577 = germanica.
subnuda, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 50.—Kurdist.

STACHYS:—

- subsessilis, *Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 548.—Afr. austr.
 Swainsoni, *Benth. l. c.* 535.—Graecia.
 Swainsoni, Sprun. ex Nym. Consp. 580 = Spruneri.
 sylvatica, *Linn. Sp. Pl.* 580.—Europ.; Reg. Himal.; As. bor.
 sylvatica, Nutt. Gen. Am. ii. 30 = cordata.
 sylvatica, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 408 = bullata.
 sylvestris, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. xxviii = recta.
 tenuifolia, *Fisch. ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève.* i. 11. (1823) 454.—Rossia.
 tenuifolia, *Fanka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 180.—Turcia.
 tenuifolia, Pall. in Link, Enum. Hort. Berol. ii. 109 = angustifolia.
 tenuifolia, Willd. Sp. Pl. iii. 100 = aspera.
 tetragona, *Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 736.—Graecia.
 teucriifolia, *Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II.* iv. 40 = distans.
 Thirkei, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. (1848) 685.—As. Min.
 Thunbergii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 540.—Afr. austr. tibetica, *Vatke, in Bot. Zeitschr.* xxxiii. (1875) 447.—Reg. Himal.
 tmolea, *Boiss. Diagn. Ser. I.* v. 29.—As. Min.
 tomentosa, *Benth. in DC. Prod.* xii. 489.—Persia.
 tomentosa, Bunge, Lab. Pers. 71 = lavandulaefolia.
 tomentosa, Gater. Desc. Pl. Montaub. 107 = germanica.
 Toronjilillo, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 193.—Chili.
 Tournefortii, *Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopo.* 37 = messeniaca.
 Tournefortii, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 227.—Ins. Creta.
 transsilvanica, Schur, Enum. Pl. Transs. 539 = recta.
 trapezuntea, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iv. 38 = sylvatica.
 triloba, *Stokes, Bot. Mat. Med.* iii. 329 = Leonurus Cardiaca.
 truncata, *Kunze, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 550.—Chili.
 umbrosa, *Scheele, in Linnaea*, xxii. (1849) 595.—Texas.
 urticaefolia, *Tausch, in Flora*, xiv. (1831) 1. 216 = alpina.
 valentina, *Lag. in Varied. Cienc.* ii. iv. (1805) 39 = heraclea.
 velutina, *Schwein. in Long, Exped. Winnep.* ii. 390 = palustris.
 velutina, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 41 = circinata.
 venosa, *Pers. Syn.* ii. 123.—Hab. ?
 verbascifolia, *Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 536 = germanica.
 vestita, *Benth. l. c.* 538 = sericea.
 virgata, *Bory & Chaub. Expéd. Mor.* 166. t. 17.—Graecia.
 viridis, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II.* iv. 39.—Graecia.
 viscosa, *Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. vi. (1836) 49.—Armenia.
 viticina, *Boiss. Diagn. Ser. I.* xii. 77.—Syria.
 Volckmanni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 519.—Chili.
 Wirtgenii ×, *F. Schultz, in Pollichia*, xviii–xix. (1861) 117.—Europ.
 Zuccarinii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 535 = virgata.

STACHYSTEMON, *Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 471. t. 15. *EUPHORBACEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 263.
 brachyphyllus, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxii. (1863) 76.—Austral.
 polyandrus, *Benth. Fl. Austral.* vi. 62.—Austral.
 vermicularis, *Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 472. t. 15.—Austral.

STACHYTARPHA, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 18 (1821) = seq.

STACHYTARPHETA, *Vahl, Enum.* i. 205 (1805). *VERBENACEAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 1145.
 ARENA, *Neck. Elem.* i. 296 (1790).
 CYMBURUS, *Salisb. Parad. Lond.* tt. 49, 53 (1806).
 MELASANTHUS, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* i. 75. tt. 60–65 (1827).
 STACHYTARPHA, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 18 (1827).

STACHYTARPHETA:—

- TARPHETA, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 103 (1836).
 VALERIANOIDES, *Medic. Phil. Bot.* i. 177 (1789), nomen prius.
 VERMICULARIA, *Moench, Meth. Suppl.* 150 (1802).
 acuminata, *DC. ex Schau. in DC. Prod.* xi. 570.—Mexic.
 ajugaeifolia, *Schau. l. c.*—Bras.
 albiflora, *DC. ex Schau. l. c.* 567.—Mexic.
 angustifolia, *Vahl, Enum.* i. 205.—Guian.
 aristata, *Vahl, l. c.* 206 = orubica.
 asperrima, *Walp. Rep.* iv. 8, sphalm = scaberrima.
 bicolor, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5538.—Bras.
 bifurca, *Benth. Pl. Hartw.* 21 = Bouchea Ehrenbergii.
 bogoriensis, *Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll.* 52.—Java.
 bracteosa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) 11. 198.—N. Granat.
 cajanensis, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 243 = dichotoma.
 cajanensis, *Vahl, Enum.* i. 208.—Am. trop.
 canescens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 281.—Peruv.
 cayennensis, *Schau. in DC. Prod.* xi. 562 = cajanensis.
 Chamissonis, *Walp. Rep.* iv. 10.—Bras.
 ciliata, *Kunze, Del. Sem. Hort. Lips.* (1840) 9, in Adnot. = indica.
 coccinea, *Schau. in DC. Prod.* xi. 567.—Bras.
 commutata, *Schau. l. c.* 570.—Bras.
 crassifolia, *Schrad. in Goett. Gel. Anz.* i. (1821) 709.—Bras.
 dichotoma, *Vahl, Enum.* i. 207.—Am. trop.
 discolor, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 251.—Bras.
 elatior, *Schrad. ex Schult. Mant.* i. 172.—Bras.; Guian.
 elegans, *Welw. Apont.* 588 = mutabilis.
 Frantzi, *Polak. in Linnaea*, xli. (1877) 593.—Costa Rica.
 gesnerioides, *Cham. l. c.* vii. (1832) 245.—Bras.
 gibberosa, *Reichb. Ic. Bot. Exot.* ii. 15. t. 138 = dichotoma.
 glabra, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 250.—Bras.
 glauca, *Walp. Rep.* iv. 11; *Schau. in DC. Prod.* xi. 569.—Bras.
 goyazensis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) 11. 198.—Bras.
 Hildebrandtii, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 529.—Afr. trop.
 hirsuta, *Jacq. f. Eclog. Pl.* ii. 10. t. 160 = canescens.
 hirsutissima, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 19 = canescens.
 hirta, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 280 = cajanensis.
 hispida, *Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 69.—Bras.
 indica, *Vahl, Enum.* i. 206.—Cosmop. trop.
 integrifolia, *Walp. Rep.* iv. 10 = glauca.
 jamaicensis, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 184 = dichotoma.
 jamaicensis, *Vahl, Enum.* i. 206 = indica.
 lactea, *Schau. in DC. Prod.* xi. 562.—Bras.
 lacunosa, *Mart. ex Schau. l. c.* 571.—Bras.
 lanata, *Schau. l. c.*—Bras.
 laxiflora, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) 11. 199.—N. Granat.
 longiflora, *Turcz. l. c.* 197.—Hab. ?
 Lychnitis, *Mart. ex Schau. in DC. Prod.* xi. 571.—Bras.
 lythrophylla, *Schau. l. c.* 563.—Bras.
 marginata, *Vahl, Enum.* i. 207 = indica.
 Martiana, *Schau. in DC. Prod.* xi. 568.—Bras.
 Maximiliani, *Schau. l. c.* 565.—Bras.
 microphylla, *Walp. Rep.* iv. 6 = sanguinea.
 mutabilis, *Vahl, Enum.* i. 208.—Ind. occ.; Venezuela.
 orubica, *Vahl, l. c.*—N. Granat.
 pachystachya, *Mart. ex Schau. in DC. Prod.* xi. 569.—Bras.
 palustris, *Schott, Cat. Hort. Vindob.* (1823) = elatior.
 pilosiuscula, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 279 = indica.
 Pohlana, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 248.—Bras.
 polyura, *Schau. in DC. Prod.* xi. 562.—Bras.
 prismatica, *Vahl, Enum.* i. 209 = Bouchea Ehrenbergii.

STACHYTARPHETA:—

- Pseudochascanum*, *Walp. Rep.* iv. 11 = Bouchea laetevirens.
 quadrangula, *Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 69.—Bras.
 reticulata, *Mart. ex Schau. in DC. Prod.* xi. 566.—Bras.
 rhomboidalis, *Walp. Rep.* iv. 10; *Schau. l. c.* 569.—Bras.
 rotundifolia, *Link, ex Walp. Rep.* iv. 5 = canescens.
 sanguinea, *Mart. ex Schau. in DC. Prod.* xi. 564.—Bras.
 scaberrima, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 244.—Bras.
 Schottiana, *Schau. in DC. Prod.* xi. 563.—Bras.
 Sellowiana, *Schau. l. c.* 571.—Bras.
 speciosa, *Pohl, ex Schau. l. c.* 568.—Bras.
 squamosa, *Vahl, Enum.* i. 209 = Elytraria tridentata.
 strigosa, *Vahl, l. c.* 207.—Mexic.; Ind. occ.
 subincisa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) 11. 198.—Cuba.
 triphylla, *Walp. Rep.* iv. 10 = rhomboidalis.
 trispicata, *Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 70.—Bras.
 umbrosa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 280 = dichotoma.
 urticifolia, *Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. Suppl.* 68 = indica.
 urticifolia, *Sims, Bot. Mag.* t. 1848 = dichotoma.
 veronicaefolia, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 246 = cajanensis.
 villosa, *Cham. l. c.* 247 = commutata.
 villosa, *Schau. in DC. Prod.* xi. 570.—Bras.
 villosa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) 11. 197 = indica.
 viscidula, *Schau. in DC. Prod.* xi. 570.—Bras.
 Zuccagni, *Roem. & Schult. Syst.* i. 205 = mutabilis.

STACHYURUS, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap.* i. 42. t. 18 (1835). *TERNSTROEMIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 184.
 himalaicus, *Hook. f. & Thoms. ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 55.—Reg. Himal.
 japonicus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 630, sphalm. = seq.
 praecox, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap.* i. 43.—Japan.

STACHYUS, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 109 = *Stachys*, *Tourn. (Labiati).*

STACKHOUSIA, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* iv. (1798) 218. *STACKHOUSIEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 371.

PLOKIOSTIGMA, *Schuch. in Linnaea*, xxvi. (1853–55) 39.
TRIPTEROCOCCUS, *Endl. in Enum. Pl. Hueg.* 17 (1837).

- aspericocca, *Schuch. in Linnaea*, xxvi. (1853–55) 12 = monogyna.
 Brunonis, *Benth. Fl. Austral.* i. 409.—Austral.
 cuneata, *A. Cunn. ex Hook. f. Fl. Tasm.* i. 79 = spathulata.
 doryopetala, *Schuch. in Linnaea*, xxvi. (1853–55) 24 = viminea.
 elata, *F. Muell. Fragm.* iii. 86 = viminea.
 flava, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* t. 269.—Austral.
 Gunniana, *Schuch. in Linnaea*, xxvi. (1853–55) 18 = monogyna.
 Gunnii, *Hook. f. Fl. Tasm.* i. 79 = monogyna.
 Huegelii, *Endl. in Enum. Pl. Hueg.* 17.—Austral.
 linariifolia, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales*, 356 = monogyna.
 lutea, *Herb. Sond. ex Schuch. in Linnaea*, xxvi. (1853–55) 8 = monogyna.
 maculata, *Sieber, ex Hook. f. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 421 = spathulata.
 megaloptera, *F. Muell. Fragm.* viii. 35.—Austral.
 minima, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 47.—N. Zel.
 monogyna, *Labill. Nov. Holl. Pl.* i. 77. t. 104.—Austral.
 monogyna, *Labill. l. c.*, partim = spathulata.
 monogyna, *Sieber, ex Benth. Fl. Austral.* i. 408 = viminea.
 Muelleri, *Schuch. in Linnaea*, xxvi. (1853–55) 16 = monogyna.

STACKHOSIA :—

muricata, Ldl. Bot. Reg. sub t. 1917.—Austral.
nuda, Lindl. c. = *viminea*.
obtusa, Lincl. c. = *monogyna*.
pubescens, Rich. Sert. Astrolab. 89. t. 33.—Anstral.
pulvinaris, Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i.
 (1855) 10.—Austral.
scoparia, Béh. Fl. Austral. i. 409.—Austral.
spathulata, Zber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 124.
 —Austral.
viminea, Snin Rees, Cycl. xxxiii. n. 1.—Austral.

STADMANIA, Lam. Illustr. ii. 443 (1793).

SAPINDACEAE, Benth. & Hook. f. i. 406.
australis, Cunn. ex Hook. Bot. Mag. sub t. 4470 =
Diplogloss Cunninghamii.
australis, Don, Gen. Syst. i. 669 = *Melicocca*
australis.
bahiensis, Liden, Cat. n. 18. (1863) 10.—Bras.
bijuga, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1304 = *Melicocca bijuga*.
dentata, D. Dietr. l. c. 1305 = *Melicocca dentata*.
diversifolia, Spreng. Syst. ii. 243 = *Doratoxylon*
diversifolium.
Frazeri, Liden, Cat. n. 17 (1861) 10.—Hab.?
frigida, Liden, l. c. = *Giesbrechtii*.
Giesbrechtii, Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap.
 112, nom.—Bras.?
integrifolia, Liden, Cat. n. 17 (1862) 10.—Bras.
Jonghii, Liden, l. c.—Hab.?
Liboniana, Liden, l. c. n. 18. (1863) 10.—Bras.
macrophyll, Liden, l. c.—Bras.?
oliveaform, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1305 = *Talisia*
oliveaformis.
oppositifol, Lam. Illustr. ii. 443; Encyc. vii. 376.—
 Ins. Boron.
paniculata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1305 = *Hypelate*
paniculata.
pubescens, Spreng. Syst. ii. 243 = *Schleichera trijuga*.
pulchella, Liden, Cat. n. 18. (1863) 10.—Bras.
Sideroxyle, DC. Prod. i. 615 = *oppositifolia*.
sorbifolia, Liden, Cat. n. 18. (1863) 10.—Bras.
trijuga, Spreng. Syst. ii. 243 = *Schleichera trijuga*.

STADTMANIA, Walp. Ann. ii. 215 (1851-52), sphalm.
= praec.

STAEBE, Hl. Veg. Syst. iii. 145 (1761); iv. 33 (1762)
 = *Centarea*, Linn. (Compos.).
aethiopica, Hill, l. c. iii. 145.—Afr. bor.
Cineraria, Hill, Hort. Kew. 65 = *C. Cineraria*.
paniculata, Hill, l. c. 66 = *C. paniculata*.
ragusina, Hill, l. c. = *C. ragusina*.

STAEHELINA, Linn. Syst. ed. II. 28 (1740).

COMPPOSITAE, Penth. & Hook. f. ii. 471.
ALKIBAS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 119 (1836).
APLINA, Rafin. l. c. (1836).
BARBELINA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 500, 501
 (1827).
HIRTELINA, Cass. l. c. 499, 511 (1827); et l. 441.
OCNERON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 120 (1836).
ROCCADIA, Rafin. l. c. 119 (1836).
alpina, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. vii.
 1816-17 (1820) 59 = *Saussurea alpina*.
apiculata, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. iv. 3. t. 1 = *Lobelii*.
arborescens, Linn. Mant. i. 111.—Ins. Creta; Archip.;
 Graec.
baetica, DC. Prod. vi. 544.—Hispan.
centaurodes, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 23 = *Relhania*
centauroides.
Chamaepeuce, Linn. Syst. ed. XII. 538 = *Cnicus*
Chamaepeuce.
corymbos, Thunb. Prod. Pl. Cap. 143 = *Vernonia*
corymbosa.
corymbos, Wight, ex DC. Prod. vi. 364 = *Senecio*
corymbosus.
cretica, Zacc. ex DC. Prod. vi. 658 = *Cnicus Chamaepeuce*.
dubia, Linn. Sp. Pl. 840.—Europ. austr.
elegans, Walt. Fl. Carol. 202 = *Liatris elegans*.
fasciculata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 143 = *Lachno-*
spermum ericifolium.
fimbriata, Forst. ex DC. Prod. vi. 153 = *Craspedia*
uniflora.
fruticosa, Linn. Syst. ed. XII. 538.—Ins. Creta.
gnaphaloides, Linn. Sp. Pl. 840 = *Helipterum*
gnaphaloides.
hastata, Vahl, Symb. Bot. i. 70 = *Vernonia atriplicifolia*.

STAEHELINA :—

ilicifolia, Linn. f. Suppl. 358 = *Gynoxys ilicifolia*.
imbricata, Berg. Desc. Pl. Cap. 233; Thunb. Prod. Pl.
 Cap. 143 = *Metasias uniflora*.
Lobelii, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 194.—
 Syria.
pinnata, Lag. ex Pers. Syn. ii. 391 = *Jurinea pinnata*.
rosmarinifolia, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 439 = *dubia*.
solidaginoides, Willd. ex DC. Prod. v. 41 = *Vernonia*
scorpioides.
spinosa, Vahl, Symb. Bot. i. 69 = *Iphiona juniperifolia*.
squarrosa, Rafin. Fl. Tellur. iv. 118 = *Helipterum*
gnaphaloides.
syriaca, Spreng. Syst. iii. 391 = *Lobelii*.
tenuifolia, Presl, Fl. Sic. p. xxix = *dubia*?
uniflosculosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 162.—
 Graecia.

STAEHELINIA, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 624
 (1742) = *Bartsia*, Linn. (Scrophul.).
alpina, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 294 = *B. alpina*.

STAELIA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828)
 364. t. 3. f. 3. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii.
 148.
caespitosa, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 158.—
 Reg. Argent.
galioides, DC. Prod. iv. 573.—Bras.
reflexa, DC. l. c.—Bras.
thymoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828)
 364.—Bras.

STAFLINUS, Rafin. New Fl. Am. iv. 28 (1836) =
Daucus, Tourn. (Umbell.).
crinitus, Rafin. l. c. = *D. crinitus*.
setifolius, Rafin. l. c. = *D. setifolius*.

STAGMARIA, Jack, Desc. Malay. Pl. iii. 12 (1823) ?
 = *Gluta*, Linn. (Anacard.).
verniciiflua, Jack, l. c.; et in Hook. Comp. Bot. Mag.
 i. (1835) 267 = *G. Benghas*.
verniciiflua, Wall. Cat. n. 980 = *Melanorrhoea*
Wallichii.

STAHLIA, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x.
 (1881) 255. *LEGUMINOSAE*.
maritima, Bello, l. c.—Porto Rico.

STALAGMITES, Spreng. Anleit. ii. 11. 784 (1818) = seq.

STALAGMITIS, Murr. in Comm. Gotting. ix. 1787-88
 (1789), 173 = *Garcinia*, Linn. (Guttif.).
acida, Cambess. ex Spach, Hist. Vég. Phan. v. 328 =
G. cochinchinensis.
Boobicowa, G. Don, Gen. Syst. i. 621 = *G. paniculata*?
Cambogia, Pers. Syn. ii. 68 = seq.
cambogioides, Murr. in Comm. Gotting. ix. 1787-88
 (1789) 173 = *G. spicata*.
celebica, G. Don, Gen. Syst. i. 621 = *G. cornea*.
cochinchinensis, G. Don, l. c. = *G. cochinchinensis*.
Cowa, G. Don, l. c. = *G. Cowa*.
dulcis, Cambess. in Mém. Mus. Par. xvi. (1828) 393,
 426 = *G. dulcis*.
elliptica, G. Don, Gen. Syst. i. 621 = *G. elliptica*.
erosipetala, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 126
 (sp. dub.).—China.
guineensis, G. Don, Gen. Syst. i. 621 (= *Xantho-*
chymus guineensis).—Afr. trop.
Gutta, G. Don, l. c. = *G. Cambogia*.
indica, G. Don, l. c. = *G. indica*.
javanensis, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 328 = *G.*
dulcis.
Kydiana, G. Don, Gen. Syst. i. 621 = *G. Cowa*.
lamponga, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 496 = *G.*
cymulosa.
lanceaefolia, G. Don, Gen. Syst. i. 621 = *G. lanceae-*
folia.
luteus, G. Don, l. c. (= *Xanthochymus luteus*).—
 Ind. or.
macrophylla, G. Don, l. c. (= *Xanthochymus macro-*
phyllus).—Ind. or.
nervosa, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 496 = *G. Andersoni*.
ovalifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 621 = *G. ovalifolia*.
paniculata, G. Don, l. c. = *G. paniculata*.
pictoria, G. Don, l. c. 620 = *G. Xanthochymus*.
purpurea, G. Don, l. c. 621 = *G. indica*.
spicata, Walp. Rep. i. 396 = *G. ovalifolia*.
umbellata, G. Don, Gen. Syst. i. 621.—Ind. or.

STAMMARIUM, Willd. ex DC. Prod. v. 102 (1836) =
Pectis, Linn. (Compos.).
hyssopifolium, Willd. ex DC. l. c. = *P. auricularis*.

STANFORDIA, S. Wats. in Bot. Calif. ii. 479 (1880)
CRUCIFERAE.
californica, S. Wats. l. c.—Calif.

STANGERIA, T. Moore, in Hook. Kew Journ.
 v. (1853) 228. *CYCADACEAE*, Benth. & Hook. f.
 iii. 446.
Katzeri, Regel, Gartenfl. (1874) 163. t. 798.—Afr.
 austr.
paradoxa, T. Moore, in Hook. Kew Journ. v. (1853)
 228.—Afr. austr.
schizodon, Bull. Cat. (1872) 8.—Afr. austr.

STANGGERIA, Stevens, in Proc. Linn. Soc. ii. (1854)
 340, sphalm. = praec.

STANHOPEA, Frost, ex Hook. Bot. Mag. tt. 2948,
 2949 (1829). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f.
 iii. 549.

CERATOCHILUS, Lindl. in Lodd. Bot. Cab. t. 1414
 (1828).
STANHOPEASTRUM, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852)
 927.

amoena, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx.
 (1852) 273 = *Wardii*.
atropurpurea, Lodd. ex Planch. Hort. Donat. 215 =
insignis.
aurantia, Lodd. ex P. N. Don, in Donn, Hort. Cantab.
 ed. XIII. 608 = *S. Bucephalus*.
aurata, Beer, Prakt. Orch. 310 = *graveolens*.
aurea, Lodd. ex Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 11;
 Endl. in Harting. Parad. Vindob. t. 31 = *Wardii*.
bicolor, C. Koch, Berl. Allg. Gartenz. (1857) 209,
 nomen (Quid ?)—Hab.?
Bucephalus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 157.—Mexic.
calceolata, Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 117 =
eburnea.
Calceolus, Reichb. f. l. c.—Am. centr.
candida, Rodrig. Orch. Nov. i. 101.—Bras.
Cavendishii, Lindl. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit.
 Suppl. iii. 643, nomen = *devoniensis*?
cirrha, Lindl. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 37 =
Nicaragua.
connata, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.
 xxii. (1854) 226.—Peruv.
costaricensis, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xvi. (1860)
 424.—Costa Rica.
cymbiformis, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 84. t. 124.—
 Am. centr.
deltoides, Lem. Illustr. Hortic. ix. (1862), sub t. 340.
 —Mexic.
devoniensis, Lindl. Sert. Orch. t. 1.—Mexic.
eburnea, Lindl. Bot. Reg. t. 1529.—Bras.
ecornuta, Lem. in Fl. des Serres, ii. (1846) t. 181.
 —Guatemala.
expansa, P. N. Don, in Donn, Hort. Cantab. ed. XIII.
 721; Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 120 = *tigrina*.
flava, Lodd. ex Beer, Prakt. Orch. 312 = *insignis*.
florida, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) II. 615.—
 Am. austr.
Fregeana, Reichb. f. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.
 xxiii. (1855) 313.—Mexic.
gibbosa, Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 1254.—
 Am. centr.
grandiflora, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 158 = *eburnea*.
grandiflora, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 587 =
S. Bucephalus.
graveolens, Klotzsch, ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 118
 = *connata*.
graveolens, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 59.—Peruv.
graveolens, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846)
 55. t. 54 = *oculata*.
guttata, Beer, Prakt. Orch. 312 = *S. Bucephalus*.
guttata, C. Koch, Berl. Allg. Gartenz. (1858) 364 =
 seq.
guttulata, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 75 = *oculata*.
Harrisoniae, P. N. Don, in Donn, Hort. Cantab.
 ed. XIII. 607 = *Bifrenaria Harrisoniae*.
Haselowiana, Reichb. f. in Otto & Dietr. Allg.
 Gartenz. xxiii. (1855) 322 (Haseloffiana).—Peruv.
implicata, Westcott, ex Lindl. Fol. Orchid. Stanh. 6 =
Martiana.
inodora, Lodd. Cat. n. 1147; ex Lindl. Bot. Reg.
 (1845) t. 65.—Mexic.

STANHOPEA :—

- inodora*, Reichb. f. *Xenia* Orch. ii. 157 = *graveolens*.
insignis, Frost, in *Hook. Bot. Mag.* tt. 2948, 2949.—Bras.
Jenischiana, Kramer, ex Reichb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 934 = *S. Bucephalus*.
Lindleyi, Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* ii. (1831-36) 320 = *oculata*.
lyncea, P. N. Don, in *Donn, Hort. Cantab. ed.* XIII. 608 = *devoniensis vel tigrina*.
macrochila, Lem. *Illustr. Hort.* vi. (1859) *Misc.* 71, cum ic.—Mexic.
maculosa, Knowles & Westc. *Flor. Cab.* iii. (1840) 119. t. 121 = *devoniensis*.
Marshii, Reichb. f. *Xenia* Orch. i. 120.—Guatemala.
Martiana, Lindl. *Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 50.—Mexic.
nigroviolacea, Beer, *Prakt. Orch.* 313 = *tigrina*.
oculata, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 158.—Mexic.
odoratissima, Hort. ex Planch. *Hort. Donat.* 216 = *insignis*.
ornatissima, Lem. *Illustr. Hort.* ix. (1862) t. 325.—Mexic.
platyceras, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1868) 27.—N. Granat.
pulla, Reichb. f. l. c. (1877) i. 850.—Costa Rica.
quadricornis, Lindl. *Bot. Reg.* (1838) t. 5.—Am. bor. occ.
radiosa, Lem. *Illustr. Hort.* vi. (1859) *Misc.* 72, cum ic. = *saccata*.
Reichenbachiana, Roesl, ex Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1879) ii. 40.—Reg. Andin.
Ruckeri, Lindl. *Bot. Reg.* (1843) sub t. 44.—Nicaragua.
Russelliana, Lodd. *Cat. ex P. N. Don, in Donn, Hort. Cantab. ed.* XIII. 721, nomen.—Bras.
saccata, Batem. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 15.—Guatemala.
Schilleriana, Reichb. f. *Xenia* Orch. ii. 158.—Am. centr. ?
serrata, Gard. *Chron.* (1880) i. 779 (*Ind. gen.*), sphalm. = *cirrata*.
Shuttleworthii, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1876) i. 795.—N. Granat.
tigrina, Batem. *Orch. Mex. & Guatem.* t. 7.—Mexic.
tricornis, Lindl. in *Journ. Hort. Soc.* iv. (1849) 263.—Peruv.
velata, C. Morr. in *Ann. Soc. Bot. Gand.* iii. (1847) 333. t. 153 = *Martiana*.
venusta, Lindl. *Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 11, in obs. = *Wardii*.
Wallisii, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 109.—N. Granat.
Wardii, Lodd. ex Lindl. *Sert. Orch.* t. 20.—Mexic.
Warszewicziana, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xx. (1852) 274.—Am. centr.
xytiophora, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1868) 842.—Peruv.

STANHOPEASTRUM, Reichb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 927 = *Stanhopea*, Frost (*Orchid.*).
ecornutum, Reichb. f. l. c. = *Stanhopea ecomuta*.

STANLEYA, Nutt. *Gen. Am.* ii. 21 (1818). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 80.

- PODOLOBUS*, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1819) 194.
amplexifolia, Nutt. in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* v. (1822) 297 = *Warea amplexifolia*.
cartilaginea, Spreng. *Syst.* ii. 909 = *Sisymbrium junceum*.
fruticosa, Nutt. in *Journ. Acad. Philad. N. S.* i. (1847) 180 = *pinnatifida*.
gracilis, DC. *Syst.* ii. 512 = *Warea cuneifolia*.
heterophylla, Nutt. in Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 97 = *pinnatifida*.
integrifolia, James, in Long's *Exped.* ii. 17; ex Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 166 = *pinnatifida*.
pinnatifida, Nutt. *Gen. Am.* ii. 71.—Am. bor.
tomentosa, Parry, in *Am. Natural.* viii. (1874) 212.—Am. bor. occ.
viridiflora, Nutt. in Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 98.—Am. bor. occ.
Washitana, DC. *Syst.* ii. 512 = *Streptanthus maculatus* ?

- STANNIA**, Karst. *Ausw. Neuer Gew. Venez.* 27 (1848) = *Posoqueria*, Aubl. (*Rubiaceae*).
formosa, Karst. l. c. t. 9 = *P. formosa*.
grandiflora, Karst. *Fl. Columb.* i. 31. t. 16.—N. Granat.
metensis, Karst. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 441.—Venezuela.
panamensis, Walp. & Duchass. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 755 = *P. latifolia*.
spectabilis, Klotzsch, ex Walp. & Duchass. l. c., in obs.—Hab. ?

STAPELIA, Linn. *Gen. ed.* i. 64 (1737). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 784.

- CARUNCULARIA*, Haw. *Syn. Pl. Succ.* 333 (1812).
GONOSTEMON, Haw. l. c. 27 (1812).
ORBEA, Haw. l. c. 37 (1812).
PODANTHES, Haw. l. c. 32 (1812).
TRIDENTEA, Haw. l. c. 34 (1812).
TROMOTRICHE, Haw. l. c. 36 (1812).
acuminata, Mass. *Stapel.* 15. t. 17.—Afr. austr.
adscendens, Roxb. *Pl. Corom.* i. 28. t. 30 = *Caralluma adscendens*.
ambigua, Mass. *Stapel.* 13. t. 12.—Afr. austr.
Ango, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 50 (*Carallumae* sp. ?)—Abyss.
anguinea, Jacq. *Stapel.* t. 37 = *picta*.
angulata, Todaro, *Hort. Bot. Panorm.* i. 54. t. 13. f. 3.—Afr. austr.
anonymos, Poir. *Encyc.* vii. 391 = *multangula*.
aperta, Mass. *Stapel.* 23. t. 37.—Afr. austr.
arida, Mass. *Stapel.* 21. t. 33.—Afr. austr.
articulata, Ait. *Hort. Kew. ed.* i. i. 310 = *Pectinaria articulata*.
Asterias, Mass. *Stapel.* 14. t. 14.—Afr. austr.
atrata, Todaro, *Hort. Bot. Panorm.* i. 50. t. 13. f. 1.—Afr. austr. ?
atropurpurea, Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* 372.—Afr. austr. ?
barbata, Mass. *Stapel.* 11. t. 7 = *Huernia barbata*.
Bayfieldii, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1877) i. 431. f. 66.—Hab. ?
beffoniana, Hort. ex Schult. *Syst.* vi. 49 = *variegata*.
bidentata, Hort. ex Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* 266, nomen = *variegata*.
bifolia, Hort. ex Schult. *Syst.* vi. 49 (*Quid* ?)—Hab. ?
bisulca, Donn, *Hort. Cantab. ed.* III. 43, nomen; *et ex Schult. Syst.* vi. 37.—Afr. austr.
brevirostris, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 14, nomen (*Quid* ?)—Hab. ?
bufonia, Jacq. *Stapel.* t. 35 = *variegata*.
bufonis, Sims, *Bot. Mag.* t. 1676 = *normalis*.
cactiformis, Hook. l. c. t. 4127 = *clavata*, Willd.
caespitosa, Mass. *Stapel.* 20. t. 29 = *Duvalia caespitosa*.
Callamulia, Buch.-Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 77 = *Boucerosia umbellata*.
campanulata, Mass. *Stapel.* 11 = *Huernia campanulata*.
campanulata, Pav. ex Planch. in *Fl. des Serres*, viii. (1852-53) 55, sub t. 770 = *Dictyanthus Pavonii*.
campanulata, Sims, *Bot. Mag.* t. 1661 = *Huernia clavigera*.
canescens, Hort. ex Haw. *Syn. Succ. Pl.* 26.—Afr. austr.
caudata, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 46 = *Brachystelma crispum*.
chinensis, Lour. *Fl. Cochinch.* 165 = *Hoya carnososa*.
ciliata, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 46 = *Diplocyatha ciliata*.
ciliolata, Todaro, *Ind. Sem. Hort. Panorm.* (1861) 10, nomen (*Quid* ?)—Afr. austr.
clavata, Decne. in *DC. Prod.* viii. 664, sphalm. = *clavigera*.
clavata, Willd. *Sp. Pl.* i. 1295 (*Trichocaulonis* sp.)—Afr. austr.
clavigera, Jacq. *Stapel.* t. 5 = *Huernia clavigera*.
clypeata, Jacq. l. c. t. 34.—Afr. austr.
cochinchinensis, Lour. *Fl. Cochinch.* 165 = *Hoya cochinchinensis*.
comata, Jacq. *Stapel.* t. 49.—Afr. austr.
compacta, Schult. *Syst.* vi. 46 = *Duvalia compacta*.
concinna, Mass. *Stapel.* 15. t. 18.—Afr. austr.
concolor, Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* 372 (*Duvaliae* sp.)—Afr. austr. ?
congestiflora, Delile, in *Rochet, Sec. Voy. Choa*, 345.—Afr. trop.
conspurcata, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 284.—Afr. austr.

STAPELIA :—

- cordata*, Hort. ex Haw. *Syn. Pl. cc.* 26.—Afr. austr.
Corderoyi, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 082 = *Duvalia Corderoyi*.
Courcelii, Hort. ex N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1877) i. 140 = *patentirostris*.
crassa, Donn, *Hort. Cantab. ed.* II. 43 = *Huernia tubata*.
crispa, Hort. ex Haw. *Syn. Pl. Succ.* 31 = *Huernia crispa*.
Curtisii, Schult. *Syst.* vi. 38 = *variegata*.
cylindrica, Hort. ex Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5930 = *Echidnopsis cereiformis*.
cymosa, Hort. ex Schult. *Syst.* vi. 9 = *Duvalia hirtella*.
decora, Mass. *Stapel.* 19. t. 26 = *Piarantia decorus*.
deflexa, Hort. ex Haw. *Syn. Pl. Succ.* 1 = *reflexa*.
deflexa, Hort. Lips. (1864); ex Todaro, *Hort. Bot. Panorm.* i. 52 = *trisulca*.
deflexa, Jacq. *Stapel.* t. 20.—Afr. austr.
dejecta, Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* 372.—Afr. austr.
dentata, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* cviii. (*Boucerosiae* sp.)—Arab.
depressa, Hort. ex N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1876) ii. 809, in obs. = *glabriflora*.
depressa, Jacq. *Stapel.* t. 55 = *patula*.
Desmidorchis, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 63 = *Boucerosia Russelliana*.
discolor, Todaro, *Hort. Bot. Panorm.* i. t. 12. f. 3.—Afr. austr. ?
divaricata, Mass. *Stapel.* 17. t. 22.—Afr. austr.
duodecimfida, Jacq. *Stapel.* t. 4 = *Huernia tubata*.
elegans, Mass. *Stapel.* 19. t. 27 = *Duvalia elegans*.
elongata, Sweet, *Hort. Brit. ed.* II. 357 = *patula*.
emarginata, Breit. *Hort. Breit.* 504, nomen (*Quid* ?)—Hab. ?
erivacaria, Roxb. *Hort. Beng.* 21, nomen (*Quid* ?)—Hab. ?
eruciformis, Hort. ex N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1875) i. 136 = *olivacea*.
europaea, Guss. *Fl. Sic. Prod. Suppl.* i. 5 (1832); et in *Atti Acc. Sc. Nap.* iv. (1839) (Bc) 87 = *Boucerosia Gussoneana*.
fasciculata, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 46.—Afr. austr.
fissirostris, Jacq. *Stapel.* t. 23.—Afr. austr.
flavicomata, Haw. *Suppl. Pl. Succ.* 8.—Afr. austr.
flavirostris, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1877) i. 558 = *grandiflora*.
fuscata, Hort. *Parm. ex Todaro, Hort. Bot. Panorm.* i. 47 = *mutabilis*.
fuscata, Jacq. *Stapel.* t. 46.—Afr. austr.
geminata, Mass. *Stapel.* 18. t. 25 = *Piaranthus geminatus*.
gemmifera, Hort. ex Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* 266, nomen = *seq.*
geminiflora, Mass. *Stapel.* 14. t. 15.—Afr. austr.
gigantea, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1877) i. 684. f. 112.—Afr. austr.
glabriflora, N. E. Br. l. c. (1876) ii. 80. f. 149.—Afr. austr. ?
glandulifera, Pers. *Syn.* i. 279 = *seq.*
glanduliflora, Mass. *Stapel.* 16. t. 19.—Afr. austr.
glauca, Jacq. *Stapel.* t. 44.—Afr. austr.
glomerata, Hort. ex Haw. *Syn. Pl. Succ.* 6 = *Duvalia glomerata*.
Gordoni, Mass. *Stapel.* 24. t. 40 = *Hoodia Gordoni*.
grandiflora, Curt. *Bot. Mag.* t. 585 = *spectabilis*.
grandiflora, Jacq. *Stapel.* t. 59 = *obscura*.
grandiflora, Mass. *Stapel.* 13. t. 11.—Afr. austr.
Gussoneana, Jacq. ex Lindl. *Bot. Reg.* t. 1731 = *Boucerosia Gussoneana*.
guttata, Mass. *Stapel.* 10 = *Huernia guttata*.
hamata, Jacq. *Stapel.* t. 50.—Afr. austr.
hircosa, Jacq. l. c. 25.—Afr. austr.
hirsuta, Linn. *Sp. Pl.* 217.—Afr. austr.
hirtella, Jacq. *Stapel.* t. 10 = *Duvalia hirtella*.
hispidula, Hornem. *Hort. Hafn.* i. 251 = *glanduliflora*.
humilis, Mass. *Stapel.* 10. t. 5 = *Huernia humilis*.
Hystrix, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5751 = *Huernia Hystrix*.
incarnata, Linn. f. *Suppl.* 171 = *Boucerosia incarnata*.
inodora, Decne. in *DC. Prod.* viii. 661.—Afr. austr.
involuta, Herb. *Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 47 = *Heterostemma tanjorense*.
irrorata, Lodd. *Bot. Cab.* t. 127 = *verrucosa*.
irrorata, Mass. *Stapel.* 12. t. 9.—Afr. austr.

STAPELIA:—

- italica*, Tenore, ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 300, nomen = Boucerosia Gussoniana.
Jacquiniana, Schult. Syst. vi. 45 = Duvalia Jacquiniana.
Juvenula, Jacq. Stapel. t. 28.—Afr. austr.
laevigata, Hort. ex Haw. Syn. Pl. Succ. 46 = Duvalia laevigata.
laevis, Decne. in DC. Prod. viii. 658 = pedunculata.
lampadosa, Jacq. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 300, nomen = Boucerosia Gussoniana.
lanifera, Haw. Suppl. Pl. Succ. 8.—Afr. austr.
lentiginosa, Sims, Bot. Mag. t. 506 = Huernia guttata.
lepida, Jacq. Stapel. t. 43.—Afr. austr.
limosa, Hort. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 266 = praec.
lucida, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 148.—Afr. austr.
lunata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 357 = uncinata.
macrocarpa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 50.—Abyss.
maculosa, Jacq. Stapel. t. 31.—Afr. austr.
mammillaris, Linn. Mant. ii. 216 = Boucerosia mammillaris.
marginata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 13.—Afr. austr.
marmorata, Jacq. Stapel. t. 38.—Afr. austr.
Massoni, Haw. Syn. Pl. Succ. 18.—Cf. N. E. Br. in Gard. Chron. (1883) II. 761.—Afr. austr.
mastodes, Jacq. Stapel. t. 13 = Duvalia mastodes.
mastodis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = praec.
meliflua, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 202 = Hoya diversifolia.
mixta, Donn, Hort. Cantab. ed. IV. 53, nomen = maculosa.
mixta, Mass. Stapel. 23. t. 38.—Afr. austr.
monstrosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 631 = variegata.
moschata, Donn, Hort. Cantab. ed. III. 43 = hircosa.
multangula, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cviii (Echidnopsidis sp.?).—Arab.
multiflora, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 149.—Afr. austr.
mutabilis, Jacq. Stapel. t. 29.—Afr. austr.?
namaquensis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1882) II. 648.—Afr. austr.
neglecta, Todaro, Hort. Bot. Panorm. i. 47 = mutabilis.
normalis, Jacq. Stapel. t. 42.—Afr. austr.
obliqua, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 13.—Afr. austr.
obscura, N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) I. 558, in obs.—Afr. austr.
ocellata, Jacq. Stapel. t. 6 = Huernia ocellata.
olivacea, N. E. Br. in Gard. Chron. (1875) I. 136.—Afr. austr.
ophinncula, Haw. Syn. Pl. Succ. 27.—Afr. austr.
orbicularis, Andr. Bot. Rep. t. 439.—Afr. austr.
orbiculata, Donn, Hort. Cantab. ed. III. 43, nomen = praec.
pallens, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 631 = pallida.
pallida, Wendl. Coll. Bot. 39. t. 51.—Afr. austr.
paniculata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 13.—Afr. austr.
papillosa, DC. Pl. Gr. ex Desf. Tabl. ed. II. 92, nomen (Quid?).—Afr. austr.
parviflora, Mass. Stapel. 21 (Carallumae sp.).—Afr. austr.
Passerini, Todaro, Hort. Bot. Panorm. i. 47, nomen = mutabilis.
patentirostris, N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) I. 140. f. 21.—Afr. austr.
patula, Willd. Enum. Hort. Berol. 281.—Afr. austr.
pedunculata, Mass. Stapel. 17. t. 21.—Afr. austr.
penduliflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 631 = pedunculata.
picta, Donn, Hort. Cantab. ed. III. 43, nomen; Bot. Mag. t. 1169.—Hab.?
pilifera, Linn. f. Suppl. 171 = Trichocaulon piliferum.
planiflora, Jacq. Stapel. t. 40.—Afr. austr.
Plantii, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 5692.—Afr. austr.
Plantii, MacKen, ex N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) I. 684 = gigantea.
plicata, Hort. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 267, nomen (Quid?).—Hab.?

STAPELIA:—

- protensa*, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 30 = revoluta.
pruinosa, Mass. Stapel. 24. t. 41.—Afr. austr.
pulchella, Hort. ex Haw. Syn. Pl. Succ. 33 = roriflua.
pulchella, Mass. Stapel. 22. t. 36.—Afr. austr.
pulchra, Schult. Syst. vi. 23 = roriflua.
pulla, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 310 = Boucerosia mammillaris.
pulvinata, Donn, Hort. Cantab. ed. IV. 53 = lanifera.
pulvinata, Mass. Stapel. 13. t. 13.—Afr. austr.
punctata, Mass. l. c. 18.—Afr. austr.
quadrangula, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 202 = Heterostemma cuspidatum.
quadrangula, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 51 = Boucerosia quadrangula.
quadrangula, Schousb. Gew. Marok. 107 = Boucerosia maroccana.
quinquenervis, Schult. Syst. vi. 37 = planiflora.
radiata, Jacq. Stapel. t. 12 = Duvalia Jacquiniana.
radiata, Sims, Bot. Mag. t. 619 = Duvalia radiata.
ramosa, Mass. Stapel. 21. t. 32.—Afr. austr.
reclinata, Mass. l. c. 19. t. 28 = Duvalia reclinata.
reclinata, Sims, Bot. Mag. t. 1397 = Duvalia hirtella.
reflexa, Haw. Syn. Pl. Succ. 18.—Afr. austr.
replicata, Jacq. Stapel. t. 15 = Duvalia replicata.
reticulata, Mass. Stapel. 9. t. 2 = Huernia reticulata.
retusa, Schult. Syst. vi. 41.—Afr. austr.
revoluta, Mass. Stapel. 12.—Afr. austr.
revoluta, Sims, Bot. Mag. t. 724 = tigridia.
roriflua, Jacq. Stapel. t. 19.—Afr. austr.
rufa, Mass. Stapel. 16. t. 20.—Afr. austr.
rufescens, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 373.—Afr. austr.
rugosa, Jacq. Stapel. t. 41.—Afr. austr.
rugosa, Wendl. Coll. Bot. ii. 41. t. 52 = Wendlandiana.
sagittata, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 288 (Cynanchi sp.).—Guian.
sanguinea, Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 99, nomen (Quid?).—Hab.?
sarmentosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 632 = Ceropegia variegata.
scutellata, Todaro, Hort. Bot. Panorm. i. 52. t. 13. f. 2 = trisulca.
serrulata, Jacq. Stapel. t. 17 = Piaranthus serrulatus.
Simsii, Schult. Syst. vi. 33.—Afr. austr.
sororia, Hook. f. Bot. Mag. t. 5963 = patentirostris.
sororia, Jacq. Stapel. tt. 56, 57 = patula.
sororia, Mass. Stapel. 23. t. 39.—Afr. austr.
spectabilis, Haw. Syn. Pl. Succ. 16.—Afr. austr.
stellaris, Haw. l. c. 19; Suppl. 9; Jacq. Stapel. t. 48.—Afr. austr.
stellata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = S. Asterias.
stricta, Sims, Bot. Mag. t. 2037.—Afr. austr.
stygia, Schult. Syst. vi. 32 (err. typ. 562).—Afr. austr.
subulata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cviii = Caralluma subulata.
tigridia, Decne. in DC. Prod. viii. 657.—Afr. austr.
tridentata, Hort. ex Schult. Syst. vi. 49, nomen (Quid?).—Hab.?
trifida, Todaro, Hort. Bot. Panorm. i. 45. t. 12. f. 1.—Afr. austr.
trifolia, Breit. Hort. Breit. 505, nomen (Quid?).—Hab.?
trisulca, Donn, Hort. Cantab. ed. III. 43; Jacq. Stapel. t. 33.—Afr. austr.
tsomoensis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1882) II. 168.—Afr. austr.
tubata, Jacq. Stapel. t. 3 = Huernia tubata.
tuberculata, Hort. ex Haw. Syn. Pl. Succ. 46 = Duvalia radiata.
tuberosa, Meerb. Pl. Rar. sub t. 54. f. 1 = Brachystelma tuberosum.
tubulosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 632 = Huernia tubata.
umbellata, Donn, Hort. Cantab. ed. IV. 54; Roxb. Hort. Beng. 21; Pl. Corom. iii. 36. t. 241 = Boucerosia umbellata.
umbilicata, Thuret, Choix Gr. n. 2 (1869), 6, nomen; ex Todaro, Hort. Bot. Panorm. i. 47 = mutabilis.
uncinata, Jacq. Stapel. Disp. tab.—Afr. austr.
unguipetala, N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) I. 334. f. 54.—Afr. austr.
variegata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 51 = Ceropegia variegata.
variegata, Linn. Sp. Pl. 217; Jacq. Misc. i. 27. t. 4.—Afr. austr.
venusta, Mass. Stapel. 10 = Huernia venusta.
verrucosa, Hort. ex Haw. Syn. Pl. Succ. 32 = roriflua.

STAPELIA:—

- verrucosa*, Mass. Stapel. 11. t. 8.—Afr. austr.
verticillata, Hort. ex Schult. Syst. vi. 49, nomen (Quid?).—Hab.?
vetula, Mass. Stapel. 15. t. 16.—Afr. austr.
vetula, Sims, Bot. Mag. t. 1234 = Simsii.
virgata, Hort. ex Schult. Syst. vi. 49, nomen (Quid?).—Hab.?
Wendlandiana, Schult. Syst. vi. 39.—Afr. austr.
Woodfordiana, Hort. ex Haw. Syn. Pl. Succ. 42 = picta.
- STAPHIDIATRUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 325 = *Sagraea*, DC. (Melastom.).
aphananthum, Naud. l. c. 333 = Clidemia aphanantha.
attenuatum, Naud. l. c. 332 = Sag. attenuata.
Berteri, Naud. l. c. 328 = Sag. plumosa.
Bonplandii, Naud. l. c. 333 = Sag. Bonplandii.
capilliflorum, Naud. l. c. 330 = Sag. capilliflora.
cognatum, Naud. l. c. 334 = Clidemia rubra.
coriaceum, Naud. l. c. 329 = Sag. coriacea.
fasciculare, Naud. l. c. 333 = Henriettella fascicularis.
impetiolare, Naud. l. c. 329 = Calophysa pilosa.
latifolium, Naud. l. c. 326 = Sag. latifolia.
obliquum, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 59 = Sag. obliqua.
pilosum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 334 = Sag. pilosa.
platyphyllum, Naud. l. c. 331 = Sag. platyphylla.
polystachyum, Naud. l. c. 327 = Sag. polystachya.
pulverulentum, Naud. l. c. 334 = Oxymeris pulverulenta.
rariflorum, Naud. l. c. 334 = Sag. rariflora.
rubrinerve, Naud. l. c. 328 = Sag. domingensis.
rubrum, Naud. l. c. 331 = Clidemia rubra.
scabridum, Naud. l. c. 334 = Henriettella fascicularis.
umbrosum, Naud. l. c. 327 = Sag. umbrosa.
- STAPHIDIUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 305 = *Clidemia*, D. Don (Melastom.).
affine, Naud. l. c. 313 = C. novemnervia.
agreste, Naud. l. c. 324 = Leandra agrestis.
anceps, Naud. l. c. 312 = C. tiliacifolia.
astrotrichum, Naud. l. c. 324 = Miconia astrotricha.
attenuatum, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 218 = Sagraea attenuata.
Benthamianum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 324 = C. hirta.
biserratum, Naud. l. c. 315 = C. biserrata.
blepharodes, Wawra, Bot. Ergeb. Maxim. Bras. 21. t. 38 = C. blepharodes.
brachystephanum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 309 = C. brachystephana.
bracteosum, Naud. l. c. 318 = C. dependens.
chinantlanum, Naud. l. c. 318 = C. chinatlana.
chrysanthum, Naud. l. c. 310 = C. hirta.
confertiflorum, Naud. l. c. 318 = C. dependens.
conglomeratum, Naud. l. c. 321 = C. conglomerata.
cuneatum, Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 113 = Miconia cuneata.
dependens, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 319 = C. Deppeana.
dispar, Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 141 = Calophysa dispar.
divaricatum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 315 = C. serrulata.
diversifolium, Naud. l. c. 322 = Octopleura diversifolia.
elegans, Naud. l. c. 307 = C. hirta.
Galeottii, Naud. l. c. 319 = C. laxiflora.
glabratum, Naud. l. c. 324 = Miconia ibaguensis.
gracile, Naud. l. c. 314 = C. petiolaris.
Hostmannii, Naud. l. c. 310 = C. hirta.
involutum, Naud. l. c. 323 = C. involutata.
lanatum, Naud. l. c. 324 = Miconia lanata.
lappaceum, Naud. l. c. = Miconia lappacea.
latifolium, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 218 = Sagraea latifolia.
Lindenianum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1852) 314 = C. petiolaris.
lucidum, Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 134 = Heterotrichum lucidum.
minutiflorum, Berg, ex Triana, l. c. 137 = Sagraea minutiflora.
mutabile, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 324 = Miconia mutabilis.
naevulum, Naud. l. c. 323 = C. naevula.
novemnervium, Naud. l. c. 312 = C. novemnervia.

STAPHIDIUM:—

- octonum*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 306 = *Heterotrichum octonum*.
oxyurum, Naud. l. c. 321 = *Clidemia oxyura*.
paraguayense, Naud. l. c. 324 = *Oxymeris paraguayensis*.
pauciflorum, Naud. l. c. 308 = *C. hirta*.
petiolare, Naud. l. c. 324 = *C. petiolaris*.
petiolatum, Naud. l. c. = *C. Deppeana*.
pliosomon, Naud. l. c. 313 = *C. rariflora*.
polyandrum, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 59 = *Miconia Benthiana*.
purpureum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 309 = *C. dentata*.
reversum, Naud. l. c. 324 = *Oxymeris reversa*.
sessiliflorum, Naud. l. c. 311 = *Sagraea sessiliflora*.
spicatum, Naud. l. c. 316 = *C. dependens*.
strigosum, Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 134 = *Heterotrichum strigosum*.
tiliaefolium, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 324 = *C. tiliaefolia*.
triste, Naud. l. c. 320 = *Miconia bracteata*, Triana.
umbrosum, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 218 = *Sagraea umbrosa*.
urceolatum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 316 = *C. neglecta*.
Wilsonii, Naud. l. c. 311 = *C. erythropogon*.

STAPHILEA, Medic. Pfl. Anat. 401 (1801), sphalm. = seq.

STAPHYLAEA, Linn. Syst. ed. I (1735) = seq.

STAPHYLEA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 270 (1753).

- SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 412.
BUMALDA, Thunb. Nov. Gen. iii. 62 (1783).
 STAPHYLODENDRON, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 423 (1742).
 Bolanderi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 69. —Calif.
Bumalda, DC. Prod. ii. 2—Japon.
chrysodonta, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 313.—Japon.
colchica, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 11. 276.—Reg. Cauc.
corymbosa, DC. Prod. ii. 3 = *Turpinia occidentalis*.
Emodi, Wall. Cat. n. 4275.—Reg. Himal.
geniculata, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 22. —Calif.
heterophylla, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 29. t. 253.—Peruv.
indica, Burm. f. Fl. Ind. 75. t. 24. f. 2 = *Leea sambucina*.
montana, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 160 = *Gymnosporia montana*.
occidentalis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 55 = *Turpinia occidentalis*.
pinnata, Linn. Sp. Pl. 270.—Europ.; Reg. Cauc.
pinnatifida, Gueldenst. Reisen, i. 421 = praec.
simplicifolia, Gardn. & Champ. in Hook. Kew Journ. i. (1849) 309 = *Turpinia arguta*.
trifolia, Linn. Sp. Pl. 270.—Am. bor.
trifoliata, Payson, Organ. t. 36 = praec.
vepretum, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 160 = *Gymnosporia emarginata*.

STAPHYLIS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 159 = praec.

STAPHYLLAEA, Scop. Intro. 253 (1797), sphalm. = praec.

STAPHYLODENDRON, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 223 (1772), sphalm. = seq.

STAPHYLODENDRON, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 423 (1742) = *Staphylea*, Linn. (Sapind.).
pinnatum, Crantz, Inst. ii. 438 = *Staphylea pinnata*.
trifoliatum, Crantz, l. c. = *Staphylea trifolia*.

STAPHYLODENDRUM, Moench, Meth. 64 (1794) = praec.

STAPHYLORHODOS, Turcz. in Bull. Soc. Bot. Mosc. (1862) 11. 321. Genus dubium *ROSACEARUM*, Benth. & Hook. f. i. 606.
Cotoneaster, Turcz. l. c. 322.—'N. Zel.'

STAPHYLOSYCE, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 828 (1867) = *Physedra*, Hook. f. (Cucurb.).
Barteri, Hook. f. l. c. = *P. Barteri*.

STAPHYSAGRIA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 347 (1839) = *Delphinium*, Tourn. (Kanunc.).

STARBIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 7 (1806) = *Alectra*, Thunb. (Scrophul.).
madagascariensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 632.—Madag.

STARKEA, Willd. Sp. Pl. iii. 2216 (1804) = *Liabum*, Adans. (Compos.).
pinnata, Nutt. Gen. Am. ii. 169 = *Aplopappus spinulosus*.
umbellata, Willd. Sp. Pl. iii. 2216 = *L. Brownei*.

STARKIA, Juss. ex Stend. Nom. ed. II. ii. 632 (1841), sphalm. = praec.

STATICE, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 88 (1737), partim. *PLUMBAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 625.
 EURYCHITON, J. Grah. Cat. Pl. Bomb. Addend. (1839).

GONOLIMON, Boiss. in DC. Prod. xii. 632 (1848).
 LIMONUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 283 (1763).
 PLEGORHIZA, Molina, Sagg. Chile, ed. I. 164, 351 (1782).

TAXANTHEMA, Neck. Elem. i. 115 (1790); R. Br. Prod. 426 (1810).

acerosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 252 = *Acantholimon lepturides*.

acerosa, Hohen. ex Boiss. Diagn. Scr. I. vii. 78 = *Acantholimon tenuiflorum*.

acerosa, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 420 = *Acantholimon acerosum*.

aciphylla, Jaub. & Spach, Illustr. i. 162 = *Acantholimon Hohenackeri*.

acutifolia, Ehrenb. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 636 = *Thouini*.

acutifolia, Reichb. Ic. Fl. Germ. iii. 23 = *minuta*, Linn.

adensis, Boiss. in DC. Prod. xii. 670.—Arab.

aegyptiaca, Pers. Syn. i. 334 = *Thouini*.

airoides, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 255 = *bellidifolia*.

alata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 15 = *Thouini*.

alata, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 259.—Turkestan.

albicans, Ledeb. Fl. Ross. iii. 465 = *callicoma*.

albida, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 369 = *psiloclada*.

alliacea, Cav. Ic. ii. 6. t. 109 = *Armeria allioides*.

alliacea, Guss. ex Nym. Consp. 614 = *Armeria macropoda*.

alliacea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. t. 204 = *Armeria majellensis*.

alliacea, Willd. Sp. Pl. i. 1523 = *Armeria plantaginea*.

alpina, Poir. Encyc. Suppl. v. 234 = *Armeria alpina*.

altaica, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 115, nomen.—Sibir.

alutacea, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) 1. 367.—Rossia.

anceps, Regel, Pl. Nov. Fedsch. 74.—Turkestan.

androsacea, Jaub. & Spach, Illustr. i. 161, 164 = *Acantholimon androsaceum*.

angustifolia, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 254 = *S. Limonium*.

annulata, Spreng. Syst. i. 960 = *Aegialitis annulata*.

aphylla, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 60 = *pruinosa*.

aphylla, Poir. Encyc. vii. 408 = *decipiens*.

arabica, Jaub. & Spach, Illustr. i. 156. t. 85.—Arab.

Ararati, Hort. Angl. ex Planch. in Fl. des Serres, vii. (1851–52) 95.—Armen.

arborea, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 337 = *fruticans*.

arborescens, Brouss. Elench. Hort. Monsp. (1805) 58, nomen = *fruticans*.

Arbuscula, Maxim. in Trautv. Regel, Maxim. & Winkl. Decas Pl. Nov. 8.—Japon.

arenaria, Pers. Syn. i. 332 = *Armeria plantaginea*.

aretiaefolia, Fries, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 657 = *linifolia*.

argentea, Pall. ex Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 282 = *callicoma*.

aristata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 213 = *echioides*.

Armeria, Brot. Fl. Lusit. i. 486 = *Armeria Welwitschii*.

STATICE:—

Armeria, Hook. Fl. Bor. Am. i. 123 = *Armeria sanguinolenta*.

Armeria, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 339 = *Armeria macloviana*.

Armeria, Linn. Sp. Pl. 274 = *Armeria maritima*, *elongata*.

Armeria, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 223 = *Armeria plantaginea*.

Armeria, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 227 = *Armeria alpina*.

Armeria, Sm. Engl. Bot. t. 226 = *Armeria pubescens*.

articulata, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 225. t. 6.—Europ. austr.

articulata, Schimp. ex Nym. Consp. 612 = *cancellata*.

articulata, Vis. Fl. Dalm. ii. 7 = *cosyrensis*.

aspera, Lam. Fl. Fr. iii. 64 = *echioides*.

attenuata, Schult. Syst. vi. 798.—Abyss.

Aucheri, Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 38 = *ocymifolia*.

aurea, Linn. Sp. Pl. 276.—Sibir.

auriculaefolia, Benth. Cat. Pl. Pyren. 123 = *lychnidifolia*.

auriculaefolia, Brot. Fl. Lusit. i. 489 = *ovalifolia*.

auriculaefolia, DC. Fl. Fr. iii. 431 = *Girardiana*.

auriculaefolia, Poir. Encyc. vii. 401 = *duriuscula*.

auriculaefolia, Vahl, Symb. Bot. i. 25.—Europ.

auriculaefolia, Vahl, l. c., partim = *oleaefolia*.

auriculae-ursifolia, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 330 = *lychnidifolia*.

auriculata, Hort. Dorpat. (1810–14); ex Schult. Syst. vi. 799.—Hab.?

australis, Moris, Diagn. Stirp. Sard. (1857) 1 = *duriuscula*.

australis, Spreng. Syst. i. 959.—China; Japon.; Austral.

Avei, De Not. Prosp. Fl. Ligust. 54 = *echioides*.

axillaris, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 58.—Arab.

bahamensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 389.—Ind. occ.

bahusiensis, Fries, Mant. i. 10 = *S. Limonium*.

Balsanae, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 69 = *pycnantha*.

bayonnensis, Gren. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 649 = *occidentalis*.

Beaumierana, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 66, nomen.—Maroc.

Behen, Drejer, Fl. Excurs. Hafn. 122 = *S. Limonium*.

bellidifolia, Auct. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 648 = *auriculaefolia*.

bellidifolia, Bertol. Fl. Ital. iii. 524 = *psiloclada*.

bellidifolia, Colm. Cat. Pl. Catalun. 130 = *virgata*.

bellidifolia, Gouan, Fl. Monsp. 231.—Europ.

bellidifolia, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 749 = *caspia*.

bellidifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 90. t. 295 = *ocymifolia*.

bellidifolia, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 291 = *cordata*.

Bessieriana, Frivald. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 633 = *collina*.

Bessieriana, Schult. Syst. vi. 789 = *tatarica*.

bicolor, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 129.—China.

Billardieri, Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 325.—Ins. Molucc.

binervosa, G. E. Sm. in Engl. Bot. Suppl. t. 2663 = *auriculaefolia*.

Boissieri, Lafont, in Act. Linn. Soc. Bord. xxvii. (1869) 156. t. 9. f. 7.—As. Min.; Aegypt.

Bonduelli, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 81.—Alger.

Bourgaei, Webb, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 638.—Ins. Canar.

Bovei, Jaub. & Spach, Illustr. i. 157. t. 86 = *axillaris*.

bracteata, Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 330 = *Acantholimon bracteatum*.

bracteosa, Vis. Pl. Aegypt. 16, nomen.—Aegypt.

brasiliensis, Boiss. in DC. Prod. xii. 644.—Am. bor. et austr.

brassicaefolia, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 181.—Ins. Canar.

Braunii, C. Bolle, Ind. Sem. Hort. Berol. (1861) App. 4.—Ins. Cap. Virid.

Brunneri, Webb, in Hook. Niger Fl. 170.—Ins. Cap. Virid.

Bubanii, Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 326 = *occidentalis*.

Bungeana, Boiss. in DC. Prod. xii. 642.—Mongol.

Bungei, Claus, in Beitr. Pfl. Russ. Reich. viii. 308.—Reg. Casp.

cabulica, Boiss. in DC. Prod. xii. 666.—Afghan.

STATICE:—

caesia, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.* (1844) 325.—Hispan.
caespitosa, Cav. Ic. i. 38 = *Armeria juniperifolia*.
caespitosa, Poir. *Encyc. vii.* 396, in obs. = *Armeria chilensis*.
caespitosa, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. vi.* (1826) 606 = *Armeria macloviana*.
Calcarae, Todaro, ex Janka, in *Termész. Füzetek. vi.* (1882) 175 = dictyoclada.
californica, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 643 = *S. Limonium*.
callicoma, C. A. Mey. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. ii.* (1845) 212.—Sibir.
cancellata, Bernh. ex Bertol. *Fl. Ital. iii.* 525.—Dalmat.; Graecia.
cancellata, Bernh. ex Mutel, *Fl. Fr. iii.* 88 = *furfuracea*.
canescens, Host, *Fl. Austr. i.* 407 = *Armeria canescens*.
capillifolia, Poir. *Encyc. vii.* 397 = *Armeria pinifolia*.
capitata, Lam. *Fl. Fr. iii.* 63 = *Armeria maritima*.
carnosa, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 663.—Persia.
caroliniana, Walt. *Fl. Carol. 118* = *S. Limonium*.
caryophyllacea, Boiss. & Hohen. ex Boiss. *Diagn. Ser. I. vii.* 79 = *Acantholimon caryophyllaceum*.
caspia, Pollini, *Fl. Veron. i.* 418, 611 = *virgata*.
caspia, Willd. *Enum. Hort. Berol. 336*.—Reg. Cauc.; Sibir.
catalaunica, Willk. & Costa, ex Willk. in *Linnaea, xxx.* (1859–60) 122 = *duriuscula*.
Cephalotes, Ait. *Hort. Kew. ed. I. i.* 383 = *Armeria latifolia*.
Cephalotes, Beitol. *Fl. Ital. iii.* 511 = *Armeria Morisii*.
Cephalotes, Poir. *Encyc. vii.* 394 = *Armeria mauritanica*.
caespitosa, Auct. = *caespitosa*.
chilensis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1861) 58.—Chili.
chryscephala, Regel, in *Act. Hort. Petrop. vi.* (1879) 383.—As. centr.
chrysocoma, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. xv.* (1842) 429.—Soongar.
cinerea, Poir. *Encyc. vii.* 407 = *purpurata*.
collina, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel. ii.* 300.—Graec.; As. Min.; Syria.
collina, Nym. *Consp. 613* = *dalmatica*.
Companyonis, Gren. & Billot, in *F. Schultz, Fl. Fr. et Allem. 338*.—Gallia.
confusa, Gren. & Godr. *Fl. Fr. ii.* 743.—Reg. Mediterr.
congesta, Heldr. ex Nym. *Consp. 610* = *corinthiaca*.
congesta, Ledeb. *Fl. Alt. i.* 427.—Sibir. altaic.
conspicua, Sims, Bot. Mag. t. 1629 = *speciosa*.
coralloides, Tausch, in *Syll. Ratisb. ii.* (1828) 255 = *decipiens*.
cordata, Desf. *Fl. Atlant. i.* 273 = *virgata*.
cordata, Guss. *Fl. Sic. Prod. i.* 382 = *cosyrensis*.
cordata, Linn. *Sp. Pl. 275*.—Reg. Mediterr.
cordata, Poir. *Voy. Barb. ii.* 142 = *spathulata*.
cordata, Savi, *Due Cent. 82* = *psiloclada*.
cordata, [Suffr.] *Princip. Bot. (1802) 132* = *bellidifolia*.
coriacea, Hort. ex Schult. *Syst. vi.* 778 = *latifolia*.
Coriaria, Pall. *Tabl. Taur. 49*; et ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc. i.* 249 = *latifolia*.
corinthiaca, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II. iv.* 69.—Graecia.
corymbulosa, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 658.—Afr. austr.
corymbulosa, Nym. *Consp. 609*.—Hispan.
Costae, Willk. in *Linnaea, xxx.* (1859–60) 12 = *Girardiana*.
cosyrensis, Guss. *Suppl. Fl. Sic. Prod. 90*.—Europ. austr.
crispa, Pers. *Syn. i.* 334 = *mucronata*.
Crouanii, Lenorm. ex Nym. *Consp. 609* = *S. Limonium*.
cumana, Tenore, *Fl. Nap. iii.* 351.—Italia.
cuneata, Sm. ex Link, *Handb. ii.* 264; Hort. Loud. ex Boiss. in *DC. Prod. xii.* 636 = *Thouini*.
cuspidata, Delort, in *F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 339* = *duriuscula*.
cylindrica, Steud. *Nom. ed. I.* 810, sphalm. = seq.
cylindrifolia, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab. 59*.—Arab.; Afr. bor.
cymulifera, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov. (1852) 104*.—Afr. bor.
cyrtostachya, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.* (1844) 328.—Afr. bor.

STATICE:—

dalmatica, Presl, *Bot. Bemerk. 105*.—Dalmat.; Graec.
daurica, Pall. *Reise, iii.* 320 = *flexuosa*.
decipiens, Ledeb. *Fl. Alt. i.* 433.—Sibir. altaic.
decumbens, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 659.—Afr. austr.
delicatula, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.* (1844) 327.—Hispan.
densiflora, Girard, l. c. *Sér. II. xvii.* (1842) 25 = *Girardiana*.
densiflora, Guss. *Suppl. Fl. Sic. Prod. 86* = *oleae-folia*.
dentata, Hort. *Pesth. (1812)*; ex *Schult. Syst. vi.* 799 (Quid?).—Hab.?
denticulata, Bertol. *Rar. Ital. Pl. Dec. ii.* 34 = *Armeria denticulata*.
denudata, Regel & Koern. *Ind. Sem. Hort. Petrop. (1857) 37*; *Gartenfl. (1861) 159*.—Hab.?
desertorum, Trautv. *Pl. Imag. 17. t. 11* = *tatarica*.
dianthifolia, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 162 = *Acantholimon venustum*.
dichotoma, Cav. Ic. i. 37. t. 50.—Hispan.; Graec.
dichotoma, Duby, Bot. Gall. i. 388 = *bellidifolia*.
dichotoma, Guss. *Fl. Sic. Syn. i.* 372 = *virgata*.
dichotoma, Mutel, *Fl. Fr. Suppl. 171* = *auriculae-folia*.
dichotoma, Reichb. *Pl. Crit. viii.* 7. t. 718 = *oleae-folia*.
dichotoma, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod. i.* 212 = *cosyrensis*.
dichotoma, Willk. in *Flora, xxxv.* (1852) 290 = *duriuscula*.
dichroantha, Rupr. *Sert. Tiansch. 69*.—As. centr.
Dickensoni, Hort. ex Poit. in *Rev. Hort. Sér. II. ii.* (1843–44) 425.—Afr. austr.
Dicksoniana, Hort. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl. iii.* 643, nomen = *rosea*.
dictyoclada, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 654.—Corsica.
dictyophora, Tausch, in *Syll. Ratisb. ii.* (1828) 254 = *cancellata*.
diffusa, Laterr. ex Boiss. in *DC. Prod. xii.* 661 = *caspia*.
diffusa, Pourr. in *Mém. Acad. Toul. iii.* (1788) 330.—Gall.; Lusitan.
divaricata, Cav. ex Schult. *Syst. vi.* 847 = *reticulata*.
Dodartii, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii.* (1842) 31 = *auriculae-folia*.
Dregeana, Presl, *Bot. Bemerk. 105*; Boiss. in *DC. Prod. xii.* 659.—Afr. austr.
drepanensis, Tineo, ex Guss. *Fl. Sic. Syn. ii.* 805 = *S. Limonium*.
dschungarica, Regel, in *Act. Hort. Petrop. vi.* (1879) 386.—As. centr.
dubia, Andr. ex Guss. *Suppl. Fl. Sic. Prod. 89* = *dictyoclada*.
Dubyei, Gren. & Godr. *Fl. Fr. ii.* 750.—Gallia; Hispan.
Dufourei, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii.* (1842) 36.—Hispan.
Duriaei, Girard, in *Mém. Acad. Montp. (Sect. Sc.) i.* (1848) 187.—Afr. bor.
duriuscula, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.* (1844) 327.—Gall. austr.
echinata, Hort. Gorenk. (1812); ex *Schult. Syst. vi.* 799 (Quid?).—Hab.?
Echinus, Bieb. *Fl. Taur. Cauc. i.* 251 = *Acantholimon Hohenackeri*.
Echinus, Linn. *Sp. Pl. 276* = *Acantholimon androsaceum*, *caryophyllaceum*, *tenuiflorum*.
echioides, Hort. ex Schult. *Syst. vi.* 785 = *reticulata*.
echioides, Linn. *Sp. Pl. 275*.—Reg. Mediterr.
echioides, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod. i.* 213 = *rorida*.
effusa, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 646.—Lydia.
elata, Fisch. *Cat. Hort. Gorenk. (1812) 18*.—Sibir.
elegans, Coss. ex Nym. *Consp. 613* = *caesia*.
elongata, Hoffm. *Deutschl. Fl. ed. II. i.* 150 = *Armeria elongata*.
emarginata, Schur, *Enum. Pl. Transs. 558* = *Gmelini*.
emarginata, Willd. *Enum. Hort. Berol. 335*.—Gibralt.
equisetina, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 658.—Afr. austr.
erinacea, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 163 = *Acantholimon roseum*.
eximia, Schrenk, *Enum. Pl. Nov. i.* 13.—As. centr.
fasciculata, Vent. *Jard. Cels, 38* = *Armeria fasciculata*.
ferox, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 163 = *Acantholimon Scorpius*.

STATICE:—

ferulacea, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 396.—Reg. Mediterr. occ.
festucacea, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 163 = *Acantholimon festucaceum*.
filicaulis, Boiss. *Elench. 80*.—Hispan.
Fischeri, Trautv. in *Act. Hort. Petrop. ii.* (1873) 481 = *nuda*.
flexuosa, Less. in *Linnaea, ix.* (1834) 196 = *elata*.
flexuosa, Linn. *Sp. Pl. 276*.—Sibir.
foliosa, Penny, ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl. ii.* 675, nomen.—Ins. Canar.
formosa, Hort. ex Viln. *Fl. Pl. Terre, ed. III.* 1103 = *Armeria latifolia*.
Fortuni, Lindl. *Bot. Reg. (1845) t. 63* = *australis*.
Fradiniana, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl. 128* = *oleae-folia*.
Franchetii, Debeaux, in *Act. Linn. Soc. Bord. xxxi.* (1877) 384.—China.
frutescens, Hort. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl. iii.* 643; Lem. in *Fl. des Serres, iv.* (1848) t. 325 = seq.
fruticans, Webb, ex Boiss. in *DC. Prod. xii.* 636.—Ins. Canar.
fruticosa, Lepech. *Reise, i.* 254 = *suffruticosa*.
furfuracea, Lag. *Gen. et Sp. Nov. 13*.—Hispan.
furfuracea, Reichb. Ic. *Fl. Germ. xvii.* 64 = *cancellata*.
Gaillardoti, Lafont, in *Act. Linn. Soc. Bord. xxvii.* (1869) 158. t. 9. f. 9.—Syria.
genistoides, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 162 = *Acantholimon genistoides*.
Girardiana, Guss. *Fl. Sic. Syn. i.* 368.—Hispan.
glauca, Less. in *Linnaea, ix.* (1834) 196 = *suffruticosa*.
glauca, Pers. *Syn. i.* 333 = *spathulata*.
glauca, Willd. ex Schult. *Syst. vi.* 799 = *Gmelini*.
globulariaefolia, DC. *Fl. Fr. Suppl. 379* = *confusa*.
globulariaefolia, Desf. *Fl. Atlant. i.* 274.—Afr. bor.
globulariaefolia, Webb, Iter *Hisp. 18* = *Girardiana*.
globularifolia, Pourr. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp. ii.* 376 = *salsuginosa*.
globularifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. iii.* 90. t. 296 = *Sibthorpiana*.
globulifera, Boiss. & Heldr. ex Boiss. in *DC. Prod. xii.* 665.—As. Min.
glomerata, Tausch, in *Syll. Ratisb. ii.* (1828) 255.—Sardinia.
glumacea, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 162, 166 = *Acantholimon glumaceum*.
Gmelini, Koch, *Syn. Fl. Germ. ed. II.* 684 = *S. Limonium*.
Gmelini, Spreng. *Syst. i.* 957 = *ovalifolia*.
Gmelini, Willd. *Sp. Pl. i.* 1524.—Reg. Cauc.; Sibir.
Gougetiana, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.* (1844) 328.—Hispan.
gracilis, Fisch. ex Boiss. in *DC. Prod. xii.* 660.—Sibir. altaic.
gracilis, Tineo, in Guss. *Fl. Sic. Syn. ii.* 807 = *dictyoclada*.
graeca, Boiss. in *DC. Prod. xii.* 650.—Graecia; Syria.
graeca, Poir. *Encyc. Suppl. v.* 237 = *rorida*.
graminifolia, Ait. *Hort. Kew. ed. II. i.* 383.—Rossia.
graminifolia, Bess. *Enum. Pl. Volh. 44* = *tatarica*.
grandiflora, Hort. Viln. (1811) ex Schult. *Syst. vi.* 777 = *Armeria latifolia*.
Griffithii, Aitch. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. xix.* (1882) 175.—Afghan.
gummifera, Dur. ex Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov. (1852) 104*.—Afr. bor.
Gussoniana, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 633 = *Sibthorpiana*.
Halleri, Garcke, *Fl. Deutschl. ed. II.* 273 = *Armeria elongata*.
halochrysa, Fisch. ex Boiss. in *DC. Prod. xii.* 641 = *Schrenkiana*.
hirsuta, Presl, *Bot. Bemerk. 105* = *sinuata*.
hirta, Steud. *Nom. ed. I.* 811 = *Armeria baetica*.
Histrix, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 162 = *Acantholimon libanoticum*.
Hoeltzeri, Regel, in *Act. Hort. Petrop. v.* (1877) 259.—Turkestan.
Hohenackeri, Jaub. & Spach, *Illustr. i.* 162, 167 = *Acantholimon Hohenackeri*.
horrida, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.* (1844) 331 = *Acantholimon Hohenackeri*.
Humboldtii, C. Bolle, in *Ind. Sem. Hort. Berol. (1861) App. 4*.—Ins. Canar.
humilis, Link, in *Schrad. Journ. (1800) i.* 61 = *Armeria caespitosa*.

STATICE:—

hybrida, Mont. ex Lloyd, Fl. Loire-Inf. 211 = ovalifolia.
hyssopifolia, Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 329 = rorida.
iconia, Boiss. & Heldr. in DC. Prod. xii. 661. — Anatolia.
imbricata, Webb, ex Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 330. — Ins. Canar.
inanimensis, Guss. Enum. Pl. Inar. 267 = minutiflora.
incana, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 251; Bess. Enum. Pl. Volh. 94 = tatarica.
incana, Ledeb. Fl. Alt. i. 435 = callicoma.
incana, Linn. Mant. i. 59. — Tauria; Sibir.: Afr. bor.
incana, Urv. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 672 = collina.
incana, Vis. Fl. Dalm. ii. 7 = dalmatica.
insignis, Coss. Notes Pl. Crit. 177. — Hispan.
intermedia, Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 87 = psiloclada.
japonica, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 72 = australis.
Jauberti, Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 331 = Acantholimon roseum.
Jovibarba, Webb, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 665. — Afr. trop.
Juncea, Tatarinow, in Wlangali, Reise Oestl. Kirgisent. 251, nomen — Turkestan.
juniperifolia, Boiss. in DC. Prod. xii. 680 = Armeria splendens.
juniperifolia, Pall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 633 = juniperina.
juniperifolia, Vahl, Symb. Bot. i. 25 = Armeria caespitosa.
juniperina, Willd. ex Steud. Nom. ed. I. 811 = Acantholimon Hohenackeri.
Karelini, Stschégel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 475 = Acantholimon Karelini.
kaschgaria, Rupr. Ser. Tiansch. 69. — Turkestan.
Kaufmanniana, Regel, Gartenfl. (1880) 1. — As. centr.
Kotschyi, Jaub. & Spach, Illustr. i. 162 = Acantholimon Kotschy.
Kraussiana, Buching. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 73. — Afr. austr.
laeta, Ball, in Journ. Bot. xiii. (1875) 176 = ornata.
laeta, Moris, Fl. Sard. iii. 42 = duriuscula.
laeta, Salisb. Prod. 177 = mucronata.
lanceolata, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) 1218 = axillaris.
lanceolata, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 446 = ovalifolia.
lanceolata, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, cd. III. 1099 = eximia.
lanceolata, Reichb. Pl. Crit. viii. 7. t. 719. f. 961 = occidentalis.
latifolia, Sm. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 250. — Bulgar.; Rossia; Reg. Cauc.
latissima, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 729. — Soongar.
Lefroyi, Hemsl. in Journ. Bot. xxi. (1883) 105. — Ins. Bermuda.
Legrandi, Gaut. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iv. (1877-78) 40 = Companyonis.
lepidorachis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 127 = sebkatum.
leptoloba, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 385. — As. centr.
leptophylla, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iii. (1845) 211. — Soongar.
leptostachya, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 68. — Persia.
leptostachys, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 311. — Alger.
lepturoides, Jaub. & Spach, Illustr. i. 163, 170 = Acantholimon lepturoides.
Lespinassi, Lafont, in Act. Linn. Soc. Bord. xxvii. (1869) 156. t. 8. f. 5. — Europ.
leucacantha, Jaub. & Spach, Illustr. i. 164 = Acantholimon Scorpis.
leucantha, Pouz. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 560; vi. (1827) 405; Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 223 = Armeria leucocephala.
lilacina, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 68 = Gmelini.
limonia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = S. Limonium.
Limonium, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 379 = ovalifolia.
Limonium, Linn. Sp. Pl. ed. I. 274. — Europ.; Am. bor.
Limonium, Pall. Tabl. Taur. 49 = Gmelini.

STATICE:—

Limonium, Thunb. Fl. Jap. 129 = australis.
limonoides, Bivona, ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 295 = S. Limonium.
linearifolia, Laterr. Fl. Bord. cd. II. 189 = Armeria maritima.
linearifolia, Loisel. Fl. Gall. ed. I. i. 180 = Armeria elongata.
Lingua, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 129. — Alger.
linifolia, Drège, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 658 = equisetina.
linifolia, Linn. f. Suppl. 187. — Afr. austr.
littoralis, Poir. Encyc. Suppl. v. 235 = Armeria littoralis.
lobata, Linn. f. Suppl. 187 = Thouini.
longidentata, Lafont, in Act. Linn. Soc. Bord. xxvii. (1869) 156. t. 8. f. 6. — Europ.
longifolia, Thunb. Prod. Pl. Cap. 54 = purpurata.
lusitanica, Poir. Voy. Barb. ii. 141 = Armeria mauritanica.
lusitanica, Poir. l. c. 173 = Armeria latifolia.
lychnidifolia, Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 18. t. 3. — Europ. austr. occ.; Maroc.
lycopodioides, Girard, l. c. Sér. III. ii. (1844) 330 = Acantholimon lycopodioides.
lyrata, Bieb. Besch. Casp. 166 = spicata.
macrophylla, Brouss. ex Spreng. Syst. i. 959. — Ins. Canar.
macroptera, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 182. — Ins. Canar.
macrorrhabdos, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 67. — Afghan.
macrorrhiza, Ledeb. Fl. Alt. i. 434. — Sibir. altaic.
marginata, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 633. — Bras.
maritima, Lam. Fl. Fr. iii. 64 = cordata, S. Limonium.
maritima, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = Armeria maritima.
Maurocenia, Hort. Par. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 661 (Quid ?). — Hab. ?
melia, Nym. Consp. 612 = cosyrensis.
membranacea, Czern. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 117, nomen. — Rossia.
Meyeri, Boiss. in DC. Prod. xii. 645 = S. Limonium, Gmelini.
micrantha, Lafont, in Act. Linn. Soc. Bord. xxvii. (1869) 159. t. 9. f. 10. — As. Min.
minuta, Desf. Fl. Atlant. i. 275 = Gougetiana.
minuta, Falk, Beitr. ii. 153. — Ross. austr.
minuta, Linn. Mant. i. 59. — Reg. Mediterr.
minuta, Mor. ex Reichb. Pl. Crit. iii. 23 = rupicola.
minuta, Tenore, ex Nym. Consp. 610, partim = Gougetiana.
minuta, Tenore, Syll. 593 = minutiflora.
minuta, Thomas, ex Nym. Consp. 612 = cancellata.
minuta, Vis. Fl. Dalm. iii. 356 = cordata.
minuta, Willk. Pl. Haloph. 137 = virgata.
minutiflora, Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 89. — Sicil.
mongolica, Fisch. ex Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 329. — Mongolia.
monopetala, Linn. Sp. Pl. 276 = Limoniastrum articulatum.
montana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = Armeria alpina.
montana, Soleir. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 686 = Armeria leucocephala.
mucosa, Salzm. ex Boiss. l. c. 646 = ovalifolia.
mucronata, Linn. f. Suppl. 187. — Maroc.
multiceps, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 128. — Alger.
myosuroides, Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 74. — Turkestan.
myriantha, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 14. — Soongar.
nana, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 601 = auriculæfolia ?
neglecta, Andr. Rys. Bot. Wilno (1823), 48, nomen (Quid ?). — Rossia.
nigricans, Lafont, in Act. Linn. Soc. Bord. xxvii. (1869) 155. — Europ.
nuda, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 184. — Persia.
obovata, Ledeb. Fl. Ross. iii. 468. — Reg. Cauc.
obtus, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 660 = cordata.
occidentalis, Lloyd, Fl. Loire-Inf. 212. — Europ. occ.; Maroc.
ochrantha, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 730. — Sibir. altaic.
ocymifolia, Schult. Syst. vi. 780 = seq.
ocymifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 238. — Graecia.
oleaefolia, Host, Syn. Pl. Austr. 177 = reticulata.
oleaefolia, Pourr. ex DC. Fl. Fr. iii. 422 = virgata.

STATICE:—

oleaefolia, Scop. Delic. Insub. i. 24. t. 10. — Reg. Mediterr. occ.
oleaefolia, Willd. Sp. Pl. i. 1525 = Dodartii.
oleifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 212 = virgata.
Oliveriana, Andr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 862 = rorida.
Oliverii, Jaub. & Spach, Illustr. i. 163, 168 = Acantholimon venustum.
Oliveriana, Andr. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 650 = graeca.
ornata, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 559. — Maroc.
Orphanidis, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 146 (Index), sphalm. = Armeria majellensis.
otolepis, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Pétersb. i. (1843) 362. — Soongar.
ovalifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 237. — Reg. Mediterr. occ.
Owerini, Boiss. Fl. Orient. iv. 870. — Reg. Cauc.
oxylepis, Boiss. in DC. Prod. xii. 647 = oleaefolia.
palmaris, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 91. t. 297 = rorida.
panormitana, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1857) 45. — Cf. Linnaea, xxix. (1857-58) 750 = minutiflora.
papillata, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 177. — Ins. Canar.
parvifolia, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 806 = dictyoclada.
patens, Fisch. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 661 = bellidifolia.
pauciflora, Jaub. & Spach, Illustr. i. 162 = Acantholimon androsaceum.
pectinata, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 385. — Ins. Canar.
pedicellata, Wallr. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 658. — Afr. austr.
peregrina, Berg. Desc. Pl. Cap. 80 (excl. syn.) = rosca.
perfoliata, Karel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1839) 167, nomen; et ex Boiss. in DC. Prod. xii. 663. — Persia.
pinifolia, Brot. Fl. Lusit. i. 486 = Armeria pinifolia.
plantaginea, All. Fl. Pedem. ii. 90 = Armeria plantaginea.
plantaginea, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 366 = Armeria Gussonei.
plantaginiflora, Jaub. & Spach, Illustr. i. 159. t. 88 = spicata.
plumosa, Phil. Fl. Atac. 46. — Chili.
polianthemum, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 160. — Europ.
Preauxii, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 181. — Ins. Canar.
preciosa, Tcherkoff, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 15. — Rossia.
prolifera, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 291 = rorida.
pruinosa, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 372 = caesia.
pruinosa, Forsk. ex Schult. Syst. vi. 794 = furfuracea.
pruinosa, Linn. Mant. i. 59. — Aegypt.
pruinosa, Webb & Berth. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 640 = papillata.
Pseudo-armeria, Pav. Ic. i. 38 = Armeria gaditana.
Pseudo-armeria, Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) t. 79 = Armeria latifolia.
Pseudo-limonium, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 191 = S. Limonium.
psiloclada, Boiss. in DC. Prod. xii. 651. — Reg. Mediterr.
puberula, Webb, in Bot. Reg. t. 1450. — Ins. Canar.
pubescens, DC. Fl. Fr. Suppl. 380 = cordata.
pubescens, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 595 = cancellata.
pubescens, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 79 = minuta, Linn.
pubescens, Salisb. in Flora, xvii. (1834) II. Beibl. 13 = Armeria leucocephala.
pubescens, Sm. ex Schult. Syst. vi. 772 (cum cit. falsa) = Armeria maritima.
pubigera, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 391 = Armeria maritima.
pulchella, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 296 = Armeria elongata.
pungens, Brot. Fl. Lusit. 487 = Armeria pungens.
pungens, Jaub. & Spach, Illustr. i. 163 = Acantholimon roseum.
purpurata, Linn. Mant. i. 59. — Afr. austr.

STATICE:—

purpurata, Willd. Sp. Pl. i. 1528 = rosea.
purpurea, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 595 = *Armeria elongata*.
pycnantha, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 716.—As. Min.
pygmaea, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 807 = dictyoclada.
pyramidata, Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 18.—Ins. Porto-santo.
pyrrholepis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 131 = delicatula.
Raddiana, Boiss. in DC. Prod. xii. 653 = globulariaefolia.
ramosissima, Poir. Voy. Barb. ii. 142 = globulariaefolia.
raviflora, Drejer, Fl. Excurs. Hafn. 121 = S. Limonium.
remotispicula, Lacaita, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xvi. (1884) 168.—Italia.
reniformis, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 325 = perfoliata.
reticulata, Auct. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 654 = dictyoclada.
reticulata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 251 = caspia.
reticulata, Gouan, Suppl. Fl. Monsp. 139, nomen = virgata.
reticulata, Linn. Sp. Pl. 275.—Europ.
reticulata, Siev. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 661 = decipiens.
rorida, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 91. t. 298.—Graecia; Syria.
rorida, Vis. Stirp. Dalmat. 48; et ex Boiss. Fl. Orient. iv. 863 = cancellata.
rosea, Boiss. in DC. Prod. xii. 624 = *Acantholimon roseum*.
rosea, Pall. Reise, iii. 260 = flexuosa.
rosea, Sm. in Rees, Cycl. xxxiv. [n. 20].—Afr. austr.
rubella, S. T. Gmel. Reise, ii. 199. t. 34 = tatarica.
rupicola, Badaro, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 191.—Italia.
rytidophylla, Hook. Bot. Mag. t. 4055 = rosea.
sabulosa, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 141.—Europ.
salicorniacea, F. Muell. Fragm. xi. 7.—Austral.
salsuginosa, Boiss. in DC. Prod. xii. 653.—Hispan.
sareptana, Becker, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 12 = tomentella.
Sartorii, Nym. Syll. Suppl. 25.—Ins. Mycon.
scabra, Drège, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 666 = purpurata.
scabra, Krauss, in *Flora*, xxviii. (1845) 72 = corymbulosa, Boiss.
scabra, Pall. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 681 = *Armeria scabra*.
scabra, Pers. Syn. i. 334 = *Limoniastrum articulatum*.
scabra, Thunb. Prod. Pl. Cap. 54.—Afr. austr.
scabrida, Presl, Bot. Bemerk. 105 = equisetina.
Schrenkiana, Fisch. & Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 362.—Soongar.
scoparia, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1098 = eximia.
scoparia, C. A. Mey. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 645 = S. Limonium, Gmelini.
scoparia, Pall. ex Willd. Sp. Pl. i. 1524 = Gmelini.
scoparia, Reichb. ex Nym. Consp. 609 = S. Limonium.
Scopoliana, Bertol. Fl. Ital. iii. 528 = oleaefolia.
Scorpius, Jaub. & Spach, Illustr. i. 163 = *Acantholimon Scorpius*.
scorzoneraefolia, Link, in Schrad. Journ. (1800) i. 60 = *Armeria plantaginea*.
sebkarum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 130.—Alger.
sedoides, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 384.—As. centr.
Semenovii, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) i. 398.—Sibir.
serbica, Nym. Syll. Suppl. 25.—Serbia.
serotina, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 191 = S. Limonium.
Sewerzowi, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 386.—Turkestan.
sibirica, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 661 = echinoides.
sibirica, Ledeb. Fl. Ross. iii. 457.—Sibir. baical.
Sibthorpiana, Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 87.—Sicil.
Sieberi, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 530, in nota.—Graecia.
sinensis, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 329 = australis.
sinuata, Linn. Sp. Pl. 276.—Reg. Mediterr.

STATICE:—

sisymbriifolia, Jaub. & Spach, Illustr. i. 158 = spicata.
Smithii, Tenore, Fl. Nap. iii. 350. t. 223 = virgata.
Spachii, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 322 = *Acantholimon tragacanthinum*, A. Scorpius.
spathulata, Desf. Fl. Atlant. i. 275.—Afr. bor.; Creta.
spathulata, Heldr. ex Nym. Consp. 611 = rorida.
spathulata, Hook. Brit. Fl. ed. I. 145 = auriculataefolia.
spathulata, Jan, ex Nym. Consp. 610 = oleaefolia.
spathulata, Nym. Syll. 143 = emarginata.
spathulata, Sieber, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 650 = Sieberi.
spathulata, Willd. ex Boiss. l. c. 652 = duriuscula.
spathulata, Willd. Enum. Hort. Berol. 335 = Willdenovii.
speciosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. xxiv = collina.
speciosa, Hort. ex Schult. Syst. vi. 796 = mucronata.
speciosa, Linn. Sp. Pl. 275.—Reg. Cauc.; Oriens; Sibir.
spicata, Willd. Sp. Pl. i. 1533.—Sibir. occ.; Reg. Cauc.; Oriens.
spinulosa, Fanka, in *Termész. Füzetek*, vi. (1882) 170.—Europ.
splendens, Lag. & Rodr. in *Anal. Cienc. Nat.* v. (1802) 274 = *Armeria splendens*.
squamata, Poir. Encyc. Suppl. v. 237 = tubiflora.
Stockii, Boiss. in DC. Prod. xii. 664.—Sind; Beluchist.
stricta, Gueldenst. Reisen, ii. 225; ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 470.—Ross. austr.
suffruticosa, Linn. Sp. Pl. 276.—Reg. Cauc.; As. med.
supina, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 326.—Hispan.
Saworowi, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 550.—As. centr.
tatarica, Linn. Sp. Pl. 275.—Europ. austr. or.; Reg. Cauc.
Taxanthema, Schult. Syst. vi. 798 = australis.
tenella, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 203.—Mongol.
Tenoreana, Guss. Enum. Pl. Inar. 268, in syn. = minutiflora.
tenuicula, Tineo, ex Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 90 = reticulata.
tenuifolia, Bertol. in Moris, Stirp. Sard. Elench. ii. 8 = rupicola.
tenuifolia, Jaub. & Spach, Illustr. i. 162 = *Acantholimon Hohenackeri*.
terekeiensis, Gueldenst. Reisen, ii. 33 = tatarica.
tetragona, Drège, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 659 = Dregeana.
tetragona, Thunb. Prod. Pl. Cap. 54.—Afr. austr.
thessala, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 146 (Index), sphalm. = *Armeria cariensis*.
Thouini, Viv. Fl. Lib. Spec. 18. t. 11. f. 1.—Reg. Mediterr.
thymoides, Girard, in *Mém. Acad. Montp. (Sect. Sc.)* i. (1848) 189.—Alger.
Tineii, Woods, Tourist's Fl. 306 = dictyoclada.
tomentella, Boiss. in DC. Prod. xii. 645.—Ross. austr.
Tournefortii, Girard, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 326 = delicatula.
Tournefortii, Jaub. & Spach, Illustr. i. 165. t. 90 = *Acantholimon androsaceum*.
Tournefortii, Jaub. & Spach, l. c. iv. t. 388 = rorida.
tragacanthina, Jaub. & Spach, l. c. i. 164 = *Acantholimon tragacanthinum*.
trigona, Pall. Tabl. Taur. 49; et ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 251 = tatarica.
trigonoides, Hort. Par. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 633 = collina.
trigonoides, Pall. Reise, iii. 637 = incana.
trinervia, Hort. Monsp. (1804); ex Schult. Syst. vi. 799 (Quid?).—Hab.?
tripteris, Hort. Par. ex Poir. Encyc. Suppl. v. 237 = Thouini.
triquetra, Boeb. in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 261 = tatarica.
tuberculata, Boiss. in DC. Prod. xii. 662.—Afr. trop.
tubiflora, Delile, Fl. Egypte, 215. t. 25. f. 2.—Aegypt.
tubiflora, Sieber, ex Schult. Syst. vi. 798 = pruinosa.
ulicina, Willd. ex Schult. l. c. = *Acantholimon libanoticum*.
undulata, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 20. t. 11 = *Armeria argyrocephala*.
varia, Hance, in *Fourn. Bot.* xx. (1882) 290.—China.

STATICE:—

variabilis, Salisb. Prod. 176 = *Armeria latifolia*.
venusta, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 832 = *Acantholimon venustum*.
verrucosa, Willd. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 650 = graeca.
viminea, Schrad. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 37 = virgata.
virgata, Herb. ex Nym. Consp. 611 = confusa.
virgata, Orph. ex Nym. Consp. 610 = Sieberi.
virgata, Willd. Enum. Hort. Berol. 336.—Reg. Mediterr.
vulgaris, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 332 = *Armeria maritima*.
Willdenovii, Poir. Encyc. Suppl. v. 236.—Gall. austr.
Willdenowiana, Herb. ex Nym. Consp. 610 = oleaefolia.
Willdenowiana, Reichb. Pl. Crit. ii. 55. f. 293 = duriuscula.
Willdenowii, Loisel. Fl. Gall. II. i. 224 = Girardiana.
Wrightii, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* v. (1866) 236.—Ins. Luchu.

STAUNTONIA, DC. Syst. i. 513 (1818). *BERBERIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 42.
angustifolia, Wall. Cat. n. 4951 = *Holboellia latifolia*.
Brunoniana, Wall. l. c. n. 4592 = *Parvatia Brunoniana*.
chinensis, DC. Syst. i. 514.—China.
filamentosa, Griff. Notul. iv. 334; Ic. Pl. Asiat. t. 495. f. 1 = *Holboellia latifolia*.
hexaphylla, Decne. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xii. (1839) 105; et in *Arch. Mus. Par. i.* (1839) 192.—Japon.
latifolia, Wall. Cat. n. 4950 = *Holboellia latifolia*.
trifoliata, Griff. Notul. iv. 330; Ic. Pl. Asiat. t. 495. f. 2, 3 = *Parvatia Brunoniana*.

STAURACANTHUS, Link, in Schrad. Neues Journ. ii. 11. (1807) 52 = *Ulex*, Linn. (Legumin.).
aphyllus, Link, l. c. = U. genistoides.
spartioides, Webb, Otia Hisp. 27. t. 19 = U. spartioides.
spectabilis, Webb, l. c. t. 20 = U. spectabilis.

STAUANTHERA, Benth. Scroph. Ind. 57 (1835).
GESNERACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1016.
ANOMORHEGMIA, Meissn. Gen. 303 (1840).
CYANANTHUS, Griff. Notul. iv. 154 (1854).
MIQUELIA, Blume, in Bull. Néerl. (1838) 94.
QUINTILIA, Endl. Gen. 1408 (1841).
Brandisii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 372.—Burma.
ecalcarata, Benn. Pl. Jav. Rar. 121.—Java.
grandifolia, Benth. Scroph. Ind. 57.—Malaya.
umbrosa, C. B. Clarke, Comm. & Cyrt. Beng. t. 89.—Assam.

STAUANTHUS, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 91. *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 303.
perforatus, Liebm. l. c. 92.—Mexic.

STAUREGTON, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 170, sphalm. = **STAUROGETON**, Reichb. = **Lemna**, Linn.

STAUROGLOTTIS, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 432 = **Phalaenopsis**, Blume (Orchid.).
violacea, Reichb. f. l. c. = P. violacea.

STAUROGETON, Reichb. Nom. 33 (1841) = **Lemna**, Linn.
trisulcus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 70 = L. trisulca.

STAUROGLOTTIS, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 432 = **Phalaenopsis**, Blume (Orchid.).
equestris, Schau. l. c. = P. rosea.

STAUROGYNE, Wall. Pl. As. Rar. ii. 80. t. 186 (1831) = **Ebermaiera**, Nees (Acanth.).
angustifolia, Wall. Cat. n. 4906 = E. angustifolia.
argentea, Wall. Pl. As. Rar. ii. 80. t. 186 = E. Staurogyne.

STAUROMATUM, Endl. Ench. 128 (1841), sphalm. = **Sauromatum**, Schott (Aroid.).

STAUOPHRAGMA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 90 (1843). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 929. natolicum, *Fisch. & Mey. l. c.*—As. Min.

STAUROPSIS, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 117. **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 572.

FIELDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 424. t. 36 (1826). fasciata, *Benth. & Hook. f. Gen. iii. 572.*—Ind. or. gigantea, *Benth. ex Pfitzer, Vergl. Morph. Orch. 14.*—Burma. lissochiloides, *Pfitzer, l. c.*—Ins. Philipp. pallens, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 117 = *Phalaenopsis pallens*. philippinensis, *Reichb. f. l. c.*—Ins. Philipp.

STAUROSPERMUM, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 73 (1827) = **Mitracarpum**, Zucc. (Rubiace.). verticillatum, Schum. & Thonn. l. c. = *M. scabrum*.

STAUROSTIGMA, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848) 129. **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 987.

ASTEROSTIGMA, Fisch. & Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iii. (1845) 148; Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. ii. (1852) 67, nomen prius. **RHOPALOSTIGMA**, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 39.

concinnum, *C. Koch, in Ender. Ind. Aroid. 77.*—Bras.

Luschnathianum, *C. Koch, l. c. 78.*—Bras. odorum, *Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848) 129.*—Bras.

Pavoni, *C. Koch, in Ender. Ind. Aroid. 78.*—Peruv. Riedelianum, *Engl. in Mart. Fl. Bras. iii. 11. 206.*—Bras.

Tweedianum, *C. Koch, in Ender. Ind. Aroid. 78.*—Bras.

Vellozianum, *C. Koch, l. c.* = *Luschnathianum*. vermitoxicum, *Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 517.*—Rep. Argent.

STAUROTHYRAX, Griff. Notul. iv. 476 (1854); Ic. Pl. Asiat. t. 584. f. 6 = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

STAVIA, Thunb. Nov. Gen. vii. 108 (1792), sphalm. = **Staavia**, Dahl (Bruniac.).

STAWELLIA, F. Muell. Fragm. vii. 85 (1870). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 796. dimorphantha, *F. Muell. l. c.*—Austral.

STECHMANNIA, DC. Prod. vi. 543 (1837) = **Jurinea**, Cass. (Compos.).

eribasis, *Jaub. & Spach, Illustr. ii. t. 179* = *J. eribasis*.

heterophylla, *Jaub. & Spach, l. c. 99. t. 181* = *J. heterophylla*.

leptoloba, *Jaub. & Spach, l. c. 100. t. 182* = *J. leptoloba*.

ramosissima, *Jaub. & Spach, l. c. i. 128. t. 66* = *J. ramosissima*.

Stachelinae, DC. Prod. vi. 543 = *J. Stachelinae*.

STECHYS, Boiss. Fl. Orient. iv. 694 (1879), err. typ. = **Stachys**, Linn. (Labiata.).

STEEGIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 634 (1841), sphalm. = **STEGIA**, DC. = **Lavatera**, Linn. (Malvac.).

STEENHAMERA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 838 (1834) = seq.

STEENHAMMERA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 337 (1831) = **Mertensia**, Roth (Borag.).

dahurica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 250 = *M. dahurica*.

kamcsatica, Turcz. l. c. = *M. paniculata*. maritima, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 337 = *M. maritima*.

STEENHAMMERA :—

Pallasii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 247 = *Mertensia sibirica*.

pilosa, Turcz. l. c. 249 = *M. paniculata*. *pterocarpa*, Turcz. l. c. 245 = *M. sibirica*. *rivularis*, Turcz. l. c. 248 = *M. rivularis*. *serrulata*, Turcz. l. c. 246 = *M. serrulata*. *sibirica*, Turcz. l. c. 247 = *M. sibirica*. *stylosa*, Turcz. l. c. 248 = *M. stylosa*. *virginica*, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 838 = *M. pulmonarioides*.

STEERBECKIA, J. F. Gmel. Syst. 820 (1791) = **STERBECKIA**, Schreb. = **Stingana**, Aubl. (Inc. Sed.).

STEETZIA, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 450 = **Olearia**, Moench (Compos.).

grandiflora, Sond. l. c. 452 = *O. grandiflora*. *Muelleri*, Sond. l. c. 453 = *O. pannosa*. *ovata*, Sond. l. c. 452 = *O. pannosa*. *pannosa*, Sond. l. c. 451 = *O. pannosa*.

STEFFENSIA, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 609 = **Piper**, Linn.

acutifolia, Kunth, l. c. 650 = *P. acutifolium*. *adunca*, Kunth, l. c. 633 = *P. aduncum*. *alnoides*, Kunth, l. c. 643 = *P. alnoides*. *ampla*, Kunth, l. c. 618 = *P. amplum*. *angustifolia*, Kunth, l. c. 622 = *P. angustifolium*. *anonaefolia*, Kunth, l. c. 619 = *P. anonaefolium*. *asperifolia*, Kunth, l. c. 644 = *P. asperifolium*. *asperiuscula*, Kunth, l. c. 631 = *P. hirsutum*. *caracasana*, Kunth, l. c. 664 = *P. caracasana*. *Carpunya*, Kunth, l. c. 690 = *P. Chaba*. *celtidifolia*, Kunth, l. c. 635 = *P. celtidifolium*. *chimonanthifolia*, Kunth, l. c. 628 = *P. chimonanthifolium*.

citrifolia, Kunth, l. c. 629 = *P. citrifolium*. *coccoloboides*, Kunth, l. c. 666 = *P. coccoloboides*. *consanguinea*, Kunth, l. c. 623 = *P. consanguineum*. *crassinervia*, Kunth, l. c. 659 = *P. crassinervium*. *crocata*, Kunth, l. c. 652 = *P. crocatum*. *diospyrifolia*, Kunth, l. c. 627 = *P. diospyrifolium*. *elongata*, Kunth, l. c. 637 = *P. elongatum*. *eucalyptifolia*, Kunth, l. c. 620 = *P. eucalyptifolium*. *evonymifolia*, Kunth, l. c. 624 = *P. lanceolatum*. *eximia*, Kunth, l. c. 665 = *P. obliquum*. *flexuosa*, Kunth, l. c. 644 = *P. flexuosum*. *fuliginea*, Kunth, l. c. 655 = *P. fuligineum*. *Gaudichaudiana*, Kunth, l. c. 638 = *P. Gaudichaudianum*.

geniculata, Kunth, l. c. 612 = *P. geniculatum*. *glabrata*, Kunth, l. c. 632 = *P. glabratum*. *hirsuta*, Kunth, l. c. 641 = *P. hirsutum*. *hydrangeifolia*, Kunth, l. c. 659 = *P. crassinervium*. *insigne*, Kunth, l. c. 667 = *P. insigne*. *Jacquemontiana*, Kunth, l. c. 631 = *P. citrifolium*. *lacunosa*, Kunth, l. c. 651 = *P. lacunosum*. *Lhotzkyana*, Kunth, l. c. 658 = *P. Lhotzkyanum*. *Luschnathiana*, Kunth, l. c. 616 = *P. Luschnathianum*. *mollis*, Kunth, l. c. 648 = *P. mollicomum*. *nitida*, Kunth, l. c. 611 = *P. nitidum*. *nubigena*, Kunth, l. c. 634 = *P. crocatum*. *obliqua*, Kunth, l. c. 663 = *P. obliquum*. *oblonga*, Kunth, l. c. 625 = *P. Chamissonis*. *Olfersiana*, Kunth, l. c. 645 = *P. hirsutum*. *Opizii*, Kunth, l. c. 641 = *P. Opizianum*. *plantaginea*, Kunth, l. c. 672 = *P. plantagineum*. *Poeppigii*, Kunth, l. c. 646 = *P. Poeppigii*. *pothifolia*, Kunth, l. c. 671 = *P. pothifolium*. *Pseudo-churumayu*, Kunth, l. c. 662 = *P. Pseudo-churumayu*.

Radula, Kunth, l. c. 650 = *P. Bredemeyeri*. *rhododendrifolia*, Kunth, l. c. 621 = *P. rhododendrifolium*. *richardiaefolia*, Kunth, l. c. 668 = *P. richardiaefolium*. *salicariaefolia*, Kunth, l. c. 6 = *P. salicariaefolium*. *scabra*, Kunth, l. c. 639 = *P. hirsutum*. *Schlechtendalii*, Kunth, l. c. 673 = *P. decumanum*. *scopulorum*, Kunth, l. c. 669 = *P. scopulorum*. *secunda*, Kunth, l. c. 626 = *P. secundum*. *Sellowiana*, Kunth, l. c. 657 = *P. Sellowianum*. *tectoniaefolia*, Kunth, l. c. 660 = *P. tectoniaefolium*. *tiliaefolia*, Kunth, l. c. 674 = *P. Schiedeianum*. *tuberculata*, Kunth, l. c. 614 = *P. tuberculatum*. *tumida*, Kunth, l. c. 654 = *P. tumidum*. *verrucosa*, Kunth, l. c. 613 = *P. verrucosum*. *xylopioides*, Kunth, l. c. 610 = *P. xylopioides*.

STEGANOTAENIA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beil. 4 = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.). *araliacea*, Hochst. l. c. = *P. araliaceum*.

STEGANOTROPIS, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1826); et in Flora, x. (1827) 96 = **Centrosema**, Benth. (Legumin.). *conjugata*, Lehm. ll. cc. = *C. conjugatum*.

STEGANOTUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 396 (1825) = **Arctotis**, Linn. (Compos.). *undulatus*, Cass. l. c. = *A. laciniata*.

STEGIA, DC. Fl. Fr. iv. 835 (1805) = **Lavatera**, Linn. (Malvac.). *Lavatera*, DC. l. c. = *L. trimestris*.

STEGITRIS, Rafin. Sylva Tellur. 132 (1838) = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.). *algarviensis*, Rafin. l. c. = *H. ocyroides*. *atriplicifolius*, Rafin. l. c. = *H. atriplicifolium*. *calycinus*, Rafin. l. c. = *H. calycinum*. *lasianthus*, Rafin. l. c. = *H. alyssoides*.

STEGNOCARPUS, Torr. in Pacif. Rail. Rep. ii. 169 (1855) = **Coldenia**, Linn. (Borag.). *canescens*, Torr. l. c. 169. t. 7 = *C. canescens*.

STEGNOSPERMA, Benth. Bot. Voy. Sulph. 17. t. 12 (1844). **PHYTOLACCACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 87.

CHLAMYDOSPERMA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 631 (1845). cubense, *A. Rich. Ess. Fl. Cub. 632.*—Cuba. halimifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph. 17. t. 12.*—Mexic.

STEGOLEPIS, Klotzsch, ex Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 480. **RAPATEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 859.

MONOTREMA, Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 475.

aemulans, *Benth. & Hook. f. Gen. iii. 859.*—Bras. *ferruginea*, *Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 331.*—Guian.

guianensis, *Klotzsch, ex Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 481.*—Guian.

STEGOSIA, Lour. Fl. Cochinch. 51. (1790) = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.). *cochinchinensis*, Lour. l. c. = *R. exaltata*.

STEIGERIA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 215 = **Baloghia**, Endl. (Euphorb.). *montana*, Muell. Arg. l. c. = *N. Caled.*

STEINCHISMA, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 220 = **Panicum**, Linn. (Gramin.). *divaricatum*, Rafin. l. c. = *P. debile*? *hians*, Rafin. l. c. = *P. debile*.

STEINERIA, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 64. t. 5 C = **Begonia**, Tourn. *ferruginea*, Klotzsch, l. c. 65 = *B. Hookeriana*. *pulchella*, Klotzsch, l. c. = *B. pulchella*.

STEINHEILIA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 339. t. 12. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 748. *radians*, *Decne. l. c.*—Arab.

STEINMANNIA, Opiz, Seznam, 93 (1852) = **Rumex**, Linn. (Polygonac.). *aurea*, Opiz, l. c. = *R. maritimus*. *flavo-virens*, Opiz, l. c. = *R. palustris*.

STEINMANNIA, Phil. f. in Anal. Univ. Chil. (1884) [reimpr.] 10. **LILIACEAE**. *graminifolia*, *Phil. f. l. c.*—Chili.

STEINREITERA, Opiz, Seznam, 93 (1852) = **Thesium**, Linn. (Santalac.). *secunda*, Opiz, l. c. = *T. alpinum*.

STEINSCHISMA, Steud. Nom. ed. II. ii. 635 (1841) = **STEINCHISMA**, Rafin. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

STEIRACTIS, DC. Prod. v. 345 (1836) = *Olearia*, Moench (Compos.).
arborescens, DC. l. c. = *O. nitida*.

STEIRACTIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 5 (1836) = *Layia*? Hook. & Arn. (Compos.).

STEIRANISIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 68 (1836) = *Saxifraga*, Tourn.
heterantha, Rafin. l. c. 69 = *Saxif. Mertensiana*.
punctata, Rafin. l. c. = *Saxif. umbrosa*.
reflexa, Rafin. l. c. = *Saxif. reflexa*.

STEIREMA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 363 (1880), sphalm. = seq.

STEIREMIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1836) = *Telanthera*, R. Br. (Amarant.).
ciliata, Rafin. New Fl. Am. iv. 45 = *Digera arvensis*.
ficoidea, Rafin. Fl. Tellur. iii. 41 = *T. ficoidea*.
repens, Rafin. l. c. = *T. polygonoides*.
sessilifolia, Rafin. l. c. = *Alternanthera sessilis*?

STEIREYA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 100 (1836) = *Trichopus*, Gaertn. (Dioscor.).
angustifolia, *cordata*, *media*, Rafin. l. c. = *T. zeylanicus*.

STEIROCOMA, Reichb. Nom. 88 (1841) = *Dicoma*, Cass. (Compos.).

STEIROCTIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836) (Thymel.).
capitata, Rafin. l. c. = *Lachnaea capitata*.
uniflora, Rafin. l. c. = *Cryptadenia uniflora*.

STEIRODISCUS, Less. Syn. Comp. 251 (1832).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 264.
capillaceus, Less. l. c. = *Afr. austr.*
linearilobus, DC. Prod. vi. 74. = *Afr. austr.*

STEIROGLOSSA, DC. Prod. vi. 38 (1837) = *Brachycome*, Cass. (Compos.).
chamomillaefolia, DC. l. c. 39 = *B. iberidifolia*.
humilis, DC. l. c. = *B. diversifolia*.
lineariloba, DC. l. c. = *B. ptychocarpa*.
rigidula, DC. l. c. = *B. ciliaris*.

STEIRONEMA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vii. (1820) 193. *PRIMULACEAE*.
ciliatum, Rafin. l. c. = *Europ.*; *Am. bor.*
floridum, Baudo, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 346 = *lanceolatum*.
heterophyllum, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vii. (1820) 193. = *Am. bor.*
hybridum, Rafin. l. c. = *heterophyllum*.
lanceolatum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1876) 63 = *heterophyllum*.
longifolium, A. Gray, l. c. = *Am. bor.*
longifolium, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vii. (1820) 193. = *Am. bor.*
radicans, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1876) 63. = *Am. bor.*
revolutum, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vii. (1820) 193 = *longifolium*, Rafin.

STEKHOVIA, De Vriese, in Nat. Verh. Haarl. x. (1854) 166 = *Goodenia*, Sm.
scapigera, De Vriese, l. c. 167. t. 32. f. 1-12 = *G. scapigera*.
viscida, De Vriese, l. c. 168 = *G. viscida*.

STELANTHES, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 339 (1812) = *Marlea*, Roxb. (1814) (Cornac.).
solitarius, Stokes, l. c. = *M. begonifolia*.

STELECHOCARPUS, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 94 (1855). *ANONACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 22.
Burakol, Hook. f. & Thoms. l. c. = *Malaya*.
montana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 22. = *Java*.

STELECHOSPERMUM, Blume, Fl. Jav. Dipter., in Adnot. (1829). *Genus dubium GUTTIFERARUM*.
—Cf. Benth. & Hook. f. i. 170.
flexuosum, Blume, l. c. = *Java*.

STELEPHUROS, Adans. Fam. ii. 31 (1763) = *Phleum*, Linn. (Gramin.).

STELESTYLIS, Drude, in Mart. Fl. Bras. iii. II. 230. t. 53. *CYCLANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 952.
coriacea, Drude, l. c. 231. = *Bras.*

STELIS, Sw. in Schrad. Journ. ii. (1799) 239. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 490.

DIALISSA, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1844) 107.

abrupta, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 7. = *N. Granat.*

acuífera, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 12. = *N. Granat.*

acutiflora, Willd. Sp. Pl. iv. 139. = *Peruv.*

acutissima, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 14. = *Peruv.*

alata, Lindl. l. c. 18. = *Venezuela.*

alba, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 363. = *Peruv.*

alismaefolia, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 16. = *Peruv.*

angustifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 362. = *N. Granat.*

apiculata, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 11. = *Peruv.*

aprica, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Bras.*

argentata, Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 64. = *Guian.*

ascendens, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Peruv.*

aspera, Pers. Syn. ii. 524. = *Peruv.*

atra, Lindl. Orch. Linden. 3. = *Venezuela.*

atropurpurea, Hook. Bot. Mag. t. 3975 = *ciliaris.*

atroviolacea, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 70. = *Venezuela.*

attenuata, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 2. = *N. Granat.*

aviceps, Lindl. l. c. 16. = *Peruv.*

barbicollis, Lindl. l. c. 9. = *Peruv.*

barrensis, Lindl. l. c. 6. = *Bras.*

bicornis, Lindl. l. c. 18. = *Peruv.*

biflora, Sm. in Rees, Cyclop. xxxiv. n. 13 (Bulbophyllum sp.). = *Reg. Himal.*

biserrula, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 16. = *Peruv.*

braccata, Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia, ii. (1854) 114. = *N. Granat.*

brevilabris, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. v. (1845) 107. = *N. Granat.*

Bruchmuelleri, Reichb. f. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 6521 (Brueckmuelleri). = *Mexic. ?*

caespitifica, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 71. = *Venezuela.*

caespitosa, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Bras.*

campanulifera, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 3. = *Bolivia.*

canaliculata, Reichb. f. in Gard. Chron. (1872) 1718. = *N. Granat.*

capillaris, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Peruv.*

capillipes, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 240 = *flexuosa.*

carnosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 361. = *Am. austr.*

catharinensis, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Peruv.*

caudata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 32 = *Bulbophyllum odoratissimum.*

chachapoyensis, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 225. = *Peruv.*

chlorantha, Rodrig. Orch. Nov. ii. 86. = *Bras.*

ciliaris, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Mexic.*

columnaris, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 15. = *Peruv.*

concinna, Lindl. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 11. = *Peruv.*

connata, Presl, Rel. Haenk. i. 103. = *Peruv.*

contorta, Pers. Syn. ii. 524. = *Peruv.*

cordata, Willd. Sp. Pl. iv. 140. = *Peruv.*

coriifolia, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 18. = *Venezuela.*

costaricensis, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 225. = *Costa Rica.*

crassifolia, Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 9. = *N. Granat.*

cupuligera, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 114. = *Peruv.*

cymbiformis, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 11. = *Venezuela.*

dactyloptera, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 19. = *Ecuador.*

densiflora, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 16. = *Peruv.*

depauperata, Lindl. l. c. 16. = *Peruv.*

deregularis, Rodrig. Orch. Nov. ii. 94. = *Bras.*

Dialissa, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 71. = *N. Granat.*

discolor, Reichb. f. l. c. 241. = *Peruv.*

STELIS:—

disticha, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 47. t. 81. = *Peruv.*

drosophila, Rodrig. Orch. Nov. ii. 88. = *Bras.*

dubia, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 8. = *Peruv.*

elator, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Peruv.*

elongata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 363. = *N. Granat.*

endocharis, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 8. = *N. Granat.*

Endresii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1870) 1373. = *Costa Rica.*

eublepharis, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 240. = *Peruv.*

euspatha, Reichb. f. l. c. 225. = *Bolivia.*

fasciculiflora, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 99. = *Hab. ?*

Fendleri, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 3. = *Venezuela.*

filiformis, Lindl. l. c. 6. = *Bras.*

fissa, Lindl. l. c. 5. = *Peruv.*

flacca, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 210. = *Peruv.*

flavida, H. C. Focke, in Tijdschr. Wetensch. ii. (1849) 202 = *Pleurothallis flavida.*

flexuosa, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xii. (1843) 397. = *Peruv.*

floreia, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 5. = *Venezuela.*

floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 362. = *N. Granat.*

foliosa, Hook. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 330 = *Polystachya cerea.*

foveata, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 2. = *Peruv.*

fraterna, Lindl. l. c. 14. = *Bras.*

Gigas, Rodrig. Orch. Nov. ii. 89. = *Bras.*

gladiata, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 9. = *Peruv.*

globiflora, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 19. = *Ecuador.*

glossula, Reichb. f. in Gard. Chron. (1870) 1373. = *Costa Rica.*

glumacea, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 3. = *Peruv.*

graminea, Lindl. l. c. 11. = *Peruv.*

grandiflora, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 353. = *Bras.*

grandis, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 70. = *Venezuela.*

grossilabris, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) II. 717. = *Hab. ?*

gutturosa, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 23. = *Venezuela.*

Hallii, Lindl. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 12. = *Peruv.*

hemicardia, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 8. = *N. Granat.*

herbiola, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 10. = *N. Granat.*

Heylidyana, H. C. Focke, in Tijdschr. Wetensch. ii. (1849) 201. = *Guian.*

hirta, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 3. = *Peruv.*

hirta, Sm. in Rees, Cyclop. xxxiv. n. 11 = *Bulbophyllum hirtum.*

humilis, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 10. = *Venezuela.*

hylophila, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 241. = *Peruv.*

iminapensis, Reichb. f. Xenia Orch. iii. 25. = *Bolivia.*

intermedia, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 46. t. 79. = *Peruv.*

Jamesoni, Lindl. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 11. = *Ecuador.*

lamellata, Lindl. in Hook. Ic. Pl. t. 62. = *Ecuador.*

lanata, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 13. = *Ecuador.*

lancea, Lindl. l. c. 3. = *Peruv.*

lanceolata, Willd. Sp. Pl. iv. 139. = *Peruv.*

lancilabris, Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am. 94. t. 8. = *Costa Rica.*

lentiginosa, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 8. = *Peruv.*

leucopogon, Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am. 95. t. 9. = *Costa Rica.*

Liebmanni, Reichb. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 203. = *Mexic.*

Lindeni, Lindl. Orch. Linden. 3. = *Venezuela.*

littoralis, Rodrig. Orch. Nov. ii. 85. = *Bras.*

lobata, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 241. = *Peruv.*

loxensis, Lindl. in Benth. Pl. Hartw. 149. = *Ecuador.*

lutea, Lindl. Fol. Orch. Stelis, 7. = *Venezuela.*

macrocarpa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 363. = *N. Granat.*

macrostachya, Lodd. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 643, nomen (Quid?). = *Am. centr.*

major, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 23. = *Venezuela.*

STELIS:—

- maxima, *Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xv. (1845) 106.—Peruv.
 megantha, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 83.—Bras.
 melanoxantha, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 71.—Venezuela.
 micrantha, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 93.—Bras.
 micrantha, *Sw. in Schrad. Journ. ii.* (1799) 240.—Jamaic.
 microcaulis, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 85.—Bras.
 microglossa, *Reichb. f. in Linnaea*, xxii. (1849) 821.—Bras.
 microphylla, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 10.—Peruv.
 microstigma, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 94. t. 8.—Costa Rica.
 microtis, *Reichb. f. l. c.* 95. t. 8.—Costa Rica.
 Miersii, *Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xii. (1843) 396.—Bras.
 Miqueliana, *Lindl. Fol. Orch. Pleuroth.* 17, sphalm. = *Pleurothallis Miqueliana*.
 modesta, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 87.—Bras.
 mononeura, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 4.—Peruv.
 muscifera, *Lindl. l. c.* 2.—Venezuela.
 muscosa, *Lindl. l. c.* 7.—Venezuela.
 myriantha, *Lindl. l. c.* 10.—Peruv.
 nana, *Lindl. l. c.* 16.—Peruv.
 nanegalensis, *Lindl. l. c.* 8.—Peruv.
 nitens, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 22.—Venezuela.
 nutans, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 15.—Peruv.
 oblonga, *Willd. Sp. Pl.* iv. 139.—Peruv.
 oblongifolia, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 12.—Peruv.
 obscurata, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 95. t. 8.—Costa Rica.
 ochreata, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 2.—Peruv.
 odoratissima, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxiv. n. 12 = *Bulbophyllum odoratissimum*.
 oligantha, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 93.—Bras.
 omalosantha, *Rodrig. l. c.* i. 34.—Bras.
 ophioglossoides, *Sw. in Schrad. Journ. ii.* (1799) 239.—Am. austr.
 ovalifolia, *H. C. Focke, in Tijdschr. Wetensch.* ii. (1849) 262 = *Pleurothallis ovalifolia*.
 pachystachya, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 13.—N. Granat.
 palmeiraënsis, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 92.—Bras.
 papaquerensis, *Reichb. f. in Linnaea*, xxii. (1849) 822.—Bras.
 parahybanensis, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 84.—Bras.
 paraënsis, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 88.—Bras.
 pardipes, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 96.—Costa Rica.
 parviflora, *Pers. Syn. ii.* 524 = *micrantha*, *Sw.*
 parvilabris, *Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xv. (1845) 385.—N. Granat.
 parvula, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 7.—Nicaragua.
 pauciflora, *Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xii. (1843) 396.—Bras.
 peliochyla, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 84.—Bras.
 penduliflora, *Rodrig. l. c.* 91.—Bras.
 pentodonta, *Reichb. f. in Linnaea*, xxii. (1849) 821.—Am. trop.
 petropolitana, *Reichb. f. in Wawra, Bot. Ergeb. Maxim. Bras.* 151.—Bras.
 philargyrus, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 118.—Venezuela.
 piperina, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 17.—Peruv.
 polybotrya, *Lindl. l. c.* 4.—Peruv.
 polyclada, *Lindl. l. c.* 10.—Peruv.
 polystachya, *Willd. Sp. Pl.* iv. 139.—Am. austr.
 Porpax, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 23.—Venezuela.
 puberula, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 86.—Bras.
 Pugiunculi, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 17.—Peruv.
 pulchella, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 364. t. 90 = *Pleurothallis pulchella*.
 Purdiaei, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 5.—N. Granat.
 purpurascens, *A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér.* III. iii. (1845) 18.—Mexic.
 purpurea, *Willd. Sp. Pl.* iv. 140 = *Pleurothallis linearis*.
 pusilla, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 361.—Ecuador; Jamaic.
 racemiflora, *Lodd. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 643, nomen (Quid?).—Jamaic.
 racemosa, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxiv. n. 10 = *Liparis odorata*?
 reflexa, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 3.—Peruv.
 revoluta, *Willd. Sp. Pl.* iv. 140.—Peruv.

STELIS:—

- Ruprechtiana, *Reichb. f. in Linnaea*, xxii. (1849) 821.—Bras.
 scabrida, *Lindl. in Ann. Nat. Hist. Ser. I.* v. (1840) 115.—Ins. Dominic.
 Scansor, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 241.—Peruv.
 Serra, *Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xii. (1843) 397.—Peruv.
 sesquipedalis, *Lindl. Orch. Linden.* 3.—Venezuela.
 setacea, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 3.—Bolivia.
 smaragdina, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 90.—Bras.
 spathulata, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* i. 46. t. 80.—Peruv.
 sphaerochila, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 13.—Venezuela.
 spiralis, *Pers. Syn. ii.* 524 = *Pleurothallis spiralis*.
 stenophylla, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 70.—Peruv.
 striolata, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 4.—Peruv.
 superbiens, *Lindl. l. c.* 8.—N. Granat.
 tenuicaulis, *Lindl. l. c.* 16.—Bolivia.
 tenuilabris, *Lindl. l. c.* 4.—Venezuela.
 thecoglossa, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 93.—Costa Rica.
 triangularis, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 91.—Bras.
 tricardium, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 14.—Peruv.
 trichorrhachis, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 71.—N. Granat.
 tridentata, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 6.—Peruv.
 triplicata, *Lindl. l. c.* 2.—Peruv.
 trisetata, *Lindl. l. c.* 17.—Bolivia.
 tristyla, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) Misc. 42.—Bras.
 triura, *Lindl. Orch. Linden.* 3 (an gen.?).—Venezuela.
 truncata, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 353.—Peruv.
 tubata, *Lodd. Bot. Cab. t.* 1601 = *Physosiphon Loddigesii*.
 Tweediana, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 7.—Bras.
 velutina, *Lindl. l. c.* 17.—Peruv.
 vinosa, *Rodrig. Orch. Nov. ii.* 89.—Bras.
 viridipurpurea, *Lindl. Fol. Orch. Stelis*, 3.—Bras.
 vittata, *Lindl. l. c.* 13.—Peruv.
 Vulcani, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 19.—Ecuador.
 zonata, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) II. 556.—Guian.
- STELLA, *Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 377 = *Astragalus*, *Tourn.* (Legumin.).
radiata, *Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvi. (1868) 364 = *A. Stella*.
sesamea, *Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 377 = *A. sesameus*.
- STELLANDRIA, *Brickell, in Med. Repos. N. York*, vi. (1803) 327 = *Schizandra*, *Michx.* (Magnol.).
glabra, *Brickell, l. c.* = *Sch. coccinea*.
- STELLARA, *Fisch. ex Reut. in DC. Prod.* xi. 39 (1847) = *Boschniakia*, *C. A. Mey.* (Orobanch.).
lathraeoides, *Fisch. ex Reut. l. c.* = *B. glabra*.
- STELLARIA, *Hall. Enum. Stirp. Helv.* i. 198 (1742) = *Callitriche*, *Linn.* (Halor.).
autumnalis, [Weber, in] *Wigg. Prim. Fl. Holsat.* 2 = *C. autumnalis*.
intermedia, [Weber, in] *l. c.* = *C. verna*.
verna, [Weber, in] *l. c.* = *C. verna*.
- STELLARIA, *Linn. Sp. Pl. ed. I.* 421 (1753).
CARYOPHYLLEAE, *Benth. & Hook. f.* i. 149.
ADENONEMA, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1836) 448 (Verz. Suppl. Fl. Alt. 36).
DICHODON, *Reichb. Nom.* 205 (1841).
HYLEBIA, *Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvi. (1868) 347.
LARBREA, *A. St. Hil. in Mém. Mus. Par.* ii. (1815) 287.
KRASCHENNIKOVIA, *Turcz. ex Bess. in Flora*, xvii. (1834) i. Beibl. 9.
LEUCOSTEMMA, *Benth. in Wall. Cat. n.* 642 (1828); et ex *G. Don, Gen. Syst. i.* 449 (1831).
MALACHIUM, *Fries, Fl. Halland.* 77 (1817).
MICROPETALON, *Pers. Syn. i.* 509 (1805).
MYOSANTHUS, *Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvi. (1868) 348.
MYOSOTON, *Moench, Meth.* 225 (1794).
SCHIZOTECHNIUM, *Reichb. Nom.* 205 (1841).

STELLARIA:—

- SPERGULASTRUM, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 275 (1803).
 STELLULARIA, *Linn. Syst. ed. VI* (1748).
 abortiva, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 265.—Chili.
 aculeata, *Scop. Fl. Carn. ed. II.* i. 316 = *Arenaria grandiflora*.
 adulterina x, *Focke, in Bremen, Abh.* i. (1867) 145.—Europ.
 alpestris, *Fries, Mant. i.* 10 = *borealis*.
 alpestris, *Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i.* 387 = *longipes*.
 alpicola, *Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr.* i. 148 = *media*.
 alpina, *S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 660 = *Cerastium alpinum*.
 alsinaefolia, *Less. ex Ledeb. Fl. Ross. i.* 380 = *dichotoma*.
 Alsine, *Afzel. & Wadsb. in Roem. Archiv*, iii. (1803) 97 = *media*.
 Alsine, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii.* 156 = *crassifolia*.
 Alsine, *Hoffm. Deutschl. Fl. ed. I.* 153 = *uliginosa*.
 alsinoides, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 41.—Persia.
 alsinoides, *Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III.* 29 = *media*.
 altenoides, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 291, sphalm. = *alsinoides*.
 amblyosepala, *Schrenk, Enum. Pl. Nov.* ii. 54.—Soongar.
 anagalloides, *Rupr. Fl. Cauc.* 222.—Reg. Cauc.
 angustifolia, *Hook. Journ. Bot. i.* (1834) 250 = *palustris*.
 anomala, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 785 = *Cerastium anomalum*.
 apetala, *Opiz, ex Nym. Consp.* 111 = *media*.
 apetala, *Ucria, in Roem. Arch.* i. i. (1796) 68.—Sicil.
 aphanantha, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 27.—Reg. Argent.
 aquatica, *Cham. & Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 50 = *borealis*.
 aquatica, *Pollich, Hist. Pl. Palat. i.* 429 = *uliginosa*.
 aquatica, *Scop. Fl. Carn. ed. II.* i. 319.—Europ.; As. bor.
 Arenaria, *Linn. Sp. Pl.* 1196 = *Arenaria spathulata*.
 aristata, *Ser. in DC. Prod. i.* 396.—Mexic.
 arvalis, *Phil. f. Cat. Fl. Vasc. Chil.* 26 = *prostrata*.
 arvensis, *S. F. Gray, Nat. Arr. Br. Pl.* ii. 660 = *Cerastium arvense*.
 arvensis, *Scop. Fl. Carn. ed. II.* i. 318 = *Spergula arvensis*.
 australis, *Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie*, ii. (1845) 581.—Java.
 Baldwini, *Fenzl, ex Peyr. in Linnaea*, xxx. (1859-60) 57.—Mexic.
 Barthiana, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn*, xv. II. (1877) 142 = *graminea*.
 biflora, *Host, Syn. Pl. Austr.* 243 = *Arenaria polygonoidea*.
 biflora, *Linn. Sp. Pl.* 422.—Europ.
 biflora, *Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 317 = *Arenaria lateriflora*.
 biflora, *Rudolph, ex Ledeb. Fl. Ross. i.* 387 = *florida*.
 biflora, *Wulf. in Jacq. Coll. i.* 351 = *Arenaria austriaca*.
 Boraëana, *Jord. Pugill. Pl. Nov.* 33 = *media*.
 borealis, *Bieb. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 636 = *petraea*.
 borealis, *Bigel. Fl. Bost. ed. II.* 182.—Reg. bor. et arct.
 borealis, *Darling. Fl. Cestr.* 274 = *uliginosa*.
 brachypetala, *Bong. Vég. Ins. Sitcha*, 126 = *borealis*.
 brachypetala, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii.* 161.—Sibir. altaic.
 bracteata, *Richt. in Klatt & Richt. Fl. Leipz.* 386 = *uliginosa*.
 Brauniana, *Fenzl, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 60.—Afr. trop.
 breviflora, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 151 = *uliginosa*.
 brevifolia, *Borkh. in Rhein. Mag. i.* (1793) 523 = *graminea*.
 brevifolia, *Schum. Pl. Saell.* 142 = *crassifolia*.
 Brotherana, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 153.—Reg. Cauc.
 bulbifera, *Benth. in Journ. Linn. Soc. vi.* (1862) 67.—Europ. centr.
 bulbosa, *Wulf. in Jacq. Coll. iii.* 21.—Europ. or.; As. bor.; Reg. Himal.

STELLARIA:—

Bungeana, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 376 = nemorum.
caespitosa, Duf. in Act. Soc. Linn. Bord. viii. (1836) 91 = radicans?
caespitosa, Hook. f. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 411 = palustris.
caespitosa, Vest, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 636 = holostea.
calycantha, Bong. Vég. Ins. Sitcha, 127 = borealis.
Cerastium, Murr. Syst. ed. XV. 452; ex DC. Prod. i. 396 = media.
cerastoides, Linn. Sp. Pl. 422 = Cerastium trigynum.
cerastoides, Merlet, ex Steud. Nom. ed. I. 813 = Cerastium anomalum.
chinensis, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) 1. 283, in textu.—China.
ciliata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 152 = S. Holostea.
ciliata, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 315 = Arenaria polygonoides.
ciliata, Vahl, ex Pers. Syn. i. 501.—Peruv.
ciliata, Willd. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 26 = ovata.
ciliatosepala, Trautv. in Middend. Sibir. Reise, i. II. 52. t. 8.—Sibir.
cilicica, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. v. 59.—As. Min.; Syria.
connata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 250 = S. Holostea.
cordata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 152 = nemorum.
cordata, S. G. Gmel. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 402 = Cerastium davuricum.
cordata, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 197.—Am. austr.
crassifolia, Boland. Cat. Pl. Calif. 6, nomen = borealis.
crassifolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 50 = humifusa.
crassifolia, Ehrh. in Hannov. Mag. 8tes St. (1784) 116; et ex F. F. Gmel. Syst. 718.—Reg. bor. et arct.
crassifolia, S. Wats. Bot. King's Exped. 38 = longipes.
crispata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 51.—Fret. Behring.
crispata, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 215; Cat. n. 633.—Reg. Himal.
cryptopetala, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 27.—Reg. Argent.
Cupaniana, Nym. Consp. 111 = media.
cuspidata, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 196 = nemorum.
davurica, Spreng. Syst. ii. 398 = petraea.
davurica, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 195.—Dahuria.
debilis, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 618.—Patagon.
decandra, Schur, Enum. Pl. Transs. 970 (Index) = media.
decipiens, Hook. f. Fl. Antarct. 7.—Ins. Dom. Auckland.
decumbens, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 35.—Reg. Himal.
depauperata, Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 234.—Reg. Himal.
diandra, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 379.—Japon.
dichotoma, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 976 = media.
dichotoma, Linn. Sp. Pl. 421.—Sibir.
dichotoma, Patrin, ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 153 = nemorum.
dichotoma, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 314 = bulbosa.
dichotoma, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 34 = crassifolia.
diceranoides, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 395.—Fret. Behring.
diffusa, Pall. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 195 = longifolia.
Dilleniana, Leers, Fl. Herborn. 107 = uliginosa.
Dilleniana, Moench, Enum. Pl. Hass. 214 = palustris.
discolor, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 88; xv. (1842) 601.—Dahuria.
diversiflora, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 379, in nota.—Japon.
domingensis, Spreng. Syst. ii. 392.—Ins. S. Doming.
drymarioides, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 24.—Zeylan.
dubia, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 24 = Cerastium anomalum.
eciliata, Rupr. Fl. Cauc. 297.—Reg. Cauc.

STELLARIA:—

Edwardssii, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. p. cclxxi = longipes.
elatinoides, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 25.—N. Zel.
elegans, Meinsh. in Baer & Helm. Beitr. Kenntn. Russ. Reich. xxvi. 146.—Sibir. or.
elegans, Ser. in DC. Prod. i. 400 = Cerastium trigynum.
Elisabethae, F. Schultz, Arch. Fl. 302 = media.
elodes, Bieb. ex Bess. Enum. Pl. Vollh. 81 = crassifolia.
elongata, Nutt. Gen. Am. i. 289 = Arenaria lanuginosa.
eriantha, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 388 = davurica.
Eschscholtziana, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 384.—Kamtschat.
exigua, Steph. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 636 = petraea.
falcata, Ser. in DC. Prod. i. 398 = davurica.
Fenzliana, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 141 = longissima.
Fenzlii, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) 1. 264, 280 = borealis.
Fischeriana, Ser. in DC. Prod. i. 398 = florida.
flaccida, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 275.—Austral.
flaccida, Peterm. Fl. Lips. Excurs. 324 = graminea? florida, Fisch. ex DC. Prod. i. 399.—Camtschat.
foecunda, Hance, in Walp. Ann. ii. 95 = aquatica.
fontana, Wulf. in Jacq. Coll. i. 327 = uliginosa.
Frieseana, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 388 = davurica.
Friesiana, Ser. in DC. Prod. i. 397.—Europ. bor.
geniculata, Gueldest. Reisen, i. 192; ex Ledeb. Fl. Ross. i. 395 (Quid?)—Reg. Cauc.
glabella, Nym. Consp. 111 = media.
glacialis, Lagg. in Oestr. Bot. Zeitschr. xviii. (1868) 242 = uliginosa.
glandulifera, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 515 = glandulosa.
glandulifera, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 141.—Ind. or.
glandulosa, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. 673.—Hungar.
glareosa, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 636 = Cerastium trigynum.
glauca, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 207 = Cerastium manticum.
glauca, E. Mey. Pl. Lab. 93 = longipes.
glauca, Salisb. Prod. 301 = S. Holostea.
glauca, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 388 = davurica.
glauca, With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 420.—Europ.; Sibir.
Gmelini, Nesterofsky, ex Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 293 = Gypsophila uralensis.
gracilentia, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 326.—N. Zel.
gracilis, Lange, ex Hage, Obflod. in Ersler, Geogr. Tidsskr. v. (1881) Hefte ix—x. 144 = crassifolia.
gracilis, Richards, in Frankl. 1st Journ. App. 738 = uliginosa.
graminea, Bigel. Fl. Bost. ed. I. 110 = longifolia.
graminea, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 48 = longipes.
graminea, Grev. in Mem. Wern. Soc. iii. (1820) 429 = longipes?
graminea, James, in Trans. Am. Phil. Soc. ii. (1825) 181, nomen = Jamesiana.
graminea, Linn. Sp. Pl. 422.—Europ.; As. bor.
graminifolia, Gmel. ex Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 381 = S. Holostea.
graminifolia, Salisb. Prod. 301 = graminea.
grandiflora, Gilib. Fl. Lituan. ii. 151 = graminea.
grandiflora, Woods, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 264 = media.
groenlandica, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. II. 107 = Arenaria groenlandica.
gypsophiloides, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 380.—China.
hebecalyx, Fenzl, in Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 26.—Lapponia.
helodes, Auct. = elodes.
heterophylla, Magn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxviii. (1881) 82 = glauca.
Holostea, Linn. Sp. Pl. 422.—Europ.; Reg. Cauc.
humifusa, Retz. Fl. Scand. ed. I. 84 = crassifolia.
humifusa, Rottb. in Skrivt. Vidensk. Selsk. Kiob. x. (1770) 447.—Reg. bor. et arct.
hypericifolia, All. Fl. Pedem. ii. 115 = uliginosa.
hypericifolia, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 34.—Europ.

STELLARIA:—

imbricata, Bong. ex Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 385 = Eschscholtziana.
imbricata, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 159.—Sibir. altaic.
irrigua, Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 35.—Sibir. altaic.
Jamesiana, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 169.—Am. bor. occ.
Jamesii, Steud. Nom. ed. II. ii. 636, sphalm. = praec.
Jamesonii, G. Don, Gen. Syst. i. 428, sphalm. = praec.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 79.—Japon.
juncea, Fries, Summa Veg. Scand. 37 = graminea.
Kingii, S. Wats. in Bot. King's Exp. 39. t. 6.—Am. bor. occ.
Kotschyana, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. i. 705.—Persia.
labradorica, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. II. (1818) 24 = Arenaria groenlandica.
laeta, Richards, in Frankl. 1st Journ. App. 738 = longipes.
laevis, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871–73) 275.—Peruv.
lanata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 232.—Reg. Himal.
lanceolata, Poir. Encyc. vii. 416.—Reg. Magellan.
lanceolata, Torr. Fl. U. St. 453 = borealis.
lanuginosa, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 187 = Arenaria lanuginosa.
laricifolia, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 317 = Arenaria laricifolia, recurva.
lateriflora, Fleisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 101 = crassifolia.
lateriflora, Krock. Fl. Siles. ii. 1. 52 = uliginosa.
latifolia, Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 231.—Reg. Himal.
latifolia, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 660 = Cerastium latifolium.
latifolia, Pers. Syn. i. 501 = media.
Laxmanni, Fisch. ex DC. Prod. i. 397 = glauca.
leptopetala, Benth. Pl. Hartw. 163.—N. Granat.
leptophylla, Hance, in Walp. Ann. ii. 96.—China.
ligustrina, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 180 = Schiedea ligustrina.
linoides, Tausch, in Flora, xix. (1836) 413 = uliginosa.
litigiosa, Magn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxviii. (1881) 82 = glauca.
littoralis, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 69.—Calif.
longicaulis, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 90 (Quid?)—Europ.
longifolia, Fries, in Svensk Bot. viii. t. 506 = Friesiana.
longifolia, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 479.—Sibir.; Am. bor.
longifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 636, sphalm. = longissima.
longifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 88 = graminea.
longipes, Goldie, in Edinb. Phil. Journ. vi. (Apr. 1822) 327.—Am. bor. et arct.
longissima, Wall. Cat. n. 632.—Reg. Himal.
lycopodioides, Fenzl, ex Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871–73) 275 = laevis.
macropetala, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 184.—Am. bor. occ.
magna, Gueldest. Reisen, i. 427; ex Ledeb. Fl. Ross. i. 395 (Quid?)—Reg. Cauc.
Mannii, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 183.—Afr. trop.
mantica, DC. Fl. Fr. iv. 794 = Cerastium manticum.
marginata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 50 = humifusa.
media, Cyrill. Char. Comm. (1784) 36.—Geront. temp.
media, Sibth. Fl. Oxon. 141 = palustris.
media, Wight, ex Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 229 = crispata.
Meyeriana, Rupr. Fl. Cauc. 297. t. 5. f. 3.—Reg. Cauc.
micrantha, Spruce, ex Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871–73) 280.—Ecuador.
microphylla, Schur, Enum. Pl. Transs. 116 = media.
modesta, Fenzl, in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 165 (Quid?)—Malaya.
Moenchii, Magn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxviii. (1881) 82 = glauca.
moenchioides, Fenzl, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 675 = nitens.
mollis, Fisch. ex DC. Prod. i. 397 = velutina.

STELLARIA :—

- mollis*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 142 = longissima.
- mollis*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 196 = Cerastium Willdenowii.
- mollis*, Wirzén, Geogr. Pl. Prov. Casan. 43. n. 95 = borealis.
- molluginea*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 56 = Arenaria molluginea.
- monogyna*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 215 = media.
- monosperma*, Buch.-Ham. ex D. Don, l. c. = crispata.
- mosquiensis*, Bieb. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 195 = longifolia.
- multicaulis*, Willd. Sp. Pl. ii. 714 = Cerastium trigynum.
- multiflora*, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 275. — Austral.
- muralis*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 429 = Arenaria graveolens.
- Murmura*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 630. p. 248 = media.
- neglecta*, Weihe, in Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 560 = media.
- memoralis*, Salisb. Prod. 301 = nemorum.
- nemorum*, Linn. Sp. Pl. 421. — Europ.; Reg. Cauc.
- nemorum*, Stev. ex Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 377 = media.
- nitens*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 185, 675. — Am. bor. occ.
- nitida*, Hook. in Scoresby, Greenl. 411 = longipes.
- nodosa*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 319 = Sagina nodosa.
- Nuttallii*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 183. — Texas.
- obtus*, Engelm. in Coult. Bot. Gaz. vii. (1882) 5. — Am. bor.
- oligosperma*, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 276. — Chili.
- ovalifolia*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 97 = Arenaria physodes.
- ovata*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 196. — Am. austr.
- Pallasiana*, Ser. in DC. Prod. i. 399 = dichotoma.
- pallida*, Dum. ex Nym. Consp. 111 = media.
- paludosa*, Laest. ex Fries, Summa Veg. Scand. 37 = crassifolia.
- palustris*, Ehrh. Beitr. v. 176, nomen; Retz. Fl. Scand. Prod. ed. II. 106. — Geront. temp.; Greenl.
- palustris*, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. 738 = longipes.
- paniculata*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 35 = crispata.
- paniculata*, Pall. Tabl. Taur. 51 = graminea.
- parviflora*, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 25. — N. Zel.
- patens*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 215 = longissima.
- pauciflora*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 30. — Java.
- peduncularis*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 157 = longipes.
- pentagyna*, Gaud. Fl. Helv. iii. 179 = aquatica.
- pentandra*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 318 = Spargula pentandra.
- persica*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 85 = palustris.
- petraea*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 160. — Sibir. altaic.
- petraea*, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 234 = decumbens.
- pilosa*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 250 = media.
- prostrata*, Baldw. in Ell. Sketch, i. 518. — Am. bor. et austr.
- Pseudo-malachium*, Schur, Enum. Pl. Transs. 117 = nemorum.
- pubera*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 273. — Am. bor.
- pubescens*, Willd. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 35 = Arenaria lanuginosa.
- pumila*, Brocchi, in Bibl. Ital. xxviii. (1822) 223 = Cerastium Thomasii.
- pumila*, Fenzl, Verbr. Alsin. in Tab. Synop. ad p. 18 = petraea.
- pumila*, S. F. Gray, Nat. Arr. Br. Pl. ii. 659 = Cerastium pumilum.
- pungens*, Brongn. Voy. Coq. Bot. t. 78. — Austral.
- radians*, Linn. Sp. Pl. 422. — Sibir.
- radicans*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 250. — Mont. Pyren.
- recurvata*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 196. — N. Granat.
- Reichenbachii*, Wierzb. ex Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 76 = nemorum.
- repens*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 320 = Cerastium tomentosum.

STELLARIA :—

- rigida*, Bunge, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 251. — Turkestan.
- rotundifolia*, Humb. & Bonpl. ex Steud. Nom. ed. I. 813 = cordata.
- rotundifolia*, Poir. Encyc. vii. 416. — Reg. Magellan.
- Roughii*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 23. — N. Zel.
- rubra*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 316 = Arenaria fasciculata, Gouan.
- rupestris*, Scop. l. c. 317. t. 18. f. 1 = Arenaria lanceolata.
- ruscifolia*, Pall. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 194. — Sibir. or.; Am. bor. occ.
- sabulosa*, Fisch. ex DC. Prod. i. 397 = Cerastium anomalum.
- saxatilis*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 215. — Reg. Himal.; As. bor.; Japon.
- saxatilis*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 317 = Arenaria saxatilis.
- Saxifraga*, Bertol. Pl. Ital. Rar. iii. 55 = Arenaria Saxifraga.
- scapigera*, Willd. Sp. Pl. ii. 716. — Scotia.
- Schlechtendalliana*, Ser. in DC. Prod. i. 399 = dichotoma.
- semidecandra*, Link, Diss. Bot. Suerin (1795), 62 = Cerastium semidecandrum.
- semivestita*, Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 230. — Reg. Himal.
- serpyllifolia*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 319 = Arenaria serpyllifolia.
- serpyllifolia*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 196. — Peruv.
- sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 230. — Reg. Himal.
- sitchana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 637 = borealis.
- spatulata*, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 35. — Europ.
- squarrosa*, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 250 = pungens.
- stenopetala*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 20. — Chili.
- Stephaniana*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 194 = dichotoma.
- stricta*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 96, partim = nitens.
- stricta*, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 707 = palustris.
- stricta*, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. ed. II. 15 = longipes.
- stricta*, Sw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 637 = Arenaria lapponica.
- subulata*, Boeb. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 195 = graminea.
- subumbellata*, Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 233. — Reg. Himal.
- sylvatica*, Maxim. ex Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) i. 302. — Reg. Amur.
- tenella*, Fenzl, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 142; et in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 165 = pauciflora.
- tenella*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 344; Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 392 = longifolia.
- tetragona*, Blume, Bijdr. 63. — Java.
- tetrandra*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 659 = Cerastium tetrandrum.
- thymifolia*, Wall. Cat. n. 636 = uliginosa.
- tibetica*, Kurz, in Flora, lv. (1872) 285. — Reg. Himal.
- tomentosa*, Link, Diss. Bot. Suerin (1795), 62 = Cerastium tomentosum.
- tomentosa*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 381. — Japon.
- triandra*, Debray, ex Bluff Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 171, nomen = Holosteum umbellatum.
- trivialis*, Link, Diss. Bot. Suerin (1795), 62 = Cerastium triviale.
- tschachanensis*, Less. ex Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 386 = dichotoma.
- uliginosa*, Laest. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1822) 335 = borealis.
- uliginosa*, Murr. Prod. Stirp. Gotting. 55. — Reg. bor. temp. et arct.
- umbellata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 89; xv. (1842) 173. — Sibir. or.; Am. bor. occ.
- umbrosa*, Opiz & Rupr. in Opiz, Seznam, 93 = media.
- undulata*, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) i. 282 = chinensis.
- undulata*, Thunb. Fl. Jap. 185 = uliginosa.
- uniflora*, Walt. Fl. Carol. 141. — Am. bor.
- velutina*, Ser. in DC. Prod. i. 397. — Sibir.
- vestita*, Kurz, in Journ. Bot. xi. (1873) 194 = saxatilis.
- villosa*, Poir. Encyc. vii. 416. — Ins. Borbon.

STELLARIA :—

- villosa*, Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 194 = dichotoma.
- virens*, Rupr. Fl. Cauc. 222. — Reg. Cauc.
- virgata*, Ser. in DC. Prod. i. 396. — Hab.?
- viscida*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 342 = Cerastium anomalum.
- viscosa*, Albert, in Bull. Soc. Sc. Draguign. (1884), reimp. 13 (Quid?). — Gallia.
- viscosa*, Link, Diss. Bot. Suerin (1795), 62 = Cerastium triviale.
- vulgata*, Link, l. c. = Cerastium glomeratum.
- Wagneriana*, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 281. — Ecuador.
- Webbiana*, Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 230. — Reg. Himal.
- Willkommii*, Roem. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 617 = Arenaria intricata.

STELLARIOIDES, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 369 = **Anthericum**? Linn. (Liliac.).

canaliculata, Medic. l. c. — Hab.?

STELLARIS, Dill. ex Moench, Meth. 303 (1794) = **Scilla**, Linn. (Liliac.).

- bifolia*, Moench, l. c. 304 = Sc. bifolia.
- corymbosa*, Moench, l. c. = Ornithogalum umbellatum.
- erecta*, Moench, l. c. 303 = Ornithogalum pyrenaicum.
- latifolia*, Moench, l. c. = Ornithogalum latifolium.
- minima*, Moench, l. c. = Gagea pusilla.
- parviflora*, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 286 = Sc. numidica.
- Scilla*, Moench, Meth. 304 = Urginea Scilla.

STELLASTER, Heist. Syst. 5, 19 (1748) (Quid?).

STELLERA, J. G. Gmel. ex Linn. Diss. Dass. 16 (1747); Amoen. Acad. i. 399, pro parte (1749). **THYMELAEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 193.

- XAIASME**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 106 (1836).
- altaica*, Thieb. ex Pers. Syn. i. 436 = S. Chamaejasme.
- annua*, Salisb. Prod. 282 = Thymelaea arvensis.
- Chamaejasme*, Linn. Sp. Pl. 559. — As. bor. et temp.
- concinna*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 88 = S. Chamaejasme.
- dichotoma*, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 592 = S. Chamaejasme.
- Ganpi*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 22; Meissn. in DC. Prod. xiv. 550 = Wikstroemia canescens.
- Griffithii*, Meissn. l. c. = Lessertii.
- Hedyotis*, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1052 = Thymelaea Aucheri.
- hypericifolia*, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 63 = S. Chamaejasme.
- japonica*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 22 = Wikstroemia japonica.
- lathraeoides*, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 323 = Boschniakia glabra.
- Lessertii*, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 359. — Oriens.
- Passerina*, Linn. Sp. Pl. 559 = Thymelaea arvensis.
- persica*, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 63 = Lessertii.
- pubescens*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 466 = Thymelaea arvensis.
- spicata*, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 359 = Lessertii.
- stachyoides*, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 253; et Enum. Pl. Nov. ii. 16 = Lessertii.

STELLERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 167 = **Swertia**, Linn. (Gentian.).

cyanea, Turcz. l. c. 168 = Sw. tetrapetala.

STELLINA, Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 318 = **Callitriche**, Linn. (Haler.).

hamulata, Bubani, l. c. = C. hamulata.

STELLIX, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).

STELLULARIA, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1318 (1880). **SCROPHULARINEAE**.

nigricans, Benth. l. c. — Afr. trop.

STELLULARIA, Linn. Syst. ed. VI (1748) = *Stellaria*, Linn. (Caryoph.).

STELMANIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 47 (1836) = *Heterothea*, Cass. (Compos.).
scabra, Rafin. l. c. = *H. Lamarckii*.

STELMATION, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. t. 24 (1885). *ASCLEPIADEAE*.
myrtifolium, Fourn. l. c. 227. — Bras.

STEMMESUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 19 (1836) = *Allium*, Tourn. (Liliac.).
stellatus, Rafin. l. c. = *A. stellatum*.

STEMLOTIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 101 (1836) = *Oldenlandia*, Linn. (Rubiace.).
glomerata, Rafin. l. c. = *O. glomerata*.

STEMEIENA, Rafin. Atl. Journ. 144 (1832) = *Krameria*, Loeff. (Polygal.).

STEMMACANTHA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 12 = *Serratula*, Linn. (Compos.).
cynaroides, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 460 = *Cnicus cynaroides*.
ficifolia, Turcz. ex DC. Prod. vi. 663 = *Serratula atriplicifolia*.
inermis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 521 = *Cnicus centauroides*.

STEMMADENIA, Benth. Bot. Voy. Sulph. 124. t. 44 (1844). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 707.

ODONTOSTIGMA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. 86. t. 56 (1853).
bella, Miers, *Apocyn. S. Am.* 77. — Mexic.
bignoniaceiflora, Miers, l. c. — Mexic.
Galeottiana, Miers, l. c. 76. — Cuba.
glabra, Benth. Bot. Voy. Sulph. 124. t. 44. — Honduras.
grandiflora, Miers, *Apocyn. S. Am.* 75 = *Tabernaemontana grandiflora*.
guatemalensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 410 = *Malouetia panamensis*.
insignis, Miers, *Apocyn. S. Am.* 76. — Mexic.; Venezuela.
mollis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 125. — Mexic.
pubescens, Benth. l. c. — Mexic.

STEMMATELLA, Wedd. ex Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 82, nomen. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 359.
congesta, Wedd. l. c., nomen. — Bolivia.

STEMMATIUM, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 551 = *Tristagma*, Poepp. (Liliac.).
narcissoides, Phil. l. c. = *T. narcissoides*.

STEMMATOPHYSUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 637 (1841), sphalm. = seq.

STEMMATOSIPHON, Meissn. Gen. 49 (1837) = seq.

STEMMATOSIPHUM, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 86. tt. 157-159 (1831) = *Symplocos*, Linn. (Styrac.).
nitens, Pohl, l. c. 88. t. 158 = *Symplocos nitens*.
platyphyllum, Pohl, l. c. 87. t. 157 = *Symplocos platyphylla*.
uniflorum, Pohl, l. c. 89. t. 159 = *Symplocos uniflora*.

STEMMATOSPERMUM, Beauv. Agrost. 144. t. 25. f. 5 (1812) = *Nastus*, Juss. (Gramin.).
verticillatum, Beauv. l. c. = *Nastus borbonicus*.

STEMMODONTIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 11 = *Wedelia*, Jacq. (Compos.).
scaberrima, Cass. in Dict. Sc. Nat. xvi. 407 = *W. hispida*.

STEMMODIA, Linn. Syst. ed. X. 1118 (1759). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 950.
DICKIA, Scop. Introd. 199 (1777).
GOMPHIPUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 76 (1836).
MATOUREA, Aubl. Pl. Gu. ii. 641. t. 259 (1775).

STEMODIA :—

POARIUM, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 46 (1825).
UNANUEA, Ruiz & Pav. Ic. Fl. Per. ined.; ex Benth. in DC. Prod. x. 380 (1846).
ageratifolia, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 99. — Cuba.
angulata, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 22. — Am. centr.
aquatica, Willd. Sp. Pl. iii. 346 = *Limnophila polystachya*.
arenaria, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 357. t. 175 = *parviflora*.
arvensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 637 = *viscosa*.
azurea, Linden, Cat. n. 17 (1862) 6 = *Otacanthus caeruleus*.
balsamea, Benth. in Wall. Cat. n. 3928 = *Limnophila balsamea*.
bartsiodes, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1470. — Mexic.
Berteroana, Benth. in DC. Prod. x. 384. — Ins. S. Doming.
camphorata, Benth. in Wall. Cat. n. 3932 = *Limnophila diffusa*.
camphorata, Vahl, Symb. Bot. ii. 69 = *Adenosma camphoratum*.
capitata, Benth. in Wall. Cat. n. 3926 = *Adenosma capitatum*.
chilensis, Benth. in Bot. Reg. t. 1470. — Chili.
cimicina, Benth. in Wall. Cat. n. 3933 = *Limnophila diffusa*.
coerulea, Benth. in DC. Prod. x. 381 = *Adenosma caeruleum*.
coromandelina, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3929 D = *viscosa*.
debilis, Benth. Fl. Austral. iv. 487. — Austral.
diffusa, Benth. in Wall. Cat. n. 3937 = *Limnophila pygmaea*.
durantifolia, Sw. Obs. Bot. 240. — Ind. occ.
Ehrenbergiana, Schlecht. in Bot. Zeit. i. (1843) 169. — Mexic.
foliosa, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 46. — Bras.
glabra, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 21. — Mexic.
glabra, Spreng. Syst. ii. 811 = *Gratiola peruviana*.
glaucia, Klein, ex Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 310 = *Ebermaiera glauca*.
grandiflora, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 89 = *Lindenbergia grandiflora*.
gratiolaefolia, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 217 = *palustris*.
gratioloides, Benth. in Wall. Cat. n. 3938 = *Limnophila erecta*.
gratioloides, F. Muell. Fragm. x. 89. — As.; Afr.; Austral.
grossa, Benth. Fl. Austral. iv. 486. — Austral.
hirsuta, Heyne, in Wall. Cat. n. 3930 = *Limnophila hirsuta*.
hypericifolia, Benth. in Wall. Cat. n. 3934 = *Limnophila hypericifolia*.
hyptoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 8. — Bras.
jurullensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 358. — Mexic.
lanata, Ruiz & Pav. ex Benth. in DC. Prod. x. 383. — Mexic.
lanceolata, Benth. l. c. 384. — Bras.
latifolia, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1861) 39. — Hab. ?
linophylla, F. Muell. Fragm. x. 88. — Austral.
littoralis, Boiss. Fl. Orient. iv. 425 = *Lindenbergia urticaefolia*.
lobata, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 299. — Am. trop.
lobelioides, Lehm. in Linnaea, xi. (1837) Litt. 91. — Chili.
lutea, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 45 = *Adenosma camphoratum*.
lythrifolia, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 486. — Austral.
macrostachya, Benth. in Wall. Cat. n. 3925 = *Lindenbergia macrostachya*.
maritima, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3931 = *viscosa*.
maritima, Linn. Syst. ed. X. 1118. — Ind. occ.
Menthastrum, Benth. in Wall. Cat. n. 3927 = *Limnophila Roxburghii*.
micrantha, Benth. l. c. n. 3936 = *Limnophila micrantha*.
microphylla, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 298. — Bras.
minuta, G. Don, Gen. Syst. iv. 542 = *Vandellia scabra*.

STEMODIA :—

Morgania, F. Muell. Fragm. x. 89. — Austral.
multifida, Spreng. Syst. ii. 811 = *Conobea multifida*.
muraria, Roxb. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 89 = *Lindenbergia urticaefolia*.
odoratissima, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 485 = *Adenosma Muellieri*.
palustris, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 216. — Bras.
parviflora, Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 52. — Am. trop.
pedicellaris, F. Muell. Fragm. viii. 231. — Austral.
peduncularis, Benth. in DC. Prod. x. 382. — Mexic.
philippensis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 5 = *Lindenbergia philippensis*.
punctata, F. Muell. Census, 97 = *Limnophila gratisima*.
pusilla, Benth. Bot. Voy. Sulph. 144. — Mexic.
radicans, Griseb. Cat. Pl. Cub. 182. — Cuba.
repens, Benth. in Wall. Cat. n. 3935 = *Limnophila conferta*.
ruderalis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 498 = *Lindenbergia philippensis*.
ruderalis, Retz. Obs. v. 25. — Ind. or.
ruderalis, Vahl, Symb. Bot. ii. 69 = *Lindenbergia urticaefolia*.
senegalensis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 107. — Afr. trop.
serrata, Benth. in DC. Prod. x. 381. — Ind. or.; Afr. trop.
sessiliflora, F. Muell. Census, 97 = *Limnophila sessiliflora*.
sessilis, Benth. in Wall. Cat. n. 3939 = *Limnophila conferta*.
stricta, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 10. — Bras.
subbistata, Benth. in DC. Prod. x. 381. — Bras.
suffruticosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 357. — Am. austr.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 475. — Guian.
tenuiflora, Benth. in Wall. Cat. n. 3940 = *Limnophila conferta*.
tomentosa, G. Don, Gen. Syst. iv. 542 = *Mazus rugosus*.
trifoliata, Reichb. Ic. Exot. i. 3. t. 1. — Bras.
veronicoides, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 298. — Bras.
verticillaris, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 144 = *durantifolia*.
viscosa, Roxb. Pl. Corom. ii. 33. t. 163. — Ind. or.; Afghan.
xorullensis, Spreng. Syst. ii. 810 = *jurullensis*.

STEMODIACRA, P. Br. Hist. Jamaic. 261. t. 22. f. 2 (1756) = *praec.*

STEMODOXIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 20 (1836) = *Allium*, Tourn. (Liliac.).
junceae, Rafin. l. c. = *A. junceum*.

STEMONA, Lour. Fl. Cochinch. 404 (1790). *ROXBURGHACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 747.
ROXBURGHIA, [Banks, in] Roxb. Pl. Corom. i. 29 (1795).
gloriosoides, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 650 = *tuberosa*.
Griffithiana, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 109. t. 10. — Burma.
japonica, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 92. — Japon.
sessilifolia, Franch. & Sav. l. c. — Japon.
tuberosa, Lour. Fl. Cochinch. 404. — As. trop.

STEMONACANTHUS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 53. tt. 4, 205 (1847) = *Ruellia*, Plum. (Acanth.).
angustior, Nees, l. c. 54. — Bras.
coccineus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 452 = *R. coccinea*.
formosus, T. Anders. in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 270 = *R. formosa*.
fulgidus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 452 = *R. fulgida*.
hirsutus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 53. — Bras.
Humboldtianus, Nees, in DC. Prod. xi. 206 = *R. Humboldtiana*.
macrophyllus, Nees, l. c. 205 = *R. macrophylla*.
multiflorus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 54. — Bras.
Pearcei, Hook. f. Bot. Mag. t. 5648. — Bolivia.
radicans, Nees, in DC. Prod. xi. 207. — Guian.
salviaefolius, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 54. — Bras.
Sellowianus, Nees, l. c. — Bras.
thysacanthoides, Nees, in DC. Prod. xi. 207. — N. Granat.
Willdenovianus, Nees, l. c. — Hab. ?

STEMONE, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 92 (1876) = **Stemona**, Lour. (Roxburgh.).

STEMONIX, Rafin. Atl. Journ. 165 (1838) = **Eurycles**, Salisb. (Amaryll.).
nervosus, Rafin. l. c. = *E. sylvestris*.

STEMONOPORUS, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 67. t. 2 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).
acuminatus, Bedd. Fl. Sylv. t. 100 = *V. acuminata*.
affinis, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 68 = *V. affinis*.
canaliculatus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 38 = *V. canaliculata*.
Gardneri, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 68 = *V. Gardneri*.
lanceolatus, Thw. l. c. = *V. lanceolata*.
macrophyllus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 37 = *V. ceylanica*.
Moonii, Thw. l. c. 39 = *V. Moonii*.
nitidus, Thw. l. c. = *V. nitida*.
oblongifolius, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 68 = *V. oblongifolia*.
petiolaris, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 38 = *V. petiolaris*.
reticulatus, Thw. l. c. = *V. reticulata*.
rigidus, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 69 = *V. rigida*.
Wightii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 37 = *V. ceylanica*.

STEMONURUS, Blume, Bijdr. 648 (1825) = **Gomphandra**, Wall. et **Lasianthera**, Beauv. (Olac.).
affinis, Miers, l. c. 94 = *G. affinis*.
africanus, Miers, l. c. 87 = *Lasianthera africana*.
apicalis, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxii. (1859) 110; Thw. Enum. Pl. Zeyl. 43 = *Lasianthera apicalis*.
axillaris, Miers, Contrib. i. 91 = *G. axillaris*.
capitatus, Becc. Malesia, i. (1877) 114. — Borneo.
ceylanicus, Miers, Contrib. i. 93 = *G. axillaris*.
coriaceus, Miers, l. c. 87 = *G. polymorpha*.
crassipes, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 298 = *G. crassipes*.
Cumingianus, Miers, Contrib. i. 83 = *G. Cumingiana*, Villar.
foetidus, Wight, Spicil. Neilgherr. i. 21. t. 23 = *Mappia tomentosa*.
frutescens, Blume, Bijdr. 649. — Java.
Gardneri, Miers, Contrib. i. 89 = *G. polymorpha*.
grandifolius, Becc. Malesia, i. (1877) 114. — Borneo.
Heyneanus, Miers, Contrib. i. 91 = *G. axillaris*.
javanicus, Blume, Bijdr. 649 = *Lasianthera javanica*.
javanicus, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 250 = *G. affinis*.
lanceolatus, Becc. Malesia, i. (1877) 114 = *Lasianthera lanceolata*.
laxiflorus, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. x. (1852) 111 = *G. laxiflora*.
litoralis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 250 = *Lasianthera littoralis*.
longifolius, Miers, Contrib. i. 90 = *G. axillaris*.
macrocarpus, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 250 = *Lasianthera macrocarpus*.
macrophyllus, Blume, l. c. = *Lasianthera macrophylla*.
membranaceus, Blume, l. c. = *Lasianthera membranacea*.
ovalifolius, M. Roem. Syn. Hesper. 24 = *Lasianthera ovalifolia*.
parviflorus, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 250 = *Lasianthera parviflora*.
pauciflorus, Blume, Bijdr. 648. — Java.
penangianus, Miers, Contrib. i. 90 = *G. penangiana*.
polymorphus, Miers, l. c. 87 = *G. polymorpha*.
prasinus, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 249 = *G. affinis*.
punctatus, Becc. in Malesia, i. (1877) 116, in obs. — Zeylan.?
quadrifidus, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 249 = *G. penangiana*.
scorpioides, Becc. Malesia, i. (1877) 113. — Borneo.
secundiflorus, Blume, Bijdr. 649 = *Lasianthera apicalis*.
tomentellus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 298 = *G. tomentella*.
umbellatus, Becc. Malesia, i. (1877) 115. — Borneo.
vitiensis, Seem. Fl. Vit. 39. — Ins. Fiji.
Walkerii, Miers, Contrib. i. 93 = *G. polymorpha*.

STEMOPTERA, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1840) 62 = **Apteria**, Nutt (Burm.).
lilacina, Miers, l. c. = *A. setacea*?

STEMOTIS, Rafin. Sylva Tellur. 152 (1838) = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).
album, Rafin. l. c. 153 = *R. album*.
coccineum, Rafin. l. c. = *R. arboreum*.
roseum, Rafin. l. c. = *R. arboreum*.

STENACHAENIUM, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 289 (1873). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
campestre, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 79. — Bras.
macrocephalum, Benth. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 289. — Bras.
macrocephalum, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 183 = *campestre*.
megapotamicum, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 105. — Bras.
Riedelii, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 78. — Bras.

STENACTIS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxvii. 462 (1825) = **Erigeron**, Linn. (Compos.).
alpina, Cass. l. c. 485; l. 485 = *E. alpinus*.
ambigua, DC. Prod. v. 299 = *E. strigosus*.
annua, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxvii. 485 = *E. annuus*.
bellidiflora, A. Br. Ind. Sem. Hort. Berol. (1859) 10 (Quid?). — Helvet.
bellidioides, Nees, Gen. et Sp. Ast. 274 = *E. bellidioides*, Benth. & Hook. f.
Beyrichii, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. v. n. 2169; ex iisd. vi. 63, in obs. = *E. strigosus*.
delphinifolia, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxvii. 485; l. 483 = *E. delphinifolius*.
dubia, Cass. xxxvii. l. c. 485 = *E. annuus*.
glaucia, Nees, Gen. et Sp. Ast. 275 = *E. glaucus*.
gnaphalioides, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 484 = *E. gnaphalioides*.
multiradiata, Lindl. in DC. Prod. v. 299 = *E. multiradiatus*.
pilosus, DC. l. c. = *E. pilosus*.
pubescens, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 484 = *E. pubescens*.
speciosa, Lindl. Bot. Reg. t. 1577 = *E. speciosus*.
strigosa, DC. Prod. v. 299 = *E. strigosus*.
verna, Nees, Gen. et Sp. Ast. 275 = *E. nudicaulis*.

STENANDRIUM, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 444 (1836). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1095.
CALDENBACHIA, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 281 (1847).

HEMITOME, Nees, l. c. 295, in obs. (1847).
SYNDRA, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 715.
aurantiacum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 78. — Bras.
barbatum, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 168. t. 4. — Mexic.
chameranthemoideum, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 139. — Mexic.
corymbosum, Nees, in DC. Prod. xi. 727. — N. Granat.
decoratum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 79. — Bras.
diphyllum, Nees, l. c. 75. — Bras.
droseroides, Nees, in DC. Prod. xi. 284. — Cuba.
dulce, Nees, l. c. 282. — Chili.
elegans, Nees, l. c. 283. — Venezuela.
hirsutum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 77. — Bras.
Humboldtianum, Nees, in DC. Prod. xi. 284. — Am. austr.
igneum, André, in Illustr. Hort. xxiv. (1877) t. 266. — Peruv.
igneum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 78. — Bras.
Macraganum, Nees, in DC. Prod. xi. 282, sphalm. = *dulce*.
Macrayanum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 75 (an præc.?). — Chili; Peruv.
mandioccanum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 76. — Bras.

obtusifolium, Nees, l. c. 78. — Bras.
ornatum, Nees, in DC. Prod. xi. 291 = *Aphelandra ornata*.
Pohlui, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 75. — Bras.
punctatum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 196. — Ind. occ.
radicosum, Nees, in DC. Prod. xi. 283. — N. Granat.
Riedelianum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 76. — Bras.
rupestre, Nees, in DC. Prod. xi. 283. — Ind. occ.
scabrosum, Nees, l. c. 284. — Ins. S. Doming.
serpens, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 77. — Bras.
speciosum, Nees, ex Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 24 = *Geissomeria longiflora*.
tenellum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 77. — Bras.

STENANDRIUM:—
trinerve, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 75. — Bras.
venatum, Nees, l. c. 79. — Bras.
villosum, Nees, l. c. 77. — Bras.

STENANTHEMUM, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 295. **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 382.
coronatum, Reiss. l. c. — Austral.
humile, Benth. Fl. Austral. i. 436. — Austral.
leucophractum, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 295. — Austral.
pimeleoides, Benth. Fl. Austral. i. 436. — Tasman.
pomadroides, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 295. — Austral.
tridentatum, Reiss. l. c. = *Spyridium tridentatum*.
Waterhousii, Benth. Fl. Austral. i. 436. — Austral.

STENANTHERA, R. Br. Prod. 538 (1810) = **Astroloma**, R. Br. (Epacrid.).
brachyloma, F. Muell. Fragm. iv. 99 = *Brachyloma concolor*.
ciliata, Lindl. Swan River App. 25 = *A. longiflorum*.
conostephioides, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 296 = *A. conostephioides*.
ericoides, F. Muell. Fragm. iv. 98 = *Brachyloma ericoides*.
pinifolia, R. Br. Prod. 538 = *A. pinifolium*.
squamuligera, F. Muell. Fragm. iv. 97 = *A. Baxteri*.

STENANTHIUM, Kunth, Enum. Pl. iv. 189 (1843). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 835.
angustifolium, Kunth, l. c. 190. — Am. bor.
frigidum, Kunth, l. c. — Mexic.
gramineum, Kunth, l. c. = *angustifolium*.
occidentale, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 405. — Am. bor. occ.
robustum, S. Wats. l. c. xiv. (1879) 278. — Am. bor.
sachalinense, F. Schmidt, Reisen Amurl. 188. — Ins. Sachalin.

STENANTHUS, Oerst. ex Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 209 = **Columnnea**, Plum. (Gesner.).
heterophyllus, Oerst. ex Hanst. l. c. = *C. heterophylla*.
sanguinolentus, Klotzsch, ex Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 123 = *C. sanguinolenta*.
serratus, Klotzsch, ex Oerst. l. c. = *C. serrata*.
squarrosus, Klotzsch, ex Oerst. l. c. = *C. sanguinolenta*.

STENAPHIA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 9 (1847), sphalm. = **Stephania**, Lour. (Menisp.).

STENARIA, Rafin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 776, in syn. (1840) = **Houstonia**, Gronov. (Rubiace.).

STENARRHENA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 111 (1825) = **Salvia**, Tourn. (Labiata).
lanata, D. Don, l. c. = *Salvia lanata*.

STENGELIA, Neck. Elem. ii. 258 (1790) = **Mourera**, Aubl. (Podost.).

STENGELIA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 26 = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
adoensis, Sch. Bip. l. c., nomen = *V. adoensis*.
Calvoana, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 199 = *V. Calvoana*.
controversa, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 947 = *V. abyssinica*.
insignis, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 199 = *V. insignis*.
Kotschyana, Hochst. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 134, nomen = *V. Kotschyana*.
Schimperi, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 360 = *V. Schimperi*.

STENIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1991 (1837). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 553.
STENOPOLEN, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1836), nomen prius.
Beaumontii, A. Rich. Cat. Hort. Pescat. ex Richb. f. Otia Bot. Hamb. iii. 37 = *Batemannia Beaumontii*.
fimbriata, Linden & Reichb. f. in Gard. Chron. (1868) 1313 = *Chondrorhyncha fimbriata*.
guttata, Reichb. f. l. c. (1880) ii. 134. — Peruv.
pallida, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1991; (1838) t. 20. — Guian.

STENOCAELIUM, Ledeb. & Hook. f. Gen. i. 902 (1867), sphalm. = **STENOCOELIUM**, Ledeb. = **Seseli**, Linn. (Umbell.).

STENOCALYX, Berg, in *Linnaea*, xxvii. (1854) 309 = *Eugenia*, Mich. (Myrtac.).
affinis, Berg, in *Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 336.—Bras.
alagoënsis, Berg, l. c. 350.—Bras.
albicans, Berg, in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 698 = *Calyptanthus cuprea*?
bahiensis, Berg, in *Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 351.—Bras.
blastanthus, Berg, l. c. 348.—Bras.
brasiliensis, Berg, l. c. 347 = *E. brasiliensis*.
brunneus, Berg, l. c. 335.—Bras.
costatus, Berg, l. c. 340 = *E. costata*, Cambess.
dasyblastus, Berg, l. c. 337.—Bras.
dentatus, Berg, l. c. 338.—Bras.
Duarteanus, Berg, l. c. 342 = *E. Duarteana*.
dysentericus, Berg, l. c. 351 = *E. dysenterica*.
Gardnerianus, Berg, l. c. 350.—Bras.
gemmiflorus, Berg, l. c. 344.—Bras.
glaber, Berg, l. c. 337.—Bras.
grandiflorus, Berg, l. c. 347.—Bras.
grandifolius, Berg, l. c. 340.—Bras.
impressus, Berg, l. c. 593.—Bras.
impunctatus, Berg, l. c. 336 = *E. multiflora*.
lanceolatus, Berg, l. c. 341 = *E. Uvalha*.
Langsdorffii, Berg, l. c. 594 = *E. linearifolia*?
laxus, Berg, l. c. 349 = *E. laxa*.
ligustrinus, Berg, in *Linnaea*, xxvii. (1854) 312 = *E. ligustrina*, Willd.
longipes, Berg, in *Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 345.—Bras.
lucidus, Berg, l. c. 337.—Bras.
Micheli, Berg, l. c. = *E. uniflora*, Linn.
mollicoma, Berg, l. c. 350 = *E. mollicoma*.
mutabilis, Berg, l. c. 347.—Bras.
myrtifolius, Berg, l. c. 342 = *E. myrtifolia*, Cambess.
oblongifolius, Berg, l. c. 339.—Bras.
Patrisii, Berg, in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 247 = *E. Patrisii*.
pistaciaefolia, Berg, in *Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 343 = *E. pistaciaefolia*.
Pitanga, Berg, l. c. 341.—Bras.
pilus, Berg, l. c. 342 = *E. pia*.
Plumieri, Berg, in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 698.—Ind. occ.
portoricensis, Berg, l. c. xxix. (1857-58) 246 = *E. portoricensis*.
protractus, Berg, in *Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 593.—Bras.
Pseudo-psidium, Berg, in *Linnaea*, xxvii. (1854) 314 = *E. Pseudo-psidium*.
reticulatus, Berg, in *Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 340 = *E. ligustrina*, Miq.
Riedelianus, Berg, l. c. 349.—Bras.
sessilifolius, Berg, l. c. 344 = *E. sessilifolia*.
silvestris, Berg, l. c. 346 = *E. brasiliensis*.
squamiflorus, Berg, l. c. 345.—Bras.
stipularis, Berg, l. c. 348.—Bras.
strigosus, Berg, l. c. 335.—Bras.
sulcatus, Berg, l. c. 339 = *E. sulcata*.
ubensis, Berg, l. c. 344 = *E. ubensis*.
xanthoxyloides, Berg, l. c. 346 = *E. xanthoxyloides*.

STENOCALYX, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 393. *MALPIGHIACEAE*.
involutus, Turcz. l. c. 394.—N. Granat.

STENOCARPUS, R. Br. in *Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 201. *PROTEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 182.
AGNOSTUS, A. Cunn. in *Loud. Hort. Brit.* 580 (1830).
CYBELE, Salisb. in *Knight, Prot.* 123 (1809), nomen prius.
acacioides, F. Muell. *Fragm.* i. 135 = *salignus*.
concolor, F. Muell. l. c. iii. 147 = *salignus*.
Cunninghami, R. Br. *Prot. Nov.* 34.—Austral.
Cunninghami, Hook. *Bot. Mag.* t. 4263 = *sinuatus*.
dareoides, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 45; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 208.—N. Caled.
elegans, Brongn. & Gris, *ll. cc.* 44; 207.—N. Caled.
Forsteri, R. Br. in *Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 201.—N. Caled.
gracilis, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 43; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 205.—N. Caled.
heterophyllus, A. Brongn. & Gris, *ll. cc.* 44; 207.—N. Caled.
intermedius, A. Brongn. & Gris, *ll. cc.* 42; 204.—N. Caled.
latifolius, Montr. in *Mém. Acad. Lyon*, x. (1860) 249.—N. Caled.

STENOCARPUS :—

laurifolius, Panch. & Sebert, *Not. Bois Nouv. Caléd.* 181 = *laurinus*.
laurinus, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 43; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 205.—N. Caled.
Milnei, Hook. *Kew Journ.* vi. (1854) 359.—N. Caled.
Moorei, F. Muell. *Fragm.* i. 134 = *salignus*.
rubiginosus, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 43; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 206.—N. Caled.
salignus, R. Br. in *Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 202.—Austral.
sinuatus, Endl. *Gen. Suppl.* iv. ii. 88.—Austral.
sinuosus, F. Muell. *Fragm.* vi. 224 = *præc.*?
tremuloides, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 44; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 207.—N. Caled.
villosus, Brongn. & Gris, *ll. cc.* 44; 206.—N. Caled.

STENOCEPHALUM, Sch. Bip. in *Pollichia*, xx-xxi. (1863) 385 = *Vernonia*, Schreb. (Compos.).
apiculatum, Sch. Bip. l. c. 387 = *V. apiculata*.
brevifolium, Sch. Bip. l. c. = *V. megapota mica*.
hexanthum, Sch. Bip. l. c. 390 = *V. hexantha*.
megapota mica, Sch. Bip. l. c. 388 = *V. megapota mica*.
melanotrichium, Sch. Bip. l. c. = *V. megapota mica*.
monticolum, Sch. Bip. l. c. 386 = *V. monticola*.
penicillatum, Sch. Bip. l. c. 389 = *V. megapota mica*.
targiaefolium, Sch. Bip. l. c. = *V. megapota mica*.

STENOCHASMA, Griff. *Notul.* iii. 431 (1851) = *Amomum*, Linn. (Scitam.).
convoluta, Griff. l. c. 433 = *A. Leonurus*.
urceolare, Griff. l. c. 431 = *A. scyphiferum*.

STENOCHASMA, Miq. *Pl. Jungh.* 45 (1850) = *Broussonetia*, L'Hérit. (Urtic.).
ancolanum, Miq. l. c. = *Sumatra*.

STENOCHILUS, R. Br. *Prod.* 517 (1810) = *Eremophila*, R. Br. (Myopor.).
albicans, Bartl. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 351 = *E. Brownii*.
bignoniæflorus, Benth. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 386 = *E. bignoniiflora*.
curvipes, Benth. l. c. 221 = *E. maculata*.
glaber, R. Br. *Prod.* 517 = *E. Brownii*.
incanus, Lindl. in *Bot. Reg.* (1839) Misc. 70 = *E. Brownii*.
longifolius, R. Br. *Prod.* 517 = *E. longifolia*.
longifolius, A. Cunn. ex Lindl. *Bot. Reg.* (1839) Misc. 69 (an *præc.*?).—Austral.
maculatus, Ker-Gawl. in *Bot. Reg.* t. 647 = *E. maculata*.
ochroleucus, A. Cunn. ex A. DC. in *DC. Prod.* xi. 715 = *E. Brownii*.
pubiflorus, Benth. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 273 = *E. longifolia*.
racemosus, Endl. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 202 = *E. maculata*.
salicinus, Benth. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 251 = *E. longifolia*.
serrulatus, DC. *Prod.* xi. 715 = *E. latifolia*.
subcanescens, Bartl. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 351 = *E. Brownii*.
viscosus, R. Grah. in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-Mar. 1829) 387 = *E. Brownii*.

STENOCHLOA, Nutt. in *Journ. Acad. Philad. N. S.* i. (1847) 189 = *Dissanthelium*, Trin. (Gramin.).
californica, Nutt. l. c. = *D. californica*.

STENOCLINE, DC. *Prod.* vi. 218 (1837). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 312.
bracteifera, DC. l. c. = *Madag.*
chionaea, DC. l. c. 219.—Bras.
ericoides, DC. l. c. = *Madag.*
ferruginea, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 187.—*Madag.*
flaginoides, DC. *Prod.* vi. 219.—*Madag.*
fruticosa, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 186.—*Madag.*
Gardneri, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 127 = *satureoides*.

STENOPTERA :—

gymnocephala, DC. *Prod.* vi. 218.—*Madag.*
incana, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 187.—*Madag.*
inuloides, DC. in *Deless. Ic. Sel.* iv. t. 53.—*Madag.*
lecheoides, DC. *Prod.* vi. 218.—*Madag.*
pusilla, Klatt, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* xviii. (1873) 373.—Ins. Maurit.
satureoides, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 312.—Bras.

STENOCOELIUM, Ledeb. *Fl. Alt.* i. 298 (1829) = *Seseli*, Linn. (Umbell.).
athamantoides, Ledeb. l. c. = *Sibir. altaic.*
divaricatum, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 93; xvii. (1844) 734 = *Siler divaricatum*.
trichocarpum, Schrenk, in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* i. (1843) 80.—*Soongar.*

STENOCORYNE, Lindl. *Bot. Reg.* (1843) Misc. 53 = *Bifrenaria*, Lindl. (Orchid.).
longicornis, Lindl. l. c. = *B. longicornis*.

STENODISCUS, Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 295 = *Spyridium*, Fenzl (Rhamn.).
ulicinus, Reiss. l. c. = *Spyr. ulicinum*.

STENODON, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 146. *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 737.
gracilis, Berg, ex *Triana*, in *Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 25.—Bras.
suberosus, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 146, t. 3.—Bras.

STENOCASTRA, Hanst. in *Linnaea*, xxvi. (1853-55) 205 = *Sinningia*, Nees (Gesner.).
concinna, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5253.—Bras.
hirsuta, Hanst. in *Linnaea*, xxvi. (1853-55) 205.—Bras.
multiflora ×, Lem. *Illustr. Hort.* (1864) t. 390.

STENOGLOSSUM, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 355, t. 87 (1815). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 523.
coriophorum, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 62 = *seq.*
corynephorum, Spreng. *Syst.* iii. 742 = *seq.*
coryophorum, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 356.—N. Granat.
subulatum, Lindl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 51 = *coryophorum*.

STENOGLOTTIS, Lindl. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 209. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 622.
calcarata, Reichb. f. in *Flora*, xlviii. (1865) 180 = *Habenaria calcarata* (in *Addend.*).
fimbriata, Lindl. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 210.—Afr. austr.

STENOgonum, Nutt. in *Journ. Acad. Philad. N. S.* i. (1847) 170 = *Eriogonum*, Michx. (Polygon.).
salsuginosum, Nutt. l. c. = *E. salsuginosum*.

STENOgyne, Benth. in *Bot. Reg.* sub t. 1292 (1831). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1217.
PHAEOPSIS, Nutt. ex Benth. in *DC. Prod.* xii. 555 (1848).
angustifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) 348.—Ins. Sandvic.
calaminthoides, A. Gray, l. c. 347.—Ins. Sandvic.
cordata, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 654.—Ins. Sandvic.
crenata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) 348.—Ins. Sandvic.
diffusa, A. Gray, l. c. = *microphylla*.
Haliakalae, Wawra, in *Flora*, lv. (1872) 554 = *rotundifolia*.
Kaaleae, Wawra, in *Flora*, lv. (1872) 556.—Ins. Sandvic.
Kamehamehae, Wawra, l. c. 532 = *calaminthoides*.
Kealiae, Wawra, l. c. 556 = *purpurea*.
macrantha, Benth. in *Bot. Reg.* sub t. 1292.—Ins. Sandvic.
microphylla, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 655.—Ins. Sandvic.
Nelsonii, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 655 = *scrophularioides*.
parviflora, H. Mann, in *Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 193.—Ins. Sandvic.
purpurea, H. Mann, l. c.—Ins. Sandvic.
rotundifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) 347.—Ins. Sandvic.

STENOGYNE :—

- rugosa*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1292.—Ins. Sandvic.
scrophularioides, Benth. l. c.—Ins. Sandvic.
sessilis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 654.—Ins. Sandvic.

STENOGYNE, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 493 (1827) = *Eriocephalus*, Linn. (Compos.).

STENOLOBIUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 125 = *Calopogonium*, Desv. (Legumin.).
arborescens, Wawra, in Flora, xlvii. (1864) 243.—Bras.
brachycarpum, Benth. in Seem. Bot. Voy. Herald, 109 = *C. mucronoides*.
caeruleum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 125 = *C. caeruleum*.
galactioides, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 140 = *C. galactioides*.
glabrum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 125 = *C. caeruleum*.
tomentosum, Benth. l. c. = *C. caeruleum*.
velutinum, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 437 = *Rhynchosia Luschnathiana*.

STENOLOBIUM, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. ix. (1823) 264 = *Tecoma*, Juss. (Bignon.).
castanifolium, D. Don, l. c. = *Bignonia castaneaefolia*.
molle, Seem. Journ. Bot. i. (1863) 90 = *T. mollis*.
sambucifolium, Seem. l. c. 91 = *T. stans*.
stans, Seem. l. c. 88 = *T. stans*.

STENOLOPHUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 35 (1826); l. 499 (1827) = *Centaurea*, Linn. (Compos.).

STENOMERIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 312. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 756.
decapetis, Turcz. l. c. —N. Granat.
pentapetis, Turcz. l. c. 313.—N. Granat.

STENOMERIS, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 319. *DIOSCOREACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 745.
Cumingiana, Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. ii. (1870) 8.—Ins. Philipp.
dioscoreaefolia, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 320.—Ins. Philipp.

STENOMESSION, Herb. App. [Bot. Reg.] 40 (1821). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 733.
CALLITHAUMA, Herb. Amaryll. 225 (1837).
CARPODETES, Herb. App. [Bot. Reg.] 41 (1821).
CHRYSIPHIALA, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. sub t. 778 (1824).
CLINANTHUS, Herb. App. [Bot. Reg.] 40 (1821).
CLITANTHES, Herb. in Bot. Reg. xxv. (1839) Misc. 87.
COBURGIA, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 17 (1838).
NEAERA, Salisb. Gen. Fl. Fragm. 109 (1866).
SPIAEROTELE, Presl, Rel. Haenk. 119. t. 16 (1830).
acutum, Baker, in Saund. Refug. Bot. sub t. 308 = *incarnatum*.
aurantiacum, Herb. App. [Bot. Reg.] 40.—Ecuador.
breviflorum, Herb. Amaryll. 199. t. 28. f. 7, 8 = *coccineum*.
coccineum, Herb. App. [Bot. Reg.] 40.—Peruv.
croceum, Herb. Amaryll. 199. t. 28. f. 4.—Peruv.
curvidentatum, Herb. in Bot. Mag. t. 2640 = *flavum*.
discolor, Baker, in Saund. Refug. Bot. sub t. 308 = *recurvatum*.
eustephioides, Herb. in Bot. Reg. (1843) Misc. 62 = *aurantiacum*.
flavum, Herb. App. [Bot. Reg.] 40.—Peruv.
Hartwegii, Lindl. Bot. Reg. (1844) t. 42 = *aurantiacum*.
humilis, Baker, in Saund. Refug. Bot. sub t. 308.—Peruv.
incarnatum, Baker, l. c.—Peruv.
latifolium, Herb. in Bot. Mag. t. 3803 = *flavum*.
luteoviride, Baker, l. c. t. 6508.—Ecuador.
luteum, Baker, in Saund. Refug. Bot. sub t. 308 = *recurvatum*.
obragillensis, Baker, l. c. = *recurvatum*.
pauciflorum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 406; Herb. Amaryll. 198. t. 28. f. 3 = *flavum*.
Pearcei, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 308.—Peruv.
recurvatum, Baker, l. c.—Peruv.
rubrum, Herb. Amaryll. 199. t. 28. f. 6.—Peruv.
Ruizianum, Kunth, Enum. Pl. v. 642 = *croceum*.

STENOMESSION :—

- Stricklandi*, Baker, in Gard. Chron. (1882) ii. 102.—Ecuador.
suspensum, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 22.—Peruv.
viridiflorum, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 733.—Peruv.
vitellinum, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 2 = *flavum*.

STENONEMA, Hook. ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 75 (1862) = *Dolichostylis*, Turcz. (Crucif.).

STENONIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 578. t. 22 (1858). *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 267.
Boiviniana, Baill. l. c. 579. t. 22.—Afr. trop.

STENONIA, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 146 = *Argithamnia*, Sw. (Euphorb.).
montevidensis, Didr. l. c. 148 = *A. montevidensis*.

STENOPETALUM, R. Br. ex DC. Syst. ii. 513 (1821); et in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 239. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 82.
australis, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 146, sphalm. = *Menkea draboides*.
croceum, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 258 = *robustum*.
draboides, Hook. Ic. Pl. t. 617 = *Menkea draboides*.
filifolium, Benth. Fl. Austral. i. 78.—Austral.
gracile, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 257 = *robustum*.
incisifolium, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 276 = *Capella procumbens*.
lineare, R. Br. ex DC. Syst. ii. 513.—Austral.
minus, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 258 = *robustum*.
nutas, F. Muell. Fragm. iii. 27.—Austral.
pedicellare, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 79.—Austral.
procumbens, Hook. Ic. Pl. t. 610 = *Menkea australis*.
robustum, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 4.—Austral.
sphaerocarpum, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 35.—Austral.
velutinum, F. Muell. Vict. Pl. i. 49.—Austral.

STENOPHRAGMA, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iii. (1875) 445. *CRUCIFERAE*.
Thalianum, Celak. l. c.—Hispan.

STENOPHYLLUM, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 391 (1873) = *Caiea*, Linn. (Compos.).
senecioides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 258 = *C. senecioides*.
Senecionis, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 391 = *C. senecioides*.

STENOPHYLLUS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825) = *Scirpus*, Tourn. (Cyper.).
caespitosus, Rafin. l. c. (= *Isolepis stenophylla*).—Am. bor.

STENOPOLEN, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1836) = *Stenia*, Lindl. (1837) (Orchid.).

STENOPTERA, Presl, Rel. Haenk. i. 95. t. 14 (1827). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 595.
PORPHYROSTACHYS, Reichb. f. Xenia Orch. i. 18 (1854).
acuta, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 447.—Bras.
ananassacomis, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxi. (1863) 131.—Jamaic.
cardinalis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 448.—Peruv.
goodyeroides, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 211.—Peruv.
macrostachya, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 211 = *peruviana*.
peruviana, Presl, Rel. Haenk. i. 95.—Peruv.
viscosa, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 211.—Peruv.

STENORHYNCHUS, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 386 = seq.

STENORHYNCHUS, Lindl. in Benth. Pl. Hartw. 92 (1842) = seq.

STENORRHYNCHIUM, Reichb. Nom. 55 (1841) = seq.

STENORRHYNCHOS, Spreng. Gen. ii. 660 (1831) = seq.

STENORRHYNCHUS, Reichb. Consp. 67 (1828) = seq.

STENORYNCHUS, Rich. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 59 = *Spiranthes*, Rich. (Orchid.).

actinophila, Rodr. Orch. Nov. ii. p. xv (Index) = *Sp. actinophila*.
albescens, Rodr. l. c. i. p. x (Index) = *Sp. micrantha*.
aphyllus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 478 = *Sp. orchioides*.
argenteus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 339.—Reg. Argent.
Arrabidae, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 815 = *Sp. Arrabidae*.
aurantiacus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 479 = *Sp. aurantiaca*.
australis, Lindl. l. c. 477 = *Sp. orchioides*?
calcaratus, Rich. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 59 = *Pelexia setacea*.
ceracifolia, Rodr. Orch. Nov. ii. p. xv (Index) = *Sp. ceracifolia*.
cernuus, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 386.—Ecuador.
cinnabarinus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 479 = *Sp. cinnabarina*.
epiphyta, Rodr. Orch. Nov. i. p. x (Index) = *Sp. epiphyta*.
euphlebia, Reichb. f. in Regel, Gartenfl. (1853) 3, in obs. = *Sp. euphlebia*.
flavus, Spreng. Syst. iii. 710 = *Corymbis flava*.
hypnophila, Rodr. Orch. Nov. i. p. x (Index) = *Sp. hypnophila*.
hysterantha, Rodr. l. c. = *Sp. hysterantha*.
icmadophila, Rodr. l. c. ii. p. xv (Index) = *Sp. icmadophila*.
lanceolatus, Rich. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 59 = *Sp. orchioides*?
laxus, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 7. t. 109 = *Pelexia laxa*.
lupulinus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 479 = *Sp. lupulina*.
macropoda, Rodr. Orch. Nov. i. p. x (Index) = *Sp. macropoda*.
madrensis, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 177 = *Sp. madrensis*.
michuacanus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 480 = *Sp. mechoacana*.
montanus, Lindl. in Benth. Pl. Hartw. 95 = *Sp. montana*.
novofriburgensis, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 815 = *Sp. novofriburgensis*.
nutas, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 12.—Venezuela.
orchioides, Rich. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 59 = *Sp. orchioides*.
papulosus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 477.—Mexic.
pauciflorus, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 211 = *Sp. pauciflora*.
polystachyon, Spreng. Syst. iii. 710 (= *Chloidia vernalis*).—Jamaic.
speciosus, Rich. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 59 = *Sp. colorata*.
squamulosus, Spreng. Syst. iii. 710.—N. Granat.
sulphureus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 478 = *Sp. sulphurea*.
umbrosa, Rodr. Orch. Nov. i. p. x (Index) = *Sp. umbrosa*.
vaginatus, Spreng. Syst. iii. 710; Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 101 = *Sp. vaginata*.

STENOSEMIS, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 551 (1862) = *Annesorhiza*, Cham. & Schlecht. (Umbell.).
angustifolia, E. Mey. ex Harv. & Sond. l. c.—Afr. austr.
caffra, Sond. l. c.—Afr. austr.
teretifolia, E. Mey. ex Sond. l. c. = *caffra*.

STENOSIPHON, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 326, 384. *ONAGRARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 792.
linifolium, Heynh. Nom. ii. 704 = *virgatum*.
virgatum, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 385.—Am. bor.

STENOSIPHONIUM, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 75 (1832). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1086.
confertum, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 464 = *diandrum*.
confertum, Nees, in DC. Prod. xi. 105.—Ind. or.

STENOSIPHONIUM :—

- diandrum*, Nees, in DC. Prod. xi. 105, partim = *Strobilanthes exareolatus*.
diandrum, Wight, Ic. t. 1502.—Ind. or.
Moonianum, Wight & Gardn. ex T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 466 = *Strobilanthes adenophorus*.
parviflorum, T. Anders. l. c. 464.—Ind. or.
Russelianum, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 84.—Ind. or.
Russelianum, Nees, l. c., partim = *parviflorum*.
Russelianum, Wight, Ic. t. 873 = confertum.
setosum, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 464.—Ind. or.
subsericeum, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 84 = *Russelianum*.
zeylanicum, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 225.—Zeylan.

- STENOSOLENIUM**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiii. (1840) ii. 253 = *Arnebia*, Forsk. (Borag.).
perenne, Schrenk, Enum. Pl. Nov. i. 34 = *Macrotomia perennis*.
saxatile, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiii. (1840) ii. 253.—Sibir. baical.; China.

- STENOSPERMATION**, Schott, Gen. Aroid. 70 (1858). *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 990.
amomifolium, Schott, Prod. Aroid. 348.—Peruv.
angustifolium, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 425.—Nicaragua.
marantaefolium, Hemsl. l. c.—Nicaragua.
Mathewsii, Schott, Gen. Aroid. t. 70.—Peruv.
popayanense, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 39.—N. Granat.
Spruceanum, Schott, Gen. Aroid. t. 70.—Bras.
Wallisi, Mast, in Gard. Chron. (1875) 558 = *popayanense*.

- STENOSPERMATIUM**, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 39 = *præc.*

- STENOSPERMUM**, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 209 (1830) = *Metrosideros*, Banks (Myrtac.).
capitatum, Sweet, l. c. = *Kunzea capitata*.
ciliatum, Heynh. Nom. i. 787 = *M. ciliata*.
corifolium, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 130 = *Kunzea corifolia*.
ericaefolium, Heynh. Nom. i. 787; ii. 338 = *Kunzea ericifolia*.

- STENOSTACHYS**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) ii. 330. Genus dubium *GRAMINEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1228.
narduroides, Turcz. l. c. 331.—N. Zel.

- STENOSTEPHANUS**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 91 (1847). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1106.
lasiostachyus, Nees, in DC. Prod. xi. 311.—Venezuela.
lobeliaeformis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 92.—Bras.

- STENOSTOMUM**, Gaertn. f. Fruct. iii. 69. t. 192 (1805) = *Antirrhoea*, Comm. (Rubiace.).
acutatum, DC. Prod. iv. 460 = *A. aristata*.
bifurcatum, DC. l. c. = *A. bifurcata*.
coriaceum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 334.—Ind. occ.
densiflorum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 132 = *Laugeria densiflora*.
dichotomum, DC. Prod. iv. 461 = *A. dichotoma*, Tournefortia bicolor.
granulatum, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 507.—Cuba.
lucidum, Gaertn. f. Fruct. iii. 69 = *A. lucida*.
microphyllum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 133 = *Guetarda Echinodendron*.
myrtifolium, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 334.—Ind. occ.
nitidum, DC. Prod. iv. 461.—Ind. occ.
paniculatum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 27. t. 23.—Peruv.?
pauciflorum, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 67.—Cuba.
radiatum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 132.—Ind. occ.
ramosa, Griseb. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 100, sphalm. = seq.
resinosum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 334 = *Laugeria resinosa*.
tomentosum, DC. Prod. iv. 460.—Jamaica.
viscosum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 334 = *A. viscosa*.

- STENOTAENIA**, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 339 = *Heracleum*, Linn. (Umbell.).
Hausknechtii, Boiss. Fl. Orient. ii. 1052.—Persia.
nudicaulis, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 340.—Persia.
torolyioides, Boiss. l. c. 339.—Persia.

- STENOTAPHRUM**, Trin. Fund. Agrost. 175 (1820). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1108.
DIASTEMANTHE, Steud. Syn. Pl. Gram. 360 (1855).
americanum, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 98 = *glabrum*.
complanatum, Schrank, in Flora, vii. (1824) ii. Beil. 26 = *glabrum*.
dimidiatum, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 127 = *glabrum*.
glabrum, Trin. Fund. Agrost. 176.—Littora tropica.
Koenigii, Schrank, in Flora, vii. (1824) ii. Beil. 28 = *glabrum*.
lepturoides, Hensl. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 346. t. 11 = *subulatum*.
madagascariense, Kunth, Rév. Gram. ii. t. 211 = *glabrum*.
oostachyum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 299.—Madag.
sarmentosum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 93; Fl. Afr. Austr. 63 = *glabrum*.
subulatum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. iii. (1835) 190.—Ins. Pacif.
Swartzianum, Nees, Fl. Afr. Austr. 62 = *glabrum*.
unilaterale, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 299.—Madag.

- STENOTHECA**, Monn. Ess. Hierac. 71 (1829) = *Hieracium*, Tourn. (Compos.).
mariana, Monn. l. c. 72 = *H. marianum*.
subnuda, Monn. l. c. = *H. venosum*.
venosa, Monn. l. c. = *H. venosum*.

- STENOTIUM**, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 58, in syn. (1841) = *Lobelia*, Linn. (Campan.).

- STENOTROPIS**, Hassk. Retzia, i. 183 (1855) = *Erythrina*, Linn. (Legumin.).
Berteroi, Hassk. in Retzia, i. 183 = *E. poianthes*.

- STENOTUS**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 334 = *Aplopappus*, Cass. (Compos.).
acaulis, Nutt. l. c. = *A. acaulis*.
armerioides, Nutt. l. c. 335 = *A. armerioides*.
caespitosus, Nutt. l. c. = *A. acaulis*.
florifer, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 238 = *Townsendia florifer*.
linearifolius, Torr. & Gray, l. c. = *A. linearifolius*.
multicaulis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 335 = *A. multicaulis*.
pygmaeus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 237 = *A. pygmaeus*.

- STENURUS**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 5 (1866) = *Biarum*, Schott (Aroid.).
tenuifolium, Salisb. l. c. = *B. tenuifolium*.

- STEPHANANDRA**, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 739. t. 4. *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 612.
chinensis, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 210.—China.
flexuosa, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 739. t. 4.—Japan.
gracilis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 333.—Japan.
incisa, Zabel, in Berl. Garten-Zeit. iv. (1885) 511 = *flexuosa*.
Tanaka, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 332.—Japan.

- STEPHANANTHUS**, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1826) 18; et in Flora, x. (1827) 96 = *Baccharis*, Linn. (Compos.).
juncus, Lehm. ll. cc. = *B. juncea*.

- STEPHANIA**, Lour. Fl. Cochinch. 608 (1790). *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 37.
CLYPEA, Blume, Bijdr. 26 (1825).
HOMOCNEMIA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 40.
ILIOCARPUS, Miers, l. c. (1851).
PERICHASMA, Miers, l. c. Ser. III. xviii. (1866) 21.
STYPHANIA, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 66 (1868).

STEPHANIA :—

- abyssinica*, Walp. Rep. i. 96.—Abyss.
acuminata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 316.—Java.
acuminatissima, Walp. Rep. i. 96 = *præc.*
appendiculata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 15.—Ind. or.
australis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 38 = *discolor*.
australis, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 40 = *Cissampelos Pereira*.
bullulata, Miers, l. c. Ser. III. xviii. (1866) 16 = *abyssinica*.
Burmanni, Walp. Rep. i. 96 = *Cyclea Burmannii*.
capitata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 316.—Java.
cauliflora, Becc. Malesia, i. (1877) 155.—Ins. Celebes.
concinna, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 15.—Java.
convolvulacea, Miers, l. c. Ser. II. vii. (1851) 40 = *Cissampelos Pereira*.
corymbosa, Walp. Rep. i. 96.—Malaya.
discolor, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 316.—Geront. trop.
elegans, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 195.—Reg. Himal.
exigua, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 16.—Ins. Philipp.
fastuosa, Miers, l. c.—Afr. trop.
florulenta, Becc. Malesia, i. (1877) 153.—N. Guin.
Forsteri, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 36 = *discolor*.
Gaudichaudii, A. Gray, l. c. 37 = *discolor*.
glabra, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 40 = *rotunda*.
glandulifera, Miers, l. c. Ser. III. xviii. (1866) 15 = *rotunda*.
glaucescens, Walp. Rep. i. 96.—Ins. Timor.
gracilentia, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 15.—Ind. or.
hermandifolia, Walp. Rep. i. 96 = *discolor*.
hexandra, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 40 = *rotunda*.
hypoglauca, Miers, l. c. Ser. III. xviii. (1866) 15 = *discolor*.
intertexta, Miers, l. c. = *discolor*.
japonica, Miers, l. c. 14 = *rotunda*.
laetificata, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 47.—Afr. trop.
laevigata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 16 = *abyssinica*.
latifolia, Miers, l. c. 15 = *discolor*.
longa, Lour. Fl. Cochinch. 609 = *rotunda*.
longifolia, Becc. Malesia, i. (1877) 156.—Borneo.
Meyeriana, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 4.—Afr. austr.
obvia, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 15.—Java.
pallidula, Miers, l. c. 16.—Austral.
praelata, Miers, l. c.—Afr. austr.
racemosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 282.—Ind. or.
ramuliflora, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 16.—Borneo.
rotunda, Lour. Fl. Cochinch. 608.—As. trop.
rotundata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 84 = *tomentosa*.
Roxburghiana, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 14 = *rotunda*.
Schimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 9 = *abyssinica*.
tetrandra, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 225.—China.
tomentosa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 316.—Java.
venosa, Spreng. l. c. 96 = *rotunda*.

- STEPHANIA**, Willd. Sp. Pl. ii. 239 (1799) = *Steriphoma*, Spreng. (Cappar.).
cleomoides, Willd. l. c. = *Steriphoma cleomoides*.
elliptica, DC. Prod. i. 253 = *Steriphoma ellipticum*.

- STEPHANIMUM**, Schreb. Gen. 124 (1789) = *Palicourea*, Aubl. (Rubiace.).
guianense, J. F. Gmel. Syst. 368 = *P. guianensis*.

- STEPHANOCARPUS**, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 368 = *Cistus*, Tourn.
monspeliensis, Spach, l. c. 369 = *C. monspeliensis*.

- STEPHANOCHILUS**, Coss. & Dur. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 477 (1873) = *Volutarella*, Cass. (Compos.).
omphalodes, Coss. & Dur. ex Benth. & Hook. f. l. c. = *V. omphalodes*.

STEPHANOCOMA, Less. Syn. Comp. 56 (1832).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 461.
atriplicifolium, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 639
 = *Serratula atriplicifolia*.
berckheyoides, Less. Syn. Comp. 56.—Afr. austr.
berckheyoides, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 775
 (= *Stobaea echinopoda*).—Afr. austr.
carduoides, Less. Syn. Comp. 56 = *Berkheya cardui-*
formis.
incana, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 774 = *Berkheya*
fruticosa.
rubricaulis, Sch. Bip. l. c. = *B. carlinoides*.

STEPHANODAPHNE, Baill. Adansonia, xi.
 (1875) 302. *THYMELAEACEAE*, Benth. & Hook. f.
 iii. 198.
Boivini, Baill. l. c.—Ins. Comor.
cremostachya, Baill. l. c. 303.—Madag.

STEPHANOASTRA, Karst. & Triana, in Linnaea,
 xxviii. (1856) 425 = *Centronia*, D. Don (Mela-
 stom.).
purpurea, Karst. & Triana, l. c. 426 = *C. Mutisii*.

STEPHANOLIRION, Baker, in Gard. Chron. (1875)
 i. 234 = *Tristagma*, Poepp. (Liliac.).
narcissoides, Baker, l. c. (= *Stemmatium narcissoides*).
 —Chili.

STEPHANOMERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil.
 Soc. N. S. vii. (1841) 427. *COMPOSITAE*, Benth. &
 Hook. f. ii. 533.
HEMITILUM, Torr. Bot. Emory Exped. 105 (1858).
JAMESIA, Nees, in Neuwied, Reise N. Am. ii. 442
 (1844).
PTILORIA, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832), nomen
 prius.
cichoriacea, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-
 65) 552.—Calif.
coronaria, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. IV. (1885)
 194.—Calif.
elata, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847)
 173.—Calif.
exigua, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.
 (1841) 428.—Am. bor. occ.
heterophylla, Nutt. l. c. 427 = *runcinata*.
intermedia, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1873)
 39 = *Microseris nutans*.
lactucina, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65)
 552.—Calif.
minor, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.
 (1841) 427.—Am. bor. occ.
myrioclada, Eaton, in Bot. King's Exp. 198. t. 20.—
 Am. bor. occ.
paniculata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.
 (1841) 428.—Am. bor. occ.
Parryi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 61.—
 Calif.
pentachaeta, Eaton, in Bot. King's Exp. 199. t. 20.—
 Am. bor. occ.
runcinata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.
 (1841) 428.—Am. bor. occ.
Schottii, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 533; A. Gray, in
 Bot. Calif. i. 427.—Arizona.
Thurberi, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855)
 325.—N. Mexic.
virgata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 32.—Am. bor. occ.
Wrightii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 62.
 —Am. bor. occ.

STEPHANOPAPPUS, Less. in Linnaea, vi. (1831) 234
 = *Nestlera*, Spreng. (Compos.).
reflexus, Less. l. c. = *N. biennis*.

STEPHANOPHYLLUM, Guill. in Deless. Ic. Sel. iii.
 61 (1837) = *Paepalanthus*, Mart. (Eriocaul.).
flagellaris, Guill. l. c. 61 = *P. flagellaris*.
proliferum, Guill. l. c. = *P. prolifer*.
viviparum, Guill. l. c. = *P. viviparus*.

STEPHANOPHORUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 133
 (1867) = *Narcissus*, Tourn. (Amaryll.).
biflorum, Dulac, l. c. = *N. biflorus*.
filiforme, Dulac, l. c. 134 = *N. juncifolius*.
grandiflorus, Dulac, l. c. = *N. Pseudo-narcissus*.
infundibuliformis, Dulac, l. c. = *N. Bulbocodium*.
luteum, Dulac, l. c. = *N. Jonquilla*.
purpuraceum, Dulac, l. c. 133 = *N. poeticus*.

STEPHANOPHYSUM, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 83. tt. 155,
 156 (1831) = *Ruellia*, Plum. (Acanth.).
angustiflorum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 51.—
 Bras.
asperulum, Mart. & Nees, l. c. 52.—Bras.
attenuatum, Mart. in Flora, xx. (1837) ii. Beibl. 123
 = *Geissomeria longiflora*.
Baikiei, Hook. Bot. Mag. t. 5111.—Afr. trop.
brevifolium, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 84. t. 155.—
 Bras.
ciliare, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 52.—Bras.
cordifolia, Nees, l. c. 51.—Bras.
flavum, Nees, l. c.—Bras.
Herbstii, T. Anders. in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind.
 N. S. i. (1868) 269 = *Ruellia Herbstii*.
hirsutum, Mart. ex Nees, in DC. Prod. xi. 205 =
asperulum.
hirsutum, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 50.—
 Bras.
longifolium, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 85. t. 156 =
R. amoena.
molle, Nees, in DC. Prod. xi. 203.—Peruv.
quadriflorum, Nees, l. c. 202 = *Macrostegia Ruiziana*?
repens, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 25
 = *Baikiei*.
Ruizianum, Nees, in DC. Prod. xi. 203.—Peruv.;
 Chili.
tubulatum, Nees, l. c. 202 = *R. tubulata*.
ventricosum, Nees, l. c. 203 = *R. ventricosa*.

STEPHANOPODIUM, Poepp. & Endl. Nov. Gen.
 et Sp. iii. 40. t. 246 (1842). *CHAILLETIACEAE*,
 Benth. & Hook. f. i. 341.
Engleri, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 109.—
 Bras.
peruvianum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 40.
 t. 246.—Peruv.

STEPHANOSIPHON, Boiv. ex C. DC. in DC. Monog.
 Phan. i. 446 (1878) = *Turraea*, Linn. (Meliac.).
madagascariensis, Boiv. ex C. DC. l. c. = *T. sericea*.

STEPHANOSTACHYS, Klotzsch, ex Oerst. in Kjoeb.
 Vidensk. Meddel. (1858) 26 = *Chamaedorea*,
 Willd. (Palm.).
Casperiana, Klotzsch, ex Oerst. l. c. 27; et Oerst.
 L'Amérique Centrale, 14. t. 7 = *C. Casperiana*.
Martiana, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858)
 29 = *C. Martiana*.
Tepejilote, Oerst. l. c. 28 = *C. Tepejilote*.
Wendlandiana, Oerst. l. c. = *C. Wendlandi*.

STEPHANOTELLA, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi.
 iv. 326 (1885). *ASCLEPIADEAE*.
Glaziovii, Fourn. l. c.—Bras.

STEPHANOTIS, Thon. Gen. Nov. Madag. 11 (1806)
ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 773.
ISAURA, Comm. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 185
 (1813).
JASMINANTHES, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.
 148. t. 28 (1850).
acuminata, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837)
 30.—Madag.
chinensis, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ.
 v. (1853) 53.—Ins. Hongk.
floribunda, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii.
 (1837) 30.—Madag.
grandiflora, Decne. in DC. Prod. viii. 620.—Madag.
Isaura, Decne. l. c.—Madag.
longiflora, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 773.—
 Cuba.
Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 39.—Malacca.
Thouarsii, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii.
 (1837) 30.—Madag.
vincaeflora, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 773.—Cuba.

STEPHANOTRICHUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér.
 III. iv. (1845) 54 = *Clidemia*, D. Don (Melastom.).
hispidum, Naud. l. c. = *Heterotrichum octonum*.
octonum, Naud. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i.
 430 = *Heterotrichum octonum*.

STEPHEGYNE, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 160.
 t. 35 (1840) = *Mitragyna*, Korth. (Rubiace.).
africana, Walp. Rep. ii. 513 = *M. africana*.
diversifolia, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 31; Hook. f.
 Fl. Brit. Ind. iii. 26.—Burma; Ins. Philipp.

STEPHEGYNE :—
parvifolia, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 161 =
Mitragyna parvifolia.
parvifolia, Vidal, Sinops. t. 56. f. A = *diversifolia*.
speciosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 160. t. 35 =
M. speciosa.
stipulata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 31 = *M. macro-*
phylla.
tubulosa, Benth. & Hook. f. l. c.—Ind. or.
tubulosa, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III.
 Nov. App. 104 = *diversifolia*.

STEPHENSONIA, Hort. ex Van Houtte, in Fl. des
 Serres, xv. (1862-63) 177 = *Stevensonsonia*, Duncan
 (Palm.).
grandifolia, Hort. ex Van Houtte, l. c. = *Stevensonsonia*
grandifolia.

STEPTIUM, Boiss. Fl. Orient. iv. 533 (1879) =
STREPTIUM, Roxb. = *Priva*, Adans. (Verben.).

STEPTORHAMPHUS, Bunge, in Mém. Sav. Etr.
 Pétersb. vii. (1851) 381 = *Lactuca*, Linn. (Compos.).
crambifolius, Bunge, l. c. = *L. crambifolia*.
hispidulus, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867)
 ii. 176.—Turkestan.

STERBECKIA, Schreb. Gen. i. 360 (1789) = *Singana*,
 Aubl. (Inc. sed.).
guianensis, J. F. Gmel. Syst. 820 = *Sing. guianensis*.
lateriflora, Willd. Sp. Pl. ii. 1177 = *Sing. guianensis*.

STERCULIA, Linn. Diss. Dass. 29 (1747); Amoën.
 Acad. i. 412 (1749). *STERCULIACEAE*, Benth. &
 Hook. f. i. 217.
BALANGHAS, Rafin. Sylva Tellur. 72 (1838).
BRACHYCHITON, Schott, Melet. 34 (1832).
BRAXIPIS, Rafin. Sylva Tellur. 72 (1838).
CARPOPHYLLUM, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 401
 (1860).
CAVALAM, Adans. Fam. ii. 357 (1763).
CHICHAEAE, Presl, Rel. Haenk. ii. 140 (1836).
CLOMPANUS, Rafin. Sylva Tellur. 73 (1838).
COLARIA, Rafin. l. c. (1838).
CULHAMIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 96 (1775).
DELABECHEA, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.
 155 (1848).
ERYTHROPSIS, Lindl. in Brande, Journ. (Sept. 1827)
 112, in obs.
FIRMIANA, Marsigli, in Sagg. Padov. i. (1786) 106,
 cum ic.
HILDEGARDIA, Schott, Melet. 33 (1832).
ICOSINIA, Rafin. Sylva Tellur. 75 (1838).
IVIRA, Aubl. Pl. Gui. 694. t. 279 (1775).
JOIRA, Steud. Nom. ed. II. ii. 639, in syn. (1841).
KARAKA, Rafin. Sylva Tellur. 72 (1838).
KAYALAMA, Rafin. l. c. (1838).
MATEATIA, Vell. Fl. Flum. ix. t. 95 (1827).
OLEOBACHIA, Hort. ex Mast. in Gard. Chron.
 (1880) ii. 232.
ORSOPEA, Rafin. Sylva Tellur. 73 (1838).
POECILODERMIS, Schott, Melet. 33 (1832).
POMPILA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790)
 ed. I. Art. iv. 3.
PTEROCYMBIUM, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 219.
 t. 45 (1838?).
PTERYGOTA, Schott, Melet. 32 (1832).
SCAPHIUM, Schott, l. c. (1832).
SOUTHWELLIA, Salisb. Parad. Lond. t. 69 (1806).
THEODORIA, Neck. Elem. ii. 286 (1790).
TRICHOSEPHON, Schott, Melet. 34 (1832).
TRIPHACA, Lour. Fl. Cochinch. 577 (1790).
TRILOBUS, Rafin. Sylva Tellur. 110 (1838).
abyssinica, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *S.*
Triphaca.
abyssinica, R. Br. l. c., partim = *arabica*.
acerifolia, A. Cunn. in Loud. Hort. Brit. 392.—
 Austral.
acerifolia, A. Cunn. l. c., partim = *incana*.
acerifolia, Hemsl. Diol. Centr. Am. Bot. i. 126.—
 Mexic.
acuminata, Beauv. Fl. Owar. i. 41. t. 24 = *Cola*
acuminata.
affinis, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 361.—
 Malacca.
alata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 525 = *Blancoi*.
alata, Roxb. Hort. Beng. 50; Pl. Corom. iii. 84. t. 287.
 —Ind. or.
alata, Wall. Cat. n. 1127 D = *guttata*.

STERCULIA:—

- Alexandri, *Harv. in Proc. Dubl. Univ. Zool. & Bot. Assoc.* i. (1859) 140. t. 15.—Afr. austr.
angustifolia, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. i. 21 = rubiginosa.
angustifolia, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 148 = S. Balanghas.
apetala, Karst. Fl. Columb. ii. 35 = carthaginensis.
arabica, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. i. (1860) 9.—Arab.
arbutiflora, Zipp, ex Mackl. in Bijdr. Nat. Wet. v. (1830) 178, nomen (Quid?).—N. Guin.
armata, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 357 = ornata, etc.
Balanghas, Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 338 = nobilis.
Balanghas, Linn. Sp. Pl. 1007.—As. trop.
Barteri, Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 218.—Afr. trop.
bicolor, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 359.—Malacca.
Bidwilli, Hook. ex Benth. Fl. Austral. i. 228.—Austral.
Blancoi, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 308.—Ins. Philipp.
Blumei, G. Don, Gen. Syst. i. 515.—Java.
bullata, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 214.—N. Caléd.
campanulata, Wall. ex Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 362.—Burma; Java.
Candollii, Wall. Pl. As. Rar. i. 4, in textu = populnifolia.
caribaea, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 228.—Ind. occ.
caricaefolia, G. Don, Gen. Syst. i. 517 = Cola Afzelii.
carthaginensis, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 328, partim = P. Chica.
carthaginensis, Cav. Diss. vi. 353.—Am. trop.
caudata, Heward, ex Benth. Fl. Austral. i. 230.—Austral.
ceramica, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 233.—Ins. Molucc.
Chapelieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 486.—Madag.
Chicha, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 278. t. 46.—Bras.
chrysodasys, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 399.—Sumatra.
cinerea, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 74. t. 16.—Abyss.
cinerea, Schweinf. Pl. Nilot. 15 = Hartmanniana.
citrifolia, Salisb. Prod. 387 = S. Balanghas.
coccinea, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. i. 20 = laevis.
coccinea, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 151.—Ind. or.
coccinea, Wall. Cat. n. 1122, partim = alata.
Cola, Pers. Syn. ii. 239 = Cola acuminata.
colorata, Roxb. Pl. Corom. i. 26. t. 25.—Ind. or.
comorensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 485.—Madag.
comosa, Wall. Pl. As. Rar. ii. 25.—Ins. Amboin.
convoluta, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = S. Helicteres.
cordata, Blume, Bijdr. 83.—Java.
cordifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 764.—Ins. Philipp.
cordifolia, Cav. Diss. v. 236. t. 144. f. 2.—Afr. trop.
crassinervia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 399.—Sumatra.
crepitans, F. Muell. Ind. Perf. Linn. Sp. Pl. 37, sphalm. = Hura crepitans.
crinita, Cav. Diss. v. 285 = S. Ivira.
cuneata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 232.—Ins. Philipp.
cuneata, Heyne, in Wall. Cat. n. 1127³ = guttata.
cuneifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 400.—Sumatra.
cuspidata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 232.—Sumatra.
cymbiformis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 526 (Quid?).—Ins. Philipp.
decandra, Blanco, l. c. ed. I. 766 = Myristica intermedia.
discolor, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 228.—Austral.
diversifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 516.—Austral.
diversifolia, Seem. Fl. Vit. 23.—Ins. Fiji.
ensifolia, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 359.—Burma; Penang.

VOL. II.

STERCULIA:—

- erythrosiphon, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 486.—Madag.
excelsa, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 40.—Bras.
ferruginea, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 232.—Ins. Philipp.
Fiorniana, J. F. Gmel. Syst. 1034 = plantanifolia.
Firmiana, J. F. Gmel. l. c. 1632 = praec.
foetida, Linn. Sp. Pl. 1008.—Geront. trop.
Forsteri, Seem. Fl. Vit. 23, in nota.—Ins. Tanna.
frondosa, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 111.—Guian.
fulgens, Wall. Cat. n. 1135.—Reg. Himal.; Burma; Malaya.
geniculata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 400.—Sumatra.
gilva, Miq. l. c. 401.—Sumatra.
glandulosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 764 = Myristica simiarum.
glomerata, Blanco, l. c. = Myristica glauca?
gracilis, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 306.—Borneo.
grandiflora, Vent. Jard. Malm. sub t. 91 = Cola acuminata.
grandifolia, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 232.—Java.
guineensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 640 (Quid?).—Afr. trop.?
guttata, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 148.—Ind. or.; Malaya.
Halmahairae, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 88, nomen.—N. Guin.
Hartmanniana, Schweinf. Rel. Kotschy. 39.—Afr. trop.
Helicteres, Pers. Syn. ii. 240.—N. Granat.
heterophylla, Beauv. Fl. Owar. i. t. 40 = Cola heterophylla.
heterophylla, Cunn. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 82 = diversifolia, G. Don.
Heyne, Bedd. Fl. Sylv. t. 230 = alata.
Humblotiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 485.—Madag.
hyposticta, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 399 = Sumatra.
imberbis, DC. Prod. i. 483.—Guian.
incana, Benth. Fl. Austral. i. 228.—Austral.
insularis, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 232.—Ins. Molucc.
ipomoeaefolia, Garcke, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 130 = S. Triphaca.
Ivira, Pers. Syn. ii. 239 = imberbis.
Ivira, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 98.—Am. austr.
Ivira, Sw. l. c., partim = caribaea.
Juckiana, Wall. Cat. n. 1134; et in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 287 = rubiginosa.
javanica, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 230.—Java.
Joiria, J. F. Gmel. Syst. 1633 (Index) = S. Ivira.
laevis, Wall. Cat. n. 1138; et in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 287.—Burma; Malaya.
lanceaefolia, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 150.—Reg. Himal.
lanceolata, Blume, Bijdr. 82 = Blumei.
lanceolata, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 1122 = coccinea.
lanceolata, Cav. Diss. v. 287.—China; Java.
lasiantha, Mart. Med. Mat. Bras. (1843) 18 = striata.
laurifolia, F. Muell. Fragm. vi. 172.—Austral.
linearicarpa, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 360.—Malacca.
linearis, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 305.—Borneo.
linguifolia, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 357.—Burma.
longifolia, Vent. Jard. Malm. sub t. 91 = Cola acuminata.
lurida, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 228.—Austral.
lychnophora, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 243.—Cambodia.
macrocarpa, G. Don, Gen. Syst. i. 515 = Cola acuminata.
macrophylla, Vent. Jard. Malm. sub t. 91.—Malaya.
madagascariensis, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 229.—Madag.
Maingayi, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 359.—Malacca.
mexicana, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 227.—Mexic.

STERCULIA:—

- mollis*, Wall. Cat. n. 1131 = S. Balanghas.
monosperma, Vent. Jard. Malm. t. 91 = nobilis.
nitida, Vent. l. c. sub t. 91 = Cola acuminata.
nobilis, Sm. in Rees, Cycl. xxxiv. n. 4.—As. trop.
oblonga, Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 216.—Afr. trop.
oblongata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 232.—Ins. Philipp.
oblongifolia, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 482.—Mexic.
obovata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 233 = S. Tragacantha.
obtusifolia, Zipp, ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 173 = populnifolia.
ornata, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 105, nomen; et ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 228.—Burma.
ovalifolia, Wall. Cat. n. 1132 = lanceaefolia.
paniculata, Wall. ex Boj. Hort. Maurit. 36.—Ind. or.
parviflora, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 147.—Reg. Himal.; Malaya.
parvifolia, Wall. Cat. n. 1123.—Malaya.
peltata, G. Don, Gen. Syst. i. 517 = Pterospermum heterophyllum?
platanifolia, Linn. f. Suppl. 423.—China; Japon.
polyphylla, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 227.—Sumatra.
populifolia, DC. Prod. i. 483 (an seq.?).—Ins. Timor.
populnifolia, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 148.—Ind. or.
propinqua, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 229.—Guian.
pubescens, G. Don, Gen. Syst. i. 515 = S. Tragacantha.
pubescens, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 357.—Malacca.
pubescens, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 228, in nota.—Austral.
punctata, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 483.—Mexic.
punduana, Wall. Cat. n. 2701 = Reevesia Wallichii.
purpurascens, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 306.—Borneo.
pyriformis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 83 = platanifolia.
quadrifida, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 233.—Austral.
ramiflora, Benth. Fl. Austral. i. 227.—Austral.
Richardiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 486.—Madag.
robusta, Carr. in Rev. Hort. (1868) 120.—China.
Roxburghiana, Wall. Cat. n. 1124 = seq.
Roxburghii, Wall. Pl. As. Rar. iii. 39 = lanceaefolia.
rubicunda, Wall. Cat. n. 1119 D, F, G = colorata.
rubiginosa, Vent. Jard. Malm. sub t. 91.—Burma; Malaya.
rubiginosa, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 399 = chrysodasys.
rufa, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 306.—Borneo.
rugosa, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 229.—N. Granat.
rupestris, Benth. Fl. Austral. i. 230.—Austral.
scaphigera, Wall. Cat. n. 1130.—Burma; Malaya.
scatigera, G. Don, Gen. Syst. i. 517, sphalm. = praec.
setigera, Delile, Voy. Méroé Bot. 61 = tomentosa?
Spangleri, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 230.—Java.
spectabilis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 400.—Sumatra.
stipularis, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 232.—Ins. Philipp.
stipulata, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 306.—Borneo.
striata, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 213.—Bras.
striatiflora, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 356.—Burma.
subpeltata, Blume, Bijdr. 83.—Java.
surinamensis, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 229 = excelsa.
Tavia, Baill. Adansonia, x. (1872) 177.—Ins. Molucc.
Thwaitesii, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 361.—Zeylan.
tomentosa, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 81. t. 16.—Afr. trop.
tomentosa, Thunb. Jap. Ic. Dec. iv. t. 8 = platanifolia.
Tragacantha, Lindl. Bot. Reg. t. 1353.—Afr. trop.
Trichosiphon, Benth. Fl. Austral. i. 229.—Austral.
triloba, G. Don, Gen. Syst. i. 517 (Quid?).—Ind. or.

6 L

STERCULIA :—

- Triphaca, *R. Br. in Benn. Pl. Fav. Rar.* 228.—Afr. trop.
 tubulata, *Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 362.—Malacca.
 urccolata, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxiv. n. 3.—Ins. Amboin.
 urens, *Roxb. Pl. Corom.* i. 25. t. 24.—Ind. or.
 versicolor, *Wall. Pl. As. Rar.* i. 48. t. 59.—Burma.
 verticillata, *Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin.* Pl. 240 = *Cola acuminata*.
 villifera, *Steud. in Flora*, xxvi. (1843) 755 = *excelsa*.
 villosa, *Roxb. Hort. Beng.* 50; *Fl. Ind.* iii. 153.—Ind. or.
 vitiensis, *Seem. Fl. Vit.* 23.—Ins. Fiji.
 Wallichii, *G. Don, Gen. Syst.* i. 516 (Quid?).—Ind. or.
 Zippelii, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848) 307.—Java.

STEREOCHILUS, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 38 = *Sarcochilus*, *R. Br. (Orchid.)*.
 hirtus, *Lindl. l. c.*—Reg. Himal.

STEREODERMA, *Blume, Fl. Jav. Praef.* 9 (1828) = *Olea*, *Tourn.*
 javanica, *Blume, l. c.* = *O. maritima*.

STEREOSANDRA, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 176 (1856). *ORCHIDEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 607.
 javanica, *Blume, l. c.*—Java.

STEREOSPERMUM, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 720. *BIGNONIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 1047.
 DIPTEROSPERMA, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 152 (1844).
 HIERANTHES, *Rafin. Sylva Tellur.* 79 (1838).
 LAGAROPYXIS, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 198 (1863-64).
 RADERMACHERA, *Zoll. & Mor. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 53 (1854).
 Arguezona, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 58.—Abyss.
 Banaibana, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 314.—Ins. Philipp.
 caudatum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 200.—Ind. or.
 chelonoides, *DC. in Bibl. Univ. Genève*, xvii. (1838) 124; *Prod.* ix. 210.—Ind. or.; Burma.
 dentatum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 58.—Abyss.
 euphorioides, *DC. Prod.* ix. 211.—Madag.
 filiforme, *DC. in Bibl. Univ. Genève*, xvii. (1838) 124 = *Spathodea filiformis*.
 fimbriatum, *DC. l. c.* 124; *et Prod.* ix. 211.—Burma; Malaya.
 Ghorta, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 384.—Ind. or.
 glandulosum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 565.—Burma; Malaya.
 Hasskarlii, *Teysm. ex Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 756 (an seq.?).—Java.
 Hasskarlii, *Zoll. & Mor. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 54.—Malaya.
 hypostictum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 565.—Burma; Malaya.
 integrifolium, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 59.—Afr. trop.
 Kunthianum, *Cham. in Linnaea*, vii. (1832) 720.—Afr. trop.
 nematocarpum, *DC. Prod.* ix. 211.—Madag.
 neuranthum, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 91.—Burma.
 pinnatum, *F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 151.—Ins. Philipp.
 quadripinnatum, *F. Villar, l. c.* 151. t. 252.—Ins. Philipp.
 Seemannii, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 314.—Ins. Philipp.
 senegalense, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 200.—Afr. trop.
 serrulatum, *DC. in Bibl. Univ. Genève*, xvii. (1838) 124; *Prod.* ix. 206 = *Spathodea Serratula*.
 suicum, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 16.—China.
 suaveolens, *DC. ll. cc.* 124; 211.—Ind. or.; Burma.
 tetragonum, *DC. ll. cc.* 124; 210.—Ind. or.

STEREOSPERMUM :—

- Wallichii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 383.—Burma.
 zylocarpum, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 1047.—Ind. or.
 STEREOXYLON, *Ruiz & Pav. Prod.* 38. t. 6 (1794) = *Escallonia*, *Mutis (Saxifr.)*.
 ciliatum, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 247 = *Micromyrtus microphylla*.
 corymbosum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 14 = *E. corymbosa*.
 crenulatum, *Poir. ex DC. Prod.* iii. 230 = *Baeckea crenulata*.
 cuneifolium, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 16 = *E. discolor*?
 discolor, *Poir. Encyc.* v. 246 = *E. discolor*.
 paniculatum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 16 = *E. floribunda*.
 patens, *Ruiz & Pav. l. c.* 13 = *E. myrtilloides*.
 pendulum, *Ruiz & Pav. l. c.* 16 = *E. pendula*.
 pulverulentum, *Ruiz & Pav. l. c.* 15 = *E. pulverulenta*.
 resinosum, *Ruiz & Pav. l. c.* 14 = *E. resinosa*.
 revolutum, *Ruiz & Pav. l. c.* 15 = *E. revoluta*.
 rubrum, *Ruiz & Pav. l. c.* = *E. rubra*.
 serratum, *Poir. Encyc.* vii. 435 = *E. serrata*.
 virgatum, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 14 = *E. virgata*.

STERIGMA, *DC. Syst.* ii. 579 (1821). *CRUCIFERAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 102.
 ARTHROLOBUS, *Stev. ex DC. Syst.* ii. 579 (1821).
 STERIGMOSTEMUM, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* 444 (1819).

- acanthocarpum, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 38.—Armen.; Peruv.
 brachypetalum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvii. (1842) 386 = *sulphureum*.
 chionophilum, *Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot.* 111 = *Anchonium Tournefortii*.
 contortuplicatum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvii. (1842) 387.—Persia.
 elychnisifolium, *DC. Syst.* ii. 581 = *Anchonium Tournefortii*.
 longistylum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvii. (1848) 387.—Persia.
 purpurascens, *Boiss. Fl. Orient.* i. 241.—Persia; Afghan.
 sulphureum, *DC. Syst.* ii. 580.—As. occ. et bor.
 tomentosum, *DC. l. c.* 579.—Reg. Cauc.
 torulosum, *DC. l. c.* 580.—Reg. Cauc.; Armen.

STERIGMANTHE, *Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl.* (1859) 252; *et in Abh. Akad. Berl.* (1860) 100 = *Euphorbia*, *Linn.*
 Bojeri, *Klotzsch & Garcke, ll. cc.* 252; 101 = *E. Bojeri*.
 splendens, *Klotzsch & Garcke, ll. cc.* 252; 100 = *E. splendens*.

STERIGMOSTEMON, *Poir. in Dict. Sc. Nat.* l. 519 (1827) = seq.

STERIGMOSTEMUM, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* 444 (1819) = *Sterigma*, *DC. (Crucif.)*.
 incanum, *Bieb. l. c.* = *Sterigma torulosum*.
 tomentosum, *Bieb. l. c.* = *Sterigma tomentosum*.

STERIPHA, *Banks, ex Gaertn. Fruct.* ii. 81 (1791) = *Dichondra*, *Forst. (Convolv.)*.
 reniformis, *Soland. ex Gaertn. l. c.* = *D. repens*.

STERIPHE, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 141. *COMPOSITAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 251.
 corymbosa, *Phil. l. c.*—Chili.

STERIPHOMA, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 130, 139 (1827) *CAPPARIDEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 107.
 HERMUPOA, *Loefl. It. Hisp.* 307 (1758).
 ROEMERA, *Tratt. Gen.* 88 (1802).
 STEPHANIA, *Willd. Sp. Pl.* 239 (1799).
 cleomoides, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 139.—N. Granat.
 elliptica, *l. c.*—Ins. Trinit.
 paradoxum, *Endl. in Flora*, xv. (1832) 396; *Karst. Ausw. Gew. Venez.* 10. t. 3 = *cleomoides*.
 peruviana, *Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 267.—Peruv.

STERIS, *Adans. Fam.* ii. 255 (1763) = *Lychnis*, *Tourn. (Caryoph.)*.

STERIS, *Linn. Mant.* i. 8 (1767) = *Hydrolea*, *Linn. (Hydroph.)*.
 aquatica, *Burm. f. Fl. Ind.* 73. t. 39. f. 3 = *H. zeylanica*.
 javanica, *Linn. Mant.* i. 54 = *H. zeylanica*.
 villosa, *Pav. ex A. W. Benn. in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 275 = *H. zeylanica*.
 villosa, *Pav. ex A. W. Benn. l. c.* 277 = *H. multiflora*.

STERNBECKIA, *Pers. Syn.* ii. 69, in syn. (1807), *sphalm.* = *STERBECKIA*, *Schreb.* = *Singana*, *Aubl. (Inc. sed.)*.

STERNBERGIA, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* ii. 172. t. 159 (1805). *AMARYLLIDAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 721.
 Oporanthus, *Herb. App. [Bot. Reg.]* 38 (1821).
 aetnensis, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 395; *Schult. f. Syst.* vii. 794 = *colchiciflora*.
 americana, *Hoffmgg. Verz. Pfl.* 197 = *Haylockia pusilla*.
 caucasica, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 27.—Reg. Cauc.
 citrina, *Ker-Gawl. ex Schult. f. Syst.* vii. 795.—Graecia.
 Clusiana, *Ker-Gawl. ex Schult. l. c.* 794 = *colchiciflora*.
 colchiciflora, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* ii. 172. t. 159.—Europ. austr.
 dalmatica, *Herb. Amaryll.* 413. t. 47. f. 2 = *colchiciflora*.
 exigua, *Ker-Gawl. ex Schult. f. Syst.* vii. 795 = *Tapeinanthus humilis*.
 exscapa, *Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn.* i. 384 (sp. dub.).—Sicil.
 Fischeriana, *Roem. Syn. Ens.* 46 = *lutea*.
 Fischeriana, *Rupr. in Regel, Gartenfl.* (1868) 100. t. 576.—Reg. Cauc.
 lutea, *Ker-Gawl. ex Schult. f. Syst.* vii. 795.—Reg. Mediterr.
 lutea, *Orph. ex Nym. Consp.* 713 = *citrina*.
 macrantha, *J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient.* v. 148 = *colchiciflora*.
 pulchella, *Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II.* iv. 97 = *colchiciflora*.
 Schuberti, *Schenk, Pl. Sp. Aegypt.* 11 = *colchiciflora*.
 sicula, *Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 811 = *lutea*.
 stipitata, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* v. 148 = *colchiciflora*.

STERRHYMENIA, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 231 = *Sclerophylax*, *Miers (Solan.)*.
 Cynocrambe, *Grisch. l. c.*—Reg. Argent.

STETHOMA, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 61 (1836) = *Dianthera*, *Gronov. (Acanth.)*.
 pectoralis, *Rafin. l. c.* = *D. pectoralis*.

STEUARTA, *Catesb. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI.* 175 *App.* (1752), *sphalm.* = *Stuartia*, *Linn. (Ternstr.)*.

STEUDELIA, *Mart. Nov. Gen. et Sp. Bras.* t. 168 (1827) = *Leonia*, *Ruiz & Pav. (Violar.)*.
 cymosa, *Mart. l. c.* t. 169 = *L. cymosa*.
 racemosa, *Mart. l. c.* t. 168 = *L. glycyarpa*.

STEUDELIA, *Presl, Steud. Nov. Pl. Gen.* (1829); *et Symb. Bot.* i. 3. t. 2 (1830) = *Adenogramma*, *Reichb. (Ficoid.)*.
 capillaris, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 283.—Afr. austr.
 diffusa, *Eckl. & Zeyh. l. c.* 284 = *A. diffusa*.
 galioides, *Presl, Steud. Nov. Pl. Gen.* (1829); *et Symb. Bot.* i. 3. t. 2 = *A. galioides*.
 sylvatica, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 283 = *A. sylvatica*.

STEUDELIA, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 59 (1822) = *Erythroxylum*, *P. Br. (Lineae)*.
 brasiliensis, *Spreng. l. c.* = *E. ovatum*.

STEUDNERA, *C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr.* (1862) 114. *AROIDEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 988.
 colocasiaefolia, *C. Koch, l. c.* 114.—Malaya.
 discolor, *Bull. in Gard. Chron.* (1875) 708 = *colocasiae-folia*.

STEVENA, *Andrz. ex DC. Syst.* ii. 291 (1821) = *Alyssum*, *Tourn. (Crucif.)*.

STEVENIA, Adams & Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 84 = *Arabis*, Linn. (Crucif.).
alyssoides, Adams & Fisch. l. c. —Sibir.
cheiranthoides, DC. Syst. ii. 210 = *A. incarnata*.
incana, Andr. ex DC. l. c. 291 = *A. incana*.

STEVENSIA, Poit. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 235. t. 60 = *Rondeletia*, Linn. (Rubiaceae).
buxifolia, Poit. l. c. = *R. buxifolia*.

STEVENSONIA, J. Dunc. Cat. Hort. Maurit. 87 (1863), nomen. PALMEAE, Benth. & Hook. f. iii. 908.

PHOENICOPHORUM, H. Wendl. in Illustr. Hort. xii. (1865) Misc. 5. t. 433.

STEPHENSONIA, Hort. ex Van Houtte, Fl. des Serres, xv. (1862-63) 177.

grandiflora, J. Dunc. Cat. Pl. Maurit. 87 = seq. *grandifolia*, J. Dunc. l. c., in errat. —Ins. Mascar. *viridifolia*, J. Dunc. — Cf. Gard. Chron. (1870) 697; Baker, Fl. Maurit. 388 = *Verschaffeltia splendida*.

STEVIA, Cav. Ic. iv. 32. tt. 354-356 (1797). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 242.

MUSTELIA, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 28 (1801); et in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 152. t. 13.

NOTHITES, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 163 (1825). XETOLIGUS, Rafin. New Fl. Am. iv. 74 (1836).

adenophora, Lag. Gen. et Sp. Nov. 27. —Chili.

alpina, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 165. —Reg. Argent.

amabilis, Lemmon, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1884) 1. —Arizona.

angustifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 149 = *salicifolia*.

anisostemma, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 167. —Peruv.

arbutifolia, Willd. ex DC. Prod. v. 115 = *Ageratum arbutifolium*.

aristata, D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238. —Reg. Argent.

Arnottiana, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 201 = *Gilliesii*.

Aschenborniana, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 269. —Mexic.

Berlandieri, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 73, in Adnot. —Mexic.

boliviensis, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 81; et in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 535, nomen. —Bolivia.

breviaristata, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238. —Reg. Argent.

breviflora, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 291 = *aristata*?

callosa, Cerv. ex Loud. Hort. Brit. 335 (Quid?). —Mexic.

callosa, Nutt. in Journ. Acad. Philad. ii. (1821) 121 = *Polypteris callosa*.

calycina, DC. Prod. v. 124 = *Eupatorium calyculatum*.

camporum, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 202. —Bras.

canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 143 = *serrata*.

caracasana, DC. Prod. v. 119. —Venezuela.

cathartica, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 55. —Peruv.

Chamaedrys, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 167. —Reg. Argent.

cinerascens, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 209. —Bras.

Claussenii, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 203. —Bras.

clinopodia, DC. Prod. v. 116. —Mexic.

collina, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 458. —Bras.

compacta, Benth. Pl. Hartw. 197. —N. Granat.

conferta, DC. Prod. v. 116 = *pilosa*.

congesta, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238 = *satureiaefolia*.

connata, Lag. Elench. Hort. Madr. (1805); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 27. —Mexic.

cordifolia, Benth. Pl. Hartw. 39. —Mexic.

coriacea, Lag. Gen. et Sp. Nov. 28. —Peruv.

coronata, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 155 = *urticaefolia*.

coronifera, DC. Prod. v. 115. —Mexic.

crenata, Benth. Pl. Hartw. 197. —Mexic.

STEVIA:—

crenata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 205 = *menthaefolia*, Sch. Bip.

crenulata, Baker, l. c. 211. —Bras.

cryptantha, Baker, l. c. 204. —Bras.

decussata, Baker, l. c. 203. —Bras.

dissitifolia, DC. Prod. v. 121. —Mexic.

dissoluta, Schlecht. Hort. Hal. 16. —Mexic.

divaricata, DC. Prod. v. 123. —Mexic.

dodecachaeta, DC. l. c. 122. —Peruv.

Ehrenbergiana, Schlecht. in Linnaea, xvi. (1842) 370. —Mexic.

elatior, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 144. —N. Granat.

elliptica, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 434. —Mexic.

elongata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 144. —N. Granat.

enarthotricha, Lag. Gen. et Sp. Nov. 27. —Mexic.

erecta, Walp. Rep. ii. 548, sphalm. = *ovata*?

Eupatoria, [Ker-Gawl.] Bot. Reg. t. 93 = *purpurea*.

Eupatoria, Willd. Sp. Pl. iii. 1775. —Mexic.

fascicularis, Less. in Linnaea, v. (1830) 140. —Mexic.

fastigiata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 148. —Mexic.

febrifuga, Moç. [& Sesse], ex DC. Prod. v. 104 = *Piqueria trinervia*.

ferruginea, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 211 = *S. Veroniceae*.

fruticosa, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 167. —Reg. Argent.

Gardneriana, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 207. —Bras.

Gilliesii, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 251, in textu. —Bras.

glabra, Moç. [& Sesse], ex DC. Prod. v. 117 = *connata*.

glandulifera, Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal. (1839) 19. —Mexic.

glandulosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 296. —Mexic.

glutinosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 148. —N. Granat.

gracilipes, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 210 = *Lundiana*.

grandidentata, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 75 = *glandulifera*.

grandidentata, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 81; et in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 535, nomen. —Bolivia.

gratioloides, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238 = *S. Veroniceae*.

Haenkeana, DC. Prod. v. 122. —Mexic.

heptachaeta, DC. l. c. —Bras.

hirsuta, DC. l. c. 121. —Mexic.

hirsuta, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 239 = *satureiaefolia*.

hirtiflora, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 274. —Mexic.

hispidula, DC. Prod. v. 122. —Mexic.

hymenopappa, Moç. [& Sesse], ex DC. Prod. v. 117 = *lucida*.

hyptifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 434 = *collina*.

hyssopifolia, Cav. Desc. 190 = *S. Eupatoria*.

hyssopifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 140 = *laxiflora*.

hyssopifolia, Phil. Fl. Atac. 29. —Chili.

hyssopifolia, Sims, Bot. Mag. t. 1861 = *paniculata*.

imbricata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 458 = *Dissothrix Gardneri*.

incanescens, Lag. Gen. et Sp. Nov. 27 = *serrata*, microcephala, uniaristata.

involuta, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 211. —Bras.

ivaefolia, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 137. —Mexic.; N. Granat.

jorullensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 144. —Mexic.

Karwinskyana, Steud. Nom. ed. II. ii. 641. —Mexic.

lanceolata, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238 = *Gilliesii*.

lanceolata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 26. —Mexic.

lanceolata, Moç. [& Sesse], ex DC. Prod. v. 116 = *subpubescens*.

lanceolata, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 319 = *Karwinskyana*.

latifolia, Benth. Pl. Hartw. 40. —Mexic.

STEVIA:—

lavandulaefolia, Willd. ex DC. Prod. v. 125 = *Palafoxia linearis*.

laxa, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238 = *satureiaefolia*.

laxiflora, DC. Prod. v. 122. —Mexic.

Lemmoni, A. Gray, in Proc. A. Acad. xvii. (1882) 204. —Arizona.

leptophylla, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 205. —Bras.

leucantha, Schlecht. Hort. Hal. 16. —Mexic.

leuconeura, DC. Prod. v. 121. —Mexic.

Liebmannii, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 75. —Mexic.

linariaefolia, DC. Prod. v. 123 = *satureiaefolia*.

linearifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 641 = *praece*.

linearifolia, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 320. —Mexic.

linearis, Gill. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 208 = *satureiaefolia*.

linearis, Willd. Sp. Pl. iii. 1774 = *Palafoxia linearis*.

linoides, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 284. —Mexic.

longifolia, Moç. [& Sesse], ex DC. Prod. v. 118 = *viminca*.

longiseta, Moç. [& Sesse], l. c. 121 = *leuconeura*.

Lorentzii, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 164 (err. typ. 416). —Reg. Argent.

lucida, Lag. Gen. et Sp. Nov. 28. —Mexic.

Lundiana, DC. Prod. v. 122. —Bras.

macella, A. Gray, Pl. Wright. ii. 70 = *micrantha*.

Mandonii, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 81; et in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 535, nomen. —Bolivia.

megapotamica, DC. Prod. v. 123 = *satureiaefolia*.

melissaeifolia, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 291. —Peruv.

menthaefolia, Phil. Fl. Atac. 29. —Chili.

menthaefolia, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 282. —Bras.

micrantha, Lag. Elench. Hort. Matr. (1805); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 27. —Mexic.

microcephala, DC. Prod. v. 118. —Mexic.

microchaeta, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 291. —Mexic.

micropappa, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 81 = *grandidentata*.

microphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 140. —Mexic.

minor, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 166. —Reg. Argent.

molles, Schrad. ex DC. Prod. v. 120. —Hab.?

monardaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 147. —Mexic.

multiaristata, Spreng. Syst. iii. 449 = *satureiaefolia*.

multifida, [Moç. & Sesse], ex DC. Prod. v. 121 = *trifida*.

myriadenia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 206. —Bras.

nepetaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 146. —Am. austr.

nervosa, DC. Prod. v. 117. —Mexic.

nitida, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 320. —Mexic.

oaxacana, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 75 = *lucida*.

oligocephala, DC. Prod. v. 117. —Bras.

organensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 115. —Bras.

organifolia, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 321. —Mexic.

organoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 147. —Mexic.

ovata, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iv. 93 = *S. Eupatoria*, *salicifolia*.

ovata, Lag. Elench. Hort. Matr. (1805); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 27. —Mexic.

ovata, Rafin. New Fl. Am. iv. 73 (Quid?). —Am. bor.

oxylaena, DC. Prod. v. 123. —Bras.

pallida, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 206 = *collina*.

paniculata, Lag. Elench. Hort. Matr. (1805); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 27. —Mexic.

paniculigera, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 772; et ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 201 = *urticaefolia*.

pedata, Cav. Ic. iv. 33. t. 356 = *Florestina pedata*.

petiolata, Sch. Bip. in Linnaea, xxv. (1852) 291. —Peruv.

pilosa, Lag. Gen. et Sp. Nov. 26. —Mexic.

STEVIA:—

- Plumerae, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 204.—Arizona.
 podoccephala, *DC. Prod.* v. 121.—Mexic.
 podoccephala, *Schau. in Linnaea*, xix. (1847) 718 = *Aschenborniana*.
 Pohlana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 211.—Bras.
 polycephala, *Baker, l. c.* 207.—Bras.
 polycephala, *Bertol. Fl. Guatimal.* 32.—Guatemal.
 polyphylla, *DC. Prod.* v. 123.—Am. austr.
 puberula, *D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 238 = *Gilliesii*.
 puberula, *Hook. Misc. Bot.* ii. (1831) 225.—Peruv.
 pubescens, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 26.—Mexic.
 pubescens, *Moq. [& Sesse,] ex DC. Prod.* v. 119 = *nepetaeifolia*.
 punctata, *Pers. Syn.* ii. 403 = *S. Eupatoria*.
 punctata, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxv. (1852) 286 = *serrata*.
 purpurea, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 26 = *laxiflora*.
 purpurea, *Pers. Syn.* ii. 402.—Mexic.
 pyrolaeifolia, *Schlecht. in Linnaea*, xvi. (1842) 326.—Mexic.
 quitensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 145.—Ecuador.
 ranunculoides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 89 = *seq.*
 rapunculoides, *DC. Prod.* v. 124.—Mexic.
 reglensis, *Benth. Pl. Hartw.* 40.—Mexic.
 Regnellii, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxii. (1849) 572; xxv. (1852) 272 = *S. Veronicae*.
 resinosa, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 457.—Bras.
 rhombifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 143.—Mexic.
 Riedelii, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 204.—Bras.
 salicifolia, *Cav. Ic.* iv. 32. t. 354.—Mexic.
 salviaeifolia, *Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 335 (Quid?).—Mexic.
 satireaeifolia, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxv. (1852) 291.—Bras.
 satireifolia, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* vi. (1802) 317 = *Mikania amara*.
 scabrella, *Benth. Pl. Hartw.* 19.—Mexic.
 Seemannii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald.* 298.—Mexic.
 Selloi, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 209 = *oxylaena*.
 semperflorens, *Tenore, ex DC. Prod.* v. 117 = *salicifolia*.
 sempervirens, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 641, sphalm. = *prae.*
 serrata, *Cav. Ic.* iv. 33. t. 355.—Am. austr.
 sphacelata, *Nutt. ex Torr. in Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 214 = *Polypteris Hookeriana*.
 stenoccephala, *Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 81 = *grandidentata*.
 stenophylla, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 25.—Mexic.
 stricta, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 792 = *purpurea*.
 suaveolens, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 27 = *nepetaeifolia*.
 subhirsuta, *Lag. ex Reichb. Ic. Bot. Exot.* ii. 33. t. 188 = *purpurea*?
 suboctoaristata, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 27.—Peruv.
 subpubescens, *Lag. l. c.* 28.—Mexic.
 tenella, *Moq. [& Sesse,] ex DC. Prod.* v. 121 = *micrantha*.
 tenuifolia, *D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 238 = *satireaeifolia*.
 tenuifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 397; *et in Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 128.—Chili.
 tenuis, *Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 239 = *S. Veronicae*.
 ternifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 146.—Mexic.
 tomentosa, *H. B. & K. l. c.* 145.—Mexic.
 tomentosa, *Schau. in Linnaea*, xix. (1847) 719 = *nepetaeifolia*.
 trachelioides, *DC. Prod.* v. 115.—Mexic.
 trachelioides, *Hook. Bot. Mag.* t. 3856 = *glandulifera*.
 trichopoda, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* iv. (1849) 64.—Mexic.
 trifida, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 27.—Mexic.
 triflora, *DC. Prod.* v. 115.—Mexic.
 umbellata, *Alam. ex DC. l. c.* 118 = *viminea*.
 uniaristata, *DC. l. c.* 120.—Mexic.

STEVIA:—

- urticaefolia, *Thunb. Pl. Bras. Dec.* i. 13.—Bras.
 vaga, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 165.—Reg. Argent.
 Veronicae, *DC. Prod.* v. 123.—Bras.
 verticillata, *Schlecht. in Linnaea*, xvi. (1842) 372.—Bras.
 vigintisetata, *DC. Prod.* v. 123.—Mexic.
 villosa, *Moq. [& Sesse,] ex DC. l. c.* 122 = *viscida*.
 viminea, *Schrad. Hort. Gotting.* (1832); *DC. l. c.* 117.—Mexic.
 violacea, *Cerv. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 675 (Quid?).—Mexic.
 virgata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 142 = *serrata*.
 viscida, *H. B. & K. l. c.* 140.—Mexic.
 viscosa, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 642 = *viscida*.
 STEVOGTIA, *Neck. Elem.* ii. 23 (1790) = **Convolvulus**, *Tourn.*
 platycarpus, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 70 = *Phacelia platycarpa*.
 STEWARTIA, *Linn. in Act. Soc. Upsal.* (1741) 79, sphalm. = *Stuartia*, *Linn. (Temstr.)*.
 STHAELINA, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 24 (1816), *err. typ.* = *Stachelina*, *Linn. (Compos.)*.
 STIBADOTHECA, *Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.* 1854 (1855), 128. t. 12 A = *Begonia*, *Tourn.*
 ferruginea, *Klotzsch, l. c.* 130 = *B. ferruginea*.
 magnifica, *Klotzsch, l. c.* 129 = *B. ferruginea*.
 trachyptera, *Klotzsch, l. c.* 131 = *B. trachyptera*.
 Urticae, *Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod.* xvi. i. 274 = *B. trachyptera*.
 STIBAS, *Comm. ex DC. Prod.* vii. 338 (1839) = **Levenhookia**, *R. Br. (Campan.)*.
 STICHONEURON, *Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 747 (1883). **ROXBURGHACEAE**, *Benth. & Hook. f. l. c.*
 membranaceum, *Hook. f. & Thoms. (in Herb. Kew.)*.—Ind. or.
 STICHOPHYLLUM, *Phil. Fl. Atac.* 19. t. 1 D (1860) = **Pycnophyllum**, *Remy (Caryophyll.)*.
 bryoides, *Phil. l. c.* = *P. bryoides*.
 STICHORCHIS, *Thou. Orch. Isles Austr. Afr. Tabl.* 1^{er} (1822) = **Liparis**, *Rich. (Orchid.)*.
 STICKMANNIA, *Neck. Elem.* iii. 171 (1790) = **Dichorisandra**, *Mikan (Commel.)*.
 africana, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 69 = *Commelina africana*.
 guyanensis, *Rafin. l. c.* = *Commelina nudiflora*.
 longicollis, *Rafin. l. c.* = *Commelina nudiflora*.
 mollis, *Rafin. l. c.* = *D. villosula*.
 STICTOPHYLLUM, *Edgew. in Proc. Linn. Soc. i.* (1845) 253; *et in Trans. Linn. Soc. xx.* (1846) 78 = **Tricholepis**, *DC. (Compos.)*.
 glabrum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx.* (1846) 78 = *T. Stictophyllum*.
 STIEFIA, *Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek.* Ges. i. (1791) 200; *Phil. Bot.* ii. 40 (1791) = **Salvia**, *Tourn. (Labi.)*.
 STIFFTIA, *Mikan, Del. Bras.* i. 1. t. 1 (1820). **COMPOSITAE**, *Benth. & Hook. f. ii.* 491.
 ARISTOMENIA, *Vell. Fl. Flum.* 345 (1825).
 AUGUSTA, *Leandr. in Denkschr. Akad. Muench.* vii. (1819) 235. t. 14.
 GONGYLOLEPIS, *Schomb. in Linnaea*, xx. (1847) 759.
 MOCINIA, *DC. Prod.* vii. 26 (1838).
 SANHILARIA, *Leandr. ex DC. l. c.* (1838).
 Benthamiana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 352.—Guian.
 chrysantha, *Mikan, Del. Bras.* i. 1. t. 1.—Bras.
 condensata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 351.—Guian.
 insignis, *Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov.* 135 = *chrysantha*?
 Martiana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 351.—Bras.
 parviflora, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1833) 291.—Bras.

STIFTIA, *Cass. in Dict. Sc. Nat.* xlvii. 499, 511 (1827), sphalm. = *prae.*

STIFTIA, *Pohl, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 70 (1847) = **Ebermaiera**, *Nees (Acanth.)*.
 elegans, *Pohl, ex Nees, l. c.* 72 = *E. elegans*.

STIGMANTHUS, *Lour. Fl. Cochinch.* 146 (1790).
 Genus dubium **RUBIACEARUM**.—Cf. *Benth. & Hook. f. ii.* 29.

STIGMATANTHUS, *Roem. & Schult. Syst.* v. p. xv. 225 (1819).
 cymosus, *Lour. Fl. Cochinch.* 146.—Cochinch.

STIGMAPHYLLON, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 48. tt. 170, 171 (1832). **MALPIGHIACEAE**, *Benth. & Hook. f. i.* 257.

acuminatum, *A. Juss. l. c.* 58.—Bras.
 adenodon, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 360.—Ind. occ.

affine, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 57.—Bras.

alternans, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 316.—N. Granat.

alternifolium, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 54 = *tomentosum*.

angulosum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 362.—Ind. occ.

angustifolium, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. 41 = *seq.*

angustilobum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 53.—Bras.

anomalum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 363 = *urenaefolium*.

aristatum, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1659.—Am. austr.

auriculatum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 48.—Bras.

bogotense, *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 320.—N. Granat.

brachiatum, *Planch. & Triana, l. c.* 316.—N. Granat.

cardiophyllum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 374.—Bras.

ciliatum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 49.—Bras.

convolvulaefolium, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 372.—Guian.

dichotomum, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 207 = *rotundifolium*.

diversifolium, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 381.—Ind. occ.

echitoides, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 318.—N. Granat.

ellipticum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 377.—Mexic.

emarginatum, *A. Juss. l. c.* 382.—Ind. occ.

Faustinum, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 16.—Cuba.

Finlayianum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 373.—Ind. occ.

fulgens, *A. Juss. l. c.* 370.—Guian.

Gaudichaudianum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 50 = *vitifolium*.

Gayanum, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 211 = *affine*.

Gayanum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 56.—Bras.

hastatum, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 208 = *affine*.

heterophyllum, *Hook. Bot. Mag.* t. 4014.—Reg. Argent.

Humboldtianum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 56 = *tomentosum*.

Humboldtianum, *Seem. Bot. Voy. Herald.* 91 = *retusum*.

hypargyreum, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 318.—Panama.

hypoleucum, *Miq. in Linnaea*, xviii. (1844) 51.—Guian.

ipomoeoides, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 317.—N. Granat.

irregularis, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 366 = *affine*.

jatrophaefolium, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 51.—Bras.

lacunosum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 370 = *puberulum*.

Lalandianum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 58; *et l. c.* 381 = *acuminatum*.

latifolium, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 128.—Guian.

STIGMAPHYLLON:—

- Lindenianum*, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 362.—Mexico.
lineare, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 43.—Cuba.
littorale, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 55.—Bras.
macropodium, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 369 = *tomentosum*.
malpighioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 582.—Mexico.
Martianum, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 371.—Bras.
megacarpum, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 209 = *tomentosum*.
microphyllum, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 168.—Cuba.
mucronatum, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 377 = *ellipticum*.
multilobum, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 433.—Bras.
obtusum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 582.—Cuba.
palmatum, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 362.—Ind. occ.
Paralias, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 59 = *Brachypterys australis*.
periplocaefolium, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 380.—Ind. occ.
puberulum, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 205.—Bras.
puberum, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 376.—Ind. occ.
purpureum, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 128 = *fulgens*.
repandum, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 202.—Bras.
reticulatum, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 378.—Cuba.
retusum, Griseb. & Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 45.—Panama.
rhombifolium, Wright, in Sawv. Fl. Cub. 17.—Cuba.
Richardianum, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 372.—Guian.
rotundifolium, A. Juss. l. c. 373.—Am. austr.
sagittatum, A. Juss. l. c. 362.—Ind. occ.
Sagraeanum, A. Juss. l. c. 379.—Cuba.
Saltzmännii, A. Juss. l. c. 365.—Am. austr.
sericeum, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 43 = *diversifolium*.
sinuatum, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 361.—Guian.
strigosum, A. Juss. l. c. 368.—Peruv.
ternatum, A. Juss. l. c. 376 = *ellipticum*.
tomentosum, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 53.—Bras.
umbellatum, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 642 (Quid ?).—Bras.
urenaefolium, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 52.—Bras.
velutinum, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 320.—N. Granat.
vitifolium, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 50.—Bras.

STIGMAROSA, Hook. f. & Thoms. in Fl. Brit. Ind. i. 193 (1872), sphalm. = seq.

STIGMAROTA, Lour. Fl. Cochinch. 633 (1790) = *Flacourtia*, Comm. (Bixin.).
africana, Lour. l. c. = F. Ramontchi.
edulis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 560 = F. sepiaria.
Jangomas, Lour. Fl. Cochinch. 634 = F. cataphracta.

STIGMATANTHUS, Roem. & Schult. Syst. v. p. xv. 220 (1819) = *Stigmanthus*, Lour. (Rubiace.).

STIGMATOCOCCA, Willd. ex Schult. Mant. iii. 3, 55 (1827). *INCERT. SEDIS*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. ii. 888.
solanacea, Willd. l. c.—Bras.

STIGMATOPHYLLON, Meissn. Gen. 55 (1837) = *Stigmaphyllon*, A. Juss. (Malpig.).

STIGMATOPHYLLUM, Spach, Hist. Vég. Phan. iii. 153 (1834) = praec.

STIGMATOTHECA, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 255 (1836-46) = *Chrysanthemum*, Tourn. (Compos.).
lacera, Sch. Bip. l. c. 257 = C. Broussonetii.
pinnatifida, Sch. Bip. l. c. 255 = C. piunatifidum.

STILAGINELLA, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 240 = *Hyeronima*, Allem. (Euphorb.).
amazonica, Tul. l. c. 241 = H. alchorneoides.
Benthamii, Tul. l. c. 247 = H. oblonga.
Blanchetiana, Tul. l. c. 249 = H. Blanchetiana.
clusioides, Tul. l. c. 245 = H. clusioides.
ferruginea, Tul. l. c. 250 = H. ferruginea.
laxiflora, Tul. l. c. 244 = H. laxiflora.
oblonga, Tul. l. c. 248 = H. oblonga.
scabrida, Tul. l. c. 242 = H. scabrida.

STILAGO, Linn. Mant. i. 16 (1767) = *Antidesma*, Burm. (Euphorb.).
Bunius, Linn. l. c. 122 = A. Bunius.
diandra, Roxb. Pl. Corom. ii. t. 166 = A. diandrum.
lanceolaria, Roxb. Hort. Beng. 71; Fl. Ind. iii. 760 = A. diandrum.
tomentosa, Roxb. ll. cc. 71; 757 = A. Roxburghii.

STILBANTHUS, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1286 (1879). *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 35.
scandens, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1286.—Reg. Himal.

STILBE, Berg. Desc. Pl. Cap. 30. t. 4 (1767). *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1138.
LUEHEA, F. W. Schmidt, Neue u. Selt. Pfl. 23 (1793).
albiflora, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 279.—Afr. austr.
cernua, Linn. f. Suppl. 441 = *Campylostachys cernua*.
ericoides, Lam. ex Poir. Encyc. Suppl. v. 251 = *albiflora*.
ericoides, Linn. Mant. ii. 305; Thunb. Prod. Pl. Cap. 29.—Afr. austr.
myrtifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 252 = *Lonchostoma obtusiflorum*.
phylicoides, A. DC. in DC. Prod. xii. 606.—Afr. austr.
phylicoides, Licht. ex Walp. Rep. iv. 173 (Quid ?).—Hab. ?
pinastria, Linn. Mant. ii. 305 = *vestita*.
procumbens, Spreng. Syst. i. 418 = *Cephalanthus procumbens*.
serrulata, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 229 = *Eurylobium serrulatum*.
vestita, Berg. Desc. Pl. Cap. 30.—Afr. austr.
virgata, Poir. Encyc. Suppl. v. 252 = *ericoides*.

STILBOCARPA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 714 (1854). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 935.

STYLBOCARPA, Decne. & Planch. in Rev. Hort. (1854) 105, sphalm.
Lyallii, Armst. in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 336.—N. Zel.
polaris, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 714.—N. Zel.

STILINGIA, Rafin. Atl. Journ. 146 (1832), sphalm. = *Stillingia*, Linn. (Euphorb.).

STILLENGIA, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 151 (1848), sphalm. = praec.

STILLINGFLEETIA, Boj. Hort. Maurit. 284 (1837) = *Sapium*, P. Br. (Euphorb.).
sebifera, Boj. l. c. = *Sapium sebiferum*.

STILLINGIA, Linn. Mant. i. 19 (1767). *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 334.
DITRISYNA, Rafin. Sylva Tellur. 64 (1838).
GYMNOSTILLINGIA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 89.
SEBORIUM, Rafin. Sylva Tellur. 63 (1838).
acutifolia, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 135.—Mexico.
africana, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 163 = *Excoecaria africana*.
Agallocha, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1220 = *Excoecaria Agallocha*.
angustifolia, Engl. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 154.—Texas.

STILLINGIA:—

- annua*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1160.—Mexico.
appendiculata, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 87.—Mexico.
aquatica, Chapm. Fl. S. U. St. 405.—Florida.
asperococca, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1175 = *Sebastiania Chamaelea*.
aucuparia, Muell. Arg. l. c. 1161, 1206 = *Sapium Aucuparium*.
baccata, Muell. Arg. l. c. 1161, 1211 = *Sapium baccatum*.
bahiensis, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 329 = *Sebastiania bahiensis*.
bidentata, Baill. l. c. 324 = *Sebastiania virgata*.
biglandulosa, Baill. l. c. 320 = *Sapium Aucuparium*.
bingyrica, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1216 = *Sapium indicum*.
brasiliensis, Muell. Arg. l. c. 1161, 1191 = *Maprounea brasiliensis*.
brevifolia, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 328 = *Sebastiania brevifolia*.
campestris, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1169 = *Sebastiania corniculata*.
Chamaelea, Muell. Arg. l. c. 1161, 1175 = *Sebastiania Chamaelea*.
cochinchinensis, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 351 = *Excoecaria Loureiroana*.
Commersoniana, Baill. l. c. v. (1864-65) 330 = *Gymnanthes marginata*.
concolor, Baill. l. c. 327 = *Actinostemon caribaeus*.
coriacea, Baill. l. c. 323 = *Sebastiania marginata*.
corniculata, Baill. Etud. Gén. Euph. Atlas, 17 = *Sebastiania corniculata*.
cremostachys, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 322 = *Sapium Aucuparium*.
crotonoides, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1171 = *Sebastiania corniculata*.
cubana, Muell. Arg. l. c. 1161, 1212 = *Excoecaria cubensis*.
daphniphylla, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 326 = *Sebastiania daphniphylla*.
desertorum, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen = *Sebastiania brasiliensis*.
dichotoma, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 88.—Bras.
discolor, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 1 = *Sapium discolor*.
discolor, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1885 = *Sebastiania discolor*.
diversifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 461 = *Excoecaria diversifolia*.
dracunculoides, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 321 = *Sapium Aucuparium*.
eglandulosa, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 202 = *Bonania adenodon*.
elliptica, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 162.—Afr. austr.
frutescens, Bosc, ex Steud. Nom. ed. I. 815 = seq.
fruticosa, Spreng. Syst. iii. 805 = *Sebastiania ligustrina*.
Gaudichaudii, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 332 = *Sebastiania Gaudichaudii*.
glabrata, Baill. Etud. Gén. Euph. Atlas, 17 = *Sebastiania multiramea*.
glandulosa, Domb. ex Baill. l. c. = *Adenopeltis Colliguaya*.
Goudotiana, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 30 = *Excoecaria Goudotiana*.
guineensis, Benth. in Hook. Niger Fl. 501 = *Excoecaria guineensis*.
guyanensis, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 332 = *Maprounea guianensis*.
hastata, Baill. l. c. 325 = *Sebastiania ditassoides*.
heterodoxa, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 89.—Bras.
Hilariana, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 332 = *Maprounea brasiliensis*.
himalayensis, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 116 = *Sapium indicum*, *Excoecaria acerifolia*.
Hippomane, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1204 = *Sapium Aucuparium*.
hypoleuca, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 330 = *Gymnanthes hypoleuca*.
indica, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1161, 1216 = *Sapium indicum*.
integerrima, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 162.—Afr. austr.

STILLINGIA :—

- jacobinensis*, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 329 = Sebastiania jacobinensis.
japonica, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1846) 145 = Excoecaria japonica.
lanceolaria, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 461 = Excoecaria lanceolaria.
lanceolata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 176.—Am. bor.
Lastellei, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162, 1218 = Excoecaria Lastellei.
Laureola, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 327 = Sebastiania Laureola.
laurifolia, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 201 = Sapium Laurocerasum.
Laurocerasus, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 351 = Sapium Laurocerasum.
ligustrina, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 213 = Sebastiania ligustrina.
linearifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 297.—Calif.
lineata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1157.—Ind. Maurit.
Luschnathiana, Muell. Arg. l. c. 1162, 1177 = Sebastiania multiramea.
macrantha, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 135.—Mexic.
madagascariensis, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 30 = Excoecaria madagascariensis.
marginata, Baill. l. c. v. (1864-65) 321 = Sapium marginatum.
mauritanica, Baill. l. c. ii. (1861-62) 27 = obtusifolia.
melanosticta, Baill. l. c. i. (1860-61) 285.—Madag.
multiramea, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162, 1179 = Sebastiania multiramea.
myrtilloides, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 323 = Sebastiania daphnoides.
nervosa, Baill. l. c. 328 = Sebastiania nervosa.
nutans, Geisel. Crot. Monog. 80 = Homalanthus nutans.
nutans, Vahl, ex Spreng. Syst. iii. 805.—Ins. Amicor.
obovata, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 321 = Sapium obovatum.
obtusifolia, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1157 = lineata.
oppositifolia, Baill. Etud. Gén. Euph. Atlas, 13.—Bras.
oppositifolia, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162, 1219 = Excoecaria crenulata.
pachystachys, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 102 = Sebastiania pachystachys.
pacifica, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1156.—Ins. Fiji.
paniculata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 461 = Sapium baccatum.
patula, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162, 1172 = Sebastiania corniculata.
paucidentata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 298.—Am. bor.
phyllanthiformis, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 331 = Sebastiania Schottiana.
populnea, Geisl. Crot. Monog. 80 = Homalanthus Leschenaultianus.
prostrata, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 324 = Sebastiania corniculata.
prunifolia, Baill. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162 = Sapium Aucuparium.
pteroclada, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 329 = Sebastiania pteroclada.
ramosissima, Baill. l. c. 328 = Sebastiania brasiliensis.
rigida, Baill. l. c. 330 = Sebastiania rigida.
salicifolia, Klotzsch, ex Baill. Adansonia, v. (1864-65) 320 = Sapium Aucuparium.
salicifolia, Rafin. Atl. Journ. 146 (Quid ?).—Am. bor.
sanguinolenta, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 88.—Mexic.
saxatilis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 539.—Bras.
Schottiana, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 331 = Sebastiania Schottiana.
sebifera, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 213 = Sapium sebiferum.
Sellowiana, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162, 1169 = Sebastiania corniculata.
serrata, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 329 = Sebastiania serrata.
serrulata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162, 1167 = Sebastiania serrulata.
sinensis, Muell. Arg. l. c. 1162, 1210 = Sapium sebiferum.

STILLINGIA :—

- spinulosa*, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 151.—Am. bor.
stipulacea, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 325 = Sebastiania stipulacea.
sylvatica, Linn. Mant. i. 126.—Am. bor.
tanguinia, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 28 = lineata.
terminalis, Baill. l. c. 29.—Madag.
Thuarsiana, Baill. l. c. 28.—Afr. trop.
Torreyana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 298 = Sebastiania Treculiana ?
trinervia, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 328 = Sebastiania trinervia.
velutina, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1162, 1168 = Sebastiania corniculata.
virgata, Muell. Arg. l. c. 1162, 1216 (= Excoecaria virgata).—Java.
Weddelliana, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 329 = Sebastiania Weddelliana.
Widgreni, Baill. l. c. 326 = Sebastiania Widgreni.
ypanemensis, Baill. l. c. 330 = Sebastiania ypanemensis.
zelayensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 87.—Mexic.

STILPNOGYNE, DC. Prod. vi. 293 (1837). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 444.
bellidioides, DC. l. c. ; et in Deless. Ic. Sel. iv. 24. t. 54 (1839).—Afr. austr.

- STILPNOPAPPUS**, Mart. ex DC. Prod. v. 75 (1836). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 232.
Lasiocarpus, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 138 (1873).
Strophopappus, DC. Prod. v. 75 (1836).
Xiphochaeta, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 44. t. 250 (1842).
agrestis, Gardn. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 136 = pratensis.
bicolor, Mart. ex Baker, l. c. 140.—Bras.
dentatus, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 229 = pratensis.
emarginatus, Gardn. l. c. vi. (1847) 424.—Bras.
ferrugineus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 138.—Bras.
glomeratus, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 423.—Bras.
patulus, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 109.—Bras.
Pohlui, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 139.—Bras.
pratensis, Mart. ex DC. Prod. v. 76.—Bras.
procumbens, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 229.—Bras.
Regnellii, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 139.—Bras.
Riedelianus, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 424.—Bras.
rufulus, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 138 = patulus.
scaposus, DC. Prod. v. 76.—Bras.
speciosus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 138 = patulus.
suffruticosus, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 228.—Bras.
tomentosus, Gardn. l. c. 230 = pratensis.
tomentosus, Mart. ex DC. Prod. v. 76.—Bras.
trichospiroides, Mart. l. c.—Bras.
villosus, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 140.—Bras.
viridis, Benth. ex Baker, l. c. 137.—Bras.

STILPNOPHYLLUM, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1147 (1873). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 33.
lineatum, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1147.—Peruv.**STILPNOPHYTUM**, Less. Syn. Comp. 264 (1832). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 433.
axillare, Less. l. c.—Afr. austr.
linifolium, Less. l. c.—Afr. austr.
longifolium, Less. l. c. = linifolium.
ocephalum, DC. Prod. vi. 93.—Afr. austr.**TIMEGAS**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 45 (1836) = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).
venustum, Rafin. l. c. 46 = C. venustum.**STIMENES**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 76 (1836) = **Nierembergia**, Ruiz & Pav. (Solanac.).
gracilis, Rafin. l. c. = N. gracilis.**STIMOMPHIS**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 76 (1836) = **Salpiglossis**, Ruiz & Pav. (Solanac.).
linearis, Rafin. l. c. = Sal. linearis.**STIMORYNE**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 76 (1836) = **Petunia**, Juss. (Solanac.).
purpurea, Rafin. l. c. = P. violacea.**STIMPSONIA**, Wright, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 401, in Adnot. **PRIMULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 633.
chamaedryoides, Wright, ex Gray, l. c.—Ins. Luchu.
crispidens, Hance, in Journ. Bot. xviii. (1880) 234 (Lysimachia sp.).—China.**STIPA**, Linn. Sp. Pl. ed. II. 78 (1753). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1141.

- ACHNATHERUM*, Beauv. Agrost. 19. t. 6. f. 7 (1812).
ARISTELLA, Bertol. Fl. Ital. i. 690 (1833).
JARAVA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 2. t. 1 (1794).
LASIAGROSTIS, Link. Hort. Berol. i. 99 (1827).
LASINGROSTIS, Schur, Enum. Pl. Transs. 741 (1866).
MACROCHLOA, Kunth, Rév. Gram. i. 58 (1830).
ORTHORAPHIUM, Nees, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 94.
PODOPOGON, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
PTILAGROSTIS, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 447 (1853).
STREPTACHNE, R. Br. Prod. 174 (1810).
TRICHOSATHERA, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789).
africana, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3.—Afr. austr.
alpestris, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 642 = Muehlenbergia alpestris.
altaica, Trin. ex Ledeb. Fl. Alt. i. 80 = splendens.
amethystina, Steud. Syn. Pl. Gram. 124.—Chili.
angulata, Steud. Nom. ed. II. ii. 642 = Zizania aquatica.
aperta, Janka, ex Čelak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 319 = pennata.
appendiculata, Čelak. l. c. = pennata.
arabica, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 77 = barbata.
arenaria, Brot. Fl. Lusit. i. 86 = gigantea, Link.
arguens, Linn. Sp. Pl. ed. II. 117 = Anthistiria arguens.
arguens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 20 = Anthistiria imberbis.
Aristella, Gouan, Illustr. 4 = S. Calamagrostis.
Aristella, Linn. Syst. ed. XII. iii. App. 229.—Reg. Mediterr. ; As. Min.
aristiglumis, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 43.—Austral.
arundinacea, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 81.—N. Zel.
australis, Steud. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 55 ; Syn. Pl. Gram. 132.—Java.
avenacea, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 403 = setigera.
avenacea, Linn. Sp. Pl. 78.—Am. bor.
avenacea, Spreng. ex Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 40 = hyalina.
avenacea, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = virescens.
barbata, Desf. Fl. Atlant. i. 97. t. 27.—Reg. Mediterr.
barbata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 53 = avenacea.
bella, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 45 = Neaei.
Bergeri, Link. in Linnaea, ix. (1834) 135 = parviflora.
Bertrandi, Phil. l. c. xxxiii. (1864-65) 283.—Chili.
bicolor, Cav. Ic. v. 42. t. 466. f. 2 = Neesiana.
bicolor, Nees, Agrost. Bras. 373, partim = Oryzopsis setacea.
bicolor, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 73 = avenacea.
bicolor, Vahl, Symb. Bot. ii. 24.—Bras. ; Chili.
Bloomeri, Boland. in Proc. Calif. Acad. iv. (1870) 168 = sibirica.
brachychaeta, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 450.—Hab. ?
brevicalyx, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 538 = Oryzopsis Fournieriana.
breviflora, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 82.—Tibet.
brevipes, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 282.—Chili.
Bungeana, Trin. ex Bunge in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 144.—China ; Mongol.

STIPA:—

caerulescens, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 449 = *Oryzopsis caerulescens*.
caespitosa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = *Aristida jorullensis*.
Calamagrostis, *Wahlenb. Veg. Helv.* 23.—Europ. austr.
calatajeronensis, Tineo, ex Arcang. Comp. Fl. Ital. 772 = barbata.
campylachne, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 99 = semi-barbata.
canadensis, Poir. Encyc. vii. 452 = *Oryzopsis parviflora*.
capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 19 = tortilis?
capillaris, Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 350 = capillata.
capillaris, Lam. Illustr. i. 158 = *Muehlenbergia capillaris*.
capillata, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 237 = comata.
capillata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 116.—Europ. austr.; As. bor.
Caragana, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 74 = Redowskii.
caspia, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 440 = barbata.
caudata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 75.—Chili.
chapulcensis, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 536.—Mexic.
chrysophylla, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 278. t. 76. f. 2.—Am. bor. occ.; Chili.
ciliata, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 342.—Texas.
cirrosa, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 536.—Mexic.
Clarazii, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 237.—Patagon.
coerulea, J. Presl. in Rel. Haenk. i. 227.—Mexic.
coleotricha, Steud. Syn. Pl. Gram. 125.—Mexic.
comata, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 75.—Am. bor.
commutata, Trin. & Rupr. l. c. 49 = pubescens.
compressa, R. Br. Prod. 175.—Austral.
conferta, Poir. Encyc. Suppl. v. 252 = Redowskii.
consanguinea, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 78 = Richteriana.
contracta, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 285.—Chili.
contracta, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = *Muehlenbergia glabrata*.
coronata, Thurb. ex S. Wats. in Bot. Calif. ii. 287.—Calif.
crinita, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 407 = flavescens?
Cumingiana, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 67.—Chili.
damascena, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 45 = barbata.
dasyphylla, Czern. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 350, nomen = pennata.
Delilei, Steud. Syn. Pl. Gram. 126 = papposa.
demissa, Steud. l. c. 130.—Am. bor.
Dichelachne, Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = *Dichelachne sciurea*.
diffusa, Walt. Fl. Carol. 78 = *Muehlenbergia capillaris*.
diffusa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = *avenacea*.
Dregeana, Steud. Syn. Pl. Gram. 132.—Afr. austr.
Drummondii, Steud. l. c. 128.—Austral.
duriuscula, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 282.—Chili.
editorum, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 536.—Mexic.
Ehrenbergiana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 75 = barbata.
elegantissima, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 23. t. 29.—Austral.
elongata, Roth, in Usteri, Ann. Bot. xiv. (1795) 22.—Peruv.
elongata, Steud. Syn. Pl. Gram. 132.—Afr. austr.
eminens, Cav. Ic. v. 42. t. 467. f. 1.—Am. bor. et austr.
eminens, Nees, Agrost. Bras. 374 = setigera.
erecta, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 536.—Mexic.
erecta, Hort. Madr. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 81 = capillata.
eriocaulis, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 401.—Europ. austr.

STIPA:—

eripus, Benth. Fl. Austral. vii. 570.—Austral.
eristachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 127. t. 41 = S. Jarava.
expansa, Poir. Encyc. vii. 453 = *Cinna arundinacea*.
expansa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = *Gymnopogon racemosus*.
fernandeziana, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 560.—Chili.
fernandeziana, Steud. Syn. Pl. Gram. 124 = bicolor.
filiculmis, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1849) 7.—Hab.?
filifolia, Nees, Agrost. Bras. 379.—Reg. Argent.
filiformis, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = mongolica.
fimbriata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 126 = *Oryzopsis fimbriata*.
flavescens, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 24. t. 30.—Austral.
flavescens, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 99 = scabra.
Fontanesii, Parl. Fl. Ital. i. 167, in obs. = gigantea.
formicarum, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1849) 7.—Hab.?
frigida, Phil. Fl. Atac. 54.—Chili.
gallica, Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 317 = pennata.
geniculata, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 46.—Chili.
gigantea, Lag. Gen. et Sp. Nov. 3.—Reg. Mediterr. occ.
gigantea, Ledeb. Fl. Ross. iv. 448 = *Lagascas*.
gigantea, Link. in Schrad. Journ. ii. (1799) 313.—Lusitan.
Graftana, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) 11. 116 = pennata.
Grisebachii, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 537.—Mexic.
gynerioides, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1870) 103; ex Hemsl. l. c. = S. Jarava.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient. v. 501.—Persia.
hemipogon, Benth. Fl. Austral. vii. 569.—Austral.
heterophylla, Willd. ex Nees, Agrost. Bras. 373 = fimbriata.
hirta, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 283.—Chili.
hispanica, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 77 = barbata.
Hohenackeriana, Trin. & Rupr. l. c. 80 = barbata.
holosericea, Trin. l. c. Sér. VI. i. (1831) 81 = *Lagascas*.
humilis, Brot. Fl. Lusit. i. 86 = tortilis.
humilis, Cav. Ic. v. 41. t. 466. f. 1.—Am. austr.
hyalina, Nees, Agrost. Bras. 378.—Reg. Argent.
hymenoides, Roem. & Schult. Syst. ii. 339 = *Oryzopsis cuspidata*.
ibarrensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 125.—Ecuador.
Ichu, Kunth, Rév. Gram. i. 60 = S. Jarava.
inconspicua, J. Presl. in Rel. Haenk. i. 227 (= *Urachne Haenkeana*).—Peruv.
inebrians, Nance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 212.—China.
intermedia, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 26.—Bras.
intricata, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 449.—Hab.?
Jacquemontii, Faub. & Spach, Illustr. iv. 60.—Reg. Himal.
Jarava, Beauv. Agrost. 19. t. 6. f. 3.—Mexic.
juncea, Cav. Desc. 39 = gigantea, Lag.
juncea, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 631 = parviflora.
juncea, Lam. Illustr. i. 157 = capillata.
juncea, Linn. Sp. Pl. 78.—Reg. Mediterr.
juncea, Michx. Fl. Bor. Am. i. 54 = *Oryzopsis parviflora*.
juncea, Nutt. Gen. Am. i. 58 = comata.
juncea, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 72 = spartea.
juncea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 67. t. 85 = *Lagascas*.
Kingii, Boland. in Proc. Calif. Acad. iv. (1870) 170.—Calif.
koleotricha, Steud. Syn. Pl. Gram. 125.—Mexic.
Kotschyana, Hochst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 448 = *Lagascas*.
lachnophylla, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 67 (= *Urachne megalantha*).—Chili.
laeviculmis, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 99.—Tasman.
Lagascas, Guss. Pl. Rar. 48 = gigantea, Link.
Lagascas, Roem. & Schult. Syst. ii. 333.—Reg. Mediterr.; Oriens.

STIPA:—

latifolia, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 449 = *Olyra latifolia*.
laxa, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 283.—Chili.
laxa, Portenschl. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 132 = *elongata*, Steud.
Lechleriana, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56.—Peruv.
leiocarpa, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 124.—Chili.
leptostachya, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 299.—Reg. Argent.
Lessingiana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 79 = pennata?
leucogluma, Steud. Syn. Pl. Gram. 420.—Chili.
leucotricha, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 54 = setigera.
Liebmanni, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 537.—Mexic.
linearifolia, Fourn. ex Hemsl. l. c.—Mexic.
littorea, Burm. f. Fl. Ind. 29 = *Spinifex squarrosus*.
longearistata, Steud. Syn. Pl. Gram. 127.—Austral.
longiflora, Steud. l. c. 124.—Chili.
longiglumis, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 286.—Chili.
Lorentziana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 298.—Reg. Argent.
madagascariensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 300.—Madag.
manicata, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 288.—Chili.
megalantha, Steud. Syn. Pl. Gram. 124.—Chili.
megapotamica, Spreng. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 77.—Bras.
melanocarpa, Muhl. Desc. Gram. 183 = *Heteropogon acuminatus*.
melanosperma, J. Presl. in Rel. Haenk. i. 226.—Hab.?
membranacea, Linn. Sp. Pl. 560 = *Festuca bromoides*.
membranacea, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 728 = *Oryzopsis cuspidata*.
Meyeriana, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 78 = barbata.
micrantha, Cav. Ic. v. 42; R. Br. Prod. 175.—Austral.
micrantha, Nees, ex Hook. f. Handb. Fl. N. Zel. 326 = *Dichalachne sciurea*.
micrantha, Sieber, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 74 = ramosissima.
microsperma, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = *Andropogon stipoides*.
mollis, R. Br. Prod. 174 = semibarbata.
mongolica, Turcz. ex Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 67.—Sibir. baical.; Am. bor. occ.
mucronata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 125.—Mexic.
Muelleri, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. vii. (1885) 70.—Austral.
Neaci, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 126.—Patagon.
Neesiana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 27 = setigera.
nitens, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 712.—Maroc.
nivalis, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56.—Peruv.
Nuttalliana, Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = viridula.
occidentalis, Boland. in Proc. Calif. Acad. iv. (1870) 169, partim = comata.
occidentalis, Thurb. ex S. Wats. in Bot. King's Exp. 380.—Am. bor. occ.
orientalis, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 14 = barbata.
orientalis, Trin. ex Ledeb. Fl. Alt. i. 83.—As. bor.
Orthoraphium, Steud. Syn. Pl. Gram. 131.—Ind. or.
ovata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 73 = *Oryzopsis setacea*.
paleacea, Poir. Voy. Barb. ii. 101 = *Anthistiria paleacea*.
paleacea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 68. t. 86 = tortilis.
paleacea, Vahl, Symb. Bot. ii. 24 = barbata.
panicoides, Lam. Illustr. i. 158 = *Oryzopsis setacea*.
panicoides, Nees, Agrost. Bras. 376 (= *Urachne panicoides*).—Chili; Bras.
papposa, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1849) 7.—Hab.?
papposa, Nees, Agrost. Bras. 377 = S. Jarava.
paradoxa, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 449 = *Oryzopsis paradoxa*.
Parishii, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. vii. (1882) 33.—Calif.

STIPA :—

- parviflora, Desf. *Fl. Atlant.* i. 98. t. 29.—Reg. Mediterr.
 parviflora, Nutt. Gen. Am. i. 58 = viridula.
 parvula, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 169.—Afr. austr.
 patens, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = Muehlenbergia stipoides.
 pauciflora, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 449 = Olyra pauciflora.
 pekinensis, Hance, in *Journ. Bot.* xv. (1877) 268.—China.
 peltata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 71 = Lagascae.
 pennata, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 213 = barbata.
 pennata, Linn. *Sp. Pl.* 78.—Europ.; As. et Am. bor.
 pennatiformis, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. (1852) 250 = barbata.
 pennigulumis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 77 = Chrysopogon stipoides.
 Pentapogon, F. Muell. *Fragm.* viii. 106 = Pentapogon Billardieri.
 Petriei, J. Buch. Man. Indig. Grasses, N. Zeal. t. 17². f. 2 = setacea.
 Philippii, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 125.—Chili.
 platyphylla, Czern. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 350, nomen = pennata.
 plumosa, Pourr. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* i. 60 = barbata.
 plumosa, Sieber, ex Nees, *Fl. Afr. Austr.* 180 = Aristida obtusa.
 plumosa, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 67.—Chili.
 plumosula, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 127.—Chili.
 Poeppigiana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 29.—Chili.
 poganathera, E. Desv. in C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 277.—Chili.
 pratensis, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 284.—Chili.
 prolifera, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 131.—Nubia.
 puberula, Steud. l. c. 128 = scabra.
 pubescens, R. Br. *Prod.* 174.—Austral.
 pubescens, Lag. Gen. et Sp. Nov. 3 = Lagascae.
 pubinodis, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 50.—Tasman.
 pulchella, Munro, ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 237.—Patagon.
 pulcherrima, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 440 = pennata.
 pungens, [Nees, in] Meyen, *Reise*, i. 484 = S. Jarava.
 purpurea, Griseb. in *Goett. Nachr.* (1868) 82.—Tibet.
 pycnostachya, Benth. *Fl. Austral.* vii. 568.—Austral.
 ramosissima, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 74 = micrantha.
 rariflora, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 81.—Am. antarct.
 Redowskii, Trin. in *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 53.—As. bor.
 Regeliana, Hack. in *Sitzb. Akad. Wien*, lxxxix. (1884) 130.—As. centr.
 Richardsoni, Link, *Hort. Berol.* ii. 245.—Am. bor.
 Richteriana, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 862.—Soongar.
 robusta, Nutt. ex Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 69 = spartea.
 rostrata, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 142 (Quid ?).—Ins. Galapag.
 rostrata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = Muehlenbergia stipoides.
 rudis, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 31 = pubescens.
 sareptana, Beck. in Bull. Soc. Nat. Mosc. lvii. (1882) 52 = capillata.
 scabra, Lindl. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 31.—Austral.
 scelerata, Behr, ex Benth. *Fl. Austral.* vii. 568 = setacea.
 Scribneri, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xi. (1884) 125.—N. Mexic.
 Sellowiana, Nees, ex Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 38.—Bras.
 semibarbata, R. Br. *Prod.* 174.—Austral.
 seminuda, Vahl, ex Hornem. *Hort. Hafn.* i. 76 = tortilis.
 sericea, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 54 = Muehlenbergia capillaris.

STIPA :—

- setacea, R. Br. *Prod.* 174.—Austral.
 setifolia, Kunth, *Enum. Pl.* i. 182 (= *Urachne simplex*).—Peruv.
 setigera, J. Presl, in *Rel. Haenk.* i. 226.—Am. bor. occ.
 sibirica, Lam. *Illustr.* i. 158.—As. bor.; Reg. Himal.
 Sibthorpii, Boiss. & Reut. ex Boiss. *Fl. Orient.* v. 501 = Lagascae.
 spartea, Hook. *Fl. Bor. Am.* ii. 237 = viridula.
 spartea, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 82.—Am. bor.
 speciosa, Trin. & Rupr. l. c. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 45.—Calif.; Chili.
 spicata, Linn. f. *Suppl.* 111; Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 20 = Heteropogon hirtus.
 spicata, Walt. *Fl. Carol.* 78 = Ctenium carolinianum.
 Spica-venti, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 449 = Apera Spica-venti.
 Spinifex, Linn. *Mant.* i. 84 = Spinifex squarrosus.
 splendens, Trin. in *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 54.—Sibir.
 stenophylla, Czern. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 351, nomen = pennata.
 Stillmannii, Boland. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1870) 169.—Calif.
 Streptachne, F. Muell. *Census*, i. 133.—Austral.
 striata, Link, *Hort. Berol.* i. 98.—Austral. ?
 stricta, Lam. *Illustr.* i. 158.—Am. bor.
 stricta, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 42.—Am. bor.
 subulata, Fourn. ex Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 537.—Mexic.
 Szovitsiana, Trin. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 243 = barbata.
 tauricola, Čelak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 349 = pennata ?
 tenacissima, Linn. *Cent. Pl.* i. 6; *Amoen. Acad.* iv. 266.—Reg. Mediterr. occ.
 tenacissima, Ucria, *Hort. Panorm.* (1789) 61 = tortilis.
 tenella, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 452.—Hab. ?
 tenuiflora, Phil. in *Linnaea*, xxx. (1864–65) 281.—Chili.
 tenuifolia, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = parviflora.
 tenuifolia, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 128 = scabra.
 tenuis, Phil. *Sert. Mendoc. Alt.* 46.—Chili.
 tenuis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 643 = Aristida tenuis, Kunth.
 tenuissima, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 67.—Chili.
 teretifolia, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 128.—Austral.; N. Zel.
 Tirsia, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) ii. 115 = pennata.
 tortilis, Buch, in Abh. Akad. Berl. 1816–17 (1819), 376 = tenacissima.
 tortilis, Desf. *Fl. Atlant.* i. 99. t. 31.—Reg. Mediterr.; Oriens.; Afr. austr.
 tortuosa, E. Desv. in C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 281.—Chili.
 trachysperma, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 284.—Chili.
 trichophylla, Benth. *Fl. Austral.* vii. 570.—Austral.
 trichotoma, Nees, *Agrost. Bras.* 375 (= *Urachne trichotoma*).—Uruguay.
 trochlearis, [Nees, in] Meyen, *Reise*, i. 484, nomen.—Peruv.; Mexic.
 Tuckeri, F. Muell. *Fragm.* xi. 128.—Austral.
 ucranica, Steud. Nom. ed. I. 816 = seq.
 ucranensis, Lam. *Illustr.* i. 157 = capillata.
 vaginata, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 281.—Chili.
 verticillata, Nees, in *Spreng. Syst.* iv. Cur. Post. 30 = micrantha.
 villosa, Walt. *Fl. Carol.* 78 = Oryzopsis cuspidata.
 virescens, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 126. t. 680.—Mexic.
 virginica, Pers. *Syn.* i. 99 = avenacea.
 viridula, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 67.—Am. bor. occ.
 Virletii, Fourn. ex Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 538.—Mexic.
 vulgaris, Gueldest. *Reisen*, ii. 39; ex Ledeb. *Fl. Ross.* iv. 451 = pennata.
 vulpiaeformis, Cesati, in *Att. Soc. Acc. Sc. Nap.* v. (1873) n. vii. 19.—Reg. Argent.

STIPAGROSTIS, Nees, in *Linnaea*, vii. (1832) 290 =

- Aristida, Linn. (Gramin.).
 capensis, Nees, l. c. 291 = A. capensis.
 Dregeana, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 172 = A. Dregeana.
 geminifolia, Nees, l. c. 173 = A. geminifolia.
 obtusa, Nees, in *Linnaea*, vii. (1833) 293 = A. obtusa.
 plumosa, Munro, ex T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* i. (1860) 40 = A. plumosa.

STIPECOMA, Muell. Arg. in *Mart. Fl. Bras.* vi. i.

175. t. 53 (1860). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 724.
 macrocalyx, Miers, *Apocyn. S. Am.* 136 = Echites macrocalyx.
 mucronata, Miers, l. c. 135 = Echites peltata.
 ovata, Miers, l. c. 137 (Quid ?).—Bras.
 peltata, Miers, l. c. 134 = Echites peltata.
 peltigera, Muell. Arg. in *Mart. Fl. Bras.* vi. i. 176.—Bras.
 plicata, Miers, *Apocyn. S. Am.* 134 = Echites peltata.
 pulchra, Miers, l. c. 135 (Quid ?).—Bras.
 speciosa, Miers, l. c. 136 (Quid ?).—Bras.

STIPELLARIA, Benth. in Hook. *Kew Journ.* vi.

- (1854) 2 = Alchornea, Sw. (Euphorb.).
 mollis, Benth. l. c. 3 = A. mollis.
 parviflora, Benth. l. c. 4 = A. parviflora.
 tiliaefolia, Benth. l. c. = A. tiliaefolia.
 trewioides, Benth. l. c. 3 = A. trewioides.
 villosa, Benth. l. c. 4 = A. villosa.
 Zollingeri, Miq. *Fl. Ind. Bot. Suppl.* 183, 460 = A. villosa.

STIPELLARIA, Klotzsch, in Schomb. *Faun. Fl. Brit.*

- Gui. 1203 (1848) nomen. *LEGUMINOSAE*.
 mollis, Klotzsch, l. c. (Quid ?).—Guian.

STIPHONIA, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* 218 (1880),

- sphalm. = STYPHONIA, Nutt. = *Rhus*, Linn. (Anacard.).

STIPULARIA, Beauv. *Fl. Owar.* ii. 26. t. 75 (1805).

- RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 74.
 africana, Beauv. l. c.—Afr. trop.
 elliptica, Schweinf. ex Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 80.—Afr. trop.
 gabonica, Hiern, l. c.—Afr. trop.

STIPULARIA, Haw. *Syn. Pl. Succ.* 103 (1812) = *Sper-*

- gularia*, J. & C. Presl (Caryoph.).
 capensis, Haw. l. c. 104 = Arenaria capensis.
 fallax, Edgew. in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 185 (Quid ?).—Ind. or.
 flaccida, Edgew. l. c. = Spargula pentandra.
 marina, Haw. *Syn. Pl. Succ.* 104 = Spargularia media.
 media, Haw. l. c. 103 = Spargularia media.
 pentandra, Edgew. in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 185 = Spargula pentandra.
 pubescens, Haw. *Syn. Pl. Succ.* 103 = Spargularia media.
 rubra, Haw. l. c. = Spargularia rubra.

STIPULICIDA, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 26. t. 6

- (1803). *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 154.
 setacea, Michx. l. c.—Am. bor.

STIRADOTHECA, Klotzsch, in *Monatsb. Berl. Akad.*

- (Macz 1854) 127 = *Begonia*, Tourn.
 ferruginea, Klotzsch, l. c. = B. ferruginea.
 magnifica, Klotzsch, l. c. = B. magnifica.
 trachyptera, Klotzsch, l. c. = B. trachyptera.

STIRLINGIA, Endl. *Gen.* 339 (1838). *PROTEA-*

- CEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 173.
 SIMSIA, R. Br. in *Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 152.
 abrotanoides, Meissn. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 517.—Austral.
 acutifolia, Endl. *Gen. Suppl.* iv. ii. 81 = tenuifolia.
 affinis, Meissn. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 516 = teretifolia.
 anethifolia, Endl. l. c. 23 = tenuifolia.
 capillifolia, Meissn. in Hook. *Kew Journ.* vii. (1855) 70 = simplex.
 intricata, Meissn. l. c. iv. (1852) 184 = tenuifolia.
 latifolia, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 644.—Austral.
 paniculata, Lindl. *Swan River App.* 30 = latifolia.
 simplex, Lindl. l. c.—Austral.
 tenuifolia, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 644; *Endl. Gen. Suppl.* iv. ii. 81.—Austral.
 teretifolia, Meissn. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 515.—Austral.

STISSERA, Giseke, Prael. Linn. 207, 209 (1792) = **Curcuma**, Linn. (Scitam.).
Curcuma, Raensch. Nom. ed. III. 2 = *C. longa*.
longa, Giseke, Prael. Linn. 228 = *C. longa*.

STISSERIA, Linn. Syst. ed. I. (1735) = **Stapelia**?, Linn. (Asclep.).

STISSERIA, Scop. Introd. 199 (1777) = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).

STIXIS, Lour. Fl. Cochinch. 295 (1790) = **Roydsia**, Roxb. (1819) (Cappar.).
scandens, Lour. l. c. = Cochinch.

STIZA, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 31 (1835) = **Lebeckia**, Thunb. (Legumin.).
erioloba, E. Mey. l. c. = *L. pungens*.
psiloloba, E. Mey. l. c. 32 = *L. psiloloba*.
pungens, Presl, Bot. Bemerk. 125 = *L. pungens*.

STIZOLOBIUM, P. Br. Hist. Jamaica. 290 (1756) = **Mucuna**, Adans. (1763) (Legumin.).
altissimum, Pers. Syn. ii. 299 = *M. altissima*.
bulbosum, Spreng. Syst. iii. 252 = *Pachyrhizus angulatus*.
domingense, Spreng. l. c. = *Pachyrhizus angulatus*.
ellipticum, Pers. Syn. ii. 299 = *M. elliptica*.
giganteum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 281 = *M. gigantea*.
inflexum, Pers. Syn. ii. 299 = *M. inflexa*.
macroceras, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 281 = *M. macroceratides*.
Meyeri, Spreng. l. c. iii. 253 = *M. spuria*.
mite, Pers. Syn. ii. 299 = *M. mitis*.
molle, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 281 = *M. mollis*.
montanum, Spreng. Syst. iii. 252 = *Pueraria phaseoloides*.
Mutisianum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 281 = *M. Mutisiana*.
nigricans, Pers. Syn. ii. 299 = *M. nigricans*.
platycarpum, Pers. l. c. = *M. platycarpa*.
pruriens, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 399 = *M. pruriens*.
scarabaeoides, Spreng. Syst. iii. 253 = *Atylosia scarabaeoides*.
tuberosum, Spreng. l. c. 252 = *Pachyrhizus tuberosus*.
urens, Pers. Syn. ii. 299 = *M. urens*.

STIZOLOPHUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 35 (1826) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
Balsamita, Cass. l. c. 36 = *C. Balsamita*.
balsamitaefolius, Cass. l. c. li. 49, 50 = *C. Balsamita*.
coronopifolius, Cass. l. c. 51 = *C. coronopifolia*.

STIZOPHYLLUM, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 197 = **Bignonia**, Linn.
adpersum, Miers, l. c. 198, nomen.—Bras.
affinis, Miers, l. c. nomen. = *B. affinis*.
auricomum, Miers, l. c., nomen.—Bras.
cordifolium, Miers, l. c. = *B. cordifolia*.
dentatum, Miers, l. c. = *B. dentata*.
denticulatum, Miers, l. c. 197.—Bras.
glandulosum, Miers, l. c. 198 = *B. glandulosa*.
insigne, Miers, l. c., nomen.—Bras.
longipes, Miers, l. c., nomen.—Bras.
occidentale, Miers, l. c. = *B. occidentalis*.
perforatum, Miers, l. c. = *B. perforata*.
punctulatum, Miers, l. c. nomen.—Bras.
velutinum, Miers, l. c. = *B. velutina*.

STOBÆA, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141 (1800) = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).
acanthopoda, DC. Prod. vi. 521.—Afr. austr.
acarnoides, DC. l. c. 519.—Afr. austr.
adenocarpa, DC. l. c. 515 = *B. fruticosa*?
aristosa, DC. l. c. 518.—Afr. austr.
atractylodes, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141 = *B. carlinoides*.
Bergeri, DC. Prod. vii. 37, sphalm. = seq.
Bergii, Spreng. Syst. iii. 394 = *Dicoma diacanthoides*.
biloba, DC. Prod. vi. 516.—Afr. austr.
bipinnatifida, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 499.—Afr. austr.
buphthalmoides, DC. Prod. vi. 517.—Afr. austr.
cardopatifolia, DC. l. c. 514.—Afr. austr.
carlinaefolia, DC. l. c. 516.—Afr. austr.

VOL. II.

STOBÆA :—
carlinoides, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 516 = *carlinaefolia*.
carlinoides, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141 = *Berkheya carlinoides*.
cirsiiifolia, DC. Prod. vi. 519.—Afr. austr.
crispa, DC. l. c. 517.—Afr. austr.
cruciata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 498 = *B. cruciata*.
decurrens, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141 = *Stephanocoma berckheyoides*.
discolor, DC. Prod. vi. 520.—Afr. austr.
echinacea, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 495.—Afr. austr.
echinopoda, DC. Prod. vi. 521.—Afr. austr.
epitrachys, DC. l. c. 515.—Afr. austr.
eribasis, DC. l. c. 516.—Afr. austr.
Erysithales, DC. l. c. 519.—Afr. austr.
erysithalis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = praec.
Gaertneri, DC. Prod. vi. 522.—Afr. austr.
Gerrardii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 495.—Afr. austr.
glabrata, Alam. ex DC. Prod. v. 660 = *Jaumea mexicana*.
glabrata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141.—Afr. austr.
glabriuscula, DC. Prod. vi. 519.—Afr. austr.
glaucæ, DC. l. c. 516.—Afr. austr.
glomerata, Spreng. Syst. iii. 394 = *Platycarpha glomerata*.
grandifolia, DC. Prod. vi. 517.—Afr. austr.
helianthiflora, DC. l. c. 520.—Afr. austr.
heterophylla, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141.—Afr. austr.
insignis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 496 = *B. subulata*.
Kraussii, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 776 = *B. grandiflora*.
lanata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141.—Afr. austr.
M'Kenii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 494.—Afr. austr.
membranifolia, DC. Prod. vi. 521.—Afr. austr.
microcephala, DC. l. c. 520.—Afr. austr.
multijuga, DC. l. c. 521.—Afr. austr.
onobromoides, DC. l. c. 516.—Afr. austr.
onopordifolia, DC. l. c. 521.—Afr. austr.
oppositifolia, DC. l. c. 517.—Afr. austr.
petiolata, DC. l. c. 520.—Afr. austr.
pinnata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141 = *B. pinnata*.
pinnatifida, Thunb. l. c.—Afr. austr.
platyptera, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 495.—Afr. austr.
polyacantha, DC. Prod. vi. 519.—Afr. austr.
purpurea, DC. l. c. 518 = *B. purpurea*.
Radula, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 491.—Afr. austr.
rhapontica, DC. Prod. vi. 519.—Afr. austr.
rigida, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141.—Afr. austr.
rubricaulis, DC. Prod. vi. 515 = *B. carlinoides*.
scolymoides, DC. l. c. 520 = *B. scolymoides*.
seminivea, DC. l. c. 518 = *B. seminivea*.
sonchifolia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 496.—Afr. austr.
speciosa, DC. Prod. vi. 518.—Afr. austr.
sphaerocephala, DC. l. c. 518.—Afr. austr.
viscosa, DC. l. c. 517.—Afr. austr.
Zeyheri, DC. l. c. 515 = *B. carlinoides*.
Zeyheri, Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 496 = *B. subulata*.

STOCKSIA, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 304. **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 397.
brahuica, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 305.—Beluchist.

STOEBE, Linn. Coroll. Gen. 14 (1737). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 323.
EREMANTHIS, Cass. ex DC. Prod. vi. 261, in syn. (1837).
SERIPHUM, Linn. Sp. Pl. ed. I. 928 (1753).
adpressa, DC. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 285.—Afr. austr.
aethiopica, Linn. Sp. Pl. 831.—Afr. austr.
aethiopica, Sieber, ex DC. Prod. vi. 260 = *incana*.
alopecuroides, Less. Syn. Comp. 349.—Afr. austr.
alopecuroides, Reichb. ex DC. Prod. vi. 262 = *cinerea*.
artemisioides, E. Mey. ex DC. l. c. 263.—Afr. austr.

STOEBE :—
aspera, Thunb. Prod. Pl. Cap. 170 = *Helichrysum ericaefolium*.
canescens, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 182 = *Elytropappus canescens*.
capitata, Berg. Desc. Pl. Cap. 338.—Afr. austr.
cernua, Thunb. Prod. Pl. Cap. 170 = *Elytropappus Rhinocerotis*.
cinerea, Sieber, ex DC. Prod. vi. 256 = *Elytropappus glandulosus*.
cinerea, Thunb. Prod. Pl. Cap. 169.—Afr. austr.
cinerea, Zeyh. ex DC. Prod. vi. 266 = *ifloga polycnemoides*.
colorata, E. Mey. ex DC. l. c. 263 = *spiralis*.
copholepis, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 179.—Afr. austr.
cupressina, Reichb. ex DC. Prod. vi. 257 = *Elytropappus Rhinocerotis*.
disticha, Linn. f. Suppl. 391 (= *Trichogyne seriphoides*).—Afr. austr.
ericoides, Berg. Desc. Pl. Cap. 339.—Afr. austr.
fasciculata, Cass. in Dict. Sc. Nat. li. 62 = *cinerea*.
fasciculata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 169 (= *Trichogyne seriphoides*).—Afr. austr.
filaginea, Sch. Bip. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 285.—Afr. austr.
fusca, Thunb. Prod. Pl. Cap. 170.—Afr. austr.
glandulosus, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 182 = *Elytropappus glandulosus*.
gnaphaloides, Linn. Mant. ii. 518 = *gomphrenoides*.
gnaphaloides, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 726 = *Metalasia pulcherrima*.
gomphrenoides, Berg. Desc. Pl. Cap. 336.—Afr. austr.
incana, Thunb. Prod. Pl. Cap. 169.—Afr. austr.
laricifolia, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 265 (= *Trichogyne laricifolia*).—Afr. austr.
leiocarpa, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 694.—Afr. austr.
leucocephala, DC. Prod. vi. 259.—Afr. austr.
microcephala, Steud. Nom. ed. II. ii. 645, sphalm. = seq.
microphylla, DC. Prod. vi. 259.—Afr. austr.
mucida, E. Mey. ex DC. l. c. 256 = *Elytropappus glandulosus*.
muricata, Spreng. in Flora, xiii. (1830) i. Beil. 21 = *Elytropappus glandulosus*.
muricella, Steud. ex Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 183.—Afr. austr.
nervigera, Sch. Bip. l. c. 179.—Afr. austr.
nivea, Thunb. Prod. Pl. Cap. 170 = *ericoides*.
pallens, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 182 = *Elytropappus glandulosus*.
paniculata, Cass. in Dict. Sc. Nat. li. 63 = seq.
passerinoides, Willd. Sp. Pl. iii. 2408.—Ins. Maurit.
phlaeoides, Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 282, sphalm. = seq.
phleoides, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 179.—Afr. austr.
phylicoides, Thunb. Prod. Pl. Cap. 169.—Afr. austr.
phyllostachya, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 179.—Afr. austr.
plumosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 169 = *cinerea*.
prostrata, Linn. Mant. ii. 291.—Afr. austr.
ramosissima, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 183 = *Elytropappus ambiguus*.
reflexa, Linn. f. Suppl. 391 (= *Trichogyne reflexa*).—Afr. austr.
Rhinocerotis, Linn. f. Suppl. 391 = *Elytropappus Rhinocerotis*.
rigida, Spreng. Syst. iii. 441.—Afr. austr.
rugulosa, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 280.—Afr. austr.
scabra, Linn. f. Suppl. 391 = *Elytropappus ambiguus*.
spiralis, Less. Syn. Comp. 247.—Afr. austr.
squarrosa, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 282.—Afr. austr.
stenostachya, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 183 = *Elytropappus ambiguus*.
subulata, Sm. in Rees, Cycl. xxxiv. n. 10 = *Elytropappus ambiguus*.
torta, Spreng. Neue Entdeck. iii. 42 = *Disparago ericoides*.
tortilis, DC. Prod. vi. 260.—Afr. austr.
vermiculata, DC. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 284 = *artemisioides*.
virgata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 170 = *cinerea*.

6 M

STOECHAS, Gueldenst. Reisen (1787); ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 607 (1846) = *Helichrysum*, Vaill. (Compos.).
citrina, Gueldenst. l. c. = *H. arenarium*.

STOECHAS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = *Lavandula*, Tourn. (Labiata).
abrotanoides, Reichb. f. in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 161 = *L. abrotanoides*.
dentata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3; Reichb. f. l. c. = *L. dentata*.
officinarium, Mill. l. c. n. 1. = *L. Stoechas*.
pedunculata, Mill. l. c. n. 2; Reichb. f. in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 161 = *L. pedunculata*.
pinnata, Reichb. f. l. c. = *L. pinnata*.
rotundifolia, Reichb. f. l. c. = *L. rotundifolia*.

STOEHELINA, Hall. Helv. 312; ex Benth. in DC. Prod. x. 544 (1846) = *Bartsia*, Linn. (Scrophul.).

STOERKEA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 523 = seq.

STOERKIA, Crantz, Duab. Dracon. Arb. 25 (1768) = *Dracaena*, Vand. (Liliac.).
Draco, Crantz, l. c. = *D. Draco*.

STOKESIA, L'Hérit. Sert. Angl. 27 (1788). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 234.
CARTESTIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 198.
cyanea, L'Hérit. Sert. Angl. 28.—Am. bor.

STOLIDIA, Baill. Adansonia, ii. (1862) 359.
OLACINEAE, Benth. & Hook. f. i. 996.
mauritanica, Baill. l. c.—Ins. Maurit.

STOMADENA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 12 (1836) = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.).
violacea, Rafin. l. c. = *I. Aitoni*.

STOMARRHENA, DC. Prod. vii. 738 (1839) = *Astroloma*, R. Br. (Epacrid.).
serratifolia, DC. l. c. = *A. Candolleianum*.
xerophylla, DC. l. c. = *A. xerophyllum*.

STOMATECHIUM, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 31 (1840), sphalm. = *STOMOTECHIUM*, Lehm. = *Anchusa*, Linn. (Borag.).

STOMATOCALYX, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1142 (1866) = *Pimelodendron*, Hassk. (Euphorb.).
Griffithianus, Muell. Arg. l. c.—Malaya.

STOMOISIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 108 (1836) = *Utricularia*, Linn. (Lentib.).
cornuta, Rafin. l. c. = *U. cornuta*.

STOMOTECHIUM, Lehm. Asperif. 395 (1818) = *Anchusa*, Linn. (Borag.).
papillosum, Lehm. l. c. 396.—Afr. austr.

STONCKENYA, Rafin. in Am. Monthly Mag. iv. (1819) 193, err. typ. = *HONCKENYA*, Ehrh. = *Arenaria*, Rupp. (Caryoph.).

STOORIA, Neck. Elem. i. 132 (1790) = *Lobelia*, Plum. (Campan.).

STOPINACA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 11 (1836) = *Polygonella*, Michx. (Polygon.).
parvifolia, Rafin. l. c. = *P. parvifolia*.

STORCKIELLA, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 255, 363. t. 6. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 571.
Doga, Baill. Adansonia, ix. (1869) 205.
Pancheri, Baill. l. c.—N. Caled.
vitiensis, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 255, 363. t. 6.—Ins. Fiji.

STORTHOCALYX, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 499, 660. *SAPINDACEAE*.
chryseus, Radlk. l. c. 661.—N. Caled.
leioneurus, Radlk. l. c.—N. Caled.
Pancheri, Radlk. l. c.—N. Caled.
sordidus, Radlk. l. c.—N. Caled.

STRABONIA, DC. Prod. v. 481 (1836) = *Pulicaria*, Gaertn. (Compos.).
gnaphalodes, DC. l. c. = *P. gnaphalodes*.

STRACHEYA, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 306. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 510.
tibetica, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 307.—Reg. Himal.

STRAKAEA, Presl, Epim. Bot. 221 (1849) = *Bragantia*, Lour. (Aristol.).
melastomaeifolia, Presl, l. c. 222 = *B. corymbosa*.

STRAMONIUM, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Hclv. ii. 49 (1742) = *Datura*, Linn. (Solan.).
arborescens, Moench, Meth. Suppl. 173 = *D. suaveolens*.
Datura, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = *D. fastuosa*.
fastuosum, Moench, Meth. 456 = *D. fastuosa*.
foetidum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 157; All. Fl. Pedem. i. 103 = *D. Stramonium*.
infernale, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = *D. fastuosa*?
laeve, Moench, Meth. 456 = *D. inermis*?
Metel, Moench, l. c. = *D. Metel*.
spinosum, Lam. Fl. Fr. ii. 256 = *D. Stramonium*.
Tatula, Moench, Meth. 456 = *D. Stramonium*.
vulgare, Moench, l. c. = *D. Stramonium*.
vulgatum, Gaertn. Fruct. ii. 243. t. 132; Moench, l. c. = *D. Stramonium*.

STRANGALIS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 195 (1867) = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).
adpressa, Dulac, l. c. = *B. adpressa*.

STRANGEA, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 66 = *Grevillea*, R. Br. (Proteac.).
cynanchocarpa, F. Muell. Fragm. vii. 132 = *G. cynanchicarpa*.
linearis, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 66 = *G. Strangea*.

STRANGEVEIA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 429 = *STRANGWEJA*, Bertol. = *Hyacinthus*, Tourn. (Liliac.).

STRANGULA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 = *Ardisia*, Sw. (Myrsin.).

STRANGWEIA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 423 = seq.

STRANGWEJA, Bertol. in Mem. Soc. Ital. Modena, xxi. (1835) 2. t. 1 = *Hyacinthus*, Tourn. (Liliac.).
hyacinthoides, Bertol. l. c. = *H. spicatus*.
spicata, Bertol. l. c. = *H. spicatus*.

STRANGWEYA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 812 (1883) = *praeac.*

STRANIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 = *Canarium*, Rumph (Burser.).

STRANVAESIA, Lindl. Bot. Reg. t. 1956 (1837). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 627.
Calleryana, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. (1874) 179.—China.
Davidiana, Decne. l. c. 179.—Tibet.
digyna, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ii. (1843) 129 = *Photinia villosa*.
glauca, Baill. Hist. Pl. i. 411 = *glaucescens*.
glaucescens, Lindl. Bot. Reg. t. 1956.—Reg. Himal.
Nussia, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. (1874) 178 = *glaucescens*.
undulata, Decne. l. c. 179.—China.

STRASBURGERIA, Baill. Adansonia, xi. (1876) 372. *TERNSTROEMACEAE*.
calliantha, Baill. l. c.—N. Caled.

STRATEUMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 89 (1836) = *Zeuxine*, Lindl. (Orchid.).
zeylanica, Rafin. l. c. = *Z. sulcata*.

STRATEUMA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 290 = *Orchis*, Tourn.
grandis, Salisb. l. c. = *O. purpurea*.
militaris, Salisb. l. c. = *O. Simia*.

STRATIOITES, Gilib. Exercit. i. 342 (1791), sphalm. = seq.

STRATIOTES, Linn. Syst. ed. I (1735). *HYDROCHARIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 454.
acoroïdes, Linn. f. Suppl. 268 = *Enhalus Koenigii*.
aculeatus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 52 = *aloides*.
alismoides, Linn. Sp. Pl. 535 = *Ottelia alismoides*.
aloides, Linn. l. c.—Europ.
aquaticus, Pall. Reise, iii. 315 = *aloides*.
ensiformis, Gilib. Fl. Lituan. ii. 220 = *aloides*.
nymphoides, Humb. & Bonpl. in Willd. Sp. Pl. iv. 821 = *Hydrocleys Commersonii*.
quinquealatus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 53 = *Ottelia alismoides*.

STRAUSSIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 42. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 122.
hawaiensis, A. Gray, l. c. 43.—Ins. Sandvic.
kaduana, A. Gray, l. c.—Ins. Sandvic.
mariniana, A. Gray, l. c.—Ins. Sandvic.

STRAVADIA, Pers. Syn. ii. 30 (1807) = seq.

STRAVADIUM, Juss. Gen. 326 (1789) = *Barringtonia*, Forst. (Myrtac.).
acuminatum, Blume, in Fl. des Serres, vii. (1851–52) 24 = *B. acuminata*.
acuminatum, Wall. Cat. n. 3636 = *B. macrostachya*.
acutangulum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 159 = *B. acutangula*.
album, Pers. Syn. ii. 30 = *B. racemosa*.
augustum, Wall. Cat. n. 3637 = *B. augusta*.
coccineum, DC. Prod. iii. 289 = *B. excelsa*.
cochinchinense, Blume, in Fl. des Serres, xvii. (1851–52) 24 = *B. acutangula*?
costatum, Blume, l. c. vii. (1851–52) 24 = *B. costata*.
demissum, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 81 = *B. acutangula*.
denticulatum, Miers, l. c. 88.—Austral.
excelsum, DC. Prod. iii. 289 = *B. excelsa*.
globosum, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 86 = *B. acutangula*.
gracile, Miers, l. c. = *B. acutangula*.
Horsfieldii, Miers, l. c. 85 = *B. Horsfieldii*.
insigne, Blume, in Fl. des Serres, xvii. (1851–52) 21, 24 = *B. insignis*.
integrifolium, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 210.—N. Caled.
lucidum, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 88.—Java.
luzonense, Miers, l. c. 84 = *B. luzonensis*.
macrophyllum, Blume, in Fl. des Serres, vii. (1851–52) 24 = *B. speciosa*.
obtusangulum, Blume, l. c. = *B. acutangula*.
pubescens, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 83 = *B. acutangula*.
racemosum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 159 = *B. racemosa*.
Reinwardtii, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 88 = *B. Reinwardtii*.
reticulatum, Blume, in Fl. des Serres, vii. (1851–52) 24 = *B. reticulata*.
Rheedii, Blume, l. c. = *B. acutangula*.
rubrum, DC. Prod. iii. 289, partim = *B. racemosa*.
rubrum, Pers. Syn. ii. 30 = *B. acutangula*.
sarcostachys, Blume, in Fl. des Serres, vii. (1851–52) 24 = *B. macrostachyum*.
semisutum, Miers, in Trans. Linn. Soc. Sér. II. i. (1875) 89.—Ins. Pacif.
serratum, Miers, l. c. 87 = *B. serrata*.
spicatum, Blume, ex DC. Prod. iii. 289 = *B. spicata*.

STREBANTHUS, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 218 = *Eryngium*, Tourn. (Umbell.).
auriculatus, Rafin. l. c. = *E. Baldwinii*.
gracilis, Rafin. New Fl. Am. iv. 36 = *E. Baldwinii*.
heterophyllum, Rafin. l. c. 35 = *E. prostratum*.
humilis, Rafin. l. c. = *E. Baldwinii*.
tenuifolia, Rafin. l. c. 36 = *E. Baldwinii*.

STREBLANTHERA, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 29 = *Trichodesma*, R. Br. (Borag.).
oleaeifolia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 93.—Abyss.
trichodesmoides, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 29 = *T. calathiforme*.

STREBLANTHUS, Rafin. Atl. Journ. 149 (1832) = *STREBANTHUS*, Rafin. = *Eryngium*, Tourn. (Umbell.).

STREBLIDIA, Link, Hort. Berol. i. 276 (1827) = **Schoenus**, Linn. (Cyperac.).
ferruginea, Link, l. c. = Sch. ferrugineus.

STREBLOCARPUS, Arn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 235 = **Maerua**, Forsk. (Cappar.).
angustifolia, Endl. Gen. 893 = M. oblongifolia.
Fenzlii, Parl. in Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 24.—Abyss.
oblongifolia, Endl. Gen. 893 = M. oblongifolia.
ovalifolia, Endl. ex Walp. Rep. i. 197 = M. ovalifolia.
pubescens, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 166 = M. nervosa.
scabra, Endl. ex Walp. Rep. i. 197 = M. ovalifolia.
scandens, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 165 = M. nervosa.

STREBLOCHAETA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1163 (1883), sphalm. = seq.

STREBLOCHAETE, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 421 (1851) = **Danthonia**, DC. (Gramin.).
Costlini, Hochst. ex A. Rich. l. c. = D. Streblochaeta.
nutans, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 245 = D. Streblochaeta.
Schimperi, Hochst. ex Steud. l. c. = D. Streblochaeta.

STREBLORHIZA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 503. (err. typ.) (1865) = seq.

STREBLORRHIZA, Endl. Prod. Fl. Norf. 92 (1833).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 503.
speciosa, Endl. l. c. 93.—Ins. Norfolk.

STREBLOSA, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 245 = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).
polyantha, Korth. l. c. 246 = P. singalensis.
tortilis, Korth. l. c. = P. tortilis.
undulata, Korth. l. c. 247 = P. undulata.

STREBLUS, Lour. Fl. Cochinch. 614 (1790). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 359.
ALBRANDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 509 (1826).
CALIUS, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 698 (1837).
EPICARPURUS, Blume, Bijdr. 488 (1825).
asper, Lour. Fl. Cochinch. 615.—As. trop.
Brunoniana, F. Muell. Fragm. vi. 192 = Pseudomorus Brunoniana.
cordatus, Lour. Fl. Cochinch. 615 = Trophis cordata.
lactescens, Blume, Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. 80 = asper.
macrophyllus, Blume, l. c. (= *Diplocos macrophylla*).—Ins. Celebes.
mauritanus, Blume, l. c. = Ampalis madagascariensis.
microphylla, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 465 = Phyllochlamys spinosa.
mitis, Kurz, l. c. 464.—Burma.
pendulina, F. Muell. Fragm. vi. 192 = Pseudomorus Brunoniana.
rectinervis, F. Muell. l. c. = Aphanantha philippinensis.
taxoides, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 465 = Phyllochlamys spinosa.
zeylanica, Kurz, l. c. 464 = Taxotrophis zeylanica.

STRECKERA, Sch. Bip. in Flora, xvii. (1834) 483 = **Leontodon**, Linn. (Compos.).
Clauræ, Sch. Bip. l. c. 487 = L. asperimus.
tuberosa, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 197 = L. tuberosus.

STRELESKIA, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 266 = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campan.).
montana, Hook. f. l. c. 267 = W. saxicola.

STRELITSIA, Thunb. Fl. Cap. ii. 113 (1818), sphalm. = seq.

STRELITZIA, [Banks] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 285. t. 2 (1789). **SCITAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 656.
angusta, D. Dietr. Syn. Pl. i. 850, sphalm. = S. Augusta.

STRELITZIA:—

angustifolia, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 55 = parvifolia.
Augusta, Thunb. Nov. Gen. 113.—Afr. austr.
farinosa, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 55 = S. Reginae.
gigantea, J. S. Kern. Hort. Semperv. t. 589 = S. Augusta?
glauca, Rich. in Nov. Act. Nat. Cur. xv. (1831) Suppl. 17. t. 2-3 = S. Reginae.
humilis, Link, Enum. Hort. Berol. i. 150; Handb. i. 234 = S. Reginae.
juncea, Link, Enum. l. c.; Andr. ex Spreng. Syst. i. 833 = parvifolia.
lanceolata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 645 (Quid?).—Afr. austr.
Lemoinei, Miellez, in Fl. des Serres, xviii. (1880) sub t. 2370 = S. Reginae.
macrophylla, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 645 (Quid?).—Afr. austr.
Nicolai, Regel & C. Koch, in Gartenfl. (1858) 265. t. 235.—Afr. austr.
ovata, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 55 = S. Reginae.
parvifolia, [Dryand.] l. c.—Afr. austr.
Principis, Andr. ex Spreng. Syst. i. 833 = parvifolia.
prolifera, Carr. in Rev. Hort. (1869) 159 = S. Reginae.
pumila, Hort. ex Planch. in Fl. des Serres, xi. (1856) 53 = S. Reginae.
Quenconi, Lem. Illustr. Hort. x. (1863) Misc. 20.—Afr. austr.
regalis, Salisb. Prod. 145 = S. Reginae.
Reginae, [Banks, in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 285. t. 2; Thunb. Nov. Gen. 113.—Afr. austr.
rutilans, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) t. 53 = S. Reginae.
teretifolia, Barrow, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 645 (Quid?).—Afr. austr.

STREMPERIA, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 180. t. 18. f. 2 = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).
guianensis, A. Rich. l. c.—Guian.

STREMPELIOPSIS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 702 (1876). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
strempeleioides, Benth. l. c.—Cuba.

STREPHIUM, Schrad. ex Nees, Agrost. Bras. 298 (1829) = **Olyra**, Linn. (Gramin.).
distichophyllum, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. i. 70 = O. polypodioides.
floribundum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 36 = O. floribunda.
pulchellum, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 193.—Cuba.
strictiflorum, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 465 = O. strictiflora.

STREPHONEMA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 782 (1867). **LYTHRARIACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
Mannii, Hook. f. l. c.—Afr. trop.
sericea, Hook. f. l. c.—Afr. trop.

STREPSANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 13 (1836) = **Anthurium**, Schott (Aroid.).
macrophylla, Rafin. l. c. = A. grandifolium.

STREPSIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 645 (1841) = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).
usneoides, Steud. l. c. = T. usneoides.

STREPSILOBUS, Rafin. Sylva Tellur. 117 (1838) = **Entada**, Adans. (Legum.).
scandens, Rafin. l. c. 118 = E. scandens.

STREPSIMELA, Rafin. Sylva Tellur. 159 (1838) = **Loranthus**, Linn.
coccinea, Rafin. l. c. = L. coccinea.

STREPSIPHUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 91 (1836) = **Peristrophe**, Nees (Acanth.).
speciosus, Rafin. l. c. = P. speciosa.

STREPSIPHILA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 60 (1836) = **Drimia**, Jacq. (Liliac.).
undulata, Rafin. l. c. = Scilla undulata.
villosa, Rafin. l. c. = D. villosa.

STREPTACHNE, R. Br. Prod. 174 (1810) = **Stipa**, Linn. (Gramin.).
Calamagrostis, Dum. Obs. Gram. Belg. 135 = Stipa Calamagrostis.
cubensis, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 311.—Cuba.
floridana, Chapm. Fl. S. U. St. 554 = Aristida floridana.
indica, Buese, ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 99.—Malaya.
ramosissima, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 7 = Stipa micrantha.
stipoides, R. Br. Prod. 174.—Austral.
verticillata, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 7 = Stipa micrantha.

STREPTACHNE, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 124. t. 40 (1815) = **Aristida**, Linn. (Gramin.).
domingensis, Spreng. ex Schult. Mant. ii. 188 = Andropogon hirtiflorus.
pilosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 124 = A. jorulensis.
scabra, H. B. & K. l. c. t. 40 = A. scabra.
tenuis, H. B. & K. l. c. = A. tenuis.

STREPTALON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1836) = **Hypericum**, Tourn.
dolabriforme, Rafin. l. c. = H. dolabriforme.

STREPTANTHERA, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. iii. t. 209 (1827). **IRIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 703.
cuprea, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 501.—Afr. austr.
elegans, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. iii. t. 209.—Afr. austr.
lineata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 390 = Sparaxis grandiflora.
tricolor, Klatt, l. c. = Sparaxis tricolor.

STREPTANTHUS, Nutt. in Journ. Acad. Philad. v. (1825) 134. t. 7. **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 69.
angustifolius, A. Gray, in Proc. Acad. Philad. 1863 (1864) 57 = Arabis Drummondii.
angustifolius, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 76 = Arabis Holboellii.
arcuatus, Nutt. l. c. 77 = Arabis arcuata.
bracteatus, A. Gray, Gen. Am. Bor.-or. Illustr. i. 146.—Am. bor. occ.
brazoensis, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862), 448 = Arabis petiolaris.
Breweri, A. Gray, in Proc. Calif. Acad. iii. (1864) 101.—Calif.
carinatus, Wright, ex A. Gray, Pl. Wright. ii. 11.—N. Mexic.
cordatus, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 77.—Am. bor. occ.
cordatus, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 65 = tortuosus.
crassicaulis, Torr. in Stansbury, Exped. Utah, 383. t. 9 = Caulanthus crassicaulis.
diversifolius, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 363.—Calif.
flavescens, A. Gray, l. c. vi. (1864) 186 = Caulanthus procerus.
flavescens, Hook. Ic. Pl. t. 44.—Calif.
flavescens, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 65 = Thelypodium flavescens.
glabrifolius, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862), 448 = hyacinthoides.
glandulosus, Hook. Ic. Pl. t. 40.—Am. bor. occ.
heterophyllum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 77 = Caulanthus Coulteri.
hispidus, A. Gray, in Proc. Calif. Acad. iii. (1864) 101.—Calif.
Howellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 353.—Am. bor. occ.
hyacinthoides, Hook. Bot. Mag. t. 3516.—Am. bor. occ.
linearifolius, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 7 = Thelypodium linearifolium.
longifolius, Benth. Pl. Hartw. 10 = Thelypodium longifolium.
maculatus, Nutt. in Journ. Acad. Philad. v. (1825) 134. t. 7.—Am. bor. occ.
micranthus, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 7 = Thelypodium longifolium.
obtusifolius, Hook. Bot. Mag. t. 3317 = maculatus.
petiolaris, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 7 = Arabis petiolaris.
platycarpus, A. Gray, Pl. Wright. ii. 10.—Am. bor. occ.

STREPTANTHUS—

- polygaloides, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* i. (1865) 519.—Calif.
procerus, Brewer, ex *A. Gray*, l. c.=*Caulanthus procerus*.
repandus, *Nutt. ex Torr. & Gray*, *Fl. N. Am.* i. 77 (*Arabidis* sp. ?).—Calif.
sagittatus, *Nutt.* in *Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 12 = *Thelypodium Nuttallii*.
tortuosus, *Kellogg*, in *Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 152. f. 46.—Calif.
virgatus, *Nutt. ex Torr. & Gray*, *Fl. N. Am.* i. 76 = *Arabis Holboellii*.

STREPTIMA, *Rafin.* *Fl. Tellur.* ii. 93 (1836) = **Frankenia**, *Linn.*
pauciflora, *Rafin.* l. c. = *F. pauciflora*.

STREPTIUM, *Roxb.* *Pl. Corom.* ii. 25. t. 146 (1798) = **Priva**, *Adans.* (*Verben.*)
asperum, *Roxb.* l. c. = *P. leptostachya*.

STREPTOCALYX, *Beer*, in *Flora*, xxxvii. (1854) 348. **BROMELIACEAE**, *Benth. & Hook.* f. iii. 659.
Furstenbergii, *E. Morr.* in *Belg. Hort.* (1883) 13.—Bras.
Poeppigii, *Beer*, *Bromel.* 141.—Bras.
Vallerandi, *E. Morr.* in *Belg. Hort.* xxxiii. (1883) 13. t. 1-2.—Bras.

STREPTOCARPUS, *Lindl.* *Bot. Reg.* t. 1173 (1828). **GESNERACEAE**, *Benth. & Hook.* f. ii. 1023.
angovensis, *DC. Prod.* ix. 271.—Madag.
benguellensis, *Welw. ex C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* v. 150.—Afr. trop.
biflorus, *Crocker*, in *Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 66. t. 4 = *Gardenii*.
Bojeri, *R. Br.* in *Benn. Pl. Jav. Rar.* 119.—Madag.
caulescens, *Vatke*, in *Linnaea*, xliii. (1880-82) 323.—Afr. trop.
Cooperi, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* v. 150.—Afr. austr.
Fanninii, *Harv. ex C. B. Clarke*, l. c.—Afr. austr.
floribunda, *Hort.*—Cf. *Gard. Chron.* (1878) ii. 282 (an hybr.?).—Hab.?
Gardenii, *Hook. Bot. Mag.* t. 4862.—Afr. austr.
Greenii ×, *Hort.*—Cf. *Gard. Chron.* (1876) i. 74.
Hildebrandtii, *Vatke*, in *Linnaea*, xliii. (1880-82) 324.—Madag.
Hilsenbergii, *R. Br.* in *Benn. Pl. Jav. Rar.* 119 (*Helsingbergii*).—Madag.
Kirkii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6782.—Afr. trop.
lutea, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* v. 153.—Afr. austr.
monophylla, *Welw. in Bibl. Univ. Genèv.* (1861) 202.—Afr. trop.
muscosa, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* v. 155.—Madag.
nobilis, *C. B. Clarke*, l. c.—Afr. trop.
paniculata, *R. Br.* in *Benn. Pl. Rar. Jav.* 119.—Madag.
parviflorus, *E. Mey.* in *Drège, Zwei Pfl. Docum.* 152.—Afr. austr.
plantaginea, *Vatke*, in *Linnaea*, xliii. (1880-82) 323.—Ins. Comor.
polyanthus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4850.—Afr. austr.
primuloides, *Dickie*, in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 126, nomen.—Hab.?
pusillus, *Harv. ex C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* v. 149.—Afr. austr.
Rexii, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1173.—Afr. austr.
Saundersii, *Hook. Bot. Mag.* t. 5251.—Afr. austr.
Thompsonii, *R. Br.* in *Benn. Pl. Jav. Rar.* 119.—Madag.

STREPTOCAULON, *Wight & Arn.* *Contrib.* 64 (1834). **ASCLEPIADEAE**, *Benth. & Hook.* f. ii. 744.
TRIPLOLEPIS, *Turcz.* in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) i. 251.
abyssinicum, *Hochst.* ex *Steud.* *Nom. ed.* II. ii. 305, in syn.; 646 = *Periploca linearifolia*.
albicans, *G. Don*, *Gen. Syst.* iv. 162 = *Periploca albicans*.
Baumii, *Decne.* in *DC. Prod.* viii. 496.—Ins. Philipp.
calophyllum, *Wight*, in *Wight & Arn. Contrib.* 65 = *Periploca calophylla*.

STREPTOCAULON—

- chinense*, *G. Don*, *Gen. Syst.* iv. 162 = *Vallis sinensis*.
cochinchinense, *G. Don*, l. c. (*Pergulariae* sp. ?).—Cochinch.
Cumingii, *F. Villar*, in *Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 132.—Ins. Philipp.
divaricatum, *G. Don*, *Gen. Syst.* iv. 162 = *Strophanthus divergens*.
extensum, *Wight*, in *Wight & Arn. Contrib.* 65 = *Myriopteron paniculatum*.
Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 10.—Burma.
Hamiltonii, *Wight*, in *Wight & Arn. Contrib.* 64 = *Decalepis Hamiltonii*.
Horsfieldii, *Miq.* *Fl. Ind. Bat.* ii. 470 = *Myriopteron paniculatum*.
Kleinii, *Wight & Arn. Contrib.* 65.—Ind. or.
mauritanum, *G. Don*, *Gen. Syst.* iv. 162 = *Tylophora laevigata*.
obtusum, *Turcz.* in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) i. 252 = *Baumii*.
parviflorum, *G. Don*, *Gen. Syst.* iv. 162 = *Periploca parviflora*.
sylvestre, *Wight*, in *Wight & Arn. Contrib.* 65.—Ind. or.
tomentosum, *Wight*, l. c. 64.—Burma; China.
virgatum, *G. Don*, *Gen. Syst.* iv. 162 (= *Orthosia virgata*).—Bras.
Wallichii, *Wight*, in *Wight & Arn. Contrib.* 65.—Malaya.

STREPTOCHAETA, *Schrad.* ex *Nees*, *Agrost. Bras.* 536 (1829). **GRAMINEAE**, *Benth. & Hook.* f. iii. 1111.
LEPIDELEMA, *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. (1831) 93.
spicata, *Schrad.* ex *Nees*, *Agrost. Bras.* 537.—Bras.

STREPTODESMIA, *A. Gray*, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 427. t. 47 (1854) = **Adesmia**, *DC.* (*Legumin.*)
canescens, *A. Gray*, l. c.—Patagon.

STREPTOGLOSSA, *Steetz*, ex *F. Muell.* in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* vii. (1863) 491 = **Pterigeron**, *A. Gray* (*Compos.*).
Steetzii, *F. Muell.* l. c. = *P. decurrens*.

STREPTOGYNE, *Beauv.* *Agrost.* 80. t. 16. f. 8. (1812). **GRAMINEAE**, *Benth. & Hook.* f. iii. 1191.
crinita, *Beauv.* l. c.—Am. bor.; Ind. occ.
guianensis, *Rich. ex Roem. & Schult.* *Syst.* ii. 614 = *crinita*.

STREPTOLIRION, *Edgew.* in *Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 254; et in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 90. t. 2. **COMMELINACEAE**, *Benth. & Hook.* f. iii. 852.
volubile, *Edgew. ll. cc.*—Reg. Himal.

STREPTOLOMA, *Bunge*, in *Arb. Naturf. Ver. Riga*, i. (1847) 155. **CRUCIFERAE**, *Benth. & Hook.* f. i. 77.
desertorum, *Bunge*, l. c. 156.—Turkest.

STREPTOPETALUM, *Hochst.* in *Flora*, xxiv. (1841) 665. **TURNERACEAE** [*Benth. & Hook.* f. i. 807].
Hildebrandtii, *Urb.* in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 57.—Afr. trop.
serratum, *Hochst.* in *Flora*, xxiv. (1841) 666.—Abyss.

STREPTOPUS, *Michx.* *Fl. Bor. Am.* i. 200. t. 18 (1803). **LILIACEAE**, *Benth. & Hook.* f. iii. 769.
HEXORIMA, *Rafin.* in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 351.—Cf. *Desv. Journ. Bot.* ii. (1809) 168.
KRUHSEA, *Regel*, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xi. (1859) 122.
ajanensis, *Tiling*, ex *Regel & Tiling*, l. c. 122.—Sibir.; Am. bor.
alpina, *Royle*, *Illustr. Bot. Himal.* 464 (Index), sphalm. = *Smilacina alpina*.
amplexicaulis, *Poir.* *Encyc.* vii. 467, sphalm. = seq.
amplexifolius, *DC.* *Fl. Fr.* iii. 174 = *distortus*.
borealis, *Royle*, *Illustr. Bot. Himal.* 464 (Index), sphalm. = *Smilacina borealis*.

STREPTOPUS—

- brevipes*, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 592.—Am. bor. occ.
candidus, *Walt.* *Cat. n.* 5111 = simplex.
chinensis, *Sm.* in *Rees, Cycl.* xxxvii. sub *Uvularia*, n. 4 = *Disporum pullum*.
distortus, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 200; *Bess. Prim. Fl. Galic.* i. 234.—Europ.; Am. bor.
fusca, *Royle*, *Illustr. Bot. Himal.* 464 (Index), sphalm. = *Smilacina fusca*.
lanuginosus, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 201 = *Disporum lanuginosum*.
maculatus, *Buckl.* in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* xlv. (1843) 170 (*Dispori* sp.).—Am. bor.
multiflorus, *D. Dietr.* *Syn. Pl.* ii. 1121 = *Disporum pullum*.
pallida, *Royle*, *Illustr. Bot. Himal.* 464 (Index), sphalm. = *Smilacina pallida*.
peduncularis, *Sm.* in *Rees, Cycl.* xxxvii. sub *Uvularia*, n. 5 = *Disporum pullum*.
purpurea, *Royle*, *Illustr. Bot. Himal.* 464 (Index), sphalm. = *Smilacina purpurea*.
roseus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 201. t. 18.—Am. bor.
roseus, *Wright*, ex *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 269 = *ajanensis*.
simplex, *D. Don*, *Prod. Fl. Nep.* 48.—Reg. Himal.
undulatus, *Rafin.* in *Am. Monthly Mag.* (1811) 356, nomen = *distortus*?

STREPTORHAMPHUS, *Regel*, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) 11. 176, sphalm. = **STREPTORHAMPHUS**.
Bunge = **Lactuca**, *Tourn.* (*Compos.*).

STREPTOSEMA, *Presl*, *Bot. Bemerk.* 128 (1844); in *Abh. Boehm. Ges.* V. iii. (1845) 558 = **Aspalathus**, *Linn.* (*Legumin.*).
Histrix, *Presl*, *Bot. Bemerk.* 128 = *A. Hystrix*.
verrucosa, *Presl*, l. c. = *A. verrucosa*.

STREPTOSOLEN, *Miers*, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* v. (1850) 208. **SOLANACEAE**, *Benth. & Hook.* f. ii. 910.
Benthami, *Miers*, *Illustr. S. Am. Pl.* ii. 70 = *Jamesonii*.
Jamesonii, *Miers*, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* v. (1850) 208.—N. Granat.

STREPTOSTACHYS, *Desv.* in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* ii. (1810) 190 = **Panicum**, *Linn.* (*Gramin.*).
asperifolia, *Desv.* l. c. = *P. Streptostachys*.
hirsuta, *Beauv.* *Agrost.* t. 10. f. 11 = *P. Streptostachys*.

STREPTOSTIGMA, *Regel*, *Gartenfl.* (1853) 322. t. 68 = **Cacabus**, *Benth.* (*Solan.*).
Warszewiczii, *Regel*, l. c.—Peruv.

STREPTOSTIGMA, *Thw.* in *Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 298. t. 9 A = **Harpullia**, *Roxb.* (*Sapind.*).
viridiflora, *Thw.* l. c. — *H. cupanoides*.

STREPTOTHAMNUS, *F. Muell.* *Fragm.* iii. 27 (1862). **BIXINEAE**, *Benth. & Hook.* f. i. 972.
Becklerii, *F. Muell.* l. c. 28.—Austral.
Moorii, *F. Muell.* l. c.—Austral.

STREPTYLIS, *Rafin.* *Fl. Tellur.* iv. 122 (1836) = **Aneilema**, *R. Br.* (*Commel.*).
bracteolata, *Rafin.* l. c. = *A. spiratum*.

STRIGA, *Lour.* *Fl. Cochinch.* 22 (1790). **SCROPHULARINEAE**, *Benth. & Hook.* f. ii. 968.
CAMPULEIA, *Thou.* *Gen. Nov. Madag.* 7 (1806).
MICROSYPHUS, *Presl*, *Bot. Bemerk.* 91 (1844).
PSAMMOSTACHYS, *Presl*, l. c. (1844).
aspera, *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 362.—Afr. trop.
Campuleia, *Steud.* *Nom. ed.* II. ii. 646 = *hermonthica*.
coccinea, *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 364 = *lutea*.
curviflora, *Benth.* l. c. 362.—Austral.
densiflora, *Benth.* l. c. 363.—Ind. or.
elegans, *Benth.* l. c.—Afr. austr.
euphrasioides, *Benth.* l. c. 364.—Ind. or.
Eustriga, *Steud.* *Nom. ed.* II. ii. 546 = *lutea*.

STRIGA :—

- flava*, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 704.—Sumatra.
Forbesii, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 364.—Afr. austr.
glabrata, *Benth. l. c.* = *euphrasioides*.
hermonthica, *Benth. l. c.* 365.—Afr. bor. et trop.
hirsuta, *Benth. in DC. Prod.* x. 502 = *lutea*.
humifusa, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 362 = *Cycnium humifusum*.
humilis, *Hochst. ex Benth. in DC. Prod.* x. 504 = *Cycnium humifusum*.
latericea, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 311.—Afr. trop.
lutea, *Lour. Fl. Cochinch.* 22.—As. et Afr. trop.
macrantha, *Benth. in DC. Prod.* x. 503.—Afr. trop.
Masuria, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 364.—Afr. austr.
micrantha, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 130.—Abyss.
multiflora, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 363.—Austral.
orchidea, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 43 = *orobanchoides*.
orobanchoides, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 361. t. 19.—Ind. or.; Afr. trop.
parviflora, *Benth. l. c.* 362.—Austral.
parvula, *Miq. in Journ. Bot. Néerl.* i. (1861) 113 = *lutea*.
phoenicea, *Benth. Scroph. Ind.* 40 = *lutea*.
pubiflora, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 227.—Afr. trop.
pusilla, *Hochst. ex Benth. in DC. Prod.* x. 503 = *lutea*.
Schimperiana, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 24, nomen.—Abyss.
senegalensis, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 363.—Afr. trop.
Spanogheana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 704.—Ins. Timor. vel Java.
sulphurea, *Dalz. in Gibs. Bomb. Fl.* 182.—Ind. or.
Thunbergii, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 363.—Afr. austr.
zangebarica, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* t. 35 = *hirsuta*.
zanzibarensis, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880–82) 310.—Afr. trop.

STRIGILIA, Cav. Diss. vii. 358. t. 201 (1789) = **Styrax**, Linn.

- acuminata*, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* iii. (1859) 282 = *Styr. acuminatum*.
alba, *Miers, l. c.* = *Styr. album*.
argentea, *Miers, l. c.* = *Styr. argenteum*.
aurea, *Miers, l. c.* = *Pamphilia aurea*.
camporum, *Miers, l. c.* = *Styr. camporum*.
chrysastera, *Miers, l. c.* = *Styr. chrysasterum*.
cordata, *Poir. Encyc.* vii. 469 = *Styr. cordatum*.
crocea, *G. Don, Gen. Syst.* i. 679.—Peruv.
ferruginea, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* iii. (1859) 283 = *Styr. ferrugineum*.
florida, *Miers, l. c.* 282 = *Styr. floridum*.
Gardneriana, *Miers, l. c.* = *Styr. Gardnerianum*.
glabrata, *Miers, l. c.* 283 = *Styr. glabratum*.
guayanensis, *Miers, l. c.* 282 = *Styr. glabrum*.
laevis, *Miers, Contrib. Bot.* i. t. 30 = *Styr. leiophyllum*.
latifolia, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* iii. (1859) 282 = *Styr. latifolium*.
leiophylla, *Miers, l. c.* 283 = *Styr. leiophyllum*.
leprosa, *Miers, l. c.* = *Styr. leprosum*.
longiflora, *Miers, l. c.* 282 = *Styr. longiflorum*.
macrophylla, *Miers, l. c.* 283 = *Styr. macrophyllum*.
nervosa, *Miers, l. c.* 282 = *Styr. reticulatum*.
obliquinervia, *Miers, l. c.* = *Styr. chrysasterum*.
oblonga, *Poir. Encyc.* vii. 469 = *Styr. oblongum*.
ovata, *Poir. l. c.* = *Styr. ovatum*.
pallida, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* iii. (1859) 282 = *Styr. pallidum*.
parvifolia, *Miers, l. c.* = *Styr. parvifolium*.
pauciflora, *Miers, l. c.* 283 = *Styr. pauciflorum*.
Pavonii, *Miers, l. c.* = *Styr. Pavonii*.
Pohlil, *Miers, l. c.* 282 = *Styr. Pohlil*.
psilophylla, *Miers, l. c.* 283 = *Styr. psilophyllum*.
punctata, *Miers, l. c.* 282 = *Styr. punctatum*.
racemosa, *Cav. Diss.* vii. 358 = *Styr. racemosum*.
reticulata, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III.* iii. (1859) 282 = *Styr. reticulatum*.
subcordata, *Miers, l. c.* = *Styr. subcordatum*.
tomentosa, *Miers, l. c.* 283 = *Styr. tomentosum*.

STRIGOSELLA, Boiss. *Diagn. Ser.* II. iv. 22 (1853) = **Malcomia**, R. Br. Crucif.).
cabulica, Boiss. l. c. = *M. cabulica*.

STROBIDIA, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 614 (1860).
SCITAMINEAE, *Benth. & Hook. f.* iii. 647.
sumatrana, *Miq. l. c.*—Sumatra.

STROBILA, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 327 (1837) = **Arnebia**, *Forsk. (Borag.)*.
hispidissima, *G. Don, l. c.* = *A. hispidissima*.

STROBILA, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 (Quid?).

STROBILACANTHUS, *Griseb. in Bonplandia*, vi. (1858) 10. **ACANTHACEAE**, *Benth. & Hook. f.* ii. 1096.
lepidospermus, *Griseb. l. c.*—Panama.

STROBILANTHES, *Blume, Bijdr.* 781, 796 (1826).
ACANTHACEAE, *Benth. & Hook. f.* ii. 1086.

ADENACANTHUS, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 75, 196 (1832).

BUTERAEAE, *Nees, l. c.* (1832).

DIDYPSANDRA, *Wight, Ic.* iv. iv. 3. t. 1515 (1850).

ENDOPOGON, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 76 (1832).

GOLDFUSSIA, *Nees, l. c.* 196 (1832).

GUTZLAFFIA, *Hance, in Hook. Kew Journ.* i. (1849) 142.

LEPTACANTHUS, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 75, 169 (1832).

MACKENZIEA, *Nees, in DC. Prod.* xi. 308 (1847).

PHLEBOPHYLLUM, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 75, 102 (1832).

TRIAENANTHUS, *Nees, in DC. Prod.* xi. 169 (1847).

acrocephalus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 473.—Reg. Himal.

acuminatus, *T. Anders. l. c.*—Burma.

acuminatus, *T. Anders. l. c.*, partim = *longipes*.

adenophorus, *Bedd. Ic. Pl. Ind. Or.* i. 53. t. 225.—Ind. or.

adenophorus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 182 = *lanceolatus*.

adnatus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 436.—Reg. Himal.

agrestis, *C. B. Clarke, l. c.* 466.—Reg. Himal.

alatus, *Blume, Bijdr.* 798.—Java.

alatus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 194.—Reg. Himal.

alatus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 646 = *Wallichii*.

amabilis, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 476.—Ind. or.

amplectens, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 86 = *auriculatus*.

anceps, *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 312.—Ind. or.

ancolanus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 799.—Sumatra.

Andersonii, *Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III.* i. (1864) 55.—Ind. or.

angustifrons, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 466.—Reg. Himal.

anisophyllum, *T. Anders. in Cat. Pl. Hort. Bot. Calc.* 43; et in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 478.—Reg. Himal.

anisostachys, *Boj. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 368 (= *Anisostachya Bojeri*).—Madag.

apricus, *T. Anders. ex Benth. Fl. Hongk.* 262.—China.

arborea, *Span. in Linnaea*, xv. (1841) 328.—Ins. Timor.

argutus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 188 = *sexennis*.

Arnottianus, *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 312.—Zeylan.

asper, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 385 = *scaber*.

asper, *Wight, Ic.* t. 1518.—Ind. or.

aspermus, *Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 187 = *Heyneanus*.

aspermus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 183.—Zeylan.

atropurpureus, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 86.—Reg. Himal.

attenuatus, *Jacq. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 193 = *alatus*.

auriculatus, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 86. t. 195.—Ind. or.; Burma.

barbatus, *Nees, l. c.* 85.—Ind. or.

STROBILANTHES :—

- Beddomei*, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 482 = *gracilis*.
bibracteatus, *Blume, Bijdr.* 799.—Java.
biceps, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 804 = *capitatus*.
boërhaavioides, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 479.—Reg. Himal.
bolumpattianus, *Bedd. Ic. Pl. Ind. Or.* i. 46.—Ind. or.
Brandisii, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 475.—Burma.
Brunonianus, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 87.—Reg. Himal.
burmanicus, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 92 = *Hemigraphis elegans*.
callosus, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 85.—Ind. or.
callosus, *Nees, l. c.*, partim = *zeylanicus*.
calycinus, *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 312.—Zeylan.
campanulatus, *Wight, Ic.* t. 1562 = *Heyneanus*.
canaricus, *Bedd. Ic. Pl. Ind. Or.* i. 50.—Ind. or.
capitatus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 475.—Reg. Himal.; Burma.
caudatus, *T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 228.—Ind. or.
cerinthoides, *Nees, in DC. Prod.* xi. 724 = *sexennis*.
cernuus, *Blume, Bijdr.* 797.—Java.
Championi, *T. Anders. ex Benth. Fl. Hongk.* 261 = *flaccidifolius*.
ciliatus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 468, partim = *warreensis*.
ciliatus, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 85.—Ind. or.
collinus, *Nees, l. c.* 86.—Ins. Penang.
coloratus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 481.—Reg. Himal.
coloratus, *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 312 = *trifidus*, *calycinus*.
consanguineus, *T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 226, partim = *exareolatus*.
consanguineus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 435.—Ind. or.
crassifolius, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 800.—Sumatra.
crataegifolius, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 477.—Burma.
crenulatus, *Boj. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 369 = *Justicia tenella*.
crenulatus, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 148 = *hirtus*.
crinitus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 481 = *coloratus*.
crispus, *T. Anders. l. c.* = *phyllostachys*.
crispus, *Blume, Bijdr.* 798.—Java.
cuspidatus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 465.—Ind. or.
Dalhousianus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 460.—Reg. Himal.
Dalzellii, *T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c.* 443 = *lupulinus*.
dasypermus, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 94.—Burma.
debilis, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 467.—Burma.
decurrens, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 470 = *adnatus*.
decurrens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 189.—Ind. or.
deflexus, *T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 227.—Zeylan.
denticulatus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 483.—Reg. Himal.
diclipteroides, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 802.—Java.
dimorphotrichus, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 355.—China.
discolor, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 477.—Reg. Himal.
divaricatus, *T. Anders. l. c.* 478.—Reg. Himal.
Dupeni, *Bedd. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 453.—Ind. or.
durus, *T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c.* 447 = *phyllostachys*.
echinatus, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 85 = *pectinatus*.
Edgeworthianus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 190 = *auriculatus*.
elatus, *Fungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie*, ii. (1845) 53.—Malaya.
elegans, *Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 484, nomen.—Munipore.
elongatus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 470.—Reg. Himal.

STROBILANTHES:—

- eriocephalus*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 466 = *ixiocephalus*.
erosus, Nees, in DC. Prod. xi. 180.—Java.
exareolatus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 432.—Zeylan.
exsertus, C. B. Clarke, l. c. 445.—Zeylan.
extensus, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 47. t. 202 = Newii.
extensus, Nees, in DC. Prod. xi. 195.—Reg. Himal.
Falconeri, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 484.—Burma.
farinosus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Ind. iv. 470.—Burma.
filiformis, Blume, Bijdr. 800.—Java.
fimbriatus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 470, partim = *macrostegius*.
fimbriatus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 86.—Reg. Himal.
flaccidifolius, Nees, in DC. Prod. xi. 194.—Ind. or.; Burma; China.
flaccidus, G. Mann, Assam For. Rep. (1876-77) par. 135 = *flaccidifolius*.
flavus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) II. 78 = *Hemigraphis flava*.
foetidissimus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 93.—Burma.
foliosus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 467.—Ind. or.
formosanus, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 294.—Ins. Formosa.
Gardnerianus, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 226.—Zeylan.
geniculatus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 459.—Reg. Himal.
glabratus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 85.—Reg. Himal.
glandulosus, Blume, Bijdr. 800.—Java.
glandulosus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 92.—Ins. Andaman.
glaucescens, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 85; Cat. n. 7155 = *Hemigraphis glaucescens*.
glomeratus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 475.—Reg. Himal.; Burma.
glutinosus, J. Grah. Cat. Pl. Bomb. 162 = *ixiocephalus*.
glutinosus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 86.—Reg. Himal.
Goldfussia, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. Suppl. 71 (excl. syn.) = *isophyllus*.
gossypinus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 466.—Ind. or.
gracilis, T. Anders. l. c. 474 = *geniculatus*.
gracilis, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 55.—Ind. or.
Grahamianus, Wight, Ic. t. 1520 = *callosus*.
Griffithianus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 481.—Reg. Himal.
haplanthoides, T. Anders. l. c. 471.—Burma.
Helferi, T. Anders. l. c. 472.—Burma.
helicoides, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 229.—Zeylan.
Helictus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 479.—Reg. Himal.
heteromallus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 437.—Ind. or.
Heyneanus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 85.—Ind. or.
hirsutissimus, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 313 = *sexennis*.
hirsutus, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 386 = *Hemigraphis Decaisneana*.
hirtus, Blume, Bijdr. 797.—Java.
homotropus, Nees, in DC. Prod. xi. 187.—Ind. or.
Hookeri, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 312.—Zeylan.
hypoleucus, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 226 = *rhytisperma*.
imbricatus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 86.—Burma.
inflatus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 476.—Reg. Himal.
interruptus, Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 474 = *sexennis*.
involutus, Blume, Bijdr. 799.—Java.
isophyllus, T. Anders. in Cat. Pl. Hort. Bot. Calc. 43; et in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 478.—Ind. or.
ixiocephalus, Benth. in Flora, xxxii. (1849) 557.—Ind. or.

STROBILANTHES:—

- japonicus*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 124.—China; Japon.
jeyporensis, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 50.—Ind. or.
karensium, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 94 = *Falconeri*.
khasyanus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 471.—Reg. Himal.
Kunthianus, T. Anders. ex Benth. Fl. Hongk. 262, in nota.—Ind. or.
lachenensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 465.—Reg. Himal.
lactatus, Hook. Bot. Mag. t. 4366 (Ruelliae sp.?).—Bras.
laevigatus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 467.—Reg. Himal.
laevigatus, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 484, nomen.—Reg. Himal.
lamifolius, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 476.—Reg. Himal.
lamioides, T. Anders. l. c. 485.—Burma.
lanatus, Nees, in DC. Prod. xi. 191.—Ind. or.
lanceifolius, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 480.—Burma.
lanceolatus, Hook. ex Nees, in DC. Prod. xi. 181.—Zeylan.
laxus, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 228.—Zeylan.
longifolius, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 797.—Java.
longipes, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 455.—Burma.
lupulinus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 469 = *Heyneanus*, trifidus.
lupulinus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 85.—Ind. or.
luridus, Wight, Ic. t. 1515-16.—Ind. or.
Maclellandi, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 453.—Burma.
macrostachya, C. B. Clarke, l. c. 442 = *anceps*.
macrostegius, C. B. Clarke, l. c. 456.—Reg. Himal.
maculatus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 473 = *petiolaris*.
maculatus, Nees, in DC. Prod. xi. 190.—Reg. Himal.
madagascariensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 220.—Madag.
Maingayi, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 448.—Malaya.
Mastersi, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 481.—Assam.
micranthus, Wight, Ic. t. 1519.—Ind. or.
microcarpus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 482.—Burma.
microstachyus, Benth. in Flora, xxxii. (1849) 557 = *anceps*.
monadelphus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 87.—Reg. Himal.
moschiferus, Blume, Bijdr. 800.—Java.
multidens, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 461.—Reg. Himal.
mysurensis, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 86 = *Asystasia Lawiana*.
Neesianus, Wight, Ic. t. 1523 = *ixiocephalus*.
Neesii, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 93.—Burma.
neglectus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 435 = *consanguineus*.
neilgherrensis, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 45.—Ind. or.
Newii, Bedd. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 464.—Ind. or.
nigrescens, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 226.—Zeylan.
nobilis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 471.—Reg. Himal.
nutans, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 475.—Reg. Himal.
oliganthus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 124.—China; Japon.
oligocephalus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 461.—Reg. Himal.
pallidus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 470 = *decurrens*.
Panichanga, T. Anders. l. c. 478.—Reg. Himal.
paniculatus, T. Anders. l. c. 483.—Zeylan.
paniculatus, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 46. t. 199 = *rubicundus*.
paniculatus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 802 = *alatus*.

STROBILANTHES:—

- papillosus*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 468.—Ind. or.
parabolicus, Nees, in DC. Prod. xi. 180.—Java.
Parishii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 431.—Burma.
parviflorus, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 45 = *warreensis*.
paucinervis, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 470.—Burma.
pauper, C. B. Clarke, l. c. 463.—Reg. Himal.
pectinatus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 474.—Reg. Himal.
pedunculatus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 803.—Java.
pentstemonoides, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 477.—Reg. Himal.
pentstemonoides, T. Anders. l. c., partim = *Dalhousianus*.
perfoliatus, T. Anders. l. c. 471.—Ind. or.
Perrottetianus, Nees, in DC. Prod. xi. 179.—Ind. or.
petiolaris, Nees, l. c. 189, partim.—Reg. Himal.
petiolaris, Nees, l. c., partim = *Brunonianus*.
phyllocaulos, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 464.—Reg. Himal.
phyllostachyus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xi. (1871) II. 75.—Burma.
plumulosus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 86 = *auriculatus*.
polybotrys, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 803.—Sumatra.
polycephalus, Miq. l. c. 798.—Java.
polythrix, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 470.—Reg. Himal.
pterocaulis, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 93 = *imbricatus*.
pulcherrimus, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 229.—Ind. or.
pulneyensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 438.—Ind. or.
pumilus, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 310.—Japon.
punctatus, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 47, in obs. = *pulneyensis*.
punctatus, Nees, in DC. Prod. xi. 183 = *anceps*.
purpureus, Hook. ex Nees, l. c. = *asperimus*.
quadrangularis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 460.—Reg. Himal.
radicans, T. Anders. in Benth. Fl. Hongk. 262.—China.
reflexus, Nees, in DC. Prod. xi. 194 = *alatus*.
remotus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 471.—Tenasserim.
reptans, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 368 = *Justicia trifolioides*.
rhamnifolius, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 226.—Zeylan.
rhombifolius, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 461.—Reg. Himal.
rhytispermus, C. B. Clarke, l. c. 432.—Zeylan.
roscus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 84.—Burma.
rubescens, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 479.—Reg. Himal.
rubicundus, T. Anders. l. c. 483.—Ind. or.
rubicundus, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 229 = *paniculatus*.
rufescens, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 472.—Burma.
rugosus, Wight, Ic. t. 1619 = *Heyneanus*.
Sabinianus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 86.—Reg. Himal.
salicifolius, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 484.—Reg. Himal.
scaber, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 227, partim = *Hemigraphis flava*.
scaber, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 84.—Ind. or.; Burma.
scrobiculatus, Dalz. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 445.—Ind. or.
secundus, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 480.—Reg. Himal.
sessilis, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 85.—Ind. or.
sessiloides, Wight, Ic. t. 1512 = *praece*.
sexennis, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 48. t. 206 = *homotropus*.
sexennis, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 312.—Ind. or.
Simonsii, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 474.—Reg. Himal.

STROBILANTHES:—

- speciosus, *Blume, Bijdr.* 799.—Java.
 spicatus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 484.—Reg. Himal.
 stenodon, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 432.—Zeylan.
 stenophyllus, *C. B. Clarke, l. c.* 472.—Reg. Himal.
 subcapitatus, *C. B. Clarke, l. c.* 455.—Burma.
 subnndatus, *C. B. Clarke, l. c.* 472.—Reg. Himal.
 subflaccidus, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 94 = acuminatus.
 sumatranus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 802.—Sumatra.
 tamburensis, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 454.—Reg. Himal.
 Tatei, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* v. (1882) 81.—Austral.
 tener, *Nees, in DC. Prod.* xi. 184 = trifidus.
 tetrapteris, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 342 = barbatus.
 Teysmanni, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 799.—Snmatra.
 Thomsoni, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 478.—Reg. Himal.
 Thwaitesii, *T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 227.—Zeylan.
 timorensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 178.—Ins. Timor.
 trifidus, *Hook. ex Nees, l. c.* 186 = calycinus.
 trifidus, *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 312.—Zeylan.
 tristis, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 470.—Ind. or.
 urophyllus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 192.—Reg. Himal.
 verruculosus, *Nees, l. c.* 181.—Ind. or.
 vestitus, *Nees, l. c.* 180.—Zeylan.
 violaceus, *Bedd. Ic. Pl. Ind. Or.* i. 48.—Ind. or.
 violaeifolius, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 485.—Reg. Himal.
 virgatus, *Blume, ex Zipp. in Flora.* xii. (1829) 284, nomen.—N. Guin.
 viscosus, *T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 226.—Zeylan.
 Walkeri, *Arn. ex Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 312.—Zeylan.
 Wallichii, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 87.—Reg. Himal.
 warreensis, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 341.—Ind. or.
 Wightianus, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii. 86.—Ind. or.
 Zenkerianus, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 467.—Ind. or.
 zeylanicus, *T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 227.—Zeylan.

STROBILANTHOS, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon.* vii. (1880) 56 = praece.

STROBILANTHUS, *Reichb. Handb.* 190 (1837) = praece.

STROBILOCARPOS, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 231 (1880) = seq.

STROBILOCARPUS, *Klotzsch, in Linnaea.* xiii. (1839) 330 = *Grubbia*, *Berg. (Santal.)*.
diversifolius, *Klotzsch, l. c.* 381 = *G. stricta*.

STROBILORHACHIS, *Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* vii. (1839) 307 = *Aphelandra*, *R. Br. (Acanth.)*.
Blanchetiana, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 85.—Bras.
glabra, *Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* vii. (1839) 308 = *A. prismatica*.
hirta, *Klotzsch, l. c.* = *A. lutea*.
prismatica, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 84 = *A. prismatica*.

STROBOCALYX, *Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix.* (1861) 170 = *Vernonia*, *Schreb. (Compos.)*.
arborescens, *Sch. Bip. l. c.* 171 = *V. arborescens*.
Blumeana, *Sch. Bip. l. c.* = *V. arborescens*.
celebica, *Sch. Bip. l. c.* = *V. arborescens*.
Doniana, *Sch. Bip. l. c.* = *V. Doniana*.
elaegnifolia, *Sch. Bip. l. c.* = *V. elaeagnifolia*.
elliptica, *Sch. Bip. l. c.* = *V. elaeagnifolia*.
glandulosa, *Sch. Bip. l. c.* = *V. glandulosa*.
insularum, *Sch. Bip. l. c.* 170 (= *Monosis insularum*).—Ins. Fiji.

STROBOCALYX:—

- javanica*, *Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix.* (1861) 171 = *Vernonia arborescens*.
obovatus, *Sch. Bip. l. c.* 172 = *V. scandens*.
pyrrhopappa, *Sch. Bip. l. c.*—Ins. Philipp.
secundifolia, *Sch. Bip. l. c.* 171 = *V. secundifolia*.
solanifolia, *Sch. Bip. l. c.* = *V. solanifolia*.
Wightiana, *Sch. Bip. l. c.* 170 = *V. Monosis*.

STROBON, *Rafin. Sylva Tellur.* 132 (1838) = *Cistus*, *Tourn., &c.*
halimifolium, *Rafin. l. c.* = *Helianthemum halimifolium*.
vaginatum, *Rafin. l. c.* = *C. vaginatus*.

STROBUS, *Opiz, in Lotos.* iv. (1854) 94 = *Pinus*, *Tourn. (Conif.)*.
Weymouhiana, *Opiz, l. c.* = *P. Strobilus*.

STROEMERIA, *Roxb. Fl. Ind.* ii. 78 (1832), *sphalm.* = seq.

STROEMIA, *Vahl, Symb. Bot.* i. 19 (1790) = *Cadaba*, *Forsk. (Cappar.)*.
capparoides, *Spreng. Syst.* i. 766 = *C. capparoides*.
dubia, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 802 = *C. farinosa*.
farinosa, *Vahl, Symb. Bot.* i. 20 = *C. farinosa*.
glandulosa, *Vahl, l. c.* = *C. glandulosa*.
longifolia, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64 = *C. longifolia*.
ovalifolia, *Zipp. ex Span. in Linnaea.* xv. (1841) 164 = *C. capparoides*.
rotundifolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 20 = *C. rotundifolia*.
tetrandra, *Vahl, l. c.* = *C. indica*.
trifoliata, *Roxb. Hort. Beng.* 86; *Fl. Ind.* ii. 79 = *C. trifoliata*.
trifoliata, *Vahl, ex Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 114 = *Euadenia trifoliata*.
trinervia, *D. Dietr. Syn. Pl.* i. 802 = *Cleome coluteoides*.

STROGANOVIA, *Lindl. Veg. Kingd.* 355 (1847) = seq.

STROGANOWIA, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 386. *CRUCIFERAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 88.
brachyota, *Kar. & Kir. l. c.* 387.—Sibir. altaica.
intermedia, *Kar. & Kir. l. c.* xv. (1842) 162.—Sibir. altaica.
paniculata, *Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 242.—Turkestan.
sagittata, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 387.—Sibir. altaica.

STROMANTHE, *Sond. in Hamb. Gartenz.* v. (1849) 225. *SCITAMINEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 650.
KERCHOVEA, *Jorissens, in Belg. Hort.* (1882) 201. t. 8.
MARANTOPSIS, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) i. 97.
amabilis, *Hort. ex E. Morr. in Belg. Hort.* xxv. (1875) 135.—Bras.
eximia, *Eichl. in Berl. Phys. Abh.* (1884) 81 = *Maranta eximia*.
Lubbersiana, *E. Morr. in Belg. Hort.* xxxii. (1882) 21. t. 1 (*Myrosotis* sp.).—Bras.
lutea, *Eichl. in Berl. Phys. Abh.* (1884) 81.—Venezuela.
Porteana, *A. Gris, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* ix. (1858) 185.—Bras.
sanguinea, *Sond. in Hamb. Gartenz.* v. (1849) 225.—Ind. or.
Schottiana, *Eichl. in Berl. Phys. Abh.* (1884) 81.—Bras.
Selloi, *A. Gris, ex Horan. Prod. Monog. Scitam.* 10 = *Maranta Selloi*.
setosa, *A. Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* vi. (1859) 348 = *Ctenanthe setosa*.
spectabilis, *Lem. Jard. Fleur.* iv. (1854) t. 401; et *Misc.* 63 = *sanguinea*.
Tonckat, *Eichl. in Berl. Phys. Abh.* (1884) 80.—Guian.

STROMATOCACTUS, *Karw. ex Foerst. Handb. Cact. ed. II.* i. 229 (1885) = *Mammillaria*, *Haw. (Cact.)*.
Kotschoubeyi, *Karw. ex Foerst. l. c.* 232 (= *Anhalonium sulcatum*).—Mexic.

STROMBOCARPA, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 243 = *Prosopis*, *Linn. (Legumin.)*.
brevifolia, *Nutt. ex A. Gray, Pl. Wright.* i. 60 = *P. pubescens*.
cinerascens, *A. Gray, l. c.* 61 = *P. cinerascens*.
odorata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 475 = *P. juliflora*?
pubescens, *A. Gray, Pl. Wright.* i. 60 = *P. pubescens*.
reptans, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 475 = *P. reptans*.
strombulifera, *A. Gray, l. c.* = *P. strombulifera*.

STROMBOCARPUS, *Benth. & Hook. f. Gen.* i. 591 (1867), *sphalm.* = praece.

STROMBODURUS, *Willd. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 647 (1841) = *Pentarrhapis*, *H. B. & K. (Inc. Sed.)*.
gracilis, *Willd. ex Steud. l. c.* = *P. scabra*.

STROMBOSIA, *Blume, Bijdr.* 1154 (1826). *OLACINEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 348.
LAVALLEA, *Baill. Adansonia*, ii. (1862) 361.
ceylanica, *Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist.* vi. (1846) 350.—Zeylan.
grandifolia, *Hook. f. ex Benth. in Hook. Niger Fl.* 258.—Afr. trop.
javanica, *Blume, Bijdr.* 1155.—Burma; Malaya.
javanica, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 42 = *ceylanica*.
lucida, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 207, nomen.—Java.
philippinensis, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 23, 102.—Ins. Philipp.

STRONGYLOCALYX, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 89. t. 54 (1849) = *Eugenia*, *Mich. (Myrtac.)*.
hemisphaericus, *Blume, l. c.* 90 = *E. hemisphaerica*.
lancaefolius, *Blume, l. c.* 89, in obs. = *E. Wallichii*.
leptostachyus, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1 443 = *E. leptostemon*.
leptostemon, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 89 = *E. leptostemon*.
oblatus, *Blume, l. c.*, in obs. = *E. oblata*.
praecox, *Blume, l. c.*, in obs. = *E. Wallichii*.

STRONGYLODON, *Vog. in Linnaea.* x. (1836) 585. *LEGUMINOSAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 532.
Lastellianus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 381.—Madag.
lucidus, *Seem. Fl. Vit.* 61.—Ins. Fiji.
macrobotrys, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 448. t. 49.—Ins. Philipp.
madagascariensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 267.—Madag.
ruber, *Vog. in Linnaea.* x. (1836) 585.—Ins. Sandvic.

STRONGYLOMA, *DC. Prod.* vii. 52 (1838) = *Nassauvia*, *Comm. (Compos.)*.
axillare, *DC. l. c.* = *N. axillaris*.
glomerulosum, *DC. l. c.* = *N. glomerulosa*.

STRONGYLOSPERMA, *Less. Syn. Comp.* 261 (1832) = *Cotula*, *Tourn. (Compos.)*.
australe, *Less. l. c.* = *C. australis*.
reptans, *Benth. in Enum. Pl. Hueg.* 60 = *C. reptans*.

STROPHA, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 4; ed. II. 66 (1827) = *Chloranthus*, *Sw.*

STROPHADES, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvii. (1842) 82 = *Erysimum*, *Tourn. (Crucif.)*.
lanceolata, *Boiss. l. c.* 83 = *E. Strophades*.
linearis, *Boiss. l. c.* = *E. oleaeifolium*.

STROPHANTHUS, *DC. in Bull. Soc. Philom.* iii. (1802) 122. t. 8. *APOCYNACEAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 714.
CERCOCOMA, *Wall. Cat. n.* 1623 (1831?).
CHRISTYA, *Harv. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 134. t. 21.
alterniflorus, *Spreng. Syst.* i. 638.—China.
brevicaudatus, *Wight, Ic.* t. 1302.—Burma; Malaya.
Bullenianus, *Mast. in Gard. Chron.* (1870) 1471. f. 257.—Afr. trop.
capensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 419.—Afr. austr.
caudatus, *Kurz, For. Fl. Brit. Burma.* ii. 192 = *Wallichii*?

STROPHANTHUS :—

- caudatus*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 257 = *dichotomus*.
chinensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 85 = *divergens*.
Cumingii, A. DC. in DC. Prod. viii. 418.—Ins. Philipp.
dichotomus, DC. in Bull. Soc. Philom. iii. (1802) 123.—Burma; Malaya.
dichotomus, Wall. Cat. n. 1641 = *Wallichii*.
divaricatus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 199 = *divergens*.
divaricatus, Wall. Cat. n. 1642.—Burma.
divergens, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-Jun. 1827) 177.—China.
Griffithii, Wight, Ic. t. 1300 = *dichotomus*.
hirtus, Poir. in Dict. Sc. Nat. li. 150 = seq.
hispidus, DC. in Bull. Soc. Philom. iii. (1802) 123.—Afr. austr.
Horsfieldianus, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 442 = *dichotomus*.
Jackianus, Wall. Cat. n. 1643.—Ins. Penang.
Kombe, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1098.—Afr. trop.
laurifolius, DC. in Bull. Soc. Philom. iii. (1802) 123.—Afr. trop.
longicaudatus, Wight, Ic. t. 1299 = *dichotomus*.
pendulus, Hook. in W. Gray, Trav. West. Afr. 392. t. C = *sarmentosus*.
pentaphyllus, Griff. Notul. iv. 78 = *dichotomus*.
Petersianus, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 276.—Afr. trop.
sarmentosus, DC. in Bull. Soc. Philom. iii. (1802) 123. t. 8. f. 1.—Afr. trop.
scandens, Griff. Notul. iv. 743 (an seq.?).—Malacca.
scandens, Reinw. & Schult. Syst. iv. 412 = *dichotomus*.
Senegambiae, A. DC. in DC. Prod. viii. 418 = *sarmentosus*.
Stanleyanus, Hort. ex Hook. Bot. Mag. sub t. 4466 = *Roupellia grata*.
terminalis, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 56 = *dichotomus*.
Wallichii, A. DC. in DC. Prod. viii. 418.—Ind. or.
Wightianus, Wall. Cat. n. 1659.—Ind. or.

- STROPHIOSTOMA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 258 = *Myosotis*, Tourn. (Borag.).
amoena, Rupr. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1852); et in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xiv. (1856) 229 = *M. amoena*.
propinqua, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 259 = *M. propinqua*.
sparsiflorum, Turcz. l. c. 258 = *M. sparsiflora*.

- STROPHIS**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 12 (1866) = *Dioscorea*, Plum.
cirrhusa, Salisb. l. c. 12 = *D. cirrhosa*.

- STROPHIUM**, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 247 (1867) = *Arenaria*, Rupp. (Caryoph.).
filiforme, Dulac, l. c. 248 = *A. muscosa*.
trinervium, Dulac, l. c. = *A. trinervia*.

- STROPHOLIRION**, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 149 (1856). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 799.
MACROSCAPA, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 148.
RUPALLEYA, Morière, in Bull. Soc. Linn. Norman. l. viii. (1864) 313. t. 15.
californicum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 149. t. 21.—Calif.

- STROPHOPAPPUS**, DC. Prod. v. 75 (1836) = *Stilpnopappus*, Mart. (Compos.).
bicolor, DC. l. c. = *Stilpnopappus bicolor*.
emarginatus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 141, sphalm. = *Stilpnopappus emarginatus*.
Riedelianus, Baker, l. c. 140, sphalm. = *Stilpnopappus bicolor*.

- STROPHOSTYLES**, Ell. Sketch, ii. 229 (1822) = *Phaseolus*, Tourn. (Legumin.).
angulosa, Ell. l. c. = *P. diversifolius*.
helvola, Ell. l. c. 230 = *P. helvolus*.
peduncularis, Ell. l. c. = *P. helvolus*.

- STROPHOSTYLES**, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 147 (1835) = *Vigna*, Savi (Legumin.).
capensis, E. Mey. l. c. = *V. capensis*.

- STRUCHIUM**, P. Br. Hist. Jamaic. 312. t. 34 (1756) = *Sparganophorus*, Vaill. (Compos.).
africanum, Beauv. Fl. Owar. i. 81. t. 48 = *Sparg. Vaillantii*.
americanum, Poir. Encyc. vii. 475 = *Sparg. Vaillantii*.

- STRUKERIA**, Vell. Fl. Flum. 8; i. t. 20 (1825) = *Vochisia*, Juss.
oppugnata, Vell. ll. cc. = *V. oppugnata*.

- STRUMARIA**, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. 13. tt. 356–360 (1790). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 728.
CHOERADODIA, Herb. Amaryll. 87 (1837).
EUDOLON, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 127 (1866).
HYMENETRON, Salisb. l. c. 128 (1866).
NESYSTYLIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 123 (1836).
PUGIONELLA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 128 (1866).
STYLAGO, Salisb. l. c. 127 (1866).
angustifolia, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. 13. t. 359; Coll. Suppl. 48.—Afr. austr.
Baueriana, Herb. Amaryll. 394. t. 45. f. 5 = *truncata*.
chilensis, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 130, 284.—Chili.
crispa, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1363 = *Hessea crispa*.
filifolia, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. 14. t. 361 = *Hessea filifolia*.
gemmata, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1620 = *Hessea geminata*.
lilifolia, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1187 = *Hessea filifolia*.
linguaefolia, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. 13. t. 356 = *truncata*.
rubella, Jacq. l. c. t. 358.—Afr. trop.
spiralis, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 213 = *Carpolyza spiralis*.
stellaris, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1363 = *Hessea stellaris*.
strumosa, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 127 = *Hessea filifolia*.
truncata, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. 13. t. 357.—Afr. trop.
undulata, Berg. ex Kunth, Enum. Pl. v. 627 = *Hessea gemmata*.
undulata, Jacq. Ic. Pl. Rar. ii. 14. t. 360.—Afr. austr.

- STRUMARIUM**, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 89 = *Xanthium*, Linn. (Compos.).

- STRUMPFIA**, Jacq. Enum. Pl. Carib. 8 (1760); Select. Am. 218 (1763). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 117.
PATSIOTTI, Adans. Fam. ii. 84 (1763).
dubia, [Sprang.] Bot. Gart. Halle, 93, nomen = seq.?
maritima, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28; Select. Am. 218.—Ind. occ.

- STRUTHANTHUS**, Mart. in Flora, xiii. (1830) 102 = *Loranthus*, Linn.
acuminatus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. acuminatus*.
acutifolius, Blume, l. c. = *L. acutifolius*.
aduncus, Blume, l. c. = *L. aduncus*.
affinis, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. affinis*.
alveolatus, G. Don, Gen. Syst. iii. 410 = *L. alveolatus*.
amplexicaulis, G. Don, l. c. = *L. amplexicaulis*.
anceps, G. Don, l. c. 411 = *L. anceps*.
andrastylus, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 74.—Bras.
attenuatus, Eichl. l. c. 72 = *L. attenuatus*.
avicularis, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. avicularis*.
buxifolius, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. buxifolius*.
calobotrys, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 79.—Bras.
chordocladus, Eichl. l. c. 70, in obs. = *L. chordocladus*.
citricola, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. citricola*.
complexus, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 73.—Bras.
concinus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. concinns*.
conduplicatus, Mart. l. c. = *L. conduplicatus*.

STRUTHANTHUS :—

- confertus*, Mart. in Flora, xiii. (1830) 104 = *Loranthus confertus*.
crassipes, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 70, in obs. = *L. crassipes*.
cuspidatus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. cuspidatus*.
Deppeanus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. Deppeanus*.
Destructor, Blume, l. c. = *L. Destructor*.
dichotrianthus, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 75.—Am. trop.
domingensis, G. Don, Gen. Syst. iii. 414 = *L. dominicensis*.
elegans, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. elegans*, Mart.
ellipticus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. ellipticus*.
emarginatus, G. Don, Gen. Syst. iii. 410 = *L. emarginatus*.
erythrocarpus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. erythrocarpus*.
Escholzianus, Mart. l. c. 104 = *L. Eschscholzianus*.
Eschscholzianus, Schult. f. Syst. vii. 1613 = *praece.*
eugenioides, Blume, in Schult. f. l. c. 1731 = *L. eugenioides*.
flexicaulis, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. flexicaulis*.
floribundus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 (Quid?).—Hab.?
glomeratus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 104 = *L. glomeratus*.
glomeriflorus, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 84.—Bras.
guadalupensis, G. Don, Gen. Syst. iii. 414 = *L. guadalupensis*.
guianensis, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 978 = *L. syringaeifolius*.
heterophyllus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. heterophyllus*.
interruptus, G. Don, Gen. Syst. iii. 413 = *L. interruptus*.
lancifolius, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. lancifolius*.
laurifolius, Blume, l. c. = *L. laurifolius*.
laxiflorus, G. Don, Gen. Syst. iii. 414 = *L. laxiflorus*.
leptostachyus, G. Don, l. c. 411 = *L. leptostachyus*.
ligustrifolius, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. ligustrifolius*.
longepedunculatus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. longipedunculatus*.
Magdalenae, G. Don, Gen. Syst. ii. 414 = *L. Magdalenae*.
marginatus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. marginatus*.
microphyllus, G. Don, Gen. Syst. iii. 413 = *L. microphyllus*.
nigricans, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 76.—Bras.
nitens, Mart. in Flora, xiii. (1830) i. 105 = *L. nitens*.
nitidus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. nitidus*.
oblongus, G. Don, Gen. Syst. ii. 410 = *Phoradendron rubrum*.
occidentalis, G. Don, l. c. = *L. occidentalis*.
orbicularis, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. orbicularis*.
orinocensis, Blume, l. c. = *L. orinocensis*.
ovalifolius, G. Don, Gen. Syst. iii. 411 = *L. ovalifolius*.
paniculatus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. paniculatus*.
parvifolius, G. Don, Gen. Syst. iii. 413 = *L. parvifolius*.
patens, Mart. in Flora, xiii. (1830) 104 = *L. patens*.
Patrisii, G. Don, Gen. Syst. iii. 410 = *L. Patrisii*.
pauciflorus, G. Don, l. c. 414 = *L. pauciflorus*, Sw.
pauciflorus, Miq. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 75 = *dichotrianthus*.
pedunculatus, G. Don, Gen. Syst. iii. 414 = *L. pedunculatus*.
Perrottetii, G. Don, l. c. 413 = *L. Perrottetii*.
phillyraeoides, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. phillyraeoides*.
phylliraeoides, G. Don, Gen. Syst. iii. 413 = *praece.*
podopterus, G. Don, l. c. 410 = *L. podopterus*.
polyanthus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. polyanthus*.
polyrrhizus, Mart. l. c. = *L. polyrrhizus*.

STRUTHANTHUS:—

- polystachyus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *Loranthus polystachyus*.
portoricensis, G. Don, Gen. Syst. iii. 414 = *L. portoricensis*.
psilobotrys, G. Don, l. c. = *L. psilobotrys*.
pterygopus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. pterygopus*.
punctatus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. punctatus*, Ruiz & Pav.
puracensis, Blume, l. c. = *L. puracensis*.
pyrifolius, Blume, l. c. = *L. pyrifolius*.
quercicola, Blume, l. c. = *L. quercicola*.
radicans, Blume, l. c. = *L. radicans*.
retroflexus, Blume, l. c. = *L. retroflexus*.
retusus, Blume, l. c. = *L. Sellowianus*.
rhynchophyllus, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. ii. 85. — Bras.
rotundifolius, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora, ii. 536 = *L. rotundifolius*.
rubens, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. rubens*.
rufus, Mart. l. c. = *L. rufus*.
salicifolius, Mart. l. c. 104 = *L. salicifolius*.
Salzmanni, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. ii. 80. — Bras.
sarmentosus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. sarmentosus*.
sessilis, Blume, l. c. = *L. sessilis*.
spicatus, G. Don, Gen. Syst. iii. 410 = *L. spicatus*.
squamulosus, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 978 (= *Phthirusa squamulosa*). — Guian.
staphylinus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. staphylinus*.
Stelis, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. Stelis*.
suaveolens, Blume, l. c. = *L. suaveolens*.
subcampestris, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. subcampestris*.
subrotundus, G. Don, Gen. Syst. iii. 413 = *L. subrotundus*.
syringaeifolius, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. syringaeifolius*.
Tagua, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. Tagua*.
taubatenensis, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. ii. 84. — Bras.
terniflorus, Eichl. l. c. 75 = *L. terniflorus*.
terniflorus, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 978 = *dichotrianthus*.
tetraqueter, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. tetraqueter*.
Theobromae, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. Theobromae*.
thyrsiflorus, Blume, l. c. = *L. thyrsiflorus*.
triceps, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1161 = *L. syringaeifolius*.
uniflorus, G. Don, Gen. Syst. iii. 414 = *L. uniflorus*.
uraguensis, G. Don, l. c. 410 = *L. uraguensis*.
uruguayensis, Gibert, Enum. Pl. Montev. 83 = *L. uraguensis*.
venetus, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1731 = *L. venetus*.
virgatus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 105 = *L. virgatus*.
vulgaris, Mart. l. c. xxiv. (1841) ii. Beibl. 33. — Bras.

STRUTHIA, Royen, ex Linn. Gen. ed. II. 164 (1742) = *Gnidia*, Linn. (Thymel.).

STRUTHIOLA, Linn. Mant. i. 4 (1767). *THYME-LAEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 196.

- BELVALA*, Adans. Fam. ii. 285 (1763).
angustifolia, Lam. Illustr. i. 314 (err. typ. 214). — Afr. austr.
angustifolia, Steud. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 469 = *lineariloba*.
argentea, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1831) 6, 7. — Afr. austr.
aurea, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 571 = *argentea*.
brevifolia, Willd. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 477 = *striata*.
chrysanthia, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 572 = *tomentosa*.
chrysanthia, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 333. — Afr. austr.
ciliata, Andr. Bot. Rep. t. 149 = *virgata*.
ciliata, Lam. Illustr. i. 314 (err. typ. 214) = *lucens*.
dodecapetala, Bartl. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 475. — Afr. austr.
Dregeana, Meissn. l. c. 472 = *argentea*.
Eckloniana, Meissn. in DC. Prod. xiv. 568. — Afr. austr.

VOL. II.

STRUTHIOLA:—

- erecta*, Curt. Bot. Mag. t. 222 = *lineariloba*?
erecta, Linn. Mant. i. 41. — Afr. austr.
formosa, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 571 = *argentea*.
glabra, Roem. & Schult. Syst. iii. 331 = *erecta*.
glabra, Zeyh. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 468 = *parviflora*.
glauca, Lodd. Cat. (1807) 33 = *virgata*?
glauca, Nois. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 570 = *longiflora*.
glauca, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 108 = *virgata*.
grandis, Bartl. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 476 = *hirsuta*.
hirsuta, Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1818) 290. — Afr. austr.
imbricata, Andr. Bot. Rep. t. 113 = *striata*.
imbricata, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 559 = *Arthrosolen spicatus*.
incana, Lodd. Bot. Cab. t. 11 = *virgata*.
juniperina, Retz. Obs. iii. 26 = *lineariloba*.
lanceolata, Retz. l. c. = *ovata*.
lateriflora, Hornem. Hort. Hafn. ii. 955 = *striata*.
lateriflora, Meissn. in DC. Prod. xiv. 573 = *Arthrosolen spicatus*.
laxa, Nois. ex Schult. Mant. iii. 260, nomen (Quid?). — Hab.?
lineariloba, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 468. — Afr. austr.
littoralis, Wendl. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 63 = *Arthrosolen spicatus*.
longiflora, Lam. Illustr. i. 314 (err. typ. 214) t. 78. — Afr. austr.
lucens, Poir. Encyc. vii. 477. — Afr. austr.
lutescens, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 568 = *parviflora*.
Martiana, Meissn. l. c. 570. — Afr. austr.
Mundtii, Eckl. ex Meissn. l. c. 572. — Afr. austr.
Myrsinites, Lam. Illustr. i. 314 (err. typ. 214) = *ovata*.
nana, Linn. f. Suppl. 128 = *Gnidia nana*.
oppositifolia, Cat. Pl. Bot. Gard. Liverpool (1808), 176, nomen (Quid?). — Hab.?
ovata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 76. — Afr. austr.
parviflora, Bartl. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 467. — Afr. austr.
pendula, Salisb. Prod. 282 = *erecta*.
pubescens, Retz. Obs. iii. 26 = *virgata*.
pubescens, Sims, Bot. Mag. t. 1212 = *longiflora*.
pubescens, Steud. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 478 = *lucens*.
rigida, Meissn. in DC. Prod. xiv. 570. — Afr. austr.
rubra, Donn. Hort. Cantab. ed. IV. 31 = *longiflora*.
rubra, Stend. Nom. ed. II. ii. 648 = *virgata*.
scandens, Wall. ex Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 582 = *Cansjera Rheedii*.
striata, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 572 = *Mundtii*.
striata, Lam. Illustr. i. 314 (err. typ. 214). — Afr. austr.
stricta, Donn. Hort. Cantab. ed. VI. 40 = *lineariloba*?
subulata, Lam. Illustr. i. 314 (err. typ. 214) = *erecta*.
subulata, Vahl, ex Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1818) 291 = *tuberculosa*?
sulcata, F. W. Schmidt, Neue u. Selt. Pfl. 34 = *striata*.
superba, Cat. Hort. Bot. Gard. Liverpool (1808), 176, nomen (Quid?). — Hab.?
tetragona, Retz. Obs. iii. 25 = *erecta*.
Thomsoni, Oliver, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 404. — Afr. trop.
tomentosa, Andr. Bot. Rep. t. 334. — Afr. austr.
tuberculosa, Lam. Illustr. i. 314 (err. typ. 214). — Afr. austr.
tuberculosa, Vahl, ex Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1818) 287 = *virgata*.
Vahlia, Wikstr. l. c. 291 = *tuberculosa*?
villosa, Vahl, ex Wikstr. l. c. 287 = *virgata*.
villosa, Wikstr. l. c. 288 = *tomentosa*.
virgata, Houtt. Handleid. vii. 364. t. 40. f. 2 = *lucens*.
virgata, Linn. Mant. i. 41; *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 12. — Afr. austr.
virgata, Wendl. Bot. Beobacht. 9. t. 2. f. 9 = *striata*.

STRUTHIOLA, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 12 (1768) = *prae*.

STRYCHNODAPHNE, Nees & Mart. in Linnaea, viii. (1833) 39 = *Ocotea*, Aubl. (Laurin.).
floribunda, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 188 = *O. botryophylla*.

STRYCHNODAPHNE:—

- lanceolata*, Nees, in Linnaea, viii. (1833) 39 = *Ocotea lanceolata*.
Lhotskyi, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 113 = *O. Lhotskii*.
puberula, Nees & Mart. in Linnaea, viii. (1833) 39 = *O. puberula*.
salicifolia, Meissn. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1870) 139 (= *Oreodaphne microbotrys*). — Bras.
suaveolens, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 134 = *O. puberula*.

STRYCHNOPSIS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 456. *MENISPERMACEAE*.
Thouarsii, Baill. l. c. — Madag.

STRYCHNOS, Linn. Syst. ed. I (1735). *LOGANIA-CZAE*, Benth. & Hook. f. ii. 797.

- ATHERSTONEA*, Pappe, Sylva Cap. ed. II. 29 (1862).
BREHMIA, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 25.
CHEMNICIA, Scop. Introd. 139 (1777).
CURARE, Humb. Relat. Hist. ii. 549 (1819).
IGNATIA, Linn. f. Suppl. 20 (1781).
IGNATIANA, Lour. Fl. Cochinch. 126 (1790).
LASIOSTOMA, Schreb. Gen. 75 (1789).
NARDA, Vell. Fl. Flum. 108 (1825); iii. t. 24 (1827).
ROUHAMON, Aubl. Pl. Gui. i. 93. t. 36 (1775).
TOXICARIA, Schreb. in Naturf. xix. (1783) 146.
UNGUACHA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 103.
abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. *Intell.* 25, nomen. — Abyss.
acuminata, Wall. Cat. n. 1593, partim. — Burma.
acuminata, Wall. l. c., partim = *rufa*.
acuta, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 280. — Bras.
albiflora, Prog. l. c. 279. — Bras.
angustifolia, Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1856) 102. — China.
Atherstonei, Harv. Thes. Cap. ii. 41. — Afr. austr.
axillaris, Blume, Bijdr. 1019 = *monosperma*.
axillaris, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 356. t. 15. — Reg. Himal.
axillaris, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 155 = *Dalzellii*.
Baculum, Harv. Thes. Cap. ii. 41 = *Atherstonei*.
Beddomei, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 88. — Ind. or.
Benthami, C. B. Clarke, l. c. 87. — Zeylan.
bicirrhosa, Lesch. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 267 = *colubrina*.
bicolor, Prog. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 31. — Bras.
brachiata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 30. t. 157. — Peruv.
brasiliensis, Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1856) 107, partim = *Martii*.
brasiliensis, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 84. — Bras.
breviflora, A. DC. in DC. Prod. ix. 15. — Bras.
brevifolia, Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 106. — Bras.
Castelnaeana, Baill. Adansonia, xii. (1879) 374 = *seq.*
Castelnaei, Wedd. in Castel. Exp. Am. Sud. v. 22; ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1856) 108. — Bras.
chlorantha, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 273. — Costa Rica.
cinnamomea, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 425, sphalm. = *seq.*
cinnamomifolia, Thw. l. c. 201. — Zeylan.
cirrhosa, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 414 = *colubrina*.
cogens, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 241. — Guian.
colubrina, Auct. ex DC. Prod. ix. 15 = *ligustrina*.
colubrina, Blume, Rumphia, i. 70 = *Rheedei*.
colubrina, Linn. Sp. Pl. 189. — Ind. or.
colubrina, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 414 (Qnid?). — Hab.?
colubrina, Wall. Cat. nn. 4455, 1589 = *Beddomei*, *cinnamomifolia*.
coriacea, Thw. Enum. Pl. Zel. 425 = *Beddomei*.
Crevauxiana, Baill. Adansonia, xii. (1879) 377. — Guian.
Crevauxii, G. Planch. in Journ. Pharm. et Chim. (1880), reimpr. 25 = *prae*.
Curare, Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1856) 108. — Am. trop.
Dalzellii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 87. — Ind. or.
darienensis, Seem. in Bot. Voy. Herald, 166. — Panama.

STRYCHNOS:—

- densiflora, *Baill. Adansonia*, xii. (1879) 369.—Afr. austr.
 depauperata, *Baill. l. c.* 372.—Am. trop.
 dysophylla, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 103.—Afr. austr.
 Erichsonii, *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1082, nomen; *et ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i.* 274.—Guian.
 farinosa, *Blume, Rumphia*, i. 70.—Madag.
 Gardneri, *A. DC. in DC. Prod. ix.* 14.—Bras.
 Gaultheriana, *Pierre, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv.* 89=malaccensis.
 Geoffraeana, *Baill. Adansonia*, xii. (1879) 378.—Bras.?
 glabra, *Sagot, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i.* 275.—Guian.
 Gomesiana, *Casar. Atti 3^a Riun. Scient. Ital.* (1841) 515=triplinervia.
 grandis, *Wall. Cat. n.* 4454=Anisophyllea grandis.
 Grayi, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii.* (1862) 519.—Cuba.
 Gubleri, *G. Planch. in Journ. Pharm. et Chim. v.* (1882) reimpr. 1.—Venezuela.
 guineensis, *Thonn. ex Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 190=Landolphia scandens.
 hachensis, *Karst. Fl. Columb. ii.* 75. t. 138.—N. Granat.
 hirsuta, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 106.—Bras.
 Horsfieldiana, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii.* 379.—Java.
 hypogyna, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv.* 86.—Burma.
 Icaja, *Baill. Adansonia*, xii. (1879) 368.—Afr. trop.
 Ignatii, *Berg. Mat. Med. i.* 146.—Ins. Philipp.
 innocua, *Delile, Cent. Pl. Méroë*, 53.—Nubia.
 Jobertiana, *Baill. Adansonia*, xii. (1879) 367.—Bras.
 lanceolaris, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 551.—Sumatra.
 lanceolata, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 105.—Bras.
 laurina, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 201=Beddomei.
 laurina, *Wall. Cat. n.* 1591.—Ind. or.; Malaya.
 ligustrina, *Blume, Rumphia*, i. 68. t. 25=S. Nux-vomica.
 ligustrina, *Zipp. ex Span. in Linnaea*, xv. (1841) 325=colubrina.
 Lokua, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii.* 52.—Abyss.
 lucida, *R. Br. Prod.* 469.—Austral.
 lucida, *Wall. Cat. n.* 1590=S. Nux-vomica, Wallichiana.
 macroacanthos, *Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i.* 280. t. 82.—Bras.
 madagascariensis, *Poir. Encyc. viii.* 696.—Madag.
 madagascariensis, *Spreng. ex Baker, Fl. Maurit.* 235=spinosa.
 Maingayi, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv.* 88.—Malacca.
 malaccensis, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 101.—Burma; Malaya.
 marginata, *Benth. l. c.* 107.—Bras.
 Martii, *Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i.* 279.—Bras.
 Medeola, *Sagot, ex Prog. l. c.* 282.—Am. trop.
 Melinoniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1880) 256.—Guian.
 micrantha, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 425.—Zeylan.
 minor, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 100=Benthami.
 minor, *Blume, Rumphia*, i. 70=colubrina.
 minor, *Dennst. Schluess. Hort. Malab.* 33.—Ind. or.
 Mittscherlichii, *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 950=smilacina.
 monosperma, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii.* 381.—Malaya.
 monosperma, *Stokes, Bot. Mat. Med. i.* 415=potatorum.
 multiflora, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 102.—Ins. Philipp.
 muricata, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora*, iii. 1072=ligustrina.
 nigricans, *Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i.* 280. t. 79.—Bras.
 nitida, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 66=S. Nux-vomica, Wallichiana.
 Nux-vomica, *Linn. Sp. Pl.* 189.—Ind. or.; Burma.
 oblongifolia, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 827=Carissa oblongifolia.
 ovalifolia, *Stokes, Bot. Mat. Med. i.* 412=S. Nux-vomica.
 ovalifolia, *Wall. Cat. n.* 1592=laurina.
 palembanica, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 551.—Sumatra.
 panamensis, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 166.—Panama.

STRYCHNOS:—

- paniculata, *Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. v.* (1853) 56.—China.
 parviflora, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 107.—Bras.
 parvifolia, *A. DC. in DC. Prod. ix.* 16.—Bras.
 pedunculata, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 105.—Guian.
 philippensis, *Blanco, Fl. Filip. ed. II.* 61=Ignatii.
 Poeppigii, *Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i.* 282.—Peruv.
 potatorum, *Linn. f. Suppl.* 148.—Ind. or.; Burma.
 Pseudo-china, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 104=seq.
 Pseudo-quina, *A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. ix.* (1822) 340.—Bras.
 psilosperma, *F. Muell. Fragm. iv.* 44.—Austral.
 pubescens, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv.* 89.—Malacca.
 randiaeformis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1880) 246.—Afr. austr.
 Rheedei, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv.* 87.—Ind. or.
 rhexioides, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1144, nomen.—Guian.
 rondeletoides, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 104.—Bras.
 Rouhamon, *Benth. l. c.* 106.—Am. trop.
 rubiginosa, *A. DC. in DC. Prod. ix.* 16.—Bras.
 rufa, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv.* 89.—Burma; Malacca.
 scandens, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 127=Landolphia scandens.
 Schomburgkiana, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1144=pedunculata.
 septemnervis, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv.* 88.—Malacca.
 smilacina, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 105.—Am. trop.
 spinosa, *Lam. Illustr. ii.* 38.—Madag.
 subcordata, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 106.—Bras.
 Telankotta, *J. F. Gmel. Syst.* 387, sphalm.=seq.
 Tetankotta, *Retz. Obs. ii.* 12=potatorum.
 Ticute, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 648, err. typ.=seq.
 Tieute, *Lesch. in Ann. Mus. Par. xvi.* (1810) 479, 480. t. 23.—Java.
 tomentosa, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 104.—Guian.
 toxifera, *Schomb. ex Benth. in Hook. Journ. Bot. iii.* (1841) 240; *et in Hook. Ic. Pl. tt.* 364–365.—Guian.
 trinitensis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 407.—Ind. occ.
 triplinervia, *Mart. in Flora*, xxiv. (1841) ii. Beibl. 83.—Bras.
 Unguacha, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii.* 52.—Abyss.
 Vacacoua, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1880) 242.—Madag.
 vestita, *Prog. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 32.—Bras.
 vomica, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 70=S. Nux-vomica.
 Vuntak, *Boj. Hort. Maurit.* 205=spinosa.
 Wallichiana, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 102.—Reg. Himal.
 Wallichiana, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 648=S. Nux-vomica, Wallichiana.
 yapurensis, *G. Planch. in Journ. Pharm. et Chim. v.* (1882), reimpr. 12.—Ecuador.

STRYCHNUS, *Linn. Gen. ed. I.* 54 (1737)=præc.

- STRYPHODENDRON**, *Mart. in Flora*, xx. (1837) ii. Beibl. 117. **LEGUMINOSAE**, *Benth. & Hook. f. i.* 590.
FOLIANTHERA, *Rafin. Sylva Tellur.* 120 (1838).
 angustum, *Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx.* (1875) 375; *et in Mart. Fl. Bras. xv. ii.* 287.—Bras.
 Barbatimam, *Mart. in Flora*, xx. (1837) ii. Beibl. 117.—Bras.
 coriaceum, *Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx.* (1875) 373; *et in Mart. Fl. Bras. xv. ii.* 284.—Bras.
 discolor, *Benth. in Hook. Journ. Bot. iv.* (1842) 342=rotundifolium.
 floribundum, *Benth. l. c.* 343.—Bras.
 guianense, *Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx.* (1875) 374.—Guian.
 inaequale, *Benth. l. c.*=microstachyum.

STRYPHODENDRON:—

- Melinonis, *Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xiii. (1882) 322.—Guian.
 microstachyum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 82.—Bras.
 obovatum, *Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx.* (1875) 374; *et in Mart. Fl. Bras. xv. ii.* 286.—Bras.
 paniculatum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 81. t. 291=Piptadenia Poeppigii.
 polyphyllum, *Mart. in Flora*, xx. (1837) ii. Beibl. 117.—Bras.
 rotundifolium, *Mart. l. c.*—Bras.

STRZELECKYA, *F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix.* (1857) 308=**Flindersia**, *R. Br. (Meliac.)*.
dissosperma, *F. Muell. l. c.*=*F. maculosa*.

STUARTIA, *Linn. in Act. Soc. Upsal.* (1741) 79 (Stewartia). **TERNSTROEMACEAE**, *Benth. & Hook. f. i.* 185.

MALACHODENDRON, *Mitch. in Act. Phys.-Med. Acad. Nat. Cur.* (1748) App. 216; *Cav. Diss. v.* 302. t. 158 (1788).

MALACHODENDRUM, *Pers. Syn. ii.* 260 (1807).
corchoroides, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 126=Sida spinosa.

dentata, *Nois, ex Steud. Nom. ed. I.* 815, nomen (Quid?).—Hab.?

grandiflora, *Carr. in Rev. Hort.* (1874) 399.—Japon.

grandiflora, *Siebold, ex Briot, in Rev. Hort.* (1879) 430=S. Pseudo-camellia.

Malacodendron, *Linn. Sp. Pl.* 698.—Am. bor.

marilandica, *Andr. Bot. Rep. t.* 397=S. Malacodendron.

monadelpha, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xi. (1867) 430=serrata.

monadelpha, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i.* 181. t. 96.—Japon.

montana, *Bartr. Trav. ed. II.* (1794) 332=pentagyna.

nobilis, *Salisb. Prod.* 386=S. Malacodendron.

pentagyna, *L'Hérit. Stirp. Nov.* 155. t. 74.—Am. bor.

Pseudo-camellia, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xi. (1867) 429.—Japon.

serrata, *Maxim. l. c.* 430.—Japon.

virginica, *Cav. Diss. v.* 303. t. 159. f. 2=S. Malacodendron.

STUARTINA, *Sond. in Linnaea*, xxv. (1852) 521. **COMPOSITAE**, *Benth. & Hook. f. ii.* 300.

Muelleri, *Sond. l. c.* 522.—Austral.

STUBENDORFFIA, *Schrenk, ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix.* Suppl. 20 (1844).

CRUCIFERAE, *Benth. & Hook. f. i.* 89.

orientalis, *Schrenk, l. c.* 21.—Soongar.

STUBENDORFIA, *Walp. Rep. v.* 50 (1846), sphalm.=præc.

STUPA, *Aschers. Fl. Brandenb.* 812 (1864)=**Stipa**, *Linn. (Gramin.)*.

STURMIA, *Gaertn. f. Fruct. iii.* t. 192. f. 3 (1805)=**Antirrhoea**, *Comm. (Rubiace.)*.

lucida, *Gaertn. f. l. c.*=*A. lucida*.

STURMIA, *Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft. vii.* (1799)=**Mibora**, *Adans. (Gramin.)*.

minima, *Hoppe, l. c.*=*M. verna*.

verna, *Pers. Syn. i.* 76=*M. verna*.

STURMIA, *Reichb. in Moessl. Handb. ed. II.* ii. 1576 (1828)=**Liparis**, *Rich. (Orchid.)*.

abyssinica, *Reichb. f. in Walp. Ann. iii.* 527=L. abyssinica.

angustilabris, *F. Muell. Fragm. iv.* 164=L. reflexa.

arnoglossophylla, *Reichb. f. in Bonplandia*, iv. (1856) 217=L. amoglossophylla.

bituberculata, *Reichb. f. l. c.* ii. (1854) 22=L. bituberculata, elata.

capensis, *Sond. in Linnaea*, xix. (1847) 71=L. capensis.

coelogyoides, *F. Muell. Fragm. ii.* 71=L. coelogyoides.

cuneilabris, *Benth. Fl. Austral. vi.* 273, sphalm.=L. reflexa.

elliptica, *Reichb. f. in Linnaea*, xxii. (1849) 833=L. elliptica.

habenarina, *F. Muell. Fragm. iv.* 131=L. habenarina.

STURMIA:—

- Kappleri*, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 833 = *Liparis Kappleri*.
lilifolia, Reichb. f. in Walp. Ann. iii. 527 = *L. lilifolia*.
Loeselii, Reichb. in Moesl. Handb. ed. II. ii. 1576 = *L. Loeselii*.
longipes, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 250 = *L. longipes*.
nervosa, Reichb. f. l. c. = *L. nervosa*.
paludosa, Reichb. in Moesl. Handb. ed. II. ii. 1576 = *Malaxis paludosa*.
reflexa, F. Muell. Fragm. ii. 72 = *L. reflexa*.
Wageneri, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 73 = *L. Wageneri*.

STURTIA, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 68 (1849) = *Gossypium*, Linn. (Malvac.).
gossypoides, R. Br. l. c. = *G. Sturtii*.

STUTZERIA, F. Muell. Fragm. v. 31 (1865) = *Callicoma*, Andr. (Saxifr.).
callicomoides, F. Muell. l. c. = *C. Stutzeri*.

STYGNANTHE, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 209 = *Columnnea*, Plum. (Gesner.).
moesta, Hanst. l. c. = *C. moesta*.

STYLAGO, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 127 (1866) = *Strumaria*, Jacq. (Liliac.).
rubella, Salisb. l. c. 128 = *Strumaria rubella*.

STYLANDRA, Nutt. Gen. Am. i. 170 (1818) = *Podostigma*, Ell. (Asclep.).
pumila, Nutt. l. c. = *P. pubescens*.

STYLANTHUS, Reichb. & Zoll. in Linnaea, xxviii. (1856) 312 = *Mallotus*, Lour. (Euphorb.).

STYLAPTERA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 202 (1880), sphalm. = seq.

STYLAPTERUS, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 23. t. 1 = *Penaea*, Linn.
barbatus, A. Juss. l. c. = *P. barbata*.
ericoides, A. Juss. l. c. = *P. ericoides*.
fruticulosus, A. Juss. l. c. = *P. fruticulosa*.

STYLOCARPA, Decne. & Planch. in Rev. Hortic. (1854) 105, sphalm. = *Stilbocarpa*, Decne. (Araliac.).

STYLEDIUM, Andr. Bot. Rep. t. 658 (1811?), sphalm. = *Stylidium*, Sw.

STYLESIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 377 = *Bahia*, Lag. (Compos.).
ambrosioides, Nutt. l. c. = *B. ambrosioides*.
puberula, Nutt. l. c. 378. = *Chili*.

STYLEURODON, Rafn. Fl. Tellur. ii. 14 (1836) = *Verbena*, Linn.
carolinianum, Rafn. l. c. = *V. carolina*.

STYLEXIA, Rafn. Fl. Tellur. iv. 121 (1836) = *Cayusea*, A. St. Hil. (Resed.).

STYLIDIUM, Lour. Fl. Cochinch. 220 (1790) = *Marlea*, Roxb. (Cornac.).
chinense, Lour. l. c. 221 = *M. begonifolia*.
vitiense, F. Muell. Census, 74 = *M. vitiensis*.

STYLIDIUM, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 48. tt. 1, 2. *STYLIDIEAE*, Benth. & Hook. f. ii. [II.] 534.

ANDERSONIA, Koen. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 721 (1834).

CANDOLLEA, Labill. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 453.

FORSTERIOPSIS, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 393 (1845).

VENTENATIA, Sm. Exot. Bot. ii. 13 (1806).

aciculare, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 373 = *lineare*.
adnatum, R. Br. Prod. 572. = Austral.

adpressum, Benth. Fl. Austral. iv. 22. = Austral.
affine, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 371 = *redu-plicatum*.

alsinoides, R. Br. Prod. 572. = Austral.
amoenum, R. Br. l. c. 570. = Austral.

STYLIDIUM:—

androsaceum, DC. Prod. vii. 783 = *guttatum*.
androsaceum, Lindl. Swan River App. 29 = *calcaratum*.
Armeria, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 66. t. 216 = *graminifolium*.

armerium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *praece*.

articulatum, R. Br. Prod. 570. = Austral.

assimile, R. Br. l. c. 569. = Austral.

Barleei, F. Muell. Fragm. vi. 5. t. 69. = Austral.

bellidifolium, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 376 = *spatulatum*.

bicolor, Lindl. Swan River App. 28 = *piliferum*.

brachyphyllum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 386. = Austral.

breviscapum, R. Br. Prod. 572. = Austral.

Brunonianum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 72. = Austral.

Brunonis, Griff. Notul. iv. 275 = *Kunthii*.

bryoides, F. Muell. Fragm. vi. 91 = *pedunculatum*.

bulbiferum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 73. = Austral.

buxifolium, Hort. Belv. ex Steud. Nom. ed. I. 818, nomen (Quid ?). = Austral. ?

caespitosum, R. Br. Prod. 569. = Austral.

calcaratum, R. Br. l. c. 570. = Austral.

canaliculatum, Lindl. Swan River App. 29. = Austral.
canaliculatum, Poir. Encyc. Suppl. v. 412 = *graminifolium*.

capillare, R. Br. Prod. 570. = Austral.

caricifolium, Lindl. Swan River App. 28 = *reduplicatum*.

carnosum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 71. = Austral.

caulescens, Lindl. Swan River App. 29; DC. Prod. vii. 782 = *amoenum*.

cicatricosum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 390 = *fasciculatum*.

ciliatum, Lindl. Swan River App. 28. = Austral.

compressum, Lindl. l. c. 29 = *Brunonianum*.

corymbosum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 72 = *pulchellum*.

corymbosum, R. Br. Prod. 571. = Austral.

crassifolium, R. Br. l. c. = Austral.

crossocephalum, F. Muell. Fragm. vi. 5. = Austral.

debile, F. Muell. l. c. i. 149. = Austral.

despectum, R. Br. Prod. 571. = Austral.

dichotomum, DC. Prod. vii. 783. = Austral.

Dicksoni, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 645 = *pilosum*.

diffusum, R. Br. Prod. 571. = Austral.

dispermum, F. Muell. Fragm. iv. 93. = Austral.

diuroides, Lindl. Swan River App. 29. = Austral.

divaricatum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 385 = *streptocarpum*.

diversifolium, R. Br. Prod. 570. = Austral.

Drummondii, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (1840-41) 208 = *reduplicatum*.

eglandulosum, F. Muell. Fragm. i. 150. = Austral.

elongatum, Benth. Fl. Austral. iv. 11. = Austral.

emarginatum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 383. = Austral.

eriopodium, DC. Prod. vii. 784 = *breviscapum*.

erorhizum, R. Br. Prod. 569. = Austral.

falcatum, R. Br. l. c. 572. = Austral.

fasciculatum, R. Br. l. c. = Austral.

fasciculatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1459 = *adnatum*.

fissilobum, F. Muell. Fragm. i. 154. = Austral.

Floodii, F. Muell. l. c. 149. = Austral.

floribundum, R. Br. Prod. 569. = Austral.

fruticosum, R. Br. l. c. 570 = *glandulosum*.

glandulosum, Salisb. Parad. Lond. t. 77. = Austral.

glaucum, R. Br. Prod. 569 = *rupestre*.

glaucum, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 64. t. 214. = Austral.

graminifolium, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 49. = Austral.

guttatum, R. Br. Prod. 571. = Austral.

hebegynum, DC. Prod. vii. 782 = *reduplicatum*.

hirsutum, R. Br. Prod. 568. = Austral.

hispidum, Lindl. Swan River App. 29 = *ciliatum*.

Hookeri, Planch. in Fl. des Serres, vi. (1850-51) 229 = *dichotomum*.

imbricatum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 73. = Austral.

inundatum, R. Br. Prod. 571 = *despectum*.

involutum, F. Muell. Fragm. i. 154 = *breviscapum*.

juncum, R. Br. Prod. 569. = Austral.

Kunthii, Wall. Cat. n. 3759. = Ind. or.; Burma.

laricifolium, Rich. in Pers. Syn. ii. 210. = Austral.

STYLIDIUM:—

laricifolium, Walp. Rep. ii. 704, sphalm. = *redu-plicatum*.

laxiflorum, DC. Prod. vii. 782 = *scabridum*.

Lehmannianum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 375 = *rupestre*.

lepidum, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 27. = Austral.

leptobotrydium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = *seq.*

leptobotrys, DC. Prod. vii. 783 = *crassifolium*.

leptocalyx, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 373 = *scabridum*.

leptophyllum, DC. Prod. vii. 783. = Austral.

leptorhizum, F. Muell. Fragm. i. 148. = Austral.

leptostachyum, Lindl. Swan River App. 28 = *car-nosum*.

Lessoni, DC. Prod. vii. 337 = *falcatum*?

limbatum, F. Muell. Fragm. x. 57. = Austral.

Lindleyanum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 390 = *calcaratum*.

lineare, Sieber, ex DC. Prod. vii. 333 = *graminifolium*.

lineare, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 50. t. 1. f. 1. = Austral.

lineatum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 376. = Austral.

lobuliflorum, F. Muell. Fragm. i. 153. = Austral.

longifolium, Rich. in Pers. Syn. ii. 210 = *pilosum*.

longitubum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 73. = Austral.

luteum, R. Br. Prod. 570. = Austral.

marginatum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 379 = *diversifolium*.

melastachys, R. Br. Prod. 568 = *graminifolium*.

mitrasacmoides, F. Muell. Fragm. i. 150 = *alsinoides*.

mucronifolium, Hook. Bot. Mag. t. 4538 = *dichotomum*.

mucronifolium, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 383 = *leptophyllum*.

musciola, F. Muell. Fragm. i. 153. = Austral.

nudum, Lindl. Swan River App. 29 = *glaucum*.

obtusatum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 382 = *petiolare*.

pachyrhizum, F. Muell. Fragm. i. 152. = Austral.

pedunculatum, R. Br. Prod. 571. = Austral.

perminutum, F. Muell. Fragm. vi. 78 = *perpusillum*.

perpusillum, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 266. = Austral.

petiolare, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 382. = Austral.

piliferum, R. Br. Prod. 569. = Austral.

pilosum, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 63. t. 213. = Austral.

pilosum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 371 = *redu-plicatum*.

planifolium, Poir. Encyc. Suppl. v. 412 = *lineare*.

plantagineum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 371 = *pilosum*.

polystachium, Rich. in Pers. Syn. ii. 210 = *graminifolium*?

Preissii, F. Muell. Fragm. iii. 122. = Austral.

proliferum, DC. Prod. vii. 783 = *bulbiferum*.

propinquum, R. Br. Prod. 572 = *adnatum*.

pruinatum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 379 = *diversifolium*.

pnbigerum, Sond. l. c. 383. = Austral.

pulchellum, Sond. l. c. 381. = Austral.

pyncostachyum, Lindl. Swan River App. 29. = Austral.

pygmaeum, R. Br. Prod. 571. = Austral.

radicans, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 381 = *repens*.

ramosum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 57. = Hab.?

recurvum, R. Grah. in Bot. Mag. t. 3913 = *bulbiferum*.

reduplicatum, R. Br. Prod. 568. = Austral.

repens, R. Br. l. c. 571. = Austral.

rhynchocarpum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 389. = Austral.

rigidulum, Sond. l. c. = *streptocarpum*.

robustum, Sond. l. c. 378. = Austral.

roseum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 137 = *tenellum*.

rotundifolium, R. Br. Prod. 571. = Austral.

rupestre, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 375. = Austral.

saxifragoides, Lindl. Swan River App. 28 = *ciliatum*.

scabridum, Lindl. l. c. = Austral.

STYLIDIUM—

scandens, R. Br. Prod. 570.—Austral.
scarosum, DC. Prod. vii. 783 = *juncum*.
schizanthum, F. Muell. Fragm. i. 152.—Austral.
schoenoides, DC. Prod. vii. 782 = *reduplicatum*.
semparatum, F. Muell. Fragm. i. 147 = *leptorhizum*.
serrulatum, Rich. in Pers. Syn. ii. 210 = *graminifolium*.
setaceum, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 65 = *spinulosum*?
setigerum, DC. Prod. vii. 782 = *ciliatum*.
sinicum, Hance, in Walp. Ann. ii. 1030 = *uliginosum*.
soboliferum, F. Muell. in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 162.—Austral.
spatulatum, R. Br. Prod. 569.—Austral.
spinulosum, R. Br. l. c.—Austral.
squamellosum, DC. Prod. vii. 782 = *caespitosum*.
stipitatum, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 72 = *Levenhookia stipitata*.
streptocarpum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 385.—Austral.
striatum, Lindl. Swan River App. 28.—Austral.
subulatum, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 168.—N. Zel.
sulcatum, Steud. Nom. ed. I. 818; ed. II. ii. 649 = *falcatum*.
tenellum, R. Br. Prod. 571 = *uliginosum*.
tenellum, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 51.—Ind. or.; Burma.
tenerimum, F. Muell. Fragm. i. 150.—Austral.
tenerum, Spreng. Syst. iii. 749 = *uliginosum*.
tenuis, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 380 = *Brunonianum*.
tenuifolium, R. Br. Prod. 570 = *laricifolium*.
thesioides, DC. Prod. vii. 783 = *canaliculatum*.
thyrsiforme, DC. l. c. = *pycnostachyum*.
trichopodium, F. Muell. Fragm. x. 86.—Austral.
uliginosum, Kurz, in Flora, lv. (1872) 303 = *Kunthii*.
uliginosum, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 52.—As. et Austral. trop.
umbellatum, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 66. t. 217 = *graminifolium*?
uniflorum, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 381.—Austral.
utricularioides, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 73.—Austral.
verticillatum, F. Muell. Fragm. iv. 94.—Austral.
violaceum, R. Br. Prod. 569.—Austral.
Wightianum, Wall. Cat. n. 3760 (Quid?).—Ind. or.

STYLIMNUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 100 = **Pluchea**, Cass. (Compos.).
maritimus, Rafin. ex DC. Prod. v. 452 = *P. camphorata*.

STYLIS, Poir. Encyc. Suppl. v. 260 (1817) = **Marlea**, Roxb. (Cornac.).
chinensis, Poir. l. c. = *M. begoniaefolia*.

STYLISMA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).
aquatica, Rafin. l. c.; Chapm. Fl. S. U. St. 346 = *B. aquatica*.
elliptica, Rafin. New Fl. Am. iv. 55 (Quid?).—Am. bor.
evolvuloides, Choisy, Conv. Rar. 160 = *B. humistrata*.
heterophylla, Rafin. New Fl. Am. iv. 54 (Quid?).—Am. bor.
humistrata, Chapm. Fl. S. U. St. 346 = *B. humistrata*.
peduncularis, Rafin. New Fl. Am. iv. 55 (Quid?).—Am. bor.
Pickeringii, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 335 = *B. Pickeringii*.
Sherardi, Rafin. New Fl. Am. iv. 55; Fl. Tellur. iv. 83 (Quid?).—Am. bor.
tenella, Rafin. Neogenyt. 2 = *B. humistrata*.

STYLISMUS, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 94 (1840) = *prae*.

STYLISTA, Rafin. Sylva Tellur. 112 (1838) = **Cleome**, Linn. (Cappar.).

STYLOBASIUM, Desf. in Mém. Mus. Par. v. (1819) 37. t. 2. **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 609.
MACROSTIGMA, Hook. l. c. Pl. t. 412 (1842).
lineare, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 95.—Austral.
spatulatum, Desf. in Mém. Mus. Par. v. (1819) 37. t. 2.—Austral.

STYLOCERAS, A. Juss. Euph. Tent. 53. t. 17 (1824). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 265.

columnare, Muell. Arg. in DC. Prod. xvi. i. 10.—Bolivia.
Dombeyanum, Baill. Etud. Gén. Euph. 666; et Monog. Bux. 80 = *laurifolium*.
Kunthianum, A. Juss. Euph. Tent. 117. t. 17. f. 56.—Ecuador.
laurifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 173. t. 638.—N. Granat.; Peruv.
macrostachyum, Poepp. ex Baill. Monog. Bux. 81 = *Alchornea cordata*.
subrotundum, Poepp. ex Baill. Adansonia, v. (1864–65) 240 = *Alchornea glandulosa*.

STYLOCHITON, Lepr. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 184 (Stylochaeton). **AKOIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 969.

GUENZIA, Sond. ex Schott, Aroideae, 10 (1853).
hypogaeum, Lepr. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 185.—Afr. trop.
lancifolium, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 42. t. 20.—Afr. trop.
natalense, Schott, Aroideae, 10. t. 14.—Afr. austr.

STYLOCLINE, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 338. **COMPOSITAE** [Benth. & Hook. f. ii. 298].

ANCISTROCARPHUS, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 355.
acaulis, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. vii. (1877) 112 = *Evax caulescens*.
filaginea, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 652.—Am. bor. occ.
gnaphaloides, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 338.—Calif.
Griffithii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 652.—Afghan.
micropoides, A. Gray, Pl. Wright. ii. 84.—Am. bor. occ.

STYLOCORYNA, Cav. Ic. iv. 45. t. 368 (1797) = **Randia**, Hout. (Rubiace.).

albituba, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 541.—Sumatra.
attenuata, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 377 = *Tarenna zeylanica*.
auricularia, Wall. Cat. n. 8402 = *Anomanthoda auriculata*.
bispinosa, Griff. Notul. iv. 260 = *R. longiflora*.
brevifolia, Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 106 (= *Webera lucens*).—Ind. or.
buruensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 129.—Ins. Buru.
celebica, Miq. l. c. 190.—Ins. Celebes.
coffeoides, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1859) 309 = *R. coffeoides* (in Addend.).
conferta, Benth. in Hook. Niger Fl. 389 = *Tarenna conferta*.
coriacea, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 175.—Borneo.
corymbosa, Labill. Sert. Austro-Caled. 48. t. 48 = *Olostyla corymbosa*.
costata, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 203.—Sumatra.
cuspidata, E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 4.—Afr. austr.
dasyphylla, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 205.—Sumatra.
densiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 649 = *R. densiflora*.
dimorphophylla, Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 402 = *R. densiflora*.
elliptica, Thw. Enum. Pl. Zcyl. 421 = *Byrsophyllum ellipticum*.
Forsteniana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 191.—Ins. Celebes.
fragilis, D. Dietr. Syn. Pl. i. 794 = seq.
fragrans, Blume, Bijdr. 982 (= *Webera fragrans*).—Malaya.

grandiflora, Benth. in Hook. Niger Fl. 390 = *Tarenna grandiflora*.
grandifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 540.—Sumatra.
Harveyi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1859) 309.—Ins. Fiji.
hirsuta, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 175.—Java.
Junghuhniana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 237.—Java?
lateriflora, Span. in Linnaea, xv. (1841) 316.—Ins. Timor.

STYLOCORYNA—

laxiflora, Blume, Bijdr. 983 (= *Webera fragrans*).—Malaya.
lucida, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 541 (= *Webera fragrans*).—Malaya.
macrophylla, Bartl. ex DC. Prod. iv. 377.—Ins. Philipp.
macrophylla, Wall. Cat. n. 8405 = *Coptosapelta flavescens*.
malabarica, DC. Prod. iv. 377 = *Randia malabarica*.
mollissima, Walp. Rep. ii. 517 (= *Webera mollissima*).—China.
monosperma, Wight & Arn. Prod. 401.—Ind. or.
nitidula, Benth. in Hook. Niger Fl. 390 = *Tarenna nitidula*.
odorata, Steud. Nom. ed. II. ii. 649 (= *Webera odorata*).—Ind. or.
oppositifolia, Steud. l. c. = *R. densiflora*.
orophila, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 237.—Sumatra.
ovata, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 203.—Java.
Pandaki, DC. Prod. iv. 377 = *R. malabarica*.
pavettoides, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 354.—Ins. Banca.
penangensis, Miq. l. c. 206 (= *Webera odorata*).—Reg. Himal.; Penang.
pepericarpa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 223.—Ins. Fiji.
polycarpa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 204.—Java.
pubescens, Bartl. ex DC. Prod. iv. 377.—Ins. Philipp.
pubiflora, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 419.—Ins. Timor.
racemosa, Cav. Ic. iv. 46. t. 368 = *R. racemosa*.
refracta, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 204.—Java.
Rheedii, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 576.—Malabar.
rigida, Wight, Ic. t. 1064 = *Tarenna zeylanica*.
Roxburghii, Steud. Nom. ed. II. ii. 649 (= *Webera odorata*).—Reg. Himal.; Penang.
sambucina, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1859) 309 (= *Tarennae* sp.).—Ins. Pacif.
setigera, Walp. Ann. ii. 793.—Sumatra.
subsessilis, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858) 394.—Ins. Bonin.
tomentosa, Blume, Bijdr. 983.—Java.
truncata, Wall. Cat. n. 8403 = *Triseiadia truncata*.
Webera, Kurz, Andam. Rep. B. 10 (= *Webera Kurzii*).—Ins. Andam. et Nicob.
Webera, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 248 = *Tarenna zeylanica*.
Webera, Wall. Cat. n. 8401 = *Tarenna zeylanica* (et *Webera odorata*, *stellulata*, *Wallichii*, *campanuliflora*).—As. trop.

STYLOCORYNE, Wight & Arn. Prod. 400 (1834) = **Tarenna**, Gaertn. (Rubiace.).

STYLODISCUS, Benn. Pl. Jav. Rar. 133. t. 29 (1838) = **Bischofia**, Blume (Euphorb.).
trifoliatus, Benn. l. c. = *B. javanica*.

STYLODON, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) = **Verbena**, Linn.
scabrum, Rafin. l. c. = *V. carolina*.

STYLOGLOSSUM, Breda, Orch. Kuhl. & Hass. t. [7] (1827) = **Calanthe**, R. Br. (Orchid.).
nervosa, Breda, l. c. = *C. curculigoides*.

STYLOGYNE, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 91 = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).
Martiana, A. DC. l. c. = *A. latipes*.

STYLOLEPIS, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1828) 17.—Cf. Flora, xii. (1829) i. Erg. 55 = **Podolepis**, Labill. (Compos.).
gracilis, Lehm. l. c. = *P. gracilis*.

STYLOMECON, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 74, lapsu = **HYLOMECON**, Maxim. = **Stylophorum**, Nutt. (Papav.).

STYLONGCERUS, Spreng. Syst. iii. 356 (1826) = **Angianthus**, Wendl. (Compos.).
cylindraceus, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 485 = *A. humifusus*.
humifusus, Spreng. Syst. iii. 356 = *A. humifusus*.
multiflorus, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 244 = *Rutidosia Pumilo*.
suberectus, Steetz, l. c. i. 436 = *A. humifusus*.

STYLOPAPPUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 431 = **Troximon**, Nutt. (Compos.).
elatus, Nutt. l. c. 433 = T. Nuttallii.
grandiflorus, Nutt. l. c. 422 = T. grandiflorum.
laciniatum, Nutt. l. c. = T. laciniatum.
Lessingii, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1322 = T. humile.
pumilus, D. Dietr. l. c. = T. aurantiacum.

STYLOPHORUM, Nutt. Gen. Am. ii. 7 (1818).
PAPAVERACEAE, Benth. & Hook. f. i. 52.
DICRANOSTIGMA, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 255 (1855).
HYLOMECON, Maxim. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ix. (1858) (Prim. Fl. Amur.) 36. t. 3.
cambricum, Spreng. Syst. ii. 570 = Meconopsis cambrica.
crassifolium, Steud. Nom. ed. II. ii. 650 = Meconopsis heterophylla.
diphyllum, Nutt. Gen. Am. ii. 7.—Am. bor.
heterophyllum, Steud. Nom. ed. II. ii. 650 = Meconopsis heterophylla.
japonicum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 11.—Japon.
lactucoides, Baill. Hist. Pl. iii. 114.—Reg. Himal.
nepalense, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 203 = Meconopsis nepaulensis.
ohiense, Spreng. Syst. ii. 570 = diphyllum.
paniculatum, G. Don, Gen. Syst. i. 135 = Meconopsis nepaulensis.
petiolatum, Nutt. Gen. Am. ii. 8 = diphyllum.
simplicifolium, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 203 = Meconopsis simplicifolia.

STYLOSANTHES, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 108 (1788); et Fl. Ind. Occ. 1280. t. 25 (1806). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 517.
angustifolia, Vog. in Linnaea, xiii. (1838) 63.—Bras.
angustissima, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1200, nomen.—Guian.
aprica, Span. in Linnaea, xv. (1841) 192 = mucronata.
Bojeri, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 68.—Afr. trop.
bracteata, Vog. l. c. 70.—Bras.
capitata, Vog. l. c.—Bras.
elator, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1789) 296. t. 11. f. 2.—Am. bor.
erecta, Beauv. Fl. Owar. ii. 28. t. 77.—Afr. trop.
flavicans, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 156.—Afr. trop.
glutinosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 507. t. 595.—Mexic.
gracilis, H. B. & K. l. c. t. 596.—N. Granat.
guianensis, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1789) 296.—Guian.
guineensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 281.—Afr. trop.
guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 357 = erecta.
hispidula, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 75 = elator.
hispidula, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 112 = guianensis.
humilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 506. t. 594.—Venezuela.
humilis, Rich. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 272 = procumbens.
juncata, Michx. in Mém. Soc. Phys. Genève. xxviii. (1883) n. vii. 19.—Paraguay.
leiocarpa, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 64.—Bras.
longiseta, Michx. in Mém. Soc. Phys. Genève. xxviii. (1883) n. vii. 18.—Paraguay.
montevidensis, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 67.—Bras.
mucronata, Willd. Sp. Pl. iii. 1166.—As. et Afr. trop.
procumbens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 108.—Ind. occ.
rigida, Spreng. Syst. iii. 310.—Bras.
ruellioides, Mart. ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 90.—Bras.
scabra, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 69.—Am. trop.
setosa, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 227 = mucronata.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 567 = guianensis.
tenuifolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 281 = angustifolia.
viscosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 108.—Am. trop.

STYLURUS, Rafin. Fl. Ludov. 27 (1817) = **Ranunculus**, Tourn.
fistulosus, Rafin. l. c. 28 = R. multifidus?

STYLURUS, Salisb. in Knight, Prot. 115 (1809) = **Grevillea**, R. Br. (1810) (Proteac.).
buxifolia, Knight, l. c. 115 = G. buxifolia.
collina, Knight, l. c. 116 = G. buxifolia.

STYLYPUS, Rafin. Neogenyt. 3 (1825) = **Geum**, Linn. (Rosac.).
vernus, Rafin. l. c. = G. vernum.

STYPA, Garcke, Fl. Deutschl. ed. II. 367 (1851) = **Stipa**, Linn. (Gramin.).

STYPANDRA, R. Br. Prod. 278 (1810). **LILIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 794.
STYPONEMA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 67 (1866).
caerulea, R. Br. Prod. 279, in obs. = Pasithea caerulea.
caespitosa, R. Br. l. c.—Austral.
coarctata, R. Br. l. c. in obs. = Excremis ramosa.
frutescens, Knowles & Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 69 = glauca.
glauca, R. Br. Prod. 279.—Austral.
grandiflora, R. Br. l. c.—Austral.
imbricata, R. Br. Prod. 279 = glauca.
propinqua, A. Cunn. in Hook. Bot. Mag. t. 3417 = glauca.
scabra, R. Br. Prod. 279 = Agrostocrinum stypan-droides.
scoparia, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 35 = glauca.
umbellata, R. Br. Prod. 279.—Austral.
virgata, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 35 = glauca.

STYPHANIA, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 66 (1868), sphalm. = **Stephania**, Lour. (Menisp.).

STYPHELIA, Sm. Spec. Bot. New Holl. 45. t. 14 (1793). **EPACRIDAE**, Benth. & Hook. f. ii. 610.
SOLENSICIA, Lindl. Swan River App. 57 = glauca.
abietina, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 48. t. 68 = Cyathodes abietina.
acerosa, Soland. ex Gaertn. Fruct. ii. 78 = Cyathodes acerosa.
acicularis, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon acicularis.
acuminata, Spreng. Syst. i. 659 = Leucopogon acuminatus.
adscendens, R. Br. Prod. 537.—Austral.
affinis, Spreng. Syst. i. 658 = Leucopogon lanceolatus.
aggregata, Spreng. l. c. 657 = Acrotriche aggregata.
Allittii, F. Muell. Fragm. vi. 34 = Leucopogon Allittii.
alternifolia, Spreng. Syst. i. 655 = Leucopogon alternifolius.
amplexicaulis, Rudge, in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 292. t. 8 = Leucopogon amplexicaulis.
androstoma, F. Muell. Fragm. vi. 55 = Cyathodes empetrifolia.
angustifolia, DC. Prod. vii. 735 = laeta.
apiculata, Spreng. Syst. i. 656 = Leucopogon apiculatus.
appressa, Spreng. l. c. 658 = Leucopogon appressus.
assimilis, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon assimilis.
attenuata, F. Muell. l. c. 106 = Leucopogon attenuatus.
australis, F. Muell. Fragm. vi. 43 = Leucopogon australis.
Baxteri, F. Muell. l. c. 35 = Astroloma Baxteri.
biflora, Spreng. Syst. i. 659 = Leucopogon biflorus.
Billardieri, F. Muell. Fragm. vi. 43 = Cyathodes glauca.
blepharolepis, F. Muell. l. c. 48 = Leucopogon blepharolepis.
blepharophylla, F. Muell. l. c. 34 = Leucopogon elegans.
Bossiaea, F. Muell. l. c. 47 = Leucopogon Bossiaea.
brachycephala, F. Muell. l. c. 34 = Leucopogon cucullatus.
brachyloma, F. Muell. l. c. 39 = Brachyloma Preissii.
bracteolaris, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon bracteolaris.
brevicuspis, F. Muell. l. c. = Leucopogon brevicuspis.
breviflora, F. Muell. l. c. 107 = Leucopogon breviflorus.
Brownii, Spreng. Syst. v. 683 (Index) = Leucopogon reflexus.
Candolleana, F. Muell. Fragm. vi. 38 = Astroloma Candolleana.
capitellata, F. Muell. l. c. 31 = Leucopogon capitellatus.

STYPHELIA :—

carinata, Spreng. Syst. i. 658, partim = Leucopogon carinatus.
ciliata, F. Muell. Fragm. vi. 42 = Brachyloma ciliatum.
collina, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 47. t. 65 = Leucopogon collinus.
compacta, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon compactus.
compacta, Spreng. Syst. i. 657 = Astroloma compactum.
conantha, F. Muell. Fragm. vi. 30 = Conostephium planifolium.
concinna, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon concinnus.
concurva, F. Muell. Fragm. vi. 36 = Leucopogon concurvus.
conferta, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon confertus.
Conostephium, F. Muell. Fragm. vi. 40 = Conostephium pendulum.
conostephioides, F. Muell. l. c. 34 = Leucopogon conostephioides.
cordata, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 46. t. 63 = Acrotriche ovalifolia.
cordata, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon cordatus.
cordifolia, F. Muell. Fragm. viii. 54 = Leucopogon cordifolius.
corifolia, F. Muell. Census, 105 = Leucopogon corifolius.
cornifolia, Rudge, in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) t. 9 = Trochocarpa laurina.
corynocarpa, F. Muell. Census, 107 = Leucopogon corynocarpus.
costata, F. Muell. in Wing's South. Sc. Record (April, (1885).—Austral.
crassiflora, F. Muell. Fragm. vi. 40 = Leucopogon crassiflorus.
crassifolia, F. Muell. l. c. 33 = Leucopogon crassifolius.
cryptantha, F. Muell. Census, 106 = Leucopogon cryptanthus.
cucullata, Spreng. Syst. i. 656 = Leucopogon cucullatus.
cuneifolia, F. Muell. Fragm. vi. 37 = Astroloma compactum.
Cunninghami, F. Muell. l. c. 39 = Melichrus urceolatus.
cuspidata, Spreng. Syst. i. 657 = Leucopogon cuspidatus.
cymbiformis, F. Muell. Fragm. vi. 34 = Leucopogon cymbiformis.
Cymbula, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 67 = Leucopogon Cymbulae.
daphnoides, Sm. Spec. Bot. New Holl. 48 = Brachyloma daphnoides.
dealbata, Spreng. Syst. i. 659 = Cyathodes dealbata.
deformis, Spreng. l. c. 658 = Leucopogon deformis.
denticulata, Spreng. l. c. = Astroloma humifusum.
denuadata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 67 = Leucopogon micropphyllus.
depressa, F. Muell. Fragm. vi. 42 = Brachyloma depressum.
depressa, Spreng. Syst. i. 655 = Acrotriche depressa.
distans, Spreng. l. c. = Leucopogon distans.
divaricata, Spreng. l. c. 658 = Acrotriche divaricata.
Drummondii, F. Muell. Fragm. vi. 37 = Astroloma Drummondii.
dura, F. Muell. Census, 107 = Leucopogon durus.
elegans, Sond. in Lehm. Pl. Preiss. i. 296 = tenuiflora.
elliptica, Sm. Spec. Bot. New Holl. 49 = Monotoca elliptica.
empetrifolia, F. Muell. in Papers Roy. Soc. Tasm. (1874) 86 = Monotoca empetrifolia.
Epacridis, F. Muell. Fragm. vi. 38 = Astroloma divaricatum.
epacrioides, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 65, nomen (Quid?).—Austral.
ericoides, Sm. Spec. Bot. New Holl. 48 = Leucopogon ericoides.
erubescens, F. Muell. Fragm. vi. 33 = Leucopogon Oxycedrus.
esquamata, Spreng. Syst. i. 658 = Leucopogon esquamatus.
exarrhena, F. Muell. Fragm. vi. 31 = pusilliflora.
exolasia, F. Muell. l. c. 34 = Leucopogon exolasius.
fasciculiflora, F. Muell. l. c. viii. 55 = Acrotriche fasciculiflora.
fastigiata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 67 = Leucopogon esquamata.

STYPHELIA:—

- fimbriata*, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon fimbriatus*.
flavescens, F. Muell. Fragm. vi. 33 = *Leucopogon flavescens*.
flexifolia, Spreng. Syst. i. 659 = *Leucopogon flexifolius*.
florulentus, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon florulentus*.
Fraseri, F. Muell. Fragm. vi. 56 = *Leucopogon Fraseri*.
geissoloma, F. Muell. l. c. 39 = *Brachyloma concolor*.
gibbosa, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon gibbosa*.
Gilbertii, F. Muell. l. c. = *Leucopogon Gilbertii*.
glabella, F. Muell. Fragm. vi. 32 = *Leucopogon phyllostachys*.
glabella, Spreng. Syst. i. 655 = *Leucopogon glabellus*.
glacialis, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon glacialis*.
glauca, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 45. t. 61 = *Monotoca lineata*.
glaucescens, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Chr. Post. 67 = *triflora*.
gnaphalioides, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon gnaphalioides*.
Gnidium, Vent. Jard. Malm. 23 = *Leucopogon Richii*.
gracilis, Spreng. Syst. i. 658 = *Leucopogon gracilis*.
gracillima, F. Muell. Fragm. vi. 34 = *Leucopogon gracillimus*.
grandiuscula, F. Muell. l. c. 47 = *Leucopogon atherolepis*.
Hainesii, F. Muell. l. c. iv. 96. t. 28. — Austral.
hirsuta, F. Muell. l. c. vi. 31 = *Leucopogon hirsutus*.
hirtella, F. Muell. Census, 107 = *Leucopogon hirtellus*.
Hookeri, F. Muell. Fragm. vi. 44 = *Cyathodes ascendens*.
humifusa, Pers. Syn. i. 174 = *Astroloma humifusum*.
imbricata, Spreng. Syst. i. 656 = *Leucopogon imbricatus*.
interrupta, Spreng. l. c. = *Leucopogon interruptus*.
involuta, Spreng. l. c. 655 = *Pentachondra involu-crata*.
juniperina, Pers. Syn. i. 174 = *Leucopogon juniperinus*.
laeta, R. Br. Prod. 537. — Austral.
lanceolata, Sm. Spec. Bot. New Holl. 49 = *Leucopogon lanceolatus*.
lasionema, F. Muell. Fragm. vi. 40 = *Astroloma stomarrhena*.
lasiolepis, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon lasiolepis*.
latifolia, R. Br. Prod. 537 = *laeta*.
ledifolia, F. Muell. Census, 107 = *Monotoca ledifolia*.
leptantha, F. Muell. l. c. = *Leucopogon leptanthus*.
leptospermoides, Spreng. Syst. i. 659 = *Leucopogon leptospermoides*.
Leucopogon, F. Muell. Fragm. iv. 97. — Austral.
Lindleyi, F. Muell. l. c. vi. 40 = *Conostephium minus*.
linifolia, F. Muell. l. c. 36 = *Leucopogon melaleucoides*.
lissanthoides, F. Muell. l. c. 33 = *Leucopogon cuneifolius*.
lobopogona, F. Muell. l. c. 39 = *Brachyloma ericoides*.
longiflora, F. Muell. l. c. viii. 54 = *Astroloma longiflorum*.
longifolia, R. Br. Prod. 537. — Austral.
Macraei, F. Muell. Fragm. vi. 46 = *Leucopogon Macraei*.
macrocalyx, F. Muell. l. c. 37 = *Astroloma macrocalyx*.
malaica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 67 = *Leucopogon malayanus*.
margarodes, Spreng. Syst. i. 657 = *Leucopogon margarodes*.
megacarpa, F. Muell. Fragm. vi. 32 = *Leucopogon planifolius*.
melaleucoides, F. Muell. l. c. iv. 97. — Austral.
Michiei, F. Muell. l. c. vi. 80 = *Coleanthera myrtoides*.
microcalyx, F. Muell. l. c. 37 = *Astroloma microcalyx*.
microdonta, F. Muell. Census, 105 = *Astroloma microdonta*.
microphylla, Spreng. Syst. i. 656 = *Leucopogon microphyllus*.
minutiflora, F. Muell. Fragm. xi. 122 = *Monotoca tamariscina*.
Mitchellii, F. Muell. Census, 107 = *Leucopogon Mitchellii*.

STYPHELIA:—

- montana*, F. Muell. Fragm. vi. 45 = *Lissanthe montana*, *Leucopogon Hookeri*.
multiflora, Spreng. Syst. i. 658 = *Leucopogon multiflorus*.
mutica, F. Muell. Fragm. vi. 45 = *Leucopogon muticus*.
neo-anglica, F. Muell. Census, 107 = *Leucopogon neo-anglicus*.
obovata, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 48. t. 67 = *Leucopogon revolutus*.
obtecta, F. Muell. Census, 107 = *Leucopogon obtectus*.
obtusata, F. Muell. l. c. 106 = *Leucopogon obtusatus*.
Oldfieldii, F. Muell. l. c. = *Leucopogon Oldfieldii*.
Oldfieldii, F. Muell. l. c. 107 = *Leucopogon ovalifolius*.
oligarrhenoides, F. Muell. Fragm. ix. 47 = *Monotoca oligarrhenoides*.
opponens, F. Muell. l. c. vi. 48 = *Leucopogon opponens*.
oppositifolia, F. Muell. l. c. 32 = *Leucopogon oppositifolius*.
ovalifolia, Spreng. Syst. i. 656 = *Acrotriche ovalifolia*.
Oxycedrus, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 49. t. 69 = *Cyathodes acerosa*.
ozothamnoides, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon ozothamnoides*.
pallida, Spreng. Syst. i. 658 = *Astroloma pallidum*.
parviflora, Andr. Bot. Rep. t. 287 = *Leucopogon Richei*.
parvifolia, F. Muell. in Papers Roy. Soc. Tasm. (1874) 86 = *Cyathodes parvifolia*.
patula, Spreng. Syst. i. 657 = *Acrotriche patula*.
pauciflora, Spreng. l. c. 658 = *Leucopogon leptospermoides*.
pendula, Spreng. l. c. 657 = *Leucopogon pendulus*.
pentapogona, F. Muell. Fragm. vi. 36 = *Astroloma microphyllum*.
phyllostachys, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon phyllostachys*.
pinifolia, Spreng. Syst. i. 659 = *Astroloma pinifolium*.
platyphylla, F. Muell. Fragm. vi. 37 = *Astroloma tectum*.
pleiosperma, F. Muell. l. c. 41 = *Leucopogon pleiospermus*.
pleurandroides, F. Muell. l. c. 32 = *Leucopogon pleurandroides*.
plumuliflora, F. Muell. l. c. 29 = *Leucopogon plumuliflorus*.
pluriloculata, F. Muell. l. c. 32 = *Leucopogon pluriloculatus*.
pogonocalyx, F. Muell. Census, 107 = *Leucopogon pogonocalyx*.
polymorpha, F. Muell. Fragm. vi. 31 = *Leucopogon polymorphus*.
polystachys, Spreng. Syst. i. 659 = *Leucopogon polystachys*.
Preissii, F. Muell. Fragm. vi. 40 = *Conostephium Preissii*.
procumbens, Pers. Syn. i. 174 = *Melichrus rotatus*.
propinqua, Spreng. Syst. i. 658 = *Leucopogon propinquus*.
prostrata, F. Muell. Census, 105 = *Astroloma prostratum*.
pulchella, F. Muell. Fragm. vi. 34 = *Leucopogon pulchellus*.
pumila, Spreng. Syst. i. 656 = *Pentachondra pumila*.
pungens, F. Muell. Fragm. vi. 34 = *Leucopogon propinquus*.
pusilliflora, F. Muell. l. c. iv. 105. — Austral.
racemulosa, F. Muell. l. c. vi. 33 = *Leucopogon racemulosus*.
ramiflora, F. Muell. l. c. vi. 44 = *Acrotriche fasciculiflora*.
ramiflora, Spreng. Syst. i. 659 = *Acrotriche ramiflora*.
reflexa, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 296. t. 19 = *Leucopogon collinus*?
reflexa, Spreng. Syst. i. 655 = *Leucopogon reflexus*.
revoluta, Spreng. l. c. 657 = *Leucopogon revolutus*.
Richei, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 44. t. 60 = *Leucopogon Richei*.
rotata, F. Muell. Fragm. vi. 38 = *Melichrus rotatus*.
rotundifolia, F. Muell. l. c. 45 = *Leucopogon cordifolius*.
rotundifolia, Spreng. Syst. i. 655 = *Leucopogon rotundifolius*.

STYPHELIA:—

- rubicunda*, F. Muell. Fragm. vi. 31 = *Leucopogon rubicundus*.
rubricaulis, Spreng. Syst. i. 656 = *Leucopogon revolutus*.
rudis, F. Muell. Fragm. vi. 32 = *Leucopogon assimilis*.
rufa, F. Muell. l. c. 46 = *Leucopogon rufus*.
ruscifolia, Spreng. Syst. i. 656 = *Leucopogon ruscifolius*.
sapida, F. Muell. Fragm. vi. 42 = *Lissanthe sapida*.
scoparia, Sm. Spec. Bot. New Holl. 49 = *Monotoca scoparia*.
semiopposita, F. Muell. Fragm. vi. 49 = *Leucopogon elatior*.
serrulata, Labill. Holl. Pl. Nov. i. 45. t. 62 = *Acrotriche serrulata*.
setigera, Spreng. Syst. i. 658 = *Leucopogon setiger*.
Sonderi, F. Muell. Fragm. vi. 36 = *Astroloma conostephoides*.
splendens, Hort. ex Planch. in Fl. des Serres, x. (1854-55) 129 = *Astroloma divaricatum*.
sprengelioides, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon sprengelioides*.
spuria, Poir. Encyc. vii. 485 = *Leucopogon ericoides*.
squarrosa, F. Muell. Fragm. vi. 31 = *Leucopogon squarrosus*.
straminea, Spreng. Syst. i. 656 = *Cyathodes straminea*.
striata, Spreng. l. c. = *Leucopogon striatus*.
stricta, F. Muell. Census, 107 = *Leucopogon strictus*.
strigosa, Sm. Spec. Bot. New Holl. 49 = *Lissanthe strigosa*.
strongylophylla, F. Muell. Fragm. vi. 33 = *Leucopogon strongylophyllus*.
subulifolia, F. Muell. l. c. = *Leucopogon insularis*.
tamariscina, Spreng. Syst. i. 656 = *Leucopogon tamariscinus*.
Tameiameiae, F. Muell. Fragm. vi. 55 = *Cyathodes Tameiameiae*.
tecta, Spreng. Syst. i. 657 = *Astroloma tectum*.
tenuiflora, Benth. Fl. Austral. iv. 148. — Austral.
tenuifolia, Lindl. Swan River App. 25, sphalm. = *praece*.
tenuis, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon tenuis*.
tetragona, F. Muell. Fragm. vi. 31 = *Leucopogon tetragonus*.
thymifolia, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon thymifolius*.
triandra, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 67 = *triflora*.
trichocarpa, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 47. t. 66 = *Leucopogon ericoides*.
triflora, Andr. Bot. Rep. t. 72. — Austral.
trochocarpoides, F. Muell. Papuan Pl. 107. — N. Guin.
tubiflora, Sm. Spec. Bot. New Holl. 45. t. 14. — Austral.
unilateralis, F. Muell. Census, 106 = *Leucopogon unilateralis*.
urceolata, F. Muell. Fragm. vi. 38 = *Melichrus urceolatus*.
variifolia, F. Muell. l. c. 32 = *Leucopogon glabellus*.
verticillata, Spreng. Syst. i. 656 = *Leucopogon verticillatus*.
villosa, Dryand. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 513 = *Leucopogon juniperinus*.
villosa, Spreng. Syst. i. 657 = *Leucopogon revolutus*?
virgata, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 46. t. 64 = *Leucopogon virgatus*.
viridiflora, R. Br. Prod. 537 = *viridis*.
viridis, Andr. Bot. Rep. t. 312. — Austral.
Woodsii, F. Muell. Census, 107 = *Leucopogon Woodsii*.
xerophylla, F. Muell. Fragm. vi. 38 = *Astroloma xerophyllum*.

STYPHNOLOBIUM, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1830) 844; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 54 = **Sophora**, Linn. (Legumin.).
affine, Walp. Rep. i. 807 = *Sophora affine*.
japonicum, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1830) 844; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 55 = *Sophora japonica*.

STYPHONIA, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. 230 (1791); Phil. Bot. ii. 70 (1791) = **Lavandula**, Tourn. (Labiata.).

STYPHONIA, Nutt. in Torr. et Gray, Fl. N. Am. i. 220 (1838) = *Rhus*, Tourn. (Anacard.).
atra, Nutt. l. c. = *Oncocarpus vitiensis*.
integrifolia, Nutt. l. c. = *R. integrifolia*.
mollis, Nutt. l. c. = *R. mollis*.
serrata, Nutt. l. c. = *R. integrifolia*.

STYPONEMA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 67 (1866) = *Stypandra*, R. Br. (Liliac.).

STYRANDRA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266 = *Maianthemum*, Weber (Liliac.).
bifolia, Rafin. Med. Fl. ii. 84 = *M. Convallaria*.
canadensis, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266 = *M. Convallaria*.

STYRAX, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 143 (1737). STYRACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 669.

BENZON, Hayne, Arzn. Gew. xi. t. 24 (1829).
 CYRTA, Lour. Fl. Cochinch. 278 (1790).
 EPIGENIA, Vell. Fl. Flum. 183 (1825); iv. tt. 137, 138 (1827).
 FOVEOLARIA, Ruiz & Pav. Prod. 57. t. 9 (1794), partim.
 STRIGILIA, Cav. Diss. vii. 358. t. 201 (1789).
 TREMANTHUS, Pers. Syn. i. 467 (1805).
 TRICHOGAMILA, P. Br. Hist. Jamaic. 218 (1756).
acuminatum, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 58. t. 133.—Bras.
agreste, G. Don, Gen. Syst. iv. 5.—Cochinch.
album, Mart. ex Spreng. Syst. ii. 285.—Bras.
alutaceum, Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 190.—Bras.
ambiguum, Seub. l. c. 192.—Bras.
americanum, Lam. Encyc. i. 82.—Am. bor.
angustifolium, Buc'hoz, Herb. Am. t. 26.—Hab. ?
argenteum, Presl, Rel. Haenk. ii. 60.—Mexic.
aureum, Mart. Reise Bras. i. 551 = *Pamphilia aurea*.
barbatum, Willd. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 188 = *glabrum*.
benjuiferum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 517 = *S. Benzoin*.
Benzoin, Dryand. in Phil. Trans. lxxvii. (1787) ii. 308. t. 12.—Malaya.
californicum, Torr. in Smithson. Contrib. vi. (1854) 4.—Calif.
camporum, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 53. t. 136.—Bras.
Candollei, Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 189.—Bras.
chrysasterum, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 59. t. 139.—Bras.
cordatum, A. DC. in DC. Prod. viii. 267.—Peruv.
cotinifolium, Salisb. Prod. 286 = *officinale*.
crotonoides, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 589.—Singapore.
crymophyllum, G. Don, Gen. Syst. iv. 5, sphalm. = *erymophyllum*.
ellipticum, Fungh. & De Vriese, in De Vriese, Pl. Nov. Ind. Batav. fasc. i. (1845) 10.—Sumatra.
erymophyllum, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 57. t. 137 = *glabratum*.
ferrugineum, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. i. (1823) 88.—Bras.
ferrugineum, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 55. t. 135 = *Pohl.*
Finlaysonianum, Wall. Cat. n. 4403.—Siam ?
floribundum, Griff. Notul. iv. 287 = *serrulatum*.
floridum, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 54. t. 134.—Bras.
fulvum, Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 264 = *longiflorum*.
Gardnerianum, A. DC. l. c. 263.—Bras.
glabratum, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 406.—Bras.
glabrescens, Benth. Pl. Hartw. 66.—Mexic.
glabrum, Cav. Diss. vii. 340. t. 188. f. 1 = *americanum*.
glabrum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 74.—Am. trop.
grandiflorum, J. F. Gmel. Syst. 1633, sphalm. = *grandifolium*.
grandiflorum, Griff. Notul. iv. 287 = *serrulatum*.
grandifolium, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 75.—Am. bor.
guineense, G. Don, Gen. Syst. iv. 5.—Afr. trop.
guyanense, A. DC. in DC. Prod. viii. 261 = *glabrum*.
Hookeri, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 589.—Reg. Himal.
japonicum, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 53. t. 23.—Japon.
japurense, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 188 = *glabrum*.
javanicum, Blume, Bijdr. 671 = *Marlea begoniifolia*.
Klotzschii, Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 194.—Bras.
laeve, Walt. Fl. Carol. 140 = *americanum*.
laevigatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 75 = *americanum*.
laevigatum, Sims, Bot. Mag. t. 921 = *pulverulentum*.

STYRAX:—

lanceifolium, Klotzsch, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 191.—Bras.
latifolium, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 60. t. 140.—Bras.
leiophyllum, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593.—Bras.
leprosum, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 282.—Bras.
Limoncillo, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 292 = *Symplocos martinicensis*.
longiflorum, A. DC. in DC. Prod. viii. 264.—Bras.
macrophyllum, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 405, nomen; et ex Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 61. t. 141.—Bras.
Martii, Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 194.—Bras.
nervosum, A. DC. in DC. Prod. viii. 263 = *ferrugineum*.
Obassia, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 93. t. 46.—Japon.
obliquinervium, A. DC. in DC. Prod. viii. 263 = *chrysasterum* ?
oblongum, A. DC. l. c. 261.—Peruv.
obtusifolium, Griseb. Cat. Pl. Cub. 167.—Cuba.
occidentale, Thunb. Diss. Styr. 8 = *glabrum*.
octandrum, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 75 = *americanum*.
odoratissimum, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 304 = *Finlaysonianum*.
officinale, Linn. Sp. Pl. 444.—Europ. austr.; As. Min.
officinale, Walt. Fl. Carol. 140 = *grandifolium*.
officinatum, Crantz, Inst. ii. 382 = *officinale*.
ovale, Klotzsch, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 194 = *Klotzschii*.
ovatum, A. DC. in DC. Prod. viii. 267.—Peruv.
pallidum, A. DC. l. c. 261.—Guian.
parvifolium, Herb. Berol. ex A. DC. l. c. 263 = *floridum*.
parvifolium, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 53. t. 133.—Bras.
pauciflorum, A. DC. in DC. Prod. viii. 265.—Bras.
Pavonii, A. DC. l. c. 266.—Peruv.
Pentlandianum, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 229.—Bolivia.
platiniifolium, Engelm. ex Torr. in Smithson. Contrib. vi. (1854) 4, in nota.—Texas.
Pohl., A. DC. in DC. Prod. viii. 264.—Bras.
polyspermum, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 590.—Reg. Himal.
Porterianum, Wall. Cat. n. 4401 = *serrulatum*.
psilophyllum, A. DC. in DC. Prod. viii. 266.—Guian.
pulverulentum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 41.—Am. bor.
punctatum, A. DC. in DC. Prod. viii. 264.—Bras.
racemosum, A. DC. l. c. 265.—Peruv.
reticulatum, Mart. Reise Bras. i. 550 = *ferrugineum*.
rigidum, Salisb. Prod. 286 = *americanum*.
Rossamala, Reinw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 651, nomen = *Marlea begoniifolia* ?
rugosum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) 11. 61.—Burma.
serrulatum, Roxb. Hort. Beng. 33; Fl. Ind. ii. 415.—Reg. Himal.; Burma; China.
subcordatum, Moric. Pl. Nouv. Am. 117. t. 71.—Bras.
subenticulatum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 474.—Sumatra.
suberifolium, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 196. t. 40.—China.
subleprosum, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1087, nomen.—Guian.
subpaniculatum, Fungh. & De Vriese, in De Vriese, Pl. Nov. Ind. Batav. fasc. i. (1845) 9. t. 3.—Sumatra.
tinifolium, G. Don, Gen. Syst. iv. 5 = *Clethra tinifolia*.
tomentosum, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 72. t. 101.—Ecuador.
tomentosum, Spreng. Syst. iv. App. 405 = *macrophyllum*.
varians, Seub. in Mart. Fl. Bras. vii. 189 = *chrysasterum*.
villosum, Blume, Bijdr. 671.—Java.
virgatum, Wall. Cat. n. 4400 = *serrulatum*.

STYROSINIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 95 (1836) = *Gesneria*, Linn.
coccinea, Rafin. l. c. 96 = *G. aggregata*.

SUAEDA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 69. t. 18 B (1775). CHENOPODIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 66.
BELOVIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 168 (1849).
BREZIA, Moq. l. c. 167 (1849).
CAVELIA, Moq. l. c. (1849).
CHENOPODINA, Moq. l. c. 159 (1849).

SUAEDA:—

COCHLIOSPERMUM, Lag. Mem. Pl. Barill. 58 (1817).
DONDIA, Adans. Fam. ii. 261 (1763), nomen prius.
EINADIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 121 (1836).
LERCHEA, Hall. Hort. Gotting. 21 (1743).
SCHANGINIA, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 394 (1829).
SCHOBERIA, C. A. Mey. l. c. 395 (1829).
SEVADA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 154 (1849).
TRIKALIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836).
acuminata, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 306.—Rossia.
aestuarina, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 328 = *maritima*.
africana, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 158 = *Salsola aphylla*.
albida, Pall. Illustr. Pl. 53. t. 45 = *Kochia hirsuta*.
altissima, Pall. l. c. 49. t. 42.—Europ. austr.; As. occ.
ampullacea, Bunge, in Bull. Acad. Pétersb. xxv. (1879) 360.—Mongolia.
anonyma, J. F. Gmel. Syst. 503 (Quid ?).—Reg. Arab.
arcuata, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 461.—Turkest.
asphaltica, Boiss. Fl. Orient. iv. 938.—Palaest.
australis, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 318.—As.; Austral.; Polynes.
baccata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 69.—Aegypt.
baccifera, Pall. Illustr. Pl. 48. t. 41.—Ross. mer.
bacciformis, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 328 = *maritima*.
Balansae, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 75 = *setigera*.
Biebersteinia, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 312 = *microphylla*.
calceoliformis, Moq. Chenop. Enum. 128.—Am. bor.
californica, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = *maritima*.
californica, S. Wats. in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 89.—Calif.
chenopodioides, Pall. Illustr. Pl. 56 = *maritima*.
cinerea, Schur, Enum. Pl. Transs. 570 = *Kochia scoparia*.
Clemente, Heynh. Nom. ii. 712 = *setigera*.
corniculata, Bunge, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 429.—Tibet.; Soongar.; Sibir.
crassifolia, Heynh. Nom. ii. 712 = *maritima*.
crassifolia, Pall. Illustr. Pl. 54. t. 46 = *Kochia hirsuta*.
dendroides, Moq. Chenop. Enum. 126.—Reg. Caucas.
depressa, S. Wats. Bot. King's Exped. 294 = *plattensis*.
diffusa, S. Wats. in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 88.—Am. bor. occ.
divaricata, Moq. Chenop. Enum. 123.—Chili.
filiformis, Dum. Fl. Belg. 22 = *maritima*.
foetida, Moq. Chenop. Enum. 132.—Hab. ?
foliosa, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 156.—Peruv.
fruticosa, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 57 = *monoica*.
fruticosa, Dum. Fl. Belg. 22 = *fruticosa*.
fruticosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 70.—Reg. bor. temp.
fruticosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 387 = *Torreyana*.
fruticulosa, Moq. Chenop. Enum. 132.—Reg. Ural.
glauca, Bunge, in Bull. Acad. Pétersb. xxv. (1879) 362 = *Stauntoni*.
gracilis, Moq. Chenop. Enum. 123 = *setigera*.
Helenae, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 158.—Ins. S. Helen.
heterocarpa, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. iii. 781.—Reg. Caucas.; Persia.
heterophylla, Bunge, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 429; Boiss. Fl. Orient. iv. 943 = *Afghan*; Sibir.
hirsuta, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 580 = *Kochia hirsuta*.
hortensis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 70.—Aegypt.
hyssopifolia, Pall. Illustr. Pl. 44. t. 36 = *Kochia hyssopifolia*.
indica, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 316 = *nudiflora*.
indica, Seem. Bot. Voy. Herald, 406 = *australis*.
intermedia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 296.—Am. bor. occ.
Jacquini, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 329 = *maritima*.
Kareliniana, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. iii. 789.—Sibir. altaic.
Kochii, Todaro, ex Nym. Consp. 630 = *maritima*.
laxifolia, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) reimp. 11 = *fruticosa*.

SUAEDA :—

- leiosperma*, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 306 = *altissima*.
linearis, Moq. *Chenop. Enum.* 130.—Am. bor.; Cuba.
linifolia, Pall. *Illustr. Pl.* 47. t. 40.—Ross. mer. or.
longifolia, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 188 = *setigera*.
macrocarpa, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 309 = *maritima*.
maritima, Dum. *Fl. Belg.* 22.—Reg. temp. bor. et austr.
maritima, S. Wats. in Bot. King's Exped. 294 = *diffusa*.
maxima, C. Koch, in *Linnaea*, xvii. (1843) 312 = *altissima*.
microphylla, C. Koch. l. c. = *dendroides*.
microphylla, Moq. *Chenop. Enum.* 127 = *microphylla*.
microphylla, Pall. *Illustr. Pl.* 52. t. 44.—Reg. Caucas.; Sibir.
microsperma, Fenzl, in *Ledeb. Fl. Ross.* iii. 785.—Soongaria; Tibet.
minima, Fenzl, l. c. 789.—Sibir. altaic.
minutiflora, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 194.—Calif.
mollis, Delile, *Fl. Aegypt. Illustr.* 57 = *vermiculata*.
monantha, C. Koch, in *Linnaea*, xvii. (1843) 313 = *setigera*.
monoica, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 70.—Afr. bor.; As. occ.; Ind. or.
monoica, Schimp. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 986 = *baccata*.
muricata, Pall. *Illustr. Pl.* 43. t. 35 = *Kochia muricata*.
nudiflora, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 316.—Ind. or.
nudiflora, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 155 = *maritima*.
nudiflora, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 246 = *monoica*.
obtusifolia, Trautv. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) ii. 62.—Turkestan.
occidentalis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 90.—Am. bor. occ.
Pallasiana, Heynh. *Nom.* ii. 712 = *Kochia hirsuta*.
paradoxa, Bunge, in *Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 427.—Bokhara.
parvifolia, Moq. *Chenop. Enum.* 131 = *microsperma*.
physophora, Pall. *Illustr. Pl.* 51. t. 43.—Reg. Casp.; Persia; As. bor.
pinnatifida, Delile, *Desc. Egypt.* 57. n. 298 = *Salsola pinnatifida*.
plattensis, Nutt. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 164, in syn.—Am. bor. occ.
platyphylla, Ehrenb. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 986 = *baccata*.
prostrata, Pall. *Illustr. Pl.* 55. t. 47 = *microsperma*.
pruinosa, Lange, in Kjoeb. *Vidensk. Meddel.* (1861) 45 = *vera*.
Przewalskii, Bunge, in *Bull. Acad. Petersb.* xxv. (1879) 360.—Mongolia.
pterantha, Bunge, in *Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 430.—Soongar.
puberula, Moq. *Chenop. Enum.* 122.—Hab.?
pygmaea, Moq. l. c. 127.—Hab.?
Rosmarinus, Ehrenb. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 951 = *Seidlitzia Rosmarinus*.
salsa, Pall. *Illustr. Pl.* 46. t. 39.—Reg. Caucas.; Sibir.
sedifolia, Pall. l. c. 41. tt. 32–34 = *Kochia sedoides*.
sedoides, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 651, sphalm. = *praec.*
setifera, Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* i. 257 = *Halogeton sativus*.
setigera, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 309.—Reg. Mediterr.; As. occ.
Sieversiana, Pall. *Illustr. Pl.* 45. t. 38 = *Kochia scoparia*.
spicata, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 317 = *maritima*.
splendens, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* iii. 30 = *setigera*.
Stauntonii, Moq. *Chenop. Enum.* 131.—China.
suffrutescens, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 88.—Am. bor. occ.
tamariscina, Lindl. in Mitch. *Journ. Trop. Austral.* 239 = *Enchylaena microphylla*.
tomentosa, Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1838), reimp. 12 = *Chenolea canariensis*.
Torreyana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 88.—Am. bor. occ.

SUAEDA :—

- tortuosa*, Moq. *Chenop. Enum.* 131.—N. Zel.
transoxana, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 943 = *pterantha*.
triandra, Henck. *Adumbr. Hort. Hal.* 21 = *Kochia hyssopifolia*.
trigyna, Heynh. *Nom.* ii. 640, in syn.—Hab.?
vera, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 69.—Reg. Mediterr.
vermiculata, Forsk. l. c. 70.—Afr. bor.; Arab.
villosa, Lowe, ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 129 = *Chenolea canariensis*.
SUARDA, Nocca, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 651 (1841) = *Eugenia*, Mich. (Myrtac.).
ligustrifolia, Nocca, ex Steud. l. c. = *E. baruensis*.
SUARDIA, Schrank, *Pl. Rar. Hort. Monac.* t. 58 (1819) = *Melinis*, Beauv. (Gramin.).
picta, Schrank, l. c. = *M. minutiflora*.
SUBERTIA, Wood, in *Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.* 1868 (1869) 172, sphalm. = *SEUBERTIA*, Kunth = *Brodiaea*, Sm. (Liliac.).
SUBLIMIA, Comm. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 164 (1836 ?) = *Hyophorbe*, Gaertn. (Palm.).
aevidaps, Comm. ex Mart. l. c. 176 = *H. amari-caulis*.
amaricaulis, Comm. ex Mart. l. c. 309 = *H. amari-caulis*.
Areca, Comm. ex Mart. l. c. 169 = *Areca Catechu*.
centennina, Comm. ex Mart. l. c. 174 = *Acantho-phoenix crinita*.
palmicaulis, Comm. ex Mart. l. c. 175 = *Dietyosperma album*.
vilicaulis, Comm. ex Mart. l. c. 164 = *H. indica*.
SUBRISIA, Rafin. *Sylva Tellur.* 43 (1838) = *Ehretia*, Linn. (Borag.).
petiolaris, Rafin. l. c. = *E. petiolaris*.
SUBULARIA, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 117 (1775) = *Schouwia*, DC. (Crucif.).
purpurea, Forsk. l. c. = *Schouwia arabica*.
SUBULARIA, Ray, ex Linn. *Syst. ed.* I (1735). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 83.
alpina, Willd. *Sp. Pl.* iii. 424 = *Arabis vochinensis*.
aquatica, Linn. *Sp. Pl.* 642.—Europ.; Am. bor.
monticola, A. Br. ex Schweinf. *Beitr. Fl. Aethiop.* 76.—Abyss.
repens, Pritz. *Ic. Ind.* 1082, sphalm. = *Littorella juncea*.
SUCCISA, Neck. *Elem.* i. 109 (1790); Wallr. *Sched. Crit.* 46, in syn. (1822) = *Cephalaria*, Schrad. et *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).
alpina, Moench, *Meth.* 488 = *C. alpina*.
altissima, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 297 = *Sc. Succisa*.
ambrosioides, Spreng. *Syst.* i. 379 = *C. comiculata*.
amplexicaulis, Spreng. l. c. = *Sc. amplexicaulis*.
angustula, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 49 = *Sc. Succisa*.
arvensis, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 94 = *Sc. arvensis*.
atropurpurea, Moench, *Meth.* 490 = *Sc. australis*.
aurigerana, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 51 = *Sc. Succisa*.
australis, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 196 = *Sc. australis*.
beugesia, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 51 = *Sc. Succisa*.
bipinnata, Moench, *Meth.* 489 = *Sc. gramuntia*.
brevis, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 49 = *Sc. Succisa*.
cagiriensis, Jeanb. & Timb. in *Bull. Soc. Phys. et Nat. Toul.* iii. (1875–76) 580 = *Sc. Succisa*.
centauroides, Spreng. *Syst.* i. 379 = *C. corniculata*.
ciliata, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 94 = *Sc. ciliata*.
Columbaria, Moench, *Meth.* 489 = *Sc. Columbaria*.
corniculata, Sweet, *Hort. Brit. ed.* I. 204 = *C. corniculata*.
cuspidata, Jord. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 54 = *Sc. Succisa*.
decurrens, Spreng. *Syst.* i. 379 = *C. attenuata*.
dentata, Jord. & Fourr. *Brev. Nov. fasc.* ii. 54 = *Sc. Succisa*.
dichotoma, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 94 = *Sc. dichotoma*.

SUCCISA :—

- diversifolia*, Spreng. *Neue Entdeck.* i. 279 = *Scabiosa banatica*.
elliptica, Jeanb. & Timb. in *Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* iii. (1875–76) 579 = *Sc. Succisa*.
Fuchsii, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 476 = *Sc. Succisa*.
fuscescens, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 48 = *Sc. Succisa*.
Fussiana, Heuff. ex Schur, *Enum. Pl. Transs.* 293 = *C. radiata*.
gigantea, Jeanb. & Timb. in *Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* iii. (1875–76) 579 = *Sc. Succisa*.
glabrata, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 54 = *Sc. Succisa*.
glabrata, Sweet, *Hort. Brit. ed.* I. 204 = *Sc. Succisa*.
gracilescens, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 50 = *Sc. Succisa*.
graminifolia, Moench, *Meth. Suppl.* 185 = *Sc. graminifolia*.
humilis, Spreng. *Syst.* i. 379 = *C. attenuata*.
incisa, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 51 = *Sc. Succisa*.
inflexa, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 298 = *Sc. australis*.
joppica, Spreng. *Syst.* i. 378 = *C. joppensis*.
laetevirens, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 53 = *Sc. Succisa*.
laevigata, Spreng. *Syst.* i. 379 = *C. corniculata*.
lancifolia, Moench, *Meth.* 488 = *C. syriaca*.
leucantha, Moench, l. c. 489 = *C. leucantha*.
macrocalycina, Moench, l. c. = *Sc. ucranica*.
microcephala, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 56 = *Sc. Succisa*.
microcephala, Willk. in *Flora*, xxxiv. (1851) 740 = *Sc. microcephala*.
palustris, Sass, Phaner. *Fl. Oesels*, 57 = *Sc. Succisa*.
parvula, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 56 = *Sc. Succisa*.
pentaphylla, Moench, *Meth.* 488 = *C. transylvanica*.
pinnatifida, Lange, in Kjoeb. *Vidensk. Meddel.* (1861) 63 = *Sc. Succisa*?
platyphylla, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 48 = *Sc. Succisa*.
praemorsa, Aschers. *Fl. Brandenb.* 285 = *Sc. Succisa*.
pratensis, Moench, *Meth.* 489 = *Sc. Succisa*.
pratensis, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 52 = *Sc. Succisa*.
procera, Jord. & Fourr. l. c. = *Sc. Succisa*.
propera, Jord. & Fourr. l. c. 55 = *Sc. Succisa*.
pyrenaica, Jord. & Fourr. l. c. 55 = *Sc. Succisa*.
radiata, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 293 = *C. radiata*.
rhodanensis, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 53 = *Sc. Succisa*.
rigida, Spreng. *Syst.* i. 379 = *C. rigida*.
sabauda, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 50 = *Sc. Succisa*.
scabra, Spreng. *Syst.* i. 379 = *C. scabra*.
stellata, Moench, *Meth.* 490 = *Sc. stellata*.
stricta, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 52 = *Sc. Succisa*.
subacaulis, N. Bernardin, in *Cariot. Et. Fl. ed.* V. ii. 301 = *Sc. Succisa*.
sylvatica, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 59 = *Sc. Succisa*.
syriaca, Spreng. *Syst.* i. 378 = *C. syriaca*.
tardans, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. Fasc.* ii. 54 = *Sc. Succisa*.
tatarica, Spreng. *Syst.* i. 378 = *C. tatarica*.
transylvanica, Spreng. l. c. = *C. transylvanica*.
trifida, Spreng. l. c. 379 = *C. attenuata*.
uralensis, Spreng. *Syst.* i. 378 = *C. corniculata*.
ustulata, Spreng. l. c. 379 = *C. attenuata*.
viretorum, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* ii. 49 = *Sc. Succisa*.
vogesiaca, Jord. & Fourr. l. c. 55 = *Sc. Succisa*.
vulgaris, J. & C. Presl, *Fl. Čech.* 31 = *Sc. Succisa*.
SUCCISOCREPIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 104 = *Crepis*, Vaill. (Compos.).
succisaefolia, Fourr. l. c. = *C. succisaefolia*.
SUCCOVIA, Spreng. *Anleit.* ii. ii. 721 (1818) = *Succowia*, Medic. (Crucif.).
SUCCOWIA, Dennst. *Schluess. Hort. Malab.* 32 (1818) = *Hiptage*, Gaertn. (Malpig.).
fimbriata, Dennst. l. c. = *H. Madablota*.

- SUCCOWIA**, Medic. Pflanzeng. i. 64 (1792) t. 1. f. 9. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 86. *balearica*, Medic. l. c. 65.—Reg. Mediterr. *echinata*, Moench, Meth. 265 = *balearica*.
- SUCCUTA**, Desmoul. Etudes Org. Cusc. 74 (1853) = **Cuscuta**, Tourn. (Convolv.). *alba*, Desmoul. l. c. = *C. Epithymum*.
- SUCHTENLENIA**, Karel. ex Meissn. Gen. Comm. 188 (1840); et in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 16. t. 2. *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 845. *acanthocarpa*, Karel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 17. t. 2 = *cerinthifolia*. *calycina*, A. DC. in DC. Prod. x. 163 = *cerinthifolia*. *cerinthifolia*, Karel. ex Meissn. Gen. Comm. 188.—Reg. Transcauc.; Turkest. *uniseriatis*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 169 = *cerinthifolia*.
- SUCKLEYA**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 103. *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 54. *petiolaris*, A. Gray, l. c.—Am. bor.
- SUEDA**, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 192, sphalm. = **Suaeda**, Forsk. (Chenop.).
- SUENSONIA**, Gaudich. ex Miq. Syst. Pip. 535 (1843) = **Piper**, Linn.
- SUFFRENIA**, Bell. in Mém. Acad. Turin, x, xi. (1802-3) 445 = **Ammannia**, Houst. et **Rotala**, Linn. (Lythrar.). *capensis*, Harv. Thes. Cap. ii. 56. t. 189 = *R. filiformis*. *dichotoma*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 616 = *Ammannia multiflora*. *filiformis*, Bell. in Mém. Acad. Turin, x, xi. (1802-3) 445 = *R. filiformis*.
- SUGEROKIA**, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 144 (1867) = **Heloniopsis**, A. Gray (Liliac.). *japonica*, Miq. l. c. 145 = *H. japonica*.
- SUGILLARIA**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 18 (1866) = **Scilla**, Linn. (Liliac.). *lanceaeifolia*, Salisb. l. c. = *S. lanceaeifolia*.
- SUITENIA**, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 479 (1812) = **Swietenia**, Linn. (Meliac.).
- SUITRAMIA**, Reichb. Nom. 173 (1841) = **Svitramia**, Cham. (Melastom.).
- SUKAMINEA**, Rafin. New Fl. Am. iii. 44 (1836) = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).
- SUKANA**, Adans. Fam. ii. 269 (1763) = **Celosia**, Linn. (Amarant.).
- SUKSDORFIA**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 41. *SAXIFRAGEAE*. *violacea*, A. Gray, l. c. 42.—Am. bor.
- SULCANUX**, Rafin. Sylva Tellur. 148 (1838) = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).
- SULIPA**, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 497 (1837) (Genus delendum). *globosa*, Blanco, l. c. ed. II. 348 = *Planchonia valida*. *Pseudopsidium*, Blanco, l. c. ed. I. 497 = *Gardenia Pseudopsidium*.
- SULITRA**, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 366 = **Lessertia**, DC. (Legumin.). *africana*, Medic. l. c. = *L. linearis*? *herbacea*, Medic. Phil. Bot. i. 202 = *L. linearis*. *perennans*, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 366 = *L. perennans*. *pubescens*, Moench, Meth. 164 = *L. linearis*.
- SULLA**, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 372 = **Hedysarum**, Tourn. (Legumin.). *amoena*, Medic. l. c. 373 = *H. coronarium*. *coronaria*, Medic. Phil. Bot. i. 209 = *H. coronarium*. *flexuosa*, Medic. l. c. = *H. flexuosum*.
- SULLIVANTIA**, Torr. & Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii. (1842) 22, in nota. *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 636. *Ohionis*, Torr. & Gray, l. c.; et in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 229.—Am. bor. *oregana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 292.—Am. bor. occ.
- SULPITIA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 37 (1836) = **Epiden-drum**, Linn. (Orchid.). *odorata*, Rafin. l. c. = *E. odoratissimum*.
- SULZERIA**, Roem. & Schult. Syst. iv. p. lx. 707 (1819) = **Anabata**, Willd. (Logan.). *odorata*, Roem. & Schult. l. c. 707 = *A. odorata*.
- SUMBAVIA**, Baill. Etud. Gén. Euph. 390 (1858). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 304. *DORYXYLON*, Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 172, nomen prius. *MERCADOA*, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. t. 463 (1880?). *macrophylla*, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 482.—Ind. or. *rottleroides*, Baill. Etud. Gén. Euph. 390.—Malaya.
- SUMBULUS**, H. Reinsch, in Jahrb. Pract. Pharm. xiii. (1846) 69 = **Ferula**, Tourn. (Umbell.). *moschatus*, H. Reinsch, l. c. = *F. Sumbul*.
- SUNANIA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 95 (1836) = **Poly-gonum**, Tourn. *filiformis*, Rafin. l. c. = *P. virginianum*.
- SUNAPTEA**, Griff. Notul. iv. 516 (1854) = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.). *bantamensis*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 65 = *V. grandiflora*. *disticha*, Trimen, Syst. Cat. Pl. Ceyl. 9 = *V. disticha*. *grandiflora*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 65 = *V. grandiflora*. *odorata*, Griff. Notul. iv. 516 = *V. grandiflora*. *scabriuscula*, Trimen, Syst. Cat. Pl. Ceyl. 9 = *V. scabriuscula*.
- SUNIPIA**, Buch.-Ham. ex Sm. in Rees, Cycl. xxxiv. Art. Stelis, nn. 11, 13 [1816]; Lindl. Orch. Scel. 14 (1826). *ORCHIDAEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 504. *bicolor*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 179 (= *Ione bicolor*).—Reg. Himal. *scariosa*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7373; et l. c.—Reg. Himal.; Burma.
- SUPRAGO**, Gaertn. Fruct. ii. 402. t. 166 (1791) = **Vernonia**, Schreb. (Compos.). *glauca*, Gaertn. l. c. = *V. noveboracensis*. *sphaerocephala*, Cass. in Dict. Sc. Nat. li. 386 = *Liatris scariosa*. *spicata*, Gaertn. Fruct. ii. 402. t. 167 = *Liatris spicata*.
- SUREGADA**, [Roxb.] Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 206 = **Gelonium**, Roxb. (Euphorb.). *adenophora*, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 253 = *G. adenophorum*. *angustifolia*, Baill. Etud. Gén. Enph. 396 = *G. lanceo-latum*. *bifaria*, Baill. Hist. Pl. v. 120 = *G. bifarium*. *bilocularis*, Roxb. ex Wall. Cat. n. 7981 = *G. multi-florum*. *Boiviniana*, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 252 = *G. Boivinianum*. *ceratophora*, Baill. l. c. iii. (1862-63) 154 = *G. afri-canum*. *crenulata*, Baill. l. c. i. (1860-61) 252 = *G. adeno-phorum*. *glabra*, Roxb. Fl. Ind. iii. 831, in obs. = *G. multi-florum*. *glomerulata*, Baill. Etud. Gén. Euph. 396 = *G. bi-farium*. *laurina*, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 253 = *G. lanrinum*. *multiflora*, Baill. Etud. Gén. Euph. 396 = *G. multi-florum*. *spicata*, Baill. l. c. = *G. spicatum*. *zanzibariensis*, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 254 = *G. zanzibariense*.
- SURIANA**, Domb. & Cav. ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xiii. (Apr.-Oct. 1832) 238; Meissn. Gen. Comm. 235 (1841) = **Ercilla**, A. Juss. (Phytol.). *volubilis*, Domb. & Cav. l. c. = *E. volubilis*.
- SURIANA**, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 340 (1737). *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 313. *maritima*, Linn. Sp. Pl. 284.—Littora trop.
- SURUBEA**, Jaume St. Hil. Expos. ii. 355 (1805) = **SOUROUBEA**, Aubl. = **Ruyschia**, Jacq. (Ternstr.). *Aubletii*, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 120 = *R. Souroubea*.
- SURWALA**, M. Roem. Syn. Hesper. 108 (1846) = **Walsura**, Roxb. (Meliac.). *robusta*, M. Roem. l. c. = *W. robusta*.
- SUSARIUM**, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 248 = **Symphystemon**, Miers (Irid.). *andinum*, Phil. l. c. 250 = *Chamelum andinum*. *nigricans*, Phil. l. c. 249.—Chili. *Segethi*, Phil. l. c.—Chili.
- SUSIANA**, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Fritillaria**, Tourn. (Liliac.).
- SUSSEA**, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, tt. 24, 25, 38 (1844-57?) = **Pandanus**, Rumph. *conoidea*, Gaudich. l. c. t. 24 = *P. montanus*. *lagenaeformis*, Gaudich. l. c. t. 25 = *P. lagenaeformis*. *microcarpa*, Gaudich. l. c. = *P. Sussea*. *microstigma*, Gaudich. l. c. t. 38 = *P. microstigma*.
- SUSSODIA**, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 104 (1825) = **Colebrookia**, Sm. (Labiata). *oppositifolia*, Buch.-Ham. l. c. = *C. oppositifolia*.
- SUSUM**, Blume, in Schult. f. Syst. vii. p. xcv. 1493 (1830). *FLAGELLARIEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 861. *HANGUANA*, Blume, Enum. Pl. Jav. 15 (1827). *VERATRONIA*, Miq. Fl. Ind. Bat. 553 (1859). *anthelminthicum*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1493.—Java. *minus*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 598.—Sumatra.
- SUTERA**, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 820 (1821) = **Lessertia**, DC. (Legumin.). *pubescens*, Hort. ex Steud. l. c. = *L. perennans*.
- SUTERA**, Roth, Bot. Bemerk. 172 (1807) = **Chaeno-stoma**, Benth. (Scrophul.). *brachiata*, Roth, l. c. 173.—Hab. ? *foetida*, Roth, l. c. 172 = *C. foetidum*. *oppositifolia*, Roth, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 652 = *C. hispidum*.
- SUTERA**, Roth, Nov. Pl. Sp. 291 (1821). *SCROPHU-LARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 945. *dissecta*, Walp. Rep. iii. 271 = *glandulosa*. *glandulosa*, Roth, Nov. Pl. Sp. 291.—Afr. bor.; Arab.; Ind. or. *multifida*, Walp. Rep. iii. 271 = *Conobea multifida*. *serrata*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 43 = *Stemodia serrata*.
- SUTERIA**, DC. Prod. iv. 536 (1830) = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.). *brasiliensis*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 71 = *P. brasiliensis*. *calycina*, DC. Prod. iv. 536 = *P. Lindleyana*. *fluminensis*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 71 = *P. fluminensis*. *Hookeriana*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 109 = *P. Gardneriana*. *macrantha*, Gardn. l. c. 110 = *P. macrantha*. *macrocalyx*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 71 = *P. megalocalyx*. *nuda*, Mart. l. c. = *P. Gardneriana*. *parviflora*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 110 = *P. suterella*.
- SUTHERLANDIA**, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 327 (1812). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 503. *Darumbium*, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 55.—Chili.

SUTHERLANDIA:—

floribunda, Carr. in *Rev. Hort.* (1870-71) 611.—Hab.?
 foliolata, Lange, *Ind. Sem. Hort. Haun.* (1859) 29; et in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 757.—Austral.?
 frutescens, R. Br. in *Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 327.—Afr. austr.
 incana, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 121 = frutescens.
 microphylla, Burch. ex DC. *Prod.* ii. 273 = frutescens.
 tomentosa, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 251 = frutescens.
 tomentosa, Spreng. *Syst.* iii. 242 = Lessertia tomentosa.
 vesicaria, Spreng. l. c. = Lessertia vesicaria.

SUTHERLANDIA, J. F. Gmel. *Syst.* 1027 (1791) = *Heritiera*, Dryand. (*Stercul.*).
littoralis, J. F. Gmel. l. c. = *H. littoralis*.

SUTRINA, Lindl. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. x.* (1842) 184. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 567.
bicolor, Lindl. l. c. 185.—Peruv.

SUTTONIA, A. Rich. *Ess. Fl. N. Zél.* 349 (1832) = *Myrsine*, Linn.
australis, A. Rich. l. c. 349, t. 33 = *M. Urvillei*.
divaricata, Hook. f. *Fl. Antarct.* 51. t. 34 = *M. divaricata*.
montana, Hook. f. *Fl. N. Zél.* ii. 334 = *M. montana*.
nummularia, Hook. f. l. c. i. 173 = *M. nummularia*.
salicina, Hook. f. *Fl. Antarct.* 52; et l. c. 172 = *M. salicina*.
saligna, Walp. *Rep.* vi. 450, sphalm. = praec.
tenuifolia, Hook. f. *Fl. Antarct.* 52.—Ins. Norfolk.

SUZYGIUM, P. Br. *Hist. Jamaic.* 240 (1756); Adans. *Fam.* ii. 244 (1763) = *Calyptanthus*, Sw. (*Myrtac.*).

SVIDA, Opiz, Seznam, 94 (1852) = *Cornus*, Tourn.
alba, Opiz, l. c. = *C. alba*.
sanguinea, Opiz, l. c. = *C. sanguinea*.

SVITRAMIA, Cham. in *Linnaea*, ix. (1834) 445. *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 736.
canescens, Walp. *Rep.* ii. 132 = pulchra.
pulchra, Cham. in *Linnaea*, ix. (1834) 446.—Bras.

SWAINSONA, Salisb. *Parad. Lond.* t. 28 (1806) *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 504.
CYCLOGYNE, Benth. in Lindl. *Swan River App.* 16 (1839).

DIPLOBIUM, F. Muell. in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* vii. (1863) 489.
albiflora, G. Don, *Gen. Syst.* ii. 245 = coronillaefolia.
astragalifolia, Hort. ex G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 305 = lessertiaefolia.
brachycarpa, Benth. *Fl. Austral.* ii. 217.—Austral.
Burkei, F. Muell. ex Benth. l. c. 218.—Austral.
Burkittii, F. Muell. ex Benth. l. c.—Austral.
campylantha, F. Muell. in *Rep. Greg. Pl.* 6.—Austral.
canescens, F. Muell. *Fragm.* iii. 46.—Austral.
colutoides, F. Muell. l. c. x. 6.—Austral.
coronillaefolia, Salisb. *Parad. Lond.* t. 28.—Austral.
Drummondii, Benth. *Fl. Austral.* ii. 220.—Austral.
Fraseri, Benth. l. c. 224.—Austral.
Froebelii, Regel, *Gartenfl.* iii. (1854) 178 = lessertiaefolia.
galegifolia, R. Br. in *Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 327 = coronillaefolia.
gracilis, Benth. *Fl. Austral.* ii. 220.—Austral.
grandiflora, R. Br. in *Sturt, Exped. Centr. Austral.* ii. App. 74 = Greyana.
Greyana, Lindl. *Bot. Reg.* (1846) t. 66.—Austral.
laxa, R. Br. in *Sturt, Exped. Centr. Austral.* ii. App. 76.—Austral.
lessertiaefolia, DC. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 99.—Austral.
luteola, F. Muell. *Fragm.* i. 75.—Austral.
Maccullochiana, F. Muell. l. c. vii. 25.—Austral.
magnifica, Hort. ex Dombr. *Flor. Mag.* v. (1866) t. 273 = coronillaefolia?
microphylla, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 410.—Austral.
monticola, Benth. ex A. Gray, l. c. 411.—Austral.
Murrayana, Wawra, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxi. (1881) 69.—Austral.

SWAINSONA:—

Novae-Zelandiae, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 51.—N. Zel.
occidentalis, F. Muell. *Fragm.* iii. 46.—Austral.
oligophylla, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* ii. 219.—Austral.
Oliverii, F. Muell. in *Wing, South. Sc. Record*, ii. (1882) 152.—Austral.
oncinotropis, F. Muell. in *Melb. Chemist* (Oct. 1884).—Austral.
oroboides, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* ii. 222.—Austral.
Osbornii, T. Moore, in *Gardn. Comp.* (1852) t. 65 = coronillaefolia.
parviflora, Benth. *Fl. Austral.* ii. 223.—Austral.
phacifolia, F. Muell. in *S. Austral. Register* (1850); ex Benth. *Fl. Austral.* ii. 221.—Austral.
phacoides, Benth. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 363.—Austral.
plagiotropis, F. Muell. *Fragm.* ix. 153.—Austral.
procumbens, F. Muell. l. c. iii. 46.—Austral.
stenodonta, F. Muell. l. c. xi. 70.—Austral.
stipularis, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 393 = phacifolia.
tephrotricha, F. Muell. l. c. 392 = lessertiaefolia.
unifoliolata, F. Muell. *Fragm.* viii. 226.—Austral.
viciaefolia, F. Muell. in *D. N. F. Dietr. Fl. Univ.* N. S. t. 17 = lessertiaefolia.
violacea, Henders. *Illustr. Bouq.* t. 19 = procumbens.

SWAINSONIA, Spreng. *Anleit.* ii. 11. 754 (1818) = praec.

SWAMMERDAMIA, DC. *Prod.* vi. 164 (1837) = *Heli-chrysum*, Vaill. (*Compos.*).
Antennaria, DC. l. c. = *H. antennarium*.
glomerata, Raoul, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 120 (= *Ozothamnus glomeratus*).—N. Zel.
volubilis, Regel, *Cat. Pl. Hort. Aksakov.* 136, nomen.—Austral.

SWANALLOIA, Hort. ex Walp. *Rep.* iii. 934 (1844-45), sphalm. = *Juanulloa*, Ruiz & Pav. (*Solan.*).
aurantiaca, Hort. ex Walp. l. c. = *J. parasitica*.

SWANTIA, Alef. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* ix. (1859) 358, 365 = *Vicia*, Linn. (*Legumin.*).
aurantia, Alef. l. c. 366 = *V. aurantia*.

SWARTZIA, J. F. Gmel. *Syst.* 360 (1791) = *Solandra*, Sw. (*Solan.*).
grandiflora, J. F. Gmel. l. c. = *Sol. grandiflora*.

SWARTZIA, Schreb. *Gen.* 518 (1791). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 561.
DITHYRIA, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 89.
GYNANTHISTROPHE, Poit. ex DC. *Prod.* ii. 424 (1825).
HOELZELIA, Neck. *Elem.* iii. 62 (1790).
POSSIRA, Aubl. *Pl. Gui.* ii. 934, t. 355 (1775).
ITTERIA, Schreb. *Gen.* 364 (1789).
RIVERIA, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 266, t. 659 (1825).
ROSSINA, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 652 (1841), sphalm.
TOUNATEA, Aubl. *Pl. Gui.* i. 549, t. 218 (1775), nomen prius.
TRISCHIDIUM, Tul. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xx. (1843) 141, t. 4.
acuminata, Willd. ex Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 173.—Bras.
acutifolia, Vog. l. c. 174.—Bras.
alata, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1220.—Guian.
alterna, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 89.—Bras.
amazonica, S. Moore, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 132.—Bras.
apetala, Raddi, in *Mem. Moden. xviii. Fis.* (1820) 398.—Bras.
aptera, DC. *Mém. Légum.* 405.—Am. trop.
argentea, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 31.—Bras.
auriculata, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 61.—Bras.
Benthamiana, Mig. *Stirp. Surin. Sel.* 15.—Am. trop.
bifida, Steud. in *Flora*, xxvi. (1843) 757 = triphylla.
Blanchetii, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 29.—Bras.

SWARTZIA:—

brachystachya, DC. *Mém. Légum.* 408.—Guian.
bracteosa, Mart. ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 20.—Bras.
brasiliensis, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 169 = Langsdorffii.
callistemon, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 36 = acuminata.
calophylla, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 61, t. 267.—Peruv.
capparioides, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1104, nomen.—Guian.
cardiosperma, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 33.—Bras.
caribaea, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 212.—Ind. occ.
conferta, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 20.—Bras.
coriacea, Desv. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* ix. (1826) 424 = *Dipteryx nudipes*.
coriacea, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 652, sphalm. = *apetala*.
corrugata, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 87.—Am. trop.
crocea, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 23.—Bras.
cuspidata, Spruce, ex Benth. l. c. 36.—Bras.
dicarpa, Moric. ex Meissn. *Gen. Comm.* 68.—Am. trop.
dipetala, Willd. ex Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 173 = dicarpa.
discolor, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 62.—Bras.
dodecandra, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1220.—Am. austr.
elegans, Schott, in *Spreng. Syst.* iv. App. 407.—Bras.
eriocarpa, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 17.—Guian.
erythrocarpa, Spruce, ex Benth. l. c. 28 = sericea.
Flemmingi, Raddi, in *Mem. Moden. xviii. Fis.* (1820) 397 (Flemmingi).—Bras.
floribunda, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 21.—Bras.
fugax, Spruce, ex Benth. l. c. 30.—Bras.
glabra, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 175 = *apetala*.
grandiflora, Vog. l. c. 169, partim = *crocea*.
grandiflora, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1220.—Am. trop.
grandifolia, Bong. ex Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 85.—Am. trop.
Hostmanni, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 18.—Guian.
Langsdorffii, Raddi, in *Mem. Moden. xviii. Fis.* (1820) 396.—Bras.
latifolia, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 86.—Guian.
laurifolia, Benth. l. c. 87.—Bras.
laxiflora, Bong. ex Benth. l. c. 86.—Bras.
leicocalycina, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 28.—Guian.
leptopetala, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 87.—Bras.
lomatus, Mart. in *Flora*, xx. (1837) 11. Beibl. 103 = *multijuga*, Vog.
longifolia, DC. *Mém. Légum.* 406.—Guian.
macrocarpa, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 38.—Bras.
macrophylla, Willd. ex Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 172.—Bras.
macrosperma, Bertol. *Misc. Bot.* xxi. 16.—Guatemala.
macrostachya, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 24.—Bras.
madagascariensis, Desv. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* ix. (1826) 424.—Madag.
marginata, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 87 = *madagascariensis*.
Martii, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 19.—Bras.
Mathewsii, Benth. in Hook. *l. c.* t. 1064 (Matthewsii).—Peruv.; Bolivia.
microcarpa, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 11. 35.—Bras.
micropetala, Schott, in *Spreng. Syst.* iv. App. 407 = *myrtifolia*.
microstylis, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 89 = *dicarpa*.
mollis, Benth. l. c.—Bras.
montana, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 174 = *Flemmingi*.
multijuga, A. Rich. *Ess. Fl. Cub.* 457.—Cuba.
multijuga, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 175.—Bras.
myrtifolia, Sm. in *Rees, Cycl.* xxxiv. n. 5.—Am. trop.
nitens, Vog. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 653.—N. Granat.

SWARTZIA :—

- oblonga, *Benth. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 238.—Guian.
 ochracea, DC. *Mém. Légum.* 405. t. 58 = grandiflora.
 panamensis, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 38.—Am. centr.
 parviflora, DC. *Mém. Légum.* 403. t. 60 = triphylla.
 pendula, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 19.—Bras.
 picta, *Spruce, ex Benth. l. c.* 25.—Bras.
 pilulifera, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 90.—Bras.
 pinnata, Seem. *Bot. Voy. Herald*, 113 = panamensis.
 pinnata, Willd. *ex Vog. in Linnaea*, xi. (1837) 173 = acumiata.
 pinnata, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1220.—Guian.
 polyanthera, Steud. in *Flora*, xxvi. (1843) 757 = tomentosa.
 polyphylla, DC. *Mém. Légum.* 411.—Guian.
 pulcherrima, Allem. *ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 24 = Langsdorffii.
 pulchra, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 169 = elegans.
 racemosa, *Benth. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 238.—Bras.
 recurva, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 61.—Bras.
 robiniaefolia, Willd. *ex Vog. in Linnaea*, xi. (1837) 171.—N. Granat.
 rosea, *Mart. ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 32.—Bras.
 Schomburgkii, *Benth. l. c.* 38.—Guian.
 sericea, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 176.—Bras.
 simplex, Spreng. *Syst.* ii. 567 = grandiflora.
 simplicifolia, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1219 = grandiflora.
 Sprucei, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 37.—Bras.
 stipellata, Benth. l. c. = Sprucei.
 stipularis, Spruce, *ex Benth. l. c.* 38 = macrocarpa.
 subspicata, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1208, nomen.—Guian.
 surinamensis, Klotzsch, l. c., nomen.—Guian.
 tomentosa, DC. *Mém. Légum.* 409. t. 59.—Guian.
 Trianae, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 39.—Am. trop.
 triphylla, DC. *Prod.* ii. 423, partim = myrtifolia.
 triphylla, Willd. *Sp. Pl.* 1220.—Am. trop.
 velutina, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 21.—Bras.

SWEERTIA, Koch, *Syn. Fl. Germ. ed. II.* 558 (1844) = Swertia, Linn. (Gentian.).

SWEETIA, DC. *Prod.* ii. 381 (1825) = Galactia, P. Br. (Legumin.).
 filiformis, DC. l. c. 382 = G. filiformis.
 lignosa, DC. l. c. = Ins. S. Doming.
 longifolia, DC. l. c. 381 = G. Jussiaeana.
 uliginosa, G. Don, *Gen. Syst.* ii. 342 = Derris uliginosa.
 velutina, G. Don, l. c. = Tephrosia velutina.

SWEETIA, Spreng. *Syst.* ii. 171, 213 (1825). **LEGU-MINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 559.
 ACOSMIUM, Schott, in Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 406 (1827).
 LEPTOLOBIUM, Vog. in *Linnaea*, xi. 388 (1837).
 bijuga, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 261.—Bras.
 brachystachya, *Benth. l. c.* 262.—Bras.
 dasycarpa, *Benth. l. c.*—Bras.
 elegans, *Benth. l. c.*—Bras.
 fruticosa, Spreng. *Syst.* ii. 213.—Bras.
 Gardneri, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 263 = Rourea Gardneriana.
 glabrifolia, *Benth. l. c.* 262 = dasycarpa.
 lentiscifolia, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 406.—Bras.
 nitens, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 262.—Bras.
 panamensis, *Benth. l. c.* 263.—Panama.
 tenuifolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 7.—Bras.

SWERTIA, All. *Fl. Pedem.* i. 208 (1785) = Tolpis, Linn. (Compos.).
 barbata, All. l. c. = T. barbata.

SWERTIA, Linn. *Sp. Pl. ed. I.* 226 (1753). **GENTIANEA**, Benth. & Hook. f. ii. 816.
 AGATHOTES, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 522.
 ANAGALLIDIUM, Griseb. *Gen. et Sp. Gent.* 311 (1836).

SWERTIA :—

- BLEPHARADEN, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 449 (1867).
 HENRICEA, Lem. Lis. in *Bull. Soc. Philom.* (1824) 171.
 MONOBOTHRUM, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) 27.
 OPHELIA, D. Don, *ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 178 (1837); *et in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 524.
 RELLESTA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) ii. 337.
 SCZUKINIA, Turcz. l. c. (1840) 165.
 STELLERA, Turcz. l. c. 167 (1840).
 abyssinica, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 24, nomen; *et ex Griseb. in DC. Prod.* ix. 134.—Abyss.
 affinis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 126.—Ind. or.
 alata, Royle, *ex D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 523.—Reg. Himal.
 albicaulis, Dougl. *ex Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 330 = Frasera albicaulis.
 alpestris, Baumg. *Mant.* (1846) 19.—Transsylv.
 alternifolia, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 278. t. 67. f. 2.—Reg. Himal.
 americana, Spreng. *Syst.* i. 861 = Halenia deflexa.
 angustifolia, Buch-Ham. *ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 127.—Reg. Himal.
 asclepiadea, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 175 = Halenia Pavoniana.
 Aucheri, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 90.—Armen.; Persia.
 Balansae, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 78.—Pontus.
 Beddomei, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 127.—Ind. or.
 bimaculata, Hook. f. & Thoms. *ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 449.—Reg. Himal.
 brevicornis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 174 = Halenia brevicornis.
 brevicornis, Willd. *ex Schult. Syst.* vi. 132 = Halenia Pavoniana.
 caerulea, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 464, (Index) = caerulea.
 carinthiaca, Wulf. in Jacq. *Misc.* ii. 53 = Pleurogyna carinthiaca.
 centrostemma, Wall. *Cat. n.* 4385 = Halenia elliptica.
 chinensis, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 26 = diluta.
 Chirata, Buch-Ham. *ex Wall. Cat. n.* 4372.—Reg. Himal.
 ciliata, Royle, *ex D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 526 = purpurascens.
 clarenciana, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 16.—Afr. trop.
 coerulea, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 278. t. 67. f. 1.—Reg. Himal.
 connata, Schrenk, *Enum. Pl. Nov.* i. 37.—Sibir. altaic.
 cordata, Wall. *Cat. n.* 4378.—Reg. Himal.
 corniculata, Linn. *Sp. Pl.* 227 = Halenia sibirica.
 corniculata, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 97 = Halenia deflexa.
 corymbosa, Wight, *ex Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 317; *Field. & Gardn. Sert. Pl.* t. 71.—Ind. or.
 cuneata, Wall. *Cat. n.* 4380.—Reg. Himal.
 decumbens, Vahl, *Symb. Bot.* i. 24.—Arab.
 decussata, Nimmo, in *J. Grah. Cat. Pl. Bomb.* 249, nomen; *et ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 127.—Ind. or.
 deflexa, Sm. in Rees, *Cyclop.* xxxiv. n. 8 = Halenia deflexa.
 dichotoma, Linn. *Sp. Pl.* 227.—Sibir.
 difformis, Linn. *Herb. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. 125 = Frasera carolinensis.
 difformis, Linn. *Sp. Pl.* 226 = Sabbatia Elliotii.
 dilatata, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 122.—Reg. Himal.
 diluta, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 817.—As. or.
 elegans, Wall. *Cat. n.* 4376 = pulchella.
 erythrosticka, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 503.—China.
 fastigiata, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 101 = Frasera thyrsoflora.
 filiformis, Macfad. in *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 116, nomen.—Jamaic.
 florida, Wall. *Cat. n.* 4382 = pulchella.
 gracilis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 176 = Halenia gracilis.
 Griffithii, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 122.—Reg. Himal.
 Hookeri, C. B. Clarke, l. c. 127.—Reg. Himal.

SWERTIA :—

- Hugelii, Griseb. in *DC. Prod.* ix. 133 = cuneata.
 hypericoides, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 176 = Halenia hypericoides.
 iberica, Fisch. *ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 78 = punctata.
 intermedia, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* x. (1859) 149 = alpestris.
 intermixta, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 57.—Abyss.
 javanica, Blume, *Bijdr.* 848.—Java.
 kamoonensis, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 653, sphalm. loci nomen.—Cf. Wall. *Cat. sub nn.* 4379, 4380.
 Kingii, Hook. f. *l. c. Pl.* t. 1442.—Reg. Himal.
 lactea, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 393.—Persia; Turkest.
 lahulensis, Kern, in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, i. (1870) 100 = petiolata.
 longifolia, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 90.—Persia.
 lurida, Royle, *ex D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 523.—Reg. Himal.
 lutea, Vest, *ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 429 = Gentiana lutea.
 macrosperma, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 123.—Reg. Himal.
 Mannii, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 206.—Afr. trop.
 marginata, Schrenk, in *Bull. Sc. Acad. Pétersb.* x. (1842) 353.—Soongar.
 Michauxiana, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 122 = Halenia Schiedeana.
 Michauxiana, Schult. *Syst.* vi. 130 = Halenia deflexa.
 multicaulis, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 127.—Reg. Himal.
 nervosa, Wall. *Cat. n.* 4383.—Reg. Himal.
 obtusa, C. Koch, in *Linnaea*, xxiii. (1850) 586 = Aucheri.
 obtusa, Ledeb. in *Mém. Acad. Pétersb.* v. (1812) 526 = perennis.
 Pallasii, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 176 = tetrapetala.
 paniculata, Wall. *Cat. n.* 4374; *et Pl. As. Rar.* iii. 3. t. 205.—Reg. Himal.
 parnassifolia, Labill. *Nov. Holl. Pl.* i. 72. t. 97 = Villarsia parnassifolia.
 parviflora, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 174 = Halenia parviflora.
 pauciflora, Humb. & Bonpl. *ex Schult. Syst.* vi. 135 = Halenia plantaginea.
 peloria, Griff. *Itin. Notes*, 197 = Halenia elliptica.
 perennis, Bieb. *ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 78 = punctata.
 perennis, Linn. *Sp. Pl.* 226.—Reg. bor. temp.
 perfoliata, Royle, *ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 176 = petiolata.
 persica, Griseb. in *DC. Prod.* ix. 132 = Aucheri.
 petiolata, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 277, nomen; *et ex D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 519.—Reg. Himal.
 Petitiiana, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 55.—Abyss.
 pinifolia, Ruiz & Pav. *ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 177 = Halenia pinifolia.
 plantaginea, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 175 = Halenia plantaginea.
 pulchella, Buch-Ham. *ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 127; *et ex Wall. Cat. n.* 4375.—Reg. Himal.
 pumila, Hochst. *ex Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 206.—Abyss.
 punctata, Baumg. *Enum. Stirp. Transs.* i. 190.—Europ. or.; Reg. Caucas.
 purpurascens, Wall. *Cat. n.* 4379.—Reg. Himal.
 purpurea, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 277 = praec.?
 pusilla, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 101 = Pleurogyna carinthiaca.
 quadricornis, Willd. *ex Schult. Syst.* vi. 134 = Halenia Pavoniana.
 Quartiniiana, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 56.—Abyss.
 racemosa, Wall. *Cat. n.* 4377.—Reg. Himal.
 recurva, Sm. in Rees, *Cyclop.* xxxiv. n. 9 = Halenia gracilis.
 Rex, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 127.—Reg. Himal.
 rotata, Linn. *Sp. Pl.* 226 = Pleurogyna rotata.
 rotata, Pall. *Fl. Ross.* i. ii. 98. t. 89. f. 3 = Pleurogyna carinthiaca.
 rotata, Thunb. *Fl. Jap.* 115.—Japon.
 Schimperii, Griseb. in *DC. Prod.* ix. 563.—Abyss.
 speciosa, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 176 = petiolata.
 speciosa, Wall. *Cat. n.* 4384.—Reg. Himal.
 stigmantia, C. Koch, in *Linnaea*, xxiii. (1850) 586 = punctata.
 sulcata, Rottb. in *Skrift. Kioeb. Selsk.* x. (1770) 438. t. 1. f. 4 = Pleurogyna rotata.

SWERTIA:—

- tetragona, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 86.
—Reg. Himal.
tetrandra, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 28.—Abyss.
tetrapetala, *Pall. Fl. Ross.* i. ii. 99.—Kamtschat.
tetraptera, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii.
(1881) 503.—China.
Thomsoni, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv.
129.—Reg. Himal.
trichotoma, *Wall. Cat.* n. 4381.—Ind. or.
turfosa, Baumg. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 653, nomen
(Quid?).—Transsylv.
umbellata, Mathews, ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 328
= *Halenia gracilis*.
umbellata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 21 = *Halenia*
Pavoniana.
vacillans, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881)
504, in obs.—China.
zeylanica, *Walker, ex Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 316,
in syn.—Zeylan.

SWERTYA, Steud. Nom. ed. II. ii. 653 (1841), sphalm.
= SWERTIA, All. = **Toipis**, Linn. (Compos.).

SWIETENIA, Jacq. Enum. Pl. Carib. 4 (1760).

- MELIACEAE**, Benth. & Hook. f. Gen. i. 338.
MAHAGONI, Adans. Fam. ii. 343 (1763).
ROIA, Scop. Introd. 226 (1777).
acutifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 479 = *S. Mahagoni*.
alternifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 653 = *Cedrela*
alternifolia.
angolensis, *Welw. Apont.* 587.—Afr. trop.
Chickrassia, Roxb. Hort. Beng. 33; Fl. Ind. ii. 399 =
Chickrassia tabularis.
Chloroxylon, Roxb. Pl. Corom. i. 46. t. 64 = *Chlor-*
oxylon Swietenia.
fabrilis, Salisb. Prod. 317 = *S. Mahagoni*.
febrifuga, Roxb. Pl. Corom. i. 18. t. 17 = *Soymida*
febrifuga.
humilis, Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* ii. (1831–36)
355. t. 7.—Mexic.
Mahagoni, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 20; *Linn. Sp. Pl.*
ed. II. 271.—Am. austr.
Mahogani, DC. Prod. i. 625 = praec.
Mahogoni, Lam. Encyc. iii. 678 = praec.
multijuga, Schiede, in *Linnaea*, iv. (1829) 578 =
humilis.
obtusifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 480 = *Soymida*
febrifuga.
rubra, Wight, ex Wall. Cat. n. 4890 = *Soymida febrifuga*.
senegalensis, Desv. in *Lam. Encyc.* iii. 679 = *Khaya*
senegalensis.
Soymida, A. Dunc. Tent. 16 = *Soymida febrifuga*.
Sureni, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 72 = *Cedrela*
Toona.
Toon, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 480 = *Cedrela Toona*.
trilocularis, Roxb. ex Euch.-Ham. Journ. i. 184 =
Chickrassia tabularis.
velutina, Wall. ex Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii.
(1873) ii. 65 = *Chickrassia tabularis*.
villosa, Wall. ex Kurz, l. c. = *Chickrassia tabularis*.

SWINTONIA, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1846) 283.

- ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 421.
ANAUANOPETALUM, Teijsm. & Binn. in *Journ. Bot.*
Néerl. i. (1861) 368.
ASTROPETALUM, Griff. Notul. iv. 411. t. 565 (1854).
acuta, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 44.—Borneo.
floribunda, *Griff. in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 283.—
Burma.
glauca, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 44.—Borneo.
Griffithii, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870)
ii. 75 = floribunda.
Helferi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 26.—Burma.
obtusifolia, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 231.—
Borneo.
Pierrei, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 257.—
Cambodia.
Schwenckii, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 230,
nomen; et *ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 26.—Malaya.
spicifera, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 27.—Malaya.

SYAGRUS, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 129. t. 89 (1824)

- = **Cocos**, Linn. (Palm.).
amara, Mart. Palmet. Orbign. 132 = *C. amara*.
botryophora, Mart. l. c. 133 = *C. botryophora*.
Chiragua, H. Wendl. in *Kerch. Palm.* 257.—N. Granat.

SYAGRUS:—

- cocoides, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 130. tt. 89, 90 =
Cocos Syagrus.
comosa, Mart. Palmet. Orbign. 134 = *C. comosa*.
macrocarpa, Rodrig. Prot.-App. Enum. Palm. Nov. 46,
48 = *C. Procopia*.
majestica, Hort. ex H. Wendl. in *Kerch. Palm.* 257,
nomen.—Hab.?
Mikaniana, Mart. Palmet. Orbign. 133 = *C. Mikan-*
niana.
picrophylla, Rodrig. Prot.-App. Enum. Palm. Nov. 45,
48 = *C. Martiana*.
Sancona, Karst. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 247.—
N. Granat.
Tamaca, Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) 32,
nomen.—N. Granat.
Wallisi, Linden, Cat. n. 16 (1861); n. 18 (1863) 45.—
N. Granat.

SYALITA, Adans. Fam. ii. 364 (1763) = **Dillenia**, Linn.

SYAMA, Jones, in *As. Res.* iv. (1795) 261 = **Pupalia**,
Juss. (Amarant.).
lata, Pritz. Ic. Ind. i. 1082 (Quid?).—Ind. or.

SYCAMORUS, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. (1874)

- 149, err. typ. = SYCOMORUS, Gasp. = **Ficus**, Tourn.
(Urtic.).
SYCHINIUM, Desv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826)
216. t. 12 = **Dorstenia**, Plum. (Urtic.).
ramosum, Desv. l. c. 217 = *D. arifolia*.

SYCHNOSEPALUM, Eichl. in *Flora*, xlvii. (1864)

395. **MENISPERMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 963.
DETANDRA, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser.*
III. xiii. 124 (1864); et xx. (1867) 17.
microphyllum, Eichl. in *Flora*, xlvii. (1864) 396.—
Bras.
paraense, Eichl. l. c. —Bras.
Sagotianum, Eichl. l. c. —Guian.

SYCIOS, Medic. Vorles. Churpf. Phys. Ges. iv. i. (1789)

- 190, sphalm. = **Sicyos**, Linn. (Cucurb.).
SYCODIUM, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 39 (1874) =
Anvillea, DC. (Compos.).
radiatum, Pomel, l. c. = *A. radiata*.

SYCOMORPHE, Miq. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. i.

- (1844) 35 = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).
Roxburghii, Miq. l. c. = *F. hispida*.

SYCOMORUS, Gasp. Ricerch. Caprif. e Fic. 86 (1845) =

- Ficus**, Tourn. (Urtic.).
antiquorum, Gasp. l. c. = *F. Sycomorus*.
capensis, Miq. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848)
113. t. 3. f. B = *F. capensis*.
capreaefolia, Walp. Ann. iii. 418 = *F. antithetophylla*.
Dahro, Walp. l. c. = *F. Dahro*.
gnaphalocarpus, Miq. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii.
(1848) 113 = *F. gnaphalocarpa*.
guineensis, Miq. l. c. 112. t. 14 = *F. capensis*.
gummiflua, Miq. Pl. Jungh. 64 = *F. variegata*.
hirsuta, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 137 =
F. Sonderi.
panifica, Miq. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848)
111. t. 3. f. A = *F. panifica*.
rigida, Miq. l. c. 110.—Afr. trop.
riparia, Miq. l. c. 114 = *F. riparia*.
Schimperiana, Miq. l. c. 112 = *F. Vallis-Choudae*.
Thonningiana, Miq. l. c. = *F. Thonningiana*.
trachyphyllus, Miq. l. c. 110 = *F. trachyphylla*.
Vogeliana, Miq. l. c. 112 = *F. Vogeliana*.

SYCOPSIS, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860)

83. t. 8. **HAMAMELIDEAE**, Benth. & Hook. f. i.
666.
Griffithiana, Oliver, l. c.—Reg. Himal.

SYDERITIS, All. in *Misc. Taur.* v. (1773) 59, sphalm.

- = **Sideritis**, Linn. (Labiata.).

SYENA, Schreb. Gen. 39 (1789) = **Mayaca**, Aubl.

- Aubletii*, Schott & Endl. Melet. 24 = *M. Aubletii*.
fluviatilis, Willd. Sp. Pl. i. 254 = *M. fluviatilis*.
Mayaca, J. F. Gmel. Syst. 121 = *M. fluviatilis*.
Nuttalliana, Schult. Mant. i. 343.—Am. bor.

SYKESIA, Arn. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836)

- 351 = **Gaertnera**, Lam. (Logan.).
Koenigii, Arn. l. c. 353 = *G. Koenigii*.
thyrsiflora, Arn. l. c. = *G. Koenigii*.
Walkerii, Arn. l. c. 354 = *G. Walkerii*.

SYKORAEA, Opiz, Seznam, 94 (1852) = **Campanula**, Tourn.

- barbata, Opiz, l. c. = *C. barbata*.
hortensis, Opiz, l. c. = *C. Medium*.

SYLITRA, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 114 (1835).

- LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 496.
angolensis, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 103.—
Afr. trop.
biflora, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 114.—Afr.
austr.

SYLLEPIS, Fourn. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1125

- (1883) = **Imperata**, Cyrilli (Gramin.).
polystachya, Fourn. ex Hack. in *Mart. Fl. Bras.* ii. 111.
251 = *I. exaltata*.
Ruprechtii, Fourn. ex Hack. l. c. = *I. brasiliensis*.

SYLLISIUM, Endl. Gen. Suppl. iii. 102 (1843) = seq.**SYLLYSIUM**, Meyen & Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.*

- xix. Suppl. i. (1843) 334 = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).
buxifolium, Meyen & Schau. l. c. = *E. pyxophylla*?

SYLVIA, Lindl. Veg. Kingd. 685 (1847), sphalm. =

- Silvia**, Benth. (Scrophul.).

SYMBASIANDRA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 767

- (1840) = **Hilaria**, H. B. & K. (Gramin.).
repens, Willd. ex Steud. l. c. = *H. cenchroides*.

SYMBLOMERIA, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.*

- vii. (1841) 284 = **Albertinia**, Spreng. (Compos.).
Baldwiniana, Nutt. l. c. = *A. brasiliensis*.

SYMBOLANTHUS, G. Don, Gen. Syst. iv. 210 (1837)

- = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).
calygonus, Griseb. in *DC. Prod.* ix. 80 = *L. calygonus*.
Kunthii, G. Don, Gen. Syst. iv. 210 = *L. anomalus*.
Pavonii, G. Don, l. c. = *L. calygonus*.
superbus, Miers, in *Journ. Bot.* vii. (1869) 218.—
N. Granat.

SYMBRYON, Griseb. Cat. Pl. Cub. 64 (1866).

- PIPERACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 133.
tetrastachyum, Griseb. l. c. —Cuba.

SYMEA, Baker, in *Saund. Refug. Bot.* t. 260 (1871) =

- Solaria**, Phil. (Liliac.).
gillesioides, Baker, l. c. = *Solaria miersioides*.

SYMETHUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 83 (1836) = **Convol-**

- vulus**, Tourn.
siculus, Rafin. l. c. = *C. siculus*.

SYMMERIA, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iv.

- (1845) 630. **POLYGONACEAE**, Benth. & Hook. f.
iii. 105.
THURNHEYSSERA, Mart. ex Meissn. in *DC. Prod.*
xiv. 185 (1856).
paniculata, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iv.
1845) 630.—Bras.

SYMMETRIA, Blume, Bijdr. 1130 (1826) = **Carallia**,

- Roxb. (Rhizoph.).
obovata, Blume, l. c. 1131 = *C. integerrima*.

SYMPACHNE, Steud. Nom. ed. II. ii. 654 (1841),

- sphalm. = **SYMPHACHNE**, Beauv. = **Eriocaulon**,
Linn.

SYMPEGMA, Bunge, in *Bull. Acad. Pétersb.* xxv.

- (1879) 371. **CHENOPODIACEAE**, Benth. &
Hook. f. iii. 76.
Regelii, Bunge, l. c.—Turkest.

SYMPETALEIA, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xii.

- (1877) 161. **LOASEAE**.
aurea, A. Gray, l. c.—Am. bor. occ.

SYMPHACHNE, Beauv. ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828) 47. t. 5 = *Eriocaulon*, Linn. *xyroides*, Beauv. ex Desv. l. c. 48 = *E. decangulare*.

SYMPHYANDRA, Steud. Nom. ed. II. ii. 655 (1841), sphalm. = *Symphyantra*, DC. (Campan.).

SYMPHIONEMA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 157 = *Symphyonema*, R. Br. (Proteac.).

SYMPHITUM, Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. ii. (1770) 479 = *Symphytum*, Tourn. (Borag.).

SYMPHONIA, Linn. f. Suppl. 49, 303 (1781). *GUTTIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 173.

ACTINOSTIGMA, Welw. Apont. 560 (1858).

ANEURISCUS, Presl, Symb. Bot. i. 71. t. 48 (1832).

CHRYSOPIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 14 (1806).

acuminata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 322.—Madag.

clusioides, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 19.—Madag.

esculenta, Arruda, ex DC. Prod. i. 563 = globulifera, Moronobea grandiflora.

esculenta, Steud. Nom. ed. II. ii. 654, partim = *Platonia insignis*.

eugenioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 91.—Madag.

fasciculata, Baill. Hist. Pl. vi. 399.—Madag.

globulifera, Linn. f. Suppl. 302.—Guian.; Afr. trop.

grandiflora, Spreng. Syst. iii. 334 = Moronobea grandiflora.

lepidocarpa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 91.—Madag.

Melleri, Baker, l. c. 90.—Madag.

Moronobea, Raesch. Nom. ed. III. 191 = Moronobea grandiflora.

pauciflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 90.—Madag.

SYMPHORANTHUS, Mitch. in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 219 = *Polypremum*, Linn. (Logan.).

SYMPHOREMA, Roxb. Pl. Corom. ii. 46. t. 186 (1798). *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1159.

ANALECTIS, Juss. in Jaume St. Hil. Expos. ii. 362 (1805).

SCZEGLEWIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1863) ii. 212.

glabrum, Hassk. in Flora, xlviii. (1865) 402.—Ins. Philipp.

grossum, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 254.—Burma.

involucratum, Roxb. Pl. Corom. ii. 46. t. 186.—Ind. or.

involucratum, Wall. Cat. n. 1740 = polyandrum.

Jackianum, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 255 = Sphenodesme pentandra.

luzonicum, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 162.—Ins. Philipp.

luzoniense, Vidal, Sinops. t. 75. f. F = praec.

microstylis, Bedd. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 600 = Sphenodesme microstylis.

paniculatum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1739, partim = involucratum.

pentandrum, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 255 = Sphenodesme Griffithiana.

polyandrum, Wight, Ic. t. 363.—Ind. or.

unguiculatum, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 255 = Sphenodesme unguiculata.

SYMPHORIA, Pers. Syn. i. 214 (1805) = *Symphoricarpos*, Dill. (Caprifol.).

albus, Rafin. New Fl. N. Am. iii. 21 = *Symphoricarpos racemosus*.

conglomerata, Pers. Syn. i. 214 = *Symphoricarpos orbiculatus*.

elongata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 3 = *Symphoricarpos racemosus*.

glaucescens, Spreng. Syst. i. 757 = *Symphoricarpos microphyllus*.

globuliflora, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 95, in syn. sphalm. = *Symphonia globulifera*.

glomerata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 162 = *Symphoricarpos orbiculatus*.

SYMPHORIA:—

heterophylla, Rafin. New Fl. Am. iii. 21; Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 3 = *Symphoricarpos racemosus*.

leucocarpa, Hort. ex DC. Prod. iv. 339 = *Symphoricarpos racemosus*.

microphylla, Spreng. Syst. i. 757 = *Symphoricarpos microphyllus*.

montana, Spreng. l. c. = *Symphoricarpos microphyllus*.

occidentalis, R. Br. in Richards. App. Frankl. 2nd Journ. 733 = *Symphoricarpos occidentalis*.

parviflora, Buek, Ind. ad DC. Prod. i. 386 = *Symphoricarpos orbiculatus*.

punicea, Loud. Hort. Brit. 80 = *Symphoricarpos puniceus*.

racemosa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 162 = *Symphoricarpos racemosus*.

rubra, Rafin. New Fl. N. Am. iii. 21.—Am. bor.

vulgaris, D. Dietr. Syn. Pl. i. 783 = *Symphoricarpos orbiculatus*.

SYMPHORICARPA, Neck. Elem. i. 129 (1790) = seq.

SYMPHORICARPOS, Dill. ex Juss. Gen. 211 (1789). *CAPRIFOLIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 4.

ANISANTHUS, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. p. xiv. (1819).

DESCLIAEA, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. iv. 483 (1830).

MARGARIS, DC. l. c. (1830).

SYMPHORIA, Pers. Syn. i. 214 (1805).

albus, C. Koch, Dendrol. ii. i. 48 = *racemosus*.

ciliatus, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 4 = *molliis*.

conglomeratus, Pers. Syn. i. 214 = *orbiculatus*.

elongatus, Presl, ex DC. Prod. iv. 339 = *racemosus*.

erythrocarpus, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 98 = *orbiculatus*.

glaucescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 424. t. 295 = *microphyllus*.

glomeratus, C. Koch, Dendrol. ii. i. 48 = *orbiculatus*.

heterophyllus, Presl, ex DC. Prod. iv. 339 = *racemosus*.

imberbis, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 734 = *orbiculatus*.

leucocarpus, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 49 = *racemosus*.

longiflorus, A. Gray, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1873) 12.—Am. bor. occ.

mexicanus, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 50 = *microphyllus*.

microphyllus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 424.—Mexic.

molliis, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 4.—Am. bor. occ.

montanus, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiv. (1862) 249 = *oreophilus*.

montanus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 425. t. 296 = *microphyllus*.

montanus, S. Wats. Bot. King's Exped. 132 = *rotundifolius*.

occidentalis, Hook. Fl. Bor. Am. i. 285.—Am. bor.

odoratus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 145 = *Schoepfia fragrans*.

orbiculatus, Moench, Meth. 503.—Am. bor.

oreophilus, A. Gray, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1873) 12.—Am. bor. occ.

parviflorus, Desf. Tabl. ed. I. 114 = *orbiculatus*.

poluccensis, C. Koch, Dendrol. ii. i. 149, sphalm. = *toluccensis*.

puniceus, Steud. Nom. ed. II. ii. 654.—Am. bor.

racemosus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 107.—Am. bor.

rotundifolius, A. Gray, Pl. Wright. ii. 66.—Mexic.

rotundifolius, C. Koch, Dendrol. ii. i. 48 = *orbiculatus*.

spicatus, Engelm. ex A. Gray, in Post. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 215 = *orbiculatus*.

toluccensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 49, 50 = *microphyllus*, *racemosus*.

vulgaris, Michx. Fl. Bor. Am. i. 106 = *orbiculatus*.

SYMPHORICARPUS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 424 (1818) = praec.

SYMPHYANDRA, A. DC. Monog. Camp. 365. t. 8 (1830). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 563.

armena, A. DC. l. c. 366. t. 8.—Reg. Cauc.

cretica, A. DC. l. c.—Ins. Creta.

SYMPHYANDRA:—

heterophylla, Schur, Enum. Pl. Transs. 431 = Wanneri.

Hofmanni, Pant. in Magyar Növényt. Lapok, v. (1881) 150.—Bosnia.

lazica, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 888.—Pontus.

ossetica, A. DC. Monog. Camp. 366. t. 8.—Reg. Cauc.

pendula, A. DC. l. c.—Reg. Cauc.

stylosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 253 = *Phyteuma Thomsoni*.

Wanneri, Heuff. in Flora, xxxvii. (1854) 292.—Transsylv.

SYMPHYDOLON, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 142 (1866) = *Gladiolus*, Tourn. (Irid.).

angustus, Salisb. l. c. = *G. angustus*.

blandus, Salisb. l. c. = *G. blandus*.

cardinalis, Salisb. l. c. = *G. cardinalis*.

carneus, Salisb. l. c. = *G. cuspidatus*.

cuspidatus, Salisb. l. c. = *G. cuspidatus*.

floribundus, Salisb. l. c. = *G. floribundus*.

hastatus, Salisb. l. c. = *G. hastatus*.

Milleri, Salisb. l. c. = *G. Milleri*.

undulatus, Salisb. l. c. = *G. undulatus*.

SYMPHYLLANTHUS, Vahl, in Skrivt. Nat. Hist. Selsk. vi. (1810) 86 = *Chailletia*, DC.

glaber, Vahl, l. c. 89.—Guian.

rugosus, Vahl, l. c. 88.—Guian.

SYMPHYLLIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 473. t. 11 (1858) = *Adenochlaena*, Baill. (Euphorb.).

mallotiformis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 156 = *A. indica*.

siletiana, Baill. Etud. Gén. Euph. 474. t. 11 = *A. silhetensis*.

silhetense, Benth. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 228 = praec.

SYMPHYLLIUM, Benth. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 228 = praec.

SYMPHYLOCARPUS, Maxim. Prim. Fl. Amur. 151. t. 8. f. 1 (1859). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 296.

exilis, Maxim. l. c.—Manchuria.

SYMPHYLOMA, Steud. Nom. ed. II. ii. 654 (1841), sphalm. = *SYMPHYOLOMA*, C. A. Mey. = *Heraacleum*, Linn. (Umbell.).

SYMPHYODOLON, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 170, sphalm. = *SYMPHYDOLON*, Salisb. = *Gladiolus*, Tourn. (Irid.).

SYMPHYOGLOSSUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 255 = *Cynanchum*, Linn. (Asclep.).

hastatum, Turcz. l. c. 256 = *C. Wilfordii*.

SYMPHYLOMA, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 127 (1831) = *Heraacleum*, Linn. (Umbell.).

graveolens, C. A. Mey. l. c.—Reg. Cauc.

SYMPHYOMERA, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 116 = *Cotula*, Tourn. (Compos.).

Filicula, Hook. f. l. c. 118 = *C. Filicula*.

SYMPHYOMYRTUS, Schau. in Lehm. Pl. Preiss. i. 126 (1844) = *Eucalyptus*, L'Hérit. (Myrtac.).

Lehmanni, Schau. l. c. 127 = *E. Lehmanni*.

SYMPHYONEMA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 157 (*Symphionema*); Spreng. Anleit. ii. i. 333 (1817). *PROTEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 174.

abrotanoides, Sieber, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 46 = *paludosum*.

montanum, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 48, 157.—Austral.

montanum, Endl. Ic. t. 12 = *paludosum*.

paludosum, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 48, 157.—Austral.

SYMPHYOPAPPUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 583. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 244.

KALLOPHYLLON, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 365 (1876).

SYMPHYOPAPPUS :—

cuneatus, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. 11. 367.—Bras.
 decussatus, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) 1. 584.—Bras.
 polystachyus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. 11. 368.—Bras.
 reticulatus, *Baker, l. c.* 367.—Bras.
 vernicosus, *Sch. Bip. ex Baker, l. c.* 368 = reticulatus.
 viscosus, *Sch. Bip. ex Baker, l. c.* 366.—Bras.

SYMPHYOPETALON, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 54 = **Nematolepis**, Turcz. (Rutac.).

corraeoides, J. Drumm. ex Harv. l. c. = **N. phebaloides**.

SYMPHYOSTEMON, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 159 (1861) = **Cleome**, Linn. (Cappar.).
strictus, Klotzsch, l. c. = **C. strigosa**.

SYMPHYOSTEMON, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 123; et in Trans. Linn. Soc. xix. (1843) 97. **IRIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 700.

PSITHYRISMA, Herb. in Bot. Reg. (1843) Misc. 85.

SUSARIUM, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 248.

flexuosus, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 122, 123 = **Sisyrinchium cuspidatum**.

narcissoides, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 283 = odoratissimus.

odoratissimus, *Miers, in Proc. Linn. Soc. i.* (1841) 122, 123.—Am. austr.

SYMPHYOTRICHUM, Nees, Gen. et Sp. Ast. 135 (1833) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
unctuosum, Nees, l. c. = **A. Novi-Belgii**.

SYMPHYZIA, Presl, Epist. ad Jacq. (1827); et in Oken, Isis, xxi. (1828) 274; xxiv. (1831) 489 = **Horne-mannia**, Vahl (Vaccin.).

guadalupensis, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 37 = **H. martinicensis**.

martinicensis, Presl, Epist. ad Jacq. (1827); in Oken, Isis, xxi. (1828) 274; et in Flora, xi. (1828) 110 = **H. martinicensis**.

SYMPHYSCARPUS, Hassk. in Flora, xl. (1857) 101 = **Heterostemma**, Wight & Arn. (Asclep.).
chrysanthus, Hassk. l. c. 102.—Java.

SYMPHYSDAPHNE, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 190. t. 67 (1853) = **Misanteca**, Cham. (Laurin.).
cubensis, A. Rich. l. c. = **M. cubensis**.

SYMPHYTUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 854.

abchasicum, Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) 1. 72.—Reg. Cauc.

album, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 821 = officinale.

anatolicum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 43.—Anatolia.

angustifolium, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 227 = tuberosum.

armenum, Gundelsh. ex DC. Prod. x. 66 = **Onosma sericea**.

aspermum, Donn, in Sims, Bot. Mag. t. 929.—Reg. Cauc.; Persia.

aspermum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 276 = **anatolicum**.

asperum, Lepech. in Nov. Act. Acad. Petrop. xiv. (1805) 442. t. 7 = **aspermum**.

azureum, Van Hall, in Tijdschr. Wetensch. ii. (1849) 128.—Hab.?

bohemicum, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 13. t. 263 = officinale.

borragineum, Tausch, in Flora, xix. (1836) 393 = **tauricum**.

brachycalyx, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 43.—Kurdistan.

brochum, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 13. t. 8 = bulbosum.

bulbosum, Schimp. in Flora, viii. (1825) 17.—Europ.

bulbosum, Schur, Enum. Pl. Transs. 468 = tuberosum.

bullatum, Hornem. Hort. Hafn. i. 179 = **tauricum**.

calcaratum, Clarke, Trav. ii. 651.—Palaest.

Carmosina, Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 654 (Quid?).—Sibir.

caucasicum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 128.—Reg. Cauc.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

caucasicum, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 294 = Donii.

SYMPHYTUM :—

Clusii, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 144 = bulbosum.

coccineum, Hort. ex Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849) 731.—Hab.?

coeruleum, Hort. Angl. ex DC. Prod. x. 40.—Sibir.

Consolida, Gueldest. Reisen, i. 420; ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 114 = officinale.

cordatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 130 = **grandiflorum**.

cordatum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 6. t. 7.—Hungar.

cordatum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schrift. ii. (1799) 121.—Europ. centr.

cordifolium, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 126 = **cordatum**.

Donii, DC. Prod. x. 37.—Hab.?

echinatum, Ledeb. Hort. Dorpat. Suppl. (1811) 5 = **aspermum**.

elatum, Tausch, in Flora, xix. (1836) 393 = officinale.

filipendulum, Bisch. l. c. ix. (1826) 562 = bulbosum.

floribundum, Shuttlew. ex Nym. Consp. 509 = **mediterraneum**.

foliosum, Rehm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 495.—Rossia.

fruticosum, Moç. ex DC. Prod. x. 121 = **Antiphytum mexicanum**.

grandiflorum, DC. Prod. x. 40.—Reg. Canc.

Gussonei, F. Schultz, in Arch. Fl. (1874) p. lviii; et in Flora, lviii. (1875) 218.—Sicil.

hirsutum, Rafin. Med. Fl. ii. 95.—Am. bor.

ibericum, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 647 = **grandiflorum**.

intermedium, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. 27; Roem. & Schult. Syst. iv. 66 (Quid?).—Hab.?

Jacquinianum, Tausch, in Flora, xix. (1836) 392, in obs. = orientale.

kurdicum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Pl. Or. Nov. Dec. ii. 5.—Kurdist.

laeve, Bess. Cat. Hort. Crem. Suppl. (1812) (Quid?).—Podolia.

macrolepis, J. Gay, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 347 = bulbosum.

majus, Gueldest. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 115 = **aspermum**.

mediterraneum, Guss. ex F. Schultz, in Flora, lviii. (1875) 218 = **Gussonei**.

mediterraneum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 500.—Europ. austr.

microcalyx, Opiz, Seznam, 94 = officinale.

molle, Janka, in Termész. Füzetek, i. (1877) 29.—Hungar.

nodosum, Schur, Enum. Pl. Transs. 468 = **tuberosum**.

officinale, Linn. Sp. Pl. 136.—Europ.

orientale, Linn. l. c.—Byzant.

orientale, Pall. Tabl. Taur. 47; Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 129 = **tauricum**.

orientale, Pinard, ex DC. Prod. x. 40 = **brachycalyx**.

ottomanum, Frivald. in Flora, xix. (1836) 439.—Rumelia.

Palestinae, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 94.—Syria.

pannonicum, Pers. Syn. i. 161 = **cordatum**.

patens, Fries, Mant. ii. 13 = orientale.

patens, Sibth. Fl. Oxon. 70 = officinale.

peregrinum, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1820) 4; et ex Spreng. Syst. i. 563 = **aspermum**.

pictum, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1884) i. 827.—Hab.?

punctatum, Gaud. Fl. Helv. ii. 41 = bulbosum.

racemosum, Steph. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 752 = **caucasicum**.

regium, S. T. Gmel. Reise, iii. 363. t. 36. f. 1 (= **Cynoglossum umbellatum**).—Hungar.

secundum, S. T. Gmel. l. c. = **Echium glomeratum**.

sepalicrale, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 174.—Pontus.

sylvaticum, Boiss. Pl. Or. Nov. Dec. ii. 4.—Pontus.

tanaicense, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1. 577.—Rossia.

tauricum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. ii. (1799) 121. t. 5. f. 1.—Reg. Cauc.; Armen.

tuberosum, Linn. Sp. Pl. 136.—Europ. austr.

uliginosum, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 227 = officinale.

uplandicum, Nym. Syll. 80 = orientale.

variegatum, Hort. ex Gard. Chron. (1880) i. 779, cum cit. falsa = officinale.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

Zeyheri, Schimp. in Flora, xii. (1829) 418 = bulbosum.

SYMPIEZA, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 8, 171 (1818). **ERICACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 593.

brachyphylla, Benth. in DC. Prod. vii. 706.—Afr. austr.

capitellata, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 8, 171.—Afr. austr.

Eckloniana, Klotzsch, in Linnaea, viii. (1823) 656.—Afr. austr.

Kunthii, Klotzsch, l. c. 229.—Afr. austr.

tenuiflora, Benth. in DC. Prod. vii. 706.—Afr. austr.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (1847), nomen (Styrac.?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 668.

SYMPLEURA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 593 a (

SYMPLOCOS:—

- brevipes*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 577, in obs. = coccinea.
caerulescens, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 429.—N. Caled.
caryophylloides, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 136; et in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 161.—Java.
caudata, Wall. Cat. n. 4413.—Reg. Himal.; China; Japon.
celastrifolia, Griff. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 575.—Malaya.
celastrinea, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 31.—Bras.
cerasifolia, Wall. Cat. n. 4434.—Malaya.
cernua, Benth. Pl. Hartw. 78 = Hartwegi.
cernua, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 188. t. 53.—Peruv.
ciliata, Benth. Pl. Hartw. 78, in nota.—Mexic.
ciliata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 466.—Java.
Ciponima, L'Hérit. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 175.—Am. trop.
ciponimoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 167.—Cuba.
citrea, Lex. in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 22.—Mexic.
Claussenii, A. DC. in DC. Prod. viii. 251.—Bras.
coccinea, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 185. t. 52.—Mexic.
congesta, Benth. Fl. Hongk. 211.—China.
congesta, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 136.—Malaya.
cordifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 187.—Zeylan.
coriacea, A. DC. in DC. Prod. viii. 248.—Peruv.
coronata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 187.—Zeylan.
costaricana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 301.—Costa Rica.
costata, Choisy, ex Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 136.—Java.
crassifolia, Benth. Fl. Hongk. 212.—China.
crassipes, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 580.—Malacca.
crataegoides, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 145.—Reg. Himal.; Burma; China; Japon.
cubensis, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 518.—Cuba.
cuneata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 186.—Zeylan.
decora, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 369.—China.
dryophila, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 578.—Reg. Himal.
elegans, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 185.—Zeylan.
estrellensis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 32.—Bras.
fasciculata, Roxb. ex A. DC. Prod. viii. 259 = Eurya japonica.
fasciculata, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 136.—Malaya.
ferruginea, Roxb. Hort. Beng. 40; Fl. Ind. ii. 542.—Reg. Himal.; Malaya.
flavida, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 573 = spicata.
floribunda, Wall. Cat. n. 4419 = S. Sumuntia.
foliosa, Wight, Ic. t. 1234.—Ind. or.
Fordii, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 78.—China.
Gardneriana, Wight, Ic. t. 1231.—Ind. or.
glaucescens, Vieill. ex Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 305.—N. Caled.
glomerata, King, ex Gamble, Darjeeling List, 54.—Reg. Himal.
gracilis, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 431.—N. Caled.
grandiflora, Wall. Cat. n. 4421.—Reg. Himal.
Hamiltoniana, Wall. Cat. n. 4420 = racemosa.
Hartwegi, A. DC. in DC. Prod. viii. 252.—Mexic.
hebantha, Thw. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 586.—Zeylan.
Henscheli, Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 588.—Malaya; China.
hirsuta, A. DC. in DC. Prod. viii. 253.—Bras.
hirsuta, Wight & Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 185 = minor, latiflora.
hispidula, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 186.—Zeylan.
Hohenackeri, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 582.—Ind. or.
Hookeri, C. B. Clarke, l. c. 578.—Reg. Himal.
Horsfieldiana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 475 = ferruginea.
Itatiaia, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 77. t. 4. f. B.—Bras.
iteophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 187, 476 = adenophylla.
japonica, A. DC. in DC. Prod. viii. 255.—China; Japon.

SYMPLOCOS:—

- javanica*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) ii. 64 = ferruginea.
jucunda, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 186.—Zeylan.
Jurgensenii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 301.—Mexic.
kurgensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 576.—Ind. or.
lachnobotrya, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 475 = ferruginea.
laeta, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 184.—Zeylan.
lanceaeifolia, Brongn. ex Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 305 = Lenormandiana.
lanceolata, A. DC. in DC. Prod. viii. 253.—Bras.
lancifolia, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 133.—Assam; China; Japon.
latiflora, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 585.—Zeylan.
laurina, Wall. Cat. n. 4416 = spicata.
laxiflora, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 232. t. 18.—Bras.
leiostachya, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 144, partim = nicobarica.
leiostachya, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 89.—Burma.
Lenormandiana, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 428.—N. Caled.
leptostachys, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 134 = lancifolia.
leucantha, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 89.—Burma.
Limoncillo, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 196 = martinicensis.
linearis, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 136, nomen.—Japon.
Loha, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 144 = spicata.
Lohu, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 298 = praec.
lucida, Brongn. & Gris, ex Miers, l. c. 305, in syn.—N. Caled.
lucida, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 55. t. 24 = japonica.
lucida, Wall. Cat. n. 4414 = theaeifolia.
Lundii, A. DC. in DC. Prod. viii. 251.—Bras.
macrocarpa, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 582.—Ind. or.
macrophylla, Wall. Cat. n. 4431.—Reg. Himal.
Maingayi, Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 588.—Malacca.
marginalis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 187.—Zeylan.
Martii, A. DC. in DC. Prod. viii. 252.—Bras.
martinicensis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 24; Linn. Sp. Pl. ed. II. 747.—Ind. occ.
Mathewsii, A. DC. in DC. Prod. viii. 250 (Mathewsii).—Peruv.
microcarpa, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 303 = lancifolia.
microphylla, Wight, Ic. t. 1232.—Ind. or.
minor, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 586.—Zeylan.
mollis, Wall. Cat. n. 4433 = ferruginea.
monantha, Wight, Ic. t. 1236.—Ind. or.
montana, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 430.—N. Caled.
mucronata, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 196.—N. Granat.
myrtacea, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 133.—Japon.
neriifolia, Sieb. & Zucc. l. c. 134.—Japon.
nervosa, A. DC. in DC. Prod. viii. 256 = racemosa.
nervosa, Wight, Ic. t. 1235 = foliosa.
nicobarica, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 580.—Ins. Nicobar.
nitens, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 232.—Bras.
nitida, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 430.—N. Caled.
nuda, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 195.—N. Granat.
oblongifolia, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 31.—Bras.
oblongifolia, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 33, 124.—Ins. Philipp.
obovata, A. DC. in DC. Prod. viii. 251.—Bras.
obovata, Wight & Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 185 = obtusa.
obtusa, Wall. Cat. n. 4424.—Ind. or.
octopetala, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 109.—Jamaic.
odoratissima, Choisy, ex Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 136.—Java.

SYMPLOCOS:—

- oligandra*, Bedd. Forest. Man. Bot. 150.—Travancor.
ophirensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 579.—Malacca.
ovalis, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 168.—Cuba.
oxyphylla, Wall. Cat. n. 4430.—Reg. Himal.; Burma.
pallida, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 308 = crataegoides.
paniculata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 102.—Japon.
paniculata, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 145; et Cat. n. 4429 = crataegoides.
paraensis, Endl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 24 = S. Ciponima.
parviflora, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 232.—Bras.
parvifolia, Benth. Pl. Hartw. 140.—Ecuador; Peruv.
pauciflora, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 587.—Zeylan.
pedicellata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 89 = oxyphylla.
pendula, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 84 = pauciflora.
pendula, Wight, Ic. t. 1237.—Zeylan.
pentagyna, Spreng. Neue Entdeck. ii. 129 = Vismia decipiens.
phaeoclados, A. DC. in DC. Prod. viii. 253.—Bras.
phyllocalyx, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 575 = japonica.
platyphylla, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 233.—Bras.
polycarpa, Wall. Cat. n. 4423 = spicata.
polystachya, Wall. l. c. n. 4428 = ferruginea.
prionophylla, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 302.—Mexic.
prospingua, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 329 = racemosa.
prunifolia, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 133 = caudata.
pubescens, Klotzsch, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 233.—Bras.
pulchra, Wight, Ic. t. 1230.—Ind. or.
pycnantha, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 302.—Mexic.
pycnobotrya, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 25.—Bras.
pyrifolia, Wall. Cat. n. 4415.—Reg. Himal.
racemosa, Roxb. Hort. Beng. 40; Fl. Ind. ii. 539.—Ind. or.; China.
racemosa, Wall. Cat. n. 4418 = spicata, theaeifolia, S. Sumuntia.
racemosa, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 583 = rosea.
ramentacea, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 33.—Bras.
ramosissima, Wall. Cat. n. 4425.—Reg. Himal.
reflexa, A. DC. in DC. Prod. viii. 248.—Peruv.
repandula, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 475.—Sumatra.
reticulata, J. Grah. Cat. Bomb. Pl. 104.—Ind. or.
revoluta, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 31.—Bras.
revoluta, A. DC. in DC. Prod. viii. 253.—Bras.
rhamnifolia, A. DC. l. c.—Bras.
Ribes, Fungh. & De Vriese, in De Vriese, Pl. Nov. Ind. Batav. fasc. i. 11.—Java.
rigida, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 581.—Malacca.
rigida, Wall. Cat. n. 4422 = racemosa.
rosea, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 51.—Travancor.
rotundifolia, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 430.—N. Caled.
rubiginosa, Wall. Cat. n. 4432.—Malaya.
rufescens, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 192, t. 55.—N. Granat.
rufescens, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 184 = versicolor.
salacensis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 466.—Java.
salicifolia, Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 579 = pyrifolia.
salicifolia, Griseb. Cat. Pl. Cub. 168.—Ind. occ.
Samuntia, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 298, sphalm. = S. Sumuntia.
Schiedeana, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 527.—Bras.
Schomburgkii, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1087, nomen.—Guian.
serrulata, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 190, t. 54.—N. Granat.
sessilis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 587.—Travancor.

SYMPLOCOS:—

- sinica*, [Ker-Gawl.] *Bot. Reg.* t. 710.—China.
speciosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 302.—Mexic.
spicata, *Roxb. Hort. Beng.* 40; *Fl. Ind.* ii. 541.—As.
 et Austral. trop.
Stawellii, F. Muell. *Fragm.* v. 60 = *spicata*.
stravadioides, *Brongn. & Gris*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.*
 xiii. (1866) 428.—N. Caled.
subcordata, Wight, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl.*
Brit. Ind. iii. 585 = *hispidula*.
subsessilis, *Choisy*, ex *Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch.*
 136.—Java.
subspinosa, *Buch.-Ham.* ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.*
 144 = *spicata*.
sulcata, *Kurz*, in *Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) ii.
 65.—Burma.
Sumuntia, *Buch.-Ham.* ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 145.
 —Reg. Himal.
Swinhoeana, *Hance*, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xv.
 (1861) 226 = *caudata*.
tetrandra, *Mart. Syst. Mat. Med. Bras.* 49.—Bras.
theaeifolia, *D. Don*, *Prod. Fl. Nep.* 145.—Reg. Himal.;
 Burma.
theophrastaeifolia, *Sieb. & Zucc.* in *Abh. Akad. Muench.*
 iv. III. (1846) 134.—Japon.
Thwaitesii, *F. Muell. Fragm.* iii. 22.—Austral.
tinctoria, *L'Hérit.* in *Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 176.
 —Am. bor.
tomentosa, *Humb. & Bonpl. Pl. Aequin.* i. 195.—
 N. Granat.
uniflora, *Bedd.* in *Madr. Journ. Sc. Ser. III.* i. (1864)
 51 = *anamallayana*.
uniflora, *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* xviii. (1840)
 233.—Bras.
urceolaris, *Hance*, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 307.—
 China.
variabilis, *Mart. ex Miq.* in *Mart. Fl. Bras.* vii. 30.—
 Bras.
Verhuelli, *Jungh. & De Vriese*, in *De Vriese, Pl. Nov.*
Ind. Batav. i. 12 = *ferruginea*.
versicolor, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii.
 584.—Zeylan.
Vieillardii, *Brongn. & Gris*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.*
 xiii. (1866) 429.—N. Caled.
virgata, *Royle*, *Illustr. Bot. Himal.* 464 (Index),
sphalm. = *Styrax serrulatum*.
xanthophylla, *Jungh. & De Vriese*, in *De Vriese, Pl.*
Nov. Ind. Batav. i. 11.—Java.
- SYMPLODIUM**, C. Koch, in *Linnaea*, xvi. (1842) 356 =
Carum, Rupp. (Umbell.).
simplex, C. Koch, l. c. = *C. elegans*.
- SYNACTILA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 104 (1836) = **Passi-**
flora, Linn.
viridiflora, Rafin. l. c. = *P. viridiflora*.
- SYNADENA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 9 (1836) = **Phalae-**
nopsis, Blume (Orchid.).
amabilis, Rafin. l. c. = *P. amabilis*.
- SYNADENIUM**, Boiss. in *DC. Prod.* xv. II. 187
 (1862). **EUPHORBACEAE**, Benth. & Hook. f. iii.
 261.
arborescens, *Boiss. l. c.*—Afr. austr.
carinatum, *Boiss. l. c.*—Ins. Borbon.
Grantii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5633.—Afr. trop.
- SYNAECIA**, Pritz. *Ic. Ind.* i. 1048 (1855), *sphalm.*
 = **SYNOECIA**, *Miq.* = **Ficus**, *Tourn.* (Urtic.).
- SYNAEDRIS**, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 655 (1841), *sphalm.*
 = seq.
- SYNAEDRYS**, Lindl. *Introd. Nat. Syst. ed. II.* 441
 (1836) = **Quercus**, *Tourn.* (Cupul.).
ossea, *Lindl. l. c.* = *Q. cornea*.
- SYNALLODIA**, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 93 (1836).
 (Gentianac. ?)
japonica, Rafin. l. c. (Quid ?).—Japon.
- SYNANDRA**, Nutt. *Gen. Am.* ii. 29 (1818).
LABIATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1205.
Torreya, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1811) 356.
grandiflora, *Nutt. Gen. Am.* ii. 29.—Am. bor.
- SYNANDRA**, Schrad. in *Goett. Gel. Anz.* (1821) i. 715
 = **Stenandrium**, *Nees* (Acanth.).
amoena, *Schrad. l. c.* 716 = *Sten. igneum*.

SYNANDRODAPHNE, Meissn. in *DC. Prod.* xv.
 i. 176 (1864). **LAURINEAE**, Benth. & Hook. f. iii.
 159.
antillana, Meissn. l. c. (= *Oreodaphne fragrans*).—
 Ind. occ.
laxa, *Meissn. l. c.*—N. Granat.

SYNANDROSPADIX, Engl. *Bot. Jahrb.* iv. (1883)
 61. **AROIDEAE**.
vermitoxicus, *Engl. l. c.* 62.—Reg. Argent.

SYNANTHERIAS, Schott, *Gen. Aroid.* t. 28 (1858).
AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 972.
sylvatica, *Schott, l. c.*—Ind. or.

SYNAPHE, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 90 (1867) = **Fes-**
tuca, *Tourn.* (Gramin.).
rigida, *Dulac, l. c.* = *F. rigida*.

SYNAPHEA, R. Br. in *Trans. Linn. Soc.* x. (1810)
 155. **PROTEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 173.
acutiloba, *Meissn. in Lehm. Pl. Preiss.* i. 528.—
 Austral.
brachystachya, *Lindl. Swan River App.* 32 = poly-
 morpha.
decorticans, *Lindl. l. c.*—Austral.
dilatata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 156.—
 Austral.
Drummondii, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852)
 183 = *dilatata*.
favosa, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 156.—
 Austral.
gracillima, *Lindl. Swan River App.* 32 = *petiolaris*.
petiolaris, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 156.
 —Austral.
pinnata, *Lindl. Swan River App.* 32.—Austral.
polymorpha, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810)
 156.—Austral.
Preissii, *Meissn. in Lehm. Pl. Preiss.* i. 529.—Austral.

SYNAPISMA, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 655 (1841)
sphalm. = **SYNASPISMA**, *Endl.* = **Codiaeum**,
Rumph. (Euphorb.).

SYNAPSIS, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 187 (1866). **SCRO-**
PHULARINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 943.
ilicifolia, *Griseb. l. c.*—Cuba.

SYNAPTANTHA, Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* t. 1146
 (1873). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 61.
tillaeacea, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* t. 1146.—Austral.

SYNAPTEA, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870)
 II. 65 = **SUNAPTEA**, *Griff.* = **Vatica**, *Linn.* (Dip-
 teroc.).

SYNAPTOLEPIS, Oliver, in *Hook. Ic. Pl.* t. 1074
 (1870). **THYMELAEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii.
 198.
alternifolia, *Oliver, l. c.* t. 1194.—Afr. trop.
Kirkii, *Oliver, l. c.* t. 1074.—Afr. trop.

SYNARRHENA, Fisch. & Mey. in *Bull. Sc. Acad.*
Petersb. viii. (1841) 255 = **Mimusops**, *Linn.* (Sapot.).
floribunda, *Fisch. & Mey. l. c.* 256 = *M. floribunda*.
subsericea, *Fisch. & Mey. l. c.* 255 = *M. subsericea*.

SYNARTHRON, Benth. & Hook. f. *Gen. ii.* 477 (1873)
 = seq.

SYNARTHURUM, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xlviii. 448
 (1827) = **Senecio**, *Tourn.* (Compos.).
appendiculatum, *Cass. l. c.* = *Senecio appendiculatus*.

SYNASPISMA, *Endl. Gen.* 1110 (1840) = **Codiaeum**,
Rumph. (Euphorb.).
pellatum, *Endl. l. c.* = *C. inophyllum*.

SYNASSA, *Lindl. Orch. Scel.* 9 (1826); *Bot. Reg.* sub
 t. 1618 (1833) = **Spiranthes**, *Rich.* (Orchid.).
corymbosa, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1618 (= *Pelexia*
corymbosa).—Peruv.

SYNCARPHA, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvi. (1810) 205.
 t. 5. f. 31 = **Helipterum**, *DC.* (Compos.).
gnaphaloides, *DC. l. c.* 207 = *H. gnaphaloides*.
staehelinoides, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 655 = *praec.*

SYNCARPIA, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1839) 12.
 n. 13; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xiii. (1840) 381.
MYRTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 709.
Kamptzia, *Nees, Progr. Gratul. Kamptzia* (1840);
 et in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. Suppl. i. p. ix.
 (1841).

Sincarpia, *Tenore*, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xxii.
 (1841) 230.
Hillii, *Bailey*, in *Proc. Roy. Soc. Queensl.* i. (1884) 86.
 —Austral.
laurifolia, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1839) 12. n.
 13; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xiii. (1840) 381.—
 Austral.
leptopetala, *F. Muell. Fragm.* i. 79.—Austral.
Vertholenii, *Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.*
 iii. (1855) 411.—Ins. Amboin.

SYNCEPHALANTHA, *Bartl. Ind. Sem. Hort.*
Götting. (1836) 6.—Cf. *Linnaea*, xii. (1838) Litt. 80.
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 409.
decipiens, *Bartl. l. c.*—Mexic.

SYNCEPHALANTHUS, Benth. & Hook. f. *Gen. ii.*
 409 (1873), *err. typ.* = *praec.*

SYNCEPHALUM, *DC. Prod.* vi. 282 (1837). **COM-**
POSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 326.
Bojeri, *DC. l. c.*—Madag.

SYNCHODENDRON, *Boj. ex DC. Prod.* v. 92
 (1836). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 288.
Bernieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1881) 279.
 —Madag.
pauciflorum, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 655, *sphalm.* = seq.
ramiflorum, *DC. Prod.* v. 93.—Madag.
senegalense, *Klatt*, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* xviii.
 (1873) 364.—Afr. austr.

SYNCLISIA, Benth. in Benth. & Hook. f. *Gen. i.* 36
 (1862). **MENISPERMACEAE**, Benth. & Hook. f.
 l. c.
scabrida, *Miers*, in *Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III.
 xx. (1867) 171.—Afr. trop.

SYNCODIUM, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 22 (1836) = **Seilla**,
Linn. (Liliac.).
nutans, *Rafin. l. c.* = *S. festalis*.

SYNCODON, *Fourr.* in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S.
 xvii. (1869) 111 = **Campanula**, *Tourn.*
cervicarium, *Fourr. l. c.* = *C. Cervicaria*.
glomeratum, *Fourr. l. c.* = *C. glomerata*.
thyrsoides, *Fourr. l. c.* = *C. speciosa*.

SYNCOLOSTEMON, *E. Mey. Comm. Pl. Afr.*
Austr. 230 (1837). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f.
 ii. 1174.
densiflorus, *Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.*
 230.—Afr. austr.
dissitiflorus, *Benth. in DC. Prod.* xii. 54.—Afr.
 austr.
parviflorus, *Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.*
 230.—Afr. austr.
ramulosus, *Benth. l. c.*—Afr. austr.
rotundifolius, *Benth. l. c.*—Afr. austr.

SYNDESMANTHUS, *Klotzsch*, in *Linnaea*, xii. (1838)
 240 = **Simocheilus**, *Klotzsch* (Ericac.).
articulatus, *Klotzsch, l. c.* 241.—Afr. austr.
capitellatus, *Klotzsch*, ex *Benth.* in *DC. Prod.* vii. 705
 = *Simocheilus oblongus*.
ciliatus, *Benth. l. c.* 707.—Afr. austr.
fasciculatus, *Klotzsch*, in *Linnaea*, xii. (1838) 240 =
Simocheilus glabellus.
glaucus, *Klotzsch, l. c.*—Afr. austr.
paucifolius, *Benth. in DC. Prod.* vii. 707.—Afr.
 austr.
scaber, *Klotzsch*, in *Linnaea*, xii. (1838) 241.—Afr.
 austr.
squarrosus, *Benth. in DC. Prod.* vii. 707.—Afr. austr.

SYNDESMIS, *Wall.* in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 314
 (1824) = **Gluta**, *Linn.* (Anacard.).
coarctatus, *Griff. Notul.* iv. 409. t. 567. f. 1 =
G. velutina.
elegans, *Wall.* in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 314 =
G. elegans.
tavoyana, *Wall. Cat. n.* 1004 = *G. tavoyana*.

SYNDESMON, Hoffmgg. in Flora, xv. (1832) II. Intell. n. iv. (err. typ. n. iii.) 34 = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).
thalictroides, Hoffmgg. l. c. = *A. thalictroides*.
tuberosum, Hoffmgg. l. c. = *Thalictrum tuberosum*.

SYNECHANTHUS, H. Wendl. in Bot. Zeit. xvi. (1858) 145. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 912.

RATHEA, Karst. in C. Koch & Fint. Wochenschr. i. (1858) 377.

REINECKIA, Karst. l. c. 349 (1858).

angustifolius, H. Wendl. in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1859) 15.—Costa Rica.

fibrosus, H. Wendl. in Bot. Zeit. xvi. (1858) 145.—Guatemala.

Warszewiczianus, H. Wendl. l. c.—Costa Rica.

SYNEDRELLA, Gaertn. Fruct. ii. 456. t. 171 (1791). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 383.

UCACOU, Adans. Fam. ii. 131 (1763), partim.

nodiflora, Gaertn. Fruct. ii. 456. t. 171.—Am. trop.

peduncularis, Benth. Pl. Hartw. 119.—Ecuador.

vialis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 217 = *Blainvillea tampicana*.

SYNEILESIS, Maxim. Prim. Fl. Amur. 165 (1859) = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

aconitifolia, Maxim. l. c. = *Senecio aconitifolius*.

palmata, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 487 = *Senecio Syneilesis*.

SYNELCOSCIADIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 345 = **Tordylium**, Linn. (Umbell.).
Carmeli, Boiss. l. c. = *Heracleum Carmeli*.

SYNEMA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 154 (1867) = **Mercurialis**, Tourn. (Euphorb.).
annuum, Dulac, l. c. = *M. annua*.
perenne, Dulac, l. c. = *M. perennis*.

SYNEXEMIA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).
caroliniana, Rafin. l. c. = *P. carolinensis*.
cuneifolia, Rafin. New Fl. Am. iv. 100 (Quid?).—Am. bor.
humilis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 399, sphalm. = *P. pumilus*.
obovata, Rafin. Neogenyt. 2 = *P. carolinensis*.
pumila, Rafin. l. c. = *P. pumilus*.

SYNGONIUM, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 780; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 53. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 979.
affine, Schott, Syn. Aroid. 67.—Am. trop.
albolineatum, Bull. Cat. (1871) 6.—Am. centr.
angustatum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 178.—Nicaragua.

auritum, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 780; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 53.—Mexic.

decipiens, Schott, Syn. Aroid. 69 = *Vellozianum*.

gracile, Schott, l. c. 70 = *affine*.

Hoffmannii, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 178 = *Porphyrospatha Hoffmannii*.

neglectum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 163 = *auritum*.

Oerstedianum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 178 (*Oerstedianum*).—Costa Rica.

pelocladum, Schott, Prod. Aroid. 202.—Costa Rica.

Plumieri, Schott, l. c. 206 = *auritum*.

podophyllum, Schott, in Bot. Zeit. ix. (1851) 85.—Mexic.

Poeppigii, Schott, Syn. Aroid. 68 = *Vellozianum*.

Riedelianum, Schott, l. c. 70 = *Vellozianum*.

Ruizii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 418 = *auritum*.

salvadorense, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 178 = *podophyllum*.

Schottianum, Wendl. ex Schott, Prod. Aroid. 200 = *Porphyrospatha Schottiana*.

Vellozianum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 418.—Bras.

Wendlandii, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 178.—Costa Rica.

Willdenowii, Schott, Syn. Aroid. 68 = *Vellozianum*.

xanthophidium, Schott, Prod. Aroid. 214.—Mexic.

VOL. II.

SYNIMA, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 501. *SAPINDACEAE*.
Cordierii, Radlk. l. c. 513, 539.—Austral.

SYNISOON, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1879) 208. *RUBIACEAE*.
Schomburgkianum, Baill. l. c.—Guian.

SYNMERIA, Nimmo, in J. Grah. Cat. Pl. Bomb. Addend. (1839) p. sine numero = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

schizochilus, Nimmo, l. c. = *H. crinifera*.

SYNNEMA, Benth. in DC. Prod. x. 538 (1846) = **Cardanthera**, Buch.-Ham. (Acanthac.).
avanum, Benth. l. c. = *C. avana*.

SYNNETIA, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 150 (1826), sphalm. = seq.

SYNNOTTIA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 169, sphalm. = seq.

SYNNOTIA, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 150 (1826) (sphalm. *Synnetia*, in Ind. correct.). *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 709.

ANACTORION, Rafin. Fl. Tellur. iv. 34 (1836).

bicolor, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 398; ed. II. 501.—Afr. austr.

galeata, Sweet, ll. cc.—Afr. austr.

variegata, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 150.—Afr. austr.

versicolor, Steud. Nom. ed. II. ii. 614, in syn., sphalm. = *praec.*

Walthamii, Hort. Kew.—Cf. Gard. Chron. (1881) I. 370, nomen = *variegata*.

SYNODON, Rafin. Sylva Tellur. 95 (1838) = **Conostegia**, D. Don (Melastom.).
calyprata, Rafin. l. c. = *C. calyprata*.
montana, Rafin. l. c. = *C. montana*.

SYNOECIA, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 469 = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).

diversifolia, Miq. l. c. 470. t. 9 A = *F. diversifolia*.

falcata, Miq. l. c. t. 9. B = *F. punctata*.

grandifolia, Kurz, in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 184 = *F. oligoneura*.

Guillielmi-primi, De Vriese, Synoecia, 1 = *F. asper-rima*.

serpens, Miq. Pl. Jungh. 67 = *F. punctata*.

sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 329 = *F. kalliecarpa*.

SYNOLIGA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 15 (1836) = **Xyris**, Linn.

pauciflora, Rafin. l. c. = *X. pauciflora*.

subulata, Rafin. l. c. = *X. subulata*.

SYNOPECTRIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 89 (1836) = **Neottia**, Linn. (Orchid.), etc.

picta, Rafin. l. c. 90 = *Spiranthes picta*.

viridis, Rafin. l. c.—Hab.?

SYNOPTERA, Rafin. Sylva Tellur. 98 (1838) = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melastom.).

levigata, Rafin. l. c. = *M. laevigata*.

SYNOSMA, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 247 = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

reniformis, Rafin. l. c. 247 = *Sen. Muehlenbergii*.

suaveolens, Rafin. l. c. = *Sen. suaveolens*.

SYNOSTEMON, F. Muell. Fragm. i. 32 (1858) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

glaucus, F. Muell. l. c. 33 = *P. Adami*.

hirtellus, F. Muell. l. c. iii. 89 = *P. hirtellus*.

ramosissimus, F. Muell. l. c. i. 33 = *P. ramosissimus*.

rigens, F. Muell. l. c. ii. 153 = *P. rigens*.

SYNOUM, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 226. t. 15. *MELIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 335.

glandulosum, A. Juss. l. c. 227. t. 15.—Austral.

Muelleri, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 593.—Austral.

SYNPHYLLIUM, Griff. in Madr. Journ. Sc. Ser. I. iv. (1836) 373 = **Curanga**, Juss. (Scrophul.).

torenioides, Griff. l. c. = *C. amara*.

SYNPTERA, Llanos, Fragm. 98 (1851) = **Cleisostoma**, Blume (Orchid.).
subviolacea, Llanos, l. c. = *C. subviolaceum*.

SYNSIPHON, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 490 = **Colchicum**, Linn. (Liliac.).
crociflorus, Regel, l. c. 491 = *C. crociflorum*, Regel.

SYNSTIMA, Rafin. Sylva Tellur. 48 (1838) = **Ilex**, Tourn.

acuminata, Rafin. l. c. 49 = *I. ambigua*.

ambigua, Rafin. ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 157 = *I. ambigua*.

caroliniana, Rafin. Sylva Tellur. 49 = *I. ambigua*.

rotundifolia, Rafin. l. c. = *I. rotunda*?

SYNTHERISMA, Walt. Fl. Carol. 76 (1788) = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

aegyptiacum, Schult. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 656 = *Eleusine aegyptiaca*.

ciliare, Schrad. Fl. Germ. 160 = *P. sanguinale*.

glabrum, Schrad. l. c. 163. t. 3. f. 6 = *P. glabrum*.

malabaricum, Sw. ex Schult. Syst. ii. 474 = *Centotheca lappacea*.

praecox, Walt. Fl. Carol. 76 = *P. sanguinale*.

sanguinale, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 77 = *P. sanguinale*.

serotinum, Walt. Fl. Carol. 76 = *Paspalum serotinum*.

villosum, Walt. l. c. 77 = *P. filiforme*?

vulgare, Schrad. Fl. Germ. 161 = *P. sanguinale*.

SYNTHLIPSIS, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) (Pl. Fendl.) 116. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 93.

Berlandieri, A. Gray, ex Torr. Bot. Mex. Bound. 34, in nota.—Mexic.

Greggii, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 116.—N. Mexic.

heterochroma, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 321.—N. Mexic.

SYNTHYRIS, Benth. in DC. Prod. x. 454 (1846). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 963.

alpina, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiv. (1862) 251.—Am. bor. occ.

Houghtoniana, Benth. in DC. Prod. x. 454.—Am. bor. pinnatifida, S. Wats. in Bot. King's Exp. 227. t. 22.—Am. bor. occ.

plantaginea, Benth. in DC. Prod. x. 455.—Am. bor. occ.

reniformis, Benth. l. c. 454.—Am. bor. occ.

rotundifolia, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 285.—Am. bor. occ.

rubra, Benth. in DC. Prod. x. 455.—Am. bor. occ.

SYNTRICHOPAPPUS, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 106 (1856). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 402.

Fremontii, A. Gray, l. c.—Calif.

Lemmonii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 20.—Calif.

SYNTROPHE, G. Ehrenb. ex Muell. Arg. in Neue Denkschr. Schw. Ges. Zuerich, xvi. (1858) 227 = **Caylusea**, A. St. Hil. (Resed.).

canescens, G. Ehrenb. l. c. = *C. canescens*.

fruticosa, G. Ehrenb. l. c. 229 = *C. canescens*.

SYNZISTACHIUM, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1838) = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).

peruvianum, Rafin. l. c. = *H. peruvianum*.

SYNZYGANTHERA, Ruiz & Pav. Prod. 137. t. 50 (1794) = **Laestema**, Sw.

purpurea, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 273 = *L. purpureum*.

SYORHYNCHIUM, Hoffmgg. Verz. Pf. 198 (1824), err. typ. = **Sisyrinchium**, Linn. (Irid.).

SYPHOCAMPYLOS, Hort. Belg. ex Hook. Bot. Mag. t. 4505 (1850), sphalm. = **Siphocampylus**, Pohl (Campanul.).

SYPHARISSA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 37 (1866) = **Urginea**, Steinh. (Liliac.).

exuviata, Salisb. l. c. 38 = *U. exuviata*.

filifolia, Salisb. l. c. = *U. filifolia*.

fragrans, Salisb. l. c. = *U. fragrans*.

SYPHOCAMPYLOS, Hort. Belg. ex Hook. Bot. Mag. t. 4505 (1850), sphalm. = **Siphocampylus**, Pohl (Campanul.).

SYPHOMERIS, Steud. Nom. ed. II. ii. 656 (1841), sphalm. = SIPHOMERIS, Boj. = *Grewia*, Juss. (Tiliac.).

SYRENIA, Andr. ex DC. Syst. ii. 491 (1821). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 80. *angustifolia*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 689 = *Erysimum angustifolium*, Ehrh. *Biebersteinii*, Andr. ex DC. Syst. ii. 493 = *Erysimum cuspidatum*. *cuspidata*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 689 = *Erysimum cuspidatum*. *Ehrharti*, Andr. ex DC. Syst. ii. 492 (*Ehrarti*) = *Erysimum angustifolium*, Ehrh. *Ehrhartiana*, Andr. in Bess. Enum. Pl. Volh. 104 = praec. *goniocala*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 24 = *Erysimum goniocalon*. *Lamarckii*, Andr. ex DC. Syst. ii. 492 = sessiliflora. *latifolia*, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 27 = *Erysimum cuspidatum*. sessiliflora, Ledeb. Fl. Ross. i. 193. — Ross. mer. siliculosa, Andr. ex DC. Syst. ii. 491. — Sibir.

SYRENOPSIS, Jaub. & Spach, Illustr. i. 6. t. 3 (1842) = *Iberidella*, Boiss. (Crucif.). *stylosa*, Jaub. & Spach, l. c. — As. Min.

SYRINGA, Linn. Syst. ed. I (1735). *OLEACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 675. *LIGUSTRINA*, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. xi. 55 (1859).

LILAC, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 223 (1763). *LILIACUM*, Renault, Fl. Dép. Orne, 100 (1800). *albiflora*, Opiz, Natural. n. x. (1825) 239 = vulgaris. *amoena*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 266 = vulgaris. *amurensis*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 371. — Manchuria. *angustifolia*, Salisb. Prod. 14 = persica. *bicolor*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 266 = vulgaris. *capitata*, S. T. Gmel. Reise, iii. 304 = persica. *carlsruhensis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 266 = vulgaris. *chinensis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 116 = oblata. *chinensis*, Turcz. ex DC. Prod. viii. 283 = villosa. *chinensis*, Willd. Berl. Baumz. 378. — China. *cordifolia*, Stokes, Bot. Comment. i. 33 = vulgaris. *dubia*, Pers. Syn. i. 9 = chinensis. Emodi, Wall. Cat. n. 2831. — Reg. Himal. Josikaea, Jacq. f. in Flora, xiv. (1831) 67, 399. — Transsylv. *laciniata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = persica. *latifolia*, Salisb. Prod. 13 = vulgaris. *Libertii*, Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 100, nomen = vulgaris? *ligustrina*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 272 = amurensis. *marliensis*, Hort. l. c. 266 = vulgaris. *media*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 709 = chinensis. *nigricans*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 266 = vulgaris. *Notgeri*, Hort. l. c. = vulgaris. *oblata*, Lindl. ex Carr. in Fl. des Serres, xiii. (1858) 126. — China. *pekinense*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 371 = amurensis. *persica*, Linn. Sp. Pl. 9. — Reg. Cauc. ; Persia. *Philemon*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 266 = vulgaris. *pubescens*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 73 = villosa. *rothomagensis*, Hort. ex A. Rich. in Dict. Class. ix. 401 = chinensis. *rotundifolia*, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. II. ii. (1879) 44. — Manchuria. *speciosa*, Hort. ex DC. Prod. viii. 282 = chinensis. *suspensa*, Thunb. Fl. Jap. 19 = Forsythia suspensa. *versaliensis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 266 = vulgaris. *villosa*, Vahl, Enum. i. 38. — China. *vincetoxifolia*, Baumg. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 656 = S. Josikaea. *virginialis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 266 = vulgaris. *vulgaris*, Linn. Sp. Pl. 9. — Transsylv.

SYRINGA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 244 (1763) = *Philadelphus*, Riv. (Saxifr.). *inodora*, Moench, Meth. 678 = P. inodorus. *suaveolens*, Moench, l. c. = P. coronarius.

SYRINGODEA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = *Erica*, Tourn. *abietina*, D. Don, l. c. = E. abietina. *acuminata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 656 = E. Massoni. *ambigua*, G. Don, Gen. Syst. iii. 824 = E. Massoni. *Archeriana*, G. Don, l. c. 822 = E. Archeria. *argentiflora*, G. Don, l. c. = E. purpurea. *aurea*, G. Don, l. c. = E. aurea. *Bedfordiana*, G. Don, l. c. 819 = E. pellucida. *Bedfordiana*, G. Don, l. c. 821 = E. Massoni. *bicolor*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. bicolor. *Bowieana*, G. Don, Gen. Syst. iii. 825 = E. Bowieana. *brachialis*, G. Don, l. c. 820 = E. brachialis. *Broadleyana*, G. Don, l. c. 818 = E. Broadleyana. *buccinaeformis*, G. Don, l. c. 824 = E. buccinaeformis. *carinata*, G. Don, l. c. 825 = E. Massoni. *Cephalotes*, G. Don, l. c. 822 = E. Cephalotes. *cerviciflora*, G. Don, l. c. 825 = E. cerviciflora. *clavaeflora*, G. Don, l. c. 824 = E. clavaeflora. *clavata*, G. Don, l. c. 818 = E. viridiflora. *coccinea*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. coccinea. *colorans*, G. Don, Gen. Syst. iii. 821 = E. colorans. *concinna*, G. Don, l. c. 823 = E. concinna. *conspicua*, G. Don, l. c. 820 = E. conspicua. *coronata*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. fascicularis. *costata*, G. Don, Gen. Syst. iii. 818 = E. versicolor. *cruenta*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. cruenta. *curviflora*, G. Don, Gen. Syst. iii. 819 = E. curviflora. *cuspidigera*, G. Don, l. c. 824 = E. ignescens. *cyrillaeiflora*, G. Don, l. c. 821 = E. palustris. *densa*, G. Don, l. c. 824 = E. ventricosa. *densiflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 656, sphalm. = seq. *densifolia*, G. Don, Gen. Syst. iii. 823 = E. Uhria. *diaphana*, G. Don, l. c. 818 = E. transparentis. *dichrus*, G. Don, l. c. = E. dichrus. *Dickensonii*, G. Don, l. c. 824 = E. pallens. *Dicksoniana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 656, sphalm. = praec. *discolor*, G. Don, Gen. Syst. iii. 823 = E. discolor. *doliiformis*, G. Don, l. c. 826 = E. blanda. *echiiflora*, G. Don, l. c. 822 = E. coccinea. *elata*, G. Don, l. c. 819 = E. conspicua. *elongata*, G. Don, l. c. 826 = E. elongata. *epistomia*, G. Don, l. c. 824 = E. sacciflora. *erubescens*, G. Don, l. c. 819 = E. erubescens. *Ewerana*, G. Don, l. c. 823 = E. Uhria. *exposita*, G. Don, l. c. 826 = E. pellucida. *exurgens*, G. Don, l. c. 819 = E. exurgens. *exudans*, G. Don, l. c. 819 = E. pellucida. *fascicularis*, G. Don, l. c. 825 = E. fascicularis. *filamentosa*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. filamentosa. *flammea*, G. Don, Gen. Syst. iii. 819 = E. flammea. *flava*, G. Don, l. c. = E. parilis. *foliacea*, Benth. in DC. Prod. vii. 630, sphalm. = seq. *foliosa*, G. Don, Gen. Syst. iii. 825 = E. foliacea. *gemmifera*, G. Don, l. c. 820 = E. Massoni. *gilva*, G. Don, l. c. 825 = E. gilva. *glabra*, Steud. Nom. ed. II. ii. 656 = E. ventricosa. *glandulosa*, G. Don, Gen. Syst. iii. 820 = E. pellucida. *grandiflora*, G. Don, l. c. 822 = E. grandiflora. *Hibbertiana*, G. Don, l. c. = E. Hibbertia. *hirsuta*, G. Don, l. c. 826 = E. perspicua. *hirta*, G. Don, l. c. 823 = E. speciosa. *hybrida*, G. Don, l. c. 824 = E. Massoni. *ignescens*, G. Don, l. c. 820 = E. ignescens. *insulsa*, G. Don, l. c. 818 = E. insulsa. *lanata*, G. Don, l. c. 823 = E. conspicua. *Leeana*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. Leea. *Linkii*, G. Don, Gen. Syst. iii. 819 = E. protrudens. *Linnaeana*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. perspicua.

SYRINGODEA :—

linnaeoides, G. Don, Gen. Syst. iii. 819 = *Erica* perspicua. *lituiflora*, G. Don, l. c. 820 = E. perspicua. *longifolia*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. longifolia. *lycopodiifolia*, D. Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 656 = E. Massoni. *mammosa*, G. Don, Gen. Syst. iii. 825 = E. mammosa. *Massonii*, G. Don, l. c. 820 = E. Massoni. *mutabilis*, G. Don, l. c. 824 = E. cruenta. *nana*, G. Don, l. c. = E. nana. *nitens*, G. Don, l. c. = E. nitens. *obpyramidalis*, G. Don, l. c. 821 = E. pyramidalis. *onosmaeflora*, G. Don, l. c. 822 = E. onosmaeflora. *ostrina*, G. Don, l. c. 824 = E. coccinea. *pallens*, G. Don, l. c. 818 = E. pallens. *Pateronii*, G. Don, l. c. 825 = E. abietina. *pateronioides*, G. Don, l. c. = E. Massoni. *pauciflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 656, sphalm. = E. sacciflora. *pellucida*, G. Don, Gen. Syst. iii. 818 = E. pellucida. *perspicua*, G. Don, l. c. 821 = E. Massoni. *phylicifolia*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. purpurea. *pinex*, G. Don, Gen. Syst. iii. 821 = E. vestita. *pinifolia*, G. Don, l. c. = E. longifolia. *procera*, G. Don, l. c. 820 = E. ignescens. *pulchella*, G. Don, l. c. 823 = E. Leea. *pulviniformis*, G. Don, l. c. = E. coccinea. *pusa*, G. Don, l. c. = E. Leea. *purpurea*, G. Don, l. c. = E. purpurea. *radiata*, G. Don, l. c. 819 = E. Massoni. *refulgens*, G. Don, l. c. 818 = E. versicolor. *Rollinsonii*, G. Don, l. c. 826 = E. Rollissonia. *rosea*, G. Don, l. c. 822 = E. vestita. *rubida*, G. Don, l. c. 826 = E. Massoni. *rugosa*, G. Don, l. c. 823 = E. Massoni. *sacciflora*, G. Don, l. c. 825 = E. sacciflora. *Salisburyana*, G. Don, l. c. 822 = E. purpurea. *sanguinea*, G. Don, l. c. 824 = E. sanguinea. *sceptriformis*, G. Don, l. c. 826 = E. spicata. *serratifolia*, G. Don, l. c. 820 = E. serratifolia. *sessiliflora*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. spicata. *simpliciflora*, G. Don, Gen. Syst. iii. 820 = E. curviflora, buccinaeformis. *sordida*, G. Don, l. c. = E. conspicua. *speciosa*, G. Don, l. c. 824 = E. speciosa. *spicata*, G. Don, l. c. 825 = E. spicata. *splendens*, G. Don, l. c. 821 = E. conspicua. *spuria*, G. Don, l. c. 819 = E. Massoni. *stagnalis*, G. Don, l. c. = E. sulphurea. *sulphurea*, G. Don, l. c. = E. sulphurea. *transparentis*, G. Don, l. c. 818 = E. elongata. *triphylia*, G. Don, l. c. = E. triphylla. *tubiflora*, G. Don, l. c. 820 = E. tubiflora. *tumida*, G. Don, l. c. 825 = E. tumida. *velitaris*, G. Don, l. c. = E. velitaris. *versicolor*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. versicolor. *verticillata*, G. Don, Gen. Syst. iii. 821 = E. mammosa. *vestita*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155 = E. vestita. *virescens*, G. Don, Gen. Syst. iii. 824 = E. virescens. *viridiflora*, G. Don, l. c. = E. viridiflora. *viridis*, G. Don, l. c. 822 = E. Leea.

SYRINGODEA, Hook. f. Bot. Mag. t. 6072 (1873). *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 693. *bicolor*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 67. — Afr. austr. *filifolia*, Baker, l. c. — Afr. austr. *latifolia*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 403. — Afr. austr. *minuta*, Klatt, l. c. = *Pauridia hypoxidioides*. *montana*, Klatt, l. c. — Afr. austr. *pulchella*, Hook. f. Bot. Mag. t. 6072. — Afr. austr. *rosea*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 403 = *Romulea rosea*.

SYRINGOSMA, Mart. ex Reichb. Consp. 134 (1828); et ex Lindl. Veg. Kingd. 601 (1847) = *Forsteronia*, G. W. F. Mey. (Apocyn.).

SYRIUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 657 (1841), sphalm. = **SIRIUM**, Schreb. = *Santalum*, Linn.

SYRMATIUM, Vog. in Linnaea, x. (1835-36) 590 = *Hosackia*, Dougl. (Legumin.).
glabrum, Vog. l. c. 591 = *H. glabra*.
tomentosum, Vog. l. c. = *H. tomentosum*.

SYRRHONEMA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiii. (1864) 124; xx. (1867) 19. Genus dubium *MENISPERMACEARUM*. Cf. Benth. & Hook. f. i. 959.
fasciculatum, Miers, ll. cc. 124; 20.—Ins. Fernando Po.

SYSIMBRIUM, Pall. Reise, ii. 740 (1774), err. typ. = *Sisymbrium*, Tourn. (Crucif.).

SYRINCHIUM, Engelm. & A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 263, sphalm. = *Sisyrinchium*, Linn. (Irid.).

SYSPONE, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 5 (1843) = *Genista*, Linn. (Legumin.).
sagittalis, Griseb. l. c. 6 = *G. sagittalis*.

SYSTEMON, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 33; Gartenfl. vi. (1857) 81 = *Galipea*, Aubl. (Rutac.).
Fischeri, Regel, ll. cc.—Bras.

SYSTREPHA, Burch. Trav. i. 546 (1822) = *Ceropegia*, Linn. (Asclep.).
filiforme, Burch. l. c.—Afr. austr.
multiflora, Burch. ex Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 10 = *C. multiflora*.

SYSTREPHIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 779 (1876), sphalm. = *praece*.

SYZIGANTHUS, Steud. Syn. Pl. Cyp. 153 (1855) = *Gahnia*, Forst. (Cyperac.).
multiflorus, Steud. l. c. = *G. javanica*.

SYZIGIUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 657 (1841), sphalm. = *seq.*

SYZYGEUM, Wight, Ic. i. 4 (1838), sphalm. = *seq.*

SYZYGIUM, Gaertn. Fruct. i. 166. t. 33 (1788) = *Eugenia*, Mich. (Myrtac.).
acuminatissimum, DC. Prod. iii. 261.—Java.
acuminatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 452 = *E. acuminata*.
aegiceroides, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 203 = *E. aegiceroides*.
alternans, Miq. ex Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 500 = *E. Heyneana*.
alternifolium, Walp. Rep. ii. 179 = *E. alternifolia*.
altissimum, Wall. Cat. n. 3588 = *E. Thumra*.
amicorum, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 839 = *E. amicorum*.
androsaeoides, Walp. Rep. ii. 179 = *E. androsaeoides*.
angkolanum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 448 = *E. operculata*.
apodum, Miq. l. c. Suppl. 312.—Sumatra.
areolatum, DC. Prod. iii. 260 = *E. areolata*.
Arnottianum, Walp. Rep. ii. 180 = *E. Arnottiana*.
assimile, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 116 = *E. assimilis*.
auriculatum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 184.—N. Caled.
avene, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 312.—Sumatra.
balsameum, Wall. Cat. n. 3592 = *E. balsamea*.
Bellutta, DC. Prod. iii. 261 = *E. zeylanica*.
borneense, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 453 = *E. borneensis*.
brachiatum, Miq. l. c. 460 = *E. brachiata*.
brachybotryum, Miq. l. c. 452.—Sumatra.
brachyneum, F. Muell. Fragm. iv. 59 = *E. Smithii*.
Brackenridgei, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 838 = *E. Brackenridgei*.
brevifolium, C. Muell. l. c. 839 = *E. brevifolia*.
buxifolium, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 187.—China.
calophyllifolium, Walp. Rep. ii. 180 = *E. calophyllifolia*.
campanellum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 451.—Java.
campanulatum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 203.—Borneo.
capillare, Wall. Cat. n. 3578 = *E. filiformis*, Wall.
caryophyllaeum, Gaertn. Fruct. i. 166. t. 33 = *E. caryophyllaea*.
caryophyllifolium, DC. Prod. iii. 260 = *E. Jambolana*.

SYZYGIUM:—

caryophyllifolium, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 449 = *Zippelianum*.
caudatum, Wall. Cat. n. 3591 = *Eugenia cymosa*.
cinerascens, Presl, Bot. Bemerk. 70 = *seq.*
cinereum, Wall. Cat. n. 3576 = *E. brachiata*.
claviflorum, Wall. l. c. 3575 = *E. claviflora*.
clusiaefolium, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 839 = *E. clusiaefolia*.
coarctatum, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 437 = *E. zeylanica*.
concinnum, Wall. Cat. n. 3582 = *E. cymosa*.
confertiflorum, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 838 = *E. confertiflora* (cf. Addend.).
confusum, Blume, ex Miq. Anal. Bot. Ind. i. 27 = *E. microbotrya*.
conicum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 204.—Borneo.
contractum, Wall. Cat. n. 3602 = *E. pellucida*.
cordatum, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 425 = *E. cordatum*, M. Laws.
cordifolium, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 63. t. 11 = *E. cordatum*, M. Laws.
cordifolium, Walp. Rep. ii. 179 = *E. cordifolia*.
corticatum, Wall. Cat. n. 3565 = *E. zeylanica*.
corymbosum, DC. Prod. iii. 261.—Java.
corynocarpa, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 839 = *E. corynocarpa*.
costatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 451 = *E. operculata*.
costatum, Wall. Cat. n. 3556 (Quid ?)—Ind. or.
cuneatum, Wall. l. c. 3598 = *E. cuneata*.
cuneifolium, Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 144 = *E. cuneifolia*.
cyminiferum, Presl, Bot. Bemerk. 70 (= *Jambosa cymifera*).—Afr. austr.
cymosum, DC. Prod. iii. 259 = *E. cymosa*.
cymosum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 202 = *E. pamatensis*, operculata.
densiflorum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 182.—N. Caled.
densiflorum, Wall. Cat. n. 3601 = *E. Arnottiana*.
effusum, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 838 = *E. effusa*.
ellipticum, Wall. Cat. n. 3587 = *E. valdevenosa*.
euneuron, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 314.—Sumatra.
excavatum, Wall. Cat. n. 3574 = *E. claviflora*.
expansum, Wall. l. c. 3567 = *E. expansa*, Duthie.
ficifolium, Wall. l. c. 3558 = *E. tetragona*.
filiforme, Wall. l. c. 3580 = *E. filiformis*.
firmitum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 417 = *E. grandis*.
floribundum, F. Muell. Fragm. iv. 58 = *E. Ventenatii*.
forte, F. Muell. l. c. v. 13 = *E. grandis*.
fraternum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 458.—Java.
frutescens, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 184.—N. Caled.
fruticosum, DC. Prod. iii. 260 = *E. fruticosa*.
furcatum, Blume, ex Miq. Anal. Bot. Ind. i. 23 = *E. Muelleri*.
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 117 = *E. Gardneri*.
glaucescens, Miq. Anal. Bot. Ind. i. 24 = *E. borneensis*.
glomeratum, DC. Prod. iii. 259 = *E. glomerata*, Lam.
grande, Wall. Cat. n. 3554 = *E. grandis*.
gratum, Wall. l. c. 3586 = *E. grata*.
guineense, DC. Prod. iii. 259 = *Calyptanthus guineensis*.
guineense, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 315. t. 72 = *E. owariensis*.
Heyneanum, Wall. Cat. n. 3599 = *E. Heyneana*.
hypericifolium, DC. Prod. iii. 261.—Ins. Borbon.
inophylloides, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 838 = *E. inophylloides*.
inophyllum, DC. Prod. iii. 260 = *E. inophylla*.
Jambolanum, DC. l. c. 259 = *E. Jambolana*.
javanicum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 461.—Java.
kalahiense, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 205 = *E. kalahiensis*.
Korthalsianum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 454 = *E. Korthalsiana*.
laevigatum, Miq. l. c. 457 = *E. laevigata*.
lanceolatum, Wight & Arn. Prod. 330 = *E. Wightiana*.
lateriflorum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 183.—N. Caled.
lateriflorum, Royle, ex Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 499 = *E. Jambolana*.
latifolium, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 294 = *E. bracteata*.
latifolium, DC. Prod. iii. 259.—Ins. Maurit.
laxiflorum, DC. l. c. 261 = *Calyptanthus laxiflora*.
leucoxylon, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 203 = *E. leucoxylon*.

SYZYGIUM:—

lineare, Wall. Cat. n. 3596 = *Eugenia linearis*, Duthie.
lissophyllum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 117 = *E. lissophylla*.
longiflorum, Presl, Bot. Bemerk. 70.—Ins. Philipp.
longiflorum, Wall. Cat. n. 3572 = *E. claviflora*.
lucidum, Gaertn. Fruct. i. 167. t. 33 = *E. lucida*, Banks.
macranthum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 182.—N. Caled.
magnoliaefolium, DC. Prod. iii. 261.—Java.
magnoliaefolium, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 203 = *E. borneensis*.
Makul, Gaertn. Fruct. i. 166. t. 33.—Zeylan.
marginatum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 203.—Sumatra.
Metrosideros, DC. Prod. iii. 261.—Cochinch.
micans, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 468.—N. Caled.
Michellii, Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 505 = *E. uniflora*, Linn.
micranthum, Blume, ex Miq. Anal. Bot. Ind. i. 22 = *E. pamatensis*.
micranthum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 117 = *E. micrantha*, Bedd.
minutiflorum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 311.—Sumatra.
montanum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 116 = *E. grandis*.
Muelleri, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 453 = *E. Muelleri*.
multipetalum, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 182.—N. Caled.
myrtifolium, DC. Prod. iii. 261 = *E. myrtifolia*, Roxb.
Neesianum, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. i. (1836) 335 = *E. Neesiana*.
neglectum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 184.—N. Caled.
nelitricarpum, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 53 = *E. cymosa*.
nervosum, DC. Prod. iii. 260 = *E. operculata*.
nitidum, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 221.—N. Guin.
nitidum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 183.—N. Caled.
nodosum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 447 = *E. operculata*.
oblatum, Wall. Cat. n. 3569 = *E. oblata*.
obovatum, DC. Prod. iii. 259 = *E. obovata*, Poir.
obovatum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 205 = *E. Muelleri*.
obovatum, Wall. Cat. n. 3552 = *E. operculata*.
obtusatum, Blume, ex Miq. Anal. Bot. Ind. i. 25 = *E. caryophyllaea*.
obtusifolium, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iv. 1532 = *E. Jambolana*.
occlusum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 460 = *E. occlusa*.
odoratum, DC. Prod. iii. 260.—China.
oleinum, Wall. ex Walp. Rep. ii. 178 = *E. myrtifolia*.
oliganthum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 118 = *E. oligantha*.
ovale, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 205.—Borneo.
owariense, Benth. in Hook. Niger Fl. 359 = *E. owariensis*.
palembanicum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 313 = *E. lepidocarpa*.
Pancheri, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 183.—N. Caled.
Panealla, Wall. Cat. n. 3557 = *E. operculata*.
paniculatum, Gaertn. Fruct. i. 167. t. 33 = *E. paniculata*.
patens, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 203.—Sumatra.
patens, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 184.—N. Caled.
politum, Wall. Cat. n. 3626 = *E. zeylanica*.
polyanthum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 450.—Java.
polyanthum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 116 = *E. operculata*.
polyanthum, Walp. Rep. ii. 180 = *E. polyantha*, Wight.
Pseudo-jambolana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 458.—Java.
pterocalyx, Brongn. & Gris, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiii. (1870-71) 386.—N. Caled.
pulchellum, Wall. Cat. n. 3566 = *E. oblata*.
punctulatum, Wall. l. c. 3583 = *E. pyrifolia*, Duthie.
pyrifolium, DC. Prod. iii. 261 = *E. pyrifolia*, Duthie.
quadrialatum, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 246.—Ins. Molucc.
racemosum, DC. Prod. iii. 261.—Java.
rameum, Wall. Cat. n. 3595 = *E. tetragona*.
reticulatum, Walp. Rep. ii. 179 = *E. mangifolia*.
revolutum, Walp. l. c. 180 = *E. revoluta*, Wight.

SYZYGIIUM:—

ribesoides, Wall. Cat. n. 3553 A = *Eugenia brachiata*.
rigidum, Wall. l. c. 3581 = *E. chlorantha*.
robustum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 1086.—Ins. Banca.
rostratum, DC. Prod. iii. 261.—Java.
rotundifolium, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. 1.
 (1836) 335 = *E. rotundifolia*.
rubens, Walp. Rep. ii. 180 = *E. rubens*.
rubescens, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 839 = *E. rubescens*.
rubicundum, Wight & Arn. Prodr. 330 = *E. rubicunda*.
rugosum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 204.—Java.
salicifolium, J. Grah. Cat. Pl. Bomb. 73 = *E. Heyneana*.
salicifolium, Wall. Cat. n. 3597 = *E. rubicunda*.
sandwicensis, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 838 = *E. sandwicensis*.
savaensis, C. Muell. l. c. 839 = *E. savaensis*.
scandens, Boj. Hort. Maurit. 143 = *E. scandens*.
Schwenckii, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 246.—Sumatra.
sclerophyllum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 118 = *E. sclerophylla*.
scoparium, Wall. Cat. n. 3594 = *E. scoparia*.
sessile, Blume, ex Miq. Anal. Bot. Ind. i. 25 = *E. Korthalsiana*.
Sieberianum, Presl, Bot. Bemerk. 69.—Irs. Maurit.
spathulatum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 118 = *E. olivifolia*.
speciosum, Wall. Cat. n. 3568 = *E. Thumra*.
spicatum, DC. Prod. iii. 260 = *E. zeylanica*.
suavissimum, Wall. Cat. n. 3573 = *E. leptantha*, Wight.
subcapitulatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 450.—Java.
subdecurrens, Miq. l. c. 449.—Java.
subdecussatum, Wall. Cat. n. 3589 = *E. subdecussata*.
subnodosum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 313.—Sumatra.
subtile, Miq. l. c.—Sumatra.
sylvestre, Walp. Rep. ii. 178 = *E. sylvestris*.
Tatna, Wall. Cat. n. 3555 = *E. Tatna* (in Addend.).
tenellum, Blume, ex Miq. Anal. Bot. Ind. i. 27.—Borneo.
tenuis, Wall. Cat. n. 3570 = *E. tenuis*.
tenuiflorum, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 183.—N. Caled.
tesselatum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 203.—Borneo.
tetragonum, Wall. ex Wight, Illustr. Ind. Bot. ii. 16 = *E. tetragona*.
timorianum, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 455.—Ins. Timor.
toddalioides, Walp. Rep. ii. 179 = *E. toddalioides*.
tripinervium, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 246.—Java.
truncatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 455.—Java.
tutuilese, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 839 = *E. tutuilensis*.
umbellatum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 205.—Sumatra.
umbrosum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 118 = *E. subavenis*.
validum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 204.—Sumatra.
varifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 311.—Ins. Banca.
vastum, Wall. Cat. n. 3561 = *E. operculata*.
venosum, DC. Prod. iii. 260 = *E. frondosa*.
venulosum, Wall. Cat. n. 3585 = *E. venulosa*.
verecundum, Wall. l. c. 3579 = *E. verecunda*.
vimineum, Wall. l. c. 3593 = *E. cymosa*.
wagapense, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 468.—N. Caled.
Wallichianum, Presl, Bot. Bemerk. 70 = *E. operculata*.
Wallichii, Walp. Rep. ii. 180 = *E. Wallichii*.
Wightianum, Wall. Cat. n. 3577 = *E. Wightiana*.
zeylanicum, DC. Prod. iii. 260 = *E. zeylanica*, Wight.
Zippelianum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 449.—Java.

SEGLEWIA, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 419 (1868), sphalm. = SCZEGLEEWIA, Turcz. = *Symphorema*, Roxb. (Verben.).

SZOVITSIA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 39 (1835). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 925
callicarpa, Fisch. & Mey. l. c.—Reg. Cauc.

SZOWITSIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 658 (1841) = *præc.*

T

TABACINA, Reichb. Handb. 201 (1837) = *seq.*

TABACUM, Gilib. Fl. Lituan. i. 39 (1781) = *Nicotiana*, Linn. (Solan.).
latissimum, Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm. iii. 309 = *N. Tabacum*.
Nicotianum, Bercht. & Opiz, l. c. 307 = *N. Tabacum*.
ovatifolium, Gilib. Fl. Lituan. i. 39 = *N. Tabacum*.

TABACUS, Moench, Meth. 448 (1794) = *Nicotiana*, Linn. (Solan.).
viscidus, Moench, l. c. = *N. glutinosa*.

TABEBUIA, Gomez, Obs. ii. 7. t. 2 (1803). *BIGNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1042.
POTAMOXYLON, Rafin. Sylva Tellur. 78 (1838).
aesculifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 494.—Mexic.
Avellanadae, Lorentz, ex Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 258.—Reg. Argent.
brevipes, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 199, nomen.—Bras.
cassinoides, DC. Prod. ix. 213.—Bras.
citrifolia, DC. in Bibl. Univ. Genève. xvii. (1838) 131; Prod. ix. 213.—Bras.
cordata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 129.—Am. austr.
dentata, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 199.—Bras.
dracocephaloides, Miers, l. c.—Bras.
fallax, DC. in Bibl. Univ. Genève. xvii. (1838) 131 = *Bignonia fallax*.
flavescens, Benth. & Hook. f. ex Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 257.—Reg. Argent.
fluviatilis, DC. Prod. ix. 215.—Guian.
fusca, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 494.—Mexic.
Guayacan, Hemsl. l. c. 495.—Panama.
haemantha, DC. Prod. ix. 214.—Porto Rico.
heterotricha, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 495.—S. Salvador.
ilicifolia, DC. Prod. ix. 213.—Madag.
japurensis, DC. l. c. 214.—Bras.
lanceolata, DC. in Bibl. Univ. Genève. xvii. (1838) 131; Prod. ix. 213.—Bras.
latifolia, DC. ll. cc. = *Callichlamys riparia*.
leucoxyla, DC. ll. cc. 131; 212.—Am. trop.
magnolioides, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 199.—Bras.
Mansoana, DC. Prod. ix. 214.—Bras.
mexicana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 495.—Mexic.
neurophylla, Miq. in Linnaea, xxvi. (1853) 219.—Guian.
nodosa, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 258.—Reg. Argent.
pallida, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 199.—Ind. occ.
palustris, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 495.—Panama.
pentaphylla, Hemsl. l. c.—Panama.
Pisoniana, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 199.—Bras.
pyramidata, DC. Prod. ix. 214.—Guian.
rosea, DC. l. c. 215.—Mexic.
rufinervis, DC. l. c. 213 = *Callichlamys riparia*.
sanguinea, DC. in Bibl. Univ. Genève. xvii. (1838) 131; Prod. ix. 176 = *Fredericea speciosa*.
triphylla, DC. Prod. ix. 214.—Ind. occ.
uliginosa, DC. in Bibl. Univ. Genève. xvii. (1838) 131; Prod. ix. 212.—Bras.
xanthophylla, DC. Prod. ix. 214.—Bras.

TABERNA, Miers, Apocyn. S. Am. 61 (1878) = *Tabernaemontana*, Plum. (Apocyn.).
cymosa, Miers, l. c. 62 = *Tabernaem. cymosa*.
discolor, Miers, l. c. = *Tabernaem. discolor*.
disparifolia, Miers, l. c. 63.—Peruv.
disticha, Miers, l. c. 64 = *Tabernaem. disticha*.
laurina, Miers, l. c. 63 = *Tabernaem. laurifolia*.
Poeppigii, Miers, l. c. = *Tabernaem. Poeppigii*.
Riedelii, Miers, l. c. 64 = *Tabernaem. Riedelii*.

TABERNAEMONTANA, Plum. ex Linn. Gen. ed. i. 66 (1737). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 706.

ANACAMPTA, Miers, Apocyn. S. Am. 64 (1878).
ANARTIA, Miers, l. c. 79 (1878).
BONAFOUSIA, A. DC. in DC. Prod. viii. 359 (1844).
CODONEMA, Miers, Apocyn. S. Am. 72 (1878).
MERIZADENIA, Miers, l. c. 78 (1878).
PANDACA, Thou. Gen. Nov. Madag. 10 (1806).
PESCHIERA, A. DC. in DC. Prod. viii. 360 (1844).
REICHARDIA, Dennst. Schlusss. Hort. Malab. 32 (1818).
REJOUA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 450. t. 61 (1826).
RHIGOSPIRA, Miers, Apocyn. S. Am. 67 (1878).
TABERNA, Miers, l. c. 61 (1878).
acapulcensis, Miers, l. c. 57.—Mexic.
accedens, Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 107.—Bras.
acuminata, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 406.—Bolivia.
acutissima, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 73.—Bras.
affinis, Muell. Arg. l. c. 83.—Bras.
africana, A. DC. in DC. Prod. viii. 367.—Afr. trop.
alba, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *citrifolia*.
alba, Nicholson, ex Griseb. Fl. Brit. Pl. Ind. 409 = *citrifolia*.
alternifolia, Linn. Sp. Pl. 211 = *coronaria*?
alternifolia, Roxb. Fl. Ind. ii. 24 = *crispa*.
Amsonia, Linn. Sp. Pl. ed. II. 308 = *Amsonia Tabernaemontana*.
amygdalaefolia, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14.—Am. austr.
amygdalifolia, Seem. Bot. Voy. Herald, 167 = *acapulcensis*.
amygdalifolia, Sieber, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 369 = *persicariaefolia*.
angulata, Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 72.—Bras.
angustifolia, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 300 = *Amsonia angustifolia*.
apoda, Wright, in Sawv. Fl. Cub. 118.—Cuba.
arcuata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 22. t. 143.—Peruv.
aurantiaca, Gaudich. Freyc. Voy. Bot. 50, 55.—Ins. Rawak.
australis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 84.—Bras.
Barteri, Hook. Bot. Mag. t. 5859.—Afr. trop.
Benthaminiana, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 70 = *Muelleriana*.
Benthaminiana, Muell. Arg. l. c. 80.—Bras.
Benthaminina, Miers, Apocyn. S. Am. 289, sphalm. = *præc.*
Berterii, A. DC. in DC. Prod. viii. 367.—Porto Rico.
bicolor, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 952, nomen.—Guian.
bovina, Lour. Fl. Cochinch. 118.—Cochinch.
bracteolaris, Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 83.—Bras.
breviflora, Muell. Arg. l. c. 79.—Bras.
bufalina, Lour. Fl. Cochinch. 117.—Cochinch.
calycina, Spruce, ex Miers, Apocyn. S. Am. 73 = *Muelleriana*.
calycina, Wall. Cat. n. 1577; et in Bot. Reg. sub t. 1273.—Burma.
Camassi, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 137 = *Gonioma Kamassi*.
catharinensis, A. DC. in DC. Prod. viii. 365.—Bras.
celebica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 139.—Ins. Celebes.
cerifera, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 188.—N. Caled.
cerniiflora, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 325.—Ins. Timor.
cestroides, Nees, ex Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. 1. (1823) 83 = *Malouetia cestroides*.
cirrrosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 115 = *Finlaysonia obovata*.
citrifolia, Forst. f. Prod. 20 = *orientalis*.
citrifolia, Linn. Sp. Pl. 210.—Ind. occ.; Mexic.
citrifolia, Lunan, Fl. Jamaic. ii. 222 = *discolor*.
coffeaefolia, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 224, sphalm. = *seq.*
coffeoides, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 370.—Ins. Mascari. & Johann.
Collignonae, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 170 = *graciliflora*.

TABERNAEMONTANA:—

- collina, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 178.—Bras.
congesta, Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 71 = rubrostriolata.
coriacea, Link. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 431.—Bras.
coronaria, Willd. Enum. Hort. Berol. 275.—Ind. or. *coronata*, Paxt. Mag. Bot. xvi. (1848) t. 354, sphalm. = praec.
corymbosa, Roxb. Hort. Beng. [84]; Fl. Ind. ii. 25; et ex Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273.—Ind. or. *crassa*, Benth. in Hook. Niger Fl. 447.—Afr. trop. *crispa*, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 24.—Ins. Andaman.
Cumingiana, A. DC. in DC. Prod. viii. 373.—Ins. Philipp.
cylindracea, Wall. Cat. n. 4451 = *Rauwolfia serpentina*. *cylindrica*, Steud. Nom. ed. II. ii. 658 = praec.
cymosa, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14.—N. Granat. *cymosa*, Mart. ex Miers, Apocyn. S. Am. 84 = *Geissospermum Martianum*.
cymulosa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 422.—Sumatra. *Decaisnei*, A. DC. in DC. Prod. viii. 369 = *orientalis*. *densiflora*, Wall. in Bot. Reg. t. 1273 = *Rauwolfia densiflora*.
dichotoma, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 21.—Ind. or.
didyma, Vell. Fl. Flum. 106.—Bras.
discolor, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 52.—Ind. occ. *disticha*, A. DC. in DC. Prod. viii. 362.—Guian.
divaricata, R. Br. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 427.—Cf. R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1811) 72 = *coronaria*.
divaricata, G. Don, Gen. Syst. iv. 91 = *coronaria*. *ebracteata*, R. Br. Prod. 468 = *pubescens*, R. Br. *echinata*, Aubl. Pl. Gui. i. 263.—Guian.
echinata, Vell. Fl. Flum. 105; iii. t. 17 = *T. Hystrix*. *Echites*, Linn. Syst. ed. X. 945.—Jamaic. ?
elastica, Spreng. Syst. i. 639 = *Urceola elastica*. *elliptica*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 115.—Ins. Philipp. *elliptica*, Thunb. Fl. Jap. 111 = *Amsonia elliptica*. *fagraeoides*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 420.—Java.
fallax, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 84.—Bras.
fasciculata, Poir. Encyc. vii. 531.—Guian. *Finlaysoniana*, Wall. Cat. n. 4452.—Siam.
flavescens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 798 = *Malouetia flavescens*.
flavicans, Willd. ex Roem. & Schult. l. c. 797.—Bras. *floribunda*, Blume, Bijdr. 1028.—Java.
frutescens, Miers, Apocyn. S. Am. 57 = *laurifolia*. *fuchsiaeifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 365.—Bras. *Gaudichaudii*, A. DC. l. c.—Bras.
glabrata, Mart. ex Miers, Apocyn. S. Am. 81 = *oblongifolia*.
globosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 116 = *Voacanga foetida*.
globosa, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 130 = *sphaerocarpa*.
graciliflora, Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273; Cat. n. 1576.—Burma.
gracilis, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 244.—Guian.
gracilis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 82.—Bras.
grandiflora, Hook. in W. Gray, Trav. West. Afr. 389 = *africana*.
grandiflora, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14.—Ind. occ. *grandiflora*, Linn. Mant. i. 53.—N. Granat.
gratissima, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. i. (1830) 55; Bot. Reg. t. 1084 = *recurva*.
guianensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 754.—Guian.
guyanensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 404.—Guian.
heterophylla, Span. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 347, nomen.—Ins. Timor.
heterophylla, Vahl, Eclog. Am. ii. 22.—Guian. *Heyneana*, Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273; Cat. n. 1573.—Ind. or.
Hilariana, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 85.—Bras.
hirta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 646.—Malacca. *hirtula*, Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 73.—Bras.
humilis, Salisb. Prod. 148 = *Amsonia Tabernaemontana*.

TABERNAEMONTANA:—

- Hystrix*, Steud. Nom. ed. II. ii. 658.—Bras. *indica*, Willd. ex Steud. l. c. nomen (Quid ?).—Ind. or. *intercedens*, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 166 = *Heyneana*.
jasmionoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 225 = *Malouetia jasmionoides*.
javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 422.—Java. *Kamassi*, Eckl. in S. Afr. Quart. Journ. i. (1830) 371 = *Gonioma Kamassi*.
lactiflua, Miers, Apocyn. S. Am. 289 (Index) = *Malouetia lactiflua*.
laeta, Mart. in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 98.—Bras.
laevigata, Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 77 = *flavicans*.
laevis, Vell. Fl. Flum. 105; iii. t. 18 = *Geissospermum Vellozii*.
lanceolata, Miers, Apocyn. S. Am. 268. t. 7.—Am. austr.
laurifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 114 = *T. Pandacaqui*.
laurifolia, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 716 = *dichotoma*. *laurifolia*, Linn. Sp. Pl. 210.—Ind. occ.
laurifolia, Schott, ex Miers, Apocyn. S. Am. 76 = *Stemmadenia insignis*.
laxa, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 244 = *Ambelania laxa*.
laxifolia, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 403.—Java.
Linkii, A. DC. in DC. Prod. viii. 364.—Bras.
litoralis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 228.—Mexic.
longiflora, Benth. in Hook. Niger Fl. 447.—Afr. trop. *longifolia*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 243.—Guian.
lucida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 209.—Venezuela.
Lundii, A. DC. in DC. Prod. viii. 365.—Bras.
lurida, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 172.—Hab. ?
macrocalyx, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 403.—Guian.
macrocarpa, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 80.—Sumatra.
macrocarpa, Korth, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 154 = *Willughbeia firma*.
macrophylla, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 75 = *Phissocarpus rigidus*.
macrophylla, Poir. Encyc. Suppl. v. 276.—Am. austr. *malaccensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 649.—Malacca.
Martensii, Peyr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 31.—Mexic.
mauritanica, Poir. Encyc. vii. 530.—Ins. Mascari.
membranacea, A. DC. in DC. Prod. viii. 370.—Ins. Nossibé.
membranifolia, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 90.—Burma.
Meyeri, G. Don, Gen. Syst. iv. 89.—Guian.
micrantha, A. DC. in DC. Prod. viii. 370.—Ins. Maurit.
micrantha, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 527 = *Wallichiana*.
microcarpa, Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273; Cat. n. 1581 = *Rauwolfia microcarpa*.
modesta, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 219.—Madag.
mollis, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 199.—China.
monocarpa, Steud. Nom. ed. II. ii. 658, sphalm. = *macrocarpa*.
Muelleriana, Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 181.—Bras.
multiflora, Link, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 431 = *Linkii*.
multiflora, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 11.—Ins. Mascari.
muricata, Link, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 431.—Bras.
muricata, Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 76 = *macrophylla*.
nerieifolia, Vahl, Eclog. Am. ii. 21.—Porto Rico.
nerosa, Desf. ex Poir. Encyc. Suppl. v. 275 = *persicariaefolia*.
nicobarica, Liebm. Ind. Sem. Hort. Haun. (1855) 27.—Cf. Linnaea, xxviii. (1856) 363.—Ins. Nicobar.
Noronhiana, Boj. Hort. Maurit. 210.—Madag.
novo-guineensis, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 36.—N. Guin.

TABERNAEMONTANA:—

- oblonga*, Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273.—Ind. or. *oblongifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 368.—Bras. *obtusa*, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 8.—Ins. Borbon. *obtusifolia*, Poir. Encyc. Suppl. v. 275.—Madag.
occidentalis, Miers, Apocyn. S. Am. 58.—Peruv. *ochracea*, Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 81 = *muricata*.
odorata, Vahl, Eclog. Am. ii. 22 = *Malouetia Tamaquarina*.
olivacea, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 75.—Bras.
ophiorrhizoides, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 89.—Burma.
orientalis, R. Br. Prod. 468.—Ind. or.; Austral. *orientalis*, G. Don, Gen. Syst. iv. 92 = *Melodinus orientalis*.
ovalis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 229, 554.—Sumatra. *pacifica*, Seem. Fl. Vit. 160.—Ins. Fiji.
Pandacaqui, Poir. Encyc. vii. 529.—N. Guin. *parviflora*, Boj. Hort. Maurit. 209 = *mauritanica*.
parviflora, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 379 = *orientalis*.
parviflora, Heyne, ex Wall. Cat. p. 158, re n. 1 80 = *Hunteria corymbosa*.
parviflora, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4453 = *Rauwolfia densiflora*.
parviflora, Poir. Encyc. Suppl. v. 276 = *populifolia*.
parviflora, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 25 = *Wallichiana*.
pauciflora, Blume, Bijdr. 1028.—Java.
pauciflora, Wight, Ic. t. 393 = *Wallichiana*.
paucifolia, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 87.—Bras.
peduncularis, Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273; Cat. n. 1575.—Ins. Penang.
pentasticta, Scheff. in Flora, lii. (1869) 309; et in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 22.—Malaya.
Perrottetii, A. DC. in DC. Prod. viii. 362.—Guian.
persicariaefolia, Jacq. Coll. iv. 139.—Ins. Mascari.
pilifera, Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 73 = *hirtula*.
Poeppigii, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 405.—Bras.
polyantha, Blume, Bijdr. 1029 = *Micrechites polyantha*. *polyantha*, Herb. Lugd. Bat. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 394 = *Urceola elastica*.
polygama, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 82.—Ins. Philipp. *populifolia*, Poir. Encyc. Suppl. v. 276.—Am. austr.
psychotriaefolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 658 = seq. *psychotrifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 227.—Am. trop.
psychotrioides, G. Don, Gen. Syst. iv. 90 = praec. *pubescens*, R. Br. Prod. 468.—Austral.
pubescens, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 125.—Ins. Buru.
Rauwolfiae, A. DC. in DC. Prod. viii. 364 = *Salzmanni*. *recurva*, Hohen. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 646 = *Heyneana*.
recurva, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 26.—Ind. or.; Burma.
repanda, E. Mey. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 658.—Guian.
reticulata, A. DC. in DC. Prod. viii. 366.—Bras. *rhynchophylla*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 422.—Ins. Banca.
Riedeliana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 139.—Ins. Celebes.
Riedelii, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 72.—Bras.
riparia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 228 = *Malouetia riparia*.
rosea, Tenore, Cat. Orto Nap. (1845) 97.—Hab. ?
rostrata, Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273; Cat. n. 1578.—Burma.
rubrostriolata, Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 71.—Bras.
rupicola, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 243.—Guian.
salicifolia, Wall. in Bot. Reg. sub t. 1273; Cat. n. 1580 = *Hunteria corymbosa*.
Salzmanni, A. DC. in DC. Prod. viii. 362.—Bras. *Sananho*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 22. t. 144.—Peruv.
sessilifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 205.—Madag.
sessilifolia, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 952, nomen.—Guian.
sessilis, Vell. Fl. Flum. 106 = *Malouetia sessilis*. *solanifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 365.—Bras.

TABERNAEMONTANA :—

- speciosa*, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 275.—Guian.
sphaerocarpa, *Blume, Bijdr.* 1028.—Java.
Spixiana, *Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1. 78.—Bras.
Sprucei, *Muell. Arg. l. c.* 86.—Bras.
squamosa, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxv. n. 3 = mauritiana.
squamosa, *Spreng. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 327 = *Urceola elastica*.
stenoloba, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxx. (1859–60) 407.—Peruv.
subcapitata, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 633 = *Rauwolfia densiflora*.
subcapitata, *Wall. in Bot. Reg.* sub t. 1273; *Cat.* n. 1579.—Burma.
submollis, *Mart. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1. 70.—Bras.
subsessilis, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 448.—Afr. trop.
Telfairiana, *Wall. in Bot. Reg.* sub t. 1273.—Ins. Maurit.
tenuiflora, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 554.—Sumatra.
tenuiflora, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1. 76.—Bras.
tenuifolia, *Willd. ex Meissn. in DC. Prod.* xv. 1. 28 = *Alseodaphne semecarpifolia*.
ternstroemiacea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1. 88.—Bras.
tetrastachya, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 227.—N. Granat.
Thurstoni, *Horne, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 368.—Ins. Fiji.
umbrosa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 226.—N. Granat.
undulata, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 135 = *Meyeri*.
undulata, *Perr. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 362 = *Perrottetii*.
undulata, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 20.—Ind. occ.; Guian.
utilis, *Arn. in Edinb. N. Phil. Journ.* viii. (1830) 318.—Guian.
Vanheurckii, *Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 168.—Peruv.
ventricosa, *Hochst. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 366.—Afr. austr.
verrucosa, *Blume, Bijdr.* 1029.—Java.
verticillata, *Bedd. Forest. Fl. Anal. Gen.* xx; *Man. Bot.* 159 = *Rauwolfia Beddomei*.
vitiensis, *Seem. in Bonplandia*, ix. (1861) 257 = *orientalis*.
Wallichiana, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 658.—Sumatra.
Warmingii, *Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 107.—Bras.
Wulfschlaegelii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 409.—Jamaic.

TABRACA, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 4 (Anonacea?).

TACAMAHACA, *Mill. Gard. Dict. ed. VI. App.* 175 (1752) = *Populus*, *Linn. (Salicin.)*.

TACAZZEA, *Decne. in DC. Prod.* viii. 492 (1844). *ASCLEPIADEAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 745.
LEPTOPAEIA, *Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II.* 231 (1868).
apiculata, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 108.—Afr. trop.
venosa, *Decne. in DC. Prod.* viii. 493.—Abyss.

TACCA, *Forst. Char. Gen.* 69. t. 35 (1776). *TACCA-CEAE*, *Benth. & Hook. f. iii.* 741.
ATACCIA, *Presl, Rel. Haenk.* 149 (1828).
artocarpifolia, *Seem. Fl. Vit.* 101.—Ins. Mascar.
aspera, *Roxb. Hort. Beng.* 25; *Fl. Ind.* ii. 169 = *integrifolia*.
Brownii, *Seem. Fl. Vit.* 100 = *pinnatifida*.
cristata, *Jack, in Malay. Misc.* i. (1820) n. v. 23.—Ind. or.
dubia, *Schult. f. Syst.* vii. 167.—Ins. Amboin.
Gaogao, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 262 = *pinnatifida*.
guineensis, *G. Don, ex Loud. Hort. Brit.* 124, nomen = *involuta*?
integrifolia, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 1488.—Ind. or.
involuta, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 177.—Afr. trop.
laevis, *Roxb. Hort. Beng.* 25; *Fl. Ind.* ii. 171.—Ind. or.
lancaefolia, *Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll.* 91.—Java.
maculata, *Seem. Fl. Vit.* 103 = *pinnatifida*.

TACCA :—

- maculata*, *Zipp. ex Span. in Linnaea*, xv. (1841) 480, nomen (Quid?).—Ins. Timor.
madagascariensis, *Boj. Hort. Maurit.* 350 = *pinnatifida*?
montana, *Schult. f. Syst.* vii. 168 = *palmeta*.
oceanica, *Seem. in Journ. Bot.* iv. (1866) 261 = *pinnatifida*.
palmeta, *Blume, Enum. Pl. Fav.* i. 83.—Java.
palmatifida, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 100.—Ins. Celebes.
Parkeri, *Seem. Fl. Vit.* 102.—Guian.
phallifera, *Schult. f. Syst.* vii. 167, in syn. = *pinnatifida*, *Amorphophallus campanulatus*.
pinnatifida, *Forst. Char. Gen.* 70. t. 35.—As. et Afr. trop.; Ins. Pacif.
pinnatifolia, *Gaertn. Fruct.* i. 43. t. 14. f. 2, sphalm. = *praece*.
quanzensis, *Welw. Apont.* 591 = *pinnatifida*.
Rafflesiana, *Jack, ex Wall. Cat. n.* 5172 = *cristata*.
Rumphii, *J. C. Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 442.—Ins. Philipp.
Sprucei, *Benth. in Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 741.—Bras.
vesicaria, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 261 = *palmeta*.

TACCARUM, *Brongn. ex Schott, Gen. Aroid.* t. 65 (1858). *AROIDEAE*, *Benth. & Hook. f. iii.* 986.
ENDERA, *Regel, Gartenfl.* (1872) 226. t. 732.
LYSISTIGMA, *Schott, in Bonplandia*, x. (1862) 222.
cylindricum, *Arcangeli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xi. (1879) 190.—Java.
peregrinum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 646 = *cylindricum*.
Warmingii, *Engl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1880) 362.—Bras.
Weddellianum, *Brongn. ex Schott, Gen. Aroid.* t. 65.—Bras.

TACHIA, *Aubl. Pl. Gui.* i. 75. t. 29 (1775). *GENTIANEA*, *Benth. & Hook. f. ii.* 813.
MYRMECIA, *Schreb. Gen.* 74 (1789).
calygonia, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 204 = *Lisianthus calygonus*.
cordifolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 119 = *Leianthus longifolius*.
exsertus, *Mart. l. c.* = *Leianthus exsertus*.
gracilis, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 203.—Guian.
guianensis, *Aubl. Pl. Gui.* i. 75. t. 29.—Guian.
longifolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 119 = *Leianthus longifolius*.
Schomburgkiana, *Benth. in Hook. Kew Journ. Bot.* vi. (1854) 204.—Guian.
Swartzia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 197 = *Leianthus exsertus*.

TACHIA, *Pers. Syn.* i. 459 (1805) = **Tachigalia**, *Aubl. (Legumin.)*.
paniculata, *Pers. l. c.* 460 = *Tachigalia paniculata*.
punctata, *Plée, ex Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 148 = *Caesalpinia monosperma*.
trigona, *Pers. Syn.* i. 460 = *Tachigalia paniculata*.

TACHIADENUS, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 200 (1839). *GENTIANEA*, *Benth. & Hook. f. ii.* 804.
carinatus, *Griseb. l. c.*—Madag.
gracilis, *Griseb. in DC. Prod.* ix. 82.—Madag.
longiflorus, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 202.—Madag.
platypterus, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 172.—Madag.
trinervis, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 201.—Madag.
tubiflorus, *Griseb. l. c.* 202.—Madag.

TACHIBOTA, *Aubl. Pl. Gui.* 287. t. 112 (1775).
Genus dubium BIXINEARUM.—Cf. *Benth. & Hook. f. i.* 124.
SALMASIA, *Schreb. Gen.* 201 (1789).
guianensis, *Aubl. Pl. Gui.* i. 287.—Guian.

TACHIGALIA, *Aubl. Pl. Gui.* 372. t. 143 (1775) (*Tachigali*). *LEGUMINOSAE*, *Benth. & Hook. f. i.* 582.
CUBA, *Scop. Introd.* 300 (1777).
TACHIA, *Pers. Syn.* i. 459 (1805).
TASSIA, *Rich. ex DC. Prod.* ii. 487 (1825).
VALENTINIA, *Neck. Elem.* ii. 450 (1790).
angustifolia, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 13 = *paniculata*.
aurea, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 169 = *Sclerolobium aureum*.

TACHIGALIA :—

- bijuga*, *DC. Prod.* ii. 487 = *Sweetia bijuga*.
emarginata, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 436.—Bras.
ericalyx, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 164 = *paniculata*.
floribunda, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 659 = *Molden-hawera floribunda*.
glaucia, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 165.—Guian.
multijuga, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 229.—Am. austr.
paniculata, *Aubl. Pl. Gui.* i. 372. t. 143. f. 1.—Guian.
Poeppigiana, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 168 = *polyphylla*.
polyphylla, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 60.—Bras.
ptychophysca, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 229.—Bras.
pubiflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 94.—Am. trop.
purpurea, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 108.—Guian.
Richardiana, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 166.—Guian.
sericea, *Tul. l. c.* 163 = *paniculata*.
trigona, *Aubl. Pl. Gui.* i. 372. t. 143. f. 2 = *paniculata*.

TACHIGALEA, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 501 (1861), sphalm. = **TALIGALEA**, *Aubl. = Amasonia*, *Linn. f. (Verben.)*.

TACHITES, *Soland. ex Gaertn. Fruct.* i. 205 (1788) = **Melicytus**, *Forst. (Violar.)*.
umbellata, *Soland. ex Gaertn. l. c.* = *M. ramiflorus*.

TACHYTES, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 659 (1841), sphalm. = *praece*.

TACSONIA, *Juss. Gen.* 398 (1789). *PASSIFLOREAE*, *Benth. & Hook. f. i.* 811.
ODOSTELMA, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 104 (1836).
POGGENDORFFIA, *Karst. in Linnaea*, xxvii. (1856) 438; et *Fl. Columb.* i. 29. t. 15 (1858).
RATHEA, *Karst. Fl. Columb.* i. 77. t. 38 (1859?).
adulterina, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vi. (1805) 393.—N. Granat.
ampullacea, *Mast. in Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 539.—Ecuador.
anastomosans, *Lamb. ex DC. Prod.* iii. 335.—Peruv.
Andersoni ×, *Mast. in Gard. Chron.* (1875) ii. 167.
bicoronata, *Mast. in Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 541 = *mixta*?
bicuspidata, *Karst. in Linnaea*, xxx. (1859–60) 160 = *Passiflora bicuspidata*.
bilobata, *Spreng. Syst.* iii. 44 = *Passiflora bilobata*.
Buchanani, *Lem. Illustr. Hort.* xiv. (1867) t. 519 = *Passiflora vitifolia*.
canaliculata, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vi. (1805) 392 = *Passiflora glandulosa*.
candida, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 59 = *Passiflora candida*.
citrifolia, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vi. (1805) 392 = *Passiflora citrifolia*.
cumbalensis, *Karst. in Linnaea*, xxx. (1859–60) 161 = *glaberrima*.
cuneata, *Benth. Pl. Hartw.* 183 = *Passiflora bicuspidata*.
Dombeyana, *M. Roem. Syn. Pepon.* 197 = *peduncularis*.
eriantha, *Benth. Pl. Hartw.* 183 = *mixta*.
exoniensis ×, *Hort. Veitch*.—Cf. *Gard. Chron.* (1872) 1653.
flexipes, *Mast. in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 26.—N. Granat.
floribunda, *Mast. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 628; et *in Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 538.—N. Granat.
Fockeana, *Miq. in Linnaea*, xviii. (1844) 364 = *Passiflora glandulosa*.
fulgens, *Hort. ex Mast. in Journ. Hort. Soc. N. S.* iv. (1877) 127 = *Passiflora coccinea*, *quadriglandulosa*.
glaberrima, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vi. (1805) 394.—Peruv.
glandulosa, *Juss. l. c.* 391 = *Passiflora glandulosa*.
glaucia, *Poepp. ex Mast. in Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 569 = *Passiflora reflexiflora*.
gracilens, *A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 639.—Peruv.
grandiflora, *Forbes, Hort. Woburn.* 232.—Hab.?

TACSONIA :—

grandis, Hort. ex Mast. in Journ. Hort. Soc. N. S. iv. (1877) 127 = Van-Volxemii?
hastata, Ruiz & Pav. ex Mast. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 638 = Passiflora reflexiflora.
hederacea, Mast. & André, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 29.—Ecuador.
igneae, Hort. ex Mast. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 629 = manicata.
infundibularis, Mast. in Journ. Bot. xxi. (1883) 34.—Peruv.
insignis, Mast. in Gard. Chron. (1873) 1112.—Am. austr.
Jamesoni, Mast. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 537.—Peruv.
laevis, Benth. Pl. Hartw. 118 = Passiflora reflexiflora.
lanata, Fuss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 392. t. 59. f. 1.—N. Granat.
lanceolata, Mast. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 536.—Peruv.
longifolia, Pers. Syn. ii. 223 = mixta.
Mandoni, Mast. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 538.—Bolivia.
manicata, Fuss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 393. t. 59. f. 2.—Peruv.
Mansii, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 7 = Passiflora Mansoi.
Mathewsii, Mast. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 539 (Matthewsii).—Peruv.
micradena, DC. Prod. iii. 334.—Peruv.
mixta, Fuss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 394.—Am. trop.
mollissima, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1869) 388 = mixta.
mollissima, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 144.—N. Granat.
Paritae, Mast. in Gard. Chron. (1882) i. 218.—N. Granat.
parvifolia, DC. Prod. iii. 335.—Peruv.
peduncularis, Fuss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 395.—Peruv.
pennipes, M. Roem. Syn. Pepon. 194 = pinnatistipula.
pinnatistipula, Fuss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 393.—Chili.
pubescens, DC. Prod. iii. 335 = Passiflora quadriglandulosa.
Purupuru, DC. ex Mast. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 537 = pinnatistipula.
quadridentata, DC. Prod. iii. 335 = Passiflora quadriglandulosa.
quadriglandulosa, DC. l. c. = Passiflora quadriglandulosa.
quitensis, Benth. Pl. Hartw. 183 = mixta.
reflexiflora, Juss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 393 = Passiflora reflexiflora.
Rohriana, DC. Prod. iii. 335 = Passiflora glandulosa.
rugosa, Mast. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 539.—N. Granat.
sanguinea, Benth. ex Mast. l. c. 542 = Passiflora vitifolia.
sanguinea, DC. Prod. iii. 334 = Passiflora quadriglandulosa.
serrata, Karst. in Linnaea, xxx. (1859–60) 160 = mixta.
speciosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 143 = mixta.
spinescens, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gu. 1168, nomen.—Guian.
spinosa, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 59 = Passiflora spinosa.
splendens, Hort. Veitch, ex Mast. in Journ. Hort. Soc. N. S. iv. (1877) 127.—Hab.?
Stoupyana, DC. Prod. iii. 335 = Passiflora glandulosa.
subcoriacea, Garcke, in Linnaea, xxii. (1849) 62 = Passiflora glandulosa.
Tacso, Pers. Syn. ii. 223 = mixta.
tomentosa, Fuss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 394.—Peruv.
trifoliata, Fuss. l. c. 393.—Peruv.; Chili.
trigona, DC. Prod. iii. 334 = trifoliata.
trinervia, Juss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 390. t. 58 = Passiflora trinervia.
tripartita, Fuss. l. c. 395. t. 60.—Ecuador.
umbilicata, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 149.—Reg. Argent.
urceolata, Mast. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 539.—Am. trop.
Van-Volxemii, Hook. Bot. Mag. t. 5571.—N. Granat.
viridiflora, Juss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 389 = Passiflora viridiflora.

TAENAIIS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 115 (1866) = **Crinum**, Linn. (Amaryll.).
ampla, Salisb. l. c. = C. giganteum.
Australasiae, Salisb. l. c. = C. flaccidum.
caricifolia, Salisb. l. c. = C. yuccaefflorum.
mucronigera, Salisb. l. c. = C. zeylanicum.
ornata, Salisb. l. c. = C. yuccaefflorum?
yuccaefflorum, Salisb. l. c. = C. yuccaefflorum.
zeylanica, Salisb. l. c. = C. zeylanicum.

TAENIDIUM, Targ. Tozz. Cat. Veg. Mar. 80. t. 1 (1826) = **Posidonia**, Kon. (Naiad.).
acuminatum, Targ. Tozz. l. c. 84 = P. Caulini.
oceanicum, Targ. Tozz. l. c. 81 = P. Caulini.

TAENIOCARPUM, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 420 = **Pachyrhizus**, Rich. (Legumin.).
articulatum, Desv. l. c. 421 = P. angulatus.

TAENIOCHLAENA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 433 (1865). **CONNARACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
Griffithii, Hook. f. l. c. 434.—Malacca.

TAENIOLA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 35 (1866) = **Ornithogalum**, Tourn. (Liliac.).
vittata, Salisb. l. c. = O. vittatum.

TAENIOPETALUM, Vis. Fl. Dalm. iii. 49 (1849) = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
Neumayeri, Vis. l. c. = P. Neumayeri.
peucedanoides, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 203 = P. alsaticum.

TAENIOPHYLLUM, Blume, Bijdr. 355. t. 70 (1825). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 582.
ALWISIA, Thw. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1858) 42, in obs.
acuminatissimum, Blume, Bijdr. 357.—Java.
Alwisii, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1858) 42.—Zeylan.
asperulum, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 53.—Ins. Tahiti.
elegantissimum, Reichb. f. l. c.—Ins. Tahiti.
Fasciola, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 296.—Ins. Fiji.
glandulosum, Blume, Bijdr. 356.—Java.
Hasseltii, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 68.—Java?
hirtum, Blume, Bijdr. 356.—Java.
Jerdonianum, Wight, Ic. v. t. 1756 = Saccolabium Jerdonianum.
Muelleri, Lindl. ex Benth. Fl. Austral. vi. 291.—Austral.
obtusum, Blume, Bijdr. 357.—Java.
philippinense, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 53.—Ins. Philipp.
Seemanni, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 296.—Ins. Fiji.
Zollingeri, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 41.—Java.

TAENIOSAPIUM, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1200 (1866) = **Excoecaria**, Linn. (Euphorb.).
Goudotianum, Muell. Arg. l. c. 1201 = E. Goudotiana.

TAENIOSTEMA, Spach, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 289 = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.).
micranthum, Spach, l. c. = H. glomeratum.

TAENOSAPIUM, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 337 (1880), err. typ. = **TAENIOSAPIUM**, Muell. Arg. = **Excoecaria**, Linn. (Euphorb.).

TAETSIA, Medic. Theodora, 82 (1786) = **Cordylone**, Royen (Liliac.).
ferrea, Medic. l. c. = C. terminalis.

TAFALLA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (July–Sept. 1831) 273. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 300.
LORICARIA, Wedd. Chlor. And. i. 165. t. 27* A, B, C (1856).
THYOPSIS, Wedd. l. c. 165, in nota, t. 27 (1856).
ferruginea, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (July–Sept. 1831) 274.—Reg. Andin.
thyoides, D. Don, l. c. 273.—Reg. Andin.

TAFALLA, Ruiz & Pav. Prod. 136. t. 29 (1794) = **Hedyosmum**, Sw. (Chloranth.).
angustifolia, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 272 = H. angustifolium.

TAFALLA :—

glaucua, Ruiz & Pav. ex Spreng. Syst. iii. 866 = Hedyosmum Bonplandianum.
glaucua, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 271 = H. glaucum.
laciniata, Ruiz & Pav. l. c. 272 = H. laciniatum.
racemosa, Ruiz & Pav. l. c. 271 = H. racemosum.
scabra, Ruiz & Pav. l. c. 270 = H. scabrum vel glabratum.

TAGERA, Rafin. Sylva Tellur. 129 (1838) = **Cassia**, Tourn. (Legumin.).
filiformis, Rafin. l. c. = C. Tagera.

TAGETES, Linn. Gen. ed. I. 261 (1737). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 411.

DIGLOSSUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 70.
ENALCIDA, Cass. l. c. (1819) 31.
SOLENOTHECA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 375.
angustifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 194.—Mexic.
apetala, Posado, in Baill. Adansonia, x. (1872) 186.—N. Granat.
bonariensis, Pers. Syn. ii. 459 = minuta.
campanulata, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 188.—Reg. Argent.
caracasana, Humb. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2128.—Venezuela.
clandestina, Lag. Gen. et Sp. Nov. 28 = coronopifolia.
congesta, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 299 = micrantha.
coronopifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 60.—Mexic.
corymbosa, Lag. Elench. (1805); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 29 = coronopifolia.
corymbosa, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 151 = patula.
daucoides, Schrad. Sem. Hort. Gotting. (1833) 5.—Cf. Linnaea, x. (1836) Litt. 71.—Chili.
dianthiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 197.—Peruv.
dianthifolia, DC. Prod. v. 646, sphalm. = praec.
dichotoma, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 72.—Peruv.
elliptica, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 7.—Peruv.
elongata, Willd. Sp. Pl. iii. 2127 = patula, peduncularis.
erecta, Linn. Sp. Pl. 887.—Mexic.
Feuillei, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 35. t. 30 = Lasthenia obtusifolia.
Fevillei, Steud. Nom. ed. II. ii. 12, in syn., sphalm. = praec.
filifolia, Lag. Elench. (1805); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 28 = multifida.
filiformis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 223, sphalm. = praec.
florida, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 35 = lucida.
flosculosa, Spreng. Syst. iii. 571.—Reg. Argent.
foeniculacea, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 171 = coronopifolia.
foeniculacea, Poepp. ex DC. Prod. v. 646.—Peruv.
foetidissima, Hort. ex DC. l. c. 645.—Mexic.
glandulifera, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 54 = minuta.
glandulosa, Schrank, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 339 = minuta.
gracilis, DC. Prod. v. 645.—Peruv.
graveolens, L'Hérit. ex DC. l. c. 644.—Peruv.
lanceolata, La Llave, in La Naturaleza, vii. (1885) Apénd. 73.—Mexic.
Lemmonii, A. Gray, Proc. Am. Acad. xix. (1883) 40.—Arizona.
lucida, Cav. Ic. iii. 33. t. 264.—Mexic.
lunulata, Ortega, Hort. Matr. Dec. 44.—Mexic.
macroglossa, Polak. in Linnaea, xli. (1877) 580.—Costa Rica.
maculata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 660 (Quid?).—Hab.?
major, Gaertn. Fruct. ii. 434. t. 172 = erecta.
Mandonii, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 529, nomen.—Bolivia.
Michauxiana, Roem. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 660 (Quid?).—Hab.?
micrantha, Cav. Ic. iv. 31. t. 352.—Mexic.
microglossa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 118.—N. Granat.
minuta, Linn. Sp. Pl. 887.—Am. trop.
montana, Hort. ex DC. Prod. v. 644 = glandulifera.
multifida, DC. l. c. 646.—Mexic.

TAGETES—

- multiflora, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 197.—Ecuador.
 multiseta, *DC. Prod.* v. 645.—Mexic.
 oligocephala, *DC. l. c.*—Mexic.
Ozolis, Spreng. ex *DC. Prod.* v. 647 (Quid?).—Hab.?
papposa, Vent. Jard. Cels, 36 = *Dysodia chrysanthemoides*.
 Parryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 40.—Mexic.
 patula, *Linn. Sp. Pl.* 887.—Mexic.
 pauciloba, *DC. Prod.* v. 645.—Chili.
 pectinata, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 71.—Peruv.
 peduncularis, *Cav. Desc.* 201; *Lag. & Rod. in Anal. Cienc. Nat.* v. (1802) 74.—Mexic.
 Pineda, *La Llave, in La Naturaleza*, vii. (1885) *Apénd.* 73.—Mexic.
Porophyllum, Vell. *Fl. Flum.* viii. t. 116 = minuta.
pumila, Hort. Pisan. ex Pursh, *Fl. Am.* Sept. ii. 559 = *Dysodia chrysanthemoides*.
 punctata, Moq. & Sesse, ex *DC. Prod.* v. 638 = *Adenophyllum coccineum*.
 pusilla, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 194.—Ecuador.
 remotiflora, Kunze, in *Linnaea*, xx. (1847) 23.—Mexic.
 rotundifolia, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. n. 4.—Mexic.
 Schiedeana, Less. in *Linnaea*, ix. (1835) 271.—Mexic.
 signata, Bartl. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1837) 7.—Mexic.
 silenoides, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 272.—Peruv.
 subulata, Cerv. in *La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc.* fasc. i. 31 = multiseta.
 subvillosa, *Lag. Elench.* (1804); ex *ej. Gen. et Sp. Nov.* 29.—Mexic.
 tanacetifolia, Hort. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 660 = foetidissima.
 tenuifolia, *Cav. Ic.* ii. 54. t. 169.—Peruv.
 tenuifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 196 = patula.
 terniflora, *H. B. & K. l. c.*—Ecuador.
 tinctoria, *Hornsch. Del. Sem. Hort. Gryph.* (1845) 3.—Bras.
 verticillata, *Lag. & Rod. in Anal. Cienc. Nat.* v. (1802) 73.—Venezuela.
 Wislizenii, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* iv. (1849) 92.—Mexic.
 zypaquinensis, *Humb. & Bonpl. Pl. Aequin.* ii. 18. t. 73.—N. Granat.

AGUARIA, Rafin. *Sylva Tellur.* 125 (1838) = **Loranthus**, Linn.
elliptica, Rafin. l. c. = *L. ellipticus*.
laurifolia, Rafin. l. c. = *L. laurifolius*.
nitida, Rafin. l. c. = *L. nitidus*.
punctata, Rafin. l. c. = *L. punctatus*.
puracensis, Rafin. l. c. = *L. puracensis*.
vera, Rafin. l. c. = *L. Tagua*.

TAINIA, Blume, *Bijdr.* 354 (1825). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 515.
 ANIA, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 129 (1831).
 MITOPETALUM, Blume, *Fl. Jav. Praef.* 8 (1838).
 angustifolia, Benth. & Hook. f. *Gen.* iii. 515.—Burma.
 barbata, Lindl. in *Gard. Chron.* (1857) 68 = *Eria barbata*.
 bicornis, *Reichb. f. in Bonplandia*, v. (1857) 54.—Ind. or.
 fimbriata, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1853) 492.—Java.
 latifolia, *Reichb. f. in Bonplandia*, v. (1857) 54.—Reg. Himal.; Burma.
 maculata, Trimen, *Cat. Pl. Ceyl.* 88 (= *Chrysoglossi* sp.).—Zeylan.
 speciosa, Blume, *Bijdr.* 354.—Malaya.
 trinervis, *Reichb. f. in Bonplandia*, v. (1857) 54.—Java.

TALA, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 484 (1837); ed. II. 338 (1845) = **Limnophila**, R. Br. (Scrophul.).
 odorata, Blanco, l. c. ed. I. 484 = *L. Roxburghii*.

TALANELIS, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 70 (1836) = **Campanula**, Tourn.
Medium, Rafin. l. c. = *C. Medium*.

TALANGNINIA, Chapel. ex *DC. Prod.* iv. 389 (1830) = **Randia**, Houst. (Rubiace.).

TALASIUM, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 22 (1827) = **THALASIUM**, Spreng. = **Panicum**, Linn. (Gram.).

TALAUMA, Juss. *Gen.* 281 (1789). **MAGNOLIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. i. 18.
 AROMADENDRON, Blume, *Bijdr.* 8 (1825).
 BLUMEA, Nees, in *Verh. Batav. Gen. ix.* (1823) 147.
 BUEGERIA, Sieb. & Zucc. *Fl. Jap. Fam. Nat.* i. 78. t. 2 (1845).
 angatensis, D. Vidal, *Cat. Pl. Prov. Man.* 17 (an seq.?).—Ins. Philipp.
 angatensis, F. Villar, in Blanco, *Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 3 = Hodgsoni.
 caerulea, Jaime St. Hil. *Expos.* ii. 76 (*cerulea*) = Plumierii.
 Candollei, Blume, *Bijdr.* 9; *Fl. Jav. Magnol.* 32.—Ins. Amboin.
 Cespedesii, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xvii. (1862) 23.—N. Granat.
 coerulea, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 660 = caerulea.
 dubia, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 126.—Bras.
 elegans, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 70.—Java.
 fragrantissima, Hook. *Ic. Pl.* tt. 208–212.—Bras.
 gigantifolia, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. ii. 15.—Sumatra.
 glauca, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 70.—Sumatra.
 Hodgsoni, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 74.—Reg. Himal.
 lanigera, Hook. f. & Thoms. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 40.—Malaya.
 liliifera, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) ii. 47.—Burma.
 macrocarpa, Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* ii. (1831–36) 369. t. 1.—Mexic.
 mexicana, G. Don, *Gen. Syst.* i. 85.—Mexic.
 mutabilis, Blume, *Fl. Jav. Magnol.* 35.—Java.
 mutabilis, F. Villar, in Blanco, *Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 3 = Villariana.
 obovata, Benth. & Hook. f. ex Hance, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 2 = Magnolia obovata.
 obovata, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* ii. (1851) *Versl.* 98.—Borneo.
 ovalis, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 69.—Ins. Celebes.
 ovata, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* i. 26. t. 4. f. A.—Bras.
 Plumierii, *DC. Prod.* i. 81.—Ind. occ.
 pumila, Blume, *Fl. Jav. Magnol.* 38 = Magnolia pumila.
 Rabaniana, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 75.—Reg. Himal.
 Roxburghii, G. Don, *Gen. Syst.* i. 85 = Magnolia pterocarpa.
 rubra, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. ii. 14.—Sumatra.
 Rumphii, Blume, *Bijdr.* 10.—Ins. Molucc.
 salicifolia, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 258.—Japan.
 Sebasia, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 153, 367.—Sumatra.
 Selloi, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 90, in syn., sphalm. = seq.
 Sellowiana, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* i. 26. t. 4. f. B.—Bras.
 Sieboldii, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 257 = Magnolia obovata.
 stellata, Miq. l. c.—Japan.
 Villariana, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 307.—Ins. Philipp.
 villosa, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 367.—Sumatra.
 Vrieseana, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 70 = Magnolia Vrieseana.

TALBOTIA, Balf. in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* ix. (1868) 190 = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).
 elegans, Balf. l. c. 192 = *V. elegans*.

TALGUENEA, Miers, *Trav. Chili*, ii. 529 (1826). **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 385.
 costata, Miers, l. c.—Chili.
 mollis, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vi. (1860) 8; *Contrib.* i. 298.—Chili.

TALI, Adans. *Fam.* ii. 319 (1763) = **Connarus**, Linn.

TALIERA, Mart. *Progr. Palm. Fam. et Gen.* 10 (1824) = **Corypha**, Linn. (Palm.).
 bengalensis, Spreng. *Syst.* ii. 18 = *C. Taliera*.
 Gembanga, Schult. f. *Syst.* vii. 1307 = *C. umbraculifera*.
 sylvestris, Blume, in Schult. f. l. c. = *C. sylvestris*.
 Tali, Mart. in Schult. f. l. c. 1306 = *C. Taliera*.

TALIGALEA, Aubl. *Pl. Gui.* ii. 625. t. 252 (1775) = **Amasonia**, Linn. f. (Verben.).
 campestris, Aubl. l. c. = *A. erecta*.
 punicea, Poir. *Encyc.* vii. 556 = *A. punicea*.
 umbellata, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 337 = *Ixora macrophylla*.

TALINIUM, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1818) 175 = **Talinum**, Adans. (Portul.).

TALINOPSIS, A. Gray, *Pl. Wright.* i. (in *Smithson. Contrib.* iii.) 14. t. 3 A (1852). **PORTULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 157.
 frutescens, A. Gray, l. c. 15.—N. Mexic.

TALINUM, Adans. *Fam.* ii. 245 (1763). **PORTULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 157.
 HELIANTHEMOIDES, Medic. *Phil. Bot.* i. 95 (1789).
 PHEMERANTHUS, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 350.
 acaule, Spreng. *Syst.* ii. 453 = *Calandrinia compressa*.
 adscendens, Hort. Berol. ex *DC. Prod.* iii. 359 = *Calandrinia compressa*.
 album, Ruiz & Pav. *Prod.* 65, in obs.; *Syst. Veg.* 116 = *Calandrinia alba*.
 aliatum, Hook. *Exot. Bot.* ii. t. 82, sphalm. = *ciliatum*, Hook.
 Anacampteros, Moench, *Meth.* 232 = *Anacampteros Telephium*.
 Andrewsii, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 170 = *Calandrinia Andrewsii*.
 arachnoides, Ait. *Hort. Kew.* ed. II. iii. 149 = *Anacampteros arachnoides*.
 Arnottii, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 6220.—Afr. austr.
 aurantiacum, Engelm. in *Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 153.—Texas.
 brachypodium, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 355.—Mexic.
 brevifolium, Torr. in *Sitgr. Rep.* 156.—Am. bor. occ.
 cafrum, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 282 = *Portulaca cafra*.
 calycinum, Engelm. in *Wisliz. Tour N. Mexico*, 88.—Am. bor. occ.
 caulescens, Spreng. *Syst.* i. 453 = *Calandrinia caulescens*, nitida.
 ciliatum, Hook. *Exot. Bot.* ii. t. 82 = *Calandrinia pilosiuscula*.
 ciliatum, Lindl. *Bot. Reg.* (1843) sub t. 1 = *teretifolium*.
 ciliatum, Ruiz & Pav. *Prod.* 65, in obs.; et *Syst. Veg.* 116 = *Calandrinia ciliata*.
 confertiflorum, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, viii. (1881) 121.—Am. bor.
 crassifolium, Willd. *Sp. Pl.* ii. 862 = *triangulare*.
 crenatum, Ruiz & Pav. *Prod.* 65, in obs.; *Syst. Veg.* 115.—Peruv.
 cuneifolium, Willd. *Sp. Pl.* ii. 864.—Ind. or.; Arab.; Afr.
 decumbens, Willd. *Sp. Pl.* ii. 864 = *Orygia decumbens*.
 dichotomum, Ruiz & Pav. *Syst. Veg.* 118 = *reflexum*.
 diffusum, Colla, in *Mem. Acc. Torin.* xxxvii. (1834) 70.—Chili.
 filamentosum, Ait. *Hort. Kew.* ed. II. iii. 149 = *Anacampteros filamentosa*.
 fruticosum, Macfad. *Fl. Jamaic.* ii. 169 = *patens*.
 fruticosum, Willd. *Sp. Pl.* ii. 864 = *triangulare*.
 gracile, Colla, in *Mem. Acc. Torin.* xxxvii. (1834) 70.—Chili.
 grandiflorum, Hort. ex G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 188 = *Calandrinia Lockharti*.
 humile, Greene, in *Coult. Bot. Gaz.* vi. (1881) 183.—N. Mexic.
 indicum, Wight & Arn. *Prod.* 356 = *cuneifolium*.
 lanceolatum, Link. *Enum. Hort. Berol.* ii. 2 = *Anacampteros lanceolata*.
 Linaria, Colla, in *Mem. Acc. Torin.* xxxvii. (1834) 70.—Chili.
 lineare, Hoffmgg. *Verz. Pf.* 217 = *Calandrinia pilosiuscula*.

TALINUM:—

- lineare, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 77.—Mexic.
linguaeforme, Hort. ex Lem. Illustr. Hort. x. (1863)
 Misc. 81=Cotyledon linguaeformis.
lingulatum, Ruiz & Pav. Prod. 65, in obs.; Syst.
 Veg. 116=Calandrinia lingulata.
Menziesii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 223. t. 70=Calan-
 drinia Menziesii.
 mexicanum, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 23.—Mexic.
 minimum, *Miers, Trav. Chil.* i. 530, nomen; *et ex*
Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 69.—Chili.
 minus, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 282.—Afr. austr.
monandrum, Ruiz & Pav. Prod. 65, in obs.; Syst.
 Veg. 118=Monocosmia corrigioloides.
 mucronatum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 76.—
 Mexic.
nanum, Nees, in Lehmann. Pl. Preiss. i. 246=Calandrinia
 pygmaea.
 napiforme, *DC. Prod.* iii. 357.—Mexic.
nitidum, Ruiz & Pav. Prod. 65, in obs.; Syst. Veg.
 117=Calandrinia nitida.
paniculatum, Gaertn. Fruct. ii. 219. t. 128=patens.
paniculatum, Moench, Meth. 232=triangulare.
paniculatum, Ruiz & Pav. Prod. 65, in obs.; Syst.
 Veg. 114=Calandrinia paniculata.
 parviflorum, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 197.
 —Am. bor. occ.
patens, Andr. Bot. Rep. iv. t. 253=Calandrinia An-
 drewsii.
patens, Willd. Sp. Pl. ii. 863.—Am. trop.
polyandrum, Hook. Bot. Mag. t. 4833=Calandrinia
 polyandra.
 polyandrum, *Ruiz & Pav. Prod.* 65, in obs.; Syst.
 Veg. 115.—Peruv.
 polygaloides, *Gill. ex Arn. in Edinb. Journ. Nat. &*
Geog. Sc. iii. (1831) 354–55.—Chili.
polyphyllum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 3=Ana-
 campseros polyphylla.
purpureum, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 219
 (Quid ?).—Hab. ?
pygmaeum, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii.
 (1862) 407=Calandrinia pygmaea.
racemosum, Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 297=
 triangulare.
reflexum, Cav. Ic. I. t. 1.—Am. bor. et austr.
retusum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 26=
 Anacampseros arachnoides.
 revolutum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 76.—
 Venezuela.
rubens, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 661=Ana-
 campseros arachnoides.
 sarmentosum, *Engelm. in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi.
 (1850) 153.—Texas.
spathulatum, A. Gray, Pl. Wright. i. 14=reflexum.
spinescens, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 250.—
 Am. bor. occ.
 strictum, *Wall. Cat. n.* 6846.—Ind. or.
 teretifolium, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 365.—Am. bor.
 triangulare, *Willd. Sp. Pl.* ii. 862.—Am. trop.
trichotomum, Desf. Fl. ed. I. 166=teretifolium.
 trigonum, *Colla, in Mem. Acc. Torin.* xxxvii. (1834)
 71.—Chili.
umbellatum, Ruiz & Pav. Prod. 65, in obs.; Syst.
 Veg. 117=Calandrinia umbellata.

TALIPULIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 17 (1836) =
 Aneilema, R. Br. (Commel.).

- TALISIA**, Aubl. Pl. Gui. i. 349. t. 136 (1775).
SAPINDACEAE, Benth. & Hook. f. i. 401.
 ACLADOIDEA, Ruiz & Pav. Prod. 133. t. 29 (1794).
 COMATOGLOSSUM, Karst. & Triana, in Linnaea,
 xxviii. (1856) 436.
 acladodea, *DC. Prod.* i. 609.—Peruv.
 acutifolia, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad.*
Muench. viii. (1878) 349.—Bras.
 angustifolia, *Radlk. l. c.* 345.—Bras.
 carinata, *Radlk. l. c.* 348.—Guian.
 cerasina, *Radlk. l. c.* 347 = Sapindus oblongus, cera-
 sinus.
 clathrata, *Radlk. l. c.* 349.—Bras.
 coriacea, *Radlk. l. c.* 346.—Bras.
 cupularis, *Radlk. l. c.* 350.—Bras.
 dasyclada, *Radlk. l. c.* 348.—Bras.
 esculenta, *Radlk. l. c.* 345=Sapindus esculentus.
 firma, *Radlk. l. c.* 346.—Bras.
 glabra, *DC. Prod.* i. 609=guianensis.
 guianensis, *Aubl. Pl. Gui.* i. 349. t. 136.—Guian.

VOL. II.

TALISIA:—

- hemidasys, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad.*
Muench. viii. (1878) 349.—Guian.
 hexaphylla, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 29.—Am. austr.
 laxiflora, *Benth. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 212
 (al. gen. ?).—Bras.
 longifolia, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.*
 viii. (1878) 348; ix. (1879) 519 = Cupania longi-
 folia.
 macrophylla, *Radlk. l. c.* viii. (1878) 347.—Bras.
 megaphylla, *Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xii.
 (1881) 196.—Guian.
 mollis, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 48=
 guianensis.
 multinervis, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad.*
Muench. viii. (1878) 346.—Bras.
 oedipoda, *Radlk. l. c.* 347.—Bras.
 olivaeformis, *Radlk. l. c.* 342.—N. Granat.
 pachycarpa, *Radlk. l. c.* 350.—Guian.
 pedicellaris, *Radlk. l. c.* 342.—Guian.
 pilosula, *Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xii. (1881)
 196.—Guian.
 pinnata, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.*
 viii. (1878) 351=T. accladodea.
 praealta, *Radlk. l. c.* 345=Cupania praealta.
 pulverulenta, *Radlk. l. c.* 342.—Guian.
 rosea, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 30=guianensis.
 squarrosa, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.*
 viii. (1878) 346.—Guian.
 stricta, *Triana & Planch. ex Radlk. l. c.* 350.—
 N. Granat.
 subalbens, *Radlk. l. c.* 345.—Bras.
 sylvatica, *Radlk. l. c.* 341=Racaria sylvatica.

TALPINARIA, Karst. Fl. Columb. i. 153. t. 76 (1859 ?)
 =Pleurothallis, R. Br. (Orchid.).
 bivalvis, Karst. l. c.=P. bivalvis.

TAMALA, Rafin. Sylva Tellur. 136 (1838) = Persea,
 Plum. (Laurin).
 acuminata, Rafin. l. c. 137 = Nectandra berchemiaefolia.
 borbonica, Rafin. l. c. 136 = P. carolineusis.
 carolinensis, Rafin. l. c. = P. carolinensis.
 palustris, Rafin. l. c. 137 = P. Lingue.

TAMARA, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 661 (1841)
 =Nelumbium, Juss. (Nymph.).
 alba, Roxb. ex Steud. l. c. = N. speciosum.
 hemisphaerica, Buch-Ham. ex Pritz. Ic. Ind. i. 1087
 = N. speciosum ?
 rubra, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 661 =
 N. speciosum.

TAMARINDUS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 581.
 indica, *Linn. Sp. Pl.* 34.—As. et Afr. trop.
 Intsia, Spreng. Syst. iii. 158=Azelia bijuga.
 occidentalis, Gaertn. Fruct. ii. 310. t. 146=indica.
 officinalis, Hook. Bot. Mag. t. 4563=indica.
 umbrosa, Salisb. Prod. 323=indica.

TAMARISCUS, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i.
 419 (1742)=Tamarix, Linn.
 decander, Lam. Fl. Fr. iii. 74=Myricaria germanica.
 gallicus, All. Fl. Pedem. ii. 87=Tamarix gallica.
 germanicus, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 224=Myricaria
 germanica.
 pentander, Lam. Fl. Fr. iii. 73=Tamarix gallica.

TAMARIX, Linn. Syst. ed. I (1735). *TAMARI-*
SCINEAE, Benth. & Hook. f. i. 160.
 TAMARISCUS, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i.
 419 (1742).
 TRICHAURUS, Arn. in Wight & Arn. Prod. 40
 (1834).
 aegyptiaca, Bertol. Misc. Bot. xiv. 15=gallica.
 affinis, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 36.—
 Reg. Casp.
 africana, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 20=
 tetrandra.
 africana, *Poir. Voy. Barb.* ii. 139; *Desf. Fl. Atlant.* i.
 269.—Reg. Mediterr.
 amplexicaulis, *Ehrenb. in Linnaea*, ii. (1827) 275.—
 Afr. bor.
 anglica, Webb, in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 430=
 gallica.

TAMARIX:—

- angustifolia, Boiss. Fl. Orient. i. 771=florida.
 angustifolia, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838)
 363=Hohenackeri.
 angustifolia, Ledeb. in Eichw. Besch. Casp.-Cauc. 12
 =gracilis.
 arabica, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 55.—Arab.
 aralensis, *Bunge, l. c.* 59.—Reg. Casp.
 arborea, *Ehrenb. ex Bunge, l. c.* 67.—Aegypt.
 arceuthoides, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii.
 (1851) 295.—As. bor.
 articulata, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 48. t. 32.—Arab.;
 Pers.; Ind. or.
 articulata, Wall. Cat. n. 3756 B, C=dioica.
 bachtiarica, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient.* i. 772.—
 Persia.
 Balansae, *J. Gay, ex Munby, Cat.* 12, nomen.—Alger.
 bounopaea, *J. Gay, l. c.* nomen.—Alger.
 Boveana, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 24.—
 Alger.
 brachystachys, *Bunge, l. c.* 26.—Reg. Casp.
 brachystylis, *J. Gay, ex Munby, Cat.* 12, nomen.
 —Alger.
 Bungei, *Boiss. Fl. Orient.* i. 774.—Persia.
 canariensis, Willd. in Abh. Akad. Berl. 1812–13
 (1816) 79=gallica.
 canescens, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825)
 348=hispida.
 chinensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 182.—China.
 chinensis, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 132=juniperina.
 cretica, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 33=
 parviflora.
 cupressiformis, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 423.—Sibir. altaic.
 daurica, Willd. in Abh. Akad. Berl. 1812–13 (1816)
 85=Myricaria daurica.
 decandra, Pall. Fl. Ross. ii. 73. t. 80=Myricaria
 longifolia.
 decandra, Salisb. Prod. 173=Myricaria germanica.
 deserti, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 9=tetragyna.
 dioica, *Roxb. Hort. Beng.* 22; *Fl. Ind.* ii. 101.—Ind.
 or.; Burma.
 dubia, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 18.—Persia.
 effusa, *Ehrenb. in Linnaea*, ii. (1827) 258.—Aegypt.
 Ehrenbergii, Presl, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.
 (1852) 54=gallica.
 elegans, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 481=gallica.
 elongata, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 421.—Sibir. altaic.
 epacroides, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 4=gallica.
 ericoides, *Rotl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv.
 (1803) 214.—Ind. or.
 Eversmanni, Presl, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 135=
 gallica.
 Faras, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 188=
 articulata.
 floribunda, Stev. ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.
 (1852) 44=Hohenackeri ?
 florida, *Bunge, l. c.* 37.—Persia.
 Furas, Buch-Ham. ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 213
 =articulata.
 gallica, [Habl.] Besch. Taur. 105=tetrandra.
 gallica, *Linn. Sp. Pl.* 270.—Europ.; As.; Afr.
 gallica, Sieber, ex Nym. Consp. 253=parviflora.
 gallica, Thunb. Fl. Jap. 126=chinensis.
 germanica, S. T. Gmel. Reise, iv. 63=seq. ?
 germanica, Linn. Sp. Pl. 271=Myricaria germanica.
 germanica, Pall. Reise, iii. 320=Myricaria longifolia.
 germanica, Schang. in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 49=
 Myricaria daurica.
 gracilis, Willd. in Abh. Akad. Berl. 1812–13 (1816)
 81.—Sibir. altaic.
 Hampeana, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 8.—
 As. Min.
 herbacea, Willd. in Abh. Akad. Berl. 1812–13 (1816)
 84=Myricaria germanica ?
 hexandra, Hampe, in Flora, xxv. (1842) 62=Ham-
 peana.
 hispanica, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 56.—Hispan.
 hispida, Willd. in Abh. Akad. Berl. 1812–13 (1816)
 77.—Reg. Casp.
 Hohenackeri, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852)
 44.—Reg. Casp.
 indica, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv.
 (1803) 214=gallica.
 ispanica, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient.* i. 768.—
 Persia.
 Jordanis, Boiss. l. c. 771.—Syria.
 juniperina, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii.
 (1835) 102.—China.

TAMARIX:—

- Karelini, *Bunge, l. c.* vii. (1851) 294.—Reg. Casp.
Korolkowi, *Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop.*
v. (1877) 582.—Turkestan.
Kotschy, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 30.—
Persia.
laxa, *Willd. in Abh. Akad. Berl.* 1812–13 (1816) 82.
—Ross.; Sibir. altaic.
leptopetala, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 72.—
Persia.
leptostachys, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.*
vii. (1851) 293.—Turkestan.
Lessingii, *Presl, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852)
51 = gallica.
libanotica, *Hort. ex C. Koch, Dendrol. i.* 454 = gallica.
longifolia, *Willd. in Abh. Akad. Berl.* 1812–13
(1816) 85 = Myricaria longifolia.
longipes, *Presl, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852)
21 = Hampeana.
macrocarpa, *Ehrenb. ex Bunge, l. c.* 79.—Aegypt.;
Persia.
mannifera, *Ehrenb. ex Bunge, l. c.* 63.—Aegypt.;
Arab.; Persia.
mannifera, *Kotschy, ex Bunge, l. c.* 52 = gallica.
mascatenensis, *Bunge, l. c.* 60.—Arab.
Meyeri, *Boiss. Diagn. Ser. I. x.* 9 = tetragyna.
monogyna, *Stokes, Bot. Mat. Med. ii.* 176 = Myricaria
germanica.
mucronata, *Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 5* = ericoides.
nilotica, *Ehrenb. ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.*
(1852) 54 = gallica.
Noëana, *Boiss. Diagn. Ser. II. ii.* 56 = tetragyna.
octandra, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 17.—
Persia.
odessana, *Stev. ex Bunge, l. c.* 47.—Ross.
orientalis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 206 = articulata.
palaestina, *Bertol. Misc. Bot. xiv.* 16 = gallica.
Pallasii, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv.* (1825) 349
= gallica.
paniculata, *Stev. ex DC. Prod. iii.* 96 = gallica.
parviflora, *DC. l. c.* 97.—Graecia.
passerinoides, *Delile, Fl. Aegypt. Illustr.* 58.—Aegypt.;
Arab.
pauciovulata, *J. Gay, ex Munby, Cat.* 12, nomen.—
Alger.
pentandra, *Hampe, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.*
(1852) 32 = parviflora.
pentandra, *Pall. Fl. Ross. i. ii.* 72; *Salisb. Prod.* 173
= gallica.
Petteri, *Presl, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852)
32 = parviflora.
Pharos, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3758 = articulata.
Pharos, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 661, sphalm. = praec.
plumosa, *Carr. in Rev. Hort. (1868)* 358 = gallica?
polystachya, *Ledeb. Fl. Ross. ii.* 133 = laxa.
praecox, *Portenschl. ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.*
(1852) 40 = africana.
pyncocarpa, *DC. Prod. iii.* 97 = passerinoides.
ramosissima, *Karel. ex Boiss. Fl. Orient. i.* 776 =
Karelini.
ramosissima, *Ledeb. Fl. Alt. i.* 424 = gallica.
rosea, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 19.—Persia.
salina, *Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.* 248.—Ind.
bor. occ.
salsa, *Stev. ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852)
24 = tetragyna.
senegalensis, *DC. Prod. iii.* 96 = gallica.
serotina, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. i.* 773.—Persia.
smyrnensis, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 53.—
Smyrna.
songarica, *Eversm. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 661 =
Haloxylon Ammodendron.
songorica, *Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x.* (1797)
374 = Hololachna songorica.
speciosa, *Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi.* (1877) 372.
—Marocc.
speciosa, *Hort. ex C. Koch, Dendrol. i.* 453 = tetrandra.
squamosa, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 661 = Myricaria ger-
manica.
stricta, *Boiss. Diagn. Ser. II. ii.* 57.—Sind.; Beluchist.
syriaca, *Stev. ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852)
21, in syn.; *Boiss. Fl. Orient. i.* 767.—Syria.
Szovitsiana, *Bunge, Tent. Gen. Tamaric.* (1852) 26.—
Persia.
taurica, *Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x.* (1797)
276, in nota = tetrandra.
tenacissima, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3757 =
ericoides.

TAMARIX:—

- tetragyna, *Buhse, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.*
(1852) 19 = dubia.
tetragyna, *Ehrenb. in Linnaea, ii.* (1827) 257, 258.—
Aegypt.; Arab.
tetragyna, *Szovits, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.*
(1852) 18 = octandra.
tetramera, *Kar. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1839) 155,
nomen (Quid?).—Turkestan.
tetrandra, *Gueb. ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.*
(1852) 52 = gallica.
tetrandra, *Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i.* 247.—
Europ. or.
tetrandra, *Szovits, ex Bunge, Tent. Gen. Tamaric.*
(1852) 48 = odessana.
tomentosa, *Sm. in Rees, Cyclop. xxxv. n. 2* = hispida.
usneoides, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 225
= articulata.
variabilis, *Hort. ex C. Koch, Dendrol. i.* 457 =
tetragyna.

TAMATAVIA, *Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen.*
ii. 92 (1873). *RUBIACEAE*, *Benth. & Hook. f. l. c.*
Melleri, Hook. f. l. c.; et in *Hook. Ic. Pl. t.* 1090.—
Madag.

TAMBOURISSA, *Sonner. Voy. Ind. Or. iii.* 267.
t. 134 (1782). *MONIMIACEAE*, *Benth. & Hook. f.*
iii. 139.

- AMBORA, *Juss. Gen.* 401 (1789).
MITHRIDATEA, *Comm. ex Schreb. Gen.* 783 (1791).
alternifolia, *A. DC. in DC. Prod. xvi. ii.* 660 =
quadrifida?
amplifolia, *A. DC. l. c.* 659.—Ins. Maurit.
Boivinii, *A. DC. l. c.*—Madag.
elliptica, *A. DC. l. c.* 660.—Ins. Mascar.
Ficus, *A. DC. l. c.* 659.—Java.
leptophylla, *A. DC. l. c.* 658.—Ins. Comor.
neglecta, *A. DC. l. c.* 659 = quadrifida.
obovata, *A. DC. l. c.* 660 = quadrifida.
parvifolia, *Baker, in Journ. Bot. xx.* (1882) 267.—
Madag.
pedicellata, *Baker, Fl. Maurit.* 289.—Ins. Maurit.
peltata, *Baker, l. c.* 288.—Ins. Maurit.
purpurea, *A. DC. in DC. Prod. xvi. ii.* 659.—Madag.
quadrifida, *Sonner. Voy. Ind. Or. iii.* 267. t. 134.—
Ins. Mascar.
religiosa, *A. DC. in DC. Prod. xvi. ii.* 659.—Madag.
Rota, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xx.* (1883) 240.—
Madag.
Sieberi, *A. DC. in DC. Prod. xvi. ii.* 660.—Ins.
Maurit.
tetragona, *A. DC. l. c.* 659.—Ins. Maurit.
trichophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xx.* (1883)
240.—Madag.
vestita, *A. DC. in DC. Prod. xvi. ii.* 660.—Ins. Borbon.

TAMMSIA, *Karst. Fl. Columb. i.* 179. t. 89 (1861?).
RUBIACEAE, *Benth. & Hook. f. ii.* 79.
anomala, *Karst. l. c.*—N. Granat.

TAMNUS, *Tourn. ex Linn. Syst. ed. I* (1735) = **Tamus**,
Linn. (Dioscor.).

TAMONEA, *Aubl. Pl. Gui. i.* 441. t. 175 (1775) = **Mi-**
conia, *Ruiz & Pav. (Melastom.)*.
guianensis, *Aubl. l. c.* = *M. Fothergilla*.
lasiopetala, *DC. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii.*
(1871) 103 = *M. platyhedra*.

TAMONEA, *Aubl. Pl. Gui. ii.* 659. t. 268 (1775).
VERBENACEAE, *Benth. & Hook. f. ii.* 1147.
GHINIA, *Schreb. Gen.* 19 (1789).
ISCHNIA, *DC. ex Meissn. Gen.* 298; *Comm.* 206
(1840); et *Prod. ix.* 257 (1845).
KAEMPFERA, *Houst. Reliq. 3. t. 2* (1781).
LEPTOCARPUS, *Willd. in Link, Jahrb. i. iii.* (1820) 51.
arabica, *Mirb. Hist. Pl. ed. II. xv.* 233 = *Priva lep-*
tostachys.
curasavica, *Pers. Syn. ii.* 139 = spinosa.
juncea, *Schau. in DC. Prod. xi.* 529.—Bras.
lappulacea, *Poir. Encyc. vii.* 568 = *Priva echinata*.
mutica, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 94 = spicata.
scabra, *Schlecht. & Cham. in Linnaea, v.* (1830)
99.—Mexic.
spicata, *Aubl. Pl. Gui. ii.* 660. t. 268.—Guian.
spinosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 94.—Ind occ.
verbenacea, *Sw. Fl. Ind. Occ. ii.* 1089, in syn. = spinosa.

TAMONOPSIS, *Griseb. in Goett. Abh. xix.* (1874) 246
= *Lantana*, *Linn. (Verben.)*.
spicata, *Griseb. l. c.*—Reg. Argent.

TAMPOA, *Aubl. Pl. Gui. ii. Suppl.* 35 (1775).
INCERT. SEDIS.
guyanensis, *Aubl. l. c.*—Guian.

TAMUS, *Linn. Gen. ed. I.* 305 (1737). *DIO-*
SCOREACEAE, *Benth. & Hook. f. iii.* 744.
TAMNUS, *Tourn. ex Linn. Syst. ed. I* (1735).
canariensis, *Willd. ex Kunth, Enum. Pl. v.* 455
(Quid?).—Ins. Canar.
communis, *Link, in Buch, Besch. Canar. Ins.* 140 =
edulis.
communis, *Linn. Sp. Pl.* 1028.—Europ.; Persia; Afr.
bor.
cordifolia, *Stokes, Bot. Mat. Med. iv.* 544 = com-
munis.
cretica, *Linn. Sp. Pl.* 1028 = communis.
edulis, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv.* 1. (1833)
12.—Ins. Mader.
Elephantipes, *L'Hérit. Sert. Angl.* 29 = Testudinaria
Elephantipes.
Norsa, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. iii.* (1838),
reimp. 21 = edulis.
parviflora, *Kunth, Enum. Pl. v.* 454.—Ins. Teneriff.
racemosa, *Gouan, Fl. Monsp.* 426 = communis.
sylvestris, *Hort. Berol. ex Kunth, Enum. Pl. v.* 443 =
Testudinaria sylvatica.

TANACETUM, *Tourn. ex Linn. Syst. ed. I* (1735).
COMPOSITAE, *Benth. & Hook. f. ii.* 434.

HEMIPAPPUS, *C. Koch, in Linnaea, xxiv.* (1851)
340.

MATRICARIOIDES, *Spach, Hist. Vég. Phan. x.* 24
(1841).

OMALANTHUS, *Less. Syn. Comp.* 260 (1832).

OMALOTES, *DC. Prod. vi.* 83 (1837).

PSANACETUM, *Neck. Elem. i.* 89 (1790).

SPHAEROMERIA, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.*
vii. (1841) 401.

Achilleae, *Sch. Bip. Tanacet.* 58 = Chrysanthemum
Achilleae.

achilleaeefolium, *Sch. Bip. l. c.* 47 = Chrysanthemum
achilleaeefolium.

achilleoides, *DC. Prod. vi.* 130.—Mongol.

acutifolium, *DC. l. c.* 132 = Matricaria acutifolia.

aegyptiacum, *Juss. ex Jacq. Hort. Vindob. iii.* 46.
t. 88 = Grangea maderaspatana.

alatavicum, *Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl.* (1867)
ii. 129.—Sibir. ural.

albidum, *DC. Prod. vi.* 132 = Matricaria albida.

alpestre, *Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii.* 602 = boreale.

alpinum, *Sch. Bip. Tanacet.* 61 = Chrysanthemum
alpinum.

angulatum, *Willd. Sp. Pl. iii.* 1811 = Achillea filipen-
dulina.

annuum, *Linn. Sp. Pl.* 844.—Europ. austr.

arcticum, *Sch. Bip. Tanacet.* 35 = Chrysanthemum
arcticum.

argenteum, *Willd. Ach. 51. t. 2. f. 4.*—As. Min.

argyreaum, *DC. Prod. vi.* 134 = Schistostephium
flabelliforme.

argyranthemoides, *Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi.*
(1863) 444.—Armenia.

armenum, *Sch. Bip. Tanacet.* 35 = Chrysanthemum
fruticulosum.

artemisioides, *Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.*
318.—Reg. Himal.

atratum, *Sch. Bip. Tanacet.* 62 = Chrysanthemum
atratum.

Aucheri, *DC. Prod. vii.* 298.—Syria.

Aucherianum, *Sch. Bip. Tanacet.* 49.—As. Min.

Audiberti, *DC. Prod. vi.* 131.—Reg. Mediterr.

axillare, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 147 = Stilpnophytum
axillare.

Balsamita, *Linn. Sp. Pl.* 845 = Chrysanthemum Bal-
samita.

balsamitoides, *Sch. Bip. Tanacet.* 51 = Chrysanthemum
Balsamita.

balsamitum, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii.*
(1880) 136 = praec.

Barclayanum, *DC. Prod. iv.* 128.—Sibir.

bipinnatum, *Sch. Bip. Tanacet.* 48 = Chrysanthemum
bipinnatum.

Bocconii, *Sch. Bip. l. c.* = Chrysanthemum Bocconi.

TANACETUM:—

boreale, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 313.—Podol.; Sibir.
 boreale, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 401 = *huronense*.
Burchellii, DC. Prod. vi. 132 = *Matricaria Burchellii*.
camphoratum, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 521.—Calif.
canariense, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 149 = *Gonospermum canariense*.
canescens, DC. Prod. vi. 129.—Persia.
canum, Eaton, in *Bot. King's Exp.* 179. t. 19. f. 8–14.—Am. bor. occ.
capense, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 24.—Afr. austr.
capitatum, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* ii. 415.—Am. bor.
cappadocicum, Sch. Bip. *Tanacet.* 48.—As. Min.
Capusi, Franch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xvi. (1883) 308.—Turkestan.
carneum, Sch. Bip. *Tanacet.* 58 = *Chrysanthemum coronopifolium*, Willd.
caucasicum, Sch. Bip. l. c. 60 = *Chrysanthemum caucasicum*.
ceratophylloides, Sch. Bip. l. c. 35 = *Chrysanthemum coronopifolium*, Vill.
chiliophyllum, Sch. Bip. l. c. 47 = *Chrysanthemum millefolium*.
chinense, A. Gray, ex Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvii. (1872) 427 = *Schistostephium artemisioides*.
chrysanthemoides, Gaertn. *Fruct.* ii. 396. t. 165 = *Chrysanthemum flosculosum*.
cinerariaefolium, Sch. Bip. *Tanacet.* 58 = *Chrysanthemum cinerariaefolium*.
cinereum, DC. Prod. vi. 131 = *Cotula cinerea*.
consanguineum, DC. l. c. 133 = *Schistostephium crataegifolium*.
corymbosum, Sch. Bip. *Tanacet.* 57 = *Chrysanthemum corymbosum*.
cotuloides, Linn. *Mant.* ii. 232 = *Hippia gracilis*.
crataegifolium, DC. Prod. vi. 134 = *Schistostephium crataegifolium*.
crispum, Noronha, in *Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 (Quid?).—Java.
crispum, Steud. *Nom.* ed. I. 825; Hoffm. *Verz. Pf.* 116 = *vulgare*.
crithmifolium, Linn. *Sp. Pl.* 843 = *Athanasia parviflora*, Thunb.
decipiens, Sch. Bip. *Tanacet.* 47 = *Matricaria decipiens*.
densum, Sch. Bip. l. c. 48 = *Chrysanthemum densum*.
discoideum, Reichb. f. *Ic. Fl. Germ.* xvi. 51. t. 988 = *Chrysanthemum discoideum*.
diversifolium, Eaton, in *Bot. King's Exp.* 180. t. 19.—Am. bor. occ.
Douglasii, DC. Prod. iv. 128 = *huronense*.
dumosum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vi. 89.—Persia.
elatum, Salisb. *Prod.* 190 = *vulgare*.
elegans, Decne. in *Fl. des Serres*, xii. (1857) 19. t. 1191 = *camphoratum*.
elongatum, Sch. Bip. *Tanacet.* 61 = *Matricaria oreades*.
Falconeri, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 320.—Reg. Himal.
fasciculatum, Sch. Bip. *Tanacet.* 11 = *Artemisia fasciculata*.
ferulaceum, Sch. Bip. l. c. 50.—Ins. Canar.
Fisheræ, Aitch. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 170.—Afghanistan.
flabellifolium, Boiss. & Heldr. *Diagn.* Ser. I. xi. 26.—As. Min.
flabelliforme, L'Hérit. *Sert. Angl.* 21 = *Pentzia crenata*.
frutescens, Linn. *Sp. Pl.* 844 = *Hippia frutescens*.
fruticosum, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 166, in syn., sphalm. = *Matricaria multiflora*.
fruticosum, Link. in *Buch, Besch. Canar. Ins.* 149 = *Gonospermum canariense*.
fruticulosum, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 153 = *gracile*.
fruticulosum, Ledeb. *Fl. Alt.* iv. 58.—Reg. Himal.; Soongar.
Funkii, Sch. Bip. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* ii. 102.—Hispan.
Gayanum, Sch. Bip. in *Bonplandia*, vii. (1860) 369 = *Chrysanthemum Mawii*.
globiferum, DC. 6me Not. *Jard. Genève* 8 = *Matricaria globifera*.
Gmelini, Sch. Bip. *Tanacet.* 35 = *Chrysanthemum arcticum*.

TANACETUM:—

gnaphaloides, Steud. in *Flora*, xiii. (1830) 542 = *Helichrysum anomalum*.
gossypinum, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 154.—Reg. Himal.
gracile, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 318.—Reg. Himal.
graminifolium, Reichb. f. *Ic. Fl. Germ.* xvi. 51 = *Chrysanthemum graminifolium*.
grandiflorum, Poir. *Encyc.* vii. 574 (= *Plagiograndiflorus*).—Afr. bor.
grandiflorum, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 147 = *Matricaria grandiflora*.
gratum, Wall. ex DC. *Prod.* v. 374 = *Cyathocline lyrata*.
griseum, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 168 (*Schistostephium* sp.).—Afr. austr.
heptalobum, DC. *Prod.* vi. 133 (*Schistostephium* sp.).—Afr. austr.
heptalobum, Sch. Bip. in *Flora*, xxvii. (1844) 675 = *hippiaefolium*.
Herderi, Regel & Schmalh. in *Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 619.—Turkestan.
heterophyllum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vi. 90 = *myriophyllum*.
hippiaefolium, DC. *Prod.* vi. 133 (*Schistostephium* sp.).—Afr. austr.
hispidum, DC. l. c. = *Cenia hispida*.
humile, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 148 = *Grangea maderaspatana*.
huronense, Nutt. *Gen. Am.* ii. 141.—Am. bor.
huronense, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 401, partim = *camphoratum*.
incanum, Fisch. & Mey. ex DC. *Prod.* vi. 129 = *canescens*.
incanum, Hort. ex DC. l. c. 128 = *Barclayanum*.
incanum, Linn. *Sp. Pl.* 844 = *Artemisia fasciculata*.
indicum, Sch. Bip. *Tanacet.* 50 = *Chrysanthemum indicum*.
integrifolium, Sch. Bip. l. c. 35 = *Chrysanthemum integrifolium*.
Johnstonii, Hemsl. in *Journ. Bot.* xxi. (1883) 135.—Afghanistan.
Kochii, Sch. Bip. *Tanacet.* 47 = *Chrysanthemum millefolium*.
Kotschyi, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 351 = *myriophyllum*.
Kotzebueense, Bess. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* ix. (1836) 107; et ex DC. *Prod.* vi. 131 = *Chrysanthemum bipinnatum*.
lanuginosum, Sch. Bip. & Herd. in *Pollichia*, xx–xxi. (1863) 442.—Sibir.
larvatum, Kanitz, ex Nym. *Consp.* 371 = *Chrysanthemum coronopifolium*.
latifolium, Sch. Bip. *Tanacet.* 35 = *Chrysanthemum lacustre*.
Ledebourii, Sch. Bip. l. c. 47.—Reg. Casp.
leptolobum, DC. *Prod.* vi. 133 = *Matricaria multiflora*.
leptophyllum, Sch. Bip. *Tanacet.* 48.—Reg. Cauc.
Leucanthemum, Sch. Bip. l. c. 35 = *Chrysanthemum Leucanthemum*.
leucophyllum, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 551.—Turkestan.
linearilobum, DC. *Prod.* vi. 133 = *Cenia sericea*.
linifolium, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 147 = *Stilpnophytum linifolium*.
longifolium, Thunb. l. c. = *Stilpnophytum linifolium*.
longifolium, Wall. *Cat. n.* 3231.—Reg. Himal.
macrophyllum, Fisch. ex Steud. *Nom.* ed. I. 825, nomen (Quid?).—Hab.?
macrophyllum, Sch. Bip. *Tanacet.* 53 = *Chrysanthemum macrophyllum*.
Maresii, Sch. Bip. in *Bonplandia*, viii. (1860) 369 = *Chrysanthemum Maresii*.
marginatum, Aliq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 177.—Borneo.
matricarioides, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 544 = *Matricaria discoidea*.
maximum, Sch. Bip. *Tanacet.* 35 = *Chrysanthemum maximum*.
Meyerianum, Sch. Bip. l. c. 47.—Sibir.
microphyllum, DC. *Prod.* vi. 131.—Hispan.
millefolium, Fisch. & Mey. ex DC. l. c. 128.—Armenia.
millefolium, Aitch. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 169 = *Achillea micrantha*.
minimum, Sch. Bip. *Tanacet.* 60 = *Chrysanthemum tomentosum*.

TANACETUM:—

monanthos, Linn. *Mant.* i. 111 = *Anacyclus alexandrinus*.
monspeliense, Sch. Bip. *Tanacet.* 35 = *Chrysanthemum monspeliense*.
montanum, Sch. Bip. l. c. = *Chrysanthemum montanum*.
multicaule, Sch. Bip. l. c. 48 = *Chrysanthemum multicaule*.
multiflorum, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 147 = *Matricaria multiflora*.
Myconis, Schenk, *Ind. Sem. Hort. Wirceb.* (1861) = *Chrysanthemum Myconis*.
myriophyllum, Willd. *Sp. Pl.* iii. 1814.—Reg. Cauc.
nanum, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 155.—Reg. Himal.
nivale, Sch. Bip. *Tanacet.* 60.—Armenia.
niveum, Sch. Bip. l. c. 56 = *Chrysanthemum praealtum*.
nubigenum, Wall. ex DC. *Prod.* vi. 130.—Reg. Himal.
Nuttallii, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* ii. 415.—Am. bor. occ.
obtusum, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 147 = *Matricaria globifera*.
officinale, Gueldenst. ex Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 601 = *vulgare*.
officinatum, Crantz, *Inst.* i. 273 = *vulgare*.
oligocephalum, Sch. Bip. *Tanacet.* 48 = *Chrysanthemum millefolium*.
orientale, Willd. *Sp. Pl.* iii. 1812 = *Artemisia fasciculata*.
ovatifolium, Stokes, *Bot. Mat. Med.* iv. 180 = *Chrysanthemum Balsamita*.
Pallasianum, Trautv. & Mey. in *Middend. Reise (Fl. Ochot.)* 55.—Manchuria.
pallens, Sch. Bip. *Tanacet.* 35 = *Chrysanthemum pallens*.
palmatifidum, Sch. Bip. l. c. 60.—Hispan.
palustre, Sch. Bip. l. c. 49 = *Chrysanthemum palustre*.
parthenifolium, Sch. Bip. l. c. 56 = *Chrysanthemum praealtum*.
Parthenium, Sch. Bip. l. c. 55 = *Chrysanthemum Parthenium*.
pauciflorum, DC. *Prod.* vi. 131 = *Matricaria discoidea*.
pauciflorum, Fisch. *Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 37 (Quid?).—Hab.?
pauciflorum, Richards. in *Frankl. Narr. 1st Journ.* App. ed. II. 30 = *huronense*.
pilosum, Berg. *Desc. Pl. Cap.* 244 = *Hippia gracilis*.
pinnatifidum, Sch. Bip. *Tanacet.* 52 = *Chrysanthemum multifidum*.
pinnatum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vi. 90.—Persia.
polycephalum, Sch. Bip. *Tanacet.* 47 (= *Pyrethrum polycephalum*).—Mesopot.
potentilloides, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 204.—Am. bor. occ.
Pseudo-parthenium, Sch. Bip. in *Pollichia*, xx–xxi. (1863) 444 = *nivale*.
ptarmicaeflorum, Sch. Bip. *Tanacet.* 50 (= *Pyrethrum ptarmicaeflorum*).—Ins. Canar.
pulchellum, Sch. Bip. l. c. 61.—Sibir.
pulchrum, Sch. Bip. l. c. 49.—Sibir. altaic.
pulverulentum, Sch. Bip. l. c. 48 = *Chrysanthemum pulverulentum*.
purpureum, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 181 = *Cyathocline lyrata*.
pyrethroides, Sch. Bip. in *Pollichia*, xx–xxi. (1863) 441 = *Chrysanthemum Richeria*.
radicans, Sch. Bip. *Tanacet.* 48 = *Chrysanthemum radicans*.
robustum, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 154.—Reg. Himal.
roseum, Sch. Bip. *Tanacet.* 58 = *Chrysanthemum coccineum*.
rotundifolium, DC. *Prod.* vi. 133 = *Schistostephium rotundifolium*.
saxatile, Sch. Bip. *Tanacet.* 47 = *Chrysanthemum millefolium*.
Scharnhorsti, Regel & Schmalh. in *Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 620.—Turkestan.
Semenovii, Herd. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 130.—As. bor.
Senecionis, J. Gay, ex DC. *Prod.* vi. 129.—Reg. Himal.
sericeum, Sch. Bip. *Tanacet.* 59 = *Chrysanthemum argenteum*.
serotinum, Sch. Bip. l. c. 35 = *Chrysanthemum serotinum*.
setaceum, Tausch, in *Flora*, xii. (1829) 11 = *myriophyllum*.

TANACETUM :—

- sibiricum*, Falk, Topogr. ii. n. 942; ex Ledeb. Fl. Alt. iv. 60 = vulgare.
sibiricum, Linn. Sp. Pl. 844.—Sibir.
siculum, P. G. Strobl, in Flora, lxx. (1882) 249 = vulgare.
silafolium, Sch. Bip. Tanacet. 61 = *Matricaria grandiflora*.
simplicifolium, Salisb. Prod. 190 = *Chrysanthemum Balsamita*.
sinaicum, Delile, ex DC. Prod. vi. 59.—Arab.
sinense, Sch. Bip. Tanacet. 50 = *Chrysanthemum sinense*.
sinuatum, Sch. Bip. l. c. 35 = *Chrysanthemum sinuatum*.
suaveolens, Hook. Fl. Bor. Am. i. 327. t. 110 = *Matricaria discoidea*.
suffruticosum, Burm. ex DC. Prod. vi. 144 = *Hippia gracilis*.
suffruticosum, Linn. Sp. Pl. 843 = *Matricaria multiflora*.
suffruticosum, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 641, partim = *Hippia frutescens*.
sulphureum, Sch. Bip. Tanacet. 48.—Hispan.
tauricum, Sch. Bip. l. c. = *Chrysanthemum millefoliatum*.
tenuifolium, Jacquem. ex DC. Prod. vi. 129.—Reg. Himal.
tenuisectum, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 444 = *Chrysanthemum coronopifolium*, Vill.
tibeticum, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 154.—Reg. Himal.
tomentellum, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 354.—Armenia.
tomentosum, DC. Prod. vi. 130 = *T. Senecionis*.
tomentosum, Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) ii. 128 = Herderi.
tomentosum, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 305 = *fruticulosum*.
tortuosum, DC. Prod. vi. 133 = *Pentzia tortuosa*.
Tournefortii, Sch. Bip. Tanacet. 59 = *Chrysanthemum argenteum*.
transiliense, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) ii. 129.—As. bor.
trichophyllum, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 255.—Turkestan.
trifidum, DC. Prod. vi. 130.—Mongol.
trifidum, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 172 = *praec.*?
trifurcatum, Sch. Bip. Tanacet. 48 = *Chrysanthemum trifurcatum*.
uliginosum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 167 = *Cotula tridentata*.
umbellatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 171 = vulgare.
umbelliferum, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 30.—Afghan.
uniflorum, Sch. Bip. Tanacet. 48.—Persia.
VahlII, DC. Prod. vi. 129.—Hispan.
vestitum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 147 = *Athanasia fasciculata*.
virgatum, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 551 = *Chrysanthemum flosculosum*.
viscosum, Wall. Cat. n. 3232 = *Cyathocline lyrata*.
vulgare, Linn. Sp. Pl. 844.—Europ.; As. bor.
Waldsteinii, Sch. Bip. Tanacet. 35 = *Chrysanthemum rotundifolium*.
Willkommii, Sch. Bip. ex Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 748 = VahlII.

TANAECIUM, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 91 (1788).

- BIGNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1039.
albiflorum, DC. Prod. ix. 245 = *T. Jaroba*.
brasiliense, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. viii. (1861) 118.—Bras.
crucigerum, Seem. in Bonplandia, iv. (1856) 127.—Ind. occ.
exsertum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 450.—Jamaica.
Jaroba, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 92.—Am. trop.
lilacinum, Seem. Bot. Voy. Herald, 182.—Panama.
paniculatum, Sieber, ex DC. Prod. ix. 245 = *Jacaranda Sagraeana*.
parasiticum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 92 = *Schlegelia parasitica*.
pinnatum, Willd. Sp. Pl. iii. 312 = *Kigelia pinnata*.
praelongum, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. viii. (1861) 117.—Guian.
Tripinna, Rausch. Nom. ed. III. 178 = *Colea tripinnata*.

TANAKAEA, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 352 (1876), err. typ. = seq.

TANAKEA, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 144 (1875). *SAXIFRAGEAE*.
radicans, Franch. & Sav. l. c.—Japon.

TANAXION, Rafin. Fl. Tellur. ii. 51 (1836) = *Eri-geron*, Linn. (Compos.).
tomentosum, Rafin. l. c. = *E. bahamensis*.

TANDONIA, Baill. Adansonia, i. (1860–61) 184 = *Tannodia*, Baill. (Euphorb.).
cordifolia, Baill. l. c. 185 = *Tannodia cordifolia*.

TANDONIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 226 (1849) = *Boussingaultia*, H. B. & K. (Chenop.).
brachystachya, Moq. l. c. 227.—N. Granat.
cordifolia, Moq. l. c. 228.—N. Granat.
diffusa, Moq. l. c. 226.—Peruv.
filiformis, Moq. l. c. 227.—Peruv.
marginata, Moq. l. c. 226.—Ecuador.
obovata, Moq. l. c. 227.—N. Granat.
ramosa, Moq. l. c. = *B. ramosa*.

TANGARACA, Adans. Fam. ii. 143 (1763) = *Hamelia*, Jacq. (Rubiace.).

TANGHINIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 10 (1806) = *Cerbera*, Linn. (Apocyn.).
dichotoma, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 461 = *Tabernaemontana dichotoma*.
lactaria, G. Don, l. c. = *C. Odollam*.
laurifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 98 = *C. Odollam*.
maculata, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 461 = *Ochrosia borbonica*.
Manghas, G. Don, Gen. Syst. iv. 98 = *C. Odollam*.
Odollam, G. Don, l. c. = *C. Odollam*.
veneneflua, G. Don, l. c. sphalm. = seq.
venenifera, Poir. Encyc. Suppl. v. 283 = *C. Tanghin*.

TANIBOUCA, Aubl. Pl. Gui. 448. t. 178 (1775) = *Terminalia*, Linn. (Combret.).
guianensis, Aubl. l. c. = *Term. Tanibouca*.

TANKERVILLIA, Link, Handb. i. 251 (1829) = *Phaius*, Lour. (Orchid.).
cantonensis, Link, l. c. = *P. grandifolius*.

TANNODIA, Baill. Adansonia, i. (1860–61) 251. t. 7. *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 304.

TANDONIA, Baill. Adansonia, i. (1860–61) 184.
cordifolia, Baill. l. c. 251.—Madag.

TANROUJOU, Juss. Gen. 351, in adnot. (1789) = *Hymenaea*, Linn. (Legumin.).

TANTALUS, Noronha, ex Thou. Hist. Vég. Afr. 39 (1806) = *Sarco-laena*, Thou. (Chlaen.).

TANULEPIS, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 17; et in Baker, Fl. Maurit. 225 (1877). *ASCLEPIADEAE*.
sphenophylla, Balf. f. l. c. —Ins. Rodriguez.

TAONABO, Aubl. Pl. Gui. i. 569. tt. 227, 228 (1775) = *Ternstroemia*, Mutis.
dentata, Aubl. l. c. 569 = *Temstr. dentata*.
punctata, Aubl. l. c. 571 = *Temstr. punctata*.

TAPANAFA, Adans. Fam. ii. 470 (1763) = *Pothos*, Linn. (Aroid.).
chinensis, Rafin. Fl. Tellur. iv. 14 = *P. scandens*.
indica, Rafin. l. c. = *P. scandens*.
Rheedi, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 165 = *P. scandens*.

TAPANAWA, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 165 = *praec.*

TAPANHUACANGA, Vell. ex Vand. Fl. Lusit. 9. f. 5 (1788). *RUBIACEAE*? (Quid?).
brasiliensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 663.—Bras.

TAPEINAEGLE, Herb. in Bot. Reg. (1847) t. 22. f. 4 = *Tapeinanthus*, Herb. (Amaryll.).
humilis, Herb. l. c. = *Tapeinanthus humilis*.

TAPEINANTHUS, Boiss. ex Benth. in DC. Prod. xii. 436 (1848) = *Chamaesphacos*, Schrenk (Labiata).
brahuicus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 29.—Persia.
persicus, Boiss. ex Benth. in DC. Prod. xii. 436.—Persia.

TAPEINANTHUS, Herb. Amaryll. 190 (1837). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 719.
BRAXIREON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 (1836), nomen prius.
CARREGNOA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 605 (1842).
GYMNOTERPE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 108 (1866).
TAPEINAEGLE, Herb. in Bot. Reg. (1847) t. 22.
humilis, Herb. Amaryll. 190, 414.—Hispan.; Marocc.

TAPEINIA, Juss. Gen. 59 (1789). *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 699.
magellanica, F. F. Gmel. Syst. 108; Ker-Gawl. Gen. Irid. 9.—Chili.

TAPEINOCHEILOS, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 101. t. 4 (1868). *SCITAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 644.
pungens, Miq. l. c.—Malaya; Austral.

TAPEINOCHEILUS, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 644 (1883), sphalm. = *praec.*

TAPEINOPHALLUS, Baill. Dict. Bot. i. (fasc. v.), Ic. sine desc. [1877] = *Amorphophallus*, Blume (Aroid.).
Rivieri, Baill. l. c. = *A. Rivieri*.

TAPEINOSPERMA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 647 (1876). *MYRSINEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.
Lenormandii, Hook. f. l. c.—N. Caled.
Veillardii, Hook. f. l. c.—N. Caled.

TAPEINOSTEMON, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 194. *GENTIANAEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 808.
capitatum, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 195.—Bras.
spenneroides, Benth. l. c. 194.—Bras.

TAPEINOTES, DC. Prod. vii. 544 (1839) = *Sinningia*, Nees (Gesner.).
barbata, DC. l. c. = *S. Carolinae*.
Carolinae, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 273 = *S. Carolinae*.
pusilla, DC. Prod. vii. 544 (= *Ligeria pusilla*).—Bras.
villosa, Walp. Rep. ii. 716 = *S. villosa*.

TAPHROGITON, Montand. Guide Bot. 346 (1868) = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).
radicans, Montand. l. c. = *S. radicans*.
sylvaticum, Montand. l. c. = *S. sylvaticus*.

TAPHROSPERMUM, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 172 (1831) = *Cochlearia*, Tourn. (Crucif.).
altaicum, C. A. Mey. l. c. 173.—Sibir. altaic.
brachycarpum, Meissn. Comm. 12 = *Erysimum brachycarpum*.
caucasicum, Rupr. Fl. Cauc. 84.—Reg. Cauc.
platypetalum, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 60.—Soongaria.

TAPIA, Adans. Fam. ii. 407 (1763) = *Crataeva*, Linn. (Cappar.).

TAPINA, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 59. t. 225. f. 1 (1829) = *Sinningia*, Nees (Gesner.).
barbata, Mart. l. c. 60. t. 225. f. 1 = *S. Carolinae*.
Carolinae, Hort. ex Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. 101 = *S. Carolinae*.
pusilla, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 61. t. 225. f. 2 (= *Ligeria pusilla*).—Bras.
splendens, Triana, in Belg. Hortie. vii. (1857) 198 = *Episcia splendens*?
variegata, Linden, Cat. n. 21. (1867) 5; et in Belg. Hortie. xvii. (1867) 105.—Peruv.
villosa, Gardn. in Hook. Ic. t. 469 = *S. villosa*.

TAPINANTHUS, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730 (1830) = *Loranthus*, Linn.
lanceolatus, Blume, l. c. = *L. lanceolatus*.
sessilifolius, Blume, l. c. = *L. sessilifolius*.

TAPINIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 663 (1841), sphalm. = *Tapirira*, Aubl. (Anacard.).

TAPINOCARPUS, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 345 = *Theriodaphnum*, Blume (Aroid.).
Dalzelli, Schott, Gen. Aroid. t. 15 (*Dalzeli*) = *Theriodaphnum crenatum*.

TAPIRIA, Juss. Gen. 372 (1789), sphalm. = seq.

TAPIRIRA, Aubl. Pl. Gui. i. 470. t. 188 (1775).
ANACARDIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 423.
JONCQUETIA, Schreb. Gen. 308 (1789).
PEGIA, Coleb. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 364.
PHLEBOCHITON, Wall. in Trans. Med. & Phys. Soc. Calc. vii. (1835) 230.
SALABERTIA, Neck. Elem. ii. 238 (1790).
TAPIRIA, Juss. Gen. 372 (1789).

acida, March. Rév. Anacard. 162 = *Odina acida*.
bijuga, Hook. f. ex March. l. c. = *guianensis*.
caffra, March. l. c. = *Harpephyllum caffrum*.
Colebrookiana, Hook. f. ex March. l. c. = *Nothopegia Colebrookiana*.
cyrtocarpa, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 222. —Mexic.
discolor, March. Rév. Anacard. 162 = *Odina discolor*.
extensa, Hook. f. ex March. l. c. —Reg. Himal.
fruticosa, March. l. c. = *Odina fruticosa*.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 470. t. 188. —Guian.
hirsuta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 28 = *extensa*.
humilis, March. Rév. Anacard. 162 = *Odina humilis*.
Marchandii, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 379. —Bras.
mexicana, March. Rév. Anacard. 162. —Mexic.
myriantha, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1872) 295. —N. Granat.
obovata, March. Rév. Anacard. 162 = *Odina obovata*.
Pao-pombo, March. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1873) 58 = *guianensis*.
Peckoltiana, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 380. —Bras.
velutina, March. Rév. Anacard. 162 = *Odina velutina*.
Wodier, March. l. c. = *Odina Wodier*.

TAPIROCARPUS, Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xiii. (1882) 292. **BURSERACEAE**.
Talisia, Sagot, l. c. —Guian.

TAPOGOMEA, Aubl. Pl. Gui. i. 157. tt. 60, 63 (1775) = *Cephaelis*, Sw. (Rubiaceae).
alba, Aubl. l. c. 164 = *C. alba*.
axillaris, Poir. Encyc. vii. 585 = *C. axillaris*.
Carapichea, Poir. l. c. 587 = *C. involucreta*.
elata, Poir. l. c. 585 = *C. elata*.
glabra, Aubl. Pl. Gui. i. 165 = *C. glabra*.
muscosa, Poir. Encyc. vii. 587, in obs. = *C. muscosa*.
prunifolia, Poir. in Dict. Sc. Nat. lii. 236 = *Psychotria microcephala*.
punicea, Poir. Encyc. vii. 585 = *C. elata*.
purpurea, Aubl. Pl. Gui. i. 162 = *C. purpurea*.
rubra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 145 = *Uncaria acida*.
tomentosa, Aubl. Pl. Gui. i. 160. t. 61 = *Psychotria tomentosa*, Muell. Arg.
violacea, Aubl. l. c. 157 = *C. violacea*.

TAPOMANA, Adans. Fam. ii. 343 (1763) = *Connarus*, Linn.

TAPURA, Aubl. Pl. Gui. i. 126. t. 48 (1775).
CHAILLETIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 341.
ROHRIA, Schreb. Gen. 30 (1789).
africana, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 344. —Afr. trop.
amazonica, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 41. t. 246. f. 2. —Bras.
capitulifera, Baill. Adansonia, xi. (1873) 112. —Bras.
ciliata, Gardn. in Hook. Ic. Pl. t. 466. —Bras.
cubensis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 56. —Cuba.
cucullata, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 292. —Bras.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 126. t. 48. —Guian.
latifolia, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 291. —Am. trop.?

TARA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 153 (1810) = *Caesalpinia*, Linn. (Legumin.).
tinctoria, Molina, l. c. = *C. tinctoria*.

TARAKTOGENOS, Hassk. Retzia, 127 (1855).
BIXINEAE, Benth. & Hook. f. i. 129.
Blumei, Hassk. l. c. —Sumatra.

TARALEA, Aubl. Pl. Gui. ii. 745. t. 298 (1775) = *Dipteryx*, Schreb. (1791) (Legumin.).
oppositifolia, Aubl. l. c. = *D. oppositifolia*.

TARAXACUM, Linn. Syst. ed. I (1735): Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 739 (1742). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 522.
CARAMANICA, Tineo, Pl. Rar. Sic. fasc. i. 3 (1846).
DENS-LEONIS, Tourn. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 197 (1745).

LASIOFUS, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 346 (1836).

LEONTODON, Adans. Fam. ii. 112 (1763).
affine, Jord. Pugill. Pl. Nov. 113 = officinale.

alpestre, DC. Prod. vii. 148 = officinale.
alpinum, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 676 = officinale.

alpinum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1852) 87, nomen; Enum. Pl. Transs. 368 = palustre.

apenninum, DC. Prod. vii. 148. —Ital.

arcuratum, Dum. Fl. Belg. 61 = officinale.

Assemani, Blanche, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 791. —As. Min.; Persia.

atlanticum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 9 = microcephalum.

aureum, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) i. 180 = officinale.

autumnale, Cast. Cat. Pl. Marseille, 87 = gymnanthum.

autumnale, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 778 = *Leontodon autumnalis*.

bellidifolium, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) i. 187 = officinale.

bessarabicum, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 34, nomen = palustre.

bicolor, DC. Prod. vii. 148. —Sibir. altaic.

bithynicum, Boiss. Fl. Orient. iii. 791 = *Assemani*.

bithynicum, DC. Prod. vii. 149. —Bithyn.

boreale, DC. l. c. 105, in syn. —Rossia.

bulbosum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 270 = *Crepis bulbosa*.

canescens, Poiss. Fl. Orient. iii. 786 = montanum.

capense, Sch. Bip. in Flora, xxxi. (1848) 170. —Afr. austr.

causasicum, DC. Prod. vii. 146 = officinale.

caulescens, Moris, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 108. t. 24 (= *Macrorhynchus pterocarpus*). —Chili.

ceratophorum, DC. Prod. vii. 146 = officinale.

collinum, DC. l. c. 149. —Sibir.

commune, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iv. 25 = officinale.

commutatum, Jord. Pugill. Pl. Nov. 116 = officinale.

corniculatum, DC. Prod. vii. 146 = officinale.

coronopifolium, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 609 (= *Macrorhynchus pumilus*). —Ins. Falkland.

crepidiforme, DC. Prod. vii. 149. —As. Min.; Persia.

crispum, Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 148 = serotinum.

Dens-leonis, Desf. Fl. Atlant. ii. 228 = officinale.

denudatum, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 95 = montanum.

dissectum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 814. —Sibir. or.

erectum, Schrank, Baier. Fl. ii. 314 = officinale.

eripodum, DC. Prod. vii. 147 = officinale.

erythrospermum, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 75, 106 = officinale.

frigidum, Schur, Enum. Pl. Transs. 368 = palustre.

fulvipilus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 527. —Afr. austr.

getulum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 264. —Alger.

Gilliesii, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 31. —Reg. Argent.

glabrum, DC. Prod. vii. 147. —Dahuria.

glaciale, Huet, ex Nym. Consp. 437 = officinale.

glaucanthum, DC. Prod. vii. 147 = officinale.

glaucescens, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 270 = officinale.

gymnanthum, DC. Prod. vii. 145. —Reg. Mediterr.

halophilum, Trautv. ex Beck. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) i. 111, nomen = officinale.

hirsutum, DC. Prod. vii. 149 = *Troximon humile*.

Hoppeanum, Griseb. & Schenk, in Wiegmann Archiv, xviii. (1852) i. 349 = officinale.

hybernium, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 410 = gymnanthum.

TARAXACUM. —

inaequilobum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 8. —Alger.
integrifolium, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 676. —As. Min.

laciniatum, Martr. Pl. Crit. Tarn, 32 = officinale.

laevigatum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 149 = officinale.

lanceolatum, Poir. Encyc. v. 349 = officinale.

lanuginosum, Noé, ex Nym. Consp. 436 = serotinum.

latilobum, DC. Prod. vii. 146 = officinale?

Leontodon, Gueldenst. Reisen, ii. 56; Dum. Fl. Belg. 61 = officinale.

leptocephalum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 270 = palustre.

leucanthum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 815 = bicolor.

leucospermum, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 31 = officinale.

levigatum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 420 = officinale.

libanoticum, DC. Prod. vii. 149 = serotinum.

lyratum, DC. l. c. 148. —Sibir. altaic.

maculatum, Jord. Pugill. Pl. Nov. 117 = officinale.

magellanicum, Comm. ex Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1855) 122. —Reg. Argent.

mexicanum, DC. Prod. vii. 146 = officinale.

microcephalum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 8. —Alger.

microcephalum, Schur, Enum. Pl. Transs. 367 = officinale.

minimum, Heldr. ex Nym. Consp. 437 = officinale.

minimum, Terrac. in Att. Ist. Incoragg. Nap. Ser. II. vi. (1869) 352. —Sicil.; Ital.

montanum, DC. Prod. vii. 145. —As. Min.; Persia.

montanum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 430 = officinale.

nigricans, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 270 = officinale.

obovatum, DC. Rapp. Voy. ii. 83 = officinale.

officinale, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 56. —Reg. temp. bor. et austr.

officinatum, Rupr. Fl. Ingr. 619 = officinale.

Pacheri, Sch. Bip. in Flora, xxxi. (1848) 170 = apenninum.

paludosum, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 215 = palustre.

palustre, DC. Fl. Fr. iv. 45. —Europ.; As. bor.

parvulum, DC. Prod. vii. 149 = officinale.

phymatocarpum, J. Vahl, in Fl. Dan. t. 2298. —Reg. arct.

porphyranthum, Boiss. Fl. Orient. iii. 790. —Reg. Cauc.

pratense, Hegetschw. Fl. Schw. 762 = officinale.

procumbens, Less. in Linnaea, ix. (1834) 181 = palustre.

Pseudo-officinale, Schur, Enum. Pl. Transs. 366 = officinale.

psychrophilum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 48 = crepidiforme.

pumilum, Gaud. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 103 (= *Macrorhynchus pumilus*). —Ins. Falkland.

purpurascens, Schur, Enum. Pl. Transs. 366 = officinale.

pyrenaicum, Reut. Cat. Gr. Genév. (1861) 4 (Quid?). —Mont. Pyren.

pyrenaicum, Timb. ex Nym. Consp. 437 = officinale.

pyrrhopappum, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 19 = serotinum.

Raii, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 426 = palustre.

rubrinerve, Jord. Pugill. Pl. Nov. 115 = officinale.

runcinatum, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) i. 187 = officinale.

salinum, Dum. Fl. Belg. 61 = palustre.

salsugineum, Lamotte, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) 123 = palustre.

Scorzonera, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 270 = palustre.

Scorzonera, Trautv. Fl. Taimyr. 40 = phymatocarpum.

serotinum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 420; Sadl. Fl. Pest. ed. I. ii. 243. —Europ. or.; As. occ.

sinense, Poir. l. c.; DC. Prod. vii. 150 = officinale.

stenocephalum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 790. —Kurdistan.

stenolobum, Stschégel. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 180. —As. bor.

Stevenii, DC. Prod. vii. 149 = officinale.

stipitatum, Sch. Bip. Cich. 76; ex Nym. Consp. 436 = *Chondrilla stipitata*.

sylvaticum, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 525, nomen. —Rossia.

syriacum, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 96 = serotinum.

taraxacoides, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 231 = officinale.

TARAXACUM:—

tenuifolium, Koch, in *Flora*, xxiii. (1840) 374.—Europ.
tonmentosum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861)
101 = *serotinum*.
triviale, Hegetsch. Fl. Schw. 762 = officinale.
udum, Jord. Pugill. Pl. Nov. 114 = palustre.
vulgare, Schrank, Baier. Reise, 11 = officinale.
Wallichii, DC. Prod. vii. 147 = officinale.
Wattii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 402.—Reg. Himal.

TARCHONANTHUS, Linn. Coroll. Gen. 13 (1737).

COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 288.
SALVIASTRUM, Heist. Syst. 16 (1748).
abyssinicus, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
287 = *camphoratus*.
angustissimus, DC. Prod. v. 431 = minor.
camphoratus, Houtt. ex DC. l. c. 430 = *Brachylaena*
elliptica.
camphoratus, Linn. Sp. Pl. 842.—Afr. austr.
dentatus, Eckl. ex DC. Prod. v. 430 = *Brachylaena*
nerifolia.
dentatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 145 = *Brachylaena*
dentata.
ellipticus, Thunb. l. c. = *Brachylaena elliptica*.
ericoides, Linn. f. Suppl. 360 = *Eriocephalus glaber*.
glaber, Linn. l. c. = *Brachylaena dentata*.
lanceolatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 145 = *Brachylaena*
nerifolia.
litakunensis, DC. Prod. v. 431 = *camphoratus*.
minor, Less. Syn. Comp. 208.—Afr. austr.
obovatus, DC. Prod. v. 431 = minor.
procerus, Salisb. Prod. 189 = *camphoratus*.
racemosus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 145 = *Brachylaena*
racemosa.
trilobus, DC. Prod. v. 432.—Afr. austr.

TARDAVEL, Adans. Fam. ii. 145 (1763) = **Sperma-**
coce, Dill. (Rubiace).**TARENAYA**, Rafin. Sylva Tellur. 111 (1838) = **Cleome**,
Linn. (Cappar.).
spinosa, Rafin. l. c. = *C. spinosa*.**TARENNA**, Gaertn. Fruct. i. 139. t. 28 (1788).

RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 86.
CERISCUS, Nees, in *Flora*, viii. (1825) 116.
CHOMELIA, Linn. Gen. ed. I. 55 (1737).
STYLOCORYNE, Wight & Arn. Prod. 400 (1834).
WAHLENBERGIA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 14
(1823).
WEBBERA, Schreb. Gen. 794 (1791).
angolensis, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 89.—
Afr. trop.
conferta, Hiern, l. c. 90.—Afr. trop.
congensis, Hiern, l. c. 91.—Afr. trop.
grandiflora, Hiern, l. c.—Afr. trop.
macrochlamys, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885)
411.—Madag.
mossambicensis, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii.
89.—Afr. trop.
nigrescens, Hiern, l. c. 92.—Afr. trop.
nilotica, Hiern, l. c. 90.—Afr. trop.
nitidula, Hiern, l. c.—Afr. trop.
pallidula, Hiern, l. c. 91.—Afr. trop.
tetramera, Hiern, l. c.—Afr. trop.
zeylanica, Gaertn. Fruct. i. 139. t. 28. f. 3.—Zeylan.

TARIRI, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 37 (1775) = **Pieramnia**,
Sw. (Simarub.).
guianensis, Aubl. l. c. = *P. Tariri*.
polyantha, Baill. Hist. Pl. iv. 412 = *P. polyantha*.**TARPHETA**, Rafin. Fl. Tellur. ii. 103 (1836) = **Stachy-**
tarphe, Vahl (Verben.).**TARRIETIA**, Blume, Bijdr. 227 (1825). *STERCU-*

LIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 218.
ARGYRODENDRON, F. Muell. Fragm. i. 2 (1858).
Argyrodendron, Benth. Fl. Austral. i. 230.—Austral.
javanica, Blume, Bijdr. 227.—Java.
Riedeliana, Oliver, in *Journ. Linn. Soc.* xv. (1876)
98.—Ins. Celebes.
simplicifolia, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 362.—
Malacca.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 401.—Sumatra.
trifoliolata, F. Muell. Fragm. ix. 43.—Austral.

TARSINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed.
I. Art. iv. 4 (Quid?).**TASMANNIA**, R. Br. ex DC. Syst. i. 445 (1818) = **Drimys**,
Forst. (Magnol.).

aromatica, R. Br. l. c. = *D. aromatica*.
dipetala, R. Br. ex DC. Prod. i. 78 = *D. dipetala*.
insipida, R. Br. ex DC. Syst. i. 445 = *D. dipetala*.
monticola, A. Rich. Sert. Astrolab. 50 = *D. dipetala*.
piperita, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ii.
(1858) 110 = *D. piperita*.

TASOBA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 (1836) = **Polygonum**,
Tourn.

arifolia, Rafin. l. c. = *P. arifolium*.
sagittata, Rafin. l. c. 95 = *P. sagittatum*.

TASSADIA, Decne. in DC. Prod. viii. 579 (1844).

ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 756.
Burchellii, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 230.—
Bras.
Colubrina, Decne. in DC. Prod. viii. 579.—Bras.
comosa, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 229.—Bras.
Decaisneana, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 25 =
Metastelma Decaisneana.
floribunda, Decne. in DC. Prod. viii. 580.—Bras.
guianensis, Decne. l. c. 579.—Guian.
lanceolata, Decne. l. c.—Bras.
leptobotrys, Decne. l. c.—Guian.
Martiana, Decne. l. c. 580.—Bras.
neovidensis, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 229.—
Bras.
obovata, Decne. in DC. Prod. viii. 579.—Guian.
Poeppigiana, Decne. l. c. 580.—Bras.
propinqua, Decne. l. c. 579.—Guian.
Selloana, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 231.—Bras.
Sprucei, Fourn. l. c. 229.—Bras.
turiformis, Fourn. l. c. 231.—Bras.

TASSIA, Rich. ex DC. Prod. ii. 487 (1825) = **Tachi-**
galia, Juss. (Legumin.).**TATEA**, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. vi.

(1883) 33. *VERBENACEAE*.
acaulis, F. Muell. Census, Suppl. i. 3, sphalm. = seq.
subcaulis, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral.
vi. (1883) 34.—Austral.

TATEA, Seem. Fl. Vit. 125 (1866) = **Bikkia**, Reinw.

(Rubiace.).
portlandioides, Seem. l. c.—N. Caled.

TATTIA, Scop. Introd. 104 (1777) = **Homalium**,
Jacq. (Samyd.).

ignota, J. F. Gmel. Syst. 836 = *H. Napimoga*.

TAUMASTOS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 9 (1836) =

Libertia, Spreng. (Irid.).
compressus, Rafin. l. c. 10 = *L. formosa*.

TAUOSTALIX, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 933

= **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
herminiostachys, Reichb. f. l. c. = *B. herminiostachys*.

TAURRETTIA, Raensch. Nom. ed. III. 176 (1797),

sphalm. = **Tourrettia**, Juss. (Bignon.).

TAUSCHERIA, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812)

49; et ex DC. Syst. ii. 563 (1821). *CRUCI-*
FERAE, Benth. & Hook. f. i. 94.
desertorum, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. ii. 14. t. 139;
Royle, Illustr. Bot. Himal. 72 = *lasiocarpa*.
gymnocarpa, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 49,
nomen; et ex DC. Syst. ii. 564 = *lasiocarpa*.
lasiocarpa, Fisch. l. c., nomen; et ex DC. l. c. 563.—
Reg. Himal. et Casp.

TAUSCHIA, Preissler, in *Flora*, xi. (1828) 43 = **Horne-**

mannia, Vahl (Vaccin.).
hederaefolia, Preissler, l. c. 44 = *H. martinicensis*.

TAUSCHIA, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 607.

UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 882.
Coulteri, A. Gray & Harv. ex A. Gray, in Bost. Journ.
Nat. Hist. vi. (1850) 211.—Mexic.
nudicaulis, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 608.—
Mexic.
texana, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850)
211 = *Eulophus texanus*.

TAVALLA, Pers. Syn. ii. 633 (1807) = **TAFALLA**, Ruiz
& Pav. = **Hedyosmum**, Sw. (Chloranth.).**TAVERNARIA**, Reichb. Consp. 152 (1828) = seq.**TAVERNIERA**, DC. Mém. Légum. 339. t. 52

(1825?). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 510.
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 206.—
Afr. trop.
aegyptiaca, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 113.—Aegypt.
cuneifolia, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. i. (1836)
332 = *nummularia*.
cyclophylla, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop.
Afr. ii. 141 = *Schimperi*.
ephedroidea, Jaub. & Spach, Illustr. i. 122 = *num-*
mularia.
floribunda, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 17 =
Schimperi.
glabra, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 90.—Persia.
glauca, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1874)
ii. 1214.—Arab.
gonoclada, Jaub. & Spach, Illustr. i. 120 = *num-*
mularia.
incana, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 90 = *nummularia*.
lappacea, DC. Prod. ii. 339.—Arab.
nummularia, DC. Mém. Légum. 340.—Persia; Mesopot.;
Ind. bor. occ.
persica, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 509.
—Persia.
Schimperi, Jaub. & Spach, Illustr. v. 83. t. 474.—
Abyss.
sericophylla, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi.
(1882) 510.—Ins. Socotra.
spartea, DC. Prod. ii. 339 = *nummularia*.
Stockii, Boiss. Fl. Orient. ii. 509.—Beluchist.

TAVOMYTA, Vitm. Summa Pl. vi. 70 (1792), sphalm.
= **Tovomita**, Aubl. (Guttif.).**TAXANTHEMA**, Neck. Elem. i. 115 (1790) = **Statice**,
Linn. (Plumbag.).

aegyptiaca, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 333 = *S. Thouini*.
alata, Sweet, l. c. = *S. Thouini*.
attenuata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *S. at-*
tenuata.
auriculaefolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 332 =
S. auriculaefolia.
australis, R. Br. Prod. 426 = *S. australis*.
bellidifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 332 = *S. ocymi-*
folia.
caroliniana, Sweet, l. c. = *S. Limonium*.
caspia, Sweet, l. c. = *S. caspia*.
conspicua, Sweet, l. c. 333 = *S. speciosa*.
cordata, Sweet, l. c. 332 = *S. cordata*.
dichotoma, Sweet, l. c. 333 = *S. dichotoma*.
echioides, Sweet, l. c. = *S. rorida*.
elata, Sweet, l. c. 332 = *S. elata*.
emarginata, Sweet, l. c. = *S. emarginata*.
ferulacea, Sweet, l. c. 333 = *S. ferulacea*.
flexuosa, Sweet, l. c. = *S. flexuosa*.
globulariaefolia, Sweet, l. c. 332 = *S. globulariae-*
folia.
Gmelini, Sweet, l. c. = *S. Gmelini*.
graminifolia, Sweet, l. c. = *S. graminifolia*.
incana, Sweet, l. c. = *S. incana*.
latifolia, Sweet, l. c. = *S. latifolia*.
Limonium, Sweet, l. c. = *S. Limonium*.
macrophylla, Sweet, l. c. 333 = *S. macrophylla*.
minuta, Sweet, l. c. = *S. minuta*.
monopetala, Sweet, l. c. = *Limoniastrum articulata*.
mucronata, Sweet, l. c. = *S. mucronata*.
oleaefolia, Sweet, l. c. 332 = *S. virgata*.
pectinata, Sweet, l. c. 333 = *S. pectinata*.
purpurata, Sweet, l. c. 332 = *S. purpurata*.
reticulata, Sweet, l. c. 333 = *S. reticulata*.
scabra, Sweet, l. c. 332 = *S. scabra*.
Scoparia, Sweet, l. c. = *S. Gmelini*.
sinuata, Sweet, l. c. 333 = *S. sinuata*.
spathulata, Sweet, l. c. 332 = *S. spathulata*.
speciosa, Sweet, l. c. 333 = *S. speciosa*.
suffruticosa, Sweet, l. c. = *S. suffruticosa*.
tatarica, Sweet, l. c. = *S. tatarica*.
tetragona, Sweet, l. c. 332 = *S. tetragona*.
Thouini, Sweet, l. c. 333 = *S. Thouini*.
viminea, Sweet, l. c. = *S. virgata*.
virgata, Sweet, l. c. = *S. virgata*.
Willdenowiana, Sweet, l. c. 332 = *S. Willdenovii*.

TAXODIUM, Rich. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 298. *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 429. CUPRESSINATA, [Nelson], Senilis, Pinaceae, 61 (1866).

GLYPTOSTROBUS, Endl. Syn. Conif. 69 (1847). SCHUBERTIA, Mirb. in Nouv. Bull. Soc. Philom. iii. (1812) 123. *ascendens*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1833) 182 = distichum. *capense*, Hort. ex Endl. Syn. Conif. 32 = Callitris arborea. *denudatum*, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 182 = distichum. *distichum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 4 = mucronatum. *distichum*, Rich. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 298. —Am. bor. *fastigiatum*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 145 = distichum. *giganteum*, Hort. ex Carr. l. c. 164 = Sequoia sempervirens. *giganteum*, Kellogg & Behr, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 51 = Sequoia gigantea. *heterophyllum*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1833) 184. —China. *Horsfieldii*, Knight, ex Carr. Conif. ed. I. 478 = Podocarpus cupressina. *Hugeli*, Laws. ex Gord. Pinet. 307 = mucronatum. *imbricatum*, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 181 = distichum. *japonicum*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1833) 183 = Cryptomeria japonica. *japonicum*, Dehnhard, ex Gord. Pinet. 89 = heterophyllum. *juniperoides*, Rich. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 664 = Callitris arborea. *Knightii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 198 = distichum. *mexicanum*, Carr. Conif. ed. I. 147 = mucronatum. *microphyllum*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1833) 182 = distichum. *Montezumae*, Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr. i. (1854) 71 = mucronatum. *mucronatum*, Tenore, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. (1853) 355. —Mexic. *nucifera*, Brongn. ex Gord. Pinet. ed. II. 126 = heterophyllum. *nutkaense*, Lamb. ex Endl. Syn. Conif. 198 = Sequoia sempervirens? *pinatum*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 147 = mucronatum. *sempervirens*, Lamb. Pin. 114; ed. II. 107 = Sequoia sempervirens. *sinense*, Forbes, Pinet. Woburn. 179 = heterophyllum. *sinense*, Nois. ex Gord. Pinet. 309 = distichum. *Washingtonianum*, Winslow, in Calif. Farm. (Sept. 1854); ex Hook. Kew Journ. vii. (1855) 29 = Sequoia gigantea.

TAXOTROPHIS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 77. t. 26 (1852) [1856]. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 358. DIPLOCOS, Bur. in DC. Prod. xvii. 215 (1873). TOXOTROPHIS, Planch. in DC. l. c. 208 (1873). *javanica*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 77. —Java. *microphylla*, F. Muell. Fragm. vi. 193 (= *Epicarpurus microphyllus*). —N. Zel. *rectinervis*, F. Muell. l. c. 192 = Aphananthe philippinensis. *Roxburghii*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 78. —Ind. or.; Malaya. *zeylanica*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 264. —Zeylan.

TAXUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 431. VERATAXUS, [Nelson], Senilis, Pinaceae, 168 (1866). *adpressa*, Hort. ex Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 227. —Japan. *aurea*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 93 = baccata. *baccata*, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 167, partim = brevifolia. *baccata*, Linn. Sp. Pl. 1040. —Reg. bor. temp. *baccata*, Thunb. Fl. Jap. 275 = Cephalotaxus drupacea. *Bourcierii*, Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 228 = brevifolia. *brevifolia*, Hort. ex Gord. Pinet. 310 = adpressa.

TAXUS:—

brevifolia, Nutt. N. Am. Sylva, iii. 86. —Am. bor. occ. *canadensis*, Bigel. in Pacif. Rail. Rep. iv. 25 = brevifolia. *canadensis*, Willd. Sp. Pl. iv. 856. —Am. bor. *capensis*, Lam. Encyc. iii. 229 = Podocarpus elongata. *chinensis*, Roxb. Hort. Beng. 73 = Podocarpus chinensis. *colummaris*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 92 = baccata. *contorta*, Griff. Notul. iv. 28 = baccata. *coriacea*, Hort. ex Knight, Syn. Conif. 51 = Cephalotaxus drupacea. *cuspidata*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 108. —Japan. *disticha*, Wender. ex Henk. & Hochst. Syn. Nadelh. 354 = baccata. *Dovastonii*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 518 = baccata. *elegantissima*, Hort. ex Carr. l. c. = baccata. *elongata*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 415; Thunb. Prod. Pl. Cap. 117 = Podocarpus elongata. *empetrifolia*, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 390 = baccata. *erecta*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 518 = baccata. *ericoides*, Hort. ex Carr. l. c. 519 = baccata. *expansa*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 92 = baccata. *falcata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 117 = Podocarpus falcata. *fastigiata*, Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 227 = baccata. *floridana*, Nutt. N. Am. Sylva, iii. 92, in obs.; ed. II. ii. 155. —Florida. *Fortunei*, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 338 = Podocarpus koraiana. *Foxii*, Hort. Angl. ex Carr. Conif. ed. I. 519 = baccata. *globosa*, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 496. —Mexic. *Harringtonia*, Knight, ex Forbes, Pinet. Woburn. 217 = Cephalotaxus pedunculata. *hibernica*, Hook. ex Loud. Arbor. iv. 2066 = baccata. *horizontalis*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 518 = baccata. *imperialis*, Hort. ex Gord. Pinet. 312 = baccata. *Inukaja*, Knight, Syn. Conif. 51 = Cephalotaxus pedunculata. *Jacksonii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 93 = baccata. *japonica*, Hook. ex Gord. Pinet. Suppl. 21 = Cephalotaxus drupacea. *japonica*, Lodd. ex Gord. Pinet. 275 = Cephalotaxus pedunculata. *Lambertiana*, Wall. Cat. n. 6056 = Abies Pindrow. *lanceifolia*, Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1827) 76 = Podocarpus coriacea. *latifolia*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 117 = Podocarpus Thunbergii. *Lindleyana*, A. Murr. in Edinb. N. Phil. Journ. i. (Jan.-Apr. 1855) 294 = brevifolia. *longifolia*, Hort. ex Gord. Pinet. 278 = Podocarpus macrophylla. *lugubris*, Salisb. Prod. 396 = baccata. *macrophylla*, Banks, ex Endl. Syn. Conif. 218 = Podocarpus Thunbergii. *macrophylla*, Thunb. Fl. Jap. 276 = Podocarpus macrophylla. *Makoya*, Forbes, Pinet. Woburn. 218 = Podocarpus macrophylla. *marginata*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 518 = baccata. *Michellii*, Hort. ex Carr. l. c. ed. II. 736 = baccata. *microphylla*, Hort. ex Gord. Pinet. 313 = baccata. *Mitchelli*, Hort. ex Gord. l. c. = baccata. *monstrosa*, Hort. ex Gord. l. c. = baccata. *monstruosa*, Hort. ex Parl. in DC. Prod. xvi. ii. 501 = baccata. *montana*, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 857 = Podocarpus taxifolia. *montana*, Nutt. N. Am. Sylva, iii. 92, in obs.; ed. II. ii. 155 = floridana. *nana*, Hort. ex Parl. in DC. Prod. xvi. ii. 501 = baccata. *nepalensis*, Jacquem. ex Parl. l. c. 500 = baccata. *nucifera*, Hort. ex Parl. l. c. 439 = Glyptostrobus heterophyllus. *nucifera*, Linn. Sp. Pl. 1040 = Torreya nucifera.

TAXUS:—

nucifera, Telfair, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 664 = Podocarpus chinensis. *nucifera*, Wall. Tent. Fl. Nep. 57. t. 44 = baccata. *occidentalis*, Nutt. N. Am. Sylva, iii. t. 108 = brevifolia. *orientalis*, Bertol. Misc. Bot. xxiv. 17 = baccata. *parvifolia*, Wender. Conif. 42; ex Henck. & Hochst. Syn. Nadelh. 361 = adpressa. *patagonica*, Hort. ex Gord. Pinet. 300 = Saxegothea conspicua. *pectinata*, Gilib. Exercit. ii. 417 = baccata. *pendula*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 518 = baccata. *procumbens*, Lodd. Cat. (1836) 67; ex Loud. Arbor. iv. 2067 = canadensis. *pyramidalis*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 519 = baccata. *recurvata*, Laws. ex Gord. Pinet. 313 = baccata. *serratifolia*, Nois. ex Gord. Pinet. Suppl. 43 = Phyllocladus rhomboidalis. *sinensis*, Knight, ex Gord. Pinet. Suppl. 21 = Cephalotaxus pedunculata. *sparsifolia*, Loud. Encyc. Trees, 940 = baccata. *spicata*, Domb. ex Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 76 = Podocarpus andina. *spinulosa*, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 7 = Podocarpus spinulosa. *stricta*, Hort. ex Gord. Pinet. 312 = baccata. *tardiva*, Laws. ex Gord. l. c. 310 = adpressa. *tenuifolia*, Parl. in DC. Prod. xvi. ii. 509 = Podocarpus coriacea. *tomentosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 117 = Grubbia rosmarinifolia. *umbraculifera*, Hort. ex Gord. Pinet. 312 = baccata. *variegata*, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 518 = baccata. *verticillata*, Thunb. Fl. Jap. 276 = Sciadopitys verticillata. *virgata*, Wall. ex Gord. Pinet. 317 = baccata. *Wallichiana*, Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iii. (1837-43) 803. t. 5 = baccata. *Washingtoni*, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 394 = canadensis.

TAYOTUM, Blanco, Fl. Filip. ed. I. (1837) 104; ed. II. 76 (1845). Genus dubium *APOCYNACEARUM*. —Cf. Benth. & Hook. f. ii. 690. *ngirescens*, Blanco, l. c. ed. I. 105. —Ins. Philipp.

TCHIHATCHEWIA, Boiss. in Tchihat Asie Min. Bot. i. 292 (1860). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 93. *isatidea*, Boiss. l. c. —Armenia.

TECLEA, Delile, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 90 = *Toddalia*, Juss. (Rutac.). *nobilis*, Delile, l. c. = *Toddalia nobilis*.

TECMARSIS, DC. Prod. v. 93 (1836) = *Pluchea*, Cass. (Compos.). *Bojeri*, DC. l. c. —Madag.

TECOMA, Juss. Gen. 139 (1789). *BIGNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1044. *ASTIANTHUS*, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. ix. (1823) 262. *CAMPSIDIUM*, Seem. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. x. (1862) 32. *CAMPSIS*, Lour. Fl. Cochinch. 377 (1790). *DENDROPHILA*, Zipp. ex Blume, Rumphia, iv. 34. t. 190 (1848). *DUCOUDRAEA*, Bur. Monog. Bign. 49 (1864). *KOKOSCHKINIA*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 33. *LEUCOXYLON*, Rafin. Sylva Tellur. 77 (1838). *PANDOREA*, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. (1840) 136. *PLATOLARIA*, Rafin. Sylva Tellur. 78 (1838). *STENOLOBUM*, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. ix. (1823) 264. *TECOMARIA*, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 137 (1840). *TECOMELLA*, Seem. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. x. (1862) 30. *actinophylla*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 194. —Cuba. *aesculifolia*, DC. Prod. ix. 221 = *Tabebuia aesculifolia*. *Aesculus*, DC. l. c. 222. —Bras. *africana*, G. Don, Gen. Syst. iv. 224 = *Bignonia africana*.

TECOMA:

- alata*, DC. Rev. Bign. (1838) 24; et Prod. ix. 225 = *T. Guarume*.
alba, Cham. in *Linnaea*, vii. (1832) 655.—Bras.
amboinensis, Blume, *Rumphia*, iv. 35.—Ins. Amboin.
araliacea, DC. Prod. ix. 221.—Bras.
atrovirens, DC. l. c. 220.—Bras.
aurea, DC. l. c. 222.—Bras.
australis, R. Br. Prod. 471.—Austral.
austro-caledonica, Bur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 163.—N. Caled.
azaleaeflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 142 = *rosaeifolia*.
azaleaefolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 224, sphalm. = *praece*.
barbata, DC. Prod. ix. 221.—Venezuela.
Barterii, DC. l. c. 220.—Ind. occ.
bibracteolata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 193.—Cuba.
capensis, Lindl. Bot. Reg. t. 1117.—Afr. austr.
Cariba, Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) II. Beibl. 14.—Bras.
Carianthera, Mart. ex DC. Prod. ix. 225 (= *Lundia intermedia*).—Bras.
ceramensis, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 412.—Ins. Ceram.
chinensis, C. Koch, Dendrol. ii. 1. 307 = *grandiflora*.
chrysantha, DC. Prod. ix. 221.—Venezuela.
chrysotricha, Mart. ex DC. l. c. 216.—Bras.
conspicua, DC. l. c. 221.—Guian.
cuspidata, Blume, *Rumphia*, iv. 35 = *Nyctocalos brunfelsiaeflorus*.
cyrtantha, Mart. ex DC. Prod. ix. 218.—Bras.
Dendrophila, Blume, *Rumphia*, iv. 35.—N. Guin.
digitata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 142.—Mexic.
diversifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 225 = *australis*.
dubia, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 95.—Cuba.
elliptica, DC. Prod. ix. 220.—Bras.
eximia, Miq. in *Linnaea*, xxii. (1849) 803.—Bras.
flavescens, Mart. ex DC. Prod. ix. 216 = *Tabebuia flavescens*.
floribunda, A. Cunn. ex DC. Rev. Bign. (1838) 24; et Prod. ix. 225 = *australis*.
fulgens, Mart. ex DC. Prod. ix. 222.—Bras.
fulva, G. Don, Gen. Syst. iv. 224.—Peruv.; Bolivia.
fusca, DC. Prod. ix. 218 = *Tabebuia fusca*.
Garrocha, Hieron. in *Bot. Acad. Nac. Córdoba*, iv. (1881) 402.—Reg. Argent.
Gaudichaudi, DC. Prod. ix. 223.—N. Granat.
glauca, DC. l. c. = *undulata*.
grandiflora, Loisel. Herb. Amat. v. t. 286.—China; Japon.
grandiflora, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 284 = *Aeschynanthus grandiflora*.
Guarume, DC. Prod. ix. 224.—Peruv.
Guarume, Hook. Bot. Mag. sub t. 4896, in adnot. = *valdiviana*.
Guayacan, Seem. Bot. Voy. Herald, 180 = *Tabebuia Guayacan*.
haemantha, Griseb. Cat. Pl. Cub. 194.—Cuba.
heptaphylla, Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) II. Beibl. 13, 14.—Bras.
heteropoda, DC. Prod. ix. 219.—Peruv.
heterotricha, DC. l. c. = *Tabebuia heterotricha*.
Hillii, F. Muell. Fragm. x. 101.—Austral.
hirsuta, DC. Prod. ix. 222.—Ind. or.
hirta, Mart. ex DC. l. c. = *Bras*.
hypodictyon, DC. l. c. 217.—Bras.
hypoleuca, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 94.—Cuba.
impetiginosa, Mart. ex DC. Prod. ix. 218.—Bras.
incisa, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 284 = *stans*.
insignis, Miq. Stirp. Surin. Sel. 122.—Guian.
Ipe, Liai, Brés. 605 = *ochracea*, obtusata.
jasminoides, Lindl. Bot. Reg. t. 2002; G. Don, Gen. Syst. iv. 225.—Austral.
lasianthera, Mart. ex DC. Prod. ix. 180 = *Lundia cordata*.
lateriflora, Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) II. Beibl. 51 = *Cuspidaria lateriflora*.
Latrobei, F. Muell. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 154, nomen.—Austral.?
lepidophylla, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1862) 524.—Cuba.
lepidota, DC. Prod. ix. 220.—Cuba.
leptophylla, Blume, *Rumphia*, iv. 35.—N. Guin.
leucophila, Mart. ex DC. Prod. ix. 217.—Bras.
leucoxylon, Mart. ex DC. l. c. 219.—Ind. occ.; Guian.
longiflora, Griseb. Cat. Pl. Cub. 194.—Cuba.
longiflora, Mart. ex DC. Prod. ix. 218 = *speciosa*.
loxensis, Benth. Pl. Hartw. 354 = *Delostoma nervosum*.

TECOMA:

- Maximiliani*, Mart. ex DC. Prod. ix. 222.—Bras.
meonantha, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 284 = *australis*.
mexicana, Mart. ex DC. Prod. ix. 218 = *Tabebuia mexicana*.
Meyeriana, DC. l. c. 221.—Guian.
mirabilis, Hort. ex Van Houtte, in Fl. des Serres, xx. (1874) 149 = *valdiviana*.
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 144.—Mexic.
myriantha, DC. Prod. ix. 220.—Bras.
myrtifolia, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1862) 524.—Cuba.
nigricans, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gu.* 1159, nomen.—Guian.
nodosa, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 223 = *Tabebuia nodosa*.
Nyassae, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1351.—Afr. trop.
obtusata, DC. Prod. ix. 217.—Bras.
ochracea, Cham. in *Linnaea*, vii. (1832) 653.—Bras.
ochracea, Mart. ex DC. Prod. ix. 217 = *obtusata*.
ochroxantha, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 12 = *australis*.
Oxleyi, A. Cunn. ex DC. Prod. ix. 225 = *australis*.
Pandorea, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 664 = *australis*.
parviflora, Mart. ex DC. Prod. ix. 215 (= *Craterolecoma parviflora*).—Bras.
Patrisiana, DC. l. c. 221.—Guian.
pentaphylla, Juss. Gen. 139 = *Tabebuia pentaphylla*.
Petersii, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 193, in obs. = *capensis*.
platyantha, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 447.—Jamaic.
radicans, Juss. Gen. 139.—Am. bor.
rosaeifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 143.—Peruv.
rosea, Bertol. Fl. Guatim. 25 = *Tabebuia rosea*.
Salzmanni, DC. Prod. ix. 219.—Bras.
sambucifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 143 = *stans*.
sanguinea, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 96.—Cuba.
serratifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 224.—Ind. occ.
setulosa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 193.—Cuba.
sinensis, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 135 = *grandiflora*.
sorbifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 144 = *mollis*.
speciosa, DC. ex Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) II. Beibl. 13.—Bras.
spectabilis, Planch. & Linden, ex Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 233. t. 948.—Ind. occ.; Venezuela.
spiralis, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 194.—Cuba.
splendida, Spreng. Syst. ii. 834 = *Esterhazyia splendida*.
squamellulosa, DC. Prod. ix. 220.—Bras.
stans, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 257 = *T. Garrocha*.
stans, Juss. Gen. 139.—Am. bor. et austr.
suaveolens, G. Don, Gen. Syst. iv. 224 = *Stereospermum suaveolens*.
subvernica, DC. Prod. ix. 219.—Bras.
Tagliabuana, Vis. in Att. Ist. Venet. Sc. Ser. III. iv. (1858-59) 135.—Hab.?
Thunbergi, Carr. in Rev. Hort. (1876) 440.—Hab.?
toxophora, Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) II. Beibl. 15.—Bras.
trachycarpa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 192.—Cuba.
trichocalycina, DC. Prod. ix. 221.—Bolivia.
triphylla, Mart. ex DC. l. c. 215 = *Tabebuia triphylla*.
uliginosa, Mart. ex DC. l. c. 212 = *Tabebuia uliginosa*.
umbellata, Sond. in *Linnaea*, xxii. (1849) 562.—Bras.
undulata, G. Don, Gen. Syst. iv. 223.—Oriens; Ind. bor. occ.
uspallatensis, Mart. ex DC. Prod. ix. 235 = *Argylia uspallatensis*.
valdiviana, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 14.—Chili.
velutina, Lindl. in Gard. Chron. (1855) 820 = *stans vel mollis*?
venusta, Lem. Hort. Univ. (Mai 1843) 1 = *Bignonia venusta*.
viminalis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 497.—Mexic.
xylocarpa, G. Don, Gen. Syst. iv. 225 = *Stereospermum xylocarpum*.
Zeyheri, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 138 (Quid?).—Hab.?

TECOMARIA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 137 (1840) = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).
capensis, Spach, l. c. = *Tecoma capensis*.
fulva, Seem. in Journ. Bot. i. (1863) 19 = *Tecoma fulva*.

TECOMARIA:

- Krebsii*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 193, in obs. = *Tecoma capensis*.
Petersii, Klotzsch, l. c. 192 = *Tecoma capensis*.
rosaeifolia, Seem. in Journ. Bot. i. (1863) 20 = *Tecoma rosaeifolia*.

TECOMELLA, Seem. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. x. (1862) 30 = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).
Bulweri, F. Muell. Fragm. iv. 147 = *Diplanthera tetraphylla*.
undulata, Seem. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. x. (1862) 30 = *Tecoma undulata*.

TECOPHILAEA, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxix. (1836) 19. t. 55. **HAEMODORACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 680.

DISTREPTA, Miers, Trav. Chil. ii. 529 (1826), nomen prius.
PHYGANTHUS, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 71. t. 200 (1838).
POEPPIGIA, Kunze, in Reichb. Consp. 212^a (1828).
albida, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 505 = *violaeiflora*.
cyaneo-crocea, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 496, sphalm. = seq.
cyanocrocus, Leyb. in *Bonplandia*, x. (1862) 370.—Chili.
violaeiflora, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxix. (1836) 20.—Chili.

TECOPHILEA, Herb. Amaryll. 69 (1837) = *praece*.

TECTICORNIA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 65 (1880). **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
cinerea, Hook. f. l. c.—Austral.

TECTONA, Linn. f. Suppl. 20, 151 (1781). **VERBENACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1152.

NAUTEA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3.
THEKA, Adans. Fam. ii. 445 (1763).
grandis, Linn. f. Suppl. 151.—Ind. or.; Burma.
Hamiltoniana, Wall. Pl. As. Rar. iii. 68. t. 294.—Ind. or.
philippinensis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1152.—Ins. Philipp.
ternifolia, Buch.-Ham. ex Wall. Pl. As. Rar. iii. 68 = *Hamiltoniana*.
Theca, Lour. Fl. Cochinch. 137 = *grandis*.

TECTONIA, Spreng. Anleit. ii. II. 893 (1818) = *praece*.

TEEDIA, Rudolphi, in Schrad. Journ. ii. (1799) 288, 289. **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 936.

BORCKHAUSENIA, Roth, Catalect. fasc. ii. 56 (1800).
lucida, Rudolphi, in Schrad. Journ. ii. (1799) 228.—Afr. austr.
pubescens, Burch. in Bot. Reg. t. 214.—Afr. austr.

TEESDALEA, Aschers. Fl. Brandenb. 58 (1864) = seq.

TEESDALIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 83 (1812). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 92.
FOLIS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 190 (1867).
GUELFINIA, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 35 (1812).

caulescens, Holl, in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 21 = *nudicaulis*.
Iberis, DC. Syst. ii. 392 = *nudicaulis*.
irregularis, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 693 = *nudicaulis*.
Lepidium, DC. Syst. ii. 392 = *regularis*.
nudicaulis, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 83.—Europ.; Reg. Mediterr.
petraea, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 659 = *Hutchinsia petraea*.
regularis, Sm. in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 286.—Reg. Mediterr.; As. Min.

TEGANIUM, Schmid. Ic. Pl. 67. t. 18 (1747) = **Nolana**, Linn. (Convolv.).
procumbens, Schmid. Ic. Pl. ed. Kell. (1762) 67 = *N. prostrata*.

TEGANOCHARIS, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) I. Intell. 42, sphalm. = **TENAGOCCHARIS**, Hochst. = **Butomopsis**, Kunth (Alismac.).

TEGNERIA, Lilja, Flora oefver Sver. Od. Vext. 76 (1839) = *Calandrinia*, H. B. & K. (Portulac.). *discolor*, Lilja, l. c. 77 = *C. discolor*. *speciosa*, Lilja, l. c. 76 = *C. Menziesii*.

TEICHMEYERIA, Scop. Introd. 267 (1777) = *Gustavia*, Linn. (Myrtac.).

TEICHOSTEMMA, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 (1814) = *Vernonia*, Schreb. (Compos.). *fruticosum*, R. Br. l. c. = Abyss.

TEINOSOLEN, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 61 (1873). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c. *grandiflora*, Hook. f. in *Herb. Kew.*—Bolivia. *macrosepala*, Hook. f. l. c. = Bolivia. *Pearcei*, Hook. f. l. c. = Bolivia.

TEINOSTACHYUM, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 142. t. 3. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1213. *attenuatum*, Munro, l. c. 143.—Ind. or. *Griffithii*, Munro, l. c. = Ind. or. *maculatum*, Trimen, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 273.—Zeylan. *schizostachyoides*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) ii. 89 = *Melocanna Kurzii*. *Wightii*, Munro, ex *Bedd. Fl. Sylv.* ii. 233. t. 323.—Ind. or.

TEKTONA, Linn. f. Suppl. 20 (1781) = *Tectona*, Linn. f. (Verben.).

TELANTHERA, R. Br. in Tuckey, Congo, 477, in nota (1818). *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 88. *ADOKETON*, Rafin. New Fl. Am. i. 65 (1836). *AMARANTESIA*, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1869) 102. *BRANDESIA*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 25. t. 125 (1826). *BUCHOLZIA*, Mart. l. c. 49. t. 147 (1826). *STIREMIS*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1836). *albida*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 367.—Reg. Argent. *amoena*, Regel, Gartenfl. (1869) 101.—Bras. *andicola*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 373.—Peruv. *angustata*, Anderss. Eugenies Resa, Bot. 61 = *strictiuscula*. *arenaria*, Casar. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. i. 185 = *Alternanthera paronychioides*. *argentea*, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 168 = *echinocephala*. *Bettzichiana*, Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1862) 28; *Gartenfl.* (1862) 178.—Bras. ? *brasiliensis*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 382 = *Mogiphanes straminea*. *canescens*, Moq. l. c. 368.—Venezuela. *capituliflora*, Moq. l. c. 381.—N. Granat.; Peruv. *caracasana*, Moq. l. c. 370.—Venezuela. *cinerascens*, Moq. l. c. 372 = *mexicana*. *Crucis*, Moq. l. c. 362.—Ind. occ. *cyclophylla*, Seub. in Mart. Fl. Bras. v. i. 174.—Bras. *densiflora*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 366.—Am. trop. *dentata*, Moq. l. c. 378 = *Mogiphanes brasiliensis*. *diffusa*, Moq. l. c. 382 = *Mogiphanes ramosissima*. *echinocephala*, Moq. l. c. 373.—Ins. Galapag. *elongata*, Moq. l. c. 372.—Bras. *eupatorioides*, Remy, in *C. Gay, Fl. Chil.* v. 223.—Chili. *ficoidea*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 363.—Am. trop. *filifolia*, Moq. l. c. 368.—Ins. Galapag. *flavescens*, Moq. l. c. 382 = *Mogiphanes flavescens*. *flavicomma*, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 166.—Ins. Galapag. *floridana*, Chapm. Fl. S. U. St. 383.—Florida. *frutescens*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 365.—Am. trop. *glauescens*, Moq. l. c. 369.—Ins. Galapag. *glomerata*, Moq. l. c. 376 = *pubiflora*. *gomphrenoides*, Moq. l. c. 377.—Peruv. *gracilis*, Moq. l. c. 375.—Mexic. *grandifolia*, Moq. l. c. 376.—Mexic. *hirtula*, Moq. l. c. 380 = *Mogiphanes hirtula*. *junciflora*, Remy, in *C. Gay, Fl. Chil.* v. 224.—Chili.

VOL. II.

TELANTHERA :—

lanceolata, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 371.—N. Granat. *longipes*, Moq. l. c. 370 = *Alternanthera longipes*. *lupulina*, Moq. l. c. 374.—Peruv. *luzuloides*, Moq. l. c. 378.—Bolivia. *manillensis*, Walp. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 404 = *frutescens*. *maritima*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 364.—Am. trop.; Afr. trop. *Martii*, Moq. l. c. 374.—Bras. *martinicensis*, Moq. l. c. 366.—Ins. Martinic. *mexicana*, Moq. l. c. 372.—Mexic. *Meyeriana*, Regel & Koern. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 24.—Peruv. *microcephala*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 371.—Mexic. *minutiflora*, Seub. in Mart. Fl. Bras. v. i. 177.—Bras. *Moguini*, Webb, ex Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 379 = *Mogiphanes villosa*. *multicaulis*, Moq. l. c. 380 = *Mogiphanes straminea*. *nana*, Moq. l. c. 374.—Peruv. *nodifera*, Moq. l. c. 367.—Reg. Argent. *nudicaulis*, Moq. l. c. 369.—Ins. Galapag. *obovata*, Moq. l. c. 370.—Mexic. *paniculata*, Moq. l. c. 377.—N. Granat. *paraguayensis*, Parodi, in *Anal. Soc. Cient. Argent.* v. (1878) 315; *Contrib.* 83.—Paraguay. *peruviana*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 366.—Peruv. *philoxeroides*, Moq. l. c. 362.—Bras. *picta*, C. Koch, *Wochenschr.* ix. (1866) 15 = *Bettzichiana*. *polygonoides*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 363.—Am. trop. *polygonoides*, Seem. Bot. Voy. Herald, 407 = *Alternanthera sessilis*. *porrigens*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 377.—Peruv. *praelonga*, Moq. l. c. 369.—Bras. *puberula*, Moq. l. c. 372.—Bras. *pubiflora*, Moq. l. c. 375.—Am. trop. *pungens*, Moq. l. c. 371 = *Alternanthera achyrantha*. *pyncantha*, Moq. l. c. 376.—Mexic. *ramosissima*, Moq. l. c. 381 = *Mogiphanes ramosissima*. *Regelii*, Seub. in Mart. Fl. Bras. v. i. 177.—Bras. *rufa*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 375.—Bras. *serpyllifolia*, Moq. l. c. 373.—Ind. occ. *strictiuscula*, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 166.—Ins. Galapag. *strigosa*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 370.—Java. *tomentosa*, Moq. l. c. 380.—Peruv. *truxillensis*, Moq. l. c. 367.—Peruv. *versicolor*, Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1868) 83.—Bras. *vestita*, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 169.—Ins. Galapag. *villosa*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 379.—Peruv. *virgata*, Moq. l. c. 382 = *Mogiphanes straminea* ?

TELEIANDRA, Nees & Meyen, in *Linnaea*, viii. (1833) 46 = *Ocotea*, Aubl. (Laurin.). *glauca*, Nees & Meyen, l. c. (= *Oreodaphne Teleiandra*).—Bras.

TELEIANTHERA, Endl. Gen. 301 (1837) = *Telantthera*, R. Br. (Amarant.).

TELEKIA, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 149 (1816) = *Bupthalamum*, Linn. (Compos.). *africana*, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 201 = *Anisoppapus africanus*. *cordifolia*, DC. Prod. v. 485 = *B. speciosum*. *ovata*, C. Koch, in *Linnaea*, xxiii. (1850) 712 = *B. speciosum*. *speciosa*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 150 = *B. speciosum*. *speciosissima*, DC. Prod. v. 485 = *B. speciosissimum*.

TELELOPHUS, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 353 (1867) = *Seseli*, Linn. (Umbell.). *tenuifolius*, Dulac, l. c. (= *Dethawia tenuifolia*).—Mont. Pyren.

TELEPHIASTRUM, Medic. Phil. Bot. i. 100 (1789) = *Anacampseros*, Linn. (Portulac.).

TELEPHIOIDES, Tourn. ex Moench, Meth. Suppl. 310 (1802) = *Andrachne*, Linn. (Euphorb.). *procumbens*, Moench, l. c. = *A. Telephioides*.

TELEPHIUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *FICOIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 857.

MEROPHRAGMA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 365 (1867). *album*, *Gueldenst. Reise*, ii. 209.—Ross. *alternifolium*, DC. Prod. iii. 366, sphalm. = *oppositifolium*. *alternifolium*, Moench, Meth. 231 = *Imperati*. *glandulosum*, Bertol. Misc. Bot. i. 18.—Assyria. *Imperati*, Linn. Sp. Pl. 271.—Reg. Mediterr.; Oriens. *laxiflorum*, DC. Prod. iii. 366 = *Orygia decumbens*. *madagascariense*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1844) 347.—Madag. *maximum*, Eichw. Skizze, 159 = *Sedum maximum*. *oligospermum*, Steud. ex Boiss. Fl. Orient. i. 754.—Kurdist. *oppositifolium*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 388.—Afr. bor. *orientale*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 11 = *Imperati*. *purpureum*, Eichw. Skizze, 159 = *Sedum Telephium*. *repens*, Lam. Fl. Fr. iii. 71 = *Imperati*. *sphaerospermum*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 12.—Aegypt.; Arab. *triphylum*, Eichw. Skizze, 159 = *Sedum Telephium*.

TELESIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 41 (1836) = *Zexmenia*, La Llave (Compos.). *aurea*, Rafin. l. c. = *Z. aurea*.

TELESILLA, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1083 (1848), nomen. *ASCLEPIADEAE*. *cynanchioides*, Klotzsch, l. c.—Guian.

TELESMIA, Rafin. Alsog. Am. 15 (1838) = *Salix*, Tourn. *hermaphrodita*, Rafin. l. c. = *S. pentandra*.

TELESONIX, Rafin. Fl. Tellur. ii. 69 (1836) = *Saxifraga*, Tourn. *Jamesi*, Rafin. l. c. = *S. Jamesii*.

TELESTRIA, Rafin. Sylva Tellur. 122 (1838) = *Bauhinia*, Linn. (Legumin.). *purpurea*, Rafin. l. c. = *B. purpurea*. *racemosa*, Rafin. l. c. = *B. racemosa*.

TELFAIRIA, Hook. Bot. Mag. t. 2751–2752 (1827). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 821. *AMPELOSCYOS*, Thou. Hist. Vég. Isles Afr. Austr. 68. t. 22 (1807). *JOLIFFIA*, Boj. ex Delile, in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* iii. (1827) 314. t. 6. *occidentalis*, Hook. f. in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 524.—Afr. trop. *pedata*, Hook. Bot. Mag. t. 2751–2752.—Afr. trop.

TELFAIRIA, Newm. ex Hook. Bot. Misc. i. (1830) 291 = *Buettneria*, Loefl. *volubilis*, Newm. ex Hook. l. c. = *B. heterophylla*.

TELINA, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 67 (1835) = *Lotononis*, Eckl. & Zeyh. (1836) (Legumin.). *angustifolia*, E. Mey. l. c. 70 = *L. angustifolia*. *brevifolia*, Eckl. & Zeyh. ex Drège, in *Linnaea*, xix. (1847) 639.—Afr. austr. *Capnitidis*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 69 = *L. Capnitidis*. *cytisoides*, E. Mey. l. c. 68 = *L. cytisoides*. *ericaarpa*, E. Mey. l. c. = *L. cytisoides*. *excisa*, E. Mey. l. c. 70 = *L. prostrata*. *genuflexa*, E. Mey. l. c. 69 = *L. genuflexa*. *heterophylla*, E. Mey. l. c. = *L. azurea*. *prostrata*, E. Mey. l. c. = *L. prostrata*. *striata*, E. Mey. l. c. 68 = *L. carnosia*. *varia*, E. Mey. l. c. 70 = *L. varia*. *villosa*, E. Mey. l. c. = *L. villosa*.

TELINARIA, Presl, Bot. Bemerk. 49 (1844); in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 566 = *Cytisus*, Linn. (Legumin.). *acanthoclada*, Presl, l. c. 136 = *Genista acanthoclada*. *albida*, Presl, l. c. = *Genista albida*. *anglica*, Presl, l. c. = *Genista anglica*. *aprutia*, Presl, l. c. = *Genista Michellii* ? *aspalathoides*, Presl, l. c. = *Genista aspalathoides*. *biflora*, Presl, l. c. = *C. Fontanesii*. *canariensis*, Presl, l. c. 49 = *C. canariensis*. *candicans*, Presl, l. c. = *C. candicans*. *cinerea*, Presl, l. c. 136 = *Genista cinerea*. *congesta*, Presl, l. c. 49 = *Genista congesta*. *Cumingii*, Presl, l. c. 136 = *Anarthrophyllum Cumingii*.

TELINARIA :—

- florida*, Presl, Bot. Bemerck. 136 = *Genista florida*.
Friedrichsthaliana, Presl, l. c. = *Genista acanthoclada*.
hispanica, Presl, l. c. = *Genista hispanica*.
holopetala, Presl, l. c. = *Genista radiata*.
horrida, Presl, l. c. = *Genista horrida*.
humifusa, Presl, l. c. = *Genista humifusa*.
linifolia, Presl, l. c. 49 = *Cytisus linifolius*.
Lobelii, Presl, l. c. 136 = *Genista aspalathoides*.
pilosa, Presl, l. c. = *Genista pilosa*.
radiata, Presl, l. c. 135 = *Genista radiata*.
ramosissima, Presl, l. c. 49 = *C. canariensis*.
rosmarinifolia, Presl, l. c. = *C. rosmarinifolius*.
sagittalis, Presl, l. c. 136 = *Genista sagittalis*.
Salzmanni, Presl, l. c. 49 = *Genista aspalathoides*.
sericea, Presl, l. c. 136 = *Genista sericea*.
stenopetala, Presl, l. c. 49 = *Genista stenopetala*.
triquetra, Presl, l. c. = *Genista triquetra*, L'Herit.
umbellata, Presl, l. c. 135 = *Genista umbellata*.
virgata, Presl, l. c. 49 = *Genista virgata*.

TELINE, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 342; Phil. Bot. i. 203 (1789) = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).

- canariensis*, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 37 = *C. canariensis*.
candicans, Medic. Phil. Bot. i. 203 = *C. candicans*.
candidum, Steud. Nom. ed. II. ii. 665, sphalm. = *praec.*
congesta, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 40 = *Genista congesta*.
linifolia, Webb & Berth. l. c. 41 = *C. linifolius*.
maderensis, Webb & Berth. l. c. 37 = *C. maderensis*.
medicagoides, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 342 = *C. candicans*?
monspessulana, C. Koch, Dendrol. i. 30 = *C. monspessulanus*.
ramosissima, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 38 = *C. canariensis*.
rosmarinifolia, Webb & Berth. l. c. 43. t. 44 = *C. rosmarinifolius*.
stenopetala, Webb & Berth. l. c. 39. t. 45 = *Genista stenopetala*.

TELIOSTACHYA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 71. t. 8 (1847) = **Lepidagathis**, Willd. (Acanth.).
alopecuroidea, Nees, in DC. Prod. xi. 263 = *L. alopecuroidea*.

- alopecuroides*, Nees, l. c. 262 = *praec.*
cataractae, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 72. — *Bras.*
diffusa, Nees, l. c. — *Bras.*
hyssopifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 481 = *L. hyssopifolia*.
laguroidea, Nees, in DC. Prod. xi. 264 = *L. laguroidea*.
lanceolata, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 74. — *Bras.*
lopecuroidea, Nees, l. c. 72, sphalm. = *L. alopecuroidea*.
microcarpa, Nees, l. c. 73. — *Bras.*

TELIPODUS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (1836) = **Philo-dendron**, Schott (Aroid.).
grandifolius, Rafin. l. c. = *P. Simsii*.

TELIPOGON, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 335. t. 75. (1815). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 587.

- Alberti, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 27. — *N. Granat.*
andicola, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 239. — *Ecuador.*
angustifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 336. t. 75. — *N. Granat.*; *Venezuela.*
antioquiensis, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 72. — *N. Granat.*
Astroglossus, *Reichb. f. Xenia Orch.* i. 16. t. 7 = *Trichoceros Astroglossus*.
asuayanus, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 71. — *Ecuador.*
aureus, *Lindl. in Benth. Pl. Hartw.* 150. — *Ecuador.*
auritus, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 69. — *N. Granat.*
Benedicti, *Reichb. f. l. c. 3.* — *Bolivia.*
Boissierianus, *Reichb. f. in Bonplandia*, iv. (1856) 213. — *Peruv.*
Bowmani, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 69. — *N. Granat.*
Bruchmuelleri, *Reichb. f. l. c. 28.* — *N. Granat.*
chrysocrates, *Reichb. f. l. c. 4.* — *N. Granat.*
Croesus, *Reichb. f. l. c. 70.* — *N. Granat.*

TELIPOGON :—

- dendriticus*, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 6. — *Ecuador.*
dubius, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 104. — *N. Granat.*
falcatus, *Linden & Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 280. — *N. Granat.*
felinus, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 4. — *Venezuela.*
Fritillum, *Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia*, ii. (1854) 101. — *Peruv.*
Gustavi, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 105. — *N. Granat.*
gymnopolis, *Reichb. f. l. c. 70.* — *Peruv.*
Hartwegii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 6. — *Ecuador.*
hastatus, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 69. — *N. Granat.*
Hausmanni, *Reichb. f. l. c. 70* = *seq.*
Hausmannianus, *Reichb. f. in Bonplandia*, ix. (1861) 213. — *N. Granat.*
hemimelas, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 72. — *N. Granat.*
ionopogon, *Reichb. f. l. c. 27.* — *Ecuador.*
Klotzscheanus, *Reichb. f. in Linnaea*, xxii. (1849) 851. — *N. Granat.*
latifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 336. — *Peruv.*
latifolius, *Lindl. Orch. Linden.* 23 = *Hausmannianus*.
macroglossus, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 71. — *Ecuador.*
muscaeus, *Reichb. f. l. c. 3.* — *N. Granat.*
nitens, *Reichb. f. l. c. 4.* — *N. Granat.*
obovatus, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t. 27. — *Peruv.*
pachensis, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 105. — *N. Granat.*
pamplonensis, *Reichb. f. Xenia Orch.* i. 232. — *N. Granat.*
Papilio, *Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia*, ii. (1854) 101. — *Peruv.*
Patini, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 70. — *N. Granat.*
pogonostalis, *Reichb. f. l. c. 72.* — *Ecuador.*
polymerus, *Reichb. f. l. c. 4.* — *N. Granat.*
polyrrhizus, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 6. — *Ecuador.*
pulcher, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 105. — *N. Granat.*
radiatus, *Reichb. f. l. c. 70.* — *Peruv.*
Roelzii, *Reichb. f. l. c. 4.* — *Venezuela.*
tesselatus, *Lindl. in Benth. Pl. Hartw.* 150. — *Peruv.*
Wallisii, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 104. — *N. Granat.*
Warszewiczii, *Reichb. f. Xenia Orch.* i. 231 (Warszewiczii). — *Ecuador.*
zephyrinus, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 71. — *N. Granat.*

TELIS, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Trigonella**, Linn. (Legumin.).

TELLIMA, R. Br. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 765, in obs. (1823). **SAXIFRAGEAE**, Benth. & Hook. f. i. 637.

- LITHOFRAGMA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 26.
LITHOPHRAGMA, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 583 (1840).
PLEURENDOTRIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 73 (1836).
affinis, A. Gray, in Bot. Calif. i. 198. — *Am. bor. occ.*
Bolanderi, A. Gray, l. c. — *Calif.*
Cymbalaria, Steud. Nom. ed. II. ii. 665; Walp. Rep. ii. 372. — *Am. bor. occ.*
glabra, Steud. Nom. l. c.; Walp. l. c. 371 = *tenella*.
grandiflora, R. Br. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 765, in obs.; Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1178. — *Am. bor. occ.*
heterophylla, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346. — *Calif.*
parviflora, Hook. Fl. Bor. Am. i. 239. t. 78 A. — *Am. bor. occ.*
tenella, Steud. Nom. ed. II. ii. 665; Walp. Rep. ii. 371. — *Am. bor. occ.*

TELMATOPHACE, Schleid. in Linnaea, xiii. (1839) 391 = **Lemna**, Linn.
arrhiza, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 70 = *L. gibba*.
cylindracea, Welw. ex Hegelm. Lemnaceen, 123 = *Wolffia cylindracea*.

TELMATOPHACE :—

- gibba*, Schleid. in Linnaea, xiii. (1839) 391 = *Lemna gibba*.
gibbosa, Montand. Guide Bot. 308 = *L. gibba*.
orbicularis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 70 = *L. polyrrhiza*.
polyrrhiza, Godr. Fl. Lorr. ed. I. iii. 18; ed. II. ii. 327 = *L. polyrrhiza*.
transsilvanica, Schur, Enum. Pl. Transs. 635 = *L. polyrrhiza*.

TELMATOPHILA, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789) = **Seheuchzeria**, Linn. (Naiad.).

TELMATOPHILA, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 170 (1873). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 236.
Scolymastrum, Mart. ex Baker, l. c. — *Bras.*

TELMATOPHACE, Ball. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 685, sphalm. = **TELMATOPHACE**, Schleid. = **Lemna**, Linn.

TELMINOSTELMA, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 218 (1885). **ASCLEPIADEAE**.
roulinioides, Fourn. l. c. — *Bras.*

TELISSA, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 14 (1842) = **Sedum**, Tourn. (Crassul.).
microcarpa, Boiss. Fl. Orient. ii. 795 = *Crassula microcarpa*.
sedoides, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 15 = *Crassula microcarpa*.

TELOGYNE, Baill. Etud. Gén. Euph. 327 (1858) = **Trigonostemon**, Blume (Euphorb.).
indica, Baill. l. c. 328 = *Trig. indicus*.

TELOPEA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 197. **PROTEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 184.
HYLOGYNE, Salisb. in Knight, Prot. 126 (1809), *nomen prius*.
oreades, F. Muell. Fragm. ii. 170. — *Austral.*
speciosissima, R. Br. in Trans. Soc. Linn. x. (1810) 198. — *Austral.*
truncata, R. Br. l. c. — *Tasman.*

TELOPEA, Soland. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 345 (1858) = **Aleurites**, Forst. (Euphorb.).
perspicua, Soland. ex Seem. Fl. Vit. 223 = *A. triloba*.

TELOPOGON, Mutis, ex Spreng. Anleit. ii. i. 291 (1817) = **Telipogon**, H. B. & K. (Orchid.).

TELOXIS, Reichb. Handb. 238 (1837) = *seq.*

TELOXYS, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 289, t. 10 = **Chenopodium**, Tourn.
aristata, Moq. l. c. = *C. aristatum*.
cornuta, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 129 = *C. cornutum*.

TELUKRAMA, Rafin. Alsog. Am. 64 (1838) = **Cornus**, Tourn.
obovata, Rafin. l. c. (Quid?). — *Am. bor.*

TEMA, Adans. Fam. ii. 496 (1763) = **Panicum**, Tourn. (Gramin.).

TEMECARPUS, Proc. Linn. Soc. (1882-83) 2, err. typ. = **Semecarpus**, Linn. (Anacard.).

TEMMINCKIA, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. i. (1851) 141 = **Scaevola**, Linn. (Gooden.).
Chamissoniana, De Vriese, l. c. 143 = *S. Chamissoniana*.
ciliata, De Vriese, l. c. 144 = *S. Chamissoniana*.
Gaudichaudii, De Vriese, l. c. = *S. Gaudichaudii*.
macrophylla, De Vriese, l. c. 146 (Quid?). — *N. Zel.*
Menziesiana, De Vriese, l. c. 144 = *S. Chamissoniana*.
micrantha, De Vriese, l. c. 145 = *S. micrantha*.
mollis, De Vriese, l. c. 147 = *S. mollis*.
tomentosa, De Vriese, l. c. 148 = *S. tomentosa*.

TEMNADENIA, Miers, Apocyn. S. Am. 207 (1878). **APOCYNACEAE**.
annularis, Miers, l. c. 216 = *Prestonia annularis*.
bicruva, Miers, l. c. 208 = *Echites varia*.
cordata, Miers, l. c. 212 = *Echites cordata*.

TEMNADENIA :—

- corrugulata, *Miers, Apocyn. S. Am.* 215.—Bras.
Franciscea, Miers, l. c. 212 = *Echites varia*.
glaucescens, Miers, l. c. 214 = *Mandevilla oaxacana*.
lasiocarpa, Miers, l. c. 210 = *Mandevilla hispida*.
leptoloba, Miers, l. c. 211 = *Echites leptoloba*.
Lobbiana, Miers, l. c. 209 = *Mandevilla hispida*.
pallidiflora, Miers, l. c. 211 = *Echites varia*.
palustris, Miers, l. c. 213 = *Echites tomentosa*.
parviflora, Miers, l. c. 215 = *Prestonia parviflora*.
quinquangularis, Miers, l. c. 217 = *Prestonia quin-*
quangularis.
Riedelii, Miers, l. c. 216 (= *Haemadictyon Riedelii*).
—Bras.
secundiflora, Miers, l. c. 211 = *Echites secundiflora*.
semidigyna, Miers, l. c. 213 = *Echites semidigyna*.
solanifolia, Miers, l. c. 214 (= *Haemadictyon solani-*
folium).—Bras.
stellaris, Miers, l. c. 210 = *Echites stellaris*.
tenuicula, Miers, l. c. 216.—Bras.
tomentosa, Miers, l. c. 213 = *Echites tomentosa*, *Vahl*.
violacea, Miers, l. c. 208 = *Echites violacea*.
xanthostoma, Miers, l. c. 212 = *Echites xanthostoma*.

TEMNOCYDIA, Mart. ex DC. Prod. ix. 143 (1845) = **Bignonia**, Tourn.

- aequinoctialis*, Mart. l. c. 155 = *B. aequinoctialis*.
Carajura, Mart. l. c. 185 = *Arabidaea rosea*.
densiflora, Mart. l. c. 181 = *Lundia densiflora*.
elliptica, Mart. l. c. 156 = *B. Martusiana*.
flavida, Mart. l. c. 168 = *B. flavida*, *flava*.
laserpitifolia, Mart. l. c. = *B. laserpitifolia*.
spectabilis, Mart. l. c. 155 = *B. aequinoctialis*.

TEMNOPTERYX, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 72 (1873). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
sericea, Hook. f. l. c.—Afr. trop.

TEMPLETONIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 269 (1812). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 474.

- NEMATOPHYLLUM*, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 20.
aculeata, Benth. *Fl. Austral.* ii. 170.—Austral.
Drummondii, Benth. l. c. 169.—Austral.
egena, Benth. l. c. 170.—Austral.
glauca, Sims, Bot. Mag. t. 2088 = *retusa*.
Hookeri, Benth. *Fl. Austral.* ii. 170.—Austral.
Muelleri, Benth. l. c. 169.—Austral.
retusa, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 269.—Austral.
sulcata, Benth. *Fl. Austral.* ii. 171.—Austral.

TEMU, Berg, in Linnaea, xxx. (1859–60) 710 = **Myrtus**, Tourn.
Cruckshanksii, Berg, l. c. 711 = *Eugenia Cruckshanksii*.
divaricatum, Berg, l. c. = *Eugenia divaricata*, Berg.

TEMUS, Molina, Sagg. Chile, 178 (1782) = **Myrtus**, Tourn.
moschata, Molina, l. c.—Chili.

TENAGEIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789); Reichb. Ic. Fl. Germ. ix. 22. t. 416 (1847) = **Juncus**, Tourn.
bufonia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 172 = *J. bufonius*.
bulbosa, Fourr. l. c. = *J. supinus*.
Gerardi, Fourr. l. c. = *J. Gerardi*.
multiflora, Fourr. l. c. = *J. subulatus*.
ranaria, Fourr. l. c. = *J. bufonius*.
sphaerocarpa, Reichb. Ic. Fl. Germ. ix. 22 = *J. Tenageia*.
squarrosa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 172 = *J. squarrosus*.
Vaillantii, Reichb. Ic. Fl. Germ. ix. 22, in obs. = *J. Tenageia*.

TENAGOCCHARIS, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 369 = **Butomopsis**, Kunth (Alismac.).
alismoides, Hochst. l. c. i. Intell. 42 = *B. lanceolata*.
cordofana, Hochst. l. c. xxiv. (1841) 369 = *B. lanceolata*.
latifolia, Buchen. in Goett. Nachr. (1869) 238 = *B. lanceolata*.

TENARIS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 198 (1837). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 775. *rostrata*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1885) ii. 39.—Afr. trop.
rubella, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 198.—Afr. austr.

TENDANA, Reichb. f. in Oestr. Bot. Wochenbl. vi. (1857) 160 = **Micromeria**, Benth. (Labiata).
Piperella, Reichb. f. l. c. = *M. Piperella*.

TENICROA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 52 (1836) = **Urginea**, Steinh. (Liliac.).
fragrans, Rafin. l. c. 53 = *U. fragrans*.

TENOREA, Colla, Hort. Ripul. 137 (1824) = **Trixis**, P. Br. (Compos.).
Berteri, Colla, l. c. = *Trixis radialis*.
calyculata, Bert. ex Colla, l. c. = *Trixis frutescens*.

TENOREA, Gasp. Nov. Gen. Fici, 6 (1844); et Ricerche Caprif. e Fic. 81 (1845) = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).
heterophylla, Gasp. Il. cc. 7; 81 = *F. stipulata*.

TENOREA, C. Koch, Dendrol. i. 670 (1869) = **TENORIA**, Spreng. = **Bupleurum**, Tourn. (Umbell.).

TENOREA, Rafin. Specch. i. 193 (1814) = **Zanthoxylum**, Linn. (Rutac.).
corymbosa, Rafin. l. c. = *Z. corymbosum*.

TENORIA, Dehnh. & Giord. Cat. Pl. Hort. Camald. ed. II. (1829) 24 = **Hygrophila**, R. Br. (Acanth.).
undulata, Dehnh. l. c. = *H. spinosa*.

TENORIA, Spreng. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle, ii. (1813) (Pl. Umb. Prod.) 32 = **Bupleurum**, Tourn. (Umbell.).
arborescens, Spreng. l. c. = *Heteromorpha arborescens*.
baldensis, Spreng. l. c. = *B. baldense*.
canariensis, Spreng. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle, ii. (1813) 32 = *Astydamia canariensis*.
canescens, Schousb. ex Loud. Hort. Brit. 106 = *B. gibraltarium*.
coriacea, Spreng. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle, ii. (1813) 32 = *B. gibraltarium*.
difformis, Spreng. l. c. = *B. difforme*.
frutescens, Spreng. l. c. = *B. frutescens*.
fruticosa, Spreng. l. c. = *B. fruticosum*.
nuda, Spreng. l. c. = *B. nudum*.
plantaginea, Spreng. in Schult. Syst. vi. 676 = *B. plantagineum*.
pyrenaea, Spreng. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle, ii. (1813) 32 = *B. angulosum*.
romana, Schk. ex Spreng. in Schult. Syst. vi. 434 = *Foeniculum vulgare*.
spinosa, Spreng. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle, ii. (1813) 32 = *B. spinosum*.

TEPESIA, Gaertn. f. Fruct. iii. 72. t. 192 (1805) = **Hamelia**, Jacq. (Rubiace.).
dubia, Gaertn. f. l. c.—Chili.

TEPHEA, Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa, 340 (1846). **APOCYNACEAE**.
aequipetala, Delile, l. c.—Afr. trop.

TEPHIS, Adans. Fam. ii. 276 (1763) = **Polygonum**, Tourn.
frutescens, Rafin. Fl. Tellur. iii. 11 = *Atraphaxis lanceolata*?
parvifolia, Rafin. l. c. = *Polygonella parvifolia*.

TEPHRANTHUS, Neck. Elem. ii. 235 (1790) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

TEPHRAS, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 477 (1862) = **Galenia**, Linn. (Ficoid.).
papulosa, E. Mey. ex Harv. & Sond. l. c. = *G. pruinosa*.

TEPHROCACTUS, Lem. Cact. 88 (1868) = **Opuntia**, Tourn. (Cactae).
andicolus, Lem. l. c. 88 = *O. andicola*.
aoracanthus, Lem. l. c. 89 = *O. aoracantha*.
calvus, Lem. l. c. 88 = *O. Turpinii*.
diadematus, Lem. l. c. = *O. diademata*.
platyacanthus, Lem. l. c. = *O. diademata*.
pusillus, Lem. l. c. = *O. pusilla*.
retrospinus, Lem. l. c. = *O. Parmentieri*.
Turpinii, Lem. l. c. = *O. Turpinii*.

TEPHROSERIS, Reichb. Nom. 87 (1841) = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
alpestris, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 342 = *S. alpestris*.
angustifolia, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 102 = *S. lugens*.
aurantiaca, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 342 = *S. palustris*.
campestris, Griseb. & Schenk, l. c.; Schur, Enum. Pl. Transs. 343 = *S. campestris*.
capitata, Griseb. & Schenk, l. c. = *S. palustris*.
cladobotrys, Griseb. & Schenk, l. c. 343 = *S. cladobotrys*.
Clusiana, Schur, Enum. Pl. Transs. 344 = *S. alpestris*.
crassifolia, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 342 = *S. alpestris*.
crispa, Schur, Enum. Pl. Transs. 346 = *S. crispatus*.
Fussii, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 342 = *S. campestris*.
longifolia, Griseb. & Schenk, l. c. 343; Schur, Enum. Pl. Transs. 344 = *S. brachychaetus*.
microrrhiza, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 146 = *S. campestris*.
palustris, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404 = *S. palustris*.
papposa, Schur, Enum. Pl. Transs. 344 = *S. lugens*.
pratensis, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 342 = *S. campestris*.
procera, Griseb. & Schenk, l. c. 343 = *Cineraria procera*.
rivularis, Schur, Enum. Pl. Transs. 347 = *S. crispatus*.
rupicola, Schur, l. c. 345.—Europ.
spathulaefolia, Schur, l. c. 344 = seq.
spathulifolia, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 342 = *S. spathulaefolius*.
stenophylla, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 326 = *S. lugens*.
transsilvanica, Schur, Enum. Pl. Transs. 345 = *S. lugens*?
Wolfii, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 102 = *S. campestris*.

TEPHROSIA, Pers. Syn. ii. 328 (1807). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 496.
APODYNOMENE, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 111 (1835).
BALBOA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 106.
BRISSONIA, Neck. Elem. iii. 36 (1790).
CATACLINE, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) 1214.
CRACCA, Linn. Fl. Zeyl. 139 (1747); et Sp. Pl. ed. I. 752 (1753), nomen prius.
EREBINTHUS, Mitch. in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 210.
KIESERA, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 11.
MACRONYX, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 35.
NEEDHAMIA, Scop. Introd. 310 (1777).
POGONOSTIGMA, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 39 (1843).
REINERIA, Moench, Meth. Suppl. 44 (1802).
REQUIENTIA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 91.
SEEMANNANTHA, Alef. in Bonplandia, x. (1862) 264.
XIPHOCARPUS, Presl, Symb. Bot. i. 13. t. 7 (1830).
acaciaefolia, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 106.—Afr. trop.
adscendens, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 48 = *purpurea*.
adunca, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 432.—Am. trop.
aemula, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 210.—Afr. austr.
aequilata, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 113.—Afr. trop.
ambigua, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1043, in syn.; Chapm. Fl. S. U. St. 96.—Am. bor.
amoena, Hort. Calc. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 113 = *Hookeriana*.
amoena, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 109.—Afr. austr.
andongensis, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 116.—Afr. trop.
angulata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 109 = *pallens*.
angustifolia, Featherman, Bot. Rep. Louisiana Univ. (1870) 73 = *onobrychoides*.

TEPHROSIA:—

- angustissima, *Shuttlew. ex Chapm. Fl. S. U. St.* 96.—Am. bor.
 aniloides, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 258.—Porto Rico.
 Ansellii, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 297.—Afr. trop.
 anthylloides, *Hochst. ex Webb, in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 345; *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 118.—Afr. trop.
 Apollinea, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* 196 = anthylloides.
 Apollinea, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 47 = villosa.
 Apollinea, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 252; *DC. Prod.* ii. 254.—Afr. trop.
 arabica, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 666.—Arab.
 argentea, *Pers. Syn.* ii. 329 = villosa.
 argentea, *Wight, ex Wall. Cat. n.* 5648 = fusca.
 ascendens, *Macfad. Fl. Jamaic.* i. 257 = purpurea.
 astragalina, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 464.—Ecuador.
 astragaloides, *Benth. Fl. Austral.* ii. 208.—Austral.
 barbigera, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 113.—Afr. trop.
 Barclayana, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 142 = mimosoides.
 Barclayi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1883) 388 = *Dalbergia Barclayii*.
 Baueri, *Benth. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i.* 408 = purpurea.
 Bidwilli, *Benth. Fl. Austral.* ii. 210.—Austral.
 biflora, *DC. Prod.* ii. 254.—Hab. ?
 biflora, *Zipp. ex Span. in Linnaea, xv.* (1841) 191 = purpurea.
 Boiviniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1883) 388.—Madag.
 Bojeri, *Baill. l. c.* 389.—Madag.
 brachycarpa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* ii. 207.—Austral.
 brachyloba, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 110 = Dregeana.
 brachystachya, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 99.—Nepal.
 brachystachya, *Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i.* i. 299 = coarctata.
 bracteolata, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 194.—Afr. trop.
 brevipes, *Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I.* iii. (1839) 432.—Am. trop.
 brunnea, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 122.—Afr. trop.
 calophylla, *Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i.* 36.—Ind. or.
 candida, *DC. Prod.* ii. 249.—As. trop.
 canescens, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 109.—Afr. austr.
 capensis, *Pers. Syn.* ii. 330.—Afr. austr.
 capillipes, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 108.—Afr. trop.
 capitulata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 251.—Ins. Sandvic.
 caribaea, *DC. Prod.* ii. 251.—Am. trop.
 cephalantha, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 119.—Afr. trop.
 chilensis, *Trev. in Linnaea, x.* (1836) Litt. 73.—Chili.
 chinensis, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vii. (1830) 58.—China.
 chrysophylla, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x.* ii. (1843) 49.—Mexic.
 chrysophylla, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 489.—Am. bor.
 cinerea, *Pers. Syn.* ii. 328.—Am. trop.
 coarctata, *Miq. Fl. Ind. Bat. i.* i. 299.—Ins. Lombok.
 coccinea, *Wall. Pl. As. Rar. i.* 49 = tinctoria.
 coerulea, *Pers. Syn.* ii. 329 = *Dalea Mutisii*.
 Colonila, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 545 = purpurea.
 Colutea, *Pers. Syn.* ii. 329.—Ind. occ.
 Colutea, *Wight, ex Wall. Cat. n.* 5647 = *Hookeriana*.
 concinna, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 112.—Afr. trop.
 conferta, *F. Muell. Census*, 39 = singuliflora ?
 confertiflora, *Benth. in Miq. Pl. Jungh.* 208.—Java.
 cordofana, *Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 118 = anthylloides.
 coriacea, *Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 208 = elongata, *E. Mey.*
 coriacea, *Benth. Fl. Austral.* ii. 204.—Austral.
 coronillaefolia, *DC. Prod.* ii. 252.—Ins. Borbon.

TEPHROSIA:—

- coconilloides, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 123.—Afr. trop.
 crassa, *Boj. ex Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 68 = purpurea.
 crassifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 80.—Mexic.
 crocea, *Benth. Fl. Austral.* ii. 205.—Austral.
 crotalarioides, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* i. 45 = *Indigolera crotalarioides*.
 dasyphylla, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 118.—Afr. trop.
 davorica, *Pers. Syn.* ii. 328 = *Astragalus dahuricus*.
 decidua, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 189 = subtriflora.
 decora, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 123.—Afr. trop.
 decumbens, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 7.—Nicaragua.
 deflexa, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 111.—Afr. trop.
 densiflora, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 296.—Afr. trop.
 desertorum, *Scheele, in Linnaea, xvii.* (1843) 338.—Abyss.
 dichotoma, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* ix. (1826) 415.—Ins. Philipp.
 dichrocarpa, *Steud. ex Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 31, nomen; et *ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 185.—Abyss.
 diffusa, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 210.—Afr. austr.
 diffusa, *Wight & Arn. Prod.* 213 = purpurea.
 digitata, *DC. Prod.* ii. 255.—Afr. trop.
 dimorphophylla, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 116.—Afr. trop.
 discolor, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 111.—Afr. austr.
 disperma, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 108.—Afr. trop.
 dolichocarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 101.—Reg. Argent.
 domingensis, *Pers. Syn.* ii. 330 = purpurea.
 Dregeana, *E. Mey. in Linnaea*, vii. (1832) 169.—Afr. austr.
 drepanocarpa, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 124.—Afr. trop.
 dubia, *Pers. Syn.* ii. 330 = *Lessertia diffusa*.
 Ehrenbergiana, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 18 = villosa.
 elegans, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 105 = hispidula.
 elegans, *Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 376.—Afr. trop.
 elegans, *Wall. Cat. n.* 5634 = senticosa.
 Elliottii, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 127, in obs. = *Galactia Elliottii*.
 elongata, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 298.—Afr. trop.
 elongata, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 111.—Afr. austr.
 emarginata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 461 = toxicaria.
 emeroides, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 190.—Abyss.
 ensifolia, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 208 = elongata, *E. Mey.*
 eriocarpa, *Benth. Fl. Austral.* ii. 207.—Austral.
 erioseoides, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1872) 57.—Afr. trop.
 falcata, *Pers. Syn.* ii. 328.—Afr. austr.
 fasciculata, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 298.—Afr. trop.
 ferruginea, *Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 215 = *Derris ferruginea*.
 filifolia, *Pers. Syn.* ii. 328 = *Argyrolobium filiforme*.
 filiformis, *Pers. l. c.*—Am. austr.
 filipes, *Benth. Fl. Austral.* ii. 208.—Austral.
 flammea, *F. Muell. ex Benth. l. c.* 204.—Austral.
 flexuosa, *Chapm. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 297 = hispidula.
 flexuosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 232.—Afr. trop.
 Forbesii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 116, in nota.—Afr. trop.
 Forrestiana, *F. Muell. Fragm.* xi. 98.—Austral.
 frutescens, *DC. Prod.* ii. 256.—Honduras.
 fruticosa, *DC. l. c.* 249.—Ind. or.
 fulvinervis, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 187.—Abyss.
 fusca, *Wight & Arn. Prod.* 210.—Ind. or.
 galeoides, *R. Grah. ex Wall. Cat. n.* 5649 = purpurea.

TEPHROSIA:—

- glabrescens, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 81 = *Cracca glabrescens*.
 glandulifera, *Benth. l. c.*—Ecuador.
 glomeruliflora, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 86.—Afr. austr.
 gracilipes, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 194. t. 49.—Afr. trop.
 gracilis, *Nutt. Gen. Am.* ii. 119 = hispidula.
 Grahami, *Wall. Cat. n.* 5652 = tinctoria.
 graminifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* ii. 206.—Austral.
 grandiflora, *Pers. Syn.* ii. 329.—Afr. austr.
 gynothrix, *Miq. in Linnaea*, xviii. (1844) 29 = cinerea.
 heterantha, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 101.—Reg. Argent.
 heterophylla, *Boj. ex Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 69 = *Vigna angivensis*.
 heterophylla, *Fisch. Hort. Gorenk. ed. II.* (1812) 71 = tinctoria.
 heterophylla, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 214.—Afr. trop.
 Heyneana, *Wall. Cat. n.* 5631 = tinctoria.
 Heyniana, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 142 = tinctoria.
 Hildebrandtii, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 222.—Afr. trop.
 hirsuta, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 377.—Afr. trop.
 hirta, *Boj. Hort. Maurit.* 93, nomen.—Afr. trop.
 hirta, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 546 = *Hookeriana*.
 hispida, *DC. Prod.* ii. 250 = spicata.
 hispidula, *Pers. Syn.* ii. 329.—Am. bor.
 holosericea, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 105 = virginiana.
 Hookeriana, *Wight & Arn. Prod.* 212.—Ind. or.; Malaya; Ins. Mascar.
 huillensis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 121.—Afr. trop.
 humilis, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 196.—Afr. trop.
 hypargyrea, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 99 = tinctoria.
 ichthynea, *Bertol. Misc. Bot.* xviii. 18 = *Mundulea suberosa*.
 incana, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 142; *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5644 = villosa.
 indigofera, *Bertol. Misc. Bot.* xix. 9. t. 5 = purpurea.
 inebrians, *Welw. Apont.* 573 = *Vogelii*.
 intermedia, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5632 = tinctoria.
 interrupta, *Hochst. ex Steud. in Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 31; et *ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 666 = *dichrocarpa*.
 juncea, *Benth. Fl. Austral.* ii. 208.—Austral.
 Kinkii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 115.—Afr. trop.
 Kotschyana, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 186 = bracteolata.
 Kraussiana, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 87.—Afr. austr.
 laevigata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 107.—Afr. trop.
 Lagascana, *DC. Prod.* ii. 253.—Hab. ?
 lamprolobioides, *F. Muell. Fragm.* ix. 64.—Austral.
 lanata, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 48.—Mexic.
 lanceaefolia, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 252 = purpurea.
 lanceolata, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5636 = purpurea.
 lathyroides, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 193.—Afr. trop.
 leiocarpa, *A. Gray, Pl. Wright.* ii. 36.—N. Mexic.
 leptoclada, *Benth. Fl. Austral.* ii. 207.—Austral.
 leptostachya, *DC. Prod.* ii. 251 = purpurea.
 leucantha, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 460.—Mexic.
 Lindheimeri, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 172.—Texas.
 linearis, *Pers. Syn.* ii. 330.—Afr. trop.
 lineata, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 376 = purpurea.
 littoralis, *Pers. Syn.* ii. 329 = cinerea.
 lobata, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5646 = purpurea.
 longifolia, *Pers. Syn.* ii. 328.—Am. trop.
 longipes, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 87.—Afr. austr.
 lupinifolia, *DC. Prod.* ii. 255.—Afr. trop. et austr.

TEPHROSIA:—

- lurida, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 30.—Afr. austr.
- luzoniensis, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.* (1848) 15.—Ins. Philipp.
- Lyallii, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 68.—Madag.
- macrocarpa, *Benth. Fl. Austral.* ii. 209.—Austral.
- macrophylla, *Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 214 = *Millettia auriculata*.
- macropoda, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 210.—Afr. austr.
- madrensis, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 280. t. 61.—Mexic.
- mariana, *DC. Prod.* ii. 253.—Ins. Marian.
- maxima, *Pers. Syn.* ii. 329 = *purpurea*.
- melanocalyx, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 106.—Afr. trop.
- mimosoides, *Pers. Syn.* ii. 330.—Ind. or.
- Mitchellii, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5641 = *purpurea*.
- modesta, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 162 = *Argyrolobium abyssinicum*.
- mollis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 463 = *Cracca caribaea*.
- mollissima, *Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog.* ii. (1850) 274 = *spicata*.
- monantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 128.—Madag.
- moschata, *Tussac, Fl. Antill.* ii. 22. t. 6.—Ind. occ.
- mucronata, *DC. Prod.* ii. 251 = *Lessertia mucronata*.
- multiflora, *Featherman, Bot. Rep. Louisiana Univ.* (1870) 73 = *onobrychoides*.
- myrtifolia, *DC. Prod.* ii. 255.—Afr. austr.
- nana, *Kotschy, ex Schweinf. Reliq. Kotsch.* 20. t. 16.—Afr. trop.
- nematophylla, *F. Muell. Fragm.* ix. 63.—Austral.
- nervosa, *Pers. Syn.* ii. 328 = *tinctoria*.
- nicaraguensis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 6.—Nicaragua.
- nitens, *Benth. in Seem. Bot. Voy. Herald*, 107.—Am. trop.
- noctiflora, *Boj. Hort. Maurit.* 93, nomen; *et ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 112.—Afr. trop.
- nubica, *Baker, l. c.* 125.—Afr. trop.
- obcordata, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
- oblongata, *Benth. Fl. Austral.* ii. 205.—Austral.
- oblongifolia, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 108.—Afr. austr.
- ochroleuca, *Pers. Syn.* ii. 329 = *Cracca ochroleuca*.
- odorata, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 404.—Ins. Socotra.
- oligophylla, *Benth. Fl. Austral.* ii. 209.—Austral.
- onobrychoides, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 104.—Am. bor. occ.
- oroboides, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 81 = *decumbens*.
- oroboides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 462. t. 578.—Mexic.
- oxygona, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 114.—Afr. trop.
- pallens, *Pers. Syn.* ii. 329.—Afr. austr.
- paniculata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 122.—Afr. trop.
- parviflora, *Wight, ex Wall. Cat. n.* 5642 = *purpurea*.
- pauciflora, *Wall. Cat. n.* 5635.—Ind. or.; *Burma*.
- paucifolia, *Nutt. Gen. Am.* ii. 119 = *spicata*.
- pedicellata, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 117.—Afr. trop.
- penicillata, *Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I.* iii. (1839) 431 = *adunca*.
- pentaphylla, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 142; *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5650 = *senticosa*.
- Perriniana, *DC. Prod.* ii. 251.—Am. austr.
- persica, *Boiss. Diagn. Ser. I.* ii. 40.—Persia.
- Petersiana, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 584 (Index) t. 9 = *Mundulea suberosa*.
- phaeosperma, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* ii. 208.—Austral.
- pinnata, *Pers. Syn.* ii. 330.—Afr. austr.
- piscatoria, *Pers. l. c.* 329 = *purpurea*.
- platycarpa, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 195.—Afr. trop.
- plicata, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 1445.—Afr. austr.
- Pogonostigma, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 193.—Aegypt.; *Arab.*
- polysperma, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 113.—Afr. trop.
- polystachya, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 109.—Afr. austr.

TEPHROSIA:—

- polyzyga, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* ii. 206.—Austral.
- porrecta, *Benth. l. c.*—Austral.
- procumbens, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 54 = *purpurea*.
- procumbens, *Macfad. Fl. Jamaic.* i. 256 = *cinerea*.
- prostrata, *Nutt. Gen. Am.* ii. 120 = *chrysophylla*, *Pursh.*
- Pseudo-piscatoria, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1200, nomen.—Guian.
- pulchella, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 299.—Afr. trop.
- pulcherrima, *Wight, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit.* Ind. ii. 112 = *tinctoria*.
- pulchra, *Coleb. in Wall. Cat. n.* 5630 = *Millettia pulchra*.
- pumila, *Pers. Syn.* ii. 330 = *purpurea*.
- purpurea, *Pers. l. c.* 329.—Amphig. trop.
- pusilla, *Pers. l. c.* 328.—Afr. austr.
- racemosa, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 142; *Wight & Arn. Prod.* 210 = *Millettia racemosa*.
- radicans, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 121.—Afr. trop.
- reflexa, *DC. Prod.* ii. 252.—Hab. ?
- remotiflora, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* ii. 209.—Austral.
- reptans, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 121.—Afr. trop.
- reticulata, *Benth. Fl. Austral.* ii. 205.—Austral.
- Rheedi, *DC. Prod.* ii. 255.—Ind. or.
- rigida, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 114.—Afr. trop.
- rigida, *Span. in Linnaea*, xv. (1841) 191.—Ins. Timor.
- rigidula, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 112.—Afr. trop.
- rosea, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* ii. 211.—Austral.
- rufescens, *Benth. in Linnaea*, xxii. (1849) 513.—Bras.
- Rutenbergiana, *Vatke, in Bremen, Abh.* vii. (1882) 246.—Afr. trop.
- Schiedeana, *Schlecht. in Linnaea*, xii. (1838) 299 = *toxicaria*.
- secunda, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 115.—Afr. trop.
- semiglabra, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 29.—Afr. austr.
- seminuda, *Boj. ex Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 68.—Madag.
- Senna, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 458.—N. Granat.
- sennoides, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 292.—Ins. Celebes.
- senticosa, *Pers. Syn.* ii. 330.—Ind. or.; *Burma*.
- sericea, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 107.—Afr. trop.
- sericea, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 545 = *purpurea*.
- sericea, *DC. Prod.* ii. 249 = *Mundulea suberosa*.
- sericea, *Hort. Bog. ex Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie*, iii. (1846) 76 = *candida*.
- sericea, *Pers. Syn.* ii. 328 = *Argyrolobium pumilum*.
- simplicifolia, *Franch. in Révoil, Comali*, 28.—Afr. trop.
- simplicifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* ii. 206.—Austral.
- singuliflora, *F. Muell. Fragm.* ix. 65.—Austral.
- sophoroides, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 99.—Reg. Himal.
- sphaerosperma, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 125.—Afr. trop.
- sphaerospora, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record*, iii. (1883) 128.—Austral.
- spicata, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 296.—Am. bor.
- spinosa, *Pers. Syn.* ii. 330.—Ind. or.; *Malaya*.
- stipularis, *DC. Prod.* ii. 254.—Am. austr.
- striata, *Eckl. & Zeyh. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 667 = *capensis*.
- striata, *Pers. Syn.* ii. 328 = *Lessertia pulchra*.
- stricta, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5639 = *purpurea*.
- stricta, *Pers. Syn.* ii. 329.—Afr. austr.
- Stuartii, *Benth. Fl. Austral.* ii. 207.—Austral.
- suberosa, *DC. Prod.* ii. 249 = *Mundulea suberosa*.
- subsessilis, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5969.—Ind. or.
- subtriflora, *Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 117.—Abyss.

TEPHROSIA:—

- Taylori, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5637 = *purpurea*.
- Telfairii, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 142, nomen = *Mundulea Telfairii*.
- tenella, *A. Gray, Pl. Wright.* ii. 36.—Mexic.
- tenuis, *Wall. Cat. n.* 5970.—Ind. or.
- ternata, *DC. Prod.* ii. 256 = *Aspalathus ferruginea*.
- timoriensis, *DC. l. c.* 254 = *purpurea*.
- tinctoria, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5643 = *purpurea*.
- tinctoria, *Pers. Syn.* ii. 329.—Ind. or.
- tomentosa, *Pers. l. c.*—Arab.
- totta, *Pers. l. c.* 328.—Afr. austr.
- toxicaria, *Pers. l. c.* 329.—Am. trop.
- trapezicarpa, *DC. Prod.* ii. 255 = *Indigofera senegalensis*.
- trifoliata, *DC. l. c.* 256 = *Argyrolobium sericeum*.
- uliginosa, *Spreng. Syst.* iii. 232 = *Derris uliginosa*.
- uniflora, *Pers. Syn.* ii. 329.—Afr. trop.
- uniovulata, *F. Muell. Fragm.* xi. 70.—Austral.
- velutina, *Spreng. Syst.* iii. 232.—Ins. S. Doming.
- venosa, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. 11. (1843) 47.—Mexic.
- venustula, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 459 = *cinerea*.
- vestita, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.* (1843) 15.—Sumatra; *China*.
- viciaeformis, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1852) 168.—Ind. or.
- vicioides, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 188.—Afr. trop.
- vicioides, *Schlecht. in Linnaea*, xii. (1838) 297.—Mexic.
- villosa, *Pers. Syn.* ii. 329.—As. et Afr. trop.
- villosa, *Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie*, iii. (1846) 54 = *confertiflora*.
- virginiana, *Pers. Syn.* ii. 329.—Am. bor.
- virginica, *Bigel. Fl. Bost. ed. III.* 296 = *præc.*
- Vogelii, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 296.—Afr. trop.
- Wallichii, *R. Grah. in Wall. Cat. n.* 5640 = *purpurea*.
- TEPHROTHAMNUS, *Sch. Bip. in Pollichia*, xx-xxi. (1863) 431 = *Vernonia*, *Schreb. (Compos.)*.
- calophyllus, *Sch. Bip. l. c.* 432.—Venezuela.
- paradoxus, *Sch. Bip. l. c.* = *V. paradoxa*.
- pycnanthus, *Sch. Bip. l. c.* 433 = *V. pycnantha*.
- TEPHROTHAMNUS, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 126 (1830) = *Argyrolobium*, *Eckl. & Zeyh.* (1836) (*Legumin.*).
- tomentosus, *Sweet, l. c.* = *A. Andrewsianum*.
- TEPION, *Adans. Fam.* ii. 131 (1763) = *Verbesina*, *Linn. (Compos.)*.
- TEPUALIA, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 119. *MYRTACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 710.
- Philippiana, *Griseb. l. c.* 120 = *stipularis*?
- Philippii, *Griseb. ex Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 637 = *stipularis*?
- stipularis, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 119.—Chili.
- TERAMNUS, *P. Br. Hist. Jamaic.* 290 (1756); *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 105 (1788). *LEGUMINOSAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 530.
- Botrydium, *Schott, in Wien. Zeitschr.* iv. (1830) 1216; *ex Endl. in Linnaea*, vi. (1831) Litt. 55 = *uncinatus*.
- clandestinus, *Spreng. Syst.* iii. 235 = *Glycine clandestina*.
- flexilis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 265.—Reg. Himal.
- grandiflorus, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 75.—Cuba.
- hedysaroides, *Spreng. Syst.* iii. 235 = *Glycine hedy-saroides*.
- labialis, *Spreng. Syst.* iii. 235.—Cosmop. trop.
- mollis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 265 = *labialis*.
- obcordatus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 382.—Madag.
- oxyphyllus, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) 11. 255.—Burma.
- parviflorus, *Spreng. Syst.* iii. 235 = *labialis*.
- rhombifolius, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1856) 120.—Panama.
- tenuiflorus, *Spreng. Syst.* iii. 325 = *Galactia dubia*.
- uncinatus, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 105.—Am. trop.
- volubilis, *Sw. l. c.*—Am. trop.
- Wallichii, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) 11. 255.—Burma.

TERANA, La Llave, in *La Naturaleza*, vii. (1885) Apénd. 83. *COMPOSITAE*. lanceolata, *La Llave*, l. c. 84.—Mexic.

TEREBINTHUS, [Tourn.] P. Br. Hist. Jamaic. 345 (1756) = *Pistacia*, Linn. (Anacard.). *Brownii*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 18 = *Bursera gummi-fera*. *Lentiscus*, Moench, Meth. 345 = *P. Lentiscus*. *vulgaris*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 356 = *P. Lentiscus*.

TEREBRARIA, Sesse, ex DC. Prod. iv. 458 (1830) = *Guettarda*, Linn. (Rubiace.).

TEREIANTHES, Rafin. Fl. Tellur. iii. 72 (1836) = *Reseda*, Tourn. *alba*, Rafin. l. c. = *R. alba*. *fruticosa*, Rafin. l. c. = *R. alba*. *glauca*, Rafin. l. c. = *R. glauca*. *undata*, Rafin. l. c. = *R. alba*.

TEREIANTHUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 342 = *Reseda*, Tourn. *suffruticulosus*, Fourr. l. c. = *R. alba*.

TEREIETRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 124 (1836) = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.). *violacea*, Rafin. l. c. 125 = *I. violacea*.

TEREIPHAS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 95 (1836) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.). *rutefolia*, Rafin. l. c. = *S. rutae-folia*. *urceolata*, Rafin. l. c. = *S. rutae-folia*.

TEREMIS, Rafin. Sylva Tellur. 53 (1838) = *Lycium*, Linn. (Solan.). *elliptica*, Rafin. l. c. 54 = *L. barbarum*. *turbinata*, Rafin. l. c. = *L. chinense*.

TEREPIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 (1836) = *Salvia*, Tourn. (Labi.). *Forskålei*, Rafin. l. c. = *S. Forskohlei*.

TERERA, [Domb.] ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 196, in obs. = *Miconia*, Ruiz & Pav. (Melastom.). *triplinervia*, [Domb.] ex Naud. l. c. = *M. Terera*.

TERMINALIA, Linn. Mant. i. 21 (1767). *COM-BRETACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 685.

ARISTOTELIA, Comm. ex Lam. Encyc. i. 349 (1784). *BADAMIA*, Gaertn. Fruct. ii. 90. t. 97 (1791).

BUCERAS, P. Br. Hist. Jamaic. t. 23 (1756), nomen prius.

BUCHENAVIA, Eichl. in Flora, xlix. (1866) 164.

BUCIDA, Linn. Syst. ed. X. 1025 (1759).

CATAPPA, Gaertn. Fruct. ii. 206. t. 127 (1791).

CHICHARRONIA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 529. t. 43 (1845).

CHUNCOA, Pav. ex Juss. Gen. 76 (1789).

FATREA, Juss. in Ann. Mus. Par. v. (1804) 223.

GIMBERNATEA, Ruiz & Pav. Prod. 138. t. 36 (1794).

HUDSONIA, Robins. in Lunan, Hort. Jamaic. ii. 310 (1814).

KNIPHOFIA, Scop. Introd. 327 (1777).

MYROBALANUS, Gaertn. Fruct. ii. 90. t. 97 (1791).

PAMEA, Aubl. Pl. Gui. 946. t. 359 (1775).

PENTAPTERA, Roxb. Hort. Beng. 34 (1814); Fl. Ind. ii. 437 (1832).

RESINARIA, Comm. ex Lam. Encyc. i. 349 (1784).

TANIBOUCA, Aubl. Pl. Gui. 448. t. 178 (1775).

VICENTIA, Allem. Diss. (1844).—Cf. Bot. Zeit. xii. (1854) 435.

actinophylla, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 22. —Bras.

acuminata, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 92. —Bras.

acuta, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 3980 C = *paniculata*.

acuta, Walp. Rep. ii. 61 = *T. Chebula*.

adamantium, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 241. —Bras.

adenopoda, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 327. —Sumatra.

alata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1522. —Ind. or.

alata, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 3980 B = *paniculata*.

alata, Roth, Nov. Pl. Sp. 379 = *tomentosa*.

amboinensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 668 (Quid ?). —Malaya ?

TERMINALIA:—

angolensis, O. Hoffm. in *Linnaea*, xliii. (1880–82) 131. —Afr. trop.

angustifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 377 = *T. Bellerica*.

angustifolia, Jacq. Hort. Vindob. iii. 51. —Malaya.

angustifolia, Roxb. Hort. Beng. 33; Fl. Ind. ii. 437 = *travancorensis*.

angustifolia, Sauv. Fl. Cub. 38 = *T. Bucas*.

Arbuscula, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68. —Jamaic.

argentea, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 43. —Bras.

Arjuna, Wight & Arn. Prod. 314, in textu; Bedd. Fl. Sylv. t. 28. —Ind. or.

Arunja, Steud. Nom. ed. II. ii. 668, sphalm. = *prae*.

Aruta, Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 659 = *T. Chebula*.

attenuata, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 46 = *T. Bellerica*.

australis, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 240. —Bras.

avicennoides, Guill. & Perr. Fl. Seng. Tent. i. 277. t. 64. —Afr. trop.

Badamia, DC. Prod. iii. 12. —Madag.

Badamia, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 92 = *T. Catappa*.

Belirica, Wall. Cat. n. 3968 = seq.

Bellerica, Roxb. Pl. Corom. ii. 54. t. 198. —Ind. or.; Malaya.

bengalensis, Roxb. ex DC. Prod. iii. 12. —Ind. or.; Malaya.

Benzoë, Pers. Syn. i. 485 = seq.

Benzoin, Linn. f. Suppl. 434 = *angustifolia*.

Berryi, Wight & Arn. Prod. 314 = *T. Arjuna*.

bialata, Steud. Nom. ed. II. ii. 668; Kurz, For. Fl. Brit. Burma, i. 456. —Ind. or.; Burma.

bialata, F. Villar, in Blanco, Fl. Filip. ed. III. Nov. App. 80 = *T. Calamansanay*.

biscutella, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 88. —Bras.

Biticaria, Roxb. Hort. Beng. [90] = *T. Bellerica*.

Boivinii, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 95. —Madag.

brasilensis, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 91. —Bras.

brasilensis, Raddi, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 668 = *januarensis*.

brasilensis, Spreng. Syst. ii. 359 = *Gouania Blanchetiana*.

Brownii, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 152. t. 9. f. 1 = *cycloptera*.

Bucas, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 38; Baill. Hist. Pl. vi. 275. —Ind. occ.; Am. centr.

bursarina, F. Muell. Fragm. ii. 149. —Austral.

Cacoucia, Baill. Hist. Pl. vi. 275 = *Cacoucia coccinea*.

Calamansanay, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 310. —Ins. Philipp.

calophylla, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 102. —Madag.

capitata, Sauv. Fl. Cub. 38 = *Hilariana*.

Catappa, Linn. Mant. ii. 519. —As. trop.

Chebula, Retz. Obs. v. 31. —As. trop.

Chebula, Willd. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 181 = *T. Bellerica*.

Chicharronia, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 38. —Cuba.

cicatricosa, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 54. —Persia.

ciliata, Spreng. Syst. ii. 359 (sp. dub.). —Ind. or.

circumalata, F. Muell. Fragm. iii. 91. —Austral.

citrina, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 183. —Ind. or.; Malaya.

confertifolia, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 263 = *cycloptera*.

coriacea, [Rottl.] ex Spreng. Fl. Hal. Mant. 54. —Zeylan.

coriacea, Wight & Arn. Prod. 315 = *tomentosa*.

crenata, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 91. —Madag.

crenulata, Roth, Nov. Pl. Sp. 380; Wight & Arn. Prod. 314 = *tomentosa*.

cuneata, Roth, l. c. 379 = *T. Arjuna*.

cuneifolia, Wall. Cat. n. 3972. —Ind. or.

cycloptera, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64. —Abyss.

dichotoma, E. Mey. Prim. Fl. Esseq. 177 = *T. Tanibouca*.

discolor, F. Muell. Fragm. iii. 92. —Austral.

discolor, Spreng. Neue Entdeck. ii. 111. —Bras.

disticha, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 412, nomen (Quid ?). —Ind. or.

TERMINALIA:—

edulis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 265 = *T. Bellerica*.

edulis, F. Muell. Fragm. ii. 151. —Austral.

eglandulosa, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 445 = *T. Bellerica*.

elegans, Linden, Cat. n. 21. (1867) 11. —Madag.

elliptica, Willd. Sp. Pl. iv. 969 = *tomentosa*.

erecta, Baill. Hist. Pl. vi. 266, 275 = *Conocarpus erectus*.

eriantha, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 240 = *T. Tanibouca*.

eristachya, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 524. —Cuba.

erythrocarpa, F. Muell. Fragm. ii. 150. —Austral.

erythrophylla, Burch. Trav. i. 400. —Afr. austr.

excelsa, Liebm. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 402. —Mexic.

exsculpta, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 93. —Madag.

fagifolia, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 42. t. 29. —Bras.

Fatrea, DC. Prod. iii. 12. —Madag.

firma, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 43 = *lucida*.

flavicans, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 99. —Madag.

foetidissima, Griff. Notul. iv. 685. —Malaya.

gangetica, Roxb. Hort. Beng. 23; Fl. Ind. ii. 437 = *T. Chebula*.

Gella, Dalt. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 227 = *T. Bellerica*.

glabra, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. ii. 501, nomen = *Muelleri*.

glabra, Wight & Arn. Prod. 314 = *T. Arjuna*.

glabrata, Forst. f. Prod. 74. —Ins. Amicor.

glabrescens, Mart. in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 124. —Bras.

glaucescens, Planch. ex Benth. in Hook. Niger Fl. 336. —Afr. trop.

gracilis, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 96. —Madag.

grandialata, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 127, in obs. —Bras.

grandiflora, Benth. Fl. Austral. ii. 503. —Austral.

guyanensis, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 88. —Bras.; Guian.

hemignosta, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 263 = *cycloptera*.

Hilariana, Steud. Nom. ed. II. ii. 668. —Bras.

Hilia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3970 C = *citrina*.

hirta, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 265 = *Combretum Schimperianum*.

horrida, Steud. Nom. ed. II. ii. 668 = *Scleropyrum Wallichianum*.

Hylobates, Eichl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1870) 195. —Bras.

intermedia, Bert. ex Spreng. Syst. ii. 359 = *T. Catappa*.

intermedia, Span. in Linnaea, xv. (1841) 203 = *microcarpa*.

jamaicensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 668, sphalm. = seq.

januarensis, DC. Prod. iii. 11. —Bras.

javanica, Mig. Fl. Ind. Bat. i. 1. 603. —Java.

Kydiana, Roxb. ex Wall. Cat. sub n. 3974 = *procera*.

lanceolata, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 43. t. 29 = *fagifolia*.

lancifolia, Griff. Notul. iv. 685 = *Combretum trifoliatum*.

latifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 376 = *T. Catappa*.

latifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68. —Jamaic.

latipes, Benth. Fl. Austral. ii. 501. —Austral.

laurinoides, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 237. —Java.

leiocarpa, Baill. Hist. Pl. vi. 265 = *Anogeissus leiocarpa*.

litoralis, Seem. Fl. Vit. 94. —Ins. Fiji.

lucida, Hoffmgg. ex Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 43. —Bras.

macrocarpa, Steud. Nom. ed. II. ii. 668 = *tomentosa*.

macrophylla, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 98, in syn. —Bras.

macroptera, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 276. —Afr. trop.

macroptera, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 22 = *grandialata*.

macrostemon, Spreng. Syst. ii. 358 = *Myrcia micrantha*.

madagascariensis, Spreng. l. c. = *T. Fatrea*.

Maradu, Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 660, in syn. = *tomentosa*.

TERMINALIA :—

- Mariana, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi.* (1856) 98.—Madag.
mauritanica, Blanco, *Fl. Filip. ed. II.* 264 = T. Catappa.
mauritanica, Lam. *Encyc. i.* 349.—Ins. Mascar.
melanocarpa, F. Muell. *Fragm. iii.* 92.—Austral.
microcarpa, Decne. in *Nouv. Ann. Mus. Par. iii.* (1834) 457.—Ins. Timor.
microcarpa, F. Muell. *Fragm. iii.* 92 = Muelleri.
microphylla, Eichl. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1870) 193.—Bras.
modesta, Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 87 = subsericea.
modesta, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi.* (1856) 102.—Madag.
mollis, M. Laws. in *Oliver, Fl. Trop. Afr. ii.* 417.—Afr. trop.
mollis, Vidal, *Phan. Cumings. Philipp. 30.* 112.—Ins. Philipp.
moluccana, Lam. *Encyc. i.* 349 = T. Catappa.
moluccana, Roxb. *Hort. Beng. 33*; *Fl. Ind. ii.* 432 = T. Bellerica.
moluccana, Wall. *Cat. n.* 3969 (Quid ?).—Ind. or.
monaptera, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 382 = paniculata.
Muelleri, Benth. *Fl. Austral. ii.* 500.—Austral.
myriocarpa, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot. 215.*—Reg. Himal.; Burma.
Myrobalana, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 378 = T. Catappa.
nitens, Presl, *Epim. Bot. 214.*—Ins. Philipp.
nitida, Roxb. ex G. Don, *Gen. Syst. ii.* 659 (sp. dub.).—Ind. or.
nitidissima, Raesch. *Nom. ed. III.* 296.—Guian.
oblonga, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 668.—Peruv.
oblongata, F. Muell. *Fragm. ii.* 152.—Austral.
obovata, Cambess. in A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer. ii.* 241 = Hilariana.
obovata, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 668.—Peruv.
octandra, Spreng. ex Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 93, nomen (Cupaniae sp.).—Bras.
odontoptera, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot. 217.*—Guian.
ovalifolia, Rottl. ex C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind. ii.* 447 = T. Arjuna.
ovata, Rottl. ex C. B. Clarke, l. c. —tomentosa.
ovatifolia, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = T. Catappa.
oxycarpa, Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) II. Beibl. 22.—Bras.
oxyphylla, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl. 326.*—Sumatra.
Pamaea, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 668 = seq.
Pamea, DC. *Prod. iii.* 13.—Guian.
paniculata, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 383.—Ind. or.
Papilio, Hance, in *Journ. Bot. xy.* (1877) 333.—Siam.
paraënsis, Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) II. Beibl. 24 = T. Catappa.
parviflora, Presl, *Epim. Bot. 214.*—Ins. Philipp.
parviflora, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 103 = T. Chebula.
pauciflora, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi.* (1856) 101.—Madag.
pellucida, Presl, *Epim. Bot. 214.*—Ins. Philipp.
petiolaris, A. Cunn. ex Benth. *Fl. Austral. ii.* 502.—Austral.
phaeocarpa, Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 89.—Bras.
platyphylla, F. Muell. *Fragm. ii.* 150.—Austral.
platyptera, F. Muell. l. c. 151.—Austral.
polyantha, Presl, *Epim. Bot. 213.*—Ins. Philipp.
porphyrocarpa, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral. ii.* 501.—Austral.
procera, Roxb. *Hort. Beng. 33*; *Fl. Ind. ii.* 429.—Ins. Andam. et Nicob.
prunioides, M. Laws. in *Oliver, Fl. Trop. Afr. ii.* 415.—Afr. trop.
psidiifolia, Delile, Voy. Méroë, Bot. 92 = T. Arjuna.
pterocarya, F. Muell. *Fragm. ii.* 152.—Austral.
pumila, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi.* (1856) 97.—Madag.
punctata, Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 85.—Bras.
punctata, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 381 = T. Bellerica.
punctata, Spruce, ex Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 98, in syn.—Bras.
pyrifolia, Kurz, *For. Fl. Brit. Burma, i.* 457; et in *Journ. As. Soc. Beng. xlvii.* (1877) II. 54.—Burma.
pyrifolia, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 669 = Combretum pyrifolium.

TERMINALIA :—

- reticulata*, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 381 = T. Chebula.
rhomboides, Spreng. *Syst. ii.* 358.—Madag.
Richii, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped. i.* 616.—Ins. Samoa.
Riedelii, Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 92.—Bras.
rotata, Roxb. ex DC. *Prod. iii.* 12 = bengalensis.
rotundifolia, Lodd. ex G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 412, nomen (Quid ?).—Ind. or.
rubrigemmis, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi.* (1856) 102.—Madag.
Saja, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 669 = myriocarpa.
salicifolia, Schweinf. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii.* (1868) 663.—Afr. trop.
Schimperia, Hochst. ex Delile, in *Ferret & Galin. Voy. Abyss. iii.* 133 = avicennioides.
scutifera, Planch. ex M. Laws. in *Oliver, Fl. Trop. Afr. ii.* 417.—Afr. trop.
sericea, Burch. ex DC. *Prod. iii.* 13.—Afr. austr.
sericea, Cambess. in A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer. ii.* 243 = argentea.
sericocarpa, F. Muell. *Fragm. ix.* 159.—Austral.
suaveolens, Spruce, ex Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 97, in syn.—Bras.
subcordata, Humb. & Bonpl. ex Willd. *Sp. Pl. iv.* 968 = T. Catappa.
subsericea, Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 127, in obs.—Bras.
sulcata, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi.* (1856) 94.—Madag.
sumatrana, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl. 326.*—Sumatra.
Tanibouca, Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792) 109; Sm. in *Rees, Cycl. xxxv. n.* 11.—Guian.
tarapotensis, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot. 213.*—Peruv.
Telfaireana, Wall. *Cat. n.* 3977.—Ins. Maurit.
Thozetii, Benth. *Fl. Austral. ii.* 500.—Austral.
tomentella, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng. xlii.* (1873) II. 80 = T. Chebula.
tomentosa, Mart. ex Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 97, in syn.—Bras.
tomentosa, Wight & Arn. *Prod. 314.*—Ind. or.
travancorensis, Wight & Arn. l. c. —Ind. or.
trifoliata, Spreng. *Syst. ii.* 358.—Bras.
triopteris, Heyne, ex Wall. *Cat. n.* 3980 B = paniculata.
undulata, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 669 = Combretum flagrocarpum.
Urjan, Royle, *Illustr. Bot. Himal. 209* = T. Arjuna.
Vasivae, Spruce, ex Eichl. in *Mart. Fl. Bras. xiv. II.* 97 = suaveolens.
venosa, Wall. *Cat. n.* 3973.—Burma.
Vernix, Lam. *Encyc. i.* 350.—Ins. Molucc.
villosa, Spreng. *Neue Entdeck. ii.* 111.—Bras.
volucris, R. Br. ex Benth. *Fl. Austral. ii.* 498.—Austral.
zeylanica, Heurck & Muell. *Arg. in Heurck, Obs. Bot. 220* = T. Chebula.
- TERMINALIS**, Medic. Theodora, 83 (1786) = **Dracaena**, Vand. (Liliac.).
angustifolia, Medic. l. c. = D. angustifolia.
- TERMINTHOS**, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon, viii.* (1881) 203 = **Pistacia**, Linn. (Anacard.).
- TERMONTIS**, Rafin. Chl. Aetn. 5 (1813) = **Linaria**, Tourn. (Scrophul.).
chalepensis, Rafin. l. c. = L. chalepensis.
cordata, Rafin. l. c. —Europ. austr.
purpurea, Rafin. l. c. 10 = L. purpurea.
villosa, Rafin. l. c. 5 = L. villosa.
- TERNATEA**, Tourn. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735); H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp. vi.* 415 (1823) = **Clitoria**, Linn. (Legumin.).
vulgaris, H. B. & K. l. c. = C. Ternatea.
- TERNIOLA**, *Tul. in Arch. Mus. Par. vi.* (1852) 189, t. 13. **PODOSTEMACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 108.
DALZELLIA, Wight, *lc. v. II.* 34 (1852).
LAWIA, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi.* (1849) 112.
MNIANTHUS, Walp. *Ann. iii.* 443 (1853).
TULASNEA, Wight, *lc. tt.* 1919–20 (1852).
foliosa, Wedd. in *DC. Prod. xvii.* 47.—Ind. or.
Lawii, Wedd. l. c.—Ind. or.

TERNIOLA :—

- longipes*, *Tul. in Arch. Mus. Par. vi.* (1852) 193, t. 13.—Ind. or.
pedunculosa, Wedd. in *DC. Prod. xvii.* 47.—Ind. or.
pulchella, *Tul. in Arch. Mus. Par. vi.* (1852) 192, t. 13, f. 4.—Ind. or.
ramosissima, Wedd. in *DC. Prod. xvii.* 47.—Ind. or.
zeylanica, *Tul. in Arch. Mus. Par. vi.* (1852) 190, t. 13, f. 3.—Zeylan.
- TERNSTROEMIA**, Mutis, ex Linn. f. *Suppl. 39* (1781). **TERNSTROEMIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 182.
AMPHANIA, Banks, ex DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève. i.* (1821) 408.
CLEYERA, Thunb. *Nov. Gen. 68* (1783); *Fl. Jap. 12* (1784).
DUPINIA, Scop. *Introd. 195* (1777).
ERYTROCHITON, [Schlecht. in] *Bot. Zeit. iv.* (1846) 656.
HOFERIA, Scop. *Introd. 194* (1777).
LLANOSIA, Blanco, *Fl. Filip. ed. II.* 319 (1845).
REINWARDTIA, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot. 101.* t. 12 (1840 ?).
TAONABO, Aubl. *Pl. Gui. 569. tt.* 227, 228 (1775), nomen prius.
TONABEA, Juss. *Gen. 262, 451* (1789).
VOELCKERIA, Klotzsch & Karst. in *Endl. Gen. Suppl. iv.* 66 (1847).
acuminata, Jack, in *Malay. Misc. ii.* (1822) n. VII. 26.—Sumatra.
albo-punctata, Planch. ex Griseb. *Cat. Pl. Cub. 36.*—Cuba.
aneura, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl. 477* = japonica.
bancana, Miq. l. c. 477.—Ins. Banca.
bifaria, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep. 143* = Eurya acuminata.
bilocularis, Roxb. *Fl. Ind. ii.* 522 = Saurauja tristyla.
brasiliensis, Cambess. in A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer. i.* 298, t. 59.—Bras.
brevipes, DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève. i.* (1822) 408 = elliptica.
carnosa, Cambess. in A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer. i.* 299.—Am. austr.
cernua, Griseb. *Cat. Pl. Cub. 35.*—Cuba.
clusiaefolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp. v.* 207, t. 463, f. 1.—Ecuador.
congestiflora, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii.* (1862) 259.—N. Granat.
coriacea, Scheff. in *Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi.* (1870) 352.—Malaya.
coriacea, Wall. *Cat. n.* 1453 = Adinandra acuminata.
corymbosa, Sm. in *Rees, Cycl. xxxv. n.* 6.—Guian.
crassifolia, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot. ii.* (1843) 363.—Am. austr.
crenata, Macfad. *Fl. Jamaic. i.* 114 = Symplocos octopetala.
crenulata, Wall. *Cat. n.* 3723 = Adinandra crenulata.
cuneata, Poepp. ex Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève. xiv.* (1855) 111.—Peruv.
cuneifolia, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot. iv.* (1845) 100.—Bras.
cuneifolia, Pav. ex Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève. xiv.* (1855) 107 = elliptica.
cuspidata, Jack, in *Malay. Misc. ii.* (1822) n. VII. 28 (Sauraujae sp.).—Sumatra.
dasyanthera, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi.* (1858) i. 241.—Japon.
delicatula, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève. xiv.* (1855) 108.—Guian.
dentata, Spreng. ex DC. l. c. i. (1821) 411 = Freziera undulata.
dentata, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ. 81.*—Guian.
dubia, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève. xiv.* (1855) 19 = japonica.
dumosa, Wall. *Cat. n.* 2245 = Adinandra dumosa.
elliptica, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève. xiv.* (1855) 16 = sylvatica.
elliptica, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ. 81.*—Ind. occ.; Mexic.
emarginata, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève. xiv.* (1855) 104.—Zeylan.
fasciculata, Wall. *Cat. subn.* 1468 = Saurauja fasciculata.
flavescens, Griseb. *Cat. Pl. Cub. 35.*—Cuba.
fragrans, Choisy, in *Mém. Soc. Phys. Genève. xiv.* (1855) 109 = japonica.
gedeensis, Teijsm. & Binn. in *Nat. Tijdschr. Neêrl. Ind. xiv.* (1857) 156, sphalm. = seq.
gedehensis, Teijsm. & Binn. l. c. iii. (1852) 332.—Java.

TERNSTROEMIA:—

- globiflora*, Ruiz & Pav. Syst. 179.—Peruv.
globosa, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 106 = *præc.*
globuliflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 669, sphalm. = *globiflora*.
integerrima, Wall. Cat. n. 1452 = *Adinandra integririma*.
japonica, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 335.—As. subtrop.
khasyana, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 110 = *Illicium Griffithii*.
lineata, DC. l. c. i. (1822) 409 = *elliptica*.
longipes, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1092, nomen.—Guian.
Lushia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 225 = *Cleyera ochracea*.
Lushia, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 109 = *japonica*.
macrocarpa, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 15 = *penangiana*.
macrocarpa, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 259.—N. Granat.
macrophylla, Wall. Cat. n. 3663 = *Pyrenaria acuminata*.
meridionalis, Mutis, Amer. i. t. 9; ex Linn. f. Suppl. 264.—N. Granat.
meridionalis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 81 = *elliptica*.
micrantha, Choisy, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 142, 145.—Java.
microcarpa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 241.—Am. austr.
multiflora, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 108 = *dentata*.
obovalis, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 221. t. 25.—Ind. occ.
occidentalis, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 106 = *globiflora*.
pandana, Wall. Cat. sub n. 1470 = *Saurauja panduana*.
paniculata, Wall. l. c. sub n. 1469 = *Saurauja napaulensis*.
patens, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 109.—Sumatra.
Pavoniana, Moric. l. c. vii. (1836) 258. t. 13.—Peruv.
peduncularis, DC. l. c. i. (1822) 409 = *elliptica*.
peduncularis, Seem. Bot. Voy. Herald, 87 = *Seemanni*.
penangiana, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 110.—Malaya.
pentapetala, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 40 = *Saurauja tristyla*.
punctata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 81.—Guian.
quinquepartita, Ruiz & Pav. Syst. 180.—Peruv.
racemosa, D. Don, Prod. Fl. Nep. 225 = *Saurauja napaulensis*.
reticulata, Wall. Cat. n. 2246 = *Adinandra integririma*.
revoluta, Splitg. in H. ev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 99 = *punctata*.
Roraimae, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1092, nomen.—Guian.
rubicunda, Klotzsch, l. c. 1092, 1175, nomen.—Guian.
rubiginosa, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 39 (= *Cleyera rubiginosa*).—Sumatra.
Ruiziana, Moric. in Mém. Soc. Phys. Genève. vii. (1836) 257. t. 12.—Peruv.
salicifolia, DC. l. c. i. (1822) 411 = *Freziera undulata*.
Schomburgkiana, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 362.—Guian.
Seemanni, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 260.—Panama.
sericea, Wall. Cat. n. 1454 = *Adinandra villosa*.
serrata, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 27.—Sumatra.
serrata, Roxb. Hort. Beng. 40; Fl. Ind. ii. 521 = *Saurauja Roxburghii*.
serrulata, Pav. ex Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 110 = *Cleyera serrulata*.
sessiliflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 577.—Bras.
siphilitica, Pav. ex Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 110 = *Cleyera siphilitica*.
suborbicularis, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1092, nomen.—Guian.
sylvatica, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 220 = *globiflora*.
sylvatica, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 106.—Mexic.
Tepezapote, Cham. & Schlecht. l. c. vi. (1831) 420 = *elliptica*.?

TERNSTROEMIA:—

- Toquian, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 19.—Ins. Philipp.
trilocularis, Roxb. Hort. Beng. [93] = *Saurauja tristyla*.
venosa, Spreng. Neue Entdeck. ii. 162.—Bras.
verticillata, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1092, nomen.—Guian.
vitiensis, Seem. Fl. Vit. 14.—Ins. Fiji.
Wightii, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 109 = *japonica*.
TEROBERA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; Syn. Pl. Cyp. 164 (1855) = *Cladium*, P. Br. (Cyperac.).
scirpoidea, Steud. ll. cc. = *C. scirpoideum*.
TEROGIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 56 (1836) = *Ortega*, Loeff. (Caryoph.).
dichotoma, Rafin. l. c. = *O. dichotoma*.
TERPNANTHUS, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 152. t. 19 = *Spiranthera*, A. St. Hil. (Rutac.).
jasminoides, Nees & Mart. l. c. 178 = *S. odoratissima*.
TERPNOPHYLLUM, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 70. t. 2 C = *Garcinia*, Linn. (Guttif.).
acuminatum, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 364 = *G. terpnophylla*.
zeylanicum, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 70. t. 2. f. 1 = *G. terpnophylla*.
TERRANEA, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 11. t. 23 = *Erigeron*, Linn. (Compos.).
fernandeziana, Colla, l. c. = *E. fruticosus*.
TERSONIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 40 (1849).
PHYTOLACCACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 87.
GYRANDRA, Moq. l. c. (1849).
brevipes, Moq. l. c.—Austral.
brevipes, Moq. l. c. (quoad δ) = *Gyrostemon ramulosus*.
subvolubilis, Benth. Fl. Austral. v. 150.—Austral.
TERTREA, DC. Prod. iv. 481 (1830). *RUBIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 108.
SCHIEDEA, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 186.
martinicensis, DC. Prod. iv. 481.—Ins. Martinic.
TERTRIA, Schrank, Fl. Monac. iii. 249 (1816) = *Polygala*, Tourn.
Chamaebuxus, Schrank, l. c. = *P. Chamaebuxus*.
TERUSTROEMIA, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 39, err. typ. = *Ternstroemia*, Mutis.
TESOTA, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 479 (1857) = *Olneya*, A. Gray (Legumin.).
TESSARANDRA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. viii. (1851) 198 = *Linociera*, Sw. (Oleac.).
fluminensis, Miers, l. c.—Bras.
TESSARANTHIUM, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1862) 142 = *Fraseria*, Walt. (Gentian.).
radiatum, Kellogg, l. c. 144 = *F. speciosa*.
TESSARIA, Ruiz & Pav. Prod. 112. t. 24 (1794).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 291.
GYNETERIA, Spreng. Anleit. ii. II. 899 (1818).
GYNHETERIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140.
MONOPHALACRUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. liii. 235 (1828).
PHALACROMESUS, Cass. l. c. (1828).
POLYPAPPUS, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 178.
absinthioides, DC. Prod. v. 457.—Chili.
absinthioides, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 185 = *integrifolia*.
ambigua, DC. Prod. v. 457.—Am. austr.
banksiaefolia, Brougn. Bot. Voy. Cog. t. 64.—Hab.?
boliviensis, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 534, nomen.—Bolivia.

TESSARIA:—

- borealis*, A. Gray, Pl. Wright. i. 102.—N. Mexic.
dentata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 213 = *integrifolia*.
integrifolia, Ruiz & Pav. l. c.—Bras.
legitima, DC. Prod. v. 456 = *integrifolia*.
mucronata, DC. l. c. = *integrifolia*.
redolens, Less. in Linnaea, vi. (1831) 151 (= *Monen-teles redolens*).—N. Caled.
TESSENIA, Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 318 = *Erigeron*, Linn. (Compos.).
muralis, Bubani, l. c. = *E. acris*.
TESSERANTHERUM, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 142, sphalm. = *TESSARANTHIUM*, Kellogg = *Fraseria*, Walt. (Gentian.).
TESSERANTHIUM, Pritz. Ic. Ind. ii. 270 (1865), sphalm. = *præc.*
TESSIERA, DC. Prod. iv. 574 (1830) = *Spermacoce*, Linn. (Rubiace.).
lanigera, DC. l. c. = *S. lanigera*.
lithospermoides, DC. l. c. = *S. lithospermoides*.
pubescens, Miq. Stirp. Surin. Sel. 178.—Guian.
TESTUDINARIA, Salisb. in Burch. Trav. ii. 147 (1824). *DIOSCOREACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 744.
RHIZEMYS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 (1836).
Elephantipes, Salisb. in Burch. Trav. ii. 148.—Afr. austr.
montana, Burch. l. c.—Afr. austr.
sylvatica, Hort. Berol. ex Kunth, Enum. Pl. v. 443.—Afr. austr.
TETA, Roxb. Hort. Beng. 24 (1814); Fl. Ind. ii. 165 (1832) = *Peliosanthes*, Andr. (Haemod.).
petiolaris, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 650 = *P. petiolaris*.
viridiflora, Roxb. Hort. Beng. 24; Fl. Ind. ii. 165 = *P. Teta*.
TETANOSIA, Rich. ex M. Roem. Syn. Hesper. 23 (1846) = *Opilia*, Roxb. (Olacin.).
olacioides, M. Roem. l. c. = *O. amentacea*.
TETARIS, [Lindl. in] Chesn. Narrat. Euphr. Exped. (1868) t. ad p. 443. *BORAGINEAE*.
capitata, [Lindl.] l. c. t. ad p. 443.—Mesopot.
parviflora, [Lindl.] l. c.—Mesopot.
TETILLA, DC. Prod. iv. 667 (1830). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 640.
DIMORPHOPETALUM, Bert. Merc. Chil. (1829).—Cf. Bull. Férussac, xx. (1830) 110; Am. Journ. Sc. Ser. I. xx. (1831) 256, nomen.
TETRAPLASIUM, Kunze, in Flora, xiv. (1831) 378.
hydrocotylaefolia, DC. Prod. iv. 667; et vii. 778.—Chili.
TETRACANTHUS, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 60 (1853). *COMPOSITAE*.
linearifolius, A. Rich. l. c.—Cuba.
TETRACANTHUS, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 153 (1866) = *Pinillosia*, Ossa (Compos.).
humilis, Wright, ex Griseb. l. c. = *P. bellioides*.
TETRACARPAEA, Benth. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 72, sphalm. = *TETRACRYPTA*, Gardn. = *Anisophyllea*, (Rhizoph.).
TETRACARPUM, Moench, Meth. Suppl. 240 (1802) = *Schkuhria*, Roth. (Compos.).
pinnatum, Moench, l. c. 241 = *S. abrotanoides*.
TETRACELLION, Turcz. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. (1835) 39 = *TETRAPOMA*, Turcz. = *Nasturtium*, R. Br. (Crucif.).
ellipsoideum, Turcz. l. c. = *N. palustre*.
globosum, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 669 = *N. austriacum*.

TETRACERA, Linn. Gen. ed. I. 345 (1737). *DIL-
LENACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 12.
Assa, Houtt. Handleid. v. 275 (1776).
CALLIGONUM, Lour. Fl. Cochinch. 342 (1790).
DELIMA, Linn. Diss. Dass. 19 (1747); Amoen. Acad.
i. 403 (1749).
DELIMOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 9 (1859).
DIPLOTER, Rafin. Sylva Tellur. 165 (1838).
ELEIATIS, Rafin. l. c. (1838).
EURYANDRA, Forst. Char. Gen. 81. t. 41 (1776).
GYNETRA, Rafin. Sylva Tellur. 165 (1838).
KOROSVEL, Adans. Fam. ii. 442 (1763).
LEONTOGLOSSUM, Hance, in Walp. Ann. ii. 18
(1851).
ROEHLINGIA, Dennst. Schlusss. Hort. Malab. 31
(1818).
TRACHYTELLA, DC. Syst. i. 410 (1818).
TRAXILISA, Rafin. Sylva Tellur. 161 (1838).
WAHLBOMIA, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh.
(1790) 215. t. 9.
acuminata, DC. Syst. i. 399.—Am. austr.
alata, Presl, Rel. Haenk. ii. 71.—Mexic.
alnifolia, DC. Syst. i. 401 = obtusata.
alnifolia, Willd. Sp. Pl. ii. 1243.—Afr. trop.
arborescens, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 45.
—Sumatra.
aspera, Willd. Sp. Pl. ii. 1241.—Guian.
asperula, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 133 = rotundi-
folia.
Assa, DC. Syst. i. 402.—Ind. or.; Malaya.
Blumei, Walp. Rep. i. 67.—Java.
Boiviniana, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 300. t. 7.
—Afr. trop.
borneensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 76.—
Borneo.
Breyiniana, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 174.—
Bras.
Calinea, Willd. Sp. Pl. ii. 1241 = Doliocarpus
Calinea.
canescens, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, viii. (1833)
177, nomen (Myrtaceae).—Bras.
carpinifolia, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 92.—
Bras.
castaneaeifolia, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat.
Sér. IV. xvii. (1862) 22.—N. Granat.
ciliata, Poepp. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 101
= Davilla cuspidulata.
costata, Mart. ex Eichl. l. c. 86.—Bras.
cuspidata, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 205 =
Doliocarpus Rolandi.
Daemeliania, F. Muell. Fragm. v. 191.—Austral.
dichotoma, Blume, Bijdr. 3.—Java.
Doliocarpus, Willd. Sp. Pl. ii. 1241 = Doliocarpus
Rolandi.
erecta, Sesse & Moç. ex DC. Syst. i. 404.—Mexic.
Enryandra, Vahl, Symb. Bot. iii. 71.—Malaya; N.
Caled.
fagifolia, Blume, Bijdr. 4.—Java.
fagifolia, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, viii. (1833)
174 = rotundifolia.
Gardneri, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 91.—Bras.
gracilis, Blume, Bijdr. 4.—Java.
grandiflora, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 92.—
Bras.
Guillemini, Steud. Nom. ed. II. ii. 670 = alnifolia.
Heyneana, Wall. Cat. n. 6630.—Ind. or.
hispidia, Spreng. Syst. ii. 629.—Bras.
hydrophila, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér.
IV. xvii. (1862) 20.—N. Granat.
hygrophila, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, i. 22.—
Ind. or.
jamaicensis, DC. Syst. i. 399 = volubilis.
japnensis, Mart. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. i.
(1832) 367.—Bras.
juncea, Hort. Angl. ex Stend. Nom. ed. II. ii. 670
(Qnid?).—Austral.
Korthalsii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 75.—
Borneo.
laevigata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 8.—Sumatra.
laevis, Vahl, Symb. Bot. iii. 71.—Ind. or.; Malaya.
lasiocarpa, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 84.—
Bras.
laurifolia, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, viii. (1833)
177 = Myrcia magnoliaefolia.
Lima, Willd. ex DC. Syst. i. 399 = Davilla rugosa.
lucida, Wall. Cat. n. 6631 = T. Euryandra.
lutea, Spreng. Nene Entdeck. ii. 164 = Ochna arborea.
macrocarpa, Wall. Cat. n. 6628.—Ind. or.; Malaya.

VOL. II.

TETRACERA :—

macrophylla, Wall. ex Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 63,
sphalm. = praec.
madagascariensis, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, viii.
(1833) 176.—Madag.
malabarica, Lam. Illustr. iii. 32 = T. Assa.
mexicana, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 87, in obs.
—Mexic.
monocarpa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 459.—Ins. Philipp.
multiflora, DC. Syst. i. 400 = Davilla Sagraana.
multiflora, H. B. & K. ex Schlecht. in Linnaea, viii.
(1833) 177, in obs. = Davilla multiflora.
nitida, Vahl, Symb. Bot. iii. 70.—Ins. Trinit.
Nordiana, F. Muell. Fragm. v. 1.—Austral.
oblongata, DC. Syst. i. 399.—Bras.
obovata, DC. l. c. 401 = alnifolia.
obovata, Willd. Sp. Pl. ii. 1241 = Doliocarpus Soramia.
obtusata, Planch. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 12.—
Afr. trop.
ovalifolia, DC. Syst. i. 400.—Ind. occ.; Guian.
paniciflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 88.
—Madag.
Perriniana, Spreng. Neue Entdeck. ii. 164.—Am.
austr.
plicata, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, viii. (1833)
177 = Davilla Kunthii.
plumbea, Moric. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 90
= Breyiniana.
Poeppigiana, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 174 =
volubilis.
portobellensis, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.
1854 (1856) 113.—Panama.
potatoria, Afzel. ex G. Don, Gen. Syst. i. 69 =
alnifolia.
Radula, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 91. t. 23.—
Bras.
rhamnifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 72.—Panama.
Rheedii, DC. Syst. i. 402 = laevis.
Riedeliana, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 88.—Bras.
rigida, Blume, Bijdr. 4.—Java.
rotundifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 7.—Am. trop.
rugosa, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 2 = alnifolia.
rugosa, H. B. & K. ex Schlecht. in Linnaea, viii. (1833)
177, in obs. = Davilla Kunthii.
Rutenbergii, Buchen. in Bremen, Abh. vii. (1880) 12.
—Madag.
salicifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 71.—Mexic.
sarmentosa, Vahl, Symb. Bot. iii. 70.—China.
scaberrima, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 9.—Sumatra.
scabra, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 203 = alnifolia.
Sellowiana, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 175.—
Bras.
senegalensis, DC. Syst. i. 401.—Afr. trop.
sericea, Blume, Bijdr. 3 = laevis.
sessiliflora, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér.
IV. xvii. (1862) 21.—N. Granat.
stricta, Willd. Sp. Pl. ii. 1241 = Doliocarpus strictus.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 619 =
fagifolia.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 265.—
Guian.
Tigarea, DC. Syst. i. 403 = aspera.
tomentosa, Willd. Sp. Pl. ii. 1241 = Doliocarpus
Rolandi.
triceris, Thou. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1882)
332 = madagascariensis.
trigyna, Roxb. ex Wall. Cat. n. 6629 A = T. Assa.
trigyna, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 645 =
laevis.
tripetala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi.
(1863) i. 547.—Java.
ulmifolia, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, viii. (1833)
177, nomen (Brockia sp.?).—Bras.
volubilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 50 =
sessiliflora.
volubilis, Linn. Sp. Pl. 533.—Am. austr.
Wahlbomia, DC. Syst. i. 403.—Java.
Willdenowiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 670 = rotundi-
folia.
Wuthiana, F. Muell. Fragm. x. 49.—Austral.

TETRACHELOS, Lehm. Pl. Preiss. ii. 368 (1847) =
Acacia, Willd. (Legumin.).
Meisneri, Lehm. l. c. = A. tetragonocarpa.

TETRACHNE, Nees, Fl. Afr. Austr. Gram. 375
(1841). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1171.
Dregei, Nees, l. c. 376.—Afr. austr.

TETRACHYRON, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 744
= **Calea**, Linn. (Compos.).
manicatum, Schlecht. l. c. = C. manicata.

TETRACLEA, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II.
xvi. (1853) 98. *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii.
1220.
Coulteri, A. Gray, l. c.—N. Mexic.

TETRACLIS, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.
xii. (1873) 271. t. 11. *EBENACEAE*, Benth. &
Hook. f. ii. 666.
clusiaefolia, Hiern, l. c.—Madag.

TETRACME, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat. (1836).
—Cf. Linnaea, xii. (1838) Litt. 71. *CRUCIFERAE*,
Benth. & Hook. f. i. 76.
contorta, Boiss. Fl. Orient. i. 317.—Afghan.
quadricornis, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat. (1836).
—Cf. Linnaea, xii. (1838) Litt. 71.—Turkestan.
recurvata, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga, i. (1847)
158.—Oriens.
secunda, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 29.—Afghan.
Stocksii, Boiss. Fl. Orient. i. 317.—Beluchist.

TETRACOCCLUS, Engelm. ex Parry, in West-Am.
Scientist, i. (1885) 13. *EUPHORBACEAE*.
dioicus, Parry, l. c. 13, 35.—Calif.
Engelmanni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885)
373 = dioicus.

TETRACOCYNE, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.
(1863) i. 555 = **Ryania**, Vahl (Bixin.).
angustifolia, Turcz. l. c. = R. speciosa.
puberula, Turcz. l. c.—Guian.

TETRACRYPTA, Gardn. & Champ. in Hook. Kew
Journ. i. (1849) 314 = **Anisophyllea**, R. Br.
(Rhizoph.).
cinnamomoides, Gardn. & Champ. l. c. = A. zeylanica.

TETRACTINOSTIGMA, Hassk. in Flora, xl. (1857)
533; Hort. Bog. Desc. 55 (1858) = **Aporosa**, Blume
(Euphorb.).
lucidum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 471.—Sumatra.
microcalyx, Hassk. in Flora, xl. (1857) 533 =
A. microcalyx.

TETRACTIS, DC. Prod. i. 16 (1824), sphalm. = **TE-
TRACTYS**, Spreng. (Ranunc.?).

TETRACTOMIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 490
(1875). *RUTACEAE*.
majus, Hook. f. l. c. 491.—Malaya.
Roxburghii, Hook. f. l. c.—Malaya.

TETRACTYS, Spreng. Neue Entdeck. iii. 53 (1822).
Genus dubium *RANUNCULACEARUM*.—Cf. Benth.
& Hook. f. i. 3.
capensis, Spreng. l. c.—Afr. austr.

TETRADENIA, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1300
(1830). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1180.
fruticosa, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1300.—Madag.

TETRADENIA, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 61
(1831) = **Litsea**, Lam. (Laurin.).
consimilis, Nees, l. c. 64 = L. zeylanica.
foliosa, Nees, l. c. = L. zeylanica.
furfuracea, Nees, l. c. = L. zeylanica.
lanuginosa, Nees, l. c. = L. lanuginosa.
obovata, Nees, l. c. = Actinodaphne obovata.
Pseudo-Culitlawan, Nees, in Otto & Dietr. Allg.
Gartenz. i. (1833) 373 = L. Pseudoculitlawan.
umbrosa, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 64 =
L. umbrosa, zeylanica.
zeylanica, Nees, l. c. = L. zeylanica.

TETRADIA, Benn. Pl. Jav. Rar. 233 (1844). *STER-
CULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 219.
Horsfieldii, Benn. l. c.—Java.

TETRADIA, Thou. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi.
(1856) 137 = **Tetrataxis**, Hook. f. (Lythrar.).
salicifolia, Thou. ex Tul. l. c. = Tetrataxis salicifolia.

TETRADICLIS, Stev. ex Bieb. Fl. Tanr. Cauc. iii. 648.—Cf. 277 (1819). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 288.

ANATROPA, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 402.
caspia, [Lindl. in] Chesn. Narrat. Euph. Exped. (1868) t. ad p. 441.—Mesopot.
Eversmanni, Bunge, in Linnaea, xiv. (1840) 178.—Reg. Casp.
salsa, Claus, in Goebel, Reise, ii. 319 = Eversmanni.
salsa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 226.—Reg. Cauc.

TETRADIMUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 321 (1867) = *Sedum*, Tourn. (Crassul.).
odoratum, Dulac, l. c. = *S. roseum*, Scop.

TETRADIMUM, Lour. Fl. Cochinch. 91 (1790) = *Evoidia*, Forst. (Rutac.).
amarissimum, Poir. Encyc. Suppl. v. 291 = *Bruccea sumatrana*.
cymosum, Wall. ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 157 = *E. fraxinifolia*.
fraxinifolium, Wall. ex Royle, l. c. = *E. fraxinifolia*.
trichotomum, Lour. Fl. Cochinch. 91 = *E. fraxinifolia*.

TETRADYMIA, DC. Prod. vi. 440 (1830). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 450.

LAGOTHAMNUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 416.

canescens, DC. Prod. vi. 440; et in Deless. Ic. Sel. iv. 27. t. 60.—Am. bor. occ.

comosa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 60.—Am. bor. occ.

glabrata, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. (1854) 122. t. 5.—Am. bor. occ.

inermis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 415 = *canescens*.

Nuttallii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 447.—Am. bor. occ.

ramosissima, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 145 = *Psathyrotes ramosissima*.

spinosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 360.—Am. bor. occ.

squamata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 207 = *Lepidospartum squamatum*.

stenolepis, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 92.—Calif.

TETRAGAMESTUS, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 21 = *Ponera*, Lindl. (Orchid.).

aureus, Reichb. f. l. c. 22 = *Ornithidium ruberimum*.

isochitoides, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 20; et in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 376.—N. Granat.

modestus, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 21 = *P. modesta*.

TETRAGASTRIS, Gaertn. Fruct. ii. 130. t. 109 (1791) = *Hedwigia*, Sw. (Burser.).—Cf. Benth. & Hook. f. i. 326; iii. 318.

ossea, Gaertn. l. c.—Hab. ?

TETRAGLOCHIN, [Kunze, in] Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 26 (1833) = *Margyriacarpus*, Ruiz & Pav. (Rosac.).

buxifolium, Presl, Epim. Pot. 200.—Chili.

caespitosum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 63.—Chili.

microphyllum, Phil. l. c. xxviii. (1856) 687 = *M. microphyllum*.

strictum, [Kunze, in] Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 26 = *M. alatus*.

striosum, Walp. Rep. ii. 44, sphalm. = *praec.*

TETRAGLOSSA, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. II. xxii. (1861) 70 = *Cleidion*, Blume (Euphorb.).
indica, Bedd. l. c. = *C. javanicum* ?

TETRAGONANTHUS, S. G. Gmel. Fl. Sibir. iv. 113 (1769) = *Halenia*, Borkh. (Gentian.).

TETRAGONELLA, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 245 (1844) = *Tetragonia*, Linn. (Ficoid.).
implexica, Miq. l. c. (*amplexica*) = *Tetragonia implexica*.

TETRAGONIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *FICOIDAE*, Benth. & Hook. f. i. 854.

DEMIDOVIA, Pall. Hort. Demid. 150. t. 1 (1781).

LUDOLFFIA, Adans. Fam. ii. 244 (1763).

TETRAGONIA:—

TETRAGONELLA, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 245 (1844).

angustifolia, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. ii. 470.—Chili.

Arbuscula, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 467.—Afr. austr.

calycina, Fenzl, l. c. 466.—Afr. austr.

chenopodioides, Eckl. & Zeyh. Enum. 324.—Afr. austr.

cornuta, Gaertn. Fruct. ii. 483 = *expansa*, Murr.

crystallina, L'Hérit. Stirp. Nov. 81. t. 39.—Peruv.

decumbens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Afr. austr.

diptera, F. Muell. Fragm. xi. 8.—Austral.

distorta, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 467.—Afr. austr.

echinata, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 177.—Afr. austr.

expansa, Murr. in Comm. Gotting. vi. (1783) 13.—Australas.

expansa, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 335.—Japan.

fruticosa, Linn. Sp. Pl. 480.—Afr. austr.

galenioides, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 463.—Afr. austr.

glauca, Fenzl, l. c. 468.—Afr. austr.

halimifolia, Forst. f. Prod. 39 = *expansa*, Murr.

halimoides, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 463.—Afr. austr.

Haworthii, Fenzl, l. c. 468.—Afr. austr.

herbacea, Linn. Sp. Pl. 480.—Afr. austr.

heterophylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 324.—Afr. austr.

hirsuta, Linn. f. Suppl. 258.—Afr. austr.

implexica, Hook. f. Fl. Tasm. i. 148.—Austral.

inermis, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 384 = *expansa*, Murr.

ivaefolia, Linn. f. Suppl. 257 = *Haloragis alata*.

japonica, Thunb. Fl. Jap. 208 = *expansa*, Thunb.

lanceolata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 14.—Afr. austr.

linearis, Haw. Rev. Pl. Succ. 73.—Afr. austr.

macrocarpa, Phil. Fl. Atac. 19.—Chili.

maritima, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. ii. 469.—Chili.

microcarpa, Phil. Anal. Univ. Chil. (1872) 717; Fl. Atac. 19.—Chili.

microptera, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 461.—Afr. austr.

nigrescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 323.—Afr. austr.

obovata, Haw. Rev. Pl. Succ. 73.—Afr. austr.

pedunculata, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 717.—Chili.

pentandra, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 404.—Ins. Socotra.

peruviana, Hort. Chels. ex Haw. in Phil. Mag. (1827) 124 = *Calandrinia phacosperma*.

portulacoides, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 462.—Afr. austr.

psiloptera, Fenzl, l. c. 466.—Afr. austr.

purpurea, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 234.—Hab. ?

pusilla, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 716.—Chili.

quadricornis, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 127 = *expansa*, Murr.

reduplicata, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 583.—Afr. trop.

robusta, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 467.—Afr. austr.

saligna, Fenzl, l. c. 469.—Afr. austr.

sarcophylla, Fenzl, l. c. 468.—Afr. austr.

spicata, Linn. f. Suppl. 258.—Afr. austr.

Tetrapteris, Haw. Misc. Nat. 121.—Afr. austr.

trigyna, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 77; et Handb. N. Zeal. Fl. 84.—N. Zel.

verrucosa, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 465.—Afr. austr.

villosa, Poir. Encyc. vii. 604 = *hirsuta*.

Zeyheri, Fenzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 465.—Afr. austr.

TETRAGONOCARPUS, Hassk. in Flora, xl. (1857) 99 = *Marsdenia*, R. Br. (Asclep.).

Teysmanni, Hassk. l. c. 100.—Malaya.

TETRAGONOLOBUS, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 87 (1772) = *Lotus*, Tourn. (Legumin.).

aduncus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 46 = *L. aduncus*.
aegaeus, Griseb. l. c. 45 = *L. aegaeus*.

biflorus, Ser. in DC. Prod. ii. 215 = *L. biflorus*.

TETRAGONOLOBUS:—

Boutelouii, Willk. Iber. Halbinsel, 116 = *Lotus siliquosus conjugatus*, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 264 = *L. conjugatus*.

edulis, Link, l. c. = *L. Tetragonolobus*.

glaucus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 284 = *L. siliquosus*.

guttatus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 182 = *L. conjugatus*.

maritimus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 323 = *L. siliquosus*.

monanthos, Sacc. & Penzig, in Bot. Centralbl. v. (1881) 285.—Hab. ?

palaestinus, Boiss. Diagn. Scr. II. ii. 20.—As. Min.; Syria.

prostratus, Moench, Meth. 164 = *L. siliquosus*.

purpureus, Moench, l. c. = *L. Tetragonolobus*.

Requienii, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 23 = *L. Requieni*.

Scandalida, Bernh. Syst. Verz. Erf. 243 = *L. uliginosus*.

siliquosus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 323 = *L. siliquosus*.

simplicifolius, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 397 = *Alysicarpus tetragonolobus*.

tauricus, Bunge, ex Nym. Consp. 182 = *L. siliquosus*.

Wiedemanni, Boiss. Fl. Orient. ii. 176 = *L. Wiedemanni*.

TETRAGONOSPERMA, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 166 = *Tetragonotheca*, Dill. (Compos.).

lyratifolium, Scheele, l. c. 167 = *Tetragonotheca texana*.

TETRAGONOTHECA, Dill. ex Linn. Gen. ed. I. 259 (1737). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 367.

BIKERA, Adans. Fam. ii. 130 (1763).

GONOTHECA, Rafin. in Mcd. Repos. N. York, v. (1808) 352.

HALEA, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 304 (1840).

TETRAGONOSPERMA, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 166.

abyssinica, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. Suppl. (1824) 7 = *Guizotia abyssinica*.

helianthoides, Linn. Sp. Pl. 903.—Am. bor.

ludoviciana, A. Gray, in E. Hall, List. Pl. Tex. 13.—Am. bor.

parviflora, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28.—Ind. occ.

texana, A. Gray & Engelm. in Proc. Am. Acad. i. (1848) 48.—Texas; Mexic.

TETRAGYNE, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 463 (1860). Genus dubium *EUPHORBIACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. iii. 257.

acuminata, Miq. l. c. 464.—Sumatra.

TETRAHIT, Adans. Fam. ii. 190 (1763) = *Galeopsis*, Linn. (Labiata).

grandiflorum, Gilib. Fl. Lituan. i. 83 = *G. Tetrahit*.

Ladanum, Moench, Meth. 394 = *G. Ladanum*.

leucanthum, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 135 = *G. Tetrahit*.

longiflorum, Moench, Meth. 395 = *G. ochroleuca*.

Navieri, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 135 = *G. Tetrahit*.

nodosum, Moench, Meth. 395 = *G. Tetrahit*.

praecox, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 135 = *G. Tetrahit*.

purpurascens, Gilib. Fl. Lituan. i. 83 = *G. Tetrahit*.

Reichenbachii, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 135 = *G. Tetrahit*.

sulfureum, Fourn. l. c. = *G. versicolor*.

TETRAHITUM, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 103 (1809) = *Stachys*, Tourn. (Labiata).

hirtum, Hoffmgg. & Link, l. c. 104 = *S. hirta*.

TETRALEPIS, Steud. Syn. Pl. Cyp. 159 (1855) = *Cyathochaeta*, Nees (Cyperac.).

australis, Steud. l. c. = *C. avenacea*.

TETRALIX, Griseb. Cat. Pl. Cub. 8 (1866). Genus dubium *BIXINEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. i. 971.

brachypetalus, Griseb. l. c. 9.—Cuba.

TETRALIX, Hill, Veg. Syst. iv. 18 (1762) = *Cnicus*, Linn. (Compos.).

eriphora, Hill, Herb. Brit. i. 75 = *C. eriphorus*.

TETRALOBUS, A. DC. in DC. Prod. viii. 667 (1844) = *Polypompholyx*, Lehm. (Lentib.).

Preissii, A. DC. l. c. = *P. multifida*.

pusillus, A. DC. l. c. = *P. tenella*.

TETRALOPHA, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1072 (1870). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 120. Motley, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1072*.—Borneo.

TETRALYX, Hill, Hort. Kew. 61 (1768) = **TETRALIX**, Hill = **Cnicus**, Linn. (Compos.).

TETrameLES, R. Br. in Denh. & Clapp. Trav. II. 230 (App. 25) (1826). *DATISCEAE*, Benth. & Hook. f. i. 845.

ANICTOCLEA, Nimmo, in J. Grah. Cat. Bomb. Pl. 252 (1835).
Grahamiana, Wight, Ic. t. 1956 = nudiflora.
Horsfieldii, Steud. Nom. ed. II. ii. 671 = nudiflora.
nudiflora, R. Br. in *Benn. Pl. Jav. Rav.* 79. t. 17.—Ind. or.; Malaya.
rufinervis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 726; Pl. Jungh. 401 = nudiflora.

TETRAMERIS, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 120. t. 4 = **COMOLIA**, DC. (Melastom.).
Aubletii, Naud. l. c. 127 = *C. Aubletii*.
brachyandra, Naud. l. c. = *Pterolepis glomerata*, Tibouchina versicolor.
cerastifolia, Naud. l. c. 122 = *Tibouchina cerastifolia*.
excoriata, Naud. l. c. 125 = *C. violacea*.
isanthera, Naud. l. c. 123 = *Tibouchina versicolor*.
Martiana, Naud. l. c. 121 = *Tibouchina sebastianopolitana*.
nitida, Naud. l. c. 127 = *Tibouchina nitida*.
repanda, Naud. l. c. = *Pterolepis repanda*.
rotundifolia, Naud. l. c. 124 = *C. denudata*.
serrulata, Naud. l. c. 123 = *Tibouchina nitida*.
Sertularia, Naud. l. c. 126 = *C. Sertularia*.
simplicicaulis, Naud. l. c. 122 = *Tibouchina simplicicaulis*.
stenodon, Naud. l. c. 126 = *C. stenodon*.
trivialis, Naud. l. c. 121. t. 4 = *Macairea multinervia*.
uruguayensis, Naud. l. c. 127 = *Tibouchina nitida*.
versicolor, Naud. l. c. = *Tibouchina versicolor*.
villosa, Naud. l. c. 127 = *C. villosa*.
violacea, Naud. l. c. 124 = *C. lanceaeflora*.
viscidula, Naud. l. c. 125 = *C. sessilis*.

TETRAMERISTA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 534 (1860). *OCHNACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 318.
glabra, Miq. l. c.—Malaya.
paniculata, Kurz, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 333.—Malaya.

TETRAMERIUM, Gaertn. f. Fruct. iii. 90. t. 196 (1805) = **FARAMEA**, Aubl. (Rubiaceae).
coeruleum, Nees, ex Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. i. (1824) 13 = *F. coerulea*.
jasminoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 373. t. 287 = *F. jasminoides*.
latifolium, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 30 = *F. latifolia*.
montevidense, Cham. & Schlecht. l. c. 29 = *F. montevidense*.
multiflorum, Bartl. ex DC. Prod. iv. 497 = *F. guayaquilensis*.
occidentale, Nees, ex Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. i. (1824) 13 = *F. odoratissima*.
odoratissimum, Gaertn. f. Fruct. iii. 90. t. 196 = *F. odoratissima*.
oleaefolium, Spreng. Syst. i. 409 = *Coffea oleifolia*.
paniculatum, Spreng. l. c. = *Coffea paniculata*.
sessilifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 374 = *F. sessilifolia*.
stipulaceum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 31 = *F. stipulacea*.

TETRAMERIUM, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 147. t. 48 (1844). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1121.
HENRYA, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 148. t. 49 (1844).
glandulosum, Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 171.—Mexic.
hispidum, Nees, in DC. Prod. xi. 468.—Mexic.
nervosum, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 148. t. 48.—Am. centr.
ovalifolium, Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 170.—Mexic.
ovatum, Oerst. l. c. 169.—Mexic.
platystegium, Torr. in *Bot. Mex. Bound.* 126.—Am. bor.

TETRAMERIUM:—

polystachyum, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 147.—Am. austr.
racemosum, Nees, l. c. 148, in obs.; et in DC. Prod. xi. 468.—Ind. occ.
scorpioides, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 526.—Am. centr.

TETRAMICRA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 119 (1831). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 532.

LEPTOTES, Lindl. Bot. Reg. t. 1625 (1833).
bicolor, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1883) II. 20.—Bras.
Eulophiae, Reicheb. f. ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 264.—Cuba.
montana, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 622 = *Octadesmia serratifolia*.
parviflora, Lindl. ex Griseb. l. c.—Jamaic.
platyphylla, Griseb. Cat. Pl. Cub. 264 = *Bletia sarcophylla*.
rigida, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 119.—Ind. occ.
schoenina, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 533.—Ins. S. Doming.
tenera, Griseb. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 314 = *Eulophiae*.

TETRAMOLOPIUM, Nees, Gen. et Sp. Aster. 202 (1833), partim. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 282.
ochraceum, DC. Prod. v. 262.—Ecuador.
phylloides, DC. l. c.—Mexic.
rupestre, Nees, Gen. et Sp. Aster. 203 = *Diplostegium rupestre*.
tenerrimum, Nees, l. c. 203.—Ins. Sandvic.

TETRAMORPHEA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 331 = *Centaurea*, Linn. (Compos.).
Belangeriana, DC. Prod. vi. 609 = *C. phyllocephala*.
Bruguieriana, DC. l. c. = *C. phyllocephala*.

TETRANDRA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 929 (1859) = **Tournefortia**, Linn. (Borag.).
glabra, Miq. l. c. = *Tourn. Wallichii*.
Wallichii, Miq. l. c. 928 = *Tourn. Wallichii*.
Zollingeri, Miq. l. c. = *Tourn. Wallichii*.

TETRANEMA, Benth. in Bot. Reg. (1843) t. 52. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 942.
mexicanum, Benth. in Bot. Reg. (1843) t. 52.—Mexic.

TETRANEMA, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 149 (1830) = **Desmodium**, Desv. (Legumin.).
nutans, Sweet, l. c. = *D. tiliaefolium*.

TETRANTHA, Poit. ex DC. Prod. v. 696, 503 (1836) = **Rienocurtia**, Cass. (Compos.).
suaveolens, Poit. ex DC. l. c. 504 = *R. glomerata*.

TETRANTHERA, Jacq. Hort. Schoenb. i. 59. t. 113 (1797) = **Litsea**, Lam. (Laurin.).
accedens, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 383 (= *Cylicodaphne accedens*).—Borneo.
acuminatissima, Blume, l. c. 381 = *L. amara*.
aestivalis, Spreng. Syst. ii. 267 = *L. geniculata*.
albicans, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 102.—Burma.
albida, Spreng. Syst. ii. 267 = *Sassafras officinale*.
alnoides, Miq. Pl. Jungh. 180 = *L. polyantha*.
amara, Nees, Syst. Laurin. 551 = *L. amara*.
ambigua, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 377.—Ins. Molucc.
ambrosa, Wall. Cat. n. 2564, sphalm. = *L. umbrosa*.
angulata, Nees, Syst. Laurin. 544 = *L. angulata*.
angusta, Wall. Cat. n. 6344 = *L. amara*.
angustifolia, Wall. l. c. n. 2537.—Ind. or.
angustifolia, Wall. l. c. n. 2559 = *Actinodaphne angustifolia*.
angustifolia, Zoll. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 182 = *L. citrata*.
apetala, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 222 = *L. tomentosa*.
apetala, Herb. Mus. Par. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 382 = *L. timoriana*.
apetala, Roxb. Pl. Corom. ii. 25 = *L. Sebifera*.
areolata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 381.—N. Guin.
attenuata, Wall. Cat. n. 2534 = *salicifolia*, Roxb.
bancana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 950.—Ins. Banca.
bandongana, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 114, 115 = *L. Noronhae*.

TETRANTHERA:—

Baula, Buch.-Ham. ex Nees, in Wall. Cat. n. 2540 B; et Pl. As. Rar. ii. 67 (= *Cylicodaphne nitida*).—Ind. or.
Berterii, Spreng. Syst. ii. 267.—Am. austr.
bifaria, Wall. Cat. n. 2530 = *Lindera heterophylla*.
bifurca, Steud. Nom. ed. II. ii. 671, sphalm. = *praece*.
Bindoniana, F. Muell. Fragm. v. 167.—Austral.
Blumei, Miq. Pl. Jungh. 178 = *seq.*
Blumii, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 65 = *Litsea ferruginea*.
borneensis, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 184.—Borneo.
brachystachya, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 384.—Java.
Brawas, Blume, l. c.—Sumatra.
caduca, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2559 = *Actinodaphne angustifolia*.
calicaris, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 216 = *T. Tangao*.
californica, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 159 = *Umbellularia californica*.
calononeura, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 946.—Java.
calophylla, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 102 = *martabanica*.
calophylla, Miq. Pl. Jungh. 183 = *L. Tetranthera*.
calycaris, Hook. f. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 191 = *calicaris*.
camphoracea, Wall. ex Meissn. l. c. 25 = *Cinnamomum inunctum*.
capitata, Roxb. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 65 = *L. Sebifera*.
capitulata, Miq. Pl. Jungh. 182 = *L. amara*.
caudata, Wall. Cat. n. 2566 (= *Daphnidium caudatum*).—Ind. or.
cauliflora, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 69 = *L. longifolia*.
causticans, Pasq. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. i. (1869) 290 = *Umbellularia californica*?
celastroides, Miq. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 180 = *L. ligustrina*.
Cervantesii, Nees, Syst. Laurin. 553 = *L. glaucescens*.
chartacea, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 186, partim.—Reg. Himal.
chartacea, Wall. Cat. n. 2531.—Nepal.
chrysantha, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 376 = *L. minuta*.
chrysophaena, Blume, l. c. 377.—Ins. Molucc.
chrysopleura, Blume, l. c. 383.—Java.
citrata, Nees, Syst. Laurin. 560 = *L. citrata*.
citrifolia, Spreng. Syst. ii. 266 = *L. Sebifera*.
cordata, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 34.—Sumatra.
cordifolia, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 196, sphalm. = *cordata*.
coriacea, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2556.—Ins. Penang.
crassifolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 386.—Borneo.
Cubeba, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 199 = *L. Cubeba*.
Cuipala, D. Don, Prod. Fl. Nep. 65 = *L. lanuginosa*.
cuneata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 375.—Ins. Celebes.
cuspidata, Blume, l. c. 383.—Java.
Daradmeda, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2554 E = *L. Sebifera*.
dealbata, R. Br. Prod. 403 = *L. dealbata*.
Dengek, Miq. Pl. Jungh. 178 = *L. fulva*.
Diepenhorstii, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 363.—Sumatra.
Diglatia, Buch.-Ham. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 66 = *salicifolia*, Roxb.
Diospyros, Spreng. Syst. ii. 267 = *Lindera melissaefolia*.
discolor, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 382 = *L. timoriana*.
diversifolia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 90 = *L. diversifolia*.
diversifolia, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 114 (= *Cylicodaphne sumatrana*).—Malaya.
Doshia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 65 = *L. oblonga*.
elliptica, Nees, Syst. Laurin. 550 = *L. elliptica*.
elongata, Hook. f. & Thoms. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 181.—Ind. or.
elongata, Wall. Cat. n. 2546 = *L. elongata*.
fagifolia, Wall. l. c. n. 2539 = *Beilschmiedia fagifolia*.
faginea, Miq. Pl. Jungh. 181 = *L. amara*.
Fawcettiana, F. Muell. Fragm. v. 168 = *reticulata*, Meissn.
ferruginea, R. Br. Prod. 403 = *L. hexantha*.
ferruginea, F. Muell. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 73 = *Endiandra pubens*.
firma, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 381.—Borneo.

TETRANTHERA :—

- flexuosa*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 382.—Ins. Molucc.
floribunda, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 199 = *Litsea citrata*.
floridana, Shutt. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 181 = *L. geniculata*.
foliosa, Wall. Cat. n. 2563 = *L. zeylanica*.
Forstenii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 383.—Ins. Celebes.
fruticosa, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 189 = *L. polyantha*.
fruticosa, Nees, Syst. Laurin. 543 = *L. amara*.
fruticosa, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 823.—Ind. or.
fruticosa, Span. in Linnaea, xv. (1841) 346, nomen = *undulata*.
fulva, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 377 = *L. fulva*.
furfuracea, Wall. Cat. n. 2568 = *L. zeylanica*.
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 255 = *L. Gardneri*.
gemelliflora, Miq. Pl. Jungh. 179.—Sumatra.
geminata, Nees, Syst. Laurin. 559 = *L. Sebifera*.
geniculata, Nees, l. c. 567 = *L. geniculata*.
glaberrima, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 255 = *L. glaberrima*.
glabra, Roxb. Hort. Beng. 73, nomen.—Ind. or.
glabraria, Nees, Syst. Laurin. 569 = *L. Sebifera*.
glabrata, Wall. Cat. n. 2543.—Ind. or.
glauca, Wall. l. c. n. 2533 = *salicifolia*, Roxb.
glaucescens, Spreng. Syst. ii. 267 = *L. glaucescens*.
glaucescens, Wall. Cat. n. 2560 = *Cinnamomum Ceidodaphne*.
grandiflora, Wall. l. c. n. 2544 = *Dodecadinia grandiflora*.
grandis, Wall. l. c. n. 2552.—Ins. Penang.
Griffithii, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 191.—Malacca.
Gullavara, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2593 = *Actinodaphne angulifolia*.
hexantha, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 189 = *L. polyantha*.
Hirana, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2554 F = *L. polyantha*.
hispidula, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 374 = *L. Sebifera*.
Hookeriana, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 188.—Zeylan.
hypoglaucia, Miq. Pl. Jungh. 182 = *Actinodaphne glomerata*.
impressa, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 378.—Java.
insignis, Blume, l. c. 382.—Sumatra.
intermedia, Blume, l. c. 383.—Java.
itiodaphne, Nees, Syst. Laurin. 542 = *L. ovalifolia*.
japonica, Spreng. Syst. ii. 266 = *L. japonica*.
japonica, Wight, ex Wall. Cat. n. 2550 B = *L. tomentosa*.
khasyana, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 185.—Reg. Himal.
laeta, Wall. Cat. n. 2541 = *L. laeta*.
lanceaefolia, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 822 = *salicifolia*, Roxb.
lancifolia, Roxb. ex Wall. Cat. n. 2532 = *L. minuta*.
lanuginosa, Wall. l. c. n. 2561 = *L. lanuginosa*.
laurifolia, Jacq. Hort. Schoenb. i. 59 = *L. Sebifera*.
laurifolia, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 823 = *salicifolia*, Roxb.
leiantha, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 300.—Ins. Andam.
Lhuysii, Carr. in Rev. Hort. (1869) 368.—Japon.
ligustrina, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 65 = *L. ligustrina*.
ligustrina, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 254.—Zeylan.
litoralis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 375 = *L. Sebifera*.
longifolia, Nees, Syst. Laurin. 528 = *L. longifolia*.
longifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 255 = *L. laeta*, *glaberrima*.
lucida, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 90.—Java.
lusona, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 200 = *Lindera heterophylla*.
luzonica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 377 = *L. luzonica*.
macrantha, Wall. Cat. n. 2587 = *L. Sebifera*.
macrocalyx, Hance, in Journ. Bot. xv. (1877) 336.—China.
macrocarpa, Nees, Syst. Laurin. 565 (= *Nothaphoebe cuneata*).—Malaya.
macrophylla, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 822.—Ind. or.
macrophylla, Wall. Cat. n. 2549 = *L. polyantha*.
mappacea, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 381.—Sumatra.

TETRANTHERA :—

- martabanica*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 301.—Burma.
megapotamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 156.—Bias.
melaestomacea, Wall. Cat. n. 2565 = *Lindera melaestomacea*.
Merawas, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 362.—Sumatra.
micrantha, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 83 = *coriacea*.
Mogal, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 383.—Java.
mollis, Blume, l. c. 372.—Java.
mollis, Miq. Pl. Jungh. 179.—Java?
monopetala, Roxb. Pl. Corom. ii. 26 = *Litsea polyantha*.
multiflora, Nees, Syst. Laurin. 544 = *L. Sebifera*.
multiflora, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. 114 = *grandis*.
myristicaefolia, Wall. Cat. n. 2548.—Burma.
Myrrha, Koster. Allg. Med.-Pharm. Flora, ii. 479 = *L. trinervia*?
Neesiana, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 712 = *L. Neesiana*.
Neesiana, Wall. Cat. n. 2558 = *Lindera Neesiana*.
nemoralis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 255 = *L. nemoralis*.
nervosa, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 187 = *L. glaberrima*.
nigricans, Meissn. l. c. 190.—Borneo.
nitens, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 375.—Java.
nitida, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 818 (= *Cylicodaphne nitida*).—Ind. or.
nuculacea, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) 11. 102.—Burma.
oblonga, Wall. Cat. n. 2542 = *L. oblonga*.
obovata, Wall. l. c. n. 2562 = *Actinodaphne obovata*.
obscura, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 386.—N. Guin.
obtusa, Nees, Syst. Laurin. 564 = *L. obtusa*.
ochrasces, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 363 = *L. rugosa*.
oleoides, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 195.—Ind. or.
oppositifolia, Miq. Pl. Jungh. 178 = *L. fulva*.
ovalifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 256 = *L. ovalifolia*.
oxyphylla, Wall. Cat. n. 2547 (= *Aperula oxyphylla*).—Ins. Penang.
pallens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 68 = *L. umbrosa*.
pallida, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 377.—Celebes.
palmatinervia, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 191.—Ins. Fiji.
Panamansa, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 67 = seq.
Panamansa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2553.—Ind. or.
Panshia, Herb. Buch.-Ham. ex Wall. l. c. n. 2554 D = *L. Sebifera*.
Pantjara, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 385.—Java; Sumatra.
pentandra, Roxb. Fl. Ind. iii. 824 = *L. zeylanica*.
Perrottetii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 384 = *L. Perrottetii*.
Pichurim, Spreng. in Berl. Jahrb. (1821) t. 3; ex Pritz. Ic. Ind. i. 1093 (Quid?).—Hab.?
Pickeringii, A. Gray, ex Seem. Fl. Vit. 203.—Ins. Fiji.
picta, Carr. in Rev. Hort. (1869) 367.—Japon.
pilosa, Spreng. Syst. ii. 267 = *Machilus pilosa*.
platyphylla, Nees, Syst. Laurin. 570 = *L. Sebifera*.
polyantha, Wall. Cat. n. 2538 = *L. citrata*.
polycephala, Wall. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 179 = *L. Sebifera*.
polyneura, Hort. Bog. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 939 (= *Lepidadenia polyneura*).—Java?
propinqua, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 385.—Sumatra.
prunifolia, Wall. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 241 = *Lindera Neesiana*.
Pseudo-angulata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 385 = *L. Noronhae*.
pulcherrima, Wall. Cat. n. 2567 = *L. zeylanica*, *umbrosa*.
pusilla, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 376 = *L. minuta*.
quadriflora, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 821.—Ind. or.
racemosa, Spreng. ex Nees, Syst. Laurin. 394 = *Ocotea tristis*.
rangoonensis, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 187.—Burma.
resinosa, Nees, Syst. Laurin. 550 = *L. resinosa*.
reticulata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2551 = *Lindera reticulata*.

TETRANTHERA :—

- reticulata*, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 192.—Austral.
riparia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 382.—Ins. Molucc.
robusta, Nees, Syst. Laurin. 564 = *Litsea robusta*.
rotundifolia, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 200 = *Actinodaphne chinensis*.
Roxburghii, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 65 = *L. Sebifera*.
rubra, Miq. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 202 = *L. Noronhae*.
rubra, Nees, Syst. Laurin. 564 = *L. rubra*.
Rumphii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 382.—Ins. Molucc.
salicifolia, Roxb. ex Wall. Cat. n. 2536.—Ind. or.
salicifolia, Zoll. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 179 = *L. Sebifera*.
saligna, Hook. f. & Thoms. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 185 = *salicifolia*, Roxb.
saligna, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 67 = *angustifolia*.
Sebifera, Spreng. Syst. ii. 267 = *L. Sebifera*.
Seemannii, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 192.—Ins. Fiji.
semecarpifolia, Wall. Cat. n. 6345 A = *L. polyantha*.
sericea, Wall. l. c. 2545.—Reg. Himal.
sikkimensis, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 181 = *L. elongata*.
subovata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 362.—Sumatra.
Tangao, R. Cunn. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 380.—N. Zel.
tersa, Spreng. Syst. ii. 267 = *L. Sebifera*.
Thomsonii, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 183.—Ind. or.
timoriana, Span. in Linnaea, xv. (1841) 346, nomen = *L. timoriana*.
tomentosa, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 65 = *L. Sebifera*.
tomentosa, Roxb. ex Wall. Cat. n. 2550 A, B = *L. tomentosa*, *Heyne*.
trinervia, Spreng. Syst. ii. 266 = *L. zeylanica*, *trinervia*?
umbrosa, Wall. Cat. n. 2564 (*ambrosa*) = *L. umbrosa*.
undulata, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 346, nomen.—Ins. Timor.
utilis, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 183.—Borneo.
varians, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 376.—Sumatra.
velutina, Blume, l. c.—Ind. or.
venulosa, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 187.—Ind. or.
verticillata, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. l. c. 189 = *L. polyantha*.
verticillata, Wall. ex Meissn. in DC. l. c. 214 = *Actinodaphne angustifolia*.
vestita, Nees, Syst. Laurin. 551 = *L. tomentosa*, *Blume*.
vestita, Wall. Cat. sub n. 2530 = *bifaria*?
villosa, Boj. Hort. Maurit. 272 = *L. polyantha*.
villosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 359 = *L. Neesiana*.
villosa, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 350 = *L. villosa*.
virens, Nees, Syst. Laurin. 536.—Ins. Penang.
vitiana, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 514.—Ins. Fiji.
Waitziana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 384.—Java.
Wightiana, Wall. Cat. n. 2557 = *L. Wightiana*.
Wightii, Nees, Syst. Laurin. 523.—Ind. or.
xanthophylla, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 381.—Sumatra.
Zollingeriana, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 114, 115 = *intermedia*.
- TETRANTHUS**, Sw. Prod. Veg. Ind. Oec. 116 (1788). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 343.
Berterii, Spreng. Syst. iii. 459 = *Pinillosia tetranthoidea*.
hirsutus, Spreng. Neue Entdeck. iii. 40.—Ins. S. Doming.
littoralis, Spreng. Syst. iii. 459 = *hirsutus*.
littoralis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 116.—Ins. S. Doming.
ruderalis, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 234 = *Eleutheranthera ovata*.
thymoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 286 = *Thymopsis Wrightii*.
- TETRAOTIS**, Reinw. in Blume, Bijdr. 892 (1826) = **Enhydra**, Lour. (Compos.).
longifolia, Reinw. l. c. = *E. paludosa*.
paludosa, Reinw. l. c. = *E. paludosa*.

TETRAPANAX, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 371 = *Fatsia*, Decne. (Araliac.).
innovans, C. Koch, l. c. = *Acanthopanax innovans*.
papyrifera, C. Koch, l. c. = *F. papyrifera*.
ricinifolium, C. Koch, l. c. = *Acanthopanax ricinifolium*.

TETRAPASMA, G. Don, Gen. Syst. ii. 40 (1832) = *Discaria*, Hook. (Rhamn.).
juncea, G. Don, l. c. = *D. australis*.

TETRAPATHAEA, Reichb. Consp. 132 (1828) = *Passiflora*, Linn.
australis, Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 123 = *P. tetrandra*.

TETRAPELTIS, Wall. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 212 (1832) = *Otochilus*, Lindl. (Orchid.).
fragrans, Wall. ex Lindl. l. c. 213 = *O. porrecta*.

TETRAPETALUM, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 1 (1865-66). *AVONACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 955.
volubile, Miq. l. c. — Borneo.

TETRAPHYLAX, De Vriese, in Nat. Verh. Haarl. x. (1854) 164 = *Goodenia*, Sm.
quadrilocularis, De Vriese, l. c. 165 = *G. quadrilocularis*.

TETRAPHYLE, Eckl. & Zeyh. Enum. 292 (1837) = *Crassula*, Dill.
campestris, Eckl. & Zeyh. l. c. 294 = *Tillaea pharnaceoides*.

corallina, Eckl. & Zeyh. l. c. 293 = *C. corallina*.
furcata, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. furcata*.
lanceolata, Eckl. & Zeyh. l. c. 294 = *C. lanceolata*.
littoralis, Eckl. & Zeyh. l. c. 293 = *C. littoralis*.
lycopodioides, Eckl. & Zeyh. l. c. 294 = *C. lycopodioides*.
muscosa, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. muscosa*.
parvula, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. parvula*.
polpodacea, Eckl. & Zeyh. l. c. 293 = *C. polpodacea*.
propinqua, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. propinqua*.
pyramidalis, Eckl. & Zeyh. l. c. 292 = *C. pyramidalis*.
quadrangula, Eckl. & Zeyh. l. c. 293 = *C. quadrangula*.

TETRAPHYLLUM, Griff. Notul. iv. 148 (1854). *CYRTANDREAE*.
bengalense, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 137.—Ind. or.

TETRAPILUS, Lour. Fl. Cochinch. 611 (1790) = *Olea*, Tourn.
axillaris, Rafin. Sylva Tellur. 138.—Hab.?
brachiatus, Lour. Fl. Cochinch. 611 = *O. maritima*.

TETRAPLACUS, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. xv. (1885) 261. *SCROPHULARINEAE*.
platychilus, Radlk. l. c. 262.—Bras.

TETRAPLANDRA, Baill. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ix. (1858) 200 = *Algernonia*, Baill. (Euphorb.).
Leandri, Baill. l. c. 202.—Bras.
Riedelii, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 534.—Bras.

TETRAPLASANDRA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 727. t. 94 (1854). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 947.
hawaiiensis, A. Gray, l. c. 728. t. 94.—Ins. Sandvic.
paucidentis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 4.—N. Guin.
Waimeae, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 158.—Ins. Sandvic.

TETRAPLASIUM, Kunze, in Flora, xiv. (1831) 378 = *Tetilla*, DC. (Saxifr.).
petiolare, Kunze, ex Walp. Rep. ii. 265 = *Tetilla hydrocotylaefolia*.

TETRAPLEURA, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 345. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 590.
andongensis, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 331.—Afr. trop.
obtusangula, Welw. ex Oliver, l. c.—Afr. trop.
Thonningii, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 345.—Afr. trop.

TETRAPLEURA, Parl. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 131 (1849) = *Tornabenia*, Parl. (Umbell.).
insularis, Parl. ex Webb, l. c. = *Torn. insularis*.

TETRAPOGON, Desf. Fl. Atlant. ii. 388. t. 255 (1799). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1170.
macranthus, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 106.—Arab.
villosus, Desf. Fl. Atlant. ii. 388. t. 255.—Afr. bor.

TETRAPOMA, Turcz. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. (1835) 39 = *Nasturtium*, Linn. (Crucif.).
barbareaefolium, Turcz. l. c. 39 = *N. palustre*.
Crusianum, Walp. Rep. i. 154, sphalm. = seq.
Kruhsianum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 39 = *N. palustre*.
pyriforme, Seem. Bot. Voy. Herald, 24. t. 2.—Sibir.

TETRAPORA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = *Baeckea*, Linn. (Myrtac.).
glomerata, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 329 = *B. pentandra*.
Preissiana, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = *B. pentandra*.
verrucosa, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 329 = *Kunzea recurva*.

TETRAPTERA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 172 (1847) = *Burmannia*, Linn.

TETRAPTERA, Phil. in Bot. Zeit. xxviii. (1870) 169 = *Gaya*, H. B. & K. (Malvac.).
parviflora, Phil. l. c. = *G. Gaudichaudiana*.

TETRAPTERIS, Cav. Diss. ix. 433. tt. 260-262 (1790). *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 260.
acapulcensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 168.—Mexic.
acuminata, Raeusch. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 521 = *mucronata*.
acutifolia, Cav. Diss. ix. 433. t. 261.—Guian.
acutifolia, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 236, partim = *psilandra*.
adenodon, Miq. l. c. xxii. (1849) 548 = *multiglandulosa*.
aequalis, Wright, in Sawv. Fl. Cub. 18.—Cuba.
affinis, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 519.—Bras.
allopterys, Moris, in Mem. Soc. Ital. Sc. Moden. xxiv. ii. (1850) 213.—N. Granat.
anisoptera, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 520.—Bras.
argentea, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. iv. (1840) 419.—Guatemala.
Benthamiana, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 88.—Bras.
Benthamii, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 333.—N. Granat.
brachyptera, Mart. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 524 = *magnifolia*.
bracteolata, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 238.—Bras.
buxifolia, Cav. Diss. ix. 434. t. 262. f. 1.—Ins. S. Doming.
calophylla, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 525.—Guian.
chalcophylla, A. Juss. l. c. 529 = *sericea*.
chamaecerasifolia, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 7. t. 162.—Bras.
chamaedrifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 672, sphalm. = *praec.*
cinerea, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 233.—Bras.
citrifolia, Pers. Syn. i. 508.—Jamaic.
citrifolia, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 857 = *inaequalis*.
complicata, Miq. Stirp. Surin. Sel. 82.—Guian.
Cotoneaster, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 528.—Mexic.
crebriflora, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 9.—Bras.
crebriflora, Mart. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 521, in obs. = *Guilleminiana*.
crispa, A. Juss. l. c. 522.—Guian.
crotonifolia, Benth. Pl. Hartw. 115 = *Benthamii*.
crotonifolia, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 526.—Peruv.

TETRAPTERIS:—

cuspidata, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 336.—N. Granat.
discolor, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 134 = *ovalifolia*.
discolor, DC. Prod. i. 587.—Guian.
eriocarpa, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. iv. (1840) 419.—Guatemala.
fimbriopetala, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 544.—Guian.
fraxinifolia, A. Juss. l. c. 537 = *lucida*.
Gaudichaudiana, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 9 = *Hiraea Gaudichaudiana*.
glaberrima, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 134 = *mucronata*.
glabra, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 82 = *punctulata*.
glandulosa, Griseb. l. c. 83.—Bras.
Goudotiana, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 333.—N. Granat.
gracilis, Walp. Ann. iii. 1152 (Index) = *maranhamensis*.
Guilleminiana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 534.—Bras.
helianthemifolia, Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1875) 144.—Bras.
heteropetala, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 88.—Bras.
humilis, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 546.—Bras.
inaequalis, Cav. Diss. ix. 433. t. 260.—Am. trop.
inclusens, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 133.—Guian.
Jamesonii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 394.—Ecuador.
Kohauti, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273 = *citrifolia*.
Lalandiana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 530 = *sericea*.
lancifolia, A. Juss. l. c. 536.—Bras.
Langsdorffiana, A. Juss. l. c. 539.—Bras.
lasiocarpa, A. Juss. l. c. 527 = *rotundifolia*.
laurifolia, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 88.—Bras.
leucanthele, Griseb. in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1003 (= *Mascagnia leucanthele*).—Bras.; Guian.
leucosepala, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 531.—Bras.
ligustrifolia, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 12.—Bras.
longibracteata, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 541.—Bras.
lucida, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 11.—Bras.
macrophylla, Poepp. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 77 = *ovalifolia*.
magnifolia, Ruiz, ex Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 22.—Bras.
maranhamensis, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 537.—Bras.
metallicolor, A. Juss. l. c. 531 = *punctulata*.
mexicana, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 281.—Mexic.
mogoriifolia, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 11.—Bras.
mollis, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 232.—Bras.
mucronata, Cav. Diss. ix. 434. t. 262. f. 2.—Guian.
multiflora, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 533 = *mogoriifolia*.
multiglandulosa, A. Juss. l. c. 532.—Bras.
mutabilis, Bunb. in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 109.—Bras.
nitida, Mart. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 523.—Bras.
obovata, Poepp. ex A. Juss. l. c. 314 = *Hiraea crassipes*.
oleifolia, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 86, in obs.—Guian.
ovalifolia, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 237.—Bras.
paludosa, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 540.—Bras.
panamensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = *Hiraea Barclayana*.
paniculata, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 245.—Porto Rico.
papyracea, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 334.—N. Granat.
pauciflora, DC. Prod. i. 587 = *Diplopterys Paralias*.

TETRAPTERIS :—

- Poeppigiana, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. 87.—Bras.
 psilandra, Griseb. l. c. 81.—Bras.
 puberula, Miq. in Hoeb. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 84.—Guian.
 punctulata, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 10.—Bras.
 racemulosa, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 547.—Bras.
 ramiflora, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 8, partim.—Bras.
 ramiflora, A. Juss. l. c., partim=humilis.
 renidens, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. 88.—Bras.
 rotundifolia, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 6. t. 161.—Bras.
 Schiedeana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 218.—Mexic.
 Seemanni, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 335.—Panama.
 sericea, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 529.—Bras.
 squarrosa, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. 87.—Bras.
 Stephaniana, Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1875) 143.—Bras.
 styloptera, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 542.—Peruv.
 suaveolens, A. Juss. l. c. 535.—Bolivia.
 surinamensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 55.—Guian.
 tinifolia, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 336.—N. Granat.
 trinitensis, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 524 = discolor.
 Turnerae, Mart. ex A. Juss. l. c. 546.—Bras.
 vacciniifolia, A. Juss. l. c. 543.—Venezuela.
 viburnifolia, Mart. ex A. Juss. l. c. 528 = rotundifolia.
 xylosteifolia, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 7.—Bras.
 Xylostium, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. 84.—Bras.
- TETRAPTERYGIIUM**, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 39 (1835). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 95.
glastifolium, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 204 = stylophorum.
glastifolium, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 39.—Armenia.
stylophorum, Faub. & Spach, Illustr. i. 100. t. 50.—Persia.
- TETRAPTERYS**, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. (1840) 261 = *Tetrapteris*, Cav.
- TETRARHAPHIS**, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1853) 143 [t. 17] = *Oxytheca*, Nutt. (Polygon.).
apiculata, Miers, ex Benth. in DC. Prod. xiv. 23 = *O. dendroidea*.
- TETRARIA**, Beauv. in Mém. Inst. Fr. [Acad. Sc. Par.] 1812 (1816), II. 54. *CYPERACEAE*, [Benth. & Hook. f. iii. 1063].
 BUEKIA, Nees, in Linnaea, ix. (1835) 300.
 CYATHOCOMA, Nees, l. c. (1835) 300.
 DECALEPIS, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 509.
 ELYNANTHUS, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 520; ix. 298 (1835).
 IDELERIA, Kunth, Enum. Pl. ii. 310 (1837).
 LEPISIA, Presl, Lepis. Nov. Pl. Gen. (1829); et Symb. Bot. i. 9. t. 5 (1830).
 SCLEROCHAETIUM, Nees, in Linnaea, ix. (1835) 302.
 TRICHOBALLIA, Presl, Symb. Bot. i. 9 (1830).
 compar, Beauv. in Lestib. Ess. Cyp. 36.—Afr. austr.
 Thuarii, Beauv. in Mém. Inst. Fr. [Acad. Sc. Par.] 1812 (1816), II. 54.—Afr. austr.
- TETRARRHENA**, R. Br. Prod. 209 (1810).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1138.
 acuminata, R. Br. l. c. 210.—Austral.
 distichophylla, R. Br. l. c.—Austral.
 Drummondiana, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 409 = laevis.
 juncea, R. Br. Prod. 210.—Austral.
 laevis, R. Br. l. c.—Austral.
 tenacissima, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 409 = juncea.

TETRASPERMA, Steud. Nom. ed. II. ii. 673 (1841), sphalm. = *TETRAPASMA*, G. Don = *Discaria*, Hook. (Rhamn.).
juncea, Steud. l. c. = *D. australis*.

TETRASPIDIUM, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 215. *SCROPHULARINEAE*.
laxiflorum, Baker, l. c.—Madag.

TETRASPORA, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 150 = *Baeckea*, Linn. (Myrtac.).
Gunniana, Miq. l. c. = *B. Gunniana*.

TETRASTEMON, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 317 = *Myrrhinium*, Schott (Myrtac.).
loranthoides, Hook. & Arn. l. c. 318 = *M. rubriflorum*.

TETRASTYLIDIUM, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 33 (1872) *OLACIENAE*.
brasiliense, Engl. l. c.—Bras.

TETRASTYLIS, Barb. Rodrig. in Rev. Engenh. (Nov. 14, 1882), reimpr. 1 = *Passiflora*, Linn.
montana, Barb. Rodrig. l. c., reimpr. 3 = *P. ovalis*.

TETRATAXIS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 783 (1867). *LYTHRARIEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.
TETRADIA, Thou. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 137.
salicifolia, Baker, Fl. Maurit. 100.—Ins. Mascar.

TETRATELEIA, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 58 (1859) = *Cleome*, Linn. (Cappar.).
maculata, Sond. l. c. (= *Polanisia maculata*).—Afr. austr.

TETRATHECA, Sm. Bot. Nov. Holl. i. t. 2 (1793).
TREMANDREAE, Benth. & Hook. f. i. 134.
PETROTHECA, Steud. Nom. ed. II. ii. 310 (1841), sphalm.

aculeata, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 218 = *hirsuta*.
affinis, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 7.—Austral.
aphylla, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, ii. (1882) 97.—Austral.

baueriaefolia, F. Muell. in Schuch. Syn. Trem. 29 = *ciliata*.
calva, Schuch. l. c. 25 = *pilosa*.
ciliata, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 206.—Austral.

confertifolia, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 214.—Austral.
denticulata, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. App. 147 = *pilosa*.

efoliata, F. Muell. Fragm. x. 3.—Austral.
elongata, Schuch. Syn. Trem. 38 = *setigera*.
epilobioides, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 218 = *hirsuta*.

ericifolia, F. Muell. Pl. Vict. i. 182, partim = *pilosa*.
ericifolia, Sm. Exot. Bot. i. 37. t. 20.—Austral.
ericoides, Planch. in Van Houtte, Fl. des Serres, x. (1854–55) 229. t. 1065 = *pilosa*.

filiformis, Benth. Fl. Austral. i. 135.—Austral.
galioides, Schnizl. Ic. t. 232 = *Platytheca galioides*.
glandulosa, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 95. t. 123.—Austral.

glandulosa, Sm. Exot. Bot. i. 39. t. 21 = *pilosa*.
gracilis, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 215 = *viminea*.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. i. 36 = *pilosa*.

Harperi, F. Muell. Fragm. v. 49. t. 38.—Austral.
hirsuta, Lindl. Swan River App. 38.—Austral.
hispidissima, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 217.—Austral.

juncea, Sm. Spec. Bot. Nov. Holl. t. 2.—Austral.
micrantha, Schuch. Syn. Trem. 43 = *pilifera*.
nuda, Lindl. Swan River App. 38.—Austral.
oppositifolia, Pers. Syn. i. 419 = *Boronia polygaliifolia*.

pilifera, Lindl. Swan River App. 38.—Austral.
pilosa, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 95. t. 122.—Austral.
Preissiana, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 219 = *pilifera*.

procumbens, Gunn, ex Hook. f. Fl. Tasm. i. 35 = *pilosa*.
pubescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 141.—Austral.

TETRATHECA :—

- rubiaeoides*, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 335 = *ericifolia*.
rubriseta, Lindl. Swan River App. 38 = *hirsuta*.
setigera, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 8.—Austral.
speciosa, Hort. ex Walp. Ann. ii. 87 = *Platytheca galioides*.
subaphylla, Benth. Fl. Austral. i. 132.—Austral.
tenuiramea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 142 = *pubescens*.
thymifolia, Sm. Exot. Bot. i. 41. t. 22.—Austral.
verticillata, Paxt. Mag. Bot. xiii. (1847) 171 = *Platytheca galioides*.
viminea, Lindl. Swan River App. 38.—Austral.
virgata, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 212.—Austral.

TETRATHYLACIUM, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 34. t. 240 (1842). *VIOLARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 119.

EDMONSTONIA, Seem. Bot. Voy. Herald, 98. t. 18 (1853 ?).
macrophyllum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 34. t. 240.—Chili.

TETRATHYRIUM, Benth. Fl. Hongk. 132 (1861) = *Loropetalum*, R. Br. (Hamamel.).
subcordata, Benth. l. c. 133 = *L. subcordatum*.

TETRATOME, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 46. t. 163 (1838) = *Mollinedia*, Ruiz & Pav. (Monim.).
arguta, Mart. ex Tul. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 321 = *M. nitida*.

cinerea, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 136 = *M. cinerea*.
elliptica, Gardn. l. c. i. (1842) 530 = *M. nitida*.
latifolia, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 47 = *M. latifolia*.

lepidota, Poepp. & Endl. l. c. = *Citriosma Poeppigii*.
racemosa, Poepp. ex Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 114 = *M. racemosa*.
tomentosa, Benth. Pl. Hartw. 250 = *M. tomentosa*.

triflora, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 46. t. 163 = *M. racemosa*.

TETRAULACIUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 53. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 949.

veronicaeforme, Turcz. l. c. 54.—Bras.

TETRAZYGIA, Rich. ex DC. Prod. iii. 172 (1828).

MELASTOMACEAE, Benth. & Hook. f. i. 762.
ANTHERYA, Rafin. Sylva Tellur. 95 (1838).
CHITONIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 339.

HARRERA, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 60 (1837).
LOMANTHERA, Rafin. Sylva Tellur. 96 (1838).
MICONIASTRUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 341.

NAUDINIA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. i. 561 (1845).
adenophora, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 53 = *Miconia aurea*.

albicans, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 100.—Ind. occ.
ancistrophora, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 48 = *Miconia ancistrophora*.

angustiflora, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 53 = *Miconia delicatula*, pallens.
angustifolia, DC. Prod. iii. 172.—Ind. occ.

brachycentra, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 49.—Cuba.
cornifolia, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 53 = *Miconia cinnamomifolia*.

crotonifolia, DC. Prod. iii. 172.—Ins. S. Doming.
discolor, DC. l. c.—Ind. occ.

elaeagnoides, DC. l. c.—Ind. occ.
elaeagnoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 98 = *Miconia delicatula*.

elaeagnoides, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 255 = *laxiflora*.
elaeagnoides, Hook. Bot. Mag. t. 4383 = *Miconia pallens*.

Fadyenii, Hook. Kew Journ. i. (1849) 379 = *Charl-anthus Fadyeni*.
hispida, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 58.—Jamaic.

laxiflora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 343.—Ind. occ.

semicrenata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 185 = *Miconia semicrenata*.
smaragdina, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 53 = *Miconia smaragdina*.

tetrandra, DC. Prod. iii. 172 = *Miconia tetrandra*.

TETRAZYGOS, Rich. ex DC. Prod. iii. 197 (1828) = *Charianthus*, D. Don (Melastom.).
ciliatus, Rich. ex DC. l. c. = *C. ciliatus*.

TETRAZYGUS, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 99 = praec.

TETREILEMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 199. Genus dubium *VERBENA-CEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1137.
articulatum, Turcz. l. c. 200.—Chili.
boliviense, Turcz. l. c. (bolierense).—Bolivia.

TETRODEA, Rafin. New Fl. Am. i. 81 (1836) = *Amphicarpaea*, Ell. (Legumin.).
comosa, Rafin. l. c. = *A. monoica*.
monoica, Rafin. l. c. = *A. monoica*.
subterranea, Rafin. l. c. = *Voandzeia subterranea*.

TETRODUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. iv. 264, 272 (1828) = *Helenium*, Linn. (Compos.).
quadridentatus, Cass. l. c. = *H. quadridentatum*.

TETRONCIUM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 17. *NAIADACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1013.
CATHANTHES, Rich. in Mém. Mus. Par. i. (1815) 365.
magellanicum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 17.—Reg. Magellan.

TETROCHIDIUM, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 23. t. 227 (1842). *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 288.
andinum, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 538.—Peruv.
macrophyllum, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1133.—Peruv.
parvulum, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 513.—Bras.
rubrivenium, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 23.—Costa Rica.
trigynum, Baill. Etud. Gén. Euph. 440 = *rubrivenium*.

TETROHIZA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 25 (1836) = *TRETORRHIZA*, Renealm. = *Gentiana*, Tourn.

TETRORRHIZA, Steud. Nom. ed. II. ii. 673 (1841) = praec.

TEUCRIDIDIUM, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 203. t. 49 (1854). *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1157.
parvifolium, Hook. f. Fl. N. Zel. 203. t. 49.—N. Zel.

TEUCRION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *Teucrium*, Tourn. (Labi.).
chamaedryum, St. Lag. l. c. = *Teucrium Chamaedrys*.
scorodonium, St. Lag. l. c. = *Teucrium Scorodonia*.

TEUCRIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1221.
BOTRYS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 138.
CHAMAEDRYS, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 630 (1742).
MELOSOMON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 (1836).
MONIPSIS, Rafin. l. c. (1836).
MONOCHILON, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 405 (1867).
POLIODENDRON, Noé, in Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 106. t. 173 (1835-60).
POLIUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
SCORDIUM, Cav. Ic. i. 19. t. 31 (1791).
SCORODONIA, Adans. Fam. ii. 188 (1763).
TRIXAGO, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 (1836).
abutiloides, L'Hérit. Stirp. Nov. 84.—Ins. Mader.
abyssinicum, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 586 = *T. Scordium*.
Achaemenis, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 44 = *T. Polium*.
aegypticum, Pers. Syn. ii. 112 = *T. Polium*.
africanum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 95.—Afr. austr.
albidum, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 286.—Alger.
album, Poir. Encyc. Suppl. ii. 770 = *T. Polium*.
Alopecurus, Noé, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 585.—Afr. bor.

TEUCRIUM :—

alpestre, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 31. t. 538.—Ins. Creta.
alpinum, Linn. Syst. ed. X. 1094 = *T. Botrys*.
alysifolium, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 104.—Lycia.
amplexicaule, Benth. Lab. Gen. et Sp. 687.—Hispan.
amplexicaule, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 594 (Beitr. Fl. Hercyn. 224) = *scordioides*.
angustifolium, Salisb. Prod. 76 = *fruticans*.
angustifolium, Steud. Nom. ed. I. 828 = *T. Polium*.
angustissimum, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 49 = *T. Polium*.
aragonense, Huet, ex Čelak. in Bot. Centralbl. xiv. (1883) 186 = *chlorocephalum*.
aragonense, Losc. & Pard. Ser. Inconf. 85 = *T. Polium*.
Arduini, Linn. Mant. i. 81.—Europ. austr.
arenarium, S. T. Gmel. Reise, i. 149. t. 26 = *T. Scordium*.
argutum, R. Br. Prod. 504.—Austral.
arcanum, Orph. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 55.—Graecia.
arvense, Salisb. Prod. 76 = *Ajuga Chamaepitys*.
asiaticum, Linn. Mant. i. 80 = *lancifolium*.
atratum, Pomel. Nouv. Mat. Fl. Atl. 304.—Alger.
aureiforme, Pomel, l. c. 113 = *T. Polium*.
aureum, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 43 = *T. Polium*.
australe, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 673 = *Anisomeles australis*.
baeticum, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 98 = *T. Pseudo-scorodonia*.
baeticum, Clem. ex Nym. Consp. 564 = *fruticans*.
Balansae, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 632 = *mauritanicum*.
balearicum, Coss. ex Marès. & Vigin. Cat. Pl. Baléar. 224 = *subspinosum*.
Belion, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 47 = *T. Polium*.
betonicaefolium, Jacq. Coll. i. 145 = *betonicum*.
betonicum, L'Hérit. Stirp. Nov. 83. t. 40.—Ins. Mader.
bicolor, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. [n. 25].—Peruv.; Chili.
Botrydium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *T. Botrys*.
botryoides, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 673 = *T. Botrys*.
Botrys, Linn. Sp. Pl. 562.—Europ.; Afr. bor.
bracteatum, Desf. Fl. Atlant. ii. 7. t. 120.—Reg. Mediterr. occ.
brevifolium, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 27.—Graecia; Ins. Creta.
bullatum, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 260.—Marocc.
buxifolium, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 42.—Hispan.; Creta.
caespitosum, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 430 = *T. Polium*.
campanulatum, Linn. Sp. Pl. 562.—Ital.; Graecia.
canadense, Linn. l. c. 564.—Am. bor.
canadense, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. ii. 409 = *occidentale*.
canariense, Lam. Encyc. ii. 692 = *heterophyllum*.
canescens, Forst. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) 58 = *betonicum*.
canum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 40 = *T. Chamaedrys*.
capense, Thunb. Prod. Pl. Cap. 95.—Afr. austr.
capitatum, Linn. Sp. Pl. 566 = *T. Polium*.
carthaginense, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1881) 97.—N. Granat.
causasicum, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 708 = *T. Scordium*.
Cavanillesii, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 674 = *bicolor*.
Cephalotes, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 116 = *T. Polium*.
chamaedriforme, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 16 = *cubense*.
Chamaedrys, Linn. Sp. Pl. 565.—Europ.; As. bor.; Oriens.
Chamaepitys, Linn. l. c. = *Ajuga Chamaepitys*.
charamoniense, Cav. Desc. 82 = *creticum*.
chilense, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 674.—Chili.
chium, J. F. Gmel. Syst. 893 = *Ajuga chia*.
chlorocephalum, Čelak. in Bot. Centralbl. xiv. (1883) 186.—Hispan.
chrysotrichum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1881) 96.—Europ.
Chutilia, Cav. ex Spreng. Syst. ii. 708 = *T. Polium*.
cinereum, Boiss. Elench. 79.—Hispan.

TEUCRIUM :—

cinereum, Rafin. New Fl. Am. iv. 98 (Quid ?).—Am. bor.
coeleste, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 49 = *T. Polium*.
collinum, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 258.—Marocc.
collinum, Salisb. Prod. 75 = *T. Botrys*.
collinum, Salisb. l. c. 77 = *T. Polium*.
Commersonii, Spreng. Syst. ii. 710 = *Salvia procurrens*.
compactum, Clem. ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 17.—Hispan.
compositum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 114 = *T. Polium*.
coniortodes, Boiss. & Blanche, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 818.—Syria.
corbariense, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. I. 829 = *resupinatum*.
corbariense, Pourr. ex Nym. Consp. 565 = *scordioides*.
cordifolium, Čelak. in Bot. Centralbl. xiv. (1883) 221.—Europ.
corymbiferum, Desf. Fl. Atlant. ii. 8 = *T. Polium*.
corymbosum, R. Br. Prod. 504.—Austral.
creticum, Lam. Encyc. ii. 692 = *brevifolium*.
creticum, Linn. Sp. Pl. 563.—Reg. Mediterr.
crispum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 304 = *T. Pseudo-scorodonia*.
cubense, Jacq. Enum. Pl. Carib. 25.—Am. bor. et trop.
cuneifolium, Schimp. ex Boiss. Diagn. Ser. I. v. 44 = *leucocladum*.
cuneifolium, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 30. t. 537.—Ins. Creta.
cuneifolium, Webb, Iter Hisp. 23 = *fragile*.
cuspidatum, Čelak. in Bot. Centralbl. xiv. (1883) 222.—Europ.
cylindricum, Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 829 = *T. Polium*.
cymosum, Pers. Syn. ii. 112.—Hispan.
cyprium, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 43.—Ins. Cyprus.
Decaisnii, Presl, Bot. Bermerk. 100.—Arab.
deciens, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 258.—Marocc.
densiflorum, Vis. Sem. Rar. Hort. Patav. (1847) 4.—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 181 = *Arduini*.
divaricatum, Sieber, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 682, in syn.; Boiss. Fl. Orient. iv. 816.—Graec.; As. Min.; Syria.
diversiflorum, Moench, Meth. Suppl. 132 = *campanulatum*.
elevatum, Benth. in Wall. Cat. n. 2026 = *stoloniferum*.
elongatum, Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt. 146 = *T. Scordium*.
eriocalyx, Čelak. in Bot. Centralbl. xiv. (1883) 187.—Hispan.
eriocephalum, Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 58.—Hispan.
euganeum, Vis. Ind. Sem. Hort. Patav. (1836); ex Walp. Rep. iii. 923 = *T. Scorodonia*.
fasciculatum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 767.—Hab. ?
filifolium, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 348 = *Campylanthus salsoloides*.
filiforme, Poir. Encyc. Suppl. ii. 769 = *Campylanthus salsoloides*.
fililobum, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. v. 134.—Austral.
flavescens, Schreb. Pl. Vert. Unilab. 44 = *T. Polium*.
flavicans, Lam. Encyc. ii. 700 = *T. Polium*.
flavum, Linn. Sp. Pl. 565.—Reg. Mediterr.
foliosum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 115 = *T. Polium*.
Fortunei, Benth. in DC. Prod. xii. 583 = *quadrifarium*.
fragile, Boiss. Elench. 77.—Hispan.
fruticans, Linn. Sp. Pl. 563.—Reg. Mediterr. occ.
fulvum, Hance, in Walp. Ann. iii. 270 = *quadrifarium*.
Funkianum, Willk. Iber. Halbinsel, 134 = *T. Polium*.
garganicum, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 829 (Quid ?).—Hab. ?
Gasparrini, Nym. Consp. 564 = *T. Scorodonia*.
genevense, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 253 = *Ajuga genevensis*.
glandulosum, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 23.—Mexic.
globuliferum, Salisb. Prod. 77 = *abutiloides*.
gnaphalodes, L'Hérit. Stirp. Nov. 84; Vahl, Symb. Bot. i. 41 = *T. Polium*.
graecum, Čelak. in Bot. Centralbl. xiv. (1883) 217 = *divaricatum*.
granatense, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 99.—Reg. Mediterr. occ.
Gussonii, Nym. Consp. 567 = *T. Polium*.

TEUCRIUM:—

- Haenscleri, Boiss. *Elench.* 79.—Hispan.
 Halacsyanum, Heldr. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 241.—Graec.
 heliotropifolium, Barbey, in *Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.* xxi. (1875) 97.—Ins. Karpathos.
 heterophyllum, Cav. Ic. vi. 56 = bicolor.
 heterophyllum, L'Hérit. *Stirp. Nov.* 84. t. 49.—Ins. Canar.
 hircanicum, Linn. *Syst. ed. X.* 1095.—Reg. Cauc.; Persia.
 hirtum, Willd. ex Spreng. *Syst. ii.* 710 = inflatum.
 hispidum, Benth. ex Wall. *Cat. n.* 2029 = Ajuga parviflora.
 hyrcanicum, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 674 = hircanicum.
 hyssopifolium, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 28 = creticum.
 incanum, Aitch. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 184.—Afghan.
 incanum, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 547 = montanum.
 inflatum, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 88.—Am. austr.
 integerrimum, Steud. *Nom. ed. II. ii.* 674 = T. Polium.
 integrifolium, Benth. *Fl. Austral.* v. 133.—Austral.
 intricatum, Lange, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1863) 21.—Hispan.
 Iva, Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. v. 1076 = Ajuga Laxmanni.
 Iva, Linn. *Sp. Pl.* 563 = Ajuga Iva.
 japonicum, Willd. *Sp. Pl.* iii. 23.—Japon.
 Kotschyannum, Poeh. *Enum. Pl. Ins. Cyp.* 24.—As. Min.
 laciniatum, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 231.—Am. bor. occ.
 laevigatum, [Soland. in] *Russ. Aleppo*, ed. II. ii. 255 = Ajuga laevigata.
 laevigatum, Vahl, *Symb. Bot. i.* 40 = cubense.
 lamifolium, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 320 = Arduini.
 lanceolatum, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 666 = corymbosum.
 lanceolatum, Rafin. & Collins, in *Rafin. New Fl. Am.* iv. 97 (Quid?).—Am. bor.
 lancifolium, Boiss. *Diagn. Ser. II. iv.* 56.—Ins. Balear.
 lanigerum, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 17 = T. Polium.
 lanuginosum, Hoffmgg. & Link, *Fl. Port. i.* 84. t. 3 = scordioides.
 latifolium, Linn. *Sp. Pl.* 563 = fruticans.
 lavandulatum, Pourr. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 686 = T. Polium.
 Laxmanni, Murr. *Syst. ed. XIII.* 439 = Ajuga Laxmanni.
 laxum, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 109.—Reg. Himal.
 leucocladum, Boiss. *Diagn. Ser. I. v.* 44.—Arab.
 leucophyllum, Month. & Auch. ex Benth. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi.* (1836) 55.—Cappadoc.
 Leucosceptrum, Voigt, *Hort. Suburb. Calc.* 463 = Leucosceptrum canum.
 levigatum, Rafin. *New Fl. Am. iv.* 96 = cubense?
 Libanitis, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 48 = pumilum.
 lucidum, Linn. *Syst. ed. X.* 1095.—Reg. Mediterr.
 lucidum, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. vi.* 27. t. 532 = divaricatum.
 lusitanicum, Benth. in *DC. Prod. xii.* 585, partim = lancifolium.
 lusitanicum, Lam. *Encyc. ii.* 694.—Europ. austr.
 lusitanicum, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 47 = T. Polium.
 macrophyllum, Lam. *Encyc. ii.* 692 = abutiloides.
 macrostachyum, Wall. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 664 = Leucosceptrum canum.
 macrum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient. iv.* 810.—Persia.
 maderense, Lam. *Encyc. ii.* 692 = betonicum.
 Majorana, Pers. *Syn. ii.* 112.—Hispan.
 majoricum, Rouy, in *La Natural. ii.* (1882) (*Matér. Rév. Fl. Portug.* 11, 15).—Ins. Balear.
 maritimum, Lam. *Fl. Fr. ii.* 414 = T. Marum.
 Marum, Linn. *Sp. Pl.* 564.—Reg. Mediterr.
 mascatense, Boiss. *Diagn. Ser. I. v.* 44.—Arab.
 massiliense, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 789.—Europ. austr.
 massiliense, Lour. *Fl. Cochinch.* 362 = stoloniferum.
 mauritanicum, Noé, ex Coss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i.* (1854) 226; et in *Bull. Soc. Bot. Fr. ii.* (1855) 585.—Alger.
 mauritanum, Linn. *Sp. Pl.* 563 = T. Pseudo-chamaepitys.
 Mazziarii, Heldr. ex Nym. *Consp.* 567 = Coleus arabicus.
 melissaeefolium, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 27 = stoloniferum.
 melissoides, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient. iv.* 813.—Persia.

TEUCRIUM:—

- microphyllum, Desf. in *Ann. Mus. Par. x.* (1807) 300.—Ins. Creta.
 micropodioides, Rouy, in *La Natural. ii.* (1882) (*Matér. Rév. Fl. Portug.* 16).—Lusitan.
 montanum, Linn. *Sp. Pl.* 565.—Europ.; Oriens.
 Montbretii, Benth. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi.* (1836) 56.—As. Min.; Syria.
 moschatum, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII. n.* 15 = Ajuga Iva.
 mucronatum, Linn. *Sp. Pl.* 566 = spinosum.
 multicaule, Montbr. & Auch. ex Benth. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi.* (1836) 54.—Syria.
 multiflorum, Hort. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 680 = T. Chamaedrys.
 multiflorum, Linn. *Sp. Pl.* 564.—Hispan.
 myrtifolium, Desf. *Cat. Hort. Par. ed. III.* 394 = T. Marum.
 myrtifolium, Poir. *Encyc. Suppl. ii.* 766.—Oriens.
 nepetaefolium, Benth. in *DC. Prod. xii.* 580.—China.
 Nissolianum, Linn. *Sp. Pl.* 563 = T. Pseudo-chamaepitys.
 nitidum, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 35.—Mauritan.
 nivale, Boiss. *Diagn. Ser. I. xii.* 91 = orientale.
 nuchense, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 704 = T. Chamaedrys.
 nudicaule, Hook. *Bot. Misc. ii.* (1831) 235.—Peruv.
 occidentale, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am. ii. i.* 349.—Am. bor.
 ochroleucum, Jord. *Pugill. Pl. Nov.* 137 = montanum.
 Odontites, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II. iv.* 57.—Cilicia.
 odoratum, Lam. *Fl. Fr. ii.* 413 = massiliense.
 odorum, Salisb. *Prod.* 76 = T. Marum.
 officinale, Lam. *Fl. Fr. ii.* 414 = T. Chamaedrys.
 oliganthum, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 310.—Japon.
 Oliverianum, Ging. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 668.—Persia; Assyria.
 orchideum, Lindl. *Bot. Reg. t.* 1255 = bicolor.
 orientale, Linn. *Sp. Pl.* 562.—As. Min.
 paederotoides, Boiss. *Fl. Orient. iv.* 1268 (Index).—Cf. 814.—Syria; Persia.
 palmatum, Benth. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind. iv.* 702.—Reg. Himal.; China.
 palustre, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp. ii.* 306 = inflatum.
 palustre, Lam. *Fl. Fr. ii.* 411 = T. Scordium.
 paniculatum, Herb. *Madr. ex Wall. Cat. n.* 2025 = tomentosum.
 pannonicum, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1863) 384 = montanum.
 parviflorum, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 31.—As. Min.; Persia.
 Pernyi, Franch. *Pl. Davidian. i.* (1884) 245.—China.
 persicum, Boiss. *Diagn. Ser. I. v.* 42.—Persia.
 Pestalozzae, Boiss. *l. c.* xii. 90.—Syria.
 petiolare, Balf. *f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 92.—Ins. Socotra.
 petiolare, Rafin. *New Fl. Am. iv.* 97 (Quid?).—Am. bor.
 petrophilum, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 426 = corymbosum.
 pictum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient. iv.* 809 = procerum.
 poederotoides, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *l. c.* 814, err. typ. = paederotoides.
 Polium, Decne. ex Presl, *Bot. Bemerk.* 100 = Decaisnii.
 Polium, Linn. *Sp. Pl.* 566.—Reg. Mediterr.; Oriens.
 Polium-trifoliatum, Vahl, *Symb. Bot. i.* 40 = T. Polium.
 polycephalum, Medic. in *Act. Acad. Theod. Palat. iii.* Phys. (1775) 216. t. 13 = T. Polium?
 polycephalum, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 114 = T. Polium.
 procerum, Boiss. & Blanche, *Diagn. Ser. II. iv.* 56.—Syria; Persia.
 prostratum, Balf. *f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 92.—Ins. Socotra.
 prostratum, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 60.—Transsylv.
 pruinatum, Boiss. *Fl. Orient. iv.* 808.—Cappadoc.
 Pseudina, Gueldenst. ex Ledeb. *Fl. Ross. iii.* 449 = Ajuga Laxmanni.
 Pseudo-chamaedrys, Wender. in *Flora*, ix. (1826) 358 = T. Chamaedrys.
 Pseudo-chamaepitys, Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. v. 1076 = Ajuga chia.

TEUCRIUM:—

- Pseudo-chamaepitys, Linn. *Sp. Pl.* 562.—Reg. Mediterr.
 Pseudo-hyssopus, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 45 = T. Polium.
 Pseudo-scorodonia, Desf. *Fl. Atlant. ii.* 5. t. 119.—Reg. Mediterr. occ.
 pulverulentum, Coss. ex Barcelo, *Fl. Balear.* 375; et Rouy, in *La Natural. ii.* (1882) (*Matér. Rév. Fl. Portug.* 16) = T. Polium.
 pumilum, Linn. *Cent. Pl. i.* 15; *Amoen. Acad.* iv. 276.—Hispan.
 purpurascens, Medic. in *Act. Acad. Theod. Palat. iii.* Phys. (1775) 210 = T. Polium?
 purpureum, Link, *Handb. i.* 456 = T. Polium.
 pycnaphyllum, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 48 = T. Polium.
 pyramidale, Crantz, *Stirp. Austr. ed. II.* 252 = Ajuga pyramidalis.
 pyrenaicum, Linn. *Sp. Pl.* 566.—Europ. austr.
 quadratum, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 36.—Hispan.
 quadratum, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. vi.* 25. t. 530 = microphyllum.
 quadrifarium, Buch.-Ham. in *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 108.—Reg. Himal.; China.
 quadrifarium, Wight, ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind. iv.* 701 = Wightii.
 racemosum, R. Br. *Prod.* 504.—Austral.
 ramosissimum, Desf. *Fl. Atlant. ii.* 4. t. 118.—Hispan.
 regium, Auct. ex Boiss. *Fl. Orient. iv.* 817 = divaricatum.
 regium, Hort. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 682 = flavum.
 regium, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 35.—Hispan.
 reptans, Pourr. in *Mém. Acad. Toul. iii.* (1788) 330 = pyrenaicum.
 reptans, Salisb. *Prod.* 75 = Ajuga reptans.
 resupinatum, Balansa, ex Coss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i.* (1854) 226 = mauritanicum.
 resupinatum, Desf. *Fl. Atlant. ii.* 4. t. 117.—Reg. Mediterr. occ.
 revolutum, Stokes, *Bot. Mat. Med. iii.* 295 = montanum.
 rhombifolium, Willd. ex Spreng. *Syst. ii.* 732 = Hyptis canescens.
 rigidum, Benth. in *DC. Prod. xii.* 578.—Assyria.
 riparium, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 66.—Afr. austr.
 riparium, Rafin. *New Fl. Am. iv.* 97 (Quid?).—Am. bor.
 rosmarinifolium, Herb. *Bout. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii.* 469 = fruticans.
 rosmarinifolium, Lam. *Encyc. ii.* 693 = creticum.
 rosmarinifolium, Pourr. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp. ii.* 476 = pumilum.
 rotundifolium, Poir. *Encyc. Suppl. ii.* 767 = Salvia procurrens.
 rotundifolium, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 42 = pyrenaicum.
 Royleanum, Wall. *Cat. n.* 2027.—Reg. Himal.
 rupestre, Coss. & Bal. in *Bull. Soc. Bot. Fr. xx.* (1873) 259.—Maroc.
 salicifolium, Linn. *Mant. i.* 80 = Ajuga salicifolia.
 salviaefolium, Salisb. *Prod.* 76 = T. Scrodonia.
 Salviastrum, Hoffmgg. & Link, *Fl. Port. i.* 85. t. 2 = lusitanicum.
 Salviastrum, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 38 = T. Pseudo-scorodonia.
 saxatile, Cav. Ic. ii. 19. t. 121. f. 1 = buxifolium.
 saxatile, Lam. *Encyc. ii.* 699 = pyrenaicum.
 saxatile, Sieber, ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 685 = alpestre.
 saxatile, Sieber, ex Čelak. in *Bot. Centralbl.* xiv. (1883) 187 = Sieberi.
 Schimper, Presl, *Bot. Bemerk.* 100 = leucocladum.
 scordioides, Schreb. *Pl. Vert. Unilab.* 37.—Reg. Mediterr.; Oriens.
 Scordium, Brot. *Fl. Lusit. i.* 164 = scordioides.
 Scordium, Linn. *Sp. Pl.* 565.—Europ.; As. temp.; Afr. bor.
 Scrodonia, Falk, *Beitr. ii.* 204 (Quid?).—Sibir. altaic.
 Scrodonia, Linn. *Sp. Pl.* 564.—Europ.
 Scrodonia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod. i.* 392 = Kotschyannum.
 scrobiculatum, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 705.—Oriens.
 secundum, Heyne, in *Wall. Cat. n.* 2028 = Anisomeles Heyneana.

TEUCRIUM :—

- serratum, *Benth. in DC. Prod.* xii. 586.—Afghan.
sessiliflorum, *Benth. l. c.* 580.—Austral.
sessilifolium, *Clarke, Trav.* iv. 555 (sessilifolium).—
Thracia.
sibiricum, *Linn. Sp. Pl.* 564 = *Nepeta ucranica*.
sibiricum, *Willd. ex Benth. in Linnaea*, xi. (1837) 347
= *Nepeta parviflora*.
siculum, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 837 = *T. Scorodonia*.
Sieber, *Celak. in Bot. Centralb.* xiv. (1883) 187.—
Reg. Mediterr.
sinaicum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* xii. 91.—Arab.
sinuatum, *Celak. in Bot. Centralb.* xiv. (1883) 218.—
Kurdistan.
smyrneum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* v. 42 = *Kotschymanum*.
Socinianum, *Boiss. Fl. Orient.* iv. 818.—Syria.
sordium, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 675, in syn., err. typ.
= *T. Scordium*.
speciosum, *Hill, Hort. Kew.* 253 = canadense.
spicigerum, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. (1848) 706.—
Oriens.
spinosum, *Linn. Sp. Pl.* 566.—Reg. Mediterr.
staechadifolium, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 113 =
T. Polium.
Stockianum, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iv. 58.—Beluchist.
stoloniferum, *Roxb. Hort. Beng.* 44; *Fl. Ind.* iii. 3.—
As. trop.
subspinousum, *Pourr. ex Willd. Enum. Hort. Berol.*
596.—Ins. Balear.
subtriphyllum, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 17 = *T. Polium*.
supinum, *Linn. Sp. Pl.* 566 = montanum.
sylvestre, *Lam. Fl. Fr.* ii. 412 = *T. Scorodonia*.
sympirene, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. (1848) 704 =
T. Chamaedrys.
Taylori, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vii. 61.—Persia.
Teuthrion, *Schreb. Pl. Vert. Unilab.* 46 = *T. Polium*.
Thea, *Lour. Fl. Cochinch.* 363.—China.
thymifolium, *Schreb. Pl. Vert. Unilab.* 50.—Hispan.
thymoides, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 112 =
T. Polium.
tomentosum, *Heyne, in Wall. Cat. n.* 2025.—Ind. or.
tomentosum, *Lam. Fl. Fr.* ii. 407; *Vill. Hist. Pl.*
Dauph. ii. 352 = *T. Polium*.
tomentosum, *Moench, Meth.* 382 = fruticans.
tomentosum, *Wight, Ic. t.* 1458 = *Wightii*.
trifidum, *Retz. Obs. i.* 21 = africanum.
trifidum, *Schlecht. in Linnaea*, xx. (1847) 609 =
sessiliflorum.
trifidum, *Wendl. Bot. Beobacht.* 50 = africanum?
trifoliatum, *Willd. Sp. Pl.* iii. 36 = *T. Polium*.
tripartitum, *Meyen, Reise, i.* 406 = nudicaule.
undulatum, *Lour. Fl. Cochinch.* 362.—Cochinch.
undulatum, *Rafin. Fl. Ludov.* 42 (Quid?).—Am.
bor.
valentinum, *Schreb. Pl. Vert. Unilab.* 46 = *T. Polium*.
veronicaefolium, *Salisb. Prod.* 76 = *T. Chamaedrys*.
veronicoides, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxiii.
(1877) 388.—Japon.
verticillatum, *Cav. Ic. ii.* 77. t. 198.—Hispan.
vesicarium, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 17 =
inflatum.
vestitum, *Wall. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 675 = quadri-
farium.
villosum, *Forst. f. Prod.* 43 = inflatum.
vincentinum, *Rouy, in La Natural.* ii. (1882) (*Matér.*
Rév. Fl. Portug. 9).—Lusit.
virescens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 115 = *T. Polium*.
virginicum, *Linn. Sp. Pl.* 564 = canadense.
virginicum, *Thunb. Fl. Jap.* 244 = japonicum.
viscidum, *Blume, Bijdr.* 827 = stoloniferum.
Wallichianum, *Benth. in Wall. Pl. As. Rar.* ii. 19 =
Achyrosperrum Wallichianum.
Webbianum, *Boiss. Elench.* 78.—Hispan.
Wightii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 701.—Ind. or.

TEURIUM, *Meerb. Afbeeld.* t. 45 (1775), sphalm. =
praec.

TEXIERA, *Jaub. & Spach, Illustr.* i. 1. t. 1 (1842).
CRUCIFERAE, *Benth. & Hook. f. i.* 96.

GLASTARIA, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvi.
(1841) 382.
glastifolia, *Jaub. & Spach, Illustr.* i. 1. t. 1.—As.
Min.

TEXTORIA, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 12
(1863) = *Dendropanax*, *Decne. (Araliac.)*.
japonica, *Miq. l. c.* = *D. japonicum*.

VOL. II.

TEYSMANNIA, *Miq. in Versl. en Med. Kon. Wetensch.*
Akad. vi. (1857) 193 = *Pottisia*, *Hook. & Arn.*
(*Apocyn.*).
Hookeriana, *Miq. l. c.* 194; et *Fl. Ind. Bat.* ii. 456
= *P. cantonensis*.
laxiflora, *Miq. ll. cc.* 194; 455 = *P. cantonensis*.

TEYSMANNIA, *Reichb. f. & Zoll. in Linnaea*,
xxviii. (1856) 657 (Teyssmania). *PALMAE*, *Benth.*
& *Hook. f. iii.* 924.
altifrons, *Reichb. f. & Zoll. l. c.*—Java.

THACLA, *Spach, Hist. Vég. Phan.* vii. 295 (1839) =
Caltha, *Rupp. (Ranunc.)*.
ficarioides, *Spach, l. c.* = *C. natans*.

THACOMBAUIA, *Seem. Fl. Vit.* 426 (1871).
HUMIRACEAE.
vitiensis, *Seem. l. c.*—Ins. Fiji.

THALAMIA, *Spreng. Anleit.* ii. 218 (1817) = *Phyllo-*
cladus, *Rich. (Conif.)*.
asplenifolia, *Spreng. l. c.* = *P. rhomboidalis*.
cupressina, *Spreng. Syst.* iii. 890 = *Dacrydium cupres-*
sinum.

THALASIUM, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 30 (1827) =
Panicum, *Linn. (Gramin.)*.
montevidense, *Spreng. l. c.* = *P. racemosum*?

THALASSIA, *Banks, in Kon. & Sims, Ann. Bot.*
ii. (1805) 96. *HYDROCHARIDEAE*, *Benth. &*
Hook. f. iii. 455.
SCHIZOTHECA, *Ehrenb. in Abh. Akad. Berl. i.* (1832)
429.

antarctica, *F. Muell. ex Aschers. in Linnaea*, xxxv.
(1867–68) 159 = *Cymodocea antarctica*.
bullata, *Kunth, Enum. Pl. iii.* 120 = *Zostera bullata*.
ciliata, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* ii. (1834) 18
= *Halophila ovata*.
ciliata, *Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot.* ii. (1805) 97
= *Cymodocea ciliata*.
Hemprichii, *Aschers. in Neumayer, Anleit. Wiss.* 361.
—Litora As. trop.
stipulacea, *Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot.* ii. (1805)
97 = *Halophila ovata*.
testudinum, *Kon. l. c.* 96.—Mare Caribaeum.
vaginata, *Decne. ex Kunth, Enum. Pl. iii.* 120 =
Halophila ovata.
vitrorium, *Pers. Syn.* ii. 563 = *testudinum*.

THALESIA, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1818) 267 =
Aphyllon, *Mitch. (Orobanch.)*.
uniflora, *Rafin. l. c.* = *A. uniflorum*.

THALIA, *Linn. Gen. ed. I.* 362 (1737). *SCITA-*
MINEAE, *Benth. & Hook. f. iii.* 650.
MALACARYA, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1819)
190.

PERONIA, [Delar. in] *Red. Lil. vi. t.* 342 (1812).
SPIROSTALIS, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 51 (1836).
altissima, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.*
917 = *geniculata*.
angustifolia, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 256.—
Cuba.
bicolor, *C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz.* xxv. (1857) 146
= *Maranta bicolor*.
brachystachys, *C. Koch, l. c.* = *Phrynium brachy-*
stachyum.
cannaeformis, *Forst. f. Prod.* 1 = *Clinogyne dichotoma*.
colorata, *Vell. Fl. Flum.* 5; i. t. 16 = *Maranta bicolor*.
composita, *C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz.* xxv.
(1857) 146 = *Maranta Riedeliana*.
concolor, *Horan. Prod. Monog. Scitam.* 11, sphalm.
= *colorata*.
dealbata, *Fras. Thal. dealbata*, t. 1.—Am. bor.
dealbata, *Hort. ex Link, Jahrb.* i. iii. (1820) 21 =
Clinogyne dichotoma.
dichotoma, *Roxb. ex Link, l. c.* = *Clinogyne dichotoma*.
divaricata, *Chapm. Fl. S. U. St.* 465.—Am. bor.
erecta, *Vell. Fl. Flum.* 4; i. t. 17.—Bras.
farinosa, *Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xii. (1860)
195, in obs. = *Ischnosiphon leucophaeus*.
geniculata, *Linn. Sp. Pl.* 1193.—Am. bor.
glumacea, *C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz.* xxv.
(1857) 163 = *Maranta glumacea*.
hexantha, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 24.
t. 132 = *Maranta hexantha*.

THALIA :—

- latifolia, *Link, Jahrb.* i. iii. (1820) 22 = *Calathea*
latifolia.
leptostachya, *C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz.* xxv.
(1857) 258 = *Maranta leptostachya*.
Linkiana, *Steudner, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1857)
App. 10 = *Maranta Riedeliana*.
Luschnathiana, *C. Koch, ex Horan. Prod. Monog.*
Scitam. 11 = *Ctenanthe Luschnathiana*.
lutea, *Steudner, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1857) App.
10 = *Stromanthe lutea*.
marantifolia, *Vell. Fl. Flum.* 5; i. t. 15.—Bras.
multiflora, *Horkel, ex Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*
xxxv. (1862) i. 76.—Bras.
nemorosa, *Willd. ex Link, Jahrb.* i. iii. (1820) 22 =
Heliconia psittacorum.
Pavonii, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
i. 77.—Peruv.
pilosa, *C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz.* xxv. (1857)
146 = *Stromanthe Tonckat*.
pubescens, *Willd. ex Link, Jahrb.* i. iii. (1820) 22 =
Stromanthe Tonckat.
racemosa, *Humb. ex Link, l. c.* 21 = *Stromanthe Tonckat*.
rotundifolia, *C. Koch, ex Horan. Prod. Monog.*
Scitam. 11 = *Calathea rotundifolia*.
sanguinea, *Lem. Jard. Fleur.* iii. (1852–53) t. 268 =
Stromanthe sanguinea.
Selloi, *C. Koch, in Steudner, Ind. Sem. Hort. Berol.*
(1857) App. 10; et in *Berl. Allg. Gartenz.* xxv.
(1857) 258 = *Ctenanthe Luschnathiana*.
setosa, *C. Koch, ll. cc.* 9; 258 = *Myrosma setosum*.
spectabilis, *Lem. Jard. Fleur.* iv. (1854) t. 401; *Misc.*
63 = *Stromanthe sanguinea*.
Steudneri, *C. Koch, ex Koern. in Bull. Soc. Nat.*
Mosc. xxxv. (1862) i. 65 = *Ctenanthe pilosa*.
sylvestris, *Willd. ex Schult. Mant.* i. 10.—Am. austr.
tuberosa, *Vell. Fl. Flum.* 4; i. t. 18 = *Calathea tube-*
rosa.
unilateralis, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 24.
t. 133 = *Myrosma unilaterale*.

THALIANTHUS, *Klotzsch, in Schomb. Reise Brit. Gui.*
iii. 1125 (*Faun. Fl. Brit. Gui.*) (1846) = *Myrosma*,
Linn. f. (Scitam.).
macropus, *Klotzsch, l. c.* = *M. cannaefolium*.
macropus, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1862) i. 66
= *Maranta Moritziana*.

THALICTRUM, *Tourn. ex Linn. Gen. ed. I.* 164
(1737). *RANUNCULACEAE*, *Benth. & Hook. f. i.* 4.
PHYSOCARPUM, *Bercht. & Presl, Rostl. i.* *Ranunc.* 14
(1823).
PRATICOLA, *Ehrh. Phyt. n.* 15 (1786); ex *ej. Beitr.*
iv. 146 (1789).
RUPRECHTIA, *Opiz, Seznam.* 86 (1852).
TRIPETERIUM, *Bercht. & Presl, Rostl. i.* *Ranunc.* 14
(1823).
abbreviatum, *Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii.
(1873) 255 = *angustifolium*?
abortivum, *Jord. Diagn.* i. 39 = minus.
acaule, *Jacquem. Voy. Bot.* 3 = alpinum.
actaeifolium, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv.
ii. (1843) 178.—Japon.
acuminatum, *Spreng. Pugill.* ii. 68 = minus.
acutibulum, *DC. Syst.* i. 177 = foetidum.
adanthifolium, *Bess. ex Eichw. Skizze.* 182 = minus.
affine, *Jord. Diagn.* i. 42, partim = minus.
affine, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 10 = simplex.
agreste, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841)
371 = minus.
alatum, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 212 = *aquilegifolium*.
alchemillifolium, *Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.*
193 = *rotundifolium*.
alpestre, *Gaud. Fl. Helvet.* iii. 502 = alpinum.
alpestre, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 7 = *aquilegi-*
folium.
alpicolum, *Jord. Diagn.* i. 43 = simplex.
alpinum, *Linn. Sp. Pl.* 545.—Reg. bor. et arct.
altaicum, *Hort. Dorpat. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot.*
Belg. xxiv. (1885) 248 (Quid?).—Rossia.
altaicum, *Hort. Monsp. ex Lecoy. l. c.* = minus.
altissimum, *Thomas, ex De Massas, in Ann. Sc. Nat.*
Sér. II. ix. (1838) 369 = flavum.
altissimum, *Wender. in Flora, ix.* (1826) 358 =
glaucum.
ambigens, *Jord. Diagn.* i. 38 = minus.
ambiguum, *Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV.* 34 =
minus.

THALICTRUM:—

ammophilum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 21 = angustifolium.
amoenum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 248 = minus.
amurense, Maxim. Prim. Fl. Amur. 15 = simplex.
anemonoides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 322 = Anemone thalictroides.
angulatum, Pers. Syn. ii. 101, sphalm. = seq.
angulosum, Desf. Tabl. ed. I. 123 = glaucum.
angulosum, Hort. Par. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 251 (Quid?).—Hab.?
angustatum, Schrad. Hort. Gotting. ex Lecoy. l. c. = minus.
angustatum, Weinm. ex Lecoy. l. c. 250 = flavum.
angustifolium, Linn. Sp. Pl. 546.—Europ.; As. Min.
angustifolium, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 101 = simplex.
angustissimum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 76; ed. II. 105 = angustifolium.
anonymum, Wallr. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 252 = flavum.
apiculatum, Loud. Encyc. Pl. 647 (Quid?).—Hab.?
apiculatum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 252 = minus.
apiifolium, Schrad. l. c. = minus.
appendiculatum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 356 = minus.
aquilegifolium, Linn. Sp. Pl. 547.—Europ.; As. bor.
arabicum, Botta, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 253 = minus.
aristatum, Willd. ex Lecoy. l. c. = revolutum.
armenum, C. Koch, ex Lecoy. l. c. = minus.
Arnaudiae, Jord. Diagn. i. 31 = minus.
arrigens, Jord. l. c. 35 = minus.
athesianum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 288 = minus.
atropurpureum, Jacq. Hort. Vindob. iii. 34 = aquilegifolium.
auriculatum, Bess. ex Eichw. Skizze, 182 = simplex vel flavum.
auriculatum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 254 = simplex.
aurigeranum, Baill. & Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 63 = minus.
axilliflorum, Schur, Enum. Pl. Transs. 10 = simplex.
baicalense, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 85.—Sibir. baical.
banchianum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 289 = minus.
Barthii, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 14 = minus.
Batula, Buch.-Ham. ex DC. Syst. i. 185 = rotundifolium.
Bauhini, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 70; ed. II. 105 = angustifolium, simplex.
Bauhini, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 22 = angustifolium.
Bauhinianum, Wallr. Sched. Crit. 264 = angustifolium.
belgium, Jord. Diagn. i. 51 = flavum.
Billotii, F. Schultz, ex Jord. l. c. 36 = minus.
Bondonii, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 121 = minus.
brachycarpum, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. vi. (1883-84) 77.—Mont. Pyren.
bracteatum, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 671 = Clematis Cadmia.
bracteifolium, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iii. (1863) 422 = alpinum.
bresimense, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 55 = minus.
brevepubens, Jord. Diagn. i. 33 = minus.
budense x, Simk. in Magyar Növényt. Lapok, i. (1877) 149.—Europ.
caffrum, Eckl. & Zeyh. Enum. 1 = minus.
calabricum, Spreng. Pugill. i. 37.—Italia.
calabrum, Tenore, Fl. Nap. iv. 333, sphalm. = praec.
calcareum, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 9 = minus.
calcareum, Kitt. Taschenb. ed. II. 752 (Quid?).—Europ.
callistemon, Wender. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 257 (Quid?).—Europ.?
canadense, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5.—Am. bor.
capillare, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 729 = minus.
capitatum, Jord. Diagn. i. 51 = flavum.
carolinianum, Bosc, ex DC. Syst. i. 174 = Cornuti, dasycarpum.

THALICTRUM:—

carolinianum, Walt. Fl. Carol. 157 = Anemone Walteri.
Chelidonii, DC. Prod. i. 11.—Reg. Himal.
Chelidonii, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 13, partim = cultratum.
chymocarpum, Walp. Ann. ii. 5 = rhynchocarpum.
cinereum, Desf. Tabl. ed. II. 146 = glaucum?
clavatum, DC. Syst. i. 171.—Am. bor.
clavatum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 2 = sparsiflorum.
Clesianum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 119 = simplex.
clypeatum, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 446 = minus.
collinum, Wallr. Sched. Crit. 259 = minus.
columnare, Costa, Suppl. (1877) 2 (sp. dub.).—Hispan.
commutatum, C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 12 = flavum?
comosum, Fries, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 260 = minus.
complex, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 225, sphalm. = simplex.
concinnum, Willd. Enum. Hort. Berol. 584 = minus.
confertiflorum, C. A. Mey. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 29 = simplex.
confertum, Moench, Meth. 297 (Quid?).—Hab.?
contortum, Linn. Sp. Pl. 547 = aquilegifolium.
controversum, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 992.—Europ.
convexum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 262 = minus.
copticum, Jord. ex Lecoy. l. c. (Quid?).—Hab.?
cordifolium, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 670 = podocarpum.
Cornuti, Linn. Sp. Pl. 545.—Am. bor.
Cornuti, Poir. Encyc. v. 319 = minus, aquilegifolium.
Cornuti, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 38, partim = corynellum.
corymbosum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 256 = angustifolium.
corynellum, DC. Syst. i. 172.—Am. bor.
Costae, Timb. ex Debeaux, Rech. Fl. Pyrén. Orient. i. 14.—Mont. Pyren.
crenatum, Desf. Tabl. ed. II. 146 = glaucum.
cruciatum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 264 = minus.
Csatoi, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 15 = minus.
cultratum, Wall. Pl. As. Rar. ii. 26.—Reg. Himal.
cuneatum, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 730 = crenatum.
cuneatum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 14, in textu = minus.
cuspidatum, Koch, ex Ind. Sem. Hort. Panorm. (1874) = minus.
cynapiifolium, Fisch. ex G. Don, Gen. Syst. i. 14.—Sibir.
cysticarpum, Wall. Pl. As. Rar. ii. 26 = Chelidonii.
Dahurici, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 265, sphalm. = dauricum.
Dalingo, Buch.-Ham. ex DC. Syst. i. 175 = foliolosum.
Dalzellii, Hook. Ic. Pl. t. 868.—Ind. or.
dasycarpum, Fisch. Mey. & Avel-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 72.—Am. bor.
dauricum, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 11 = minus.
debile, Buckl. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 175.—Am. bor. occ.
Delarbrei, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 34 = minus.
densiflorum, H. B. & K. ex DC. Syst. i. 184 = glaucum.
depauperatum, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1868) 357 = minus.
despiciens, Schrad. ex Lecoy. l. c. xxiv. (1885) 266 = minus.
dichotomum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 266 = squarrosum.
diffusum, Schrad. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 2 = minus.
dioicum, Hook. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 264 = corynellum.
dioicum, Linn. Sp. Pl. 545.—Am. bor.
discolor, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = glaucum.
dispermum, Hort. Dorpat. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 267 (Quid?).—Hab.?
distans, Laest. ex Nym. Consp. 6 = minus?

THALICTRUM:—

divaricatum, Herb. Berol. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 264 = corynellum.
divaricatum, Spreng. Ind. Sem. Hort. Hal. (1807) 61 = angustifolium.
divergens, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 92 = corynellum.
dubium, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 268 = minus.
dubium, Schum. Enum. Pl. Saell. i. 167 = simplex.
dumulosum, Jord. Diagn. i. 36 = minus.
dunense, Dum. Fl. Belg. Prod. 126 = minus.
elatum, Jacq. Hort. Vindob. iii. 49 = minus.
elegans, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 7 = minus.
elegans, Wall. Cat. n. 4728.—Reg. Himal.
elongatum, Jord. ex Nym. Consp. 6 = simplex.
eminens, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 4 = minus.
erectum, Falc. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 270 = pauciflorum, Royle.
exaltatum, Gaud. Fl. Helvet. iii. 515 = flavum?
exaltatum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 352 = simplex.
eximium, Desf. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 276 (Quid?).—Hab.?
expansum, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 6 = minus.
falcatum, Hort. Ticin. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 271 (Quid?).—Hab.?
Falconeri, Lecoy. l. c. 192.—Reg. Himal.
fallacinum, Gren. ex Lecoy. l. c. 271 = minus.
Fendleri, C. L. Anders. Cat. Pl. Nevad. 117 = polycarpum.
Fendleri, Engelm. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 5.—Am. bor. occ.
filamentosum, Maxim. Prim. Fl. Amur. 13.—Reg. Amur.
filipes, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 38 = clavatum.
firmum, Hort. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 272 (Quid?).—Hab.?
Fischeri, Ledeb. ex Lecoy. l. c. = minus.
fistulosum, Jacquem. ex Lecoy. l. c. = cultratum.
flaccidum, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 35 = flavum?
flavo-virens, Ledeb. Fl. Ross. i. 9 = minus.
flavum, Cav. Desc. 508 = glaucum.
flavum, Linn. Sp. Pl. 546.—Europ.; As. bor.
flavum, Pall. Reise, iii. 519 = simplex.
flavum, Thunb. Fl. Jap. 241 = minus.
flexicaule, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 274 = minus.
flexuosum, Bernh. Cat. (1815); ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 728 = minus.
floribundum, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1832).—Cf. Linnaea, viii. (1833) Litt. 27 = minus.
foeniculaceum, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 76.—China.
foetidum, Gouan, Hort. Monsp. 263 = minus.
foetidum, Linn. Sp. Pl. 545.—Europ.; Sibir.
foliolosum, DC. Syst. i. 175.—Reg. Himal.
foliolosum, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 14, partim = Falconeri.
formosum, Steud. Nom. ed. II. ii. 676 = aquilegifolium.
Fortunei, S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 130.—China.
Friesii, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 17 = minus.
Friesii, Wolfner, in Lotos, v. (1855) 115, 140 = minus?
frigidum, Arv. Ess. Pl. Dauph. 11 = minus.
frutetorum, Jord. Diagn. i. 33 = minus.
fulgidum, Gren. ex Nym. Consp. 5 = angustifolium.
Galeottii, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 131.—Mexic.
galiiforme, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 19 = angustifolium.
galioides, Andr. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 251 (Quid?).—Podol.
galioides, Pers. Syn. ii. 101 = simplex.
galioides, Presl, ex Nym. Consp. 5 = angustifolium.
Gerberi, [Willk.] Del. Sem. Hort. Dorpat. (1880) 5 (Quid?).—Hab.?
gibbosum, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 132.—Mexic.
glaucescens, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = minus.
glaucifolium, Wender. Ind. Sem. Hort. Mart. App. n. 12 = glaucum.
glaucophyllum, Wender. l. c. n. 13 = glaucum.

THALICTRUM:—

- glaucoirens*, Andr. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 277 = flavum.
glaucom, Desf. *Tabl.* ed. I. 123; ed. II. 146.—Europ. austr.
glaucom, Sieber, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 264 = corynellum.
globiflorum, Ledeb. Fl. Ross. i. 9 = minus.
glomerulosum, Fries, Mant. iii. 49 = minus.
glyphocarpum, Wight & Arn. Prod. 2 = javanicum.
Godronii, Jord. Diagn. i. 32 = minus.
gracile, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 348 = minus, foetidum.
gracile, Schur, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxix. (1885) 273 = flavum.
Grenieri, Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 16, in textu = minus.
Hernandezii, Tausch, in Presl, *Rel. Haenk.* ii. 69.—Mexic.
heterophyllum, Lej. Rev. Fl. Spa, 109 = flavum.
heterophyllum, Nutt. ex Torr. Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 213 = dioicum.
heterophyllum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 20 = angustifolium?
heterophyllum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 727 = simplex.
hirtinum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 280 = minus.
hirsutum, Mert. ex Lecoy. l. c. 264 = corynellum.
hirsutum, Willd. l. c. 280 = foetidum.
hirtellum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 13 = minus.
hirtum, Hort. Dorpat. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 280 (Quid?).—Hab.?
Hornemanni, Schrad. ex Lecoy. l. c. = minus.
humile, Schleich. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iv. 123 = minus.
hybridum, Jord. ex Nym. Consp. 5 = flavum.
hypoleucum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 178 = minus.
ibericum, Hort. Dorpat. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 281 (Quid?).—Hab.?
incisum, Schrad. ex Lecoy. l. c. = minus.
inclinatum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 14 = minus.
iodostemum x. Borb.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 410.—Europ.
isopyroides, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 346.—Oriens; As. bor.
Jacquinianum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 5 = minus.
japonicum, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 337 = Coptis brachypetala.
javanicum, Blume, *Bijdr.* 2.—Ind. or.; Java.
Jordani, F. Schultz, ex Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 12 = minus, simplex.
Jordanianum, F. Schultz, Fl. Pfalz, 5 = praec.?
kantschaticum, Nyland. Spicil. Pl. Fenn. Cent. ii. 9, in obs. = minus.
kemense, Fries, Fl. Hall. i. 94 = minus.
Kochii, Fries, Mant. iii. 46 = minus.
lacerostipellatum, C. Koch & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 13 = simplex.
laetum, Jord. Diagn. i. 44 = simplex.
laevigatum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 322 = dioicum.
Laggeri, Jord. Diagn. i. 26 = minus.
lanatum, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xvi. (1877) 226.—Mexic.
laserpitiifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = angustifolium?
lasiosylum, Presl, *Rel. Haenk.* ii. 70 = Hernandezii.
lathyrifolium, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 285 = angustifolium.
latifolium, Tausch, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 676 = flavum.
laxiflorum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 93 = aquilegifolium.
Ledebourianum, C. A. Mey. ex Rupr. Fl. Cauc. 4, in textu = minus.
leiocarpum, Fries.—Cf. Linnaea, xxix. (1857–58) 731 = baicalense.
leptophyllum, Nyland. Spicil. Pl. Fenn. Cent. ii. 8 = minus.
leucostemon, C. Koch & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 13 = corynellum.
leucostylum, Link, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 285 = corynellum.
Leyii, Loehr, in Flora, xxv. (1842) 107 = simplex.

THALICTRUM:—

- lividum*, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 286 = angustifolium.
lobatum, Fisch. Cat. Hort. Dresd. ex Lecoy. l. c. 286 (Quid?).—Hab.?
longepedunculatum, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 676 = rhynchocarpum.
longifolium, Krock. Fl. Siles. ii. i. 242 = angustifolium.
longistylum, DC. Syst. i. 171.—Am. austr.
lucidum, Guenth. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 251 (Quid?).—Siles.
lucidum, Linn. Sp. Pl. 546 = angustifolium, minus.
lumacense, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 287 = minus.
macilentum, Jord. Diagn. i. 31 = minus.
macranthum, Hort. Choix Pl. Liège (1880) 7; ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 288 (Quid?).—Hab.?
macrocarpum, Gren. in Acad. Sc. Besançon. Séances Publ. (1838) 117.—Mont. Pyren.
macrostigma, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 26 = pauciflorum.
macrostigma, Herb. Kew. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 333 = virgatum.
majus, Dum. ex Ind. Sem. Hort. Panorm. (1880) 32 (Quid?).—Hab.?
majus, Gren. in Act. Linn. Soc. Bord. viii. (1836) 2. t. 9 = macrocarpum.
majus, Jacq. Fl. Austr. v. 9. t. 430 = minus.
majus, Tenore, Syll. 265 = aquilegifolium.
marginatum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 51 = alpinum.
maritimum, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 221 = flavum.
maritimum, Willd. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 290 = minus.
Maxwellii, Royle, Illustr. Bot. Himal. 52 = minus.
meanense, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 123 = minus.
medianum, Jord. Diagn. i. 48 = minus.
mediterraneum, Jord. l. c. 52 = angustifolium.
medium, Jacq. Hort. Vindob. iii. 50 = minus.
medium, Saut. Versuch, 44 = flavum.
megacarpum, Torr. in Frém. Rep. 87 = polycarpum?
menthosma, Stocks, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 291 = reniforme.
mexicanum, DC. Syst. i. 187 (sp. dub.).—Mexic.
mexicanum, Hort. Berol. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 292 = Hernandezii, minus.
micranthum, Dougl. ex Lecoy. l. c. = minus.
microcarpon, Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 676, nomen = angustifolium.
microphyllum, Anders. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 292 = minus.
microphyllum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 51 = alpinum.
micropodium, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 370 = minus.
minus, Linn. Sp. Pl. 546.—Europ.; As. et Afr. bor.
minus, Oed. Fl. Dan. t. 244 = simplex.
minutiflorum, C. A. Mey. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 295 = angustifolium.
minutissimum, Timb. & Gant. in Mém. Acad. Toul. Ser. VII. vii. (1875) 472 = minus.
montanum, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 993 (an seq.?)—Europ.
montanum, Wallr. Sched. Crit. 255 = minus.
monticolum, Jord. Diagn. i. 24 = minus.
Morisoni, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 422 = flavum?
mucronatum, Ledeb. Fl. Ross. i. 8 = minus.
multiflorum, Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 17 = minus.
nanum, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 35 = minus.
neglectum, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 590 (Beitr. Fl. Hercyn. 220) = minus.
nemorialis, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 297 = minus.
Nesleri, F. Schultz, Fl. Pfalz, 4 = simplex.
neurocarpum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 51 = reniforme.
negrescens, Hort. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 297 = angustifolium.
nigricans, DC. Syst. i. 182; Prod. i. 14 = angustifolium.
nigricans, Jacq. Fl. Austr. v. t. 421 = flavum.
nigricans, Reichb. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 251 (Quid?).—Europ.
nitidulum, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 17 = minus, simplex.
niveum, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 298 = aquilegifolium.
nothum, Jord. Diagn. i. 39 = minus.

THALICTRUM:—

- nudicaule*, Schwein. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 39 = clavatum.
nutans, Gilib. Fl. Lituan. ii. 284; Desf. *Tabl.* ed. I. 123 = minus.
nutans, Schleich. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iv. 129, 137 = flavum.
obscuratum, Jord. Diagn. i. 30 = minus.
obscurum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 299 = minus.
obtusatum, Schrad. ex Lecoy. l. c. = flavum.
obtusilobum, Tausch, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1874) = minus.
occidentale, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 372 = dioicum.
ochotense, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 300 = minus.
ochoticum, Fisch. in Zeyh. Cat. Sem. Hort. Schweiz. (1823) = minus.
odoratum, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 6 = minus.
olidum, Jord. Diagn. i. 22 = minus.
oligospermum, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 2 = squarrosus.
olympicum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 5 = minus.
oreites, Jord. Diagn. i. 28 = minus.
orientale, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 349.—Graec.; As. Min.
ovatum, Hort. Berol. ex C. Koch & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 15 = minus.
pallidiflorum, Hort. Monac. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 301 = minus.
pallidum, Fisch. Del. Sem. Hort. Dorpat. 5 (Quid?).—Hab.?
pallidum, Franch. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 301 = Fortunei.
palmatum, Walt. ex Spreng. Syst. ii. 674 = Trautvetteria palmata.
paniculatum, Bess. ex Link, *Handb.* ii. 400.—Hab.?
paradoxum, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 10 = minus.
parisiense, Jord. Diagn. i. 40 = minus.
parviflorum, Salisb. Prod. 370 = minus.
parvifolium, Bertol. in Mém. Acad. Sc. Bologn. Ser. II. v. (1865) 376 = foetidum.
parvifolium, Moench, Meth. 298 = minus.
patens, Hort. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 302 (Quid?).—Hab.?
pauciflorum, Rafin. Atl. Journ. 151 (Quid?).—Am. bor.
pauciflorum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 52.—Reg. Himal.
pauciflorum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 84 = aquilegifolium.
pauciflorum, Steph. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 302 = simplex.
pauperculum, Herm. ex DC. Syst. i. 183 = flavum.
pedunculatum, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 27.—Reg. Himal.
peltatum, DC. Prod. i. 11.—Mexic.
persicum, Sprenger, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1874); ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 303 = minus.
petaloideum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 771.—As. bor.
petrosum, Schur, Enum. Pl. Transs. 8 = minus.
peucedanifolium, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. i. (1852) 312 = angustifolium.
planum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 254 = angustifolium.
platycarpum, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 13 = cultratum.
platystemon, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 303 = aquilegifolium.
podocarpum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 38.—Am. austr.
podolicum, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 173.—Europ.
polycarpum, Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 17 = minus.
polycarpum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 288.—Am. bor. occ.
polygamum, Herb. Link, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 264 = corynellum.
polygamum, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 172, nomen; et ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 388; DC. Syst. i. 173 = corynellum, revolutum, minus.
polyphyllum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 304 = minus.
polyspermum, Arv. Ess. Pl. Dauph. 13–14 = minus.
Porphyratae, F. Schultz, in Flora, lvi. (1873) 232 = minus.
porrectum, Jord. ex Nym. Consp. 5 = flavum.

THALICTRUM:—

- porrigens*, Jord. Diagn. i. 48 = minus.
praeceox, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 2 = minus.
praeceox, C. Koch & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 15 = minus.
praeceox, F. Schultz, in Pollichia, (1859) 1 = minus.
praeeflorens, Jord. Diagn. i. 27 = minus.
praeeruptum, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 445 = minus.
pratense, Linn. Sp. Pl. 546, in syn. = flavum.
pratense, F. Schultz, in Pollichia, xx-xxi. (1863) 102 = minus.
Princeps, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 458 = flavum.
procerulum, Jord. Diagn. i. 45 = simplex.
propendens, Jord. l. c. 37 = minus.
prorepens, Jord. l. c. 50 = flavum.
pruinatum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 226 = minus.
Przewalskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 305.—China.
Pseudo-flavum, Schur, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 306 = flavum.
pubens, Steph. ex Lecoy. l. c. = foetidum.
puberulum, Aschenb. ex Lecoy. l. c. = Hernandezii.
pubescens, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 388 = corynellum, revolutum.
pubescens, Schleich. ex DC. Fl. Fr. Suppl. 633 = minus.
pubigerum, Benth. Pl. Hartw. 285.—Mexic.
pulchellum, Pursh, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 307 = dioicum.
punduanum, Wall. Pl. As. Rar. ii. 26; Cat. n. 3712.—Reg. Himal.
purpurascens, DC. Syst. i. 174 = dioicum.
purpurascens, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1063 = minus.
purpurascens, Linn. Sp. Pl. 546 = minus, corynellum.
purpureum, Schang. in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 42 = minus.
purpureum, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 676, 677 = calabricum.
pyramidale, Hort. Panorm. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 308 = minus.
pyrenaicum, Jord. Diagn. i. 29 = minus.
pyrrhocarpum, Kkodi, Ind. Sem. Hort. Valent. (1883) (Quid ?).—Hab. ?
radiatum, Royle, Illustr. Brit. Himal. 52 = saniculaeforme.
radicans, Hort. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 308 = minus.
ranunculinum, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 585 = Trautvetteria palmata.
rariflorum, Fries, Summa Veg. Scand. 137 = minus, simplex ?
recurvum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 309 = minus.
Regelianum, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 75 = simplex.
reniforme, Wall. Pl. As. Rar. ii. 26; Cat. n. 3716.—Reg. Himal.
repens, W. Baxt. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 676, = minus ?
repens, C. A. Mey. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 309 = minus.
repens, Schrad. ex Lecoy. l. c. = squarrosus.
revolutum, DC. Syst. i. 173.—Am. bor.
revolutum, Herb. Fisch. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 264 = corynellum.
revolutum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 254 = angustifolium.
rhacticum x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 76.—Europ.
rhodanense, Jord. Diagn. i. 45 = simplex.
rhynchocarpum, Q. Dillon. & A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 262.—Afr. trop.
Richardsonii, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii. (1842) 17, in textu = sparsiflorum.
rigidum, Fisch. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 310 = minus.
riparium, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 5 = flavum.
Rochebrunnianum, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 264.—Japon.
rosmarinifolium, Pollini, in Brugnati. Giorn. Fis. ix. (1816) 32 = minus.
rostellatum, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 15.—Reg. Himal.
rotundifolium, DC. Syst. i. 185.—Reg. Himal.

THALICTRUM:—

- rotundifolium*, Laest. ex Nym. Consp. 6 = minus.
rotundum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 311 = minus.
rubellum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 177 = aquilegifolium.
rufinerve, Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 207 = flavum.
rufum, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xvi. (1877) 227.—Ind. or.
rugosum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 262 = flavum, glaucum, corynellum.
rugosum, Poir. Encyc. v. 317 = angustifolium.
rugosum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 388 = dasycarpum ?
rustre, Hort. Berol. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 312 = minus.
rustre, Madden, ex Lecoy. l. c. = saniculaeforme.
rutafolium, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 14.—Reg. Himal.
ruthenicum, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1832).—Cf. Linnaea, viii. (1833) Litt. 27 = minus.
rutidocarpum, DC. Syst. i. 172.—Am. austr.
sachalinense, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 152.—Ins. Sachalin.
saniculaeforme, DC. Prod. i. 12.—Reg. Himal.
Savatieri, Foucaud, Cat. Pl. Vasc. Charente-Inf. ii. 45 = minus.
saxatile, Schleich. ex DC. Fl. Fr. Suppl. 633 = minus.
saxatile, Vill. Prosp. 50; Hist. Pl. Dauph. iii. 714 = minus.
saxicolum, Arv. Ess. Pl. Dauph. 15 = minus.
Schimperianum, Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 78 = minus.
Schultzii, Jord. Diagn. i. 32 = minus.
Schweiggeri, Spreng. Syst. ii. 671 = minus.
secundum, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 26 = pauciflorum.
Sendtneri, F. Schultz, Arch. Fl. 31 = minus.
serotinum, F. Schultz, in Pollichia, xvii. (1859) 1 = minus.
sibiricum, Ledeb. Fl. Ross. i. 11 = squarrosus.
sibiricum, Linn. Sp. Pl. 546 = minus, foetidum, isopyroides.
sibiricum, Pall. Reise. i. 219 = foetidum.
silafolium, Jord. Diagn. i. 41 = minus.
silleanum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 285 = minus.
silvaticum x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 76.—Europ.
simplex, DC. Prod. i. 15 = flavum.
simplex, Linn. Mant. i. 78.—Europ. et As. bor.
sinense, Lour. Fl. Cochinch. 346 (sp. dub.).—China.
soboliferum, Schur, in Oestr. Bot. Zeit. x. (1860) 250, in textu = flavum.
sparsiflorum, Turcz. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 40.—Dahuria; Am. bor. occ.
speciosum, Hort. ex Poir. Encyc. v. 315 = glaucum.
speciosum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = angustifolium.
sphaerocarpon, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 317 = angustifolium.
sphaerocarpon, Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 208 = flavum.
sphaerospermum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 317 = angustifolium.
spurius, Timeroy, ex Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 19 = flavum.
squamiferum, Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xvi. (1877) 229.—Tibet.
squarrosus, Steph. ex Willd. Sp. Pl. ii. 1299.—Sibir.; China.
stamineum, Linn. f. Suppl. 271 = petaloideum.
stenocarpum, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 446, in obs. = minus.
stenophyllum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 19 = angustifolium ?
stipellatum, Jord. Diagn. i. 42 = minus.
stipulaceum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 229 (Quid ?).—Europ.
strictum, Laest. ex Nym. Consp. 6 = minus, simplex.
strictum, Ledeb. Fl. Ross. i. 10 = simplex.
strigillosum, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 1.—Mexic.
styloideum, Linn. f. Suppl. 271 = foetidum.
subalpinum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 57 = minus.
subcorymbosum x, Borb.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 410.—Europ.
subspicatum, Jord. Diagn. i. 46 = simplex.

THALICTRUM:—

- subtrigynum*, Reichb. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 320 = minus.
sylvaticum, Koch, in Flora, xxiv. (1841) 426 = minus.
tenuis, Franch. in Pl. Davidian. i. (1884) 16.—China.
tenuicolum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 320 = foetidum.
tenuifolium, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 12 = angustifolium.
tenuifolium, Schwein. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 294 = minus.
tenuifolium, Sw. Summ. Veg. Scand. 72 = simplex.
thamnophilum, Jord. Diagn. i. 34 = minus.
thibeticum, Franch. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 153.—Tibet.
Thunbergii, DC. Syst. i. 183 = minus.
Timeroyi, Jord. Obs. Pl. Crit. v. (1847) 14 = simplex.
tortuosum, Jord. Diagn. i. 38 = minus.
transsilvanicum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 84 = minus.
tridentinum, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 219 = minus.
trifidum, Lièvre, l. c. xxiii. (1873) 255 = angustifolium.
trigynum, Fisch. ex Trev. Ind. Sem. Hort. Vratisl. App. ii. (1820) 3 = squarrosus.
trispermum, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 92 = squarrosus.
triternatum, Rupr. Fl. Caucas. 2.—Reg. Cauc.
tuberiferum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxii. (1877) 227.—Japon.
tuberosum, Linn. Sp. Pl. 545.—Europ. occ.
udum, Jord. Diagn. i. 50 = flavum.
uncinnatum, Rehm. in Spraw. Kom. Fis. Krakow, vii. (1873) 90.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 239 = petaloideum.
uncinatum, Franch. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 169.—Tibet.
vaccinense, Lièvre, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 125 = minus.
vaginatum, Desf. Tabl. ed. II. 274 = flavum.
vaginatum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 52 = minus, foetidum, squamiferum.
varium, Doell. Rhein. Fl. 543 (Quid ?).—Europ.
Verloti, Arv. Ess. Pl. Dauph. 13, 14 = minus.
versiflorum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 323 = minus.
versifolium, Schrad. ex Lecoy. l. c. = minus.
vesiculosum, Lecoy. l. c. 130.—Am. austr.
villosum, Jacquem. ex Lecoy. l. c. 323 = Falconeri, minus.
viperinum, Andr. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 336 = minus.
virens, Wallr. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 1015 (Quid ?).—Europ.
virgatum, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 14.—Reg. Himal.
virgatum, Schrad. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 323 = minus.
virginicum, Drège, ex Lecoy. l. c. = dasycarpum.
virgultorum, Jord. Diagn. i. 35 = minus.
vitifolium, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 741 = Trautvetteria palmata.
viviparum, Stocks, ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 323 = Chelidonii.
Vrabelyi, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 11 = minus.
vulgare, Kitt. Taschenb. ed. II. 752 = minus.
vulgatum, F. Schultz, Fl. Pfalz, 3 = minus.
Wallrothi, Boenn. Prod. Fl. Monast. 162 = flavum.
Wallrothianum, Dettl. ex Lecoy. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxiv. (1885) 273, 324 = flavum.
Walteri, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 677 = Anemone Walteri.
Wrightii, A. Gray, Pl. Wright. ii. 7.—Mexic.

THALLIANA, Steud. Nom. ed. II. ii. 677 (1841), sphalm. = **Tralliana**, Lour. (Inc. Sed.).

THALYSIA, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Zea**, Linn. (Gramin.).

THAMINOPHYLLUM, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 155 (1864-65). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 423.
 multiflorum, Harv. l. c.—Afr. austr.
 Mundtii, Harv. l. c.—Afr. austr.

THAMNEA, Soland. ex R. Br. Pl. Abel. 3 (1818), nomen; et ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 386. t. 38. **BRUNIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 671.

THAMNEA :—

depressa, *Oliver*, in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 332.—Afr. austr.
 gracilis, *Oliver*, l. c.—Afr. austr.
 hirtella, *Oliver*, l. c.—Afr. austr.
 laxa, *Baill. Hist. Pl.* iii. 388 = *Tittmannia laxa*.
 uniflora, *Soland. ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* viii. (1826) 386.—Afr. austr.

THAMNIUM, *Klotzsch*, in *Linnaea*, xii. (1838) 228 = *Scyphogyne*, *Brongn.* (Ericac.).
 puberulum, *Klotzsch*, l. c. = *S. puberulum*.

THAMNOCALAMUS, *Munro*, in *Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 33, 157 = *Arundinaria*, *Michx.* (Gramin.).
Falconeri, *Hook. f. ex Munro*, l. c. 34 = *A. falcata*.
Ringala, *Falc. ex Munro*, l. c. 157 = *A. falcata*.
spathiflorus, *Munro*, l. c. 34 = *A. spathiflora*.

THAMNOCHORTUS, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 353 (1767). *RESTIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 1034.

aemulus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 439 = *imbricatus*.
argenteus, *Kunth*, l. c. 432.—Afr. austr.
bromoides, *Kunth*, l. c. = *dichotomus*.
Burchellii, *Mast. in DC. Monog. Phan.* i. 322.—Afr. austr.
carcinus, *Mast. l. c.* 327.—Afr. austr.
cernuus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 439.—Afr. austr.
consanguineus, *Kunth*, l. c. 432 = *dichotomus*.
debilis, *Spreng. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 677 = *Restio debilis*.
dichotomus, *R. Br. Prod.* 244.—Afr. austr.
dichotomus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 432 = *elongatus*, *dichotomus*.
dichotomus, *Spreng. Syst. i.* 187 = *Restio triflorus*, *triticeus*?
distichus, *Mast. in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 233.—Afr. austr.

Ecklonianus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 430 = *dichotomus*.
elongatus, *Hochst. in Flora*, xxviii. (1845) 339 = *striatus*.
elongatus, *Mast. in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 226.—Afr. austr.

erectus, *Mast. l. c.* xiv. (1875) 419.—Afr. austr.
floribundus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 435.—Afr. austr.
fruticosus, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 353.—Afr. austr.
giganteus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 435.—Afr. austr.
gracilis, *Mast. in DC. Monog. Phan.* i. 327.—Afr. austr.

imbricatus, *Mast. in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 231.—Afr. austr.
micans, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 441.—Afr. austr.
modestus, *Kunth*, l. c. 434 = *Leptocarpus modestus*.
platypteris, *Kunth*, l. c. 429.—Afr. austr.
robustus, *Kunth*, l. c. 436 = *Cannamois Cephalotes*.
scariosus, *R. Br. Prod.* 244 = *fruticosus*.
scirpiformis, *Mast. in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 228.—Afr. austr.

scirpoides, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 438 = *Cannamois scirpoides*.
spicigerus, *R. Br. Prod.* 244.—Afr. austr.
spicigerus, *Sieber, ex Kunth, Enum. Pl.* iii. 434 = *dichotomus*.
striatus, *Hochst. in Flora*, xxviii. (1845) 339.—Afr. austr.
strictus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 438 = *Cannamois simplex*.
umbellatus, *Kunth*, l. c. 440.—Afr. austr.
virgatus, *Kunth*, l. c. 436 = *Cannamois Cephalotes*.

THAMNOSERIS, *Phil. f. in Anal. Univ. Chil.* (1875) 191. *COMPOSITAE*.
lacerata, *Phil. f. l. c.*—Chili.

THAMNOSMA, *Torr. & Frém. in Frém. [2nd] Rep.* 313 (1845). *RUTACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 288.
RUTOSMA, *A. Gray, Gen. Illustr.* 143. t. 155 (1849).
montana, *Torr. & Frém. in Frém. [2nd] Rep.* 313; *et in Duch. Rév. Bot. ii.* (1846–47) 154.—Calif.
socotrana, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 505.—Ins. Socotra.
texana, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 42.—Am. bor.

THAMNUS, *Klotzsch*, in *Linnaea*, xii. (1838) 235 = *Simocheilus*, *Klotzsch* (Ericac.).
multiflorus, *Klotzsch*, l. c. = *S. obovatus*.

THAMNUS, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 426 (1822) = *Tamus*, *Linn. (Dioscor.)*.

THANATOPHORUS, *Walp. Ann.* ii. 213 (1851–52), *sphalm.* = *DANATOPHORUS*, *Blume = Harpullia*, *Roxb. (Sapind.)*.

THAPSANDRA, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 40 (1844) = *Ceisia*, *Linn. (Scrophul.)*.
cretica, *Griseb. l. c.* = *C. cretica*.

THAPSIA, *Linn. Syst. ed. I* (1735). *UMBELLIFERAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 930.

MELANOSELINUM, *Hoffm. Gen. Umb.* 156 (1814).
MONIZIA, *Lowe, in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 295.

altissima, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 6.—Ital.
apulia, *Mill. l. c.* n. 4 = *Elaeoselinum Asclepium*.
asclepiadea, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 136 = seq.

Asclepium, *Linn. Sp. Pl.* 261 = *Elaeoselinum Asclepium*.

decipiens, *Hook. f. Bot. Mag. t.* 5670.—Ins. Mader.
decussata, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 12 = *garganica*.
foetida, *Linn. Sp. Pl.* 261 = *Elaeoselinum foetidum*.
garganica, *Linn. Mant. i.* 57.—Reg. Mediterr.
glomerata, *Nutt. Gen. Am. i.* 184 = *Cymopterus glomeratus*.

gummifera, *Spreng. Sp. Umbellif.* 31 = *Laserpitium gummiferum*.

Laserpitii, *Spreng. l. c.* 32 = *Prangos ferulacea*.
lineariloba, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 314 = *garganica*.

marocana, *Pomel, l. c.* in obs. = *garganica*.
maxima, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 2 = *villosa*.
melanoselina, *Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x.* (1881) 185 = *decipiens*?

meoides, *Guss. Fl. Sic. Prod. i.* 370 = *Elaeoselinum meoides*.

microcarpa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 312 = *villosa*.

minor, *Hort. ex Nym. Consp.* 276 = *villosa*.
minor, *Link, ex Steud. Nom. ed. I.* 831 (Quid?)—Hab.?

Moniza, *Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x.* (1881) 185.—Ins. Canar.

platycarpa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 313 = *garganica*.

polygama, *Desf. Fl. Atlant. i.* 261. t. 75.—Afr. bor.
polygama, *Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi.* (1878) 481 = *Elaeoselinum foetidum*.

praecalta, *Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 288.—Ins. Cos.

silphia, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 136 = *garganica*.

stenocarpa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 313 = *garganica*.

stenoptera, *Pomel, l. c.* 312 = *villosa*.
Sylphium, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 17 = *garganica*.

tenuifolia, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 12 = *Elaeoselinum Lagascae*.

transagana, *Brot. Fl. Lusit. i.* 468.—Lusitan.

trifoliata, *Linn. Sp. Pl.* 262 = *Thaspium trifoliatum*.

trifoliata, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 5 = *Thaspium barbinode*.

villosa, *Linn. Sp. Pl.* 261.—Europ. austr.

THAPSIUM, *Walp. Rep. ii.* 403 (1843), *sphalm.* = *Thaspium*, *Nutt. (Umbell.)*.

THAPSUS, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 89 (1836) = *Verbascum*, *Tourn. (Scrophul.)*.

Blattaria, *Rafin. l. c.* = *V. Blattaria*.

floccosum, *Rafin. l. c.* = *V. pulverulentum*.

Linnaei, *Opiz, Seznam*, 95 = *V. Thapsus*.

Lychnitis, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 89 = *V. Lychnitis*.

montanum, *Rafin. l. c.* = *V. montanum*.

mucronatum, *Rafin. l. c.* = *V. mucronatum*.

nigrum, *Rafin. l. c.* = *V. nigrum*.

phoeniceum, *Rafin. l. c.* = *V. phoeniceum*.

phlomoides, *Opiz, Seznam*, 96 = *V. phlomoides*.

pulverulentum, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 89 = *V. pulverulentum*.

thapsoides, *Rafin. l. c.* = *V. thapsoides*.

Schraderi, *Opiz, Seznam*, 96 = *V. Thapsus*.

sinuatum, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 89 = *V. sinuatum*.

Willdenowii, *Opiz, Seznam*, 96 = *V. thapsoides*.

THASPIUM, *Nutt. Gen. Am. i.* 196 (1818). *UMBELLIFERAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 913.

UPOPION, *Rafin. New Fl. Am. iv.* 29 (1836).

actaeifolium, *Nutt. Gen. Am. i.* 196 = *Archangelicum Gmelini*.

atropurpureum, *Nutt. l. c.*—Am. bor.

aureum, *Nutt. l. c.*—Am. bor.

barbinode, *Nutt. l. c.*—Am. bor.

cordatum, *Torr. & Gray, Fl. N. Am. i.* 615 = *atropurpureum*.

foliosum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 40 = *Pimpinella caespitosa*.

macrocarpum, *Herb. Bourg. ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot.* 429 = *Peucedanum macrocarpum*.

montanum, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv.* (1849) 57 = *Ligusticum montanum*.

pinnatifidum, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II.* 155 = *Walteri*.

purpureum, *Walp. Am. ii.* 702 = *atropurpureum*.

trachypleurum, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 63 = *Cicuta trachypleura*.

trifoliatum, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II.* 156.—Am. bor.

verticillatum, *Geyer, ex Hook. Lond. Journ. Bot. vi.* (1847) 233 = *Angelica verticillata*.

Walteri, *Shuttl. ex A. Gray, Pl. Wright. i.* 79.—Am. bor.

THAUMATOCOCCUS, *Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii.* 652 (1883). *SCITAMINEAE*, *Benth. & Hook. f. l. c.*
Danielli, *Benth. l. c.*—Afr. trop.

THAUMATOPHYLLUM, *Schott, in Bonplandia*, vii. (1859) 31. *AROIDEAE*, *Benth. & Hook. f.* iii. 979.
Spruceanum, *Schott, l. c.*—Bras.

THAUMAZA, *Salisb. Gen. Pl. Fragm.* 15 (1866) = *Eriospermum*, *Jacq. (Liliac.)*.
paradoxa, *Salisb. l. c.* = *E. paradoxum*.

THAUMURIA, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 502 (1826) = *Parietaria*, *Tourn. (Urtic.)*.
cretica, *Gaudich. l. c.* = *P. cretica*.

THEA, *Linn. Syst. ed. I* (1735) = *Camellia*, *Linn. (Ternstr.)*.

assamica, *J. W. Mast. in Journ. Agric. & Hort. Soc. Ind. iii.* (1844) 63 = *C. Thea*.

assimilis, *Seem. in Trans. Linn. Soc. xxii.* (1859) 349 = *C. assimilis*.

Bohea, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 743 = *C. Thea*.

Camellia, *Hoffm. Verz. Pf.* 117 = *C. japonica*.

cantonensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 339 = *C. Thea*.

caudata, *Seem. in Trans. Linn. Soc. xxii.* (1859) 348 = *C. caudata*.

chinensis, *Sims, Bot. Mag. t.* 998 = *C. Thea*.

cochinchinensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 338 = *C. Thea*.

euryoides, *Booth, in Trans. Hort. Soc. vii.* (1830) 560 = *C. euryoides*.

grandifolia, *Salisb. Prod.* 370 = *C. Thea*.

imperialis, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 678; *et ex Seem. in Trans. Linn. Soc. xxii.* (1859) 350 = *Micromeria obovata*.

japonica, *Baill. Hist. Pl. iv.* 229 = *C. Thea*.

latifolia, *Lodd. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III.* 91 = *C. Thea*.

longifolia, *Nois. ex Steud. Nom. ed. I.* 832 = *C. Thea*.

maliflora, *Seem. in Trans. Linn. Soc. xxii.* (1859) 346 = *C. rosaeiflora*.

oleosa, *Lour. Fl. Cochinch.* 339 = *C. Thea*.

parvifolia, *Salisb. Prod.* 370 = *C. Thea*.

salicifolia, *Seem. in Trans. Linn. Soc. xxii.* (1859) 349 = *C. salicifolia*.

Sasangua, *Nois. ex Cels, Cat. Arbr.* (1817) 35 = *C. Thea*.

sinensis, *Linn. Sp. Pl.* 515 = *C. Thea*.

stricta, *Hayne, Arn. Gew. vii.* t. 27 = *C. Thea*.

viridis, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 735 = *C. Thea*.

THEAPHYLLA, *Rafin. Sylva Tellur.* 139 (1838) = seq.

THEAPHYLLA, *Rafin. Med. Fl. ii.* 267 (1830) = *Camellia*, *Linn. (Ternstr.)*.

anamensis, *Rafin. Sylva Tellur.* 139 = *C. Thea*?

cantonensis, *Rafin. l. c.* = *C. Thea*.

euryoides, *Rafin. l. c.* = *C. euryoides*.

THEAPHYLLA:—

lanceolata, Rafin. Sylva Tellur. 139 = *Camellia lanceolata*.
laxa, Rafin. l. c. = *C. Thea*.
oleifera, Rafin. l. c. = *C. Thea*.
viridis, Rafin. l. c. = *C. Thea*.

THEAPHYLLUM, Nutt. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 605 = *Perrottetia*, H. B. & K. (Celastr.).
celastrinum, Nutt. ex Turcz. l. c. = *P. sandwicensis*.

THEBESIA, Neck. Elem. ii. 313 (1790) = *Knowltonia*, Salisb. (Ranunc.).

THECA, Juss. Gen. 108 (1789) = *THEKA*, Adans. = *Tectona*, Linn. (Verben.).

THECACORIS, A. Juss. Tent. Euph. 12. t. 1 (1824).
 EUPHORBACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 286.
madagascariensis, A. Juss. l. c. 105. t. 1. —Madag.
Manniana, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. 11. 246. —Afr. trop.
stenopetala, Muell. Arg. l. c. —Afr. trop.
trichogyne, Muell. Arg. in Journ. Bot. ii. (1864) 328. —Afr. trop.

THECANISIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 38 (1836) = *Spiraea*, Linn. (Rosac.).
angustifolia, Rafin. l. c. 39 = *S. angustifolia*?
discolor, Rafin. l. c. = *S. discolor*.
lobata, Rafin. l. c. 38 = *S. lobata*.
palmata, Rafin. Sylva Tellur. 152 = *S. palmata*?
purpurea, Rafin. New Fl. Am. ii. 38 = *S. lobata*?
Ulmaria, Rafin. Sylva Tellur. 152 = *S. Ulmaria*.

THECANTHES, Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1818) 271 = *Pimelea*, Banks (Thymel.).
Cornucopiae, Wikstr. l. c. = *P. Cornucopiae*.
punicea, Wikstr. l. c. 272 = *P. punicea*.

THECOCARPUS, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 93. *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 903.
meifolius, Boiss. l. c. 94. —Persia.

THECOSTELE, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 37. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 539.
alata, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 144 = *Zollingeri*.
Zollingeri, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 37. —Java.

THEIS, Salisb. ex DC. Prod. vii. 715 (1835) = *Rhododendron*, Linn. (Ericac.).

THEKA, Adans. Fam. ii. 445 (1763) = *Tectona*, Linn. (Verben.).
grandis, Lam. Illustr. ii. 111 = *Tectona grandis*.
ternifolia, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 185 = *Tectona Hamiltoniana*.

THELA, Lour. Fl. Cochinch. 119 (1790) = *Plumbago*, Tourn.
alba, Lour. l. c. = *P. zeylanica*.
coccinea, Lour. l. c. = *P. rosea*.

THELAIA, Alef. in Linnaea, xxviii. (1856) 33 = *Pyrola*, Tourn. (Ericac.).
angustifolia, Alef. l. c. 52 = *P. angustifolia*.
aphylla, Alef. l. c. 39 = *P. aphylla*.
arenaria, Alef. in Bot. Zeit. xx. (1862) 220 = *P. rotundifolia*.
asarifolia, Alef. in Linnaea, xxviii. (1856) 54 = *P. rotundifolia*.
bracteosa, Alef. l. c. 57 = *P. rotundifolia*.
chlorantha, Alef. l. c. 41 = *P. chlorantha*.
elliptica, Alef. l. c. 47 = *P. elliptica*.
grandiflora, Alef. l. c. 68 = *P. rotundifolia*.
intermedia, Alef. l. c. 65 = *P. rotundifolia*.
media, Alef. in Bot. Zeit. xx. (1862) 219 = *P. chlorantha*?
occidentalis, Alef. in Linnaea, xxviii. (1856) 36 = *P. chlorantha*.
rotundifolia, Alef. l. c. 60 = *P. rotundifolia*.
Sartorii, Alef. l. c. 50 = *P. Sartorii*.
spatulata, Alef. l. c. 45 = *P. picta*.

THELASIS, Blume, Bijdr. 385. t. 75 (1825).
ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 589.
EUPROBOSIS, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 371. t. 26.
OXYANTHERA, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. 197. t. 37 (1829).
capitata, Blume, Bijdr. 386. —Java.
carinata, Blume, l. c. —Java.
carinata, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 37 = *pygmaea*.
contracta, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 187. —Java.
elegans, Blume, l. c. = *Phreatia elegans*.
elongata, Blume, l. c. —Java.
obtusa, Blume, Bijdr. 386. —Java.
ochreatea, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 63. —Borneo.
pygmaea, Lindl. l. c. —Ind. or.
triptera, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 219. —Malaya.
Zollingeri, Reichb. f. l. c. v. (1857) 37. —Java.

THELEOPHYTON, Moq. in DC. Prod. xiii. 11. 115 (1849) = *Atriplex*, Tourn. (Chenop.).
Billardieri, Moq. l. c. 116 = *A. Billardieri*.

THELEPOGON, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 46, 788 (1817); Roth, Nov. Pl. Sp. 62 (1821).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1131.
JARDINEA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229 (Jandinea).
RHINIACHNE, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 360, in syn. (1855).
elegans, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 788; Nov. Pl. Sp. 62. —Afr. trop.; Ind. or.
sanguineus, Spreng. Syst. i. 299 = *Andropogon Pseudograya*.

THELESERMA, Less. in Linnaea, vi. (1831) 511.
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 387.
COSMIDIUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 361.
ambiguum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 16. —Am. bor. occ.
filifolium, A. Gray, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 252. —Am. bor. occ.
gracile, A. Gray, l. c. —Am. bor. occ.
longipes, A. Gray, Pl. Wright. i. 109. —Texas; Mexic.
scabiosoides, Less. in Linnaea, vi. (1831) 511. —Bras.
simplicifolium, A. Gray, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 252. —Mexic.
subnudum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 72. —Am. bor. occ.
subsimplifolium, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 90. —Am. bor. occ.

THELIGONUM, Linn. Gen. ed. I. 357 (1737) = *Thelygonum*, Linn. (Urtic.).

THELIRA, Thou. Gen. Nov. Madag. 21 (1806) = *Pariarium*, Aubl. (Rosac.).

THELMATOPHACE, Godr. Fl. Lorr. ed. I. iii. 18 (1844); ed. II. ii. 327 (1861), sphalm. = *TELMATOPHACE*, Schleid. = *Lemna*, Linn.

THELYCHITON, Endl. Prod. Fl. Norf. 32 (1833) = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).
argyropus, Endl. l. c. = *Bulbophyllum argyropus*.
brachypus, Endl. l. c. 33 = *D. brachypus*.
macropus, Endl. l. c. = *D. macropus*.

THELYCRANIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 394 = *Cornus*, Tourn. (Cornac.).
sanguinea, Fourr. l. c. = *C. sanguinea*.

THELYGONUM, Linn. Gen. ed. I. 357 (1737) (*Theligonum*); Schreb. Gen. ii. 644 (1791). *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 395.
CYNOCRAMBE, Gaertn. Fruct. i. 362. t. 75 (1788).
alsinoides, Lam. Fl. Fr. ii. 198 = *T. Cynocrambe*.
Cynocrambe, Linn. Sp. Pl. 993. —Reg. Mediterr.; Oriens; Ind. or.

THELYMITRA, Forst. Char. Gen. 97. t. 49 (1776).
ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 607.
MACDONALDIA, Gunn, ex Lindl. Swan River App. 50. t. 9 (1839).

angustifolia, R. Br. Prod. 314 = *longifolia*.
angustifolia, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 5 = *aristata*.
antennifera, Hook. f. l. c. 4. t. 101 A. —Austral.
arenaria, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 519 = *longifolia*.
aristata, Lindl. l. c. 521. —Austral.
Benthamiana, Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 55. —Austral.
campanulata, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 14 = *canaliculata*.
campanulata, Lindl. Swan River App. 49 = *ixioides*.
canaliculata, R. Br. Prod. 314. —Austral.
carnea, R. Br. l. c. —Austral.
circumsepta, Fitzg. Austral. Orch. t. 4. —Austral.
Colensoi, Hook. f. Handb. N. Z. Fl. 271. —N. Z.
cornicina, Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 54 = *canaliculata*.
crinita, Lindl. Swan River App. 49. —Austral.
cyanea, Lindl. ex Benth. Fl. Austral. vi. 323. —Austral.
epipactoides, F. Muell. Fragm. v. 174 = *canaliculata*.
flexuosa, Endl. Nov. Stirp. Dec. 23. —Austral.
Forbesii, Ridl. in H. O. Forbes, Nat. Wand. East. Archip. 518. —Ins. Timor.
formosa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 328. —N. Z.
Forsteri, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 228 = *longifolia*.
fuscolutea, R. Br. Prod. 315. —Austral.
graminea, Lindl. Swan River App. 49 = *longifolia*.
grandiflora, Fitzg. in Gard. Chron. (1882) i. 495. —Austral.
grandis, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 319 = *aristata*.
imberbis, Hook. f. Fl. N. Z. i. 244. —N. Z.
intermedia, Berggr. in Minneskr. Fisiog. Sällks. Lund, (1877) n. viii. 21. —N. Z.
iridioides, Sieber, ex Benth. Fl. Austral. vi. 318 = *ixioides*.
ixioides, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 228. t. 3. —Austral.
javanica, Blume, Bijdr. 419. —Java.
juncifolia, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 522 = *ixioides*.
lilacina, F. Muell. ex Lindl. in Linnaea, xxvi. (1854-55) 242 = *ixioides*.
longifolia, Forst. Char. Gen. 98. t. 49. —Austral.
luteociliun, Fitzg. in Gard. Chron. (1882) i. 495. —Austral.
Mackibbinii, F. Muell. in Melb. Chemist (1881), 44. —Austral.
Macmillani, F. Muell. Fragm. v. 93. —Austral.
macrophylla, Lindl. Swan River App. 49 = *aristata*.
media, R. Br. Prod. 314 = *canaliculata*.
mucida, Fitzg. in Gard. Chron. (1882) i. 495. —Austral.
nemoralis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 249. —N. Z.
nuda, R. Br. Prod. 314 = *longifolia*.
ovata, F. Muell. Fragm. vi. 84 = *crinita*.
pardalina, F. Muell. l. c. v. 94 = *villosa*.
pauciflora, R. Br. Prod. 314 = *longifolia*.
porphyrostica, F. Muell. Fragm. v. 97 = *variegata*.
pulchella, Hook. f. Fl. N. Z. i. 244. —N. Z.
purpureo-fusca, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1880) 249. —N. Z.
rubra, Fitzg. in Gard. Chron. (1882) i. 495. —Austral.
Smithiana, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 4. t. 101 B = *flexuosa*.
stellata, Lindl. Swan River App. 49. —Austral.
stenopetala, Hook. f. Fl. Antarct. 69. —Ins. Dom. Auckland.
tigrina, R. Br. Prod. 315. —Austral.
uniflora, Hook. f. Fl. Antarct. 70. —Ins. Dom. Auckland.
variegata, Lindl. ex Benth. Fl. Austral. vi. 323. —Austral.
venosa, R. Br. Prod. 314. —Austral.
venosa, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 4. t. 102 A = *cyanea*.
versicolor, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 520 = *longifolia*.
villosa, Lindl. Swan River App. 49. t. 8 C. —Austral.
winalis, Fitzg. in Gard. Chron. (1882) i. 495. —Austral.

THELYPODIUM, Endl. Gen. 876 (1839). *CRUCIFERAE*, [Benth. & Hook. f. i. 81].
PACHYPODIUM, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 96 (1838).

THELYPODIUM:—

- ambiguum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 290.—Am. bor.
 auriculatum, *S. Wats. l. c.* xvii. (1881–82) 321.—N. Mexic.
 brachycarpum, *Torr. Bot. U. St. Expl. Exped.* ii. 231. t. 1.—Calif.
 Cooperi, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 246.—Calif.
 flavescens, *S. Wats. in Bot. King's Exp.* 25.—Calif.
 integrifolium, *Endl. in Walp. Rep.* i. 172.—Am. bor. occ.
 laciniatum, *Endl. l. c.*—Am. bor. occ.
 linearifolium, *S. Wats. in Bot. King's Exp.* 25.—Am. bor. occ.
 longifolium, *S. Wats. l. c.*—Am. bor. occ.
 neglectum, *M. Jones, in Am. Natural.* xvii. 11. (1882) 875.—Calif.
 Nuttallii, *S. Wats. in Bot. King's Exp.* 26.—Am. bor. occ.
 petiolatum, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 2.—Mexic.
 pinnatifidum, *S. Wats. in Bot. King's Exp.* 25.—Am. bor. occ.
 sagittatum, *Endl. in Walp. Rep.* i. 172.—Am. bor. occ.
 Wrightii, *A. Gray, Pl. Wright.* i. 7.—N. Mexic.

THELYPOGON, Spreng. Syst. iii. 682 (1826) = **Teli-pogon**, H. B. & K. (Orchid.).

THELYRA, DC. Prod. ii. 527 (1825) = **THELIRA**, Thou. = **Parinarium**, Aubl. (Rosac.).
madagascariensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 479 = Madag.

THELYSIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 303 = **Iris**, Tourn.
alata, Parl. Fl. Ital. iii. 317 = **I. alata**.
caucasica, Parl. l. c., in obs. = **I. caucasica**.
fumosa, Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 304 = **I. fumosa**.
grandiflora, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 303 = **I. alata**.
persica, Parl. Fl. Ital. iii. 317, in obs. = **I. persica**.

THELYTHAMNOS, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 25 (1828) = **Ursinia**, Gaertn. (Compos.).
filiformis, Spreng. l. c. = **U. filiformis**.

THEMEDA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 (1775) = **An-thistiria**, Linn. f. (Gramin.).
polygama, J. F. Gmel. Syst. 149 = **A. Forskålili** (cf. Addend.).
triandra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 = **A. Forskålili**.

THEMIS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 85 (1866) = **Bro-diaea**, Sm. (Liliac.).
ixioides, Salisb. l. c. = **B. ixioides**.

THEMISTOCLESIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 41. **VACCINIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 576.
 EPISCOPIA, Mor. ex Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 42, in syn.
buxifolia, Klotzsch, l. c. 42 = **Ceratostema buxifolium**.
coronilla, Linden & André, Illustr. Hort. xvii. (1870) 176. t. 33.—N. Granat.
pendula, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 42.—N. Granat.

THENARDIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 209. t. 240 (1818). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 710.
corymbosa, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 246 = **Forsteronia Schomburgkii**.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 209. t. 240.—Mexic.
laurifolia, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 246 = **Forsteronia laurifolia**.
scabra, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 65.—N. Caled.
suaveolens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (1844) 359.—Mexic.
umbellata, Spreng. Syst. i. 636.—Guian.

THENARDIA, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. iii. 108 (1828) = **Rhynchanthera**, DC. (Melastom.).
rosea, Moç. & Sesse, l. c. = **R. mexicana**.

THEOBROMA, Linn. Gen. ed. I. 351 (1737).

STERCULIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 225.
 CACAO, Gaertn. Fruct. ii. 190. t. 122 (1791).
alba, Bernoulli, in Denkschr. Schw. Naturf. Ges. xxiv. (1871) n. III. 14 (sp. dub.).—Guian.
angustifolia, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 484 = **speciosa**.
augusta, Linn. Syst. ed. XII. 233 = **Abroma augusta**.
bicolor, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 104. t. 30.—N. Granat.
 Cacao, Linn. Sp. Pl. 782.—Am. trop.
caribaea, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 67 = **T. Cacao**?
celtifolia, Salisb. Prod. 387 = **Guazuma ulmifolia**.
ferruginea, Bernoulli, in Denkschr. Schw. Naturf. Ges. xxiv. (1871) n. III. 13.—Bras.
glauca, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 447 (sp. dub.).—N. Granat.
Guazuma, Linn. Sp. Pl. 782 = **Guazuma ulmifolia**.
guianensis, J. F. Gmel. Syst. 1151 = **T. Cacao**.
guyanensis, Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 55 (sp. dub.).—Guian.
integerrima, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 83 = **T. Cacao**.
lelocarpa, Bernoulli, in Denkschr. Schw. Naturf. Ges. xxiv. (1871) n. III. 6.—Am. centr.
macrantha, Bernoulli, l. c. 11.—Bras.
Martiana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1242.—Bras.
microcarpa, Mart. in Buchn. Repert. xxxv. (1830) 24; *Bernoulli*, in Denkschr. Schw. Naturf. Ges. xxiv. (1871) n. III. 11. t. 3.—Bras.
montana, Goudet, ex Bernoulli, l. c. 15 (sp. ignota).—Hab.?
nitida, Bernoulli, l. c.—Bras.
obovata, Klotzsch, ex Bernoulli, l. c. 14 = **subincana**.
ovatifolia, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 485 = **bicolor**.
pentagona, Bernoulli, in Denkschr. Schw. Naturf. Ges. xxiv. (1871) n. III. 6.—Am. centr.
quinguenervia, Bernoulli, l. c. 8 = **speciosa**.
Salzmanniana, Bernoulli, l. c. 7 (Salzmanniana).—Bras.
speciosa, Willd. ex Mart. Reise Bras. iii. 1127 = **macrantha**.
speciosa, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 332.—Bras.
Spruceana, Bernoulli, in Denkschr. Schw. Naturf. Ges. xxiv. (1871) n. III. 9 = **speciosa**.
subincana, Mart. in Buchn. Repert. xxxv. (1830) 23.—Bras.
subincana, Spruce, ex Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xi. (1881) 154 = **speciosa**.
sylvestris, Aubl. ex Mart. in Buchn. Repert. xxxv. (1830) 24 = **Martiana**.
sylvestris, G. Don, Gen. Syst. i. 522 = **Genipa Merianae**.

THEODORA, Medic. Theod. 16 (1786) = **Schotia**, Jacq. (Legumin.).
speciosa, Medic. l. c. 16, 61 = **S. speciosa**.
stipulata, Eckl. & Zeyh. Enum. 261 = **S. speciosa**.

THEODOREA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. (1827); liii. 463 (1828) = **Saussurea**, DC. (Compos.).
amara, Cass. l. c. liii. 464 = **S. amara**.
pulchella, Cass. l. c. 465 = **S. japonica**.

THEODOREA, Rodrig. Orch. Nov. i. 144 (1877). **ORCHIDEAE**.
gomezoides, Rodrig. l. c. 145.—Bras.

THEODORIA, Neck. Elem. ii. 286 (1790) = **Sterculia**, Linn.

THEOPHRASTA, Linn. Gen. ed. I. 45 (1737), partim; Juss. Gen. 150 (1789). **MYRSINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 649.
americana, Linn. Sp. Pl. 149.—Ind. occ.
americana, Sw. Obs. Bot. 59 = **Jussieu**.
angustifolia, Linden, Cat. n. 18 (1863) 10 (Clavijae sp. ?)—Hab.?
antioquiensis, Linden, l. c. n. 91 (1874) 11 (Clavijae sp.).—N. Granat.
attenuata, Linden, Cat. n. 18 (1863) 10 (Clavijae sp. ?)—Hab.?
cochinchinensis, Spreng. Syst. i. 671 = **Melodinus monogynus**?
crassipes, Linden, Cat. n. 18 (1863) 10 (Clavijae sp. ?)—Hab.?
densiflora, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. iii. (1876) 142.—Ins. S. Doming.
fusca, Decne. l. c. 143.—Hab.?
glycyarpa, Spreng. Syst. i. 671 = **Leonia glycyarpa**.

THEOPHRASTA:—

Henrici, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 27 = **Jussieu**.
Hookeri, Linden, Cat. n. 91 (1874) 55 = **Clavija Hookeri**.
imperialis, Linden, ex C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 91; Regel, Gartenfl. (1864) 323. t. 453.—Ind. occ.
integrifolia, Pohl, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. x. 277 = **Clavija integrifolia**.
Jussiae, Hook. Bot. Mag. t. 4239 (excl. syn.) = **densiflora**.
Jussieu, Lindl. Coll. Bot. t. 26.—Am. austr.
latifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 787 = **Clavija latifolia**.
longifolia, Jacq. Coll. iv. 136 = **Clavija ornata**.
macrophylla, Linden, Cat. n. 91 (1874) 54, nomen = **Clavija grandis**.
macrophylla, Link, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 187 = **Clavija macrophylla**.
madagascariensis, Willd. ex Roem. & Schult. l. c. 787 (sp. dub.).—Madag.
minor, Linden, Cat. n. 18 (1863) 10 (Clavijae sp. ?)—Hab.?
nobilis, Linden, l. c. = **C. clavata**.
pinnata, Jacq. Fragm. 49.—Venezuela.
pungens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 787 = **Clavija ornata**.
regalis, Linden, Cat. n. 21 (1867) 5 = **Clavija clavata**.
Rodekiana, Linden, l. c. n. 95 (1876) 12 = **C. Rodekiana**.
serrata, Hort. ex Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 218 = **Clavija macrophylla**.
serratifolia, Cat. Cels. (1828) 4; ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxv. (1831) 151, 153. t. 111 = **Brexia madagascariensis**?
smaragdina, Hort. Linden, ex Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. iii. (1876) 139 = **Deherainia smaragdina**.
spinosa, Willd. ex C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 98, 108.—Ind. occ.
tetramera, Mart. in Flora, xxiv. (1841) 11. Beibl. 27 = **Clavija macrophylla**.
umbrosa, Linden, Cat. n. 19 (1865) 6, 15 = **Clavija umbrosa**.

THEOPHROSERIS, Andrae, in Bot. Zeit. xiii. (1855) 310, sphalm. = **TEPHROSERIS**, Reichb. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

THEOPYXIS, Griseb. in Goett. Abh. vi. (1856) 126 = **Lysimachia**, Tourn. (Primul.).
chilensis, Griseb. l. c. 127 = **L. umbellata**.

THEREBINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 = **Oroxylum**?, Vent. (Bignoniac.).

THERESA, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 496. t. 54 (1849) = **Perilomia**, H. B. & K. (Labiata).
valdiviana, Clos, l. c. 497.—Chili.

THERESIA, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 232 = **Fritillaria**, Linn. (Liliac.).
Fleischeri, Klatt, in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 439 = **F. Fleischeriana**.
libanotica, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 20 = **F. libanotica**.
persica, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 233 = **F. persica**.
Pinardi, Klatt, in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 439 = **F. Pinardi**.
pudica, Klatt, l. c. = **F. pudica**.
tulipifolia, Klatt, l. c. 438 (excl. syn.) = **F. tulipifolia**.

THERIOPHONUM, Blume, Rumphia, i. 127 (1835). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 967.

CALYPTROCORYNE, Schott, in Oestr. Bot. Wochenschr. vii. (1857) 262.
TAPINOCARPUS, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 345.
crenatum, Blume, Rumphia, i. 128.—Ind. or.
Dalzelii, Schott, Aroid. i. 15 (Dalzelii).—Ind. or.
infaustum, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 260.—Ind. or.
Kleinii, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 2 = **crenatum**.
Wightii, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 608 = **infaustum**.
Wightii, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 3.—Ind. or.
zeylanicum, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 258.—Zeylan.

THERMIA, Nutt. Gen. Am. i. 282 (1818) = **Thermopsis**, R. Br. (Legumin.).
alpina, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 171 = *Thermopsis corgonensis*.
fabacea, Spreng. l. c. = *Thermopsis fabacea*.
laburnifolia, Spreng. l. c. = *Piptanthus nepalensis*.
lupinoides, Nutt. Gen. Am. i. 283 = *Thermopsis lanceolata*.
rhombofolia, Nutt. l. c. 282 = *Thermopsis rhombifolia*.

THERMINTHOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = *Pistacia*, Linn. (Anacard.).

THERMOPHILA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 398 = *Salacia*, Linn. (Celastr.).
angulosa, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. 1. 154 = *S. multiflora*.
cordata, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 401 = *S. multiflora*.
emarginata, Miers, l. c. = *S. multiflora*.
macrophylla, Miers, l. c. 399 = *S. macrophylla*, Miq.
obovata, Miers, l. c. = *S. multiflora*.
rugulosa, Miers, l. c. 400 = *S. multiflora*.

THERMOPSIS, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 3 (1811). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 465.

DREPILIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 52 (1836).
SCOLOBUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 259.
THERMIA, Nutt. Gen. Am. i. 282 (1818).
alpina, Ledeb. Fl. Alt. ii. 112 = *corgonensis*.
alterniflora, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedtsch. 18.—Turkestan.
barbata, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 196. t. 32. f. 1.—Reg. Himal.
californica, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 126.—Am. bor. occ.
caroliniana, M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1848) 80.—Am. bor.
chinensis, Benth. ex S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 131 = *fabacea*.
corgonensis, DC. in DC. Prod. ii. 99.—Sibir. altaic.
fabacea, DC. l. c. = Kamtschat.
fabacea, Hook. Fl. Bor. Am. i. 128 = *montana*.
fabacea, Torr. Bot. Mex. Bound. 58 = *californica*.
fraxinifolia, M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1848) 81.—Am. bor.
gorgonensis, Walp. Rep. i. 562, sphalm. = *corgonensis*.
inflata, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 35.—Reg. Himal.
laburnifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 239 = *Piptanthus nepalensis*.
lanceolata, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 3.—Sibir.; Kamtschat.
lupinoides, Link, Enum. Hort. Berol. i. 401 = *lanceolata*.
macrophylla, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 329.—Calif.
macrophylla, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 81 = *californica*.
mollis, M. A. Curt. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iii. (1848) 47. t. 9.—Am. bor.
montana, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 388.—Am. bor.
napaulensis, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 98 = *Piptanthus nepalensis*.
rhombifolia, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 737.—Am. bor.

THEROFON, Rafin. New Fl. Am. iv. 66 (1836) = **Boykinia**, Nutt. (Saxifr.).
napelloides, Rafin. l. c. = *B. aconitifolia*.

THEROGERON, DC. Prod. v. 283 (1836) = **Minuria**, DC. (Compos.).
denticulatus, DC. l. c. = *M. denticulata*.
integerrimus, DC. l. c. = *M. integerrima*.
tenuifolius, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 467 = *M. Cunninghamii*.

THEROLEPTA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825) = **Marshallia**, Schreb. (Compos.).
pumila, Rafin. l. c. = *M. pumila*.

THEROPOGON, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871) 89. **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 771.
pallidus, Maxim. l. c. 90.—Reg. Himal.

THESIDIUM, Sond. in Flora, xl. (1857) 364. **SANTALACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 222.
exocarpaceoides, Sond. l. c. 365.—Afr. austr.
fragile, Sond. l. c. 364.—Afr. austr.
globosum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 673.—Afr. austr.
hirtulum, Sond. in Flora, xl. (1857) 405 = *globosum*, strigosum.
hirtum, Sond. l. c. 365 = *globosum*, strigosum.
leptostachyum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 674.—Afr. austr.
microcarpum, A. DC. l. c. = *exocarpaceoides*.
podocarpum, A. DC. l. c. = *Thunbergii*.
strigosum, A. DC. l. c. 673.—Afr. austr.
Thunbergii, Sond. in Flora, xl. (1857) 364.—Afr. austr.

THESION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = **Thesium**, Linn. (Santal.).
micromerion, St. Lag. l. c. = *Thesium Micromeria*.
micromerium, St. Lag. l. c. viii. (1881) 203 = *Thesium Micromeria*.

THESIUM, Linn. Gen. 60 (1737). **SANTALACEAE**, Penth. & Hook. f. iii. 221.
FRISCA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 460 (1841).
RHINOSTEGIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 56.

STEINREITERA, Opiz, Seznam, 93 (1852).
XEROLOPHUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 160 (1867).
acutissimum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 4.—Afr. austr.
adpressifolium, Sond. in Flora, xl. (1857) 358 = *funale*.
adulterinum, Montand. Guide Bot. 286 = *pratense*.
alatavicum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 445.—Sibir.
alpinum, Desf. Fl. Atlant. i. 206 = *humile*.
alpinum, Kunth, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 643 = *divaricatum*.
alpinum, Linn. Sp. Pl. 207.—Europ.; Reg. Cauc.
alpinum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 122 = *humifusum*.
ambiguum, Tenore, Fl. Nap. iii. 312 = *pratense*.
amblystachyum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 6.—Afr. austr.
amplexicaule, Linn. Mant. ii. 213 = *euphorbioides*.
angulosum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 2.—Afr. austr.
aphyllum, Mart. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 671.—Bras.
apiculatum, Sond. in Flora, xl. (1857) 357 = *acutissimum*.
asperulum, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 194 = *ramosum*.
assimile, Sond. in Flora, xl. (1857) 360 = *carinatum*.
aureum, Faub. & Spach, Illustr. ii. 4; iii. 151. t. 300.—Cappadoc.
australe, R. Br. Prod. 353.—China; Japon; Austral.
australe, A. Cunn. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 676 = *Choretum lateriflorum*.
Basninianum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 470.—Dahuria.
bavarium, Schrank, Baier. Reise, 129.—Europ.
Bergeri, Zucc. in Abh. Akad. Muench. ii. (1831-36) 324.—Graec.; As. Min.
bibracteatum, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) i. Beibl. 23.—Sibir. baical.
Billardieri, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 48 = *heterophyllum*.
Boissierianum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 663.—Afr. austr.
brachycephalum, Sond. in Flora, xl. (1857) 360 = *capitellatum*.
brachyphyllum, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 48.—As. Min.
bracteatum, Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 152, nomen = *ebracteatum*?
brasiliense, A. DC. in DC. Prod. xiv. 671.—Bras.
brevicolle, J. & C. Presl, Fl. Čech. 54 = *pratense*.
brevifolium, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 3 = *leptocaula*.
byzantinum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 644 = *divaricatum*.
capitatum, Banks, ex A. DC. l. c. 664 = *scabrum*.
capitatum, Linn. Sp. Pl. 207.—Afr. austr.
capitellatum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 7.—Afr. austr.
capituliflorum, Sond. in Flora, xl. (1857) 363.—Afr. austr.
carinatum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 7.—Afr. austr.

THESIUM :—

carnosum, Wolfn. in Flora, xxxix. (1856) 561 = *alpinum*.
chinense, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii. 157 = *australe*.
ciliatum, R. Br. Prod. 353.—Afr. austr.
Colpoda, J. F. Gmel. Syst. 1636, sphalm. = seq.
Colpoon, Linn. f. Suppl. 161; Thunb. Prod. Pl. Cap. 46 = *Colpoon compressum*.
commutatum, Sond. in Flora, xl. (1857) 362.—Afr. austr.
comosum, Roth, Catalect. fasc. ii. 29 = *ebracteatum*.
compressum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 104.—As. Min.
confertum, Willd. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 659 = *ericacefolium*.
confine, Sond. in Flora, xl. (1857) 363.—Afr. austr.
corniculatum, Krauss, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 659 = *squarrosus*.
corniculatum, E. Mey. & Drège, ex A. DC. l. c. 662.—Afr. austr.
corymbiflorum, Sond. in Flora, xl. (1857) 354 = *pinifolium*.
corymbosulum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 112 = *Comandra umbellata*.
corymbuligerum, Sond. in Flora, xl. (1857) 362.—Afr. austr.
crassifolium, R. Br. Prod. 353.—Afr. austr.
crassifolium, Sond. in Flora, xl. (1857) 355.—Afr. austr.
cucullatum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 656 = *paniculatum*.
debile, R. Br. Prod. 353, nomen; Spreng. Syst. i. 830.—Afr. austr.
decumbens, Dollin. Enum. Pl. Austr. Infer. 113 = *humile*.
decumbens, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 549 = *pratense*.
decurrens, Blume, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 652 = *australe*.
densiflorum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 7.—Afr. austr.
diffusum, Andrzej. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 644.—Podol.
divaricatum, R. Grah. ex A. DC. l. c. 658 = *leptocaula*.
divaricatum, Fan, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 285.—Reg. Mediterr.
diversifolium, Sond. in Flora, xl. (1857) 359 = *spicatum*.
Dregeanum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 657.—Afr. austr.
Dregei, Sond. in Flora, xl. (1857) 356 = *gnidiaceum*.
drupaceum, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 68. t. 93 = *Leptomeria Billardieri*.
ebracteatum, Hayne, in Schrad. Journ. iii. ii. (1800) 33. t. 7.—Europ.
Ecklonianum, Sond. in Flora, xl. (1857) 356.—Afr. austr.
eifaliense, Steud. Nom. ed. II. ii. 679.—Europ.
elatus, Sond. in Flora, xl. (1857) 355.—Afr. austr.
elegans, Rochel, Pl. Banat. Rar. 36. t. 4 = *Comandra elegans*.
erectiramosum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 655 = *quinqueflorum*.
ericacefolium, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 3.—Afr. austr.
ericoides, R. Br. Prod. 353.—Afr. austr.
euphorbioides, Labg. Desc. Pl. Cap. 74; Linn. Mant. ii. 214.—Afr. austr.
euphorbioides, Jacq. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 655 = *strictum*.
euphrasioides, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 8.—Afr. austr.
Exul, A. DC. in DC. Prod. xiv. 647.—Afr. austr.
flexuosum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 6.—Afr. austr.
foliosum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 656.—Afr. austr.
fragile, Link, ex A. DC. l. c. 660 = *crassifolium*, Sond.
fragile, Linn. f. Suppl. 162 = *Thesidium Thunbergii*.
fragile, Spreng. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 656 = *paniculatum*.
Frisea, Linn. Mant. ii. 213.—Afr. austr.
Frisea, Sond. in Flora, xl. (1857) 359 = *debile*.
fulvipes, Griessel. l. c. xxii. (1839) 17 = *intermedium*.
funale, Herb. Vindob. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 667 = *T. Frisea*.
funale, Linn. Syst. ed. X. 944.—Afr. austr.

THESIUM:—

galioideus, *A. DC. Esp. Nouv. Thes.* (1857) 5.—Afr. austr.
gallicum, Schultz, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 679 = humifusum.
glaucum, Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 438 = divaricatum.
globosum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 4 = Thesidium globosum.
glomeruliflorum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 355.—Afr. austr.
gnidiaceum, *A. DC. Esp. Nouv. Thes.* (1857) 7.—Afr. austr.
gracum, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. v. 47 = Bergeri.
gracum, Zucc. in Abh. Akad. Muench. ii. (1831-36) 322 = humile.
griseum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 357.—Afr. austr.
heterophyllum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 254.—As. Min.
himalense, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 322, nomen; *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 88.—Reg. Himal.
hirtulum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 359 = pubescens.
hispidulum, *Lam. Illustr.* ii. 124.—Afr. austr.
hispidulum, Zeyb. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 659 = squarrosus.
Hockeanum, *Opiz. in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm.* ii. II. 41.—Europ.
hottentottum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 363 = euphrasioides.
humifusum, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 366.—Europ.
humifusum, Dollin. Enum. Pl. Austr. Infer. 113 = ramosum.
humifusum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 323 = divaricatum.
humifusum, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 295 = nevadense.
humile, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 43.—Reg. Mediterr.
Hussenoti, Hussen. Chard. Manc. 114 = humifusum.
Hussenoti, Schultz, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 679.—Gallia.
Hutterianum, *Opiz. in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm.* ii. II. 46.—Europ.
imbricatum, Drège, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 662 = gnidiaceum.
imbricatum, Thunb. Diss. Thes. 6.—Afr. austr.
impressum, Steud. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 649.—As. Min.; Persia.
intermedium, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 187 = bavarum.
intermedium, Schrad. Spicil. Fl. Germ. 27.—Europ.; Reg. Caucas.
italicum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 644 = intermedium.
junceum, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 80.—Afr. austr.
junceum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 359 = flexuosum.
juncifolium, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 1.—Afr. austr.
Kotschyianum, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 86 = impressum.
Krebsii, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 1.—Afr. austr.
laevigatum, Hort. Kew. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 663 = capitatum.
laxiflorum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 152.—Rossia.
leptocaulum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 362, 404.—Afr. austr.
leptostachyum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 6 = Thesidium leptostachyum.
libanoticum, Ehrenb. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 648.—Syria.
linariae-folium, Gilib. Exercit. ii. 429 = intermedium.
lineare, Spreng. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 665 = capituliflorum.
lineatum, Linn. f. Suppl. 162.—Afr. austr.
lineatum, Willd. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 672 = Polygalae sp.?
linifolium, Schrank, Baier. Reise, 129; Baier. Fl. i. 506 = *T. Linophyllum*.
Linophyllum, DC. Fl. Fr. iii. 352 = pratense.
Linophyllum, Hayne, in Schrad. Journ. iii. (1800) 1. 28. t. 6 = bavarum.
Linophyllum, Linn. Sp. Pl. 207 = bavarum, intermedium, divaricatum.
Linophyllum, Pall. Reise, ii. 458 = refractum.
Linophyllum, Patrin, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 646 = longifolium.
Linophyllum, Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 10. t. 546 = intermedium.

VOL. II.

THESIUM:—

lobelioides, *A. DC. Esp. Nouv. Thes.* (1857) 8.—Afr. austr.
longifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 100; xxv. (1852) ii. 469.—Dahuria.
macranthum, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 401.—Mesopot.
macranthum, Presl, in Sommer. Topogr. xi. 26; ex Wolfner, in Flora, xxxix. (1856) 561 = rostratum.
macrocarpon, Michx. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 649 = impressum.
macrocarpum, E. Mey. ex A. DC. l. c. 635 = Osyridi-carpos natalensis.
macrostachyum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 6.—Afr. austr.
madagascariense, A. DC. in DC. Prod. xiv. 652.—Madag.
magalismontanum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 358.—Afr. austr.
maritimum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 40.—Reg. Casp.
microcarpum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 5 = Thesidium exocarpaeoides.
Micromeria, A. DC. l. c. 8.—Afr. austr.
micropogon, A. DC. l. c. 6.—Afr. austr.
monophyllum, Gilib. Exercit. ii. 428 = ebracteatum.
montanum, Ehrh. Beitr. v. 175, nomen = bavarum.
monticulum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 359 = ambly-stachyum.
multicaule, Fisch. & Mey. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 649 = Szowitsii.
multicaule, Hook. f. & Thoms. ex A. DC. l. c. 646 = pachyrhizum.
multicaule, Ledeb. Fl. Alt. i. 276.—Sibir. altaic.
multiflorum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 4 = squarrosus.
nanum, Patrin, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 648 = repens.
natalense, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 358 = macrostachyum.
nevadense, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 295.—Hispan.
nigromontanum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 361.—Afr. austr.
nilagiricum, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 15 = Wightianum.
pachyrhizum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 646.—Reg. Himal.
palatinum, Roth, Catalect. fasc. ii. 29 = ramosum.
pallidum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 2.—Afr. austr.
paniculatum, Linn. Mant. i. 51.—Afr. austr.
paniculatum, Portenschl. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 659 = ericaefolium.
paniculatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 45 = Thunbergianum.
Parnassi, A. DC. in DC. Prod. xiv. 643.—Ital.; Graec.
paronychioides, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 359 = junceum.
parvifolium, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 3.—Afr. austr.
patentiflorum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 357 = micropogon.
phylicoides, E. Mey. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 672 (Phyllicae sp.?).—Afr. austr.
phyllostachyum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 355.—Afr. austr.
pinifolium, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 2.—Afr. austr.
planifolium, A. DC. l. c. 5 = triflorum.
podocarpum, A. DC. l. c. = Thesidium Thunbergii.
pratense, Ehrh. Beitr. v. 175, nomen.—Europ.
pratense, Holand. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 679 = Hussenoti.
pratense, Ledeb. Fl. Ross. iii. 542 = ramosum.
pratense, Turcz. Fl. Baic. ii. 1. 79 = saxatile.
pratense, Vahl, in Fl. Dan. t. 1205 = ebracteatum.
procumbens, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 40.—Reg. Caucas.
psilotoides, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 48.—China.
pubescens, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 7.—Afr. austr.
pumilum, Patrin, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 648 = repens.
pyrenaicum, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 331 = pratense.

THESIUM:—

quinqueflorum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 354.—Afr. austr.
racemosum, Bernh. ex Krauss, l. c. xxviii. (1845) 79.—Afr. austr.
radicans, Hochst. l. c. xxiv. (1841) 1. Intell. 22, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 235.—Abyss.
radicans, Hohen. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 647 = Wightianum.
ramellosum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 362 = ericaefolium.
ramosum, Bess. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 644 = diffusum.
ramosum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 223 = Parnassi.
ramosum, Hayne, in Schrad. Journ. iii. (1800) 1. 30. t. 7.—Europ.; As. or.
ramosum, Ledeb. Fl. Alt. i. 275 = refractum.
ramosum, J. & C. Presl, Fl. Čech. 54 = intermedium.
rariflorum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 364.—Afr. austr.
recurvifolium, *Sond. l. c.* 356 = lobelioides.
refractum, Kar. & Kir. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 644 = ramosum.
refractum, Ledeb. Fl. Ross. iii. 539, partim = saxatile.
refractum, C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. viii. (1841) 340.—Sibir. altaic.
repens, Ledeb. Fl. Alt. i. 274.—Sibir. altaic.
rigidum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 354 = lineatum.
robustum, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 80 = strictum.
rostratum, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 287.—Europ.
rugulosum, Bunge, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 649 = australe.
rupestre, Ledeb. Fl. Alt. i. 277.—Sibir. altaic.
Rytischowii, Fisch. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 646 = longifolium.
saxatile, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 100.—Dahuria.
scabrum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 302; Berg. Desc. Pl. Cap. 73.—Afr. austr.
scandens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 226.—Afr. austr.
Schimperianum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 22, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 235.—Abyss.
sedifolium, A. DC. in DC. Prod. xiv. 660 = crassifolium.
selagineum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 3.—Afr. austr.
serratum, Kit. ex D. Dietr. Syn. Pl. i. 878.—Pannonia.
sessiliflorum, Sekera, ex Nym. Consp. 644 = alpinum.
Souardi, Schultz, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 680 = Hussenoti.
sparteum, R. Br. Prod. 353.—Afr. austr.
sparteum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 358 = macrostachyum.
spathulatum, Blume, Bijdr. 646 = Henslowia umbellata.
spathulatum, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 244 = Henslowia varians.
spicatum, Linn. Mant. ii. 214.—Afr. austr.
spicatum, Murr. Syst. ed. XV. 249 = funale.
spinosum, Jacq. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 660 = crassifolium, *Sond.*
spinosum, Linn. f. Suppl. 161.—Afr. austr.
spinosum, Portenschl. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 647 = T. Exul.
spinulosum, A. DC. l. c.—Afr. austr.
squarrosus, Linn. f. Suppl. 162.—Afr. austr.
stelleroideus, Faub. & Spach, Illustr. ii. 4. t. 104.—Cappadoc.
strictum, Berg. Desc. Pl. Cap. 73.—Afr. austr.
strictum, Dum. Fl. Belg. 16 = eifaliense.
strictum, Krauss, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 656 = paniculatum.
strigulosum, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 4 = Thesidium strigulosum.
subnudum, *Sond. in Flora*, xl. (1857) 360 = spicatum.
Szowitsii, A. DC. in DC. Prod. xiv. 649.—Armenia.
tauricum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1067.—As. Min.
tenuis, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 80.—Afr. austr.
tenuifolium, Saut. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 718 = alpinum.

THESIUM:-

- tenuissimum, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 19.—Afr. trop.
 teretifolium, R. Br. Prod. 353.—Afr. austr.
 Thunbergianum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 666.—Afr. austr.
 transgaripepinum, Sond. in Flora, xl. (1857) 356 = Zeyheri.
 transsilvanicum, Schur, Enum. Pl. Transs. 589 = intermedium.
 triflorum, Linn. f. Suppl. 162.—Afr. austr.
 Turczaninowii, Sond. in Flora, xl. (1857) 354.—Afr. austr.
 umbellatum, Linn. Sp. Pl. 208 = Comandra umbellata.
 umbrosum, Opiz, in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm. ii. 11. 45 = bavarum, &c.
 virens, E. Mey. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 653.—Afr. austr.
 virgatum, Lam. Illustr. ii. 123.—Afr. austr.
 virgatum, Sond. in Flora, xl. (1857) 361, 402 = juncifolium.
 Vlassovianum, Fisch. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 646 = longifolium vel Barninianum.
 Weickerianum, Opiz, in Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm. ii. 11. 41 = alpinum.
 Wightianum, Wall. Cat. n. 4037.—Ind. or.
 Zeyheri, A. DC. Esp. Nouv. Thes. (1857) 8.—Afr. austr.

THESPESIA, Soland. ex Correa, in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 290. t. 8. f. 2. *MALVACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 208.

- AZANZA, Alef. in Bot. Zeit. xix. (1861) 298.
 altissima, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 257.—Java.
 Banalo, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 382 = macrophylla.
 brasiliensis, Spreng. Syst. iii. 96.—Bras.
 campylosiphon, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 308.—Ins. Philipp.
 Danis, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1336.—Afr. trop.
 grandiflora, DC. Prod. i. 456 (sp. dub.).—Porto Rico.
 Lampas, Dalz. ex Dalz. & Gibbs. Bomb. Fl. 19 = macrophylla.
 macrophylla, Blume, Bijdr. 73.—As. et Afr. trop.; Ins. Malay.
 populnea, Soland. ex Correa, in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 290.—As. et Afr. trop.
 populneoides, Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl. v. 1861 = populnea.
 sublobata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 382 = macrophylla.
 tomentosa, Presl, Rel. Haenk. ii. 136.—Mexic.

THESPIDIUM, F. Muell. in Journ. Landsborough, Exped. App. (1862). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 292.

basiflorum, F. Muell. l. c.—Austral.

THESPIS, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 517.

- COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 285.
 divaricata, DC. l. c. 517.—Ind. or.; Burma.
 erecta, DC. Prod. v. 375 = divaricata.
 sinapifolia, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 517 = divaricata.

THEVENOTIA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 331.

- COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 466.
 persica, DC. Prod. vi. 551; et in Deless. Ic. Sel. iv. t. 72.—Persia.
 scabra, Boiss. Fl. Orient. iii. 455.—Persia.

THEVENOTIA, Linn. Gen. ed. I. 380 (1737) = **Genipa**, Tourn. (Rubiaceae).**THEVETIA**, Linn. Gen. ed. I. 50 = praec.**THEVETIA**, Linn. Gen. ed. I. 62 (1737). *APO-*

- CYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 699.
 Ahouai, A. DC. in DC. Prod. viii. 345.—Bras.
 Ahuai, Rafin. Sylva Tellur. 91 = praec.
 bicornuta, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 392.—Paraguay.
 calophylla, Miers, Apocyn. S. Am. 20.—Venezuela.
 cornuta, Miers, l. c., sphalm. = bicornuta.
 cuneifolia, A. DC. in DC. Prod. viii. 344.—Mexic.
 Humboldtii, Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1144, nomen.—Guian.
 linearis, Rafin. Sylva Tellur. 91; A. DC. in DC. Prod. viii. 354 = nereifolia.

THEVETIA:-

- nereifolia, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 680.—Am. trop.
 nitida, A. DC. in DC. Prod. viii. 344.—Mexic.
 ovata, A. DC. l. c.—Mexic.
 plumeriaefolia, Benth. Bot. Voy. Sulph. 124. t. 43.—Honduras.
 Yccotli, A. DC. in DC. Prod. viii. 343.—Mexic.

THEVETIA, Vell. Fl. Flum. 57; i. t. 151 (1825).

- Genus ignotum, an *RUTACEAE*?
 pinnata, Vell. ll. cc.—Bras.

THEYGA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 163 (1810) = **THIGA**, Molina = **Laurelia**, Juss. (Monim.).**THEYODIS**, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 364 (1847) = **Oldenlandia**, Linn. (Rubiaceae).

- octodon, A. Rich. l. c. 365 = O. hedyotoides.

THIBAUDIA, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. tt. 384-388, partim [1802]; et ex Jaume St. Hil. Expos. i. 362 (1805); H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 268 (1818). *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 571.

- CHUPALON, Adans. Fam. ii. 164 (1763), nomen prius.
 acuminata, Dun. in DC. Prod. vii. 565 (Quid?).—Peruv.
 acuminata, Hook. f. Bot. Mag. t. 5752 = Cavendishia acuminata.
 acuminata, Wall. Cat. n. 6297 = Corallobotrys acuminata.
 alata, Dun. in DC. Prod. vii. 562 (= *Proclesia alata*).—Peruv.
 alnifolia, Dun. l. c. 564 (= *Proclesia alnifolia*).—Venezuela.
 angustifolia, Hook. Ic. Pl. t. 110 = Eurygania angustifolia.
 ardisiaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 274 = Eurygania ardisiaefolia.
 auriculata, Griff. Notul. iv. 300; Ic. Pl. Asiat. t. 508 = Agapetes auriculata.
 bicolor, Ruiz & Pav. ex Dun. in DC. Prod. vii. 561 = Psammisia bicolor.
 bracteata, Benth. Pl. Hartw. 143 (= *Proclesia Hartwegiana*).—Ecuador.
 bracteata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 388 (= *Proclesia bracteata*).—Peruv.
 breviflora, Benth. Pl. Hartw. 224 = Psammisia breviflora.
 camelifolia, Griff. Notul. iv. 301; Ic. Pl. Asiat. t. 516 = Vaccinium Griffithianum.
 capitata, Benth. Pl. Hartw. 142 = Cavendishia nobilis.
 caulialata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 386 (= *Proclesia alata*).—Peruv.
 Cerander, Dun. in DC. Prod. vii. 565 (Quid?).—Hab.?
 cerandra, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = praec.
 cinnamomifolia, Willd. ex Walp. Ann. ii. 1087 = Cavendishia pubescens.
 coarctata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 385 = Psammisia bicolor.
 cordifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 271 (= *Proclesia cordifolia*).—N. Granat.
 coriacea, Blume, Bijdr. 860 = Vaccinium Korthalsii.
 coronaria, Hook. f. Bot. Mag. t. 5575 = Themistoclesia coronilla.
 corymbodendron, Ruiz & Pav. ex Dun. in DC. Prod. vii. 569 = Vaccinium corymbodendron.
 crassifolia, Benth. Pl. Hartw. 65 = Cavendishia crassifolia.
 crenulata, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 234.—Bolivia.
 cubensis, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 73.—Cuba.
 cuneifolia, Blume, Bijdr. 861 = Vaccinium cuneifolium.
 cyathifera, Benth. Pl. Hartw. 222 = Psammisia cyathifera.
 dependens, Benth. l. c. 220.—N. Granat.
 diphylla, Dun. in DC. Prod. vii. 562 (Quid?).—Peruv.
 elliptica, Blume, Bijdr. 859 = Vaccinium ellipticum.
 elliptica, Ruiz & Pav. Pl. Per. iv. t. 384 (= *Siphonandra elliptica*).—Peruv.
 emarginata, Ruiz & Pav. l. c.—Peruv.
 falcata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 269 = Psammisia falcata.

THIBAUDIA:-

- flava, Nutt. ex Hook. f. in Hook. Bot. Mag. sub t. 4910 = Pentapterygium flavum.
 floribunda, Blume, Bijdr. 859 = Vaccinium Teysmannii.
 floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 269.—N. Granat.
 formosa, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1088, nomen = Psammisia formosa.
 gaultherifolia, Griff. Notul. iv. 301; Ic. Pl. Asiat. t. 512 = Vaccinium gaultheriaefolium.
 glabra, Griff. ll. cc. 301; 514 = Agapetes glabra.
 glandulosa, Humb. & Bonpl. Rel. Hist. 602; ex DC. Prod. vii. 556 = Gaylussacia buxifolia.
 glandulosa, Willd. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 528 = Gaylussacia decipiens.
 grandiflora, Ruiz & Pav. ex Dun. in DC. Prod. vii. 553 = Ceratostema grandiflorum.
 guyanensis, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1087, nomen.—Guian.
 Hendersoni, Regel, Gartenfl. (1875) 258; et in Act. Hort. Petrop. iii. 11. (1875) 287.—Hab.?
 hirsuta, Ruiz & Pav. ex Dun. in DC. Prod. vii. 553 = Ceratostema cordifolium.
 hirtiflora, Benth. Pl. Hartw. 224.—N. Granat.
 Hookeri, Walp. Rep. vi. 412 = Cavendishia acuminata.
 Jessicae, Hook. f. Bot. Mag. t. 5547.—Venezuela?
 Jussiae, Hook. f. Bot. Mag. t. 5547.—Venezuela?
 Jussiae, Dun. in DC. Prod. vii. 565 (Quid?).—Peruv.
 latifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 143 = Vaccinium latifolium.
 laurifolia, Blume, Bijdr. 859 = Vaccinium laurifolium.
 laurifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. 11. (1842) 530.—Mexic.
 leucostoma, Benth. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 127 = Psammisia leucostoma.
 longifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 269 = Psammisia longifolia.
 loranthiflora, Wall. Cat. n. 754 = Agapetes loranthiflora.
 lucida, Blume, Bijdr. 860 = Vaccinium Rollisoni.
 macrantha, Hook. Bot. Mag. t. 4566 = Agapetes macrantha.
 macrocalyx, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 235.—Bolivia.
 macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 270 = Psammisia macrophylla.
 madagascariensis, Spreng. Syst. ii. 294 = Agapetes madagascariensis.
 Martii, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 173.—Bras.
 melastomoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 272 (= *Proclesia melastomoides*).—N. Granat.
 mellifera, G. Don, Gen. Syst. iii. 860, sphalm. = seq.
 melliflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 387 = Eurygania melliflora.
 mexicana, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. 11. (1842) 530 = Cavendishia acuminata.
 microphylla, Lindl. in Gard. Chron. (1848) 23.—Peruv.
 microphylla, Ruiz & Pav. ex Dun. in DC. Prod. vii. 576 = Vaccinium acuminatum.
 Moricandi, Dun. in DC. Prod. vii. 563 (Quid?).—Peruv.
 multiflora, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 27 = Eurygania ovata.
 myrtifolia, Griff. Notul. iv. 301; Ic. Pl. Asiat. t. 510 = Pentapterygium serpens.
 myrtoidea, Blume, Bijdr. 861 = Vaccinium myrtoidea.
 nitida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 271 = Psammisia nitida.
 nutans, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1087, nomen.—Guian.
 obliqua, Griff. Notul. iv. 301; Ic. Pl. Asiat. t. 515 = Agapetes setigera.
 oblongifolia, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 233.—Bolivia.
 ocanensis, Linden, Cat. n. 6 (1851) 4 (Quid?).—N. Granat.
 panurensis, Benth. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 125.—Peruv.
 penduliflora, Dun. in DC. Prod. vii. 562 = Psammisia penduliflora.
 phyllireaeifolia, Dun. l. c. 564 = Eurygania phyllireaeifolia.
 pichinchensis, Benth. Pl. Hartw. 223.—N. Granat.
 pubescens, Benth. l. c. 224 (= *Proclesia Pseudopubescens*).—N. Granat.
 pubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 273 = Cavendishia pubescens.

THIBAUDIA :—

- pulcherrima*, Wall. ex Hook. Bot. Mag. t. 4303 = *Agapetes variegata*.
punctata, Dun. in DC. Prod. vii. 564, in syn. = *punctatifolia*.
punctatifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 387.—Peruv.
Quereme, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 274. t. 256 = *Cavendishia Querema*.
retusa, Griff. Notul. iv. 300; Ic. Pl. Asiat. t. 509 = *Vaccinium retusum*.
revoluta, Griff. ll. cc. 301; 513 = *Vaccinium Dunalianum*.
rhodoroides, Lamb. ex Dun. in DC. Prod. vii. 554 = *Agapetes variegata*.
rosea, *Fungh. in Flora*, xxx. (1847) 524.—Java.
rupestris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 270 = *Psammisia rupestris*.
sarcantha, Hook. Bot. Mag. t. 5450 = *Psammisia sarcantha*?
scabriuscula, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 272 (= *Proclesia scabriuscula*).—Ecuador.
Schlimiana, Linden, Cat. n. 6 (1851) 4.—N. Granat.
secundiflora, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 5. t. 9 = *Orthaea secundiflora*.
septemnervia, Willd. ex Walp. Ann. ii. 1087 = *Cavendishia pubescens*.
serrata, Dun. in DC. Prod. vii. 563 (Quid?).—Peruv.
serrata, Wall. Cat. n. 6299 = *Vaccinium serratum*.
setigera, Wall. l. c. n. 752 = *Agapetes setigera*.
speciosa, Benth. Pl. Hartw. 141 = *Semiramisia speciosa*.
Sprengelii, Wall. Cat. n. 6298 = *Vaccinium Donianum*.
strobilifera, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 272 (= *Proclesia strobilifera*).—N. Granat.
tarapotana, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 126 = *Cavendishia tarapotana*.
tetragona, Linden, Cat. n. 6 (1851) 4.—N. Granat.
vaccinacea, Royle, Illustr. Bot. Himal. 256, sphalm. = *verticillata*.
variegata, Royle, l. c. 257 = *Agapetes setigera*.
variegata, Wall. Cat. n. 751 = *Agapetes variegata*.
varingiaefolia, Blume, Bijdr. 860 = *Vaccinium varingiaefolium*.
verticillata, Wall. Cat. n. 753 = *Agapetes setigera*.
virgata, Ruiz & Pav. ex DC. Prod. vii. 571 = *Vaccinium attenuatum*.
Vitis-idea, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58.—Pernv.

THICUANIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 47 (1836) = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).
moschata, Rafin. l. c. = *D. moschatum*.

THIEBAUTIA, Colla, in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 161. t. 4 = **Bletia**, Ruiz & Pav. (Orchid.).
nervosa, Colla, l. c. = *B. florida*.

THIELEDOXA, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 251 = **Alibertia**, A. Rich. (Rubiace.).
elliptica, Cham. l. c. 252.—Bras.
lanceolata, Cham. l. c. 253.—Bras.

THIERSIA, Baill. Adansonia, xii. (1879) 335. **RUBICEAE**.
insignis, Baill. l. c.; et Hist. Pl. vii. 486.—Guian.

THIGA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 297 (1810) = **Laurelia**, Juss. (Monim.).
chilensis, Molina, l. c. = *L. aromatica*.

THILACHIUM et **THILAKIUM**, Lour. Fl. Cochinch. 342 (1790) = **Thylachium**, Lour. (Cappar.).

THILCUM, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 146 (1810) = **Fuchsia**, Plum. (Onagr.).
tinctorium, Molina, l. c. = *F. macrostemma*.

THILLAEA, Sang. in Atti Acc. Pont. Lincei, Ser. I. v. (1852) 717, sphalm. = **Tillaea**, Linn. (Crassul.).

THILOA, Eichl. in Flora, xlix. (1866) 149 = **Combreum**, Linn.
glaucocarpa, Eichl. l. c. 151 = *C. glaucocarpum*.
gracilis, Eichl. l. c. 152 = *C. gracile*.
nitida, Eichl. l. c. = *C. nitidum*.
paraguariensis, Eichl. l. c. 151.—Bras.
stigmara, Eichl. l. c. 152 = *C. stigmarium*.

THIMUS, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 260 (1768) = **Thymus**, Tourn. (Labiata.).

THINOGETON, Benth. Bot. Voy. Sulph. 142 (1844) = **Cacabus**, Benth. (Solan.).
Hookeri, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 217.—Ins. Galapag.
Lobbianum, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. iv. (1849) 360.—N. Granat.
maritimum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 142 = *C. maritimum*.
Miersii, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. iv. (1849) 359.—Peruv.; N. Granat.

THINOUIA, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 368 = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).
compressa, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 282.—Bras.
mucronata, Radlk. l. c.—Bras.
myriantha, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 369 = *Thouinia myriantha*.
obliqua, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 282.—Peruv.
scandens, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 369 = *Thouinia scandens*.
ternata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 282 = *Banisteria trifoliata*.
ventricosa, Radlk. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 61.—Bras.

THIODIA, Benn. Pl. Jav. Rar. 192, in adnot. (1838) = **Laetia**, Linn. (Bixin.).
laetoides, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 25 = *Casearia icosandra*.
serrata, Endl. in Walp. Rep. i. 204.—Ind. occ.
serrata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 22 = *Casearia icosandra*.

THIOLLIERIA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 217 = **Randia**, Linn. (Rubiace.).
artensis, Montr. l. c.—N. Caled.

THISANTHA, Eckl. & Zeyh. Enum. 302 (1837) = **Crassula**, Dill.
decumbens, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. decumbens*.
glabra, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. glabra*.
glomerata, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. glomerata*.
patens, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. patens*.
scaberula, Kunze, ex Fenzl. Adv. [2]; in Ind. Sem. Hort. Vindob. (1851).—Hab.?
strigosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 302 = *C. glomerata*?
subulata, Hook. Ic. Pl. t. 590 = *Tillaea subulata*.

THISBE, Falc. in Lindl. Veg. Kingd. 183 (1847) = **Herminium**, Linn. (Orchid.).

THISMIA, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 221; et in Trans. Linn. Soc. xix. (1845) 341. t. 39. **BURMANNIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 459.
MYOSTOMA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxv. (1866) 474. t. 57.

OPHIOMERIS, Miers, l. c. xx. (1851) 373. t. 15.
TRIBRACHYS, Champ. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 325 (1864).

Aseroë, Becc. *Malesia*, i. (1878) 252.—Singapore.
Brunoniana, Duch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vii. (1842) 348 = *Brunonis*.
Brunoniana, Miers, in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) t. 15. f. 20 = *Gardneriana*.
Brunonis, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 221.—Burma.
clandestina, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 616.—Java.
Gardneriana, Hook. f. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 325.—Zeylan.
Neptunis, Becc. *Malesia*, i. (1878) 251.—Borneo.
Ophiuris, Becc. l. c. 252.—Borneo.

THIUM, Steud. Nom. ed. I. 833 (1821), sphalm. = **TIUM**, Medic. = **Astragalus**, Tourn. (Legumin.).

THLADIANTHA, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 103 (Enum. Pl. Chin. Bor. 29). **CUCURBITACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 825.
calcarata, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 126.—Ind. or.; Burma.
cordifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 424.—Java.
dubia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 103.—China.

THLADIANTHA :—

dubia, Hook. f. in Hook. Bot. Mag. t. 5469 = *calcarata*.
dubia, Naud. ex Griseb. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1877) 8 (Quid?).—Hab.?
Hookeri, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 631.—Reg. Himal.
monoeca, Griseb. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1877) 8.—Hab.?

THLAPSI, Linn. Syst. ed. I (1735), err. typ. = **Thlaspi**, Tourn. (Crucif.).

THLASIDIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 96 (1836) = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).
bidens, Rafin. l. c. 96 = *S. bidens*.

THLASPI, [Tourn.], Linn. Gen. ed. I. 193 (1737). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 91.
CARPOCERAS, Link, Handb. ii. 289 (1831).
MINAEA, Lojac. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. xiii. (1881) 305.
PACHYPHRAGMA, Reichb. Nom. 179 (1841).
PTEROLOBUM, Andr. ex DC. Syst. ii. 374 (1821).
PTEROTROPIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 337.
THLASPIDEA, Opiz, Seznam, 96 (1852).

affine, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. i. 327.—Europ. or.

africanum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17 = *Lepidium ruderae*.
alliaceum, [Habl.] Desc. Taur. 145 = *montanum*.
alliaceum, Linn. Sp. Pl. 641.—Europ.

alpestre, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 28. t. 1 = *perfoliatum*.

alpestre, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 116, 260 = *alpinum*.

alpestre, Linn. Sp. Pl. ed. II. 903.—Europ.

alpestre, Lucé, Fl. Osil. 223 = *montanum*.

alpestre, Vill. Fl. Delphin. 67 = *virgatum*.

alpinum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 25; ed. II. 23.—Europ.

alpinum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 280 = *affine*.

amarum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 26; ed. II. 25 = *Iberis amara*.

ambiguum, Jord. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 161.—Europ.

andicola, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 138.—Chili.

annuum, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 258 = *natolicum*.

apetalum, Poir. Encyc. vii. 547 = *Lepidium incisum*.

arabicum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 430 = *Aethionema cappadocicum*.

arabicum, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 167 = *Aethionema cristatum*.

arabicum, Vahl, Symb. Bot. ii. 76 = *Schouwia arabica*.

arenarium, Jord. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 162 = *alpestre*.

Arnaudiae, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 60 = *virgatum*.

arvense, Linn. Sp. Pl. 641.—Europ.; As. bor.

arvernense, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 61 = *alpestre*.

australe, Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 325 = *Notothlaspi australe*.

baicalense, DC. Syst. ii. 376 = *arvense*.

balcanum, Janka, in Termesz. Füzetek, vii. (1883) 126.—Balkan.

banaticum, Uechtritz, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 186.—Banat.

bellidifolium, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 505.—Macedon.

beugesiacum, Jord. Diagn. i. 267 = *alpestre*.

bispinosum, Hornem. Hort. Hafn. ii. 604 = *Lepidium spinosum*.

bonariense, Poir. Encyc. vii. 543 = *Lepidium bonariense*.

brachypetalum, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 5 = *virgatum*.

brevicaule, Boiss. ex Kotschy, Diagn. Ser. II. v. 40.—Syria.

brevistylum, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 27 = *rivale*.

brevistylum, Mutel, Fl. Fr. i. 99 = *Hutchinsia alpina*.

bulbosum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 280 = *bellidifolium*.

bulbosum, Sprun. in Boiss. Diagn. Ser. I. i. 74.—Graecia.

Bursa, Thunb. Fl. Jap. 259 = *seq.*

THLASPI:—

Bursa-pastoris, Linn. Sp. Pl. 647 = *Capsella Bursa-pastoris*.
Bursetta, Bergeret, ex DC. Syst. ii. 384 = praec.
Buxbaumii, Fisch. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 71 = *Aethionema cappadocicum*.
caerulescens, J. & C. Presl, Fl. Čech. 133 = alpestre.
calaminare, Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 307 = alpestre.
californicum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 365. — Calif.
campestre, Linn. Sp. Pl. 641 = *Lepidium campestre*.
Cardamines, Poir. Encyc. vii. 545 = *Lepidium Cardamines*.
cardiocarpum, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 176. — Reg. Himal.
carneum, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 257 = *Aethionema cristatum*.
cartilagineum, J. Mayer, in Abh. Boehm. Ges. (1786) 235. t. 7 = *Lepidium crassifolium*.
cataonicum, Reut. Cat. Gr. Genév. (1868) 4. — Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) Rev. Bibl. 53. — Tauria.
cepeaeifolium, Koch, in Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iv. 534. — Europ.
ceratocarpon, Murr. in Comm. Gotting. (1774) 26. t. I. — As. Min.; Sibir.
chalepense, Poir. Encyc. vii. 547 = *Lepidium chalepense*.
cochleariforme, DC. Syst. ii. 381 = alpestre.
cochleariforme, Eichw. Skizze, 178 = montanum.
cochlearinum, F. Muell. Pl. Vict. i. 51. — Austral.
cochlearioides, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 177. — Reg. Himal.
coerulescens, Steud. Nom. ed. II. ii. 681 = alpestre.
collinum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 99 = arvense.
commutatum, Rochel, Bot. Reise Banat, 83 = alpestre, montanum, praecox.
cordatum, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 382. t. 39 = *Aethionema cordatum*.
cornutum, [Clairv.] Man. Herb. 214 = *ceratocarpon*.
coronarum et *coronatum*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1132 = *Iberis umbellata*.
Corongianum, Czetz, ex Nym. Consp. 63 = dacicum.
coronopifolium, Bergeret, ex Steud. Nom. ed. I. 826, in syn. = *Teesdalia regularis*.
corsicum, Soleir. ex Mutel, Fl. Fr. i. 101 = *Lepidium hirtum*.
corymbosum, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 292 = *magellanicum*.
corymbosum, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 3 = *rotundifolium*?
cristatum, Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 434. — Europ.
cuneatum, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 434 = *Capsella Bursa-pastoris*.
cuneifolium, Griseb. ex Pantoš, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 268 = montanum.
dacicum, Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 61. — Europ. or.
densiflorum, Boiss. & Kotschy, ex Unger & Kotschy, Ins. Cyp. 328; Boiss. Fl. Orient. i. 328. — As. Min.; Syria.
divaricatum, Poir. Encyc. vii. 543 = *Lepidium divaricatum*.
drabaeflorum, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 14 = *natolicum*.
Drummondii, Benth. Fl. Austral. i. 88. — Austral.
elegans, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 82. — As. Min.
erraticum, Jord. Pugill. Pl. Nov. 12 = *perfoliatum*.
exile, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 670. — Chili.
Fendleri, A. Gray, Pl. Wright. ii. 14 = alpestre.
Fischerianum, Bess. ex DC. Syst. ii. 377 = *orbiculatum*.
formosum, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1132 = *Iberis umbellata*.
Gaudinianum, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 14 = alpestre.
geratocarpos, Scop. Delic. Insub. i. 10, err. typ. = *ceratocarpon*.
glastifolium, Poir. Encyc. vii. 538 = *Lepidium glastifolium*.
glaucophyllum, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 168. — Chili.
goesingense, Halács. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 173. — Europ.
gracile, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 670. — Chili.
graecum, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 30. — Pelop.
graminifolium, Poir. Encyc. vii. 546 = *Lepidium graminifolium*.

THLASPI:—

granatense, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. i. 40. — Hispan.
grandiflorum, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 41. t. 38 = *Capsella grandiflora*.
Griffithianum, Boiss. Fl. Orient. i. 329 = alpestre.
hastulatum, Stev. ex DC. Syst. ii. 388, in syn. — Reg. Casp.
Hausknechtii, Boiss. Fl. Orient. i. 330 (*Hausknechtii*). — Cataonia.
heterophyllum, Cav. ex DC. Syst. ii. 542 = *perfoliatum*.
heterophyllum, DC. Fl. Fr. iv. 712 = *Lepidium hirtum*.
hirsutum, Lam. Fl. Fr. ii. 465 = *Lepidium campestre*, *hirtum*.
hirtum, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1122 = *Lepidium campestre*.
hirtum, Linn. Sp. Pl. 641 = *Lepidium hirtum*.
Huetii, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 39. — Armenia.
improperum, Jord. Diagn. i. 250 = *perfoliatum*.
incanum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 55 = *Lepidium campestre*.
infestum, Salisb. Prod. 267 = *Capsella Bursa-pastoris*.
inornatum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 145 = *perfoliatum*.
Ionopsidium, Janka, in Termész. Füzetek, vii. (1883) 124 = *Cochlearia acaulis*.
Jankae, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xvii. (1867) 35 = praecox.
Kernerii, Huter, l. c. xxiv. (1874) 82. — Europ. centr.
Korongianum, Czetz, ex Nym. Syll. Suppl. 37 = dacicum.
Kotschyianum, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 39. — Persia.
Kovátsii, Heuff. in Flora, xxxvi. (1853) 624. — Banat.
latifolium, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. ii. 99. — Reg. Cauc.
latifolium, Opiz, Natural. n. x. (1825) 253 = arvense.
Lereschii, Reut. in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1853-54) 17 = alpestre.
lilacinum, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 41. — As. Min.
longiracemosum, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 22 = *Kovátsii*.
lotharingum, Jord. Diagn. i. 268 = montanum.
lutescens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 54 = arvense.
luteum, Bivona, Cent. Pl. Sic. i. 78 = *Bivonaea lutea*.
macrophyllum, Hoffm. in Comm. Soc. Phys. Med. Mosq. i. (1805) 7. — Reg. Cauc.
magellanicum, Pers. Syn. ii. 189. — Reg. Magellan.
marginatum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 90 = *Aethionema ovalifolium*.
martiale, Jord. Diagn. i. 251 = *perfoliatum*.
micranthum, Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II. v. 41 = *perfoliatum*.
microphyllum, Boiss. & Orph. l. c. vi. 19. — Graecia.
microstylum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 38. — Syria.
minimum, Ard. Animad. Alt. 33 = alpinum.
montanum, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 41 = graecum.
montanum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 246; ed. II. 282 = alpestre.
montanum, Linn. Sp. Pl. 647. — Europ.
montanum, Poir. Encyc. vii. 536 = *Lepidium campestre*.
multifidum, Poir. l. c. 545 = *Lepidium bonariense*.
Mureti, Greml. Beitr. Fl. Schweiz, 60. — Helvet.
Nasturtium, Bergeret, ex Steud. Nom. ed. I. 473, in syn. = *Lepidium sativum*.
natolicum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 180. — As. Min.; Syria.
neglectum, Crépin, in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xiv. (1862) 87 = *perfoliatum*.
nemorolum, Jord. Diagn. i. 257 = virgatum.
nemorosum, Adam, in Hoffm. Hort. Mosq. (1808) n. 3249; ex DC. Prod. i. 176 = arvense.
nevadense, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 11. — Hispan.
nudicaule, DC. Fl. Fr. iv. 708 = *Teesdalia nudicaulis*, *regularis*.
obtusatum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 376 = *perfoliatum*.
occitanicum, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 12 = alpestre.
ochranthum, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 88. — Austral.
ochroleucum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 39. — Graec.; As. Min.
oleraceum, Poir. Encyc. vii. 547 = *Lepidium oleraceum*.

THLASPI:—

oppositifolium, Poir. Encyc. Suppl. v. 277 = *Aethionema oppositifolium*.
orbiculatum, Stev. ex DC. Syst. ii. 377. — Reg. Cauc.
orientale, Willd. ex DC. l. c. 562 = *Aethionema cappadocicum*.
oxyceras, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 37, in syn. — Syria.
papillosum, Boiss. Fl. Orient. i. 330. — As. Min.
Pastoraea, Janka, in Termész. Füzetek, vii. (1883) 124 = *Bivonaea praecox*.
peregrinum, Linn. Sp. Pl. 645 = *Aethionema saxatile*.
peregrinum, Poir. Encyc. vii. 541 = *Aethionema cristatum*.
perfoliatum, Linn. Sp. Pl. 641. — Europ.; As. bor.
pinnatifidum, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 19 = *Lepidium bonariense*.
pinnatum, Noulet, Fl. Sous-Pyr. 61 = *Iberis pinnata*.
piscidium, Poir. Encyc. vii. 546 = *Lepidium piscidium*.
platycarpum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vii. 57. — Natolia.
Pollichii, Poir. Encyc. vii. 547 = *Lepidium graminifolium*.
polymorphum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 56 = *Capsella Bursa-pastoris*.
posteriflorum, Jord. Diagn. i. 250 = *perfoliatum*.
praecox, Schleich. ex DC. Syst. ii. 380 = alpestre.
praecox, Unger, ex Nym. Consp. 63 = rivale.
praecox, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 124. — Austria.
procumbens, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 366 = *Capsella procumbens*.
Prolongi, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 53. t. 14 A. — Hispan.
Psychine, Willd. Sp. Pl. iii. 443 = *Psychine stylosa*.
pubescens, Guss. in Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825); ex ej. Fl. Sic. Syn. ii. 154 = *Lepidium nebrodense*.
pumilum, Ledeb. Fl. Ross. i. 164. — Reg. Cauc.
pygmaeum, Jord. Diagn. i. 252 = rivale.
Reuellierii, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 60 = *perfoliatum*.
rhaeticum, Jord. l. c. 259 = alpestre.
rivale, Presl, Delic. Prag. 12. — Graec.; Ital.
rosulare, Boiss. & Balansa, Diagn. Ser. II. v. 39. — Cappadoc.
Rothianum, Steud. Nom. ed. II. ii. 681 = *Aethionema cappadocicum*.
rotundifolium, Gaud. Fl. Helv. iv. 218. — Europ.
rotundifolium, Tineo, Pl. Rar. Sic. 46 = *perfoliatum*.
rubellum, Loret & Barr. Fl. Montp. i. 60 = *Capsella rubella*.
rudemale, All. Fl. Pedem. i. 250 = *Lepidium rudemale*.
Salisii, Brugg. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. ix. (1860) 45 = alpestre.
salticolum, Jord. Diagn. i. 255 = virgatum.
samolifolium, DC. Syst. ii. 382; (Sp. fict. — Cf. Boiss. Fl. Orient. i. 330).
sativum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 21; ed. II. 22 = *Lepidium sativum*.
saxatile, [Habl.] Desc. Taur. 157 = *Iberis taurica*.
saxatile, Linn. Sp. Pl. 646 = *Aethionema saxatile*.
scapiflorum, Viv. Prod. Fl. Cors. App. 3 = *Lepidium humifusum*.
Schrankii, J. F. Gmel. Syst. 974 = *Capsella Bursa-pastoris*.
spathulatum, Gater. Desc. Pl. Montaub. 115 = montanum.
spinosum, Poir. Encyc. vii. 545 = *Lepidium spinosum*.
stenocarpum, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 38, in syn. — Persia.
stenopterum, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. viii. 40 = alpestre.
strictum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 27. — Persia.
stylosum, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 3. t. 6 = *Nocca stylosa*.
subulatum, Cav. Desc. 414 = *Lepidium subulatum*.
suecicum, Jord. Diagn. i. 254 = alpestre.
suffruticosum, Asso, ex Losc. & Pard. Ser. Inconf. ed. II. 38 = alpestre?
sylvestre, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 9 = alpestre.
sylvium, Gaud. Fl. Helv. iv. 221 = alpinum.
Szowitsianum, Boiss. Fl. Orient. i. 324. — Afghan.
tasmanicum, Hook. f. Fl. Tasman. i. 23. — Tasman.
taygeteum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 40 = graecum.
telephifolium, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 780 = *Aethionema saxatile*.

THLASPI :—

tenuifolium, Lam. Fl. Fr. ii. 467 = *Lepidium ruderales*.
Tineum, Huet, ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 333 = *perfoliatum*.
Tinei, Nym. Syll. 205 = *perfoliatum*.
tuberosum, Nutt. Gen. Am. ii. 65 = *Cardamine rhomboidea*?
umbellatum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 26; ed. II. 25 = *Iberis umbellata*.
umbellatum, Stev. ex DC. Syst. ii. 377.—Reg. Casp.
Verloti, Jord. Diagn. i. 256 = *virgatum*.
Villarsianum, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1847) 26 = *montanum*.
violascens, Schott & Kotschy, ex Unger & Kotschy, Ins. Cyp. 328; Boiss. Fl. Orient. i. 328.—As. Min.; Syria; Ins. Cyprus.
virens, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 17 = *alpestre*.
virgatum, Gren. & Godr. Prosp. 8 (1846); ex eor. Fl. Fr. i. 144.—Mont. Pyren.
virginianum, Poir. Encyc. vii. 544 = *Lepidium virginicum*.
virginicum, Cav. Desc. 413 = *Lepidium virginicum*.
vogesiaceum, Jord. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 159 = *alpestre*.
vulcanorum, Lamotte, Notes Pl. Nouv. 24.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 93 = *virgatum*.
vulgatum, Roucell, Fl. Nord. Fr. ii. 69 = *Lepidium campestre*.

THLASPIDEA, Opiz, Seznam, 96 (1852) = **Thlaspi**, Tourn. (Crucif.).
arvensis, Opiz, l. c. = *Thlaspi arvense*.

THLASPIDIUM, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 556 (1838) = **Lepidium**, Linn. (Crucif.).
sativum, Spach, l. c. 557 = *L. sativum*.

THLASPIDIUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 422 (1763) = **Biscutella**, Linn. (Crucif.).
hieracifolium, Medic. Pflanzeng. i. 29 = *B. didyma*.
laevigatum, Medic. l. c. 30; et in Usteri, Ann. Bot. viii. (1794) 38 = *B. laevigata*.
saccatum, Moench, Meth. 218 = *B. auriculata*.
semperflorens, Andr. ex DC. Syst. ii. 744 (Index), sphalm. = seq.
sempervirens, Andr. ex DC. l. c. 394 = *Iberis semperflorens*.

THLASPIUS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 109 = **Thlaspi**, Tourn. (Crucif.).

THLIPSOCARPUS, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 695 = **Hyoseris**, Linn. (Compos.).
baeticus, Kunze, l. c. = *H. radiata*.

THOA, Aubl. Pl. Gui. ii. 874. t. 336 (1775) = **Gnetum**, Linn.
edulis, Willd. Sp. Pl. iv. 477 = *G. scandens*.
nigra, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 545 = *G. nigrum*.
pendula, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 514 = *G. scandens*.
urens, Aubl. Pl. Gui. ii. 874 = *G. nrens*.
urens, Poepp. ex Parl. in DC. Prod. xvi. ii. 351 = *G. amazonicum*.

THOMASIA, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 450. tt. 21, 22. **STERCULIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 227.
ASTEROCHITON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 138.
LEUCOTHAMNUS, Lindl. Swan River App. 19 (1839).
RHYNCHOSTEMON, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 333 (1847).
aemula, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 233 = *glutinosa*.
angustifolia, Steud. l. c. 232.—Austral.
brachystachys, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 143.—Austral.
canescens, Lindl. Swan River App. 18 = *glutinosa*.
cognata, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 232.—Austral.
cynopotamica, Steud. l. c. 231 = *grandiflora*.
diffusa, G. Don, Gen. Syst. i. 527 = *foliosa*?
discolor, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 233.—Austral.
dumosa, Hort. ex Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 356 = *Rulingia parviflora*.
foliosa, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 454. t. 22.—Austral.
Gilbertiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 10 = *triphyllo*?
glabrata, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 234 = *triphyllo*.

THOMASIA :—

glutinosa, Lindl. Swan River App. 18.—Austral.
grandiflora, Lindl. l. c.—Austral.
hypoleuca, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 234 = *quercifolia*.
involuta, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 143 = *Lysiosepalum Barryanum*.
lasioptaloidea, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 233 = *glutinosa*.
laxiflora, Benth. Fl. Austral. i. 256.—Austral.
lucida, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 231 = *grandiflora*.
macrocalyx, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 633 = *petalocalyx*.
macrocalyx, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 230.—Austral.
macrocalyx, Hueg. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 32.—Austral.
montana, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 230.—Austral.
paniculata, Lindl. Swan River App. 18 = *pauciflora*.
pauciflora, Lindl. l. c.—Austral.
petalocalyx, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 35.—Austral.
pogonanthera, F. Muell. Fragm. ii. 7 = *Guichenotia micrantha*.
prostrata, Hort. ex Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 356 = *Rulingia parviflora*.
pumila, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 233 = *Guichenotia Sarotes*.
purpurea, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 452. t. 21.—Austral.
pygmaea, Benth. Fl. Austral. i. 257.—Austral.
quercifolia, Bauer, ex Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 326 = *discolor*.
quercifolia, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 459. t. 21.—Austral.
rhynchocarpa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 142.—Austral.
rugosa, Turcz. l. c. xix. (1846) ii. 501.—Austral.
rulingioides, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 232.—Austral.
rupestris, Steud. l. c. 231 = *purpurea*.
salvifolia, Hook. ex Steetz, in Lehm. l. c. ii. 333 = *Rulingia salvifolia*.
Sarotes, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 145.—Austral.
solanacea, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 456. t. 21.—Austral.
stelligera, Benth. Fl. Austral. i. 256.—Austral.
stipulacea, Hook. Bot. Mag. t. 4111 = *macrocarpa*.
stipulacea, Lindl. Swan River App. 18 = *triphyllo*.
subhastata, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 232 = *pauciflora*.
tennivistita, F. Muell. Fragm. ii. 7.—Austral.
triflora, Walp. Ann. i. 1117 (Index), sphalm. = seq.
triloba, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xix. (1846) ii. 500.—Austral.
triphyllo, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 458.—Austral.
undulata, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 320 = *purpurea*.
viridis, Steud. in Lehm. l. c. i. 234 = *foliosa*.

THOMMASINIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 681 (1841), sphalm. = **TOMMASINIA**, Bertol. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).

THOMPSONIA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1820) 221 = **Deidamia**, Thou. (Passifl.).
Browniana, M. Roem. Syn. Pepon. 138 = *D. Thompsoniana*.

THOMPSONIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 682 (1841), sphalm. = seq.

THOMSONIA, Wall. Pl. As. Rar. i. 83. t. 99 (1830).
AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 971.
ALLOPHYTHION, Schott, Gen. Aroid. t. 24 (1832).
PYTHONIUM, Schott, Melet. i. 17 (1832).
Hookeri, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 307 = *napalensis*.
napalensis, Wall. Pl. As. Rar. i. 83. t. 99.—Ind. bor. occ.

THONNINGIA, Vahl, in Dansk. Selsk. Skrivt. vi. (1810) 124. t. 6. **BALANOPHOREAE**, Benth. & Hook. f. iii. 236.
CEPHALOPHYTON, Hook. f. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 250.
CONOPHYTA, Schum. ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1856) 42.
HAEMATOSTROBUS, Endl. Gen. 76, in Adnot. (1836).

THONNINGIA :—

janeirensis, Liebm. in Forhandl. Skand. Naturf. Christ. (1847) 180 = *Langsdorffia hypogaea*.
mexicana, Liebm. l. c. = *Langsdorffia hypogaea*.
sanguinea, Vahl, in Dansk. Selsk. Skrivt. vi. (1810) 125. t. 6.—Afr. trop.

THORA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325 = **Ranunculus**, Tourn.
venefica, Fourr. l. c. = *R. Thora*.

THORACOSPERMA, Klotzsch, in Linnaea, ix. (1834) 350; et xii. (1838) 229 = **Simoecheilus**, Klotzsch (Ericac.).
paniculata, Klotzsch, ll. cc. = *S. obovatus*.

THORACOSTACHYS, Kurz, in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 224 = seq.

THORACOSTACHYUM, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxviii. (1869) ii. 75. **CYPERACEAE** [Benth. & Hook. f. iii. 1055].
bancanum, Kurz, l. c. = *Malaya*.
sumatranum, Kurz, l. c. = *Malaya*.

THORELIA, Hance, in Journ. Bot. xv. (1877) 268. **LYTHRARIÆ**.
deglupta, Hance, l. c. 269.—Cochinch.

THORNTONIA, Reichb. Consp. 202 (1828) = **Favonia**, Cav. (Malvac.).

THORVALDSENIA, Liebm. in Lindbl. Bot. Notiser (1844), 103. **ORCHIDEAE**.
speciosa, Liebm. l. c. = *Mexic.*

THORWALDSENIA, Bot. Zeit. iv. (1846) 396 = *præc.*

THOTTEA, Rottb. in Nye Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. ii. (1783) 529. t. 2. **ARISTOLOCHIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 123.
LOBBIA, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1844) 144. t. 3.
dependens, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 589.—*Malaya*.
grandiflora, Rottb. in Nye Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. ii. (1783) 529. t. 2.—*Malaya*.
macrophylla, Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. ii. (1870) 5.—*Borneo*.
rhizantha, Becc. l. c. 6.—*Borneo*.

THOUAREA, Kunth, Enum. Pl. i. 173 (1833) = **Thuarea**, Pers. (Gramin.).

THOUARSIA, Vent. ex DC. Prod. v. 318 (1836) = **Psiadia**, Jacq. (Compos.).

THOUINIA, Linn. f. Suppl. 9, 89 (1781) = **Linociera**, Sw. (Oleac.).
flavicans, Steud. Nom. ed. I. 834, sphalm. = seq.
flavida, Soyer-Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1796) 2 = *Noronhia emarginata*.
ligustrina, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 14 = *L. ligustrina*.
nutans, Linn. f. Suppl. 89 = *L. purpurea*.

THOUINIA, Poit. in Ann. Mns. Par. iii. (1804) 70. tt. 6, 7. **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 400.
CARPIDOPTERIX, Karst. Fl. Columb. ii. 45. t. 123 (1860?).
THINOUIA, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 368.
THOUINIDIUM, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. viii. (1878) 267, 281.
THYANA, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 36 (1825).
VARGASIA, Bert. ex Spreng. Syst. ii. 283 (1825).
adenophora, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 224 = *Dodonaea adenophora*.
australis, A. Rich. Sert. Astrolab. ii. 31. t. 12 = *Atalaya salicifolia*.
canescens, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 281.—*Cuba*.
decandra, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 198. t. 56.—*Mexic.*
dicarpa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 587.—*Afr. trop.*

THOUINIA :—

- dioica*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 21. t. 4 = *Schmidelia heterophylla*.
discolor, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 127.—Ins. Baham.
elliptica, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 280.—Cuba.
hemiglaucula, F. Muell. *Fragm.* i. 98 = *Atalaya hemiglaucula*.
integrifolia, Spreng. *Neue Entdeck.* ii. 155.—Bras.
macroptera, Casar. *Nov. Stirp. Bras. Dec.* 45.—Am. trop.
mauritiana, Boj. *Hort. Maurit.* 56 = *Homea mauritiana*.
Morisiana, Casar. *Nov. Stirp. Bras. Dec.* 75 = *Pausandra Morisiana*.
myriantha, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 628.—N. Granat.
nervosa, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1860) 169.—Cuba.
ornifolia, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 82.—Reg. Argent.
patentinervis, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 280.—Cuba.
pinnata, Turpin, in *Ann. Mus. Par. v.* (1804) 401. t. 26.—Ins. S. Doming.
polygama, G. F. W. Mey. *Prim. Fl. Esseq.* 156.—Guian.
pulverulenta, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 46.—Cuba.
punctata, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 281.—Cuba.
rotundata, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 25.—Cuba.
scandens, Cambess. in *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 281.—Bras.
serrata, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 280.—Mexic.
simplicifolia, Poit. in *Ann. Mus. Par. iii.* (1804) 71. t. 6.—Ins. S. Doming.
tomentosa, DC. *Prod. i.* 612.—Ins. S. Doming.
trifoliata, Poit. in *Ann. Mus. Par. iii.* (1804) 72; v. (1804) 401, 402. t. 27.—Ins. S. Doming.
variifolia, F. Muell. *Fragm.* i. 45 = *Atalaya variifolia*.
villosa, [Moc. & Sesse], ex DC. *Prod. i.* 612.—Mexic.
weimmannifolia, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 81.—Am. austr.

THOUINIA, Sm. Ic. Ined. t. 7 (1789) = **Humbertia**, Lam. (Convolv.).
spectabilis, Sm. l. c. = *H. madagascariensis*.

THOUINIDIUM, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 267, 281 = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).
decandrum, Radlk. l. c. 284 = *Thouinia decandra*.
oblongum, Radlk. l. c.—Mexic.
pinnatum, Radlk. l. c. 283 = *Thouinia pinnata*.
pulverulentum, Radlk. l. c. 284 = *Thouinia pulverulenta*.

THOZETIA, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iv. 347 (1869). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 776.
racemosa, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iv. 347.—Austral.

THRASIA, Kunth, Syn. Pl. Aequin. i. 191 (1822), sphalm. = seq.

THRASYA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 120. t. 39 (1815) = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
cultrata, Nees, in Mart. *Fl. Bras.* ii. 95 = *P. monostachyum*.
hirsuta, Nees, l. c. 94 = *P. thrasyoides*.
paspaloides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 121. t. 39 = *P. Thrasya*.

THRAULOCOCCUS, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 246 = **Sapindus**, Tourn.
erectus, Radlk. l. c. 309 = *S. erectus*.
simplicifolius, Radlk. l. c. = *S. Thwaitesii*.

THRELKELDIA, R. Br. *Prod.* 409 (1810). **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 62.
OSTEOCARPUM, F. Muell. *Second Gen. Rep.* 15 (1854).
brevicuspis, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 198.—Austral.
diffusa, R. Br. *Prod.* 410.—Austral.

THRELKELDIA :—

- haloragoides*, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 198.—Austral.
proceriflora, F. Muell. *Fragm.* viii. 38.—Austral.
salsuginosa, F. Muell. l. c. vii. 12.—Austral.

THRICA, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 428 (1821)
THRINCIA, Roth = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

THRICHOSTEMA, Linn. *Coroll. Gen.* 10 (1737), sphalm. = **Trichostema**, Gronov. (Labiata.).

THRINAX, Linn. f. ex Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 57 (1788). **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 930.
POROTHRINAX, H. Wendl. ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 221 (1866).

argentea, Lodd. ex Desf. *Cat. Hort. Par. ed. III.* 31.—Panama.
aurantia, Fulch. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1301.—Hab. ?

aurata, Hort. ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 254 = *radiata*.
barbadensis, Lodd. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320.—Ins. Barbado.

brasiliensis, Mart. l. c. t. 104 = *Trithrinax brasiliensis*.
Chuco, Mart. l. c. 320 = *Acanthorhiza Chuco*.
crinita, Griseb. & H. Wendl. ex Kerch. *Palm.* 258.—Cuba.

elegans, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1301 = *radiata*.
excelsa, Lodd. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320 (Quid ?).—Guian.

ferruginea, Lodd. ex Mart. l. c. (Quid ?).—Jamaic.
Garberi, Chapm. in *Coult. Bot. Gaz.* iii. (1878) 12.—Florida.

gracilis, Hort. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1301 = *radiata*.
graminifolia, Hort. ex H. Wendl. *Cycl. Pand. Cycad.* 39; *Illustr. Hort.* xxxi. (1884) t. 542 = *multiflora*.

grandis, Hort. ex Kerch. *Palm.* 258 (Quid ?).—Cuba.

havanensis, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1870) 37.—Ind. occ.

maritima, Lodd. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320 (Quid ?).—Cuba.

Martii, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 221 = *parviflora*.
mexicana, Lodd. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320 (Quid ?).—Mexic.

Miraguana, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320.—Cuba.
montana, Lodd. ex Mart. l. c. (Quid ?).—Cuba.

multiflora, Mart. l. c. t. 103. f. 1; t. 163.—Ins. S. Doming.

parviflora, Maycock, *Fl. Barbado.* 146 = *barbadense*.
parviflora, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 57.—Jamaic.; Ins. S. Doming.

pumila, Fulch. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1301 = *T. Pumilio*.

Pumilio, Lodd. ex Schult. f. l. c.—Hab. ?

radiata, Lodd. ex Desf. *Cat. Hort. Par. ed. III.* 31.—Ins. Trinit.

rigida, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 221.—Cuba.

stellata, Lodd. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320 = *T. Miraguana*.

tunicata, Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) 32, nomen.—Cuba.

Yuraguana, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 278 = *T. Miraguana*.

THRINCIA, Roth, in Roem. *Arch.* i. 1. 36 (1796); *Catalect. fasc. i.* 97 (1797) = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

arenaria, Mart. *Fl. Tam.* 396 = *L. hirtus*.
caulescens, Trev. ex Spreng. *Syst. iv. Cur. Post.* 304 = *Picris radicata*.

glabra, Schleich. *Cat. Pl. Helvet. ed. III.* 29 = *L. hirtus*.

glabrata, Hoffm. & Link, *Fl. Port.* ii. 159.—Lusitan.

grumosa, Brot. *Fl. Lusit.* i. 325 = *L. tuberosus*.

hirta, Roth, *Catalect. fasc. i.* 98; DC. *Fl. Fr.* iv. 51 = *L. hirtus*.

hispida, DC. l. c. 52 = *L. hirtus*.

hispida, Roth, *Catalect. fasc. i.* 99 = *L. saxatilis*.
laevis, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 24 = *L. hirtus*.

leontodontoides, Wallr. in *Linnaea*, xiv. (1840) 662 (Beitr. *Fl. Hercyn.* 292).—Europ. centr.

Leyseri, Wallr. *Sched. Crit.* 441 = *L. hirtus*.
major, Peterm. in *Flora*, xxvii. (1844) 475 = *L. hirtus*.

THRINCIA :—

maroccana, Pers. *Syn.* ii. 368 = *Leontodon maroccanus*.
mauritanica, Spreng. *Syst.* iii. 666 = *L. saxatilis*, maroccanus.

Muelleri, Nym. *Syll.* 54 = *L. Salzmanni*.
nudicaulis, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 24 = *L. hirtus*.

nudicaulis, Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 28 = *L. saxatilis*.

orientalis, Nym. *Syll. Suppl.* 14 = *L. hispidulus*.
psilocalyx, Lag. ex Reichb. *l. c.* Pl. *Crit.* viii. 20. t. 749. f. 995. = *L. hirtus*.

psilostachya, Lag. ex Webb & Berth. *Phyt. Canar.* ii. 468 = *praece*.

pygmaea, Pers. *Syn.* ii. 369 = *L. saxatilis*.
Salzmanni, Nym. *Consp.* 470 = *L. Salzmanni*.

taraxacoides, Gaud. *Fl. Helv.* v. 49 = *L. saxatilis*.
tingitana, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov.* 68 = *L. tingitanus*.

tuberosa, DC. *Fl. Fr.* iv. 52 = *L. tuberosus*.

THRIXIA, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 495 (1867) = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

hirta, Dulac, l. c. 496 = *L. hirtus*.

THRIXSPERMUM, Lour. *Fl. Cochinch.* 519 (1790) = **Sarcochilus**, R. Br. (1810) (Orchid.).

acuminatissimum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 121 = *S. acuminatissimum*.

adversum, Reichb. f. l. c. 122 = *S. adversus*.
amplexicaule, Reichb. f. l. c. 121 = *S. amplexicaulis*.

anceps, Reichb. f. l. c. 122 = *S. anceps*.
angustifolium, Reichb. f. l. c. = *S. angustifolius*.

Arachnites, Reichb. f. l. c. 121 = *S. Arachnites*.
auriferum, Reichb. f. l. c. = *S. aurifer*.

australe, Reichb. f. Beitr. *Syst. Pfl.* 71 = *S. parviflorus*.

Berkeleyi, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1882) i. 557 = *S. Berkeleyi*.

Calceolus, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 122 = *S. Calceolus*.

Ceciliae, Reichb. f. Beitr. *Syst. Pfl.* 71 = *S. Ceciliae*.

Centipeda, Lour. *Fl. Cochinch.* 520.—Cochinch.

compressum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 121 = *S. compressum*.

croceum, Reichb. f. l. c. 122 = *S. croceus*.
dilatatum, Reichb. f. l. c. = *S. olivaceus*.

divitiflorum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) i. 750 = *S. divitiflorus*.

falcatum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 122 = *S. falcatus*.

Freemanii, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) i. 750 = *S. Freemanii* (in Addend.).

Godeffroyanum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 122.—Ins. Fiji.

gracilentum, Reichb. f. l. c. 121 = *S. gracilentus*.
Graeffei, Reichb. f. in *Seem. Fl. Vit.* 297.—Ins. Samoa.

Hartmanni, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) i. 716 = *S. Hartmanni*.

Hillii, Reichb. f. Beitr. *Syst. Pfl.* 71 = *S. Hillii*.

Hystrix, Reichb. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 145 = *S. Hystrix*.

japonicum, Reichb. f. in *Bot. Zeit.* xxxvi. (1878) 75 = *S. japonicum*.

leopardinum, Par. & Reichb. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 145.—Burma.

lilacinum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 121 = *S. lilacinus*.

luniferum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1868) 786.—Burma.

Moorei, Reichb. f. l. c. (1880) i. 104 = *S. Moorei* (in Addend.).

muriculatum, Reichb. f. l. c. (1881) ii. 198 = *S. muriculatus* (in Addend.).

obtusum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 121 = *S. obtusum*.

olivaceum, Reichb. f. l. c. 122 = *S. olivaceus*.
pallidum, Reichb. f. l. c. = *S. pallidus*.

parviflorum, Reichb. f. l. c. = *S. parviflorus*.
phyllorrhizum, Reichb. f. Beitr. *Syst. Pfl.* 71 = *S. phyllorrhizus*.

pictum, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 122 = *S. olivaceus*.
purpurascens, Reichb. f. l. c. 121 = *S. purpurascens*.

rhopalorrhachis, Reichb. f. l. c. = *S. rhopalorrhachis*.
serraeforme, Reichb. f. l. c. 121 = *S. Arachnites*.

Sillemianum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1882) i. 524 = *S. Sillemianus*.

spurius, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 122 = *S. spurius*.
subulatum, Reichb. f. l. c. = *S. subulatus*.

teres, Reichb. f. l. c. 121 = *S. teres*.

THRIXSPERMUM:—

- Teysmanni*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 121 = *Aërides* *Teysmanni*.
tridentatum, Reichb. f. l. c. 122 = *Cleisostoma* *tridentatum*.
unguiculatum, Reichb. f. l. c. = *Sarchochilus* *unguiculatus*.
usneoides, Reichb. f. l. c. 120 = *S. usneoides*.
Zollingeri, Reichb. f. l. c. 121 = *Aërides* *Zollingeri*.

- THRYALLIS, Linn. Sp. Pl. ed. II. 554 (1762) = *Galphimia*, Cav. (Malpig.).
brasiliensis, Linn. l. c. = *G. brasiliensis*.
macroptera, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 104 = *Dicella macroptera*.

- THRYALLIS, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 78. tt. 230, 231 (1829). *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 254.
brachystachis, Lindl. Bot. Reg. t. 1162.—Bras.
latifolia, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 79. t. 231.—Bras.
longifolia, Mart. l. c. 78. t. 230.—Bras.
rotundifolia, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 264.—Bras.

- THRYCOCEPHALUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 682 (1841) = seq.

- THRYOCEPHALON, Forst. Char. Gen. 129. t. 65 (1776) = *Kyllinga*, Rottb. (Cyper.).
nemorale, Forst. l. c. 130 = *K. monocephala*.

- THRYPTOMENE, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 192. *MYRTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 700.

- ASTRAEA*, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238.
BUCHERIA, Heynh. Nom. ii. 80 (1846).
EREMOPYXIS, Baill. Adansonia, ii. (1861–62) 328.
GOMPHOTIS, Rafin. Sylva Tellur. 103 (1838).
PARYPHANTHA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 235.
auriculata, F. Muell. Fragm. x. 24.—Austral.
australis, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 192.—Austral.
baeckeacea, F. Muell. Fragm. iv. 65.—Austral.
ciliata, F. Muell. in Woolls, Pl. Neighb. Sydney, 23.—Austral.
denticulata, Benth. Fl. Austral. iii. 60.—Austral.
Drummondii, F. Muell. Census, 53 = *Micromyrtus* *Drummondii*.
Elliottii, F. Muell. Fragm. ix. 62.—Austral.
elobata, F. Muell. l. c. iv. 63 = *Micromyrtus* *elobata*.
ericacea, F. Muell. l. c. i. 12.—Austral.
flaviflora, F. Muell. l. c. viii. 13.—Austral.
Homalocalyx, F. Muell. l. c. iv. 63 = *Homalocalyx* *ericaceus*.
hymenonema, F. Muell. l. c. x. 26.—Austral.
hyporhytis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) ii. 324.—Austral.
imbricata, F. Muell. Census, 53 = *Micromyrtus* *imbricata*.
Johnsonii, F. Muell. Fragm. iv. 77.—Austral.
leptocalyx, F. Muell. Census, 53 = *Micromyrtus* *imbricata*.
Maisonneuvii, F. Muell. Fragm. iv. 64.—Austral.
micrantha, Hook. f. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 299.—Tasman.
minutiflora, F. Muell. in Woolls, Pl. Neighb. Sydney, 23 = *Micromyrtus* *minutiflora*.
Miqueliana, F. Muell. Fragm. i. 11.—Austral.
Mitchelliana, F. Muell. l. c.—Austral.
mucronulata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 156.—Austral.
obovata, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 322.—Austral.
oligandra, F. Muell. Fragm. i. 11.—Austral.
plicata, F. Muell. l. c. iv. 63 = *Micromyrtus* *microphylla*.
polyandra, F. Muell. l. c. 77 = *Homalocalyx* *polyandrus*.
prolifera, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) ii. 324.—Austral.
racemosa, F. Muell. Census, 53 = *Micromyrtus* *racemosus*.
racemulosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 156.—Austral.
saxicola, Miq. Stirp. Nov. Holl. 20 = *Miqueliana*.

THRYPTOMENE:—

- saxicola*, Schau. in Lehm. Pl. Preiss. i. 102.—Austral.
stenocalyx, F. Muell. Fragm. x. 23.—Austral.
strongylophylla, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 61.—Austral.
tenella, Benth. l. c. 59.—Austral.
trachycalyx, F. Muell. Fragm. x. 25.—Austral.
urceolaris, F. Muell. l. c.—Austral.

- THUAREA, Pers. Syn. i. 110 (1805). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1109.
MICROTHUAREA, Thou. Gen. Nov. Madag. 3 (1806).

- ORNITHOCEPHALOCLOA*, Kurz, in Journ. Bot. xiii. (1875) 332. t. 171.
THUAREA, Kunth, Enum. Pl. i. 173 (1833).
involutocrata, Eschsch. in Mém. Acad. Pétersb. x. (1826) 291 = *sarmentosa*.
involuta, R. Br. Prod. 197 = *sarmentosa*.
latifolia, R. Br. l. c. = *sarmentosa*.
media, R. Br. l. c. = *sarmentosa*.
sarmentosa, Pers. Syn. i. 110.—Geront. trop.

- THUESSINKIA, Korth. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 41 (1855) = *Caryota*, Linn. (Palm.).
speciosa, Korth. l. c. = *C. mitis*.

- THUIA, Scop. Introd. 353 (1777) = *Thuya*, Linn. (Conif.).

- THUIACARPUS, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 428, (1880), sphalm. = seq.

- THUIAECARPUS, Trautv. Imag. Pl. Ross. 11. t. 6 (1844) = *Juniperus*, Tourn. (Conif.).
juniperinus, Trautv. l. c. (forma monstrosa) = *J. communis*.

- THUIOPSIS, Endl. Syn. Conif. 53 (1847) = *THUJOPSIS*, Sieb. & Zucc. = *Thuya*, Linn. (Conif.).

- THUJA, Linn. Hort. Cliff. 449 (1737) = *Thuya*, Linn. (Conif.).

- THUJOPSIS, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 32. tt. 119, 120 (1844) = *Thuya*, Linn. (Conif.).
borealis, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1854) 727; et ex Carr. Conif. ed. I. 113 = *Cupressus* *nootkatensis*.
cupressoides, Carr. in Jacques & Hérincq, Man. Pl. iv. 324 = *Cupressus* *nootkatensis*.
dolabrata, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 99 = *Thuya* *orientalis*.
dolabrata, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 34. tt. 119, 120 = *Thuya* *dolabrata*.
laetevirens, Lindl. in Gard. Chron. (1861) 56 = *Thuya* *dolabrata*.
Standishi, Gord. Pinet. Suppl. 100 = *Thuya* *japonica*.
Tchugatskoyae, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 113 = *Cupressus* *nootkatensis*.
Tschugatskoi, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 166 = *praec.*

- THUNBERGIA, Poit. in Rev. Hortic. Sér. II. iv. (1845–46) 409, sphalm. = *Thunbergia*, Retz. (Acanth.).

- THUMUNG, Koen. in Retz. Obs. iii. 62 (1783) = *Zingiber*, Adans. (Scitam.).

- THUNBERGIA, Montin, in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1773) 288. t. 11 = *Gardenia*, Ellis (Rubiace.).
capensis, Linn. f. Suppl. 162, in syn. = *G. Thunbergia*.

- THUNBERGIA, Retz. in Phys. Sällsk. Handl. i. (1776) 163. *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1072.

- ENDOMELAS*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 67 (1836).
HEXACENTRIS, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 78 (1832).
MEYENIA, Nees, l. c. (1832).
PLEIMERIS, Rafin. Sylva Tellur. 21 (1838).
PLEUREMIDIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 67 (1836).
SCHMIDIA, Wight, Ic. t. 1848 (1852).
adenocalyx, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1888) 431.—Afr. trop.
affinis, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 5.—Afr. trop.
alata, Boj. ex Sims, Bot. Mag. t. 2591; et ex Hook. Exot. Fl. t. 177.—Afr. trop.; Ind. or. (cult.).

THUNBERGIA:—

- albiflora*, Gord. in Gard. Chron. (1845) 169 = *alata*.
angolensis, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 195.—Afr. trop.
angulata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = *Sal-tiana*.
angulata, Hilsenb. & Boj. ex Hook. Exot. Fl. iii. t. 166; t. 177. ff. 1–5.—Madag.
angustifolia, Buch.-Ham. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 78 = *fragrans*.
annua, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 43, nomen; et ex Nees, in DC. Prod. xi. 55.—Afr. trop.
armipotens, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 195.—Afr. trop.
arnhemica, F. Muell. Fragm. ix. 73 = *fragrans*.
aspera, Nees, in DC. Prod. xi. 56.—Afr. austr.
atriplicifolia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 226, nomen; et ex Nees, l. c.—Afr. austr.
aurantiaca, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 269 = *alata*.
Backerii, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 919 = *alata*.
capensis, Retz. in Phys. Sällsk. Handb. i. (1776) 163.—Afr. austr.
cerinthoides, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1883) 434.—Afr. trop.
chrysops, Hook. Bot. Mag. t. 4119.—Afr. trop.
coccinea, Wall. Tent. Fl. Nap. i. 48. t. 37; R. Grah. in Edinb. Phil. Journ. xiv. (1826) 150.—Reg. Himal.; Burma.
coerulea, Wight, ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 78 = *Hawtayneana*.
convolvulifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 428.—Madag.
cordata, Colla, Hort. Ripul. 139. t. 21 = *fragrans*.
cordifolia, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 769 = *Hawtayneana*.
cordifolia, Nees, in DC. Prod. xi. 55 = *grandiflora*.
cyanea, Boj. ex Nees, l. c.—Madag.
Cycnium, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 194.—Afr. trop.
cynanchifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 475.—Afr. trop.
Diplocalymna, Steud. Nom. ed. II. ii. 683 = *Diplocalymna* *vulubile*.
Doddii, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) t. 221 = *alata*.
Dregeana, Presl, Bot. Bemerk. 94.—Afr. austr.
erecta, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 18.—Afr. trop.
erecta, Herb. Madr. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 78 = *Hawtayneana*.
fastuosa, Poit. in Rev. Hortic. Sér. II. iv. (1846) 409.—Mexic.
flava, Hoffm. Preisverz. (1841) 81.—Cf. Linnaea, xvi. (1842) Litt. 273 = *fragrans*.
fragrans, Drège, ex Presl, Bot. Bemerk. 94 = *Dregeana*.
fragrans, Roxb. Pl. Corom. i. 47. t. 67.—Ind. or.; Malaya; Austral.
fragrans, Wall. Cat. n. 767, partim = *tomentosa*.
frangulaefolia, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 329 = *hastata*.
Fryeri, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 876 = *alata*.
gentianoides, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1883) 433.—Afr. trop.
geraniifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 475.—Afr. trop.
grandiflora, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 34.—Ind. or.; Burma.
grandiflora, Wall. Cat. n. 768, partim = *laurifolia*.
Harrisii, Hook. f. Bot. Mag. t. 4998 = *laurifolia*.
hastata, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 388.—Ins. Timor.
Hawtayneana, Wall. Tent. Fl. Nap. 49, in obs.—Ind. or.
Hawtaynei, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 448 = *praec.*
heterophylla, Wall. Cat. n. 771 = *fragrans*.
hirsuta, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 20.—Abyss.
hirta, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 89 = *neglecta*.
hispidula, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 113.—Afr. trop.
huillensis, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 194.—Afr. trop.
humilis, Eckl. & Zeyh. ex Nees, in DC. Prod. xi. 55 = *capensis*.

THUNBERGIA :—

- hyalina, S. Moore, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 195.—Afr. trop.
- javanica, Gaertn. f. *Fruct.* iii. 22 = fragrans.
- Kirkiana, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 19.—Afr. trop.
- Kirkii, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 6677.—Afr. trop.
- laevis, Wall. & Nees, in *Wall. Pl. As. Rar.* iii. 77 = fragrans.
- lanceifolia, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 19.—Afr. trop.
- laurifolia, Lindl. in *Gard. Chron.* (1856) 260.—Malaya.
- leucantha, Hort. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 683 (Quid?).—Hab.?
- longiflora, F. Muell. *Fragm.* ix. 73, in obs. = fragrans.
- lutea, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 448.—Reg. Himal.
- malvifolia, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 768 = grandiflora.
- mysorensis, T. Anders. ex Bedd. in *Trans. Linn. Soc.* xxv. (1865) 222; et in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 448.—Ind. or.
- natalensis, Hook. *Bot. Mag.* t. 5082.—Afr. austr.
- neglecta, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 89.—Afr. austr.
- oblongifolia, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 125.—Afr. trop.
- pendula, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 147 = coccinea.
- platyphylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 217.—Madag.
- Powell, F. Muell. *Census*, 99.—Austral.
- quinquevallis, Buch.-Ham. ex Nees, in *Wall. Pl. As. Rar.* iii. 78 = coccinea.
- repens, Pers. *Syn.* ii. 179 = *Lepidagathis repens*.
- reticulata, Hochst. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 58.—Abyss.
- Roxburghia, Nees, in *Wall. Pl. As. Rar.* iii. 78 = fragrans.
- Saltiana, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 683.—Abyss.
- scandens, Pers. ex Nees, in *DC. Prod.* xi. 57 = fragrans.
- Schweinfurthii, S. Moore, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 6.—Afr. trop.
- smilacifolia, Kurz, *For. Fl. Brit. Burma*, ii. 241.—Burma.
- stolonifera, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 517 = *Herpestis Monnieria*.
- subsagittata, Blanco, l. c. 518 = fragrans.
- tomentosa, Wall. ex Nees, in *Wall. Pl. As. Rar.* iii. 78.—Ind. or.
- Vogeliana, Benth. in *Hook. Niger Fl.* 476.—Afr. trop.
- volubilis, Pers. *Syn.* ii. 179 = fragrans.
- Wightiana, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 448.—Ind. or.
- THUNIA, Reichb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 764 = *Phaius*, Lour. (*Orchid.*).
- alba, Reichb. f. l. c. = P. albus.
- Bensoniae, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5694 = P. albus.
- Marshalliana, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 65 = P. albus.
- pulchra, Reichb. f. in *Flora*, lv. (1872) 276 = P. albus.
- Veitchiana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1885) i. 818.
- THURARIA, Molina, *Sagg. Chile*, 159 (1782). Genus dubium *EBENACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 663.
- TURARIA, Spreng. *Syst.* ii. 260 (1825).
- chilensis, Molina, *Sagg. Chile*, 159.—Chili.
- THURARIA, [Nutt.] in *Fras. Cat.* (1813) n. 85 = *Grindelia*, Willd. (*Compos.*).
- herbacea, [Nutt.] l. c. = G. squarrosa.
- THURBERIA, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 58. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1118.
- GREENIA, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc.* v. (1837) 142.
- SCLERACHNE, Torr. ex Trin. in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. vi. (1845) 273.
- arkansana, Benth. ex Vasey, *Gr. U. St.* 16.—Am. bor. occ.
- pilosa, Vasey, l. c. = arkansana.
- THURBERIA, A. Gray, in *Mem. Am. Acad. N. S. v.* (1855) 308 = *Gossypium*, Linn. (*Malvac.*).
- thespesioides, A. Gray, l. c. = G. Thurberi.

THURNHAUSERA, Pohl, ex G. Don, *Gen. Syst.* iv. 201 (1837) = *Curtia*, Cham. & Schlecht. (*Gentian.*).

THURNHEYSSERA, Mart. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 185 (1856) = *Symmeria*, Benth. (*Polygon.*).

Tragopyrum, Mart. ex Meissn. l. c. 186 = *S. paniculata*.

THURNIA, Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* tt. 1407, 1408 (1883). *JUNCACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 869.

Jenmani, Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* t. 1408.—Guian.

sphaerocephala, Hook. f. l. c. t. 1407.—Guian.

THURYA, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser.* II. v. 63 (1856). *CARYOPHYLLAE*, Benth. & Hook. f. i. 978.

capitata, Boiss. & Bal. l. c. 64.—As. Min.

THUYA, Linn. *Syst. ed.* I (1735). *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 426.

BIOTA, D. Don, in *Lamb. Pin. ed.* II. ii. 129 (1828); *Endl. Syn. Conif.* 46 (1847).

CHAMAECYPARIS, Spach, *Hist. Vég. Phan.* xi. 329 (1842).

CHAMAEPUCE, Zucc. in *Endl. Ench.* 139 (1841).

PLATYCLADUS, Spach, *Hist. Vég. Phan.* xi. 333 (1842).

RETINISPORA, Sieb. & Zucc. *Fl. Jap.* ii. 36. tt. 121–123 (1842), partim.

THUJA, Linn. *Hort. Cliff.* 449 (1737).

THUJOPSIS, Sieb. & Zucc. *Fl. Jap.* ii. 32. tt. 119, 120 (1844).

acuta, Moench, *Meth.* 692 = orientalis.

andina, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 17. t. 220 = *Libocedrus chilensis*.

antarctica, Hort. ex Gord. *Pinet. Suppl.* 102 = orientalis.

aphylla, Burm. f. *Prod. Fl. Cap.* 27 = *Callitris cupressoides*.

aphylla, Linn. *Cent. Pl.* i. 32; *Amoen. Acad.* iv. 295 = *Tamarix articulata*.

argentea, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* I. 94 = orientalis.

articulata, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 96 = *Callitris quadrivalvis*.

asplenifolia, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 106 = plicata.

aurea, Hort. ex Carr. l. c. ed. I. 96 = orientalis.

australis, Bosc, ex Desf. *Tabl. ed.* II. 274, nomen; Poir. *Encyc. Suppl.* v. 302 = *Callitris rhomboidea*.

australis, Hort. ex Tenore, in *Mém. Acc. Sc. Borb. Nap.* iii. II. (1832) 35 = orientalis.

californica, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 106 = plicata.

californica, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. II. 177 = gigantea.

canadensis, Hort. ex C. Koch, l. c. 175 = occidentalis.

caucasica, Hort. ex Gord. *Pinet. Suppl.* 103 = occidentalis.

chilensis, D. Don, in *Lamb. Pin. ed.* 8vo. 128. n. 62; Hook. *Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 199 = *Libocedrus chilensis*.

compacta, Standish, ex Gord. *Pinet. Suppl.* 103 = occidentalis.

Craigana, A. Murr. *Oreg. Exp.* 2. [t. 5] = *Libocedrus decurrens*.

cristata, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 97 = orientalis.

cristata, Hort. ex Carr. l. c. 111 = occidentalis.

cuneata, Domb. ex Endl. *Syn. Conif.* 45 = *Libocedrus chilensis*.

cupressoides, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 97 = orientalis.

cupressoides, Linn. *Mant.* i. 125 = *Callitris cupressoides*.

curvamea, Miq. *Cat. Hort. Bot. Amst.* 21 = *Cupressus torulosa*.

decora, Salisb. *Prod.* 398 = orientalis.

Deorlesiana, Hort. Germ. ex Carr. *Conif. ed.* II. 141 = occidentalis.

dolabrata, Linn. f. *Suppl.* 420.—Japon.

Doniana, Hook. *Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 571 (*Libocedri* sp.).—N. Zel.

Douglasii, Nutt. ex Parl. in *DC. Prod.* xvi. II. 457 = gigantea.

dumosa, Gord. *Pinet. Suppl.* 102 = orientalis.

elegantissima, Hort. ex Gord. l. c. 17 = orientalis.

Ellwangeriana, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1869) 350 = occidentalis.

THUYA :—

ericoides, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 141 = orientalis? *ericoides*, Hort. ex Gord. *Pinet. Suppl.* 91 = occidentalis.

excelsa, Bong. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VI. ii. (1833) 164 = *Cupressus nootkatensis*.

expansa, Laws. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. II. 182 = orientalis.

falcata, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 96 = orientalis.

filiformis, Lodd. ex Lindl. *Bot. Reg.* (1842) t. 20 = orientalis.

flagelliformis, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 101 = orientalis.

flagelliformis, Hort. ex Gord. *Pinet.* 325 = plicata.

Fortunei, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 94 = orientalis.

freneloides, Hort. l. c. ed. I. 93 = orientalis.

funiculata, Hort. ex Gord. *Pinet. ed.* II. 52 = orientalis.

gigantea, Gord. *Pinet.* 321 = *Abies microphylla*.

gigantea, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 52.—Am. bor. occ.

gigantea, Parl. in *DC. Prod.* xvi. II. 457 = japonica.

glauca, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* I. 95 = orientalis.

gracilifolia, Knight, ex Parl. in *DC. Prod.* xvi. II. 459 = orientalis.

Howeyi, Hort. ex Gord. *Pinet. ed.* II. 405 = occidentalis.

hybrida, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 102 = orientalis.

inaequalis, Desf. *Tabl. ed.* II. 274 = *Callitris rhomboidea*.

intermedia, Hort. ex Gord. *Pinet. Suppl.* 18 = orientalis.

japonica, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* I. 94 = occidentalis.

japonica, Hort. ex Carr. l. c. ed. II. 141 = dolabrata.

japonica, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* x. (1866) 490.—Japon.

javanica, Burm. f. *Fl. Ind.* 202 (err. typ. 302) (Quid?).—Java.

lavandulaefolia, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 303 = *Taxodium heterophyllum*.

lineata, Poir. l. c. = *Taxodium heterophyllum*.

Lobbiana, Hort. ex Gord. *Pinet.* 323 = gigantea.

Lobbii, Hort. ex Gord. *Pinet.* 323 = praec.

meldensis, Quétier, in *Hérincoq, Hort.* Franç. v. (1855) 231 = orientalis.

Menziesii, Dougl. ex Endl. *Syn. Conif.* 52 = gigantea.

minor, Hort. Angl. ex Carr. *Conif. ed.* II. 110 = occidentalis.

minor, Paul, ex Gord. *Pinet. Suppl.* 102 = orientalis.

monstrosa, Hort. ex Gord. l. c. 18 = orientalis.

nana, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* I. 93; II. 110 = orientalis, occidentalis.

nepalensis, Lodd. ex G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 388; Hort. ex Carr. *Conif. ed.* I. 92 = orientalis.

obtusa, Mast. in *Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 491 = *Cupressus obtusa* (cf. *Addend.*).

obtusa, Moench, *Meth.* 691 = occidentalis.

occidentalis, Linn. *Sp. Pl.* 1002.—Am. bor.; Sibir.

odorata, Marsh. *Arbust. Am.* 152 = occidentalis.

orientalis, Linn. *Sp. Pl.* 1002.—China; Japon.

pendula, Lamb. *Pin. ed.* 8vo. 130. t. 67. n. 64; Sieb. & Zucc. *Fl. Jap.* ii. 30 = orientalis.

pendulata, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* I. 98 = praec.

pensilis, [Abel, in] Staunt. *Embassy*, 436 = *Taxodium heterophyllum*.

pisifera, Mast. in *Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 489 = *Cupressus pisifera* (cf. *Addend.*).

plicata, Donn, *Hort. Cantabr.* ed. VI. 249.—Am. bor.

plicata, Lamb. *Pin. ed.* 8vo. 127. n. 61, partim = gigantea.

procera, Salisb. *Prod.* 398 = occidentalis.

pygmaea, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 96 = orientalis.

pyramidalis, Tenore, in *Mem. Acc. Sc. Borb. Nap.* iii. II. (1832) 35. t. 2 = orientalis.

quadrangularis, Vent. in *Duham. Arb.* ed. Nov. iii. 16.—Madag.

semperaurescens, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. II. 183 = orientalis.

sibirica, Hort. ex Carr. *Conif. ed.* II. 106 = plicata.

sibirica, Hort. ex Gord. *Pinet. Suppl.* 104 = occidentalis.

sphaeroidalis, Rich. *Monog. Conif. et Cyc.* 45. t. 8. f. 2 = *Cupressus thuyoides* (cf. *Addend.*).

sphaeroidea, Spreng. *Syst.* iii. 889 = praec.

Standishii, Carr. *Conif. ed.* II. 108 = japonica.

THUYA :—

stricta, Hort. ex Gord. Pinet. Suppl. 17 = *orientalis*.
tatarica, Gord. Pinet. Suppl. 104 = *occidentalis*.
tatarica, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 388,
nomen = *orientalis*.
tetragona, Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 148 =
Libocedrus tetragona.
variegata, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 94 = *orientalis*.
variegata, Marsh. Arbust. Am. 152 = *occidentalis*.
Verschaffeltii, Hort. ex Parl. in DC. Prod. xvi. ii. 462
= *orientalis*.
Vervaeana, Van-Geert, ex Gord. Pinet. Suppl. 103
= *occidentalis*.
Wareana, Booth, Cat. (1838); ex Loud. Arb. Brit. iv.
2654 = *plicata*.
Wareana, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 104 = *occidentalis*.
Zuccarini, Hort. ex Carr. l. c. ed. II. 94 = *orientalis*.

THUYOPSIS, Parl. in DC. Prod. xvi. ii. 460 (1868) =
THUJOPSIS, Sieb. & Zucc. = **Thuya**, Linn. (Conif.).

THYANA, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 36 (1825) =
Thouinia, Poit. (Sapind.).

THYAREA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 196
= **Thuarua**, Pers. (Gramin.).

THYELLA, Rafin. Pl. Tellur. iv. 84 (1836) = **Con-**
volvulus, Tourn.
obtusiloba, Rafin. l. c. = *Ipomoea carnosa*.
tamnifolia, Rafin. l. c. = *Jacquemontia tamnifolia*.

THYIA, Aschers. Fl. Brandenb. i. 886 (1864) = **Thuya**,
Linn. (Conif.).

THYLACANTHA, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat.
Cur. xi. (1823) 45 = **Angelonia**, Humb. & Bonpl.
(Scrophul.).
campestris, Mart. l. c. = *A. salicariaefolia*.

THYLACANTHUS, Tul. in Arch. Mus. Par. iv.
(1844) 175. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i.
i. 564.
corymbosus, Baill. Hist. Pl. ii. 96 = *Dicymbe corym-*
bosa.
ferrugineus, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 176.—
Bras.

THYLACHIUM, Lour. Fl. Cochinch. 342 (1790)
[Thilachium, em. ab DC. Prod. i. 254 (1824)]. **CAP-**
PARIDEAE, Benth. & Hook. f. i. 107.
africanum, Lour. l. c. — Afr. or.
angustifolium, Boj. in Bouton, Rapp. Ann. Maur.
(1842) 49. — Madag.
Grandidieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885)
464. — Madag.
heterophyllum, Fuss. in Ann. Mus. Par. xii. (1808)
71. — Madag.
laburnoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884)
319. — Madag.
laurifolium, Baker, l. c. — Madag.
lucidum, DC. Prod. i. 254 = *Capparis lucida*.
oppositiflorum, DC. l. c. — Ind. occ.
ovalifolium, Juss. in Ann. Mus. Par. xii. (1808) 71 =
africanum.
ovatifolium, Steud. Nom. ed. II. ii. 683, sphalm. =
præc.
panduraeforme, Fuss. in Ann. Mus. Par. xii. (1808)
71. — Ins. Maurit.
querimbense, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.
163 = *africanum*.
Sumangui, Boj. Hort. Maur. 18; et ex Bouton, in
Rapp. Ann. Maur. (1842) 48. — Ins. Mascar.
verrucosum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.
164 = *africanum*.

THYLACITIS, Renealm. ex Adans. Fam. ii. 504, 539
(1763) = **Gentiana**, Tourn.
angustifolia, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.
xvii. (1869) 119 = *G. acaulis*.
Clusii, Fourn. l. c. = *G. acaulis*.
compressa, Rafin. Fl. Tellur. iii. 25 (Quid ?). — Hab. ?
grandiflora, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 26 = *G. acaulis*.
leptina, Rafin. Fl. Tellur. iii. 25 = *G. leptina*.
maritima, Rafin. l. c. = *Erythraea maritima* ?

THYLACIUM, Spreng. Anleit. ii. 776 (1818) =
Thylachium, Lour. (Cappar.).

VOL. II.

THYLACOSPERMUM, Fenzl, in Endl. Gen. 967
(1840). **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 151.

BRYOMORPHA, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat.
Mosc. (1842) 172.
FLOURENSIA, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. t. 29
(1844).
PERIANDRA, Cambess. l. c. 27 (1844).
rupifragum, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 53. — Soongar.;
Reg. Himal.

THYLACTITIS, Steud. Nom. ed. II. i. 671, in syn.
(1840), sphalm. = **THYLACITIS**, Renealm. = **Gen-**
tiana, Tourn.

THYLOCERAS, Steud. Nom. ed. II. ii. 721, in syn.
(1841), sphalm. = **Styloceras**, A. Juss. (Euphorb.).

THYLOGLOSSA, Nees, in DC. Prod. xi. 389 (1847),
sphalm. = **TYLOGLOSSA**, Hochst. = **Justicia**, Linn.
(Acanth.).

THYMBRA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 569 (1753). **LABIA-**
TAE, Benth. & Hook. f. ii. 1190.
ambigua, Clarke, Trav. iv. 239 = *spicata*.
capitata, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 127 = *Thymus*
capitatus.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 162 = *Macbridea*
pulchra.
cephalota, Desv. Opusc. 40 = *Thymus Cephalotes*.
ciliata, Desf. Fl. Atlant. ii. 10 = *Thymus ciliatus*.
ciliata, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. lxxix = *Thymus*
Serpyllum.
hirsuta, Pers. Syn. ii. 114 = *Satureia Thymbra*.
hirsutissima, Vent. ex Pers. l. c. = *præc.*
spicata, Linn. Sp. Pl. 569. — Graec.; As. Min.
spicata, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iv. 259 = *Zizi-*
phora taurica.
verticillata, Linn. Sp. Pl. 569 = *spicata*.
Zotas, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 328 =
Thymus ciliatus.

THYMELAEA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 285 (1763) =
Daphne, Tourn. (Thymel.).

THYMELAEA, Tourn. ex Scop. Fl. Carn. ed. II. ii.
275 (1772), partim; Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 65
(1847). **THYMELAEACEAE**, Benth. & Hook. f. i.
iii. 191.
CHLAMYDANTHUS, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math.
Acad. Pétersb. i. (1843) 355, 358.
GASTRILLA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836), partim.
LYGIA, Fasano, in Atti Acc. Nap. 1787 (1788) 245
(Ligia).
PAUSIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836).
PIPTOCHLAMYS, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math.
Acad. Pétersb. i. (1843) 356, 358.
alpina, All. Fl. Pedem. i. 132 = *Daphne alpina*.
argentea, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 65 = *T. Tartonraira*.
arvensis, Lam. Fl. Fr. iii. 218. — Reg. Medit.; As. or.
et bor.; Ind. bor. occ.
Ancheri, Meissn. in DC. Prod. xiv. 552. — As. Min.;
Persia.
Bauhini, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 66 = *T. Sanamunda*.
calycina, Meissn. in DC. Prod. xiv. 555. — Mont. Pyren.
candida, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 277 = *Daphne*
alpina.
canescens, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 65. — Marocc.;
Hispan.
cilicica, Meissn. in DC. Prod. xiv. 552. — Cilicia.
Cneorum, Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. t. 551 = *T. Sana-*
munda.
Cneorum, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 276 = *Daphne*
Cneorum.
coridifolia, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 66. — Hispan.
dioica, All. Auct. Fl. Pedem. 9. — Europ.
elliptica, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 66. — Hispan.
floribunda, Boiss. ex Casav. in Anal. Soc. Esp. Hist.
Nat. ix. (1880) 301 = *calycina*.
Gnidium, All. Fl. Pedem. i. 133 = *Daphne Gnidium*.
Gussoni, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, iv.
(1858) 121. — Sicil.
hirsuta, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 65 = *Passerina*
hirsuta.
Laureola, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 276 = *Daphne*
Laureola.
Mezereum, Scop. l. c. = *Daphne Mezereum*.
microphylla, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii.
(1856) 744; Meissn. in DC. Prod. xiv. 556. — Alger.

THYMELAEA :—

nitida, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 65. — Reg. Mediterr.
niyalis, Meissn. in DC. Prod. xiv. 555. — Mont. Pyren.
orientalis, Meissn. l. c. 557. — 'Oriens'; Hispan.
Passerina, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.
i. 298 = *arvensis*.
præcox, Gilib. Exercit. i. 7 = *Daphne Mezereum*.
pubescens, Meissn. in DC. Prod. xiv. 558 = *virgata* ?
Rodriguezii, Nym. Consp. 641 = *velutina*.
Ruizi, Losc. ex Casav. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.
ix. (1880) 301 = *calycina*.
Sanamunda, All. Fl. Pedem. i. 132. — Europ.
Tartonraira, All. l. c. 133. — Europ. austr.
thesoides, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 66. — Hispan.
Thomasii, Endl. l. c. = *T. Tartonraira*.
tinctoria, Endl. l. c. — Europ. occ.
tomentosa, Endl. l. c. = *T. Tartonraira*.
velutina, Meissn. in DC. Prod. xiv. 555. — Ins. Balear.
villosa, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 66. — Reg. Mediterr. occ.
virescens, Meissn. in DC. Prod. xiv. 554. — Alger.
virgata, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 66. — Marocc.

THYMELINA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 198 (1824) =
Gnidia, Linn. (Thymel.).
sericea, Hoffmgg. l. c. 199, in obs. = *G. sericea*.
simplex, Hoffmgg. l. c. 198 = *G. carinata*.

THYMOPHYLLA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 (1816).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 410.
LOWELLIA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv.
(1849) 89.
Greggii, A. Gray, l. c. 92. — Mexic.
setifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25. — Mexic.

THYMOPHYLLUM, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 410
(1873), sphalm. = *præc.*

THYMOPSIS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii.
407 (1873). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. l. c.
Wrightii, Benth. l. c. — Cuba.

THYMOPSIS, Jaub. & Spach, Illustr. i. 72 (1843) =
Hypericum, Tourn.
aspera, Jaub. & Spach, l. c. = *H. Thymopsis*.

THYMOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)
70, 136 = **Thymus**, Tourn. (Labiata).
chamaedryus, St. Lag. l. c. 136 = *Thymus Chamaedrys*.
mastichinus, St. Lag. l. c. = *Thymus Mastichina*.
piperellus, St. Lag. l. c. = *Thymus Piperella*.
serpyllus, St. Lag. l. c. = *Thymus Serpyllum*.

THYMUS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
LABIATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1186.
CORIDOTHYMUS, Reichb. f. in Oestr. Bot. Wochenbl.
vii. (1857) 160.
MASTICHINA, Adans. Fam. ii. 194 (1763).
SERPYLLUM, Tourn. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall.
234 (1745).
ZYGIS, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 46 (1825).
acicularis, Bess. Enum. Pl. Voh. 24 = *T. Serpyllum*.
acicularis, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 127 = *striatus*.
acicularis, Walldt. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 157. —
Europ.
acinoides, Schleich. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 327
= *Calamintha Acinos*.
acinoides, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxv = *Calamintha*
suaveolens.
Acinos, Asso, Syn. Stirp. Arag. 77 = *Ziziphora acinoides*.
Acinos, Brot. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 683 = *Calami-*
nthia patavina.
Acinos, Linn. Sp. Pl. 591 = *Calamintha Acinos*.
adscendens, Bernh. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 115
= *T. Serpyllum*.
aegyptiacus, Bernh. ex Steud. Nom. ed. I. 835, nomen
(Quid ?). — Aegypt.
aestivalis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 432. — Europ.
aestivus, Reut. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii.
402. — Hispan.
affinis, Sieber, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 343 =
T. Herba-barona.
affinis, Vis. in Parl. Giorn. Bot. Ital. ii. III. (1846) 4, in
obs. = *T. Serpyllum*.
albicans, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 124. t. 11. —
Lusitan.
albidus, Opiz, in Flora, vii. (1824) 526 = *T. Serpyllum*.
albinervis, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii.
(1883) 330 = *T. Zygis*.

THYMUS:—

albus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 116 = *Micromeria rupestris*.
algarbiensis, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 5 = *albicans*.
algeriensis, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 95 = *ciliatus*.
Allionii, Zumag. Fl. Pedem. i. 226 = *Micromeria Piperella*.
Almoradux, Duf. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 487 = *tomentosus*.
alpicolus, Schur, Enum. Pl. Transs. 525 = *T. Serpyllum*.
alpinus, Linn. Sp. Pl. 591 = *Calamintha alpina*.
alpinus, Pall. Tabl. Taur. 53 = *Calamintha Acinos*.
angulosus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 401 = *T. Serpyllum*.
angustifolius, Pers. Syn. ii. 130 = *T. Serpyllum*.
angustifolius, Salisb. Prod. 86 = *T. Zygis*.
angustifolius, Webb, Iter Hisp. 21 = *serpylloides*.
angustus, Opiz, ex Déségl. in Bull. Soc. Sc. Angers, (1882) 190 = *T. Serpyllum*.
apricus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
arenarius, Bernh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 312 = *T. Serpyllum*.
argaeus, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 7 = *T. Serpyllum*.
arthoclaides, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 36.—Persia.
arvensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 972 (Index) = *Calamintha Acinos*.
athonicus, Bernh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 329 = *Calamintha Nepeta*.
attenuatus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136, 70 = *T. Herba-barona*.
atticus, Čelak. in Flora, lxx. (1882) 564 = *striatus*.
aureus, Hort. ex Belg. Hort. (1872) 356 = *T. Serpyllum*.
austriacus, Bernh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 312 = *T. Serpyllum*.
azoricus, Lodd. Bot. Cab. t. 1530 = *T. Serpyllum*.
azureus, Maund, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 683, nomen (Quid?)—Europ. austr.
Balansae, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 556 = *T. Serpyllum*.
barbatus, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 74 = *T. Serpyllum*.
Barrelieri, Spreng. Syst. ii. 698 = *Micromeria marifolia*.
Beneschianus, Opiz, Seznam, 96 = *T. Serpyllum*.
bidentatus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 360 = *Mentha Pulegium*.
biflorus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 112 = *Micromeria biflora*.
Billardieri, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 8.—Ins. Cyprus.
biserratus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 478 = *Hyptis brevipes*.
Bleicherianus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 308.—Alger.
bonariensis, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1839) 12. n. 14; et in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. (1840) 381 = *Micromeria bonariensis*.
Bovei, Benth. Lab. Gen. et Sp. 342 = *T. Serpyllum*.
Bowei, Steud. Nom. ed. II. ii. 683, sphalm. = *prae*.
brachyphyllus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
bracteatus, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 8.—Hispan.
bracteatus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
bracteatus, Vis. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 346.—Dalmat.
Brauneanus, Hoppe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 329 = *Calamintha Nepeta*.
brevicalyx, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 330 = *T. Serpyllum*.
brevifolius, Wahlenb. in Bergg. Resor. ii. Bihang, 61; et in Oken, Isis, xxi. (1828) 1001.—Syria.
Broussonetii, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 492. t. 141.—Maroc.
Brownei, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 89 = *Micromeria Brownei*.
caespititius, Brot. Fl. Lusit. i. 176 = *T. Serpyllum*.
caespitosus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
Calamintha, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 425; Sm. Engl. Bot. t. 1676 = *Calamintha officinalis*.
calaminthoides, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 329, in syn. = *Calamintha officinalis*.
caliculus, Schur, Enum. Pl. Transs. 529 = *T. Serpyllum*.
campestris, Salisb. Prod. 85 = *T. Serpyllum*.
camphoratus, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 131.—Lusitan.
canescens, Dum. Fl. Belg. 48 = *Calamintha Acinos*.

THYMUS:—

canus, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 60 = *Calamintha graveolens*.
capitatus, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 123.—Reg. Mediterr.
capitellatus, Hoffmgg. & Link, l. c. 125. t. 12.—Lusitan.
cappadocicus, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 17.—Cappadoc. *carniolicus*, Borb. ex Déségl. in Bull. Soc. Sc. Angers, (1882) 191 = *T. Serpyllum*.
carnosus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 490. t. 139.—Hispan.
carolinianus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 9 = *Calamintha caroliniana*.
carpathicus, Čelak. in Flora, lxx. (1882) 563 = *T. Serpyllum*.
caucasicus, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 341 = *T. Serpyllum*.
Cephalotes, Linn. Sp. Pl. 592.—Hispan.; Lusit.
Chamaedrys, Fries, Nov. Fl. Suec. 197 = *T. Serpyllum*.
Chamissonis, Benth. in Linnaea, vi. (1831) 80 = *Micromeria Douglasii*.
Chaubardi, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 6 = *T. Serpyllum*.
cherlerioides, Vis. in Mem. Ist. Venet. i. 1842 (1843) 44 = *hirsutus*.
chinensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 314, 315 = *vulgaris*.
ciliatus, Benth. Lab. Gen. et Sp. 348.—Afr. bor.; Ins. Canar.
ciliatus, Lam. Fl. Fr. ii. 392 = *T. Serpyllum*.
ciliatus, Moench, Meth. Suppl. 138 = *T. Mastichina*.
cilicicus, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 8.—Cilicia.
cimicinus, Blum, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 348.—Ross. austr.
citratus, Dum. Fl. Belg. 48 = *T. Serpyllum*.
citriodorus, Schreb. in Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. ii. 17 = *T. Serpyllum*.
clandestinus, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 74 = *acicularis*.
clandestinus, Salzm. ex Mutel, Fl. Fr. iii. 18 = *Calamintha glandulosa*.
clandestinus, Schur, Bot. Rundr. (1853) 63 = *T. Serpyllum*.
collinus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 401 = *T. Serpyllum*.
collinus, Salisb. Prod. 86 = *vulgaris*.
coloratus, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 96 = *ciliatus*.
communis, Kitt. Taschenb. ed. II. 373 = *T. Serpyllum*.
comosus, Heuff. ex Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. i. (1852) 328 = *T. Serpyllum*.
comptus, Frivald. in Flora, xix. (1836) 439.—Rumelia.
comptus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 118 = *odoratissimus*.
concinus, Salisb. Prod. 86 = *Calamintha Acinos*.
concolor, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
conspersus, Čelak. in Flora, lxx. (1882) 564 = *striatus*.
coriaceus, Vog. in Linnaea, xv. (1841) 74.—As. Min. ?
corsicus, Moris, Stirp. Sard. Elench. 37 = *Mentha Requieni*.
corsicus, Pers. Syn. ii. 131 = *Calamintha corsica*.
crenatus, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 342 = *Gardoquia affinis*.
creticus, Brot. Fl. Lusit. i. 174 = *capitatus*.
creticus, DC. Fl. Fr. iii. 564 = *Micromeria marifolia*.
cristatus, Hampe, in Flora, xx. (1837) 233 = *Micromeria cristata*.
croaticus, Pers. Syn. ii. 130 = *Micromeria croatica*.
dalmaticus, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxvii. (1878) 400 = *T. Serpyllum*.
debilis, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 391 = *Calamintha debilis*.
decumbens, Bernh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 313 = *T. Serpyllum*.
decussatus, Benth. Lab. Gen. et Sp. 482.—Arab.
deflexus, Benth. l. c. 344 = *T. Serpyllum*.
denticulatus, Steud. Nom. ed. II. ii. 684.—Cephalonia.
diffusus, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 41 = *Calamintha Acinos*.
diffusus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 489 = *hirtus*.
diffusus, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 387 = *Calamintha Nepeta*.
diffusus, Salzm. ex Benth. l. c. 342.—Hispan.
Douglasii, Benth. in Linnaea, vi. (1831) 80 = *Micromeria Douglasii*.
duinensis, Moretti, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 860 = *Calamintha thymifolia*.

THYMUS:—

effusus, Host, Fl. Austr. ii. 137 = *T. Serpyllum*.
Eisensteinianus, Opiz, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 684 = *T. Serpyllum*.
elatus, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 313 = *T. Serpyllum*.
ellipticus, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 74; Natural. n. 9 (1825) 103 = *T. Serpyllum*.
elongatus, Ehrh. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 116 = *tomentosus*.
elongatus, Schrad. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 116 = *tomentosus*.
elwendicus, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 37.—Persia.
ericaefolius, Roth, Catalect. fasc. ii. 50 = *Micromeria varia*.
exiguus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 421; Fl. Graec. vi. 61. t. 575 = *Calamintha graveolens*.
exserens, Ehrh. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 115 = *T. Serpyllum*.
fallax, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33 = *T. Serpyllum*.
filiformis, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 313 = *Micromeria filiformis*.
filiformis, Sieber, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 376 = *Micromeria nervosa*.
floribundus, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 341 = *Micromeria densiflora*.
Fontanesii, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 95 = *Monardi*.
Froelichianus, Opiz, Nom. Bot. (1831) 80 = *T. Serpyllum*.
fruticosus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 116 = *Micromeria marifolia*.
fruticulosus, Bertol. Amoen. Ital. 101 = *Micromeria approximata*.
Funkii, Coss. Notes Crit. 125.—Hispan.
gibbosus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 360 = *Calamintha Acinos*.
glaber, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *T. Serpyllum*.
glabratus, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 130. t. 15 = *T. Serpyllum*.
glabrescens, Benth. Lab. Gen. et Sp. 345 = *T. Serpyllum*.
glandulosus, Lag. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 487 = *vulgaris*.
glandulosus, Req. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 386 = *Calamintha glandulosa*.
glaucus, Frivald. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 558 = *comptus*.
gracilis, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 341 = *Micromeria xalapensis*.
granatensis, Boiss. Elench. 74.—Hispan.
grandiflorus, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 424 = *Calamintha grandiflora*.
grandiflorus, Sims, Bot. Mag. t. 997 = *Calamintha caroliniana*.
gratissimus, Duf. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 405 = *T. Serpyllum*.
graveolens, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 60 = *Calamintha graveolens*.
graveolens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 421; Fl. Graec. vi. 61. t. 576 = *teucrioides*.
Guyonii, Noé, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 580.—Alger.
Hackeltianus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
hayderensis, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 39.—Persia.
Herba-barona, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 360. t. 9. f. 1.—Ins. Corsic.
heterophyllus, Poir. Encyc. vii. 648 = *Calamintha Acinos*.
heterotrichus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 116 = *T. Serpyllum*.
hirsutissimus, Kit. ex Kanitz, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xiii. (1863) 537.—Hungar.
hirsutissimus, Poir. Encyc. vii. 650 = *Satureia Thymbra*.
hirsutus, Auct. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 345 = *T. Serpyllum*.
hirsutus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 59.—Graec.; As. Min.
hirtus, Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 143, partim = *Micromeria julianoides*.
hirtus, Rafin. Caratteri, 80 = *striatus*.
hirtus, Sieber, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 386 = *Micromeria marifolia*.
hirtus, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 256 = *Micromeria graeca*.

THYMUS:—

hirtus, Viv. Fl. Lib. Spec. 30. t. 44 = *Salvia aegyptiaca*.
hirtus, Willd. Enum. Hort. Berol. 623.—Hispan.
hispanicus, Hort. ex Poir. Encyc. vii. 646 = *Micromeria inodora*.
Hornungianus, Opiz, Seznam, 97 = T. Serpyllum.
humifusus, Bernh. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 115 = T. Serpyllum.
humifusus, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 342 = *Micromeria nubigena*.
humillimus, Čelak. in Flora, lxvii. (1884) 534.—As. Min.
hyemalis, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 7.—Hispan.
ilderensis, Gonzal. ex Costa, Supl. Fl. Catal. 63 = T. Zygis.
imbricatus, Čelak. in Flora, lxvii. (1884) 535.—As. Min.
imbricatus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 108 = *Micromeria Forskählei*.
incanus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 421; Fl. Graec. vi. 62. t. 577 = *Calamintha incana*.
incanus, Spreng. Nov. Prov. 40.—Aegypt.
incanus, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 342 = T. Serpyllum.
includens, Ehrh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 313 = T. Serpyllum.
indicus, Burm. f. Fl. Ind. 129 = *Geniosporum prostratum*.
inodorus, Benth. in Linnaea, vi. (1831) 77 = *Micromeria varia*.
inodorus, Desf. Fl. Atlant. ii. 30 = *Micromeria inodora*.
inodorus, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 122 = *Micromeria cristata*.
inodorus, Lej. Rev. Fl. Spa, 122 = T. Serpyllum.
integer, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 116 = *Billardieri*.
integer, Sart. ex Nym. Conspect. 594 = T. Serpyllum.
intermedius, Schult. Obs. Bot. 112.—Hab.?
interruptus, Opiz, Seznam, 97 = T. Serpyllum.
jalkanensis, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, i. (1885) 38.—Persia.
Jankae, Čelak. in Flora, lxvi. (1883) 147 = T. Serpyllum.
Kollmunzerianus, Opiz, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 343 = T. Serpyllum.
Kosteckianus, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 104 = T. Serpyllum.
Kotschyanus, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. v. 16 = T. Serpyllum.
Kratzmannianus, Opiz, Seznam, 97 = T. Serpyllum.
laevigatus, Vahl, Symb. Bot. ii. 65 = T. Serpyllum.
lanceolatus, Desf. Fl. Atlant. ii. 30. t. 128.—Graecia; Afr. bor.
lanceolatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 305 = *Pycnanthemum lanceolatum*.
lanceolatus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 419 = T. Serpyllum.
lanuginosus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = T. Serpyllum.
latifolius, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 90 = T. Serpyllum.
linearis, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 31 = T. Serpyllum.
lobatus, Vog. in Linnaea, xv. (1841) 75 = *villosus*.
Loevyanus, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 105 = T. Serpyllum.
longicaulis, Presl, Fl. Sic. p. xxxvii = *striatus*.
longiflorus, Boiss. Elench. 75.—Hispan.
longistylus, Opiz, Seznam, 96 = T. Serpyllum.
Loscosii, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 401.—Hispan.
lucidus, Ehrh. Beitr. vii. 150 = *Ziziphora clinopodioides*.
lucidus, Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 198 = *nitidus*.
lucidus, Willd. Enum. Hort. Berol. 624 = T. Serpyllum.
lusitanicus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 489 = *villosus*.
Majorana, Kuntze, Taschen-Fl. Leipz. 106 = *Origanum Majorana*.
majoranaefolius, Desf. Tabl. ed. II. 74 = T. Serpyllum.
Mannianus, Opiz, Seznam, 97 = T. Serpyllum.
marginatus, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 184 = T. Chamaedrys.
marginatus, Sm. in Rees, Cyclop. xxxv. n. 17 = *Micromeria Piperella*.

THYMUS:—

marifolius, Pourr. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 626 = *tomentosus*.
marifolius, Willd. l. c. 624 = *Micromeria marifolia*.
Marinosci, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 684 = *denticulatus*.
Marinosci, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxv = *striatus*.
maroccanus, Ball, in Journ. Bot. xiii. (1875) 174.—Marocc.
Marschallianus, Viv. Fl. Cors. Diagn. 9 = T. Herbarona.
Marschallianus, Willd. Sp. Pl. iii. 141 = T. Serpyllum.
Mastichina, Linn. Sp. Pl. ed. II. 827.—Hispan.; Afr. bor.
Mastichina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 422 = *Micromeria nervosa*.
megapotamicus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 224.—Eras.
melissoides, Bernh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 327 = *Calamintha patavina*.
melissoides, Fisch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 344 = T. Serpyllum.
melissoides, Schweigg. Enum. Pl. Hort. Regiom. 72 = *Calamintha patavina*?
membranaceus, Boiss. Elench. 75.—Hispan.
micans, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 19 = T. Serpyllum.
micranthus, Brot. Fl. Lusit. i. 176 = *Micromeria graeca*.
micranthus, Wierzb. ex Opiz, Nom. (1831) 77 = T. Serpyllum.
micromerioides, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxi. (1884) 275.—Hispan.
microphyllus, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 327 = *Micromeria microphylla*.
minor, Trev. Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1819) App. i. 4 = *Calamintha Nepeta*.
minutus, Opiz, Seznam, 97 = T. Serpyllum.
Monardi, Not. in Expl. Scientif. Algér. t. 66.—Alger.
montanus, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. iv. 278 = *Calamintha alpina*.
montanus, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iii. 32 = *Satureia montana*.
montanus, Walst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 72. t. 71 = T. Serpyllum.
monticola, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 103, nomen (Quid?).
Moschatella, Pollini, in Brugn. Giorn. Fis. ix. (1816) 33 = *Calamintha officinalis*.
multiflorus, Pers. Syn. ii. 131.—Hab.?
Munbyanus, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 96 = *ciliatus*.
neapolitanus, Herb. Kern. ex Strobil. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 329 = *striatus*.
Nepeta, Sm. Fl. Brit. ii. 642 = *Calamintha Nepeta*.
nepetoides, D. Don, Prod. Fl. Nep. 113 = *Nepeta ruderalis*.
nervosus, J. Gay, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 345 = T. Serpyllum.
nitens, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. ii. 595 = T. Herbarona.
nitidus, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 97.—Sicil.
Notarisii, Zumag. Fl. Pedem. i. 226 = *Micromeria thymoides*.
nubigenus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 316 = *Micromeria nubigena*.
numidicus, Benth. Lab. Gen. et Sp. 347 = T. Zygis.
numidicus, Poir. Voy. Barb. ii. 189 = *lanceolatus*.
nummularifolius, Loisel. Fl. Gall. ed. I. t. 9. f. 2; et ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 732 = *Calamintha alpina*.
nummularius, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. ii. 58 = T. Serpyllum.
oblongifolius, Opiz, Natural. n. x. (1825) 241 = T. Serpyllum.
obtusatus, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 103 (Quid?).—Europ.
ocheus, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 6 = T. Serpyllum.
odoratissimus, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. iii. 405.—Ross. austr.; As. Min.
odoratissimus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = T. Serpyllum.
origanifolius, D. Don, Prod. Fl. Nep. 112 = *Calamintha longicaulis*.
origanifolius, Vis. in Flora, xiii. (1830) 51 = *Micromeria dalmatica*.

THYMUS:—

origanoides, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 69. t. 152.—Ins. Canar.
Origanum, Kuntze, Taschen-Fl. Leipz. 106 = *Origanum vulgare*.
Ortmannianus, Opiz, Seznam, 97 = T. Serpyllum.
ovatus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = T. Serpyllum.
pallens, Opiz, ex Déségl. in Bull. Soc. Sc. Angers, (1882) 186 = T. Serpyllum.
pallidus, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 65, nomen = *lanceolatus*.
pallidus, Noé, in Expl. Scientif. Algér. t. 66.—Alger.
pallidus, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 65, nomen = *lanceolatus*.
pannonicus, All. Fl. Pedem. i. 20 = T. Serpyllum.
paronychioides, Čelak. in Flora, lxv. (1882) 564.—Sicil.
parviflorus, Opiz, Seznam, 96 = T. Serpyllum.
parviflorus, Req. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 386 = *Mentha Requieni*.
parvifolius, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 666 = T. Serpyllum.
patavinus, Jacq. Obs. Bot. iv. 7 = *Calamintha patavina*.
patavinus, Pall. ex Bieb. Fl. Taur.-Cauc. ii. 60 = *Calamintha graveolens*.
pectinatus, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 32 = *odoratissimus*.
Petteri, Presl, Bot. Bemer. 100 = *acicularis*.
piligerus, Opiz, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 312 = T. Serpyllum.
pilosus, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 74; Natural. n. vi. (1824) 40 = T. Serpyllum.
Piperella, All. Fl. Pedem. i. 21. t. 37. f. 3 = *Micromeria Piperella*.
Piperella, Linn. Syst. ed. XII. 400.—Reg. Mediter.
Piperella, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 169 = *Micromeria croatica*.
piperitus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 112 = *Calamintha longicaulis*.
praecox, Opiz, Natural. n. vi. (1824) 40; et in Flora, vii. (1824) Beil. 84 = T. Serpyllum.
procerus, Opiz, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 343 = T. Serpyllum.
procumbens, Bernh. ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 74 = T. Serpyllum?
pruinosis, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 253 = *cappadocicus*.
Pseudo-serpyllum, Reichb. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 344 = T. Serpyllum.
pulchellus, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 40; C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 87 = T. Serpyllum.
pulcherrimus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 140 = T. Serpyllum.
pulegioides, Linn. Sp. Pl. 592 = T. Serpyllum.
pulegioides, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 313 = T. Serpyllum.
pulvinatus, Čelak. in Flora, lxvii. (1884) 533.—As. Min.
pumilus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 346 = T. Serpyllum.
punctatus, Tineo, ex Benth. in DC. Prod. xii. 217 = *Micromeria approximata*.
punctatus, Vis. in Mem. Ist. Venet. i. 1842 (1843) 43. t. 2. f. 1 = T. Serpyllum.
punctatus, Willd. Phyt. 8 = *Ziziphora clinopodioides*.
purpurascens, Poir. Encyc. vii. 654 = *Calamintha purpurascens*.
pusillus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 346 = T. Serpyllum.
Pusio, Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. ii. (1884) 134 = T. Serpyllum.
quadrangulus, Ehrh. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 559 = *decussatus*.
rariflorus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 666 = T. Serpyllum.
rariopilus, Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. ii. (1884) 134 = T. Serpyllum.
recurvatus, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 431.—Hungar.
reflexus, Lej. Rev. Fl. Spa, 121 = T. Serpyllum.
Reichelianus, Opiz, Seznam, 96 = T. Serpyllum.
Reinegeri, Opiz, l. c. 97 = T. Serpyllum.
repens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 113 = *Calamintha umbrosa*.
repens, Gilib. Fl. Lituan. i. 74 = T. Serpyllum.
Richardi, Pers. Syn. ii. 130 = *Origanum majoricum*.

THYMUS:

- rigidus*, Reichb. ex Bess. in Flora, xv. (1832) II. Beibl. 18 = *T. Serpyllum*.
robustus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
Rochelianus, Čelak. in Flora, lxv. (1882) 563 = *T. Chamaedrys*.
Roegneri, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 666 = *T. Serpyllum*.
rotundifolius, Pers. Syn. ii. 131 = *Zizyphora acinoides*.
rotundifolius, Poir. Encyc. vii. 654 = *T. Piperella*.
rotundifolius, Rochel, ex Nym. Consp. 588 = *Calamintha patavina*.
rotundifolius, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1850) 168 = *T. Serpyllum*.
sabulicola, Coss. Notes Crit. 125.—Hispan.
sabulicus, Walp. Ann. iii. 924, sphalm. = *praec.*
satureioides, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 253.—Marocc.
scaber, Presl, Fl. Sic. p. xxxvi = *Satureia scabra*.
scaber, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 342 = *Gardoquia affinis*.
scharakensis, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 103, nomen (Quid ?).—Europ.
Selloi, Spreng. ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 168 = *Cunila fasciculata*.
senilis, Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. ii. (1884) 133 = *T. Serpyllum*.
serpens, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
serpylloides, Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. iii. (1820) 16.—Hispan.
Serpyllum, Coss. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 405 = *bracteatus*.
Serpyllum, Linn. Sp. Pl. 590.—Europ.; As. et Afr. bor.
serratus, Opiz, in Flora, v. (1822) 267 = *T. Serpyllum*.
serratus, Poir. Encyc. vii. 653 = *Pycnanthemum muticum*.
serrulatus, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 203.—Abyss.
Sibthorpii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 345 = *lanceolatus*.
silvestris, Nym. Consp. 593 = *sylvestris*.
simplex, Kitt. Taschenb. ed. II. 373 = *T. Serpyllum*.
Sintenisii, Čelak. in Flora, lxvii. (1884) 537.—As. Min.
sipyleus, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 16 = *T. Serpyllum*.
sparsiflorus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 402 = *T. Zygis*.
spathulatus, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 105; Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 346 = *T. Serpyllum*.
spicatus, W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 677, nomen (Quid ?).—Europ.
spinulosus, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxv = *striatus*.
squarrosus, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 32 = *T. Serpyllum*.
stenophyllus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
striatus, Munby, Fl. Algér. 62 = *hirtus*.
striatus, Reichb. Ic. Fl. Germ. xviii. 36 = *T. Serpyllum*.
striatus, Vahl, Symb. Bot. iii. 78.—Europ. austr.; As. Min.
suaveolens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 420 = *Calamintha suaveolens*.
suavis, Salisb. Prod. 86 = *T. Mastichina*.
subcitratus, Schreb. in Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. ii. 18 = *T. Serpyllum*.
subcordatus, Vis. Fl. Dalmat. i. t. 19 = *Micromeria croatica*.
sublaxus, Rouy, in La Natural. ii. (1882) (Matér. Rev. Fl. Portug. 46) = *vulgaris*.
sublobatus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 308 = *ciliatus*.
subnudus, Spreng. Syst. ii. 698 = *Micromeria Pulegium*.
sudeticus, Opiz, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 312 = *T. Serpyllum*.
sylvaticus, Bernh. Syst. Verz. Erf. 77 = *Calamintha Clinopodium*.
sylvestris, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 132. t. 16.—Hispan.
sylvestris, Schreb. in Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. ii. 17 = *T. Serpyllum*.
syriacus, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 47.—Syria.
syrticus, Spreng. Syst. ii. 697 = *Salvia aegyptiaca*.

THYMUS:

- taxifolius*, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 342 = *Gardoquia taxifolia*.
Teneriffae, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 377 = *Micromeria microphylla*.
Teneriffae, Poir. Encyc. vii. 650 = *Micromeria Teneriffae*.
tenuifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *T. Zygis*.
teucrioides, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. v. 15.—Graec.
therebinthinaceus, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 624 = *Micromeria Teneriffae*.
thymbroides, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 124 = *ciliatus*.
tomentosus, Boiss. & Reut. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 400 = *T. Mastichina*.
tomentosus, Willd. Enum. Hort. Berol. ii. 626.—Hispan.
Trachselianus, Opiz, Natural. n. xi. (1826) 461 = *T. Serpyllum*?
Tragoriganum, Linn. Mant. i. 84 = *Satureia Thymbra*.
transsilvanicus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 197 = *T. Serpyllum*.
tunetanus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 310.—Afr. bor.
umbrosus, Spreng. Nov. Prov. 41 = *Calamintha officinalis*.
variabilis, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 134. t. 15 = *T. Serpyllum*.
verecundus, Salisb. Prod. 86 = *Calamintha patavina*.
veronicaefolius, Spreng. Syst. ii. 698 = *Melissa veronicaefolia*.
verticillatus, Poir. Encyc. vii. 653 = *Pycnanthemum lanceolatum*.
villosissimus, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 248 = *Calamintha alpina*.
villosus, Linn. Sp. Pl. 592.—Europ. austr.
villosus, Pall. ex Bieb. Fl. Taur.-Cauc. ii. 59 = *T. Serpyllum*.
villosus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 62. t. 578 = *Billardieri*.
villosus, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 342 = *T. Cephalotes*.
virgatus, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxv = *Micromeria graeca*.
virginicus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 478 = *Hyptis capitata*.
virginicus, Linn. Mant. ii. 409 = *Pycnanthemum lanceolatum*.
vulgaris, Bieb. Besch. Casp. 209 = *T. Serpyllum*.
vulgaris, Linn. Sp. Pl. 591.—Europ. austr.; As. bor.
vulgaris, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 419 = *hirtus*.
vulgaris, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 402 = *aestivus*.
Webbianus, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxi. (1884) 275.—Hispan.
Welwitschii, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 9.—Lusitan.
Wierzbickianus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
Willdenowii, Boiss. in Kelaart, Fl. Calp. 218 = *hirtus*.
Wondraekianus, Opiz, Seznam, 97 = *T. Serpyllum*.
xalapensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 316 = *Micromeria Brownei*.
xylorrhizus, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 556 = *T. Serpyllum*.
Zattar, Munby, Cat. Pl. Alger. 23, nomen.—Alger.
zattarellus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 309 = *ciliatus*.
zygioides, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 118 = *striatus*.
Zygis, Bieb. Besch. Casp. 210 = *odoratissimus*.
Zygis, Brot. Fl. Lusit. i. 176 = *sylvestris*.
Zygis, Linn. Sp. Pl. 591.—Hispan.; Lusit.
Zygis, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 313 = *T. Serpyllum*.
Zygis, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 60. t. 574 = *striatus*.

THYOPSIS, Wedd. Chlor. And. i. 165, in nota, t. 27*, A B C (1856) = **Tafalla**, D. Don (Compos.).
ferruginea, Wedd. l. c. = *T. ferruginea*.
graveolens, Wedd. l. c. (= *Loricaria graveolens*).—N. Granat.
stenophylla, Wedd. l. c. (= *Loricaria stenophylla*).—N. Granat.

THYPHA, Costa, Introd. Fl. Catal. p. lxxv. 292 (Index) (1864), sphalm. = **Typha**, Linn.

THYRIDOSTACHYUM, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 379 (1836) = **Ophiurus**, Gaertn. f. (Gramin.).
laeve, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 615 = *O. perforatus*.

THYROCARPUS, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 225. **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 847.
fulvescens, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 499.—China.
glochidiatus, Maxim. l. c.—China.
Sampsoni, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 225.—China.

THYROMA, Miers, Apocyn. S. Am. 22 (1878) = **Aspidosperma**, Mart. & Zucc. (Apocyn.).
bicolor, Miers, l. c. 25 = *A. bicolor*.
decipiens, Miers, l. c. 24 = *A. decipiens*.
Lhotskiana, Miers, l. c. 25 = *A. Lhotskianum*.
nitida, Miers, l. c. 24 = *A. nitida*.
parvifolia, Miers, l. c. 25 = *A. parvifolium*.
polynura, Miers, l. c. 24 = *A. polynuron*.
Riedelii, Miers, l. c. 26 = *A. Riedelii*.
Sellowii, Miers, l. c. 24 = *A. Sellowii*.
sessiliflora, Miers, l. c. 23 = *A. sessiliflorum*.

THYROPHORA, Neck. Elem. ii. 13 (1790) = **Gentiana**, Tourn.

THYRSACANTHUS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 97. t. 13 (1847). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1119.

ODONTONEMA, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 300.
amplexicaulis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 98.—Bras.
barlerioides, Nees, l. c. 97.—Bras.
bracteolatus, Nees, in DC. Prod. xi. 325.—N. Granat.
callistachyus, Nees, l. c. 326.—Mexic.
calycotrichus, T. Anders. in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 284 = *Schaueria calycotricha*.
coccineus, T. Anders. l. c. = *Jacobinia coccinea*.
cuspidatus, Nees, in DC. Prod. xi. 323.—Mexic.
dissitiflorus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 98.—Bras.
Earlii, F. Muell. Fragm. vi. 87 = *Graptophyllum Earlii*.
embelioides, Pritz. Ic. Ind. i. 1103, sphalm. = *Thyrsanthus embelioides*.
Flagellum, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 146.—Costa Rica.
foliaceo-bracteatus, Oerst. l. c.—Costa Rica.
fuchsoides, Nees, in DC. Prod. xi. 325.—N. Granat.
Hookerianus, Nees, l. c. 324.—Ecuador.
indicus, Nees, l. c. 325 = *Eranthemum indicum*.
interruptus, Nees, l. c. 326.—N. Granat.
Lemairianus, Nees, l. c. 729.—Hab.?
lilacinus, Lindl. in Journ. Hort. Soc. vi. (1851) 159 = *callistachys*.
Lindenianus, Nees, in DC. Prod. xi. 326 = *Eranthemum cuspidatum*.
longifolius, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 145.—Nicaragua.
longistamineus, Nees, in DC. Prod. xi. 326 (an *Jacobinia* sp.?).—Peruv.
nitidus, Nees, l. c. 327.—Ind. occ.
pantasmensis, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 144.—Nicaragua.
ramosissimus, Moric. Pl. Nouv. Am. 165. t. 96; Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 98 = *Jacobinia ramosissima* (in Addend.).
ruber, Nees, in DC. Prod. xi. 326.—Venezuela.
rutilans, Planch. in Fl. des Serres, vii. (1852) 241. t. 732.—N. Granat.
Schomburgkianus, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 636.—Guian.
sessilis, Nees, in DC. Prod. xi. 324.—N. Granat.
squarrosus, T. Anders. in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 284 = *Dianthera nodosa*?
strictus, Nees, in DC. Prod. xi. 324.—Honduras.
tubaeformis, Nees, l. c.—Guatemala.
variegatus, Nees, l. c. 325.—Guian.

THYSAMUS, Reichb. Consp. 197 (1828), sphalm. = **Thysanus**, Lour. (Inc. Sed.).

THYRSANTHEMA, Neck. Elem. i. 6 (1790) = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).

THYRSANTHUS, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 245 = **Forsteronia**, G. F. W. Mey. (Apocyn.).
Acouci, Miers, Apocyn. S. Am. 98 = *F. Acouci*.
adenobasis, Miers, l. c. 96 = *F. adenobasis*.
affinis, Miers, l. c. 101 = *F. affinis*.
Aubletianus, Miers, l. c. 98 = *Thenardia umbellata*.
Benthamianus, Miers, l. c. 95 = *F. Benthamiana*.
bracteatus, Miers, l. c. 102 = *F. bracteata*.
brasiliensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 412, in obs. = *F. brasiliensis*.
corylifolius, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 519 = *F. corylifolia*.
corymbiferus, Miers, Apocyn. S. Am. 98 = *F. Schomburgkii*.
corymbosus, Miers, l. c. 97 = *Parsonsia corymbosa*.
crebriflorus, Miers, l. c. 105 = *Bras.*
difformis, Miers, l. c. 99 = *Trachelospermum difforme*.
diospyrifolius, Miers, l. c. 96 = *F. diospyrifolia*.
embelioides, A. DC. in DC. Prod. viii. 387 = *F. embelioides*.
fasciculatus, Miers, Apocyn. S. Am. 100 = *Tabernaemontana fasciculata*.
Gardneri, A. DC. in DC. Prod. viii. 387 = *F. Gardneri*.
glabrescens, Miers, Apocyn. S. Am. 102 = *F. glabrescens*.
gracilis, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 246 = *Guian.*
guyanensis, Miers, Apocyn. S. Am. 97 = *F. guyanensis*.
laurifolius, Miers, l. c. 94 = *F. laurifolia*.
leptocarpus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 224 = *Parsonsia leptocarpa*.
Luschnatii, Miers, Apocyn. S. Am. 106 = *F. Luschnatii*.
macrophyllus, Miers, l. c. 96 = *F. macrophylla*.
meridionalis, Miers, l. c. 106 = *F. meridionalis*.
multinerviis, Miers, l. c. 103 = *F. multinervia*.
myrianthus, Miers, l. c. 105 = *F. floribunda*, *Muell. Arg.*
parviflorus, Miers, l. c. 100 = *Tabernaemontana populi folia*.
pilosus, A. DC. in DC. Prod. viii. 387 = *F. pilosa*.
placidus, Miers, Apocyn. S. Am. 101 = *Bras.*
populifolius, Miers, l. c. 99 = *Tabernaemontana populi folia*.
pubescens, Miers, l. c. 101 = *F. pubescens*.
pyriformis, Miers, l. c. 100 = *Ind. occ.*
rufus, Miers, l. c. 104 = *F. rufa*.
Schomburgkii, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 246 = *Guian.*
sessilis, Miers, Apocyn. S. Am. 104 = *Malouetia sessilis*.
spicatus, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 520, in obs. = *F. spicata*.
velutinus, Miers, Apocyn. S. Am. 86 = *F. multinervia*.
Wilsonii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 412 = *Jamaic.*

THYRSANTHUS, Ell. in Journ. Acad. Philad. i. (1818) 371 = *Wistaria*, Nutt. (Legumin.).
floridana, Croom, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xxv. (1834) 75 = *W. speciosa*.
frutescens, Ell. in Journ. Acad. Philad. i. (1818) 371 = *W. speciosa*.

THYRSANTHUS, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 75 = *Lysimachia*, Tourn. (Primul.).
palustris, Schrank, l. c. = *L. thyrsiflora*.

THYRSINE, Gled. Syst. 286 (1764) = **Cytinus**, Linn. (Balanoph.).
Hypocistis, Walp. Ann. iii. 514 = *C. Hypocistis*.

THYRSODIUM, Salzm. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 17. **ANACARDIACEAE**, [Benth. & Hook. f. i. 323].
giganteum, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 297 = *Bras.*
guianense, Sagot, ex March. Rév. Anacard. 160 = *Guian.*
Salzmannianum, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 18 = *Schomburgkiana*.
Schomburgkianum, Benth. l. c. = *Am. trop.*
Spruceanum, Benth. l. c. 17 = *Bras.*

THYRSOSMA, Rafin. Sylva Tellur. 130 (1838) = **Viburnum**, Linn. (Caprif.).
chinensis, Rafin. l. c. = *V. odoratissimum*.

THYSANACHNE, Presl, Thysan. Nov. Pl. Gen. (1829); et J. Presl, in Rel. Haenk. i. 252 (1830) = **Arun-dinella**, Raddi (Gramin.).
peruviana, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 253 (= *Ischaemum peruvianum*).—Peruv.
scoparia, Presl, Thysan. Nov. Pl. Gen. (1829); et J. Presl, in Rel. Haenk. i. 253 = *A. Deppeana*.

THYSANELLA, A. Gray, ex Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 232 = **Polygonum**, Tourn.
fimbriata, A. Gray, l. c. = *P. fimbriatum*.

THYSANELLA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 67 (1866) = **Thysanotus**, R. Br. (Liliac.).

THYSANOCARPUS, Hook. Fl. Bor. Am. i. 69. t. 18. f. A (1829). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 94.
crenatus, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 118 = *laciniatus*.
curvipes, Hook. Fl. Bor. Am. i. 69. t. 18. f. A.—Am. bor. occ.
Deppii, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 118 = *elegans*.
elegans, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 51.—Calif.
erectus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 124.—Ind. occ.
laciniatus, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 118.—Calif.
oblongifolius, Nutt. l. c. = *pusillus*.
pulchellus, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 50 = *curvipes*.
pusillus, Hook. Ic. Pl. t. 42.—Am. bor. occ.
radians, Benth. Pl. Hartw. 297.—Calif.
runcinatus, G. Don, Gen. Syst. i. 196 = *curvipes*.

THYSANOCHILUS, Falc. in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 14. **ORCHIDEAE** (an **Cyrtopera**? Lindl.).

THYSANOLAENA, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xviii. (1835) 180. **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1120.
MYRIACHAETA, Zoll. & Mor. Verz. Pl. Zoll. 101 (1845–46).
acarifera, Arn. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 181 = *T. Agrostis*.
Agrostis, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xviii. (1835) 180.—As. trop.

THYSANOSPERMUM, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 168. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 43.
diffusum, Champ. l. c.—Ins. Hongkong.

THYSANOTUS, R. Br. Prod. 282 (1810). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 730.
CHLAMYSPORUM, Salisb. Parad. Lond. t. 103 (1809), nomen prius.
ISANDRA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 67 (1866).
THYSANELLA, Salisb. l. c. (1866).
anceps, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 37 = *dichotomus*.
anceps, Lindl. Swan River App. 58.—Austral.
Arbuscula, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 339.—Austral.
asper, Lindl. Swan River App. 58.—Austral.
Banksii, R. Br. Prod. 283 = *tuberosus*.
Baueri, R. Br. l. c.—Austral.
brevipes, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 38 = *multiflorus*.
chinensis, Benth. Fl. Hongk. 372.—Austral.; China; Ins. Philipp.
chrysanthereus, F. Muell. Fragm. v. 202 = *chinensis*.
deformis, R. Br. Prod. 284 = *dichotomus*.
dichotomus, R. Br. l. c.—Austral.
divaricatus, R. Br. l. c. = *dichotomus*.
Drummondii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 341.—Austral.
elator, R. Br. Prod. 283 = *tuberosus*.
elongatus, R. Br. l. c. = *dichotomus*.
exasperatus, F. Muell. Fragm. i. 21.—Austral.
exiliflorus, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. iv. (1882) 112.—Austral.
flexuosus, R. Br. Prod. 284 = *dichotomus*.
glaucus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 38.—Austral.
gracilis, R. Br. Prod. 283 = *dichotomus*.
hispidulus, R. Br. l. c. 285 = *triandrus*.
humilis, F. Muell. Fragm. i. 22 = *Baueri*.

THYSANOTUS:—
intricatus, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 59; Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 243 = *dichotomus*.
isantherus, R. Br. Prod. 283.—Austral.
isantherus, Lindl. in Bot. Reg. t. 655 = *tuberosus*.
juncus, R. Br. Prod. 283.—Austral.
Lindleyanus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 36 = *dichotomus*.
Manglesianus, Kunth, Enum. Pl. iv. 616 = *Patersoni*.
Menziesii, R. Br. Prod. 284 = *Patersoni*.
micranthus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 36 = *Corynotheca dichotoma*.
multiflorus, R. Br. Prod. 285.—Austral.
nanus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 38 = *triandrus*.
paniculatus, R. Br. Prod. 283 = *tuberosus*.
Patersoni, R. Br. l. c. 284.—Austral.
pauciflorus, R. Br. l. c. 285.—Austral.
proliferus, Lindl. Bot. Reg. (1838) t. 8 = *multiflorus*.
scaber, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 37.—Austral.
sparteus, R. Br. Prod. 283 = *dichotomus*.
tenellus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 37.—Austral.
tenuis, Endl. l. c. = *tuberosus*.
tenuis, Lindl. Bot. Reg. (1838) t. 50 = *dichotomus*?
thyrsoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 336.—Austral.
triandrus, R. Br. Prod. 284.—Austral.
tuberosus, R. Br. l. c. 282.—Austral.
undulatorum, Behr, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 336 = *Baueri*.
volubilis, R. Br. Prod. 284 = *Patersoni*?

THYSANTHA, Hook. Ic. Pl. t. 590 (1843) = **THISANTHE**, Eckl. & Zeyh. = **Tillaea**, Mich. (Crassul.).

THYSANUS, Lour. Fl. Cochinch. 284 (1790).
Genus dubium CONNARACEARUM, Benth. & Hook. f. i. 431.
cochinchinensis, DC. Prod. ii. 91 = *T. Palala*.
Palala, Lour. Fl. Cochinch. 284.—China.

THYSSELINUM, Adans. Fam. ii. 100 (1763) = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
angustifolium, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 453 = *P. palustre*.
cantabrigense, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 154 = *Selinum sylvestre*.
Crouanorum, Bor. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1878) 30.—Gallia.
davuricum, Spreng. Syst. i. 895 = *Angelica dahurica*.
grandiflorum, Moench, Meth. 85 = *Pleurospermum austriacum*.
involutum, Moench, l. c. (= *Pachypleurum alpinum*).—Sibir. altaic.
lucidum, Moench, Meth. Suppl. 31.—Hab.?
nigrum, Moench, Meth. 84 = *Ligusticum pyrenaicum*.
palustre, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 154 = *P. palustre*.
Plinii, Spreng. Spec. Umbellif. 69 = *P. palustre*.
Schwereckii, Bess. Enum. Pl. Volh. 12 = *P. palustre*.
silvestre, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 453 = *seq.*
silvestre, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 154 = *P. palustre*.

TIARANTHUS, Herb. Amaryll. 202, 206 (1837) = **Pancratium**, Dill. (Amaryll.).

TIARELLA, Linn. Diss. Chen. 29 (1751); Amoen. Acad. iii. 17 (1787). **SAXIFRAGEAE**, Benth. & Hook. f. i. 637.
BLONDIA, Neck. Elem. ii. 115 (1790).
OREOTRYS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 74 (1836).
PETALOSTEIRA, Rafin. l. c. (1836).
alternifolia, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 50 = *Tellima grandiflora*.
bitermata, Vent. Jard. Malm. 54. t. 54 = *Astilbe decandra*.
bracteata, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 204 = *Heuchera bracteata*.
colorans, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jul.–Oct. 1829) 349 = *Heuchera glabra*.
cordifolia, Linn. Sp. Pl. 405.—As. et Am. bor.
laciniata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 239. t. 77 = *trifoliata*.
Menziesii, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 313 = *Tolmiea Menziesii*.
pentandra, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 216, in obs. = *Heuchera bracteata*.
polyphylla, D. Don, Prod. Fl. Nep. 210.—Reg. Himal.
rhombifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 588 = *trifoliata*.

TIARELLA:—

stenopetala, Presl, Rel. Haenk. ii. 55 = trifoliata.
trifolia, J. F. Gmel. Syst. 1637 = trifoliata.
trifoliata, James, Cat. 181; ex S. Wats. Bibliog. Ind.
 Bot. N. Am. 325 = *Heuchera bracteata*?
trifoliata, Linn. Sp. Pl. 406.—As. et Am. bor.
unifolia, Retz. Obs. iii. 30 = *Mitella nuda*?
unifoliata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 238. t. 81.—Am.
 bor. occ.

TIARIDIUM, Lehm. Asperif. 13 (1818); Ic. 10. t. 6
 (1821) = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).
anisophyllum, G. Don, Gen. Syst. iv. 364 = H.
indicum.
elongatum, Lehm. Asperif. 18 = H. *elongatum*.
heliotropioides, Cham. in Linnaea, iv. (1829) 453 = H.
tiaridioides.
indicum, Lehm. Asperif. 14 = H. *indicum*.
monostachyum, G. Don, Gen. Syst. iv. 365 = H. *mono-*
stachyum.
prostratum, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1 41)
 335, nomen = H. *prostratum*?
velutinum, Lehm. Asperif. 15 = H. *indicum*?

TIBOUCHINA, Aubl. Pl. Gui. i. 445. t. 177 (1775).
MELASTOMACEAE, [Benth. & Hook. f. i.
 743].

BRACEARIA, DC. ex Steud. Nom. ed. II. i. 222
 (1840).
CHAETOGASTRA, DC. Prod. iii. 131 (1828); Naud.
 in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 127.
DIPLOSTEGIUM, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv.
 (1823) 296.
HEPHESTIONIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii.
 (1849) 36.
LASIANDRA, DC. Prod. iii. 127 (1828).
MICRANTHELLA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.
 xiii. (1849) 347.
OREOCOSMUS, Naud. in Ann. l. c. 37 (1849).
PURPURELLA, Naud. in Ann. l. c. 301 (1849).
SAVASTANA, Scop. Introd. 213 (1777).
Ackermannii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 365.—
 Bras.
adenostemon, Cogn. l. c. 332.—Bras.
aegopogon, Cogn. l. c. 383.—Bras.
aemula, Cogn. l. c. 412.—Bras.
angustifolia, Cogn. l. c. 396.—Bras.
arborea, Cogn. l. c. 299.—Bras.
arenaria, Cogn. l. c. 329.—Bras.
Arstedii, Cogn. l. c. 297, sphalm. = *Oerstedii*.
aspera, Aubl. Pl. Gui. i. 446. t. 177.—Guian.;
 Bras.
asperior, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 366.—
 Bras.
australis, Cogn. l. c. 392.—Bras.
axillaris, Cogn. l. c. 396.—Bras.
barbiger, Baill. in Adansonia, xii. (1877) 75.—
 Bras.
Benthamiana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 391.
 —Bras.
Bergiana, Cogn. l. c. 316.—Bras.
bipenicillata, Cogn. l. c. 385.—Am. trop.
Blanchetiana, Cogn. l. c. 351.—Bras.
caldensis, Cogn. l. c. 306.—Bras.
Candolleana, Cogn. l. c. 339.—Bras.
canescens, Cogn. l. c. 298.—Bras.
cardinalis, Cogn. l. c. 371.—Bras.
cerastifolia, Cogn. l. c. 403.—Bras.
Chamissoana, Cogn. l. c. 349.—Bras.
cinerea, Cogn. l. c. 416.—Bras.
cisplatensis, Cogn. l. c. 407.—Bras.
Claussenii, Cogn. l. c. 310.—Bras.
clidemioides, Cogn. l. c. 398.—Bras.
clinopodifolia, Cogn. l. c. 411.—Bras.
collina, Cogn. l. c. 318.—Bras.
cordifolia, Cogn. l. c. 393.—Bras.
coronata, Cogn. l. c. 307.—Peruv.
corymbosa, Cogn. l. c. 363.—Bras.
cujabensis, Cogn. l. c. 382.—Bras.
debilis, Cogn. l. c. 401.—Bras.
decemcostata, Cogn. l. c. 331.—Bras.
dendroides, Cogn. l. c. 369.—Bras.
divaricata, Cogn. l. c. 397.—Bras.
dubia, Cogn. l. c. 415.—Bras.
Eichleri, Cogn. l. c. 370.—Bras.
elegans, Cogn. l. c. 323.—Bras.
estrellensis, Cogn. l. c. 342.—Bras.

TIBOUCHINA:—

exasperata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 377.—
 Bras.
fissinervia, Cogn. l. c. 343.—Bras.
floribunda, Cogn. l. c. 312.—Bras.
formosa, Cogn. l. c. 348.—Bras.
Fothergillae, Cogn. l. c. 320.—Bras.
foveolata, Cogn. l. c. 307.—Bras.
fragilis, Baill. Hist. Pl. vii. 7 = *Arthrostem* fragile.
Francavillana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 314.
 —Bras.
frigidula, Cogn. l. c. 328.—Bras.
Gardneri, Cogn. l. c. 334.—Bras.
Gardneriana, Cogn. l. c. 319.—Bras.
Gaudichaudiana, Baill. Hist. Pl. vii. 7. f. 9.—Bras.
Glazioviana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 325.—
 Bras.
gracilis, Cogn. l. c. 386.—Bras.
grandifolia, Cogn. l. c. 335.—Bras.
granulosa, Cogn. l. c. 340.—Bras.
grossa, Cogn. l. c. 297.—Am. trop.
herbacea, Cogn. l. c. 408.—Bras.
Herincquiana, Cogn. l. c. 399.—Bras.
heteromalla, Cogn. l. c. 336.—Bras.
hieracioides, Cogn. l. c. 389.—Bras.
hirsutissima, Cogn. l. c. 356.—Bras.
holosericea, Baill. Hist. Pl. vii. 34.—Bras.
hospita, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 417.—
 Bras.
hygrophila, Cogn. l. c. 413.—Bras.
inappendiculata, Baill. Adansonia, xii. (1877) 74 =
mollis.
intermedia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 367.—
 Bras.
Itatiaiae, Cogn. l. c. 414.—Bras.
Karstenii, Cogn. l. c. 381.—Venezuela; N. Granat.
Langsdorffiana, Baill. Hist. Pl. vii. 34.—Bras.
lasiophylla, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 297.—
 Guian.
lepidota, Baill. Adansonia, xii. (1877) 74.—Am.
 trop.
Lhotzkyana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 357.—
 Bras.
Lindeniana, Cogn. l. c. 347.—N. Granat.
longifolia, Baill. Adansonia, xii. (1877) 74.—Am.
 trop.
macrochiton, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 313.—
 Bras.
macrostachya, Baill. Hist. Pl. vii. 6 = *Heeria macro-*
stachya.
Martialis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 346.—
 Bras.
Martiusiana, Cogn. l. c. 327.—Bras.
Mathaei, Cogn. l. c. 380.—Peruv.
Maximiliana, Baill. Hist. Pl. vii. 34.—Bras.
melastomoides, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III.
 377.—Bras.
minor, Cogn. l. c. 390.—Bras.
minutiflora, Cogn. l. c. 415.—Bras.
mollis, Cogn. l. c. 349.—Am. trop.
Moricandiana, Baill. Adansonia, xii. (1877) 75.—
 Bras.
Mosenii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 393.—
 Bras.
multiceps, Cogn. l. c. 326.—Bras.
multiflora, Cogn. l. c. 333.—Bras.
multinervia, Baill. Adansonia, xii. (1877) 75 =
Macairea multiuvia.
mutabilis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 300.—
 Bras.
nervulosa, Cogn. l. c. 315.—Bras.
nitida, Cogn. l. c. 404.—Am. trop.
ochypetala, Baill. Adansonia, xii. (1877) 75.—Peruv.
Oerstedii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 297
 (Arstedii)—Am. centr.
organiensis, Cogn. l. c. 308.—Bras.
ornata, Baill. Adansonia, xii. (1877) 74.—Am.
 trop.
paleacea, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 373.—
 N. Granat.
pallida, Cogn. l. c. 316.—Bras.
papyrifera, Cogn. l. c. 378.—Bras.
parviflora, Cogn. l. c. 410.—Bras.
pauciflora, Cogn. l. c. 348.—Bras.
pogonanthra, Cogn. l. c. 381.—Bras.
pulchra, Cogn. l. c. 301.—Bras.
Raddiana, Cogn. l. c. 303.—Bras.
rediviva, Cogn. l. c. 399.—Bras.

TIBOUCHINA:—

Regeliana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 356.—
 Bras.
Regnellii, Cogn. l. c. 305.—Bras.
Reichardtiana, Cogn. l. c. 361.—Bras.
reticulata, Cogn. l. c. 298.—Ecuador.
Riedeliana, Cogn. l. c. 368.—Bras.
robusta, Cogn. l. c. 394.—Bras.
rotundifolia, Cogn. l. c. 370.—Bras.
Saldanhaei, Cogn. l. c. 302.—Bras.
salviaefolia, Cogn. l. c. 364.—Bras.
scaberrima, Cogn. l. c. 400.—Bras.
scrobiculata, Cogn. l. c. 341.—Bras.
sebastianopolitana, Cogn. l. c. 409.—Bras.
Sellowiana, Cogn. l. c. 304.—Bras.
semidecandra, Cogn. l. c. 309.—Bras.
setulosa, Cogn. l. c. 338.—Bras.
simplicicaulis, Cogn. l. c. 406.—Bras.
Spruceana, Cogn. l. c. 376.—Bras.
stenocarpa, Cogn. l. c. 344.—Bras.
sulcata, Cogn. l. c. 337.—Bras.
Thereminiana, Cogn. l. c. 310.—Bras.
trichopoda, Baill. Adansonia, xii. (1877) 75.—Bras.
tuberosa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 395.—Bras.
urceolaris, Cogn. l. c. 355.—Bras.
ursina, Cogn. l. c. 351.—Bras.
Urvilleana, Cogn. l. c. 358.—Bras.
Valtherii, Cogn. l. c. 317.—Bras.
velutina, Cogn. l. c. 350.—Bras.
versicolor, Cogn. l. c. 405.—Bras.
verticillaris, Cogn. l. c. 379.—Bras.
villosissima, Cogn. l. c. 330.—Bras.
viminea, Cogn. l. c. 359.—Bras.
virgata, Cogn. l. c. 365.—Bras.
Weddellii, Cogn. l. c. 311.—Bras.

TIBUCHINA, Jaime St. Hil. Expos. ii. 173 (1805) =
praec.

TICANTO, Adans. Fam. ii. 319 (1763) = **Caesalpinia**,
 Linn. (Legumin.).
Nuga, Medic. Theod. 52 = C. *Nuga*.

TICOREA, Aubl. Pl. Gui. ii. 689. t. 277 (1775).
RUTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 285.
OZOPHYLLUM, Schreb. Gen. 452 (1791).
aculeata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 85 = *Leea aculeata*.
foetida, Aubl. Pl. Gui. ii. 689. t. 277.—Guian.
longiflora, DC. in Mém. Mus. Par. ix. (1822) 146. t. 9.
 —Guian.
nitida, Presl, Symb. Bot. i. 28.—Am. austr.
pedicellata, DC. in Mém. Mus. Par. ix. (1822) 145.
 t. 8.—Guian.

TICOREA, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 132
 = **Galipea**, Aubl. (Rutac.).
bracteata, A. St. Hil. ex DC. Prod. i. 730 =
 G. *bracteata*.
febrifuga, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. x. (1823) 292
 = G. *multiflora*.
jasmiflora, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823)
 132; et in Mém. Mus. Par. x. (1823) 291 =
 G. *multiflora*.
simplicifolia, A. St. Hil. ex DC. Pròd. i. 730 =
 G. *simplicifolia*.

TIEDEMANNIA, DC. Mém. Ombell. 51. t. 12 (1829);
 et Prod. iv. 187 (1830) = **Peucedanum**, Tourn.
 (Umbell.).
teretifolia, DC. Prod. iv. 187 = P. *teretifolium*.

TIEDMANNIA, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 630 (1840),
 sphalm. = *praec.*

TIGAREA, Aubl. Pl. Gui. ii. 917. t. 350, 351 (1775) =
Doliocarpus, Roland. (Dillen.).
aspera, Aubl. l. c. 918 = *Tetracera aspera*.
dentata, Aubl. l. c. 920 = D. *Rolandri*.

TIGAREA, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 333. t. 15 (1814) =
Purshia, DC. (Rosac.).
tridentata, Pursh, l. c. = P. *tridentata*.

TIGLIUM, Klotzsch, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.
 i. (1843) 418 = **Croton**, Linn. (Euphorb.).
Klotzschianum, Wight, Ic. t. 1914 = C. *caudatus*.
officinale, Klotzsch, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.
 i. (1843) 418 = C. *Tiglium*.

TIGRIDIA, Juss. Gen. 57 (1789). *IRIDEAE*, Benth.

& Hook. f. iii. 690.

BEATONIA, Herb. in Bot. Mag. sub t. 3779 (1840).**PARDINIA**, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 66, in obs., partim.*atrata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 136.—Mexic.*augusta*, Drapiez, in Van-Geel, Sert. Bot. iv. (1832) t. 131; et ex C. Morr. Hort. Belg. v. (1838) 279. t. 110.—Mexic.*azurea*, Hort.—Cf. Fl. des Serres, ix. (1853–54) 139 = *Cypella plumbea*.*coelestis*, Hort. Berol.—Cf. l. c. = *Cypella plumbea*.*conchiflora*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. ii. t. 128 = *T. Pavonia*.*curvata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 136.—Mexic.*Dugesii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 375.—Mexic.*grandiflora*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 309 = *T. Pavonia*.*Herberti*, Herb. in Bot. Mag. t. 2599 = *Cypella Herberti*.*Herbertiana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 686 = *praec.**Houttei*, Roetzl, in Fl. des Serres, xxi. (1875) 49 (*Hydrotaeniae* sp.).—Mexic.*lutea*, Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Hort. Berol. 85. t. 34.—Chili; Peruv.*oxypetala*, R. Morris, Fl. Conspic. t. 20 = *T. Pavonia*.*Pavonia*, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 246; Pers. Syn. i. 50.—Mexic.*speciosa*, Poit. in Rev. Hort. Sér. II. ii. (1843–44) 447 = *T. Pavonia*.*Van-Houttei*, Roetzl, in Fl. des Serres, xxi. (1875) t. 2174 = *Houttei*.*violacea*, Schied. & Schlecht. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 233.—Mexic.**TILCO**, Adans. Fam. ii. 498 (1763) = **Fuchsia**, Plum. (Onagrar.).**TILCUSTA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 15 (1836) = **Tupistra**? Ker-Gawl. (Liliac.)*nepalensis*, Rafin. l. c. = *Tupistra aurantiaca*?**TILDENIA**, Miq. in Inst. Versl. en Med. 1842 (1843) 82 = **Peperomia**, Ruiz & Pav. (Piperac.).*mexicana*, Miq. l. c. 83 = *P. mexicana*.*peruviana*, Miq. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 483 = *P. umbilicata*.**TILESIA**, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 251 (1818) = **Wulfia**, Neck. (Compos.).*capitata*, G. F. W. Mey. l. c. 254 = *W. stenoglossa*.
spilanthoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 154 (= *Calydermos spilanthoides*).—Cuba.**TILESIA**, Thunb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 686 (1841), nomen = **Gladiolus**, Tourn. (Irid.).*incarnata*, Thunb. ex Steud. l. c., nomen = *G. incarnatus*?*spiralis*, Thunb. ex Steud. l. c., nomen = *G. tristis*.**TILIA**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). **TILIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. i. 236.**LINDNERA**, Reichb. Handb. 303 (1837).**TILIOIDES**, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 213.*acuminata*, Opiz, Seznam, 98 = *vulgaris*.*affinis*, Opiz, Natural. n. xi. (1826) 461 = *platyphyllos*.*alba*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 230.—Am. bor.*alba*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 3. t. 3 = *tomentosa*.*americana*, Duroi, Harbk. Baumz. ii. 467 = *alba*.*americana*, Linn. Sp. Pl. 514.—Am. bor.*angulata*, Hayne, ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 27 = *cordata*?*angulata*, Hayne, ex Bayer, l. c. 33 = *platyphyllos*.*apiculata*, Court. in Nouv. Mém. Acad. Brux. ix. (1835) n. vi. 15 = *platyphyllos*.*argentea*, Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 48 = *mandshurica*.*argentea*, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 150 = *tomentosa*.*asplenifolia*, Hort. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 41 = *platyphyllos*.*aurea*, Juegst. Fl. Westfalen, 194 = *platyphyllos*.**TILIA** :—*barbata*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 201 = *platyphyllos*, *vulgaris*, *cordata*.*begonia*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1846) i. n. 11. 326, in textu = *rubra*.*betulaefolia*, Hofm. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 23 = *cordata*.*bicuspidata*, Court. in Nouv. Mém. Acad. Brux. ix. (1835) n. vi. 13 = *platyphyllos*.*bohémica*, Opiz, Seznam, 97, in syn. = *cordata*.*bohémica*, Ortm. ex Nym. Consp. 131 = *platyphyllos*.*bohémica*, Rupr. Fl. Cauc. 255, 299 = *cordata*?*bracteolata*, Host, ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 25 = *cordata*.*canadensis*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 306 = *americana*.*caroliniana*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *americana*.*caucasica*, Rupr. Fl. Cauc. 253 (spp. plurim.).*cinerea*, Rafin. Alsog. Am. 46 (Quid ?).—Am. bor.*colchica*, Stev. ex Rupr. Fl. Cauc. 299 = *dasystyla*.*communis*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 875 = *platyphyllos*, *cordata*.*corallina* Sm. in Rees, Cycl. xxxv. n. 2 = *platyphyllos*, *cordata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1.—Europ.*cordifolia*, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 343 = *vulgaris*.*corinthiaca*, Bosc, Nouv. Cours Agric. xiii. 139 = *rubra*.*corylifolia*, Host, Fl. Austr. ii. 59 = *platyphyllos*.*corymbosa*, Ortm. in Opiz, Nom. 25 = *platyphyllos*.*crenata*, Rafin. Alsog. Am. 44 (Quid ?).—Am. bor.*dasystyla*, Loud. Arb. Brit. i. 366 = *euchlora*.*dasystyla*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) i. 260.—Oriens.*euchlora*, C. Koch, in Wochenschr. ix. (1866) 284; Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. i. 9.—Hab.?*europaea*, Linn. Sp. Pl. 514.—Cf. *platyphyllos*, *vulgaris*, *cordata*.*flaccida*, Host, ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 46 = *platyphyllos*.*flava*, Wolny, ex Rochel, Pl. Banat. Rar. 2, in textu = *platyphyllos*.*flavescens*, A. Br. in Doell, Rhein. Fl. 672 = *americana*.*flavescens*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 548 = *platyphyllos*?*floribunda*, A. Br. in Doell, Rhein. Fl. 672 = *americana*.*floribunda*, Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 58. t. 314 = *vulgaris*.*foemina*, Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 24 = *cordata*.*fulva*, Rafin. Alsog. Am. 45 (Quid ?).—Am. bor.*fuscata*, Rafin. l. c. 45 (Quid ?).—Am. bor.*glabra*, Vent. in Mém. Instit. Par. iv. An xi. [1803] 9. t. 2 = *americana*.*glauca*, Opiz, Alsog. Am. 45 (Quid ?).—Am. bor.*glauca*, Schwein. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 53 = *alba*.*grandifolia*, Ehrh. Beitr. v. 158 = *platyphyllos*.*grandifolia*, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 236 = *rubra*.*grandifolia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 687 = *languida*.*grata*, Salisb. Prod. 367 = *americana*.*heterophylla*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 480 = *americana*.*heterophylla*, Vent. in Mém. Instit. Par. iv. An xi. [1803] 16. t. 5 = *alba*.*Hoffmanniana*, Opiz, Seznam, 97 = *cordata*.*hollandica*, Duroi, ex Steud. Nom. ed. I. 837 = *americana*.*hollandica*, Herb. Petrop. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 30 = *cordata*.*hollandica*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 471 = *platyphyllos*.*Hostii*, Opiz, Seznam, 98 = *platyphyllos*.*hybrida*, [Behlan, in] Bechst. Forstb. ed. V. 161 = *vulgaris*.*inciso-dentata*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 480 = *americana*.*intermedia*, DC. Prod. i. 513 = *vulgaris*.*intermedia*, Host, Fl. Austr. ii. 61 = *platyphyllos*.*intermedia*, Tenore, Fl. Nap. iv. 309 = *cordata*.*laeta*, Salisb. Prod. 367.—Cf. *platyphyllos*, *vulgaris*, *cordata*.*languida*, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 220.—Hab.?*latebracteata*, Host, Fl. Austr. ii. 60 = *cordata*.*latifolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 472 = *platyphyllos*.**TILIA** :—*latifolia*, Salisb. Prod. 367 = *americana*.*laxiflora*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 306 = *americana*.*laxiflora*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 363 = *alba*.*leptophylla*, Hort. Berol. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 58 = *americana*.*longifolia*, Rafin. Alsog. Am. 44 (Quid ?).—Am. bor.*lucida*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 472 = *platyphyllos*.*macrocarpa*, Hort. ex C. Koch, l. c. 473 = *platyphyllos*.*macrophylla*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 687 = *alba*.*macrophylla*, Leveillé, in Demid. Voy. Russ. Mém. ii. 208 = *cordata*.*macropoda*, Court. in Nouv. Mém. Acad. Brux. ix. (1835) n. vi. 10 = *platyphyllos*.*mandshurica*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1856) 124.—Manchur.; Japon.*nellita*, Presl, ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 36 = *platyphyllos*.*mexicana*, Benth. Pl. Hartw. 35.—Mexic.*mexicana*, Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 377 = *americana*.*Michauxii*, Nutt. N. Am. Sylva, ed. II. i. 108 = *alba*.*microphylla*, Vent. in Mém. Instit. Par. iv. An xi. [1803] 5. t. i. f. 1 = *cordata*.*Miqueliana*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 434.—Japon.*mississippiensis*, Bosc, Encyc. Agric. vii. 748 = *americana*.*mollis*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 336; Ortm. ex Opiz, Nom. 22 = *platyphyllos*.*mongolica*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 433.—Mongolia; China.*multiflora*, Hort. ex Vent. in Mém. Instit. Par. iv. An xi. [1803] 12 = *americana*.*multiflora*, Ledeb. Fl. Ross. i. 442 = *dasystyla*.*mutabilis*, Host, Fl. Austr. ii. 60 = *platyphyllos*.*neglecta*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 341 = *americana*.*Nickertii*, Opiz, ex Nym. Consp. 131 = *platyphyllos*.*nigra*, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1219 = *americana*.*obliqua*, Opiz, Natural. n. xi. (1826) 462; Host, Fl. Austr. ii. 62 = *platyphyllos*.*obliquifolia*, Ortm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 687 = *platyphyllos*.*oblongata*, Court. in Nouv. Mém. Acad. Brux. ix. (1835) n. vi. 12 = *platyphyllos*.*officinarium*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 61; ed. II. 96 = *europaea*.*ovata*, Ortm. in Flora, xviii. (1835) 502 = *platyphyllos*.*oxycarpa*, Reichb. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 37 = *vulgaris*.*pallida*, Salisb. Prod. 367 = *alba*.*pallida*, Wierzb. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 58. t. 513 = *platyphyllos*.*pannonica*, Jacq. f. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 48 = *petiolaris*.*parviflora*, Boiss. Fl. Orient. i. 846, sphalm. = *seq.**parvifolia*, Ehrh. Beitr. v. 159; vii. 53 = *cordata*.*pauciflora*, Hayne, Arn. Gew. iii. t. 48 = *platyphyllos*.*peduncularis*, Delile, ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 58 = *alba*.*pekinensis*, Rupr. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 469 = *mandshurica*.*petiolaris*, DC. Prod. i. 514.—Hungar.*pilosa*, Presl, ex Ortm. in Flora, xviii. (1835) 501 = *platyphyllos*.*platyphylla*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 224 = *rubra*.*platyphyllos*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 6 = *dasystyla*.*platyphyllos*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 373.—Europ.*platyptera*, Court. in Nouv. Mém. Acad. Brux. ix. (1835) n. vi. 11 = *platyphyllos*.*Podhorsiana*, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 165, nomen.—Podolia.*polyantha*, Schur, Enum. Pl. Transs. 131 = *cordata*.*praecox*, A. Br. in Doell, Rhein. Fl. 673 = *americana*.*praecox*, Host, Fl. Austr. ii. 60 = *platyphyllos*.*Preslii*, Ortm. in Opiz, Nom. 24 = *platyphyllos*.*pubescens*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 229 = *americana*.*pubescens*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 472 = *platyphyllos*.*pyramidalis*, Host, Fl. Austr. ii. 61 = *platyphyllos*.*riparia*, Rafin. Alsog. Am. 45 (Quid ?).—Am. bor.*rotundifolia*, Vent. in Mém. Instit. Par. iv. An xi. [1803] 12. t. 4 = *tomentosa*.

TILIA :—

- rubra*, DC. *Cat. Hort. Monsp.* (1813) 150.—Tauria.
rugosa, Host, ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 22 = cordata.
semicuneata, Rupr. *Fl. Cauc.* 252, in textu.—Sibir.
septentrionalis, Rupr. *Fl. Ingr.* i. 219 = cordata.
serratifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 472 = platyphyllos.
sibirica, Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 23 = cordata.
speciosa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 472 = platyphyllos.
spectabilis, Host, ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 42 = platyphyllos.
sphaerocarpa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 473 = platyphyllos.
stenopetala, Rafin. *Fl. Ludov.* 92 = americana?
stipulata, Gilib. *Exercit.* i. 329 = platyphyllos, vulgaris, cordata.
sylvestris, Desf. *Tabl. ed. I.* 152 = cordata.
Teckiana, Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 25 = cordata.
tenuifolia, Host, *Fl. Austr.* ii. 61 = platyphyllos.
tomentosa, Moench, *Verzeich.* 137.—Europ.
translucens, Opiz, ex Nym. *Consp.* 131 = platyphyllos.
triflora, Puerari, in Hornem. *Hort. Hafn.* 493 = rubra.
triflora, Schrad. ex Bayer, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 40 = platyphyllos.
truncata, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* ii. (1834) 342 = americana.
Tučekii, Opiz, in *Lotos*, iv. (1854) 103 = platyphyllos.
turbinata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 473 = platyphyllos.
ulmifolia, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* i. 373 = cordata.
umbellata, Rafin. *Alsog. Am.* 46 (Quid?).—Am. bor.
variegata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 472 = platyphyllos.
vitifolia, Host, *Fl. Austr.* ii. 59 = platyphyllos.
vulgaris, Heyne, *Arzn. Gew.* iii. t. 47.—Europ.

- TILIACORA**, Colebr. in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 53. **MENISPERMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 36.
BAGALATTA, Roxb. ex Reichb. *Consp.* 86 (1828).
BRAUNEA, Willd. *Sp. Pl.* iv. 797 (1805), ex parte.
abnormalis, Miers, *Contrib.* iii. 78 = racemosa.
acuminata, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* vii. (1851) 39 = racemosa.
cuspidiformis, Miers, l. c. *Ser. III.* xiv. (1864) 254; *Contrib.* iii. 77 = racemosa.
fraternaria, Miers, *Contrib.* iii. 77 = racemosa.
funifera, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 44.—Afr. trop.
racemosa, Colebr. in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 67.—Ind. or.; Java.

- TILINGIA**, Regel & Tiling, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xi. (1859) 97 = *Selinum*, Linn. (Umbell.).
ajanensis, Regel & Tiling, l. c.—Sibir. or.

- TILIOIDES**, Medic. in *Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i.* (1791) 213 = *Tilia*, Tourn.

- TILLAEAE**, Mich. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735). **CRASSULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 657.
BULLIARDA, DC. in *Bull. Soc. Philom.* iii. (1801) n. 49. 1.
COMBESIA, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 307 (1847).
DISPOROCARPA, A. Rich. l. c. 307, in syn. (1847).
HELOPHYTUM, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 288 (1836).
MESANCHUM, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 320 (1867).
abyssinica, Walp. *Ann.* ii. 666 = aquatica.
adscendens, Nees, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 277 = Sieberiana.
alata, Viv. *Pl. Egypt.* Dec. 16 = pharnaceoides.
alsinoides, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 192.—Afr. trop.
andicola, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 720.—Chili.
angustifolia, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 558.—Am. bor.
aquatica, Lam. *Illustr.* i. 361 = Vaillantii.
aquatica, Linn. *Sp. Pl.* 128.—Europ.; Afr. trop.
aquatica, Schkuhr, in *Usteri, Ann. Bot.* ii. (1791) 21 = prostrata.
ascendens, Eaton, *Man. Bot. N. Am. ed. V.* 419 = simplex, Nutt.
brevifolia, Walp. *Rep.* ii. 251.—Afr. austr.
capensis, Linn. f. *Suppl.* 129.—Afr. austr.
chiloensis, C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 532.—Chili.

TILLAEAE :—

- Closiana*, C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 531.—Chili.
colorata, Nees, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 277 = Sieberiana.
connata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 70.—Ecuador; Peruv.
cyathiformis, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 687, sphalm. = *Tillandsia cyathiformis*.
cymosa, Nutt. *Gen. Am.* i. 110 = *Diamorpha pusilla*.
debilis, Colenso, ex Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 75.—N. Zel.
decumbens, Willd. *Sp. Pl.* i. 721.—Afr. austr.
diffusa, Willd. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 687 = connata.
Drummondii, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 558.—Am. bor.
Ecklonis, Walp. *Rep.* ii. 251.—Afr. austr.
elatinoides, Walp. l. c.—Afr. austr.
erecta, DC. *Prod.* iii. 406, in syn. = *Sedum caespitosum*.
erecta, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 24 = minima.
filiformis, Endl. ex Walp. *Rep.* ii. 252.—Afr. austr.
fluitans, Endl. l. c.—Afr. austr.
Hamiltonii, T. Kirk, ex W. Ham. in *Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 292.—N. Zel.
hexandra, Lapiere, in *Journ. Phys.* lvi. (1802) 358 = *Elatine hexandra*.
inanis, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 687 = capensis.
intricata, Nees, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 278 = recurva.
leptopetala, Benth. *Pl. Hartw.* 310 = minima.
macrantha, Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* t. 310.—Austral.
magellanica, Willd. ex Schult. *Mant.* iii. 345.—Reg. Magellan.
minima, Miers, *Trav.* ii. 530, nomen; et ex Hook. & Arn. in *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 338.—Chili; Calif.
moschata, DC. *Prod.* iii. 382.—N. Zel.; Ins. Antart.; Chili.
muscosa, Forst. f. *Prod.* 11 = Sieberiana.
muscosa, C. Gay, *Pl. Chil.* ii. 529 = minima.
muscosa, Linn. *Sp. Pl.* 129.—Europ.; Afr. bor.
Ovallei, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 719.—Chili.
paludosa, Schlecht. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 54.—Chili.
pedicellose, F. Muell. *Fragm.* xi. 118, in obs.—Austral.
peduncularis, Sm. in *Rees, Cycl.* xxxv. n. 4.—Bras.
pedunculata, Sieber, ex DC. *Prod.* iii. 382 = Sieberiana.
pedunculata, Willd. ex Schult. *Mant.* iii. 345.—Lusitan.
pentandra, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 222, nomen; et ex Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 50.—Ind. or.; Afr. trop.
perfoliata, Linn. f. *Suppl.* 129 = capensis.
pharnaceoides, Hochst. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 687, nomen; et ex Britten, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 387.—Afr. trop.
prostrata, Schkuhr, in *Usteri, Ann. Bot.* xii. (1794) 6.—Europ.?
purpurata, Hook. f. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 472.—Austral.
radicans, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 718.—Chili.
recurva, Hook. f. *Fl. Tasman.* i. 146.—Austral.
reflexa, Endl. ex Walp. *Rep.* ii. 252.—Afr. austr.
rubella, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 75 = *Bergia ammannioides*.
rubescens, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 43 = connata.
rubra, Linn. *Sp. Pl.* 129; Gouan, *Hort. Monsp.* 77 = *Sedum caespitosum*.
saginoideis, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvi. (1880) 473.—Soongar.
Sieberi, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 687, sphalm. = seq.
Sieberiana, Schult. *Mant.* iii. 345.—Am. austr.; Austral.; N. Zel.
simplex, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* i. (1817) 114.—Am. bor.
simplex, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 719.—Chili.
Sinclairii, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 62.—N. Zel.
Solierii, C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 530.—Chili.
subulata, Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 658, in obs.—Afr. trop. et austr.
trichopoda, Fenzl, ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 767 = pharnaceoides.

TILLAEAE :—

- trichotoma*, Walp. *Rep.* ii. 251.—Afr. austr.
umbellata, Willd. *Sp. Pl.* i. 721 = *Crassula umbellata*.
Vaillantii, Willd. l. c. 720.—Europ.; Afr. bor.
verticillaris, DC. *Prod.* iii. 382 = Sieberiana.
verticillaris, Hook. *Ic. Pl.* t. 295 = recurva.
verticillata, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 687, sphalm. = Sieberiana.

TILLANDSIA, Linn. *Syst. ed. I* (1735). **BROMELIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 669.

- ACANTHOSPORA*, Spreng. *Anleit.* ii. t. 255 (1817); *Syst.* ii. 25 (1825).
ALLARDTIA, A. Dietr. in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xx. (1852) 241.
AMALIA, Hort. *Hisp. ex Endl. Gen.* 183 (1837).
ANOPLOPHYTUM, Beer, in *Flora*, xxxvii. (1854) 346.
BONAPARTEA, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iii. 38 (1802).
DENDROPOGON, Rafin. *Neogenyt.* 3 (1825).
DIAPHORANTHEMA, Beer, in *Flora*, xxxvii. (1854) 349; Bromel. 153 (1857).
HEXALEPIS, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 24 (1836).
MISANDRA, F. G. Dietr. *Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr.* v. 102 (1819).
PHYTARRHIZA, Vis. in *Mem. Ist. Venet.* v. (1855) 340.
PITYROPHYLLUM, Beer, Bromel. 79 (1857).
PLATYSTACHYS, C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) App. 11; et Beer, Bromel. 80 (1857).
RENEALMIA, Linn. *Gen. ed. I.* 340 (1737).
STREPESIA, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 645 (1841).
VRIESIA, Lindl. *Bot. Reg.* (1843) t. 10.
WALLISIA, E. Morr. in *Belg. Hort.* xx. (1870) 97. t. 5.
acaulis, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1157 = *Cryptanthus undulatus*.
acrorifolia, Griseb. in *Goett. Nachr.* (1864) 19.—N. Granat.
acutifolia, Hort. *Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol.* i. 308, nomen (Quid?).—Hab.?
aëranthos, Desf. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 687 = *dianthoidea*.
aloides, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, vi. (1831) 55.—Mexic.
aloifolia, Hook. *Exot. Fl.* t. 205 = flexuosa.
amoena, Lodd. *Bot. Cab.* t. 76 = *Billbergia speciosa*.
anceps, Lodd. l. c. t. 771.—Ins. Trinit.
andicola, Gill. ex Baker, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 239.—Chili.
angustifolia, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 57.—Ind. occ.; Am. trop.
apicroides, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, vi. (1831) 55.—Mexic.
argentea, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 254.—Cuba.
argentea, C. Koch & J. Versch. in C. Koch, *Wochenschr.* xi. (1868) 163 = *tectorum*.
augusta, Vell. *Fl. Flum.* 135; iii. t. 135 = *Aechmea augusta*.
aurantiaca, Griseb. in *Goett. Nachr.* (1864) 16.—Am. trop.
axillaris, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 597 = complanata.
azurca, Presl, *Rel. Haenk.* i. 124.—Peruv.
Balbisia, Schult. f. *Syst.* vii. II. 1212.—Ind. occ.
Bartrami, Nutt. in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* v. (1822) 292 = *utriculata*.
Bartramii, Ell. *Sketch.* i. 379 = recurvata, setacea.
Benthamiana, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 263, nomen.—Mexic.
Berteroniana, Schult. f. *Syst.* vii. II. 1221 = *Catopsis nutans*.
bicolor, Brongn. in *Duperr. Voy. Coq. Bot.* 185. t. 36 = stricta.
biflora, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iii. 41.—Peruv.
bivittata, Linden, *Cat. n.* 17 (1862) 7; et Regel, *Gartenfl.* xiv. (1865) 2 = *Cryptanthus bivittatus*.
brachycaulos, Schlecht. in *Linnaea*, xviii. (1844) 422.—Mexic.
bracteata, Chapm. *Fl. S. U. St.* 471 = fasciculata.
bracteata, Vell. *Fl. Flum.* 132; iii. t. 125 = *Aechmea fasciata*?
bracteosa, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 263.—Ins. S. Doming.
breviscapa, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 265 = pruinosa.
bromeliaefolia, Rudge, *Pl. Gui.* 32. t. 50 = *Aechmea bromeliaefolia*.
bryoides, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 334.—Reg. Argent.
bulbosa, Hook. *Exot. Fl.* t. 173.—Am. trop.
caerulea, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 291.—Mexic.

TILLANDSIA:—

- caespitosa*, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 238 = retorta.
caespitosa, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 131 = setacea.
caespitosa, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 54.—Mexic.
calamifolia, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 270 = setacea.
calothyrsus, Poepp. ex Beer, Bromel. 263, nomen.—Peruv.
canescens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 57.—Jamaic.; Mexic.
capillaris, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 42.—Peruv.
capitata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 255.—Cuba.
capituligera, Griseb. l. c. 254.—Cuba.
Caput-Medusae, E. Morr. in Belg. Hort. xxx. (1880) 90.—Mexic.
Caraguata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1059 = Caraguata Berteroniana.
cinerascens, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1218 = disticha.
circinalis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 272 = Duratii.
circinnata, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 430 = streptophylla.
citrina, Burch. ex Baker, in Journ. Bot. xvii. (1879) 235.—Bras.
clavata, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1060 = Caraguata lingulata.
clavata, Lam. Encyc. i. 617 = Guzmanian tricolor.
coarctata, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 236 = bryoides.
coarctata, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1217 = floribunda.
coerulea, Auct. = caerulea.
comata, Vell. Fl. Flum. 136; iii. t. 140.—Bras.
Commelyna, E. Morr. in Belg. Hort. xx. (1870) 97 = Hamaleana.
comosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 598, 775 (Index) = Guzmanian tricolor.
compacta, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 18.—Venezuela.
complanata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 173.—N. Granat.
complanata, E. Morr. in Belg. Hort. xxii. (1872) 300. t. 23 = xiphostachys.
compressa, Bert. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1210.—Jamaic.
compressa, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 240 = Gilliesii.
concentrica, Vell. Fl. Flum. 134; iii. t. 133 (Nidularii sp.).—Bras.
consperpa, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 376.—Guian.
corallina, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1873) App. iv. 5.—Bras.
cordobensis, Hieron. Ic. Pl. Argent. 10 = recurvata.
crinita, Willd. ex Beer, Bromel. 152 = usneoides.
cyanca, E. Morr. in Belg. Hort. xxix. (1879) 297.—Guatemala.
cyathiformis, Vell. Fl. Flum. 137; iii. t. 144 (Canistri sp.).—Bras.
decumbens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 72 = Cyanotis papilionacea.
Deppeana, Steud. Nom. ed. II. ii. 688.—Mexic.
Devillea, Steud. l. c. = Caraguata Berteroniana.
dianthoidea, Rossi, Cat. Pl. Hort. Modet. 79. t. 1.—Bras.
discolor, Hort. ex Antoine, Bromel. 43 = Karatas purpurea.
dissitiflora, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 168.—Cuba.
distachia, Vell. Fl. Flum. 136; iii. t. 141 (Bilbergiae sp.).—Bras.
distachya, Baker, in Gard. Chron. (1880) 1. 200.—Honduras.
disticha, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 292.—Peruv.
disticha, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1226 = heliconioides.
divaricata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 174.—Ecuador.
Duratii, Vis. in Nuovi Sagg. Pador. v. (1841) 271.—Am. trop.
Ehrenbergiana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 320.—Mexic.
Ehrenbergii, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 264, nomen.—Mexic.
elongata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 293.—N. Granat.

VOL. II.

TILLANDSIA:—

- eminens*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 160 = bulbosa.
ensiformis, Vell. Fl. Flum. 133; iii. t. 129.—Bras.
erecta, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 239.—Chili.
erubescens, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 427.—Mexic.
erubescens, H. Wendl. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxii. (1854) 153 = ionantha.
erythraea, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 160 = bulbosa.
excelsa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 254 = dissitiflora.
excelsa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 597.—Ind. occ.
exsudans, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 50 = Aechmea exsudans.
farinosa, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1229, nomen (Quid?).—Hab.?
fasciculata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 56.—Am. bor.; Ind. occ.
Fendleri, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 17.—Venezuela.
fenestralis, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1878) 1. 440.—Hab.?
filifolia, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 53.—Mexic.
filiformis, Lodd. ex Schult. f. Syst. vii. 1229 = usneoides?
flavescens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 118 = vestita.
flexuosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 56.—Am. trop.
floribunda, Durat. ex Vis. in Nuovi Sagg. Pador. v. (1841) 271 = Duratii.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 292.—Peruv.
foliosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 597.—Am. trop.
foliosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 119.—Mexic.
fusca, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 240.—Peruv.
Gardneri, Lindl. Bot. Reg. (1842), sub t. 63.—Bras.
geminiflora, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 186.—Bras.
gigantea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 597 = T. Regina.
gigantea, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1224.—Bras.
gigantea, Ruchinger, Cat. (1876) = Duratii.
Gilliesii, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 240.—Chili.
gladioliflora, H. Wendl. in Hamb. Gartenz. xix. (1863) 31.—Am. centr.
globosa, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 222.—Bras.
glutinosa, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1225.—Bras.
gracilis, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 17 = procera.
gracilis, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 536, nomen (Quid?).—Ind. occ.
grandis, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 424.—Mexic.
Hamaleana, E. Morr. in Belg. Hort. xx. (1870) 97.—Ecuador.
haplostachya, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 169.—Cuba.
havanensis, Beer, Bromel. 85 = fasciculata.
heliconioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 293.—N. Granat.
heptandra, Poir. Encyc. vii. 671, sphalm. = seq.
heptantha, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 41.—Peruv.
heterophylla, E. Morr. in Belg. Hort. xxxiii. (1873) 138 = virginialis.
hieroglyphica, Bull. ex E. Morr. in Belg. Hort. xxxv. (1885) 57, in syn.—Bras.
humilis, Presl, Rel. Haenk. i. 125.—Chili.
imbricata, Vell. Fl. Flum. 134; iii. t. 131.—Bras.
inanis, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 159 = bulbosa.
incana, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 238 = virescens.
incana, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 223 = Gardneri.
incarnata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 291.—Am. trop.
incurva, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 15.—Venezuela.
incurvata, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 169 = Deppeana.
ionantha, Planch. in Fl. des Serres, x. (1854-55) 101. t. 1006.—Mexic.
ixioides, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 333.—Reg. Argent.

TILLANDSIA:—

- Jonghei*, C. Koch, Wochenschr. xi. (1868) 91.—Bras.
junceae, Poir. Encyc. Suppl. v. 309; Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 130 = setacea.
junceae, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 688 = Agave geminiflora.
juncifolia, Regel, Gartenfl. (1874) 321 = setacea.
Karwinskyana, Schult. f. Syst. vii. ii. 1209.—Mexic.
Kunthiana, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 53.—Mexic.
laevis, Vell. Fl. Flum. 133; iii. t. 126 = Pitcairnia australis?
Landbeckii, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 248 = recurvata.
lanuginosa, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 237 = propinqua.
latifolia, Meyen, Reise, ii. 45.—Peruv.
laxa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 596 = Valenzuelana.
laxa, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 18.—Ind. occ.; Venezuela.
Leiboldiana, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 414.—Mexic.
Lescaillei, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 167.—Cuba.
ligulata, Schult. f. Syst. vii. ii. 1220 = utriculata.
limbata, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 419 = flexuosa.
Lindenii, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. 1868 (1869) 92; E. Morr. in Belg. Hort. xix. (1869) 321, cum ic.—Peruv.
Lindeniana, Regel, Gartenfl. (1869) 193 = praec.
linearis, Vell. Fl. Flum. 133; iii. t. 128.—Bras.
lingulata, Bartr. Trav. ed. II. (1794) 59 = utriculata.
lingulata, Linn. Sp. Pl. 286 = Caraguata lingulata.
loliacea, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1204.—Bras.
longibracteata, Meyen, Reise, ii. 45 = purpurea.
Lorentziana, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 271.—Reg. Argent.
lorifolia, Lem. in Fl. des Serres, ii. (Mai, 1846) sub t. 4.—Bras.
macrocnemis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 332 = xiphioides.
macrostachya, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 264, nomen = polystachya.
maculata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 40.—Peruv.
Malzinei, Baker, in Kew Gard. Rep. (1878) 59.—Mexic.
monostachya, Linn. Sp. Pl. ed. II. 410 = Guzmanian tricolor.
monostachya, Bartr. Trav. ed. II. (1794) 59 = recurvata, setacea, utriculata.
monostachys, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 239 = recurvata.
Morelliana, Hort. ex Henfrey, in Moore & Ayres, Gard. Mag. Bot. iii. (1851) 33 = Billbergia vittata.
Moritziana, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 265, nomen.—Venezuela.
Morreniana, Regel, Gartenfl. (1870) 41 = Lindenii.
musaica, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1874) ii. 49 = musaica.
mucronata, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 20.—Venezuela.
multicaulis, Steud. Nom. ed. II. ii. 688 = caespitosa.
multiflora, Benth. Bot. Voy. Sulph. 174.—Ecuador.
musaica, Linden & André, in Illustr. Hort. xx. (1873) 171 = Caraguata musaica.
myosura, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 333.—Reg. Argent.
Nappii, Lor. & Niederl. in Roca, Exped. Rio-Negro, ii. 282.—Patagon.
narthecioides, Presl, Rel. Haenk. i. 125.—Ecuador.
nitida, Hook. Exot. Fl. t. 218 = Catopsis nitida.
nutans, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 56 = Catopsis nutans.
Nuttalliana, Schult. f. Syst. vii. ii. 1220 = utriculata.
obscura, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 119, nomen (Quid?).—Am. austr.
Osyana, Hort. Belg. ex C. Koch, in Belg. Hort. xii. (1862) 127.—Hab.?
paleacea, Presl, Rel. Haenk. i. 125.—Chili.
paniculata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 410.—Ins. S. Doming.
paniculata, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 54 = Deppeana.
parviflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 41.—Peruv.
patens, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1229 = flexuosa.
paucifolia, Baker, in Gard. Chron. (1878) ii. 748 = bulbosa.
pendula, Thunb. ex Gaertn. f. Fruct. iii. 13.—Hab.?
penduliflora, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 597.—Ins. Dominic.

6 Y

TILLANDSIA :—

- pinifolia*, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 131 = setacea.
pitiphylla, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1208 = pulchra.
platynema, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 19.—Am. trop.
pleiosticha, Griseb. l. c.—Venezuela.
polystachia, Linn. Sp. Pl. ed. II. 410.—Ind. occ.
polystachia, Vell. Fl. Flum. 136; iii. t. 138 = Aechmea brasiliensis.
polystachya, Jacq. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 595 = fasciculata.
polystachya, Muhl. Cat. ed. I. 34 = utriculata.
polytrichoides, E. Morr. in Belg. Hort. xxx. (1880) 240 = bryoides.
procera, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1224.—Bras.
propinqua, C. Gay, Fl. Chil. vi. 15.—Chili.
pruinosa, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 594.—Ind. occ.; Venezuela.
Pseudo-ananas, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 853 = Freycinetia insignis.
psittacina, Hook. Bot. Mag. t. 2841.—Bras.
pulchella, Hook. Exot. Fl. ii. t. 154 = seq.
pulchra, Hook. l. c. t. 154. in textu.—Am. trop.
pumila, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 16.—Venezuela.
pumila, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850–51) 160 = bulbosa.
punctulata, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 53.—Mexic.
purpurea, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 41.—Peruv.
purpurea, Spreng. Neue Entdeck. i. 251 = Sprengeliana.
pusilla, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 237.—Chili.
quadrangularis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 119.—Mexic.
ramealis, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1121, nomen.—Guian.
ramosa, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii. (1883) 121.—Porto Rico.
ramosa, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 425 = utriculata.
rectangula, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 238.—Reg. Argent.
recurvata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 410.—Am. trop.
recurvifolia, Hook. Bot. Mag. t. 5246 = dianthoidea.
Regina, Vell. Fl. Flum. 136; iii. t. 142.—Am. trop.
retorta, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 334.—Reg. Argent.
rigida, Gill. ex Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 239 = erecta.
rigida, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 425, nomen (Quid ?)—Ind. occ.
ringens, Griseb. Cat. Pl. Cub. 255.—Cuba.
robusta, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 15.—Venezuela.
Roezli, E. Morr. in Belg. Hort. xxvii. (1877) 272. t. 15.—Peruv.
rosea, Lindl. Bot. Reg. t. 1357 = dianthoidca.
rubida, Lindl. l. c. (1842) t. 63 = gcmiflora.
rubra, Hort. ex Antoine, Bromel. 43 = Karatas purpurca.
rubra, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 40.—Peruv.
Saundersii, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1873) App. iv. 6.—Bras.
saxatilis, Vell. Fl. Flum. 136; iii. t. 139.—Bras.
Schiedeana, Steud. Nom. ed. II. ii. 688 = vestita.
Schuchii, Bcr & Fenzl, in Allg. Gartenz. xiv. (1846) 266 = Pitcairnia albiflos.
scoparia, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1217 = straminea.
secunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 294.—Ecuador.
Selloa, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1873) App. iv. 7 = setacea.
serrata, Linn. Sp. Pl. 286 (sp. dub.).—Ind. occ.
sessiliflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 42 (Catopsidis sp.).—Am. trop.
setacea, Hook. Bot. Mag. t. 3275 = compressa.
setacea, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 593.—Am. trop.
simplex, Vell. Fl. Flum. 133; iii. t. 130.—Bras.
sordida, Salisb. Prod. 247 = Caraguata lingulata.
spiculosa, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 17.—Venezuela.
spiculosa, Schlecht. ex E. Morr. in Belg. Hort. xxix. (1879) 57 (Quid ?)—Mexic.
splendens, Brongn. in Fl. des Serres, ii. (Mai, 1846) t. 4.—Guian.
Sprengeliana, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 266, nomen.—Bras.

TILLANDSIA :—

- squamulosa*, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1209 = caerulea.
staticiflora, E. Morr. in Belg. Hort. xxi. (1871) 177. t. 12 = filifolia.
straminea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 292.—Peruv.
streptophylla, Scheidw. in Hort. Belge, iii. (1836) 252.—Mexic.
striata, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1209 = incarnata.
stricta, Lindl. Bot. Reg. t. 1338 = dianthoidea.
stricta, Soland. ex Sims, Bot. Mag. t. 1529.—Bras.
strobilantha, Poir. Encyc. Suppl. v. 309.—Peruv.
suaveolens, Lem. in Fl. des Serres, ii. (Mai, 1846) sub t. 4.—Reg. Argent.
subulata, Vell. Fl. Flum. 132; iii. t. 127 = stricta.
tectorum, E. Morr. in Belg. Hort. xxvii. (1877) 328. t. 18.—Peruv.
tenuifolia, Bert. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1212 = Balbisiana.
tenuifolia, Jacq. Select. Am. 92. t. 63 = flexuosa.
tenuifolia, Linn. Sp. Pl. 286, partim = setacea.
terminalis, Vell. Fl. Flum. 137; iii. t. 143 (Nidularii sp.).—Bras.
tessellata, Linden, Cat. (1873) 9; Illustr. Hort. (1873) 78; (1874) 123. t. 179.—Bras.
tetrantha, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 39.—Peruv.
tetrestachia, Vell. Fl. Flum. 135; iii. t. 137.—Bras.
tortilis, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 266 = pruinosa.
tortuosa, Lodd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1229, nomen (Quid ?)—Hab. ?
trichoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 290 = usneoides.
tricholpis, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 237.—Bolivia.
tricolor, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 54 = punctulata.
triflora, Vell. Fl. Flum. 134; iii. t. 134.—Bras.
triglochinoides, Presl, Rel. Haenk. i. 125.—Ecuador.
tuberosa, Vell. Fl. Flum. 135; iii. t. 136 = Dyckia rariflora.
Unca, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 273.—Reg. Argent.
undulata, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 240.—Paraguay.
uniflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 290 = recurvata.
unispicata, Vell. Fl. Flum. 132; iii. t. 124 = Aechmea nudicaulis.
usneoides, Linn. Sp. Pl. ed. II. 411.—Am. bor. et austr.
utriculata, Linn. l. c. ed. I. 286.—Ind. occ.
Valenzuelana, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 267.—Cuba.
variabilis, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 418.—Mexic.
variegata, Schlecht. l. c. 429.—Mexic.
variegata, Vell. Fl. Flum. 134; iii. t. 132.—Bras.
ventricosa, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 19.—Venezuela.
ventricosa, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 222.—Bras.
vestita, Benth. Pl. Hartw. 25 = Benthamiana.
vestita, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 52.—Mexic.
vestita, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. ii. 1228 = Aechmea bromeliaefolia.
viminalis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 323.—Costa Rica.
violacea, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 266.—Venezuela.
virescens, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 43.—Peruv.
virginalis, E. Morr. in Belg. Hort. xxx. (1880) 238.—Mexic.
viridiflora, Hort. ex Antoine, Bromel. 21 = viminalis.
vitellina, Link, Klotzsch & Otto, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 81.—Venezuela.
vittata, Linden, ex Beer, Bromel. 43.—Hab. ?
xiphoides, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 105.—Am. trop.
xiphostachys, Griseb. in Goett. Nachr. (1864) 14.—Mexic.
Zahnii, Hort. Veitch, ex Hook. f. Bot. Mag. sub t. 6059 = Caraguata Zahnii.

TILLEA, Sanguin. in Att. Acc. Pont. Lincei, Ser. I. v. (1852) 506, sphalm. = *Tillaea*, Mich. (Crassul.).

TILLIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 173 = praec.

TIMAEOSIA, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 138. t. 33. (1862) = *Gypsophila*, Linn. (Caryoph.).
cerastioides, Klotzsch, l. c. 138 = *G. cerastioides*.
rupestris, Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 217, sphalm. = praec.

TIMANDRA, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 197 = *Croton*, Linn. (Euphorb.).
dichotoma, Klotzsch, l. c. - *C. dichotomus*.
erythroxyloides, Klotzsch, l. c. = *C. erythroxyloides*.
serrata, Klotzsch, l. c. = *C. serratus*.

TIMANTHEA, Salisb. Prod. 208 (1796) = *Baltimora*, Linn. (Compos.).
tristis, Salisb. l. c. = *B. recta*.

TIMBALIA, Clos, in Bull. Soc. Bot. Fr. xviii. (1871) 178 = *Crataegus*, Tourn. (Rosac.).
Pyracantha, Clos, l. c. = *C. Pyracantha*.

TIMBULETA, Staud. Nom. ed. II. ii. 688 (1841), err. typ. = *SIMBULETA*, Forsk. = *Anarrhinum*, Desf. (Scrophul.).

TIMEROYA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 10 (1880), sphalm. = seq.

TIMEROYEA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 247. *NYCTAGINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 10.
VIELLARDIA, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 375.
artensis, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 247.—N. Caled.

TIMMIA, J. F. Gmel. Syst. 524, 538 (1791) = *Cyrtanthus*, Ait. (Amaryll.).
angustifolia, J. F. Gmel. l. c. = *C. angustifolius*.
obliqua, J. F. Gmel. l. c. = *C. obliquus*.

TIMONIUS, Rumph. Amboin. iii. 216. t. 140 (1743); DC. Prod. iv. 461 (1830). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 102.
BURNEYA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 189, partim.
ERITHALIS, Forst. f. Prod. 17 (1786).
EUPYRENA, Wight & Arn. Prod. 422 (1834).
HELOSPORA, Jack, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1823) 127. t. 4. f. 3.
NELTRIS, Gaertn. Fruct. i. 134. t. 27 (1788).
POLYPHRAGMON, Desf. in Mém. Mus. Par. vi. (1820) 5. t. 2.
POROCARPUS, Gaertn. Fruct. ii. 473. t. 178 (1791).
PYROSTRIA, Roxb. Hort. Beng. 83 (1814); Fl. Ind. i. 388 (1832).
acuminatus, Wall. Cat. n. 6218 = *Urophyllum Blumeum*.
affinis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 36.—Ins. Fiji.
Finlaysonianus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 127.—Singapore.
flavescens, Baker, Fl. Maurit. 144.—Ins. Seychelles.
Forsteri, DC. Prod. iv. 461.—Ins. Societ.
fuscus, Walp. Ann. ii. 765 = *Bobea fusca* (in Addend.).
Gaudichaudii, DC. Prod. iv. 461.—Ins. Sandvic.
Jambosella, Thw. Enum. Pl. Syst. 153 = *Koenigii*.
Koenigii, Blume, ex Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. ii. (1851) 211.—Malaya.
mutabilis, Walp. Ann. ii. 765.—Borneo.
platycarpus, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 221.—N. Caled.
putaminosus, F. Muell. Fragm. iv. 92 (= *Guetardella putaminosa*).—Austral.
Rumphii, DC. Prod. iv. 461.—Malaya.
sapotaeifolius, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 35.—Ins. Fiji.

TINA, Blume, Bijdr. 235 (1825) = *Harpullia*, Roxb. (Sapind.).
rupestris, Blume, l. c. = *H. cupanioides*.

TINA, Roem. & Schult. Syst. v. p. xxxii. 414 (1819) = *Ratonia*, DC. (Sapindac.).
cupanioides, DC. Prod. i. 614 = *Cupania laevis*, T. *Gelonium*.
dasyrca, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 663.—Madag.
fulwinervis, Radlk. l. c. 662.—Madag.
Gelonium, Roem. & Schult. Syst. v. 414.—Madag.

TINA:—

isoneura, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 663.—Madag.
madagascariensis, DC. Prod. i. 614 = *T. Gelonium*.
madagascariensis, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 662 = *Garuga madagascariensis*.
polyphylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 335.—Madag.
striata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 663.—Madag.
trijuga, Radlk. l. c. 662.—Madag.

TINAEA, Boiss. Fl. Orient. v. 58 (1884), sphalm. = TINEA, Bivona = *Habenaria*, Willd. (Orchid.).

TINAEA, Garzia, in Rel. Acc. Zel. Aci-Reale, Ann. 3-4. 24; ex Parl. Fl. Palerm. i. 138 (1845) = *Lamarkia*, Moench (Gramin.).
elegans, Garzia, ex Parl. l. c. 139 = *L. aurea*.

TINANTIA, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 240 = *Senkenbergia*, Schau. (Nyctag.).
gypsophiloides, Mart. & Gal. l. c. = *S. annulata*.

TINANTIA, Schiedw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vii. (1839) 365. *COMMELINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 853.

POGOMESIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 67 (1836), nomen prius.
anomala, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 287.—Mexic.
erecta, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 185 = *fugax*.
fugax, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vii. (1839) 365.—Am. trop.
latifolia, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 184 = *fugax*.
lineolata, Hassk. Pl. Jav. Rar. 98 = *Aneilema herbaceum*.
Sprucei, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 287.—Bras.
undata, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 185 = *fugax*.

TINEA, Bivona, in Giorn. Sc. Sicil. (1833) 149 = *Habenaria*, Willd. (Orchid.).
cylindrica, Bivona, l. c. = *H. intacta*.
intacta, Boiss. Fl. Orient. v. 58 = *H. intacta*.

TINEA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 165 (1821) = *Prockia*, Linn. (Tiliac.).
triplinervia, Spreng. l. c. = *P. Crucis*.

TINGUARRA, Parl. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 156. t. 71 (1836-50). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 896.
cerviariaefolia, Parl. l. c. 157.—Ins. Canar.
montana, Benth. & Hook. f. Gen. i. 897.—Ins. Canar.
sicula, Benth. & Hook. f. l. c.—Sicil.

TINIARIA, Reichb. Handb. 236 (1837) = *Polygonum*, Tourn.
alata, Montand. Guide Bot. 270 = *P. dumetorum*.
carinata, Montand. l. c. = *P. Convolvulus*.
Convolvulus, Webb & Moq. in Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 221 = *P. Convolvulus*.
dumetorum, Opiz, Seznam, 98 = *P. dumetorum*.

TINNEA, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 25. t. 11 (1867). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1220.
RENSCHIA, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880-82) 94.
aethiopica, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 25. t. 11.—Afr. trop.
antiscorbutica, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 58.—Afr. trop.
erianthera, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880-82) 539.—Afr. trop.
ericalyx, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 59.—Afr. trop.
heterotypica, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 69.—Afr. trop.

TINNETHAMNUS, Pritz. Ic. Ind. ii. 273 (1865) = *prae*.

TINNIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 (Quid?).

TINOMISCIMUM, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 44. *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 34.
coriaceum, Miers, l. c. = *petiolare*.
elasticum, Becc. Malesia, i. (1877) 141.—N. Guin.
javanicum, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiii. (1864) 490.—Java.
petiolare, Miers, l. c. Ser. II. vii. (1851) 44.—Malaya.
phytorenoides, Kurz, ex Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 36.—Sumatra.
pyrrhobotryum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 81.—Java.

TINOSPORA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 38. *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 34.
arfakiana, Becc. Malesia, i. (1877) 140.—N. Guin.
Bakis, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 38; et Ser. III. xiii. (1864) 322.—Afr. trop.
convolvulacea, Miers, l. c. Ser. II. vii. (1851) 38 = *cordifolia*.
cordifolia, Miers, l. c.—Ind. or.
crispa, Miers, l. c.—Java.
flavescens, Miers, l. c. = *Cocculus flavescens*.
glauca, Miers, l. c. = *Cocculus glaucus*.
Hullsii, F. Muell. Fragm. v. 147.—Austral.
lacunosus, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 38 = *Anamirta paniculata*.
malabarica, Miers, l. c.—Ind. or.
nudiflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 392.—Ind. or.
palminervis, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiii. (1864) 317.—Burma.
reticulata, Miers, l. c. 321.—Ins. Philipp.
smilacina, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 52.—Austral.
sumatrana, Becc. Malesia, i. (1877) 139.—Sumatra.
tenera, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiii. (1864) 322.—Afr. trop.
tomentosa, Miers, l. c. Ser. II. vii. (1851) 38.—Ind. or.; Burma.
uliginosa, Miers, l. c. Ser. III. xiii. (1864) 321.—Malaya.
Walcottii, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 56.—Austral.

TINUS, Linn. Syst. ed. X. 1010 (1759) = *Clethra*, Gronov. (Ericac.).
occidentalis, Linn. l. c. = *C. tinifolia*.
Volckameria, Crantz, Inst. ii. 376 = *C. tinifolia*.

TINUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735) = *Viburnum*, Linn. (Caprif.).
laurifolius, Borkh. in Roem. Arch. i. ii. (1797) 20 = *V. Tinus*.
rugosus, Spach, Hist. Vég. Phan. viii. 317 = *V. rigidum*.

TIPALIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) = *Zanthoxylum*, Linn. (Rutac.).
Limonella, Dennst. l. c. = *Z. Rhetsa*.

TIPHA, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 376 (1768) = *Typha*, Linn.

TIPHOGETON, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789) = *Ludwigia*, Linn. (Onagrar.).

TIPUANA, Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 72. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 546.
heteroptera, Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 72.—Bras.
macrocarpa, Benth. l. c.—Bras.
speciosa, Benth. l. c.—Am. austr.

TIPULARIA, Nutt. Gen. Am. ii. 195 (1818). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 497.
ANTHERICLIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195; et in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 261.
PLECTRURUS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
camtschatica, Spreng. Syst. iii. 734.—Kamtschat.
discolor, Nutt. Gen. Am. ii. 195.—Am. bor.
Josephi, Reichb. f. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 174.—Reg. Himal.

TIQUILIA, Pers. Syn. i. 157 (1805) = *Coldenia*, Linn. (Borag.).
brevifolia, Nutt. ex Torr. in Bot. Mex. Bound. 136 = *C. Nuttallii*.
dichotoma, Pers. Syn. i. 157 = *C. dichotoma*.
oregana, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 411. t. 12 = *C. Nuttallii*.
parvifolia, Nutt. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 296 = *C. Nuttallii*.

TIRASEKIA, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 563 (1839), sphalm. = JIRASEKIA, F. W. Schmidt = *Anagallis*, Tourn. (Primul.).

TIRICTA, Rafin. New Fl. Am. iv. 22 (1836) = *Daucus*, Tourn. (Umbell.).
daucoides, Rafin. l. c. 23 = *D. Carota*.

TIRTALIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 71 (1836) = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.).
anceps, Rafin. l. c. = *I. Turpethum*.
angustifolia, Rafin. l. c. = *I. angustifolia*, Jacq.
dissecta, Rafin. l. c. = *I. sinuata*.
domingensis, Rafin. l. c. = *I. sidaefolia*.
emarginata, Rafin. l. c.—Hab.?
filicaulis, Rafin. l. c. = *I. angustifolia*, Jacq.
gemella, Rafin. l. c. = *I. obscura*, Ker-Gawl.
hispida, Rafin. l. c. = *I. eriocarpa*.
macrorrhiza, Rafin. l. c. = *I. macrorrhiza*.
malabarica, Rafin. l. c. = *Argyrea malabarica*.
maxima, Rafin. l. c. = *I. sepiaria*.
pandurata, Rafin. l. c. = *I. fastigiata*.
quinqueloba, Rafin. l. c. = *I. palmata*.
sibirica, Rafin. l. c. = *I. sibirica*.
striata, Rafin. l. c. = *I. sepiaria*.
triflora, Rafin. l. c. = *I. sepiaria*?
triqueter, Rafin. l. c. = *I. Turpethum*.
umbellata, Rafin. l. c. = *I. umbellata*, Linn.
vitifolia, Rafin. l. c. = *I. vitifolia*.

TIRUCALLA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 112 (1836) = *Euphorbia*, Tourn.
indica, Rafin. l. c. = *E. Tiruculli*.

TISSA, Adans. Fam. ii. 507 (1763) = *Spergularia*, J. & C. Presl (1819) (Caryoph.).

TITA, Scop. Introd. 219 (1777) = *Cassipourea*, Aubl. (Rhizoph.).

TITANIA, Endl. Prod. Fl. Norf. 31 (1833) = *Oberonia*, Lindl. (Orchid.).
miniata, Endl. l. c. = *O. Titania*.

TITELBACHIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126, sphalm. = TITTELBACHIA, Klotzsch = *Begonia*, Tourn.

TITHONA, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Rivina*, Plum. (Phytolac.).

TITHONIA, Desf. ex Juss. Gen. 189 (1789); et in Ann. Mus. Par. i. (1802) 49. t. 4. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 374.
angustifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 435 = *Viguiera buddleiaeformis*.
argophylla, Eaton, in Bot. King's Exp. 423 = *Helianthella argophylla*.
aristata, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 114.—Costa Rica.
calva, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 305 = *Gymnolomia calva*.
decurrens, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 85 = *Viguiera decurrens*.
diversifolia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 5.—Mexic.
excelsa, DC. Prod. v. 585 = *Viguiera excelsa*.
glutinosa, Collie, ex Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 33 = *Helianthus thurifer*.
helianthoides, Weinm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 689 = *tubaeformis*.
heterophylla, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 9.—Am. centr.
ovata, Hook. Bot. Mag. t. 3901 = *Zexmenia ovata*.
pachycephala, DC. Prod. v. 585 = *Viguiera pachycephala*.
platylepis, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 368 = *Gymnolomia platylepis*.

TITHONIA:—

- pusilla*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 124.—Peruv.
recurrens, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 176, sphalm. = *Viguiera decurrens*.
scaberrima, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 91 = *Gymnolomia platylepis*.
scabra, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 375.—Hab.?
speciosa, Hook. ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Mexic.
splendens, Hort. Rendatler, ex Planch. in Fl. des Serres, viii. (1852) 19 = *Dysodia grandiflora*.
tagetiflora, Desf. in Ann. Mus. Par. i. (1802) 46. t. 4.—Mexic.
Thurberi, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 655.—Mexic.
tubaeformis, Cass. in Dict. Sc. Nat. liv. 456.—Mexic.
tubaeformis, A. Gray, in Bot. Mex. Bound. 90 = *Thurberi*.
uniflora, J. F. Gmel. Syst. 1259 = *tagetiflora*?

TITHONIA, Raeusch. Nom. ed. III. 251 (1797) = **Rudbeckia**, Linn. (Compos.).
laciniata, Raeusch. l. c. = *R. laciniata*.

TITHYMALOPSIS, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 249 = **Euphorbia**, Linn.
angustifolia, Klotzsch & Garcke, l. c. = *E. discoidalis*.
corollata, Klotzsch & Garcke, l. c. = *E. corollata*, Linn.
sphaerorrhiza, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 44 = *E. sphaerorrhiza*.

TITHYMALUS, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 189 (1742) = **Euphorbia**, Linn.
acalyphoides, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 38 = *E. acalyphoides*.
acenocarpus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 79 = *E. akenocarpa*.
acicularis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 156 = *E. Cyparissias*.
acutifolius, Lam. Fl. Fr. iii. 90 = *E. Pithyusa*.
Adrianus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 73 = *E. Adriana*.
agovensis, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 38 = *E. agowensis*.
agrarius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 89 = *E. agraria*.
aleppicus, Klotzsch & Garcke, l. c. 84 = *E. aleppica*.
alpinus, Klotzsch & Garcke, l. c. 70 = *E. alpina*.
altaicus, Klotzsch & Garcke, l. c. 79 = *E. altaica*.
altissimus, Klotzsch & Garcke, l. c. 80 = *E. altissima*.
amplexicaulis, Klotzsch & Garcke, l. c. = *E. condyllocarpa*.
amygdaloides, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. amygdaloides*.
Anacampseros, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 86 = *E. Anacampseros*.
andrachnoides, Klotzsch & Garcke, l. c. 88 = *E. subcordata*.
angulatus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115; Klotzsch & Garcke, l. c. 77 = *E. angulata*.
angustifolius, Gilib. Fl. Lituan. ii. 209 = *E. Cyparissias*.
Antiquorum, Moench, Meth. 665 = *E. Antiquorum*.
aphyllus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 82 = *E. aphylla*.
apiculatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 94 = *E. epicyparissias*.
Apios, Hill, Hort. Kew. 173/3 = *E. Apios*.
arboreus, Lam. Fl. Fr. iii. 94 = *E. dendroides*.
arkansanus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 66 = *E. dictyosperma*.
arvalis, Klotzsch & Garcke, l. c. 82 = *E. arvalis*.
asperus, Klotzsch & Garcke, l. c. 78 = *E. aspera*.
atropurpureus, Klotzsch & Garcke, l. c. 80 = *E. atropurpurea*.
atro-sanguineus, Klotzsch & Garcke, l. c. 70 = *E. portulacoides*.
attenuatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 69 = *E. elliptica*.
Aucheri, Klotzsch & Garcke, l. c. 93 = *E. Aucheri*.
aulacospermus, Klotzsch & Garcke, l. c. 82 = *E. aulacosperma*.
auriculatus, Lam. Fl. Fr. iii. 102 = *E. Peplis*.
azoricus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 98 = *E. Pinea*.
balsamiferus, Haw. Syn. Pl. Succ. 140 = *E. balsamifera*.

TITHYMALUS:—

Bergii, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 68 = *Euphorbia elliptica*.
biglandulosa, Haw. Syn. Pl. Succ. 141 = *E. biglandulosa*.
biumbellatus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 85 = *E. biumbellata*.
blepharophyllus, Klotzsch & Garcke, l. c. 73 = *E. blepharophylla*.
brachypus, Klotzsch & Garcke, l. c. 74 = *E. mauritanica*.
bracteatus, Haw. Syn. Pl. Succ. 138 = *Pedilanthus bracteatus*.
Brauni, Schweinf. in Journ. Bot. i. (1863) 295 = *E. longetuberculosa*.
Bridgesii, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 70 = *E. portulacoides*.
buchtormensis, Klotzsch & Garcke, l. c. 79 = *E. buchtormensis*.
bupleurifolius, Haw. Syn. Pl. Succ. 138 = *E. bupleurifolia*.
caesius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 87 = *E. Esula*.
Cajogalus, Moench, Meth. 667 = *E. Gerardiana*.
calendulaefolius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 74 = *E. angulata*.
calyculatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 81 = *E. calyculata*.
campester, Klotzsch & Garcke, l. c. 86 = *E. campestris*.
capensis, Klotzsch & Garcke, l. c. 98 = *E. striata*.
cardiophyllus, Klotzsch & Garcke, l. c. 78 = *E. cardiophylla*.
carniolicus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115; Klotzsch & Garcke, l. c. 77 = *E. carniolica*.
Cassia, Klotzsch & Garcke, l. c. 67 = *E. Cassia*.
cebrinus, Klotzsch & Garcke, l. c. 86 = *E. cerebrina*.
Chamaesyce, Moench, Meth. 666 = *E. Chamaesyce*.
Characias, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. Characias*.
cheiradenius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 98 = *E. cheiradenia*.
Chesneyi, Klotzsch & Garcke, l. c. 99 = *E. Chesneyi*.
chilensis, Klotzsch & Garcke, l. c. 67 = *E. portulacoides*.
chrysophyllus, Klotzsch & Garcke, l. c. 72 = *E. chrysophylla*.
cinerascens, Moench, Meth. 668 = *E. segetalis*.
Clementei, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 76 = *E. Clementei*.
cognatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 66 = *E. pilosa*.
collinus, Klotzsch & Garcke, l. c. 93 = *E. collina*.
commutatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 82 = *E. commutata*.
condylocarpus, Klotzsch & Garcke, l. c. 78 = *E. condylocarpa*.
confertus, Klotzsch & Garcke, l. c. 94 = *E. ericoides*.
consanguineus, Klotzsch & Garcke, l. c. 64 = *E. consanguinea*.
coralloides, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. coralloides*.
cotinifolius, Haw. Syn. Pl. Succ. 141 = *E. cotinifolia*.
craspedius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 87 = *E. craspedia*.
crispus, Haw. Rev. Pl. Succ. 61 = *E. elliptica*.
cuneifolius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 76 = *E. cuneifolia*.
Cupani, Klotzsch & Garcke, l. c. 85 = *E. Cupani*.
cyatophorus, Moench, Meth. 667 = *E. heterophylla*.
cybirensis, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 79 = *E. cybirensis*.
Cyparissias, Hill, Hort. Kew. 172/4, sphalm. = seq.
Cyparissias, Lam. Fl. Fr. iii. 96 = *E. Cyparissias*.
damascenus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 96 = *E. tinctoria*.
declinatus, Moench, Meth. Suppl. 284 = *E. portulacoides*.
deflexus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 84 = *E. deflexa*.
dendroides, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. dendroides*.
densus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 65 = *E. densa*.
denticulatus, Moench, Meth. 668 = *E. spinosa*.
depauperatus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 79 = *E. depauperata*.
desertorum, Klotzsch & Garcke, l. c. 97 = *E. desertorum*.
diffusus, Lam. Fl. Fr. iii. 101 = *E. spinosa*.
dilatatus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 89 = *E. dilatata*.

TITHYMALUS:—

discolor, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 97 = *Euphorbia Esula*.
divergens, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 114 = *E. Rothiana*.
dracunculoides, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 84 = *E. dracunculoides*.
dulcis, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 334 = *E. dulcis*.
dumosus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 70 = *E. thamnoides*.
Eckloni, Klotzsch & Garcke, l. c. 68 = *E. pistiaefolia*.
Elliotii, Klotzsch & Garcke, l. c. 67 = *E. Ipecacuanha*.
ellipticus, Klotzsch & Garcke, l. c. 69 = *E. elliptica*.
epicyparissias, Klotzsch & Garcke, l. c. 88 = *E. epicyparissias*.
epithymoides, Klotzsch & Garcke, l. c. 79 = *E. epithymoides*.
eriophorus, Klotzsch & Garcke, l. c. 65 = *E. eriophora*.
erubescens, Klotzsch & Garcke, l. c. 96 = *E. macrostegia*.
erythradenius, Klotzsch & Garcke, l. c. 86 = *E. erythradenia*.
erythrinus, Klotzsch & Garcke, l. c. 91 = *E. erythrina*.
erythronon, Klotzsch & Garcke, l. c. 87 = *E. erythronon*.
erythrorrhizus, Klotzsch & Garcke, l. c. 71 = *E. erythrorrhiza*.
Esula, Hill, Hort. Kew. 172/4; Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 338 = *E. Esula*.
esulaeformis, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 84 = *E. campestris*.
exiguus, Lam. Fl. Fr. iii. 100 = *E. exigua*.
falcatus, Klotzsch & Garcke, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 292; et in Abh. Akad. Berl. (1860) 83 = *E. falcata*.
Fendleri, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 85 = *E. Fendleri*?
firmus, Klotzsch & Garcke, l. c. 73 = *E. Gerardiana*.
flaccidus, Moench, Meth. 665 = *E. mauritanica*.
foliosus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 67 = *E. dumosa*.
fragiferus, Klotzsch & Garcke, l. c. 79 = *E. fragifera*.
fruticosus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 206 = *E. palustris*.
fruticosus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 78 = *E. Bivonae*.
furcillatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 86 = *E. furcillata*.
Gaillardoti, Klotzsch & Garcke, l. c. 74 = *E. Gaillardoti*.
galilaeus, Klotzsch & Garcke, l. c. 83 = *E. falcata*.
Gayi, Klotzsch & Garcke, l. c. 88 = *E. Gayi*.
genistoides, Klotzsch & Garcke, l. c. 97 = *E. genistoides*.
Gerardi, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = seq.?
Gerardianus, Steud. Nom. ed. II. ii. 689; Klotzsch & Garcke, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 291 = *E. Gerardiana*.
glaberrimus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 95 = *E. iteophylla*.
glaucus, Moench, Meth. Suppl. 282 = *E. Moenchiana*.
gracilis, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 92 = *E. Esula*.
graecus, Klotzsch & Garcke, l. c. 84 = *E. graeca*.
granulatus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. granulata*.
Guyonians, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 82 = *E. Guyoniana*.
hebecarpus, Klotzsch & Garcke, l. c. 88 = *E. hebecarpa*.
helioscopius, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. helioscopia*.
herniariaefolius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 87 = *E. herniariaefolia*.
heterophyllus, Haw. Syn. Pl. Succ. 141 = *E. heterophylla*.
hiberna, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. hyberna*.
himalayensis, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 115 = *E. himalayensis*.
hirsutus, Lam. Fl. Fr. iii. 98 = *E. pilosa*.
Hochstetterianus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 97 = *E. monticola*.
Hohenackeri, Klotzsch & Garcke, l. c. 91 = *E. Orphanidis*.
huachanhanus, Klotzsch & Garcke, l. c. 71 = *E. huachanhana*.
humilis, Klotzsch & Garcke, l. c. 67 = *E. humilis*.
hybernus, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. hyberna*.
imbricatus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 73 = *E. imbricata*.
indierensis, Klotzsch & Garcke, l. c. 65 = *E. pygmaea*.
involutus, Klotzsch & Garcke, l. c. 91 = *E. involutatus*, *E. Mey.*

TITHYMALUS:—

- Ipecacuanhae*, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 69 = *Euphorbia Ipecacuanha*.
ispahanicus, Klotzsch & Garcke, l. c. 89 = *E. megalantha*.
Kotschyana, Klotzsch & Garcke, l. c. 96 = *E. Kotschyana*.
laetus, Haw. Syn. Pl. Succ. 140 = *E. dendroides*.
Lagascae, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 65 = *E. Lagascae*.
lateriflorus, Klotzsch & Garcke, l. c. 81 = *E. osyridea*.
Lathyris, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. Lathyris*.
latifolius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 89 = *E. latifolia*.
laurocerasifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Pedilanthus padifolius*.
leptaleus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 65 = *E. graminea*.
linearis, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. linearis*.
linifolius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 81 = *E. spinosa*.
linifolius, Lam. Fl. Fr. iii. 95 = *E. Esula*.
literatus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. platyphyllos*?
longepetiolatus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 68 = *E. elliptica*.
lucidus, Klotzsch & Garcke, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 292; et in Abh. Akad. Berl. (1860) 89 = *E. Lucida*.
lutescens, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 80 = *E. lutescens*.
macroceras, Klotzsch & Garcke, l. c. 95 = *E. macroceras*.
macrocladus, Klotzsch & Garcke, l. c. 97 = *E. tinctoria*.
macrorrhizus, Klotzsch & Garcke, l. c. 79 = *E. macrorhiza*.
maculatus, Moench, Meth. 666 = *E. maculata*.
maritimus, Lam. Fl. Fr. iii. 90 = *E. Paralias*.
Marschallianus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 86 = *E. Marschalliana*.
mauritanicus, Haw. Syn. Pl. Succ. 139 = *E. mauritanica*.
medicagineus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 83 = *E. medicaginea*.
megalanthus, Klotzsch & Garcke, l. c. 91 = *E. megalantha*.
melapetalus, Klotzsch & Garcke, l. c. 81 = *E. melapetala*.
melliferus, Moench, Meth. Suppl. 282 = *E. mellifera*.
Meyeri, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 75 = *E. erubescens*.
micrantha, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 (Quid?).—Hab.?
microsciadus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 74 = *E. striatella*.
microsphaerus, Klotzsch & Garcke, l. c. 74 = *E. microsphaera*.
monticolus, Klotzsch & Garcke, l. c. 87 = *E. bounophila*.
multicaulis, Klotzsch & Garcke, l. c. 98 = *E. sclerophylla*.
Myrsinitis, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. Myrsinites*.
myrtifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *Pedilanthus tithymaloides*.
nevadensis, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 90 = *E. nevadensis*.
nicaeensis, Klotzsch & Garcke, l. c. 89 = *E. nicaeensis*.
notadaeniensis, Klotzsch & Garcke, l. c. 78 = *E. orientalis*.
nudiflorus, Haw. Syn. Pl. Succ. 142 = *E. nudiflora*.
nummularis, Lam. Fl. Fr. iii. 101 = *E. Chamaesyce*.
oblongifolius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 96 = *E. amygdaloides*.
obtusatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 69 = *E. obtusata*.
obtusifolius, Klotzsch & Garcke, l. c. 74 = *E. obtusifolia*.
orientalis, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. orientalis*.
ovatus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 97 = *E. ovata*.
pachyrrhizus, Klotzsch & Garcke, l. c. 69 = *E. pachyrrhiza*.
Pallasii, Klotzsch & Garcke, l. c. 75 = *E. Pallasii*.
palustris, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. palustris*.
panaceus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 84 = *E. Terracina*.
paniculatus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. corollata*?
papillosus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 77 = *E. Duvallii*.
Paralias, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. Paralias*.
Paralias, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 338 = *E. Gerardiana*.

TITHYMALUS:—

- parulus*, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 93 = *Euphorbia arvalis*.
pendulus, Haw. Syn. Pl. Succ. 138 = *E. pendula*.
Peplis, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 340 = *E. Peplis*.
peplodes, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 83 = *E. peplodes*.
Peplus, Gaertn. Fruct. ii. 115 = *E. Peplus*.
persepolitanus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 74 = *E. striatella*.
Pestalozzae, Klotzsch & Garcke, l. c. 87 = *E. Pestalozzae*.
petiolaris, Haw. Syn. Pl. Succ. 141 = *E. petiolaris*.
Petitianus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 96 = *E. cerebrina*.
Philippianus, Klotzsch & Garcke, l. c. 65 = *E. Philippiana*.
pictus, Haw. Syn. Pl. Succ. 143 = *E. graminea*.
pilosus, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. pilosa*.
piluliferus, Moench, Meth. Suppl. 283 = *E. pilulifera*.
pinus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 85 = *E. pinea*.
piscatorius, Haw. Syn. Pl. Succ. 139 = *E. piscatoria*.
Pithyusa, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 335 = *E. Pithyusa*.
platyphyllos, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = seq.?
platyphyllos, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. platyphyllos*.
plebejus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 86 = *E. plebeia*.
polycaulis, Klotzsch & Garcke, l. c. 97 = *E. decipiens*.
portlandicus, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. portlandica*.
procerus, Klotzsch & Garcke, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 291 = *E. pilosa*.
prunifolius, Haw. Syn. Pl. Succ. 143 = *E. geniculata*.
pterococcus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 72 = *E. pterococca*.
pumilus, Klotzsch & Garcke, l. c. 87 = *E. herniariaefolia*.
puniceus, Haw. Syn. Pl. Succ. 140 = *E. punicea*.
purpureus, Lam. Fl. Fr. iii. 98 = *E. Characias*.
pygmaeus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 84 = *E. pygmaea*.
Rapulum, Klotzsch & Garcke, l. c. 67 = *E. Rapulum*.
Regis-Jubae, Klotzsch & Garcke, l. c. 93 = *E. Regis-Jubae*.
repandus, Haw. Syn. Pl. Succ. 142 = *E. repanda*.
repens, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 96 = *E. repens*.
repetitus, Klotzsch & Garcke, l. c. 96 = *E. repetita*.
retusus, Klotzsch & Garcke, l. c. 83 = *E. sulcata*.
Reuterianus, Klotzsch & Garcke, l. c. 83 = *E. Reuteriana*.
revolvulus, Klotzsch & Garcke, l. c. 99 = *E. corifolia*.
rosea, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. rosea*?
Rothianus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 89 = *E. Rothiana*.
rotundifolius, Lam. Fl. Fr. iii. 100 = *E. Peplus*.
rupestris, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 73 = *E. rupestris*.
rupestris, Lam. Fl. Fr. iii. 97 = *E. Gerardiana*.
rupicolus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 78 = *E. rupicola*.
sagittalis, Hill, Hort. Kew. 172/3, sphalm. = *E. segetalis*.
salicifolius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 89 = *E. salicifolia*.
saxatilis, Klotzsch & Garcke, l. c. 91 = *E. saxatilis*.
Schimperianus, Klotzsch & Garcke, l. c. 96 = *E. Schimperiana*.
schizoceras, Klotzsch & Garcke, l. c. 98 = *E. tinctoria*.
Schottii, Klotzsch & Garcke, l. c. 70 = *E. Schottiana*.
segetalis, Lam. Fl. Fr. iii. 90 = *E. segetalis*.
Seguieri, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 335 = *E. nicaeensis*.
Selloi, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 66 = *E. elodes*.
semiperfoliatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 95 = *E. semiperfoliata*.
serotina, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 = *E. nicaeensis*?
serratus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 207 = *E. Helioscopia*.
serratus, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. serrata*.
sessiliflorus, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 77 = *E. oblongata*.
silenifolius, Haw. Rev. Pl. Succ. 61 = *E. elliptica*.
sororius, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 65 = *E. sororia*.
spinus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115; Klotzsch & Garcke, l. c. 77 = *E. spinosa*.
squamosus, Klotzsch & Garcke, l. c. 78 = *E. aspera*.
stenophyllus, Klotzsch & Garcke, l. c. 66 = *E. stenophylla*.
striatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 86 = *E. striatella*.

TITHYMALUS:—

- strictus*, Klotzsch & Garcke, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 290 = *Euphorbia stricta*.
subamplexicaulis, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 69 = *E. subamplexicaulis*.
subcordatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 88 = *E. subcordata*.
subcrenatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 66 = *E. portulacoides*.
sylvaticus, Hill, Hort. Kew. 172/4 = *E. amygdaloides*.
sypsiensis, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 97 = *E. tinctoria*.
Szovitsii, Klotzsch & Garcke, l. c. 65 = *E. Szovitsii*.
taurinensis, Klotzsch & Garcke, l. c. 83 = *E. taurinensis*.
tenuifolius, Klotzsch & Garcke, l. c. 92 = *E. tenuifolia*.
Terracinus, Klotzsch & Garcke, l. c. 90 = *E. Terracina*.
Thwaitesii, Klotzsch & Garcke, l. c. 92 = *E. Rothiana*.
trapezoidalis, Klotzsch & Garcke, l. c. 96 = *E. Terracina*.
trichotomus, Klotzsch & Garcke, l. c. 81 = *E. trichotoma*.
trinervius, Klotzsch & Garcke, l. c. 85 = *E. boetica*.
tristis, Klotzsch & Garcke, l. c. 92 = *E. Esula*.
truncatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 75 = *E. erubescens*.
tuberosus, Hill, Hort. Kew. 173/3 = *E. tuberosa*.
Tuckeyanus, C. Bolle, ex Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 93 = *E. Tuckeyana*.
Turczaninowii, Klotzsch & Garcke, l. c. 64 = *E. Turczaninowii*.
undulatus, Klotzsch & Garcke, l. c. 92 = *E. undulata*.
uniflorus, Haw. in Phil. Mag. x. (1831) 418 = *E. uniflora*.
variabilis, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 90 = *E. variabilis*.
venetus, Klotzsch & Garcke, l. c. 95 = *E. Wulfenii*.
verrucosus, Hill, Hort. Kew. 172/3 = *E. cybirensis*.
verrucosus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 (Quid?).—Hab.?
virgatus, Haw. Syn. Pl. Succ. 139 = *E. obtusifolia*.
virgatus, Klotzsch & Garcke, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 292; et in Abh. Akad. Berl. (1860) 88 = *E. virgata*.
Welwitschii, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 77 = *E. Welwitschii*.
Zeyheri, Klotzsch & Garcke, l. c. 71 = *E. mauritanica*.

TITRAGYNE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 9 (1866) = **Rohdea**, Roth (Liliac.).
japonicum, Salisb. l. c. = *R. japonica*.

TITTELBACHIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 126 (Titebachia); et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 105. t. 10 A = **Begonia**, Tourn.
albiflora, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 126 = *B. albiflora*.
castaneaefolia, Klotzsch, l. c. = *B. castaneaefolia*.
complicata, Hassk. Hort. Bogor. Desc. 342 = *B. Ottonis*.
fuchsoides, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 126; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 106 = *B. fuchsoides*.
Hamiltoniana, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 45 = *B. acuminata*.
miniata, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 126; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 106 = *B. fuchsoides*.

TITTMANNIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 385. t. 38. **BRUNIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 671.

MOESSLERA, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. p. 1. (1827); Consp. 160 (1828).
lateriflora, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 386.—Afr. austr.
laxa, Presl, Bot. Bemerk. 32 = *lateriflora*.

TITTMANNIA, Reichb. Ic. Bot. Exot. i. 27. t. 38 (1824) = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).
alsinoides, Spreng. Syst. ii. 800 = *V. alsinoides*.
angustifolia, Benth. in Wall. Cat. n. 3951 = *V. angustifolia*.
Colsmanni, Benth. l. c. n. 3950 = *Bonnaya veronicaefolia*.
elata, Benth. l. c. n. 3944 = *V. elata*.
erecta, Benth. l. c. n. 3947 = *V. erecta*.
grandiflora, Benth. l. c. n. 3949 = *V. pedunculata*.
grandiflora, Spreng. Syst. ii. 801 = *Ilysanthes grandiflora*.
hirta, Benth. in Wall. Cat. n. 3948 = *V. mollis*.

TITTMANNIA:—

monticola, Spreng. Syst. ii. 800 = *Ilysanthes refracta*.
obovata, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 49 = *Mazus rugosus*.
ovata, Benth. in Wall. Cat. n. 3942 = *Vandellia hirsuta*.
ovata, Reichb. Ic. Bot. Exot. i. 27 = *V. crustacea*.
pusilla, Benth. in Wall. Cat. n. 3945 = *V. scabra*.
scabra, Spreng. Syst. ii. 800 = *V. crustacea*.
scapigera, Spreng. l. c. = *V. scapigera*.
stachydifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii. 156 = *V. stachydifolia*.
subulata, Spreng. Syst. ii. 801 = *V. subulata*.
sulcata, Wight, ex Wall. Cat. n. 3946 = *V. scabra*.
trichotoma, Benth. in Wall. Cat. n. 3943 = *V. multiflora*.
viscosa, Reichb. Ic. Bot. Exot. i. 26. t. 38 = *V. hirsuta*.

TITYRUS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 101 (1866) =

Narcissus, Tourn. (Amaryll.).
bifrons, Salisb. l. c. = *N. Tazetta*.
compressus, Salisb. l. c. = *N. compressus*.
Jonquilla, Salisb. l. c. = *N. Jonquilla*.
primulaceus, Salisb. l. c. = *N. Tazetta*.
similis, Salisb. l. c. = *N. Jonquilla*.

TIUM, Medic. in Vorles. Churf. Phys. Ges. ii. (1787) 373 = *Astragalus*, Tourn. (Legumin.).
hians, Moench, Meth. 162 = *Oxytropis deflexa*.
lineare, Moench, l. c. = *A. sulcatus*.
sulcatum, Medic. in Vorles. Churf. Phys. Ges. ii. (1787) 374 = *A. sulcatus*.

TOANABO, DC. Prod. i. 528 (1824), sphalm. =
 TAONABO, Aubl. = *Ternstroemia*, Linn. f.

TOBINIA, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 56 (1825) = *Zanthoxylum*, Linn. (Rutac.).
acuminatum, Desv. l. c. 57 = *Z. acuminatum*.
coriacea, Desv. l. c. = *Z. coriaceum*.
emarginata, Desv. l. c. = *Z. emarginatum*.
punctata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 137 = *Z. punctatum*.
spinosa, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 57 = *Z. spinosum*.
ternata, Desv. l. c. = *Z. ternatum*.

TOCOCA, Aubl. Pl. Gui. i. 437. t. 174 (1775).

MELASTOMACEAE, Benth. & Hook. f. i. 764.
 HAPPIA, Neck. Elem. ii. 126 (1790).
 SPHAEROGYNE, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 331.
acuminata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 94. — N. Granat.
aristata, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 305. — Guian.
Aubletii, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 304 = *guianensis*.
barbata, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 305 = *guianensis*.
bullifera, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 165. — Bras.
bullifera, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 132, partim = *occidentalis*.
cardiophylla, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 91. — Bras.
castrata, Naud. l. c. 93 = *subnuda*.
ciliata, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 133. — Bras.
cinnamomea, Triana, l. c. — Bras.
cordata, Berg, ex Triana, l. c. — Bras.
coriacea, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 3. — Honduras.
coronata, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 303. — Am. trop.
didymophysca, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 90 = *formicaria*.
egensis, Naud. l. c. 92. — Bras.
erythrostachya, Spruce, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 132 = *bullifera*.
formicaria, Mart. ex DC. Prod. iii. 165. — Bras.
formicata, Steud. Nom. ed. II. ii. 689, sphalm. = *praec.*
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 438. t. 174. — Am. trop.
heterophylla, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 305 = *Calophysa heterophylla*.
hirsuta, Steud. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 132 = *formicaria*.
hirta, Berg, ex Triana, l. c. — Venezuela.
lanata, D. Don, ex Loud. Hort. Brit. 174. — Ins. Trinit.
lancifolia, Spruce, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 133. — Bras.

TOCOCA:—

latifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 90. — Bras.
macrophysca, Spruce, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 132. — Bras.
macrophylla, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 94. — Bras.
macrosperma, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 148. t. 279 = *Myrmidone macrosperma*.
Mayeta, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 305 = *Maieta guianensis*, Poeppigii.
nitens, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 133 = *Weddellii*.
occidentalis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 92. — Peruv.
orcheophora, Naud. l. c. 89. — Boliv.
parviflora, Spruce, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 132. — Peruv.
pauciflora, Spruce, ex Triana, l. c. 131. — Bras.
planifolia, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 305. — Am. trop.
platyphylla, Benth. Pl. Hartw. 181. — Am. trop.
pubescens, Benth. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 133 = *coronata*.
Roraimae, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 305 (*Koreini*) = *guianensis*.
sanguinea, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 305 = *Miconia hispidiissima*.
scabriuscula, Benth. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 133 = *planifolia*.
spadiciflora, Triana, l. c. 132. — N. Granat.
stephanotricha, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 95. — Bras.
subciliata, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 133. — Bras.
subnuda, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 303. — Guian.
truncata, Benth. l. c. 304. — Bras.
vesiculosa, DC. Prod. iii. 166 = *Calophysa vesiculosa*.
Weddellii, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 94. — Bras.

TOCOYENA, Aubl. Pl. Gui. i. 131. t. 50 (1775).

RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 83.
 JOCA YENA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 82.
 UCRIANA, Willd. Sp. Pl. i. 961 (1797).
acutiflora, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 82. — Bras.
brasiliensis, Mart. l. c. — Bras.
bullata, Mart. l. c. 80. — Bras.
foetida, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 25. t. 129. — Bras.
havanensis, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 8 = *Posoqueria havanensis*.
hirsuta, Moric. ex DC. Prod. iv. 375; et in Pl. Nouv. Am. 85. t. 56. — Bras.
insignis, Roem. & Schult. Syst. v. 229 = *Posoqueria latifolia*.
latifolia, Lam. Illustr. ii. 259 = *Posoqueria latifolia*.
longiflora, Aubl. Pl. Gui. i. 131. — Guian.
longifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 411. — N. Granat.
longifolia, Poir. Encyc. vii. 692 = *longiflora*.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 412 = *Posoqueria latifolia*.
microdon, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 82. — Bras.
Mutisii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 411. — N. Granat.
scandens, Blume, Bijdr. 980 = *Randia longiflora*.
speciosa, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 107. — Guian.
velutina, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 81. — Bras.
viscidula, Mart. l. c. 80. — Bras.

TODAROA, Parl. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 155. t. 74 (1836–50). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 900.
aurea, Parl. l. c. — Ins. Canar.
montana, Webb, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 897, in obs. = *Tinguarra montana*.

TODAROA, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 28 = *Campylocentron*, Benth. (Orchid.).
micrantha, A. Rich. & Gal. l. c. = *C. Schiedei*.

TODDALIA, Juss. Gen. 371 (1789). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 300.

ASAPHES, DC. Prod. ii. 90 (1825).
 ASPIDOSTIGMA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 18.
 BOSCIA, Thunb. Prod. Pl. Cap. 32 (1794).
 CRANZIA, Schreb. Gen. 143 (1789).
 DIPETALUM, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 38.
 DUNCANIA, Reichb. Consp. 197 (1828).
 RUBENTIA, Boj. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475 (1841).
 SCOPOLIA, Sm. Ic. Ined. ii. t. 34 (1790).
 TECLEA, Delile, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 90.
 VEPRI, Comm. ex A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 509.
aculeata, Pers. Syn. i. 249. — Ind. or.; Malaya; Ins. Mascar.
ambigua, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 444. — Ins. Philipp.
angustifolia, Lam. Illustr. ii. 117 = *aculeata*?
asiatica, Lam. l. c. 116 = *aculeata*.
bilocularis, Wight & Arn. Prod. 149. — Ind. or.
efusa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 443. — Ins. Philipp.
floribunda, Wall. Pl. As. Rar. iii. 17. t. 232 = *aculeata*.
inermis, Pers. Syn. i. 249 = *paniculata*.
lanceolata, Lam. Illustr. ii. 117. — Afr. trop.; Ins. Maurit.
megapotamica, G. Don, Gen. Syst. i. 805. — Bras.
micrantha, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 672, sphalm. = *seq.*
micrantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 690. — Java.
mitis, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 492 = *Zanthoxylum ovalifolium*.
natalensis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 447. — Afr. austr.
nitida, Lam. Mlustr. ii. 116 = *aculeata*.
nobilis, Hook. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 306. — Afr. trop.
paniculata, Lam. Illustr. ii. 117. — Ins. Mascar.
pilosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 329. — Madag.
rubicaulis, Roem. & Schult. Syst. v. 323 = *aculeata*.
schmidelioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 118. — Madag.
venosa, G. Don, Gen. Syst. i. 805. — Bras.
Willdenowii, Steud. Nom. ed. II. ii. 690. — Ins. Mascar.

TODDA-PANA, Adans. Fam. ii. 25 (1763) = *Cycas*, Linn.

TOECHIMA, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 501, 671. *SAPINDACEAE*.
Daemelianum, Radlk. l. c. 672. — Austral.
erythrocarpum, Radlk. l. c. 671. — Austral.
subteres, Radlk. l. c. — N. Guin.
tenax, Radlk. l. c. = *Ratonia tenax*.

TOFFIELDIA, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 94, sphalm. = *seq.*

TOFIELDIA, Pers. Syn. i. 399 (1805) = *seq.*

TOFIELDIA, Huds. Fl. Angl. ed. II. 157 (1778).
LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 828.
 CONRADIA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).
 CYMBA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 117 (1867).
 HEBELIA, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 117 (1806).
 HERITERIA, Schrank, Baier. Fl. i. 133 (1789).
 ISIDROGALVIA, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 69. t. 302 (1802).
 LEPTILIX, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).
 TRIANTHA, Nutt. Gen. Am. i. 235 (1818).
allemanica, Bluff & Finger. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 478 = *calyculata*.
alpina, Hoppe & Sternb. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 152 = *palustris*.
alpina, Sm. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 24 = *calyculata*.
anthericoides, Roth, Enum. Pl. Phaen. i. II. 109 = *calyculata*.
borealis, Wahlenb. Fl. Lapp. 89 = *palustris*.
calyculata, Wahlenb. l. c. 90, in obs. — Europ.; Am. bor.
capitata, Hoppe, ex Michl. in Flora, iii. (1820) 314 = *palustris*.

TOFIELDIA :—

- cernua*, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 244.—Sibir.
coccinea, Richards. in *Frankl. Narr.* 1st Journ. App. 786 = calyculata.
collina, Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 581 = calyculata.
falcata, Pers. Syn. i. 399.—Peruv.
flexuosa, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 28 = falcata.
frigida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 267 = falcata.
glaberrima, Macbride, ex Ell. Sketch, i. 424 = glabra.
glabra, Nutt. Gen. Am. i. 235.—Am. bor.
glacialis, Gaud. Fl. Helv. ii. 596 = calyculata.
glutinosa, Pers. Syn. i. 399.—Am. bor.
gracilis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 531.—Japon.
himalaica, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 489.—Reg. Himal.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 201.—Japon.
nepalensis, Wall. Cat. n. 5097 (Aletridis sp.).—Reg. Himal.; China.
nuda, Franch. & Sav. Fl. Jap. ii. 89, partim = stenantha.
nuda, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvii. (1872) 176.—Japon.
nutans, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 1573, in obs.—Sibir. or.; Japon.; Am. bor.
occidentalis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 283.—Am. bor. occ.
ossifraga, Nem. ex Chaub. in *Act. Linn. Soc. Bord.* xix. (1853) 228 = *Narthecium ossifragum*.
palustris, DC. Fl. Fr. iii. 193 = calyculata.
palustris, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 175.—Reg. bor. et arct.
pubens, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 28; [*Dryand.* in] *Ait. Hort. Kew.* ed. II. ii. 325.—Am. bor.
pubescens, Pers. Syn. i. 399 = pubens.
pusilla, Pers. l. c. = palustris.
racemosa, Hoppe & Hornsch. in *Flora*, iv. (1821) 189 = calyculata.
rubra, F. Br. in *Flora*, iii. (1820) 469 = calyculata.
sessiliflora, Hook. Ic. Pl. t. 691 = falcata.
sibirica, Adams, in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* ix. (1834) 236 = coccinea.
sordida, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xi. (1867) 437.—Japon.
stenantha, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 530.—Japon.
stenopetala, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 243. t. 8 f. 1 = calyculata.

TOKOYENA, Rich. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 383, in syn. (1841), sphalm. = **Tocoyena**, Aubl. (Rubiace.).

TOLA, Wedd. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 257 (1873) = **Lepidophyllum**, Cass. (Compos.).

TOLLATIA, Endl. Gen. 428 (1838) = **Layia**, Hook. & Arn. (Compos.).
chrysanthemoides, Endl. ex Walp. Rep. ii. 631 = *L. chrysanthemoides*.

TOLMIAEA, Buck, Ind. in DC. Prod. iii. 479 (1858), sphalm. = seq.

TOLMIEA, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 44 (1834) = **Cladotamnus**, Bong. (Ericac.).
occidentalis, Hook. l. c. 45 = *C. pyroliflorus*.

TOLMIEA, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 582 (1840).
SAXIFRAGEAE, Benth. & Hook. f. i. 638.
LEPTAXIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 75 (1836), nomen prius.
Menziesii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 582.—Am. bor. occ.

TOLPIS, Adans. Fam. ii. 112 (1763). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 508.

- AETHIONIA*, D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (1828-29) 309.
CALODONTA, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 448.
CHATELANIA, Neck. Elem. i. 53 (1790).
DREPANIA, Juss. Gen. 169 (1789).
POLYCHAETIA, Tausch, ex Less. Syn. Comp. 129 (1832).
SCHMIDTIA, Moench, Meth. Suppl. 217 (1802).
SWERTIA, All. Fl. Pedem. i. 208 (1785).
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 459.—Abyss.

TOLPIS :—

- abyssinica*, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 399 = altissima.
altissima, Pers. Syn. ii. 377.—Reg. Mediterr.; Syria.
ambigua, Req. ex Nym. Consp. 473 = virgata.
baetica, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. i. 43 = barbata.
barbata, Bivona, Monog. 13. t. 3 = umbellata.
barbata, Gaertn. Fruct. ii. 372. t. 160.—Reg. Mediterr.
biaristata, Link, Handb. i. 811, sphalm. = *sexaristata*.
Bivonae, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 87 = barbata.
Calderae, Bolle, in *Bonplandia*, vii. (1859) 298.—Ins. Canar.
canariensis, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 84 = barbata.
capensis, Sch. Bip. in *Bonplandia*, ix. (1861) 172 = *Hieracium capense*.
concolor, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 85 = umbellata.
coronopifolia, Bivona, Monog. 17. t. 5.—Europ.; Ins. Canar.
cretica, Sieber, ex Nym. Consp. 473 = altissima.
crinita, Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 24 = umbellata vel barbata.
crithmifolia, DC. Prod. vii. 87.—Ins. Canar.
dichroa, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 86 = barbata.
discolor, Jord. & Fourr. l. c. = barbata.
eriantha, Sch. Bip. in *Bonplandia*, ix. (1861) 173, in syn. = *Hieracium erianthum*.
farinulosa, Walp. Ann. ii. 955.—Ins. Cap. Virid.
filiformis, DC. Prod. vii. 87.—Ins. Mader.
fruticosa, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 46.—Ins. Canar.
glandulifera, Bolle, in *Bonplandia*, vii. (1859) 298.—Ins. Canar.
grandiflora, Tenore, Viagg. Basil. e Calabr. 128 = altissima.
laciniata, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 406.—Ins. Canar.
Lagopoda, C. Sm. ex Link, in *Buch, Besch.* Canar. Ins. 147.—Ins. Canar.
macrodonta, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 85 = umbellata.
macrorrhiza, DC. Prod. vii. 87.—Ins. Mader.
macrorrhiza, H. C. Wats. ex Seub. Fl. Azor. 33 = nobilis.
madagascariensis, Sch. Bip. in *Bonplandia*, ix. (1861) 172 = *Hieracium madagascariense*.
microcephala, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 271 = umbellata.
nobilis, Hochst. in *Seub. Fl. Azor.* 33. t. 11.—Ins. Azor.
pallidiflora, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 85 = barbata.
pectinata, DC. Prod. vii. 87.—Ins. Mader.
prolifera, Moench, Meth. Suppl. 220 = barbata.
pygmaea, Steud. Nom. ed. II. ii. 691 = *Leontodon nudicaulis*.
quadriaristata, Bivona, Monog. 9 = altissima.
quercifolia, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 398, 399 = umbellata, macrorrhiza.
quinqueradiata, C. Koch, in *Linnaea*, xxiii. (1850) 654 = umbellata.
sexaristata, Bivona, Monog. 11. t. 2 = altissima.
staceifolia, Sch. Bip. in *Bonplandia*, ix. (1861) 173 = *Hieracium staceifolium*.
succulentum, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 525 = fruticosa.
umbellata, Bertol. in *Mem. Soc. Emul. Genova*, ii. (1803) 133.—Reg. Mediterr.
umbellata, Bertol. l. c., partim = barbata.
virgata, Bertol. l. c. 135 = altissima.
virgata, Bivona, Monog. 15. t. 4.—Reg. Mediterr.
Webbii, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 409.—Ins. Canar.

TOLUIFERA, Linn. Gen. ed. II. 182 (1742) = **Myroxylon**, Linn. (Legumin.).
Balsamum, Linn. Sp. Pl. 384 = *M. toluiferum*.
pedicellata, Baill. Hist. Pl. ii. 383 = *M. pedicellatum*.
Pereirae, Baill. l. c. = *M. Pereirae*.
peruifera, Baill. l. c. = *M. peruiferum*.
pubescens, Baill. l. c. = *M. pubescens*.
punctata, Baill. l. c. = *M. toluiferum*.

TOLUIFERA, Lour. Fl. Cochinch. 262 (1790) = **Loureira**, Meissn. (Gen. ignot.).
cochinchinensis, Lour. l. c. = *L. cochinchinensis*, *Buchanania Lanza*.

TOLUMNIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 101 (1836) = **Oncidium**, Sw. (Orchid.).
pulchella, Rafin. l. c. = *O. pulchellum*.

TOLYPANTHUS, Blume, in Schult. f. Syst. vii. ii. 1731 (1830) = **Loranthus**, Linn.
coriaceus, Blume, l. c. = *L. coriaceus*.
involutus, Blume, l. c. = *L. involutus*.
loniceroides, Blume, l. c. = *L. loniceroides*.

TOLYPEUMA, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 226 (1843), nomen = **Nesaea**, Comm. (Lythrar.).
floridum, E. Mey. l. c. = *N. floribunda*.

TOMANTEA, Steud. Nom. ed. II. ii. 691 (1841), sphalm. = seq.

TOMANTHEA, DC. Prod. vi. 564 (1837) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
Aucherii, DC. l. c. = *C. luzeoides*.

TOMANTHERA, Rafin. New Fl. Am. ii. 65 (1836) = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).
auriculata, Rafin. l. c. 66 = *G. auriculata*.
lanceolata, Rafin. l. c. = *Zaluzianskyia villosa*.

TOMARIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836) = **Rumex**, Linn. (Polygon.).

TOMEX, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 32 (1775) = **Dobera**, Juss. (Salvad.).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 680; iii. 162, in nota.
dubia, Jacq. Hort. Vindob. ii. 90 = *D. dubia*.
glabra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 32 = *D. Roxburghii*.

TOMEX, Linn. Diss. Dass. 5 (1747); Amoen. Acad. i. 389 (1749) = **Callicarpa**, Linn. (Verben.).
tomentosa, Linn. Sp. Pl. 118 = *C. lanata*.

TOMEX, Thuub. Nov. Gen. iii. 65 (1783) = **Litsea**, Lam. (Laurin.).
Boldo, Nees, Syst. Laurin. 719 (Index), sphalm. = seq.
Bolo, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 64 = *Lindera melastomacea*.
Doshia, Buch.-Ham. ex D. Don, l. c. 65 = *L. oblonga*.
japonica, Thunb. Nov. Gen. iii. 64 = *L. japonica*.
laurina, Hornem. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 229 = *L. zeylanica*, umbrosa.
monopetala, Hoffugg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 221 = *L. polyantha*.
pubescens, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 189 = *L. polyantha*.
Sebifera, Willd. Sp. Pl. ii. 840 = *L. Sebifera*.
Tetranthera, Willd. l. c. 839 = *L. Sebifera*.

TOMIEPHYLLUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. N. S. xvii. (1869) 125 = **Scrophularia**, Tourn.
caninum, Fourr. l. c. = *S. canina*.
tenuisectum, Fourr. l. c. = *S. canina*.

TOMILIX, Rafin. New Fl. Am. ii. 72 (1836) = **Macranthera**, Torr. (Scrophul.).
bracteata, Rafin. l. c. = *M. fuchsoides*.

TOMMASINIA, Bertol. Fl. Ital. iii. 414 (1839) = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
Kotschyi, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 302 = *Dorema Aucheri*.
purpurascens, Boiss. Fl. Orient. ii. 979 = *Dorema Aucheri*.
Szowitsii, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 302 = *Dorema Aucheri*.
verticillaris, Bertol. Fl. Ital. iii. 414 = *P. verticillare*.

TOMODON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 22 (1836) = **Hymenocallis**, Salisb. (Amaryll.).
coronarium, Rafin. l. c. = *H. crassifolia*.
floridanum, Rafin. l. c. = *H. crassifolia*.
pratense, Rafin. l. c. = *H. crassifolia*?
riparium, Rafin. l. c. = *H. crassifolia*?
rotatum, Rafin. l. c. = *H. lacera*.

TOMOSTIMA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) = **Draba**, Linn. (Crucif.).
caroliniana, Rafin. l. c. = *D. caroliniana*.
hispidula, Rafin. l. c. = *D. caroliniana*.

TOMOSTYLIS, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860)
201 = *Crossostyles*, Forst. (Rhizoph.).
multiflora, Montr. l. c. = *C. multiflora*.

TOMOTRIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 89 (1836) = *Corymbis*, Thou. (Orchid.).
flava, Rafin. l. c. = *C. flava*.
polystachia, Rafin. l. c. (= *Chloidia vernalis*).—Jamaic.

TOMOXIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 54 (1836) = *Ornithogalum*, Tourn. (Liliac.).
coarctata, Rafin. l. c. = *O. coarctatum*.
odorata, Rafin. l. c. = *O. suaveolens*.
virens, Rafin. l. c. = *O. virens*.

TONABEA, Juss. Gen. 262 (1789) = TAONABO, Aubl.
= *Ternstroemia*, Linn. f.

TONDIN, G. W. Schilling, Desc. Pl. Curat. Leprae, (1778) 198; et ex J. F. Gmel. Syst. 635 (1791) (Quid?).
surinamensium, G. W. Schilling, l. c. t. 1; et ex J. F. Gmel. l. c.—Guian.

TONELLA, Nutt. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 378. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 941.
collinsioides, Nutt. ex A. Gray, l. c.—Am. bor. occ.
floribunda, A. Gray, in Bot. Calif. i. 556.—Calif.

TONGUEA, Endl. Gen. 1419 (1841) = *Sisymbrium*, Tourn. (Crucif.).

TONINA, Aubl. Pl. Gui. ii. 856. t. 330 (1775). *ERIO-CAULEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1024.
HYPHYDRA, Schreb. Gen. 666 (1791).
fluviatilis, Aubl. Pl. Gui. ii. 857. t. 330.—Guian.

TONNINGIA, Neck. Elem. iii. 165 (1790) = *Cyanotis*, D. Don (Commel.).

TONSELLA, Schreb. Gen. 34 (1789) = TONTELEA, Aubl. = *Salacia*, Linn. (Celastr.).

TONSHIA, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 225 (1825) = *Saurauja*, Willd. (Ternstroem.).
polypetala, Buch.-Ham. ex D. Don, l. c. = *S. napaulensis*.

TONTANEA, Aubl. Pl. Gui. i. 108. t. 42 (1775) = *Coccocypselum*, P. Br. (Rubiace.).
guianensis, Aubl. l. c. = *C. Tontanea*.
repens, Pers. Syn. i. 134 = *C. Tontanea*.

TONTELEA, Aubl. Pl. Gui. i. 31. t. 10 (1775) = *Salacia*, Linn. (Celastr.).

africana, Willd. Sp. Pl. i. 194 = *S. africana*.
attenuata, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 384 = *S. Richardii*.

Aubletiana, Miers, l. c. 383 = *S. scabra*.
brachypoda, Miers, l. c. 387 = *S. brachypoda*.
brasiliensis, Spreng. Syst. i. 177 = *S. brasiliensis*.
Calypso, Spreng. l. c. = *S. Calypso*.
calypsoides, Endl. in Walp. Rep. i. 400 = *S. calypsoides*.

chinensis, Spreng. Syst. i. 177 = *S. Roxburghii*.
corrugulata, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 386 = *S. micrantha*.

crassifolia, Spreng. Syst. i. 177 = *S. crassifolia*.
decussata, Vahl, Enum. ii. 30 = *Hippocratea decussata*.
disperma, Poir. Encyc. Suppl. v. 316 = *Hippocratea indica*.

elliptica, Spreng. Syst. i. 178 = *S. elliptica*.
erythroxyloides, Endl. ex Walp. Rep. i. 400 = *S. elliptica*.

floribunda, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 385 = *Hippocratea acapulcensis*.

glomerata, Spreng. Syst. i. 177 = *S. glomerata*.
grandiflora, Spreng. l. c. 178 = *S. grandifolia*.

Hookeriana, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 388.—Mexic.

laevigata, Hoffmgg. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 68 = *S. laevigata*.

levigata, Poir. Encyc. Suppl. v. 316 = *Hippocratea ovata*.

longifolia, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 384 = *Hippocratea malpighiaefolia*.

TONTELEA :—

macrophylla, Poir. Encyc. Suppl. v. 317 = *Hippocratea macrophylla*.

madagascariensis, Vahl, Enum. ii. 32 = *Salacia madagascariensis*.

malpighiaefolia, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 20 = *Hippocratea malpighiaefolia*.

micrantha, Spreng. Syst. i. 177 = *S. micrantha*.
multiflora, Vahl, Enum. ii. 32 = *S. multiflora*.

oblongifolia, Spreng. Syst. i. 178 = *S. elliptica*.

obtusifolia, Endl. in Walp. Rep. i. 400 = *S. obtusifolia*.

paniculata, Poir. Encyc. Suppl. v. 316 = *Hippocratea paniculata*.

parviflora, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 386 = *S. parviflora*.

prinoides, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 184 = *S. prinoides*.

pyriformis, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 14 = *S. pyriforme*.

Radula, Spreng. Syst. i. 177 = *S. Radula*.
scabra, Vahl, Enum. ii. 29 = *S. scabra*.

scandens, Aubl. Pl. Gui. i. 31 = *S. scabra*.
senegalensis, Vahl, Enum. ii. 31 = *S. senegalensis*.

serrata, Endl. in Walp. Rep. i. 401 = *S. serrata*.
trinervia, Spreng. Syst. i. 177 = *S. trinervia*.

undulata, Spreng. l. c. = *S. undulata*.
velutina, Endl. in Walp. Rep. i. 401 = *S. velutina*.

TOONA, M. Roem. Syn. Hesper. 131, 139 (1846) = *Cedrela*, P. Br. (Meliac.).

ciliata, M. Roem. l. c. 139 = *C. Toona*.
febrifuga, M. Roem. l. c. = *C. Toona*.

hexandra, M. Roem. l. c. = *C. Toona*.
longifolia, M. Roem. l. c. 140 = *C. Toona*.

serrata, M. Roem. l. c. 139 = *C. Toona*.
sinensis, M. Roem. l. c. = *C. sinensis*.

velutina, M. Roem. l. c. = *Chickrassia tabularis*.
villosa, M. Roem. l. c. 140 = *Chickrassia tabularis*.

TOPEINOSTEMON, C. Muell. in Walp. Ann. v. 509 (1858), err. typ. = *Tapeinostemon*, Benth. (Gentian.).

TOPIARIS, Rafin. Sylva Tellur. 43 (1838) = *Cordia*, Linn. (Borag.).

geniculata, Rafin. l. c. = *C. mirabiloides*.

TOPOBEA, Aubl. Pl. Gui. i. 476. t. 189 (1775). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 770.

DREPANANDRUM, Neck. Elem. ii. 118 (1790).
anisophylla, *Triana*, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 151.—N. Granat.

calycularis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 149.—Mexic.

fragrans, Naud. l. c. = *laevigata*.
glaberrima, *Triana*, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 150.—N. Granat.

glabrescens, *Triana*, l. c. 149.—N. Granat.
gracilis, *Triana*, l. c. 150.—N. Granat.

inflata, *Triana*, l. c.—N. Granat.
insignis, *Triana*, l. c.—N. Granat.

laevigata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 150.—Mexic.

latifolia, *Triana*, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 149.—N. Granat.

longipes, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 147.—Peruv.

multiflora, *Triana*, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 149.—Peruv.

paniculata, Rich. ex DC. Prod. iii. 105 = *Adelobotrys adscendens*.

parasitica, Aubl. Pl. Gui. i. 476.—Guian.
punctulata, *Triana*, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 150.—N. Granat.

rotundifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 150 = *Blakea rotundifolia*.

sessilifolia, *Triana*, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 150.—N. Granat.

setosa, *Triana*, l. c. 149.—N. Granat.
stephanochaeta, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 148.—N. Granat.

subscabrula, *Triana*, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 150.—N. Granat.

superba, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 147.—Panama.

TOQUERA, Rafin. Sylva Tellur. 40 (1838) = *Cordia*, Linn. (Borag.).

tomentosa, Rafin. l. c. = *C. Toqueve*.

TORDYLOIDES, Wall. ex DC. Prod. iv. 199 (1830) = *Heracleum*, Linn. (Umbell.).
Brunonis, Wall. ex DC. l. c. = *H. Brunonis*.

TORDYLOPSIS, DC. Prod. iv. 199 (1830) = *Heracleum*, Linn. (Umbell.).
Brunonis, DC. l. c. = *H. Brunonis*.

TORDYLIUM, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 71 (1737). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 924.

AINSWORTHIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 343.

CONDYLOCARPUS, Hoffmgg. Gen. Umbell. ed. II. 202 (1816).

HASSELQUISTIA, Linn. Cent. Pl. i. 9 (1755); Amoen. Acad. iv. 270 (1759).

SYNELCOSADIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 345.

absinthifolium, Pers. Syn. i. 314 = *Zosima orientalis*.
aegyptiacum, Lam. Illustr. ii. 336.—Syria; Mesopot.

americanum, Nutt. ex DC. Prod. iv. 196 = *Polytaenia Nuttallii*.

Anthriscus, Linn. Sp. Pl. 240 = *Caucalis Anthriscus*.
apulum, Linn. l. c. 239.—Reg. Mediterr.

apulum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 452 = officinale.
Arthedia, Crantz, Cl. Umb. Emend. 56 = *Artemisia squamata*.

asperum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 11 = *Caucalis Anthriscus*.

Aucheri, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 46. t. 237 = *Ormosciadium Aucheri*.

austriacum, Hort. Vilm. (1811); ex Schult. Syst. vi. 462 (Quid?).—Europ.

brachytaenium, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 45.—Pamphyl.

Brunonis, Wall. Cat. n. 590 = *Heracleum Brunonis*.
cappadocicum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 349.—Cappadoc.

concinnum, Tenore, Syll. Fl. Nap. App. iv. 11 = *apulum*.

cordatum, Poir. Encyc. vii. 712.—Ins. Cypr.; Mesopot.

cyrenaicum, Spreng. Syst. i. 895 = *Apium nodiflorum*.
divaricatum, Moench, Meth. 77 = *syriacum*.

grande, Salisb. Prod. 160 = maximum.
grandiflorum, Moench, Meth. 78 = *apulum*.

Hasselquistia, Crantz, Cl. Umb. Emend. 57 = *aegyptiacum*.

Hasselquistiae, DC. Prod. iv. 198.—Syria.

humile, Desf. Fl. Atlant. i. 235. t. 58 = *apulum*.
insulare, Clarke, Trav. iii. 337 = *apulum*.

intermedium, Pass. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. iii. (1871) 167, 168 = *apulum*.

lanatum, Boiss. Fl. Orient. ii. 1030.—As. Min.
latifolium, Linn. Sp. Pl. 240 = *Caucalis latifolia*.

lusitanicum, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 389 = maximum.

macropetalum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 348.—Caria.

magnum, Brot. Fl. Lusit. i. 450 = maximum.
maximum, Linn. Sp. Pl. 240.—Europ.; Reg. Cauc.

microspermum, Tenore, Add. (1827); ex DC. Prod. iv. 198 = officinale.

nodiflorum, Salisb. Prod. 160 = seq.
nodosum, Linn. Sp. Pl. 240 = *Caucalis nodosa*.

officinale, Linn. Sp. Pl. 239.—Europ. austr.
officinale, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 452 = *apulum*.

peregrinum, Linn. Mant. i. 55 = *Capnophyllum dichotomum*.

persicum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 1032.—Persia.

Pestalozae, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 45.—Lycia.
Secacul, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *Pastinaca Secacul*.

segetum, Hort. Par. ex Schult. Syst. vi. 484 = *Caucalis arvensis*.

Sekakul, DC. Prod. iv. 90 = *T. Secacul*.
siifolium, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 194 = *Heracleum austriacum*.

suaveolens, Delile, Fl. Egypte, Illustr. 58. n. 323 = *Pastinaca Secacul*.

sulcatum, Desf. Tabl. ed. II. Suppl. 274 (Quid?).—Hab.?

syriacum, Linn. Sp. Pl. 239.—Cilicia; Syria.

verecundum, Salisb. Prod. 160 = *Caucalis Anthriscus*.

TOREALA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 = *Inga*, Scop. et *Parkia*, R. Br. (Legumin.).

TORENIA, Linn. Diss. Chen. 45 (1751); Amoen. Acad. iii. 25 (1756). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 954.

CAËLA, Adans. Fam. ii. 209 (1763).

DUNALIA, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 (1814).

LEGAZPIA, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 338 (1845).

NORTENIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 9 (1806).

PENTSTERIA, Griff. Notul. iv. 118 (1854).

PERISTEIRA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 277–8–9 (1884), sphalm.

alata, Benth. in DC. Prod. x. 411.—Ins. Molucc.

alba, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3961 = peduncularis, *Vandellia crustacea*.

angustifolia, Buch.-Ham. l. c. n. 3951 A = *Vandellia angustifolia*.

arracanensis, Hort. ex Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 198.—Burma?

asiatica, Benth. Scroph. Ind. 38; et in DC. Prod. x. 410 = peduncularis.

asiatica, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 3954 A = cordifolia.

asiatica, Linn. Sp. Pl. 619.—As. trop.

asiatica, Wall. Cat. n. 3953, partim = vagans.

asiatica, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 278 = bicolor.

auriculaefolia, Dombr. Flor. Mag. x. (1871) t. 534 = *Craterostigma pumilum*.

Bailloni, Godefroy, ex André, in Illustr. Hort. xxv. (1878) 136. t. 324 = flava.

Benthamiana, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 226.—China.

bicolor, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 38.—Ind. or.

calcarata, Griff. Notul. iv. 124 = *Vandellia angustifolia*.

cardiosepal, Benth. in DC. Prod. x. 409 = polygonoides.

ciliaris, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 3.—Malaya.

ciliata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 278, sphalm. = *prae-coerulea*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 562 = ciliaris.

colorans, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) t. 94 = concolor.

concolor, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 62.—China.

cordifolia, Benth. in Wall. Cat. n. 3954 = asiatica.

cordifolia, Buch.-Ham. ex Wall. l. c. n. 3949 D = *Vandellia pedunculata*.

cordifolia, Roxb. Pl. Corom. ii. 52. t. 161.—Ind. or.; Malaya.

crustacea, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 570 = *Vandellia crustacea*.

diffusa, D. Don, Prod. Fl. Nep. 86 = vagans.

diffusa, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 95 = *Vandellia pedunculata*.

edentula, Benth. in DC. Prod. x. 410 = peduncularis.

edentula, Griff. in Madr. Journ. Sc. Ser. I. iv. (1836) 376 = *Vandellia mollis*?

erecta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3947 A = *Vandellia erecta*.

exappendiculata, Regel, Gartenfl. (1877) 34; et in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 271 = peduncularis.

fimbriata, Hook. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jul.-Sept. 1831) 379 = *Artanema fimbriatum*.

flaccida, R. Br. Prod. 440 = *Vandellia crustacea*.

flava, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3957 A, B.—As. trop.

flava, Wall. Cat. n. 3957 C = ciliaris.

Fordii, Hook. f. Bot. Mag. t. 6797 B.—China.

Fournieri, Linden, ex Fourn. in Illustr. Hort. xxiii. (1876) 129. t. 249.—Cochinch.

globosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3945 D = *Vandellia scabra*.

gracilis, Benth. in Wall. l. c. n. 3952 = *Bonnaya veronicaefolia*.

guinguenervis, Llanos, Fragm. 76 (err. typ.) = quinquenervis.

hians, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 96 = vagans.

hirsuta, Willd. Sp. Pl. iii. 266.—Ind. or.

hirta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3948 A = *Vandellia mollis*.

hirta, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 571 = *Vandellia scabra*.

hirtella, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 277.—Ind. or.

inflata, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 192.—Japon.

lamponga, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 562.—Sumatra.

lanceolata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 279 (sp. dub.).—Ind. or.

VOL. II.

TORENIA—

lepidota, Roth, Nov. Pl. Sp. 281 = *Centranthera humifusa*.

lobelioides, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 202 = oblonga.

longiflora, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) 441, 471 = concolor.

lucida, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3962 = *Vandellia crustacea*.

minuta, Blume, Bijdr. 755 = *Vandellia minuta*.

molluginoides, Benth. in Wall. Cat. n. 3960 = *Vandellia molluginoides*.

mucronulata, Benth. in DC. Prod. x. 409.—Burma.

multiflora, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 96 = *Vandellia multiflora*.

nana, Benth. in DC. Prod. x. 412.—Afr. austr.

Nortenia, Steud. Nom. ed. II. ii. 692.—Madag.; Bras.

oblonga, Steud. l. c.; Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 227, in nota.—China.

obtusa, Blume, Bijdr. 754 = *Vandellia obtusa*.

obtusifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 5.—Ind. or.

ovata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 306 = *Vandellia crustacea*.

paniculata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 486.—Ins. Philipp.

parviflora, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3958.—Amphig. trop.

peduncularis, Benth. in Wall. l. c. n. 3956.—Ind. or.; Malaya.

pedunculata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 692 = *T. Nortenia*.

plantaginea, Benth. in DC. Prod. x. 411 = *Craterostigma plantagineum*.

polygonoides, Benth. Scroph. Ind. 39.—Ind. or.; Malaya.

pumila, Benth. in DC. Prod. x. 411 = *Craterostigma pumilum*.

quinquenervis, Llanos, Fragm. 70 (err. typ. guinguenervis).—Ins. Philipp.

racemosa, Benth. Scroph. Ind. 38; et in Wall. Cat. n. 3957 = ciliaris.

ramosissima, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 10.—Afr. trop.

Roxburghii, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3856 A = *Bonnaya reptans*.

rubella, Buch.-Ham. l. c. n. 3962 A = *Vandellia crustacea*.

rubens, Benth. in DC. Prod. x. 410 = vagans.

rubens, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 219 = *hirtella*.

scabra, R. Br. Prod. 440 = *Vandellia crustacea*.

scabra, R. Grah. in Bot. Mag. t. 3104 = *Artanema fimbriatum*.

Schweinfurthii, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1256.—Afr. trop.

sessiliflora, Benth. in Wall. Cat. n. 3959 = *Vandellia sessiliflora*.

Soriana, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 340 = *Vandellia Soriana*.

stolonifera, Boj. ex Benth. in DC. Prod. x. 410.—Madag.

trichotoma, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3943 A = *Vandellia erecta*.

vagans, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 96.—Ind. or.; China.

varians, Griff. Notul. iv. 125 = *Vandellia pedunculata*.

varians, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 96 = *Vandellia crustacea*.

veronicaefolia, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xix. (1851) 282.—Am. centr.

veronicaefolia, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 692 = *T. Nortenia*.

veronicifolia, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 3856 B = *Bonnaya reptans*.

viscosa, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 306 = *Vandellia hirsuta*.

TORESIA, Pers. Syn. ii. 534 (1807) = **TORRESIA**, Ruiz & Pav. = **Hierochloë**, S. G. Gmel. (Gramin.).

TORFOSIDIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 112 (1836) = **Euphorbia**, Linn.

canariensis, Rafin. l. c. = *E. canariensis*.

TORICELLIA, DC. Prod. iv. 257 (1830). **CORNA-CEAE**, Benth. & Hook. f. i. 952.

tiliaefolia, DC. l. c.—Reg. Himal.

TORILIS, Adans. Fam. ii. 99 (1763) = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).

africana, Spreng. Pugill. ii. 55; et in Schult. Syst. vi. 468 = *C. capensis*.

anthriscus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *C. Anthriscus*.

Anthriscus, Bernh. Syst. Verz. Erf. 167; C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 613 = *C. Anthriscus*.

Anthriscus, Gaertn. Fruct. 83. t. 20; Moench, Meth. 103 = *Anthriscus vulgaris*.

Anthriscus, Spreng. ex DC. Prod. iv. 219 = *C. arvensis*.

arvensis, Link, Enum. Hort. Berol. i. 265 = *C. arvensis*.

Borsczowi, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 600.—Turkestan.

bracteosa, Bianca, ex Nym. Consp. 282 = *C. nodosa*.

brevipes, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 372.—Ins. Mader.

chlorocarpa, Spreng. Syst. i. 898 = *C. infesta*.

chrysocarpa, Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II. ii. 98 = *C. fallax*.

convexa, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 361 = *C. Anthriscus*.

crinita, Spreng. Sp. Umb. 141 = *Daucus crinitus*.

divaricata, Moench, Meth. Suppl. 34 = *C. arvensis*.

elata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 119; DC. Prod. iv. 220 = *C. Anthriscus*.

erythrotricha, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xxi. 84 = *C. erythrotricha*.

Friedrichthalii, Cesati, in Fried. Reise Neu-Griechenl. 280 = *C. arvensis*.

grandiflora, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 56 = *microcarpa*.

helvetica, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 617 = *C. arvensis*.

heterophylla, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 326 = *C. linearifolia*.

heterotricha, Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxix. (1866) i. 329.—Turkestan.

infesta, Roth, Enum. Pl. Phan. Germ. i. 901; Reichb. Fl. Germ. Excurs. 447 = *C. infesta*.

infesta, Spreng. Pl. Umb. Prod. 24 = *C. arvensis*.

intermedia, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, i. i. 'Tome 3me' (1842-43) 66 (Cat. Pl. Phan. Doubs, 34) = *T. Anthriscus*?

japonica, DC. Prod. iv. 219 = *C. Anthriscus*.

lanuginosa, [Clairv.] Man. Herb. 78 = *Anthriscus vulgaris*.

leptophylla, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xxi. 83. t. 169 = *C. leptophylla*.

macrocarpa, Gaertn. Fruct. i. 83 = *Chaerophyllum nodosum*.

melanantha, Vatke, in Linnaea, xl. (1876) 190 = *C. melanantha*.

microcarpa, Bess. Enum. Pl. Volh. 43.—Rossia; As. Min.

neglecta, Schult. Syst. vi. 484 = *C. infesta*.

nodosa, Gaertn. Fruct. i. 82. t. 20. f. 6 = *C. nodosa*.

nodosa, Kotschy, in Unger & Kotschy, Ins. Cypren, 306 = *C. fallax*.

obscura, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 372.—Ins. Mader.

persica, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 102 = *C. Anthriscus*.

peruviana, Presl, ex DC. Prod. iv. 214 = *Daucus montanus*.

praetermissa, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 214 = *C. Anthriscus*.

purpurea, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 325 = *C. arvensis*.

radiata, Moench, Meth. 103 = *C. infesta*.

rubella, Moench, l. c. = *C. Anthriscus*.

scabra, DC. Prod. iv. 219 = *C. Anthriscus*.

scandicina, Adans. ex Schult. Syst. vi. 524 = *Anthriscus vulgaris*.

setifolia, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 98 = *Psammogeton setifolium*.

stricta, Wibel, Prim. Fl. Werth. 192 = *C. Anthriscus*.

syriaca, Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II. ii. 98 = *C. infesta*.

tenella, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xxi. 84.—Europ.

tenuifolia, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 370.—Ins. Mader.

trichosperma, Spreng. Sp. Umb. 142 = *C. trichosperma*.

trilobata, Viv. ex DC. Prod. iv. 121 = *Pimpinella peregrina*.

triradiata, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 48.—Pamphylia.

tuberculata, Spreng. in Schult. Syst. vi. 426 = *Pimpinella peregrina*.

tumida, Moench, Meth. 102 = *Chaerophyllum nodosum*.

ucranica, Spreng. in Schult. Syst. vi. 485 = *microcarpa*.

TORMENTILLA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735) = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
adstringens, Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiii. (1850) II. 480 = *P. Tormentilla*.
alpina, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 64 = *P. aurea*?
Anserina, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 155 = *P. Anserina*.
dissecta, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) p. cxviii. = *P. Tormentilla*?
divergens, Reichb. ex Bot. Zeit. i. (1843) 263 = *P. Tormentilla*.
erecta, Linn. Sp. Pl. 500 = *P. Tormentilla*.
ericetorum, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) p. cxviii; et in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. vi. (1883-84) 114 = *P. Tormentilla*.
fruticosa, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 154 = *P. fruticosa*.
humifusa, G. Don, Gen. Syst. ii. 562 = *P. humifusa*.
montana, Schur, Enum. Pl. Transs. 188 = *P. Tormentilla*.
nodosa, Schur, l. c. = *P. Tormentilla*.
obovatifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 152 = *P. Fragariastrum*.
officinalis, Curt. Fl. Lond. fasc. v. t. 35 = *P. Tormentilla*.
orophila, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) p. cxviii. = *P. Tormentilla*.
parviflora, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 580 (Beitr. Fl. Hercyn. 210) = *P. Tormentilla*.
pusilla, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 693 = *P. elegans*.
reptans, Linn. Sp. Pl. 500 = *P. procumbens*.
reptans, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 153 = *P. reptans*.
sessilifolia, Stokes, l. c. 151 = *P. Tormentilla*.
tuberosa, Reyn. Fl. Dép. Orne, 148 = *P. Tormentilla*.

TORMINALIS, Medic. Phil. Bot. i. 134 (1789) = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

TORMINARIA, M. Roem. Syn. Rosifl. 130 (1847) = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).
Clusii, M. Roem. l. c. = *P. Tormalis*.
florentina, M. Roem. l. c. 131 = *P. crataegifolia*.
vulgaris, Schur, Enum. Pl. Transs. 207 = *P. Tormalis*.

TORNABENEA, Parl. ex Webb, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 370. **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 930.
TETRAPLEURA, Parl. in Hook. Niger Fl. 131 (1849).
Bischoffii, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 254.—Ins. Cap. Virid.
hirta, J. A. Schmidt, l. c. 253.—Ins. Cap. Virid.
insularis, Parl. ex Webb, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 370.—Ins. Cap. Virid.

TORNABENIA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 930 (1867), sphalm. = *prae*.

TORNELIA, Gutierrez, ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853) 382 = **Monstera**, Adans. (Aroid.).
dilacerata, Schott, Prod. Aroid. 356 = *M. dilacerata*.
dissecta, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 179 = *M. dilacerata*.
fragrans, Gutierrez, ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853) 382 = *M. deliciosa*.
lanata, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 179 = *M. pertusa*.
Lindenii, Schott, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 259 = *M. Friedrichsthalii*.
Spruceana, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 40 = *M. Spruceana*.
subpinnata, Schott, Prod. Aroid. 357 = *M. subpinnata*.

TORPESIA, M. Roem. Syn. Hesper. 86, 116 (1846) = **Trichilia**, Linn. (Meliac.).
mucronata, M. Roem. l. c. 116 = *Trich. heterophylla*.

TORRENTIA, Vell. Fl. Flum. viii. t. 149 (1827) = **Ichthyothere**, Mart. (Compos.).
quinquenervis, Vell. l. c. = *I. Cunabi*.

TORRESIA, Ruiz & Pav. Prod. 125 (1794) = **Hierochloë**, S. G. Gmel. (Gramin.).
antarctica, Beauv. Agrost. 63 = *H. antarctica*.
biflora, Roem. & Schult. Syst. ii. 515 = *Centotheca lappacea*.
latifolia, Beauv. ex Roem. & Schult. l. c. = *Centotheca lappacea*.

TORRESIA :—

magellanica, Beauv. Agrost. 63 = *Hierochloë magellanica*.
redolens, Roem. & Schult. Syst. ii. 516 = *H. redolens*.
utriculata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 251 = *H. utriculata*.

TORREYA, Arn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 130. **CONIFERAE**, Benth. & Hook. f. iii. 431.

CARYOTAXUS, Zucc. ex Endl. Syn. Conif. 240 (1847).

FOETATAXUS, [Nelson.] Senilis, Pinaceae 167 (1866).
bogotensis, Linden, Cat. n. 25 (1870) 12; et ex Thurb. in Bull. Torrey Bot. Club, i. (1870) 7 (sp. dub.).—N. Granat.

californica, Torr. in N. York Journ. Pharm. iii. (1852) 49.—Calif.

grandis, Fortune, ex Gord. Pinet. ed. I. 326.—China. *Humboldtii*, Hort. Kew. ex Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 226 = *Podocarpus taxifolia*.

montana, Hort. ex Lindl. & Gord. l. c. 229 = *taxifolia*.
Myristica, Hook. Bot. Mag. t. 4780 = *californica*.

nucifera, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. iv. (1846) 234.—Japon.

taxifolia, Arn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 130.—Florida.

TORREYA, Croom, ex Meissn. Gen. Comm. 340 (1843) = **Croomia**, Torr. (Roxburgh.).

TORREYA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 356 = **Synandra**, Nutt. (Labiata).
grandiflora, Rafin. l. c.; et (1819) 194 = *S. grandiflora*.

TORREYA, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 105 = **Cyperus**, Mich.

caespitosa, Rafin. l. c. = *C. Nuttallii*.
maritima, Rafin. l. c. (*Pycnei* sp.).—Am. bor.

TORREYA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 121 (1821) = **Clerodendron**, Linn. (Verben.).
paniculata, Spreng. l. c.—Bras.

TORRUBIA, Vell. Fl. Flum. 139 (1825); iii. t. 150 = **Pisonia**, Plum. (Nyctag.).
opposita, Vell. ll. cc.—Bras.

TORRULIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 693 (1841), sphalm. = *prae*.

TORTULA, Roxb. ex Willd. Sp. Pl. iii. 359 (1800) = **Priva**, Adans. (Verben.).
aspera, Roxb. ex Willd. l. c. = *P. leptostachya*.

TORULINIUM, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 15 (1825) = **Mariscus**, Ehrh. (Cyperac.).
confertum, Desv. l. c. (= *Cyperus ferax*).—Ind. occ.
ferox, Ham. l. c. (= *Cyperus ferax*).—Ind. occ.

TORYMENES, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 238 = **Amomum**, Linn. (Scitam.).
officinalis, Salisb. l. c. = *A. Granum-Paradisii*.

TOSAGRIS, Beauv. Agrost. 29. t. 8. f. 3 (1812) = **Muehlenbergia**, Schreb. (Gramin.).
agrostidea, Beauv. l. c. = *M. capillaris*.

TOUCHARDIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 94 (1854?). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 388.
candidissima, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 165 = *Leucosyke javanica*.
latifolia, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 94.—Ins. Sandvic.

TOUCHIROA, Aubl. Pl. Gui. i. 384. t. 148 (1775) = **Crudia**, Schreb. (Legumin.).
aromatica, Aubl. l. c. 385 = *C. aromatica*.
bantamensis, Hassk. Retzia, i. 202 (= *Priona bantamensis*).—Java.
Parivoa, Rich. ex DC. Prod. ii. 520 = *C. Parivoa*.
Vouarana, Rich. l. c. = *Cupania Voua-rana*.

TOULICHIBA, Adans. Fam. ii. 326 (1763) = **Ormosia**, Jack (Legumin.).

TOULICIA, Aubl. Pl. Gui. i. 359. t. 140 (1775). **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 393.
DICRANOPETALUM, Presl, Bot. Bemer. 24 (1844); (in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 454).

PONAEA, Schreb. Gen. 266 (1789).
brasilensis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 45.—Bras.
bullata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 372.—Bras.

crassifolia, Radlk. l. c. 373.—Bras.
elliptica, Radlk. l. c. 371.—Bras.

guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 359. t. 140. f. 3.—Guian.
laevigata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 372.—Bras.

megalocarpa, Radlk. Monog. Serj. 353.—Venezuela.
pulvinata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 371.—Guian.

stans, Radlk. Monog. Serj. 353.—Bras.
tomentosa, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 373.—Bras.

TOULOUOUNA, M. Roem. Syn. Hesper. 123 (1846) = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).

gigantea, M. Roem. l. c. = *C. procera*.

TOUMBOA, Naud. in Rev. Hortic. (1862) 186 = **TUMBOA**, Welw. = **Welwitschia**, Hook. f. (1862) (Gnetac.).

TOUNATEA, Aubl. Pl. Gui. i. 549. t. 218 (1775) = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).

guianensis, Aubl. l. c. 550 = *S. alata*.
madagascariensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. (1885) 446 = *S. madagascariensis*.

TOURNEFORTIA, Linn. Syst. ed. I (1735). **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 843.

ARGUSIA, Amm. ex Linn. Hort. Upsal. 36 (1748).
ARGUZIA, Rafin. Sylva Tellur. 167 (1838); Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1851) i. 558.

MESSERSCHMIDIA, Murr. Syst. ed. XIII. 161 (1774).
MESSERSMIDIA, Linn. Hort. Upsal. 36 (1748).

OSKANPIA, Rafin. Sylva Tellur. 123 (1838).
PITTONIA, Plum. ex Adans. Fam. ii. 177 (1763).

TETRANDRA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 929 (1859).
VERRUCARIA, Medic. Malv. 103 (1787).

acclimis, F. Muell. Fragm. iv. 95 = *sarmentosa*.
acuminata, DC. Prod. ix. 520.—Ins. Mascar.

acutiflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 333.—Mexic.

acutifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 540 = *caracasana*.

alba, Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 347.—Guian.

angulosa, Desf. Tabl. ed. II. 85, nomen (Quid ?).—Hab.?

angustiflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 25. t. 151.—Peruv.

angustifolia, Roem. & Schult. Syst. iv. 539 = *T. Messerschmidia*.

arborea, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 129 = *argentea*.
arborescens, Lam. Illustr. i. 417 (Quid ?).—Ind. or.

argentea, Linn. f. Suppl. 133.—Ind. or.; Malaya; Austral.

Arguzia, Roem. & Schult. Syst. iv. 540 = *sibirica*.
asperima, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 333.—Mexic.

astrotricha, DC. Prod. ix. 520.—Jamaic.

bicolor, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 40.—Am. trop.

bifida, Boj. Hort. Mauriti. 234 = *Bojeri*.
bifida, Lam. Illustr. i. 417.—Ins. Mauriti.

Billbergiana, Beurl. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 139.—Panama.

Blanchetii, A. DC. in DC. Prod. ix. 524.—Bras.

Bojeri, A. DC. l. c. 516.—Ins. Mauriti.

brachiata, A. DC. l. c. 525.—Bras.

brasilensis, Poir. Encyc. v. 357.—Bras.

breviflora, DC. Prod. ix. 520.—Am. trop.

calycina, Benth. Bot. Voy. Sulph. 139.—Mexic.

candida, Walp. Rep. v. 556.—Mexic.

Candollii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 146.—Reg. Himal.

canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 82.—Am. austr.

capitata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 332.—Mexic.

caracasana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 80.—Venezuela.

caribaea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 484.—Ind. occ.

carnea, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6.—N. Granat.

TOURNEFORTIA:—

- chamaedrifolia*, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 2 = *Cordia mirabiliflora*.
chrysantha, Walp. Rep. vi. 556.—Mexic.
cornifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 84.—N. Granat.
corymbosa, Sieber, ex DC. Prod. ix. 517 = *hirsutissima*.
corymbosa, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 541 = *foetidissima*.
cuspidata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 83.—Ecuador.
cymosa, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 253; cf. ej. Fl. Brit. W. Ind. 483 = *filiflora*.
cymosa, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 145 = *Heyneana*.
cymosa, Jacq. Coll. i. 96 = *astrotricha*.
cymosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 202.—Ind. occ.
densiflora, Mart. ex Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 333.—Mexic.
dichotoma, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. ix. 518 = *foetidissima*.
difformis, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 206.—Ins. Galapag.
Edgeworthii, A. DC. in DC. Prod. ix. 529 = *Heliotropium zeylanicum*.
elegans, Cham. in Linnaea, iv. (1829) 469.—Bras.
elliptica, Mart. ex Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 332.—Mexic.
ferruginea, Lam. Illustr. i. 417 = *scandens*.
filiflora, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 483.—Ind. occ.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 79.—N. Granat.
foetida, Pers. Syn. i. 165 = *foetidissima*.
foetidissima, Descourt. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 483 = *cymosa*.
foetidissima, Linn. Sp. Pl. 140.—Ind. occ.; Mexic.
frangulaefolia, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 334 = *sarmentosa*.
fruticosa, [Ker-Gawl.] Bot. Reg. t. 464 = *T. Messerschmidia*.
fruticosa, Ortega, Hort. Matr. Dec. 57.—Mexic.
fuliginosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 81.—Am. austr.
Gardneri, A. DC. in DC. Prod. ix. 526.—Bras.
glaberrima, Salzm. ex DC. l. c. 519.—Bras.
glabra, Linn. Sp. Pl. 141 = *cymosa*.
glabra, Aubl. Pl. Gui. i. 118; Spreng. Neue Entdeck. ii. 124.—Guian.
glabra, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 5.—Java.
gnaphalodes, R. Br. Prod. 496.—Am. trop.
grandifolia, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 56.—Bras.
Hartwegiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 693.—Mexic.
heliotropioides, Hook. Bot. Mag. t. 3096 = *Heliotropium anchusaefolium*.
Hernandesii, Dun. ex DC. Prod. ix. 529.—Mexic.
Heyneana, DC. Prod. ix. 516 = *Candollii*.
Heyneana, Wall. Cat. n. 910.—Ind. or.
hirsutissima, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 140 = *Billbergiana*.
hirsutissima, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 128 = *sarmentosa*.
hirsutissima, Linn. Sp. Pl. 140.—Am. trop.
hispida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 82.—Am. austr.
Hookeri, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 147.—Reg. Himal.
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 927.—Java.
Hostmanni, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1151, nomen.—Guian.
humilis, Linn. Sp. Pl. 141 = *Heliotropium fruticosum*.
incana, G. Don, Gen. Syst. iv. 368 = *Meyeri*.
incana, Lam. Illustr. i. 417.—Ind. occ.
intermedia, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 50.—Bras.
hasiana, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 147.—Reg. Himal.
laevigata, Lam. Illustr. i. 416.—Am. trop.
laevigata, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 18 = *volubilis*.
lanceolata, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 55.—Bras.
latifolia, D. Dietr. Syn. Pl. i. 629 = *laurifolia*.
latifolia, Willd. in Roem. & Schult. Syst. iv. 540 = *laevigata*.
laurifolia, Poepp. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 465 = *laevigata*.
laurifolia, Vent. Choix Pl. 2.—Am. trop.

TOURNEFORTIA:—

- laxiflora*, DC. Prod. ix. 525 = *floribunda*.
leptostachya, Benth. Bot. Voy. Sulph. 140.—N. Granat.
leucophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 85.—N. Granat.
linearis, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 226 (= *Heliophytum lineare*).—Afr. austr.
longifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 25. t. 150.—Peruv.
loxensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 81.—Ecuador.
lucida, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 397 = *volubilis*.
lucida, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 24.—Ind. occ.
maculata, DC. Prod. ix. 527.—Bras.
macrophylla, Lam. Illustr. i. 416 = *cymosa*, *foetidissima*.
maculata, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14.—Am. austr.
maritima, Salzm. ex DC. Prod. ix. 526.—Bras.
Martii, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 55.—Bras.
megapotamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 66.—Reg. Argent.
melanochaeta, DC. Prod. ix. 520.—Guian.
membranacea, DC. l. c. 530 = *scandens*.
Messerschmidia, Sweet, Hort. Suburb. Lond. 31.—Ins. Canar.
mexicana, Vatke, Ind. Sem. Hort. Berol. (1876) App. 1.—Mexic.
Meyeri, DC. Prod. ix. 530.—Guian.
micranthos, A. DC. l. c. x. 67 = *Heliotropium micranthum*.
microphylla, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 693 = *scandens*.
microphylla, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 24 = *volubilis*.
microstachya, Roem. & Schult. Syst. iv. 538 = *Heliotropium microstachyum*.
minuta, Bert. ex Spreng. Syst. i. 644 = *incana*.
mollis, Bertol. Misc. Bot. xii. 44, cum tab. (= *Van-gueriae* sp.?).—Afr. trop.
mollis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1875) 50.—Am. bor.
mollis, F. Muell. Fragm. i. 59.—Austral.
Monclovana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 120.—Mexic.
monostachya, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 540 = *Heliotropium strictum*.
montana, Lour. Fl. Cochinch. 122.—Cochinch.
mutabilis, Vent. Choix Pl. t. 3.—Java; Mexic.?
nitida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 84.—N. Granat.
obscura, A. DC. in DC. Prod. ix. 517.—Guian.
obtusiflora, Benth. Bot. Voy. Sulph. 140.—Ecuador.
octostachya, DC. Prod. ix. 518.—N. Granat.
opaca, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 205.—Ins. Galapag.
orientalis, R. Br. Prod. 497 = *sarmentosa*.
ovata, Wall. Cat. n. 908.—Burma; China.
paniculata, Cham. in Linnaea, iv. (1829) 468.—Bras.
peruviana, Poir. Encyc. Suppl. iv. 425.—Peruv.
petiolaris, DC. Prod. ix. 520.—Mexic.
Pohlil, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 52.—Bras.
poliochros, Spreng. Syst. i. 644.—Jamaic.
polystachya, Poepp. ex DC. Prod. ix. 492 = *Cordia Poeppigii*.
polystachya, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 24. t. 149.—Peruv.
Pseudo-heliotropium, Lehm. in E. Otto, Hamb. Gartenz. vi. (1850) 456.—Hab.?
psilostachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 78.—Am. austr.
puberula, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 211.—Madag.
pubescens, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 198.—Ins. Galapag.
punctata, Lem. Fard. Fleur. iv. (1854) Misc. 79.—Hab.?
punctata, Spreng. Syst. i. 648 = *volubilis*.
pyrrhotricha, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 53.—Bras.
reticosa, Wight, Ic. t. 1386.—Ind. or.
rosmarinifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 693 = *sibirica*.
Roxburghii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 146.—Ind. or.
Royleana, DC. Prod. ix. 527 = *Heliotropium zeylanicum*.

TOURNEFORTIA:—

- rubicunda*, Salzm. ex DC. Prod. ix. 526.—Bras.
rufescens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 541.—Am. austr.
rupicola, Benth. Bot. Voy. Sulph. 140.—Mexic.
rufo-sericea, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 197.—Ins. Galapag.
rugosa, Willd. in Roem. & Schult. Syst. iv. 540 = *fuliginosa*.
Sagraeana, DC. Prod. ix. 522 = *laurifolia*.
salicifolia, DC. l. c. 530.—Bras.
Salzmanni, DC. l. c. 524.—Bras.
Sampsoni, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 330 = *ovata*.
sarmentosa, Lam. Illustr. i. 416.—As. et Austral. trop.; Ins. Mascar.
scabra, Lam. l. c. 417.—Ins. S. Doming.
scabrida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 83.—Am. austr.
scandens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4.—Jamaic.
scandens, Willd. Enum. Hort. Berol. 188 = *peruviana*.
Schiedeana, G. Don, Gen. Syst. iv. 368.—Mexic.
Schomburgkii, DC. Prod. ix. 517.—Guian.
sericea, Vahl, Eclog. Am. i. 17 = *tomentosa*?
serrata, Linn. Sp. Pl. 140 = *Cordia mirabiliflora*.
sessilifolia, Poir. Encyc. v. 360.—Reg. Argent.
sibirica, Linn. Sp. Pl. 141.—Ross; Sibir.
spigeliaeflora, A. DC. in DC. Prod. ix. 525.—Guian.
staminea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 484.—Ind. occ.
stenoraca, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 250.—Afr. trop.
strigosa, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 207 = *psilostachya*.
suaveolens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 81.—Peruv.
subsessilis, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 119.—Bras.
subulata, Hochst. ex DC. Prod. ix. 528 = *Heliotropium zeylanicum*.
suffruticosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 202 = *incana*.
surinamensis, A. DC. in DC. Prod. ix. 526 = *laurifolia*.
synzystachya, Roem. & Schult. Syst. iv. 539 = *Heliotropium synzystachyum*.
syringaeifolia, Miq. Stirp. Surin. Sel. 137. t. 41.—Guian.
syringaeifolia, Vahl, Symb. Bot. iii. 23 = *laurifolia*.
tenuiflora, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 540 = *Declieuxia herbacea*.
tenuifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 694, sphalm. = *ternifolia*.
ternata, Wall. Cat. n. 912.—Burma.
ternifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 84.—Am. austr.
tetragona, D. Dietr. Syn. Pl. i. 629, sphalm. = *seq.*
tetrandra, Blume, Bijdr. 845.—Ins. Molucc.
tetrandra, Wall. Cat. n. 911 = *Wallichii*.
tomentosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5.—Am. trop.
trichocalycina, DC. Prod. ix. 517.—Mexic.
tristachya, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 540 = *psilostachya*.
tuberculosa, Cham. in Linnaea, iv. (1829) 467.—Afr. austr.
umbellata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 79.—Mexic.
undulata, Benth. Pl. Hartw. 20 = *Hartwegiana*.
undulata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 25.—Venezuela.
Urvilleana, Cham. in Linnaea, iv. (1829) 465.—Ins. Philipp.
Vauthieri, DC. Prod. ix. 526.—Bras.
velutina, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 79. t. 201.—Mexic.
velutina, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 13 = *argentea*.
villosa, Salzm. ex DC. Prod. ix. 524.—Bras.
virgata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 25.—Peruv.
viridiflora, Gamble, Darjeeling List, 57 = *Hookeri*.
viridiflora, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 5; Cat. n. 907 = *sarmentosa*.
volubilis, Linn. Sp. Pl. 140.—Am. trop.
volubilis, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 24 = *peruviana*.
vulgaris, Salzm. ex DC. Prod. ix. 524 = *Salzmanni*.
Walkeriae, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 147.—Zeylan.
Wallichii, DC. Prod. ix. 527.—Malaya.
Wallichii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 214 = *Walkeriae*.
Wightii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 146.—Ind. or.
zeylanica, Wight, Illustr. t. 170 = *Heliotropium zeylanicum*.

TOURNESOL, Adans. Fam. ii. 356 (1763) = seq.

TOURNESOLIA, Nissol. ex Scop. Introd. 243 (1777) = *Chrozophora*, Neck. (1790) (Euphorb.).

TOURNEUXIA, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 395; et in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 211. t. 13. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 532.
variifolia, Coss. *ll. cc.* 396; 212.—Alger.

TOURNONIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 225 (1849). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 77.
Hookeriana, Moq. l. c. —N. Granat.
leptostachys, Moq. l. c. = Boussingaultia baselloides.

TOUROLIA, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 104 (1812) = *TOUROULIA*, Aubl. = *Quina*, Aubl. (Guttif.).

TOUROUBEA, Steud. Nom. ed. II. ii. 694 (1841), sphalm. = *Souroubea*, Aubl. (Ternstr.).

TOUROULIA, Aubl. Pl. Gui. i. 492. t. 194 (1775) = *Quina*, Aubl. (Guttif.).
guianensis, Aubl. l. c. = *Q. guianensis*.
soltaria, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 105 = *Q. guianensis*.

TOURRETIA, Foug. in Mém. Acad. Sc. Par. 1784 (1787) 205. t. 1. *BIGNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1049.
DOMBEYA, L'Hérit. Stirp. Nov. 33. t. 17 (1784).
MEDICA, Cothen. Disp. Veg. 7 (1790).
lappacea, Willd. Sp. Pl. iii. 263 = *volubilis*.
scaber, Domb. ex DC. Prod. ix. 239 = *Eccremocarpus scaber*.
volubilis, *f. F. Gmel. Syst.* 940.—Peruv.

TOURRETTIA, DC. Prod. ix. 236 (1845), sphalm. = *praec.*

TOVARA, Adans. Fam. ii. 276 (1763) = *Polygonum*, Tourn.
virginiana, Rafin. Fl. Tellur. iii. 12 = *P. virginianum*.

TOVARIA, Neck. Elem. iii. 190 (1790) = *Smilacina*, Desf. (Liliac.).
davurica, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 567 = *S. dahirica*.
flexuosa, Baker, l. c. = *S. flexuosa*.
fusca, Baker, l. c. 568 = *S. fusca*.
japonica, Baker, l. c. 570 = *S. japonica*.
laxiflora, Baker, l. c. 569 = *S. laxiflora*.
nervulosa, Baker, l. c. = *S. nervulosa*.
oleracea, Baker, l. c. = *S. oleracea*.
oligophylla, Baker, l. c. 565.—Reg. Himal.
pallida, Baker, l. c. 566 = *S. purpurea*.
paniculata, Baker, l. c. 568 = *S. paniculata*.
purpurea, Baker, l. c. 566 = *S. purpurea*.
racemosa, Neck. Elem. iii. 190 = *S. racemosa*.
Rossii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 387 = *S. japonica*.
Salvini, Baker, l. c. xiv. (1875) 567 = *S. Salvini*.
scilloides, Baker, l. c. = *S. scilloidea*.
sessilifolia, Baker, l. c. 566 = *S. sessilifolia*.
stellata, Neck. Elem. iii. 190 = *S. stellata*.
thyrsoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 568 = *S. thyrsoides*.
trifolia, Neck. Elem. iii. 190 = *S. trifolia*.

TOVARIA, Ruiz & Pav. Prod. 49. t. 8 (1794). *CAPPARIDAE*, Benth. & Hook. f. i. 110.
BANCROFTIA, Macfad. Fl. Jamaica. i. 112 (1837).
pendula, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 373. t. 309.—Peruv.; Ind. occ.

TOVOMIA, Pers. Syn. ii. 68 (1807) = seq.

TOVOMITA, Aubl. Pl. Gui. ii. 956. t. 364 (1775). *GUTTIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 173.
BEAUHARNOISIA, Ruiz & Pav. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 71. t. 9.
EUTHALES, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 307 (1817).
MARIALVA, Vand. Fl. Lusit. 37 (1788).
MICRANTHERA, Choisy, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1823) 224. tt. 11, 12.

TOVOMITA :—

amazonica, Poepp. & Endl. ex Walp. Rep. i. 392.—Bras.; Ind. occ.
brasiliensis, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 83.—Bras.
calyptata, Schlecht. in Linnæa, viii. (1838) 187 = *Rheedia calyptata*.
Choisyana, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 281.—Guian.
clusiaefolia, G. Don, Gen. Syst. i. 617.—Guian.
clusioides, Cambess. in Mém. Mus. Par. xvi. (1828) 419 = *Richardiana*.
clusioides, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 166.—Cuba.
foliosa, Presl, Symb. Bot. ii. 20 = *paniculata*.
fructipendula, Cambess. in Mém. Mus. Par. xvi. (1828) 419 = *brasiliensis*.
fructipendula, G. Don, Gen. Syst. i. 617.—Peruv.
Goudotiana, Cambess. ex C. Muell. in Walp. Ann. vii. 355 = *Ochrocarpus Goudotianus*.
gracilipes, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 280.—Bras.
Grisebachiana, Planch. & Triana, l. c. 284.—Cuba.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. ii. 957.—Guian.
hameliaefolia, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 996, nomen = *Schomburgkiana*?
havetioides, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 106.—Jamaic.
laurina, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 282.—Bras.
leucantha, Planch. & Triana, l. c. 278.—Bras.
ligustrina, Poit. ex Planch. & Triana, l. c. 270 = *brasiliensis*.
macrophylla, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 996, nomen.—Guian.
macrophylla, Walp. Rep. i. 392.—Bras.
madagascariensis, Cambess. in Mém. Mus. Par. xvi. (1828) 419 = *Ochrocarpus madagascariensis*.
microcarpa, Walp. Rep. i. 392.—Peruv.
myriandra, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 368.—Guian.
nigrescens, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 276.—Guian.
paniculata, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 315.—Bras.
pentapetala, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 432 = *Ochrocarpus pentapetalus*.
Plumieri, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 106.—Ins. Dominic.
pyrifolia, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 280 = *macrophylla*.
Richardiana, Planch. & Triana, l. c. 273.—Guian.
rubella, Spruce, ex Planch. & Triana, l. c. 275.—Bras.
Schomburgkiana, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 996, nomen (an seq.?).—Guian.
Schomburgkii, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 274.—Guian.
secunda, Poepp. ex Planch. & Triana, l. c. 271 = *brasiliensis*.
Spruceana, Planch. & Triana, l. c. 277.—Am. austr.
stigmata, Planch. & Triana, l. c. 275.—N. Granat.
stylosa, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 3.—Panama.
tenuiflora, Benth. ex Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 272.—Bras.
turbinata, Planch. & Triana, l. c. 283.—N. Granat.
umbellata, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 367.—Guian.
uniflora, G. Don, Gen. Syst. i. 617.—Guian.
Weddeliana, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 277.—Bolivia.

TOVOMITOPSIS, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 261 = *Chrysochlamys*, Pocpp. (Guttif.).
costaricana, Oerst. ex Planch. & Triana, l. c. 265 = *C. costa-ricana*.
cuneata, Planch. & Linden, l. c. 264.—N. Granat.
glauca, Oerst. ex Planch. & Triana, l. c. = *C. glauca*.
nicaraguensis, Oerst. ex Planch. & Triana, l. c. 266 = *C. nicaraguensis*.
paniculata, Planch. & Triana, l. c. 262 = *Tovomita paniculata*.
psychotriaefolia, Oerst. ex Planch. & Triana, l. c. 263 = *C. psychotriaefolia*.

TOWNSENDIA, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 16. t. 119 (1833). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 268.
arizonica, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 85.—N. Mexic.
condensata, Parry, in Am. Natural. viii. (1874) 106, 213.—Am. bor. occ.

TOWNSENDIA :—

eximia, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 70.—N. Mexic.
Fendleri, A. Gray, l. c. —N. Mexic.
florifer, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 84.—Am. bor. occ.
Fremontii, Torr. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1847) 106 = *incana*.
glabella, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 86.—Am. bor. occ.
grandiflora, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 306.—Am. bor. occ.
incana, Nutt. l. c. 305.—Am. bor. occ.
mexicana, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 70.—Mexic.
Parryi, Eaton, in Am. Natural. viii. (1874) 212.—Am. bor. occ.
Rothrockii, A. Gray, ex Rothrock, in Wheeler, Rep. vi. 148.—Am. bor. occ.
scapigera, Eaton, in Bot. King's Exped. 145. t. 17.—Am. bor. occ.
sericea, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 16. t. 119.—Am. bor. occ.
spathulata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 305.—Am. bor. occ.
strigosa, Eaton, in Bot. King's Exped. 145 = *Watsoni*.
strigosa, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 344 = *florifer*.
strigosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 306.—Am. bor. occ.
Watsoni, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 84.—Am. bor. occ.
Wilcoxiana, Wood, in Bull. Torrey Bot. Club, vi. (1875) 163.—Am. bor. occ.
Wrightii, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 78 = *Aster Wrightii*.

TOXANTHERA, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. xv. 16. t. 1421 (1883). *CUCURBITACEAE*.
natalensis, Hook. f. l. c. —Afr. austr.

TOXANTHES, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 176. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 317.
ANTHOCERASTES, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 225.
major, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 64 = *Scyphocoronis viscosa*.
Muelleri, Benth. Fl. Austral. iii. 592.—Austral.
perpusilla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 177.—Austral.

TOXANTHUS, Benth. Fl. Austral. iii. 592 (1866), sphalm. = *praec.*

TOXICARIA, Aepnel. ex Steud. Nom. ed. I. 434, in syn. (1821) = *Antiaris*, Lesch. (Urtic.).
macassariensis, Aepnel. ex Steud. l. c. = *A. toxicaria*.

TOXICARIA, Schreb. in Naturf. xix. (1783) 146 = *Strychnos*, Linn. (Logan.).
americana, Schreb. l. c. = *S. Rouhamon*.

TOXICODENDRON, Auct. = *Toxicodendrum*, Thunb. (Euphorb.).

TOXICODENDRON, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735) = *Rhus*, Tourn. (Anacard.).
altissimum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10 = *R. succedanea*.
arborescens, Mill. l. c. n. 9 = *R. arborescens*.
arborescens, Mill. l. c. n. 8 = *Schmidelia Cominia*.
crenatum, Mill. l. c. n. 5 = *R. aromatica*.
cuneatum, C. Koch, Dendrol. i. 579 = *R. aromatica*.
glabrum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *R. glabra*.
magnum, Bertram, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 694 = *R. Toxicodendron*.
pinnatifolium, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *Amyris toxifera*.
pubescens, Mill. l. c. n. 2 = *R. Toxicodendron*.
serratum, Mill. l. c. n. 7 = *R. Toxicodendron*.
volubile, Mill. l. c. n. 6 = *R. Toxicodendron*.
vulgare, Mill. l. c. n. 1 = *R. Toxicodendron*.

TOXICODENDRUM, Gaertn. Fruct. i. 207. t. 44 (1788) = *Allophylus*, Linn. (Sapind.).
Cobbe, Gaertn. l. c. = *A. Cobbe*.

TOXICODENDRUM, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1796) 188. t. 7. *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 280.

HYAENANCHE, Lamb. Desc. Cinch. (1797) 52. t. 10. *acutifolium*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 214.—Afr. austr.

capense, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1796) 188. t. 7.—Afr. austr.

TOXICOPHLAEA, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 24 = *Acokanthera*, G. Don (Apocyn.). *cestroides*, A. DC. in DC. Prod. viii. 336 = *A. venenata*. *spectabilis*, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 79 = *A. spectabilis*.

Thunbergii, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 24 = *A. venenata*.

Thunbergii, Hort. Williams.—Cf. Gard. Chron. (1872) 327, 363 = *A. spectabilis*.

TOXINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 4 = *Buddleia*, Houst. (Logan.).

TOXOCARPUS, Wight & Arn. Contrib. 61 (1834). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 746.

GONIOSTEMMA, Wight, Contrib. 62 (1834).

RHYNCHOSTIGMA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 771 (1876).

SCHISTOCODON, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 362.

acuminatus, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 15.—Reg. Himal.

africanus, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 109.—Afr. trop.

auriculatus, Decne. in DC. Prod. viii. 505.—Java. Blumei, Decne. l. c. 506.—Java.

concanensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 14.—Ind. or. *crassifolius*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 148 = *Genianthus laurifolius*.

crassifolius, Wight & Arn. Contrib. 61 = *Genianthus crassifolius*.

eriocarpus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 15 (sp. dub.).—Ind. or.

glaucus, Decne. in DC. Prod. viii. 505.—Ins. Philipp. *gracilis*, Decne. l. c.—Ins. Philipp.

Griffithii, Decne. l. c.—Burma; Malaya.

himalensis, Falc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 13.—Reg. Himal.

Kleinii, Wight & Arn. Contrib. 61.—Ind. or.

Kurzii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 15.—Ins. Andaman. *laurifolius*, Wight & Arn. Contrib. 61 = *Genianthus laurifolius*.

longistigma, Wight & Arn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 694 = *Roxburghii*.

macrophyllus, Decne. in DC. Prod. viii. 505.—Java. *maritimus*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 476.—Java.

oblongifolius, Decne. in DC. Prod. viii. 505.—Ins. Maurit. (cult.).

Roxburghii, Griff. Notul. iv. 68; Ic. Pl. Asiat. t. 386 A. f. 4, 5 = *Griffithii*?

Roxburghii, Wight & Arn. Contrib. 61.—Ind. or. *villosus*, Decne. in DC. Prod. viii. 506.—Java.

Wightianus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 200 (sp. dub.).—Reg. Himal.; China.

TOXOPHOENIX, Schott, Nachr. Oester. Naturf. in Brasil. Anh. ii. 12 (1822) = *Astrocaryum*, G. F. W. Mey. (Palm.).

aculeatissima, Schott, l. c. 12 = *A. Ayri*.

TOXOPUS, Rafin. New Fl. Am. ii. 71 (1836) = *Macranthera*, Torr. (Scrophul.).

calycinus, Rafin. l. c. 72 = *M. fuchsoides*. *gymnanthes*, Rafin. l. c. = *M. Lecontii*.

TOXOSIPHON, Baill. Adansonia, x. (1872) 311 = *Erythrochiton*, Nees & Mart. (Rutac.).

Lindeni, Baill. l. c. 312 = *E. Lindeni*.

TOXOSTIGMA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 86. t. 77 (1850) = *Arnebia*, Forsk. (Borag.).

luteum, A. Rich. l. c.—Abyss. *purpurascens*, A. Rich. l. c. 87.—Abyss.

TOXOTROPHIS, Planch. in DC. Prod. xvii. 208 (1873), sphalm. = *Taxotrophis*, Blume (Urtic.).

TOXOTROPIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xix. (1846) ii. 506 = *Corynella*, DC. (Legumin.).

Jaegeri, Turcz. l. c. 507 = *C. polyantha*.

TOXYLON, Rafin. in Am. Monthly Mag. iv. (1818) 188 = *Maclura*, Nutt. (Urtic.).

Maclura, Rafin. New Fl. Am. iii. 43 = *M. aurantiaca*.

TOZZETTIA, Parl. Nuov. Gen. e Spec. 11 (1854) = *Fritillaria*, Tourn. (Liliac.).

persica, Parl. l. c. 13 = *F. persica*.

TOZZETTIA, Savi, in Mem. Soc. Ital. Sc. viii. (1798) 477 = *Alopecurus*, Linn. (Gramin.).

pratensis, Savi, l. c. = *A. utriculatus*. *utriculata*, Savi, in Usteri, Ann. Bot. xxiv. (1800) 49 = *A. utriculatus*.

TOZZIA, Linn. Gen. ed. I. 181 (1737). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 980.

FERECUPPA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 373 (1867). *KERNERA*, Schrank, Baier. Reise, 50 (1786).

alpina, Linn. Sp. Pl. 607.—Europ.

TRACANTHELIUM, Kit. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 47 = *Phyteuma*, Linn. (Campan.).

canescens, Schur, l. c. = *P. canescens*. *salignum*, Schur, Enum. Pl. Transs. 973 (Index) = *P. canescens*.

TRACAULON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 13 (1836) = *Polygonum*, Tourn.

arifolium, Rafin. l. c. = *P. arifolium*.

TRACHELANTHUS, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 82. t. 8 C = *Begonia*, Tourn.

attenuatus, Klotzsch, l. c. 83 = *B. attenuata*. *rhizocarpus*, Klotzsch, l. c. = *B. rhizocarpa*.

TRACHELANTHUS, Kunze, in Bot. Zeit. viii. (1850) 665 = *Solenanthus*, Ledeb. (Borag.).

cerinthoides, Kunze, l. c. = *S. cerinthoides*. *kurdicus*, Boiss. Fl. Orient. iv. 271 = *S. cerinthoides*.

TRACHELIOPSIS, Opiz, Seznam, 98 (1852) = *Campanula*, Tourn.

latifolia, Opiz, l. c. = *C. latifolia*. *vulgaris*, Opiz, l. c. = *C. Trachelium*.

TRACHELIUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 563.

alteratum, Bianca, ex Nym. Consp. 485 = *caeruleum*. *angustifolium*, Schousb. Vextr. Marokk, 85.—Marocc.

asperuloides, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. iii. 117 = *Gracia*.

azureum, Gouan, Hort. Monsp. 100 = *caeruleum*. *caeruleum*, Linn. Sp. Pl. 171.—Reg. Mediterr. occ.

diffusum, Linn. f. Suppl. 143 = *Prismatocarpus diffusus*. *Jacquini*, Boiss. Fl. Orient. iii. 961.—Ins. Creta.

lanceolatum, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 252.—Sicil. *longifolium*, Bianca, ex Guss. l. c. 577 = *lanceolatum*.

myrtifolium, Boiss. Fl. Orient. iii. 962.—As. Min. *rumelianum*, Hampe, in Flora, xx. (1837) 234.—*Gracia*.

rumelicum, Boiss. Fl. Orient. iii. 961, sphalm. = *praec. serotinum*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 117 = *tubulosum*.

tenuifolium, Linn. f. Suppl. 143 = *Merciera tenuifolia*.

tubulosum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 60.—Cilicia; Syria.

TRACHELOCARPUS, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 909 (1857) = *Begonia*, Tourn.

attenuatus, C. Muell. l. c. 910 = *B. attenuata*. *rhizocarpus*, C. Muell. l. c. = *B. rhizocarpa*.

TRACHELOSPERMUM, Lem. Jard. Fleur. i. (1851) t. 61. *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 720.

PARECHITES, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. vi. (1857) 193.

RHYNCHOSPERMUM, Lindl. in Journ. Hort. Soc. i. (1846) 74.

TRIADENIA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 458 (1856). *axillare*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 668.—Reg. Himal.

difforme, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 85.—Am. bor. *fragrans*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 667.—Reg. Himal.

gracilipes, Hook. f. l. c. 668.—Reg. Himal. *jasmynoides*, Lem. Jard. Fleur. i. (1851) t. 61.—China.

TRACHINEMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27 (1836) = *Anthericum*, Linn. (Liliac.).

hispidum, Rafin. l. c. = *A. hispidum*. *vespertina*, Rafin. l. c. = *A. falcatum*.

TRACHODES, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 182 = *Sonchus*, Tourn. (Compos.).

paniculatus, D. Don, l. c. = *S. paniculatus*.

TRACHOPYRON, Ger. ex Rafin. Fl. Tellur. iii. 10 (1836) = *Polygonum*, Tourn.

TRACHYANDRA, Kunth, Enum. Pl. iv. 573 (1843) = *Anthericum*, Linn. (Liliac.).

affinis, Kunth, l. c. 579 = *A. Jacquinianum*. *asperata*, Kunth, l. c. 574 = *A. asperatum*.

blepharophora, Kunth, l. c. 578 = *A. ciliatum*, Linn. f. *bracteosa*, Kunth, l. c. 582 = *A. ciliatum*, Linn. f.

Brehmeana, Kunth, l. c. 586 = *A. Brehmeana*. *canaliculata*, Kunth, l. c. 578 = *A. canaliculatum*.

ciliata, Kunth, l. c. 585 = *A. ciliatum*, Linn. f. *corymbosa*, Kunth, l. c. 577 = *A. hirsutum*.

divaricata, Kunth, l. c. 580 = *A. revolutum*. *elongata*, Kunth, l. c. 584 = *A. Jacquinianum*.

falcata, Kunth, l. c. 586 = *A. falcatum*. *fimbriata*, Kunth, l. c. 583 = *A. longifolium*.

flexifolia, Kunth, l. c. 579 = *A. flexifolium*. *floribunda*, Kunth, l. c. 583 = *Bulbinella latifolia*.

hirsuta, Kunth, l. c. 577 = *A. hirsutum*. *hispidum*, Kunth, l. c. 574 = *A. hispidum*.

humilis, Kunth, l. c.—Afr. austr. *Jacquinii*, Kunth, l. c. 578 = *A. Jacquinianum*.

longepedunculata, Kunth, l. c. 584 = *A. longepedunculatum*.

longifolia, Kunth, l. c. 582 = *A. longifolium*. *muricata*, Kunth, l. c. 576 = *A. muricatum*.

paradoxa, Kunth, l. c. 576 = *A. paradoxum*. *pauciflora*, Kunth, l. c. 584 = *A. triflorum*.

revoluta, Kunth, l. c. 579 = *A. revolutum*. *scabra*, Kunth, l. c. 585 = *A. scabrum*.

Schultesii, Kunth, l. c. 586 = *A. Schultesii*. *undulata*, Kunth, l. c. 582 = *A. hispidum*.

vespertina, Kunth, l. c. 581 = *A. falcatum*.

TRACHYCARPUS, H. Wendl. in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 429. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 929.

excelsus, H. Wendl. l. c.—Japon. *Fortunei*, H. Wendl. l. c.—China.

Griffithii, Hort. ex Rev. Hort. (1879) 212 = *khassianus*.

khassianus, H. Wendl. in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 429.—Reg. Himal.

Martianus, H. Wendl. in Kerch. Palm. 258.—Reg. Himal.

TRACHYCARYON, Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. i. 175 (1844) = *Adriana*, Gaudich. (Euphorb.).

Billardieri, Klotzsch, ex Benth. Fl. Austral. vi. 135 = *A. quadripartita*.

Cunninghami, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 15 = *A. glabrata*.

Hookeri, F. Muell. l. c. 16 = *A. Hookeri*. *Klotzschii*, F. Muell. l. c. 15 = *A. Klotzschii*.

Labillardieri, Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. i. 175 = *A. quadripartita*.

TRACHYDIUM, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 232 (1835). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 884.

EREMODAEUS, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat. (1843).—Cf. Linnaea, xviii. (1844) 151.

HAPLOSCIADIUM, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 20. *abyssinicum*, Benth. & Hook. f. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 10.—Afr. trop.

depressum, Boiss. Fl. Orient. ii. 929.—Persia. *dissectum*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 672.—Reg. Himal.

elbrusense, Boiss. Fl. Orient. ii. 930.—Persia. *hirsutulum*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 672.—Reg. Himal.

Kotschyi, Boiss. Fl. Orient. ii. 929.—Persia. *novem-jugum*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 672.—Reg. Himal.

obtusiusculum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 884; C. B. Clarke, l. c. 673.—Reg. Himal.

Roylei, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 232.—Reg. Himal.; Ind. or.

TRACHYLOBIUM, Hayne, in Flora, x. (1827) 743; et Arzn. Gew. xi. t. 18 (1830). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 583.
floribundum, G. Don, Gen. Syst. ii. 459 = *Hymenaea floribunda*.
Gaertnerianum, Hayne, in Flora, x. (1827) 744 = *Hornemannianum*.
Hornemannianum, Hayne, l. c. — Afr. trop.
Lamarckeanum, Hayne, l. c. = *Hymenaea verrucosa*.
Martianum, Hayne, l. c. = *Hymenaea Martiana*.
mossambicense, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 21. t. 11 = *Hornemannianum*.
verrucosum, Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 311, in adnot. — Ins. Mascari.

TRACHYLOMIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 174 (1842) = *Scleria*, Berg. (Cyperac.).
triglomerata, Nees, l. c. = *S. triglomerata*.

TRACHYMARATHRUM, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 344 = *Hippomarathrum*, Link (Umbell.).
sciculum, Tausch, l. c. 344 = *H. cristatum*.

TRACHYMENE, DC. Prod. iv. 72 (1830) = *Platysace*, Bunge (Umbell.).
anceps, DC. Prod. iv. 73 (= *Sieberta compressa*). — Austral.
Billardieri, F. Muell. Census, 62 = seq.
buxifolia, Sieber, ex DC. Prod. iv. 73 (= *Sieberta Billardieri*). — Austral.
Candelabrum, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 289 (= *Sieberta juncea*). — Austral.
cirrosa, F. Muell. Census, 62 = *P. cirrosa*.
commutata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 30 (= *Sieberta commutata*). — Austral.
compressa, Spreng. Sp. Umbellif. 9 (= *Sieberta compressa*). — Austral.
conferta, Gaudich. ex Benth. in Enum. Pl. Hueg. 54 = seq.
crassifolia, Benth. l. c. 54 (= *Sieberta Billardieri*). — Austral.
deflexa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 31 (= *Sieberta deflexa*). — Austral.
dissecta, F. Muell. Census, 62 (= *Sieberta dissecta*). — Austral.
effusa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 31 = *P. trachymenoides*.
ericoides, Sieber, ex DC. Prod. iv. 73 (= *Sieberta ericoides*). — Austral.
filiformis, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 289 (= *Sieberta juncea*). — Austral.
haplosciadea, F. Muell. Census, 62 (= *Sieberta haplosciadea*). — Austral.
heterophylla, F. Muell. First Gen. Rep. 13 (= *Sieberta heterophylla*). — Austral.
juncea, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 287 (= *Sieberta juncea*). — Austral.
lanceolata, Spreng. Syst. i. 879 (= *Sieberta Billardieri*). — Austral.
linearis, Spreng. Sp. Umbellif. 7 (= *Sieberta linearifolia*). — Austral.
myrtifolia, Sieber, ex DC. Prod. iv. 73 = seq.
ovalis, DC. l. c. (= *Sieberta Billardieri*). — Austral.
ovata, Spreng. Sp. Umbellif. 7 = praec.
pendula, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 54 (= *Sieberta juncea*). — Austral.
platyptera, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 287 (= *Sieberta compressa*). — Austral.
ramosissima, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 54 (= *Sieberta juncea*). — Austral.
scabriuscula, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 287 = praec.
Stephensonii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 170 (= *Sieberta Stephensonii*). — Austral.
stricta, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 288 (= *Sieberta compressa*). — Austral.
subvelutina, DC. Prod. iv. 73 (= *Sieberta ericoides*). — Austral.
tenuis, DC. l. c. 73 = praec.
tenuissima, F. Muell. Census, 62 (= *Sieberta tenuissima*). — Austral.
teres, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 286 (= *Sieberta juncea*). — Austral.
valida, F. Muell. Census, 62 = *P. valida*.

TRACHYMENE, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 300. t. 21. *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 873.
CESATIA, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 200.
DIDISCUS, DC. in Bot. Mag. t. 2875 (1828).

TRACHYMENE:—

DIMETOPIA, DC. Prod. iv. 71 (1830).
HEMICARPUS, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 18.
HUEGELIA, Reichb. Consp. 144 (1828).
LAMPRA, Lindl. ex DC. Prod. iv. 72 (1830).
PRITZELIA, Walp. Rep. i. 428 (1842).
australis, Benth. Fl. Austral. iii. 349. — Austral.
austro-caledonica, F. Muell. Phyt. New Hebr. 13. — N. Hebrid.
coerulea, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (July-Sept. 1828) 380. — Austral.
cyanea, A. Cunn. ex DC. Prod. iv. 72 = *coerulea*.
cyanopetalea, Benth. Fl. Austral. iii. 348. — Austral.
eriocarpa, Benth. l. c. — Austral.
gigantea, Ait. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 650. — Hab. ?
glandulosa, Benth. Fl. Austral. iii. 350. — Austral.
glaucofolia, Benth. l. c. — Austral.
hemicarpa, Benth. l. c. 351. — Austral.
Homei, Seem. in Journ. Bot. ii. (1864) 75. — N. Caled.
hnmilis, Benth. Fl. Austral. iii. 351. — Austral.
incisa, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 300. t. 21. — Austral.
lanceolata, Rudge, l. c. — Austral.
ovata, Rudge, l. c. 300. — Austral.
pilosa, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. Add. n. 2. — Austral.
procumbens, Benth. Fl. Austral. iii. 350. — Austral.
villosa, Benth. Fl. Austral. iii. 349. — Austral.

TRACHYNIA, Link, Hort. Berol. i. 42 (1827) = *Brachypodium*, Beauv. (Gramin.).
distachya, Link, l. c. 43 = *B. distachyum*.
rigida, Link, l. c. = *Triticum asperum*.
subtilis, Hort. ex Ind. Sem. Hort. Lips. (1842). — Cf. Walp. Ann. i. 948 = *B. distachyum*.

TRACHYNOTIA, Michx. Fl. Bor. Am. i. 63 (1803) = *Spartina*, Schreb. (Gramin.).
alterniflora, DC. Fl. Fr. Suppl. 279 = *S. stricta*.
alternifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 695, sphalm. = praec.
cynosuroides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 64 = *S. Schreberi*.
fasciculata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 443, in obs. = *S. fasciculata*.
juncea, Michx. Fl. Bor. Am. i. 64 = *S. juncea*.
patens, Poir. Encyc. Suppl. ii. 443, in obs. = *S. patens*.
polystachya, Michx. Fl. Bor. Am. i. 64 = *S. polystachya*.
stricta, DC. Fl. Fr. iii. 74 = *S. stricta*.

TRACHYOZUS, Reichb. Consp. 48 (1828) = *Trachys*, Pers. (Gramin.).
muricata, Steud. Syn. Pl. Gram. 112 = *Trachys mucronata*.

TRACHYPHYTUM, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 651 (1833). *SCITAMINEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

TRACHYPHYTUM, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 533 (1840) = *Mentzelia*, Plum. (Loasac.).
albicaule, Nutt. l. c. 534 = *M. albicaulis*.
congestum, Nutt. l. c. = *M. congesta*.
gracile, Nutt. l. c. = *M. albicaulis*.

TRACHYPLEURUM, Reichb. Consp. 143 (1828) = *Bupleurum*, Tourn. (Umbell.).
tenuissimum, Schur, Enum. Pl. Transs. 251 = *B. tenuissimum*.

TRACHYPOGON, Nees, Agrost. Bras. 341 (1829), partim. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1133.
angustifolius, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 522. — Mexic.
angustifolius, Nees, Agrost. Bras. 342 = polymorphus.
argenteus, Nees, l. c. 348 = *Andropogon saccharoides*.
avenaceus, Nees, l. c. 354 = *Sorghum halepense*.
canescens, Nees, l. c. 343 = polymorphus.
capensis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 257 = polymorphus.
dactyloides, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 523. — Mexic.

TRACHYPOGON:—

dissolutus, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 695 = polymorphus.
Gouini, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 523 = polymorphus.
gracilis, Anderss. in Oefv. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. xiv. (1857) 50 = polymorphus.
hirtus, Nees, Agrost. Bras. 346 = *Heteropogon hirtus*.
laguroides, Nees, l. c. 349 = *Andropogon saccharoides*.
ligularis, Nees, l. c. 345 = polymorphus.
macroglossus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 257 = polymorphus.
micans, Anderss. in Oefv. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. xiv. (1857) 47 = polymorphus.
Minarum, Nees, Agrost. Bras. 349 = *Chrysopogon stipoides*.
mollis, Nees, l. c. 343 = polymorphus.
Montufari, Nees, l. c. 342 = polymorphus.
Muelleri, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 523 = polymorphus.
plumosus, Nees, Agrost. Bras. 344 = polymorphus.
polymorphus, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. iii. 263. — Reg. trop. et subtrop.
Preslei, Anderss. in Oefv. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. xiv. (1857) 50 = polymorphus.
pubescens, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 180 = *Heteropogon pubescens*.
rufus, Nees, Agrost. Bras. 346 = *Andropogon rufus*.
scaberrimus, Nees, l. c. 354 = *Chrysopogon nutans*.
Schoenanthus, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 281 = *Andropogon Nardus*.
scrobiculatus, Nees, Agrost. Bras. 347 = *Heteropogon acuminatus*.
stipoides, Nees, l. c. 351 = *Chrysopogon avenaceus*.
truncatus, Anderss. in Oefv. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. xiv. (1857) 49 = polymorphus.
vestitus, Anderss. l. c. 52. — Bras.
violaceus, Anderss. l. c. 49 = polymorphus.

TRACHYRHYNCHIUM, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 113 = *Cladium*, P. Br. (Cyperac.).
iridifolium, Nees, l. c. 114 (= *Baumea Meyenii*). — Ins. Sandvic.

TRACHYRHYNGIUM, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 314, in syn. (1837), sphalm. = praec.

TRACHYS, Pers. Syn. i. 85 (1805). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1122.
TRACHYOZUS, Reichb. Consp. 48 (1828).
TRACHYSTACHYS, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 16 (1833).
mucronata, Pers. Syn. i. 85. — Ind. or.
muricata, Steud. Syn. Pl. Gram. 112, sphalm. = praec.

TRACHYSCIADIUM, Eckl. & Zeyh. Enum. 341 (1837) = *Carum*, Rupp. (Umbell.).
capense, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. capense*.

TRACHYSPERMA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = *Limonanthemum*, S. T. Gmel. (Gentian.).
nutans, Rafin. l. c. = *L. trachyspermum*.

TRACHYSPERMUM, Link, Enum. Hort. Berol. i. 267 (1821) = *Carum*, Rupp. (Umbell.).
copticum, Link, l. c. = *C. copticum*.
rigens, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 103 (= *Bunium rigens*). — Afr. austr.

TRACHYSTACHYS, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 16 (1833) = *Trachys*, Pers. (Gramin.).
geminata, A. Dietr. l. c. = *Trachys mucronata*.

TRACHYSTELLA, Steud. Nom. ed. II. ii. 695 (1841), sphalm. = *TRACHYTELLA*, DC. = *Tetracera*, Linn. (Dillen.).

TRACHYSTEMMA, Auct. ex Meissn. Gen. Comm. 188 (1840) = seq.

TRACHYSTEMON, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xiii. (1832) 239. *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 855.
NORDMANNIA, Ledeb. ex Nordm. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. ii. (1837) 312.
PSILOSTEMON, DC. Prod. x. 35 (1846).

TRACHYSTEMON:—

creticum, *D. Don*, ex *G. Don*, *Gen. Syst.* iv. 309.—Archip. Graec.
orientale, *D. Don*, in *Edinb. N. Phil. Journ.* xiii. (1832) 239.—As. Min.

TRACHYSTIGMA, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* v. 131 (1883). *CYRTANDREAE*.
Mannii, *C. B. Clarke*, *l. c.*—Afr. trop.

TRACHYTELLA, *DC. Syst.* i. 410 (1818) = *Tetracera*, *Linn.* (*Dilleniaceae*).
Actaea, *DC. l. c.* = *Tet. sarmentosa*.
aspera, *DC. l. c.* = *Tet. sarmentosa*.
Calligonum, *DC. l. c.* = *Tet. sarmentosa*.

TRACHYTHECA, *Nutt. ex Benth.* in *DC. Prod.* xiv. 7 (1857) = *Eriogonum*, *Michx.* (*Polygon.*).

TRACTEMA, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 57 (1836) = *Scilla*, *Linn.* (*Liliac.*).
pumila, *Rafin. l. c.* = *S. monophyllos*.

TRADESCANTIA, *Rupp. ex Linn. Syst. ed. I* (1735).
COMMELINACEAE, *Benth. & Hook. f.* iii. 853.
APLOLEIA, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 17 (1836).
DESCANTARIA, *Schlecht.* in *Linnaea*, xxvi. (1853–55) 140.

DISGREGA, *Hassk.* in *Flora*, xlix. (1866) 215.
EPHEMERUM, *Tourn. ex Moench, Meth.* 237 (1794).
ETHEOSANTHES, *Rafin. Neogenyt.* 3 (1825).
GIBASIS, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 16 (1836).
HEMINEMA, *Rafin. l. c.* 17 (1836).
HETERACHTHIA, *Kunze*, in *Bot. Zeit.* viii. (1850) 1.

KNOWLESIA, *Hassk.* in *Flora*, xlix. (1866) 215.
LEIANDRA, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 17 (1836).
MANDONIA, *Hassk.* in *Flora*, liv. (1871) 260.
PHYODINA, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 16 (1836).
PYRHEIMA, *Hassk.* in *Flora*, lii. (1869) 366.
SIDERASIS, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 67 (1836).
SKOFITZIA, *Hassk. & Kanitz*, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 147.
TRIPAGANDRA, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 16 (1836).
TROPITIA, *Rafin. l. c.* iii. 68 (1836).

acaulis, *Mart. & Gal.* in *Bull. Acad. Brux.* ix. ii. (1842) 375 = *crassifolia*.

albida, *Herb. Knnth*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 290 = *virginiana*.

albiflora, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 84 = *fluminensis*.
ambigua, *Mart. in Schult. f. Syst.* vii. 1170.—*Bras.*

amplexicaulis, *Klotzsch*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 304.—*Mexic.*

anagallidea, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 249.—*Bras.*

Andrieuxii, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 291. (*Andreuxii*).—*Mexic.*

anomala, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 225 = *Tinantia anomala*.

aphylla, *Heyne*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 201 = *Aneilema scapiflorum*.

argentea, *Falkenb. Bau Veget. Org. Monocot.* 116 (*Quid?*).—*Hab.?*

Aubletii, *J. F. Gmel. Syst.* 533 = *Dichorisandra Aubletiana*.

axillaris, *Linn. Mant.* ii. 321 = *Cyanotis axillaris*.

axillaris, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 87 = *virginiana?*

Balbisii, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 97 = *elongata*.

barbata, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 85 = *virginiana*.

barbata, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 138 = *Cyanotis barbata*.

biandra, *Torr. Mex. Bound. Bot.* 224 (*err. typ.*) = *leiandra*.

bicolor, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 88 = *gracilis*.

bifida, *Roth, Catalect. fasc. i.* 42 = *Tinantia fugax*.

biflora, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 1176 = *Commelina subulata*.

brasiliensis, *Lodd. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 694 (*Quid?*).—*Bras.*

brevicaulis, *Rafin. Atl. Journ.* 150 = *virginiana*.

Callisia, *Sw. Fl. Ind. Occ. i.* 603 = *Callisia repens*.

canaliculata, *Rafin. Atl. Journ.* 150 = *virginiana*.

capitata, *Blume, Enum. Pl. Jav. i.* 6 = *Cyanotis capitata*.

capitata, *Vell. Fl. Flum.* 139; iii. t. 151 = *Campelia Zanoniana*.

caricifolia, *Hook. Bot. Mag.* t. 3546 = *virginiana*.

TRADESCANTIA:—

carinata, *E. Mey. in Presl, Rel. Haenk.* i. 139.—*Peruv.*

cerinthoides, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 83.—*Bras.*

ciliata, *Blume, Cat. Gew. Buitenz.* 61.—*Java.*

ciliata, *Hort. Berol. ex Kunth, Enum. Pl.* iv. 81 = *virginiana*.

cirrifera, *Mart. Ausw. Merkw. Pfl.* 10. t. 7 = *virginiana*.

Commelina, *Neuenh. in Roem. Arch. i, II.* (1797) 24 = *Tinantia fugax*.

Commelina, *Vell. Fl. Flum.* 140; iii. t. 154 = *elongata*.

commelinoides, *Schult. f. Syst.* vii. 1176.—*Mexic.*

congesta, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. ii. (1842) 377 = *elongata*.

congesta, *Penny, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 650 (*Quid?*).—*Am. bor.*

consanguinea, *Klotzsch*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 301 = *geniculata*.

cordifolia, *Griff. Priv. Journ.* 208 = *Streptolirion volubile*.

cordifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 57.—*Am. trop.*

crassifolia, *Cav. l. c.* i. 54. t. 75.—*Am. austr.*

crassifolia, *Hassk. in Miq. Pl. Jungh.* 152 = *Cyanotis capitata*.

crassipes, *Barcl. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.–March, 1829) 388 = *T. Crassula*.

Crassula, *Link & Otto, l. c. Pl. Rar. Hort. Berol.* 13. t. 7.—*Bras.*

crinifera, *Nees*, in *Linnaea*, xix. (1847) 700 = *virginiana*.

cristata, *Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. i. 293 = *Commelina nudiflora*.

cristata, *Heyne*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 246 = *Cyanotis papilionacea*.

cristata, *Linn. Syst. ed. XII.* 233 = *Cyanotis cristata*.

cristata, *Walt. Fl. Carol.* 119 = *virginiana*.

cucullata, *Roth, Nov. Pl. Sp.* 189 = *Cyanotis cucullata*.

cumanensis, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 96.—*Venezuela.*

cyanotidea, *Hassk. Commel. Ind.* 65 = *Cyanotis villosa*.

cymbispatha, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 296.—*Bolivia.*

debilis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 262 = *gracilis*.

decumbens, *Klotzsch*, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xxi. (1853) 118 = *geniculata*.

diaphana, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 1178, in *obs.* = *gracilis*.

dilatata, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 304 = *amplexicaulis*.

discolor, *L'Hérit. Sert. Angl.* 8. t. 12 = *Rhoeo discolor*.

discolor, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 87 = *virginiana*.

Disgrega, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 97.—*Mexic.*

diuretica, *Mart. Reise Bras.* i. 281 = *elongata*.

divaricata, *Rafin. Atl. Journ.* 148 = *virginiana*.

divaricata, *Vahl, Eclat. Am. i.* 34 = *Dichorisandra Aubletiana*.

effusa, *Mart. in Schult. f. Syst.* vii. 1159 = *geniculata*.

Ehrenbergiana, *Klotzsch*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 305 = *T. Disgrega*.

elata, *Lodd. Bot. Cab. t.* 1513 = *virginiana*.

elegans, *Pritz. Ic. Ind.* 1110, *sphalm.* = *Thysanocarpus elegans*.

elongata, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 146.—*Am. austr.*

erecta, *Jacq. Coll. iv.* 113; *Ic. Pl. Rar.* ii. 13. t. 354 = *Tinantia fugax*.

fasciculata, *Heyne*, ex *Roth, Nov. Pl. Sp.* 189 = *Cyanotis fasciculata*.

filiformis, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. ii. (1842) 376 = *Leptorhoë filiformis*.

Fischeri, *Weinm. Elench. Pl. Hort. Pawlowsk.* (1824) 154; et *ex Schult. f. Syst.* vii. 1172 = *crassifolia*.

flexuosa, *Rafin. Atl. Journ.* 150 = *virginiana*.

floribunda, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 89 = *geniculata*.

floribunda, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. ii. (1842) 377 = *holosericea*.

floridana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 381.—*Florida.*

fluminensis, *Vell. Fl. Flum.* 140; iii. t. 152.—*Bras.*

formosa, *Willd. Sp. Pl.* ii. 20 = *Cyanotis nodiflora*.

fusca, *Lodd. Bot. Cab. t.* 374.—*Bras.*

Galeottiana, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 696 = *holosericea*.

gangetica, *Linn. ex C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 216 = *Aneilema vaginatum*.

Gaudichaudiana, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 93 = *elongata*.

geniculata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 232 = *Floscopa scandens*.

geniculata, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 18.—*Am. austr.*

TRADESCANTIA:—

geniculata, *Lour. Fl. Cochinch.* 193 = *Cyanotis geniculata*.

geniculata, *Vell. Fl. Flum.* 140; iii. t. 153 = *cymbispatha*.

gentianaefolia, *Salisb. Prod.* 216 = *Campelia Zanoniana*.

glabra, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 290, in *syn. errore* = *virginiana*.

glandulosa, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 253.—*Guian.*

glomerata, *Heyne*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 245 = *Cyanotis cucullata*.

glomerata, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 1175 = *Floscopa glomerata*.

Gonatandra, *Schlecht. in Linnaea*, xxiv. (1851) 659 = *Campelia Zanoniana*.

gracilis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 261. t. 672.—*Ecuador.*

graminifolia, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. ii. (1842) 378 = *linearis*.

graminifolia, *Rafin. Atl. Journ.* 148 (*Quid?*).—*Am. bor.*

guianensis, *Miq. in Linnaea*, xviii. (1844) 374 = *elongata*.

Herba-ratti, *Nees*, *l. c.* xix. (1847) 699 = *crassifolia*.

hirsuta, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 263.—*N. Granat.*

hirsutissima, *Pohl*, ex *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 254 = *fuscata*.

holosericea, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 92.—*Mexic.*

Humboldtiana, *Schult. f. Syst.* vii. 1172 = *crassifolia*.

hypophaea, *C. Koch & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) App. 9 = *geniculata*.

imbricata, *Roxb. Hort. Beng.* [23]; *Fl. Ind.* ii. 120 = *Cyanotis cristata*.

incana, *Heyne*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 250 = *Cyanotis arachnoidea*.

iridescent, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) Misc. 86 = *crassifolia*.

Karwinskyana, *Herb. Berol. ex C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 298 = *venustula*.

Karwinskyana, *Schult. f. Syst.* vii. 1165.—*Mexic.*

Koernickeana, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. i. 249 = *cerinthoides*.

Kunthiana, *Seub. l. c.* 252 = *geniculata*.

laevigata, *Auct. = levigata*.

lanata, *Heyne*, ex *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 250 = *Cyanotis arachnoidea*.

lanuginosa, *Hassk. Commel. Ind.* 67 = *crassifolia*.

latifolia, *Herb. Madr. ex Wall. Cat. n.* 5223 D = *Aneilema herbaceum*.

latifolia, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 44. t. 272 = *Tinantia fugax*.

laxiflora, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 307.—*Mexic.*

leiandra (*err. typ. biandra*), *Torr. Bot. Mex. Bound.* 224–5 = *Commelina leiandra*.

levigata, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 85 = *virginiana*.

linearis, *Benth. Pl. Hartw.* 27.—*Mexic.*

Loureiriana, *Schult. f. Syst.* vii. 1178 = *Cyanotis geniculata*.

Lyonii, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 695; *Schlecht. in Linnaea*, xxv. (1852) 186 = *virginiana*.

malabarica, *Herb. ex Schult. f. Syst.* vii. 1161 = *Tinantia fugax*.

malabarica, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 412 = *Aneilema nudiflorum*.

marginata, *Bouché*, in *Verh. Ges. Nat. Fr. Berl.* i. (1819) 392 = *Campelia Zanoniana*.

Martensiana, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 697 = *Callisia Martensiana*.

mexicana, *Hort. Belved. ex Schult. f. Syst.* vii. 1179 (*Quid?*).—*Mexic.*

mexicana, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 93 = *elongata*.

micrantha, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 224.—*Mexic.*

minuta, *C. B. Clarke*, in *DC. Monog. Phan.* iii. 307.—*Mexic.*

mollis, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 95 = *elongata*.

monandra, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 57 = *Callisia umbellulata*.

montana, *Heyne*, ex *Wall. Cat. n.* 5203 B = *Aneilema montanum*.

multiflora, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 96, *partim* = *amplexicaulis*.

multiflora, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 57.—*Jamaic.*

mundula, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 83 = *fluminensis*.

nana, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. ii. (1842) 374.—*Mexic.*

TRADESCANTIA:—

- navicularis, *Origies*, in *Regel, Gartenfl.* xxvi. (1877) 130. t. 901.—Peruv.
nervosa, Linn. Mant. ii. 223 = *Telipogon angustifolius nodiflora*, Lam. Encyc. ii. 371 = *Cyanotis nodiflora*.
ohiensis, Rafin. Préc. Découv. 45 = *virginiana*.
paniculata, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 188 = *Aneilema montanum*.
paniculata, Roxb. Pl. Corom. ii. 6. t. 109 = *Floscopa scandens*.
papilionacea, Linn. Mant. ii. 513 = *Cyanotis papilionacea*.
parviflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 43. t. 272. f. 2 = *multiflora*.
pellucida, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 376 = *pulchella*.
pilosa, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1827) 16; et in Nov. Act. Nat. Cur. xiv. II. (1829) 822 = *virginiana*.
pilosa, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 1155 = *Cyanotis pilosa*.
pilosissima, Fraser, ex Schult. f. l. c. 1175 = *virginiana*.
portoricensis, Bello, in *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xii. (1883) 122.—Porto Rico.
procumbens, Willd. Sp. Pl. ii. 19 = *multiflora*.
pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 262.—Mexic.
pumila, Rafin. New Fl. Am. ii. 86 (Quid?).—Am. bor.
purpurascens, Schau. in *Linnaea*, xix. (1847) 700.—Mexic.
radicans, Royle, Illustr. Bot. Himal. 403 = *Cyanotis barbata*.
recta, Raesch. Nom. ed. III. 91 = *Tinantia fugax*.
reflexa, Rafin. New Fl. Am. ii. 87 = *virginiana*?
repens, Vand. in *Roem. Script.* 95.—Bras.
rhodantha, Torr. Bot. Mex. Bound. 225 = *venustula*.
riparia, Rafin. New Fl. Am. ii. 88 (Quid?).—Am. bor.
rosea, Vent. Jard. Cels. t. 24.—Am. bor.
rufa, Presl, Kel. Haenk. i. 138 = *Floscopa scandens*.
rupestris, Law, in J. Grah. Cat. Bomb. Pl. 223 = *Cyanotis fasciculata*.
rupestris, Rafin. Atl. Journ. 150 = *virginiana*.
scaberrima, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 120 = *Aneilema protensum*.
Schiedeana, Kunth, Enum. Pl. iv. 90 = *geniculata*.
Schlechtendalii, Kunth, l. c. 94 = *elongata*.
Schomburgkiana, Kunth, l. c. 663 = *elongata*.
Sellowiana, Kunth, l. c. 93 = *elongata*.
spathacea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 57 = *Rhoeo discolor*.
speciosa, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 9 = *Commelina leiandra*.
speciosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 263 = *crassifolia*.
speciosa, Linn. f. Suppl. 192 = *Cyanotis nodiflora*.
speciosa, Salisb. Prod. 216 = *virginiana*.
spicata, Knowles & Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 159 = *virginiana*?
splendens, C. Koch & Bouché, in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 334 = *virginiana*.
subaspera, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1597 = *virginiana*.
subscandens, Scheidw. in *Journ. Hortic. Prat.* ii. (1845) 321.—Mexic.
tenella, Kunth, Enum. Pl. iv. 83 = *fluminensis*.
terminalis, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 6 = *Aneilema Hamiltonianum*.
thyrsiflora, Blume, l. c. = *Pollia thyrsiflora*.
trachyloma, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 290, in syn. = *virginiana*.
triandra, Kunth, Enum. Pl. iv. 93 = *elongata*.
tricolor, Hort. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 318 = *Zebrina pendula*.
triflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 376 = *geniculata*.
tuberosa, Roxb. Pl. Corom. ii. 5. t. 108 = *Cyanotis tuberosa*.
tumida, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 42 = *virginiana*.
umbellata, Heyne, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 247 = *Cyanotis cristata*.
umbellata, Pav. ex C. B. Clarke, l. c. 304 = *amplexicaulis*.
umbellata, Vahl, Eclog. iii. 7 = *Tinantia fugax*.
undata, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 347 = *Tinantia fugax*.
undulata, Vahl, in Kjoeb. Skrivt. Natur. Seisk. ii. II. (1793) 27 = *Tinantia fugax*.
vaga, Lour. Fl. Cochinch. 193 = *Cyanotis vaga*.
vaga, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. ii. 65 = *Cyanotis cristata*.

TRADESCANTIA:—

- velutina, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 12.—Guatemala.
venustula, Kunth, Enum. Pl. iv. 87.—Mexic.
versicolor, Salisb. Prod. 216 = *Rhoeo discolor*.
villosa, Spreng. Syst. ii. 116 = *Cyanotis villosa*.
villosissima, Fras. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 291 = *virginiana*.
virginiana, Linn. Sp. Pl. 288.—Am. bor.
virginica, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 888 = *Trillium ovatum*?
virginica, Linn. Syst. ed. X. 975 = *virginiana*.
virginica, Walt. Fl. Carol. 119 = *rosea*.
Warmingiana, Seub. ex Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1872) 126 = *elongata*.
Warszewicziana, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 11.—Guatemala.
Warszewiczii, Hort. in Rev. Hortic. Sér. IV. ix. (1860) 135 = *præc.*
Zanonina, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 57 = *Campelia Zanonina*.
zebrina, Hort. ex Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1340 = *Zebrina pendula*.
TRAEVIA, Neck. Elem. ii. 268 (1790) = *Trewia*, Linn. (Euphorb.).
TRAGACANTHA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752) = *Astragalus*, Tourn. (Legumin.).
angustifolia, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 269 = *A. angustifolius*.
argentea, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *A. Barba-Jovis*.
aristata, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 269 = *A. aristatus*.
Arnacantha, Stev. l. c. = *A. Arnacantha*.
aureus, Stev. l. c. = *A. aureus*.
breviflora, Stev. l. c. = *A. eriocephalus*.
caspica, Stev. l. c. = *A. caspicus*.
caucasica, Stev. l. c. = *A. caucasicus*.
compacta, Stev. l. c. = *A. compactus*.
cretica, Stev. l. c. = *A. creticus*.
Criacantha, Stev. l. c. xxix. (1856) i. 257, sphalm. = *A. Arnacantha*.
denudata, Stev. l. c. iv. (1832) 269 = *A. microcephalus*.
echinoides, Stev. l. c. = *A. angustifolius*.
Echinus, Stev. l. c. = *A. Echinus*.
eriocaulos, Stev. l. c. = *A. microcephalus*.
genargentea, Stev. l. c. = *A. sirinicus*.
glabra, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *A. Clusii*?
hispanica, Mill. l. c. n. 2.—Ins. Balear.
lagopodoides, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 269 = *A. lagopoides*.
Lagurus, Stev. l. c. = *A. Lagurus*.
longifolia, Stev. l. c. = *A. longifolius*.
massiliensis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *A. Tragacantha*.
oleaefolia, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 269 = *A. oleaefolius*.
plumosa, Stev. l. c. = *A. plumosus*.
Pseudotragacantha, Stev. l. c. = *A. Pseudotragacanthus*.
ptilodes, Stev. l. c. = *A. plumosus*.
pycnophylla, Stev. l. c. = *A. mesoleios*.
sicula, Stev. l. c. = *A. siculus*.
triacantha, Stev. l. c. xxix. (1856) II. 153 = *A. Anthacantha*?
trojana, Stev. l. c. iv. (1832) 269 = *A. gummifer*.
vera, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 374 = *A. Tragacantha*.
xanthura, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 269 = *A. Lagurus*.
TRAGANTHA, Wallr. ex Endl. Gen. 370 (1837), sphalm. = *seq.*
TRAGANTHES, Wallr. Sched. Crit. i. 456, in nota (1822) = *Eupatorium*, Tourn. (Compos.).
tenuifolia, Wallr. l. c. = *E. foeniculaceum*.
TRAGANTHUS, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 188. t. 9; et in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 46 = *Bernardia*, Houst. (Euphorb.).
sidoides, Klotzsch, II. cc. = *B. sidoides*.
TRAGANUM, Delile, Fl. Egypte, 204. t. 22 (1813).
CHENOPODIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 68.
Moquini, Webb, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 171.—Ins. Canar.

TRAGANUM:—

- nudatum*, Delile, Fl. Egypte, 204.—Aegypt.
nudatum, Moq. in Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 212 = *Moquini*.
nudatum, Schimp. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 985 = *Halogeton alopecuroides*.
nudatum, Sieber, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 172 = *Cornulaca monacantha*.
TRAGIA, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 282 (1737).
EUPHORBIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 329.
AGIRTA, Baill. Etud. Gén. Euph. 463 (1858).
BIA, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 189.
CTENOMERIA, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 29.
LASSIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 464. t. 4 (1858).
LEPTOBOTRYS, Baill. Etud. Gén. Euph. 478. t. 2 (1858).
LEPTORHACHIS, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. 189 (1841).
LEUCANDRA, Klotzsch, l. c. 188.
ZUCKERTIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 495. t. 4 (1858).
adenanthera, Baill. *Adansonia*, i. (1860–61) 275.—Afr. trop.
amoena, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 414.—Bras.
angolensis, Muell. Arg. in Journ. Bot. ii. (1864) 333.—Afr. trop.
angustifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 502.—Afr. trop.
angustifolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1827) 172 = *nepetaefolia*.
arabica, Baill. Etud. Gén. Euph. 461 = *mitis*.
arborea, Comm. ex Baill. *Adansonia*, i. (1860–61) 267 = *Acalypha arborea*.
bahiensis, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 182.—Bras.
Baillouiana, Muell. Arg. l. c. 178.—Mexic.
betonicaefolia, Muell. Arg. l. c. 181.—Bras.
btonicaefolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 173.—Am. bor.
bicolor, Mig. in *Linnaea*, xxvi. (1853) 222.—Ind. or.
bicornis, Vahl, ex A. Juss. Euph. Tent. 49 = *Sebastiania corniculata*.
Boiviiana, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 183.—Madag.
bracteata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 481 = *Pimelodendron amboinicum*.
brevispica, Engelm. & A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 262.—Texas.
burmanica, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 244.—Burma.
Camolia, Roxb. Hort. Beng. [103], nomen (Quid?).—Ind. or.
cannabina, Linn. f. Suppl. 415 = *iuvolucrata*.
capensis, E. Mey. ex Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 110 = *Meyerianum*.
capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 14.—Afr. austr.
castaneaefolia, Juss. ex Baill. *Adansonia*, i. (1860–61) 267 = *Acalypha marginata*.
Chamaelea, Linn. Sp. Pl. 981 = *Sebastiania Chamaelea*.
chlorocaulon, Baill. Etud. Gén. Euph. 461; et *Adansonia*, v. (1864–65) 306.—Bras.
cissoides, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 406.—Bras.
colorata, Poir. Encyc. vii. 725 = *Acalypha integrifolia*.
cordata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 7791 A = *involuta*.
cordata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 176 = *macrocarpa*.
cordata, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 244 = *mitis*.
cordata, Willd. Sp. Pl. iv. 322 = *cordifolia*, Vahl.
cordifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 501.—Afr. trop.
cordifolia, Vahl, Symb. Bot. i. 76.—Arabia.
corniculata, Vahl, Eclog. Am. ii. 55 = *Sebastiania corniculata*.
cuneata, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 180.—Bras.
diffusa, Vell. Fl. Flum. x. t. 10 = *volubilis*.
dioica, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 95.—Ins. Socotra.
dioica, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 109 = *rupestris*.
discolor, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 946 = *innocua*.
dodecandra, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 98.—Reg. Argent.

TRAGIA:—

elliptica, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 85 = *Sapium indicum*.
erosa, Hochst. l. c. 86 = *Pyrenacantha scandens*.
fallax, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 179.—Peruv.
Fendleri, Muell. Arg. l. c. 179.—Venezuela.
filiformis, Poir. Encyc. vii. 727 = *Acalypha spiciflora*.
fruticosa, Comm. ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 267 = *Acalypha integrifolia*.
furialis, Boj. Hort. Maurit. 286 = *angustifolia*.
Gayana, Baill. Etud. Gén. Euph. 461 = *volubilis*.
geraniifolia, Klotzsch, ex Baill. l. c., nomen; et ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 933.—Bras.
gracilis, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 176.—Cuba.
grandifolia, Klotzsch, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 46 = *Bernardia grandifolia*.
haguensis, Goudot, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 461 = *volubilis*.
hastata, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 407.—Bras.
hastata, Reinw. ex Hassk. Pl. Jav. Rar. 245 = *Cnesmone javanica*.
hexandra, Jacq. Enum. Pl. Carib. 31 = *Platygyne urens*.
Hildebrandtii, Muell. Arg. in Bremen. Abh. vii. (1880) 26.—Afr. trop.
hirsuta, Blume, Bijdr. 630.—Java.
hispidula, Willd. Sp. Pl. iv. 323 = *involucrata*.
ibaguensis, Goudot, ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 936 = *volubilis*.
incana, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 461, nomen; et ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 935.—Bras.
infesta, Mart. ex D. Dietr. Syn. Pl. v. 256 = *volubilis*.
innocua, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 479 = *Alchornea villosa*.
innocua, Walt. Fl. Carol. 229.—Am. bor.
integerrima, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 85 = *Excoecaria reticulata*.
integrifolia, Willd. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 948 = *Acalypha integrifolia*.
interrupta, Spreng. Syst. iii. 833.—Zeylan.
involucrata, Linn. Sp. Pl. 980.—As. trop.
japurensis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 404.—Bras.
Kirkiana, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 538.—Afr. trop.
laciniata, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 182.—Mexic.
lagoënsis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 409.—Bras.
laminularis, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 183.—Afr. trop.
Lessertiana, Muell. Arg. l. c. 178.—Bras.
linearifolia, Ell. Sketch, ii. 563 = *innocua*.
lobata, Wall. Cat. n. 7796 = *Acalypha integrifolia*.
macrocarpa, Willd. Sp. Pl. iv. 323.—Am. bor.
macrophylla, Wall. Cat. n. 7796 = *Cnesmone javanica*.
Manniana, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 436.—Afr. trop.
marginata, Poir. Encyc. vii. 725 = *Acalypha marginata*.
melochioides, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 60.—Reg. Argent.
Mercurialis, Linn. Sp. Pl. 980 = *Claoxylon Mercurialis*.
Mercurialis, Walt. Fl. Carol. 229 = *urticaefolia*.
mexicana, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 181.—Mexic.
Meyeriana, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 938.—Afr. austr.
minor, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 108 = *rupestris*.
Miqueliana, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 942 = *bicolor*.
mitis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 244.—Abyss.
moammarensis, Baill. Etud. Gén. Euph. 461.—Arab.
monadelpha, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 404.—Afr. trop.
monandra, Baill. Etud. Gén. Euph. 461 = *volubilis*.
montana, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 183 = *involucrata*.
natalensis, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 85 = *Excoecaria reticulata*.

VOL. II.

TRAGIA:—

natalensis, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 107.—Afr. austr.
nepetaefolia, Cav. Ic. vi. 37. t. 557. f. 1.—Mexic.
nepetaefolia, Wawra, in Bot. Ergeb. Maxim. Bras. 34 = *bahiensis*.
Novae-Hollandiae, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 180.—Austral.
obtusata, Vahl, ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 267 = *Acalypha integrifolia*.
odorata, Steud. Nom. ed. II. ii. 696, sphalm. = *Acalypha integrifolia*.
ovata, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. xi. (1881) 51.—Reg. Argent.
pedicellaris, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 415.—Bras.
pedunculata, Beauv. Fl. Owar. i. 90. t. 54 = *volubilis*.
peltata, Vell. Fl. Flum. x. t. 6 (peltata).—Bras.
pilosa, Vell. l. c. t. 9 = *Sebastiania corniculata*.
pinnata, A. Juss. Euph. Tent. 48.—Bras.
plumosa, Desf. Tabl. ed. I. 207 = *virgata*.
Pohlili, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 81.—Bras.
polyandra, Vell. Fl. Flum. x. t. 7.—Bras.
pruricus, Willd. ex Endl. Gen. Suppl. iv. iii. 88 = *Platygyne urens*.
pungens, Muell. in DC. Prod. xv. ii. 941 = *cordifolia*, Vahl.
ramosa, Torr. Bot. Mex. Bound. 200 = *stylaris*.
ramosa, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 245 = *nepetaefolia*.
reticulata, Poir. Encyc. vii. 725 = *Acalypha arborea*.
rugosa, Wall. Cat. n. 7794 = *Cnesmone javanica*.
rupestris, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 108.—Afr. austr.
salviaefolia, Boj. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 443 = *Acalypha salviaefolia*.
scandens, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 183.—Madag.
scutellariaefolia, Scheele, l. c. xxv. (1852) 587 = *nepetaefolia*.
Sellowiana, Muell. Arg. l. c. xxxiv. (1865-66) 179.—Bras.
senegalensis, Muell. Arg. l. c. 182.—Afr. trop.
Serra, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 20. t. 223 = *volubilis*.
spathulata, Benth. in Hook. Niger Fl. 502.—Afr. trop.
stylaris, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 180.—Am. bor. occ.
subhastata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 20. t. 223.—Peruv.
tenuifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 502.—Afr. trop.
tenuis, Wall. Cat. n. 7787 = *Acalypha brachystachya*.
teucriifolia, Scheele, in *Linnaea*, xxv. (1852) 586 = *nepetaefolia*.
triandra, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 947.—Afr. austr.
triangularis, Vell. Fl. Flum. x. t. 8 = *volubilis*.
trifida, Wall. Cat. n. 7795 = *involucrata*.
tristis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 410.—Bras.
nberabana, Muell. Arg. l. c. 417.—Bras.
urens, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1391 (nomen falsum) = *innocua*.
urticaefolia, Benth. Pl. Hartw. 14 = *nepetaefolia*.
urticaefolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 176.—Am. bor.
villosa, Thunb. Prod. Fl. Cap. 14 = *Acalypha decumbens*.
virgata, Lam. Illustr. iii. 347.—Hab.?
volubilis, Linn. Sp. Pl. 980.—Ind. occ.
volubilis, Michx. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 460 = *urticaefolia*.

TRAGIOPSIS, Karst. in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 5 = *Sebastiania*, Spreng. (Euphorb.).
fruticulosa, Karst. l. c. = *S. corniculata*.

TRAGIOPSIS, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 139 (1874) = *Carum*, Rupp. (Umbell.).
dichotoma, Pomel, l. c. 140 = *C. dichotomum*.
scabriuscula, Pomel, l. c. 139 = *C. dichotomum*.

TRAGIUM, Spreng. Pl. Umbell. Prod. 26 (1813) = *Pimpinella*, Riv. (Umbell.).
anisoides, Steud. Nom. ed. II. ii. 696 = *P. villosa*.
Anisum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 285 = *P. Anisum*.

TRAGIUM:—

apulium, Heynh. Nom. i. 814 = *Pimpinella Tragium?*
aromaticum, Spreng. Pl. Umbell. Prod. 26 = *P. aromatica*.
Broteri, Spreng. l. c. 27 = *P. villosa*.
Buchii, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 151 = *P. Buchii*.
canescens, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 91 = *P. Tragium*.
Columnae, Spreng. Pl. Umbell. Prod. 26 = *P. Tragium*.
Cumbræ, Choisy, ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 152 = *P. Cumbræ*.
Dendroselinum, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 152 = *P. Dendroselinum*.
depressum, Sieber, ex Spreng. in Schult. Syst. vi. 392 = *P. Tragium*.
dichotomum, Link, Handb. i. 322 = *Carum dichotomum*.
eriocarpum, Schult. Syst. vi. 394 = *P. eriocarpus*.
glaucum, J. & C. Presl, Delic. Prag. 125 = *P. Tragium*.
Gussonii, J. & C. Presl, l. c. 126 = *P. Gussonii*.
hirtellum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 28 = *P. peregrina*.
incanum, Choisy, ex DC. Prod. iv. 122 = *P. Cumbræ*.
palmetorum, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 696 = *P. palmetorum*.
peregrinum, Spreng. Pl. Umbell. Prod. 26 = *P. peregrina*.
petraeum, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 91 = *P. Tragium*.
Schousboei, Spreng. in Schult. Syst. vi. 394 = *P. villosa*.
tauricum, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1819); et ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 286 = *P. peregrina*.
tenuis, Sieber, ex Link, l. c. = *P. eriocarpus*.
tenuifolium, Spreng. in Schult. Syst. vi. 393 = *P. tenuifolia*.
tortuosum, Link, Handb. i. 322 = *P. villosa*.
villosum, Spreng. Pl. Umbell. Prod. 26 = *P. villosa*.

TRAGOCERAS, Spreng. Syst. iii. 576 (1826) = seq.

TRAGOCEROS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 248. t. 385 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 356.
flavicomum, DC. Prod. v. 533.—Mexic.
microglossum, DC. l. c.—Mexic.
peucedanifolium, Spreng. Syst. iii. 576 = *Isostigma peucedanifolium*.
Schiedeanum, Less. in *Linnaea*, ix. (1834) 269.—Mexic.
zinniioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 249. t. 385.—Mexic.

TRAGOPOGON, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).

COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 530.
GEROPOGON, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1109 (1763).
acanthocarpus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 45.—Armen.; Persia.
aculeatus, Moench, Meth. 539 = *Urospermum picroides*.
angustifolius, Bell. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1494 = *crocifolius*.
asper, Linn. Sp. Pl. 790 = *Urospermum picroides*.
aureus, Boiss. Fl. Orient. iii. 754.—Pontus.
australis, Bourq. ex Nym. Consp. 462 = *longirostris*.
australis, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 32 = *porrifolius*.
barbistrostris, Bischoff, Del. Sem. Hort. Heidelb. (1846) 4.—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 161 = *eriospermus?*
Baylei, Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Vasc. Fr. 246 = *dubius*.
bicolor, Moench, Meth. 539 = *Urospermum Dalechampii*.
Bischoffii ×, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 469, in obs. — Hab.?
brachyphyllus, Nym. Consp. 462 = *porrifolius*.
brevifolius, C. Koch, in *Linnaea*, xxiii. (1850) 662 = *persicus*.
brevirostris, DC. Prod. vii. 114.—Rossia; Soongar.
bupththalmoides, Boiss. Fl. Orient. iii. 750 = *persicus*.
calyculatus, Jacq. Hort. Vindob. ii. 48 = *Scorzonera hirsuta*.
campestris, Bess. Enum. Pl. Vohl. 84 = *dubius*.
canus, Willd. Sp. Pl. iii. 1493 = *floccosus*.
capensis, Jacq. Coll. ii. 320 = *Urospermum picroides*.
caricifolius, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 4 = *collinus*.
carinatus, Gilib. Fl. Lituan. i. 227 = *pratensis*.
castellanus, Levier, Deux Excurs. Bot. 26.—Hispan.

7 A

TRAGOPOGON:—

caucasicus, Bess. ex DC. Prod. vii. 114 = brevirostris.
caucasicus, Fisch. & Mey. ex DC. l. c. 114 = graminifolius.
coelesyriacus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 47 = longirostris.
collinus, DC. Prod. vii. 115.—As. Min.; Persia.
coloratus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 61.—Reg. Cauc.; Persia.
Crantsii ×, Dichtl. in Deutsche Bot. Monatsschr. i. (1883) 171.—Europ.
crocifolius, Linn. Syst. ed. X. 1191.—Europ. austr.
crocifolius, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 58. t. 779 = longirostris.
Cupani, Guss. ex DC. Prod. vii. 113.—Sicilia.
cuspidatus, Steud. Nom. ed. I. 843 = Troximom cuspidatum.
Dalechampi, Linn. Sp. Pl. 790 = Urospermum Dalechampi.
Dandelion, Linn. l. c. ed. II. 1111 = Krigia Dandelion.
dshimilensis, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 663 = longirostris.
dubius, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 95.—Europ.
elator, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 407.—Tauria.
elatus, Salisb. Prod. 178 = dubius.
eriospermus, Tenore, Fl. Med. ii. 3; ex *ef.* Fl. Nap. iii. p. xi.—Ital.
erostis, Boiss. & Haussk. in Fl. Orient. iii. 754.—Kurdistan.
filifolius, Rehm. ex Boiss. l. c.—Reg. Cauc.
floccosus, Cutand. Fl. Comp. Madrit. 439 = crocifolius.
floccosus, Tommas. ex Bischoff, Beitr. Fl. Deutschl. 97 = Tommasinii.
floccosus, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 116. t. 112.—Europ. or.; As. bor.
fritillarioides, Less. in Linnaea, vi. (1831) 101 = Picrosia longifolia.
glaber, Hill. Hort. Kew. 41 = hybridus.
glaucus, Steud. Nom. ed. I. 843 = Troximom glaucum.
Gorskianus, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 19 = floccosus.
gracilis, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1820) 414.—Reg. Himal.
graminifolius, DC. Prod. vii. 114.—Reg. Cauc.; Persia.
grandiflorus, Saut. in Oestr. Bot. Wochenbl. vi. (1856) 107, in obs. = pratensis.
heterospermus, Schweigg. in Koenigsb. Arch. Naturw. i. (1812) 229 = floccosus.
hirsutus, Gouan, Fl. Monsp. 342 = Scorzonera hirsuta.
humilis, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 34.—Reg. Cauc.
hybridus, Linn. Sp. Pl. 789.—Ital.
intermedius, Bess. Enum. Sem. Hort. Crem. (1821); ex *ef.* Enum. Pl. Volh. 83 = brevirostris.
jesdianus, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 138.—Persia.
juncus, Wall. Cat. n. 3257 = gracilis.
Kotschy, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 45 = graminifolius.
laetus, Salisb. Prod. 178 = Urospermum Dalechampi.
Lamottei, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxviii. (1881) p. lix.—Gallia.
lanatus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1111 = Scorzonera lanata.
latifolius, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 23.—As. Min.
leiocarpos, Saut. in Flora, xl. (1857) 178 = pratensis.
lithuanicus, Bess. ex DC. Prod. vii. 114 = brevirostris.
livescens, Bess. Enum. Pl. Volh. 30 = dubius.
longifolius, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 90.—Graecia.
longifolius, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. ii. 457 = Lamottei.
longipappus, Petrm. in Flora, xxvii. (1844) 478 = orientalis.
longirostris, Bischoff, ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 469.—As. Min.; Arab.
macropogon, C. A. Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 273 = dubius.
major, Jacq. Fl. Austr. i. 19 = dubius.
marginatus, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 136 = collinus, acanthocarpus.
minor, Billot, ex Nym. Consp. 463 = dubius.
minor, Fries, Nov. Fl. Succ. ed. II. 241 = pratensis.
minor, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Europ.
mutabilis, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 273 = collinus.
mutabilis, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. 16. t. 157; Misc. ii. 316.—Reg. Cauc.

TRAGOPOGON:—

nebrodensis, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 384.—Sicil.
nervosus, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 261.—Syria.
nervulosus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 47 = persicus.
novus, Geners. ex Steud. Nom. ed. I. 844 = orientalis.
olympicus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 46.—As. Min.
orgyalis, Reut. Cat. Gr. Jard. Genève. (1863); (1867) 4 = longirostris.
orientalis, Linn. Sp. Pl. 789.—Europ.; As. bor.
orientalis, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 59 = pusillus.
palaestinus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 46 = persicus.
parviflorus, Hornem. Hort. Hafn. ii. 970 = crocifolius.
perpusillus, Arv. Ess. Pl. Dauph. 39 (Quid?).—Gallia.
persicus, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 4.—As. Min.; Syria; Persia.
phaenopappus, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 697 = coloratus.
Pichleri, Boiss. Fl. Orient. iii. 753.—Bithyn.
picroides, Linn. Sp. Pl. 790 = Urospermum picroides.
plantagineus, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 91 = persicus.
podolicus, Bess. ex DC. Prod. vii. 114 = brevirostris.
porrifolius, J. F. Gmel. Syst. 1638, sphalm. = porrifolius.
Pommaretii, F. Schultz, in Flora, xlix. (1866) 52 = dubius.
porrifolius, Linn. Sp. Pl. 789.—Reg. Mediterr.
porrifolius, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 233 = dubius.
pratensis, Linn. Sp. Pl. 789.—Europ.; As. Min.; Ind. bor. occ.
ptercarpus, DC. Prod. vii. 112.—Syria.
pubescens, Kit. in Schult. Oesterr. Fl. ed. II. ii. 403.—Hungar.
pusillus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 521.—Reg. Cauc.; Persia.
reticulatus, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 90.—Armenia.
revolutus, Schweigg. in Hagen, Chlor. Boruss. 288 = orientalis.
roseus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 61 = collinus.
roseus, Trevir. in Mag. Ges. Naturf. Fr. Berl. vii. (1816) 152 = ruber.
ruber, Eichw. Casp.-Cauc. 28 = collinus.
ruber, S. T. Gmel. Reise, ii. 198.—Sibir.
ruthenicus, Bess. ex Claus, in Beitr. Pfl. Russ. Reich. viii. 234, nomen.—Turkestan.
Samaritani, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. v. 116.—Graecia.
sativus, Gater. Desc. Pl. Montaub. 136 = porrifolius.
Shuttleworthii, Godet, Fl. Jura, i. 401 = pratensis.
silesiacus, Krock. Fl. Sil. Suppl. ii. 224 (Quid?).—Europ.
sinuatus, Avé-Lall. Pl. Ital. Bor. 17 = pratensis.
sonchifolius, Salisb. Prod. 178 = Urospermum picroides.
stenophyllus, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 89 = reticulatus.
stenophyllus, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 42 = crocifolius.
talyschensis, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 137 = graminifolius.
Tommasinii, Sch. Bip. in Bischoff, Beitr. Fl. Deutschl. 97.—Europ. austr.
tortilis, Pritz. Ic. Ind. ii. 275 = pratensis.
transsilvanicus, Schur, Enum. Pl. Transs. 361 = orientalis.
tuberosus, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 662 = pusillus.
undulatus, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. 16. t. 158; Misc. ii. 317 = orientalis.
undulatus, Thuill. Fl. Par. ed. II. 396 = pratensis.
verticillatus, Lam. Fl. Fr. ii. 77 = Urospermum Dalechampi.
villosus, [Habl.] Desc. Taur. 151 = orientalis.
villosus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1110 (sp. dub.).—Hispan.
villosus, Pall. Reise, ii. 332 = floccosus.
virginicus, Linn. Sp. Pl. 789 = Krigia amplexicaulis.
vulgaris, Gueldenst. Reisen, ii. 33; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 790 (Quid?).—Reg. Cauc.

TRAGOPOGON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 109 = praece.

TRAGOPYRUM, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 284 (1819) = *Atraphaxis*, Linn. (Polygon.).
angustifolium, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 54 = *A. angustifolia*.

TRAGOPYRUM:—

Aucherii, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 54 = *Atraphaxis Aucherii*.
Billardieri, Endl. l. c. = *A. Billardieri*.
buxifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 284 = *A. buxifolia*.
buxifolium, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 741 = *A. laetevirens*.
canescens, Presl, Bot. Bemerk. 109 = *A. canescens*.
compactum, Presl, l. c. = *A. compacta*.
decipiens, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 54 = *A. decipiens*.
frutescens, Radde, Reisen Ost-Sibir. 425 = *A. Laxmanni*?
glaucum, Spreng. Syst. ii. 251 = *A. Laxmanni*.
grandiflorum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 285 = *A. grandiflora*.
laetevirens, Ledeb. Fl. Alt. ii. 75 = *A. laetevirens*.
lanceolatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 285 = *A. Laxmanni*.
lanceolatum, Ledeb. Fl. Alt. ii. 73 = *A. micrantha*.
lanceolatum, Turcz. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 78 = *A. pungens*.
linearifolium, Auch. ex Meissn. l. c. 79 = *A. angustifolia*.
mucronatum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 361 = *A. Laxmanni*.
polygamum, Spreng. Syst. ii. 251 = *Polygonella parvifolia*.
pungens, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 285 = *A. Laxmanni*.
rotundifolium, Presl, Bot. Bemerk. 109 = *A. spinosa*.
spinosa, Presl, l. c. = *A. spinosa*.
suaedaefolium, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 54 = *A. suaedaefolia*.
Tournefortii, Endl. l. c. = *A. Tournefortii*.

TRAGOSELINUM, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 428 (1742) = *Pimpinella*, Riv. (Umbell.).
Angelica, Lam. Fl. Fr. iii. 449 = *Aegopodium Podagraria*.
dissectum, Moench, Meth. 99 = *P. magna*.
hircinum, Moench, l. c. = *P. Saxifraga*.
luteum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 142 = *P. lutea*.
magnum, Moench, Meth. 99 = *P. magna*.
majus, Lam. Fl. Fr. iii. 448 = *P. magna*.
minus, Lam. l. c. 447 = *P. Saxifraga*.
pumilus, Lam. l. c. 448 = *Trinia Kitaibelii*, vulgaris.
saxifragum, Moench, Meth. 99 = *P. Saxifraga*.

TRAGOSMA, C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 365 (1844) = *Cymbocarpum*, DC. (Umbell.).
foetidum, C. A. Mey. ex Ledeb. l. c. = *C. anethoides*.

TRAGULARIA, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. ii. 217 (1832) = *Pisonia*, Plum. (Nyctag.).
horrida, Koen. ex Roxb. l. c. = *P. aculeata*.

TRAGUS, Hall. Hist. Stirp. Helv. ii. 203 (1768).

GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1122.
 ECHISACHYS, Neck. Elem. iii. 228 (1790).
 LAPPAGO, Schreb. Gen. 55 (1789).
 NAZIA, Adans. Fam. ii. 31 (1763), nomen prius.
alienus, Schult. Mant. ii. 205 = racemosus.
Berteronianus, Schult. l. c. = racemosus.
biflorus, Schult. l. c. = racemosus.
brevicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 44.—Persia.
decipiens, Boiss. Fl. Orient. v. 450 = brevicaulis.
Halleri, Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. ii. 122 = racemosus.
koelerioides, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xx. (1878) p. xxx = racemosus?
Latipes, J. Gay, ex Kunth, Enum. Pl. i. 171 = *Latipes senegalensis*.
muricatus, Moench, Meth. 53 = racemosus.
occidentalis, Nees, Agrost. Bras. 286 = racemosus.
orientalis, Nees, l. c. = racemosus.
racemosus, Scop. Introduct. 73; All. Fl. Pedem. ii. 241.—Reg. Mediterr.; Afghan.
racemosus, Steud. Nom. ed. II. ii. 697 = *Deschampsia caespitosa*.
senegalensis, J. Gay, ex Kunth, Enum. Pl. i. 171 = *Latipes senegalensis*.
tcheliensis, Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord. xxxiii. (1879) 71.—China.

TRAGUS, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 296 = *Festuca*, Tourn. (Gramin.).
elator, Panz. l. c. = *F. elator*.
gracilis, Panz. l. c. = *Brachypodium sylvaticum*.

TRAGUS:—

- inermis*, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 296 = *Bromus inermis*.
loliaceus, Panz. l. c. = *Festuca elatior*.
pinnatus, Panz. l. c. = *Brachypodium pinnatum*.
pratensis, Panz. l. c. = *F. elatior*?
pumilus, Panz. l. c. = *F. varia*.
unioloides, Panz. l. c. = *Bromus unioloides*.
varius, Panz. l. c. = *F. varia*.

TRAILLIA, Lindl. ex Endl. Gen. Suppl. 1419 (1841) = **Schimpera**, Hochst. (Crucif.).

TRALLESIA, Zumag. Fl. Pedem. i. 361 (1849) = **Matricaria**, Tourn. (Compos.).
matricarioides, Zumag. l. c. = *M. inodora*.

TRALLIANA, Lour. Fl. Cochinch. 157 (1790). Genus dubium **CELASTRINEARUM**.—Cf. Benth. & Hook. f. i. 360.
scandens, Lour. l. c. = *Cochinch.*

TRAMBIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 87 (1836) = **Phlomis**, Linn. (Labiata).
alpina, Rafin. l. c. = *P. alpina*.
tuberosa, Rafin. l. c. = *P. tuberosa*.

TRANKENIA, Thunb. Fl. Cap. ii. 250 (1818), err. typ. = **Frankenia**, Linn.

TRAPA, Linn. Gen. ed. I. 359 (1737). **ONAGRARIEAE**, Benth. & Hook. f. i. 793.
bicornis, Linn. f. Suppl. 128 = *natans*.
bispinosa, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 428.—Geront. trop.
Castanea, Gilib. Fl. Lituan. ii. 127 = *natans*.
chinensis, Lour. Fl. Cochinch. 86 = *natans*.
cochinchinensis, Lour. l. c. 108.—Cochinchin.
hungarica, Opiz, ex Nym. Consp. 249 = *natans*.
incisa, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1846) 134.—Japon.
laevis, Presl, ex Nym. Consp. 249 = *natans*.
natans, Linn. Sp. Pl. 120.—Europ.; Oriens; Ind. or.
natans, Thunb. Fl. Jap. 65 = *bispinosa*.
quadricornis, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 229 = *natans*.
quadrispinosa, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 430 = *natans*.
quadrispinosa, Wall. Cat. n. 6340 = *bispinosa*.
verbanensis, De Not. Cat. Sem. Ort. Bot. Roma (1875), 28; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. viii. (1876) 42.—Ital.

TRAPAULOS, Reichb. Consp. 92 (1828), sphalm. = **IRAUPALOS**, Rafin. = **Viburnum**, Linn. (Caprifol.).

TRASIS, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 32 (1819) (Trasi) = **Cladium**, P. Br. (Cyperac.).

TRASUS, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 53 (1821) = **Carex**, Dill. (Cyperac.).
ampullacea, S. F. Gray, l. c. 59 = *C. ampullacea*.
atratus, S. F. Gray, l. c. 56 = *C. atrata*.
binervis, S. F. Gray, l. c. 63 = *C. binervis*.
capillaris, S. F. Gray, l. c. 66 = *C. capillaris*.
chlorostachyos, S. F. Gray, l. c. 68 = *C. Pseudocyperus*.
clandestinus, S. F. Gray, l. c. 56 = *C. humilis*.
depauperatus, S. F. Gray, l. c. 63 = *C. depauperata*.
digitatus, S. F. Gray, l. c. 57 = *C. digitata*.
distans, S. F. Gray, l. c. 62 = *C. distans*.
erectus, S. F. Gray, l. c. 67 = *C. sempervirens*.
extensus, S. F. Gray, l. c. 61 = *C. extensa*.
filiformis, S. F. Gray, l. c. 59 = *C. filiformis*.
flavus, S. F. Gray, l. c. 60 = *C. flava*.
fulvus, S. F. Gray, l. c. 62 = *C. fulva*.
glaucus, S. F. Gray, l. c. 67 = *C. glauca*.
hirtus, S. F. Gray, l. c. 58 = *C. hirta*.
Hostianus, S. F. Gray, l. c. 61 = *C. fulva*.
laevigatus, S. F. Gray, l. c. 66 = *C. laevigata*.
limosus, S. F. Gray, l. c. 67 = *C. limosa*.
Oederi, S. F. Gray, l. c. 60 = *C. Oederi*.
pallens, S. F. Gray, l. c. 69 = *C. pallens*.
paludosus, S. F. Gray, l. c. 64 = *C. paludosa*.
panicus, S. F. Gray, l. c. 63 = *C. panicea*.
pauciflorus, S. F. Gray, l. c. 56 = *C. pauciflora*.
pendulus, S. F. Gray, l. c. 65 = *C. pendula*.

TRASUS:—

- piluliferus*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 58 = *Carex pilulifera*.
praecox, S. F. Gray, l. c. 57 = *C. praecox*.
rariflorus, S. F. Gray, l. c. 68 = *C. rariflora*.
riparius, S. F. Gray, l. c. 64 = *C. riparia*.
strigosus, S. F. Gray, l. c. 65 = *C. strigosa*.
sylvaticus, S. F. Gray, l. c. 65 = *C. sylvatica*.
tomentosus, S. F. Gray, l. c. 57 = *C. tomentosa*.
ustulatus, S. F. Gray, l. c. 66 = *C. ustulata*.
vesicarius, S. F. Gray, l. c. 59 = *C. vesicaria*.

TRATTENIKIA, Pers. Syn. ii. 403 (1807) = **Marshallia**, Schreb. (Compos.).
angustifolia, Pers. l. c. = *M. angustifolia*.
lanceolata, Pers. l. c. = *M. lanceolata*.
latifolia, Pers. l. c. = *M. latifolia*.

TRATTINICKIA, Willd. Sp. Pl. iv. 975 (1806) (Trattinnickia). **BURSERACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 326.
burseraefolia, Mart. in Nov. Gen. et Sp. iii. 93. t. 239.—Bras.
guianensis, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1188 = *burseraefolia*.
humilis, Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 284 = *burseraefolia*.
rhoifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 975.—Bras.
Ryanii, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 125.—Ins. Trinit.
Schomburgkiana, Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 284 = *seq.*
Schomburgkii, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1188 = *burseraefolia*.

TRAUNSTEINERA, Reichb. Nom. 50 (1841); Fl. Sax. 87 (1844) = **Orchis**, Tourn.
globosa, Reichb. Fl. Sax. 87 = *O. globosa*.

TRAUTVETTERIA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 22 (1835). **RANUNCULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 5.
grandis, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 37 = *palmata*.
japonica, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1846) 134 = *palmata*.
palmata, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 22.—Am. bor. occ.; Japon.

TRAVERSIA, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 163 (1864) = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
baccharoides, Hook. f. l. c. 164.—N. Zel.

TRAXARA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 85 (1836) = **Lobostemon**, Lehm. (Borag.).
capitata, Rafin. l. c. 86 = *L. capitatus*.

TRAXILISA, Rafin. Sylva Tellur. 161 (1838) = **Tetracera**, Linn. (Dillen.).
aspera, Rafin. l. c. 162 = *Tet. sarmentosa*.

TRAXILUM, Rafin. Sylva Tellur. 42 (1838) = **Ehretia**, Linn. (Borag.).
asperatum, Rafin. l. c. = *E. laevis*.

TREACORIS, Pritz. Ic. Ind. i. 1111 (1855), sphalm. = **Thecacoris**, A. Juss. (Euphorb.).

TRECHONAETES, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 350. **SOLANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 898.
Bridgesii, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 468 = *laciniata*.
laciniata, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 350.—Chili.
sativa, Miers, l. c. 352 (sp. dub.).—Reg. Argent.

TRECUA, Decne. ex Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 108. t. 3. **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 374.
PSEUDOTRECUA, Baill. Adansonia, xi. (1875) 292, in obs.

acuminata, Baill. l. c. 292.—Afr. trop.
africana, Decne. ex Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 109.—Afr. trop.

TREICHELIA, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 700. **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 559.
LEPTOCODON, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 584 (1865).
longebracteata, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 700.—Afr. austr.

TREISIA, Haw. Syn. Pl. Succ. 131 (1812) = **Euphorbia**, Linn.

- Clava*, Haw. l. c. = *E. Clava*.
erosa, Haw. Suppl. Pl. Succ. 66 = *E. cereiformis*.
Hystrix, Haw. Syn. Pl. Succ. 131 = *E. Hystrix*.
tuberculata, Haw. Suppl. Pl. Succ. 65 = *E. Clava*.

TREISTERIA, Griff. Notul. iv. 109 (1854) = **Curanga**, Juss. (Scrophul.).
assamica, Griff. l. c. 111 = *C. amara*.
cordata, Griff. l. c. 109 = *Torenia asiatica*.
lanceolata, Griff. l. c. 111 (*Toreniae* sp.).—Burma.

TREMA, Lour. Fl. Cochinch. 562 (1790). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 355.

- SPONIA**, Comm. ex Lam. Encyc. iv. 139 (1796).
affinis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 58 = *orientalis*.
africana, Blume, l. c.—Afr. trop.
amboinensis, Blume, l. c. 61.—As. et Austral. trop.
angustifolia, Blume, l. c. 58.—Malaya.
argentea, Blume, l. c.—Ins. Bonin.
aspera, Blume, l. c.—As. et Austral. trop.
Blancoi, Blume, l. c.—Ins. Philipp.
bracteolata, Blume, l. c.—Afr. austr.
Burmanni, Blume, l. c. 62 = *amboinensis*.
canescens, Blume, l. c. 58 = *micrantha*.
cannabina, Lour. Fl. Cochinch. 562 (= *amboinensis*?).—Cochinchin.

- carinata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 59.—Ins. Molucc.
Chichilea, Blume, l. c. 58.—Peruv.
Commersonii, Blume, l. c. 60 = *orientalis*.
discolor, Blume, l. c. 58.—Ind. or.
glabrescens, Blume, l. c.—Ins. Philipp.
glomerata, Blume, l. c. 58.—Afr. austr.
Griffithii, Blume, l. c. = *amboinensis*.
grisea, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 263.—Madag.
imbricata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 63.—Ins. Molucc.

- Lamarckiana*, Blume, l. c. 58.—Ind. occ.
Lima, Blume, l. c.—Ind. occ.
macrophylla, Blume, l. c.—Am. austr.
Melinona, Blume, l. c. 64.—Guian.
micrantha, Blume, l. c. 58.—Am. trop.
mollis, Blume, l. c.—Ind. occ.; Venezuela.
morifolia, Blume, l. c. 59.—Ins. Celebes.
nitens, Blume, l. c. 58.—Afr. trop.
orientalis, Blume, l. c. 62.—Geront. trop.
pallida, Blume, l. c. 60.—Ins. Amboin.
politoria, Blume, l. c. 58.—Reg. Himal.
pubigera, Blume, l. c. 60.—Ins. Molucc.
rigida, Blume, l. c. 61.—Java.
riparia, Blume, l. c. 58.—Am. austr.
rufescens, Blume, l. c.—Jamaic.
rugosa, Blume, l. c.—Porto Rico.
scaberrima, Blume, l. c. 63.—Sumatra.
Schiedeana, Blume, l. c. 58 = *micrantha*.
Sieberti, Blume, l. c. = *orientalis*.
strigosa, Blume, l. c.—Afr. trop.
timorensis, Blume, l. c. 60.—Barma; Malaya.
velutina, Blume, l. c. 62 = *amboinensis*.
virgata, Blume, l. c. 59 = *timorensis*.
viridis, Blume, l. c. 58 = *aspera*.
Wightii, Blume, l. c. = *orientalis*.

TREMANDRA, R. Br. in Flind. Voy. App. ii. 544 (1814). **TREMANDREAE**, Benth. & Hook. f. i. 134.

- diffusa*, R. Br. ex DC. Prod. i. 344.—Austral.
Huegelii, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 647 = *Tetratheca hirsuta*.
oppositifolia, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 222 = *stelligera*.
stelligera, R. Br. ex DC. Prod. i. 344.—Austral.
verticillata, Hueg. ex Walp. Ann. i. 76 = *Platytheca galioides*.

TREMANTHUS, Pers. Syn. i. 467 (1805) = **Styrax**, Tourn.

- cordata*, Pers. l. c. = *S. cordatum*.
ferruginea, Pers. l. c. = *S. racemosum*.
oblonga, Pers. l. c. = *S. oblongum*.
ovata, Pers. l. c. = *S. ovatum*.

TREMASPERMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 124 (1836) = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
Bona-nox, Rafin. l. c. = *I. Bona-nox*.

TREMASELMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 96 (1836) = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).
brachiata, Rafin. l. c. = *S. brachiata*.
Sibthorpi, Rafin. l. c. = *S. brachiata*.

TREMATOSPERMA, Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. i. (1883) 182. *OLACINEAE*.
cordatum, Urb. l. c. = *Cf. Eichl. Jahrb. Berl.* iii. (1884) 244.—Afr. trop.

TREMBLEYA, DC. Prod. iii. 125 (1828). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 738.
agrestis, DC. l. c. 126 = *Microlicia agrestis*.
calycina, Cham. in *Linnaea*, ix. (1834) 430.—Bras.
canescens, *Schnitzl. Ic.* iv. t. 268. f. 1.—Hab. ?
Chamissoana, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xii. (1849) 270.—Bras.
heterostemon, DC. Prod. iii. 126.—Bras.
laniflora, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iii. 130 = *T. Lychnitis*.
Lychnitis, DC. Prod. iii. 12.—Bras.
neopyrenaica, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 154.—Bras.
paniculata, Naud. l. c. = *heterostemon*.
parviflora, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iii. 127 = *heterostemon*, triflora.
pentagona, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 154.—Bras.
phlogiformis, DC. Prod. iii. 126.—Bras.
pithyoides, Cham. in *Linnaea*, ix. (1834) 428.—Bras.
pityrophylla, Mart. ex Triana, in *Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 24 = *Pyramia pityrophylla*.
Pradosiana, Netto, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 378. t. 12.—Bras.
revoluta, Naud. l. c. Sér. III. ii. (1844) 155 = *calycina*.
rhynanthera, Griff. Notul. iv. 677 = *Melastoma malabathricum*.
rosmarinoides, DC. Prod. iii. 125.—Bras.
Selloana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iii. 133.—Bras.
stachyoides, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 154 = *phlogiformis*.
stenophylla, Naud. l. c. xii. (1849) 265.—Bras.
tridentata, Naud. l. c. ii. (1844) 154.—Bras.
triflora, DC. Prod. iii. 126.—Bras.
Warmingii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iii. 133.—Bras.

TREMOTIS, Rafin. Sylva Tellur. 59 (1838) = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).
cordata, Rafin. l. c. = *F. Cunia*.

TREMULA, Dum. in Van Hall, Bijdr. Wet. i. (1826) 46 = **Populus**, Linn. (Salic.).
trepida, Rafin. Alsog. Am. 42 = *P. tremuloides*.
vulgaris, Opiz, Seznam, 99 = *P. tremula*.

TREMULARIA, Heist. Syst. 12 (1748) = **Briza**, Linn. (Gramin.).

TRENDELENBURGIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 123; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 52. t. 3 B = **Begonia**, Tourn.
fruticosa, Klotzsch, ll. cc. = *B. fruticosa*.

TRENTEPOHLIA, Boeck. in Bot. Zeit. xvi. (1858) 249 = **Cyperus**, Mich.
bifoliata, Boeck. l. c. = *C. Cephalotes*.

TRENTEPOHLIA, Roth, Catalect. fasc. ii. 73 (1800) = **Heliophila**, Burm. f. (Crucif.).
integrifolia, Roth, l. c. 76 = *H. amplexicaulis*.
lepidioides, Roth, Nov. Pl. Sp. 326 (err. typ. 226) = *H. diffusa*.
pinnata, Roth, Catalect. fasc. ii. 73 = *H. pendula*.

TREPNANTHUS, Steud. Nom. ed. II. ii. 698 (1841).
sphalm. = **TERPNANTHUS**, Nees & Mart. = **Spiranthera**, A. St. Hil. (Rutac.).

TREPOCARPUS, Nutt. ex DC. Mém. Ombell. 56 (1829); Prod. iv. 201 (1830). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 926.
ENTASIKON, Rafin. New Fl. Am. iv. 28 (1836).
Aethusae, Nutt. ex DC. Mém. Ombell. 56; Prod. iv. 201.—Am. bor.
brachycarpus, DC. ll. cc. 56; 202 = *T. Aethusae*.

TRESANTHERA, Karst. Fl. Columb. i. 37. t. 19 (1858) = **Rustia**, Klotzsch (Rubiace.).
condamineoides, Karst. l. c. = Venezuela.

TRESTEIRA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 279 (1884).
sphalm. = **TREISTERIA**, Griff. = **Curanga**, Juss. (Scrophul.).

TRETOCARYA, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 505. *BORAGINEAE*.
pratensis, Maxim. l. c. = China.

TRETORHIZA, Adans. Fam. ii. 503 (1763) = seq.

TRETORRHIZA, Renealm. ex Delarb. Fl. Auv. ed. II. i. 24 (1800) = **Gentiana**, Tourn.
Cruciata, Delarb. l. c. = *G. Cruciata*.

TREUIA, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 570 (1812) = **Trewia**, Linn. (Euphorb.).

TREUTLERA, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1425 (1883).
ASCLEPIADEAE.
insignis, Hook. f. l. c. = Reg. Himal.

TREVAUXIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 698 (1841), sphalm. = **TREVOUXIA**, Scop. = **Luffa**, Tourn. (Cucurb.).

TREVESIA, Vis. in Giorn. Tosc. Sc. Med. Fis. e Nat. i. (1840) 72; et in Mem. Acc. Torin. Ser. II. iv. (1842) 262. *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 942.
PARAPANAX, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 338 (1860).
PETASULA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3.
REYNOLDSIA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 723. t. 92/93 (1854).
eminens, Bull. Cat. (1884) 17.—Ins. Philipp.
insignis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 220 = *palmata*.
littoralis, Benth. & Hook. f. Gen. i. 943.—Sumatra.
moluccana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 748.—Ins. Amboin.
novo-guineensis, Scheff. in *Ann. Jard. Buitenz.* i. (1876) 26.—N. Guin.
palmata, Vis. in *Mem. Acc. Torin.* Ser. II. iv. (1842) 262.—Ind. or.; Burma.
pliosperma, Benth. & Hook. f. Gen. i. 943.—Ins. Samoa.
sandwicensis, Benth. & Hook. f. l. c. = Ins. Sandvic.
sundaica, Miq. Pl. Jungh. 420.—Java.
Zippelliana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 11.—Ins. Amboin.

TREVIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 1193 (1753) = **Trewia**, Linn. (Euphorb.).

TREVIRANA, Willd. Enum. Hort. Berol. 637 (1809) = **Achimenes**, P. Br. (Gesner.).
Andrieuxii, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 568 = *A. Andrieuxii*.
candida, Decne. ex Lem. in Fl. des Serres, iv. (1848) t. 420 = *Dicyrtia candida*.
coccinea, Willd. Enum. Hort. Berol. 638 = *A. coccinea*.
comifera, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 568 (*conifera*) = *A. comifera*.
discolor, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 8 = *Diastema discolor*.
divaricata, Poepp. & Endl. l. c. 9 = *Diastema divaricatum*.
erinoides, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 568 = *A. erinoides*.
Escheri x, Regel.—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 198.
grandiflora, Schiede, in *Linnaea*, viii. (1833) 247 = *A. grandiflora*.
heterophylla, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 65 (err. typ. 56) = *A. heterophylla*.
hirsuta, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 568 = *A. hirsuta*.
longiflora, D. Dietr. l. c. = *A. longiflora*.
maculata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. ii. (1842) 36 = *A. foliosa*.
maculata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 8 = *Diastema maculatum*.
mollis, Poepp. & Endl. l. c. 9 = *Diastema molle*.
parviflora, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 302 = *Anetanthus parviflora*.
patens, Walp. Ann. i. 472, in nota = *A. patens*.
pulchella, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 66. t. 226. f. 4 = *A. coccinea*.

TREVIRANA:—
scabra, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 8 = *Diastema scabrum*.
tenella, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 568 = *Achimenes tenella*.
tenerrima, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 9. t. 207 C = *Diastema tenerrimum*.
urticaefolia, Poepp. & Endl. l. c. 8. t. 207 B = *Diastema urticaefolium*.

TREVIRANIA, Heynh. Nom. ii. 736 (1846) = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).
calycina, Heynh. l. c. = *P. Lindleyana*.

TREVIRANIA, Roth, in Weber, Beitr. ii. (1810) 123 = **Vandellia** ? Linn. (Scrophul.).
Gratiolae, Roth, l. c. = Hab. ?

TREVIRANIA, Spreng. Anleit. ii. i. 400 (1817) = **TREVIRANA**, Willd. = **Achimenes**, P. Br. (Gesner.).

TREVOA, Miers, Trav. Chile, ii. 529 (1826). *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. i. 384.
Berteroana, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 490 = *Retanilla spinifera*.
Berteroniana, Steud. Nom. ed. II. ii. 698.—Chili.
Closiana, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 492 = *Retanilla spinifera*.
Fruittia, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 698.—Chili.
quinenervia, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 158.—Chili.
tenuis, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 489.—Chili.
trinervia, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 159 = seq.
trinervia, Miers, Trav. Chile, ii. 529.—Chili.
Weddelliana, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 491.—Bolivia.

TREVOUXIA, Scop. Introd. 152 (1777) = **Luffa**, Tourn. (Cucurb.).

TREWIA, Linn. Gen. ed. I. 152 (1737). *EUPHORBACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 318.
ROTLERA, Willd. in Goett. Journ. Wiss. i. (1797) 7. t. 1.
africana, Baill. Adansonia, i. (1860–61) 68 = *Claoxylon Barteri*.
discolor, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 4.—Ind. or.
hernandifolia, Roth, Nov. Pl. Sp. 374 = *Macaranga indica* ?
Inophyllum, Spreng. Syst. iii. 906 = *Codiaeum Inophyllum*.
insignis, Steud. Nom. ed. II. ii. 698 = *Alchornea Blumeana*.
integerrima, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 570 = *nudiflora*.
macrophylla, Blume, Bijdr. 612 = *Alchornea Blumeana*.
macrophylla, Roth, Nov. Pl. Sp. 373 = *nudiflora*.
macrostachya, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 117 = *nudiflora*.
nudiflora, Linn. Sp. Pl. 1193.—As. trop.
nudiflora, Wight, Ic. t. 1871, partim = *polycarpa*.
polycarpa, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 318.—Ind. or.
pubescens, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 3.—Ins. Amboin.
rusciflora, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 374 (Quid ?).—Ind. or.
tricuspidata, Willd. Sp. Pl. iv. 835 = *Mallotus cochinchinensis*.

TRIACHNE, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 48 = **Nassauvia**, Comm. (Compos.).
pygmaea, Cass. l. c. = *N. pygmaea*.

TRIACHYRIUM, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 86, sphalm. = seq.

TRIACHYRUM, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 19, nomen; et ex Steud. Syn. Pl. Gram. 176 (1855) = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).
adoense, Hochst. ll. cc.—Abyss.
cordofanum, Hochst. l. c. xxv. (1842) i. Beibl. 134, nomen; et ex Steud. Syn. Pl. Gram. 176.—Nubia.
discosporum, Steud. l. c.—Afr. austr.
longifolium, Hochst. ex Steud. l. c.—Abyss.
micranthum, Steud. l. c.—Abyss.
nilagiricum, Steud. l. c. = *S. piliferus*.

TRIACIS, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 189 = *Turnera*, Linn.
microphylla, Griseb. l. c. = *Turnera diffusa*.

TRIACMA, Van Hass. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 523 (1857) = *Hoya*, R. Br. (Asclep.).

TRIACTINA, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 90. *CRASSULACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 661.
verticillata, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 103. —Reg. Himal.

TRIADENIA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 458 (1856) = *Trachelospermum*, Lem. (Apocyn.).
verrucosa, Miq. l. c. 459. —Java.

TRIADENIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 172, 354 = *Hypericum*, Tourn.
aegyptiaca, Boiss. Fl. Orient. i. 783 = *H. aegypticum*.
maritima, Boiss. l. c. 784 = *H. maritimum*.
microphylla, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 173 = *H. aegypticum*.
Russeggeri, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 7. —Syria.
Sieberi, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 175 = *H. maritimum*.
thymifolia, Spach, l. c. = *H. Spachianum*.
Webbii, Spach, l. c. = *H. aegypticum*.

TRIADENUM, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = *Hypericum*, Tourn.
purpurascens, Rafin. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 171 = *H. virginicum*.
purpureum, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = *H. virginicum*.
virginicum, Rafin. Fl. Tellur. iii. 79 = *H. virginicum*.

TRIADICA, Lour. Fl. Cochinch. 610 (1790) = *Sapium*, P. Br. (Euphorb.).
chinensis, Spreng. Syst. i. 93, sphalm. = *sinensis*.
cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. 610 = *Excoecaria Loureiroana*.
japonica, Baill. Etud. Gén. Euph. 512 = *Excoecaria japonica*.
sinensis, Lour. Fl. Cochinch. 610 = *S. Sebifera*.

TRIAENA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 178 [t. 61] (1815) = *Bouteloua*, Lag. (Gramin.).
racemosa, H. B. & K. l. c. 179 [t. 61] = *B. Triathera*.

TRIAENANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 169 (1847) = *Strobilanthes*, Blume (Acanth.).
Griffithianus, Nees, l. c. = *S. Griffithianus*.

TRIAINA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. t. 61 (1815), sphalm. = TRIAENA, H. B. & K. = *Bouteloua*, Lag. (Gramin.).

TRIAINOLEPIS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 126 (1873). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.
africana, Hook. f. l. c. —Afr. trop.
Hildebrandtii, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 230. —Afr. trop.

TRIALLOSIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 60 (1836) = *Lachenalia*, Jacq. (Liliac.).
pallida, Rafin. l. c. = *L. pallida*.

TRIANAEA, Planch. & Linden, in Linden, Prix-Cour. n. 8 (1853) 4. —Cf. Bot. Zeit. xi. (1853) 717 = *Dyssochroma*, Miers (Solan.).
nobilis, Planch. & Linden, ll. cc. —N. Granat.

TRIANEA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 424 = *Limnobia*, Rich. (Hydroch.).
bogotensis, Karst. l. c. 425. —N. Granat.

TRIANOPILES, Fenzl, in Endl. Gen. 113 (1836) = *Ecklonia*, Steud. (Cyperac.).
capensis, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 422 = *E. capensis*.

TRIANOSPERMA, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 79 (1843) = *Cayaponia*, Silva Manso (Cucurb.).
africana, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 568 = *C. latebrosa*.
angustiloba, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 84 = *C. angustiloba*.
arguta, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 80, nomen. —Bras.

TRIANOSPERMA:—

attenuata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 486 = *Cayaponia attenuata*.
Belangerii, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 201. t. 11 = *C. americana*.
Boykinii, M. Roem. Syn. Pepon. 45 = *C. Boykinii*.
Crugerii, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 193 = *C. Crugerii*.
diversifolia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 92. t. 28 = *C. diversifolia*.
ficifolia, Cogn. l. c. 89 = *C. ficifolia*.
ficifolia, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 79 = *C. Martiana*.
floribunda, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 88. t. 26 = *C. floribunda*.
glandulosa, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 80 = *C. glandulosa*.
graciliflora, Griseb. Cat. Pl. Cub. 112 = *C. americana*.
gracillima, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 91 = *C. gracillima*.
heterophylla, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 194 = *C. heterophylla*.
Hilariana, Naud. l. c. Sér. V. vi. (1866) 14 = *C. ficifolia*.
Lhotzkyana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 83 = *C. Lhotzkyana*.
Martiana, Cogn. l. c. 87. t. 25 = *C. Martiana*.
piauhensis, Cogn. l. c. 83 = *C. piauhensis*.
racemosa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 112 = *C. racemosa*.
rigida, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 94 = *C. rigida*.
setulosa, Cogn. l. c. 86 = *C. setulosa*.
simplicifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 195 = *C. simplicifolia*.
Tayuya, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 80 = *C. Tayuya*.
Tibiricae, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 191 = *C. Tibiricae*.
triangularis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 86 = *C. triangularis*.
trifoliolata, Cogn. l. c. 93 = *C. trifoliolata*.
trilobata, Cogn. l. c. 89. t. 27 = *C. trilobata*.

TRIANTHA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 490 = *Tofieldia*, Huds. (Liliac.).
glutinosa, Baker, l. c. = *Tof. glutinosa*.
japonica, Baker, l. c. 491 = *Tof. japonica*.
pubens, Baker, l. c. 490 = *Tof. pubens*.

TRIANTHAEA, Spach, Hist. Veg. Phan. x. 39 (1841) = *Vernonia*, Schreb. (Compos.).

TRIANTHEMA, Sauv. Meth. Fol. 127 (1751); Linn. Sp. Pl. ed. I. 223 (1753). *FICOIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 855.
ANCISTROSTIGMA, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 293.
DIPLOCHORIUM, Fenzl, Nov. Stirp. Dec. 57 (1839).
PAPULARIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 69 (1775).
PORTULACASTRUM, Juss. ex Medic. Phil. Bot. i. 99 (1789).
REME, Adans. Fam. ii. 245 (1763).
ROCAMA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 71 (1775).
ZALEYA, Burm. f. Fl. Ind. 110. t. 31 (1768).
americana, Gill, in Edinb. Journ. Nat. & Geog. Sc. iii. (1831) 354 = *Sesuvium Portulacastrum*.
anceps, Thunb. Prod. Pl. Cap. 80 = *Acrosanthes fistulosa*.
corymbosum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 226, nomen = crystallina.
crystallina, Vahl, Symb. Bot. i. 32. —As. et Afr. trop.
cypseloides, Benth. Fl. Austral. iii. 331. —Austral.
decandra, Linn. Mant. i. 70. —As. trop.
diffusa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *decandra*.
dubia, Spreng. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) 11. 179, in syn. = *Adenocline pauciflora*.
flexuosa, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 221 = *T. Portulacastrum*.
fruticosa, Vahl, Symb. Bot. i. 32 = *Gymnocarpus fruticosus*.
glaucofolia, F. Muell. Fragm. i. 172 = *crystallina*.
glinoides, Pers. Syn. i. 486 = *decandra*.
glossostigma, F. Muell. in Wing. South. Sc. Record, iii. (1883) 282. —Austral.
Govindia, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6838 = *pentandra*.
humifusa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 80 = *Acrosanthes humifusa*.
humillima, F. Muell. Fragm. x. 72. —Austral.
hyaspica, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 203. —Ind. or.; Afr. trop.
monogyna, Linn. Mant. i. 69 = *T. Portulacastrum*.

TRIANTHEMA:—

obcordata, Roxb. Hort. Beng. 34; Fl. Ind. ii. 445 = *T. Portulacastrum*.
obcordata, Wall. Cat. n. 6837 F = *pentandra*.
oxycalyptra, F. Muell. Fragm. i. 173. —Austral.
parvifolium, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 226, nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 598. —Afr. austr.
pentandra, Linn. Mant. i. 70. —As. et Afr. trop.
pilosa, F. Muell. Fragm. i. 174. —Austral.
polyandra, Blume, Bijdr. 1137 = *Sesuvium Portulacastrum*.
polysperma, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 588 = *hyaspica*.
Portulacastrum, Linn. Sp. Pl. 223; Moench, Meth. 700. —Am. trop.
procumbens, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *T. Portulacastrum*.
rhynchocalyptra, F. Muell. Fragm. i. 174. —Austral.
rubens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 227, nomen = *crystallina*.
salsoloides, Fenzl, ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 588. —Afr. trop.
sedifolia, Vis. Pl. Aegypt. Dec. 19. t. 3. f. 1 = *crystallina*.
triquetra, Rottl. & Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 181 = *crystallina*.
turgidifolia, F. Muell. Fragm. x. 83. —Austral.

TRIANTHIUM, Desv. Opusc. 69, in obs. (1831) = *Chrysopogon*, Trin. (Gramin.).

TRIANTHUS, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 320 (1846) = *Nassauvia*, Comm. (Compos.).
ulcinus, Hook. f. l. c. —Patagon.

TRIAS, Lindl. in Wall. Cat. n. 1977 (1829); Gen. et Sp. Orch. 60 (1830). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 505.
oblonga, Lindl. ll. cc. —Burma.
ovata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 60. —Ind. or.

TRIASCIDIUM, Benth. & Hook. f. Gen. i. 876 (1867), sphalm. = *TRISCIADIUM*, Phil. = *Huanaca*, Cav. (Umbell.).

TRIASEKIA, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 792 (1839), sphalm. = *JIRASEKIA*, F. W. Schmidt = *Anagallis*, Tourn. (Primul.).

TRIASPIS, Burch. Trav. ii. 280 (1824). *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 259.
auriculata, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1883) 379. —Afr. trop.
flabellaria, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 507. —Afr. trop.
floribunda, O. Hoffm. Sert. Madag. 8. —Madag.
hypericoides, Burch. Trav. ii. 280. —Afr. austr.
lateriflora, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 281. —Afr. trop.
macropteris, Welw. ex Oliver, l. c. —Afr. trop.
mozambica, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 505. —Afr. trop.
Nelsoni, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1418. —Afr. austr.
odorata, A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 21. t. 36. —Afr. trop.
squarrosa, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1883) 377. —Afr. trop.
stipulata, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 281. —Afr. trop.

TRIATHERA, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 188 = *Bouteloua*, Lag. (Gramin.).
americana, Desv. l. c. = *B. Triathera*.
bromoides, Roth, ex Kunth, Enum. Pl. i. 520 = *Enteropogon melicoides*.
juncea, Desv. ex Beauv. Agrost. 40 = *B. Triathera*.
racemosa, Desv. Opusc. 72 = *B. Triathera*.

TRIBELES, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 307. *PITTOSPOREAE* [vel *SAXIFRAGEAE*], Benth. & Hook. f. i. 973.
CHALEPOA, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1082 (1871).
australis, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 307. —Ins. Chiloe.

TRIBLEMMA, R. Br. ex DC. Prod. iii. 113 (1828) = *Bertolonia*, Raddi (Melastom.).
acaule, Steud. Nom. ed. II. ii. 698 = *Eriocnema Hilariana*.
leuzeanum, Steud. l. c. = *B. leuzeana*.
longifolium, Steud. l. c. = *B. longifolia*.

TRIBLEMMA :—

maculata, Mart. ex DC. Prod. iii. 114 = *Bertolonia maculata*.
nymphaeifolium, Mart. ex DC. l. c. 113 = *B. ovata*.
nymphaeifolium, Steud. Nom. ed. II. ii. 698 = *B. nymphaeifolia*.
ovatum, Steud. l. c. = *B. ovata*.

TRIBOLACIS, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 297 (1860) = **Turnera**, Linn.

junceae, Griseb. l. c. = *Turnera guianensis*.

TRIBOLIUM, Desv. Opusc. 64 (1831) = **Lasiochloa**, Kunth (Gramin.).

hispidum, Desv. l. c. = *L. hispida*.

TRIBONANTHES, Endl. Nov. Stirp. Dec. 27 (1839). **HAEMODORACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 675.

australis, Endl. l. c. — Austral.
brachypetala, Lindl. *Swan River App.* 44. — Austral.
Lindleyana, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 27 = longipetala.
longipetala, Lindl. *Swan River App.* 44. — Austral.
odora, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 28 = brachypetala.
uniflora, Lindl. *Swan River App.* 44. — Austral.
variabilis, Lindl. l. c. — Austral.
violacea, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 28 = uniflora.

TRIBRACHIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 832 (1824); et Coll. Bot. t. 41 (1825) = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).

biflora, Lindl. Coll. Bot. sub t. 41 (= *Stelis biflora*). — Reg. HIMAL.
hirta, Lindl. l. c. = *B. hirtum*.
odoratissima, Lindl. l. c. = *B. odoratissimum*.
pendula, Lindl. l. c. = *B. pendulum*.
purpurea, Lindl. l. c. = *B. Careyanum*.
racemosa, Lindl. l. c. = *Liparis odorata*?
reptans, Lindl. l. c. = *B. reptans*.

TRIBRACHIUM, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 501 (1863), sphalm. = praec.**TRIBRACHYA**, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 254. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 118.

morindaeformis, Korth. l. c. 255. — Sumatra.

TRIBRACHYS, Champ. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 325 (1864) = **Thismia**, Griff. (Burman.).

Gardneriana, Champ. ex Thw. l. c. = *Thismia Gardneriana*.

TRIBULA, Hill, Veg. Syst. vi. 10 (1764) = **Athamanta**, Linn. (Umbell.).

Turbith, Hill, Hort. Kew. 91 = *A. Matthioli*.

TRIBULARIA, Heist. Syst. 8 (1748) (Quid?).**TRIBULASTRUM**, B. Juss. ex Linn. Gen. ed. II. 185 (1742) = **Neurada**, Linn. (Rosac.).**TRIBULOPIS**, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 70 (1849) = **Tribulus**, Linn. (Zygoph.).

angustifolia, R. Br. l. c. = *Tribulus angustifolius*.
bicolor, F. Muell. Fragm. i. 47 = *Tribulus bicolor*.
pentandra, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 70 = *Tribulus Brownii*.
Solandri, R. Br. l. c. = *Tribulus Solandri*.
Solandri, F. Muell. Fragm. i. 47, partim = *Tribulus angustifolius*.

TRIBULOPSIS, F. Muell. Fragm. i. 47 (1858) = praec.**TRIBULUS**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). **ZYGOPHYLLAEAE**, Benth. & Hook. f. i. 264.

EHRENBERGIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 72. t. 163 (1827).
HETEROZYGIS, Bunge, Suppl. Fl. Alt. 82 (1836).
KALISTROEMIA, Scop. Introd. 212 (1777).
TRIBULOPIS, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 70 (1849).
acanthococcus, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 9 = terrestris.
ascendens, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 245. — Ins. Galapag.

TRIBULUS :—

alatus, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 62. — Afr. bor.; Ind. or.
alatus, Drège, ex Presl, Bot. Bemerk. 30 = pterophorus.
albus, Poir. Encyc. viii. 45 = terrestris.
angustifolius, Benth. Fl. Austral. i. 290. — Austral.
astrocarpus, F. Muell. Fragm. xii. 4. — Austral.
bicolor, F. Muell. Pl. Vict. i. 99. — Austral.
bicornutus, Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 391 = terrestris.
bimucronatus, Kralik, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 28, sphalm. = praec.
bimucronatus, Viv. Pl. Aegypt. Dec. iv. 9. — Aegypt.; Afghan.
bispinulosus, Kralik, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 26 = bimucronatus?
brasilienis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 343. — Bras.
Brownii, F. Muell. Pl. Vict. i. 99. — Austral.
californicus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 125. — Calif.
cistoides, Linn. Sp. Pl. 387. — Cosmop. trop.
cristatus, Ehrenb. ex C. Muell. in Walp. Ann. iv. 404 = Ehrenbergii.
cristatus, Presl, Bot. Bemerk. 30. — Afr. austr.
decolor, Macfad. Fl. Jamaic. i. 186 = maximus.
dubescens, Walp. Ann. ii. 244, err. typ. = pubescens.
Ehrenbergii, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. i. 249. — Afr. trop.
excrucians, Wawra & Peyr. in Sitzb. Akad. Wien, Math.-Nat. xxxviii. (1860) 557 = terrestris.
Fisherii, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. vii. (1877) 162 = grandiflorus.
Forrestii, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, (Nov. 1885). — Austral.
grandiflorus, Benth. & Hook. f. ex S. Wats. Ind. Bibliog. N. Am. Bot. 149. — Am. bor. occ.
Gussonii, Todaro & Pirain. ex Parl. Fl. Ital. v. 334 = terrestris.
hirsutus, Benth. Fl. Austral. i. 289. — Austral.
hispidus, Presl, Bot. Bemerk. 29 = terrestris.
humifusus, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 215 = terrestris.
Hystrix, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 69. — Austral.
inermis, Kralik, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 25 = bimucronatus?
intermedius, Kralik, l. c. 27 = bimucronatus.
Kotschyanus, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 111 = terrestris.
lanatus, Walp. Ann. ii. 243 = T. Hystrix.
lanuginosus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 350 = cistoides.
lanuginosus, Linn. Sp. Pl. 387 = terrestris.
littoralis, Ait. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 766 (Quid?). — Austral.
longipetalus, Viv. Pl. Aegypt. Dec. iv. 10 = alatus.
macranthus, Hassk. in Flora, xlviii. (1865) 403 = cistoides.
macrocarpus, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 289. — Austral.
macropterus, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 161. — Aegypt.; Persia; Afghan.
maximus, Linn. Sp. Pl. 386. — Am. calid.
megistopterus, Kralik, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 32. — Arab.
micans, Welw. Apont. 566 = terrestris.
microcephalus, Bertol. f. in Mem. Acc. Sc. Bologn. iii. (1851) 255. — Afr. trop.
minutus, Leichh. ex Benth. Fl. Austral. i. 291. — Austral.
mollis, Ehrenb. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. i. 29 = terrestris.
moluccanus, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 446 = cistoides.
Murex, Presl, Bot. Bemerk. 29 = terrestris.
muricatus, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 496 = terrestris.
occidentalis, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 69 = T. Hystrix.
parvispinus, Presl, Bot. Bemerk. 29 = terrestris.
pentandrus, Benth. Fl. Austral. i. 290 = Brownii.
pentandrus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 81 (sp. dub.). — Arab.
persicus, Kralik, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 31 = macropterus.
platypterus, Benth. Fl. Austral. i. 289. — Austral.
pteroctarpus, Ehrenb. ex C. Muell. in Walp. Ann. iv. 404 = macropterus.
pterophorus, Presl, Bot. Bemerk. 30. — Afr. austr.
pubescens, G. Don, Gen. Syst. i. 769 = maximus.

TRIBULUS :—

ranunculiflorus, F. Muell. Fragm. i. 48. — Austral.
Revoili, Franch. in Revoil, Comali, 22. — Afr. trop.
robustus, Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II. i. 112 = terrestris.
sericeus, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 245. — Ins. Galapag.
sinaicus, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 120 = bimucronatus.
Solandri, F. Muell. Pl. Vict. i. 99, partim. — Austral.
Solandri, F. Muell. l. c. c., partim = angustifolius.
spurius, Kralik, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 28 = bimucronatus.
subinermis, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1808) 94. — Tibet.
terrestris, Linn. Sp. Pl. 387. — Amphig. trop.
terrestris, Muhl. Cat. 43 = maximus.
trijugatus, Nutt. Gen. Am. i. 277 = maximus.
trijugus, Steud. Nom. ed. II. ii. 693, sphalm. = praec.
Zeyheri, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 353. — Afr. austr.

TRICALYSIA, A. Rich. ex DC. Prod. iv. 445 (1830); et in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 224. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 95.

BUNBURYA, Meissn. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 553.
NATALANTHE, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 52.
ROSEA, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1853) 501.
angolensis, A. Rich. ex DC. Prod. iv. 445; et in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 225. — Afr. trop.
biafrana, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 122. — Afr. trop.
bracteata, Hiern, l. c. 120. — Afr. trop.
buxifolia, Hiern, l. c. 119. — Afr. trop.
congesta, Hiern, l. c. 120. — Afr. trop.
coriacea, Hiern, l. c. — Afr. trop.
crassifolia, Benth. & Hook. f. ex Hiern, l. c. 124. — Afr. trop.
cryptocalyx, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 138. — Madag.
djurensis, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 123. — Afr. trop.
gabonica, Hiern, l. c. 122. — Afr. trop.
jasminiflora, Benth. & Hook. f. ex Hiern, l. c. 124. — Afr. trop.
Kirkii, Hiern, l. c. 124. — Afr. trop.
micrantha, Hiern, l. c. 122. — Afr. trop.
microphylla, Hiern, l. c. 123. — Afr. trop.
niamniamensis, Schweinf. ex Hiern, l. c. 123. — Afr. trop.
Nyassae, Hiern, l. c. 121. — Afr. trop.
okelensis, Hiern, l. c. 122. — Afr. trop.
ovalifolia, Hiern, l. c. 119. — Afr. trop.
pallens, Hiern, l. c. 121. — Afr. trop.
reticulata, Hiern, l. c. 121. — Afr. trop.
Sonderiana, Hiern, l. c. 119. — Afr. trop.
syrmanthera, Hiern, l. c. 120. — Afr. trop.

TRICARDIA, Torr. ex S. Wats. Bot. King's Exped. 258, t. 24 (1871). **HYDROPHYLLACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 829.

Watsoni, Torr. ex S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.

TRICARIUM, Lour. Fl. Cochinch. 557 (1790) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

cochinchinense, Lour. l. c. = *P. cochinchinensis*.

TRICARYUM, Spreng. Syst. iii. 848 (1826) = praec.**TRICATUS**, Pritz. Ic. Ind. ii. 275 (1866), sphalm. = **TRICKATUS**, L'Hérit. = **Abronia**, Juss. (Nyctag.).

admirabilis, Pritz. l. c. = *A. umbellata*.

TRICENTRUM, DC. Prod. iii. 123 (1828) = **Comolia**, DC. (Melastom.).

leptophyllum, DC. l. c. = *C. leptophylla*.
ovalifolium, DC. l. c. = *C. denudata*.

TRICERA, Schreb. Gen. 630 (1791); Sw. Fl. Ind. Occ. i. 331. t. 7 (1797) = **Buxus**, Linn. (Euphorb.).

acuminata, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 162 = *B. acuminata*.
citrifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 338 = *B. citrifolia*.
cordifolia, Willd. l. c. 339 = *B. cordifolia* (cf. Addend.).

TRICERA:—

- cubana*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 217 = *Buxus cubana*.
fasciculata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 31 = *B. Purdieana glomerata*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 157 = *B. glomerata*.
gonoclada, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 282 = *B. gonoclada*.
laevigata, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 333 = *B. laevigata*.
laevigata, Willd. Sp. Pl. iv. 338, partim = *B. Vahl.*
microphylla, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 163 = *B. Wrightii*.
nepalensis, Wall. Cat. n. 7979 = *Sarcococca pruni-formis*.
retusa, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 163 = *B. retusa*.

TRICERAIA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 803 (1819) = *Turpinia*, Vent. (Sapind.).
tinifolia, Humb. & Bonpl. ex Roem. Schult. l. c. = *Turpinia insignis*.

TRICERAS, Andr. ex Reichb. Consp. 185 (1828) = *Matthiola*, R. Br. (Crucif.).

TRICERASTES, Presl, Rel. Haenk. ii. 88. t. 64 (1836) = *Datisca*, Linn.
glomerata, Presl, l. c. = *D. glomerata*.

TRICERATIA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 614. t. 44 (1845) = *Sicydium*, Schlecht. (Cucurb.).
bryonioides, A. Rich. l. c. 615 = *S. Schiedeanum*.

TRICERCANDRA, A. Gray, in Perry, Jap. Exped. ii. 318 (1857) = *Chloranthus*, Sw.
Fortuni, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 405 = *C. Fortunei*.
quadrifolia, A. Gray, in Perry, Jap. Exped. ii. 318 = *C. japonicus*.

TRICERMA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 97 = *Maytenus*, Molina (Celastr.).
crassifolium, Liebm. l. c. 98 = *M. phyllanthoides*.

TRICEROS, Griff. Notul. iv. 606 (1854) = *Gomphogyne*, Griff. (Cucurb.).

TRICEROS, Lour. Fl. Cochinch. 184 (1790). Genus dubium *ANACARDIACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. i. 418, 1000.
cochinchinensis, Lour. l. c.—Cochinch.
xalapensis, Spreng. Syst. i. 947 = *Turpinia insignis*.

TRICHACANTHUS, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neërl. Indie, ii. (1845) 572. *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1089.
exiguus, Zoll. & Mor. l. c.—Java.

TRICHACHNE, Nees, Agrost. Bras. 85 (1829) = *Panicum*, Linn. (Gramin.).
ferruginea, Nees, l. c. 90 = *P. phaeothrix*.
insularis, Nees, l. c. 86 = *P. lanatum*.
recalva, Nees, l. c. 88 = *P. recalva*.
sacchariflora, Nees, l. c. 87 = *P. lanatum*.
Sellowii, C. Muell. in Bot. Zeit. xix. (1861) 315 = *Andropogon leucostachyus*.
tenuis, Nees, Agrost. Bras. 89 = *P. tenerimum*.
velutinum, Nees, l. c. 90 = *P. vestitum*.

TRICHADENIA, Thw. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 196. t. 8. *BIXINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 129.
zeylanica, Thw. l. c.—Zeylan.

TRICHAETA, Beauv. Agrost. 86. t. 17. f. 8 (1812) = *Trisetum*, Pers. (Gramin.).
ovata, Beauv. l. c. = *Trisetum ovatum*.

TRICHANDRUM, Neck. Elem. i. 84 (1790) = *Helichrysum*, Vaill. (Compos.).

TRICHANTHA, Hook. Ic. Pl. tt. 666, 667 (1844). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1009.
major, Hook. l. c. t. 667.—N. Granat.
minor, Hook. l. c. t. 666.—N. Granat.

TRICHANTHA, Karst. & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 437 = *Breweria*, R. Br. (Convolv.).
ferruginea, Karst. & Triana, l. c. 438.—N. Granat.

TRICHANTHEMIS, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 617. *COMPOSITAE*.
karataviensis, Regel & Schmalh. l. c.—Turkestan.

TRICHANTHERA, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 401 = *Hermannia*, Linn. (Stercul.).
modesta, Ehrenb. l. c. = *H. arabica*.

TRICHANTHERA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 243, in obs. (1817). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1084.
TRIXANTHERA, Rafin. Sylva Tellur. 146 (1838).
gigantea, Humb. & Bonpl. ex Steud. Nom. ed. I. 708, in syn.; Nees, in DC. Prod. xi. 218.—N. Granat.; Panama.

TRICHANTHODIUM, Sond. & F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 489 = *Gnephosis*, Cass. (Compos.).
skerriophorum, Sond. & F. Muell. l. c. 490 = *G. skirrophora*.

TRICHARIS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 24 (1866) = *Dipeadi*, Medic. (Liliac.).
serotina, Salisb. l. c. = *D. serotinum*.

TRICHASMA, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 510 = *Argyrolobium*, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
calycinum, Walp. l. c. = *A. calycinum*.
ciliatum, Walp. l. c. = *A. Andrewsianum*.

TRICHAsterOPHYLLUM, Willd. ex Link, Jahrb. i. iii. (1820) 69 = *Helianthemum*, Tourn. (Cistin.).
hyssopifolium, Willd. ex Link, l. c. = *H. glomeratum*.

TRICHAURUS, Arn. in Wight & Arn. Prod. 40 (1834) = *Tamarix*, Linn.
Aucherianus, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 59 = *Tam. passerinoides*.
ericoides, Arn. ex Wight & Arn. Prod. 40 = *Tam. ericoides*.
pycnocarpus, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 59 = *Tam. passerinoides*.
vaginatus, Desv. ex Walp. Rep. ii. 115.—Persia.

TRICHELOSTYLIS, Lestib. Ess. Fam. Cyp. 40 (1819) = *Fimbristylis*, Vahl (Cyperac.).
angularis, Nees, in Wight, Contrib. 105, in obs. = *F. angularis*.
aspera, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 80 = *F. aspera*.
asperima, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 41 = *F. asperima*.
autumnalis, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290 = *F. autumnalis*.
borealis, Wood, Am. Bot. & Flor. 364.—Am. bor.
capillaris, Wood, Class-Book (1861), 742 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
capitata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290 = *F. capitata*.
carinata, Wood, Class-Book (1861), 742 = *Scirpus carinatus*.
chaetorrhiza, Nees, in Wight, Contrib. 106 = *F. junciformis*.
ciliatifolia, Wood, Am. Bot. & Flor. 364 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
cinnamometorum, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290 = *F. cyperoides*.
coarctata, Wood, Class-Book (1861), 742 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
complanata, Nees, in Wight, Contrib. 103 = *F. complanata*.
contexta, Nees, in Linnaea, x. (1836) 146 (Bulbostylidis sp.).—Madag.; Afr. austr.
curvifolia, Nees, in Wight, Contrib. 105, in obs. = *F. diphylla*.
digitata, Dalz. ex Boeck. in Flora, lxi. (1878) 35 = *F. digitata*.
filiformis, Nees, in Wight, Contrib. 102 = *F. pauciflora*.
geminata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290; et in Mart. Fl. Bras. ii. i. 80 = *F. autumnalis*.
globulosa, Nees, in Wight, Contrib. 105 = *F. globulosa*.
gracilis, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 492 = *Ficinia gracilis*.
junciformis, Nees, in Wight, Contrib. 106 = *F. junciformis*.
Kielmeyeri, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 38 = *F. complanata*.
latifolia, Nees, in Wight, Contrib. 106 = *F. junciformis*.

TRICHELOSTYLIS:—

Ludwigii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290 = *Scirpus Ludwigii*.
miliacea, Nees, in Wight, Contrib. 103 = *Fimbristylis miliacea*.
mucronulata, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 355 = *F. autumnalis*.
obtusifolia, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290 = *F. obtusifolia*.
pentagona, Nees, in Wight, Contrib. 105, in obs. = *F. miliacea*.
pentaptera, Nees, l. c. = *F. pentaptera*.
pilosula, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 28 = *F. exilis*.
quinquangularis, Nees, in Wight, Contrib. 104 = *F. miliacea*.
Rudgeana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 79 = *F. complanata*.
salbundia, Nees, in Wight, Contrib. 105 = *F. salbundia*.
scabra, Nees, l. c. 103 = *F. complanata*.
Schimperiana, Hochst. ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 28 = *F. exilis*.
stenophylla, Wood, Class-Book (1861), 742 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
stricta, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 394 = *F. Schomburgkiana*.
tenella, Nees, in Wight, Contrib. 103 = *F. tenera*.
tetragona, Nees, l. c. 104 = *F. miliacea*.
torta, Nees, l. c. 105 = *F. junciformis*.
Warei, Wood, Class-Book (1861), 742 (Bulbostylidis sp.).—Florida.
xyroides, Arn. ex Hook. f. Fl. Tasm. p. xlviii = *F. tetragona*.

TRICHERA, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814); Roem. & Schult. Syst. iii. 54 (1818) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).
ambigua, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. ambigua*.
amplexicaulis, Nym. Syll. 60 = *S. amplexicaulis*.
arvensis, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814); Roem. & Schult. Syst. iii. 54 = *S. arvensis*.
bidens, Schult. Mant. iii. 29 = *S. bidens*.
bohemia, Nym. Consp. 347 = *S. arvensis*.
brevis, Schult. Mant. iii. 30 = *S. papposa*.
calycina, Presl, Fl. Sic. p. xxviii.—Sicil.
campestris, Schult. Mant. iii. 27 = *S. arvensis*.
carpathica, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. arvensis*.
carphophyllax, Nym. Consp. 347 = *S. sylvatica*.
ciliata, Roem. & Schult. Syst. iii. 57 = *S. ciliata*.
collina, Nym. Syll. 60 = *S. collina*.
communis, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 815 = *S. arvensis*.
cuspidata, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. sylvatica*.
diodon, Presl, Fl. Sic. p. xxviii.—Sicil.
dipsacifolia, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. sylvatica*.
diversifolia, Nym. Syll. 60 = *S. banatica*.
diversifolia, Schult. Mant. iii. 28 = *S. banatica*.
drymeia, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. sylvatica*?
dumetorum, Nym. l. c. = *S. arvensis*.
dumetorum, Roem. & Schult. Syst. iii. 56 = *S. dumetorum*.
exaltata, Nym. Consp. 347 = *S. arvensis*.
Fleischmanni, Nym. Syll. 59 = *S. arvensis*.
Godeti, Nym. Consp. 347 = *S. longifolia*.
hirsuta, Schult. Mant. iii. 27 = *S. arvensis*.
hybrida, Roem. & Schult. Syst. iii. 58 = *S. integrifolia*.
indivisa, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. arvensis*.
integrifolia, Roem. & Schult. Syst. iii. 59 = *S. integrifolia*.
lancifolia, Fuss, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. xiv. (1863) 195 = *S. sylvatica*.
legionensis, Roem. & Schult. Syst. iii. 56 = *S. legionensis*.
leucantha, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814) 3; ex Roem. & Schult. Syst. iii. 58 = *S. ciliata*.
longifolia, Roem. & Schult. l. c. 56 = *S. longifolia*.
lyrophylla, Nym. Consp. 347 = *S. macedonica*.
macedonica, Nym. Syll. 60 = *S. macedonica*.
magnifica, Nym. Consp. 347 (= *Knautia magnifica*).—Macedon.
mollis, Nym. Syll. 60 = *S. arvensis*.
montana, Roem. & Schult. Syst. iii. 57 = *S. montana*.
mutabilis, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814) = *S. integrifolia*.
nympharum, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. ciliata*.
ovatifolia, Roem. & Schult. Syst. iii. 56 = *S. sylvatica*.
pannonica, Nym. Syll. Suppl. 14 = *S. sylvatica*.

TRICHERA:—

- puberula*, Nym. Syll. Suppl. 14 = *Scabiosa sylvatica*.
pubescens, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814);
 Roem. & Schult. Syst. iii. 57 = *S. arvensis*.
Salcedi, Roem. & Schult. Syst. iii. 55 = *S. Salcedi*.
subcanescens, Nym. Consp. 347 = *S. sylvatica*.
subscaposa, Nym. Syll. 60 = *S. collina*.
sylvatica, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814);
 Roem. & Schult. Syst. iii. 55 = *S. sylvatica*.
Timeroyi, Nym. Syll. 60 = *S. arvensis*.
transsilvanica, Schur, ex Nym. Consp. 347 = *S. sylvatica*.
trivialis, Nym. l. c. = *S. arvensis*.
Urvillei, Nym. Syll. 60 = *S. integrifolia*.
virgata, Nym. Consp. 347 = *S. arvensis*.
Willichii, Schult. Mant. iii. 29 = *S. plumosa*.

TRICHEROSTIGMA, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 7 (1862), sphalm. = TRICHOSTERIGMA, Klotzsch = *Euphorbia*, Linn.

TRICHILIA, P. Br. Hist. Jamaica. 278 (1756).

- MELIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 337.
ACRILIA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 129 (1859).
BARBILUS, P. Br. Hist. Jamaica. 216 (1756).
ELCAJA, Forsk. Fl. Aegypti. Arab. 127 (1775).
GENIOSTEPHANUS, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312.
HALESIA, Loeffl. It. Hisp. 188 (1758).
HEYNICHIA, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1844), adn., 8.
MAFUREIRA, Bertol. Misc. Bot. ix. 5. t. 2 (1851).
MOSCHOXYLUM, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 238.
ODONTANDRA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. p. xli. 511 (1819).
ODONTOSIPHON, M. Roem. Syn. Hesper. 85, 106 (1846).
PHOLACILIA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 129 (1859).
PORTESIA, Cav. Diss. vii. 369. tt. 215, 216 (1789).
ROCHETIA, Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa, 344 (1846).
TORPESIA, M. Roem. Syn. Hesper. 86, 116 (1846).
acuminata, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 704.—N. Granat.
affinis, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 78 = *T. Catigua*.
albicans, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 218.—Bras.
alliacea, Forst. f. Prod. 33 = *Dysoxylum Forsteri*.
alternans, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 700.—Bras.
amplifolia, C. DC. l. c. 694.—Peruv.
appendiculata, C. DC. l. c. 696.—N. Granat.
arborescens, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 252 = *Dysoxylum arborescens*.
asterotricha, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1883) 383.—Afr. trop.
Aubletii, Steud. Nom. ed. II. ii. 700 = *Guarea trichilioides*.
barraensis, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 222 = *fluminensis*?
bijuga, Labill. Sert. Austro-Caled. 54. t. 54 (= *Hartigsea Billardieri*).—N. Caled.
Blancheti, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 217.—Bras.
brachystachya, Klotzsch, ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 650.—Guian.; Venezuela.
canjerana, Vell. Fl. Flum. 176; iv. t. 102.—Bras.
capensis, Pers. Syn. i. 468 = *Ekebergia capensis*.
capitata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 120.—Afr. trop.
Casaretti, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 217.—Bras.
cathartica, Mart. Reise Bras. i. 546.—Bras.
Catigna, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 689, sphalm. = seq.
Catigua, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 77.—Bras.
caucana, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 669.—N. Granat.
cauliflora, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 318 = *Dysoxylum spectabile*.
Cipo, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 214.—Guian.; Bras.
Claussenii, C. DC. l. c. 207.—Bras.
corcovadensis, C. DC. l. c. 215.—Bras.
coriacea, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 1265 = *Walsura Piscidia*.
cuneata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 642.—Guatemala.
cuspidata, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 222.—Bras.

TRICHILIA:—

- discolor*, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 236, 277.—Bras.
Distini, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 698.—Jamaic.
diversifolia, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 237, 278 = *simplicifolia*.
Dregeana, Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 246 = *Dregei*.
Dregei, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 227, nomen.—Afr. austr.
echinocarpa, Walp. Ann. ii. 227.—Guian.
Eckebergia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 227 = *Eckebergia Meyerii*.
elegans, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 79. t. 98.—Bras.
emarginata, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 212.—Bras.
emetica, Vahl, Symb. Bot. i. 31.—Afr. trop.; Arab.
euneura, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 673.—Guian.
excelsa, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 368.—Bras.
excelsa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 252 = *Dysoxylum excelsum*.
flava, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 203. t. 59.—Bras.
flaviflora, C. DC. l. c. 216.—Bras.
fluminensis, M. Roem. Syn. Hesper. 112.—Bras.
fuscescens, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 641.—Guian.
Gardneri, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 221.—Bras.
Gaudichaudii, C. DC. l. c. 209.—Bras.
glabra, Linn. Syst. ed. X. 1020.—Am. trop.
glabra, Macfad. Fl. Jamaica. i. 172 (al. ordinis).—Jamaic.
glabra, Vell. Fl. Flum. 175; iv. t. 101 = *fluminensis*.
glandulosa, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 10 = *Synonym glandulosum*.
Glaziovii, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 205. t. 60. f. 1.—Bras.
Goudotiana, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xv. (1872) 366.—N. Granat.
grandiflora, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 335.—Afr. trop.
Guara, Linn. Sp. Pl. ed. II. 551 = *Guarea trichilioides*.
guayaquilensis, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 682.—Ecuador.
guianensis, Klotzsch, ex C. DC. l. c. 657.—Guian.
Halesia, Loeffl. ex A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 236 = *trifolia*.
havannensis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 20 = *glabra*.
heterophylla, Willd. Sp. Pl. ii. 554.—Madag.
Heudelotii, Planch. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 334.—Afr. trop.
hexandra, Blume, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 29 = *Chisocheton patens*.
Hieronymi, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 77.—Reg. Argent.
hirsuta, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 221. t. 63.—Bras.
hirta, Linn. Syst. ed. X. 1020.—Jamaic.
humilis, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 4 = *Munronia javanica*.
inermis, Spreng. Neue Entdeck. i. 285.—Bras.
insignis, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 206. t. 61. f. 1.—Bras.
jamaicensis, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 678.—Jamaic.
japurensis, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 214.—Bras.
Karstenii, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 704.—N. Granat.
Karwinskyana, C. DC. l. c. 663.—Mexic.
lagoënsis, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 207.—Bras.
lanceolata, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 698.—Peruv.
lepidota, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 54.—Bras.
longissima, Wall. Cat. n. 8069 = *Chisocheton paniculatus*.
macrocarpa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 252 = *Dysoxylum macrocarpum*.
macrophylla, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 369.—Bras.
Martiana, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 205.—Bras.
mauritanica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 589.—Ins. Maurit.
maynasiana, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 700.—Peruv.

TRICHILIA:—

- membranacea*, Macfad. Fl. Jamaica. i. 171 = *moschata*.
micrantha, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 369.—Bras.
microphylla, Walp. Ann. iv. 389 = *macrophylla*.
microphyllina, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 216.—Bras.
microstachya, C. DC. l. c. 212.—Bras.
minor, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 301. t. 33 = *glabra*.
mollis, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 202.—Bras.
mollissima, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 252 = *Dysoxylum mollissimum*.
monophylla, A. Rich. Ess. Fl. N. Zél. 306 = *Pittosporum tenuifolium*.
montana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 226.—N. Granat.
Moritzii, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 707.—Venezuela.
moschata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 67.—Jamaic.
multiflora, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. ii. 23.—Bras.
natalensis, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 23.—Afr. austr.
neriosa, Vahl, Symb. Bot. i. 31 = *Sandoricum indicum*.
oblonga, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 218.—Bras.
octandra, Soland. ex M. Roem. Syn. Hesper. 101 = *Synonym glandulosum*.
odorata, Andr. Bot. Rep. t. 637.—Ins. S. Vincent.
Oerstediana, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 677.—Nicaragua.
oligantha, C. DC. l. c. 693.—Mexic.
oxyphylla, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 204.—Bras.
pallens, C. DC. l. c. 218.—Bras.
pallida, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 67.—Ins. S. Doming.
paraënsis, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 213.—Bras.
parviflora, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 679.—N. Granat.
pentandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 355.—Malaya.
peruviana, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 654.—Peruv.; Chili.
Pleæana, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 215.—Bras.
Poeppigii, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 685.—Bras.
polyantha, Poepp. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xv. (1872) 371 = *Guarea Poeppigii*.
potioricensis, Spreng. Syst. iii. 68.—Porto Rico.
Prieureana, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 276.—Afr. trop.
procera, Forsyth, ex DC. Prod. i. 626 = *Carapa procera*.
propinqua, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 693 = *Nicaragua*.
Pseudostipularis, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 215.—Bras.
pteleaeifolia, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 80. t. 99.—Bras.
pubescens, Klotzsch, ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 650 = *brachystachya*.
pubescens, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 108 = *Guarea pubescens*.
Purdiei, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 697.—N. Granat.
quadrifuga, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 215.—Porto Rico.
quinquejuga, Vell. Fl. Flum. 176; iv. t. 103.—Bras.
quinquevalvis, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 191.—N. Caled.
quinquevalvis, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caled. 227 = *Dysoxylum Lessertianum*.
repanda, Vell. Fl. Flum. 176; iv. t. 104 = *Casaretti*.
retusa, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 334.—Afr. trop.
Richardiana, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 78.—Bras.
Riedelii, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 202 = *echinocarpa*?
rimosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 297 = *Heynea trijuga*.
riparia, Mart. ex C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 213.—Bras.
roraimana, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 670.—Guian.
rubescens, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 336.—Afr. trop.
rubra, C. DC. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 203.—Bras.
rufinervis, Blume, Bijdr. 164.—Java.
Rueppelliana, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 278 = *Ekebergia Ruppelliana*.
Ruiziana, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 702.—Peruv.

TRICHILIA:—

- scandens*, Lunan, *Hort. Jamaic.* ii. 319, 320.—Jamaic.
Schiedeana, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 664.—Mexic.
schinoides, Klotzsch, in *Linnaea*, xiv. (1840) 300.—Bras.
Schomburgkii, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 695.—Guian.
sebastianopolitana, C. DC. in Mart. *Fl. Bras.* xi. i. 216.—Bras.
Selloi, C. DC. l. c. 219.—Bras.
septentrionalis, C. DC. l. c. 220.—Bras.
silvatica, C. DC. l. c. 212.—Bras.
similis, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 252 = *Dysoxylon simile*.
simplicifolia, Spreng. *Syst.* iii. 69.—Ins. Martinic.
singularis, C. DC. in Mart. *Fl. Bras.* xi. i. 217.—Bras.
Sloanei, Macfad. *Fl. Jamaic.* i. 168 = *terminalis*.
spectabilis, Forst. f. *Prod.* 33 = *Dysoxylon spectabile*.
spinosa, Willd. *Sp. Pl.* ii. 554 = *Atalantia monophylla*.
spondiodes, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 20; *Select. Am.* 128.—Ind. occ.
strigulosa, Welw. ex C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 658.—Afr. trop.
subalata, C. DC. in Mart. *Fl. Bras.* xi. i. 213.—Bras.
subsessilifolia, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 685.—Guian.
surinamensis, C. DC. l. c. 679.—Guian.
terminalis, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 20; *Select. Am.* 130.—Jamaic.
tetrapetala, C. DC. in Mart. *Fl. Bras.* xi. i. 211.—Bras.
tocacheana, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 701.—Peruv.
tomentosa, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 215.—Peruv.
trachyantha, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 697.—Cuba.
trifolia, Linn. *Syst. ed. X.* 1020.—Venezuela.
trifoliata, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 551 = *præc.*
trifoliata, Wall. *Cat. n.* 8093 = *Walsura piscidia*.
trijuga, Vell. *Fl. Flum.* 176; iv. t. 105 = *cathartica*.
trinitensis, A. Juss. in *Mém. Mus. Par.* xix. (1830) 279.—Ind. occ.
tripetala, Blanco, *Fl. Filip. ed. I.* 354 (al. *ordinis*).—Ins. Philipp.
tuberculata, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 711.—Panama.
Tweediana, C. DC. in Mart. *Fl. Bras.* xi. i. 213.—Bras.
velutina, C. DC. l. c. 208.—Bras.
venosa, Spreng. *Syst.* iii. 68 = *Sandoricum indicum*.
verrucosa, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 695.—N. Granat.
villosa, Wall. *Cat. n.* 1264 = *Walsura villosa*.
volubilis, Blanco, *Fl. Filip. ed. II.* 249 = *Aglaiandra grandis*.
Warmingii, C. DC. in Mart. *Fl. Bras.* xi. i. 220.—Bras.
Wawrana, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 666.—Mexic.
Weddellii, C. DC. in Mart. *Fl. Bras.* xi. i. 201.—Bras.
Welwitschii, C. DC. in DC. *Monog. Phan.* i. 659.—Afr. trop.

TRICHINIUM, R. Br. *Prod.* 414 (1810). *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 33.

- ARTHROTRICHUM*, F. Muell. in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* vii. (1863) 500.
GOMOTRICHE, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) ii. 37.
HEMISTEIRUS, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 434.
aeroides, F. Muell. *Fragm.* iii. 123.—Austral.
alopecuroideum, Lindl. *Bot. Reg.* (1839) t. 28 = *exaltatum*.
alopecuroideum, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 13.—Austral.
angustifolium, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 293 = *macrocephalum*.
arthrolasium, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 239.—Austral.
astrolasium, F. Muell. ex Benth. l. c. 222.—Austral.
atriplicifolium, A. Cunn. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 286 = *obovatum*.

VOL. II.

TRICHINIUM:—

- auriculæfolium*, A. Cunn. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 287.—Austral.
axillare, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 232.—Austral.
Beckerianum, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 436.—Austral.
brachyanthum, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 239.—Austral.
brachytrichum, F. Muell. *Fragm.* iii. 161 = *helipetroides*.
caespitosum, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 240.—Austral.
calostachyum, F. Muell. ex Benth. l. c. 236.—Austral.
candicans, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 629 = *alopecuroideum*.
carneum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 291 = *Stirlingii*.
carnosum, Moq. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 190 = *Chenolea carnosus*.
Chrysurus, Meissn. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 307 = *Sericocoma Chrysurus*.
conicum, Lindl. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 363 = *alopecuroideum*.
conicum, Spreng. *Syst.* i. 816 = *Ptilotus conicus*.
corymbosum, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 444.—Austral.
corymbosum, Spreng. *Syst.* i. 816 = *Ptilotus corymbosus*.
Cunninghamii, Benth. *Fl. Austral.* v. 238.—Austral.
declinatum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 293.—Austral.
densum, A. Cunn. ex Moq. l. c. 289 = *nobile*.
dissitiflorum, F. Muell. *Fragm.* iv. 89.—Austral.
distans, R. Br. *Prod.* 415.—Austral.
divaricatum, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 445.—Austral.
Drummondii, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 292.—Austral.
eriocephalum, Moq. l. c. 293 = *declinatum*.
erubescens, Moq. l. c.—Austral.
esquamatum, Benth. *Fl. Austral.* v. 229.—Austral.
exaltatum, Benth. l. c. 227.—Austral.
floribundum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 283 = *sericostachyum*.
Fraseri, A. Cunn. ex Moq. l. c. 295.—Austral.
fusiforme, R. Br. *Prod.* 415.—Austral.
fusiforme, Lindl. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 383 = *macrocephalum*.
fusiforme, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 626 = *Drummondii*.
Gaudichaudii, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 700 = *corymbosum*.
giganteum, A. Cunn. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 296 = *alopecuroideum*.
gnaphalodes, A. Cunn. ex Moq. l. c. 285 = *incanum*.
gomprenoides, Moq. l. c. 287.—Austral.
gracile, R. Br. *Prod.* 415.—Austral.
helichrysoides, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 241.—Austral.
helipetroides, F. Muell. *Fragm.* iii. 122.—Austral.
holosericeum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 287.—Austral.
Hoodii, F. Muell. *Fragm.* viii. 232 = *Ptilotus Hoodii*.
humile, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 628 = *Ptilotus humilis*.
incanum, R. Br. *Prod.* 415.—Austral.
incanum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 285 = *obovatum*.
lanatum, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 123 = *obovatum*.
latifolium, E. Mey. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 328 = *Cyathula cylindrica*.
laxum, Benth. *Fl. Austral.* v. 232.—Austral.
Leucocoma, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 292.—Austral.
linifolium, A. Cunn. ex Moq. l. c. = *erubescens*.
macrocephalum, R. Br. *Prod.* 415.—Austral.
macrocephalum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 290 = *exaltatum*.
macrocephalum, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 627 = *Manglesii*.
Manglesii, Lindl. *Bot. Reg.* (1839) sub t. 28.—Austral.
mucronatum, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 628 = *spathulatum*.
nanum, F. Muell. *Fragm.* iii. 161 = *Ptilotus humilis*.
nitidum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 289 = *Ptilotus humilis*.
nobile, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 22.—Austral.
obovatum, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 445.—Austral.

TRICHINIUM:—

- pachcephalum*, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 294 = *macrocephalum*.
pallidum, Moq. l. c. 295 = *alopecuroideum*.
parviflorum, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 13.—Austral.
parvifolium, F. Muell. *Rep. Babb. Exp.* 19.—Austral.
polystachyum, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 445.—Austral.
Preissii, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 629 = *alopecuroideum*.
pulchellum, A. Cunn. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 290 = *semilanatum*.
pyramidatum, Moq. l. c. 288.—Austral.
remotiflorum, Hook. *l. c.* Pl. t. 596 = *Sericocoma remotiflora*.
Roei, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 240.—Austral.
roseum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 284.—Austral.
rotundifolium, F. Muell. *Fragm.* iii. 122.—Austral.
semilanatum, Lindl. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 45.—Austral.
sericostachyum, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 627.—Austral.
sessilifolium, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 13 = *obovatum*.
setigerum, A. Cunn. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 290 = *semilanatum*.
spathulatum, R. Br. *Prod.* 415.—Austral.
spectabile, Field. & Gardn. *Sert. Pl.* t. 53 = *Manglesii*.
Stirlingii, Lindl. *Bot. Reg.* (1839) sub t. 28.—Austral.
striatum, Moq. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 233.—Austral.
subfuscum, Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 332 = *Pupalia subfusca*.
variable, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 436 = *obovatum*.
villosum, Nees, in Lehm. *Pl. Preiss.* i. 628.—Austral.
virgatum, A. Cunn. ex Moq. in DC. *Prod.* xiii. ii. 286 = *parviflorum*.
Zeyheri, Moq. l. c. 296.—Afr. anstr.

TRICHLIS, Hall. *Hort. Gotting.* 26 (1743) = *Poly-carpon*, Loeff. (Caryoph.).

TRICHLORA, Baker, in Hook. *l. c.* Pl. t. 1237 (1877). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 805.
peruviana, Baker, l. c.—Peruv.

TRICHLORIS, Fourn. ex Benth. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 102. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1166.
fasciculata, Fourn. ex Benth. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 102.—Mexic.
pluriflora, Fourn. ex Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 560.—Mexic.

TRICHOA, Pers. *Syn.* ii. 634 (1807) = *Abuta*, Aubl. (Menisp.).
concolor, Endl. ex Walp. *Rep.* i. 95 = *A. concolor*.
conferta, DC. *Prod.* i. 103 = *A. spicata*.
conferta, Pers. *Syn.* ii. 634.—N. Granat.
guyanensis, Klotzsch, ex Eichl. in Mart. *Fl. Bras.* xiii. i. 181 = *A. guianensis*.
racemosa, Pers. *Syn.* ii. 634 = *A. racemosa*.
spicata, Pers. l. c. = *A. spicata*.

TRICHOBALLIA, Presl, *Symb. Bot.* i. 9 (1830) = *Tetraria*, Beauv. (Cyperac.).
dactyloides, Presl, l. c., in obs.—Afr. austr.
involuta, Presl, l. c. = *Lepidosperma involutatum*.
thermalis, Presl, l. c.—Afr. austr.

TRICHOBASIS, Turcz. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* x. (1852) 336. *MYRTACEAE*.
aurea, Turcz. l. c. 337.—Austral.

TRICHOCALYX, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 87. *ACANTHACEAE*.
obovatus, Balf. f. l. c. 88.—Ins. Socotra.
orbiculatus, Balf. f. l. c.—Ins. Socotra.

TRICHOCALYX, Schau. *Myrt. Xeroc.* 86, in adnot. (1840) = *Calythrix*, Labill. (Myrtac.).

TRICHOCARPUS, Neck. *Elem.* ii. 70 (1790) = *Prunus*, Tourn. (Rosac.).

TRICHOCARPUS, Schreb. Gen. 366 (1789) = *Sloanea*, Linn. (Tiliac.).
guianensis, Rausch. Nom. ed. III. 158 = *S. guianensis*.
laurifolia, Willd. Sp. Pl. ii. 1224 = *S. laurifolia*.

TRICHOCARYA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 357 (1855).
ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 607.
ANGELESIA, Korth, in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 384.
DIEMENIA, Korth, l. c. 388 (1855).
racemosa, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 358.—Sumatra.
splendens, Miq. l. c.—Sumatra.

TRICHOCAULON, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 164. *ASCLEPIADEAE*.
flavum, N. E. Br. l. c. 165.—Afr. austr.
piliferum, N. E. Br. l. c. 164.—Afr. austr.

TRICHOCENTRUM, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 11. t. 115 (1838). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 559.
albo-coccineum, Linden, in Belg. Hort. xv. (1865) 103.—Bras.
albo-purpureum, Reichb. f. ex Rodrig. Orch. Nov. ii. 238.—Bras.
amazonicum, Rodrig. l. c. i. 140.—Bras.
atropurpureum, Linden & Reichb. f. in Gard. Chron. (1866) 219.—Bras.
caloceras, Endres & Reichb. f. l. c. (1871) 1257.—Costa Rica.
candidum, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 9.—Guatemala.
capistratum, Linden & Reichb. f. in Gard. Chron. (1871) 1257.—Costa Rica.
Comucopiae, Linden & Reichb. f. l. c. (1866) 266.—Am. trop.
funale, Lindl. Bot. Reg. (1837), sub t. 1951 = *Dendrophylax funalis*.
fusum, Lindl. l. c. t. 1951.—Mexic.
Hoegei, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) II. 717.—Mexic.
ionophthalmum, Reichb. f. l. c. (1876) II. 100.—Bras.
iridifolium, Lodd. ex Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 94 (al. gen.).—Guian.
maculatum, Lindl. Orchid. Linden. 24.—Bras.
orthoplectron, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) I. 562.—Am. centr. ?
Pfavi, Reichb. f. l. c. (1881) II. 70.—Am. centr.
Pineli, Lindl. l. c. (1854) 772.—Bras.
Plectrophora, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 544 (Compertitiae sp.).—Guian.
Porphyrio, Reichb. f. in Illustr. Hort. xxxi. (1884) 9. t. 508.—Am. centr. ?
pulchrum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 11. t. 115.—Peruv.
purpureum, Lindl. in Gard. Chron. (1854) 772.—Guian. ?
recurvum, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 9.—Guian.
tenuiflorum, Lindl. in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 12.—Bras.
tigrinum, Linden & Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 892.—Am. centr.

TRICHOCEPHALUM, Schur, Enum. Pl. Transs. 293 (1866) = *Dipsacus*, Linn.
pilosum, Schur, l. c. = *D. pilosus*.

TRICHOCEPHALUS, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 374. t. 17. f. i. = *Phyllica*, Linn. (Rhamn.).
atratus, Eckl. & Zeyh. Enum. 131 = *P. atrata*.
callosus, Eckl. & Zeyh. l. c. 130 = *P. callosa*.
comosus, Eckl. & Zeyh. l. c. 132 = *P. comosa*.
ellipticus, G. Don, Gen. Syst. ii. 40 = *Nesiota elliptica*.
elongatus, Eckl. & Zeyh. Enum. 130 = *Staavia ciliata*.
gracilis, Eckl. & Zeyh. l. c. 131 = *P. gracilis*.
imberbis, Eckl. & Zeyh. l. c. 132 = *P. cuspidata*.
laevis, Eckl. & Zeyh. l. c. 130 = *P. atrata*.
littoralis, Eckl. & Zeyh. l. c. 131 = *P. atrata*.
ramosissimus, G. Don, Gen. Syst. ii. 40 = *P. ramosissima*.
rhizophorus, Eckl. & Zeyh. Enum. 131 = *P. stipularis*.
ruber, Eckl. & Zeyh. l. c. 131 = *P. rubra*.
spicatus, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 375 = *P. spicata*.
stipularis, Brongn. l. c. = *P. stipularis*.
trachyphyllus, Eckl. & Zeyh. Enum. 131 = *P. trachyphylla*.
verticillatus, Eckl. & Zeyh. l. c. 131 = *P. verticillata*.
virgata, Eckl. & Zeyh. l. c. 132 = *P. virgata*.

TRICHOCERAS, Spreng. Anleit. ii. 1. 291 (1817) = seq.

TRICHOCEROS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 337. t. 76 (1815). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 587.
ASTROGLOSSUS, Reichb. f. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 588 (1883).
antennifer, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 338.—Ecuador.
armillatus, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 212.—Peruv.
astroglossus, Lindl. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 588.—Peruv.
muralis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 174.—Peruv.
parviflorus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 337. t. 76.—N. Granat.
platyceros, Reichb. f. Xenia Orch. i. 22. t. 9. f. 3.—Peruv.
Tupaipi, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 33.—Peruv.

TRICHOCHAETA, Steud. Syn. Pl. Cyp. 155 (1855) = *Rynchospora*, Vahl (Cyperac.).
tenuis, Steud. l. c. 156.—Bras.

TRICHOCHLOA, Beauv. Agrost. 29. t. 8. f. 2 (1812) = *Muehlenbergia*, Schreb. (Gramin.).
alpestris, Roem. & Schult. Syst. ii. 388 = *M. alpestris*.
Berteroniana, Schult. Mant. ii. 209 = *M. Berteroniana*.
calycina, Trin. Gram. Unif. 193 = *M. debilis*.
capillaris, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 152; Roem. & Schult. Syst. ii. 384 = *M. capillaris*.
ciliata, Roem. & Schult. l. c. 386 = *M. ciliata*.
debilis, Roem. & Schult. l. c. 385 = *M. debilis*.
elegans, Roem. & Schult. l. c. 387 = *M. elegans*.
expansa, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 151 = *Cinna arundinacea*.
foliosa, Trin. Fund. Agrost. 117 = *M. mexicana*.
glabrata, Roem. & Schult. Syst. ii. 387 = *M. glabrata*.
glomerata, Trin. Fund. Agrost. 117 = *M. glomerata*.
gracilis, Roem. & Schult. Syst. ii. 389 = *M. gracilis*.
implicata, Roem. & Schult. l. c. 385 = *M. implicata*.
longiflora, Kunth, Enum. Pl. i. 601 (Index) = seq. ?
longiseta, Trin. Fund. Agrost. 117 = *M. Willdenowii*.
mexicana, Trin. l. c. = *M. mexicana*.
microsperma, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 151 = *M. debilis*.
mucronata, Roem. & Schult. Syst. ii. 387 = *M. mucronata*.
Polypogon, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 152 = *M. capillaris*.
quadridentata, Roem. & Schult. Syst. ii. 388 = *M. quadridentata*.
rigida, Roem. & Schult. l. c. 386 = *M. rigida*.
setosa, Roem. & Schult. l. c. = *M. debilis*.
simplex, Schult. Mant. ii. 577 = *Polypogon maritimus* ?
sobolifera, Trin. Fund. Agrost. 117 = *M. sobolifera*.
spicata, Schult. Mant. ii. 577 = *M. spicata*.
stipoides, Roem. & Schult. Syst. ii. 388 = *M. stipoides*.
tenella, Roem. & Schult. l. c. 385 = *M. tenella*.
tenuiflora, Sweet, Hort. Brit. ed. 1. 443 = *M. Willdenowii*.
virescens, Roem. & Schult. Syst. ii. 389 = *M. virescens*.

TRICHOCLADUS, Pers. Syn. ii. 597 (1807).
HAMAMELIDEAE, Benth. & Hook. f. i. 667.
DAHLIA, Thunb. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kiøbenh. ii. (1792) 133. t. 4.
crinitus, Pers. Syn. ii. 597.—Afr. austr.
Ecklonianus, Presl, Bot. Bemerk. 75 = *crinitus*.
ellipticus, Eckl. & Zeyh. Enum. 356.—Afr. austr.
grandiflorus, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1480.—Afr. austr.
peltatus, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 537.—Afr. austr.
verticillatus, Eckl. & Zeyh. Enum. 356.—Afr. austr.

TRICHOCLINE, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 13. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 496.
AMBLYSPERMA, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 67 (1837).
BICHENIA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 236.
ERIOPUS, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 376 (1884).
INGENHUSIA, Vell. Fl. Flum. 351 (1825).
angustifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 373.—Bras.

TRICHOCLINE:—

araneosa, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 374.—Bras.
arenaria, Baker, l. c.—Bras.
argentea, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 214.—Reg. Argent.
Cineraria, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 103.—Bras.
collina, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 373.—Paraguay.
dealbata, Benth. & Hook. f. ex Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 359.—Chili.
denticulata, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 375.—Bras.
Eriopus, Baker, l. c. 376.—Bras.
exscapa, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 197.—Reg. Argent.
foliosa, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 43.—Bras.
heterophylla, Less. in Linnaea, v. (1830) 289.—Bras.
hieracioides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 374.—Bras.
humilis, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 103 = *Tweedii*.
humilis, Less. in Linnaea, v. (1830) 288 = *heterophylla*.
incana, Cass. in Dict. Sc. Nat. iv. 216.—Bras.
macrocephala, Less. in Linnaea, v. (1830) 288.—Bras.
Martii, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 375.—Bras.
maxima, Less. in Linnaea, v. (1830) 290.—Bras.
nervosa, Less. Syn. Comp. 118.—Bras.
nummularia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 375.—Bras.
pedicularifolia, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 310.—Chili.
plicata, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 103.—Chili.
polymorpha, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 373.—Bras.
scapigera, F. Muell. Census, 85.—Austral.
speciosa, Less. Syn. Comp. 117.—Bras.
tontalensis, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 49.—Reg. Argent.
Tweedii, DC. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 701 (*Tweedii*).—Reg. Argent.

TRICHOCORONIS, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) (Pl. Fendl.) 65. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 240.
MARGACOLA, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 457.
Greggii, A. Gray, Pl. Wright. i. 89.—Mexic.
rivularis, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 66.—N. Mexic.
Wrightii, A. Gray, l. c. 65.—N. Mexic.

TRICHOCREPIS, Vis. Stirp. Dalm. Rar. 18. t. 7 (1826) = *Pterotheca*, Cass. (Compos.).
bifida, Vis. l. c. 19 = *P. bifida*.

TRICHODESMA, R. Br. Prod. 496 (1810). *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 845.
BORRAGINOIDES, Moench, Meth. 515 (1794).
FRIEDRICHSTHALIA, Fenzl, in Endl. Nov. Stirp. Dec. 53 (1839).
LEIOCARYA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 30.
POLLICHA, Medic. Bot. Beobacht. (1783) 247.
SPIROCONUS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1851) I. 576.
STREBLANTHERA, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 29.
africanum, R. Br. Prod. 496.—Afr. trop.; Persia; Ind. bor. occ.
ambacensis, Welw. Apont. 589.—Afr. trop.
amplexicaule, Roth, Nov. Sp. Pl. 104.—Ind. or.
angustifolium, Haro. Thes. Cap. i. 26.—Afr. austr.
Aucher, DC. Prod. x. 174.—Persia.
calathiforme, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 29.—Abyss.
calcaratum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 64, nomen.—Afr. bor.
Ehrenbergii, Schweinf. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 281.—Egypt.; Arab.
hirsutum, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 175 = *indicum*.
inaequale, Edgew. l. c. = *amplexicaule*.

TRICHODESMA:—

- incanum, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 417.—Persia.
 indicum, *R. Br. Prod.* 496.—Ind. or.; Afghan; Persia.
indicum, DC. *Prod.* x. 172=amplexicaule.
 khasianum, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 154.—Reg. Himal.
Kotschyianum, Fenzl, ex A. DC. in DC. *Prod.* x. 172=zeylanicum.
 latispaleum, F. Muell. *Fragm.* x. 102.—Austral.
 laxiflorum, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 81.—Ins. Socotra.
 lithospermoides, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 69.—Ind. or.
 microcalyx, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 81.—Ins. Socotra.
 molle, A. DC. in DC. *Prod.* x. 174.—Persia.
perfoliatum, Wall. *Cat.* n. 934=indicum.
 physaloides, A. DC. in DC. *Prod.* x. 173.—Afr. austr.
 Scotti, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 81.—Ins. Socotra.
sericeum, Lindl. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 258=zeylanicum.
spinulosum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 444=indicum.
 Stocksii, Boiss. *Diagn. Ser.* II. iii. 140.—Persia; Beluchist.
 strictum, Aitch. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 178.—Afghan.
 subsessile, Wall. *Cat.* n. 933=indicum.
 zeylanicum, *R. Br. Prod.* 496.—As. et Austral. trop.

TRICHODIA, Griff. *Notul.* iv. 570 (1854)=*Paropsia*, Noronha (Passifl.).
vareciformis, Griff. l. c. 571=P. vareciformis.

TRICHODICLIDA, Cerv. in *La Naturaleza* (1870), 346. GRAMINEAE.
 linearis, Cerv. l. c. 347.—Mexic.
 prolifera, Cerv. l. c. 346.—Mexic.

- TRICHODIUM, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 41. t. 8 (1803)=*Agrostis*, Linn. (Gramin.).
 affine, Willd. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 701=A. Humboldtiana.
 album, Presl, *Rel. Haenk.* i. 244=A. clavata.
 algidum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 283=Phippsia algida.
 alpestre, Hoppe, *Anl. Graes.* n. 4; ex Schult. *Mant.* ii. 156=A. rupestris.
 alpinum, Schrad. *Fl. Germ.* i. 200. t. 3. f. 4=A. rupestris.
 arenarium, Schur, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* ix. (1859) 51=A. canina.
 arenosum, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 736=A. canina.
 auratum, Sieber, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 701=A. alpina.
 caninum, Schrad. *Fl. Germ.* i. 198=A. canina.
 clavatum, Schult. *Mant.* ii. 556=A. clavata.
 coeruleus, Link, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 701=A. canina.
 decumbens, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 42=A. decumbens.
 diffusum, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 69=A. canina, rupestris.
 effusum, Link, ex Schult. *Mant.* iii. 554=A. effusa.
 elatum, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 61=A. elata.
 elegans, Thore, *Promen. Gascogne*, 92=A. elegans.
 filiforme, Spreng. *Pugill.* i. 6=A. rupestris.
 flavescens, Schult. *Oestr. Fl. ed.* II. i. 165=A. alpina.
 glabrum, Presl, *Rel. Haenk.* i. 244=A. glabra.
 glaucinum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 281=A. vulgaris.
 hybridum, Roem. & Schult. l. c. 282=A. canina.
 inconspicuum, Kunze, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 701=A. rupestris.
 intermedium, Hoppe, ex Schult. *Mant.* ii. 520=A. alpina.
 Kitaibelii, Schult. *Oestr. Fl. ed.* II. i. 165=A. canina.
 laxiflorum, Bigel, ex Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 42. t. 8=A. scabra.
 laxum, Schult. *Mant.* ii. 157=A. laxiflora.
 montanum, Torr. *Fl. U. St.* 84=A. scabra.
 montanum, Willd. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 701=A. canina.
 Muehlenbergiana, Schult. *Mant.* ii. 159=A. laxiflora.
 nanum, Presl, *Rel. Haenk.* i. 243=A. nana.
 neglectum, Schult. *Oestr. Fl. ed.* II. i. 166=A. Schultesii.

TRICHODIUM:—

- noveboracense, Schult. *Mant.* ii. 555=Epicampes lanata.
 paradisiaca, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 163=Agrostis chilensis.
 perennans, Ell. *Sketch.* i. 99=A. perennans.
 pusillum, Nees & Meyen, in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. vi. Sc. Nat. II. (1845) 312=A. Meyeni.
 pusillum, Van Hall, *Fl. Belg.* i. 56=A. canina.
 rubrum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 281=A. vulgaris.
 rubrum, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 735=A. canina.
 rupestre, Schrad. *Fl. Germ.* i. 279=A. alpina.
 rupestre, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 735=A. rupestris.
 salmanticum, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 3=A. salmantica.
 scabrum, Darl. *Fl. Cestr. ed.* I. i. 54=A. perennans.
 scabrum, Muhl. *Desc. Gram.* 61=A. laxiflora.
 Schleicheri, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 181=A. alpina.
 setaceum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 280=A. setacea.
 setifolium, Willd. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 701=A. setacea.
 strictum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 281=A. stricta.
 subalpinum, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 735=A. canina.
 tenerinum, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 83=A. canina.
 transsilvanicum, Schur, l. c.=A. canina.
 trichanthum, Schult. *Mant.* ii. 157=A. trichantha.
 turfosum, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 737=A. canina.

TRICHODON, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 112, sphalm.=TRICHOON, Roth=Phragmites, Trin. (1820) (Gramin.).

TRICHODRYMONIA, Oerst. in *Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 112 (Gesn. *Centr. Am.* 38)=Episcia, Mart. (Gesner).
 congesta, Oerst. l. c.=E. congesta.

TRICHOGALIMUM, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvi. (1868) 396=Galium, Linn. (Rubiaceae).
 boreale, Fourr. l. c.=G. boreale.
 rotundifolium, Fourr. l. c.=G. rotundifolium.

TRICHOGAMILA, P. Br. *Hist. Jamaic.* 218 (1756)=Styrax, Linn.

- TRICHOGLOTTIS, Blume, *Bijdr.* 359 (1825), pro parte. ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 576.
 atropurpurea, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 30.—Ins. Philipp.
 Bimae, Reichb. f. in *Bonplandia*, v. (1857) 39.—Ins. Bima.
 cirrhifera, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1853) 493.—Java.
 cochlearis, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1883) i. 142.—Sumatra.
 Dawsoniana, Reichb. f. l. c. (1872) 699, in obs.—Burma.
 fasciata, Reichb. f. in *Flora*, lv. (1872) 137=Stauroopsis fasciata.
 Guiberti, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1872) 699, in obs.=Cleisostoma Guiberti.
 lanceolaria, Blume, *Bijdr.* 360.—Java.
 pallens, Lindl. in *Journ. Hort. Soc.* v. (1850) 34=Phalaenopsis pallens.
 philippinensis, Lindl. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser.* I. xv. (1845) 386=Stauroopsis philippinensis.
 pusilla, Reichb. f. in *Bonplandia*, iv. (1856) 325; vi. (1857) 39 (sp. dub.).—Java.
 quadricornuta, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) ii. 156 (Cleisostomatis sp.).—Ins. Nicobar.
 retusa, Blume, *Bijdr.* 360.—Java.
 rigida, Blume, l. c. 361.—Java.
 tenera, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1872) 699, in obs. (Cleisostomatis sp.).—Ind. or.

TRICHOGONIA, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 459. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 243.
 campestris, Gardn. l. c.—Bras.
 Gardneri, A. Gray, in *Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 224.—Bras.
 hirtiflora, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 214.—Bras.
 laxa, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 435.—Bras.
 leiantha, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 215=Gardneri.

TRICHOGONIA:—

- macrolepis, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 215.—Bras.
 Martii, Baker, l. c. 216.—Bras.
 menthaefolia, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 434.—Bras.
 multiflora, Gardn. l. c. v. (1846) 460=villosa.
 podocarpa, Sch. Bip. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 182.—Bras.
 salviaefolia, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 460.—Bras.
 Selloi, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 215=Gardneri.
 villosa, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 213.—Bras.

TRICHOGYNE, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 231=Ifloga, Cass. (Compos.).
 cauliflora, DC. *Prod.* vi. 266=I. Fontanesii.
 decumbens, Less. *Syn. Comp.* 359.—Afr. austr.
 glomerata, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 287.—Afr. austr.
 laricifolia, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 231.—Afr. austr.
 paronychioides, DC. *Prod.* vi. 266=I. paronychioides.
 polycnemoides, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 701=I. polycnemoides.
 radicans, DC. *Prod.* vi. 265=reflexa.
 reflexa, Less. *Syn. Comp.* 360.—Afr. austr.
 seriphoides, Less. l. c.—Afr. austr.
 spicata, Sch. Bip. in *Webb & Berth. Phyt. Canar.* ii. 310=I. Fontanesii.
 verticillata, Less. *Syn. Comp.* 361=I. polycnemoides.

TRICHOLAENA, Schrad. in *Schult. Mant.* ii. 163 (1824)=Panicum, Linn. (Gramin.).
 arenaria, Nees, *Cat. Sem. Hort. Vratisl.* (1836); ex ej. *Fl. Afr. Austr.* 20=P. ammophilum?
 capensis, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 19=P. capense.
 fragilis, A. Br. in *Flora*, xxiv. (1841) 275=P. Braunii.
 fusca, Schult. *Mant.* ii. 164=Saccharum fuscum.
 grandiflora, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) Intell. 19, nomen; et ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 445=P. insigne.
 insularis, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 557=P. leucophaeum.
 leucantha, Hochst. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 92=P. leucanthum.
 longiseta, Hochst. ex Steud. l. c.=P. macrotrichum.
 micrantha, Schrad. in *Schult. Mant.* ii. 163=P. Teneriffae.
 obtecta, Fourr. ex Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 493=P. obtectum.
 rosea, Nees, *Fl. Afr. Austr.* i. 17=P. Teneriffae.
 saccharoides, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 557=Paspalum saccharoides.
 semidecumbens, Schult. *Mant.* ii. 164=Saccharum spontaneum.
 sphacelata, Benth. in *Hook. Niger Fl.* 559.—Afr. trop.
 Teneriffae, Parl. in *Webb & Bert. Phyt. Canar.* iii. 425=P. Teneriffae.
 tonsa, Nees, *Cat. Sem. Hort. Vratisl.* (1836); ex ej. *Fl. Afr. Austr.* 16=P. Teneriffae.
 Wightii, Nees & Arn. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 93=P. megalanthum.

TRICHOLEPIS, DC. in *Guill. Arch. Bot.* ii. (1833) 515. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 475.
 STICTOPHYLLUM, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 78.
 amplexicaulis, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 240.—Ind. or.
 angustifolia, DC. *Prod.* vi. 564.—Ind. or.
 Candolleana, Wight & Arn. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 81. t. 4=Voltairea divaricata.
 elongata, DC. *Prod.* vi. 563.—Reg. Himal.
 furcata, DC. l. c.; et in *Deless. Ic. Sel.* iv. t. 74.—Reg. Himal.
 glaberrima, DC. *Prod.* vi. 564.—Ind. or.
 Karensium, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) ii. 318.—Burma.
 lanuginosa, Klotzsch, in *Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 79=elongata.
 montana, Dalz. & Gibs. *Bomb. Fl.* 131.—Ind. or.
 nigricans, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 77=furcata.
 procumbens, Wight, *l. c.* Pl. t. 1139=Volutarella divaricata.
 radicans, DC. *Prod.* vi. 564.—Ind. or.

TRICHOLEPIS:—

Roylei, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 383.—Ind. bor. occ. *spartoides*, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 241=tibetica. *Stewarti*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 380.—Ind. bor. occ. *Stictophyllum*, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 241.—Reg. Himal. *tibetica*, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, l. c.—Reg. Himal.

TRICHOLOBOS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 290=**Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.). *capensis*, Turcz. l. c.=S. Turczaninowii.

TRICHOLOBUS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 236 (1850). **CONNARACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 433. *cochinchinensis*, Baill. *Adansonia*, ix. (1868-70) 150.—Cochinch. *connaroides*, F. Muell. *Fragm.* viii. 224.—Austral. *ferrugineus*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 237.—Borneo. *fulvus*, Blume, l. c.—Sumatra.

TRICHOLOMA, Benth. in DC. *Prod.* x. 426 (1846)=**Glossostigma**, Arn. (Scrophul.). *elatinoides*, Benth. l. c.=G. elatinoides.

TRICHOLOPHUS, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 114 (1839)=**Polygala**, Tourn. *monspeliacus*, Spach, l. c. 116=P. monspeliaca.

TRICHOMARIA, 'Hook. & Arn.' ex Steud. Nom. ed. II. ii. 702 (1841), sphalm.=**Tricomaria**, Gill. (Malpigh.).

TRICHOMEMA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 195 (1821), err. typ.=seq.

TRICHONEMA, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. t. 575 (1802)=**Romulea**, Marat. (Irid.). *arenarium*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702=R. arenaria. *barbatum*, Herb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89=R. barbata. *Bulbocodium*, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. sub t. 575=R. Bulbocodium. *Bulbocodium*, Sm. Engl. Bot. t. 2549=R. Columnae. *Bulbocodium*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 312=R. grandiscapa. *candidum*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1842) 12. n. 4.—Afr. austr. ? *caulescens*, [Ker-Gawl. in] Bot. Mag. t. 1392=R. bulbocodioides. *chloroleucum*, [Ker-Gawl.] l. c. sub t. 575=R. chloroleuca. *Clusianum*, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 75=R. Clusiana. *coelestinum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 399=Nemastylis coelestina. *collinum*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 317=R. Bulbocodium. *Columnae*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 83=R. Columnae. *croceum*, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 669=R. Bulbocodium. *cruciatum*, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. sub t. 575=R. cruciata. *cupreum*, Herb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89=R. cuprea. *dichotomum*, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 666=R. rosea. *edule*, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 86=R. purpurascens. *elongatum*, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. sub t. 1225=R. elongata. *filifolium*, Ker-Gawl. Irid. Gen. 82=R. filifolia. *grandiflorum*, Sprun. ex Nym. Consp. 704=R. Bulbocodium. *grandiscapum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 312. t. 222=R. grandiscapa. *hirsutum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702; Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 665=R. hirsuta. *humile*, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. sub t. 575=Geis-sorhiza humilis. *hypoxidiflorum*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 316=R. bulbocodioides. *latifolium*, Herb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89=R. latifolia.

TRICHONEMA:—

Linaresii, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 238=Romulea Requiinii. *Linaresii*, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 660=R. Linaresii. *longifolium*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 316=R. longifolia. *longitubum*, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 665=Syringodca bicolor. *maritimum*, Sibth. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 87=R. Linaresii. *minimum*, Tenore, Syll. Fl. Neap. 24=R. Columnae. *monadelphum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 399.—Afr. austr. *nivale*, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iv. 92=R. Bulbocodium. *ochroleucum*, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 223=R. chloroleuca. *ornithogaloides*, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 583.—Afr. austr. *parviflorum*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 195=R. Bulbocodium. *parviflorum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702=R. parviflora. *pudivum*, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. sub t. 575=R. rosea. *purpurascens*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 399=R. purpurascens. *Pylum*, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 40=R. Bulbocodium. *quadrangulum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 399=Geis-sorhiza quadrangula. *ramiflorum*, Sweet, l. c. ed. II. 596=R. ramiflora. *ramosum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702=R. arenaria. *recurvifolium*, Ker-Gawl. Gen. Irid. 83=R. bulbocodioides. *recurvum*, Spreng. Syst. i. 149=R. bulbocodioides. *reflexum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702=R. reflexa. *roseum*, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. sub t. 575=R. rosea. *simile*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702=R. similis. *speciosum*, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 223=R. rosea. *spirale*, Burch. Trav. i. 260=R. spiralis. *subalpestre*, Walp. Ann. i. 833, sphalm.=seq. *subpalustre*, Herb. in Bot. Reg. (1847) t. 40. f. 1=R. Bulbocodium. *tortuosum*, Licht. Reise, iv. 51; Ker-Gawl. Gen. Irid. 83=R. tortuosa. *uliginosum*, Walp. Ann. i. 833=R. Bulbocodium. *umbellatum*, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1864-65) 670=R. Bulbocodium. *vernum*, Sprun. ex Nym. Consp. 705=R. Linaresii. *Zeyheri*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702=R. Zeyheri.

TRICHONEURA, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 148=**Triodia**, R. Br. (Gramin.). *Hookeri*, Anderss. l. c. 149=Leptochloa Lindleyana.

TRICHOON, Roth, in Roem. Arch. i. iii. (1798) 37=**Phragmites**, Trin. (1820) (Gramin.). *Karka*, Roth, l. c.=P. communis. *panicus*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 702=Pennisetum setosum.

TRICHOPETALUM, Lindl. Bot. Reg. t. 1535 (1832)=**Bottionea**, Colla (Liliac.). *gracile*, Lindl. l. c.=B. thysantoides. *stellatum*, Lindl. l. c.=B. thysantoides.

TRICHOPHILA, Pritz. Ic. Ind. 1115 (1855), sphalm.=**Trichopilia**, Lindl. (Orchid.).

TRICHOPHORUM, Pers. Syn. i. 69 (1805)=**Eriophorum**, Linn. et **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.). *alpinum*, Pers. l. c. 70=E. alpinum. *caespitosum*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 78; Enum. Pl. Trans. 694=S. caespitosus. *comosum*, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 202=E. comosum. *cyperinum*, Pers. Syn. i. 69=S. Eriophorum. *emergens*, Norman, in 'Soc. Reg. Sc. Norveg. v.' (1868) 319 (Quid ?)—Norveg. *hudsonianum*, Pers. Syn. i. 69=E. alpinum. *hudsonicum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 702=praec. *lineatum*, Pers. Syn. i. 69=S. lineatus. *Lockharti*, G. Don, in Lond. Hort. Brit. 468=E. Lockharti. *montevidense*, G. Don, l. c.=Androtrichum polycephalum. *pendulum*, Muhl. Desc. Gram. 44=S. lineatus.

TRICHOPHYLLUM, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789)=**Eleocharis**, R. Br. (1810) (Cyperac.).

TRICHOPHYLLUM, Nutt. Gen. Am. ii. 166 (1818)=**Bahia**, Lag. (Compos.). *angustifolium*, Less. in Linnaea, vi. (1831) 519=Calea angustifolia. *integrifolium*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 316=Eriophyllum caespitosum. *lanatum*, Nutt. Gen. Am. ii. 168=Eriophyllum caespitosum. *multiflorum*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 35=Eriophyllum caespitosum. *oppositifolium*, Nutt. Gen. Am. ii. 167=oppositifolia.

TRICHOPILIA, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446 (1836). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 559.

HELICIA, Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 17. **LEUCOCORYLE**, Klotzsch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. I. **OLIVERIANA**, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 111.

PILUMNA, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 73. *albida*, H. Wendl. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xix. (1861) 362.—Venezuela. *Backhousiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) i. 816.—N. Granat. *callichroma*, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 104.—N. Granat.

coccinea, Warsz. ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 79=marginata. *costata*, Linden, Cat. n. 22 (1869), 45.—Hab. ? *crispa*, Lindl. ex Linden, l. c.—Am. centr. *dasyandra*, Reichb. f. Xenia Orch. iii. 64.—N. Granat. *fragrans*, Reichb. f. in Otto, Hamb. Gartenz. xiv. (1858) 229.—N. Granat. *Galeottiana*, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 26.—Mexic. *grata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1868) 1338.—Peruv. ? *hymenantha*, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 90.—Peruv.

Kienastiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) ii. 166.—Hab. ? *laxa*, Reichb. f. in Otto, Hamb. Gartenz. xiv. (1858) 229.—Bras. *lepida*, Hort. ex W. G. Smith, in Flor. Mag. N. S. (1874) t. 98=marginata. *maculata*, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 215.—Am. centr. *marginata*, Henfr. in Moore & Ayres, Gard. Mag. Bot. iii. (1851) 185.—N. Granat. *mutica*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 679.—Ins. Trinit. *nobilis*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 100.—N. Granat. *oicophyllax*, Reichb. f. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiv. (1856) 97.—Hab. ? *picta*, Lem. Illustr. Hort. vi. (1859) Misc. 86; et t. 225=Galeottiana.

Reichenheimia, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiii. (1855) 353=laxa. *rostrata*, Reichb. f. in Saund. Refug. Bot. t. 100.—N. Granat. *sanguinolenta*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 99.—Ecuador. *suavis*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 44.—Am. centr. *subulata*, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 278=hymenantha. *tortilis*, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446; et Bot. Reg. t. 1863.—Mexic. *Turialvae*, Batem. in Bot. Mag. t. 5550=Galeottiana. *Turialvae*, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xix. (1863) 11.—Costa Rica. *Wagneri*, Reichb. f. in Otto, Hamb. Gartenz. xiv. (1858) 229.—Venezuela.

TRICHOPODIUM, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1543 (1832)=**Trichopus**, Gaertn. (Dioscor.). *angustifolium*, Lindl. l. c.=Trichopus zeylanicus. *cordatum*, Lindl. l. c.=Trichopus zeylanicus. *travancoricum*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. 68=Trichopus zeylanicus. *zeylanicum*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 291, 443=Trichopus zeylanicus.

TRICHOPODIUM, Presl, Bot. Bemerk. 52 (1844)=**Dalea**, Linn. (Legumin.). *diffusum*, Presl, l. c. 53=D. diffusa. *glandulosum*, Presl, l. c. 52.—Mexic.

TRICHOPTERIA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 449 (1836), sphalm.=seq.

TRICHOPTERYA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 449 (1836), sphalm.=seq.

TRICHOPTERYX, Nees, Fl. Afr. Austr. 339 (1841).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1162.
LOUDETIA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 20; xxiv. (1841) 713.
Dregeana, Nees, Fl. Afr. Austr. 339.—Afr. austr.
flammea, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 98, sphalm.=seq.
flammda, Benth. l. c. 59.—Bras.; Afr. trop.
simplex, Benth. l. c. 98.—Afr. austr.

TRICHOPTILUM, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 97 (1858). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 415.
incisum, A. Gray, l. c.—Calif.

TRICHOPUS, Gaertn. Fruct. i. 44. t. 14 (1788).
DIOSCOREACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 745.
PODIANTHUS, Schnitzl. in Bot. Zeit. i. (1843) 739.
STEIREYA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 100 (1836).
TRICHOPODIUM, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1543 (1832).
piperifolius, Wall. ex Griff. in Trans. Linn. Soc. xix. (1845) 336 = Bragantia tomentosa.
zeylanicus, Gaertn. Fruct. i. 44. t. 14.—Ind. or.

TRICHORHIZA, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 702 (1841) = Luisia, Gaudich. (Orchid.).
teretifolia, Lindl. ex Steud. l. c.—Penang.; N. Caled.

TRICHORYNE, F. Muell. Census, 118 (1882), sphalm. = Tricoryne, R. Br. (Liliac.).

TRICHOSACME, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ii. (1845) 11. ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 765.
lanata, Zucc. l. c. 12.—Mexic.

TRICHOSANDRA, Decne. in DC. Prod. viii. 625 (1844). ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 769.
borbonica, Decne. l. c. 626.—Ins. Mascari.

TRICHOSANTHA, Stend. Nom. ed. II. ii. 702 (1841), sphalm. = TRICHOSATHERA, Ehrh. = Stipa, Linn. (Gramin.).

TRICHOSANTHES, Linn. Gen. ed. I. 295 (1737).
CUCURBITACEAE, Benth. & Hook. f. i. 821.
EOPEPON, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 31.
INVOLUCRARIA, Ser. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. i. (1825) 25. t. 5.
PLATYGONIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 33. t. 5.
amara, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 774 = Luffa acutangula.
amara, Linn. Sp. Pl. 1008 (sp. dub.).—Ins. S. Doming.
anamlaensis, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 47.—Ind. or.
anamalayana, Bedd. in Trans. Linn. Soc. xxv. (1865) 217 = praec.
Anguina, Linn. Sp. Pl. 1008.—As. trop.
angulata, Lam. Encyc. i. 190 (sp. dub.).—Ind. or.
aspera, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6686 E = pubera.
asperifolia, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 206, nomen = pubera.
Beccariana, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 380.—Sumatra.
borneensis, Cogn. l. c. 369.—Borneo.
bracteata, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 58.—Ind. or.
caudata, Willd. Sp. Pl. iv. 600 = cuspidata.
celebica, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 385.—Ins. Celebes.
chinesis, Ser. in DC. Prod. iii. 315 (= cucumeroides?).—China.
cochinchinensis, M. Roem. Syn. Pepon. 96 = cucumerina.
colubrina, Jacq. f. Eclog. t. 128 = T. Anguina.
cordata, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 703.—Ind. or.
cordata, Wall. Cat. n. 6686 B = himalensis.
cordata, Wall. l. c. 6688 C, E = pubera.
coriacea, Blume, Bijdr. 935.—Sumatra.

TRICHOSANTHES:—

corniculata, Lam. Encyc. i. 191 = Ceratosanthes tuberosa.
costata, Blume, Bijdr. 933 = Gymnopetalum cochinchinense.
cucumerina, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6688 B = pubera?
cucumerina, Linn. Sp. Pl. 1008.—As. et Austral. trop.
cucumerina, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 82 = cucumeroides.
cucumerina, Thunb. Fl. Jap. 332 = japonica.
cucumerina, Wall. Cat. n. 6690 E = Gymnopetalum cochinchinense.
cucumeroides, Maxim. in Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 172.—Japon.
cuspidata, Lam. Encyc. i. 188.—Ind. or.
dicaelosperma, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 609.—Reg. Himal.
dioica, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 701.—Ind. or.
dioica, Wall. Cat. n. 6692 C = Melothria maderaspatana.
erigera, D. Dietr. Syn. Pl. v. 370, sphalm. = ovigera.
Fatoa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6695 = Gymnopetalum cochinchinense.
foetidissima, Jacq. Coll. ii. 341 = Kedrostis foetidissima.
globosa, Blume, Bijdr. 936.—Java.
grandibracteata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1877) ii. 98, 99 = Wallichiana.
grandiflora, Blume, Bijdr. 934.—Java.
grandiflora, Wall. Cat. n. 6685 = Hodgsonia heteroclita.
Hearnii, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 315.—Austral.
heteroclita, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 705 = Hodgsonia heteroclita.
hexasperma, Blume, Bijdr. 935 = Hodgsonia heteroclita.
himalensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 608.—Reg. Himal.
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 677.—Java.
incisa, Rottl. ex Rosenth. Syn. Pl. Diaph. 683, nomen. —Hab.?
integrifolia, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1877) ii. 99.—Ind. or.; Burma.
integrifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 127 = Thwaitesii.
japonica, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. 1868 (1869) 90.—Japon.
javanica, Miq. Pl. Jungh. 399; et Fl. Ind. Bat. i. i. 678 = Thladiantha cordifolia.
Kadam, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 331 = Hodgsonia heteroclita.
Kakidonta, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 350 = pubera.
Kirilowii, Maxim. Prim. Fl. Amur. 482.—Mongol.
lacinosia, Klein, ex Willd. Sp. Pl. iv. 601 = cucumerina.
lacinosia, Wight, ex Wall. Cat. n. 6689 A, B = pubera.
Lepiniana, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 377.—Reg. Himal.; Ind. or.
lobata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6687 E = T. Anguina.
lobata, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 703 = cucumerina.
longiflora, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 374.—N. Guin.
lucioniana, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 95 = pubera.
macrocarpa, Blume, Bijdr. 935 = Hodgsonia heteroclita.
macrospira, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 308 = cordata.
multiloba, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 607 = Wallichiana.
multiloba, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 82.—Japon.
nervifolia, Linn. Sp. Pl. 1008.—Ind. or.
officinalis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6694 = dioica.
olida, F. Muell. in Trans. Soc. Bot. Edinb. vii. (1863) 491 = cucumerina.
ovata, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 365.—Reg. Himal.
ovigera, Blume, Bijdr. 934.—Malaya.
palmata, Benth. Fl. Austral. iii. 315 = subvelutina.
palmata, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 227 = Kirilowii.
palmata, Linn. Syst. ed. X. 1278.—Hab.?
palmata, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 704 = pubera.

TRICHOSANTHES:—

palmata, Wall. Cat. n. 6688 = cordata.
parviflora, Wight, ex Wall. l. c. 6690 E = Gymnopetalum cochinchinense.
Patara, M. Roem. Syn. Pepon. 97 (sp. dub.).—Ins. Tahiti.
pedatifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 677 = cucumerina.
pentaphylla, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 314.—Austral.
Perrottetiana, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 362.—Ind. or.
Petala, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6687 D = T. Anguina.
pilosa, Buch.-Ham. ex Wall. l. c. n. 6691 = cucumerina.
pilosa, Lour. Fl. Cochinch. 588.—Cochinch.
pilosa, Wall. Cat. n. 6687, partim = bracteata.
pomiformis, Macfad. Fl. Jamaica. ii. 143 = Cionosicyos pomiformis.
pubera, Blume, Bijdr. 936.—Ind. or.; Malaya.
punctata, Linn. Amoen. Acad. iii. 423 = Fevillea cordifolia.
quadrirrhiza, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 82 = cucumeroides.
quinquangulata, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 645.—Ins. Sulu.
reniformis, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. (1871) ii. 57 = dicaelosperma.
reniformis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 675 = cucumerina.
Russelliana, Wall. Cat. n. 6696 = Momordica dioica.
scabra, Lour. Fl. Cochinch. 589.—Cochinch.
subvelutina, F. Muell. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 366.—Austral.
sumatrana, Cogn. l. c. 373.—Sumatra.
tannifolia, Poir. Encyc. Suppl. i. 386.—Porto Rico.
Tatoa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6695 (sp. dub.).—Ind. or.
Theba, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6684 A = Hodgsonia heteroclita.
Thwaitesii, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 387.—Zeylan.
tricuspidata, Lour. Fl. Cochinch. 529.—Cochinch.
tricuspis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 679 = pubera.
trifoliata, Blume, Bijdr. 936.—Malaya.
truncata, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 608.—Reg. Himal.
tuberosa, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 349 = cordata.
tuberosa, Willd. Sp. Pl. iv. 601 = Ceratosanthes tuberosa.
Turolata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6688 A = pubera.
villosa, Blume, Bijdr. 934.—Java.
villosula, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 362.—Ind. or.
Wallichiana, Wight, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. viii. (1842) 270.—Ind. or.
Wawraei, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 384.—Singapore.
Wightiana, M. Roem. Syn. Pepon. 96 = cucumerina.

TRICHOSANTHOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 56 = praec.

TRICHOSATHERA, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 149 = Stipa, Linn. (Gramin.).

TRICHOSCYPHA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 423 (1862). ANACARDIACEAE, Benth. & Hook. f. l. c.
acuminata, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 425.—Afr. trop.
bijuga, Engl. l. c.—Afr. trop.
imbricata, Engl. l. c. 426.—Afr. trop.
longifolia, Engl. l. c. 425.—Afr. trop.
lucens, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 444.—Afr. trop.
Mannii, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 423.—Afr. trop.
Oliveri, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 425.—Afr. trop.
patens, Engl. l. c.—Afr. trop.
reticulata, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 307.—Afr. trop.

TRICHOSERIS, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. t. 263 (1845), sphalm. = TROCHOSERIS, Poepp. & Endl. = Troximom, Nutt. (Compos.).

TRICHOSERIS, Sch. Bip. in Flora, xxii. (1839) 19 = Pterotheca, Cass. (Compos.).
Rueppellii, Sch. Bip. l. c. = P. bifida.

TRICHOSIA, Blume, Bijdr. Tabell. 11 (1825) = TRICHOTOSIA, Blume = *Eria*, Lindl. (Orchid.).

TRICHOSIPHON, Schott & Endl. Melet. 34 (1832) = *Sterculia*, Linn.
australe, Schott & Endl. l. c. = *S. Trichosiphon*.

TRICHOSMA, Lindl. Bot. Reg. (1842) t. 21. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 518.
cylindropoda, Griff. Notul. iii. 299 = *suavis*.
suavis, Lindl. Bot. Reg. (1842) t. 21. — Reg. Himal.

TRICHOSPERMUM, Blume, Bijdr. 56 (1825).
TILIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 236.
BIXAGREWIA, Kurz, in Journ. Bot. xiii (1875) 325. t. 160.

DICLIDOCARPUS, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 200. t. 14 (1854).

javanicum, Blume, Bijdr. 57. — Java.
mexicanum, Baill. Hist. Pl. iv. 179 = *Belotia greviae-folia*.

Richii, Seem. in *Bonplandia*, ix. (1861) 254 (Ritchei); *Fl. Vit.* 27. — Ins. Fiji.

TRICHOSPIRA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 27. t. 312 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 383.

bicristata, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 343 = *menthoides*.
menthoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 23. t. 312. — Am. austr.

Pricurii, DC. Prod. v. 91 = *menthoides*.
Pulegium, Mart. ex DC. l. c. = *menthoides*.

TRICHOSPORUM, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. vii. (1822) 84 = *Aeschynanthus*, Jack (1823) (Gesner.).
albidum, Nees, in *Flora*, viii. (1825) 144 = *A. albida*.
angustifolium, Nees, l. c. = *A. angustifolia*.
grandiflorum, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. vii. (1822) 85; et Prod. Fl. Nep. 125 = *A. grandiflora*.
ovatum, D. Don, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 41 = *A. radicans*.

parviflorum, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. vii. (1822) 85; et Prod. Fl. Nep. 125 = *A. ramosissima*.

pulchrum, Blume, Bijdr. 764 = *A. pulchra*.
radicans, Nees, in *Flora*, viii. (1825) 144 = *A. radicans*.
volubile, Nees, l. c. = *A. volubilis*.

TRICHOSTACHYS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 128 (1873). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

aurea, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 227. — Afr. trop.

ciliata, Hiern, l. c. — Afr. trop.
longifolia, Hiern, l. c. — Afr. trop.
petiolata, Hiern, l. c. — Afr. trop.

TRICHOSTACHYS, Welw. Synopse, 19 (1862) = *Faurea*, Harv. (Proteac.).
speciosa, Welw. l. c. = *F. speciosa*.

TRICHOSTEGIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 81 = *Athrixia*, Ker-Gawl. (Compos.).
asteroides, Turcz. l. c. = *A. multiceps*.

TRICHOSTEMA, Gronov. ex Linn. Hort. Cliff. 493 (1737). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1219.
arizonicum, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 371. — Arizona.

brachiatum, Lam. Illustr. iii. 71 = *lineare*.
brachiatum, Linn. Sp. Pl. 598 = *Isanthus coerules*.

dichotomum, Linn. l. c. — Am. bor.
dichotomum, Roth, Nov. Pl. Sp. 280 = *lineare*.
dichotomum, Torr. Bot. Mex. Bound. 134 = *arizonicum*.

lanatum, Benth. Lab. Gen. et Sp. 659. — Calif.
lanceolatum, Benth. l. c. — Am. bor. occ.

laxum, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 387. — Calif.

lineare, Nutt. Gen. Am. ii. 39 = *seq.* ?
lineare, Walt. Fl. Carol. 164. — Am. bor.

linearifolium, Bertol. Misc. Bot. xiii. 15. t. 2. — Am. bor.
micranthum, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 348. — Calif.

oblongum, Benth. Lab. Gen. et Sp. 659. — Am. bor. occ.
ovatum, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. iii. (1885) 154. — Calif.

Parishii, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 173 = *lanatum*.

pilosum, Roth, Nov. Pl. Sp. 280 = *dichotomum*.
Sandersoni, Pritz. Ic. Ind. ii. 276, sphalm. = *Tryphostemma Sandersoni*.

spiralis, Lour. Fl. Cochinch. 371 = *Orthosiphon stamineus*.

TRICHOSTEMMA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 399, 409 (1827) = *Wedelia*, Jacq. (Compos.).
hispidum, Cass. l. c. 409 = *W. trichostephia*.

TRICHOSTEPHIUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. lv. 266, in adnot. (1828) = *seq.*

TRICHOSTEPHUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. lx. 618 (1830) = *Wedelia*, Jacq. (Compos.).
hispidus, Cass. l. c. = *W. trichostephia*.

TRICHOSTERIGMA, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 248; et in Abh. Akad. Berl. (1860) 41 = *Euphorbia*, Linn.

californicum, Klotzsch & Garcke, ll. cc. 248; 42 = *E. californica*.

fulgens, Klotzsch & Garcke, ll. cc. = *E. fulgens*.
Hindsianum, Klotzsch & Garcke, ll. cc. = *E. Hindsiana*.

miserum, Klotzsch & Garcke, ll. cc. = *E. misera*.

TRICHOSTIGMA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. i. 627 (1845) = *Villamilla*, Ruiz & Pav. (Phytol.).
rivinoides, A. Rich. l. c. 628 = *V. octandra*.

TRICHOSTOSIA, Griff. Notul. iii. 331 (1851), sphalm. = TRICHOTOSIA, Blume = *Eria*, Lindl. (Orchid.).

TRICHOTHALAMUS, Spreng. Anleit. ii. 864 (1818);
Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. x. (1821) 585. t. 49 = *Potentilla*, Linn. (Rosac.).
albus, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 370 = *P. alba*.

alchemilloides, Spreng. Anleit. ii. 864 = *P. alchemilloides*.

caulescens, Spreng. l. c. = *P. caulescens*.
Clusianus, Spreng. l. c. = *P. Clusiana*.

lignosus, Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. x. (1821) 585. t. 49 = *P. lignosa*.

lupinoides, Spreng. Anleit. ii. 864 = *P. nivalis*.
nitidus, Spreng. l. c. = *P. nitida*.

petiolulatus, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 370 = *P. caulescens*.

tridentatus, Spreng. Anleit. ii. 864 = *P. tridentata*.
Valderia, Spreng. l. c. = *P. Valderia*.

TRICHOTOSIA, Blume, Bijdr. 342 (1825) = *Eria*, Lindl. (Orchid.).

annulata, Blume, l. c. 343 = *E. annulata*.
biflora, Griff. Notul. iii. 331; l. c. Pl. Asiat. t. 315 = *E. biflora*.

ciliata, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. v. (1853) 492 = *E. ciliata*.

ferox, Blume, Bijdr. 342 = *E. ferox*.
ferox, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 184 = *E. rubiginosa*.

microphylla, Blume, Bijdr. 343 = *E. microphylla*.
pauciflora, Blume, l. c. = *E. pauciflora*, Blume.

TRICLANThERA, Rafin. Sylva Tellur. 108 (1838) = *Crataeva*, Linn. (Cappar.).

corymbosa, Rafin. l. c. = *C. magna*.
falcata, Rafin. l. c. = *C. falcata*.

TRICLICERAS, Thonn. ex DC. Pl. Rar. Jard. Genév. 56, in obs. (1829) = *Wormskioldia*, Thonn. (Turnerac.).

raphanoides, DC. l. c. = *W. heterophylla*.

TRICLINIUM, Rafin. Fl. Ludov. 79 (1817) = *Sanicula*, Tourn. (Umbell.).

marilandica, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 = *S. marilandica*.

odoratum, Rafin. Fl. Ludov. 80 = *S. canadensis*.

TRICLISIA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 39 (1862). *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

coriacea, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 49. — Afr. trop.
loucoubensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 458. — Madag.

macrophylla, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 48. — Afr. trop.
patens, Oliver, l. c. 49. — Afr. trop.

subcordata, Oliver, l. c. — Afr. trop.

TRICLISPERMA, Rafin. Specch. i. 117 (1814) = *Polygala*, Tourn.

grandiflora, Rafin. l. c. = *P. paucifolia*.

TRICLISSA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 75 (1866) = *Kniphofia*, Moench (Liliac.).
Uvaria, Salisb. l. c. = *K. aloides*.

TRICOILENDUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 97 (1836) = *Indigofera*, Linn. (Legumin.).
microphyllus, Rafin. l. c. = *I. gracilis*.

TRICOMARIA, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 157. t. 101. *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 258.

Usillo, Hook. & Arn. l. c. 158. — Chili.

TRICONDYLIUS, Salisb. in Knight, Prot. 121 (1809) = *Lomatia*, R. Br. (1810) (Proteac.).

ferrugineus, Knight, l. c. 123 = *L. ferruginea*.
myricaefolius, Knight, l. c. 122 = *L. longifolia*.

silaifolius, Knight, l. c. = *L. silaifolia*.
tinctorius, Knight, l. c. = *L. tinctoria*.

TRICORYNE, R. Br. Prod. 278 (1810). *LILIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 796.

acaulis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1152 = *Ophiopogon japonicus*.

anceps, R. Br. Prod. 278. — Austral.
anceps, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 36 = *elator*.

caulescens, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1152 = *Ophiopogon japonicus*.

elator, R. Br. Prod. 278. — Austral.
humilis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 36. — Austral.

muricata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 363. — Austral.

platyptera, Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 72. — Austral.
pteroaulon, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 363 = *platyptera*.

scabra, R. Br. Prod. 278 = *elator*.
simplex, R. Br. l. c. — Austral.

tenella, R. Br. l. c. = *elator*.

TRICOSCYPHA, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 303 (1883), sphalm. = *Trichoseypha*, Hook. f. (Anacard.).

TRICOSTULARIA, Nees, in Lehm. Pugill. viii. 50 (1844); et in Lehm. Pl. Preiss. ii. 83 (1846).

CYPERACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1064.
DISCOPODIUM, Steud. Syn. Pl. Cyp. 150 (1855).

compressa, Nees, in Lehm. Pugill. viii. 51; et in Lehm. Pl. Preiss. ii. 83. — Austral.

fimbriatylodes, Benth. Fl. Austral. vii. 384 = *Cladium undulatum*.

Neesii, Lehm. Pugill. viii. 52; et in Lehm. Pl. Preiss. ii. 83. — Austral.

paludosa, Benth. Fl. Austral. vii. 382. — Austral.
pauciflora, Benth. l. c. 383. — Austral.

TRICKATUS, L'Hérit. ex Willd. Sp. Pl. i. 807 (1797) = *Abronia*, Juss. (Nyctag.).

admirabilis, L'Hérit. ex Willd. l. c. = *A. umbellata*.
arenarius, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 53 = *A. arenaria*.

parviflorus, Spreng. Syst. i. 536 = *Colignonia parviflora*.

TRICUSPIDARIA, Ruiz & Pav. Prod. 64. t. 36 (1794). *TILIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 240.

CRINODENDRON, Molina, Sagg. Chile, 179 (1782).
TRICUSPIS, Pers. Syn. ii. 9 (1807).

dependens, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 403; Syst. Veg. 112. — Peruv.

hexapetala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 576 = *dependens*.

lanceolata, Miq. in *Linnaea*, xxv. (1852) 650. — Chili.

Patagua, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. ii. (1868) 51; Contrib. Bot. ii. 187. t. 82 = *dependens*.

TRICUSPIS, Beauv. Agrost. 77. t. 15. f. 10 (1812) = *Triodia*, R. Br. (Gramin.).

acuminata, Munro, ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 335 = *Triodia acuminata*.

albescens, Munro, ex A. Gray, l. c. = *Triodia albes-cens*.

ambigua, Chapm. Fl. S. U. St. 559 = *Triodia ambigua*.
caroliniana, Beauv. Agrost. 77 = *Triodia cuprea*.

cornuta, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 590; Wood, Am. Bot. & Flor. 398 = *Triplasis americana*.

TRICUSPIS:—

- latifolia*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 259.—Reg. Argent.
monstra, Munro, ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 56 = *Scleropogon brevifolius*.
mutica, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 156 = *Triodia mutica*.
noveboracensis, Beauv. Agrost. 77 = *Triodia cuprea*.
pulchella, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 156 = *Triodia pulchella*.
purpurea, A. Gray. Man. Bot. N. U. St. ed. I. 589 = *Triplasis purpurea*.
quinguefida, Beauv. ex G. Don. in Loud. Hort. Brit. 31 = *Triodia cuprea*.
seslerioides, Torr. Fl. N. York, ii. 463 = *Triodia seslerioides*.
simplex, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 532.—Cuba.
stricta, Nutt. ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 335 = *Triodia stricta*.
texana, Thurb. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 180 = *Triodia texana*.
trinerviolumis, Munro, ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 333 = *Triodia trinerviolumis*.

TRICUSPIS, Pers. Syn. ii. 9 (1807) = **Tricuspidaria**, Ruiz & Pav. (Tiliac.).
dependens, Pers. l. c. = *Tricuspidaria dependens*.

TRICYCLA, Cav. Ic. vi. 78. t. 598 (1801). **NYCTAGINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 7.

- peruviana*, Poir. Encyc. Suppl. v. 359 = *Bougainvillea peruviana*.
spectabilis, Poir. l. c. = *Bougainvillea spectabilis*.
spinosa, Cav. Ic. vi. 79. t. 598; et in Anal. Cienc. Nat. v. (1802) 63.—Reg. Argent.

TRICYRTIS, Wall. Tent. Fl. Nap. 61. t. 46 (1826). **LILLACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 831.

COMPANANTHUS, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 137 (1827).
 COMPSOA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 50 (1825), nomen prius.

elegans, Wall. Tent. Fl. Nap. ii. t. 46 = *pilosa*.
flava, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xi. (1867) 434.—Japan.

formosana, Baker in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 465.—Ins. Formosa.

hirta, Hook. Bot. Mag. t. 5355.—Japan.
japonica, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. II. ii. (1868) 86; et Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 155, 201 = *hirta*.

latifolia, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xi. (1867) 435.—Japan.

macropoda, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. II. ii. (1868) 86.—Japan.
pilosa, Wall. Tent. Fl. Nap. ii. 62 [t. 46].—Reg. Himal.

TRIDACHNE, Liebm. ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852) 45 = **Notylia**, Lindl. (Orchid.).
virens, Liebm. ex Lindl. & Paxt. l. c. = *N. Huegelii*.

TRIDACTYLINA, Sch. Bip. Tanacet. 48 (1844) = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).
Kirilowii, Sch. Bip. l. c. 49 (= *Pyrethrum Kirilowii*).—Sibir. baical.

TRIDACTYLITES, Haw. Saxif. Enum. 21 (1821) = **Saxifraga**, Tourn.
annua, Haw. l. c. = *S. Tridactylites*.
petraea, Haw. l. c. 22 = *S. petraea*.

TRIDALIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 (Quid?).

TRIDAX, Linn. Hort. Cliff. 418 (1737). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 392.
BALISIA, Willd. Sp. Pl. iii. 2214 (1803).
BARTOLINA, Adans. Fam. ii. 124 (1763).
CARPHOSTEPHIUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 62 (1826).
GALINSOGEA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 252. t. 386 (1820).
MANDONIA, Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 50. t. 1.
PTILOSTEPHIUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 253. tt. 387, 388 (1820).
SOGALGINA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 31.

TRIDAX:—

- angustifolia*, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 392.—Ecuador.
balbisoides, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 39.—Mexic.
bicolor, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 104.—Am. bor. occ.
brachylepis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 207.—Mexic.
candidissima, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 39.—Mexic.
coronopifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 207.—Mexic.
galaridioides, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 148 = *Layia galaridioides*.
Mandonii, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 82; et in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 536, nomen.—Bolivia.
obovata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1. 187.—Mexic.
Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 38.—Mexic.
procumbens, Linn. Sp. Pl. 900.—Am. trop.
trifida, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 39.—Mexic.
trilobata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 208.—Mexic.

TRIDENS, Roem. & Schult. Syst. ii. 34 (1817) = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).

- ambigua*, Schult. Mant. ii. 333 = *Triodia ambigua*.
brasiliensis, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 248 (= *Urolepsis brasiliensis*).—Bras.
capensis, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 324 (= *Urolepsis capensis*).—Afr. austr.
quinguefida, Schult. Mant. ii. 333 = *Triodia cuprea*.
verticillata, Meyen, Reise, i. 408, nomen = *Diplachne verticillata*.
virens, Nees, Agrost. Bras. 476 (= *Urolepsis virens*).—Bras.

TRIDENTEA, Haw. Syn. Pl. Succ. 34 (1812) = **Stapelia**, Linn.

- depressa*, Haw. ex Schult. Syst. vi. 850 = *S. patula*.
gemmiflora, Haw. Syn. Pl. Succ. 34 = *S. gemmiflora*.
hircosa, Schult. Syst. vi. 850 = *S. hircosa*.
Juvencula, Schult. l. c. 16 = *S. Juvencula*.
moschata, Haw. Syn. Pl. Succ. 25 = *S. hircosa*.
paniculata, Schult. Syst. vi. 850 = *S. paniculata*.
rugosa, Schult. l. c. = *S. rugosa*.
Simsii, Schult. l. c. = *S. Simsii*.
stygia, Haw. Syn. Pl. Succ. 34 = *S. stygia*.
vetula, Haw. l. c. 34 = *S. vetula*.

TRIDERMIA, Rafin. Sylva Tellur. 145 (1838) = **Grewia**, Linn. (Tiliac.).
papillosa, Rafin. l. c. = *G. villosa*.

TRIDESMIS, Lour. Fl. Cochinch. 576 (1790) = **Croton**, Linn. (Euphorb.).
hispida, Lour. l. c. = *China*.
tomentosa, Lour. l. c. = *C. crassifolius*.

TRIDESMIS, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 358 (1836); et in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 351. t. 6 = **Cratoxylon**, Blume (Hyperic.).
Billardieri, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 352. t. 6 = *C. formosum*.
formosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 179. t. 37 = *C. formosum*.
Jackii, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 352 = *C. formosum*.
ochnoides, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 359 = *C. formosum*.
pruniflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 293 = *C. pruniflorum*.

TRIDESMUS, Steud. Nom. ed. II. i. 445 (1840), in syn., err. typ. = **TRIDESMIS**, Lour. = **Croton**, Linn. (Euphorb.).

TRIDIA, Korth. in Hoef. & De Vriese, Tijdschr. iii. (1836) 17. t. 1 = **Hypericum**, Tourn.
frankenioides, Korth. l. c. 18 = *H. japonicum*.

TRIDIANISIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1879) 197. **OLACINEAE**.
Chapelierii, Baill. l. c.—Madag.

TRIDIMERIS, Baill. Adansonia, ix. (1869) 219. **ANONACEAE**.
Hahniana, Baill. l. c.—Mexic.

TRIDOPHYLLUM, Neck. Elem. ii. 93 (1790) = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

TRIDYNIA, Rafin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 704 (1841) = **Lysimachia**, Tourn. (Primul.).

TRIDYRA, Steud. Nom. ed. II. ii. 84 (1841), sphalm. = *praec.*

TRIENDILIX, Rafin. New Fl. Am. i. 85 (1836) = **Glycine**, Linn. (Legumin.).
clandestina, Rafin. l. c. = *G. clandestina*.

TRIENTALIS, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 109 (1737). **PRIMULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 636.

- alsinaeflora*, Gilib. Fl. Lituan. i. 31 = *T. europaea*.
americana, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 252.—Am. bor.
arctica, Fisch. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 121 = *europaea*.
borealis, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 354 = *europaea*.
capensis, Linn. Sp. Pl. 344 = *Crassula Septas*.
europaea, Linn. l. c.—Europ.; As. bor.; Am. bor. occ.
europaea, Michx. Fl. Bor. Am. i. 220 = *americana*.
heptagyna, Crantz, Inst. ii. 365 = *Crassula Septas*.
latifolia, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 121 = *europaea*.

TRIEXASTIMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 121 (1836) = **Heteranthera**, Ruiz & Pav. (Ponted.).

TRIFAX, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 (Quid?).

TRIFILLIUM, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 383 = **Medicago**, Tourn. (Legumin.).
platycarpus, Medic. l. c. = *M. platycarpa*.

TRIFOLIASTRUM, Moench, Meth. 123 (1794) = **TrigoneIIa**, Linn. (Legumin.).
caeruleum, Moench, l. c. = *Trigonella caerulea*.

TRIFOLIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 229 (1737). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 487.

- AMARENUS*, Presl, Symb. Bot. i. 47 (1830).
AMORIA, Presl, l. c. 43 (1830).
CALYCOMORPHUM, Presl, l. c. 50 (1830).
DACTYPHYLLON, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
GALEARIA, Presl, Symb. Bot. i. 49 (1830).
LAGOPUS, Bernh. Syst. Verz. Erf. 229 (1800).
LOXOSPERMUM, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 594.
LUPINASTER, Buxb. ex Heist. Syst. 9 (1748).
MICRANTHEUM, Presl, Symb. Bot. i. 47 (1830).
MICROPHYTON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 362.
MISTYLLUS, Presl, Symb. Bot. i. 49 (1830).
PARAMESUS, Presl, l. c. 45 (1830).
PENTAPHYLLON, Pers. Syn. ii. 352 (1807).
SERTULA, Linn. Syst. ed. I (1735).
TRIPHYLLOIDES, Ponted. ex Moench, Meth. 509 (1794).

- abbreviatum*, J. Woods, Tour. Fl. 92.—Europ.
acaule, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 169.—Abyss.
aciculare, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 319 = *tridentatum*.
adscendens, Hornem. Hort. Hafn. ii. 716 = *reflexum*?
affine, Lej. ex DC. Prod. ii. 195 = *medium*.
affine, Presl, Symb. Bot. i. 54 = *arvense*.
africanum, Ser. in DC. Prod. ii. 200.—Afr. austr.
agrarium, Huds. Fl. Angl. ed. I. 286 = *procumbens*.
agrarium, Linn. Sp. Pl. 772.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
agrarium, Mérat, Fl. Par. 202 = *patens*.
agrestinum, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 153 = *arvense*.
aintabense, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 140.—Syria.
alatum, Bivona, Stirp. Rar. iv. 14 = *physodes*.
albens, Fisch. ex Loud. Hort. Brit. 300 = *T. Lupinaster*.
albiceps, Ehrenb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 137.—Egypt.

TRIFOLIUM:—

albidum, *Retz. Obs.* iv. 30.—Hab.?
albidum, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 543 = maritimum.
albiflorum, Fisch. ex Loud. Hort. Brit. 299 = eximium.
albopurpureum, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 313 = Macraei.
album, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 408 = montanum, ochroleucum.
album, Lam. Fl. Fr. ii. 603 = hybridum, repens.
album, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 479 (err. typ. 4) = *Melilotus alba*.
alexandrinum, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 50 = latinum.
alexandrinum, Linn. Cent. Pl. i. 25; *Amoen. Acad.* iv. 286.—Aegypt.; As. Min.
alopecuroides, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 619 (an seq.?).—Hungar.
alopecuroides, Pers. Syn. ii. 350, in obs. = pannonicum.
alpestre, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 407 = medium.
alpestre, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1082.—Europ. austr.; As. bor.
alpicolum, *Hegetschw. Fl. Schw.* 699.—Europ.
alpinum, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1191 = alpestre.
alpinum, Linn. Sp. Pl. 767.—Europ.
alpinum, Pall. Reise, ii. 123 = eximium.
altissimum, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 130.—Am. bor. occ.
altissimum, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 479 (err. typ. 4) = *Melilotus officinalis*.
altissimum, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 120 = Beckwithii.
amabile, Auct. ex Lojac, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883) 143 = Hemsleyi.
amabile, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 503.—Mexic.
ambiguum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 208.—Reg. Cauc.
amphianthum, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 316.—Texas.
amplectens, Torr. & Gray, l. c. 319.—Am. bor. occ.
ampulescens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 89 = fragiferum.
anatolicum, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 31 = hybridum.
Andersonii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 522.—Am. bor. occ.
andinum, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 314.—Am. bor. occ.
angulatum, J. Gay, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 496 = Thalii.
angulatum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 26. t. 27.—Europ. austr.
angustifolium, Linn. Sp. Pl. 769.—Reg. Mediterr.; Oriens.
anomalum, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 51 = physodes.
anomalum, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 47 = repens.
appendiculatum, Lojac, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883) 181.—Calif.
apulum, [Hort. ex] All. in Misc. Taur. v. 76 = spumosum.
arachnoidcum, Presl, Delic. Prag. 49 = Cherleri.
arenivagum, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 153 = arvense.
argutum, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 260 = spumosum.
aristatum, Hornem. Hort. Hafn. ii. 712.—Hab.?
aristatum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 52, nomen; Link, Enum. Hort. Berol. ii. 262 = ligusticum.
armeniicum, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 601 = Pennyianum.
armenium, Eichw. Besch. Casp. Cauc. 28 = pannonicum.
armenium, Willd. Enum. Hort. Berol. 793.—As. Min.
arrectisetum, Brot. Phyt. Lusit. i. 152. t. 63 = ligusticum.
arvense, Linn. Sp. Pl. 769.—Europ.; As. et Afr. bor.; Oriens.
arvense, Walt. Fl. Carol. 183 = carolinianum.
arvernense, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 202 = pallescens.
arvicolum, Jord. ex Nym. Consp. 175 = arvense.
asperulum, De Not. ex Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1838) 347.—Ital.
atlanticum, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 306.—Marocc.

TRIFOLIUM:—

atropurpureum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 318 = involucratum.
Aucherii, Boiss. Fl. Orient. ii. 114 = medium.
aurantiacum, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. ii. 33.—Graecia.
aureum, Geners. Elench. Scepus. n. 69; ex Wahlenb. Fl. Carpat. 229 = badium.
aureum, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 344 = agrarium.
aureum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 385 = patens.
badium, Ledeb. Fl. Ross. i. 556 = rtydosemium.
badium, Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 16.—Europ.
baeticum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 726.—Hispan.
baeticum, Lag. ex Ser. ex DC. Prod. ii. 193 = maritimum.
Balansae, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 81.—As. Min.
Balbisanum, Ser. in DC. Prod. ii. 201.—Gallia.
barbatum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 152 = pannonicum.
barbigerum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 79.—Calif.
Beckwithii, Brewer, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 128.—Calif.
bejariense, Moric. Pl. Nouv. Am. 2.—Mexic.
benghalense, Gaertn. Fruct. ii. 335 (Hedysari sp.).—Ind. or.
berythium, Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II. ii. 15 = supinum.
Biasoletianum, Steud. & Hochst. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 173 = repens.
biceps, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 417 = Bocconi.
bicolor, Moench, Meth. 111 = hybridum.
bicornis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 139 = resupinatum.
bifidum, A. Gray, in Proc. Calif. Acad. iii. (1863) 102.—Calif.
biflorum, Linn. Sp. Pl. 773 = Stylosanthes elatior.
bifurcatum, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 353 = montanum.
bilineatum, Fresen. in Flora, xxii. (1839) 52.—Abyss.
Billardieri, Spreng. Syst. iii. 211 = comosum.
bithynicum, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 21 = medium.
Bivonac, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 512.—Sicil.
Blanchcanum, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 13 = Desvauuxii.
Bocconi, Savi, Obs. Trif. 37.—Europ.; Afr. bor.
Boissieri, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 858 (Boisseri).—Graec.; As. Min.
Bolanderi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 335.—Calif.
Bonanni, Presl, Delic. Prag. 51.—Sicil.
Boryanum, Steud. Nom. ed. II. ii. 705 = physodes.
Bourgaei, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 121 = smyrneum.
brachystylos, Knaf, in Lotos, iv. (1854) 237 = pratense.
bracteatum, Schousb. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 792.—Reg. Mediterr. occ.
Brandegi, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 130.—Am. bor. occ.
brevipes, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 680.—Chili.
Breweri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 131.—Calif.
Brittingeri, Weitenweb. ex Opiz, Natural. n. ix. (1825) 142 = arvense.
Broteri, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 262 = ligusticum.
brutium, Tenore, Viagg. Calabr. 127; Fl. Ncap. Prod. App. v. 24.—Calabria.
bullatum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 138.—Syria.
Burchellianum, Ser. in DC. Prod. ii. 200.—Afr. austr.
Buxbaumii, Sternb. & Hoppe, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. ii. (1818) 131.—Europ. austr.
caerulescens, E. Desv. ex Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 14 = Desvauuxii.
caeruleum, Auct. = coeruleum.
caespitosum, Eichw. Skizze, 166 = elegans.
caespitosum, J. F. Gmel. Syst. 1141; Willd. Sp. Pl. iii. 1359 = Thalii.
caespitosum, Sturm, Deutschl. Fl. Heft 32 = pallescens.
calabriticum, Steud. Nom. ed. II. ii. 705.—Calabria.
calocephalum, Fresen. in Flora, xxii. (1839) 50.—Abyss.
calocephalum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 318 = involucratum.
caloxanthum, Griseb. Bericht. (1847) 62 = Boissieri.
calycinum, Steud. Nom. ed. II. ii. 705.—Sicil.
campestre, Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 16 = procumbens.

TRIFOLIUM:—

canescens, Sims, Bot. Mag. t. 1168 = trichocephalum.
canescens, Willd. Sp. Pl. iii. 1369.—As. Min.
capense, Willd. l. c. 1364.—Afr. austr.
capillatum, Dum. Fl. Belg. Prod. 101.—Belgium.
capilliforme, Delile, ex Nym. Consp. 181 = filiforme.
Carmeli, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 16.—Syria.
carolinianum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 58.—Am. bor.
carpathicum, Janka, ex Nym. Consp. 173 = pratense.
cassium, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 23.—Syria.
catanense, Buek, Ind. ad DC. Prod. i. p. viii.—Sicil.
caucasicum, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 245 = pannonicum.
caudatum, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 22.—Lydia.
cernuum, Brot. Phyt. Lusit. i. 150.—Lusitan.
Cherleri, Linn. Cent. Pl. i. 24; *Amoen. Acad.* iv. 286.—Reg. Mediterr.
chilense, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 35.—Peruv.
chilense, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 16.—Chili.
chlorotrichum, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 48.—Phrygia.
chrysanthum, Gaud. Fl. Helv. iv. 603 = patens.
chrysopogon, Viv. Pl. Aegypt. Arab. Dec. 15.—Aegypt.
ciliatum, Clarke, Trav. ii. 261 = procumbens.
ciliatum, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. Ser. II. i. (1847) 152.—Am. bor. occ.
ciliolatum, Benth. Pl. Hartw. 304 = ciliatum.
ciliolum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 380 = diffusum.
cinctum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 152.—Gallia.
cinerascens, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 619 = ochroleucum.
circumdatum, Guss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 705 = calabriticum.
circumdatum, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 321.—Chili.
circumscissum, Pers. Syn. ii. 349 = diffusum.
clandestinum, Lag. Nov. Gen. et Sp. 23.—Hispan.
Clauseri, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 181 = Durandii.
Clusii, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 414 = resupinatum.
clypeatum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 436 = maritimum.
clypeatum, Linn. Sp. Pl. 769.—Graecia; As. Min.
coarctatum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 494.—Italia.
coccineum, Steud. Nom. ed. II. ii. 705.—Chili.
coerulescens, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 509 = Trigonella azurea.
coeruleum, Bieb. l. c. = Trigonella azurea.
coeruleum, Viv. Pl. Aegypt. Arab. Dec. 15.—Aegypt.
coeruleum, Willd. Sp. Pl. iii. 1352; Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 207 = Trigonella coerulea.
coespitosum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144 = Thalii.
collinum, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 5 = Bocconi.
commutatum, Ledeb. Fl. Ross. i. 543 = maritimum.
comosum, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. v. 15.—Syria.
comosum, Linn. Sp. Pl. 767 = carolinianum.
concinnum, Phil. Fl. Atac. 14 = polymorphum.
congestum, Guss. Cat. Pl. Boccad. (1821) 81, Adnot. 12 = catanense.
congestum, Link, in Linnaea, ix. (1834–35) 584 = fragiferum.
conicum, Kit. ex Nym. Consp. 176 = striatum.
conicum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 23 = Lagascanum.
conicum, Pers. in Savi, Obs. Trif. 41 = tenuiflorum.
constantinopolitanum, Ser. in DC. Prod. ii. 193 = alexandrinum.
controversum, Jan, ex DC. Prod. ii. 206 = filiforme.
cordifolium, Walp. Rep. i. 640, sphalm. = Origanum cordifolium.
Crosnierii, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 68 = polymorphum.
cryptopodium, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 168.—Abyss.
cryptoscias, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 30 = uniflorum.
Cupani, Tineo, Pl. Rar. Sicil. Pugill. i. 16 = physodes.
cuspidatum, Lour. Fl. Cochinch. 445.—Cochinch.
Cussoni, Hort. Berol. ex Spreng. Nov. Prov. 41.—Hab.?
cyathiferum, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1070.—Am. bor. occ.
cylandricum, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 249 = tenuiflorum.

TRIFOLIUM:—

cytisoides, Pall. Reise, iii. 266 = *Lespedeza juncea*.
dalmaticum, Vis. in *Flora*, xii. (1829) i. Erg. 21.—
 Europ. austr.; As. Min.
dasyphyllum, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 315.—Am.
 bor. occ.
dasyurum, Presl, *Symb. Bot.* i. 53 = *formosum*.
davuricum, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xv.
 (1771) 560. t. 30 = *Lespedeza trichocarpa*.
decipiens, Hornem. *Hort. Hafn.* ii. 719.—Hab.?
decumbens, F. Schultz, Arch. Fl. 272 = *elegans*.
densiflorum, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 619.—
 Chili.
dentatum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 41 =
Melilotus dentata.
denudatum, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i.
 (1847) 152 = *gracilentum*.
depauperatum, Desv. *Journ. Bot.* iv. (1814) 69.—Am.
 bor. occ.; Peruv.; Chili.
Desvauxii, Boiss. & Blanche, *Diagn.* Ser. II. ii. 12.—
 Syria.
dichotomum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 330 =
Macraei.
dichroanthum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ix. 20.—Palaestin.
diffusum, Ehrh. *Beitr.* vii. (1792) 165.—Europ.;
 Tauria.
diffusum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136 = *capense*.
dimidiatum, Salisb. Prod. 333 = *T. Lupinaster*.
dipsaceum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 382 = *ochroleucum*.
divaricatum, Hornem. *Hort. Hafn.* ii. 715.—Europ.
 austr.
diversifolium, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i.
 (1847) 152 = *amplectens*.
dubium, Sibth. *Fl. Oxon.* 231.—Europ.
duodecimnerve, Losc. ex Willk. & Lange, Prod. Fl.
 Hisp. iii. 357 = *glomeratum*.
Durandoi, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 181.—Alger.
echinatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 216 = *supinum*.
echinatum, Wierzb. ex Nym. Consp. 175 = *reclinatum*.
Ehrenbergii, Hort. Berol. ex Sweet, *Hort. Brit.* ed. II.
 137.—Aegypt.
elegans, Savi, *Fl. Pis.* ii. 161. t. 1. f. 2.—Reg.
 Mediterr.; As. Min.; Afr. bor.
elongatum, Willd. Sp. Pl. iii. 1368 = *armenium*.
Endressi, J. Gay, ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 417 =
montanum.
erectum, Poir. Encyc. viii. 28 = *procumbens*.
erectum, Walt. Fl. Carol. 184 = *Rhynchosia tomentosa*.
erinaceum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 510 = *phleoides*.
eriocephalum, Ledeb. Fl. Ross. i. 541 = *arvense*.
eriocephalum, Nutt. in Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i.
 313.—Am. bor. occ.
eriocephalum, Parry, in Am. Natural. ix. (1875) 269,
 partim = *longipes*.
eriosphoerum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ix. 25.—Palaestin.
erubescens, Fenzl, *Pugill. Fl. Nov. Syr.* 5.—Oriens.
erythraeum, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi.
 (1878) 420 = *isthmocarpum*.
eximium, Steph. ex Ser. in DC. Prod. ii. 203.—Sibir.
 ural.
expansum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 263 =
pratense.
fabaceum, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 705 (Quid?).
 —Calif.
filicaule, Boiss. & Heldr. *Diagn.* Ser. I. ix. 24.—
 Graecia.
filiforme, Linn. Sp. Pl. 773, pro maj. parte.—Europ.;
 Reg. Cauc.
filiforme, Linn. l. c., partim = *dubium*.
fimbriatum, Lindl. in Bot. Reg. t. 1070 = *involutum*.
fistulosum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 86 = *hybridum*.
flavescens, Tineo, Pl. Rar. Sicil. Pugill. i. 15 =
pallidum.
flavicans, Link, Handb. ii. 170 = *squarrosus*.
flavum, Presl, *Fl. Sic.* p. xxi.—Sicil.
Fleischeri, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii.
 705; et ex Presl, Bot. Bemerk. 52.—As. Min.
flexicaule, Vill. Prosp. 43 = *medium*.
flexuosum, Jacq. Fl. Austr. iv. 45. t. 386 = *medium*.
fuminense, Vell. Fl. Flum. 316; vii. t. 143 =
Stylosanthes guianensis.
folliculatum, Lam. Fl. Fr. ii. 599 = *spumosum*.
formosum, Curt. ex DC. Prod. ii. 200 = *resupinatum*.
formosum, Savi, Obs. Trif. 102 = *elegans*.
formosum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822)
 350.—Graecia; Oriens.

VOL. II.

TRIFOLIUM:—

fragiferum, Linn. Sp. Pl. 772.—Europ.; Oriens; Reg.
 Himal.
frigidum, Schur, Enum. Pl. Transs. 154 = *pratense*.
fruticans, Linn. Sp. Pl. 770 = *Psoralea bracteata*.
fucatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1883.—Am. bor. occ.
fulcratum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 26 = *Pignanti*.
fuscum, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828) 330
 = *agrarium*.
galilaeum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ix. 26 = *nervulosum*.
Gambelii, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847)
 151 = *fucatum*.
gemellum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 437 = *Bocconci*.
gemellum, Pourr. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1376.—Hispan.
gemellum, Savi, in Atti Acc. Ital. i. 202; ex Bertol.
 Fl. Ital. viii. 152 = *ligusticum*.
glabellum, Presl, *Fl. Sic.* p. xxi.—Europ. austr.
glabrum, J. Gay, ex Nym. Consp. 175 = *maritimum*.
glaciale, Porc. in Magyar Növényt. Lapok, ix. (1885)
 126 = *pallescent*.
glaciale, Reyner, ex J. F. Gmel. Syst. 1141; DC. Prod.
 ii. 197 = *saxatile*.
glanduliferum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ix. 30.—As. Min.
glareosum, Dum. Fl. Belg. 100 = *pratense*.
glareosum, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 35; Boiss.
 Voy. Bot. Espagne, Suppl. 727 = *pallescent*.
glaucum, Haussk. ex Nym. Consp. 180 = *Lagrangei*.
globosum, Linn. Sp. Pl. 767.—Byzant.; As. Min.
globosum, Ser. in DC. Prod. ii. 196 = *radiosum*.
glomeratum, Linn. Sp. Pl. 770.—Europ. occ.; Reg.
 Mediterr.; Oriens.
goniocarpum, Lojac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xv.
 (1883) 145.—Mexic.
gracile, Thuill. Fl. Par. ed. II. 383 = *arvense*.
gracilentum, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 316.—Am.
 bor. occ.
gracum, Griseb. Bericht. (1847) 62 = *speciosum*.
grandiflorum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 16 =
polymorphum.
grandiflorum, Ledeb. Fl. Alt. iii. 257 = *eximium*.
grandiflorum, Schreb. in Nov. Act. Nat. Cur. iii. (1767)
 477.—Ins. Creta.
Grayi, Lojac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883)
 189.—Calif.
guianense, Aubl. Pl. Gui. ii. 776 = *Stylosanthes*
guianensis.
Gussoni, Tineo, Pl. Rar. Sicil. Pugill. i. 17 =
speciosum.
gymnocarpum, Nutt. in Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i.
 320.—Am. bor. occ.
hamosum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 207 = *Trigonella*
spicata.
Haussknechtii, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 125.—Mesopot.
Haydenii, Porter, in Hayd. Rep. (1871) 480 = *Kingii*.
Haynaldi, Meynh. *Kalocsa Vidék. Növényt.* 65; et ex
Knapp, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 103.—
 Europ.
Haynaldianum, Pantoc. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii.
 (1878) 382.—Europ.
hedysaroides, Pall. Reise, iii. 751 = *Lespedeza juncea*.
Hemsleyi, Lojac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883)
 143.—Mexic.
heterodon, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 318 =
involutum.
heterophyllum, Tratt. Arch. Gew. i. 26; Lej. Rev. Fl.
 Spa, 158 = *pratense*.
hirsutum, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 91 =
africanum.
hirsutum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136.—Afr. austr.
hirtum, All. Auct. Fl. Pedem. 20.—Reg. Mediterr.;
 As. Min.
hispidissimum, Michx. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 706
 = *Stylosanthes elatior*.
hispidum, Desf. Fl. Atlant. ii. 200 = *hirtum*.
Hohenackeri, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 55, in nota =
canescens.
Humboldtianum, A. Br. & Aschers. in Ind. Sem.
Hort. Berol. (1868) 24.—Reg. Cauc.
Humboldtii, Spreng. Syst. iii. 213 = *amabile*.
humile, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 306.—Marocc.
hybridum, Linn. Sp. Pl. 766.—Europ. austr.; As. Min.
hybridum, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 330 = *elegans*.
hybridum, Savi, Fl. Pis. ii. 90 = *nigrescens*.
hygrophilum, Boiss. *Diagn.* Ser. II. ii. 18 = *Petrisavii*.
incanum, Presl, Delic. Prag. 51 = *Cherleri*.
incarnatum, Linn. Sp. Pl. 769.—Europ. austr.
incarnatum, Steph. Enum. Stirp. Mosq. 33. n. 500 =
alpestre.

TRIFOLIUM:—

indecorum, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 67 =
polymorphum.
indicum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136 = *Melilotus*
indica.
intermedium, Guss. Cat. Pl. Boccad. (1821) 82. Adnot.
 14.—Reg. Mediterr.
intermedium, Lapeyr. Suppl. Hist. Pl. Pyr. 115 =
hybridum.
intertextum, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 706 =
Medicago intertexta?
involutum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 283 = *fragi-*
ferum.
involutum, Lam. Fl. Fr. ii. 604 = *Cherleri*.
involutum, Ortega, Hort. Matr. Dec. 33; Willd. Sp.
 Pl. iii. 1372.—Am. bor. occ.
involutum, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 28 =
tridentatum.
irregulare, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 331
 = *maritimum*.
isthmocarpum, Brot. Phyt. Lusit. i. 148. t. 61.—Reg.
 Mediterr. occ.
italicum, Boiss. Fl. Orient. ii. 107, 1153 (Index) =
Melilotus italica.
jaminianum, Boiss. & Reut. *Diagn.* Ser. II. ii. 19 =
isthmocarpum.
Kingii, S. Wats. in Bot. King's Rep. v. 59.—Calif.
Kitaibelianum, Ser. in DC. Prod. ii. 194 = *striatum*.
Kochianum, Hayne, in Schrad. Neues Journ. ii. (1807)
 337 = *Melilotus dentata*.
laevigatum, Poir. Voy. Barb. ii. 219 = *strictum*.
Lagascanum, Ser. in DC. Prod. ii. 194.—Hab.?
lagopinum, Jord. Pugill. Pl. Nov. 57 = *arvense*.
lagopinum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)
 136 = *T. Lagopus*.
Lagopus, Gouan, Fl. Monsp. 105 = *arvense*.
Lagopus, Pourr. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1365.—
 Hispan.; Pyren.
Lagrangei, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 154.—Archip.;
 Graecia.
laguroides, Pourr. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 261
 = *hirtum*.
lanatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136.—Afr. austr.
lappaceum, Linn. Sp. Pl. 768.—Reg. Mediterr.;
 Oriens.
lasioccephalum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 262 =
hirtum.
latinum, Sebast. Pl. Rom. fasc. i. 7. t. 1. f. 2.—Europ.
 austr. occ.; Syria.
laxiusculum, Boiss. & Blanche, *Diagn.* Ser. II. ii. 13 =
Desvauxii.
leicocalycinum, Boiss. & Sprun. l. c. Ser. I. ii. 31.—
 Graecia.
Lemmoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 127.
 —Calif.
leptocephalum, Wallr. in *Linnaea*, xiv. (1840) 620
 (Beitr. Fl. Hercyn. 250).—Europ. centr.
leucanthum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 214.—Europ.
 austr.; As. Min.
leucophaeum, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc.
 xvi. (1878) 418 = *bracteatum*.
libanoticum, Ehrenb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 137
 = *globosum*.
ligusticum, Balb. in Mem. Acc. Torin. xxiii. (1818)
 112, nomen; et ex Savi, Obs. Trifol. 38.—Reg.
 Mediterr.
limonium, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 679 =
repens.
litigiosum, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828)
 329 = *spadiceum*.
littorale, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 153 =
arvense.
longepedunculatum, Steud. Nom. ed. II. ii. 706 =
squarrosus.
longestipulatum, Ebel, Monteneg. 84. t. 4. f. 2 =
patulum.
longestipulatum, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 122 =
squarrosus.
longipedunculatum, Loisel. ex Bull. Sc. Anger (1828),
 425 (err. typ.) = *praeac*.
longipes, Nutt. in Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 314.—
 Am. bor. occ.
longisetum, Boiss. & Bal. *Diagn.* Ser. II. vi. 47 =
arvense.
lucanicum, Gasp. in Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 494 =
dalmaticum.
lucidum, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi.
 (1878) 419 = *strictum*.

7 C

TRIFOLIUM:—

- ludovicianum*, Rafin. Fl. Ludov. 102 (Quid?).—Am. bor.
Lupinaster, [Habl.] Desc. Taur. 187; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 221 = *Dorycnium suffruticosum*.
Lupinaster, Linn. Sp. Pl. 766.—Sibir.
Lupinaster, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 95 = *patulum*.
lupinastrium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *T. Lupinaster*.
lupulinum, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 557 = *procumbens*.
lupulinum, Savi, Fl. Pis. ii. 171 = *Medicago lupulina*.
luteolum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 179 = *dubium*.
luteum, Lam. Fl. Fr. ii. 604 = *filiforme*, *procumbens*.
luxurians, Hort. Par. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 706 = *repens*.
Macraei, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 179.—Am. bor. occ.; Chili.
macrocalyx, Hook. Ic. Pl. t. 285 = *bejariense*.
macrocephalum, Poir. Encyc. Suppl. v. 336 = *megacephalum*.
macrocephalum, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 421 = *fragiferum*.
macropodum, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 338 = *Michelianum*.
macropodum, Steud. Nom. ed. II. ii. 706.—Sicil.
macrorrhizum, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 80 = *repens*.
macrorrhizum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 24 = *Melilotus officinalis*.
maculatum, Host, Fl. Austr. ii. 373.—Sicil.
magellanicum, Poir. Encyc. viii. 25 = *Oxalis erio-carpa*.
magnum, Gueldenst. Reisen, i. 426.—Transcauc.
malacanthum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 261 = *leucanthum*.
maritimum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 284.—Europ. occ.; Reg. Mediterr.
mariscum, Tenore, Syll. 620; ex Walp. Rep. ii. 850.—Europ.
Matthewsii, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 398.—Peruv.
mauritanicum, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 420 = *isthmocarpum*.
mauritanicum, Willd. Sp. Pl. iii. 1354 = *Melilotus sulcata*.
mauritanum, Steud. Nom. ed. I. 849; ed. II. ii. 706 = *Melilotus mauritanica*.
mediterraneum, Vell. Fl. Flum. 317; vii. t. 144.—Bras.
medium, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 25 = *patulum*.
medium, Linn. Faun. Suec. ed. II. 558, nomen; Huds. Fl. Angl. ed. I. 284.—Europ.; As. bor.
meduseum, Blanche, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 134.—Syria.
megacephalum, Nutt. Gen. Am. ii. 105.—Am. bor. occ.
megalanthum, Steud. Nom. ed. II. ii. 706 = *polymorphum*.
melananthum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 331 = *tridentatum*.
Melilotus, Georgi, Reise, i. 227 = *Melilotus alba*.
Melilotus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 538 = *Melilotus officinalis*.
Melilotus, Linn. Sp. Pl. ed. I. 764 = *Melilotus indica*.
Melilotus-caerulea, Linn. l. c. = *Trigonella caerulea*.
Melilotus-corniculata, Linn. l. c. 766 = *Melilotus italica*.
Melilotus-cretica, Linn. l. c. 765 = *Trigonella cretica*.
Melilotus-indica, Linn. l. c. = *Melilotus mauritanica*.
Melilotus-italica, Brot. Fl. Lusit. ii. 102 = *Melilotus mauritanica*?
Melilotus-italica, Linn. Sp. Pl. 765 = *Melilotus italica*.
Melilotus-mauritanica, Schousb. Vextr. Marokko, 196 = *Melilotus mauritanica*.
Melilotus-officinalis, Linn. Sp. Pl. 765 = *Melilotus officinalis*.
Melilotus-officinarum, Crantz, Inst. ii. 41 = *Melilotus officinalis*.
Melilotus-ornithopodioides, Linn. Sp. Pl. 766 = *Trigonella ornithopodioides*.
Melilotus-polonica, Linn. l. c. 765 = *Melilotus polonica*.
Melilotus-segetalis, Brot. Fl. Lusit. ii. 484 = *Melilotus sulcata*?
Melilotus-tauricum, Bieb. Fl. Taur. iii. 506 = *Melilotus gracilis*.
Meneghinianum, Clem. in Mem. Acc. Sc. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 267.—Byzant.; Syria.
mesogitanum, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 34 = *brutium*.

TRIFOLIUM:—

- messanense*, Hill, Veg. Syst. xxii. 35 = *seq.*?
messanense, Linn. Mant. ii. 275 = *Melilotus messanensis*.
mexicanum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 233.—Mexic.
Michelianum, Gaud. Fl. Helv. iv. 573 = *hybridum*.
Michelianum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 174 = *Meneghinianum*.
Michelianum, Savi, Fl. Pis. ii. 159.—Europ. austr.
micranthum, Viv. Fl. Lib. Spec. 45. t. 19. f. 3 = *filiforme*.
microcephalum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 478.—Am. bor. occ.
microdon, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 180.—Am. bor. occ.; Chili.
micropetalum, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. i. 90 = *stipulaceum*.
microphyllum, Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 316 = *pratense*.
minimum, Barton, Comp. Fl. Philad. ii. 74 = *procumbens*.
minus, Relhan, Fl. Cantab. ed. II. 290 = *dubium*.
minutum, Coss. Notes Crit. 5 = *cernuum*.
modestum, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 27.—Syria.
Molinerii, Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) App. i. 17 = *incarnatum*.
molybdocalyx, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xxii. 77. t. 2167 = *Petrisavii*.
monanthum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 523.—Calif.
montanum, Linn. Sp. Pl. 770.—Europ. austr.; As. bor.
montanum, Linn. l. c. 772 = *spadicum*.
moriferum, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 28 = *xerocephalum*.
mucronatum, Willd. Sp. Pl. iii. 1372.—Mexic.
multicaule, M. Jones, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 31.—Calif.
multinerve, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 175.—Abyss.
multistriatum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 190.—Dalmat.; Graecia.
mutabile, Portenschl. Enum. Pl. Dalm. 16.—Europ. austr.
Mutellii, Gren. in Acad. Sc. Besanç. Séances Publ. (1838) 127.—Alger.
nanum, Torr. in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 35. t. 3. f. 4.—Am. bor. occ.
neglectum, Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. Suppl. 21 = *fragiferum*.
neglectum, Noë, ex Nym. Consp. 178 = *repens*.
neolagopus, Lojac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883) 194.—Calif.
nervosum, Presl, Fl. Sic. p. xxi.—Europ. austr.
nervulosum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. ix. 25.—As. Min.; Syria.
nevadense, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 17.—Hispan.
nidificum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 32 = *radiosum*.
nigrescens, Viv. Fragm. Fl. Ital. 12. t. 13.—Europ. austr.
nigrocinctum, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. vi. 47 = *maritimum*.
nigrolineatum, Wahlenb. in Bergg. Resor. ii. Bihang, 42; et in Oken, Isis, xxi. (1828) 992.—Thracia.
nigropunctatum, G. Don, Gen. Syst. ii. 181 = *nigrolineatum*.
nivale, Arv. Ess. Pl. Dauph. 23 (Quid?).—Gallia.
nivale, Sieber, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 168 = *pratense*.
Noëanum, Reichb. ex Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. ed. III. v. 265 = *incarnatum*.
noricum, Wulf. in Roem. Arch. iii. (1805) 387.—Europ. austr.
nothum, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 137 = *repens*.
Nuttallii, Steud. Nom. ed. II. ii. 707 = *tridentatum*.
obcordatum, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 76 = *polymorphum*.
oblongifolium, Ser. in DC. Prod. ii. 197.—Hispan.
obscurum, Savi, Obs. Trif. 31. f. 1 = *leucanthum*.
obtusiflorum, Hook. Ic. Pl. t. 281 = *tridentatum*.
obvallatum, Moench, Meth. 112 = *Cherleri*.
ochreatum, Kunze, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 707.—Chili.
ochroleucum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 283.—Europ.; Oriens.
ochroleucum, Rostk. & Schmidt, Fl. Seden. 302 = *scabrum*.
ochroleucum-magnum, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 545 = *canescens*.
odoratum, Schrank, Baier. Fl. ii. 286 = *montanum*?

TRIFOLIUM:—

- officinale*, Willd. Sp. Pl. iii. 1355 = *Melilotus officinalis*.
oliganthum, Steud. Nom. ed. II. ii. 707 = *pauciflorum*.
Oliverianum, Ser. in DC. Prod. ii. 197 = *globosum*.
olympicum, Hornem. ex Hook. Bot. Mag. t. 2790 = *armenium*.
ornatum, Clarke, Trav. iii. 336.—Ins. Cos.
ornithopodioides, Sm. Fl. Brit. iii. 782 = *Trigonella ornithopodioides*.
Orphanideum, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 17 = *repens*.
Otonis, Sprun. ex Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 28.—Graecia.
ovatifolium, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 51 = *physodes*.
oxaloides, Bunge, ex Nym. Consp. 177 = *subterraneum*.
oxypetalum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 51 = *carolinianum*.
oxypetalum, Nym. Consp. 1036 = *hirtum*.
oxypetalum, Heldr. & Sart. ex Nym. l. c. 174 = *hirtum*.
palacstinum, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 21.—Palestin.
palavicum, Hochst. in Lorent. Wanderungen, 346 = *purpureum*.
pallescens, DC. Fl. Fr. Suppl. 555 = *nigrescens*.
pallescens, Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 15.—Europ. austr.
pallidulum, Jord. Pugill. Pl. Nov. 56 = *ochroleucum*.
pallidum, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 50. t. 23 = *Pignantii*.
pallidum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 35. t. 36.—Reg. Mediterr.
pallidum, Webb, ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 418 = *bracteatum*.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 132.—Calif.
palustre, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 295 = *Melilotus mauritanica*?
pamphylicum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. ix. 20.—As. Min.
pannonicum, Jacq. Obs. Bot. ii. 21.—Europ.; Oriens.
pannonicum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 98 = *armenium*.
panormitanum, Presl, Fl. Sic. p. xxi.—Reg. Mediterr. et Casp.
paradoxum, Steud. Nom. ed. II. ii. 707.—Chili.
parisiense, DC. Fl. Fr. Suppl. 562 = *patens*.
Parnassi, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. ii. 30.—Graecia.
Parnassi, Orph. ex Nym. Consp. 178 = *repens*.
Parryi, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 409.—Am. bor. occ.
parviflorum, Ehrh. Beitr. vii. (1792) 165.—Reg. Mediterr.; As. Min.
parviflorum, Perrey. Pl. Frej. 84 = *Perreymondi*.
parvifolium, Bunge, ex Nym. Consp. 180 = *dubium*.
patens, Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 16.—Europ. austr.
patulum, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 245.—Dalmat.; Graecia.
pauciflorum, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 319.—Am. bor. occ.
pauciflorum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 350 = *globosum*.
pauciflorum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 707 = *amabile*.
pectinatum, Willd. ex Steud. l. c. = *arvense*.
Pennyianum, Steud. l. c.—Armenia.
pensylvanicum, Willd. Enum. Hort. Berol. 793 = *medium*.
Perreymondi, Coss. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 356 = *cernuum*.
Perreymondi, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 422.—Hispan.
peruvianum, Vog. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. (1843) 12.—Peruv.
Petitianum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 168.—Abyss.
Petitpierreanum, Hayne, in Schrad. Neues Journ. ii. (1807) 337 = *Melilotus mauritanica*.
Petrisavii, Clem. in Mem. Acc. Sc. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 268.—Byzant.; As. Min.
phlebocalyx, Fenzl, ex Tchihat. Asie Min. Bot. i. 29 = *Cherleri*.
phleoides, Pourr. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1377.—Reg. Mediterr.
physanthum, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 180.—Chili.
physodes, Eichw. Skizze, 166 = *fragiferum*.
physodes, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 217.—Europ. austr.; Oriens.

TRIFOLIUM:—

- physopetalum*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 47 = fucatum.
pictum, Roth, Catalect. fasc. ii. 101 = hirtum.
Pignanti, Fauché & Chaub. in *Expéd. Morée Bot.* 219.—Græcia; Dalmat.
Pignati, Steud. Nom. ed. II. ii. 707, sphalm. = præc.
piliferum, Straub. ex Nym. Consp. 176 = formosum.
pilulare, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 29.—As. Min.; Syria.
platycephalum, Bisch. Del. Sem. Hort. Heidelb. (1839).—Cf. Linnaea, xiv. (1840) Litt. 132 = reflexum.
plebeium, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ix. 23.—Syria.
plicatum, Presl, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 137 = speciosum.
Plummeri, Lemmon, ex Lojac. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xv. (1883) 162.—Calif.
plumosum, Dougl. ex Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 130.—Am. bor. occ.
polyanthemum, Tenore, ex DC. *Prod.* ii. 200 = hybridum.
polyccephalum, Ser. in *DC. l. c.* 196.—Afr. austr.
polymorphum, Poir. *Encyc.* viii. 20.—Reg. Magellan.
polyphyllum, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 139.—Reg. Cauc.
polyphyllum, Nutt. in Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* 319 = tridentatum.
polystachyum, Fresen. in *Flora*, xxii. (1839) 50.—Abyss.
potosanum, Lojac. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xv. (1883) 144.—Mexic.
praecox, Wallr. in *Linnaea*, xiv. (1840) 621 (*Beitr. Fl. Hercyn.* 251).—Europ.
praetutianum, Guss. *Pl. Rar. Sic.* 308.—Italia.
pratense, Linn. *Sp. Pl.* 768.—Europ.; As. temp.
Preslianum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 25 = arvense.
procerum, Rochel, *Pl. Banat. Rar.* 50 = reclinatum.
procumbens, Linn. *Sp. Pl.* 727, partim = dubium.
procumbens, Linn. *l. c.*—Europ.; Afr. et As. bor.
procumbens, Pollich, *Hist. Pl. Palat.* ii. 345 = filiforme.
prostratum, Biasol. ex Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I. 173 = repens.
prostratum, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 22.—Afr. austr.
prostratum, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 29 = Petri-savii.
prutetianum, Ser. in *DC. Prod.* ii. 202, sphalm. = praetutianum.
Pseudo-procumbens, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iii. 240 = procumbens.
psoraloides, Walt. *Fl. Carol.* 184 = Psoralea meliloides.
purpurascens, Fisch. ex Loud. *Hort. Brit.* 300; G. Don, *Gen. Syst.* ii. 192.—Sibir.
purpurascens, Roth, *Catalect. Bot. fasc.* iii. 74 = diffusum.
purpureum, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 86 = pratense.
purpureum, Gueldenst. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 546 = alpestre.
purpureum, Loisel. *Fl. Gall.* ed. I. 484. t. 14.—Europ.; Oriens; As. bor.
purpureum-majus, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 87 = alpestris.
pyrenaicum, Pourr. in *Mém. Acad. Toul.* iii. (1788) 331.—Mont. Pyren.
Quartinianum, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 169.—Abyss.
radiatum, Delile, *Fl. Aeg. Illustr.* 70, nomen.—Aegypt.
radicosum, Boiss. & Hohen. *Diagn.* Ser. I. ix. 27.—Persia.
radiosum, Wahlenb. in *Bergg. Resor.* ii. Bihang, 43; et in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 992.—Thracia.
reclinatum, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 21 = leucanthum.
reclinatum, Waldst. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* iii. 299. t. 269.—Hungar.
recurvum, Waldst. & Kit. *l. c.* ii. 179. t. 165 = vesiculosum.
reflexum, Linn. *Sp. Pl.* 766.—Am. bor.
reflexum, Pourr. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 356 = cernuum.
reflexum, Roem. ex Scheele, in *Linnaea*, xxi. (1848) 460 = amphianthum.
reflexum, Schlecht. & Cham. *l. c.* v. (1830) 576 = Schiedeianum.
reflexum, Ser. in *DC. Prod.* ii. 197 = reclinatum.
repens, Linn. *Sp. Pl.* 767.—Geront. bor. temp.
repens, Walt. *Fl. Carol.* 183 = carolinianum?

TRIFOLIUM:—

- resupinatum*, Less. in *Linnaea*, ix. (1834) 175 = fragiferum.
resupinatum, Linn. *Sp. Pl.* 771.—Europ. occ.; Reg. Mediterr.
resupinatum, Willk. in *Flora*, xxxiv. (1851) 628 = Bonani.
rhombeum, S. Schau. in *Linnaea*, xx. (1847) 740.—Mexic.
rigidum, Savi, *Fl. Pis.* i. t. 1. f. 1; ii. 154 = maritimum.
rigidum, Schrad. ex Steud. *Nom. ed.* I. 850 = villosum, Seenus.
rivale, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 70 = polymorphum.
rivale, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 708, in syn., sphalm. = rivale, Sieber.
rivulare, Boiss. & Bal. *Diagn.* Ser. II. vi. 49.—Cappadoc.
Roemerianum, Scheele, in *Linnaea*, xxi. (1848) 460 = amphianthum.
roseum, Presl, *Delic. Prag.* 50 = ochroleucum.
rotundatum, Ser. in *DC. Prod.* ii. 200.—Hab.?
rotundifolium, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélop.* 50 = filicale.
rotundifolium, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* viii. 35. t. 747.—Græcia.
Roussaeum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 26 = Desvauxii.
Rouxii, Gren. in *Mém. Soc. Emul. Doubs*, Sér. III. ii. (1858) 413 = isthmocarpum.
rubellum, Jord. *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 57 = arvense.
rubens, Aubry, *Fl. Morb.* 56; ex DC. *Fl. Fr. Suppl.* 556 = incarnatum.
rubens, [Habl.] *Desc. Taur.* 24; ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 211 = alpestre.
rubens, Linn. *Sp. Pl.* 768.—Europ. austr.
rubicundum, Schousb. ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 420 = isthmocarpum.
Rueppellianum, Fresen. in *Flora*, xxii. (1839) 51.—Abyss.
rupestre, Tenore, ex Ser. in *DC. Prod.* ii. 201.—Italia.
rupestre, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* p. xliii = montanum.
rytidosemum, Boiss. & Hohen. *Diagn.* Ser. I. ix. 29.—Reg. Cauc.; Persia.
sabuletorum, Jord. ex Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 153 = arvense.
sarosiense, Hazsl. ex Neilr. *Diagn. Gefaesspfl.* 35.—Hungar.
sativum, Crome, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 222 = pratense.
Savianum, Guss. *Fl. Sic. Prod.* ii. 488 = uniflorum.
saxatile, All. *Fl. Pedem.* i. 305. t. 59. f. 3.—Europ.
scabrum, Linn. *Sp. Pl.* 770.—Reg. Mediterr.; Oriens.
scabrum, Pollich, *Hist. Pl. Palat.* ii. 338 = striatum.
Schiedeanum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 339.—Mexic.
Schimperi, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 173.—Abyss.
Schreberi, Jord. ex Reut. *Cat. Pl. Genève.* ed. II. 49 = procumbens.
sclerorrhizon, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ix. 28 = physodes.
scutatum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 27.—As. Min.; Syria.
Sebastiani, Savi, in *Diar. Med. Flajani*, (1815); ex Sebast. *Rom. Pl. fasc.* ii. 14.—Ital.; Reg. Casp.
semiglabrum, Brot. *Phyt. Lusit.* i. 155 = Bocconi.
semipilosum, Fresen. in *Flora*, xxii. (1839) 52.—Abyss.
serrulatum, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 23 = cernuum.
setiferum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 32.—As. Min.
sibiricum, Gueldenst. *Reisen*, ii. 327; ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 558 (Quid?).—Sibir.
siculum, Presl, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 708.—Sicil.
simense, Fresen. in *Flora*, xxii. (1839) 49.—Abyss.
simplex, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 69 = polymorphum.
simplicifolium, Walt. *Fl. Carol.* 184 = Rhynchosisia tomentosa.
smyrnaeum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 25.—As. Min.; Mesopot.
spadiceum, Linn. *Fl. Suec.* ed. II. 261.—Europ.; As. Min.
spadiceum, Thuill. *Fl. Par.* ed. II. 385 = procumbens.
spadiceum, Vell. *Fl. Delph.* 80; *Hist. Pl. Dauph.* iii. 491 = badium.
speciosum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ii. 33 = Boissieri.
speciosum, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélop.* 51 = aurantiacum.

TRIFOLIUM:—

- speciosum*, Marg. & Reut. *Fl. Zante*, 41 = patens.
speciosum, Ser. in *DC. Prod.* ii. 205 = comosum.
speciosum, Willd. *Sp. Pl.* iii. 1382.—Sicil.; Graec.; Oriens.
sphaerocephalum, Desf. *Fl. Atlant.* ii. 201 = Cherleri.
spicatum, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* viii. 32. t. 743 = Melilotus gracilis.
spinulosum, Dougl. ex Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 133 = involucreatum.
spumosum, Linn. *Sp. Pl.* 771.—Reg. Mediterr.
squarrosus, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 214.—Reg. Cauc.
squarrosus, DC. *Fl. Fr.* iv. 531 = panormitanum.
squarrosus, Linn. *Sp. Pl.* 768.—Europ. austr.
squarrosus, Schousb. ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 418 = maritimum.
stellatum, Huds. *Fl. Angl.* ed. II. 326 = maritimum.
stellatum, Linn. *Sp. Pl.* 769.—Reg. Mediterr.; Oriens.
stellatum, Pall. *Tabl. Taur.* 56 = leucanthum.
stenophyllum, Boiss. *Diagn.* Ser. I. ix. 30.—Palaestin.
stenophyllum, Nutt. in *Journ. Acad. Philad. N. S.* i. (1847) 151 = depauperatum.
Steudneri, Schweinf. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xviii. (1868) 652.—Afr. trop.
stipitatum, Boiss. & Bal. ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 149.—As. Min.
stipitatum, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* ii. 71 = repens.
stipulaceum, Lapeyr. *Suppl. Hist. Abr. Pl. Pyr.* 116 = maritimum.
stipulaceum, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 136.—Afr. austr.
stoloniferum, Muhl. *Cat.* 70.—Am. bor.
stramineum, Guss. ex Tenore, *Syll. Fl. Neap.* 372 = tenuifolium.
stramineum, Presl, *Fl. Sic.* p. xx = incarnatum.
strepens, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. II. fasc. v. 411 = agrarium.
striatum, Linn. *Sp. Pl.* 770.—Europ. austr.; As. Min.
strictum, Linn. *Cent. Pl.* i. 24; *Amoen. Acad.* iv. 285.—Europ.; Reg. Mediterr.
strictum, Schreb. in *Sturm, Fl. Deutschl. Heft* 15 = parviflorum.
suaveolens, Willd. *Enum. Hort. Berol.* i. 108; *Suppl.* 52 = resupinatum.
subcaulescens, A. Gray, in *Ives, Rep. Colorado River*, Bot. 10 = gymnocarpon.
subcaulescens, S. Wats. *Bot. King's Exped.* 59, partim = longipes.
subexpansum, Schur, in *Verh. Naturf. Ver. Bruenn*, xv. ii. (1877) 177 = medium.
subrotundum, Steud. & Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 32; et ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 172.—Abyss.
subterraneum, Linn. *Sp. Pl.* 767.—Reg. Mediterr.; Oriens.
subulatum, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 96 = montanum.
succinctum, Vis. in *Flora*, xii. (1829) i. *Erg.* 21 = cinctum.
suffocatum, Linn. *Mant.* ii. 276.—Europ. occ.; Reg. Mediterr. et Cauc.
sulphureum, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 63 = armenium.
supinum, Savi, *Obs. Trif.* 46. f. 2.—Europ.; Oriens.
sylvaticum, Gérard, ex Loisel. in *Desv. Journ. Bot.* ii. (1809) 367.—Gall. austr.
tauricum, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* iii. 506 = Melilotus gracilis.
tembense, Fresen. in *Flora*, xxii. (1839) 51.—Abyss.
Tenoreanum, Boiss. & Sprun. *Diagn.* Ser. I. ii. 26 = tenuifolium.
Tenoreanum, Buek, *Ind. ad DC. Prod.* i. p. viii = montanum.
tenuis, Clem. in *Atti 3a Riun. Sc. Ital.* (1841) 521.—Bras.
tenuis, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 52, nomen.—Hab.?
tenuiflorum, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* p. xlv.—Europ. austr.
tenuifolium, Tenore, *l. c.*—Italia.
Thalii, Vill. *Prosp.* 43; *Hist. Pl. Dauph.* i. 289; iii. 478.—Mont. Pyren.
thymiflorum, Vill. *ll. cc.* 43; iii. 487 (*thimiflorum*) = saxatile.
tmoleum, Boiss. ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 141 = glanduliferum.
tomentosum, Linn. *Sp. Pl.* 771.—Reg. Mediterr.
tomentosum, Willk. ex Nym. *Consp.* 177 = Bonani.
transsilvanicum, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 154, 157 = pratense.

TRIFOLIUM :—

triaristatum, *Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin.* xxxvii. (1834) 54. t. 3.—Chili.
 trichocephalum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 212.—Reg. Cauc.
trichocephalum, Bieb. l. c., partim = canescens.
 trichopterum, *Panč. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, vi. (1856) 480.—Banat.
 trichostomum, *Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.)* i. (1853) 427.—Hab. ?
 tricuspidatum, *Bert. ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 708.—Chili.
tridentatum, Hort. Berol. ex Steud. l. c. = Wormskioldii.
 tridentatum, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1070.—Am. bor. occ.
triste, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 318 = involucrellum.
 tumens, *Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 217.—Reg. Cauc.; Persia.
tumescens, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 91 = agrarium.
turgidum, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 216 = vesiculosum.
 umbellatum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 172.—Abyss.
umbellatum, Losc. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 355 = repens.
umbellatum, Ser. in DC. *Prod.* ii. 199 = carolinianum.
umbellulatum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 172.—Abyss.
 uniflorum, *Linn. Sp. Pl.* 771.—Europ. austr.
unifolium, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 140 = Psoralea corylifolia.
vaginatum, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* 51; ex Ser. in DC. *Prod.* ii. 195 = pratense.
Vaillantii, Bieb. ex Fisch. *Cat. Hort. Gorenk.* (1808) 111, nomen = ambiguum.
Vaillantii, Loisel. in *Desv. Journ. Bot.* ii. (1809) 365 = Michelianum.
Vaillantii, Poir. *Encyc.* viii. 4 = elegans.
Vaillantii, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* p. xlv = hybridum vel nigrescens.
variabile, Guss. ex DC. *Prod.* ii. 197 = leucanthum.
variegatum, Nutt. in Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 317 = pauciflorum.
 ventricosum, *Presl, ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 708.—Sicil.
venulosum, Royle, ex Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 86 = repens.
 vernum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1872) 687.—Chili.
 versicolor, *Steud. Nom.* ed. II. ii. 708.—Chili.
 vesiculosum, *Savi, Fl. Pis.* ii. 165.—Europ. austr.; Reg. Cauc.
villosum, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 89 = arvense.
villosum, *Presl, Delic. Prag.* 48.—Sicil.
villosum, *Seenus, ex Steud. Nom.* ed. I. 850.—Europ.
villosum, Tenore, *Syll. Fl. Neap.* 373 = pratense.
 volubile, *Lour. Fl. Cochinch.* 445.—'Afr. or.'
vulgare, Gueldens. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 537 = Melilotus alba.
vulgare, Hayne, in *Schrad. Neues Journ.* ii. (1807) 336 = Melilotus officinalis.
Waldsteinianum, Sweet, *Hort. Brit.* ed. II. 136 = reclinatum.
 Watsonii, *Lofac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xv. (1883) 186.—Calif.
Willdenovii, Spreng. *Syst.* iii. 208 = involucrellum.
Wormskioldii, Lehm. *Sem. Hort. Hamb.* (1825) 17.—Cf. *Linnaea*, iii. (1828) Litt. 10 = involucrellum.
xanthinum, Freyn, in *Bot. Centralb.* i. (1880) 308.—Graec.
Xatardii, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 558 = maritimum.
 xerocephalum, *Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr.* 5.—As. Min.; Syria.

TRIFURCARIA, Endl. *Gen.* 1359 (1841) = seq.

TRIFURCIA, Herb. in *Bot. Mag.* sub t. 3779 (1840) = *Herbertia*, Sweet (Irid.).
 caerulea, Herb. l. c. = H. caerulea.

TRIGASTROTHECA, F. Muell. in Hook. *Kew Journ.* ix. (1857) 16 = *Mollugo*, Linn. (Ficoid.).
 molluginea, F. Muell. l. c. = M. Trigastrotheca.

TRIGELLA, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 46 (1866) = *Cyanella*, Linn. (Haemod.).
 orchidiformis, Salisb. l. c. 47 = C. orchidiformis.

TRIGLOCHIN, Riv. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735).
 NAIADACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1012.
 ABBOTIA, Rafin. *New Fl. Am.* i. 36 (1836).
 CYCNOGETON, Endl. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 210.

JUNCAGO, Tourn. ex Moench, *Meth.* 644 (1794).
 MAUNDIA, F. Muell. *Fragm.* i. (1858) 23.
 andinum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 538.—Chili.
Ani, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 273 = maritimum.
atacamensis, Phil. *Fl. Atac.* 49 = striatum.
atlanticum, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 143 = bulbosum.
Barrelieri, Loisel. *Fl. Gall.* ed. I. 725; ed. II. i. 264 = bulbosum.
 bulbosum, *Linn. Mant.* ii. 226.—Reg. Mediterr.; Afr. trop. et austr.
calcaratum, Hook. *l. c.* t. 416 = mucronatum.
Calcitrapa, Hook. l. c. t. 731 = centrocarpum.
 centrocarpum, *Hook. l. c.* t. 728.—Austral.
chilense, Meyen, Reise, i. 354 = palustre.
ciliatum, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iii. 72 (sp. dub.).—Peruv.
decipiens, R. Br. *Prod.* 343 = striatum.
densiflorum, Domb. ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 144 = striatum.
dubium, R. Br. *Prod.* 343 = procerum.
elatum, Nutt. *Gen. Am.* i. 237 = maritimum.
filifolium, Sieber, ex Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 142 = striatum.
flaccidum, A. Cunn. in Hook. *Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 378 = striatum.
fonticola, Phil. *Fl. Atac.* 49 = palustre.
himalensis, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 402 = palustre ?
juncum, Gilib. *Exercit.* ii. 501 = palustre.
laxiflorum, Guss. *Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825); *Fl. Sic. Prod.* i. 451.—Sicil.; Corsic.
Lechleri, Steud. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 53 = striatum.
lineare, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 54 = procerum.
 litoreum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 539.—Chili.
littorale, Phil. ex Micheli, in DC. *Monog. Phan.* iii. 102 = striatum.
magellanicum, Vahl, ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 142 = Tetroncium magellanicum.
 maritimum, *Linn. Sp. Pl.* 105.—Reg. bor. temp.
maritimum, Thunb. *Fl. Cap.* ed. Schult. 340 = striatum.
 Maundii, F. Muell. *Fragm.* vi. 83, in obs.—Austral.
mexicanum, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 244 = maritimum.
minutissimum, F. Muell. *Fragm.* vi. 82, in obs. = centrocarpum.
montevideense, Spreng. *Syst.* ii. 145 = striatum.
 mucronatum, R. Br. *Prod.* 343.—Austral.
nanum, F. Muell. in *Trans. Vict. Inst.* i. (1855) 135 = centrocarpum.
Neesii, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 54 = mucronatum.
palustre, Desf. *Fl. Atlant.* i. 232 = laxiflorum.
 palustre, *Linn. Sp. Pl.* 338.—Europ.; As.; Am.
palustre, Ruching. *Fl. Venet.* 99 = maritimum.
palustre, Schousb. *Vextr. Marokko*, 184 = bulbosum.
patens, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 709 = bulbosum.
 procerum, R. Br. *Prod.* 343.—Austral.
racemosum, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 54 = Bulbine semibarbatum.
reflexum, Vahl, ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 142 = Tetroncium magellanicum.
Roegneri, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 272 = maritimum.
salina, Wallr. in *Linnaea*, xiv. (1840) 567 (Beitr. *Fl. Hercyn.* 197) = maritimum.
 sessile, Hill, *Veg. Syst.* x. 35 (Quid ?).—Hab. ?
sexloculare, Stokes, *Bot. Mat. Med.* ii. 324 = maritimum.
 striatum, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iii. 72.—Am. bor. et austr.; Afr. austr.; Austral.
triandrum, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 208 = striatum.
trichophorum, Nees, ex Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 54 = centrocarpum.
 Volkmani, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 539.—Chili.

TRIGLOSSUM, Fisch. *Hort. Gorenk.* ed. II. p. vi (1812) = *Arundinaria*, Michx. (Gramin.).
 bambusinum, Fisch. l. c. p. viii = A. macrosperma.

TRIGONACHRAS, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 299, 304; ix. (1879) 500, 672 = *Sapindus*, Tourn.
acuta, Radlk. l. c. ix. (1879) 672 = *Cupania acuta*.
cultrata, Radlk. l. c. viii. (1878) 304; ix. (1879) 672 = S. cultratus.

TRIGONEA, Parl. in *Giorn. l'Occhio*, i. (1839) 161; ex ej. *Giorn. Bot. Ital.* ii. (1847) 120 = *Allium*, Tourn. (Liliac.).
 sicula, Parl. *ll. cc.* 161; 121 = A. Dioscoridis.

TRIGONELLA, Linn. *Gen. ed. I.* 351 (1737).
 LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 486.

APORANTHUS, Bromf. *Fl. Vect.* 117 (1856).
 BOTRYOLUTUS, Jaub. & Spach, *Illustr.* i. 124. t. 63 (1842).
 BUCERAS, Hall. ex All. *Fl. Pedem.* i. 313 (1785).
 FALCATULA, Brot. *Phyt. Lusit.* 160. t. 65 (1801).
 FOENUM-GRAECUM, [Tourn.] Rupp. *Fl. Jen.* ed. Hall. 263 (1745).
 FOLLICULLIGERA, Pasq. *Cat. Ort. Bot. Nap.* 46 (1867).
 GRAMMOCARPUS, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 18.
 KENTIA, Adans. *Fam.* ii. 508 (1763).
 MELISITUS, Medic. in *Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 383.
 NEPHROMEDIA, Kostel. *Ind. Hort. Prag.* 92 (1844).
 POCKOCKIA, Ser. in DC. *Prod.* ii. 185 (1825).
 TELIS, Linn. *Syst. ed. I* (1735).
 TRIFOLIASTRUM, Moench, *Meth.* 123 (1794).
aegyptiaca, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 709 = stellata.
 aleppica, Boiss. & Haussk. in *Boiss. Fl. Orient.* ii. 79.—Syria.
 americana, Nutt. *Gen. Am.* ii. 120 = Hosackia Puishiana.
 anatolica, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* vi. 46 = polycerata.
 anguina, Delile, *Fl. Egypte*, 254. t. 110. f. 2.—Afr. bor.; Mesopot.
 arabica, Delile, in *Laborde, Voy. Arab. Pétr.* 84.—Arab.; Palaest.
 arcuata, Boiss. & Blanch. *Diagn. Ser. II.* ii. 11 = berythea.
 arcuata, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 136.—Armen.; Persia.
 arguta, Vis. *Fl. Aegypt.* 33 = occulta vel laciniata.
 armata, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 70 = berythea.
 armata, Thunb. *Prod. Fl. Cap.* 137 = Melolobium collinum.
 Aschersoniana, Urb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxiii. (1882) 67.—Aegypt.
 astroites, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 40.—As. Min.; Syria.
 Aucheri, Boiss. *Diagn. Ser. I.* ii. 20 = brachycarpa.
 aurantiaca, Boiss. l. c. 22.—As. Min.
 avium, Fritz. *l. c.* Ind. ii. 277, sphalm. = T. Pes-avium.
 azurea, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 136.—Graecia; As. Min.
 Balansae, Boiss. & Reut. *Diagn. Ser. II.* v. 79.—Graecia; As. Min.
 berythea, Boiss. & Blanche, l. c. ii. 10.—Syria.
 Besseriana, Ser. in DC. *Prod.* ii. 181.—Europ. or.; As. Min.
 biflora, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 41 = lunata.
 brachycarpa, Moris, in *Mem. Acc. Torin.* xxxvi. (1833) 190.—Oriens.
 brahuica, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 73 = polycerata.
 cachemiriana, Cambess. in *Jacquem. Voy. Bot.* 36 = Emodi.
 caelesyriaca, Boiss. *Diagn. Ser. I.* ix. 19.—Syria.
 caerulea, Ser. in DC. *Prod.* ii. 181.—Europ. or.; Reg. Cauc.
 caespitosa, Steud. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 168 = Trifolium Petitianum.
 calliceras, Fisch. ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* iii. 515.—Reg. Cauc.
 cancellata, Desf. *Tabl.* ed. I. 190, nomen = striata.
 capitata, Boiss. *Diagn. Ser. I.* ii. 17.—As. Min.
 cariensis, Boiss. l. c. 21.—As. Min.
 Cassia, Boiss. l. c. ix. 13.—Syria.
 Cephalotes, Boiss. & Bal. l. c. Ser. II. v. 77.—Cilicia.
 coerulea, Auct. = caerulea.
 connata, Meyer, ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 709 = caerulea.
 corniculata, Linn. *Syst. ed. X.* 1180.—Europ. austr.; As. Min.

TRIGONELLA:—

corniculata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 44. t. 761 = Balansae.
crassifolia, Hornem. Hort. Hafn. ii. 723.—Aegypt.
crassipes, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 23.—As. Min.; Syria.
cretica, Boiss. Fl. Orient. ii. 91.—As. Min.
cylindracea, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 77.—Syria.
Desvauxii, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 147 (Index).
sphalm. = *Trifolium Desvauxii*.
dicarpa, C. A. Mey. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 77 = Noëana.
divaricata, [Clairv.] Man. Herb. 132 = *monspeliaca*.
dura, Vis. Pl. Aegypt. 32 = *maritima*.
egyptiaca, Poir. Encyc. viii. 95 = *stellata*.
elatior, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 108 = *corniculata*.
elliptica, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 20.—Persia.
elongata, Hort. Dorp. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 267 = *stellata*.
Emodi, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 197.—Reg. Himal.
ensifera, Trautv. Del. Sem. Hort. Kiov. (1840) 6.—Cf. *Linnaea*, xv. (1841) Litt. 98.—Hab.?
esculenta, Willd. Enum. Hort. Berol. 799 = *corniculata*.
falcata, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 509.—Ins. Socotra.
fasciculata, Bertol. Misc. Bot. ii. 19 = *azurea*.
filiformis, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 532 = *striata*.
filipes, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 16.—Syria; Mesopot.
fimbriata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 197 = *corniculata*.
Fischeriana, Ser. in DC. Prod. ii. 183.—As. Min.; Reg. Cauc.
flexuosa, Delile, ex Poir. Encyc. Suppl. v. 362 = *anguina*.
flexuosa, Fisch. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 515 = *Fischeriana*.
Foenum-graecum, [Habl.] Desc. Taur. 138 = *gladiata*.
Foenum-graecum, Linn. Sp. Pl. 777.—Europ.; Oriens.
Foenum-graecum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 48. t. 766 = *cariensis*.
Foenum-graecum, Suter, Fl. Helv. ed. Hegetschw. ii. 149 = *monspeliaca*.
Gaillardoti, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 78 = *caesaryiaca*.
geminiflora, Boiss. Fl. Orient. ii. 77 = Noëana.
geminiflora, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga, i. (1847) 219 = *polycerata*.
glabra, Thunb. Prod. Pl. Cap. 137 = *hamosa*.
gladiata, Stev. in Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1808) 112.—Reg. Mediterr.
glomerata, Hort. Par. ex Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 340 = *brachycarpa*.
Goalia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5920 C = *Cyamopsis psoraloides*.
gracilis, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 197.—Ind. or.
graeca, Boiss. Fl. Orient. ii. 91.—Graecia; As. Min.
graeca, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *T. Foenum-graecum*.
grandiflora, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga, i. (1847) 218.—Turkestan.
Griffithii, Boiss. Fl. Orient. ii. 88.—Afghan.
halophila, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 78.—Cilicia.
hamigera, Clarke, Trav. ii. 260.—Graecia.
hamosa, Bess. in Flora, xv. (1832) II. Beibl. 32, in nota = *spicata*.
hamosa, Delile, ex Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 7 = *anguina*.
hamosa, Linn. Syst. ed. X. 1180.—Aegypt.
hamosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. t. 764 = *Sibthorpii*.
hierosolymitana, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 15.—As. Min.; Syria.
himalaica, Wall. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 88 = *Emodi*.
hirsuta, Thunb. Prod. Pl. Cap. 137 = *Melolobium cernuum*.
hybrida, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 331 = *Medicago Pourretii*.
incisa, Hornem. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Pétr. iv. 48 = *anguina*.
incisa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 197 = *polycerata*.
indica, Linn. Sp. Pl. 778 = *Rothia trifoliata*.
isthmocarpa, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 44.—Cappadoc.
Kotschyi, Boiss. Fl. Orient. ii. 87 = *rytidocarpa*.

TRIGONELLA:—

Kotschyi, Fenzl, ex Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 15.—As. Min.
laciniata, Desf. Tabl. ed. I. 190 = *polycerata*.
laciniata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1095.—Aegypt.
lilacina, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 17.—Palaestin.
littoralis, Guss. Adnot. Cat. Pl. Boccad. (1821) 15 = *maritima*.
longirostris, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 133 = *cariensis*.
lunata, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 19.—As. Min.
macroglchin, Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 593.—Hab.?
macrorrhyncha, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 21.—Cilicia.
marginata, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 32; et ex Steud. Nom. ed. II. ii. 709 = *Trifolium subrotundum*.
maritima, Delile, in Poir. Encyc. Suppl. v. 361.—Reg. Mediterr. or.
maritima, Tommas. ex Nym. Consp. 171 = *corniculata*.
media, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 71 = *polycerata*.
media, Lag. ex Loud. Hort. Brit. 290; Steud. Nom. ed. II. ii. 709 (Quid?).—Hab.?
Melilotus, Link, Handb. ii. 165 = *Melilotus indica*.
mexicana, G. Don, Gen. Syst. ii. 469.—Mexic.
micrantha, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 410.—Hab.?
microcarpa, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1833) 186 = *stellata*.
mnioarpa, Wallr. ex DC. Prod. ii. 172 = *Medicago lupulina*.
monantha, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 137 = *polycerata*.
monspeliaca, Linn. Sp. Pl. 777.—Reg. Mediterr.
multiflora, Humnicki, Cat. Pl. Luxeuil, 18.—Gallia.
multinervis, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 32 = *Trifolium multinerve*.
nerosa, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 158 = *hamosa*.
nilotica, Presl, Bot. Bemerck. 52 = *laciniata*.
Noëana, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 11.—As. Min.; Persia.
obcordata, Wall. Cat. n. 5986 = *hamosa*.
occulta, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 71.—Aegypt.
ornithopodioides, DC. Fl. Fr. iv. 550.—Europ.
ornithorynchos, Fisch. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 85 = *calliceras*.
orthoceras, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 399 = *polycerata*.
ovalis, Boiss. Elench. 36 = *Medicago ovalis*.
oxyrhyncha, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. ii. 182 = *calliceras*.
parviflora, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 16.—Helvet.
Pecten, Schenk, Pl. Sp. Aegypt. 34 = *arabica*.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 22.—Persia.
Pes-avium, Bertol. Fl. Ital. viii. 247.—Italia.
petiolaris, Viv. Fl. Lib. Sp. 49. t. 18. f. 5 = *maritima*.
phrygia, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 45 = *aurantiaca*.
pinnatifida, Cav. Ic. i. 26. t. 38 = *polycerata*.
plagioneura, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 16 = *cylindracea*.
platycarpus, Linn. Sp. Pl. 776 = *Medicago platycarpa*.
plicata, Boiss. Fl. Orient. ii. 90.—As. Min.
polyantha, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 77 = *stellata*.
polycarpa, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. ix. 18.—Pamphylia.
polycerata, Linn. Sp. Pl. 777.—Reg. Mediterr.; Oriens.
polyceratoides, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 172 = *polycerata*.
procumbens, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 500 = *Besseriana*.
prostrata, DC. Fl. Fr. Suppl. 571 = *gladiata*.
pubescens, Edgew. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 88.—Ind. or.
purpurascens, Lam. Fl. Fr. ii. 590 = *ornithopodioides*.
radiata, Boiss. Fl. Orient. ii. 90.—As. Min.; Persia.
raphanina, Boiss. l. c. 71.—Cilicia.
retorsa, Boiss. l. c. 78.—Afghan.
Retsii, Spreng. Syst. iii. 283 = *arcuata*.
rytidocarpa, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 44 = *Emodi*.
rigida, Boiss. & Bal. l. c. v. 79.—Cilicia.
rostrata, Boiss. Fl. Orient. ii. 89.—As. Min.
ruthenica, Linn. Sp. Pl. 776 = *Medicago ruthenica*.
ruthenica, Patr. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 253 = *Medicago platycarpa*.

TRIGONELLA:—

rytidocarpa, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 12, in syn.—Cappadoc.
Schimperi, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 32 = *Trifolium Schimperi*.
sericea, Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 459 = *Hosackia Purshiana*.
Sibthorpii, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 14.—As. Min.; Syria.
sinuata, Boiss. l. c. 18 = *astroites*.
smyrnea, Boiss. l. c. 19.—As. Min.
spicata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 108.—Graecia; As. Min.
spinosa, Linn. Sp. Pl. 777.—Ins. Creta; Syria.
Spruneriana, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 17.—Graecia; As. Min.
stellata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 140.—Afr. bor.; Arab.; Ins. Canar.
strangulata, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 17.—Syria.
striata, Linn. f. Suppl. 340.—As. Min.; Turkestan.
striata, Viv. Pl. Aeg. Dec. iv. 15 = *hamosa*.
suavissima, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. 255.—Austral.
subinermis, Thunb. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 79 = *Melolobium collinum*.
subracemosa, Boiss. Fl. Orient. ii. 73.—As. Min.
tenuior, Thunb. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 79 = *Melolobium collinum*.
tenuis, Fisch. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 514 = *striata*.
tenuissima, Brongn. & Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 59 = *suavissima*.
tetrapetala, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 197 = *Cyamopsis psoraloides*.
toментosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 137 = *Psoralea obtusifolia*.
torta, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 7 = *anguina*.
torulosa, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 40 = *Spruneriana*.
tuberculata, Presl, Delic. Prag. 46 = *gladiata*.
uncata, Boiss. & Noë, Diagn. Ser. II. ii. 12.—Persia; Afghan.
uncinata, Ser. in DC. Prod. ii. 181 = *spicata*.
uncinata, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 261.—As. Min.
uniflora, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 45 = *ornithopodioides*.
velutina, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 18.—As. Min.; Syria.
villosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 137 = *Melolobium collinum*.

TRIGONIA, Aubl. Pl. Gui. i. 387. tt. 149, 150 (1775).**VOCHYSIACEAE.**

HOEFFNAGELIA, Neck. Elem. iii. 68 (1790).

MAINEA, Vell. Fl. Flum. vii. t. 8 (1827).

boliviana, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 134.—Bolivia.

candida, Warm. l. c. 139.—Bras.

Cepo, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 115 = *mollis*.

crotonoides, Cambess. l. c.—Bras.

fasciculata, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 29.—Bras.

floribunda, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 38.—Nicaragua.

Glazioviana, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 129.—Bras.

hypoleuca, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 30.—Guian.

laevis, Aubl. Pl. Gui. i. 390. t. 150.—Guian.

macrantha, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 129.—Peruv.

macrocarpa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 373.—Guian.

macrostachya, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1258, nomen = *villosa*.

micrantha, Mart. in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 102 = *crotonoides*.

microcarpa, Sagot, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 131.—Guian.

mollis, DC. Prod. i. 571.—Bras.

najadum, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 126.—Bras.

nivea, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 113.—Bras.

paniculata, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 132.—Bras.

parviflora, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 163.—Bras.; Peruv.

TRIGONIA:—

parviflora, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 409 = mollis.
pubescens, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 114.—Bras.
rigida, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 39.—Nicaragua.
rugosa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 74.—N. Granat.
Schottiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 560 = mollis.
Schottiana, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 133.—Bras.
sericea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 141.—N. Granat.
simplex, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 125.—Bras.
Spruceana, Benth. ex Warm. l. c. 130.—Bras.
subcymosa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 373.—Guian.
tomentosa, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 142 = *Trigonis tomentosa*.
velutina, Pohl, ex A. W. Benn. l. c. xiii. III. 53 = *Bredemeyera velutina*.
villosa, Aubl. Pl. Gui. i. 388. t. 149.—Guian.
xanthopila, Garcke, in Linnaea, xxii. (1849) 51.—Guian.

TRIGONIASTRUM, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 394 (1860). *POLYGALEAE*, Benth. & Hook. f. i. 139.
ISOPTERIS, Wall. Cat. n. 7261 (1831).
hypoleucum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 395.—Malaya.

TRIGONIDIUM, Lindl. Bot. Reg. t. 1923 (1837).
ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 567.
acuminatum, Batem. in Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 74.—Guian.
callistele, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 178.—Hab.?
Egertonianum, Batem. in Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 73.—Honduras.
latifolium, Lindl. Bot. Reg. t. 1923.—Bras.
macranthum, Rodrig. Orch. Nov. i. 105.—Bras.
monophyllum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 629 = *Laelia monophylla*.
obtusum, Lindl. Bot. Reg. t. 1923.—Guian.
ringens, Lindl. l. c. (1840) Misc. 57 = *Mormolyce lineolata*.
Seemanni, Reichb. f. in Seem. Bot. Voy. Herald, 214.—Panama.
spatulatum, Linden & Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 280.—N. Granat.
tenuis, Lodd. Cat. n. 582; ex Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 44.—Guian.
turbatum, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xv. (1859) 52.—Bras.

TRIGONIS, Jacq. Enum. Pl. Carib. 3 (1760); Select. Am. 102 (1763) = *Cupania*, Plum. (Sapind.).
tomentosa, Jacq. ll. cc. 19; 102 = *C. americana*.

TRIGONOCARPAEA, Steud. Nom. ed. II. ii. 710 (1841), sphalm. = **TRIGONOCARPUS**, Wall. = *Kokoona*, Thw. (Celastr.).

TRIGONOCARPUS, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 710 (1841) = *Chorizanthe*, R. Br. (Polygon.).
cymosus, Bert. ex C. Gay, Fl. Chil. v. 283 = *C. virgata*.
secundiflorus, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 710 = *C. paniculata*.

TRIGONOCARPUS, Vell. Fl. Flum. 153 (1825); iv. t. 15 (1827) = *Cupania*, Plum. (Sapind.).
racemosus, Vell. ll. cc. = *C. castaneaefolia*.

TRIGONOCARPUS, Wall. Cat. n. 6520 (1831) = *Kokoona*, Thw. (Celastr.).
littoralis, Wall. l. c. = *K. zeylanica*.

TRIGONOCARYUM, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 278. *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 856.
prostratum, Trautv. l. c. 279.—Reg. Cauc.

TRIGONOCHLAMYS, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 170. t. 27. *BURSERACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 325.
Griffithii, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 170.—Malacca.

TRIGONOPTERUM, Steetz, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 183 = *Lipochaeta*, DC. (Compos.).
Ponténi, Anderss. l. c. 184 (= *Macraea lancifolia*).—Ins. Galapag.

TRIGONOSCIADIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 344 = *Heracleum*, Linn. (Umbell.).
tuberosum, Boiss. l. c. 345.—Mesopot.
viscidulum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 1051.—Assyria.

TRIGONOSPERMUM, Less. Syn. Comp. 214 (1832). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 346.
adenostemmoides, Less. l. c.—Mexic.
melampodioides, DC. Prod. v. 509.—Mexic.

TRIGONOSTEMON, Blume, Bijdr. 600 (1825) (*Trigostemon*); Fl. Jav. Praef. p. viii (1828).
EUPHORBIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 298.
ATHROISMA, Griff. Notul. iv. 477 (1854).
ENCHIDIUM, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 89, nomen prius.
SILVAEA, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 211 (1836).
TELOGYNE, Baill. Etud. Gén. Euph. 327 (1858).
TYLOSEPALUM, Kurz, ex Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 50.
Cumingii, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 213 = *Tritaxis Cumingii*.
diplopetalus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 277.—Zeylan.
Gaudichaudi, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 213.—Cochinch.
heteranthus, Wight, Ic. t. 1890.—Burma.
Hookerianus, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1109 = *semperflorens*.
indicus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 214.—Malaya.
laetus, Baill. Etud. Gén. Euph. 341.—Burma.
laevigatus, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 538.—Borneo.
Lawianus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 212 = *Croton Lawianus*.
longifolius, Baill. Etud. Gén. Euph. 341. t. 11.—Burma; Malaya.
macrophyllus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 213 = *Ostodes macrophylla*.
malaccanus, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 482.—Malacca.
nemoralis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 277.—Ind. or.
semperflorens, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1110.—Reg. Himal.
serratus, Blume, Bijdr. 600.—Java.
zeylanicus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 213 = *Ostodes zeylanica*.

TRIGONOTHECA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 662 = *Catha*, Forsk. (Celastr.).
serrata, Hochst. l. c. = *C. edulis*.

TRIGONOTHECA, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 672, in syn. = *Melanthera*, Rohr (Compos.).
natalensis, Sch. Bip. l. c. = *M. Brownei*.

TRIGONOTIS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 603. *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 858.
ENDOGONIA, Lindl. Veg. Kingd. 656 (1847), nomen prius.
brevipes, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 506, in nota.—Japon.
clavata, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 603.—As. temp.
Hookeri, Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 173.—Reg. Himal.
microcarpa, Benth. ex C. B. Clarke, l. c. 172.—Reg. Himal.
multicaulis, Benth. ex C. B. Clarke, l. c.—Reg. Himal.
myosotidea, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 506, in nota.—Reg. Amur.
ovalifolia, Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 172.—Reg. Himal.
peduncularis, Benth. ex S. Moore & Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 384, nomen = *clavata*.
petiolaris, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 506.—As. or.

TRIGONOTIS:—

radicans, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 603.—Reg. Amur.
rotundifolia, Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 172.—Reg. Himal.

TRIGOSTEMON, Blume, Bijdr. 600 (1825) = *Trigonostemon*, Blume (Euphorb.).

TRIGUERA, Cav. Diss. i. 41 (1785) = *Hibiscus*, Linn. (Malvac.).
acerifolia, Cav. l. c. = *H. Solandra*.

TRIGUERA, Cav. Diss. ii. App. 1. t. A (1786).
SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 897.
ambrosiaca, Cav. l. c. 2.—Hispan.
baccata, J. F. Gmel. Syst. 338 = *Celsia bugulifolia*?
inodora, Cav. Diss. ii. App. 3 (al. gen.?).—Hispan.
Osbeckii, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 524 = *Celsia bugulifolia*?

TRIGULA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4; ed. II. 67 (1827) = *Clematis*, Dill. (Ranunc.).
trifoliata, Noronha, ex DC. Prod. i. 6 = *C. Noronhiana*.

TRIGYNAEA, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 328.
ANONACEAE, Benth. & Hook. f. i. 25.
angustifolia, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 70.—Venezuela.
canescens, Benth. l. c.—Venezuela.
Galeottiana, Baill. Adansonia, viii. (1867–68) 181.—Mexic.
grandis, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 70.—Venezuela.
Matthewsi, Benth. l. c. 69.—Peruv.
oblongifolia, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 329.—Bras.
Perrottetii, Baill. Adansonia, viii. (1867–68) 179.—Guian.
rufescens, Baill. l. c. 180.—Guian.

TRIGYNEIA, Reichb. Handb. 278 (1837), sphalm. = *praec.*

TRIKALIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836) = *Suaeda*, Forsk. (Chenop.).
triflora, Rafin. l. c. = *S. altissima*.
trigyna, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 158 = *S. altissima*.

TRILEPIS, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (Oct. 1834) 267 = *Kobresia*, Willd. (Cyperac.).
abyssinica, Boeck. in Linnaea, xxxix. (1875) 9 = *Eriospira abyssinica*.
Lhotskiana, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (Oct. 1834) 267 = *Fintelmanna restioides*.
pilosa, Boeck. in Linnaea, xxxix. (1875) 10 = *Eriospira pilosa*.
Royleana, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (Oct. 1834) 267 = *K. Royleana*.

TRILEPISIUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 22 (1806).
INCERT. SEDIS. Cf. Benth. & Hook. f. i. 605.
madagascariense, DC. Prod. ii. 639.—Madag.

TRILIENA, Rafin. Sylva Tellur. 54 (1838) = *Lycium*, Linn. (Solan.).

TRILISA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 140; et in Dict. Sc. Nat. xvi. 10 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 248.
odoratissima, Cass. ll. cc.—Am. bor.
paniculata, Cass. in Dict. Sc. Nat. lv. 310.—Am. bor.

TRILIX, Linn. Mant. ii. 153 (1771) = *Prockia*, P. Br. (Tiliac.).
Crucis, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 165 = *P. Crucis*.
glandulosa, Domb. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vii. (1847) 288 = *Banara guianensis*.
guianensis, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 165 = *Banara guianensis*.
hygroscopica, Liais, Brésil, 617.—Bras.
iraguensis, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 165, sphalm. = *Banara ibaguensis*.
lutea, Linn. Mant. ii. 247 = *P. Crucis*?

TRILLIDIUM, Kunth, Enum. Pl. v. 120 (1850) = *Trillium*, Linn.
Govanianum, Kunth, l. c. = *Trillium Govanianum*.
japonicum, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 525.—
 Japon.

TRILLIUM, Linn. Sp. Pl. ed. I. 339 (1753). *LILIA-
 CEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 833.
 DELOSTYLIS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819)
 102.
 ESDRA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 60 (1866).
 PHYLLANTHERUM, Rafin. in Journ. Phys. xci. (1820)
 72.

TRILLIDIUM, Kunth, Enum. Pl. v. 120 (1850).
acuminatum, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808)
 361.—Am. bor.

atropurpureum, M. A. Curt. ex Beck, Bot. N. & M.
 St. 361 = erectum.

amblopsis, Rafin. Med. Fl. ii. 99 (Quid ?).—Am. bor.
angustifolium, Rafin. l. c. 98 (Quid ?).—Am. bor.
brevipetalum, Rafin. l. c. 100 (Quid ?).—Am. bor.
californicum, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863)
 50 = ovatum.

camtschaticum, Pall. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 246 =
 erectum ?

Catesbaei, Ell. Sketch, i. 429 = stylosum.
cernuum, Barton, Fl. N. Am. ii. 13. t. 40 = erectum.
cernuum, Linn. Sp. Pl. 339.—Am. bor.

cernuum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 216 = stylosum.
discolor, Wray, ex Hook. Bot. Mag. t. 3097 = sessile.
divaricatum, Rafin. Med. Fl. ii. 102 (Quid ?).—
 Am. bor.

erectum, Linn. Sp. Pl. 340.—Am. bor.
erectum, Stell. in Pall. N. Nord. Beitr. ii. 300 =
 obovatum.

erythrocarpum, Curt. Bot. Mag. t. 855 = grandiflorum.

erythrocarpum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 216.—Am. bor.
flavum, Rafin. Med. Fl. ii. 100 (Quid ?).—Am. bor.

foetidum, Salisb. Parad. Lond. t. 35 = erectum.
glaucum, Rafin. Med. Fl. ii. 102 = erectum.

Govanianum, Wall. Cat. n. 812; Royle, Illustr. Bot.
 Himal. 384. t. 93. f. 1.—Reg. Himal.

grandiflorum, Salisb. Parad. Lond. t. 1.—Am. bor.
hamosum, Rafin. Med. Fl. ii. 101 (Quid ?).—Am. bor.

isanthum, Rafin. l. c. 98 (Quid ?).—Am. bor.
kamtschaticum, Ledeb. Fl. Ross. iv. 121 = obovatum.

lanceolatum, Boykin, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.
 xiv. (1879) 274 = recurvatum.

latifolium, Rafin. Med. Fl. ii. 96, 101 = cernuum.
lirioides, Rafin. l. c. 100 (Quid ?).—Am. bor.

longiflorum, Rafin. l. c. 97 = sessile.
maculatum, Rafin. l. c. 103 = sessile.

medium, Rafin. l. c. 102 = cernuum.
membranaceum, Rafin. l. c. 98 (Quid ?).—Am. bor.

nerosum, Ell. Sketch, i. 429 = stylosum.
nivale, Riddell, Syn. Fl. W. St. 93.—Am. bor.

nutans, Rafin. Med. Fl. ii. 99 = erectum.
obcordatum, Rafin. l. c. 101 = grandiflorum ?

obovatum, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 180 = ovatum.
obovatum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 245 = erectum ?

ovatum, Pursh, l. c.—Am. bor. occ.
pendulum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii.
 (1801) 421 = erectum.

petiolatum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 244.—Am. bor.
 occ.

pictum, Pursh, l. c. = erythrocarpum.
pumilum, Pursh, l. c. 245 = pusillum.

purpureum, Kin, ex Ell. Sketch, i. 430 = erectum.
pusillum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 215.—Am. bor.

rectum, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1212, sphalm. = erectum.
recurvatum, Beck, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xi.
 (1826) 178.—Am. bor.

rhomboideum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 215 = erectum,
 grandiflorum.

rivale, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 378.—
 Am. bor. occ.

roseum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 710 (Quid ?).
rotundifolium, Rafin. Med. Fl. ii. 97 (Quid ?).—
 Am. bor.

sessile, Linn. Sp. Pl. 340.—Am. bor.
Smallii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1884)
 217.—Japon.

spatulatum, Rafin. Med. Fl. ii. 101 = erectum.
stylosum, Nutt. Gen. Am. i. 239.—Am. bor.

texanum, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861)
 443 = pusillum.

tinctorium, Rafin. Med. Fl. ii. 98 (Quid ?).—Am. bor.

TRILLIUM:—

Tschonoskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix.
 (1884) 218.—Reg. Himal.; Japon.

undulatum, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii.
 (1801) 422 = erythrocarpum.

unguiculatum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v.
 (1837) 154 = recurvatum.

unguiculatum, Rafin. Med. Fl. ii. 98 (Quid ?).—
 Am. bor.

viride, Beck, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xi. (1826) 178
 = sessile.

viridescens, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837)
 155 = sessile.

TRIOBULINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 110 (1836) =
Utricularia, Linn. (Lentib.).

crenata, Rafin. l. c. = U. aphylla.
fibrosa, Rafin. l. c. = U. fibrosa.

striata, Rafin. l. c. = U. fibrosa.

TRILOMISA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 91 (1836) =
Begonia, Tourn.

undulata, Rafin. l. c. = B. undulata.

TRILOPHUS, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. 56 (1812) =
Menispermum, Tourn.

Ampelisagria, Fisch. l. c. = M. dauricum.

TRILOPUS, Mitch. in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur.
 viii. (1748) App. 219 = *Hamamelis*, Linn.

dentata, Rafin. New Fl. Am. iii. 17 = H. virginiana.
estivalis, Rafin. l. c. 16 = Fothergilla Gardeni ?

hyemalis, Rafin. l. c. = H. virginiana.
nigra, Rafin. l. c. = H. virginiana.

parvifolia, Rafin. l. c. 17 = H. virginiana.
riparia, Rafin. l. c. 16 = H. virginiana.

rotundifolia, Rafin. l. c. = H. virginiana.
virginica, Rafin. l. c. 15 = H. virginiana.

TRIMA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I.
 Art. IV. 4 = *Anacardium* ? Linn.

TRIMEIANDRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836) =
Arthosolen, C. A. Mey. (1843) (Thymel.).

spicata, Rafin. l. c. = A. spicatus.

TRIMELOPTER, Rafin. Fl. Tellur. ii. 24 (1836) =
Ornithogalum, Tourn. (Liliac.).

fuscatum, Rafin. l. c. = O. fuscatum.

TRIMENIA, Seem. Fl. Vit. 425. t. 99 (1871).
MONIMIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 143.

weinmanniaefolia, Seem. l. c.—Ins. Fiji.

TRIMERANTHES, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlix. 115
 (1827) = *Siegesbeckia*, Linn. (Compos.).

dichotoma, Cass. l. c. = S. flosculosa.

TRIMERANTHUS, Karst. in Linnæa, xxx. (1859–60)
 159 = *Chaetolepis*, Miq. (Melastom.).

alpestris, Karst. l. c. = C. alpestris.

TRIMERIA, Harv. Gen. S. Afr. Pl. Suppl. 417
 (1858). *BIXINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 129.

MONOSPORA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 660.
RENARDIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1858) i.
 466.

alnifolia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 69.—Afr.
 austr.

trinervis, Harv. Gen. S. Afr. Pl. 417.—Afr. austr.

TRIMERIS, Presl, Prod. Monog. Lobel. 46 (1836) =
Lobelia, Plum. (Campan.).

oblongifolia, Presl, l. c. = L. scaevolaefolia.

TRIMERISMA, Presl, Bot. Bemerk. 73 (1844) = *Platy-
 lophus*, D. Don (Saxifr.).

trifoliatum, Presl, l. c. = P. trifoliatum.

TRIMERIZA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1543 (1832) =
Bragantia, Lour. (Aristol.).

piperina, Lindl. l. c. = B. Wallichii.

TRIMETRA, Moq. ex DC. Prod. vii. 262 (1838) =
Borrichia, Adans. (Compos.).

fcoidea, Moc. l. c. = B. frutescens.

TRIMEZA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 308.
TRIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 690.

LANSBERGIA, De Vriese, Epim. Ind. Sem. Hort.
 Lugd. Bat. (1846) 2.

POARCHON, Allem. Tract. Rio Jan. (1846).

REMACLEA, C. Morr. Belg. Hort. iii. (1853) 1.
 t. 1.

XANTHOCROMYON, Karst. in Bot. Zeit. v. (1847)
 694.

caracasana, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 690.—Vene-
 zuela.

juncifolia, Benth. & Hook. f. l. c.—Bras.

lurida, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 308.—
 Mexic.

martinicensis, Herb. in Bot. Reg. (1844) Misc. 88 =
lurida.

meridensis, Herb. l. c. = *lurida*.

TRIMORPHA, Cass. in Dict. Sc. Nat. iii. Suppl. 65
 (1816) = *Erigeron*, Linn. (Compos.).

acre, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 466 = E. acris.
alpina, S. F. Gray, l. c. 467 = E. alpinus.

glabrata, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi.
 (1868) 402 = E. glabratus.

uniflora, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 467 =
 E. uniflorus.

vulgaris, Cass. in Dict. Sc. Nat. iv. 324 = E. acris.

TRIMORPHAEA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxvii. 462
 (1825) = praec.

TRIMORPHANDRA, Brongn. & Gris, in Bull. Soc.
 Bot. Fr. xi. (1864) 190; et in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ii.
 (1864) 148 = *Hibbertia*, Andr. (Dillen.).

pulchella, Brongn. & Gris, ll. cc.—N. Caled.

TRIMORPHOEAE, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 280 (1873),
 err. typ. = TRIMORPHAEA, Cass. = *Erigeron*,
 Linn. (Compos.).

TRINACTE, Gaertn. Fruct. ii. 415 (1791) = *Jungia*,
 Linn. (Compos.).

ferruginea, Gaertn. l. c. = J. ferruginea.

TRINAX, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1091 (1840), sphalm. =
Thrinax, Linn. f. (Palm.).

TRINCHINETTIA, Endl. Gen. 1383 (1841) = *Geisso-
 pappus*, Benth. (Compos.).

caleoides, Endl. ex Walp. Rep. vi. 180 = G. caleoides.

TRINCIATELLA, Adans. Fam. ii. 112 (1763) = *Hyo-
 seris*, Linn. (Compos.).

TRINEURIA, Presl, Bot. Bemerk. 30 (1844); (in Abh.
 Boehm. Ges. Wiss. V. iii. (1845) 560) = *Aspalathus*,
 Linn. (Legumin.).

appendiculata, Presl, Bot. Bemerk. 131 = A. ciliaris.
Chenopoda, Presl, l. c. = A. Chenopoda.

ciliaris, Presl, l. c. = A. ciliaris.
cochleariformis, Presl, l. c. = A. uniflora.

comosa, Presl, l. c. = A. comosa.
cymbaeformis, Presl, l. c. = A. uniflora.

deciduiifolia, Presl, l. c. = A. nigra.
fuscescens, Presl, l. c. 131, 133 = A. nigra.

linarifolia, Presl, l. c. 131 = A. linearifolia.
marginalis, Presl, l. c. = A. marginalis.

papillosa, Presl, l. c. = A. ciliaris.
rigescens, Presl, l. c. = A. rigescens.

TRINEURON, Hook. f. Fl. Antarct. i. 23. t. 17 (1845)
 = *Abrotanella*, Cass. (Compos.).

nivigenum, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i.
 (1855) 105 = A. nivigena.

pusillum, Hook. f. Fl. N. Zel. 131 = A. pusilla.
scapigerum, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857)
 301 = A. scapigera.

spathulatum, Hook. f. Fl. Antarct. 24. t. 17 = A.
 spathulata.

TRINGA, Roxb. Hort. Beng. [81], (1814), nomen,
 sphalm. = *TUNGA*, Roxb. = *Hypolytrum*, Rich.
 (Cyperac.).

TRINIA, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 92 (1814). *UM-
 BELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 887.

APINELLA, Neck. Elem. i. 191 (1790).

GRAMMOPETALUM, C. A. Mey. ex Meinsh. in
 Linnæa, xxx. (1859–60) 514.

TRINIA :—

- RUMIA, Hoffm. Gen. Umbell. ed. II. 171 (1816).
 SPIELMANNIA, Cuss. ex Juss. in Dict. Sc. Nat. IV. 328 (1828).
dahurica, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) 1. Beibl. 14 = seselioides.
dioica, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 392 = vulgaris.
Dufourei, DC. Prod. iv. 104.—Hispan.
elator, Gaud. Fl. Helvet. ii. 413 = vulgaris.
glaberrima, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 93 = hispida, vulgaris.
glauc, Hoffm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 711 = Kitaibelii.
glauc, Reichb. Pl. Crit. v. 25; Dum. Fl. Belg. Prod. 78 = vulgaris.
Henningii, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 94.—Reg. Cauc. et Casp.
Henningii, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (1824) 127 = vulgaris.
hispida, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 94.—Tauria; Reg. Cauc.
Hoffmanni, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 244 = hispida.
Kitaibelii, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 246.—Europ. or.; As. bor.
Lessingii, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xxi. 8.—Europ.
pumila, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 473 = vulgaris.
ramosissima, Fisch. ex Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (1824) 127 = Kitaibelii.
scabra, Boiss. & Not. Diagn. Ser. II. ii. 73.—As. Min. seselioides, Ledeb. Fl. Alt. i. 357.—Sibir.
swellendamensis, Eckl. & Zeyh. Enum. 340 = Rhyticarpus Ecklonis.
uitenhagensis, Eckl. & Zeyh. I. c. = Rhyticarpus rugosus.
vulgaris, DC. Prod. iv. 103.—Europ.

TRINIUSA, Steud. Syn. Pl. Gram. 328 (1855) = **Bromus**, Dill. (Gramin.).
Danthonia, Steud. I. c. = B. macrostachys.
flavescens, Steud. I. c. = B. fasciculatus.

TRINOGETON, Walp. Rep. vi. 615 (1847), sphalm. = THINOGETON, Benth. = **Cacabus**, Bernh. (Solan.).

TRIODALLUS, A. DC. in DC. Prod. vii. 491 (1839) = seq.

TRIODANIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 67 (1836) = **Specularia**, Heist. (Campan.).
rupestris, Rafin. I. c. = S. perfoliata.
scabra, Rafin. I. c. = S. perfoliata.

TRIODIA, R. Br. Prod. 182 (1810).—**GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1175.
BRACHATERA, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 189.
DASYOCHLOA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 484 (1840).
LEPTOCARYDION, Hochst. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1176 (1883).
MERISACHNE, Steud. Syn. Pl. Gram. 117 (1855).
RHOMBOLYTRUM, Link, Hort. Berol. ii. 96 (1827).
SIEGLINGIA, Bernh. Verz. Pfl. Erf. 44 (1799), nomen prius.
TRICHONEURA, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 148.
TRICUSPIS, Beauv. Agrost. 77. t. 15. f. 10 (1812).
TRIDENS, Roem. & Schult. Syst. ii. 34 (1817).
URALEPIS, Spreng. Neue Entdeck. i. 244 (1821).
URALEPSIS, Nutt. Gen. Am. i. 62 (1818).
WINDSORIA, Nutt. Gen. Am. i. 70 (1818).
acuminata, Benth. ex Vasey, Gr. U. St. 35.—Am. bor. occ.
albescens, Benth. ex Vasey, l. c.—Texas.
alpina, Roth, Enum. Pl. Phaen. Germ. i. I. 381 = *Danthonia provincialis*.
ambigua, Benth. ex Vasey, Gr. U. St. 35.—Am. bor.
ambigua, R. Br. Prod. 183 = *Diplachne fusca*.
antarctica, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 111 = *Catabrosa antarctica*.
antarctica, Hook. f. Fl. Antarct. 380.—Reg. Magell.
avenacea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 156. t. 48.—Mexic.
Billardieri, Spreng. Syst. i. 330 = *Festuca littoralis*.
coerulescens, Desv. Opusc. 99, in obs. = *cuprea*.
Cunninghamii, Benth. Fl. Austral. vii. 606.—Austral.

TRIODIA :—

- cuprea*, Jacq. Eclog. Gram. 21. t. 16.—Am. bor.
cynosuroides, Spreng. Syst. i. 628 = *Dactylis cynosuroides*.
decumbens, Beauv. Agrost. 76. t. 15. f. 9 = Europ.; Afr. bor.
exigua, T. Kirk, in Gard. Chron. (1882) i. 260; et in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 378.—N. Zel.
festuacea, Eichw. Skizze, 119 = *Graphephorum festuaceum*.
festuacea, Roth, Enum. Pl. Phaen. Germ. i. I. 382 = *Graphephorum arundinaceum*.
festucoides, Desv. Opusc. 98.—'Am. bor.'
filiformis, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 249.—Chili.
Greenii, Spreng. Syst. i. 330 = *Graphephorum Elliotii*.
irritans, R. Br. Prod. 182.—Austral.
kerquelenensis, Hook. f. Fl. Antarct. 379. t. 139 = *Festuca kerquelenensis*.
laxa, Benth. Pl. Hartw. 194, sphalm. = *Triodon laxus*.
littoralis, Spreng. Syst. i. 330 = *Danthonia paradoxa*.
melicoides, Spreng. I. c. 331 = *Graphephorum melicoides*.
microdon, F. Muell. Census, 135 = *Triraphis microdon*.
microstachya, R. Br. Prod. 182.—Austral.
Mitchelli, Benth. Fl. Austral. vii. 606.—Austral.
mutica, Benth. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 180.—Am. bor. occ.
novaeboracensis, Desv. Opusc. 99, in obs. = *cuprea*.
pallida, Spreng. Neuc Entdeck. i. 246 = *Glyceria pallida*.
parviflora, R. Br. Prod. 182 = *Diplachne parviflora*.
plumosa, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 110.—Afr. trop.
procera, R. Br. Prod. 182.—Austral.
pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 155. t. 47.—Am. bor. occ.
pungens, R. Br. Prod. 182.—Austral.
pungens, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 340 = *Mitchelli*.
Schaffneri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 181.—Mexic.
seslerioides, Benth. ex Vasey, Gr. U. St. 35.—Am. bor.
splendida, Steud. Syn. Pl. Gram. 249 = *Deschampsia caespitosa*.
stricta, Benth. ex Vasey, Gr. U. St. 35.—Texas.
texana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 180.—Mexic.
tridenticulata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 249.—Reg. Argent.
trinervigulumis, Benth. ex Vasey, Gr. U. St. 35.—Texas.
viscida, Roem. & Schult. Syst. ii. 599 = *pungens*.

TRIODICA, Steud. Nom. ed. II. ii. 711 (1841), sphalm. = TRIADICA, Lour. = **Sapium**, P. Br. (Euphorb.).

TRIODON, DC. Prod. iv. 566 (1830). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 143.
EBELIA, Reichb. Nom. 74 (1841).
angulatus, Benth. Pl. Hartw. 70.—Mexic.
anthospermoides, DC. Prod. iv. 566.—Bras.
glomeratus, DC. I. c.—Bras.
laxus, Benth. Pl. Hartw. 194 (sphalm., *Triodia*).—Ecuador.
polymorphus, DC. Prod. iv. 566.—Bras.

TRIODON, Rich. in Pers. Syn. i. 60, in nota (1805) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).
setaceus, Rich. I. c. = R. tenerrima, Nees.

TRIODUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106 = **Carex**, Dill. (Cyperac.).

TRIOLENA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 328. **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 757.
hirsuta, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 81.—Am. trop.
pustulata, Triana, l. c.—Ecuador.
scorpioides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 328.—Mexic.

TRIOMMA, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 171. **BURSERACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 323.
malaccensis, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 171.—Malacca.

TRIONAEA, Medic. Malv. 45 (1787) = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).

TRIONUM, Linn. Syst. ed. I (1735); Medic. Malv. 46 (1787) = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).
annuum, Medic. Malv. 47 = H. Trionum.
cordifolium, Moench, Meth. Suppl. 202 = H. Trionum.
diffusum, Moench, Meth. 618 = H. Trionum.
frutescens, Medic. Malv. 47 = H. Trionum.

TRIOPTERIS, Linn. Gen. ed. I. 343 (1737). **MAL-PIGHIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 259.
acuminata, Willd. Sp. Pl. ii. 745 = *Tetrapteris mucronata*.

acutifolia, Willd. I. c. 744 = *Tetrapteris acutifolia*.
argentea, Salzm. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 50 = *Banisteria nummifera*.

bifurca, Gaertn. Fruct. ii. 168 = *Tetrapteris citrifolia*.
brasiliensis, Poir. Encyc. viii. 105 = *Banisteria ferruginea*.

buxifolia, Willd. Sp. Pl. ii. 745 = *Tetrapteris buxifolia*.
citrifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 75 = *Tetrapteris citrifolia*.

discolor, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 182 = *Tetrapteris discolor*.

divaricata, A. Rich. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 412 = *Banisteria divaricata*.

floribunda, Thunb. Pl. Bras. Dec. i. 14.—Bras.
havanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 168. t. 451.—Cuba.

Hiraea, Gaertn. Fruct. ii. 169 = *Hiraea reclinata*.
inaequalis, Rausch. Nom. ed. III. 131 = *Tetrapteris citrifolia*.

indica, Willd. Sp. Pl. ii. 744 = *Aspidopterys Roxburghiana*.

jamaicensis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 379 = *Hiptage Madablota*.

jamaicensis, Linn. Sp. Pl. 428.—Ind. occ.

lingulata, Poir. Encyc. viii. 104.—Ins. S. Doming.

lucida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 167. t. 451.—Cuba.

macrophylla, Salzm. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 99 = *Hiraea Salzmanniana*.

mexicana, Walp. Rep. v. 314, sphalm. = *Tetrapteris Schiedeana*.

odorata, Poir. Encyc. viii. 108 = *Triaspis odorata*.
ovata, Cav. Diss. 431. t. 259.—Ins. S. Doming.

parvifolia, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. (1840) 266.—Ins. Baham.

pauciflora, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 183 = *Diplopterys Paralias*.

pinnata, Poir. Encyc. viii. 108 = *Flabellaria paniculata*.

Poliandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 380 = *Berrya Ammonilla*.

polycarpa, Salzm. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 562 = *Hiraea maritima*.

quadrialata, Pav. ex A. Juss. I. c. 539 = *Tetrapteris Schiedeana*.

reclinata, Cav. Diss. ix. 431 = *Hiraea reclinata*.
rigida, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 75.—Ins. S. Doming.

sericea, Schlecht. in Linnaea, x. (1836) 243 = *Gaudichaudia Schiedeana*.

volubilis, Salzm. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 552 = *Hiraea sepium*.

TRIOPTERYS, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. 265 (1840) = *praec*.

TRIOPTOLEMEA, Mart. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 102 = **TRIPTOLEMEA**, Mart. = **Dalbergia**, Linn. (Legumin.).

TRIOSTEON, Dill. ex Adans. Fam. ii. 500 (1763) = seq.

TRIOSTEUM, Linn. Sp. Pl. ed. I. 176 (1753). **CAPRIFOLIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 4.

angustifolium, Linn. I. c.—Am. bor.

connatum, Rafin. New Fl. Am. ii. 35 = *perfoliatum*.

emodorum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 82 = *hirsutum*.

himalayanum, Wall. Cat. n. 484 = *hirsutum*.

hirsutum, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 538.—Reg. Himal.

hispidum, Rafin. New Fl. Am. ii. 37 (Quid ?).—Am. bor.

levigatum, Rafin. I. c. (Quid ?).—Am. bor.

majus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 107 = *perfoliatum*.

minus, Michx. I. c. = *angustifolium*.

molle, Rafin. New Fl. Am. ii. 36 (Quid ?).—Am. bor.

obovatum, Rafin. I. c. 37 = *perfoliatum*.

TRIOSTEUM:—

perfoliatum, Linn. *Sp. Pl.* 176.—Am. bor.
 pinnatifidum, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvii.
 (1881) 476.—China.
 pumilum, Rafin. *New Fl. Am.* ii. 36 = angustifolium.
 sinuatum, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xv. (1871)
 373.—Japon.
 triflorum, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 37 = Sabicea triflora.
 villosum, Rafin. *New Fl. Am.* ii. 36 (Quid?).—Am.
 bor.

TRIPAGANDRA, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 16 (1836) =
Tradescantia, Linn. (Commel.).
 multiflora, Rafin. l. c. = Trad. multiflora.

TRIPENTAS, Casp. in *Monatsb. Berl. Akad.* 1857 (1858)
 43; et in *Pringsh. Jahrb.* i. (1858) 497, in obs. =
Hypericum, Tonrn.

TRIPETALEIA, Sieb. & Zucc. in *Abh. Akad. Muench.*
 iii. II. (1843) 731. t. 3. f. 2 = **Elliottia**, Muhl.
 (Ericac.).
 bracteata, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xi. (1867)
 433 = E. bracteata (in Addend.).
 paniculata, Sieb. & Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* iii.
 II. (1843) 731 = E. paniculata (in Addend.).

TRIPETELUS, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 14
 (1839) = **Sambucus**, Tourn. (Caprifol.).
 australasicus, Lindl. l. c. = S. xanthocarpa.

TRIPHA, Noronha, in *Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I.
 Art. iv. 4 = **Cupania**, Plum. (Sapind.).

TRIPHACA, Lour. *Fl. Cochinch.* 577 (1790) = **Ster-
 culia**, Linn.
 africana, Lour. l. c. = S. Triphaca.

TRIPHASIA, Lour. *Fl. Cochinch.* 152 (1790).
RUTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 303.
 Aurantiola, Lour. l. c. 153.—As. trop.
 diacantha, M. Roem. *Syn. Hesper.* 37 = T. Aurantiola.
 glauca, Lindl. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 353 =
 Atalantia glauca.
 javanica, M. Roem. *Syn. Hesper.* 38 = T. Aurantiola.
 monophylla, DC. *Prod.* i. 536 = Atalantia trimera.
 sarmentosa, Blume, *Bijdr.* 132 = Luvunga eleuthe-
 randra.
 trifoliata, DC. *Prod.* i. 536; Blume, l. c. = T.
 Aurantiola.

TRIPHELIA, R. Br. ex Endl. in *Enum. Pl. Hueg.* 48
 (1837) = **Actinodium**, Schau. (Myrtac.).
 brunioides, R. Br. ex Endl. l. c. = A. Cunninghamii.

TRIPHORA, Nantt. *Gen. Am.* ii. 192 (1818) = **Pogonia**,
 Juss. (Orchid.).
 gentianoides, Nutt. l. c. 193, in nota = P. gentianoides.
 pendula, Nutt. l. c. = P. pendula.

TRIPHYLLOIDES, Moench, *Meth.* 509 (1794) = **Tri-
 folium**, Tourn. (Legumin.).
 angustifolia, Moench, l. c. 510 = Trifolium angusti-
 folium.
 clypeata, Moench, l. c. = Trifolium clypeatum.
 comosa, Moench, l. c. 509 = Trifolium subterraneum.
 nervosa, Moench, l. c. 510 = Trifolium alpestre.
 rigida, Moench, l. c. 509 = Trifolium lappaceum.
 rubens, Moench, l. c. = Trifolium rubens.

TRIPHYLLUM, Medic. *Phil. Bot.* i. 202 (1789) =
Medicago, Tourn. (Legumin.).
 platycarpus, Medic. l. c. = M. platycarpa.

TRIPHYSARIA, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.*
 ii. 52 (1835) = **Orthocarpus**, Nutt. (Scrophul.).
 versicolor, Fisch. & Mey. l. c. = O. erianthus.

TRIPINNA, Lour. *Fl. Cochinch.* 391 (1790) = **Colea**,
 Boj. (Bignon.).
 africana, Voigt, *Hort. Snburb. Calc.* 479.—Afr. trop.
 vel Ins. Mascar.
 tripinnata, Lour. *Fl. Cochinch.* 391 = C. tripin-
 nata.

TRIPINNARIA, Pers. *Syn.* ii. 173 (1807) = **Colea**, Boj.
 (Bignon.).
 africana, Spreng. *Syst.* ii. 842 (= *Tripinna africana*).
 —Afr. trop. vel Ins. Mascar.

VOL. II.

TRIPINNARIA:—

asiatica, Spreng. *Syst.* ii. 842 = Colea tripinnata.
 cochinchinensis, Pers. *Syn.* ii. 173 = C. tripinnata.
 tripinnata, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 712 = C. tripin-
 nata.

TRIPLACHNE, Link. *Hort. Berol.* ii. 241 (1833).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1151.
 nitens, Link. l. c. = Sicil.

TRIPLADENIA, D. Don, in *Proc. Linn. Soc.* i. (1839)
 46 = **Kreysigia**, Reichb. (Liliac.).
 Cunninghamii, D. Don, l. c. = K. multiflora.

TRIPLANDRA, Rafin. *Sylva Tellur.* 62 (1838) = **Croton**,
 Linn. (Euphorb.).
 lanata, Rafin. l. c. 63 = C. lanatus.

TRIPLANDRON, Benth. *Bot. Voy. Sulph.* 73. t. 38
 (1844) = **Clusia**, Linn. (Guttif.).
 lineatum, Benth. l. c. = C. lineata.
 lineatum, Seem. *Bot. Voy. Herald*, 88 = C. Seemanni.

TRIPLARINA, Rafin. *Sylva Tellur.* 104 (1838) =
Baeckea, Linn. (Myrtac.).
 camphorata, Rafin. l. c. = B. camphorata.

TRIPLARIS, Loeffl. *It. Hisp.* 256 (1758); Linn.
Syst. ed. X. 881 (1759). **POLYGONACEAE**, Benth.
 & Hook. f. iii. 104.

BLOCHMANIA, Reichb. *Consp.* 163 (1828).
 VELLASQUEZIA, Bertol. *Fl. Guatim.* 39. t. 11 (1840).
 americana, Aubl. *Pl. Gui.* ii. 910. t. 347; Rottb. in
Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 274. t. 3 = surina-
 mensis.

americana, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 182 = fel-
 pensis.

americana, Linn. *Syst. ed.* X. 881.—Am. austr.
 americana, Pav. ex Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 175 =
 auriculata.

americana, Rob. Schomb. in *Ann. Nat. Hist. Ser.* I. i.
 (1838) 264 = Schomburgkiana.

americana, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 100, partim = Vah-
 liana.

apetala, Walp. *Ann.* iii. 295 = Ruprechtia apetala.

Arnottiana, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 176.—Ecuador.

auriculata, Meissn. l. c. 174.—Mexic.

Bonplandiana, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. xiii.
 (1849) 262.—Peruv.

brachystachya, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 55 = Ruprechtia
 brachystachya.

brasiliiana, Cham. in *Linnaea*, viii. (1833) 139.—
 Bras.

caracasana, Cham. l. c. 137.—N. Granat.

colombiana, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 175 = Cumin-
 giana.

coriacea, Karst. *Fl. Columb.* ii. 131. t. 169.—Vene-
 zuela.

crenata, Casar. *Nov. Stirp. Bras. Dec.* 80 (sp. dnb.).—
 Bras.

Cumingiana, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in *Mém.*
Acad. Pétersb. Sér. VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—
 N. Granat.

cuneata, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 55, sphalm. = crenata.

felipensis, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. xiii. (1849)
 263.—N. Granat.

Gardneriana, Wedd. l. c. 265.—Bras.

guayaquilensis, Wedd. l. c. 264.—Ecuador.

laurifolia, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828)
 55 = Ruprechtia laurifolia.

Lindeniana, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. xiii.
 (1849) 266.—N. Granat.

macrocalyx, Casar. *Nov. Stirp. Bras. Dec.* ix. 79 (sp.
 dub.).—Bras.

Martiana, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in *Mém. Acad.*
Pétersb. Sér. VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 149.—Bras.

mollis, Walp. *Ann.* iii. 296 = Ruprechtia mollis.

Noli-tangere, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. xiii.
 (1849) 264.—Bras.

Pachau, Mart. *Reise Bras.* iii. 1011, nomen; et ex
 Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 177.—Bras.

paraguayensis, Parodi, in *Anal. Soc. Cient. Argent.* v.
 (1878) 157; *Contrib.* 50.—Reg. Argent.

Pavonii, Meissn. in *DC. Prod.* xiv. 172.—Peruv.

peruviana, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in *Mém. Acad.*
Pétersb. Sér. VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 149.—Peruv.

Poeppigiana, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. xiii.
 (1849) 265.—Peruv.

TRIPLARIS:—

prognostica, Rottb. in *Act. Lit. Univ. Hafn.* i. (1778)
 285.—Guian.

Purdiei, Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i. 49.—N.
 Granat.

pyramidalis, Jacq. *Select. Am.* 13. t. 173. f. 5 (Quid?).
 —N. Granat.

ramiflora, Jacq. l. c. 14 = Ruprechtia ramiflora.

ramiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i. 54
 = Ruprechtia Lundii.

Riedeliana, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in *Mém.*
Acad. Pétersb. Sér. VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 149.—
 Bras.

salicifolia, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828)
 56 = Ruprechtia salicifolia.

salicifolia, Miq. ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i. 54
 = Ruprechtia laurifolia.

scandens, Schott, ex Meissn. l. c. = Ruprechtia lauri-
 folia.

Schomburgkiana, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.*
 iv. (1845) 628.—Guian.

surinamensis, Cham. in *Linnaea*, viii. (1833) 138.—
 Guian.

tenuiflora, Endl. *Gen. Suppl.* iv. II. 55 = Ruprechtia
 tenuiflora.

tomentosa, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. xiii. (1849)
 265.—Bras.

Vahlia, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in *Mém. Acad.*
Pétersb. Sér. VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

viridiflora, Schott, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. i.
 54 = Ruprechtia Lundii.

VI. *Sc. Nat.* iv. (1845) 148.—Guian.

TRIPLOBUS, Rafin. Sylva Tellur. 110 (1838) = **Sterculia**, Linn.
cordata, Rafin. l. c. 111 = *S. cordata*.

TRIPLOCENTRON, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 38 (1826) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
apulum, Cass. l. c. lv. 349 = *C. melitensis*.
melitense, Cass. l. c. xlv. 38; lv. 349 = *C. melitensis*.
solstitiale, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 97 = *C. solstitialis*.
sulphureum, Webb, Iter Hisp. 33 = *C. sulphurea*.

TRIPLOCHITON, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 13 = **Hibiscus**, Linn. (Malv.).
setosa, Alef. l. c. = *H. panduraeformis*.
spathacea, Alef. l. c. = *H. vulpinus*.

TRIPLOLEPIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 251 = **Streptocaulon**, Wight & Arn. (Asclep.).
Cumingii, Turcz. l. c. = *S. Cumingii*.

TRIPLOMEIA, Rafin. Sylva Tellur. 134 (1838) = **Aerodielidium**, Nees (Laurin).
montana, Rafin. l. c. 135 = *A. jamaicense*.

TRIPLORHIZA, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 149 = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

TRIPLOSPERMA, G. Don, Gen. Syst. iv. 134 (1837) = **Ceropegia**?, Linn. (Asclep.).
cochinchinensis, G. Don, l. c. = *Cochinch.*

TRIPLOSTEGIA, Wall. ex DC. Prod. iv. 642 (1830).
DIPSACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 158.
glandulifera, Wall. ex DC. l. c.; et Cat. n. 436.—Reg. Himal.
glandulosa, DC. Mém. Valér. 23. t. 5, sphalm. = praec.

TRIPODANTHERA, M. Roem. Syn. Pepon. 48 (1846) = **Gymnopetalum**, Arn. (Cucurb.).
cochinchinensis, M. Roem. l. c. = *G. cochinchinense*.

TRIPODION, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 348 = **Anthyllis**, Riv. (Legumin.).
lotoides, Medic. l. c. = *A. tetraphylla*.
tetraphyllum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 359 = *A. tetraphylla*.

TRIOGON, Roth, Nov. Pl. Sp. 79 (1821). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1169.
PLAGIOLYTRUM, Nees, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 95.

abyssinicus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 301.—Abyss.
bromoides, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1200 = *abyssinicus*.
bromoides, Roth, Nov. Pl. Sp. 79.—Ind. or.
capillatus, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 47.—Ind. or.
exiguus, Buese, in Miq. Pl. Fungh. 353.—Java.
festuoides, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 49 = *bromoides*.
filiformis, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 301.—Ind. or.
Griffithii, Nees & Arn. ex Steud. l. c. = *bromoides*.
lanatus, Hochst. ex Steud. l. c. = *bromoides*.
major, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 230.—Afr. trop.
minimus, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 301 = *abyssinicus*.
semitruncatus, Nees, ex Steud. l. c. = *filiformis*.
unidentatus, Nees, l. c. = *filiformis*.
zeylanicus, Nees, l. c. = *bromoides*.

TRIPOLION, Rafin. Fl. Tellur. ii. 46 (1836) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
maritimum, Rafin. l. c. = *A. Tripolium*.
tataricum, Rafin. l. c. = *A. tataricus*.
tenellum, Rafin. l. c. = *A. tenellus*.

TRIPOLIUM, Nees, Gen. et Sp. Aster. 152 (1833) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
andinum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 129.—Chili.
angustum, Lindl. in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 15 = *A. angustum*.
caricifolium, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 721 = *A. pauciflorum*.
conspicuum, Lindl. ex DC. Prod. v. 254 = *A. imbricatus*, Walp. (cf. Addend.).
divaricatum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 296 = *A. exilis*.

TRIPOLIUM :—

flexuosum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 155 = *Aster tenuifolius*.
frondosum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 296 = *A. frondosus*.
imbricatum, Nutt. l. c. 297 = *A. imbricatus*, Walp. (cf. Addend.).
longicaule, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 327 = *A. Tripolium*.
maritimum, Léveillé, in Demid. Voy. Russ. Mér. ii. 193, 236, 237 = *A. Tripolium*.
occidentale, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 296 = *A. occidentalis*.
oregonum, Nutt. l. c. = *A. oreganus*.
paludosum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 155 = *A. paludosus*.
pannonicum, Schur, Enum. Pl. Transs. 304 = *A. Tripolium*.
pauciflorum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 157 = *A. pauciflorum*.
subulatum, Nees, l. c. 156 = *A. subulatum*.
uniflorum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 129.—Chili.
vulgare, Nees, Gen. et Sp. Aster. 153 = *A. Tripolium*.

TRIPSACUM, Linn. Syst. ed. X. 1261 (1759).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1113.

aegilopoides, Kunth, Enum. Pl. i. 602 (Index) = *Rottboellia hirsuta*.
aristatum, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 306 = *Ischaemum aristatum*.
ciliare, Rasp. l. c. = *Elionurus tripsacoides*.
compressum, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 466, in obs. = *dactyloides*.
compressum, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 306 = *Hemarthria compressa*.
cylindricum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 60 = *Rottboellia cylindrica*.
dactyloides, Linn. Syst. ed. X. 1261.—Am. bor.
dactyloides, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 40 = *fasciculatum*.
distachyum, Poir. Encyc. viii. 114 = *Ischaemum rugosum*.
distichum, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 306 = praec.
fasciculatum, Rasp. l. c. = *Chloris radiata*.
fasciculatum, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 712.—Mexic.
giganteum, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 306 = *Anthistria gigantea*.
granulare, Rasp. l. c. = *Manisuris granularis*.
hermaphroditum, Linn. Syst. ed. X. 1261 = *Anthephora elegans*.
hirsutum, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 306 = *Rottboellia hirsuta*.
lanceolatum, Rupr. ex Benth. Pl. Hartw. 347 = *dactyloides*.
monostachyon, Willd. Sp. Pl. iv. 202; Hort. Berol. l. t. 1 = *dactyloides*.
mucronatum, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 306 = *Trachys mucronata*.
muticum, Rasp. l. c. = *Ischaemum muticum*.
Myuros, Rasp. l. c. = *Rottboellia Myuros*.
panicum, Rasp. l. c. = *Pogonatherum saccharoideum*.
pubescens, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 317, in syn.; ii. 712 = *Cenchrus pubescens*.

TRIPSILINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 103 (1836) = **Passiflora**, Linn.
fetida, Rafin. l. c. = *P. foetida*.

TRIPTERANTHUS, Wall. ex Miers, in Lindl. Vcg. Kingd. 172 (1847) = **Burmanna**, Linn.

TRIPTERELLA, Michx. Fl. Bor. Am. i. 19. t. 3 (1803) = **Burmanna**, Linn.

alba, Schult. Mant. i. 358 = *B. alba*.
bicolor, Schult. l. c. 357 = *B. bicolor*.
caerulea, Muhl. Cat. ed. I. 4; et Ell. Sketch. i. 43 = *B. biflora*.
capitata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 19. t. 3 = *B. capitata*.
dasyantha, Schult. Mant. i. 357 = *B. dasyantha*.
flava, Schult. l. c. = *B. flava*.

TRIPTERIS, Less. in Linnaea, vi. (1831) 95. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 455.
aghillana, DC. Prod. vi. 457.—Afr. austr.
amplectens, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 427 = *arborescens*.

TRIPTERIS :—

amplexicaulis, DC. Prod. vi. 457 = *arborescens*.
amplexicaulis, Less. in Linnaea, vi. (1831) 97.—Afr. austr.
arborescens, Less. l. c. 96.—Afr. austr.
atropurpurea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 212 = *clandestina*.
Burchellii, Hook. f. in Melliss, St. Helena, 290. t. 45.—Ins. S. Helena.
cheiranthifolia, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 26, nomen = *Vaillantii*.
clandestina, Less. in Linnaea, vi. (1831) 97.—Afr. austr.
dentata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 427.—Afr. austr.
flexuosa, Harv. l. c. 429.—Afr. austr.
gariepina, Sond. ex Harv. & Sond. l. c. 432 = *pachypteris*.
glabrata, Harv. l. c. 425 = *macroptera*.
glandulosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 93.—Afr. austr.
herbacea, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 458 = *clandestina*.
humilis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 211.—Afr. austr.
hyoseroides, DC. Prod. vi. 458 = *clandestina*.
incana, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 426.—Afr. austr.
Kraussii, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 767 = *setifera*?
leptoloba, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 432.—Afr. austr.
limonifolia, DC. Prod. vi. 458.—Afr. austr.
linearis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 426.—Afr. austr.
Lordii, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 424.—Afr. trop.
macroptera, DC. Prod. vi. 456.—Afr. austr.
microcarpa, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 427.—Afr. austr.
monocephala, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 424.—Afr. trop.
natalensis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 430.—Afr. austr.
oppositifolia, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 456 = *sinuata*.
pachypteris, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 432.—Afr. austr.
pallenscens, DC. Prod. vi. 456.—Afr. austr.
petiolata, DC. l. c. 457.—Afr. austr.
polycephala, DC. l. c. 458.—Afr. austr.
rigida, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 426.—Afr. austr.
scariosa, DC. Prod. vi. 458 = *clandestina*.
setifera, DC. l. c. 457.—Afr. austr.
sinuata, DC. l. c. 456.—Afr. austr.
spatulata, DC. l. c. 457.—Afr. austr.
spinescens, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 431.—Afr. austr.
Thomii, Harv. l. c. 426 = *macroptera*.
tomentosa, Less. Syn. Comp. 90, in obs.—Afr. austr.
Vaillantii, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 260.—Arab.

TRIPTERIS, Thunb. Pl. Bras. Dec. i. 14 (1817), sphalm. = **Triopteris**, Linn. (Malpig.).

TRIPTERIUM, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 14 (1823) = **Thalictrum**, Tourn. (Ranunc.).
alpestre, Schur, Enum. Pl. Transs. 974 (Index) = *Th. aquilegifolium*.
aquilegifolium, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 14 = *Th. aquilegifolium*.
calabricum, Bercht. & Presl, l. c. = *Th. calabricum*.
contortum, Bercht. & Presl, l. c. = *Th. aquilegifolium*.
pauciflorum, Schur, Enum. Pl. Transs. 7 = *Th. aquilegifolium*.
transsilvanicum, Schur, in Verh. Siebnb. Ver. Naturw. iv. (1853) 10 = *Th. minus*.

TRIPTEROCALYX, Hook. Kew Journ. v. (1853) 261 = **Abronia**, Juss. (Nyctag.).
macrantha, Torr. ex Hook. l. c. = *A. Cycloptera*.

TRIPTEROCARPUS, Meissn. Gen. 52 (1837) = **Bridgesia**, Bert. (Sapind.).
incisifolia, Meissn. Comm. 37 = *B. incisifolia*.

TRIPTEROCOCCUS, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 17 (1837) = **Stackhousia**, Sm.
brachystigma, Schuch. in Linnaea, xxvi. (1853) 33 = *S. Brunonis*.
Brunonis, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 18 = *S. Brunonis*.

TRIPTEROCOCCUS:—

juncus, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 181 = *Stackhousia* Brunonis.
simplex, Bunge, l. c. = *S. Brunonis*.
spathulatus, F. Muell. ex Schuch. in Linnaea, xxvi. (1853) 29 = *S. spathulata*.

TRIPTEROSPERMUM, Blume, Bijdr. 849 (1826) = *Crawfordia*, Wall. (Gentian.).

caucasicum, Owerin, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 454, sphalm. = *Tripleurospermum caucasicum*?
Championii, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 15 = *C. japonica*.
trinerve, Blume, Bijdr. 849 = *C. Blumei*.

TRIPTYERYGIUM, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 368 (1862). *CELASTRINEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

Bullockii, Hance, in Journ. Bot. xviii. (1880) 259 = *Wilfordii*.
Wilfordii, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 368. — China; Japon.

TRIPTILION, Ruiz & Pav. Prod. 102. t. 22 (1794). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 503.

Achilleae, DC. Prod. vii. 51. — Chili.
andinum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 116. — Chili.
axillare, Lag. ex Lindl. in Bot. Reg. sub t. 853 = *Nassauvia axillaris*.
Benaventii, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 357. t. 39. — Chili.
bulbosum, Remy, l. c. 358. — Chili.
capillatum, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 43; DC. Prod. vii. 51. — Chili.
chilense, Bert. ex DC. l. c. = *Achilleae*.
cordifolium, Lag. in Bot. Reg. t. 853. — Chili.
diffusum, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 221. — Chili.
euphrasioides, Bert. ex DC. Prod. vii. 51. — Chili.
gibbosum, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 356. — Chili.
glomerulosum, Lag. ex Lindl. in Bot. Reg. sub t. 853 = *Nassauvia glomerulosa*.
laciniatum, Willd. Sp. Pl. iii. 1626 = *spinosum*.
laxum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 116. — Chili.
maritimum, Poepp. ex DC. Prod. vii. 51 = *cordifolium*.
pectinatum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1856) ii. 329. — Chili.
spinosum, Ruiz & Pav. Syst. Veg. i. 185. — Chili.
tennifolium, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 117. — Chili.

TRIPTILIUM, DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 67 = *praec.*TRIPTILODISCUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 66 = *Helipterum*, DC. (Compos.).

pygmaeus, Turcz. l. c. = *H. Dimorpholepis*.

TRIPTOLEMAEA, Walp. Rep. i. 800 (1842), sphalm. = *seq.*TRIPTOLEMEA, Mart. in Flora, xx. (1837) ii. Beibl. 122 = *Dalbergia*, Linn. f. (Legumin.).

glabra, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 103 = *D. variabilis*.
latifolia, Benth. l. c. = *D. variabilis*.
montana, Mart. in Flora, xx. (1837) ii. Beibl. 122 = *D. variabilis*.
myriantha, Mart. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 102 = *D. variabilis*.
ovata, Benth. l. c. = *D. variabilis*.
pauciflora, Mart. ex Benth. l. c. = *D. variabilis*.
platycarpa, Benth. l. c. = *D. variabilis*.
pubescens, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 68 = *D. variabilis*.
riparia, Mart. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 103 = *D. riparia*.

TRIQUETRA, Medic. in Vorles. Chnrf. Phys. Ges. ii. (1787) 376 = *Astragalus*, Tourn. (Legumin.).

boetica, Medic. l. c. = *A. baeticus*.

TRIRAPHIS, R. Br. Prod. 185 (1810). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1177.

bromoides, F. Muell. Fragm. viii. 108. — Austral.
danthonioides, F. Muell. l. c. 125. — Austral.
diantha, F. Muell. l. c. = *pungens*?

TRIRAPHIS:—

microdon, Benth. Fl. Austral. vii. 605 (sp. dub.). — Austral.
mollis, R. Br. Prod. 185. — Austral.
pumilio, R. Br. in Denh. & Clapp. Trav. App. 245. — Afr. trop.
pungens, R. Br. Prod. 185. — Austral.

TRIRAPHIS, Nees, Fl. Afr. Austr. 270 (1841) = *Danthonia*, DC. (Gramin.).

capensis, Nees, l. c. 271 = *Trisetum insulare*.

TRISACARPIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 11 (1836) = *Hippeastrum*, Herb. (Amaryll.).

falcata, Rafin. l. c. = *H. calyptratum*.
psittacina, Rafin. l. c. = *H. psittacinum*.
rubra, Rafin. l. c. = *H. aulicum*.

TRISANTHUS, Lour. Fl. Cochinch. 175 (1790) = *Hydrocotyle*, Tourn. (Umbell.).

cochinchinensis, Lour. l. c. 176 = *H. asiatica*.

TRISCENIA, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 534. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1119.

ovina, Griseb. l. c. — Cuba.

TRISCHIDIUM, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 141. t. 4 = *Swartzia*, Schreb. (Legumin.).

vestitum, Tul. l. c. 142 = *S. mollis*.

TRISCIADIA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 68 (1873). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

truncata, Hook. f. l. c. 69. — Ins. Penang.

TRISCIADIUM, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1861) i. 61 = *Huanaca*, Cav. (Umbell.).

andinum, Phil. l. c. = *H. andina*.

TRISEMA, Hook. f. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 47. t. 1. *DILLENACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 14.

TRISEMMA, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 211 (1874).

VANIERIA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 176.

coriacea, Hook. f. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 47. — N. Caléd.

Pancheri, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 211 = *coriacea*.

Vieillardii, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 191; et in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ii. (1864) 150. — N. Caléd.

TRISEMMA, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 211 (1874), sphalm. = *praec.*TRISEPALUM, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 363 (1884). *GESNERACEAE*.

acutum, C. B. Clarke, l. c. 364. — Burma.
obtusum, C. B. Clarke, l. c. 363. — Burma.

TRISETARIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 27 (1775). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1154.

ANOMALOTIS, Steud. Syn. Pl. Gram. 198 (1855).

airoides, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 265 = *Trisetum subspicatum*.

alpestris, Baumg. l. c. 264 = *Trisetum alpestre*.

brevifolia, Baumg. Mant. 80 (1846) = *Trisetum distichophyllum*.

carpatia, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 263 = *Trisetum carpathicum*.

flavescens, Baumg. l. c. = *Trisetum pratense*.
Forskählii, J. F. Gmel. Syst. 177 = *linearis*.

linearis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lx. — Aegypt.; Arab.

pratensis, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 264 = *Avena pratensis*.

pubescens, Schur, Enum. Pl. Transs. 974 (Index), sphalm. = *Avena pubescens*.

quinqueseta, Hochst. in Flora, xxxiii. (1855) 282. — Abyss.

sesquiteria, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 262 = *Avena pubescens*.

tenuis, Baumg. l. c. = *Ventenata avenacea*.

TRISETARIUM, Poir. Encyc. Suppl. v. 365 (1817), sphalm. = *seq.*TRISETUM, Pers. Syn. i. 97 (1805). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1159.

ACROSELIUM & *ACROSELIUM*, Bess. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 59.

REBENTISCHIA, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 104.
ROSTRARIA, Trin. Fund. Agrost. 149 (1820).

TRICHAETA, Beauv. Agrost. 86. t. 17. f. 8 (1812).
TRISETARIUM, Poir. Encyc. Suppl. v. 365 (1817).

agrostideum, Fries, Mant. iii. 180. — Europ.
agrostoides, Steud. Syn. Pl. Gram. 226 = *myrianthum*.

airaeforme, Steud. l. c. 229 = *Deschampsia airaeformis*.

airoides, Roem. & Schult. Syst. ii. 666 = *subspicatum*.
Alopecuros, Roem. & Schult. Syst. ii. 660. — Hab. ?

alpestre, Beauv. Agrost. 88. — Europ. med.
alpinum, Roem. & Schult. Syst. ii. 663 = *Avena pratensis*.

andinum, Benth. Pl. Hartw. 261 = *subspicatum*.
andinum, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 93. — Chili.

andropogonoides, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = *Avena andropogonoides*.

anomalum, Steud. l. c. 425. — Madag.
antarcticum, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 307 = *Danthonia antarctica*.

antarcticum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 61. — N. Zel.; Chile.

arenarium, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. v. 10. — Syria; Aegypt.

argenteum, Roem. & Schult. Syst. ii. 665. — Europ. med.

argenteum, Schnr. in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 77 = *distichophyllum*.

argentoideum, Schur, l. c. 74 = *alpestre*.
aristoides, Pers. Syn. i. 98 = *Avena aristoides*.

aureum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 225. — Ind. or.
aureum, Tenore, Fl. Nap. ii. 378. — Ital.

bambusiforme, Fourn. ex Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot. iii. 555. — Mexic.

barbatum, Nees, Fl. Afr. Austr. 345 = *Dregeanum*.
barbatum, Steud. Nom. ed. II. ii. 713; Syn. Pl. Gram. 229. — Chili.

barbinode, Trin. in Linnaea, x. (1836) 300. — Chili.

baregense, Laff. & Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) 46 = *agrostideum*.

Berteroanum, Kunth, Rév. Gram. ii. 457. t. 142 = *Deschampsia Berteroniana*.

Berteronianum, Steud. Syn. Pl. Gram. 220 = *Aira Gayana*.

biflorum, Hochst. in Flora, xxxviii. (1855) 275. — Abyss.

biflorum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 568. — Chili.

brachyatherum, Phil. l. c. 567. — Chili.

Brandegei, Scribner, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 64. — Am. bor. occ.

brevifolium, Roem. & Schult. Syst. ii. 665 = *distichophyllum*.

Bungei, Boiss. Fl. Orient. v. 535. — Persia.

Burnouffii, Reg. ex Parl. Fl. Ital. i. 263. — Ins. Corsic.

canariense, Parl. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 399 = *panicum*.

canescens, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 100 = *cernuum*.

carpathicum, Roem. & Schult. Syst. ii. 663. — Transsylv.

caudnlatum, Trin. in Linnaea, x. (1836) 300. — Chili.

Cavanillesii, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 63. — Europ. austr.; Oriens; Ind. bor. occ.

cernuum, Trin. l. c. 61. — Ins. Sitcha.

chiloense, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 93. — Ins. Chiloe.

chloranthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 225 = *aureum*, Tenore.

chromostachyum, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 350. — Chili.

compressum, Fuss, Fl. Transs. 727 = *Avena compressa*.

condensatum, Presl, in Schult. Mant. ii. 366 = *aureum*, Tenore.

depauperatum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 291. — Chili.

deyeuxioides, Kunth, Rév. Gram. i. 102 = *Deyeuxia triflora*.

distichophyllum, Beauv. Agrost. 88. — Europ. austr.

distichophyllum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 17 = *rigidum*.

Dregeanum, Steud. Syn. Pl. Gram. 227. — Afr. austr.

TRisetum:—

- Dufourei, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 122.—Hispan.
 elatum, Nutt. ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 337 = cernuum.
 elongatum, Kunth, Rév. Gram. i. 101.—Mexic.
 flavescens, Beauv. Agrost. 88 = pratense.
 Forskëlii, Beauv. l. c. = Danthonia Forskählei.
 fraudulentum, Steud. Syn. Pl. Gram. 424.—Reg. Magellan.
 Friesianum, Steud. l. c. 225 = agrostideum.
 fuscens, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 387.—Alger.
 fuscum, Roem. & Schult. Syst. ii. 664 = carpathicum.
 gallicicum, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 72.—Hispan.
 Gaudinianum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 653 = Cavanillesii.
 glabratum, Schult. Mant. ii. 369 = Avena glabra.
 glabrum, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 100 = Danthonia calycina.
 glabrum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 85 = agrostideum.
 glaciale, Boiss. Elench. 87.—Hispan.
 glomeratum, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 714; Syn. Pl. Gram. 229.—Ins. Sandvic.
 glumaceum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 49.—Aegypt.; Arab.
 Gmelini, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 66.—Hispan.
 gracile, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 654, in textu = Morisii.
 gracile, Fourn. ex Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot. iii. 556.—Mexic.
 groenlandicum, Steud. Syn. Pl. Gram. 228.—Groenland.
 Hallii, Scribner, in Bull. Torrey Bot. Club, xi. (1884) 6.—Texas.
 heteronymum, Steud. Syn. Pl. Gram. 229.—Chili.
 hirsutum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 565.—Chili.
 hirtulum, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = Avena hirta.
 hirtum, Nees, Fl. Afr. Austr. 350 = Avena hirta.
 hirtum, Trin. in Linnaea, x. (1836) 300.—Chili.
 hispanicum, Pers. Syn. i. 97.—Hispan.
 hispidum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 42.—Hispan.
 hispidum, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 849, in syn.; ii. 714 = Koeleria hispida.
 Hohenackeri, Presl, Bot. Bemerck. 120 = Gaudinia fragilis.
 imberbe, Nees, Fl. Afr. Austr. 347 = Danthonia antarctica.
 insulare, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. ii. 267.—Ins. St. Paul (Mare Ind.).
 interruptum, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 100 = elongatum.
 interruptum, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 556.—Mexic.
 labradoricum, Steud. Syn. Pl. Gram. 228.—Labrador.
 lachnanthum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 416 = Avena lachnantha.
 laconicum, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. iv. 129.—Laconia.
 lasiolepis, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 346.—Chili.
 laxiflorum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 566.—Chili.
 laxum, Phil. l. c. 568.—Chili.
 leoninum, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = Danthonia antarctica?
 lineare, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 49 = arenarium.
 litorale, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 92.—Chili.
 lobatum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 66 = Eatonia obtusata.
 Loefflingii, Beauv. Agrost. 88, 180 = hispanicum.
 Loefflingianum, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 30 = aureum, Tenore.
 longiaristum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 417.—Abyss.
 longifolium, Nees, Fl. Afr. Austr. 348.—Afr. austr.
 ludovicianum, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xii. (1885) 6.—Am. bor.
 lusitanicum, Pers. Syn. i. 97 = paniceum.
 luteum, Pers. l. c. = Avena lutea.
 luzonense, Steud. Nom. ed. II. i. 228 = Triticum luzonense.
 macilentum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 66 = Avellinia Michellii.
 macrochaetum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 48.—Palaestin.

TRisetum:—

- macrum, Beauv. Agrost. 88 = Ventenata macra.
 malacanthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 424.—Chili.
 malacophyllum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 566.—Chili.
 malacophyllum, Steud. Nom. ed. II. ii. 714; Syn. Pl. Gram. 229.—Chili.
 melitense, Steud. Syn. Pl. Gram. 225 = aurcum, Tenore.
 Michellii, Guss. Enum. Pl. Inar. 386 = Avellinia Michellii, Bromus festucoides.
 micranthum, Roem. & Schult. Syst. ii. 659.—Europ. austr.
 micratherum, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 352 = Koeleria micrathera.
 Miegévillii, Duval-Jouve, ex Miégév. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) 47 = agrostideum.
 molle, Kunth, Rév. Gram. i. 101 = subspicatum.
 molle, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 64, partim = toluccense.
 monticola, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 291.—Chili.
 Morisii, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 66.—Ins. Sardoia.
 muricatum, Spreng. Syst. i. 333, in syn. = Danthonia papillosa.
 myrianthum, C. A. Mey. in Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 95.—Ital.; Graecia.
 nanum, Steud. Syn. Pl. Gram. 227 = Diplachne nana.
 Neesii, Hochst. ex Steud. l. c. = Avena Neesii.
 neglectum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 41 = gallicicum.
 neglectum, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 29 = aureum, Tenore.
 neglectum, Roem. & Schult. Syst. ii. 660 = paniceum.
 nitidum, Pers. Syn. i. 97.—Ins. Sardoia; Afr. bor.
 nivosum, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 556.—Mexic.
 Noëanum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 48 = aureum, Tenore.
 nudum, Pers. Syn. i. 97 = Danthonia tortuosa.
 ochrostachyum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 290.—Chili.
 ovatum, Pers. Syn. i. 98.—Hispan.
 pallidum, Roem. & Schult. Syst. ii. 657 = Danthonia tortuosa.
 palustre, Torr. Fl. U. St. 126.—Am. bor.
 paniceum, Pers. Syn. i. 97.—Europ.
 paniculatum, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 556.—Mexic.
 pappophoroides, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 52, nomen.—Chili.
 parviflorum, Herb. Bout. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 72 = paniceum.
 parviflorum, Pers. Syn. i. 97.—Ital.; Afr. bor.
 pensylvanicum, Roem. & Schult. Syst. ii. 658 = Avena pensylvanica.
 pensylvanicum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 66 = Eatonia obtusata.
 phleoides, Kunth, Rév. Gram. i. 101 = subspicatum.
 phleoides, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 65 = Koeleria phleoides.
 pilosum, Roem. & Schult. Syst. ii. 662 = Avena pilosa.
 Pourretii, Roem. & Schult. l. c. 661.—Hispan.
 praecox, Dum. Obs. Gram. Belg. 122 = Avena praecox.
 pratense, Dum. l. c. = Avena pratensis.
 pratense, Pers. Syn. i. 97.—Reg. bor. temp.
 Preslei, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 347 = Avena Preslii.
 puberulum, Tenore, Fl. Nap. iv. 17 = Avellinia Michellii.
 pubescens, Roem. & Schult. Syst. ii. 662 = Avena pubescens.
 pubescens, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 65 = Koeleria villosa.
 pumilum, Kunth, Rév. Gram. i. 102.—Reg. Mediterr.; Oriens.
 pungens, Beauv. Agrost. 88.—Hab.?
 purpurascens, Torr. Fl. U. St. 127 = Avena striata, Michx.
 rigidum, Roem. & Schult. Syst. ii. 662.—Reg. Cauc.; As. Min.
 Rohlfii, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxi. (1880) 71.—Aegypt.
 Ruprechtii, Steud. Syn. Pl. Gram. 226 = Avena Ruprechtii.
 scabriusculum, Coss. Notes Crit. 129 = Koeleria scabriuscula.

TRisetum:—

- sericeum, Desv. Opusc. 100.—Bras.
 sesquiflorum, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 66 = Avena sesquiflora.
 sesquiterium, Beauv. Agrost. 88 = Avena pubescens.
 sesquiterium, Schur, Enum. Pl. Transs. 760 = praec.
 sibiricum, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 65 = Avena Ruprechtii.
 smyrnaeum, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 66 = Koeleria biseta.
 spiciforme, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 86 = subspicatum.
 splendens, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 30 = pratense.
 splendidulum, Steud. Syn. Pl. Gram. 229.—Chili.
 Steudelii, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 308.—Afr. austr.
 striatum, Pers. Syn. i. 97 = Ventenata avenacea.
 subaristatum, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 353.—Chili.
 subspicatum, Beauv. Agrost. 88.—Reg. frigid. bor. et austr.
 tenue, Baumg. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 226 = carpathicum.
 tenue, Roem. & Schult. Syst. ii. 657 = Ventenata avenacea.
 Thunbergii, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 350, in nota = Danthonia antarctica.
 toluccense, Kunth, Rév. Gram. i. 101.—Mexic.
 transsilvanicum, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 77 = pratense.
 transylvanicum, Steud. Syn. Pl. Gram. 226 = carpathicum.
 Trisetaria, Roem. & Schult. Syst. ii. 658 = arenarium.
 umbrosum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 227.—Abyss.
 uniflorum, Meyen, Reise, i. 484 = Agrostis Preslii.
 valesiacum, Boiss. ex Nym. Consp. 814 = Cavanillesii.
 variable, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 351.—Chili.
 varium, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 75 = pratense.
 velutinum, Boiss. Elench. 88.—Hispan.
 villosum, Pers. Syn. i. 97 = Danthonia Thunbergii.
 villosum, Schult. Mant. ii. 368.—Europ.
 villosum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 714 = Danthonia tortuosa.
 virescens, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 226.—Reg. Himal.
 viride, Kunth, Rév. Gram. i. 101 = Deyeuxia viridis, Fourn.
 Virletii, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 556.—Mexic.
 Wilhelmsii, Ledeb. ex Schult. Mant. ii. 367 = rigidum.
 Wolfii, Vasey, in Rep. U. St. Dept. Agric. 1874 (1875), 156 (an seq.?).—Am. bor.
 Wolfii, Vasey, in Rothr. Bot. Rep. U. St. Geogr. Surv. vi. 294 = Graphephorum Wolfii.
 Youngii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 335.—N. Zel.

TRISIOLA, Rafin. Fl. Ludov. 144 (1817) = **Uniola**, Linn. (Gramin.).
paniculata, Rafin. l. c. = U. paniculata.

TRISSAGO, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Teucrium**?, Tourn. (Labiata.).

TRISTACHYA, Nees, Agrost. Bras. 458 (1829).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1161.
MONOPOGON, J. Presl, Rel. Haenk. i. 324. t. 44 (1830).
 arundinacea, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 417.—Abyss.
 barbata, Nees, Fl. Afr. Austr. 269; et ex Steud. Nom. ed. II. ii. 714.—Arab.; Afghan.
 chrysothrix, Nees, Agrost. Bras. 460.—Bras.
 elegans, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 418.—Abyss.
 leiostachya, Nees, Agrost. Bras. 459.—Am. trop.
 leucothrix, Trin. ex Nees, l. c. 460.—Afr. austr.
 mexicana, Kunth, Enum. Pl. i. 308 = leiostachya.
 microstachya, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 238.—Peruv.
 monocephala, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 120.—Afr. austr.
 simplex, Nees, Fl. Afr. Austr. 269 = Trichopteryx simplex.
 somalensis, Franch. in Réveil, Çomali, 67.—Afr. trop.
 Stocksii, Boiss. Fl. Orient. v. 552 = barbata.

TRISTAGMA, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 8 (1833); Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 28. t. 140 (1838). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 798. **STEMMATIUM**, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 551. **STEPHANOLIRION**, Baker, in Gard. Chron. (1875) i. 234. dimorphopetalum, *C. Gay, Fl. Chil.* vi. 126.—Chili. narcisoides, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 799.—Chili. nivale, *Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile*, 9; *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 28. t. 140.—Chili.

TRISTANIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 417 (1812). *MYRTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 708.

CALLOBUXUS, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 372. **LOPHOSTEMON**, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1830) 772; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 54. **TRISTANIOPSIS**, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 371. *albens*, Hort. Berol. ex DC. Prod. iii. 210; et ex A. Cunn. in Bot. Reg. sub t. 1839 = *Syncarpia laurifolia*. *angustifolia*, Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 198 = *Lycarpus ternifolius*. *arborescens*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 156, nomen.—Anstral. *burmannica*, Griff. Cantor Pl. 17.—Burma; Malaya. *capitulata*, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 372.—N. Caled. *conferta*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 417.—Austral. *conferta*, Griff. Notul. iv. 649 = *Griffithii*. *corymbosa*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 797, in syn.; ii. 714 = *Eugenia myrifolia*, Sims. *densiflora*, Carr. in Rev. Hort. (1881) 420.—Austral. *depressa*, Hort. Angl. ex Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 273, nomen; et A. Cunn. in Bot. Reg. sub t. 1839 = *suaveolens*. *exiliflora*, F. Muell. Fragm. v. 11.—Austral. *glauca*, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 471, in syn.—N. Caled. *Griffithii*, Kurz, in Pegu Rep. App. B. 50.—Burma. *insularis*, Vieill. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 300, in syn.—N. Caled. *lactiflua*, F. Muell. Fragm. i. 82.—Austral. *laurina*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 417.—Austral. *macrophylla*, A. Cunn. in Bot. Reg. t. 1839 = *conferta*. *macrosperma*, F. Muell. Papuan Pl. i. 104.—N. Guin. *Maingayi*, Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 467.—Malaya. *merguensis*, Griff. Cantor Pl. 18.—Burma. *myrtifolia*, Ait. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 651, nomen (Quid?).—Austral. *nerifolia*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 417.—Austral. *obovata*, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 127. t. 27.—Ins. Banca. *persicaefolia*, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 350.—Austral. *psidioides*, A. Cunn. in Bot. Reg. sub t. 1839.—Austral. *rhytiphloia*, F. Muell. Fragm. i. 81 = *suaveolens*. *rufescens*, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 259.—Cambodia. *salicifolia*, Link, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 714 = *suaveolens*. *salicina*, A. Cunn. in Bot. Reg. sub t. 1839 = *nerifolia*. *suaveolens*, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 2.—Austral. *subverticillata*, H. Wendl. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 186 = *conferta*. *sumatrana*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 308 = *Whitiana*. *umbrosa*, A. Cunn. in Bot. Reg. sub t. 1839.—Austral. *Whitiana*, Griff. Cantor Pl. 18.—Malaya. *Wightiana*, Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 466 sphalm. = *prae*.

TRISTANIA, Poir. Encyc. Suppl. iv. 526, in obs. (1816) = **Spartina**, Schreb. (Gramin.). *arundinacea*, Poir. l. c. = *S. arundinacea*.

TRISTANIOPSIS, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 371 = **Tristania**, R. Br. (Myrtac.). *Callobuxus*, Brongn. & Gris, l. c. 372.—N. Caled.

TRISTANIOPSIS :—

capitulata, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 372 = *Tristania capitulata*. *glauca*, Brongn. & Gris, l. c. xiii. (1866) 471 = *Tristania glauca*. *Guillainii*, Vieill. ex Brongn. & Gris, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiii. (1870–71) 348.—N. Caled. *Vieillardii*, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 300 = *Tristania insularis*.

TRISTEGIS, Nees, Hor. Phys. Berol. 47, 54 (1820) = **Melinis**, Beauv. (Gramin.). *glutinosa*, Nees, l. c. = *M. minutiflora*.

TRISTELLARIA, Reichb. Consp. 207 (1828) = seq.

TRISTELLATEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 47 (1806). *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 258.

PLATYNEMA, Wight & Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. (July, 1833) 179.

ZYMUM, Noronha, ex Thou. Vég. Iles Afr. Austr. 69 (1807).

africana, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 289.—Afr. trop.

Australasiae, A. Rich. Sert. Astrolab. 159 = seq. *australis*, A. Rich. l. c. 38. t. 15.—Austral.

Bernierana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 497.—Madag.

Bojerana, A. Juss. l. c. 498.—Madag.

cocculifolia, A. Juss. l. c. 499.—Madag.

dulcamara, A. Juss. l. c. 500.—Madag.

heterophylla, A. Juss. l. c. 495.—Madag.

madagascariensis, Poir. Encyc. Suppl. v. 367.—Madag.

malintana, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 267 = *australis*.

montana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 496.—Madag.

novaeaguineensis, Blume, ex A. Juss. l. c. 495 = *australis*.

plurisetia, Baill. Adansonia, xi. (1874) 249.—Madag.

pubescens, Baill. l. c.—Madag.

stenactis, Baill. l. c. 250.—Madag.

TRISTEMMA, Juss. Gen. 329 (1789). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 746.

albiflorum, Benth. in Hook. Niger Fl. 353.—Afr. trop.

angustifolium, Blume, Bijdr. 1079 = *Osbeckia chinensis*.

capitatum, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 56 = *Dissotis capitata*.

cornifolium, Triana, l. c. = *Dissotis cornifolia*.

coronatum, Benth. in Hook. Niger Fl. 354.—Afr. trop.

erectum, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 312 = *Dissotis capitata*.

hirtum, Beauv. Fl. Owar. i. 94; Vent. Choix, sub t. 35.—Afr. trop.

incompletum, R. Br. in Tuckey, Congo, App. 435.—Afr. trop.

intermedium, Steud. Nom. ed. I. 853 = *incompletum*.

involutum, Benth. in Hook. Niger Fl. 354.—Afr. trop.

littorale, Benth. l. c. 353.—Afr. trop.

mauritanum, J. F. Gmel. Syst. 693 = *virusanum*.

neglectum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1850) 299 = *Dissotis cornifolia*.

Schumacheri, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 311. t. 6. f. 6 = *incompletum*.

segregatum, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 56 = *Dissotis segregata*.

theaeifolium, Triana, l. c. = *Dissotis theaeifolia*.

virusanum, Juss. Gen. 329; Vent. Choix, t. 35.—Ins. Mascar.

TRISTEMON, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 245 = **Scyphogyne**, Brongn. (Ericac.).

puberulus, Klotzsch, l. c. = *S. puberula*.

urceolatus, Klotzsch, l. c. = *S. urceolata*.

TRISTEMON, Rafin. Am. Monthly Mag. (1819) 192 = **Triglochin**, Rupp. (Naiad.).

conglomeratus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 32 = *Juncus effusus*.

marginatus, Rafin. l. c. = *Juncus marginatus*.

odoratus, Rafin. l. c. = *Juncus marginatus*.

palustris, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192 = *Trig. palustre*.

polyccephalus, Rafin. Fl. Tellur. iv. 32 = *Juncus scirpoides*.

triander, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192 = *Trig. striatum*.

TRISTEMON, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 586 = **Cucurbita**, Tourn.

texanum, Scheele, l. c. = *C. Pepo*.

TRISTERIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 275 (1884), err. typ. = **TREISTERIA**, Griff. = **Curanga**, Juss. (Scrophul.).

TRISTERIX, Mart. in Flora, xiii. (1830) i. 108 = **Loranthus**, Linn.

aphyllus, G. Don, Gen. Syst. iii. 418 = *L. aphyllus*.

Reinwardtianus, Mart. in Flora, xiii. (1830) 109 = *L. Reinwardtianus*.

tetrandrus, Mart. l. c. = *L. tetrandrus*.

viridiflorus, Mart. l. c. = *L. globosus*.

TRISTICHA, Thou. Gen. Nov. Madag. 3 (1806). *PODOSTEMACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 108.

DUFOUREA, Bory, ex Willd. Sp. Pl. v. 55 (1810).

PHILOCRENA, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1832) 80. t. 6.

alternifolia, Thou. ex Spreng. Syst. i. 22.—Madag.

bifaria, Presl, Rel. Haenk. i. 86.—Ins. Philipp.

bryoides, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 178 = *hypnoides*.

ceylanica, Gardn. l. c. 177 = *Terniolia zeylanica*.

Dregeana, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 112 = *hypnoides*.

fontinaloides, Welw. ex Wedd. in DC. Prod. xvii. 45 = *hypnoides*.

hypnoides, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 10.—Bras.

phasioides, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 41.—Reg. Argent.

Philocrena, Steud. Nom. ed. II. ii. 715 = *hypnoides*.

trifaria, Spreng. Syst. i. 22.—Ins. Mascar.

TRISTICHOCALYX, F. Muell. Fragm. iv. 27 (1863). *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 962.

diffusa, Miers, Contrib. iii. 286.—Austral.

pubescens, F. Muell. Fragm. iv. 27.—Austral.

TRISTIRA, Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 133. *SAPINDACEAE*.

harpullioides, Radlk. l. c.—Ins. Molucc.

triptera, Radlk. l. c.—Ins. Philipp.

TRISTYLEA, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 5 (1870) = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifr.).

florulenta, Jord. & Fourr. l. c. = *S. florulenta*.

TRISTYLIUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 247 = **Cleyera**, DC. (Ternstr.).

mexicanum, Turcz. l. c. 248 = *C. mexicana*.

TRISYNGYNE, Baill. Adansonia, xi. (1874) 136. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 332.

Balansae, Baill. l. c. 137.—N. Caled.

codonandra, Baill. l. c. 136.—N. Caled.

TRITAENICUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 169 = **Asteriscium**, Cham. & Schlecht. (Umbell.).

nudum, Turcz. l. c.—Chili.

TRITAXIS, Baill. Etud. Gén. Euph. 342. t. 11 (1858). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 292.

Beddomei, Benth. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 221.—Ind. or.

Cumingii, Benth. l. c.—Malaya.

Gaudichaudi, Baill. Etud. Gén. Euph. 343.—Cochinch.

macrophylla, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 482 = *Ostodes macrophylla*.

zeylanica, Muell. Arg. l. c. = *Ostodes zeylanica*.

TRITELANDRA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 85 (1836) = **Epidendrum**, Linn. (Orchid.).

fuscata, Rafin. l. c. 86 = *E. anceps*.

TRITELEIA, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1293 (1830) = **Brodiaea**, (Liliac.).

aurea, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 76 = *Milla aurea*.

Berteri, Kunth, Enum. Pl. iv. 467 = *Milla subbiflora*.

bivalvis, Hook. in Lindl. Bot. Reg. sub t. 1293 = *Milla bivalvis*.

brevipes, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 9 = *Milla brevipes*.

TRITELEIA:—

- conspicua*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 43 = *Milla uniflora*.
Gaudichaudiana, Kunth, Enum. Pl. iv. 467 = *Milla bivalvis*.
gracilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 550. —Chili.
graminifolia, Presl, Bot. Bemerk. 116. —Chili.
grandiflora, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1293 = *B. Douglasii*.
hirtella, Kunth, Enum. Pl. iv. 465 = *Milla hirtella*.
laxa, Benth. in Trans. Hort. Soc. Ser. II. i. (1835) 413. t. 15. f. 2 = *B. laxa*.
peduncularis, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1685 = *B. peduncularis*.
Poeppigiana, C. Gay, Fl. Chil. vi. 117 = *Milla Poeppigiana*.
porrifolia, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 10 = *Milla porrifolia*.
Sellowiana, Kunth, Enum. Pl. iv. 466 = *Milla Sellowiana*.
sessilis, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 72 = *Milla sessiliflora*.
uniflora, Lindl. Bot. Reg. t. 1293 = *Milla uniflora*.
uniflora, Van Houtte, in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 283. t. 967 = *Milla Poeppigiana*.
violacea, Kunth, Enum. Pl. iv. 468 = *Milla bivalvis*.

TRITELEYA, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873), reimpr. 74, sphalm. = praec.

TRITHECA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 614 (1855) = *Ammannia*, Houst. (Lythrar.).
pentandra, Miq. l. c. et 1089 = *A. pentandra*.

TRITHRINAX, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 149 (1837 ?). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 925.
DIODOSPERMA, H. Wendl. in Bot. Zeit. xxxvi. (1878) 118.

- acanthocoma*, *Drude*, in *Regel, Gartenfl.* xxvii. (1878) 361. t. 959. —Bras.
aculeata, Liebm. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 320 = *Acanthorhiza aculeata*.
brasiliensis, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 150. —Bras.
brasiliensis, Mart. Palmet. Orbign. 44. t. 10. f. 1, partim = *schizophylla*.
brasiliensis, H. Wendl. in Kerch. Palm. t. 26 = *acanthocoma*.
campestris, *Drude & Griseb.* in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 283. —Reg. Argent.
Chuco, Walp. Ann. i. 1005 = *Acanthorhiza Chuco*.
compacta, Griseb. Cat. Pl. Cub. 221 = *Hemithrinax compacta*.
mauritiaeformis, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 244 = *Sabal mauritiaeformis*.
schizophylla, *Drude*, in *Mart. Fl. Bras.* iii. II. 551. —Bras.

TRITHURIA, Hook. f. Fl. Tasman. ii. 78. t. 138 (1860). *CENTROLEPIDAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1025.

JUNCCELLA, F. Muell. 2nd Gen. Rep. 16 (1854).
occidentalis, Benth. Fl. Austral. vii. 199. —Austral.
submersa, Hook. f. Fl. Tasman. ii. 79. t. 138. —Tasman.

TRITHYROCARPUS, Hassk. in Flora, xlix. (1866) 211 = *Commelina*, Plum.

- gelatinosus*, Hassk. l. c. = *C. gelatinosa*.
oligospatha, Hassk. Commel. Ind. 25 = *C. paleata*.
polyspatha, Hassk. in Flora, xlix. (1866) 211 = *C. obliqua*.
paleatus, Hassk. l. c.; et Commel. Ind. 25 = *C. paleata*.

TRITICUM, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 16 (1737). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1204.

- AEGILOPS*, Linn. Coroll. Gen. 20 (1837).
BROMUS, Scop. Introd. 74 (1777).
CRITHODIUM, Link. in Linnaea, ix. (1834) 132. t. 3.
CRYPTOPYRUM, Heynh. Nom. ii. 174 (1846).
abyssinicum, Steud. Syn. Pl. Gram. 342. —Abyss.
acutum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 153 = *Agropyron acutum*.
acutum, Dethard. Consp. Pl. Megalop. 11 = *Agropyron repens*.
acutum, Fries, Summ. Veg. Scand. 249 = *Agropyron obtusiusculum*.

TRITICUM:—

- aegilopoides*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 26 = *Rottboellia hirsuta*.
aegilopoides, A. Gray, in Proc. Acad. Philad. 1862 (1864) 79 = *Agropyron caninum*.
aegilopoides, Turcz. ex Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 339 = *Agropyron divergens*.
Aegilops, Beauv. Agrost. 180, nomen. —Oriens.
aestivum, Linn. Sp. Pl. 85 = vulgare.
affine, Dethard. ex Kunth, Enum. Pl. i. 441 = *Agropyron acutum*.
alatum, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 234 = durum.
album, Gaertn. ex Steud. Nom. ed. I. 853 = vulgare.
algeriense, Desf. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 697 = durum.
alpinum, G. Don, ex Mitten, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 533 = *Agropyron repens*.
amyleum, Ser. Mélang. Bot. i. 124 = dicoccum.
angustifolium, Link, Enum. Hort. Berol. i. 97 = *Agropyron sibiricum*.
aragonense, Lag. in Varied. Cienc. ii. IV. (1805) 212. —Hispan.
arenicolum, Kern. ex Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt. 197. —Hungar.
Arias, Roxas Clem. in Herrera, Agric. (1818) i. 74 = *T. Spelta*.
aristatum, Hall. [f.] ex Steud. Nom. ed. II. ii. 715 = vulgare.
Arras, Hochst. in Flora, xxxi. (1848) 450. —Abyss.
arundinaceum, Schur, Enum. Pl. Transs. 806 = vulgare.
arundinaceum, Steud. Syn. Pl. Gram. 343 = *Agropyron repens*.
arvense, Schreb. in Koerte & Schweigg. Fl. Erlang. i. 143 = *Agropyron repens*.
asperillum, Link, Handb. i. 18, sphalm. = seq.
asperum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 153. —Hispan.
athericum, Link. in Linnaea, xvii. (1843) 395 = *Agropyron pungens*.
atratum, Host, Gram. Austr. iv. 5. t. 8 = dicoccum.
attenuatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 180 = *Agropyron attenuatum*.
Aucheri, Parl. Fl. Ital. i. 508 = *Agropyron Aucheri*.
baeoticum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 69 = monococcum.
barbinode, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 447 = *Brachypodium sylvaticum*.
Barrelieri, Kunth, Rév. Gram. i. 145 = *Brachypodium pinnatum*.
Bauhini, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6 = durum.
benghalense, Host, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 715, nomen (Quid ?). —Hab. ?
bicorne, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 26. —Aegypt.; Syria.
biflorum, Brign. Fasc. Pl. Forojul. 18 = *Agropyron caninum*.
biflorum, Turcz. ex Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 339 = *Agropyron strigosum*.
biunciale, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 167 = *Festuca Poa*.
Bonaepartis, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 40 = *Agropyron patulum*.
boreale, Turcz. Fl. Baic.-Dahur. ii. i. 345, in obs. = *Agropyron strigosum*.
brachystachyon, Homem. Hort. Hafn. i. 107 = praec. ?
brachystachyum, Lag. ex Schult. Mant. ii. 656 = durum.
brevisetum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 153. —Hab. ?
brizoides, Lam. Illustr. i. 212 = *Demazeria sicula*.
bromoides, [Weber, ex] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 11 = *Brachypodium pinnatum*.
Brownei, Kunth, Rév. Gram. i. 145 = *Agropyron pectinatum*.
bulbosum, Steud. Syn. Pl. Gram. 346 = *Agropyron bulbosum*.
Bungeanum, Trin. in Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 11 = geniculatum.
Buonapartis, Roem. & Schult. Syst. ii. 768, in syn. = *Agropyron patulum*.
caeruleum, Ard. ex Bayle-Barelle, Monog. Agron. Cereal. 39 (Quid ?). —Hab. ?
caesium, Kunth, Rév. Gram. i. 145 = *Agropyron repens*.
caespitosum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 153 = *Brachypodium ramosum*.
caespitosum, Walp. Ann. iii. 782 = *Agropyron caespitosum*.

TRITICUM:—

- campestre*, Roem. & Schult. Syst. ii. 769 = *Secale fragile*.
campestre, Nym. Syll. Suppl. 74 = *Agropyron glaucum*.
candissimum, Bayle-Barelle, Monog. Agron. Cereal. 42; ex Metzger, Europ. Cereal. 18 = durum.
caninum, Ledeb. Fl. Alt. i. 118 = *Agropyron strigosum*.
caninum, Linn. Sp. Pl. 86 = *Agropyron caninum*.
capense, Spreng. Pugill. ii. 23 = *Eragrostis Uniola*.
caucasicum, Spreng. Fl. Hal. Mant. 35 = *Agropyron cristatum*.
caudatum, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 603. —Europ.
caudatum, Pers. Syn. i. 110 = *Agropyron villosum*.
cereale, Bernh. Syst. Verz. Erf. 46 = vulgare.
cereale, Salisb. Prod. 27 = *Secale cereale*.
cereale, Schrank, Baier. Fl. i. 337 = vulgare.
cerulescens, Bayle-Barelle, Monog. Agron. Cereal. 39 (Quid ?). —Hab. ?
Cevallos, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6. —Hispan.
chinense, Trin. ex Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 72. —China.
Cienfuegos, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6 = dicoccum.
ciliare, Trin. ex Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 72. —China.
ciliatum, Cav. Desc. 317; DC. Fl. Fr. iii. 85 = *Brachypodium distachyum*.
cinereum, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 770 (Quid ?). —Hab. ?
clavatum, Seidl, ex Opiz, Natural. n. ix. (1825) 106 = vulgare.
coarctatum, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 716 = *Gaudinia geminiflora*.
cochleare, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6 = durum.
compactum, Host, Gram. Austr. iv. 4. t. 7 = vulgare.
compositum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 126 = vulgare.
compressum, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 770 (Quid ?). —Hab. ?
condensatum, Kunth, Enum. Pl. i. 442 = *Agropyron condensatum*.
creticum, Roem. & Schult. Syst. ii. 769. —Ins. Creta.
crinitum, Kunth, Rév. Gram. i. 144 = *Agropyron crinitum*.
cristatum, Schreb. Besch. Graeser, ii. 12. t. 23. f. 2 = *Agropyron cristatum*.
curvifolium, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 1047 = *Agropyron scirpeum*.
cylindricum, Ces. Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital. 86. —Europ.
cynosuroides, Spreng. Syst. i. 325 = *Festuca cynosuroides*.
dasyanthum, Ledeb. ex Spreng. Syst. i. 326 = *Agropyron dasyanthum*.
dasyphyllum, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 356. —Sibir. altaic.
dasytachyum, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 602 = *Agropyron dasystachyum*.
densiflorum, Willd. Enum. Hort. Berol. 135 = *Agropyron densiflorum*.
desertorum, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 97 = *Agropyron sibiricum*.
dicoccum, Schrank, Baier. Fl. i. 389. —Europ. (cult.).
distachyon, Brot. Fl. Lusit. i. 119 = *Brachypodium distachyum*.
distans, Walp. Ann. iii. 782 = *Agropyron Bourgaei*.
distertum, Tardent, Ess. Hist. Nat. Bessar. 37, nomen = *distachyon* ?
distichum, Schleich. ex DC. Fl. Fr. Suppl. 281 = *Agropyron glaucum*.
distichum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 23 = *Agropyron distichum*.
divaricatum, Walp. Ann. vi. 1048 = *Agropyron divaricatum*.
divergens, Steud. Syn. Pl. Gram. 347 = *Agropyron divergens*.
diversifolium, Steud. l. c. 342. —Abyss.
dumetorum, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 363 = seq. ?
dumetorum, Schreb. in Schweig. & Koerte, Fl. Erlang. i. 143 = *Agropyron repens*.
duplicatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 344. —Graecia.
durum, Desf. Fl. Atlant. i. 114 = sativum.
elegans, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 854, nomen (Quid ?). —Hab. ?
elongatum, Host, Gram. Austr. ii. 18 = *Agropyron rigidum*.
elymogenes, Arndt, in Flora, xlii. (1859) 215, in textu = *Agropyron strictum*.
elymoides, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 440. —Abyss.

TRITICUM:—

elymoides, Hornem. Hort. Hafn. i. 107 = *T. Spelta*.
emarginatum, Godr. in *Mém. Acad. Montp.* (Sect. Médic.) i. (1853) 454.—Hab.?
erinaceum, Hornem. Hort. Hafn. i. 106 = *præc.*?
erinaceum, Hort. ex Kunth, Enum. Pl. i. 438 = *vulgare*.
farctum, Viv. Fl. Ital. Fragm. i. 28 = *Agropyron junceum*.
farum, Bayle-Barelle, Monog. Agron. Cereal. 50. t. 4. f. 1, 2 = *T. Spelta*.
fastuosum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6 = *durum*.
Festuca, DC. Fl. Fr. iii. 87 = *Festuca Poa*.
festucoides, Bertol. Fl. Ital. i. 808 = *Festuca Poa*.
fibrosum, Schrenk, in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* iii. (1845) 209.—Sibir. altaic.
filiforme, Poir. Encyc. Suppl. ii. 677 = *Agropyron filiforme*.
firmum, Link, Hort. Berol. ii. 188 = *Agropyron repens*.
flabellatum, Tausch, in *Flora*, xx. (1837) 117 = *Festuca Tauschii*.
flexum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 441 = *Brachypodium flexum*.
Forskalei, Roxas Clem. in *Herrera*, Agric. (1818) i. 74 = *T. Spelta*.
fragile, Ces. Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital. 87.—Italia.
fragile, Link, Hort. Berol. ii. 183 = *Secale fragile*.
fragile, Roth, Catalecta, fasc. ii. 7 = *Agropyron junceum*.
Freyenetti, Hort. Lips. ex Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. 104, nomen (Quid?).—Hab.?
Gaertnerianum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6 = *durum*?
geminatum, Spreng. Syst. i. 326 = *Eleusine indica*.
geniculatum, Trin. ex Ledeb. Fl. Alt. i. 117.—Sibir. altaic.
geniculatum, Walp. Ann. iii. 783 = *Brachypodium distachyum*.
genuense, DC. Fl. Fr. Suppl. 284.—Ital.
giganteum, Roth, Catalecta, fasc. iii. 22 = *Agropyron rigidum*.
glaucescens, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 716 = *Agropyron pungens*.
glaucum, Bast. Fl. Maine-et-Loire, 45 = *Agropyron pungens*.
glaucum, Desf. Tabl. ed. I. 16 = *Agropyron glaucum*.
glaucum, Host, Gram. Austr. iv. 6. t. 10 = *Agropyron littorale*.
glaucum, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 358 = *Agropyron glaucum*?
glaucum, Krock. Fl. Siles. Suppl. i. 194 = *Agropyron rigidum*?
glaucum, Link, Hort. Berol. ii. 187 = *Agropyron junceum*.
glaucum, Moench, Meth. 174 = *polonicum*.
glaucum, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. iv.* (1826) 601 = *Agropyron repens*.
glaucum, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 110, sphalm. = *Agropyron campestre*.
Gmelini, Trin. in *Linnaea*, xii. (1838) 467.—Sibir.
gracile, Brot. Fl. Lusit. i. 121 = *Brachypodium sylvaticum*.
gracile, DC. Fl. Fr. iii. 84 = *Brachypodium pinnatum*.
gracile, Pouz. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 608 = *Agropyron glaucum*.
Halleri, Viv. Fl. Ital. Fragm. 24. t. 26. f. 1 = *Festuca Poa*.
hamosum, Rehm. ex Boiss. Fl. Orient. v. 661 = *Agropyron strigosum*.
hebestachyum, Fries, in *Bot. Notiser* (1858), 129; et ex Nym. Sver. Fanerog. ii. 458 = *Agropyron obtusiusculum*.
Hemipoa, Delile, ex Tenore, Fl. Nap. iv. 18; Syll. Fl. Neap. 56 = *Festuca Hemipoa*.
hirsutum, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 13 = *Agropyron cristatum*.
hirsutum, Stev. ex Nym. Consp. 841 = *Agropyron rigidum*.
hispanicum, Viv. Fl. Ital. Fragm. 21 = *Festuca Poa*.
hispanicum, Willd. Sp. Pl. i. 479 = *Festuca tenuiflora*.
hordeaceum, Coss. & Dur. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 312.—Afr. bor.
hordeaceum, Steud. Syn. Pl. Gram. 430 = *Agropyron orientale*.
hordeiforme, Host, Gram. Austr. iv. 3. t. 5 = *durum*.
hordeiforme, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 716 = *Hordeum vulgare*.
Hornemannii, Roxas Clem. in *Herrera*, Agric. (1818) i. 73 = *monococcum*.
Horstianum, Roxas Clem. l. c. 81 = *vulgare*.

TRITICUM:—

Hosteanum, Spreng. Syst. i. 323, in syn., sphalm. = *præc.*
hybernium, Linn. Sp. Pl. 86 = *vulgare*.
ichyostachyum, Seidl, ex Opiz, *Natural.* n. ix. (1825) 106.—Hab.?
imbricatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 88 = *Agropyron cristatum*.
imbricatum, Hort. Vindob. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 756 = *Agropyron sibiricum*.
imbricatum, Lam. Illustr. i. 212 = *Agropyron repens*.
infestum, Salisb. Prod. 27 = *Agropyron repens*.
intermedium, Bess. Enum. Pl. Volh. 6 = *Agropyron rigidum*.
intermedium, Bieb. ex Kunth, Enum. Pl. i. 443 = *Agropyron cristatum*.
intermedium, Host, Fl. Austr. i. 180 = *Agropyron glaucum*.
intermedium, Nocca & Balb. Fl. Tic. i. 63 = *Agropyron repens*.
junceum, Linn. Cent. Pl. i. 6; Amoen. Acad. iv. 266 = *Agropyron junceum*.
Kingianum, Endl. Prod. Fl. Norf. 21.—Ins. Norfolk.
Kirgianum, Steud. Nom. ed. II. ii. 716, sphalm. = *præc.*
Koeleri, Roxas Clem. in *Herrera*, Agric. (1818) i. 77 = *vulgare*.
Kotschyianum, Boiss. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 346 = *Agropyron patulum*.
Lachenalii, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 291 = *Festuca Poa*.
laevissimum, Habl. vel Hall. [f.] ex Steud. Nom. ed. II. ii. 716, 717 = *polonicum*.
lasianthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 430 = *Agropyron orientale*.
latronum, Godr. in *Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. II.* v. (1854) 11 = *Agropyron glaucum*.
laxum, Fries, Mant. iii. 13 = *Agropyron acutum*.
Leersianum, Roem. & Schult. Syst. ii. 755, in syn. = *Agropyron repens*.
ligusticum, Bertol. Fl. Ital. vi. 622 = *bicorne*.
ligusticum, Walp. Ann. iii. 783 = *Agropyron ligusticum*.
Linnaeanum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6 = *vulgare*.
litorale, Auct. ex Nym. Consp. 841 = *Agropyron repens*.
litorale, Host, Gram. Austr. iv. 5. t. 9 = *Agropyron littorale*.
litorale, Pall. Reise, iii. 287 = *Elymus dasystachys*.
litoreum, Brot. Phyt. Lusit. ii. 51 = *Agropyron junceum*.
litoreum, Schum. Enum. Pl. Saeland. i. 38 = *Agropyron repens*.
loliaceum, Sm. Engl. Bot. t. 221 = *Festuca loliacea*.
lolioides, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 866.—Sibir. altaic.
lolioides, Pers. Syn. i. 110 = *Festuca Poa*.
longearistatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 346 = *Agropyron longearistatum*.
luzonense, Kunth, Enum. Pl. i. 446.—Ins. Philipp.
macrostachyum, Le Gall, Fl. Morb. 760 = *Agropyron acutum*?
macrourum, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 105 = *Brachypodium pinnatum*.
maritimum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 127 = *Cutandia maritima*.
maritimum, Viv. Ann. Bot. i. ii. 152 = *Festuca Poa*.
maritimum, Willd. Sp. Pl. i. 479, in syn. = *Festuca tenuiflora*.
maritimum, With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. II. i. 130 = *Festuca loliacea*.
maritimum, Wulf. in *Jacq. Coll.* iii. 34 = *Festuca rigida*.
maximum, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 156 = *polonicum*?
mexicanum, Schrad. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 716.—Mexic.
missuricum, Spreng. Syst. i. 325 = *Festuca spicata*.
molle, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 770 (Quid?).—Hab.?
monococcum, Linn. Sp. Pl. 86.—Graec.; As. Min.
monostachyum, Lam. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 742 = *Brachypodium distachyum*.
multiflorum, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 311.—N. Zel.
multiflorum, Steud. Nom. ed. I. 855 = *Agropyron repens*.
murale, Salisb. Prod. 27 = *Hordeum murinum*.
muricatum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 97 = *Agropyron cristatum*.
Nardus, DC. Fl. Fr. iii. 87 = *Festuca tenuiflora*.
nigricans, Pers. Syn. i. 110.—Gallia.

TRITICUM:—

nodosum, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 96 = *Agropyron junceum*.
nubigenum, Steud. Syn. Pl. Gram. 342 = *Agropyron nubigenum*.
obtusatum, Godr. in *Mém. Acad. Montp.* (Sect. Médic.) i. (1853) 454 = *bicorne*.
obtusiflorum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 153 = *Agropyron obtusiflorum*.
obtusifolium, Boiss. Elench. 93 = *Brachypodium ramosum*.
obtusiusculum, Nym. Syll. Suppl. 74 = *Agropyron obtusiusculum*.
Olgae, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 588.—Turkestan.
orientale, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 86 = *Agropyron orientale*.
ovatum, Rasp. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* v. (1825) 435; *Gren. & Godr. Fl. Fr.* iii. 601.—Europ.
panormitanum, Bertol. Fl. Ital. iv. 780 = *Agropyron panormitanum*.
patens, Brot. Fl. Lusit. i. 120 = *Festuca loliacea*.
patulum, Willd. Enum. Hort. Berol. 134 = *Agropyron patulum*.
pauciflorum, Schwein. in *Long, Exped. Winneb.* ii. 383 = *Agropyron violaceum*.
pectinatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 87 = *Agropyron cristatum*, f. Gaertn.
pectinatum, R. Br. Prod. 179 = *Agropyron pectinatum*.
pectiniforme, Steud. Nom. ed. I. 855 = *Agropyron pectiniforme*.
peruvianum, Lam. Illustr. i. 212 = *Agropyron peruvianum*.
petraeum, Vis. & Panč. in *Mem. Ist. Venet.* x. (1861) 446 = *Agropyron panormitanum*.
phaenicoides, DC. Fl. Fr. Suppl. 284 = *Brachypodium pinnatum*.
pilosum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. Suppl. 97 = *vulgare*.
pilosum, Hornem. Hort. Hafn. i. 106 (Quid?).—Hab.?
pilosum, Kunth, Enum. Pl. i. 442 = *Agropyron pilosum*.
pilosum, Secnus, Reise Istrien, 71 = *Agropyron rigidum*.
pinnatum, Moench, Enum. Pl. Hass. 53 = *Brachypodium pinnatum*.
planum, Desf. Tabl. ed. I. 16 = *Agropyron patulum*.
platystachyum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 6 = *durum*?
Poa, DC. Fl. Fr. iii. 86 = *Festuca Poa*.
poliens, Tausch, in *Flora*, xx. (1837) 117 = *Festuca poliens*.
polonicum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 127.—(cult.)
polystachyum, Lag. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 717 = *Brachypodium distachyum*.
Pouzolzii, Godr. in *Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. II.* v. (1854) 11 = *Agropyron glaucum*.
proliferum, Reinw. ex Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 113 = *Spinifex elegans*.
prostratum, Linn. f. Suppl. 114 = *Agropyron triticeum*.
pruinatum, Hornem. Hort. Hafn. i. 107 = *durum*.
Pseudo-agropyrum, Griseb. in *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 343.—Sibir. transbaic.
puberulum, Boiss. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 345 = *Agropyron cristatum*.
pubescens, Bieb. Besch. Casp. 81 = *monococcum*.
pubescens, Hornem. Hort. Hafn. i. 107 (Quid?).—Hab.?
pubescens, Trin. in *Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt.* 11 = *geniculatum*.
pubiflorum, Steud. Syn. Pl. Gram. 429.—Reg. Magellan.
pulverulentum, Hornem. Hort. Hafn. i. 16 (Quid?).—Hab.?
pumilum, Linn. f. Suppl. 115 = *Agropyron triticeum*.
pumilum, Steud. Syn. Pl. Gram. 344.—Sibir.
pungens, Link, Hort. Berol. ii. 187.—Tauria.
pungens, Pers. Syn. i. 109 = *Agropyron pungens*.
pycnanthum, Godr. in *Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. II.* v. (1854) 10 = *Agropyron littorale*.
pyramidale, Delile, ex Schult. Mant. ii. 414 = *vulgare*.
quadratum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *vulgare*.
ramificum, Link, in *Linnaea*, xvii. (1843) 397 = *Agropyron pungens*.
ramosum, Beck, ex Nym. Consp. 841 = *Agropyron repens*.
ramosum, Trin. ex *Ledeb. Fl. Alt.* i. 114.—Sibir. ural.
recognitum, Steud. Syn. Pl. Gram. 342.—Abyss.
repens, Linn. Sp. Pl. 86 = *Agropyron repens*.
reptans, [Clairv.] Man. Herb. 26 = *præc.*

TRITICUM :—

Requienii, *Ces. Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital.* 86.—Ital.
Richardsonii, Schrad. in *Linnaea*, xii. (1838) 467 =
Agropyron violaceum.
rigidum, Schleich. ex Mert. & Koch, *Deutschl. Fl.* i.
 705 = *Agropyron glaucum*.
rigidum, Schrad. Sem. Hort. Gotting. (1803) 23; ex
 ej. *Fl. Germ.* i. 392 = *Agropyron rigidum*.
Roegnerii, Griseb. in *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 339 = *Agro-*
pyron Roegnerii.
Rottboellia, DC. *Fl. Fr.* iii. 86 (*Rottbolla*) = *Demazeria*
loliacea.
Rouxii, Nym. *Consp.* 842 = *Agropyron Rouxii*.
rufescens, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 717 =
T. Spelta.
rupestre, Fisch. ex Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 98 =
Agropyron strigosum.
salinum, Salz. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 717, nomen
 (Quid ?).—Hab. ?
sardinicum, Koel. ex Spreng. *Syst.* i. 323 = vulgare.
Sartorii, Boiss. & Heldr. ex Nym. *Consp.* 840 = *Agro-*
pyron junceum.
sativum, Lam. *Fl. Fr.* iii. 625 = durum, turgidum, vul-
 gare.
Savignionii, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 430 = seq.
Savignonii, Nym. *Syll.* 424 = *Agropyron Savignonii*.
scaberrimum, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 717 = *Brachy-*
podium sylvaticum.
scaberrimum, Tausch, in *Flora*, xx. (1837) 118 =
Brachypodium mexicanum.
scabrum, R. Br. *Prod.* 178 = *Agropyron scabrum*.
scabrum, A. Cunn. ex Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 311 =
 multiflorum.
scabrum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 343, sphalm. = *Agro-*
pyron strictum.
Schimperii, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 20,
 nomen; et ex *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 441.—
Abyss.
Schrenkianum, Fisch. & Mey. ex Schrenk, in *Bull.*
Phys.-Math. Acad. Petersb. iii. (1845) 305 = *Brachy-*
podium Schrenkianum.
scirpeum, Guss. *Fl. Sic. Prod.* i. 148 = *Agropyron*
scirpeum.
secalinum, Georgi, *Bemerk. Reise Russ. Reich.* i. 198
 = *Elymus dasystachys*.
secundum, Kunth, *Enum. Pl.* i. 442 = *Agropyron*
secundum.
segetale, Salisb. *Prod.* 27 = vulgare.
semicostatum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 346 = *Agropyron*
semicostatum.
sepium, Lam. *Fl. Fr.* iii. 629 = *Agropyron caninum*.
sepium, Thuill. *Fl. Par. ed. II.* 67 = *Agropyron repens*.
sibiricum, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 135 = *Agropyron*
sibiricum.
siculum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 765.—Sicil.; As.
 (cult.).
simplex, Hort. Vindob. ex Schult. *Mant.* ii. 422, nomen
 (Quid ?).—Hab. ?
sinaicum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 346.—Mons Sinai.
Solandri, Steud. l. c. 347 = *Agropyron scabrum*.
Spelta, Linn. *Sp. Pl.* 86.—Hab. ?
speltaeforme, Seidl, ex Opiz, *Natural. n.* ix. (1825)
 106 = *T. Spelta*.
spinulosum, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 7.—Cuba.
squarrosus, Banks & Soland. ex Hook. f. in Hook.
Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 417 = *Agropyron*
scabrum.
squarrosus, Roth, *Neue Beytr.* i. 128 = *Agropyron*
patulum.
striatum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 346.—Ind. or.
strictum, Dethard. *Consp. Pl. Megalop.* 11 = *Agro-*
pyron strictum.
strigosum, Less. in *Linnaea*, ix. (1834) 170 = *Agropyron*
divergens.
strigosum, Spreng. *Syst.* i. 326.—Tauria.
subaristatum, Link, in *Linnaea*, xvii. (1847) 395 =
Agropyron repens.
subsecundum, Link, *Hort. Berol.* ii. 190.—Am. bor.
subtile, Fisch. Mey. & Avé-Lall. *Ind. Sem. Hort.*
Petrop. x. 59 = *Brachypodium distachyum*.
subulatum, Sm. ex Munro, in *Journ. Linn. Soc.* vi.
 (1862) 51 = *Festuca Poa* ?
subulatum, [Soland. in] *Russ. Aleppo*, ed. II. ii. 244
 = *Agropyron subulatum*.
supinum, Schrank, in *Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* i.
 II. (1818; 162 = *Poa littoralis*.
sylvaticum, Moench, *Enum. Pl. Hass.* 54 = *Brachypo-*
dium sylvaticum.

TRITICUM :—

sylvaticum, Salisb. *Prod.* 27 = *Elymus europaeus*.
Tauri, Walp. *Ann. vi.* 1048 = *Agropyron Tauri*.
tenellum, Linn. *Syst. ed. X.* 880 = *Festuca Poa*.
tenellum, Viv. *Ann. Bot.* i. II. 154 = *Festuca tenuiflora*.
tenuis, Fisch. & Mey. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 317 =
Festuca subtilis.
tenuicolum, Loisel. in *Desv. Journ. Bot.* ii. (1809) 219
 = *Festuca Poa*.
teretiflorum, Wibel, *Prim. Fl. Werth.* 140 = *Brachy-*
podium sylvaticum.
Thaoudar, Reut. ex Boiss. *Fl. Orient.* v. 673 = mono-
 coccum.
tomentosum, Bayle, Barelle, *Monog. Agron. Cereal.* 40.
 t. 2. f. 10 = durum.
Tournfortii, Walp. *Ann.* iii. 782 = *Agropyron Aucheri*.
trachycaulum, Link, *Hort. Berol.* ii. 189.—Am. bor.
 occ.
triaristatum, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* iii. 602.—Europ.
trichophorum, Link, in *Linnaea*, xvii. (1843) 395.—
 Europ. austr.
triccocum, Schuebl. *Char. Desc. Cereal.* (1818) 34; et
 in *Flora*, iii. (1820) 458. tt. 1, 2 = dicoccum.
triunciale, Rasp. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* v. (1825)
 435; Gren. & Godr. *Fl. Fr.* iii. 602.—Europ.
truncatum, Wallr. in *Linnaea*, xiv. (1840) 544 (Beitr.
Fl. Hercyn. 174) = *Agropyron glaucum*.
Tumonia, Schrad. ex Balb. *Cat. Taur.* (1813) 78; et ex
 Roem. & Schult. *Syst.* ii. 770, nomen (Quid ?).—Hab. ?
turgidum, Linn. *Sp. Pl.* 86 = vulgare.
turgidum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 342 = recognitum.
unilaterale, All. *Fl. Pedem.* ii. 258 = *Demazeria loli-*
acea.
unilaterale, Linn. *Mant.* i. 35 = *Festuca tenuiflora*.
unioloides, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* i. 122 = *Demazeria*
sicula.
vaginans, Pers. *Syn.* i. 109 = *Agropyron vaginans*.
Vaillantianum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 775, in syn.
 = *Agropyron repens*.
variegatum, Fisch. ex Spreng. *Pugill.* ii. 24 = *Agro-*
pyron sibiricum.
velutinum, Hook. f. *Fl. Tasm.* ii. 129 = *Agropyron velu-*
tinum.
velutinum, Schuebl. *Char. Desc. Cereal.* (1818) 13;
 ex Schult. *Mant.* ii. 413 = vulgare.
ventricosum, *Ces. Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital.* 86 —
 Europ.
venulosum, Hochst. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 342 =
 recognitum.
venulosum, Ser. *Mélang. Bot.* i. 133.—Aegypt.
villosus, Beauv. *Agrost.* 103 = *Agropyron villosus*.
villosus, Host, *Gram. Austr.* iv. 4. t. 6 = durum.
violaceum, Hornem. in *Fl. Dan.* t. 2044 = *Agropyron*
violaceum.
virescens, Aschers. ex Nym. *Consp.* 841 = *Agropyron*
glaucum.
vulgare, Vill. *Hist. Pl. Dauph.* ii. 153.—Cosmop. (cult.)
Youngii, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 343.—N. Zel.
Zea, Host, *Gram. Austr.* iii. 20. t. 29 = *T. Spelta*.

TRITILLARIA, Sang. in *Atti Acc. Pont. Lincei*, Ser.
 I. xv. (1862) 29, sphalm. = *Fritillaria*, Tourn. (Li-
 liac.).

TRITOMA, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 744 (1804) =
Kniphofia, Moench (Liliac.).
Burchellii, Herb. ex Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 517,
 nomen; Lindl. *Bot. Reg.* t. 1745 = *K. Burchellii*.
caulescens, Carr. in *Rev. Hort.* (1884) 556 =
K. caulescens.
flammea, Hook. *Bot. Mag.* t. 4819, in syn. = *Blandfordia*
flammea.
glauc, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 892.—Afr.
 austr.
grandis, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1865) 7.—Hab. ?
Leichtlinii, Carr. in *Rev. Hort.* (1884) 556 = *K.*
Leichtlinii.
Mac-Owani, Carr. l. c. (1879) 390 = *K. Macowani* ?
Macowani, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1877) II. 374,
 407 = *K. Macowani*.
maroccana, May, in *Rev. Hort.* (1878) 255 =
K. pumila ?
media, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 744 = *K. sarmentosa*.
nobilis, Carr. in *Rev. Hort.* (1883) 525 = *K. aloides*.
pumila, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 764 = *K. pumila*.
recurva, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 892 =
glauc.
recurvata, Hort. l. c. ed. II. 933 = *glauc*.

TRITOMA :—

Rooperi, T. Moore, *Gard. Comp.* i. 113 = *Kniphofia*
Rooperi.
Saundersii, Carr. in *Rev. Hort.* (1882) 504 =
K. aloides.
Uvaria, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* sub t. 744 = *K.*
aloides.

TRITOMANTHE, Link, *Fnum. Hort. Berol.* i. 333
 (1821) = *Kniphofia*, Moench (Liliac.).
Burchellii, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 718 = *K. Burchellii*.
media, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 333 = *K. sarmentosa*.
odorata, Lodd. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 718, nomen
 (Quid ?).—Afr. austr.

pumila, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 333 = *K. pumila*.
Uvaria, Link, l. c. = *K. aloides*.

TRITOMIUM, Link, *Handb.* i. 170 (1829) = *TRITOMA*,
 Ker-Gawl. = *Kniphofia*, Moench (Liliac.).

TRITOMODON, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi.
 (1848) i. 548 = *Enkianthus*, Lour. (Ericac.).
japonicus, Turcz. l. c. 585.—Japon.

TRITONIA, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 581 (1802).

IRIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 708.
AGRETTA, Eckl. *Top. Verz.* 23 (1827).
BELLENDENIA, Rafin. in *Loud. Gard. Mag.* viii.
 (1832) 245.
DICHONE, Laws. ex Salisb. in *Trans. Hort. Soc. i.*
 (1812) 320.
MONTERETIA, DC. in *Bull. Soc. Philom.* iii. (1803)
 151.
TRITONIXIA, Klatt, in *Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv.
 (1882) 354.
WAITZIA, Reichb. *Consp.* 60 (1828).
abyssinica, Walp. *Ann.* iii. 613 = *Lapeyrousia abys-*
sinica.
anigozanthiflora, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 398, nomen.
 —Afr. austr.
aurantiaca, Eckl. *Top. Verz.* 29 = *crocata*.
aurea, Pappe, ex Hook. *Bot. Mag.* t. 4335 = *Crocasmia*
aurea.
Bakeri, Klatt, in *Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882)
 358.—Afr. austr.
Bolusii, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 337 = *dubia*.
capensis, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 618.—Afr. austr.
carnea, Hort. ex Pasq. *Cat. Orto Bot. Nap.* 104, nomen
 (Quid ?).—Hab. ?
catenularis, Salisb. in *Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 319
 = *lineata*.
coccinea, Eckl. *Top. Verz.* 29 = *crocata*.
concolor, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 398 = *Ixia panicu-*
lata.
Cooperi, Klatt, in *Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882)
 358 (*Ixiae* sp.).—Afr. austr.
crispa, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 678.—Afr. austr.
crocata, Ker-Gawl. l. c. sub t. 581.—Afr. austr.
deusta, Ker-Gawl. l. c. t. 622.—Afr. austr.
dubia, Eckl. *Top. Verz.* 30, nomen; et ex Klatt, in
Linnaea, xxxii. (1863) 761.—Afr. austr.
fenestrata, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 704.—Afr.
 austr.
flava, Ker-Gawl. in *Kon. & Sims, Ann. Bot.* i. (1804)
 228.—Afr. austr.
fucata, Lindl. *Bot. Reg.* (1838) t. 35 = *Antholyza*
fucata.
fulva, Dehnh. *Cat. Pl. Hort. Camald.* ed. II. 24
 (Quid ?).—Afr. austr.
hyalina, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 163 =
fenestrata.
kamisbergensis, Klatt, in *Linnaea*, xxxii. (1863) 760.—
 Afr. austr.
lacerata, Klatt, in *Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882)
 358 = *crispa*.
laxifolia, Benth. & Hook. f. *Gen.* iii. 708.—Afr. trop.
lineata, Ker-Gawl. in *Kon. & Sims, Ann. Bot.* i.
 (1804) 228.—Afr. austr.
longiflora, Ker-Gawl. l. c. = *Ixia paniculata*.
Mac-Owani, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1877) II. 407,
 sphalm. = *Kniphofia Mac-Owani*.
magniflora, Dehnh. *Cat. Pl. Hort. Camald.* ed. II. 24
 (Quid ?).—Afr. austr.
media, Pritz. *l. c.* Ind. i. 1124, sphalm. = *Tritoma media*.
miniata, Ker-Gawl. in *Bot. Mag.* t. 609 = *crocata*.
nervosa, Klatt, in *Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882)
 358 (= *Morphixia nervosa*).—Afr. austr.

TRITONIA:—

- odorata*, Lodd. Bot. Cab. t. 1820 = *Freesia refracta*.
pallida, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1275.—Afr. austr.
paniculata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 358 = *Ixia paniculata*.
pauciflora, Klatt, l. c.—Afr. austr.
pectinata, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 678 = *crispa*.
Pottsii, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 708.—Afr. austr.
pulchella, Dehnh. Cat. Pl. Hort. Camald. ed. II. 24 (Quid?).—Afr. austr.
purpurea, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1275 = *crocata*.
refracta, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 228 = *Freesia refracta*.
Rocheana, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 398 = seq.
Rochensis, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1503 = *Ixia paniculata*.
rosea, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. i. 91 = *capensis*.
rosea, Klatt, in *Linnaea*, xxxii. (1863) 760.—Afr. austr.
sanguinea, Eckl. Top. Verz. 29 = *crocata*.
Schimperii, Aschers. & Klatt, in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 697 = *Acidanthera unicolor*.
scillaris, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 163.—Afr. austr.
secunda, Steud. Nom. ed. II. ii. 719.—Afr. austr.
securigera, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 228.—Afr. austr.
squalida, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 581.—Afr. austr.
striata, Ker-Gawl. l. c. sub t. 678 = *Gladiolus striatus*.
strictifolia, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 708.—Afr. austr.
tenuiflora, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1275 = *Ixia paniculata*.
tripunctata, Dehnh. Cat. Pl. Hort. Camald. ed. II. 24 (Quid?).—Afr. austr.
tristis, Dehnh. l. c. (Quid?).—Afr. austr.
undulata, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 163.—Afr. austr.
ventricosa, Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 104, nomen (Quid?).—Hab. ?
viridis, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1275.—Afr. austr.
xanthospila, Ker-Gawl. ex Spreng. Syst. i. 154 (= *Anomatheca xanthospila*).—Afr. austr.

TRITONIXIA, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 355 = *Tritonia*, Ker-Gawl. (Irid.).
Bolusii, Klatt, l. c. 356 = *Tritonia dubia*.
conferta, Klatt, l. c. = *Tritonia dubia*.
crocata, Klatt, l. c. = *Tritonia crocata*.
deusta, Klatt, l. c. = *Tritonia deusta*.
disticha, Klatt, l. c.—Afr. austr.
dubia, Klatt, l. c. = *Tritonia dubia*.
hyalina, Klatt, l. c. = *Tritonia fenestrata*.
kamisbergensis, Klatt, l. c. = *Tritonia kamisbergensis*.
lineata, Klatt, l. c. 357 = *Tritonia lineata*.
miniata, Klatt, l. c. 356 = *Tritonia crocata*.
purpurea, Klatt, l. c. = *Tritonia crocata*.
rosea, Klatt, l. c. = *Tritonia rosea*.
scillaris, Klatt, l. c. 357 = *Tritonia scillaris*.
squalida, Klatt, l. c. 356 = *Tritonia squalida*.
stricta, Klatt, l. c. 357 = *Tritonia scillaris*.
undulata, Klatt, l. c. = *Tritonia undulata*.

TRITOPHUS, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 341 = *Kaempferia*, Linn. (Scitam.).

TRITRIELA, Rafn. Fl. Tellur. iii. 59 (1836) = *Ornithogalum*, Tourn. (Liliac.).

TRIUMFETTA, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 344 (1737). *TILIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 234.
BARTRAMIA, Linn. Diss. Dass. 17 (1747); Fl. Zeyl. 77 (1747); Gaertn. Fruct. ii. 137. t. 111 (1791).
PORPA, Blume, Bijdr. 117 (1825).
abutoides, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 287.—Bras.
actinocarpa, S. Moore, in *Journ. Bot.* xv. (1877) 66.—Afr. trop.
acuminata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 344.—N. Granat.
acutiloba, DC. Pl. Rar. Jard. Genève, 64.—Cuba.
aestuens, Royle, Illustr. Bot. Himal. 103 (Quid?).—Reg. Himal.
althacoides, Lam. Encyc. iii. 420.—Am. trop.
angulata, Lam. l. c. 421 = *rhomboidea*.

VOL. II.

TRIUMFETTA:—

- annua*, Linn. Mant. i. 73.—As. et Afr. trop.
appendiculata, F. Muell. Fragm. iii. 7.—Austral.
Bartramia, Linn. Syst. ed. X. 1044; Roxb. Fl. Ind. ii. 463 = *rhomboidea*.
benguensis, Wawra & Peyr. in Sitzb. Akad. Wien, Math.-Nat. xxxviii. (1860) 559 = *flavescens*.
Berterii, Spreng. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 227.—N. Granat.
bicornuta, Turcz. l. c. xxxvi. (1863) i. 574.—Java.
bilocularis, Wall. Cat. n. 1081 = *rotundifolia*.
bogotensis, DC. Prod. i. 506.—Am. centr.; N. Granat.
Botteriana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 260.—Mexic.
brachypetala, Turcz. l. c. xxxi. (1858) i. 227.—Mexic.
calycina, Turcz. l. c. xxxvi. (1863) i. 574.—Peruv.
calyculata, Vell. Fl. Flum. 200; v. t. 6 = *semitriloba*.
cana, Blume, Bijdr. 113 = *obliqua*?
caudata, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 353.—N. Granat.
chaetocarpa, F. Muell. Fragm. xi. 61.—Austral.
chrysotricha, Boj. in Bouton, Rapp. Ann. Maur. (1842) 19.—Madag.
conspicua, Trimen, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 206.—Zeylan.
cordifolia, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 91 = *semitriloba*.
cuneata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 84 = *neglecta*.
cymosa, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 353.—N. Granat.
denticulata, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. i. 274.—Austral.
dichotoma, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 261.—Bras.
diversifolia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 227, nomen = *rhomboidea*.
diversiloba, Presl, Bot. Bemerk. 20 = *semitriloba*.
dumetorum, Schlecht. in *Linnaea*, xi. (1837) 377 = *bogotensis*.
effusa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 227, nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 228.—Afr. austr.
eriocarpa, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 288 = *rhomboidea*.
eriphebia, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 235 = *rhomboidea*.
Fabreana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 478.—Ins. Marian.
flavescens, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 82.—Afr. trop.
Galeottiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 260.—Mexic.
geoides, Welw. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 256.—Afr. trop.
glabra, Spreng. Fl. Hal. Mant. 41.—Ind. or.
glandulosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxii; Lam. Encyc. iii. 421 = *rhomboidea*.
glandulosa, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1077 = *pilosa*.
glaucescens, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. i. 273.—Austral.
glechomoides, Welw. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 258.—Afr. trop.
grandidens, Hance, in *Journ. Bot.* xv. (1877) 329.—China.
grandiflora, Vahl, Eclog. Am. ii. 34.—Ind. occ.; Mexic.
graveolens, Blume, Bijdr. 113.—Java.
graveolens, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 27 (excl. syn.) = *subhirtella*.
grossulariaefolia, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 205.—Ind. occ.
guazumaefolia, Boj. in Bouton, Rapp. Ann. Maur. (1842) 18.—Madag.
havanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 345 = *semitriloba*.
heterophylla, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 96 = *semitriloba*.
heterophylla, Lam. Encyc. iii. 420.—Am. austr.
Heudelotii, Planch. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 259.—Afr. trop.
hirta, Vahl, Symb. Bot. iii. 63.—N. Granat.
hispida, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 204.—Ind. occ.
Hostmanni, Miq. in *Linnaea*, xxii. (1849) 466 = *bogotensis*?
Hostmanniana, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1175, nomen.—Guian.

TRIUMFETTA:—

- humifusa*, Hassk. Retzia, i. 139.—Java.
indica, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. nn. 237, 1078 D = *tomentosa*.
indica, Lam. Encyc. iii. 420 = *annua*.
Johnstoniana, F. Muell. in Melb. Chemist (Febr. 1885).—Austral.
Josefina, Polak. in *Linnaea*, xli. (1877) 552.—Costa Rica.
Kirkii, Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 259.—Afr. trop.
lanigera, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 = *villosiuscula*.
lappacea, Salisb. Prod. 366 = *T. Lappula*.
Lappula, Linn. Sp. Pl. 444.—Am. et Afr. trop.
Lappula, Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1258, nomen = *heterophylla*?
Lappula, Vell. Fl. Flum. v. t. 5; text. ed. Netto, 191 = *rhomboidea*.
leptacantha, F. Muell. Fragm. xi. 62.—Austral.
Lindeniana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 229.—Mexic.
longicoma, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 285.—Bras.
longispis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 229.—Mexic.
longipes, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1175, nomen.—Guian.
longiseta, DC. Pl. Rar. Jard. Genève, 64.—Cuba.
longiseta, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 92 = *semitriloba*.
macrocalyx, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 230 = *speciosa*.
macropetala, F. Muell. Fragm. iii. 8 = *Corchorus echinatus*.
macrophylla, Vahl, Eclog. Am. ii. 34 = *althaeoides*.
Martiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 228 = *rhomboidea*.
mauritiana, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273.—Ins. Maurit.
mexicana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 230 = *Belotia grewiaefolia*.
micracantha, F. Muell. Fragm. iii. 7.—Austral.
micropetala, Lindl. Bot. Reg. t. 1058 = *rhomboidea*.
microphylla, Wight & Arn. Prod. 75 = *pilosa*?
mollis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 238 = *rhomboidea*.
mollissima, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 345.—Am. austr.
monoica, Hochst. & Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 82 = *flavescens*.
nana, Boj. Hort. Maurit. 43, sphalm. = *annua*.
neglecta, Wight & Arn. Prod. 75.—Ind. or.; Afr. trop.
nemorialis, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 284.—Bras.
nipaulensis, G. Don, Gen. Syst. i. 545 = *annua*.
obliqua, Roth, Nov. Pl. Sp. 224.—As. trop.
oblonga, Hornem. ex Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 213; Wall. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 227 = *pilosa*.
oblongata, Link. Enum. Hort. Berol. ii. 5 = *pilosa*.
obovata, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, v. (1830) 228.—Mexic.
obscura, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 286 = *semitriloba*.
octandra, Griff. Notul. iv. 512 = *pilosa*.
orbiculata, Roxb. Hort. Beng. [36] = *rotundifolia*.
Orizabae, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 261 (Orizaba).—Mexic.
orthacantha, Welw. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 258.—Afr. trop.
ovata, DC. Prod. i. 507 = *semitriloba*.
oxyphylla, [Moç. & Sesse] ex DC. l. c. 508.—Mexic.
paniculata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 279.—Mexic.
parviflora, Benth. Fl. Austral. i. 274.—Austral.
pentandra, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 93. t. 19 = *neglecta*.
petiolaris, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1058.—Peruv.
pilosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 343 = *bogotensis*.
pilosa, Roth, Nov. Pl. Sp. 223.—As. et Afr. trop.
pilosa, Wall. Cat. n. 1080 = *tomentosa*.
pilosula, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 401 = *neglecta*.
Plumieri, Gaertn. Fruct. ii. 137 = *T. Lappula*.
plumigera, F. Muell. Fragm. i. 69.—Austral.
polyandra, [Moç. & Sesse] ex DC. Prod. i. 508 = *grandiflora*.
polycarpa, Wall. Cat. n. 1079 = *pilosa*, *annua*.
procumbens, Boj. Hort. Maurit. 44 = *radicans*.

7 E

TRIUMFETTA :—

- procumbens, *Forst. f. Prod.* 35.—Austral.; Ins. Societ.
 pseudo-angulata, *Blume, Bijdr.* 111.—Java.
 quinqueloba, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi.
 (1863) i. 574.—Peruv.
 radicans, *Boj. in Bouton, Rapp. Ann. Maur.* (1842)
 20.—Ins. Seychell.
 rhombeaefolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 76 = seq.
 rhomboidea, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 22; *Select. Am.*
 147. t. 90.—Reg. trop.
 rhomboidea, *Lindl. Coll. Bot. t.* 29 = petiolaris.
 riparia, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 295 = rhom-
 boidea.
 rotundifolia, *Lam. Encyc.* iii. 421; *Roth, Nov. Pl. Sp.*
 222.—Ind. or.
 rubricaulis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 342.—
 Venezuela.
 Salzmanni, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi.
 (1858) i. 229 = semitriloba.
 Schimperii, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 29;
 et ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 719 = annua.
 semitriloba, *Boj. Hort. Maurit.* 43 = rhomboidea.
 semitriloba, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 96, partim =
 heterophylla.
 semitriloba, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 22; *Select. Am.*
 147.—Reg. trop.
 sepium, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 286 = semi-
 triloba.
 setulosa, *Mast. in Olivier, Fl. Trop. Afr.* i. 259.—Afr.
 trop.
 sinuosa, *Miq. in Linnaea*, xxii. (1849) 466 = hetero-
 phylla.
 Sonderii, *Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc.*
 Ser. II. ii. (1881) 17.—Afr. trop. et austr.
 speciosa, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 86.—Panama;
 Mexic.
 spicata, *Blume, Bijdr.* 111.—Java.
 subhirtella, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. ii. 196.—Java.
 suborbiculata, *DC. Prod.* i. 506 = rotundifolia.
 suffruticosa, *Blume, Bijdr.* 113.—Java.
 surinamensis, *Steud. in Flora*, xxvi. (1843) 755
 (sp. dub.).—Guian.
 Thonningiana, *DC. Pl. Rar. Jard. Genève*, 64 =
 rhomboidea.
 tiliifolia, *Vahl, ex DC. l. c.* 65.—Ind. occ.
 tomentosa, *Boj. Hort. Maurit.* 43, nomen; et in
Bouton, Rapp. Ann. Maur. (1842) 19.—Geront. trop.
 tomentosa, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790)
 ed. I. Art. IV. 27 = cana.
 tomentosa, *Telfair, ex Wall. Cat. n.* 1080 = pilosa.
 trichocarpa, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 84.
 —Abyss.
 trichocarpa, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 19 =
 Sonderii.
 trichoclada, *DC. Prod.* i. 507 = annua.
 triclada, *Link, Enum. Mart. Berol.* ii. 5 = annua.
 tricuspis, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 288 = semi-
 triloba.
 trilobata, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790)
 ed. I. Art. IV. 27 = spicata?
 trilocularis, *Roxb. Hort. Beng.* [36]; *Fl. Ind.* ii. 462
 = rhomboidea.
 ulmifolia, *Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ.* 41 =
 semitriloba.
 urticaefolia, *Thunb. Fl. Javan.* 19 (Quid?).—Java.
 Vahlia, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 300 = rhomboidea.
 velutina, *Sieber, ex Presl, in Oken, Isis*, xxi. (1828)
 273 = mauritiana.
 velutina, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 62 = rhomboidea.
 vestita, *Wall. Cat. n.* 1078 = tomentosa, rhomboidea.
 villosiuscula, *Blume, Bijdr.* 112.—Java.
 Welwitschii, *Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 255.—
 Afr. trop.
 Winneckeana, *F. Muell. in Winnecke, Rep.* (1884) 15.
 —Austral.

TRIUMPHETTA, *Griff. Notul.* iv. 512 (1854), sphalm. =
 praec.

TRIUNILA, *Rafin. Neogenyt.* 4 (1825) = **Uniola**, *Linn.*
 (Gramin.).

TRIURIS, *Miers, in Proc. Linn. Soc. i.* (1841) 96.
TRIURIDEAE, *Benth. & Hook. f. iii.* 1002.
HEXURIS, *Miers, in Proc. Linn. Soc. ii.* (1850) 72;
 et in *Trans. Linn. Soc. xvi.* (1852) 44.
PELTOPHYLLUM, *Gardn. Il. cc. i.* (1843) 176; xix.
 (1845) 157. t. 15.

TRIURIS :—

- hyalina, *Miers, in Proc. Linn. Soc. i.* (1841) 96.
 —Bras.
 lutea, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 1002.—Bras.
TRIVALVARIA, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 19
 (1865) = **Polyalthia**, *Blume (Anonac.)*.
 carnosa, *Scheff. in Flora*, lii. (1869) 301 = Sacco-
 petalum carnosum.
 longirostris, *Becc. ex Scheff. in Ann. Jard. Buitenz.* ii.
 (1885) 28.—N. Guin.
 macrophylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 19 =
 P. macrophylla?
 Stymanni, *Scheff. in Flora*, lii. (1869) 301.—Sumatra.
TRIVOLVULUS, *Moç. & Sesse, ex Choisy, in DC.*
Prod. ix. 368 (1845) = **Ipomoea**, *Linn. (Convolv.)*.
 nutans, *Moç. & Sesse, ex Choisy, l. c.* = I. nutans.
TRIXAGO, *Hall. Hist. Stirp. Helv.* 101 (1768); *Moench,*
Meth. 398 (1794) = **Stachys**, *Tourn. (Labiata.)*.
 arvensis, *Hoffm. & Link, Fl. Port.* i. 102 =
 S. arvensis.
 colorata, *Presl, Fl. Sic. p.* xxxvii = S. arvensis.
 cordifolia, *Moench, Meth.* 398 = S. arvensis.
 punctata, *Gilib. Fl. Lituan.* i. 73 = S. arvensis.
 scordifolia, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 719, sphalm. =
 S. arvensis.
TRIXAGO, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 85 (1836) = **Teucrium**,
Tourn. (Labiata.).
 Botrys, *Rafin. l. c.* = **Teucrium Botrys**.
TRIXAGO, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. vi.* (1823) 4
 = **Bartsia**, *Linn. (Scrophul.)*.
 apula, *Stev. l. c.* = B. Trixago.
 atroviolacea, *Nym. Consp.* 550 = B. latifolia.
 carnea, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 12 = B. Trixago.
 latifolia, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 360 = B. latifolia.
 maxima, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 151 =
 B. Trixago.
 purpurea, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. vi.* (1823) 4
 = B. latifolia.
 rhinanthina, *Link, ex Spreng. Syst.* ii. 773 = B. Trixago.
 scordifolia, *Reichb. in Flora*, xiii. (1830) 131 =
 B. scordifolia.
 versicolor, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 151 =
 B. Trixago.
 viscosa, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 360 = B. viscosa.
TRIXANTHERA, *Rafin. Sylva Tellur.* 146 (1838) =
Trichanthera, *Kunth (Acanth.)*.
 angularis, *Rafin. l. c.* = **Trichanthera gigantea**.
TRIXAPIAS, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 108 (1836) =
Utricularia, *Linn. (Lentib.)*.
 capillacea, *Rafin. l. c.* = U. capillacea.
TRIXELLA, *Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.* xvii.
 (1869) 135 = **Stachys**, *Tourn. (Labiata.)*.
 arvensis, *Fourr. l. c.* = S. arvensis.
TRIXIS, *P. Br. Hist. Jamaic.* 312 (1756). **COM-**
POSITAE, *Benth. & Hook. f. ii.* 501.
 BOWMANIA, *Gardn. in Hook. Ic. Pl. t.* 519 (1843).
 CASTRA, *Vell. Fl. Flum.* 242 (1825).
 CLEANTHES, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.*
 (1830) 194.
 DOLICHLASIUM, *Lag. Amen. Nat. i.* 33 (1811).
 HOLOCHEILUS, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1818)
 73.
 PERDICUM, *Linn. Pl. Afr. Rar.* 22 (1762).
 PLATYCHEILUS, *Cass. in Dict. Sc. Nat.* xxxiv. 212
 (1825).
 PRIONANTHES, *Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac.* ii.
 t. 51 (1819).
 TENOREA, *Colla, Hort. Ripul.* 137 (1824).
 alata, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830) 192.—
 Mexic.
 angustifolia, *DC. Prod.* vii. 69.—Am. bor. occ.; Mexic.
 antinorrhoea, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi.
 iii. 385 = divaricata.
 auriculata, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-
 June 1827) 178; et in *Bot. Mag. t.* 2765 = divari-
 cata.
 Bowmanii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 390.—
 Bras.
 bracteata, *DC. Prod.* vii. 68.—Am. austr.

TRIXIS :—

- brasiliensis, *DC. in Ann. Mus. Par.* xix. (1812) 67.—
 Bras.
 brasiliensis, *Less. in Linnaea*, v. (1830) 26 = Lessingii.
 cacalioides, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830)
 187.—Peruv.
 calcarea, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847)
 460 = divaricata.
 californica, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863)
 182 = angustifolia.
 calycina, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830)
 187.—Bras.
 chionopappa, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi.
 iii. 386 = ophiorhiza.
 conferta, *Benth. Pl. Hartw.* 289.—Mexic.
 corymbosa, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830)
 188.—Mexic.
 corymbosa, *Moç. ex DC. Prod.* vii. 66 = **Perezia fruti-**
cosa.
 crenata, *Boj. ex DC. l. c.* v. 198 = **Mikania dioscoreae-**
folia.
 decurrens, *DC. l. c.* vii. 68.—Mexic.
 dioscoreaefolia, *Boj. ex DC. l. c.* v. 198 = **Mikania**
dioscoreaefolia.
 discolor, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 388 = divaricata.
 divaricata, *Spreng. Syst.* iii. 501.—Am. trop.
 Ehrenbergii, *Kunze, in Linnaea*, xvi. (1842) 317.—
 Mexic.
 flexuosa, *Less. l. c.* v. (1830) 32 = mollissima.
 flexuosa, *Spreng. Syst.* iii. 501 = divaricata.
 floribunda, *Boj. ex DC. Prod.* v. 198 = **Mikania flori-**
bunda.
 frutescens, *Spreng. Syst.* iii. 501 = radiale.
 glaberrima, *Less. Syn. Comp.* 413.—Bras.
 glabra, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830) 297.
 —Mexic.
 glabrata, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii.
 388 = picroides.
 glandulifera, *Benth. & Hook. f. ex Hieron. in Bol.*
Acad. Nac. Córdoba, iv. (1880) 50.—Chili.
 Glaziovii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 391.—
 Bras.
 glutinosa, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830)
 189.—Bras.
 Haenkei, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald*, 314.—
 Mexic.
 havanensis, *Spreng. Syst.* iii. 501 = radiale.
 hieracioides, *DC. Prod.* vii. 71 = ochroleuca.
 Inula, *Crantz, Inst.* i. 329 = radiale.
 involucreta, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830)
 193.—Mexic.
 laevigata, *Lag. Amen. Nat. i.* 36 = radiale.
 lanceolata, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii.
 388 = glutinosa.
 latifolia, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 300 =
 Perezia rigida.
 Lessingii, *DC. Prod.* vii. 70.—Bras.
 longifolia, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830)
 191.—Mexic.
 Lundii, *DC. Prod.* vii. 71 = Lessingii.
 magellanica, *Bert. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 75, 720 =
 Chaptalia exscapa.
 megapotamica, *Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot.*
Mag. i. (1835) 33 = verbasciformis.
 mexicana, *Lex. in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc.*
 fasc. i. 27.—Mexic.
 mexicana, *Moç. ex Less. in Linnaea*, v. (1830) 33 =
 radiale.
 michuacana, *Lex. in La Llave & Lex. Nov. Veg.*
Desc. fasc. i. 28.—Mexic.
 mollissima, *D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.* (1830)
 299.—Bras.
 myricaefolia, *Boj. ex DC. Prod.* v. 188 = **Mikania**
myricaefolia.
 Neaeana, *DC. Prod.* vii. 67.—Peruv.
 obvallata, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 300. t. 65.—
 Mexic.
 ochroleuca, *Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.*
 i. (1835) 33.—Bras.
 odoratissima, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi.
 (1847) 461 = divaricata.
 ophiorhiza, *Gardn. l. c.* 461.—Bras.
 othonnoides, *Less. in Linnaea*, v. (1830) 27 = brasili-
 ensis.
 pallida, *Less. l. c.* 30.—Bras.
 papillosa, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 388.—
 Chili.
 paradoxa, *Cass. Opusc.* ii. 160.—Peruv.

TRIXIS :—

patens, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 315 = *Perezia patens*.
picroides, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 462.—Bras.
pinnatifida, Less. in *Linnaea*, v. (1830) 29.—Bras.
pyrifolia, Boj. ex DC. Prod. v. 195 = *Mikania pyrifolia*.
radiale, Lag. *Amen. Nat.* i. 36, in obs.—Am. trop.
rosea, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 387 = *verbasciformis*.
rosea, Poepp. ex DC. Prod. vii. 57 = *Leucheria andryaloides*.
rosmarinifolia, Nees, in *Linnaea*, xx. (1847) 699.—Mexic.
salicifolia, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 298 = *divaricata*.
Seemannii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 315 = *Perezia Seemannii*.
Sellowii, Less. ex DC. Prod. vii. 71 = *brasiliensis*.
senecioides, Hook. Exot. Fl. ii. 101 = *Leucheria senecioides*.
sinuosa, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 389 = *Vauthieri*.
spicata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 462.—Bras.
Sprengeliana, *Gardn. l. c.* 460 = *divaricata*.
stricta, Less. in *Linnaea*, v. (1830) 28.—Bras.
stricta, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 386 = *glaberrima*.
suaveolens, Mart. ex Baker, l. c. 387 = *verbasciformis*.
suffruticosa, S. Wats. in Bot. Calif. ii. 459 = *angustifolia*.
thunbergioides, Boj. ex DC. Prod. v. 198 = *Mikania thunbergioides*.
turbinata, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 315 = *Perezia turbinata*.
Vauthieri, DC. Prod. vii. 69.—Bras.
verbasciformis, Less. in *Linnaea*, v. (1830) 29.—Bras.

TRIXIS, Mitch. in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 220 = *Proserpinaca*, Linn. (Halog.).
palustris, Gaertn. Fruct. i. 115. t. 24. f. 8 = *P. palustris*.

TRIXIS, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 7, 115 (1788); Fl. Ind. Occ. iii. 1374. t. 26 (1806) = *Clibadium*, Linn. (Compos.).
aspera, Sw. Prod. l. c. 115 = *C. surinamense*.
Barbasco, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 384; ii. 720 = *C. Barbasco*.
erosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 115 = *C. erosum*.
nereifolia, Bonpl. ex Humb. Rel. Hist. i. 605 = *C. nerifolium*.
pedunculosa, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 112 (err. typ. 105) = *C. pedunculolum*.
scabra, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1378 = *C. surinamense*.
terebinthinacea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 115 = *C. terebinthinaceum*.

TRIXOSTIS, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 221 = *Aristida*, Linn. (Gramin.).
gracilis, Rafin. l. c. = *A. gracilis*.

TRIZEUXIS, Lindl. Coll. Bot. t. 2 (1823). *ORCHIDAE*, Benth. & Hook. f. iii. 566.
falcata, Lindl. l. c. = *N. Granat*; Ins. Trinit. ?

TROCHERA, Rich. in Journ. Phys. xiii. (1779) 225. t. 3 = *Ehrharta*, Thunb. (Gramin.).
bulbosa, Beauv. Agrost. 62. t. 12. f. 3 = *E. bulbosa*.
calicina, Beauv. l. c. 62. t. 12. f. 4 = *E. calicina*.
spicata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 542, in syn., sphalm. = *E. bulbosa*.
striata, Rich. in Journ. Phys. xiii. (1779) 225. t. 3 = *E. bulbosa*.

TROCHETIA, DC. in Mém. Mus. Par. x. (1823) 106, tt. 7, 8. *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 222.
Blackburniana, Boj. Hort. Maurit. 41, nomen; et ex Baker, Fl. Maurit. 29.—Ins. Maurit.
Boivini, Baill. Adansonia, x. (1871) 109 = *Dombeya Boivini* (in Addend.).
Candolleana, Boj. Hort. Maurit. 41 = *uniflora*.
contracta, Wall. Cat. n. 1162 (Quid?).—Ind. or decanthera, Benth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 116.—Madag.
erythroxyton, Benth. l. c. = *Melhania erythroxyton*.

TROCHETIA :—

grandiflora, Boj. Hort. Maurit. 41; Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 4. t. 21 = *triflora*.
laurifolia, Benth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 116.—Madag.
melanoxyton, Benth. l. c. = *Melhania melanoxyton*.
parviflora, Boj. Hort. Maurit. 41, nomen; et ex Baker, Fl. Maurit. 30.—Ins. Maurit.
pentaglossa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 102.—Madag.
Richardi, Baill. Adansonia, x. (1871) 108 = *Dombeya Richardi* (in Addend.).
serrata, Boj. Hort. Maurit. 41, nomen (Quid?).—Ins. Maurit.
Thouarsii, Baill. Adansonia, x. (1871) 110 = *Dombeya Thouarsii* (in Addend.).
triflora, DC. in Mém. Mus. Par. x. (1823) 109.—Ins. Maurit.
uniflora, DC. l. c. 107.—Ins. Borbon.

TROCHISANDRA, Bedd. Fl. Sylv. i. t. 120 (1871) = *Kurrimia*, Wall. (Celastr.).
indica, Bedd. l. c. = *K. paniculata*.

TROCHISCANTHES, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. i. (1824) 103. *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 910.
PODOPETALUM, Gaud. Fl. Helv. ii. 401 (1828).
SCHNIZLEINIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 532, 720 (1841).
nodiflorus, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. i. (1824) 104.—Europ. austr.

TROCHISCANTHOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 56 = *præc.*

TROCHOCARPA, R. Br. Prod. 548 (1810). *EPA-CRIDEAE*, Benth. in Hook. f. ii. 612.
DECASPORA, R. Br. Prod. 548 (1810).
Clarkei, F. Muell. Fragg. iv. 57.—Austral.
disticha, Spreng. Syst. i. 660.—Austral.
ericifolia, F. Muell. in Papers Roy. Soc. Tasm. (1874) 86 = *Pentachondra ericaefolia*.
glauca, Spreng. Syst. i. 660 = *Cyathodes glauca*.
Gunnii, Benth. Fl. Austral. iv. 167.—Tasmania.
involutrata, F. Muell. Fragg. vi. 57 = *Pentachondra involutrata*.
laurina, R. Br. Prod. 548.—Austral.
parviflora, Benth. Fl. Austral. iv. 167.—Austral.
pumila, F. Muell. Fragg. vi. 57 = *Pentachondra pumila*.
thymifolia, Spreng. Syst. i. 660.—Austral.
verticillata, F. Muell. in Papers Roy. Soc. Tasm. (1874) 86 = *Pentachondra verticillata*.

TROCHOCEPHALUS, Opiz, ex Bercht. Oek. Fl. Boehm. ii. 222 (1838) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).
graminifolius, Opiz, ex Bercht. l. c. 223 = *S. graminifolius*.

TROCHODENDRON, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 83. tt. 39, 40 (1835). *MAGNOLIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 954.

GYMNANTHUS, Jungh. in Hœv. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 308.
Aralioides, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 84.—Japan.

TROCHOMERIA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 822 (1867). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.
HETEROSICYOS, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 33.

debilis, Benth. & Hook. f. Gen. i. 822.—Afr. austr.
Garcini, Benth. & Hook. f. l. c.—Afr. austr.
Hookeri, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 125 = *Garcini*.
macrocarpa, Harv. l. c.; Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 524.—Afr. trop. et austr.
macroura, Hook. f. l. c. 525.—Afr. trop.
madagascariensis, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 113.—Madag.
pectinata, Benth. & Hook. f. Gen. i. 822.—Afr. austr.
polymorpha, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 401.—Afr. trop.
sagittata, Benth. & Hook. f. Gen. i. 822.—Afr. austr.
stenoloba, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 402.—Afr. trop.
vitifolia, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 525.—Afr. trop.
Wyleyana, Benth. & Hook. f. Gen. i. 822.—Afr. austr.

TROCHOMERIOPSIS, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 661 (1881). *CUCURBITACEAE*.
diversifolia, Cogn. l. c.—Madag.

TROCHOSERIS, Endl. Gen. 500 (1838) = *Troximon*, Nutt. (Compos.).
alpina, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 56. t. 263 (= *Macrorhynchus Poeppigii*).—Chili.
pteroarpa, Poepp. & Endl. l. c. 57 (= *Macrorhynchus pterocarpus*).—Chili.

TROCHOSTIGMA, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. 11. (1843) 726. t. 2. f. 2 = *Actinidia*, Lindl. (Ternstr.).
argutum, Sieb. & Zucc. l. c. 727 = *A. callosa*.
Kolomikta, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 261 = *A. callosa*.
polygamum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. 11. (1843) 728 = *A. polygama*.
repandum, Sieb. & Zucc. l. c. = *A. polygama*.
rufum, Sieb. & Zucc. l. c. 727 = *A. callosa*.
volubile, Sieb. & Zucc. l. c. 728 = *A. volubilis*.

TROLIUS, Gilib. Fl. Lituan. ii. 280 (1782), sphalm. = *seq.*

TROLLIUS, Linn. Sp. Pl. ed. I. 556 (1753). *RANUNCULACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 7.
GAISSENIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 351.

HEGEMONE, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 51 (1842).
acaulis, Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 56.—Reg. Himal.
aconitifolius, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. I. 857; et ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 186 = *europaeus*.
africanus, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1831) 217 = *asiaticus*?
altaicus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 200.—Sibir. altaic.
altissimus, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 123; Wender. in Flora, i. (1818) 578 = *europaeus*.
americanus, Ledeb. Fl. Ross. i. 734 = *patulus*.
americanus, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 172, nomen; et ex DC. Syst. i. 313.—Am. bor.
asiaticus, Linn. Sp. Pl. 557.—Sibir.
aureus, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 936 = *caucasicus*.
aureus, Tausch, in Flora, xxii. (1839) 173 = *patulus*?
caucasicus, Ledeb. Fl. Alt. ii. 301 = *altaicus*.
caucasicus, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 265.—Reg. Cauc.
chinensis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 77 = *asiaticus*.
connivens, Moench, Meth. 313 = *europaeus*.
dahuricus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 86, nomen (*daharicus*); xv. (1842) 64 = *Ledebourii*, *patulus*.
decapetalus, Herb. Bosc, ex DC. Syst. i. 314 = *americanus*.
dschungaricus, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 383.—Turkestan.
emarginatus, G. Don, Gen. Syst. i. 45.—Hab.?
europaeus, Falk, Beitr. ii. 203 = *altaicus*.
europaeus, Linn. Sp. Pl. 556; ed. II. 782.—Europ.; Reg. Cauc.
europaeus, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 581 = *patulus*.
europaeus, Sobol. Fl. Petrop. 134 = *asiaticus*.
germanicus, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1831) 217 = *europaeus*.
globosus, Lam. Fl. Fr. iii. 323 = *europaeus*.
grandiflorus, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 936 = *caucasicus*.
grandiflorus, Tausch, in Flora, xxii. (1839) 173 = *europaeus*?
humilis, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 123; ed. II. 134 = *europaeus*.
japonicus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 6 = *asiaticus*?
laxus, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 303 = *americanus*.
Ledebourii, Reichb. Pl. Crit. iii. 63.—Sibir.
lilacinus, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 555.—Sibir. altaic.
Loddigesii, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 936 = *asiaticus*.
macropetalus, F. Schmidt, Reise Amurl. 218 = *asiaticus*.

TROLLIUS:—

- medius*, Wender. in Flora, i. (1818) 578 = *europaeus*.
minimus, Wender, l. c. 579 = *europaeus*.
montanus, Salisb. Prod. 373 = *europaeus*.
napellifolius, Roep. in Flora, iii. (1820) 105 = *europaeus*.
ochotensis, Tiling, in Regel & Tiling, Fl. Ajan. 38 = *patulus*.
palmatus, Baill. Hist. Pl. i. 22 = *Calathodes palmata*.
parviflorus, Ledeb. ex Reichb. Pl. Crit. iii. 63 = *patulus*.
patulus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 387 = *caucasicus*.
patulus, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 303. — Reg. Cauc.; Persia; As. bor.
pentapetalus, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 391 = *americanus*.
pumilus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 195. — Reg. Himal.
pumilus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 54 = *acaulis*.
Riederianus, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 48 = *patulus*.
rotundiflorus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 270 = *europaeus*.
sertiflorus, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 303 = *asiaticus*.
somcheticus, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 247 = *caucasicus*.
sphaericus, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 302 = *europaeus*.
tauricus, Hort. ex Wender. in Flora, i. (1818) 579 = *europaeus*.
transsilvanicus, Schur, Enum. Pl. Transs. 26 = *europaeus*.
viridiflorus, Schur, l. c. = *europaeus*.
viridis, Mielichh. in Flora, xxii. (1839) 492 = *europaeus*.

TROMMSDORFFIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 40. t. 139 (1826) = **Hebanthe**, Mart. (Amarant.).
argentata, Mart. l. c. 41 = *Alternanthera argentata*.
aurata, Mart. l. c. = *H. aurata*.
canescens, Mart. l. c. 42 = *Iresine canescens*.
pulverulenta, Mart. l. c. = *H. pulverulenta*, Benth. & Hook. f.

TROMMSDORFFIA, Bernh. Syst. Verz. Erf. 102 (1800) = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).
maculata, Bernh. l. c. 140 = *H. maculata*.

TROMOTRICHE, Haw. Syn. Pl. Succ. 36 (1812) = **Stapelia**, Linn. (Asclep.).
ciliata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 358 = *Diplocyatha ciliata*.
fusca, Haw. Suppl. Pl. Succ. 10 = *S. fusca*.
glauca, Haw. Syn. Pl. Succ. 37 = *S. glauca*.
mutabilis, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 358 = *S. rufa*.
obliqua, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 96 = *S. obliqua*.
pruinosa, Haw. Syn. Pl. Succ. 37 = *S. pruinosa*.
revoluta, Haw. l. c. 36 = *S. revoluta*.

TROMSDORFFIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 42 (1880), sphalm. = **TROMMSDORFFIA**, Mart. = **Hebanthe**, Mart. (Amarant.).

TROMSDORFFIA, Blume, Bijdr. 762 (1826) = **Chirita**, Buch.-Ham. (Gentian.).
elongata, Blume, l. c. 763. — Ins. Molucc.
speciosa, Blume, l. c. = *C. Horsfieldii*.

TROMSDORFFIA, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 116 (1840) = **Dichrotrichum**, Reinw. (Gesner.).
elongata, R. Br. l. c. = *D. ternatum*.

TRONICENA, Steud. Nom. ed. II. ii. 721 (1841) = **Aeginetia**, Linn. (Orobanch.).
mirabilis, Steud. l. c. = *A. Centronia*.

TRONICEUS, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 713 (1856), in syn., sphalm. = *praece*.

TROOSTWYCKIA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 434 (1862), sphalm. = *seq.*

TROOSTWYCKIA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 531 (1860). **CONNARACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 434. singularis, *Miq. l. c.* = *Sumatra*.

TROPAEOLUM, Linn. Gen. ed. I. 114 (1737). **GERANIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 274.
ANISOCENTRA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1863) i. 593.

TROPAEOLUM:—

- CARDAMINDUM**, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 388 (1763).
CHYMOCARPUS, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 13, 145.
MAGALLANA, Cav. Ic. iv. 50. t. 374 (1797).
RIXEA, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, i. (1845) 225. t. 22.
TROPHAEUM, Linn. Syst. ed. I (1735).
aduncum, Sm. Tour, i. 165 = *peregrinum*.
albiflorum, Lem. in Fl. des Serres, iii. (1847) 241. — Peruv.; Chili.
atrosanguineum, Gordon, in Gard. Chron. (1845) 185. — Peruv.
aureum, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 493, sphalm. = *azureum*.
azureum, Hook. Bot. Mag. t. 3985 = *violaeeflorum*.
azureum, Miers, Trav. Chile, ii. 531, nomen; *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1547. — Chili.
Beuthii, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xviii. (1850) 161. — Bolivia.
bicolor, Steud. Nom. ed. II. ii. 721 = *seq.*
bicolorum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 76. — Peruv.
bogotense, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 425. — N. Granat.
brachyceras, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 14. — Chili.
brasiliense, Casar. in Atti 3a Riun. Sc. Ital. Firenze, (1841) 512. — Bras.
Bridgesii, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 178; *Field. & Gardn. Sert. Pl. t. 39.* — Chili.
canariense, Hort. ex Lindl. & Moore, Treas. Bot. i. 212 = *peregrinum*.
canariense, C. R. Markham, Trav. Peru & Ind. 78 = *Haynianum*.
Chaixianum x, E. Morr. Belg. Hort. vi. (1856) 2.
chilense, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 47. — Chili.
chrysanthum, Planch. & Linden, in Fl. des Serres, x. (1854-55) 97. — N. Granat.
ciliatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 77. — Peruv.
cirrhipes, Hook. Ic. Pl. t. 411. — Peruv.
coccineum, Miers, Trav. Chile, ii. 531, nomen = *tricolorum*.
crenatiflorum, Hook. Bot. Mag. t. 4245. — Peruv.
crenatum, Karst. Fl. Columb. i. 145. t. 72. — N. Granat.
Deckerianum, Moritz & Karst. in Karst. Ausw. Neu. Gew. Venez. 38. t. 12. — Venezuela.
dentatifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 346 = *minus*.
digitatum, Karst. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xix. (1851) 301. — Venezuela.
dipetalum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 77. t. 313. — Peruv.
edule, Paxt. Mag. Bot. ix. (1842) 127. — Chili.
elatum, Salisb. Prod. 275 = *majus*.
elegans, G. Don, Gen. Syst. i. 747. — Chili.
emarginatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 425. — Mexic.
Fintelmanni, Wagen. ex Schlecht. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xviii. (1850) 105. — N. Granat.
floribundum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 426. — Chili.
Funckii, Turcz. l. c. 425. — Venezuela.
Gaertnerianum, Haage & Schmidt, ex Regel, Gartenfl. xxx. (1884) t. 1146 = *digitatum*.
Haynianum, Bernh. in Allg. Thuring. Gartenz. (1843) n. xviii. 73. — Peruv.
Heyneanum, Seem. Journ. Bot. i. (1863) 129 = *praece*.
Hookerianum, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 415. — Chili.
hybridum, Linn. Mant. i. 64 = *majus*.
incrassatum, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 439. — Chili.
Jarrattii, Paxt. Mag. Bot. v. (1838) 29. — Chili?
Kingi, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 684. — Chili.
Klotzschii, Warsz. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 293, in textu. — Bolivia.
Lechleri, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 440. — Chili.
leptophyllum, G. Don, Gen. Syst. i. 747. — Chili.
linearifolium, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 440. — Chili.
Lobbianum, Hort. Veitch, ex Hook. Bot. Mag. t. 4097. — N. Granat.
longifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 423. — N. Granat.
majus, Linn. Sp. Pl. 345. — Peruv.
massiliense x, E. Morr. Belg. Hort. vi. (1856) 2.
minimum, Miers, Trav. Chile, ii. 531, nomen = *brachyceras*.

TROPAEOLUM:—

- minus*, Linn. Sp. Pl. 345. — Peruv.
Moritzianum, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 241. — Venezuela.
Morreanum, Klatt, in Hamb. Gartenz. xv. (1859) 219 = *dipetalum*.
mucronatum, Meyen, Reise, ii. 27. — Peruv.
Naudinii, E. Morr. in Belg. Hort. vi. (1856) 2. t. 1. f. 3. — Hab.?
nubigenum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 34. — Chili.
orthoceras, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 539 = *brasiliense*.
oxalanthum, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, iv. (1848) 257. t. 207. f. 5. — Chili.
paniculatum, Meyen, Reise, i. 314, 342, nomen.
sphalm. = *mucronatum*?
parviflorum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 423. — Venezuela.
peltophorum, Benth. Pl. Hartw. 127. — Peruv.
pendulum, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xviii. (1850) 377. — Am. centr.
pentaphyllum, Lam. Encyc. i. 612. — Reg. Argent.
peregrinum, Linn. Sp. Pl. 345. — N. Granat.
pilosum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 424. — Venezuela.
pinnatum, Andr. Bot. Rep. viii. 535. — Peruv.
polyphyllum, Cav. Ic. iv. 65. t. 395. — Chili.
polyphyllum, Hort. ex Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1848 = *edule*.
Popelarii, Drapiez, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xv. (1847) 161 = *albiflorum*.
prostratum, Miers, Trav. Chile, ii. 531, nomen = *polyphyllum*.
pubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 251. — Peruv.
pulchellum, Salisb. Prod. 275 = *minus*.
quinatum, Hellen. Tropaeol. 20 = *seq.*
quingulobum, Berg, in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1765) 33. t. 1 = *majus*.
Reineckeanum x, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xiv. (1846) 153.
repandifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 346 = *majus*.
rhizophorum, Warsz. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1882) 293. — Bolivia.
rhomboideum, Lem. in Fl. des Serres, iii. (1847) sub t. 236. — Chili.
Scheuerianum, E. Morr. in Belg. Hort. vi. (1856) 1, in textu = *majus*.
Schillingii, [B. Verlot, in] Viln. Fl. Pl. Terre, ed. II. 189 = *majus*.
Schlimmii, Linden, ex Planch. Fl. des Serres, vi. (1850-51) 47 = *Wagnerianum*.
sessilifolium, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 24. t. 38. — Chili.
Smithii, DC. Prod. i. 684 = *peregrinum*.
speciosum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 22. — Chili.
subincrassatum, Steud. Nom. ed. II. ii. 721. — Chili.
tenellum, G. Don, Gen. Syst. i. 747. — Chili.
tenuirostre, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 440. — Chili.
tricolor, Lindl. Bot. Reg. t. 1935 = *seq.*
tricolorum, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. iii. t. 270. — Chili.
trilobum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 424. — Venezuela.
tuberosum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 77. t. 314. — Peruv.
umbellatum, Hook. Bot. Mag. t. 4337. — Ecuador.
violaeeflorum, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xiii. (1845) 130. — Chili.
Wagnerianum, Karst. in Otto & Dietr. l. c. xvii. (1849) 306. — Venezuela.
Warmingianum, Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 227. — Bras.
Zanderi x, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxii. (1854) 370.

TROPEOLUM, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. v. (1793) 48, sphalm. = *praece*.

TROPEXA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 (1836) = **Aristo-lochia**, Tourn.
biloba, Rafin. l. c. = *A. bilobata*.

TROPHAEUM, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Tropaeolum**, Linn. (Geran.).

TROPHIANTHUS, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xii. (1844) 218 = **Aspasia**, Lindl. (Orchid.).
zonatus, Scheidw. l. c. = *A. lunata*.

TROPHIS, P. Br. Hist. Jamaic. 357 (1756); Linn. Syst. ed. X. 1289 (1759). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 365.

BUCEPHALON, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 375 (1737).
aculeata, Roth, Nov. Pl. Sp. 368 = *Streblus asper*, *Plecosperrum spinosum*.
americana, Linn. Syst. ed. X. 1289.—Ind. occ.
anthropophagorum, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 259; Fl. Vit. 258 (= *Paratrophidis* sp.).—Ins. Fiji.
aspera, Retz. Obs. v. 30 = *Streblus asper*.
coccinea, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 335, nomen = *Malaisia tortuosa*.
cochinchenensis, Poir. Encyc. viii. 123 = *Streblus asper*.
cordata, Poir. l. c. 124 = *Broussonetia papyrifera*.
fruticosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 215 = *Cudrania javanensis vel fruticosa*.
glabrata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 314.—Mexic.
Heyneana, Wall. Cat. n. 4642 = *Phyllochlamys spinosa*.
Hilariana, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 80 = *Sorocea Hilarii*.
laurifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 733 = *Styloceras laurifolium*.
mexicana, Bur. in DC. Prod. xvii. 253.—Mexic.
opaca, Forst. ex Bur. l. c. 236 = *Paratrophis heterophylla*.
Ramon, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 357 = *americana*.
scandens, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 214 = *Malaisia tortuosa*.
spinosa, Blume, Bijdr. 489 = *Cudrania javanensis*.
spinosa, Roxb. ex Willd. Sp. Pl. iv. 734 = *Plecosperrum spinosum*.
spinosa, Roxb. Fl. Ind. iii. 762 = *Phyllochlamys spinosa*.
taxiformis, Spreng. Syst. iii. 902 = *Phyllochlamys spinosa*.
taxoides, Heyne, in Roth, Nov. Pl. Sp. 368 = *Phyllochlamys spinosa*.
zeylanica, Koen. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 79 = *Streblus asper*.

TROPHOSPERMUM, Walp. Rep. i. 171 (1842), sphalm. = **TAPHROSPERMUM**, C. A. Mey. = **Cochlearia**, Tourn. (Crucif.).

TROPIDIA, Lindl. in Wall. Cat. n. 7386 (1831); et Bot. Reg. sub t. 1618 (1833). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 592.
CNEMIDIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1618 (1833).
DECAISNEA, Lindl. in Wall. Cat. n. 7388 (1831).
GOVINDOOIA, Wight, Ic. vi. 34. t. 2090 (1853).
PTYCHOCHILUS, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 431. t. 12 B.
angulosa, Blume, Orch. Archip. Ind. 122.—Ind. or.; Burma.
assamica, Blume, l. c. 124 = *curculigoides*.
bambusifolia, Trimen, Cat. Pl. Ceyl. 90.—Zeylan.
curculigoides, Lindl. in Wall. Cat. n. 7386.—Reg. Himal.; Burma.
effusa, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 295.—Ins. Fiji.
Govindooi, Blume, Orch. Archip. Ind. 122 = *angulosa*.
graminea, Blume, l. c. 124.—Malaya.
grandis, Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 128 = *Geodorum semicristatum*.
pedunculata, Blume, Orch. Archip. Ind. 122.—Siamatra.
semilibera, Blume, l. c. = *angulosa*.
septemnervis, Reichb. f. in Linnaea, xxv. (1852) 230.—Ins. Philipp.
squamata, Blume, Orch. Archip. Ind. 123.—Borneo.

TROPIDOCARPUM, Hook. Ic. Pl. tt. 43, 52 (1836). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 82.
gracile, Hook. Ic. Pl. t. 43.—Am. bor. occ.
scabriusculum, Hook. l. c. t. 52 = *gracile*.

TROPIDOLEPIS, Tausch, in Flora, xii. (1829) 68 = **Chiliotrichum**, Cass. (Compos.).
diffusa, Tausch, l. c. = *C. amelloideum*.

TROPIDOPETALUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) 1. 265. Genus dubium **OLACINEARUM**.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. i. 995.
javanicum, Turcz. l. c.—Java.

TROPILIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 95 (1836) = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).
emulum, Rafin. l. c. = *D. aemulum*.

TROPITOMA, Rafin. New Fl. Am. ii. 19 (1836) = **Desmodium**, Desv. (Legumin.).
paradoxa, Rafin. l. c. (= *D. leucanthum*).—Am. bor.

TROPITRIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 68 (1836) = **Tradesantia**, Linn. (Commel.).
Crassula, Rafin. l. c. = *Trad. Crassula*.

TROPOCARPA, D. Don, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 423 (1857) = **Orites**, R. Br. (Proteac.).

TROS, Haw. Monog. Narciss. 5 (1831) = **Narcissus**, Tourn. (Amaryll.).
galanthifolia, Haw. l. c. = *N. poculiformis*.
poculiformis, Haw. l. c. = *N. poculiformis*.

TROSCHELIA, Klotzsch & Schomb. in Faun. Fl. Brit. Gui. 1066 (1843) = **Schieckia**, Meissn. (Haemod.).
orinocensis, Klotzsch, l. c. = *S. orinocensis*.

TROTULA, Comm. ex DC. Prod. iii. 90 (1828) = **Nesaea**, Comm. (Lythrar.).
Trianthis, Comm. ex DC. l. c. = *N. triflora*.

TROXIMON, Gaertn. Fruct. ii. 360 (1791). 'Genus male factum' Benth. & Hook. f. ii. 522.—Cf. seq.
Dandelion, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. (1795) 268; Pers. Syn. ii. 360 = *Krigia Dandelion*.
lanatum, F. W. Schmidt, l. c. 269; Pers. l. c. = *Scorzonera lanata*.
virginicum, F. W. Schmidt, l. c. 268 = *Krigia amplexicaulis*.

TROXIMON, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813), nn. 83, 84; Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 505, 742 (1814). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 522.
AGOSERIS, Rafin. Fl. Ludov. 58 (1817).
AMMOGETON, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1833) 1.
CRYPTOPLEURA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 431.
KYMAPLEURA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) [in errat.] 455.
MACRORHYNCHUS, Less. Syn. Comp. 139 (1832).
STYLOPAPPUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 431.
TROCHOSERIS, Endl. Gen. 500 (1838).

alpestre, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 70.—Am. bor. occ.
apargioides, A. Gray, in Bot. Calif. i. 438, partim = *humile*.
apargioides, Less. in Linnaea, vi. (1831) 501.—Calif.
aurantiacum, A. Gray, in Bot. Calif. i. 437, partim.—Nuttallii.
aurantiacum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 300. t. 104.—Am. bor. occ.
barbellulatum, Greene, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 437.—Calif.
bulbosum, Rafin. Fl. Ludov. 57 (Quid?).—Am. bor. occ.
chilense, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1876) 216 = *heterophyllum*.
ciliatum, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 83, nomen (Quid?).—Am. bor.
cuspidatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 742.—Am. bor.
fritillarioides, [Froel. in] DC. Prod. vii. 251, sphalm. = *Picrosia longifolia*.
glaucum, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 84, nomen; Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 505, 742.—Am. bor. occ.
glaucum, Sims, Bot. Mag. t. 1667 = *cuspidatum*.
gracilens, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 71.—Am. bor. occ.
grandiflorum, A. Gray, l. c. ix. (1876) 216.—Am. bor. occ.
heterophyllum, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 88.—Am. bor. occ.
humile, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 72.—Am. bor. occ.
laciniatum, A. Gray, l. c.—Am. bor. occ.

TROXIMON :—

marginatum, Nutt. Gen. Am. ii. 128 = *cuspidatum*.
Nuttallii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1876) 216.—Am. bor. occ.
odoratum, Rafin. Fl. Ludov. 58 (Quid?).—Am. bor.
pallidum, Rafin. l. c. 59 (Quid?).—Am. bor.
parviflorum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 434.—Am. bor. occ.
pumilum, Nutt. l. c. = *glaucum*.
retrosum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1876) 216.—Calif.
Roemerianum, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 165 = *Pinaropappus roseus*.
roseum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 434 = *glaucum*.
taraxacifolium, Nutt. l. c. = *glaucum*.

TROXIRUM, Rafin. Sylva Tellur. 85 (1838) = **Peperomia**, Ruiz & Pav. (Piper.).
blandum, Rafin. l. c. = *P. blanda*.
filiforme, Rafin. l. c. = *P. filiformis*.
Pereskia, Rafin. l. c. = *P. pereskiaefolia*.
pulchellum, Rafin. l. c. = *P. pulchella*.
quadrifolium, Rafin. l. c. = *P. reflexa*.
reflexum, Rafin. l. c. = *P. reflexa*.
stellatum, Rafin. l. c. = *P. stellata*.
trifolium, Rafin. l. c. = *P. trifolia*.
verticillatum, Rafin. l. c. = *P. pulchella*.

TROXISTEMON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 (1836) = **Hymenocallis**, Salisb. (Amaryll.).
distichus, Rafin. l. c. 123 = *H. littoralis*.
Dryandri, Rafin. l. c. (*driandrum*) = *H. littoralis*.
fragrans, Rafin. l. c. 23 = *H. caribaea*?
littorale, Rafin. l. c. = *H. littoralis*.
mexicanus, Rafin. l. c. 123 = *H. lacera*?

TROZELIA, Rafin. Sylva Tellur. 54 (1838) = **Aenictus**, Schott (Solan.).
umbellata, Rafin. l. c. = *A. umbellatus*.

TRUJANOIA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 1 (1825). Genus dubium **EUPHORBIACEARUM**.
mexicana, D. Dietr. Syn. Pl. i. 804 = *pinnata*.
pinnata, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 1.—Mexic.

TRUNCARIA, DC. Prod. iii. 106 (1828) = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melastom.).
caryophyllaea, DC. l. c. = *M. caryophyllaea*.

TRYALLIS, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 469 (1868–71), sphalm. = **Thryallis**, Mart. (Malpig.).

TRYGONANTHUS, Endl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 69, in syn. (1841) = **Loranthus**, Linn.

TRYMALIUM, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 20 (1837). **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 382.
albicans, Reiss. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 280.—Austral.
angustifolium, Reiss. l. c. 284.—Austral.
Behrii, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 274 = *Spyridium subochreatum*.
biauratum, Reiss. & F. Muell. l. c. 281 = *Pomaderris obcordata*.
bifidum, F. Muell. l. c. 282 = *Spyridium bifidum*.
Billardieri, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 25.—Austral.
bilobatum, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 279 = *Pomaderris obcordatum*.
brevifolium, Reiss. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 281.—Austral.
capsulare, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 137 = *Colubrina asiatica*.
Daltoni, F. Muell. Fragm. ix. 135.—Austral.
daphnifolium, Reiss. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 283 = *ledifolium*.
daphnoides, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 278 = *Spyridium spathulatum*.
diversifolium, F. Muell. Second Ind. Vict. Pl. 11 = *Spyridium vexilliferum*.
eupatorioides, Reiss. & F. Muell. in Linnaea, xxix. (1857–58) 270 = *Spyridium parvifolium*.
expansum, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 185 = *Billardieri*.
flabellare, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857–58) 281.—Austral.
floribundum, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 185 = *Billardieri*.

TRYMALIUM :—

- globulosum*, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 25 = *Spyridium globulosum*.
halmaturinum, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 283 = *Spyridium halmaturinum*.
helianthemifolium, Reiss. l. c. 271 = *Pomaderris ledifolia*.
hermannioides, Reiss. l. c. 275 = *Spyridium parvifolium*.
ledifolium, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 24.—Austral.
leucophractum, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 295 = *Stenanthemum leucophractum*.
Leucopogon, F. Muell. ex Reiss. l. c. 274 = *Spyridium subochreatum*.
majoranifolium, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 21 = *Spyridium spadiceum*.
microphyllum, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 273 = *Spyridium Lawrencii*.
obovatum, Reiss. l. c. 278 = *Spyridium obovatum*.
oligocephalum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 460 = *Spyridium oligocephalum*.
parvifolium, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 275 = *Spyridium parvifolium*.
phlebophyllum, F. Muell. ex Reiss. l. c. 272 = *Spyridium phlebophyllum*.
polycephalum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 460 = *Spyridium subochreatum*.
rosmarinifolium, Reiss. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 283 = *ledifolium*.
serpyllaceum, Reiss. & F. Muell. in Linnaea, xxix. (1857-58) 280 = *Spyridium serpyllaceum*.
spadiceum, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 26 = *Spyridium spadiceum*.
spathulatum, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 122 = *Spyridium spathulatum*.
stenophyllum, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 282 = *Spyridium bifidum*.
Stuarti, F. Muell. ex Reiss. l. c. 289, 290 = *Spyridium coactilifolium*.
subochreatum, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 122 = *Spyridium subochreatum*.
thomasioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 459 = *Spyridium spadiceum*.
uncinatum, F. Muell. Second Ind. Vict. Pl. 11 = *Spyridium eriocephalum*.
velutinum, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 276 = *Spyridium obovatum*.
vexilliferum, F. Muell. ex Reiss. l. c. 286 = *Spyridium vexilliferum*.
Wayac, F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. v. (1882) 80; vi. (1883) 109.—Austral.
Wayii, F. Muell. & Tate, l. c. vi. (1883) 109 = *praec.*
Wendlandianum, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 137 = *Pomaderris ferruginea*.
westringiaefolium, Reiss. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 284 = *Spyridium westringiaefolium*.
Wichurae, Nees, ex Reiss. l. c. ii. 281.—Austral.

TRYMATOCOCCUS, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 30. t. 142 (1838). *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 366.
africanus, Baill. *Adansonia*, xi. (1875) 300.—Afr. trop.
amazonicus, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 30. t. 142.—Bras.

TRYOCEPHALUM, Endl. Gen. 119 (1836) = **THRYOCEPHALON**, Forst. = **Kyllinga**, Rottb. (Cyperac.).

TRYPHANE, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 28 (1841); Nom. 205 (1841) = **Arenaria**, Rupp. (Caryoph.).
cespitosa, Reichb. l. c. = *A. verna*.
Facchini, Reichb. l. c. 29.—Europ.
Gerardi, Reichb. l. c. = *A. verna*.
hispida, Reichb. l. c. = *A. hispida*.
obtus, Reichb. l. c. 32 = *A. polygonoides*.
recurva, Reichb. l. c. 29 = *A. recurva*.
verna, Reichb. l. c. 28 = *A. verna*.

TRYPHERA, Blume, Bijdr. 549 (1825) = **Mollugo**, Linn. (Ficoid.).
prostrata, Blume, l. c. = *M. hirta*.

TRYPHIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 (1835) = **Holothrix**, Rich. (Orchid.).
Mac-Owaniana, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 108 = *H. Mac-Owaniana*.
major, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 82 = *H. secunda*.

TRYPHIA :—

- nivea*, Zeyh. ex Harv. Gen. S. Afr. Pl. 323 = *Holothrix Lindleyana*?
orthoceras, Harv. Thes. Cap. ii. 4 = *H. orthoceras*.
parviflora, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 209 = *H. parviflora*.
secunda, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 = *H. Lindleyana*.

TRYPHOSTEMMA, Harv. Thes. Cap. i. 32. t. 51 (1859). *PASSIFLOREAE*, Penth. & Hook. f. i. 811.
Hanningtonianum, Mast. in Hook. Ic. Pl. t. 1484.—Afr. trop.
natalense, Mast. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 639 = *Sandersoni*.
Sandersoni, Harv. Thes. Cap. i. 33.—Afr. austr.
zanzibaricum, Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 508.—Afr. trop.

TRYPTOMENE, Walp. Rep. ii. 157 (1843), sphalm. = **Thryptomene**, Endl. (Myrtac.).

TSCHUDYA, DC. Prod. iii. 155 (1828) = **Oxymenis**, DC. (Melastom.).
asperiuscula, DC. l. c. = *O. asperiuscula*.
berbiceana, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 47 = *Miconia Acinodendron*.
ibaguensis, Griseb. l. c. = *Miconia ibaguensis*.
ionopogon, Mart. in Flora, xxiv. (1841) 11. Beibl. 37 = *O. ionopogon*.
lanata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 250 = *Miconia lanata*.
pulverulenta, DC. Prod. iii. 155 = *O. pulverulenta*.
robusta, Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 329 = *Miconia trichodes*.
rufescens, DC. Prod. iii. 155 = *O. rufescens*.
spondylantha, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 251 = *Miconia spondylantha*.
strigillosa, Griseb. l. c. 250 = *Platycentrum clide-mioides*.
verticillata, DC. Prod. iii. 155 = *O. rufescens*.

TSIA, Adans. Fam. ii. 450 (1763) = **Camellia**, Linn. (Ternstr.).

TSIANA, J. F. Gmel. Syst. i. 9 (1791) = **Costus**, Linn. (Scitac.).
speciosa, J. F. Gmel. l. c. = *C. speciosus*.

TSIEMTANI, Adans. Fam. ii. 303 (1763) = **Rumphia**, Linn. (Anacard.).

TSJERUCANIRAM, Adans. Fam. ii. 80 (1763) = **Cansjera**? Juss. (Olcac.).

TSJINKIA, Adans. Fam. ii. 401 (1763) = **Lagerstroemia**, Linn. (Lythrac.).

TSUBAKI, Adans. Fam. ii. 399 (1763) = **Camellia**, Linn. (Ternstr.).

TSUGA, Carr. Conif. ed. I. 185 (1855). *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 440.
Micropeuce, Gord. Pinet. Suppl. 13 (1862).
Balfouriana, M^oNab, in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 211.—Am. bor. occ.
Brunoniana, Carr. Conif. ed. I. 188.—Reg. Himal.
canadensis, Carr. l. c. 189.—Am. bor.
caroliniana, Engelm. in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 223.—Am. bor.
diversifolia, Mast. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 514.—Japon.
Douglasii, Carr. Conif. ed. I. 192 = *Pseudotsuga Douglasii*.
Hookeriana, Carr. l. c. ed. II. 252.—Calif.
Lindleyana, Roezl, Cat. Grain. Conif. Mex. 8 = *Pseudotsuga Douglasii*.
Mertensiana, Carr. Conif. ed. II. 250.—Am. bor. occ.
Pattoniana, Engelm. in Gard. Chron. (1879) 11. 756.—Am. bor. occ.
Roezlii, Carr. in Rev. Hort. (1870) 217.—Calif.
Sieboldii, Carr. Conif. ed. I. 186.—Japon.
Tsuga, A. Murr. in Proc. Hort. Soc. Lond. ii. (1862) 508 = *Sieboldii*.

TSUSIOPHYLLUM, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xvi. (1871) n. ix. 12. *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 602.
Tanakae, Maxim. l. c.—Japon.

TSUTSUSI, Adans. Fam. ii. 164 (1763) = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).

TUAMINA, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 102 = **Vicia**, Tourn. (Legumin.).
Michauxii, Alef. l. c. = *V. Michauxii*.

TUBANTHERA, Comm. ex DC. Prod. ii. 30 (1825) = **Colubrina**, Rich. (Rhamn.).
Katapa, Rafin. Sylva, Tellur. 154 = *C. asiatica*.

TUBERARIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 364 = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.).
annua, Spach, l. c. 365 = *H. guttatum*.
brevipes, Willk. Ic. Pl. Hisp. ii. 79. t. 116 = *H. guttatum*.
bupleurifolia, Willk. l. c. 77. t. 115 = *H. bupleurifolium*.
discolor, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 218 = *H. discolor*.
echioides, Willk. Ic. Pl. Hisp. ii. 81. t. 118 = *H. echioides*.
globulariaefolia, Willk. l. c. 71. t. 111 = *H. globulariaefolium*.
glomerata, Willk. l. c. t. 117 = *H. glomeratum*.
guttata, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 340 = *H. guttatum*.
inconspicua, Willk. Ic. Pl. Hisp. ii. 78. t. 116 = *H. guttatum*.
macrocephala, Willk. l. c. 80. t. 117.—Hispan.
patula, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 354 = *H. patulum*.
perennis, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 365 = *H. Tuberaria*.
variabilis, Willk. Ic. Pl. Hisp. ii. 73. tt. 112-114 = *H. variabile*.
villosissima, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 218 = *H. villosissimum*.
viscida, Pomel, l. c. = *H. glutinosum*?
vulgaris, Willk. Ic. Pl. Hisp. ii. 69. t. 110 = *H. vulgare*.

TUBEROSA, Heist. Syst. 5 (1748) = **Polianthes**, Linn. (Amaryll.).
amica, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 480 = *P. tuberosa*.

TUBEROSTYLES, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 241 (1873), err. typ. = *seq.*

TUBEROSTYLIS, Steetz, in Seem. Bot. Voy. Herald, 142. t. 29 (1853). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 241.
Rhizophorae, Steetz, l. c.—Panama.

TUBIFLORA, J. F. Gmel. Syst. 27 (1791) = **Elytraria**, Michx. (1803) (Acanth.).
carolinensis, J. F. Gmel. l. c. = *E. virgata*.

TUBILIUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 153 = **Pulicaria**, Gaertn. (Compos.).
angustifolium, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 20 = *P. inuloides*.
siculum, Choisy, ex DC. Prod. v. 477 = *P. sicula*.

TUBOCYTISUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 358 = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).
biflorus, Fourr. l. c. = *C. biflorus*.
capitatus, Fourr. l. c. = *C. capitatus*.
elongatus, Fourr. l. c. = *C. biflorus*.
supinus, Fourr. l. c. xvii. (1869) 195 = *C. supinus*.

TUBOPADUS, Pomel, Mat. Fl. Atl. 8 (1860) = **Prunus**, Tourn. (Rosac.).
prostratus, Pomel, l. c. = *P. prostrata*.

TUCKERMANNIA, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 248 = **Corema**, D. Don (Empetr.).
Conradi, Klotzsch, l. c. = *C. Conradi*.

TUCKERMANNIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 363 = **Leptosyne**, DC. (Compos.).
maritima, Nutt. l. c. = *L. maritima*.

TUCKEYA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 26 (1844-49) = **Pandanus**, Linn.
Candelabrum, Gaudich. l. c. f. 10-20 = *P. Candelabrum*.

- TULA**, Adans. Fam. ii. 500 (1763). *RUBIACEAE*? Adansonii, Roem. & Schult. Syst. iv. 355.—Peruv.
- TULAKENIA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 120 (1836) = *Jurinea*, Cass. (Compos.). *blanda*, Rafin. l. c. = *J. mollis*. *cyanoides*, Rafin. l. c. = *J. cyanoides*. *mollis*, Rafin. l. c. = *J. mollis*.
- TULASNEA**, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 142. *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 739. *foliosa*, Naud. l. c. 143.—Bras. *gracillima*, Naud. l. c. t. 2.—Bras.
- TULASNEA**, Wight, Ic. v. tt. 1919–20 (1852) = *Terniola*, Thl. (Podostem.). *ceylanica*, Wight, l. c. t. 1919 = *Terniola zeylanica*. *foliosa*, Wight, l. c. = *Terniola foliosa*. *Lawii*, Wight, l. c. (*Lauri*) = *Terniola Lawii*. *pedunculata*, Wight, l. c. t. 1919 = *Terniola pedunculosa*. *pedunculosa*, Wedd. in DC. Prod. xvii. 47, sphalm. = *præcox*. *ramosissima*, Wight, Ic. t. 1920 = *Terniola ramosissima*. *zeylanica*, Wedd. in DC. Prod. xvii. 46 = *ceylanica*.
- TULBACHIA**, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1030 (1840), err. typ. = seq.
- TULBAGHIA**, Linn. Mant. ii. 148 (1771) (*Tulbagia*); Neck. Elem. iii. 188 (1790). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 798. *OMENTARIA*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 87 (1866). *acutifolia*, Harv. Thes. Cap. ii. 51. t. 180.—Afr. austr. *aequinoctialis*, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 246.—Afr. trop. *affinis*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 310 = *alliacea*. *alliacea*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 806 = *capensis*. *alliacea*, Linn. f. Suppl. 193; Thunb. Prod. Pl. Cap. 60.—Afr. austr. *australis*, Link, ex Steud. Nom. ed. I. 857 (nom. delend. sec. ej. ed. II. ii. 722). *brachystemma*, Kunth, Enum. Pl. iv. 483 = *alliacea*. *Camerooni*, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 321.—Afr. trop. *capensis*, Linn. Mant. ii. 223.—Afr. austr. *cepacea*, Linn. f. Suppl. 194 (excl. syn.).—Afr. austr. *cepacea*, Linn. f. l. c., partim = *capensis*. *cernua*, Avé-Lall. ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. Suppl. 25.—Afr. austr. *Dregeana*, Kunth, Enum. Pl. iv. 483.—Afr. austr. *Heisteri*, Fabr. Enum. Pl. Hort. Helmst. 4 = *Agapanthus umbellatus*. *hypoxidea*, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 3; Schult. f. Syst. vii. 995.—Afr. austr. *inodora*, Gaertn. Fruct. i. 57 = *alliacea*. *Ludwigiana*, Harv. in Bot. Mag. t. 3547 = *alliacea*. *narcissifolia*, Salisb. Prod. 219 = *alliacea*. *pulchella*, Avé-Lall. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iii. (1844) 204 = *capensis*. *violacea*, Harv. in Bot. Mag. t. 3555.—Afr. austr.
- TULEXIS**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 42 (1836) = *Brassavola*, R. Br. (Orchid.). *bicolor*, Rafin. l. c. 43 = *B. tnberculata*.
- TULIPA**, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 91 (1737). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 818. *LIRIACIS*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 97 (1836). *LIRIOPOGON*, Rafin. l. c. 35 (1836). *ORITHYIA*, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 336 (1836). *PODONIX*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 28 (1836). *acrocarpa*, Jord. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 293 = *gallica*. *acuminata*, Vahl, ex Hornem. Hort. Hafn. i. 328.—Hab. ? *acutiflora*, DC. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 283 = *Didieri*. *acutiflora*, Poir. Encyc. viii. 134 = *T. Oculus-solis*. *agenensis*, [DC. in] Red. Lil. t. 60*, Add. = *T. Oculus-solis*. *Alberti*, Regel, Gartenfl. (1877) 257; et in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 264.—Turkestan. *aleppensis*, Boiss. ex Regel, Gartenfl. (1873) 296; et Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 450 = *T. Oculus-solis*.

- TULIPA** :—*aleppica*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 278 = *T. Oculus-solis*. *alpestris*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 120 = *australis*. *alpina*, J. Gay, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 289 = *pulchella*. *altaica*, Geblert, ex Schult. f. Syst. vii. 385, 553 = *uniflora*. *altaica*, Pall. ex Spreng. Syst. ii. 63.—Sibir. *altaica*. *apula*, Guss. ex Tenore, Fl. Neap. Syll. App. v. 12 = *præcox*. *aristata*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 506.—China. *armena*, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 99 = *Gesneriana*. *atheniensis*, Orphan. in Bull. Congr. Bot. Pétersb. 1869 (1870) 116 = *Orphanidea*. *aurea*, Rafin. Atl. Journ. 153 (Quid ?).—Am. bor. *australis*, Link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 317.—Lusit.; Gall. *Beccariana*, Bicchi, Agg. Fl. Lucch. (1860) 21, nomen; et Desc. Nuov. Sp. Tulip. 2, cum ic.—Ital. *Behmiana*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 505.—Turkestan. *bicolor*, Rafin. Atl. Journ. 153 (Quid ?).—Am. bor. *Biebersteiniana*, Schult. f. Syst. vii. 382.—Reg. Cauc.; Podol. *biflora*, Becker, ex Nym. Consp. 723 = *Biebersteiniana*. *biflora*, Donn, Hort. Cantab. ed. V. 75 = *Clusiana*. *biflora*, Hort. Lund. ex Schult. f. Syst. vii. 384 = *patens*. *biflora*, Pall. Reise, iii. 727.—Reg. Cauc. *Billietiana*, Jord. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. v. (1858) 11 = *Didieri*. *bithynica*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 382, in syn.—As. Min. *boeotica*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iv. 99.—Graecia. *Boissieri*, Regel, Gartenfl. (1873) 296 = *montana*. *Bonarotiana*, Reboul, Nonn. Sp. Tulip. 7 = *strangulata*. *Borszczowi*, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) i. 438.—Turkestan. *brachystemon*, Regel, Gartenfl. (1882) 323.—Turkestan. *Breyntiana*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 717 = *australis*. *Breyntiana*, Linn. Sp. Pl. 306 = *Bacometra columellaris*. *Browniana*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1172 = *patens*. *Brujniana*, Roxb. Hort. Beng. 24, nomen = *Breyntiana*? *bucharica*, Merklin, ex Boiss. Fl. Orient. v. 193 = *sogdiana*. *Buhseana*, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 98 = *humilis*. *campopetala*, Delaun. ex Loisel. Herb. Gén. Amat. iii. t. 172.—Hab. ? *caucasica*, Orsin. ex Nym. Consp. 723 = *australis*. *caucasica*, Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 722.—Reg. Cauc. *Celsiana*, [DC. in] Red. Lil. t. 38 = *australis*. *Celsiana*, Henning, in Mém. Soc. Nat. Mosc. vi. (1823) 70 = *Biebersteiniana*. *chrysantha*, Boiss. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 279.—Persia; Ind. bor. occ. *Clusiana*, [DC. in] Red. Lil. t. 37.—Europ.; Oriens. *Clusiana*, Orph. ex Nym. Consp. 723 = *Orphanidea*. *Clusiana*, Shepherd, ex Schult. f. Syst. vii. 1684 = *stellata*. *connivens*, Levier, Orig. Tul. Sav. Ital. 12.—Italia. *cornuta*, [Delile, in] Red. Lil. t. 445 = *acuminata*. *coronaria*, Salisb. Prod. 236 = *Gesneriana*. *cretica*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xiii. 19.—Ins. Creta. *crispata*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 211.—Persia. *crocata*, Orph. in Bull. Congr. Bot. Pétersb. 1869 (1870) 116 = *Orphanidea*. *cuspidata*, Regel, Gartenfl. (1884) 66.—Alger. *cuspidata*, Staff, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 17.—Persia. *Cypriani*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 722 = *Clusiana*. *dasyptemon*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 507.—Turkestan. *Didieri*, Jord. Obs. Pl. Crit. i. (1846) 34.—Europ. *Didieri*, Passer, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. iii. (1871) 168 = *Passerianiana*. *edulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 295.—China; Japon.

- TULIPA** :—*Eichleri*, Regel, Gartenfl. (1874) 193.—Turkestan. *elegans*, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 286.—Hab. ? *Elwesi*, Regel, Gartenfl. (1884) t. 1147 = *cuspidata*, Regel. *erythronioides*, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 292.—China. *etrusca*, Levier, in Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchât. xiv. (1884) 262.—Ital. *eunanthia*, Orph. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 100 = *boeotica*. *florentina*, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 290 = *syvestris*. *foliosa*, Staff, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 80.—Armenia. *Foxiana*, Reboul, Select. Sp. Tulip. 2 = *præcox*. *fragrans*, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 256.—Alger. *Fransoniiana*, Parl. Nuov. Gen. e Spec. 15 = *Didieri*. *fulgens*, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 285.—Hab. ? *gallica*, Delaun. ex Loisel. Herb. Gén. Amat. t. 160.—Gallia. *Gesneriana*, Bell. App. Fl. Pedem. 226 = *Didieri*. *Gesneriana*, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. t. 380 = *præcox*. *Gesneriana*, Linn. Sp. Pl. 306.—Europ. or.; Oriens. *Gesneriana*, Reboul, Sp. Tulip. (1822) 6 = *connivens*. *glaucophylla*, Fisch. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 448 = *Borszczowi*. *graminifolia*, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 230 = *edulis*. *Greigi*, Regel, Gartenfl. (1873) 290. t. 773.—Turkestan. *Grisebachiana*, Pantoš. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 265 = *Orphanidea*. *Grisebachii*, Borb. l. c. xxxiii. (1883) 202 = *præcox*. *Hageri*, Heldr. in Regel, Gartenfl. (1874) 97. t. 790.—Graecia. *heliophthalma*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 70 = *T. Oculus-solis*. *heteropetala*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 21. t. 85 = *uniflora*. *heterophylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 295.—Mont. Altaic. *hexagonata*, Borb. —Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 202 = *præcox*. *hispanica*, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 380, in obs. = *Clusiana*. *hortensis*, Gaertn. Fruct. i. 64 = *Gesneriana*. *hortulanorum*, Wender. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 71 = *suaveolens*. *humilis*, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 30.—Persia. *hungarica*, Borb. —Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 202.—Hungar. *iliensis*, Regel, Gartenfl. (1879) 162. t. 975.—Turkestan. *Julia*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 225 = *montana*. *Kaufmanniana*, Regel, Gartenfl. (1877) 194; et in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 265.—Turkestan. *Kesselringi*, Regel, ll. cc. 34; 637.—Turkestan. *Kolpakowskiana*, Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 266.—Turkestan. *Korolkowi*, Regel, l. c. iii. II. (1875) 295.—Turkestan. *Krauseana*, Regel, l. c. vi. (1879) 508.—Turkestan. *laciniata*, Fisch. ex Bellerin. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1816) 67 = *Gesneriana*. *laciniata*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 35 = *præcox*. *lanata*, Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1884) 647. t. 4.—Bokhara. *Lehmanniana*, Merck. ex Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 513 = *chrysantha*. *linifolia*, Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1884) 648.—Bokhara. *Lortetii*, Jord. in Ann. Soc. Lyon, N. S. v. (1858) 9 = *T. Oculus-solis*. *Lownei*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 294.—Syria. *lurida*, Levier, Orig. Tul. Sav. Ital. 15 (sp. dnb.).—Europ. *maculata*, Dulac, Fl. Haut's-Pyr. 107 = *Clusiana*. *maculata*, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 289.—Hab. ? *maculata*, Roth, Nov. Pl. Sp. 196 = *australis*.

TULIPA:—

- maleolens, *Reboul, App. Nonnull. Sp. Tulip.* 1. —Ital.
- Marshalliana*, Andr. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 290 = *syvestris*.
- Martelliana*, *Lévier, in Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchât.* xiv. (1884) 245.—Europ.
- nauriana*, Jord. & Fourr. *IC. Fl. Eur.* i. 9 = *Didieri*.
- mauritiana*, Jord. in *Ann. Soc. Lyon, N. S.* (1858) 12 = *Didieri*.
- media*, Agardh, ex Schult. f. *Syst.* vii. 379 = *acuminata*.
- microgyna*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 292 = *Biebersteiniana*.
- Minervae*, Orph. ex Baker, l. c. 294 = *Orphanidea*.
- montana*, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1106.—Oriens.
- montana*, Rafin. *Atl. Journ.* 153 (Quid?).—Am. bor.
- neglecta*, Reboul, *Select. Sp. Tul.* 7 = *strangulata*.
- Oculus-solis*, Helder. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 286 = *boeotica*.
- Oculus-solis*, [Ker-Gawl.] *Bot. Reg.* t. 204 = *praecox*.
- Oculus-solis*, Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I. 707 = *Didieri*.
- Oculus-solis*, *St. Amans, in Rec. Soc. Agr. Agen.* i. 75.—Europ. austr.; Oriens.
- odoratissima*, Vis. *Ort. Bot. Padov.* 149 = *suaveolens*?
- orientalis*, *Lévier, in Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchât.* xiv. (1884) 263.—Europ. austr.; Reg. Cauc.
- ornithogaloides*, Fisch. ex Bess. in *Flora*, xvii. (1834) i. Beibl. 25 = *Lloydia triflora*.
- Orphanidea*, Boiss. ex Helder. in *Regel, Gartenfl.* (1862) 309. t. 373.—Graecia.
- Orphanidesii*, Helder. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 294, sphalm. = *praecox*.
- Ostrowskiana*, *Regel, Gartenfl.* (1884) 34.—Turkestan.
- oxypetala*, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) II. 81.—Tauria.
- Passeriniana*, *Lévier, in Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchât.* xiv. (1884) 270.—Europ.
- patens*, Agardh. ex Schult. f. *Syst.* vii. 384.—Sibir.
- persica*, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* iv. 226 = *patens*.
- planifolia*, Jord. in *Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.* v. (1858) 13 = *Didieri*.
- platystigma*, *Jord. in Billot, Annot.* 32.—Gallia.
- polychroma*, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, 1. (1885) 18.—Persia.
- praecox*, Cav. Desc. 448 = *Clusiana*.
- praecox*, *Tenore, Fl. Nap.* i. 170.—Europ. austr.; Syria.
- primulina*, Baker, in *Gard. Chron.* (1882) II. 8.—Alger.
- pubescens*, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 17.—Hab.?
- pudica*, Rafin. *Atl. Journ.* 153 (Quid?).—Am. bor.
- pulchella*, Boiss. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 284 = *montana*.
- pulchella*, *Fenzl, in Kotschy, Reise Cilicisch. Taurus*, 379.—Cilicia.
- pumila*, Moench, *Meth.* 301 = *syvestris*.
- pumila*, Tausch, in *Flora*, xii. (1829) i. Erg. 47 = *Biebersteiniana*.
- Raddii*, Reboul, *Nonnull. Sp. Tulip.* 5 = *praecox*.
- Regeli*, *Elwes.—Cf. Gard. Chron.* (1879) i. 397.—Hab.?
- repens*, Fisch. ex Sweet, *Brit. Flow. Gard. Ser.* II. t. 97 = *syvestris*.
- retroflexa*, *Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 282.—Hab.?
- rubroalba*, Brot. *Fl. Lusit.* i. 520 = *Clusiana*.
- saxatilis*, *Sieber, ex Spreng. Syst.* ii. 63.—Ins. Creta.
- scabriscapa*, *Strangw. in Bot. Reg.* t. 1990.—Ital.
- Schrenkii*, *Regel, Gartenfl.* (1873) 297; et in *Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 452 = *Gesneriana*.
- serotina*, *Reboul, Sel. Sp. Tulip.* 6.—Ital.
- sibirica*, Patrin, ex Kunth, *Enum. Pl.* iv. 226 = *patens*.
- Sibthorpiana*, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 229 = *Fritillaria Sibthorpiana*.
- syvestris*, Herb. Bout. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hsp.* i. 219 = *australis*.
- sogdiana*, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Péttersb.* vii. (1851) 514.—Turkestan.
- Sommierii*, *Lévier, Orig. Tul. Sav. Ital.* 15.—Europ.
- spathulata*, Bertol. *Fl. Ital.* iv. 85, 86 = *Gesneriana*.
- stellata*, *Hook. Bot. Mag.* t. 2762.—Reg. Himal.; Persia.
- stenopetala*, Delaun. ex Loisel. *Herb. Gén. Amat.* iii. t. 171 = *acuminata*.

TULIPA:—

- strangulata*, Helder. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 286 = *boeotica*.
- strangulata*, *Reboul, Nonnull. Sp. Tulip.* 6.—Etruria.
- strangwaysiana*, Reboul, ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 281 = *praecox*.
- stricta*, Stokes, *Bot. Mat. Med.* ii. 239 = *Gesneriana*.
- stylosa*, Fisch. ex Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iii. 28 = *uniflora*.
- suaveolens*, Roth, *Catalect. fasc.* i. 45.—Rossia austr.
- syvestris*, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 270 = *Biebersteiniana*.
- syvestris*, Falk, ex Kunth, *Enum. Pl.* iv. 226 = *altaica*.
- syvestris*, Gouan, ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 293 = *australis*.
- syvestris*, Laxm. ex Schult. f. *Syst.* vii. 384 = *patens*.
- syvestris*, *Linn. Sp. Pl.* 305.—Europ.
- systola*, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, 1. (1885) 17.—Persia.
- tetraphylla*, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 296.—Turkestan.
- thianschanica*, *Regel, l. c.* vi. (1879) 508.—As. centr.
- Thirkeana*, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 226 = *Biebersteiniana*.
- transtagana*, Brot. *Fl. Lusit.* i. 519 = *australis*.
- tricolor*, Becker, ex Nym. *Consp.* 723 = *Biebersteiniana*.
- tricolor*, C. Koch, in *Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 532 = *Biebersteiniana*.
- tricolor*, Ledeb. *IC. Pl. Fl. Ross.* ii. 13. t. 135 = *patens*.
- triphylla*, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 636.—Turkestan.
- turcarum*, *Lévier, in Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchât.* xiv. (1884) 271 = *suaveolens*.
- turcica*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 382 = *bithynica*.
- turcica*, Kunth, *Enum. Pl.* iv. 221 = *acuminata*.
- turcica*, Roth, *Catalect. fasc.* i. 45 = *syvestris*.
- turkestanica*, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 296.—Turkestan.
- undulata*, Jacquem. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 279 = *chrysanthia*.
- undulatifolia*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 57.—As. Min.
- unguiculata*, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 35 (Quid?).—Hab.?
- uniflora*, Bess. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 295.—Sibir.
- variopicta*, Reboul, *Select. Sp. Tulip.* 7 = *strangulata*.
- violacea*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 211.—Persia.
- volgensis*, Bieb. ex Eichw. *Casp.-Cauc.* 2 = *suaveolens*.
- wolgensis*, Auct. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 723 = *Celsiana*.
- TULIPASTRUM**, Spach, *Hist. Vég. Phan.* vii. 481 (1839) = **Magnolia**, Linn.
- americanum*, Spach, l. c. 483 = *M. acuminata*.
- TULIPIFERA**, Herm. ex Mill. *Gard. Dict.* ed. VI. (1752) = **Liriodendron**, Linn. (Magnol.).
- Liriodendrum*, Mill. l. c. ed. VIII. = *L. tulipifera*.
- TULISMA**, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 98 (1836) = **Gesneria**, Linn.
- verticillata*, Rafin. l. c. = *G. maculata*.
- TULLIA**, Leavenw. in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* xx. (1830) 343. t. 5 = **Pycnanthemum**, Michx. (Labi.).
- pycnanthemoides*, Leavenw. l. c. = *P. Tullia*.
- TULOCARPUS**, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 298. t. 63 (1841) = **Guardiola**, Cerv. (Compos.).
- mexicanus*, Hook. & Arn. l. c. 299. t. 63 = *G. Tulocarpus*.
- TULOCLINIA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 119 (1836) = **Metalsia**, R. Br. (Asclep.).
- imbricata*, Rafin. l. c. = *M. uniflora*.
- TULOPHOS**, Rafin. *Fl. Tellur.* iii. 71 (1836) = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
- grandiflora*, Rafin. l. c. = *B. Douglasii*.
- laxa*, Rafin. l. c. = *B. laxa*.
- TULORIMA**, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 69 (1836) = **Saxifraga**, Tourn.
- Cymbalaria*, Rafin. l. c. = *S. Cymbalaria*.

TULOTIS, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 37 (1836) = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

fuscescens, Rafin. l. c. = *H. herbiola*.

herbiola, Rafin. l. c. = *H. herbiola*.

TUMALIS, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 114 (1836) = **Euphorbia**, Linn.

Bojeri, Rafin. l. c. = *E. Bojeri*.

TUMBOA, Welw. cf. *Gard. Chron.* (1861) 75 = **Welwitschia**, Hook. f. (1862) (Gnetac.).

Bainesii, Hook. f. in *Gard. Chron.* (1861) 1008 = *W. mirabilis*.

strobilifera, Welw. l. c. (1862) 71 = *W. mirabilis*.

TUMELAIA, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 105 (1836) = **Daphne**, Tourn. (Thymel.).

TUNGA, Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, i. 187 (1820) = **Hypolytrum**, Rich. (Cyperac.).

diandra, Roxb. l. c. 188 = *H. latifolium*, Rich.

laevigata, Roxb. l. c. = *Lipocarpa argentea*.

triceps, Roxb. l. c. 187 = *Lipocarpa sphacelata*.

TUNICA, Hall. *Enum. Stirp. Helv.* i. 381 (1742); Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 298 (1772). **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 145.

DIANTHELLA, Clauson, ex Pomel, *Mat. Fl. Atl.* 9 (1860).

FIEDLERIA, Reichb. *Nom.* 206 (1841); *IC. Fl. Germ.* vi. t. 246 (1844).

KOHLRAUSCHIA, Kunth, *Fl. Berol.* i. 108 (1838).

arabica, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 62.—Arab.

arenaria, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 301 = *Dianthus monspessulanus*.

arenicola, Nym. *Consp.* 100 = *T. Saxifraga*.

artegioides, Auct. = *ortegioides*.

barbata, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 298 = *Dianthus barbatus*.

bicolor, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* i. 10 = *T. Saxifraga*.

brachypetala, Jaub. & Spach, *Illustr.* i. 10 = *pachygona*.

Carthusianorum, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 299 = *Dianthus Carthusianorum*.

Caryophyllus, Scop. l. c. 301 = *Dianthus Caryophyllus*.

ciliata, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 260 = *T. Saxifraga*.

compressa, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 50.—Afr. bor.

cretica, Fisch. & Mey. l. c. 49.—Ins. Creta.

dianthoides, Fisch. & Mey. l. c. 48.—Ins. Creta.

dianthoides, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 54 = *Silene dianthoides*.

erecta, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* i. 10 = *T. Saxifraga*.

Gasparrini, Nym. *Consp.* 100.—Sicil.

glumacea, Boiss. *Fl. Orient.* i. 517.—Dalmat.; Graecia.

graminea, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 60.—Graecia.

hispidula, Boiss. & Helder. l. c. 62.—As. Min.

illyrica, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 49.—Europ. austr.

Morrisii, Walp. *Ann.* ii. 101 = *Dianthus Morrisii*.

ochroleuca, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 49.—Graecia.

olympica, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 61.—As. Min.

Orfanidesiana, Clem. in *Mem. Acc. Sc. Torin.* Ser. II. xvi. (1857) 253 = *thessala*.

ortegioides, Fisch. & Mey. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. i. (1854) 36 (*artegioides*).—As. Min.

pachygona, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 50.—As. Min.; Persia.

pamphylica, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* vi. 27.—Pamphylic.

plumaria, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 300 = *Dianthus plumarius*.

prolifera, Scop. l. c. 299.—Europ.; Reg. Cauc.

rigida, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 54 = *Dianthus rigidus*?

rigida, Reichb. *IC. Fl. Germ.* v. 42 = *T. Saxifraga*.

Saxifraga, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 300.—Europ.; Reg. Cauc.

Sibthorpii, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 61.—Graecia.

stricta, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 50.—As. Min.; Persia; Sibir.

syriaca, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 63.—Syria.

thessala, Boiss. l. c.—Graecia.

velutina, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* vi. 66.—Europ. austr.; Reg. Cauc.

TUNICA:—

virginea, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 302 = *Dianthus virgineus*.
xerophila, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 10 = *T. Saxifraga*.
xylophila, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 246 = *Gypsophila ortegoides*.

TUPA, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 (1834) = **Lobelia**, Plum. (Campan.).
acuminata, A. DC. in DC. Prod. vii. 396 = *L. acuminata*.
arguta, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *Siphocampylus giganteus*.
assurgens, A. DC. in DC. Prod. vii. 394 = *L. assurgens*.
atropurpurea, Vis. in Nuov. Sagg. Padov. vi. (1847) 95 = *L. fulgens*?
Berterii, A. DC. in DC. Prod. vii. 392 = *L. serrata*.
Besseriana, A. DC. l. c. 393 = *L. polyphylla*.
blanda, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 308.—Chili.
bracteosa, A. DC. in DC. Prod. vii. 393 = *L. polyphylla*.
Bridgesii, A. DC. l. c. 394 = *L. Bridgesii*.
caudata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 386.—Ind. occ.
Cavanillesiana, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *L. mucronata*, Cav.
cirsifolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 395 = *L. cirsifolia*.
columnaris, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 725 = *L. columnaris*.
conglobata, A. DC. in DC. Prod. vii. 395 = *L. conglobata*.
coquimbana, Phil. ex Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 726 = *L. polyphylla*.
costaricana, Planch. & Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 154.—Costa Rica.
crassicaulis, Hook. Bot. Mag. t. 4505.—Hab.?
Deckenii, Aschers. in Bot. Zeit. xxvii. (1869) 71; Deeken, Reisen Ost-Afrika, iii. 74 = *L. Deckenii*.
digitalifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 387.—Ind. occ.
domingensis, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 728.—Ins. S. Doming.
ensifolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 396.—Ins. S. Doming.
Feuillei, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *L. Tupa*.
flavescens, A. DC. in DC. Prod. vii. 395 = *L. conglobata*.
hyssopifolia, A. DC. l. c. 392 = *L. hyssopifolia*.
ignescens, Payer, Organog. t. 149 = *L. fulgens*?
imberbis, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 516.—Ind. occ.
infesta, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 387.—Ind. occ.
Kerstenii, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 725 = *L. Deckenii*.
laxiflora, Planch. & Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 154 = *L. laxiflora*.
Martagon, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 386.—Ind. occ.
montana, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 506.—Chili.
montana, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 159.—Cuba.
mucronata, A. DC. in DC. Prod. vii. 392 = *L. mucronata*, Cav.
obovata, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *L. incana*.
ovata, G. Don, l. c.—Peruv.
ovata, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 507.—Chili.
persicaefolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 395 = *L. persicaefolia*.
polyphylla, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *L. polyphylla*.
portoricensis, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 727.—Porto Rico.
purpurea, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *L. purpurea*.
racemosa, A. DC. in DC. Prod. vii. 394 = *L. racemosa*, Sims.
Rhynchopetalum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 9 = *L. Rhynchopetalum*.
robusta, A. DC. in DC. Prod. vii. 294 = *L. robusta*.
salicifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *Siphocampylus giganteus*.
Schimperii, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 10 = *L. Gibberoa*.
secunda, G. Don, Gen. Syst. iii. 700 = *L. secunda*.
sonchifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 388 = *L. sonchifolia*.
stricta, A. DC. in DC. Prod. vii. 395 = *L. stricta*.
subdentata, A. DC. l. c. 393 = *L. polyphylla*.

VOL. II.

TUPEIA, Blume, Fl. Jav. Lanth. tt. 27, 28 (1830?) = **Henslowia**, Blume (Santal.).
microphylla, Chalon, in Mém. Soc. Hainaut, Sér. III. v. (1870) 324 = *Lepidoceras Kingii*.
myrtifolia, Chalon, l. c. = *Loranthus myrtifolius*.
racemosa, Korth. in Bull. Néerl. (1838) 157 = *H. Reinwardtiana*.
Reinwardtiana, Blume, Fl. Jav. Lanth. t. 28; et ex Korth. in Verh. Batav. Gen. xvii. (1839) 195 = *H. Reinwardtiana*.
squamifera, Chalon, in Mém. Soc. Hainaut, Sér. III. v. (1870) 324 = *Lepidoceras squamifer*.
umbellata, Blume, Fl. Jav. Lanth. t. 27; et ex Korth. in Verh. Batav. Gen. xvii. (1839) 195 = *H. umbellata*.

TUPEIA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 203. **LORANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 216.
antarctica, Cham. & Schlecht. l. c.—N. Zel.
Cunninghami, Miq. l. c. xviii. (1844) 85 = *antarctica*.
pubigera, Miq. l. c. 86 = *antarctica*.
undulata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 329 = *antarctica*.

TUPELO, Adans. Fam. ii. 80 (1763) = **Nyssa**, Gronov. (Cornac.).

TUPIDANTHUS, Hook. f. & Thoms. in Hook. Bot. Mag. t. 4908 (1856). **ARALIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 947.
calyptatus, Hook. f. & Thoms. in Hook. Bot. Mag. t. 4908.—Reg. Himal.
Pueckleri, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 348, cum f.—Java.

TUPISTRA, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1655 (1814). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 772.
CAMPYLANDRA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 582, t. 20.
MACROSTIGMA, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 12.—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 220; Enum. Pl. v. 319 (1850).
PLATYMETRA, Noronha, ex Salisb. Gen. Pl. Fragm. 9 (1866).
TILICUSTA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 15 (1836).
aurantiaca, Wall. Cat. n. 5194.—Reg. Himal.
Macrostigma, Baker, in Hook. Bot. Mag. t. 6280.—Reg. Himal.
nutans, Wall. in Bot. Reg. t. 1223.—Reg. Himal.
singaporeana, Wall. Cat. n. 5195.—Singapore.
squalida, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 580, partim = *T. Macrostigma*.
squalida, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1655.—Ins. Amboina.
Stoliczana, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 199.—Burma.

TURARIA, Spreng. Syst. ii. 260 (1825) = **Thuraria**, Molina (Inc. Sed.).

TURBINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 81 (1836) = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
corymbosa, Rafin. l. c. = *I. Burmanni*.

TURBITH, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 343 = **Athamanta**, Linn. (Umbell.).
annua, Tausch, l. c. = *A. cretensis*.
Matthioli, Tausch, l. c. = *A. Matthioli*.

TURCZANINOVIA, DC. Prod. v. 257 (1836) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
fastigiata, DC. l. c.; Coll. Mém. ix. 20. t. 4 = *A. fastigiatus*.

TURETTA, Vell. Fl. Flum. 233 (1825) (Quid?).
racemosa, Vell. l. c. 234; v. t. 115.—Bras.

TURGENIA, Hoffm. Gen. Umbell. 59 (1814) = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).
brachyacantha, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 52 = *C. latifolia*.
foeniculacea, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 18.—As. Min.; Persia.
heterocarpa, DC. Prod. iv. 218.—Persia.
latifolia, Hoffm. Gen. Umbell. 59 = *C. latifolia*.
multiflora, DC. Prod. iv. 218 = *C. latifolia*.
tuberculata, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 52 = *C. latifolia*.

TURGENIOPSIS, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 53 = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).
foeniculacea, Boiss. l. c.—Syria.

TURGOSEA, Haw. Rev. Pl. Succ. 14 (1821) = **Crassula**, Dill.
aloides, Haw. l. c. 16 = *C. alooides*.
capitella, Haw. l. c. 17 = *C. capitella*.
linguaeifolia, Haw. l. c. 14 = *C. linguaeifolia*.
obovata, Haw. l. c. 16 = *C. obovata*.
pertusa, Haw. l. c. 14 = *C. pertusa*.
thyrsiflora, Haw. l. c. 17 = *C. thyrsiflora*.
tomentosa, Haw. l. c. 14 = *C. tomentosa*.
turrita, Haw. l. c. 17 = *C. turrita*.

TURIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 165 (1775) = **Luffa**, Tourn. (Cucurb.).
cordata, J. F. Gmel. Syst. 403 = *L. aegyptiaca*.
cylindrica, J. F. Gmel. l. c. = *L. aegyptiaca*.
Gijef, Forsk. Aegypt. Arab. 166 = *Coralocarpus Gijef*.
Lelaja, Forsk. l. c. 165 (Quid?).—Arab.
Moghadd, Forsk. l. c. 166 = *Coccinia Moimoi*.
sativa, Forsk. l. c. p. cxxi. = *L. aegyptiaca*.

TURNERA, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 87 (1737). **TURNERACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 806.
BOHADSCHIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 98. t. 68 (1831).
PUMILEA, P. Br. Hist. Jamaica. 188 (1756).
TRIACIS, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) (Pl. Wright. Cub.) 189.

TRIBOLACIS, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 297 (1860).
acaulis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 114.—Cuba.
acuta, Spreng. Syst. i. 940 = *ulmifolia*.
acuta, Willd. ex Schult. Syst. vi. 678.—Bras.
alba, Liebm. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 318 = *ulmifolia*.
albicans, Urban, in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 135.—Bras.
angustifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *ulmifolia*.
annularis, Urban, in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 124.—Bras.
aphrodisiaca, L. F. Ward, Virgin. Med. Monthly (April 1876), 49; ex Journ. Bot. xviii. (1880) 20 = *diffusa*.
apifera, DC. Prod. iii. 346, sphalm. = *opifera*.
arcuata, Urban, in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 146.—Bras.
arenaria, Spruce, ex Urban, l. c. 115 = *melochioides*.
aspera, Poir. Encyc. viii. 144 = *Piriqueta villosa*.
aturensis, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1008 = *Piriqueta villosa*.
aurantiaca, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 116.—Guian.
aurea, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 226 = *Piriqueta aurea*.
Benthamiana, Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1166 = *velutina*.
Berneriana, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ix. (1868) 322 = *Piriqueta Berneriana*.
betonicaefolia, Salisb. Prod. 174 = *Piriqueta villosa*.
Blanchetiana, Urban, in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 130.—Bras.
brasiliensis, Willd. ex Schult. Syst. vi. 678.—Bras.
callosa, Urban, in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 105.—Mexic.
ealyptocarpa, Urban, l. c. 128.—Bras.
capensis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 599 = *Piriqueta capensis*.
capitata, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 215.—Bras.
caroliniana, S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 391 = *Piriqueta fulva*.
carpinifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 125 = *acuta*.
cearensis, Urban, in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 100.—Bras.
chamaedrifolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 221.—Bras.
Chamaedrys, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1166, nomen = *ulmifolia*.
cistoides, Baill. Hist. Pl. iv. 287 = *ulmifolia*.
cistoides, Linn. Sp. Pl. ed. II. 387 = *Piriqueta villosa*.
cistoides, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 206 = *Piriqueta fulva*.
Clausseniana, Urban, in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 89.—Bras.
coerulea, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. iii. 346 = *ulmifolia*.
corchorifolia, Willd. ex Schult. Syst. vi. 678 = *odorata*.

7 F

TURNERA :—

- corchoroides*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1166, nomen = *ulmifolia*.
coriacea, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 144.—Bras.
cuneifolia, Juss. ex Urban, l. c. 139 = seq.
cuneiformis, Juss. ex Poir. Encyc. viii. 142 = *ulmifolia*.
curassavica, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 118.—N. Granat.
decipiens, Baill. Adansonia, x. (1872) 246 = *dichotoma*.
Desvauxii, DC. Prod. iii. 348 = *hirta*.
dichotoma, Gardn. ex Hook. Ic. Pl. t. 522.—Bras.
diffusa, Willd. ex Schult. Syst. vi. 679.—Bras.
dolichostigma, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 106.—Bras.
Duariteana, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 223 = *Piriqueta Duarteana*.
elegans, [Otto, ex] Nees, Hor. Phys. Berol. 36 = *ulmifolia*.
elliptica, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 107.—Bras.
frutescens, Aubl. Pl. Gui. i. 290. t. 113. f. 2 = *rupestris*.
frutescens, Mill. ex Steud. Nom. ed. I. 858 = *ulmifolia*.
genistoides, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 220. t. 121.—Bras.
glabra, DC. Prod. iii. 347 = *Piriqueta fulva*.
Glaziovii, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 93.—Bras.
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 291. t. 114.—Guian.
hebetepala, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 127.—Bras.
helianthemoides, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 224 = *Piriqueta villosa*.
hermannioides, Cambess. l. c. 218.—Bras.
hexandra, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 124 = *odorata*.
Hilaireana, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 108 = *lanceolata*.
Hindsiana, Benth. Bot. Voy. Sulph. 101.—Ecuador.
Hindsiana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 474 = *panamensis*.
hirsuta, Bert. ex DC. Prod. iii. 347 = *Piriqueta villosa*.
hirsutissima, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 55 = *T. Pumilea*.
hirta, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 33.—Guian.
hirta, Willd. ex Schult. Syst. vi. 678 = *Piriqueta villosa*.
Humboldtii, Spreng. Syst. i. 941 = *guianensis*.
humifusa, Endl. ex Walp. Rep. ii. 230 = *diffusa*.
incana, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 217.—Bras.
integrifolia, Willd. ex Schult. Syst. vi. 679 = *Piriqueta fulva*.
lamiifolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 213.—Bras.
lanceolata, Cambess. l. c. 214.—Bras.
longiflora, Cambess. l. c. 216.—Bras.
longipes, Triana, ex Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 99.—Venezuela.
lucida, Urban, l. c. 137.—Bras.
lutescens, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 217 = *opifera*.
macrophylla, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 95.—Bras.
Melochia, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvii. (1873) 187.—N. Granat.
melochioides, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 219.—Bras.
microphylla, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 33 = *diffusa*.
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 126 = *ulmifolia*.
nana, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 219.—Bras.
nervosa, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 108.—Paraguay.
oblongifolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 215 = *lanceolata*.
obtusifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 3 = *ulmifolia*.
odorata, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 107.—Guian.
odorata, Vahl, ex DC. Prod. iii. 346 = *ulmifolia*.
opifera, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 115 = *ulmifolia*.
opifera, Mart. Reise Bras. i. 552.—Bras.
ovata, Bello & Espinosa, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 275 = *Piriqueta ovata*.

TURNERA :—

- panamensis*, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 92.—Panama.
paniculata, Willd. in Schult. Syst. vi. 678 = *Melochia graminifolia*.
parviflora, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 116 = *odorata*.
pernambucensis, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 133.—Bras.
peruviana, Willd. ex Schult. Syst. vi. 679 = *ulmifolia*.
pinifolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 220.—Bras.
pinnatifida, Juss. ex Poir. Encyc. viii. 144 = *sidoides*.
Pohlana, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 104.—Bras.
procumbens, Gardn. ex Hook. Ic. Pl. sub t. 522 = *genistoides*.
pumila, Hill, Veg. Syst. xiv. 6, sphalm. = seq.
Pumilea, Linn. Syst. ed. X. 965.—Am. trop.
Pumilea, Poir. Encyc. viii. 143 = *diffusa*.
racemosa, Jacq. Hort. Vindob. iii. 49 = *Piriqueta racemosa*.
ramosissima, Spruce, ex Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 116 = *melochioides*.
refracta, Klotzsch, in Schomb. Fann. Fl. Brit. Gui. 1166, nomen = *ulmifolia*.
Riedelliana, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 110.—Bras.
rosea, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 225 = *Piriqueta rosea*.
rugosa, Willd. Sp. Pl. i. 1504 = *Piriqueta villosa*.
rupestris, Aubl. Pl. Gui. i. 289. t. 113. f. 1.—Guian.
salicifolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 227 = *serrata*.
salicifolia, Seem. Bot. Voy. Herald, 130 = *panamensis*.
Schomburgkiana, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 132.—Guian.
sedoides, DC. Prod. iii. 347 = *sidoides*.
sericea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 127 = *ulmifolia*.
serrata, Vell. Fl. Flum. 128; iii. t. 108.—Bras.
setosa, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 6 = *sidoides*.
sidaefolia, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 227 = *Piriqueta sidifolia*.
sidoides, Linn. Mant. i. 58.—Bras.
sidoides, Vell. Fl. Flum. 127; iii. t. 107 (Quid ?).—Bras.
stachydifolia, Urban & Rolfe, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 122.—Bras.
stipularis, Urban, l. c. 131.—Bras.
subglabra, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 984, nomen = *aurantiaca*.
subulata, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 2 = *ulmifolia*.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 748 = *ulmifolia*.
tomentosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 125 = *odorata*.
tomentosa, Willd. ex Schult. Syst. vi. 678 = *Piriqueta villosa*.
tomentosa, Wood, Am. Bot. & Flor. 129 = *Piriqueta fulva*.
trigona, Urban, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 111.—Bras.
trioniflora, Sims, Bot. Mag. t. 2106 = *ulmifolia*.
ulmifolia, Linn. Sp. Pl. 271.—Am. trop.
velutina, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 116.—Guian.
velutina, Presl, Rel. Haenk. ii. 44 = *ulmifolia*.
villosa, Raeusch. Nom. ed. III. 86 = *Piriqueta villosa*.
virgata, Willd. ex Schult. Syst. vi. 678 = *ulmifolia*.
viscosa, Sauvalle, Fl. Cub. 55 = *Piriqueta viscosa*.
Weddelliana, Urban & Rolfe, in *Eichl. Jahrb. Berl.* ii. (1883) 90.—Paraguay.
xanthotricha, Shuttlew. ex Urban, l. c. 71 = *Piriqueta fulva*.
xanthotricha, Shuttlew. ex Urban, l. c. = *praec.*

TURPINIA, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 113. t. 33 (1808) = **Barnadesia**, Mntis (Compos.).
laurifolia, Humb. & Bonpl. l. c. (= *Fulcaldea laurifolia*).—Peruv.

TURPINIA, Lex. in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 24 (1824) = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
tomentosa, Lex. l. c. = **V. Monosis**.

TURPINIA, Pers. Syn. ii. 314 (1807) = **Poiretia**, Vent. (Legnmin.).
montevidensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 293 = **P. psoraloides**.
punctata, Pers. Syn. ii. 314 = **P. punctata**.

TURPINIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = **Rhus**, Tourn. (Anacard.).
aromatica, Rafin. ex Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 170 = **R. aromatica**.
glabra, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = **R. glabra**.
pubescens, Rafin. l. c. = **R. pubescens** ?
suaveolens, Rafin. l. c. = **R. aromatica**.

TURPINIA, Vent. Choix, 31. t. 31 (1803). **SAPIN-DACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 413.

DALRYMPLEA, Roxb. Hort. Beng. 17 (1814); Pl. Corom. iii. 76. t. 279 (1819).

EYREA, Champ. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 331.

LACEPEDEA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 142. t. 144 (1821).

OCHRANTHE, Lindl. Bot. Reg. t. 1819 (1836).

TRICERIA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 803 (1819).

arguta, Seem. Bot. Voy. Herald, 371.—China.

corymbosa, G. Don, Gen. Syst. ii. 3 = *occidentalis*.

glandulosa, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 250.—Porto Rico.

insignis, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vii. (1847) 296.—Mexic.

latifolia, Wall. Cat. n. 4939 = *pomifera*.

martabanica, Wall. Cat. n. 4278 = *pomifera*.

megaphylla, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 361.—N. Granat.

microcarpa, Wight & Arn. Prod. 156 = *pomifera*.

montana, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 182 = *pomifera*.

nepalensis, Wall. Cat. n. 4277 = *pomifera*.

occidentalis, G. Don, Gen. Syst. ii. 3.—Ind. occ.

paniculata, Vent. Choix, 31.—Ind. occ.; Mexic.

pinnata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 216.—Mexic.

pomifera, DC. Prod. ii. 3.—As. trop.

Schiedeana, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vii. (1847) 296.—Mexic.

sphaerocarpa, Hassk. in Flora, xxv. (1842) 11. Beibl. 42.—Java.

TURPITHUM, Rafin. Fl. Tellur. iv. 71 (1836) =

Ipomoea, Linn. (Convolv.).

australe, Rafin. l. c. = **I. Turpethum**.

indicum, Rafin. l. c. = **I. Turpethum**.

TURRAEA, Linn. Mant. ii. 150 (1771). **MELIA-**

CEAE, Benth. & Hook. f. i. 331.

RUTAEA, M. Roem. Syn. Hesper. 93 (1846).

SCYPHOSIGMA, M. Roem. l. c. 80 (1846).

STEPHANOSIPHON, Boiss. ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 446 (1878).

abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 29.

—Abyss.

alata, Wight & Arn. Prod. 117; Wight, Ic. t. 90 =

Naregamia alata.

americana, Vell. Fl. Flum. 175; iv. t. 100.—Bras.

Billardieri, Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 218

= *pubescens*.

Boivini, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 253.—

Madag.

Brownii, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 442.—

Austral.

concinna, Benn. Pl. Fav. Rar. i. 182.—Java.

decandra, Blanco, Fl. Philipp. ed. I. 347 = *Dysoxylum*

Blancoi.

floribunda, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 297.—

Afr. austr.

Fockei, Buchen. in Bremen, Abh. vii. (1880) 14.—

Madag.

glabra, Cav. Diss. vii. 360 = *maculata*.

graciliflora, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 217 =

heterophylla.

herbacea, Poir. Encyc. viii. 147 = *Schwenkia brasili-*

ensis.

heterophylla, Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 245 = *flori-*

bunda.

heterophylla, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 6.—Afr.

trop.

TURRAEA :—

- Hildebrandtii, *O. Hoffm. Sert. Pl. Madag.* 10.—Madag. indica, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 439.—Ind. or.
 Kindtii, *Buchen. in Bremen, Abh.* vii. (1880) 15.—Madag.
lanceolata, Cav. Diss. vii. 361. t. 205. f. 1 = *Quivisia lanceolata*.
lobata, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 61 = heterophylla.
maculata, *Sm. Ic. Ined.* t. 11.—Madag.
mombassana, *Hiern, ex C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 439.—Afr. trop.
nilotica, *Kotschy & Peyr. Pl. Tinn.* 12. t. 6.—Afr. trop.
obtusifolia, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 296 (err. typ. 962).—Afr. austr.
octandra, *Blanco, Fl. Philipp.* ed. I. 349.—Ins. Philipp.
Pervillii, *Baill. Adansonia*, xi. (1873-76) 252.—Afr. trop.
pinnata, *Span. in Linnaea*, xv. (1841) 183.—Ins. Timor.
pinnata, Wall. Pl. As. Rar. ii. 21. t. 119 = *Munronia Wallichii*.
procera, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 444.—Afr. trop.
producta, *Baill. Adansonia*, xi. (1873-76) 254.—Madag.
propinqua, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 254 = *Vogelii*.
pubescens, Benth. Fl. Austral. i. 379 = *Brownii*.
pubescens, *Hellen. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* ix. (1788) 308. t. 10. f. 1.—China.
pumila, *Benn. Pl. Jav. Rar.* i. 183.—Java.
quercifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 678 = heterophylla.
Richardi, *Baill. Adansonia*, xi. (1873-76) 252.—Madag.
rigida, Vent. Choix, 48 = *Quivisia chilosantha*.
sericea, *Sm. Ic. Ined.* t. 12.—Madag.
sericea, Steud. Nom. ed. I. 859; ed. II. ii. 725 = *Quivisia chilosantha*.
tetramera, *Benn. Pl. Jav. Rar.* 184 = *Quivisia tetramera*.
tomentosa, Cav. Diss. vii. 361. t. 205 = *sericea*.
tricaraeopsis, *Baill. Adansonia*, xi. (1873-76) 252.—Afr. trop.
trichostylis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 502 = *Leptonychia glabra*.
villosa, *Benn. Pl. Jav. Rar.* i. 182.—Java.
virens, *Blanco, Fl. Philipp.* ed. II. 243 = *Dysoxylum Blancoi*.
virens, *Hellen. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* ix. (1788) 308. t. 10. f. 1 = *Atalantia monophylla*.
virens, *Linn. Mant.* ii. 237 (err. typ. 732).—Ind. or.
Vogelii, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 253.—Afr. trop.
Wakefieldii, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 1489.—Afr. trop.
Zollingeri, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 441.—Java.

TURRAEANTHUS, *Baill. Adansonia*, xi. (1874) 261. **MELIACEAE**.
longipes, *Baill. l. c.* 262.—Afr. trop.
Mannii, *Baill. l. c.* 261.—Afr. trop.

TURRETIA, DC. Prod. ix. 236 (1845) = seq.

TURRETTIA, Poir. Encyc. vii. 719 (1806) = **Tourretia**, Foug. (Bignon.).

TURRIGERA, Decne. in DC. Prod. viii. 590 (1844). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 751.
halophila, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 232.—Reg. Argent.
inconspicua, *Decne. in DC. Prod.* viii. 590.—Bras.

TURRITA, Wallr. Sched. Crit. 351, in nota (1822) = **Arabis**, Linn. (Crucif.).
major, Wallr. l. c. 352 = *A. Turrita*.
pendula, Wallr. l. c. = *A. pendula*.

TURRITIS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = **Arabis**, Linn. (Crucif.).
accedens, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 333 = *A. hirsuta*.
alpestris, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 36 = *A. ciliata*.

TURRITIS :—

- alpina*, Braune, Salisb. Fl. ii. t. 2 = *Arabis bellidifolia*, *pumila*.
alpina, Linn. Syst. ed. XII. 443 = *A. hirsuta*.
arenosa, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 387 = *A. arenosa*.
arvensis, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 108 = *Moricandia arvensis*.
auriculata, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 332 = *A. auriculata*.
bellidifolia, All. Fl. Pedem. i. 270 = *A. bellidifolia*.
brachycarpa, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 79 = *A. Drummondii*.
Brassica, Leers, Fl. Herborn. 147 = *A. brassicaeformis*.
Breutelii, Reichb. ex Lange, Consp. Fl. Groenl. i. 50 = *A. Breutelii*.
caerulea, All. Fl. Pedem. i. 270 = *A. caerulea*.
cenisia, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 333 = *A. alpestris*.
ciliata, Hoepf. Mag. Naturk. Helv. iv. (1789) 29, 38 = *A. ciliata*.
ciliata, Tausch, in Flora, xix. (1836) 407 = *A. hirsuta*.
collisparva, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 333 = *A. hirsuta*.
curtisiliqua, Fries, ex DC. Syst. ii. 223 = *A. hirsuta*.
diffusa, Hook. Fl. Bor. Am. i. 41 = *Sisymbrium salsugineum*.
Dregeana, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 2 = *A. perfoliata*.
elongata, Raesch. Nom. ed. III. 189 = *A. Turrita*.
enneaphyllos, Scop. ex Steud. Nom. ed. I. 268, 859 = *Cardamine enneaphylla*.
falcata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 63.—Sibir.
Gerardi, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 87 = *A. Gerardi*.
Gerardi, Presl, ex Nym. Consp. 33 = *A. hirsuta*.
Gerardiana, Ram. ex DC. Syst. ii. 222 = *A. hirsuta*.
glabra, Linn. Sp. Pl. 666 = *A. perfoliata*.
Grahamii, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1831) 7.—Cf. Linnaea, vi. (1831) Litt. 74 = *A. Holboellii*.
hirsuta, Brot. ex Nym. Consp. 33 = *A. lusitanica*.
hirsuta, Linn. Sp. Pl. 666 = *A. hirsuta*.
hirtella, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 333 = *A. hirsuta*.
hispidula, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 35, sphalm. = *Sisymbrium hispidulum*.
hispidula, DC. Syst. ii. 213 = *Sisymbrium hispidulum*.
humilis, Schleich. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 40 = *A. muralis*.
idanensis, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 333 = *A. hirsuta*.
laevigata, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 543 = *A. laevigata*.
lasiophylla, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 321 = *Sisymbrium reflexum*.
Loeselii, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 109 = *Sisymbrium Loeselii*.
lyrata, Rafin. in Am. Monthly Mag. ii. (1817) 44 = *A. canadensis*.
macrocarpa, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 78 = *A. perfoliata*.
minor, Schleich. ex Willd. Ennm. Hort. Berol. 685 = *A. incana*, *muralis*.
mollis, Hook. Fl. Bor. Am. i. 40 = *A. Holboellii*?
mollissima, Hoepf. Mag. Naturk. Helv. iv. (1789) 29, 38 = *A. saxatilis*.
multiflora, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 386 = *A. hirsuta*.
muralis, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 333 = *A. muralis*.
nemorensis, Wolf. in Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 58 = *A. hirsuta*.
oblongata, Rafin. in Am. Monthly Mag. ii. (1817) 44 = *A. hirsuta*.
ochroleuca, Lam. Fl. Fr. ii. 490 = *A. Turrita*.
ovata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 438 = *A. hirsuta*.
patula, Ehrh. Beitr. vii. (1792) 159 = *A. auriculata*.
patula, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (July-Oct. 1829) 350 = *A. Holboellii*.
pauciflora, Grimm, in Nov. Act. Nat. Cur. iii. (1767) App. 348 = *A. brassicaeformis*.
pendula, Desf. Tabl. ed. II. 152 = *A. Turrita*.
perfoliata, Neck. Delic. Gallo-Belg. 283 = *A. perfoliata*.
planisiliqua, Pers. Syn. ii. 205 = *A. hirsuta*.
praecox, Sm. in Rees, Cycl. xxxvi. n. 5 = *A. hirsuta*.
procera, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 332 = *A. Gerardi*.
propera, Fourn. l. c. 333 = *A. hirsuta*.

TURRITIS :—

- pubescens*, Desf. Fl. Atlant. ii. 92 = *Arabis pubescens*.
pubigera, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 333 = *A. Gerardi*.
purpurea, Lam. Fl. Fr. ii. 491 = *A. verna*.
Raii, Vill. Prosp. 39; Hist. Pl. Dauph. iii. 326. t. 38 = *A. stricta*.
Raji, J. & C. Presl, Fl. Čech. 140 = *A. hirsuta*.
recta, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iv. 744 (Index) = *A. auriculata*.
retrofracta, Hook. Fl. Bor. Am. i. 41 = *A. Holboellii*.
rigida, Wall. Cat. n. 4783 = *A. perfoliata*.
rigidula, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 332 = *A. Gerardi*.
rupestris, Hoppe, ex Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. 358; et ex Braune, in Flora, ii. (1819) 566 = *A. ciliata*.
sagittata, Bertol. Pl. Genuens. 185 = *A. Gerardi*.
sagittata, Jahn, ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 99 = *A. brassicaeformis*.
salsuginosa, DC. Syst. ii. 212 = *Sisymbrium salsugineum*.
sanguinea, Claus, in Beitr. Pf. Russ. Reich. viii. 57.—Rossia.
saxatilis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 495 = *A. saxatilis*?
serpyllifolia, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 332 = *A. serpyllifolia*.
setosa, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 93 = *Diplo-taxis setosa*.
spathulata, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 78 = *A. Drummondii*?
stenopetala, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 46 = *A. hirsuta*.
stricta, All. Auct. Fl. Pedem. 18 = *A. Allionii*.
stricta, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 332 = *A. stricta*.
stricta, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (July-Oct. 1829) 350 = *A. Drummondii*.
stricta, Host, Fl. Austr. ii. 268 = *A. perfoliata*.
verna, Lam. Fl. Fr. ii. 490 = *A. alpina*.

TURSENIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxvii. 480 (1825) = **Baccharis**, Linn. (Compos.).
humifusa, Cass. l. c. = *B. humifusa*.
sinuata, Cass. l. c. = *B. sinuata*.

TUSSACA, Rafin. Préc. Découv. 42 (1814); et in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 261 = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).
reticulata, Rafin. Préc. Découv. 43 = *G. pubescens*.
secunda, Rafin. l. c. = *G. repens*.

TUSSACIA, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 99 (1857) = **Catopsis**, Griseb. (Bromel.).
apicroides, Beer, l. c. = Mexico.
fulgens, Klotzsch, ex Beer, l. c. 100 = *Tillandsia aurantiaca*.
nitida, Beer, l. c. = *C. nitida*.
sessiliflora, Beer, l. c. 101.—Peruv.
vitellina, Klotzsch, ex Beer, l. c. 99.—Venezuela.

TUSSACIA, Reichb. Ic. Exot. i. 28. t. 41 (1827) (*Tussaca*); et in Moessl. Handb. i. p. xxxvii (1827). **GESNERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1006.
CHRYSOthemis, Decne. in Rev. Hort. Sér. III. iii. (1849) 242.
Friedrichsthaliana, *Hanst. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 337.—Guatemala.
pulchella, *Reichb. Ic. Bot.* i. 28. t. 41; *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 113.—Panama.
rupestris, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 363.—Guian.
sanguinea, *Heynh. Nom.* ii. 747.—Am. austr.
semi-clausa, *Hanst. ex André, in Illustr. Hort.* xvii. (1870) 140. t. 28.—Bras.
villosa, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 363.—Guian.

TUSSACIA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. vii. p. x (1829) (Quid?).
elegans, Willd. l. c. 57.—Am. austr.

TUSSILAGO, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Linn. Gen. ed. I. 252 (1737), partim. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 438.
FARFARA, Gilib. Fl. Lituan. i. 177 (1781).
alba, Linn. Sp. Pl. 866 = *Petasites albus*.

TUSSILAGO :—

- albicans*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 113 = *Chaptalia albicans*.
alpestris, Hegetschw. Fl. Schw. 842 = *Homogyne alpina*?
alpina, Georgi, Reise, i. 230 = *Gerbera Anandria*.
alpina, Linn. Sp. Pl. 865 = *Homogyne alpina*.
alpina, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 156 = *Homogyne discolor*.
Anandria, Linn. Sp. Pl. 865 = *Gerbera Anandria*.
androgyna, Gilib. Fl. Lituan. i. 176 = *Petasites officinalis*.
aquatica, Georgi, Reise, i. 230 = *Petasites laevigatus*.
Bellidiastrum, Linn. Hort. Upsal. 259. t. 3. f. 2 = *Gerbera Anandria*.
bicolor, Herb. Willd. ex DC. Prod. vii. 44 = *Chaptalia runcinata*.
bifolia, Lavy, Vég. Orig. 13; ex DC. Prod. vii. 208 (Quid?).—Hab.?
bohémica, Hoppe, Taschenb. (1803) 60; ex DC. Prod. v. 205 = *Petasites laevigatus*.
Cacalia, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 156 = *Adenostyles viridis*.
caryophyllata, Vell. Fl. Flum. viii. t. 142 (Quid?).—Bras.
corymbosa, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 269 = *Petasites frigidus*.
dentata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1213 = *Chaptalia dentata*.
discolor, Jacq. Fl. Austr. iii. 27 = *Homogyne discolor*.
elongata, Salisb. Prod. 196 = *Petasites officinalis*.
exscapa, Pers. Syn. ii. 456 = *Chaptalia exscapa*.
Farfara, Linn. Sp. Pl. 865.—Europ.; As. bor. occ.; Ind. or.
fragrans, Vill. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 72 = *Petasites fragrans*.
frigida, Linn. Sp. Pl. 865 = *Petasites frigidus*.
frigida, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 175; Suter, Fl. Helv. ii. 180 = *Petasites niveus*.
glabrescens, Steud. Nom. ed. I. 859 = *Petasites albus*.
Gmelini, Turcz. ex DC. Prod. vii. 271 = *Gerbera Anandria*.
hastifolia, Kit. in Linnaea, xxxii. (1883) 372 = *Petasites niveus*?
hermaphrodita, Gilib. Fl. Lituan. i. 175 = *Petasites officinalis*.
hybrida, Linn. Sp. Pl. 866 = *Petasites officinalis*.
integerrima, Vell. Fl. Flum. viii. t. 140 (Quid?).—Bras.
integrifolia, Michx. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1964 = *Chaptalia tomentosa*.
intermedia, Hinterhuber, ex Trachsel, in Flora, xii. (1829) 32 = *Petasites officinalis*.
japonica, Linn. Mant. i. 113 = *Senecio Kaempferi*.
Kablikianus, Opiz, Seznam, 73, in syn. = *Petasites officinalis*.
laevigata, Willd. Sp. Pl. iii. 1969 = *Petasites laevigatus*.
lobata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 726 = *Petasites palmatus*.
lutea, J. F. Gmel. Syst. 1225 = *Petasites albus*.
lyrata, Pers. Syn. ii. 456 = *Chaptalia nutans*.
lyrata, Willd. Sp. Pl. iii. 1963 = *Gerbera Anandria*.
macrophylla, Wall. Cat. n. 2989 = *Gerbera macrophylla*.
micrantha, Andr. Rys Botan. ii. (1830) 27 (Quid?).—Rossia.
nana, J. F. Gmel. Syst. 1224 = *Gerbera Anandria*.
nivea, Vill. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 73 = *Petasites niveus*.
nutans, Linn. Syst. ed. X. 1214 = *Chaptalia nutans*.
oblongifolia, Bertol. Misc. Bot. vi. 28.—Am. bor.
odorata, Vill. ex DC. Prod. v. 208 = *Adenostyles viridis*.
palmata, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 188 = *Petasites palmatus*.
paradoxa, Retz. Obs. ii. 24 = *Petasites niveus*.
paradoxa, Roth, ex Steud. Nom. ed. I. 860 = *Petasites spurius*.
patens, Vell. Fl. Flum. viii. t. 144 (Quid?).—Bras.
Petasites, Linn. Sp. Pl. 866 = *Petasites japonicus*.
piloselloides, Pers. Syn. ii. 456 = *Chaptalia piloselloides*.
pumila, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 113 = *Chaptalia sinuata*.
racemosa, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 251 = *Petasites fragrans*.
radiata, Gilib. Fl. Lituan. iii. 177 = *T. Farfara*.
radiata, J. F. Gmel. Syst. 1226 = *Petasites laevigatus*.

TUSSILAGO :—

- ramosa*, Hoppe, in Flora, x. (1827) 649 = *Petasites albus*.
reflexa, Vell. Fl. Flum. viii. t. 141 (Quid?).—Bras.
rheifolia, Warsz. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 293 (Quid?).—Bolivia.
riparia, Salisb. Prod. 196 = *Petasites officinalis*.
rubella, J. F. Gmel. Syst. 1225 (Quid?).—Sibir.
rubra, Link, in Buch. Besch. Canar. Ins. 149, 176 = *Senecio cruentus*, DC.
ruderalis, Salisb. Prod. 195 = *T. Farfara*.
rupestris, Wall. Cat. n. 2990 = *T. Farfara*.
sagittata, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 531 = *Petasites sagittatus*.
sarmentosa, Pers. Syn. ii. 456 = *Chevreulia stolonifera*.
saxatilis, Tarcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xix. (1846) 138 = *Petasites frigidus*?
sibirica, J. F. Gmel. Syst. 1225 = *Gerbera Anandria*.
sinuata, Pers. Syn. ii. 456 = *Chaptalia sinuata*.
spuria, Retz. Obs. i. 29. t. 2 = *Petasites spurius*.
spuria, Schrank, ex Steud. Nom. ed. I. 860 = *Petasites niveus*.
suaveolens, Desf. Tabl. ed. I. 97 = *Petasites fragrans*.
sylvestris, Jacq. Fl. Austr. v. App. t. 12 = *Homogyne sylvestris*.
tomentosa, Ehrh. Beitr. iii. 65 = *Petasites spurius*.
trifurcata, Forst. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) 39 = *Senecio trifurcatus*.
vaccina, Vell. Fl. Flum. viii. t. 143 (Quid?).—Bras.
vulgaris, Lam. Fl. Fr. ii. 71 = *T. Farfara*.

TUTUCA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 135 (1810).
 Genus dubium *ERICACEARUM*.
chilensis, Molina, l. c.—Chili.
fistulosa, Molina, l. c. 288.—Chili.

TWEEDIA, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 291 = *Oxypetalum*, R. Br. (Asclep.).
birostrata, Hook. & Arn. l. c. = *O. Hookeri*.
Brunonis, Hook. & Arn. l. c. 292 = *O. Brunonis*.
coerulea, D. Don, ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 407.—Reg. Argent.
floribunda, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, iv. (1848) 347 = *O. solanoides*.
macrolepis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 291 = *O. macrolepis*.
pubescens, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, iv. (1848) t. 347 = *O. solanoides*.
rosea, Hort. ex Lem. l. c. = *O. solanoides*.
versicolor, Hook. Bot. Mag. t. 3630 = *coerulea*.

TYDAEA, Decne. Rev. Hort. Ser. III. ii. (1848) 468 = *Isoloma*, Decne. (Gesner.).
amabilis, Planch. & Linden, in Linden, Cat. n. 10 (1855) 4; et in Fl. des Serres, x. (1855) 237. t. 1070.—N. Granat.
Ceciliae, André, Illustr. Hort. xxiii. (1876) 178. t. 260.—N. Granat.
elegans, Planch. & Linden, in Linden, Cat. n. 10 (1855) 4 = *I. elegans*.
gigantea ×, Planch. Fl. des Serres, x. (1854–55) 21. t. 975–76.
Hansteini ×, Ortgies, in Regel, Gartenfl. vii. (1858) 65. t. 218.
Hillii, Regel, Gartenfl. iii. (1854) 73, 74.—Hab.?
Karsteniana, Hort. ex Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 439 = *I. picta*?
Lindenii, André, Illustr. Hort. xx. (1873) 183. t. 147 = seq.
Lindeniana, Regel, Gartenfl. xvii. (1868) 257. t. 589.—Am. trop.
magnifica, Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 440 = *Achimenes magnifica*.
ocellata, Regel, Gartenfl. iii. (1854) 74 = *I. ocellatum*.
Ortgiesii ×, Hort. Van Houtte, ex Planch. in Fl. des Serres, xi. (1856) 213. t. 1181–1182.
pardina, Linden & André, Illustr. Hort. xx. (1873) 212. t. 152.—N. Granat.
picta, Decne. in Rev. Hort. Sér. III. ii. (1848) 468; et in Regel, Gartenfl. iii. (1854) 73, 75 = *I. picta*?
pyramidalis, Regel, Gartenfl. x. (1861) 193. t. 328.—Hab.?
venosa, Hort. ex Lescuyer, in L'Hortic. Franç. Sér. III. ii. (1861) 248. t. 20.—N. Granat.
Warszewiczii, Regel, Gartenfl. iii. (1854) 73, 74.—N. Granat.

TYDEA, C. Muell. in Walp. Ann. v. 427 (1858–60), sphalm. = *praec*.

TYLACANTHA, Endl. Gen. 672 (1839) = *THYLACANTHA*, Nees & Mart. = *Angelonia*, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).

TYLANTHUS, Reiss. in Endl. Gen. 1101 (1840) = *Phylica*, Linn. (Rhamn.).
abietinus, Presl, Bot. Bemerk. 38 = *P. abietina*.
atratus, Presl, l. c. 37 = *P. atrata*.
brevifolius, Presl, l. c. 38 = *P. brevifolia*.
callosus, Presl, l. c. 37, 38 = *P. callosa*.
comosus, Presl, l. c. 37 = *P. comosa*.
debilis, Presl, l. c. 38 = *P. imberbis*.
diosmoides, Presl, l. c. = *P. diosmoides*.
distichus, Presl, l. c. = *P. disticha*.
emirnensis, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 128.—Madag.
empetroides, Presl, Bot. Bemerk. 38 = *P. disticha*, rubra.
eriphorus, Presl, l. c. = *P. eriphora*.
excelsus, Presl, l. c. 37, 38 = *P. excelsa*.
gracilis, Presl, l. c. 37 = *P. gracilis*.
imberbis, Presl, l. c. = *P. imberbis*.
lanceolatus, Presl, l. c. 38 = *P. eriphora*.
litoralis, Presl, l. c. 37 = *P. atrata*.
parviflorus, Presl, l. c. 38 = *P. parviflora*.
retorsus, Presl, l. c. 37 = *P. retorsa*.
rosmarinifolius, Presl, l. c. 38 = *P. rosmarinifolia*.
secundus, Presl, l. c. = *P. eriphora*.
Thunbergianus, Presl, l. c. = *P. Thunbergiana*.
virgatus, Presl, l. c. 37 = *P. virgata*.
Willdenowianus, Presl, l. c. 38 = *P. Willdenowiana*.

TYLLOMA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 238 = *Chaetanthera*, Ruiz & Pav. (Compos.).
glabratum, DC. Prod. vii. 32.—Chili.
lanatum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 112.—Chili.
limbatum, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 236, 301 = *C. limbata*.
pusillum, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 391 = *C. pusilla*.
renifolium, Wedd. Chlor. And. i. 28. t. 8 A.—Chili.
splendens, Wedd. l. c. 27.—Chili.

TYLOCHILUS, Nees, in Verh. Gartenb. Ges. Berl. viii. (1832) 194. t. 3 = *Cyrtopodium*, R. Br. (Orchid.).
flavus, Nees, l. c. 195 = *C. flavus*.

TYLODERMA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 413 = *Hippocratea*, Linn. (Celastr.).
praecelsa, Miers, l. c. 414.—Panama.

TYLODONTIA, Griseb. Cat. Pl. Cub. 175 (1866) = *Astephanus*, R. Br. (Asclep.).
cubensis, Griseb. l. c.—Cuba.

TYLOGLOSSA, Hochst. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 144 = *Justicia*, Hout. (Acanth.).
acuminata, Hochst. l. c. xxvi. (1843) 73 = *Adhatoda acuminata*.
adenostachya, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 117.—Bras.
chrysotrichoma, Nees, l. c. 116.—Bras.
ciliata, Nees, l. c.—Bras.
flexuosa, Nees, l. c.—Bras.
genistiformis, Nees, l. c. 115.—Bras.
glandulosa, Nees, l. c. 117.—Bras.
Kotschyi, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 74.—Afr. trop.
major, Hochst. l. c. 73 = *J. major*.
minor, Hochst. l. c. = *J. minor*.
palustris, Hochst. l. c. xxv. (1842) i. Beibl. 144; xxvi. (1843) 72 = *J. palustris*.
pubescens, Hochst. l. c. xxviii. (1845) 71.—Afr. austr.
rostrata, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 397 = *J. Schimperiana*.
Schimperi, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 73 = *J. Schimperiana*.
sexangularis, Hochst. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 144 = *Dicliptera sexangularis*.

TYLOMIUM, Presl, Prod. Monog. Lobel. 31 (1836) = *Lobelia*, Plum. (Campan.).
assurgens, Presl, l. c. 32 = *L. assurgens*.
conglobatum, Presl, l. c. = *L. conglobata*.
flavescens, Presl, l. c. = *L. conglobata*.
robustum, Presl, l. c. = *L. robusta*.

TYLOPHORA, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 28. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 770.
AMBLYOGLOSSUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 310.

TYLOPHORA:—

- BELOSTEMMA, Wall. in Wight, *Contrib.* 52 (1834).
 HOMOLOSTYLES, Wall. ex Wight, l. c. 50 (1834).
 HYBANTHERA, Endl. *Prod. Fl. Norf.* 59 (1833).
 IPHISIA, Wight, *Contrib.* 52 (1834).
 albida, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 324, nomen.—Ins. Timor.
 aristolochioides, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 129.—Japon.
 asthmatica, Wight & Arn. in *Wright, Contrib.* 51.—Ind. or.; Malaya.
 barbata, R. Br. *Prod.* 460.—Austral.
 Belostemma, Benth. in *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 771.—Reg. Himal.
 bifida, F. Villar, in *Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 134.—Ins. Philipp.
 biglandulosa, F. Muell. *Fragm.* ix. 71, 169.—Ins. Norfolk.
 Bojeriana, Decne. in *DC. Prod.* viii. 607.—Madag.
 Brackenridgei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1862) 334.—Ins. Fiji.
 brevipes, F. Villar, in *Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 134.—Ins. Philipp.
 caffra, Meissn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 542 (err. typ. 442).—Afr. austr.
 calcarata, Benth. *Fl. Austral.* iv. 335.—Austral.
 capparifolia, Wight & Arn. in *Wright, Contrib.* 51.—Ind. or.
 carnosa, Dalz. & Gibs. *Bomb. Fl.* 150 = Dalzellii.
 carnosa, Wall. ex Wight, *Contrib.* 49 = tenuis.
 chlorantha, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 486.—Java.
 cirrosa, Aschers. ex Schweinf. *Beitr. Fl. Aethiop.* 132.—Afr. trop.
 cissoides, Blume, *Bijdr.* 1061.—Java.
 congesta, Decne. in *DC. Prod.* viii. 609.—Java.
 cordifolia, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 196.—Zeylan.
 crassifolia, Zipp. ex Decne. in *DC. Prod.* viii. 612.—Ins. Timor.
 cuspidata, Zipp. ex Decne. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* ix. (1838) 274. t. 10.—Ins. Timor.
 Dalzellii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 43.—Ind. or.
 enervis, F. Muell. *Fragm.* ix. 70.—Ins. Dom. Howe.
 erecta, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iv. 334.—Austral.
 exilis, Colebr. in *Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 358.—Ind. or.; Malaya.
 fasciculata, Buch-Ham. ex Wight, *Contrib.* 50.—Ind. or.
 fasciculata, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 197 = T. Iphisia.
 flava, Trimen, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 239.—Zeylan.
 flexuosa, R. Br. *Prod.* 460.—Austral.
 floribunda, Benth. *Fl. Austral.* iv. 335.—Austral.
 floribunda, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 128.—Japon.
 globifera, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 41.—Ins. Andaman; Malacca.
 Govanii, Decne. in *DC. Prod.* viii. 610.—Reg. Himal.
 grandiflora, R. Br. *Prod.* 460.—Austral.
 Helfer, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 40.—Burma.
 heterophylla, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 41 = Vincetoxicum heterophyllum.
 himalaica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 42.—Reg. Himal.
 hirsuta, Wight, *Contrib.* 49.—Reg. Himal.
 hispida, Decne. in *DC. Prod.* viii. 610.—China.
 incana, Brunn. in *Flora*, xxiii. (1840) II. *Beibl.* 26.—Afr. trop.
 Iphisia, Decne. in *DC. Prod.* viii. 610.—Ind. or.
 Jacquemontii, Decne. l. c. 607 = hirsuta.
 japonica, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 129.—Japon.
 laevigata, Decne. in *DC. Prod.* viii. 612.—Ins. Maurit.
 laevis, Decne. l. c. 611.—Hab.?
 lanceolata, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 324, nomen.—Ins. Timor.
 longifolia, Wight, *Contrib.* 50.—Ind. or.
 lutescens, Decne. in *Herb. Gén. Amat. et Hort. Univ.* 5 (1844).—Hab.?
 lycioides, Decne. in *DC. Prod.* viii. 608.—Afr. austr.
 macrantha, Hance, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 79 = *Dregea volubilis*.
 macrantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 40.—Ind. or.
 macrobotrya, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 488.—Java?
 macrophylla, Benth. *Fl. Austral.* iv. 334.—Austral.
 membranifolia, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 424 = zeylanica.
 micrantha, Decne. in *Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 377.—Ins. Timor.

TYLOPHORA:—

- micrantha, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 197 = zeylanica.
 microstachys, Hook. in *Hook. Ic. Pl.* t. 1450.—Reg. Himal.
 mollissima, Wall. *Cat. n.* 8202; Wight, *Contrib.* 49 = hirsuta.
 ovata, Hook. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 726.—China.
 paniculata, R. Br. *Prod.* 460.—Austral.
 parviflora, Wight, *Ic.* iv. n. 1274, textu = pauciflora.
 pauciflora, Herb. Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 44 = Dalzellii.
 pauciflora, Hohen. ex Hook. f. l. c. 40 = T. Iphisia.
 pauciflora, Wight & Arn. in *Wight, Contrib.* 49.—Ind. or.
 Perrottetiana, Decne. in *DC. Prod.* viii. 609.—Ins. Philipp.
 pubescens, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 45 = asthmatica.
 punctata, Kostel. *Allg. Med. Pharm. Fl.* iii. 1084 = *Cosmostigma racemosa*.
 purpurea, Wall. ex Wight, *Contrib.* 51.—Burma.
 rotundifolia, Buch-Ham. ex Wight, l. c. 50.—Ind. or.
 rupestris, Blume, *Bijdr.* 1062.—Java.
 samoensis, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1862) 334.—Ins. Samoa.
 sublancoolata, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 128.—Japon.
 sylvatica, Decne. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* ix. (1838) 273.—Afr. trop.
 syringaeifolia, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 198; Drège, ex Brunn. in *Flora*, xxiii. (1840) II. *Beibl.* 27.—Afr. austr.
 Tanakae, Maxim. ex Franch. & Sav. *Enum. Pl. Jap.* i. 321.—Japon.
 tenerima, Wight, *Contrib.* 50.—Reg. Himal.
 tenuis, Blume, *Bijdr.* 1062.—Java.
 tenuissima, Wight, *Contrib.* 49 = tenuis.
 tomentosa, G. Don, *Gen. Syst.* iv. 130 = asthmatica?
 velutina, G. Don, l. c. 128 = *Marsdenia velutina*.
 villosa, Blume, *Bijdr.* 1061; Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 486.—Java.
 vomitoria, Voigt, *Hort. Suburb. Calc.* 539 = asthmatica.
 Wallichii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 45.—Singapore.
 Woollsii, Benth. *Fl. Austral.* iv. 335.—Austral.
 zeylanica, Decne. in *DC. Prod.* viii. 608.—Ind. or.

TYLOSEPALUM, Kurz, ex Teysm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 50 = *Trigonostemon*, Blume (Euphorb.).
 aurantiacum, Kurz, ex Teysm. & Binn. l. c.—Ins. Banca.

TYLOSTYLIS, Blume, *Fl. Jav. Praef.* 6 (1828) = *Eria*, Lindl. (Orchid.).

TYLOTHRASYA, Doell, in *Mart. Fl. Bras.* ii. II. 295. t. 37 (1877) = *Panicum*, Linn. (Gramin.).
 petrosa, Doell, l. c. 296 = *P. petrosum*.

TYMPANANTHE, Hassk. in *Flora*, xxx. (1847) 757 = *Dictyanthus*, Decne. (Asclep.).
 suberosa, Hassk. l. c. 758 = *D. Pavonii*.

TYNANTHUS, Miers, in *Proc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 193. *BIGNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1031.

SCHIZOPSIS, Bur. ex Baill. *Adansonia*, v. (1865) 371. tt. 10, 11.
 cognatus, Miers, in *Proc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 193.—Bras.

confertiflorus, Miers, l. c., nomen (Quid?).—Bras.
 elegans, Miers, l. c. 193.—Bras.
 fasciculatus, Miers, l. c.—Bras.
 gibbus, Miers, l. c., nomen (Quid?).—Bras.
 Gondotiana, Bur. in *Baill. Adansonia*, viii. (1867–68) 274.—Bras.

labiatus, Miers, in *Proc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 193.—Bras.

laxiflorus, Miers, l. c., nomen.—Peruv.
 petiolatus, Miers, l. c., nomen.—Bras.
 strictus, Miers, l. c., nomen (= *Pyrostegia lauta*).—Bras.

TYNUS, J. S. Presl, *Rostl.* ii. 93 (1823) = *Viburnum*, Linn. (Caprifol.).
 ellipticus, J. S. Presl, l. c. = *V. tinoides*.
 lauriformis, J. S. Presl, l. c. = *V. Tinus*.
 lucidus, J. S. Presl, l. c. = *V. Tinus*.
 nudus, J. S. Presl, l. c. = *V. nudum*.
 rugosus, J. S. Presl, l. c. = *V. rigidum*.

TYPHA, Linn. *Syst. ed. I* (1735); *Gen. ed. I*. 281 (1737). *TYPHACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 955.
 MASSULA, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 47 (1867).
 abyssinica, Reichb. f. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 89 = angustata.
 aequalis, Schnitzl. *Typh.* 25 = angustata.
 ambigua, Schur, ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 76 = latifolia.
 americana, Rich. ex Rohrb. l. c. 97 = domingensis.
 angustata, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélo.* 4.—Reg. Mediterr. or.; Oriens.
 angustifolia, All. *Fl. Pedem.* ii. 273 = Laxmanni.
 angustifolia, Aubl. *Pl. Gui.* ii. 847 = domingensis.
 angustifolia, Decne. in *Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 338 = javanica.
 angustifolia, Eckl. & Zeyh. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 100 = capensis.
 angustifolia, Hook. f. *Fl. Tasm.* ii. 38 = Muellieri.
 angustifolia, Linn. *Sp. Pl.* 971.—Europ.; Am. bor.
 angustifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* ii. 226 = angustata.
 angustissima, Griff. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 92 = Laxmanni.
 australis, Schum. & Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* 401 = angustifolia.
 baetulona.—Cf. *Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) *Bibl.* 230, sphalm. = bethulona.
 Balansae, Reut. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 90 = stenophylla.
 bethulona, Costa, *Intr. Fl. Catal.* (1864) 251 = latifolia.
 Brownii, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 92 = angustifolia?
 Bungeana, Presl, *Epim. Bot.* 239 = Laxmanni.
 capensis, Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 96.—Afr. austr.
 caucasica, Lehm. ex Rohrb. l. c. 92 = Laxmanni.
 communis, Noronha, ex Thou. *Prod. Phyt.* 2; in *Mélang.* (1811), nomen (Quid?).—Madag.
 crassa, Rafin. *Atl. Journ.* 148 (Quid?).—Am. bor.
 daenatica, Ehrenb. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 727 = seq.
 damiattica, Ehrenb. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 88 = angustata.
 domingensis, Pers. *Syn.* ii. 532.—As. trop.
 Ehrenbergii, Schur, ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 88 = angustata.
 elata, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 733 = latifolia.
 elatior, Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 274 = angustifolia.
 elatior, Bor. in *Guill. Arch. Bot.* ii. (1833) 399 = latifolia.
 elatior, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 354, nomen; *Atl. Journ.* 148.—Am. bor.
 elephantina, Roxb. *Hort. Beng.* 66; *Fl. Ind.* iii. 566.—Reg. Mediterr.; Ind. or.
 elephantina, Schimp. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 95 = Schimper.
 elephantina, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* = javanica.
 elliptica, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iii. 603 = Laxmanni.
 Engelmanni, A. Br. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 76 = latifolia.
 essequiboensis, G. F. W. Mey. ex Rohrb. l. c. 97 = domingensis.
 gigantea, Schur, ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 92 = domingensis.
 glauca, Godr. *Fl. Lorr.* ed. I. iii. 20; ed. II. ii. 332.—Gallia.
 gracilis, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 43; et *Grain. Rec. Jard. Grenoble* (1849), 24 = Laxmanni.
 gracilis, Rafin. *New Fl. Am.* ii. 91 (Quid?).—Am. bor.
 gracilis, Reichb. *Ic. Fl. Germ.* ix. 2. t. 520. f. 744 = angustifolia.
 gracilis, Schur, *Enum. Pl. Trans.* 637 = angustata.
 Haussknechtii, Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 99.—Armenia.
 intermedia, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* 59 = Laxmanni?
 intermedia, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* ii. (1851) 206. t. 1 = latifolia.
 japonica, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 160.—Japon.
 javanica, Schnitzl. ex Zoll. *Cat. n.* 77.—As. trop.; Ins. Mascar.
 juncea, Stev. ex Rohrb. in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 92 = Laxmanni.
 juncifolia, Čelak. in *Lotos*, xvi. (1866) 149 = stenophylla.
 juncifolia, Montand. in *Friche-Joset, Syn. Fl. Jura*, 325 = Laxmanni.
 latifolia, Forst. f. *Prod.* 64 = angustifolia.

TYPHA :—

- latifolia*, Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 343 = *capensis*.
latifolia, Linn. *Sp. Pl.* 971. —Europ.; Am. bor.
latifolia, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 262 = *domingensis*.
Laxmanni, *Lepech. in Nov. Act. Acad. Petrop.* xii. (1801) 84. —Europ.; As. bor.
macranthelia, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 291 = *angustifolia*.
major, Curt. Fl. Lond. fasc. iii. t. 61 = *latifolia*.
Martini, Jord. Cat. Gr. Jard. Grenoble (1850) = *Laxmanni*.
maxima, Schur, ex Rohrb. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xi. (1869) 97 = *domingensis*.
media, Barbieri, ex Rohrb. l. c. 90 = *stenophylla*.
media, Bory & Chaub. Exp. Sc. Morée, 11 = *angustata*.
media, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 602 = *angustifolia*.
media, Pollini, Fl. Veron. iii. 100 = *latifolia*?
minima, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 251; Funk, ex Willd. *Sp. Pl.* iv. 198 = *Laxmanni*.
minor, Curt. Fl. Lond. fasc. iii. t. 62 = *angustifolia*.
minor, Sm. Fl. Brit. iii. 960, quoad syn. = *Laxmanni*.
minuta, Schrenk, ex Rohrb. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xi. (1869) 90 = *stenophylla*.
Muelleri, *Rohrb. l. c.* 95. —Austral.; N. Zel.
nana, Avé-Lall. Pl. Ital. Bor. 19 = *Laxmanni*.
orientalis, Presl, Epim. Bot. 239 = *Shuttleworthii*.
pendula, Fisch. ex Sond. Fl. Hamb. 508 = *latifolia*.
Poitiaei, Poit. ex Rohrb. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xi. (1869) 92 = *Laxmanni*.
remotiuscula, Schur, Enum. Pl. Transs. 637 = *latifolia*.
Schimperii, *Rohrb. in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xi. (1869) 95. —Abyss.
Shuttleworthii, *Koch & Sond. in Koch, Syn. Pl. Germ.* ed. II. 786. —Europ.
Shuttleworthii, Lehm. Pl. Preiss. ii. 1 = *Muelleri*.
spiralis, Rafin. Atl. Journ. 148 (Quid?). —Am. bor.
stenophylla, *Fisch. & Mey. in Bull. Phys.-Math. Petersb.* iii. (1845) 209. —Ital.; Rossia; Reg. Casp.
stenophylla, Haussk. ex Rohrb. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xi. (1869) 99 = *Haussknechtii*.
tenuifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 82 = *domingensis*.
transilvanica, Schur, Enum. Pl. Transs. 637 = *Shuttleworthii*.
truxillensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 82 = *domingensis*.

TYPHALEA, Neck. Elem. ii. 412 (1790) = **Pavonia**, Cav. (Malvae).
spinifex, Presl, Bot. Bemerk. 19 = *P. spinifex*.

TYPHOIDES, Moench, Meth. 201 (1794) = **Phalaris**, Linn. (Gramin.).
arundinacea, Moench, l. c. 202 = *P. arundinacea*.

TYPHONIUM, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 72; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 53. **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 967.
HETEROTALIS, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 261.
alismsifolium, *F. Muell. Fragm.* viii. 186. —Austral.
angustilobum, *F. Muell. l. c.* x. 66. —Austral.
Brownii, *Schott, Aroid.* 11. t. 15. —Austral.
bulbiferum, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 113. —Ind. or.
cochinchinense, Blume, Rumphia, i. 135 = *Therophonum* Wightii.
crassifolium, Ledeb. Fl. Ross. iv. 10 = *Helicophyllum* crassifolium.
crenatum, Schott, Melet. i. 17 = *Therophonum* crenatum.
cuspidatum, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 367. —As. trop.
discolor, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 54. —Java.
divaricatum, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 367; et ex *Blume, Rumphia*, i. 130. t. 36. —As. trop.
diversifolium, *Wall. Cat. n.* 8933 A. —Ind. or.
fallax, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 260. —Java.
flagelliferum, *Griff. Notul.* iii. 144 = *cuspidatum*.
flagelliforme, Blume, Rumphia, i. 134 = *cuspidatum*.
foliolosum, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 618 = *diversifolium*.
giganteum, *Engl. Bot. Jahrb.* iv. (1883) 66. —China.
gracile, *Schott, Aroid.* i. 12. —Ind. or.
hastiferum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 194; et in Bot. Zeit. xiv. (1856) 563 = *cuspidatum*.
Huegelianum, *Schott, Aroid.* i. 13. t. 19 = *diversifolium*.

TYPHONIUM :—

- javanicum*, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 193; et in Bot. Zeit. xiv. (1856) 563 = *divaricatum*.
lilifolium, *F. Muell. ex Schott, Prod. Aroid.* 107. —Austral.
minutum, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 72; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 54 = *Therophonum* Wightii?
Mottleyana, *Schott, Prod. Aroid.* 106. —Ind. or.; Malaya.
orixense, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 72; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 54 = *trilobatum*.
pedatum, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 613 = *fallax*.
pedatum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 262. —Burma.
Reinwardtiana, De Vriese & *Miq. ex Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 195 = *cuspidatum*.
Roxburghii, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 283 = *trilobatum*.
Roxburghii, *Schott, Aroid.* i. 12. t. 17. —Ind. or.
siamense, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 615 = *trilobatum*.
sylvaticum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 686 = *Synantheria* sylvaticus.
trilobatum, *Schott, in Wien. Zeitschr.* iii. (1829) 72; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 54. —Ind. or.; Malaya.
triste, *Griff. Notul.* iii. 145 = *trilobatum*.
tuberculigerum, *Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 123. —Japon.

TYPHONODORUM, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 70. **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 977.
Lindleyanum, *Schott, l. c.* —Madag.
madagascariense, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 188. —Madag.

TYPHYLA, Heist. Syst. 12 (1748) 12 (Quid?).

TYRIA, Klotzsch, in Endl. Gen. Suppl. iv. III. 88 (1850) = **Bernardia**, Houst. (Euphorb.).
myricaefolia, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 581 = *B. myricaefolia*.

TYRIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 21 = **Macleania**, Hook. (Vaccin.).
Salapa, Klotzsch, l. c. = *M. Salapa*.

TYRIMNUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 168; et in Dict. Sc. Nat. xli. 314, 335 (1826). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 470.
leucographus, *Cass. l. c.* 168; 335. —Europ. austr.

TYSSACIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 727 (1841), sphalm. = **Tussacia**, Reichb. (Gesner.).

TYTONIA, G. Don, Gen. Syst. i. 749 (1831) = **Hydrocera**, Blume (Geran.).
madagascariensis, G. Don, l. c. 750 = *Impatiens* madagascariensis.
natans, G. Don, l. c. 749 = *H. angustifolia*.

U

UAPACA, Baill. Etud. Gén. Euph. 595 (1858). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 282.
GYMNOCARPUS, Thou. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 595 (1858).
benguensis, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 332. —Afr. trop.
Bojeri, *Baill. Adansonia*, xi. (1874) 176. —Madag.
clusiacea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 278. —Madag.
clusioides, *Baker, l. c.* xxi. (1885) 441. —Madag.
densifolia, *Baker, l. c.* xx. (1883) 252. —Madag.
ferruginea, *Baill. Etud. Gén. Euph.* 596. —Madag.
guineensis, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 517. —Afr. trop.
Heudelotii, *Baill. Adansonia*, i. (1860–61) 81. —Afr. trop.
Kirkiana, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 517. —Afr. trop.
myricaefolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 440. —Madag.
nitida, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 517. —Afr. trop.
Thouarsii, *Baill. Etud. Gén. Euph.* 598. —Madag.

UBIAEA, J. Gay, in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 447 (1847) = **Landtia**, Less. (Compos.).
Schimperii, J. Gay, l. c. = *L. Schimperii*.

UBIUM, J. F. Gmel. Syst. 839 (1791) = **Dioscorea**, Plum.
quadrifarium, J. F. Gmel. l. c. (Quid?). —Hab.?

UCACEA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxvii. 9 (1823) = **Blainvillea**, Cass. (Compos.).

UCACOU, Adans. Fam. ii. 131 (1763) = **Synedrella**, Gaertn. (Compos.).

UCRIA, Targ. ex Pfeiff. Nom. ii. 1519 (1874) (nomen auctoris lapsu pro genere habitum). —Cf. Benth. & Hook. f. Gen. iii. 964.

UCRIANA, Willd. Sp. Pl. i. 961 (1798) = **Tocoyena** Aubl. (Rubiace.).
Hamelliae, D. Dietr. Syn. Pl. i. 798 (*Adenosames* sp.). —Nepal.

hirsuta, D. Dietr. l. c. = *T. hirsuta*.
Humboldtii, Spreng. Syst. i. 761 = *T. longifolia*.
insignis, Willd. ex Spreng. Syst. i. 761 = *Posoqueria* latifolia.
longiflora, D. Dietr. Syn. Pl. i. 798 = *T. longiflora*.
longifolia, D. Dietr. l. c. = *T. longifolia*.
longifolia, Spreng. Syst. i. 761 = *Augusta lanceolata*.
macrophylla, D. Dietr. Syn. Pl. i. 798 = *Posoqueria* latifolia.

Mussaendae, D. Dietr. l. c. (= *Menestoria* *Mussaendae*). —Nepal.
Mutisii, Spreng. Syst. i. 761 = *T. Mutisii*.
racemosa, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 107 = *Oxyanthus* tubiflorus.
rigida, D. Dietr. Syn. Pl. i. 798 (= *Menestoria* *rigida*). —Nepal.

speciosa, Willd. Sp. Pl. i. 961 = *T. longiflora*.
Wallichii, D. Dietr. Syn. Pl. i. 798 = *Mussaenda* *Roxburghii*?

UDORA, Nutt. Gen. Am. ii. 242 (1818) = **Elodea**, Michx. (Hydroch.).
australis, F. Muell. Second Gen. Rep. 16 = *Hydrilla* verticillata.
brasiliensis, Endl. & Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 99. —Am. austr.
canadensis, Nutt. Gen. Am. ii. 242 = *E. canadensis*.
cordofana, Hochst. in Flora, xxv. (1842) Beibl. i. 133. —Afr. trop.
granatensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 25 = *E. granatensis*.
guianensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 727 = *E. guianensis*.
guyanensis, Chat. Anat. Comp. (1856) 26. t. 10. f. 4–6 = *praeac.*?
lithuanica, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 139 = *Hydrilla* verticillata.
occidentalis, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 669 = *Hydrilla* verticillata.
orinocensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 25 = *E. orinocensis*.
pomeranica, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 31 = *Hydrilla* verticillata.
verticillata, Nutt. Gen. Am. ii. 242 = *E. canadensis*.
verticillata, Spreng. Syst. i. 170 = *Hydrilla* verticillata.

UEBELINIA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 30; ii. 664. **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 148.
abyssinica, *Hochst. l. c.* 30; 665. —Abyss.
rotundifolia, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 397. —Afr. trop.
spathulaefolia, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 46 = *abyssinica*.

UGNI, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 579 = **Myrtus**, Tourn.
Berteri, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 79 = *M. Selkirkii*.
Bridgesii, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 389, in obs. —Hab.?
Candollei, Berg, l. c. 388 = *M. Candollei*.
Friedrichsthalii, Berg, l. c. = *Eugenia* *Friedrichsthalii*.
Krausei, Phil. ex Berg, in Bot. Zeit. xvi. (1858) 250 = *M. Krausei*.

UGNI:—

- Molinae*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 579 = *Myrtus Molinae*.
montana, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 392 = *M. montana*.
myricoides, Berg, l. c. 391 = *M. myricoides*.
Oerstedii, Berg, l. c. 389 = *M. Oerstedii*, *Eugenia irazuensis*.
Philippii, Berg, l. c. 387 (*Philippii*) = *M. Molinae*.
Poeppigii, Berg, l. c. 386. — Chili.
Selkirkii, Berg, l. c. 392 = *M. Selkirkii*.
Warszewiczii, Berg, l. c. 390 = *Eugenia Warszewiczii*.
Linac.)

UGONA, Adans. Fam. ii. (22) (1763) = *Hugonia*, Linn. (Linac.).

UHDEA, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 13. — Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 316 = *Montanoa*, La Llave (Compos.).
bipinnatifida, Kunth, l. c. = *M. bipinnatifida*.

UITENIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4 = *Erioglossum*, Blume (Sapind.).
stilaginea, Noronha, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 574 = *E. edule*.

ULANTHA, Hook. Bot. Mag. sub t. 2990, et Index (1830) = *Chloraea*, Lindl. (Orchid.).
grandiflora, Hook. l. c. — Ins. S. Vincent. (cult.).

ULEX, Linn. Syst. ed. I (1735). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 483.

LEONHARDIA, Opiz, in Lotos, vii. (1857) 88.
 NEPA, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 286.

STAUACANTHUS, Link, in Schrad. Neues Journ. ii. 11. (1808) 52.

africanus, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 289. — Afr. bor. occ.

aphyllus, Link, ex Nym. Consp. 149 = *genistoides*.
argenteus, Welw. ex Webb, *Otia Hisp.* 44. — Lusitan.
armoricus, Mabilie, in Act. Linn. Soc. Bord. xxv. (1864) 524 = *europaeus*.

australis, Funk, ex Webb, *Otia Hisp.* 42 = *Willkommii*.
australis, Roxas Clem. Ensay. Vid. 291 = *parviflorus*.
australis, Welw. ex Webb, *Otia Hisp.* 41 = *Welwitschianus*.

autumnalis, Thore, Ess. Chlor. Land. 299 = *nanus*.
baeticus, Boiss. *Elench.* 30. — Reg. Mediterr. occ.

baeticus, Willk. ex Webb, *Otia Hisp.* 42 = *Willkommii*.
Boivini, Coss. ex Nym. Consp. 149 = *Cossonii*.

Boivini, Webb, *Iter Hisp.* 51. — Reg. Mediterr. occ.

Boivini, Welw. ex Webb, *Otia Hisp.* 32 = *Escayracii*.
Boivini, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 443 = *Webbianus*.

Bourgaeus, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 289 = *baeticus*.

brachyacanthus, Boiss. *Diagn.* Ser. II. ii. 9. — Hispan.
canescens, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 159. — Hispan.

capensis, Linn. Sp. Pl. 741 = *Mundtia spinosa*.
compositus, Moench, Meth. 289 = *europaeus*.

Cossonii, Nym. Syll. 278. — Hispan.
densus, Welw. ex Webb, *Otia Hisp.* 43. — Lusitan.

ericetorum, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 449 = *Welwitschianus*.

erinaceus, Welw. ex Webb, *Otia Hisp.* 44. — Lusitan.
Escayracii, Nym. Syll. 278. — Lusitan.

europaeus, Brot. Fl. Lusit. ii. 78 = *nanus*.
europaeus, Linn. Sp. Pl. 241. — Europ. occ.

europaeus, Savi, Alb. Tosc. i. 228 = *parviflorus* ?
floridus, Salisb. Prod. 329 = *europaeus*.

Funkii, Webb, *Otia Hisp.* 42 ; Nym. Consp. 148 = *Willkommii*.

Gallii, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 213. t. 9. — Europ. occ.

genistoides, Brot. Fl. Lusit. ii. 78. — Lusitan.
genistoides, Roxas Clem. Ensay. Vid. 291 = *spartioides*.

genistoides, Salzm. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1452 = *Boivini*.
grandiflorus, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 333 = *europaeus*.

hibernicus, G. Don, Gen. Syst. ii. 148 = *europaeus*.
hispanicus, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1882) i. 668 = *Genista hispanica*.

hispanicus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 426 = *Genista hirsuta*.

ianthocladus, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 290 = *baeticus*.

intermedius, Le Gall, in Congr. Sc. Fr. xvi. (1850) 139 ; Fl. Morb. 815 = *Gallii*.

ULEX:—

Jussiaci, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 291. — Lusitan.

lanuginosus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 424 = *Genista hirsuta*.

lucidus, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 469, sphalm. = seq.

luridus, Nym. Syll. 278 = *Webbianus*.
lusitanicus, Mariz, in Bol. Soc. Broter. ii. (1884) 115. — Lusitan.

lusitanicus, Pourr. ex Colm. sec. Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 449 = *Welwitschianus*.

major, Thore, Ess. Chlor. Land. 299 = *europaeus*.
Megalorites, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 469 = *Boivini*.

micranthus, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 236 = *Willkommii*.

minor, Roth, Catalect. fasc. i. 83 = *nanus*.
mitis, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 280 = *europaeus*.

nanus, Forst. in Symons, Syn. 160 ; Sm. Fl. Brit. 757. — Europ. occ.

nanus, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1882) i. 668 = *Genista hispanica*.

opistolepis, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 291 = *europaeus*.

parviflorus, Losc. & Pard. Ser. Inconf. ed. II. 91 = *recurvatus*.

parviflorus, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 334. — Europ. occ.

provincialis, Le Gall, Fl. Morb. 128 = *Gallii*.
provincialis, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 361 = *parviflorus*.

recurvatus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 449 = *Welwitschianus*.

recurvatus, Willk. l. c. 448. — Hispan.
Salzmanni, Willk. l. c. 469. — Hispan.

scaber, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 696, t. 2 = *baeticus*.
sparsiflorus, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1881) 104 (Quid ?). — Hispan.

spartioides, Nym. Syll. 278. — Lusitan.
spectabilis, Welw. ex Webb, *Otia Hisp.* 27. — Lusitan.

strictus, Hort. ex Del. Sem. Hort. Heidelberg. (1852) 8. — Cf. Linnaea, xxvi. (1853-55) 739 (an seq. ?). — Hab. ?

strictus, Mackay, in Trans. Roy. Irish Acad. xiv. (1824) 166 = *europaeus*.

Vaillantii, Nym. Syll. 278 = *Boivini*.
vernalis, Thore, Ess. Chlor. Land. 299 = *europaeus*.

Webbianus, Coss. Notes Crit. ii. 32. — Hispan.
Welwitschianus, Coss. ex Mariz, in Bol. Soc. Broter. ii. (1884) 116 = *baeticus*.

Welwitschianus, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 216. — Lusitan.

Willkommii, Webb, l. c. xvii. (1852) 290. — Hispan.

ULINA, Opiz, Seznam, 100 (1852) = *Inula*, Linn. (Compos.).

germanica, Opiz, l. c. = *I. germanica*.
hirta, Opiz, l. c. = *I. hirta*.

salicina, Opiz, l. c. = *I. salicina*.

ULLOA, Pers. Syn. i. 218 (1805) = *Juanulloa*, Ruiz & Pav. (Solan.).

parasitica, Pers. l. c. = *J. parasitica*.

ULLUCUS, Caldas, in Sman. Nuov. Granad. (1809) 185. *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 77.

GANDOLA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 224 (1849).
 MELLOCA, Lindl. in Gard. Chron. (1847) 685.

Kunthii, Moq. in Bibl. Univ. Genève. xi. (1849) 80 = *tuberosus*.

tuberosus, Caldas, in Sman. Nuov. Granad. (1809) 185. — Reg. Andin.

ULMARIA, [Tourn.] Hill, Hort. Kew. 213 (1768) = *Spiraea*, Linn. (Rosac.).

Aruncus, Hill, l. c. 214 = *S. Aruncus*.
denudata, Opiz, Seznam, 100 = *S. Ulmaria*.

Filipendula, Hill, Hort. Kew. 214 = *S. Filipendula*.
glauca, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 370 = *S. Ulmaria*.

obtusiloba, Opiz, Seznam, 100 = *S. Ulmaria*.
palustris, Moench, Meth. 663 = *S. Ulmaria*.

pentapetala, Gilib. Fl. Lituan. ii. 236 = *S. Ulmaria*.
rubra, Hill, Hort. Kew. 214. — Am. bor.

Spiraea-Ulmaria, Hill, l. c. = *S. Ulmaria*.
trifoliata, Hill, l. c. = *Gillenia trifoliata*.

variegata, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 863 = *S. Ulmaria*.

ULMUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. 1 (1735). *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 351.

CHAETOPTOLEA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1850) 76.

MICROPTOLEA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 358.

Abelicea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 172 = *Zelkova cretica*.

acuta, Dum. Fl. Belg. 25 = *pedunculata*.
alata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 173. — Am. bor.

alba, Kit. ex Willd. Berl. Baumz. 518 = *pedunculata*.

alba, Rafin. Fl. Ludov. 115 = *americana*.
americana, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 319 = *fulva*.

americana, Linn. Sp. Pl. 226. — Am. bor.
americana, Planch. in DC. Prod. xvii. 155, partim = *racemosa*.

angustifolia, Moench, Verz. Ausl. Baeume, 137 = *campestris*.

antarctica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 418 = *montana*.

aquatica, Rafin. Fl. Ludov. 165 = *Planera aquatica*.
aurea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 412 = *campestris*.

batachina, Hort. ex C. Koch, l. c. 414 = *montana*.
Berandii, Hort. ex C. Koch, l. c. 409 = *campestris*.

betulaefolia, Lodd. Cat. (1836) ; ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1376 = *campestris*.

betuloides, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 727 = *pracc.* ?

campestris, Linn. Sp. Pl. 225. — Europ. ; Oriens.
campestris, Linn. l. c., partim = *montana*.

campestris, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 632 = *pedunculata*.

campestris, Walt. Fl. Carol. 111 = *Planera aquatica*.
carpinifolia, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 498 = *campestris*.

cebenensis, Audib. ex Planch. in DC. Prod. xvii. 160 = *montana*.

chinensis, Desf. Tabl. ed. I. 212 ; Pers. Syn. i. 291 = *campestris*.

ciliata, Ehrh. Beitr. v. 161 ; vi. 88 = *pedunculata*.
cinerea, Hort. ex Planch. in DC. Prod. xvii. 160 = *montana*.

cornubiensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 409 = *campestris*.

corylacea, Dum. Fl. Belg. 25 = *montana* ?
corylifolia, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 577 = *montana*.

corylifolia, Host, Fl. Austr. i. 329 = *campestris*.
crassifolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 169. — Am. bor.

crispa, Willd. Enum. Hort. Berol. 295 = *fulva*.
Davidiana, Planch. in Compt. Rend. Par. lxxiv. (1872) i. 1498, nomen ; et in DC. Prod. xvii. 158. — China.

dentata, Rafin. New Fl. Am. iii. 39 (Quid ?). — Am. bor.

dimidiata, Rafin. l. c. (Quid ?). — Am. bor.
effusa, Sibth. Fl. Oxon. 87 = *montana*.

effusa, Willd. Prod. Fl. Berl. 94 = *pedunculata*.
elliptica, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 599 = *campestris*.

erosa, Roth, Nov. Pl. Sp. 183. — Ind. or.
erosa, Wall. Cat. n. 3546 = *Wallichii*.

excelsa, Borkh. Handb. Forstbot. i. 839 = *montana*.
exoniensis, Hort. ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1399 = *montana*.

expansa, Rota, in Bot. Zeit. xiii. (1855) 469 = *montana*.
floridana, Chapm. Fl. S. U. St. 416 = *americana*.

foliacea, Gilib. Exercit. ii. 395 = *campestris*.
Fordii, Hort. ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1399 = *montana*.

forficata, Presl, in Verh. Ges. Vaterl. Mus. Boehm. (1841) 76 = *montana* ?

fulva, Michx. Fl. Bor. Am. i. 172. — Am. bor.
fungosa, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 384 = *campestris*.

gigantea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 417 = *montana*.

glabra, Huds. Fl. Angl. ed. I. 95 = *montana*.
glabra, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *campestris*.

glaucescens, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 267. — China.

glutinosa, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 14 = *montana* ?

hollandica, Duroi, Harbk. Baumz. ii. 505 = *pedunculata*.

hollandica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *campestris*.

ULMUS:—

Hookeriana, Planch. in DC. Prod. xvii. 162 = *lanceifolia*.
horizontalis, Hort. ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1398 = *montana*.
humilis, Amman, ex Steud. Nom. ed. I. 862 = *pumila*.
integrifolia, Roxb. in Willd. Sp. Pl. i. 1326 = *Holoptelea integrifolia*.
japonica, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 28 = *parvifolia*.
Keaki, Siebold, l. c. = *Zelkova acuminata*.
Keia-ki, Planch. in DC. Prod. xvii. 163 = *præc.*
laevigata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 341 = *Wallichii*.
laevis, Pall. Fl. Ross. i. 75. t. 48. f. F = *pedunculata*.
lanceifolia, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. ii. 66. — Reg. Himal.; Burma.
latifolia, Moench, Meth. 333 = *montana*.
leucocarpa, Schur, Enum. Pl. Transs. 603 = *montana*.
leucosperma, Schur, l. c. = *præc.*
longifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 38 (Quid?). — Am. bor.
macrocarpa, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 332. — China.
major, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 261 = *campestris*.
major, Sm. Engl. Bot. t. 2542 = *montana*.
mexicana, Planch. in DC. Prod. xvii. 156. — Mexic.
microphylla, Pers. Syn. i. 291 = *pumila*.
minor, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *campestris*.
modiolina, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 384 = *campestris*.
mollifolia, Marsh. Arbust. 156 = *americana*.
montana, With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 279; Sm. Engl. Fl. ii. 22. — Europ.; As. bor.
nana, Borkh. Handb. Forstbot. i. 839 = *campestris*.
nemoralis, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 320 = *Zelkova crenata*.
nemoralis, Boiss. ex Planch. in DC. Prod. xvii. 156 = *campestris*.
nemorosa, Borkh. Handb. Forstbot. i. 846 = *campestris*.
nigra, Lodd. Cat. (1836); ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1398 = *montana*.
nitens, Moench, Meth. 333 = *campestris*.
nuda, Ehrh. Beitr. v. 160; vi. 86 = *campestris*.
obovata, Rafin. New Fl. Am. iii. 38 (Quid?). — Am. bor.
octandra, Schkuhr, Handb. 178. t. 67 = *pedunculata*.
ontariensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 728 = *montana*.
opaca, Nutt. N. Am. Sylv. i. 51 = *crassifolia*.
parvifolia, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 6. t. 262. — As. temp.
pedunculata, Fouger. in Mém. Acad. Sc. Par. 1784 (1787), 215. t. 2. — Europ.; Reg. Cauc.
pendula, Lodd. Cat. (1836); ex Loud. Arbor. Brit. 1398 = *montana*.
pendula, Willd. Berl. Baumz. 519; Enum. Hort. Berol. Suppl. 14 = *fulva*.
pinguis, Rafin. Fl. Ludov. 115 (Quid?). — Am. bor.
planeroides x, Carr. in Rev. Hort. (1875) 286, 287.
planifolia, Hort. ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1377 = *campestris*.
polygama, Juss. ex Poir. Encyc. iv. 611; Rich. in Michx. Fl. Bor. Am. ii. 248 = *Zelkova crenata*.
procera, Salisb. Prod. 391 = *campestris*.
pubescens, Walt. Fl. Carol. 112 = *fulva*.
pumila, Hort. ex Planch. in DC. Prod. xvii. 161 = *parvifolia*.
pumila, Linn. Sp. Pl. 226. — As. bor.
pumila, Pall. Reise, iii. 106 = *campestris*.
pumila, Walt. Fl. Carol. 111 = *alata*.
purpurea, Hort. ex Planch. in DC. Prod. xvii. 158 = *campestris*.
racemosa, Borkh. Handb. Forstbot. i. 851 = *pedunculata*.
racemosa, D. Thomas, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xix. (1831) 170. — Am. bor.
reticulata, Dum. Fl. Belg. 25 = *pedunculata*.
rotundifolia, Carr. in Rev. Hort. (1868) 374 = *macrocarpa*?
rubra, Hort. ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1398 = *montana*.
rubra, Michx. f. Hist. Arb. Am. iii. 278. t. 6 = *fulva*.
rugosa, Lodd. Cat. (1836); ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1398 = *montana*.

ULMUS:—

sarniensis, Lodd. Cat. (1836); ex Loud. Arbor. Brit. iii. 1376 = *campestris*.
sativa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3; Duroi, Harbk. Baumz. ii. 502 = *campestris*.
sativa, Pistohlk. in [Hupel.] Nord. Miscellan. xvii.; ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 648 = *pedunculata*.
scabra, Duroi, Harbk. Baumz. ii. [543] Zusatz = *campestris*.
scabra, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *montana*?
scampstoniensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 728 = *campestris*.
sparsa, Dum. Fl. Belg. 25 = *campestris*.
striata, Bosc. Encyc. Agric. vii. 623, nomen (Quid?). — Am. bor.
stricta, Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. II. 227 = *campestris*.
suberosa, Moench, Verz. Ausl. Bäume, 136; Ehrh. Beitr. vi. 87 = *campestris*.
surculosa, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 35 = *campestris*.
tetrandra, Schkuhr, Handb. 178. [t. 57] = *campestris*.
tiliaefolia, Host, Fl. Austr. i. 329 = *campestris*.
tomentosa, Borkh. Handb. Forstbot. i. 856 = *montana*.
tortuosa, Host, Fl. Austr. i. 330 = *campestris*.
transbaicalensis, Steud. Nom. ed. I. 862 = *pumila*.
turkestanica, Regel, Gartenfl. (1884) 28, in textu. — Trkestan.
urticaefolia, Audib. Cat. Hort. Tonn. (1817) 23 = *montana*.
viminialis, Lodd. Cat. (1836); ex Lond. Arbor. Brit. iii. 1376 = *campestris*.
virgata, Roxb. Hort. Beng. 21; Fl. Ind. ii. 67 = *parvifolia*.
viscosa, Desf. ex Steud. Nom. ed. I. 862 = *montana*?
vulgaris, Pall. Reise, iii. 314; Dum. Fl. Belg. 25 = *campestris*.
Wallichiana, Planch. in Compt. Rend. Par. lxxiv. (1872) i. 1498 = *seq.*
Wallichii, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 277–8. — Reg. Himal.
Webbiana, Lee, ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 412 = *campestris*.

ULOMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 62 (1836) = *Colea*, Boj. (Bignon.).
Telfairia, Rafin. l. c. = *C. Telfairii*.

ULOPTERA, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 460 = *Ferula*, Tourn. (Umbell.).
macrocarpa, Fenzl, l. c. (= *Ferulago macrocarpa*). — Mesopot.

ULOSPERMUM, Link, Enum. Hort. Berol. i. 267 (1821) = *Capnophyllum*, Gaertn. (Umbell.).
dichotomum, Link, l. c. = *C. dichotomum*.
siculum, Link, Handb. i. 343 = *Hippomarathrum siculum*.
tauricum, Link, l. c. = *Sanicula crithmifolia*.

ULOSTOMA, D. Don, in G. Don, Gen. Syst. iv. 196 (1837) = *Gentiana*, Tonn. *filamentosa*, D. Don, l. c. = *G. filamentosa*.

ULRICIA, Jacq. ex Steud. Nom. ed. I. 862 (1821) = *Lepechinia*, Willd. (Labiata).
pyramidata, Jacq. ex Steud. l. c. = *L. spicata*.

ULTICONA, Rafin. Sylva Tellur. 55 (1838) = *Hebecladus*, Miers (1845) (Solan.).
aspera, Rafin. l. c. = *H. asperns*.
biflora, Rafin. l. c. = *H. biflorus*.
viridiflora, Rafin. l. c. = *H. viridiflorus*.

ULUXIA, Juss. in Dict. Sc. Nat. x. 103 (1818) = *Columellia*, Ruiz & Pav.

ULVA, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 242 (1742) = *Carex*, Dill. (Cyper.).

UMARI, Adans. Fam. ii. 342 (1763) = *Geoffraea*, Linn. (Legumin.).

UMBELLULARIA, Nutt. N. Am. Sylv. 87 (1842).
LAURINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 162.
DRIMOPHYLLUM, Nutt. N. Am. Sylv. 85 (1842).
SCIADIODAPHNE, Reichb. Nom. 70 (1841).

UMBELLULARIA:—

californica, Nutt. N. Am. Sylv. 87. — Am. bor. occ.
parvifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 77. — Mexic.

UMBILICARIA, Pers. Syn. i. 510 (1805) = *Cotyledon*, Tourn. (Crassul.).

UMBILICUS, DC. in Bull. Soc. Philom. (1801) 49 = *Cotyledon*, Tourn. (Crassul.).
affinis, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 72. — Soongar.
Aizoon, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 15. — As. Min.
alpestris, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 354. — Soongar.
botryoides, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 308 = *C. Umbilicus*.
chloranthus, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 768. — Europ. or.; As. Min.
chrysanthus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 15. — As. Min.
deflexus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 324. — Alger.
elymaeticus, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 770. — Persia.
erectus, DC. Fl. Fr. iv. 384 = *C. lusitanica*.
erubescens, Maxim. Prim. Fl. Amur. 114. — Manchur.
fimbriatus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 241 = *C. fimbriata*.
gaditanus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 58. — Alger.
glaber, Regel & Winkler, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 302. — Turkestan.
globulariaefolius, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 15 = *C. globulariaefolius*.
Haussknechtii, Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 774. — Mesopot.
Heylandianus, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 176. — Ins. Canar.
hispidus, DC. Prod. iii. 399 = *C. Mucizonia*.
horizontalis, DC. l. c. 400 = *C. Umbilicus*.
horizontalis, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 258 = *Schmidtii*.
intermedius, Boiss. Fl. Orient. ii. 769. — As. Min.; Persia.
Lampusae, Kotschy, in Unger & Kotschy, Ins. Cypren, 312 = *Sedum Lampusae*.
leucantha, G. Don, Gen. Syst. iii. 113 = *C. leucantha*.
libanoticus, DC. Prod. iii. 399 = *C. libanotica*.
Lievenii, G. Don, Gen. Syst. iii. 113 = *C. Lievenii*.
Lievenii, Ledeb. Fl. Ross. ii. 173. — Persia; Sibir.
linearifolius, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1853) 290. — Turkestan.
lineatus, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 14. — Palaestin.
lineolatus, Boiss. Fl. Orient. ii. 769 = *intermedius*.
linifolius, Rupr. Sert. Tiansch. 46. — As. centr.
luteus, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 62. t. 73 = *C. Oreades*.
luteus, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 177. — Ins. Canar.
malacophyllus, DC. Prod. iii. 400 = *C. malacophylla*.
mexicanus, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 409 = *C. mexicana*.
micranthus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 325. — Alger.
microstachyum, Kotschy, in Unger & Kotschy, Ins. Cypren, 311 = *Sedum microstachyum*.
multicaulis, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 93 = *C. Lievenii*.
oppositifolius, Ledeb. Fl. Ross. ii. 176. — Reg. Canc.
Oreades, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 62 = *C. Oreades*.
oxypetalus, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 15 = *tropaeoifolius*.
pallidus, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 229 = *chrysanthus*.
paniculatus, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 583. — Kokania.
parviflorus, Boiss. Fl. Orient. ii. 768. n. 2 = *Sprunerianus*.
parviflorus, Boiss. l. c. n. 3 = *chloranthus*.
parviflorus, DC. Prod. iii. 400 = *C. parviflora*.
patens, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 324. — Alger.
patulus, Pomel, l. c. 323. — Alger.
pendulinus, DC. Pl. Grass. t. 162 = *C. Umbilicus*.
persicus, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 14. — Persia.
Pestalozzae, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 96. — As. Min.
platyphyllus, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 71. — Persia; Soongar.
pubescens, G. Don, Gen. Syst. iii. 111 = *Sedum pilosum*.
pulvinatus, Rupr. Sert. Tiansch. 47. — Turkestan.

UMBILICUS:—

radicans, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 143 = *Sedum rosulatum*.
radiciflorus, Steud. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 772 = *libanoticus*.
ramosissimus, Maxim. Prim. Fl. Amur. 472 = *Cotyledon fimbriata*.
samius, DC. Prod. iii. 399 = *C. samia*.
Schmidtii, Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 245. — Ins. Canar.
sedoides, DC. Prod. iii. 400 = *C. sedoides*.
Semenovii, Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxix. (1866) ii. 65. — As. temp.
semiensis, J. Gay, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 308 = *C. simensis*.
Sempervivum, DC. Prod. iii. 399 = *C. Sempervivum*.
sessilis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 326 = *C. sedoides*.
serratus, DC. Prod. iii. 400 = *C. serrata*.
simplex, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 41 = *C. Umbilicus*.
spathulatus, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 92 = *C. spathulata*.
spinosis, DC. Prod. iii. 400 = *C. spinosa*.
Sprunerianus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 57. — Graecia.
stamineus, Ledeb. Fl. Ross. ii. 174. — Sibir.
subulatus, G. Don, Gen. Syst. iii. 112 = *Sedum subulatum*.
thyrsiflorus, DC. Prod. iii. 400 = *C. leucantha*.
tropaeolifolius, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 14. — Persia.
tuberculosis, DC. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 729 = *C. tuberculosa*.
turkestanicus, Regel & Winkl. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 301. — Turkestan.
Winkleri, Willk. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. i. (1883) 269. — Europ.

UMSEMA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = *Pontederia*, Linn.
mucronata, Rafin. l. c. = *P. cordata*.
obtusifolia, Rafin. l. c. = *P. cordata*.

UNANNEA, Steud. Nom. ed. II. ii. 729 (1841), sphalm. = seq.

UNANUEA, Ruiz & Pav. Ic. Fl. Per. Ined.; ex Benth. in DC. Prod. x. 380 (1846) = *Stemodia*, Linn. (Scrophnl.).
febrifuga, Ruiz & Pav. l. c.; ex Benth. l. c. 382 = *S. suffruticosa*.

UNCARIA, Burch. Trav. i. 536 (1822) = *Harpagophytum*, DC. (Pedal.).
procumbens, Burch. l. c. = *H. procumbens*.

UNCARIA, Schreb. Gen. i. 125 (1789). *RUBIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 31.
AGYLOPHORA, Neck. Elem. i. 145 (1790).
OUROPARIA, Aubl. Pl. Gui. i. 177. t. 68 (1775), nomen prius.

UNCINARIA, Reichb. Nom. 230 (1841).
acida, [Hook. f. & Thoms.] ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 31 = *dasyoneura*.
acida, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 520. — Ins. Penang.

aculeata, Willd. in Usteri, Delect. Opusc. Bot. ii. (1793) 200 = *guianensis*.
africana, G. Don, Gen. Syst. iii. 471. — Afr. trop.
appendiculata, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 222. — N. Guin.

attenuata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 170. t. 34. — Malaya.

brevispina, Maing. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 31 = *dasyoneura*.

callophylla, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 170. — Borneo.

canescens, Korth. l. c. 172. — Malaya.

cirrhiiflora, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 520 (Quid?). — Malaya.

dasyoneura, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 169. — Malaya; Zeylan.

elliptica, R. Br. in Wall. Cat. n. 6104 = *dasyoneura*.

eumecocarpa, Korth. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 143 = *pedicellatum*.

eurhyncha, Miq. l. c. Suppl. 539. — Ins. Banca.

ferrea, DC. Prod. iv. 348. — Malaya.

ferrea, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 105 = *Hookeri*.

ferruginea, DC. Prod. iv. 348 = *pedicellata*.

ferruginea, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 69 = *sclerophylla*.

VOL. II.

UNCARIA:—

florida, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 176. — Ins. Philipp.
Gambier, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 517. — Malaya.
Gambier, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 138 = *dasyoneura*.
Gambier, Wall. Cat. n. 6103 C, partim = *attenuata*.
glabrata, DC. Prod. iv. 348. — Java.
glabrata, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 105 = *florida*.
guianensis, F. F. Gmel. Syst. 370. — Guian.
Hallii, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 165. t. 33 = *pedicellata*.
homomalla, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 343. — Ind. or.; Malaya.
Hookeri, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 177. — Ins. Philipp.
Horsfieldiana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 151 = *ferrea*.
inermis, Willd. in Usteri, Delect. Opusc. Bot. ii. (1793) 199. t. 3 = *Mitragyna africana*.
insignis, DC. Prod. iv. 348 = *sclerophylla*.
jasminiflora, Wall. Cat. n. 6103 C, F. — Malaya.
laevigata, Wall. l. c. 6111. — Reg. Himal.; Burma.
lanosa, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 131. — Malaya.
Lobbii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 33. — Singapore.
macrophylla, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 132. — Reg. Himal.
nemorosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 166. — Sumatra.
ovalifolia, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 519. — Malaya.
ovata, R. Br. in Wall. Cat. n. 6112, partim. — Malaya.
paucinervis, Teysm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 117. — Java.
pedicellata, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 520. — Malaya.
pilosa, Roxb. ll. cc. 86; 520. — Reg. Himal.; Burma.
pilosa, Wall. Cat. n. 6108 C = *homomalla*.
pteropoda, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 343. — Malaya.
rhynchophylla, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 108 = *Nauclaea rhynchophylla*.
Roxburghiana, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 172. — Malaya.
Roxburghii, Korth. Obs. Naocl. Ind. 17 = *prae*.
sclerophylla, DC. in Deless. Ic. Sel. iii. 48. t. 81 = *attenuata*.
sclerophylla, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 520. — Burma; Malaya.
sclerophylla, Wall. Cat. n. 6105 = *pedicellata*.
sessilifolia, Roxb. in Wall. l. c. n. 6107 = *macrophylla*.
sessilifolius, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 520. — Reg. Himal.; Burma.
setiloba, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 223. — Java.
speciosa, Wall. Cat. n. 6106 = *sclerophylla*.
spinosa, Raeusch. Nom. ed. III. 55 = *guianensis*.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 129. — Guian.
tomentosa, DC. Prod. iv. 349. — N. Granat.
Wallichii, Korth. Obs. Naocl. Ind. 17, nomen (Quid?). — Ind. or.

UNCARIOPSIS, Karst. in Linnaea, xxx. (1859-60) 152; Fl. Columb. i. 181. t. 90 (1861?). *RUBIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 67.
suaveolens, Karst. ll. cc. — N. Granat.

UNCIFERA, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 39. *ORCHIDAEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 579.

acuminata, Lindl. l. c. 40. — Reg. Himal.

heteroglossa, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) ii. 234. — Hab.?

obtusifolia, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 40. — Reg. Himal.

UNCINA, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iv. (1833) 234, sphalm. = *Uncinia*, Pers. (Cyperac.).

UNCINARIA, Reichb. Nom. 230 (1841) = *Uncaria*, Schreb. (Rubiace.).

UNCINIA, Pers. Syn. ii. 534 (1807). *CYPERA-CEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1072.

affinis, Colenso, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 392 = *riparia*.

alopecuroides, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xv. (1883) 335 = *australis*.

angusta, Nees, in Linnaea, ix. (1835-36) 305 = *Douglasii*.

UNCINIA:—

angustata, Boeck. in Linnaea, xli. (1877) 347, in syn. = *Douglasii*.
australis, R. Br. Prod. 241, in obs. = *leptostachya*.
australis, Pers. Syn. ii. 534. — N. Zel.; Ins. Pacif.
Banksii, Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel. i. 287 = *riparia*.
bella, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 204 = *macrophylla*.
bractata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 341 = *australis*.
brevicaulis, Thou. Fl. Trist. Acugna, 35. t. 6. — Ins. Tristan da Cunha.
breviculmis, Carmich. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 508 = *brevicanlis*.
brevisetia, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 428 = *Carex filifolia* (cf. Addend.).
caespitosa, Colenso, ex Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel. i. 287. — N. Zel.
Cheesemanniana, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 521 = *compacta*.
chlorostachya, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 275 = *phleoides*.
compacta, R. Br. Prod. 241. — Reg. temp.; Austral.
compacta, A. Rich. Voy. Astrolab. Bot. 118 = *australis*.
Cumingii, Nees, in Linnaea, ix. (1835-36) 305 = *phleoides*.
debiliior, F. Muell. Fragm. viii. 151 = *filiformis*.
De-la-Costa, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 52 = *macloviana*.
digyna, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 244 = *Carex parasitica* (in Addend.).
distans, Colenso, ex Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel. i. 286 = *leptostachya*.
divaricata, Boott, in Hook. f. l. c. = *compacta*.
Douglasii, Boott, in Hook. f. Fl. Antarct. ii. 369. — Ins. J. Fernand.
Durvillei, Steud. Syn. Pl. Cyp. 243 = *trichocarpa*.
erinacea, Pers. Syn. ii. 534. — Am. austr.
europaea, J. Gay, in Flora, x. (1827) 26 = *Carex microglochis*.
fernandesiana, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xli. (1877) 347, in syn. = *Douglasii*.
ferruginea, Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel. i. 288. t. 64 B = *australis*.
filifolia, Nees, in Neuwied, Reise Nord-Amer. ii. 450 = *Carex filifolia*? (cf. Addend.).
filiformis, Boott, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 392 = *riparia*.
filiformis, Colenso, ex Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel. i. 286. — Austral.; N. Zel.
Galeottii, Boott, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 400 = *mexicana*.
gracilis, Decne. in Bot. Voy. Astrolab. et Zélée, ii. t. 6. fig. B = *tenuis*.
gracilis, Thou. Fl. Trist. Acugna, 35. t. 5 = *brevicaulis*.
Hookeri, Boott, in Hook. f. Fl. Antarct. 91. t. 51 = *rupestris*.
Hookeri, Colenso, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 395 = *compacta*.
horizontalis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xv. (1883) 334 = *caespitosa*.
jamaicensis, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 272 = *mexicana*.
jamaicensis, Pers. Syn. ii. 534. — Am. trop.
Kingii, R. Br. ex Boott, in Hook. f. Fl. Antarct. ii. 370. t. 145. — Chili.
lasiocarpa, Steud. ex Boeck. in Linnaea, xli. (1877) 349 = *phleoides*.
laxiflora, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 271 = *riparia*.
Lechleriana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 244. — Reg. Magellan.
Lehmannii, Nees, in Linnaea, x. (1836) 206 = *Carex Lehmannii*.
leptostachya, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 274 = *trichocarpa*.
leptostachya, Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 116 (Choix Pl. N. Zel. 12. t. 5 B). — N. Zel.
Lindleyana, Kunth, Enum. Pl. ii. 526 = *australis*.
longearistata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 243 = *erinacea*.
longifolia, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 226. t. 72. f. 1 = *phleoides*.
longifolia, Kunth, Enum. Pl. ii. 527 = *erinacea*.
longifolia, Phil. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 399 = *phleoides*.
longispica, Boeck. in Flora, xli. (1858) 650 = *phleoides*.

7 G

UNCINIA:—

- macloviana, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 412.—Ins. Falkland.
macrolepis, Decne. [et Hombron] in Bot. Voy. Astrolab. et Zélee, 13. t. 6. f. A = *Lechleriana*.
macrophylla, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 244.—Chili.
macrostachya, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 229. t. 72. f. 2 = *multifaria*.
mexicana, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 243.—Mexic.
microglochis, Spreng. Syst. iii. 830 = *Carex microglochis*.
montana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1865) II. 322.—Chili.
Montteana, Phil. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 205 = *phleoides*.
Moseleyana, Boeck. in *Flora*, lxi. (1878) 170 = *compacta*.
multifaria, Nees, ex Boott, in *Hook. f. Fl. Antarct.* ii. 369.—Chili.
nepalensis, Nees, in Wight, Contrib. 129 = *Carex linearis*.
nerosa, Boott, in *Hook. f. Fl. Tasman.* ii. 102. t. 153 = *compacta*.
nigra, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 253 = *australis*.
obtusata, Colenso, l. c. xvi. (1884) 341.—N. Zel.
phalaroides, Boott, ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 396 = *macrophylla*.
phalaroides, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 202 = *Carex phalaroides*.
Philippii, Hohen. ex *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 243 = *erinnacea*.
phleoides, C. A. Mey. in *Bull. Acad. Brux.* ix. (1842) 249 = *mexicana*.
phleoides, *Pers. Syn.* ii. 534.—Chili.
phyllostachya, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 201 = *Carex seticulmis*.
purpurata, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 272.—N. Zel.
rigida, Boeck. in *Flora*, lxxv. (1882) 64 = *brevicaulis*.
rigida, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 271 = *rubra*.
rigidula, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 245 = *australis*.
riparia, R. Br. *Prod.* 241.—Austral.; N. Zel.
riparia, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 417 = *rupestris*.
rubra, Colenso, ex Boott, in *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 287. t. 64 A.—N. Zel.
rupestris, *Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 117; (*Choix Pl. N. Zel.* 13. t. 5. f. A).—N. Zel.
scaberrima, Nees, in *Linnaea*, ix. (1835–36) 305 = *australis*.
scabra, Colenso, ex Boott, in *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 285 = *leptostachya*.
Sellowiana, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 201 = *Carex Sellowiana*.
Sinclairii, Boott, ex *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 309.—N. Zel.
spartea, Nees, in *Linnaea*, x. (1836) 205.—Afr. austr.
spartea, Spreng. Syst. iii. 830 = *praec.*?
Sprengelii, Nees, in *Linnaea*, x. (1836) 205 = *Carex Sprengelii*.
tenella, R. Br. *Prod.* 241.—Austral.
tenuis, *Poepp. ex Kunth, Enum. Pl.* ii. 525.—Chili.
trichocarpa, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 227. t. 72. f. 3 = *phleoides*.
trichocarpa, C. A. Mey. *Cyp. Nov.* 11. t. 4.—Chili.
Urvillei, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 243 = *trichocarpa*.

UNCINUS, *Raesch. Nom. ed. III.* 63 (1797), sphalm. = ONCINUS, *Lour.* = *Melodinus*, *Forst.* (Apocyn.).

UNEDO, Hoffm. & Link, *Fl. Port.* i. 415 (1809) = *Arbustus*, *Tourm.* (Ericac.).
edulis, Hoffm. & Link, l. c. = A. Unedo.

UNGERIA, Nees, ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 34 = *Cyperus*, Mich.
monocephala, Nees, ex C. B. Clarke, l. c. = C. Cephalotes.

UNGERIA, Schott & Endl. *Melet.* 27. t. 4 (1832). *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 219.
floribunda, Schott & Endl. l. c.—Ins. Norfolk.

UNGERNIA, Bunge, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlix. (1875) II. 271. *AMARYLLIDAE*, Benth. & Hook. f. iii. 721.
flava, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* v. 149.—Persia.

UNGERNIA:—

- Oldhami, *Maxim. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 76.—Japan.
trispheara, Bunge, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlix. (1875) II. 273.—Persia.

UNGNADIA, Endl. *Atakt.* t. 36 (1834). *SAPINACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 398.

- heptaphylla*, Scheele, in *Linnaea*, xxii. (1849) 352 = *speciosa*.
heterophylla, Scheele, l. c. xxi. (1848) 589 = *speciosa*.
speciosa, Endl. *Atakt.* t. 36; *Nov. Stirp. Dec.* 86.—Texas.

UNGUACHA, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) 103 = *Strychnos*, Linn. (Logan).
simiarum, Hochst. l. c. = S. Unguacha.

UNIFOLIUM, Hall. *Enum. Stirp. Helv.* i. 288 (1742) = *Maianthemum*, Weber (Liliac.).
quadrididum, All. *Fl. Pedem.* i. 124 = M. *Convallaria*.

UNIOLA, Linn. *Gen. ed. I.* 353 (1737). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1192.

- CHASMANTHIUM*, Link, *Hort. Berol.* i. 159 (1827).
NEVROCTOLA, Rafin. *Neogenyt.* 4 (1825).
TRISOLA, Rafin. *Fl. Ludov.* 144 (1817).
TRIUNILA, Rafin. *Neogenyt.* 4 (1825).
bipinnata, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 104 = *Eragrostis cynosuroides*.
borbonica, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 281.—Ins. Borbon.
capensis, *Steud.* in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. (1831) 360 = *Eragrostis Uniola*.
ciliata, Beauv. *Agrost.* 75 (Quid?).—Hab.?
distichophylla, Labill. *Nov. Holl. Pl.* i. 21. t. 24 = *Distichlis maritima*.
flexuosa, Buckl. in *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1862 (1863) 99 = *Distichlis maritima*.
gracilis, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 71.—Am. bor.
indica, Spreng. Syst. i. 349 = *Eragrostis unioides*.
intermedia, Bosc, ex Beauv. *Agrost.* 75.—Am. bor.
Jardinii, *Steud. ex Jard. Herb. Côte Occ. Afr.* 8, nomen; *Steud. Syn. Pl. Gram.* 281.—Afr. trop.
lappacea, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. (1831) 358 = *Centothea lappacea*.
latifolia, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 71.—Am. bor.
maritima, Michx. l. c. = *Distichlis maritima*.
mucronata, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 104 = *Eragrostis mucronata*, Benth. & Hook. f. (in Addend.).
multiflora, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc.* v. (1837) 148 = *Distichlis maritima*.
nitida, Baldw. ex Ell. *Sketch.* i. 167 = *sessiliflora*.
ornithoryncha, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 280.—Am. bor.
paniculata, Linn. *Sp. Pl.* 71.—Am. bor.
paniculata, Roth, *Neue Beytr.* i. 98 = *latifolia*.
prostrata, Trin. in *Bull. Sc. Acad. Pétersb.* i. (1836) 68 = *Distichlis prostrata*.
pungens, Beauv. *Agrost.* 75 = *Sporobolus pungens*.
pungens, Rupr. ex Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 234 = *Distichlis maritima*.
racemiflora, Trin. in *Bull. Sc. Acad. Pétersb.* i. (1836) 68.—Ins. S. Doming.
scoparia, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 281 = *Poa scoparia*.
sessiliflora, *Poir. Encyc.* viii. 185.—Am. bor.
simplex, Trin. ex *Steud. Nom. ed. II.* ii. 730 (Quid?).—Hab.?
sparta, Trin. in *Linnaea*, x. (1836) 307.—Cuba.
spicata, Linn. *Sp. Pl.* 71 = *Distichlis maritima*.
stricta, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, i. (1824) 155 = *Distichlis maritima*.
thalassica, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. (1831) 359 = *Distichlis maritima*.
virgata, Bartr. ex Schult. Syst. ii. 595 = *gracilis*.
virgata, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 531 = *racemiflora*.

UNISEMA, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1819) 192; et in *Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 261 = *Pontederia*, Linn.

- acutifolia*, Rafin. *Med. Fl.* ii. 107 = P. cordata.
deltifolia, Rafin. l. c. 105.—Am. bor.
heterophylla, Rafin. l. c. 108.—Am. bor.
lancifolia, Rafin. *Atl. Journ.* 178 = P. cordata.
latifolia, Rafin. *Med. Fl.* ii. 107.—Am. bor.
media, Rafin. l. c.—Am. bor.
mucronata, Rafin. l. c. = P. cordata.
obliquata, Rafin. l. c.—Am. bor.
obtusifolia, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1819) 350 = P. cordata.

UNISEMA:—

- orbiculata*, Rafin. *Med. Fl.* ii. 108 = *Pontederia rotundifolia*.
peduncularis, Rafin. *New Fl. Am.* ii. 75 = P. cordata.
Purshiana, Rafin. *Med. Fl.* ii. 107 = P. cordata.
rotundifolia, Rafin. l. c. 108.—Am. bor.
sagittata, Rafin. *Fl. Ludov.* 18 (= *Sagittaria cerulea*).—Am. bor.

UNJALA, Blume, *Cat. Gew. Buitenz.* 56 (1823) = *Heptapleurum*, Gaertn. (Araliac.).

- bipinnata*, Reinw. ex Blume, l. c.—Java.
decomposita, Reinw. ex Blume, l. c.—Java.
longifolia, Reinw. ex Blume, l. c. = H. longifolium.
Rheedii, Reinw. ex Blume, l. c. (*Rhedii*) = H. tomentosum, polybotryum, scandens, rigidum.
serrata, Reinw. ex De Vriese, *Pl. Ind. Bat. Or.* 89 = H. serratum.

UNONA, Linn. *f. Suppl.* 270 (1781). *ANONACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 24.

- ANCANA, F. Muell. *Fragm.* v. 27. t. 35 (1865).
 DESMOS, *Lour. Fl. Cochinch.* 352 (1790).
 MEIOGYNE, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 12 (1865–66).
 MELODORUM, *Lour. Fl. Cochinch.* 351 (1790).
acuminata, DC. *Syst. i.* 488.—Guian.
acuta, *Zoll. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 11.—Java.
acutiflora, *Dun. Monog. Anon.* 116. t. 22 = *Xylopia acutiflora*.
aethiopica, *Dun. l. c.* 113 = *Xylopia aethiopica*.
Alphonsii, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 730.—Cuba.
Alphonsii, *Wall. Cat. n.* 6426 = U. *Dasymaschala*.
altissima, *Russ. ex Wall. Cat. n.* 6442 = *Polyalthia longifolia*.
ambongoensis, *Baill. Adansonia*, viii. (1867–68) 350.—Madag.
Amherstiana, *Wall. ex DC. Mém. Anon.* 28; *Wall. Cat. n.* 6424 = *discolor*.
Ancana, F. Muell. *Fragm.* v. 27.—Austral.
aromatica, *Dun. Monog. Anon.* 112 = *concolor*.
asiatica, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 730 = *pannosa*.
biglandulosa, Blume, *Bijdr.* 16 = *discolor*.
Boivini, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1882) 339 = *Popowia Boivini*.
borneensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 11.—Borneo.
Brandisana, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 19.—Burma.
Cabog, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 466 = U. *Desmos*.
caffra, E. Mey. ex C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 53 = *Guatteria caffra*.
camphorata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 468 = *Uvaria dulcis*.
Cananga, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 215.—Java.
Candolleana, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 730 = U. *Dasymaschala*.
carminativa, *Arruda, Diss.* (1810) 48 = *Xylopia sericea*.
cauliflora, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 323 = *Melodorum fulgens*.
cauliflora, *Hook. f. & Thoms. Fl. Ind.* i. 137 = *Polyalthia cinnamomea*.
cerasoides, *Baill. Hist. Pl.* i. 272 = *Polyalthia cerasoides*.
Chapelieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1882) 338 = *Polyalthia Chapelieri*.
chinensis, DC. *Syst. i.* 495 = *discolor*.
chloroxantha, *Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 17 (= *Monoon chloroxanthum*).—N. Guin.
clavata, Reinw. ex Blume, *Fl. Jav. Anon.* 66 = *Xylopia javanica*.
cochinchinensis, DC. *Syst. i.* 495 = U. *Desmos*.
coelophloeae, *Scheff. in Flora*, lii. (1869) 300.—Malaya.
concinna, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 28.—Cochinch.
concolor, *Willd. Sp. Pl.* ii. 1271.—Guian.
cordifolia, *Roxb. ex Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 59 (sphalm. pro *Uvaria*) = *discolor*.
Corinthis, *Baill. Hist. Pl.* i. 272 = *Polyalthia Korinti*.
corniculata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 469 = *Artabotrys suaveolens*.
corticosa, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 20.—Cochinch.
costata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 376.—Sumatra.
crassipetala, *Dun. Monog. Anon.* 101. t. 24.—Guian.
crinita, *Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 61.—Malacca.
cubensis, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 730.—Cuba.

UNONA:—

Dasyaschala, Blume, *Fl. Fav. Anon.* 55. t. 27. —Burma; Malaya.
debilis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 29. —Cochinch.
dehiscens, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 466 = *Xylopia* Blancoi.
desmantha, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 61. —Reg. Himal.; Malaya.
Desmos, *Raesch.* *Nom.* ed. III. 161; *Dun. Monog. Anon.* 112. —Reg. Himal.; Malaya.
discolor, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 63. t. 36. —As. trop.
discolor, Wall. *Cat. n.* 6420 D, E = U. *Desmos*.
discreta, Linn. f. *Suppl.* 270. —Guian.
diversifolia, Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 163. —Ins. Timor.
dumetorum, *Dun. Monog. Anon.* 116. —Cochinch.
dumosa, Roxb. *Hort. Beng.* 43; *Fl. Ind.* ii. 670. —Ind. or.; Malaya.
Dunali, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 131, partim = *discolor*.
Dunali, Wall. *Cat. n.* 6425. —Burma; Malaya.
elegans, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 398. —Zeylan.
elliptica, Blume, *Bijdr.* 15 = *Polyalthia elliptica*.
erecta, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 31. —Cochinch.
esculenta, *Dun. Monog. Anon.* 107 = *Artabotrys odoratissimus*.
fasciculata, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 730 = *Polyalthia simiarum*.
ferruginea, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 35. —Afr. trop.
Fitzgeraldii, F. Muell. *Fragm.* vi. 1 = *Fitzgeraldia mitrastigma*.
flagellaris, Becc. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* iii. (1871) 186. —Borneo.
fuminensis, Vell. *Fl. Flum.* v. t. 121 = *Xylopia sericea*.
fulgens, Labill. *Sert. Anstro-Caled.* 57. t. 56 = *Polyalthia nitidissima*.
fulva, Wall. *Cat. n.* 6427 = U. *Desmos*.
furfuracea, A. DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève.* v. (1832) 205 (*Mém. Anon.* 29). —Madag.
fusca, DC. *Syst.* i. 488. —Guian.
Gerrardi, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 540. —Madag.
glauca, Zipp. in *Alg. Konst.-en Letter-Bode*, i. (1829) 297, nomen. —Malaya.
glaucocarpa, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 339 = *Popowia glaucocarpa*.
grandiflora, Leschen. ex DC. *Prod.* i. 90 = *Uvaria purpurea*.
Greveana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 339. —Madag.
hamata, Blume, *Bijdr.* 15 = *Artabotrys odoratissimus*.
Hancei, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 32. —Cochinch.
Harmandii, Pierre, l. c. t. 24. —Cochinch.
heterocarpa, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. ii. 41. —Java.
hirsuta, Benth. in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 469. —Afr. trop.
humilis, Blume, *Bijdr.* 17 = *Uvaria humilis*.
jucunda, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 25. —Cochinch.
Kentii, Blume, *Bijdr.* 16 = *Melodorum Kentii*.
laevigata, Wall. *Cat. n.* 6428 (= *Roxburghiana*?). —Ind. or.
latifolia, *Dun. Monog. Anon.* 115. —Ins. Molucc.
latifolia, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 60 = *Brandisiana*.
Lawii, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 132. —Ind. or.
Leichhardtii, F. Muell. *Fragm.* iii. 41 = *Melodorum Leichhardtii*.
lepidota, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 36. —Afr. trop.
leptopetala, *Dun. Monog. Anon.* 114 = *Cananga odorata*.
Lessertiana, *Dun. l. c.* 107. t. 26 = *discolor*.
ligularis, *Dun. l. c.* 110. —Ins. Amboin.
littoralis, Blume, *Bijdr.* 16 = *Uvaria littoralis*.
longiflora, Roxb. *Hort. Beng.* 43; *Fl. Ind.* ii. 668. —Reg. Himal.
longiflora, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 730, sphalm. —Cf. *longifolia*.
longifolia, *Dun. Monog. Anon.* 109 = *Polyalthia longifolia*.
longifolia, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 730, sphalm. = *Uvaria longifolia*.
lucida, Boj. *Hort. Maurit.* 6 = *Uvaria lucida*.
lucida, DC. *Syst.* i. 498 = *Xylopia longifolia*.
lucidula, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 35. —Afr. trop.
luensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 30. —Cochinch.
macrocarpa, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 339 = *Popowia macrocarpa*.

UNONA:—

macrocarpa, Vahl, ex DC. *Syst.* i. 489 = *Uvaria* *Chamae*.
macrophylla, Blume, *Bijdr.* 17 = *Goniothalamus macrophyllus*.
Marenteria, DC. *Syst.* i. 487 = *Uvaria Marenteria*.
maritima, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 339 = *Polyalthia maritima*.
Mesnyi, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 17. —Malacca; Siam.
micrantha, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. ii. 43. —Java.
modesta, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 28. —Cochinch.
mollissima, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 162 = *Uvaria timorensis*.
monilifera, DC. *Prod.* i. 91, sphalm. = *discreta*.
moniliformis, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 731 (sphalm. pro *Uvaria monilifera*) = *discolor*.
monosperma, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* sub t. 18 = *Cananga monosperma*.
Musaria, *Dun. Monog. Anon.* 100. —Ins. Molucc.
Narum, *Dun. l. c.* 99 = *Uvaria Narum*.
nitens, F. Muell. *Fragm.* iii. 2 = *Polyalthia nitidissima*.
nitidissima, *Dun. Monog. Anon.* 109. t. 23 = *Polyalthia nitidissima*.
obovata, Benth. in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 469. —Afr. trop.
obtusiflora, DC. ex *Dun. Monog. Anon.* 102. —Guian.
odorata, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 325 = U. *Desmos*.
odorata, *Dun. Monog. Anon.* 108 = *Cananga odorata*.
odoratissima, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 730 (sphalm. pro *Uvaria*) = *Artabotrys odoratissima*.
Oliveriana, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 307. —Afr. trop.
ossea, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 467 = *discolor*.
ovata, Vahl, ex DC. *Syst.* i. 489 = *Uvaria ovata*.
oxypetala, DC. l. c. 496 = *Xylopia acutiflora*?
pachypetala, Spreng. *Syst.* ii. 637 = *crassipetala*.
pannosa, Dalz. in *Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 207. —Ind. or.
parviflora, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 730 = *Xylopia Dunaliana*.
parvifolia, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 36. —Afr. trop.
pedunculosa, A. DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève.* v. (1832) 204 (*Mém. Anon.* 28) = U. *Desmos*.
penduliflora, *Dun. Monog. Anon.* 100. t. 28 = *Cymbopetalum penduliflorum*.
pilosa, Boiv. ex Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 322 = *Popowia pilosa*.
polycarpa, DC. *Syst.* i. 499 = *Xylopia polycarpa*.
praecox, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 136. —Reg. Himal.
pycnantha, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 60 (*Polyalthia* sp.). —Malacca.
pygmaea, Walp. *Rep.* i. 79, sphalm. = *Asimina pygmaea*.
Richardiana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 339 = *Polyalthia Richardiana*.
rigida, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 163, nomen. —Ins. Timor.
Roxburghiana, Wall. *Cat. snb n.* 6428 A = *Oxymitra fornicata*.
Roxburghiana, Wall. l. c. B = *discolor*.
selanica, DC. *Prod.* i. 92. —Ins. Molucc.
sempervivens, Baill. *Hist. Pl.* i. 272 (*Polyalthia* sp.). —As. trop.
setigera, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 323 = *Uvaria purpurea*.
simiarum, Baill. ex Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 23 = *Polyalthia simiarum*.
stenopetala, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 136. —Singapore.
suaveolens, Blume, *Bijdr.* 17 = *Artabotrys suaveolens*.
subbiglandulosa, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 11. —Borneo.
subcordata, Blume, *Bijdr.* 15 = *Polyalthia subcordata*.
subglandulosa, Walp. *Ann.* vii. 54, sphalm. = *subbiglandulosa*.
sumatrana, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 377. —Sumatra.
sylvatica, *Dun. Monog. Anon.* 115. —Cochinch.
Thorelii, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 22. —Cochinch.
tomentosa, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1271 = U. *Desmos*.
tripetala, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 324, sphalm. = seq. *tripetala*, DC. *Prod.* i. 90 = seq.
tripetaloides, *Dun. Monog. Anon.* 104. —Java.
tristis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 27. —Cochinch.
uncinata, *Dun. Monog. Anon.* 105. t. 12 = *Artabotrys odoratissimus*.
undulata, *Dun. l. c.* 111. —Afr. trop.

UNONA:—

undulata, Wall. *Pl. As. Rar.* iii. 42. t. 265 = *discolor*.
uniflora, Baill. *Adansonia*, viii. (1868) 327, sphalm. = *Duguetia Candollei*.
velutina, Blume, ex Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 130, sphalm. = *Cananga odorata*.
velutina, Hance, in *Journ. Bot.* xv. (1877) 328. —Cambodia.
verrucosa, Becc. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* iii. (1871) 185. —Borneo.
violacea, *Dun. Monog. Anon.* 105. t. 25. —Mexic.
virgata, Blume, *Bijdr.* 14 = *Cananga virgata*.
viridiflora, Bedd. *l. c.* *Pl. Ind. Or.* i. 34. —Ind. or.
viridiflora, Splitg. in *Nederl. Kruiddk. Arch.* i. (1848) 224. —Guian.
xylopioides, *Dun. Monog. Anon.* 117. t. 21. —Venezuela.
zeylanica, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 132. —Zeylan.
UNXIA, Bert. ex Colla, in *Mem. Acc. Torin.* xxxviii. (1835) 37. t. 32 = *Blennosperma*, Less. (*Compos.*).
anthemidifolia, Phil. f. *Cat. Pl. Vasc. Chil.* 156, 187, sphalm. = seq.
anthemifolia, Bert. ex Colla, in *Mem. Acc. Torin.* xxxviii. (1835) 38 = B. *chilense*.
UNXIA, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 279. tt. 401, 402 (1820) = *Villanova*, Lag. (*Compos.*).
achillaeoides, Less. in *Linnaea*, v. (1830) 159 = V. *achillaeoides*.
alternifolia, Spreng. *Syst.* iii. 620 = V. *alternifolia*.
anemonifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 279. t. 402 = V. *oppositifolia*.
dissecta, Hook. *Bot. Misc.* ii. (1831) 227 = V. *dissecta*.
pratensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 279. t. 401 = V. *oppositifolia*.
UNXIA, Linn. f. *Suppl.* 56 (1781) = *Melampodium*, Linn. (*Compos.*).
achillaeoides, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 145 = M. *achillaeoides*.
camphorata, Linn. f. *Suppl.* 368 = M. *camphoratum*.
digyna, Steetz, in *Seem. Bot. Voy. Herald.* 154. t. 30 = M. *digynum*.
hirsuta, Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 112 (err. typ. 105) = M. *camphoratum*.
UPATA, Adans. *Fam.* ii. 201 (1763) = *Avicennia*, Linn. (*Verben.*).
UPOPION, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 29 (1836) = *Thaspium*, Nutt. (*Umbell.*).
cordatum, Rafin. l. c. 31 = T. *trifoliatum*.
heterophyllum, Rafin. l. c. = T. *trifoliatum*.
lobatum, Rafin. l. c. 30. —Am. bor.
pinnatum, Rafin. l. c. = T. *trifoliatum*.
trifoliatum, Rafin. l. c. = T. *trifoliatum*.
UPUDALIA, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 66 (1836) = *Daedalea*.
canthus, T. Anders. (1864) (*Acanth.*).
pulchella, Rafin. l. c. = D. *nervosa*.
URACHNE, Trin. *Fund. Agrost.* 109 (1820) = *Oryzopsis*, Michx. (*Gramin.*).
acutigluma, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 121. —Japon.?
aemulans, Steud. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 52. —Chili.
asperifolia, Trin. *Gram. Unifl.* 174 = O. *asperifolia*.
brevicaudata, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat.* iii. (1835) 127 = O. *parviflora*.
canadensis, Torr. & Gray, ex Trin. & Rupr. l. c. v. (1842) 17 = O. *parviflora*.
chilensis, Trin. l. c. iii. (1835) 123 (= *Nassella chilensis*). —Chili.
coerulescens, Trin. *Fund. Agrost.* 110 = O. *coerulescens*.
comosa, Trin. *Gram. Unifl.* 175 (= *Piptatherum miliaceum*). —Europ. austr.
depressa, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 123. —Chili.
Fieldingii, C. Muell. in *Bot. Zeit.* xix. (1861) 342. —Hab.?
frutescens, Link, *Hort. Berol.* i. 93 (= *Piptatherum miliaceum*). —Europ. austr.
fusca, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 123. —Chili.
gigantea, Steud. l. c. —Chili.
grandiflora, Steud. & Hochst. ex Steud. l. c. 124 = *Stipa megalantha*.
grandiflora, Trin. *Gram. Unifl.* 174 = O. *holciformis*.
Haenkeana, Trin. & Rupr. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat.* v. (1842) 20. —Peruv.

URACHNE:—

- holciformis*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 439 = *Oryzopsis holciformis*.
laevis, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 20.—Peruv.
lanata, Trin. l. c. iii. (1835) 126 = *O. cuspidata*.
leucosperma, Link, Hort. Berol. i. 94 = *O. asperifolia*.
Linnaei, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 13 = *O. paradoxa*.
longiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 731.—Chili.
macrathera, Steud. Syn. Pl. Gram. 123 = *trichotoma*.
major, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 21.—Chili?
megalantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 731 = *Stipa megalantha*.
melanosperma, Link, Hort. Berol. i. 94 = *O. melanocarpa*.
Meyeniana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 20.—Peruv.
micrantha, Trin. & Rupr. l. c. 16 = *O. micrantha*.
molinioides, Steud. Syn. Pl. Gram. 122 = *O. pubiflora*.
multiflora, Link, Hort. Berol. i. 93 (= *Piptatherum miliaceum*).—Europ.
mutica, Steud. Nom. ed. II. ii. 731 = *O. asperifolia*.
obtus, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 22.—Peruv.
panicoides, Trin. l. c. iii. (1835) 124.—Chili; Bras.
paradoxa, Link, Hort. Berol. i. 92 = *O. paradoxa*.
parviflora, Trin. Fund. Agrost. 110 (= *Piptatherum miliaceum*).—Europ.
pauciflora, Boiss. Fl. Orient. v. 507, sphalm. = praec.
pubiflora, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 21.—Peruv.
purpurea, Steud. Syn. Pl. Gram. 122 = *O. coerulescens*.
racemosa, Trin. Gram. Unifl. 174 = *O. melanocarpa*?
ramosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 731; Syn. Pl. Gram. 123 = *chilensis*.
ramosissima, Trin. Gram. Unifl. 173 = *Stipa micrantha*.
setacea, Walp. Ann. iii. 730, sphalm. = seq.
setosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. iii. (1835) 124 = *O. setacea*.
simplex, Trin. & Rupr. l. c. v. (1842) 22.—Chili.
sinaica, Steud. Syn. Pl. Gram. 122 = *O. holciformis*.
songarica, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 15 = *O. holciformis*.
sphacelata, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 230 (= *Piptatherum sphacelatum*).—Persia.
stipoides, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. (1842) 25 (= *Piptochaetium bicolor*).—Bras.
Thomasii, Steud. Syn. Pl. Gram. 122 (= *Piptatherum miliaceum*).—Europ.
trichotoma, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. iii. (1835) 124.—Bras.
virescens, Trin. Fund. Agrost. 110 (= *Piptatherum virescens*).—Europ. or; As. Min.

- URAGOGA, Linn. Gen. ed. I. 378, et Index (1737) = *Psychotria*, Linn. (Rubiaceae).
arbutifolia, Baill. Adansonia, xii. (1879) 292.—N. Caled.
asthmatica, Baill. Hist. Pl. vii. 376 = *Cephaëlis asthmatica* (in Addend.).
baladensis, Baill. Adansonia, xii. (1879) 287.—N. Caled.
Balansae, Baill. l. c. 223.—N. Caled.
brachylaena, Baill. l. c. 250.—N. Caled.
calliantha, Baill. l. c. 229.—N. Caled.
calorhamnus, Baill. l. c. 286.—N. Caled.
Calothyrsus, Baill. l. c. 249.—N. Caled.
canalensis, Baill. l. c. 254.—N. Caled.
cardiochlamys, Baill. l. c. 287.—N. Caled.
coptosperma, Baill. l. c. 289.—N. Caled.
costularia, Baill. l. c. 248.—Venezuela.
emetica, Baill. Hist. Pl. vii. 371 = *P. emetica*.
Faguetti, Baill. Adansonia, xii. (1879) 224.—N. Caled.
furcellata, Baill. ex Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 118 = *P. furcellata*.
Gabriellae, Baill. Adansonia, xii. (1879) 228.—N. Caled.
goniocarpa, Baill. l. c. 285.—N. Caled.
granatensis, Baill. Hist. Pl. vii. 370 = *P. Ipecacuanha*?
Grosourdieana, Baill. Adansonia, xii. (1879) 227 = *P. Grosourdieana* (in Addend.).
guianensis, Baill. Hist. Pl. vii. 376 = *Cephaëlis guianensis* (in Addend.).

URAGOGA:—

- Guiloveana*, Baill. Adansonia, xii. (1879) 329.—N. Guin.
Hombroiana, Baill. l. c. 333.—Ins. Marian.
Ipecacuanha, Baill. Hist. Pl. vii. 281 = *Psychotria Ipecacuanha*.
jasminiflora, Baill. Adansonia, xii. (1879) 226.—N. Caled.
ligustrina, Baill. l. c. 253.—N. Caled.
lyciiflora, Baill. l. c. 290.—N. Caled.
lycioides, Baill. l. c. 228.—N. Caled.
macroglossa, Baill. l. c. 251.—N. Caled.
Marcgravi, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *P. Marcgravi*.
macropoda, Baill. l. c. 376 = *Geophila macropoda*.
microglossa, Baill. Adansonia, xii. (1879) 252.—N. Caled.
Micromyrtus, Baill. l. c. 291.—N. Caled.
monanthos, Baill. l. c. 293 = *N. Caled.*
muscosa, Baill. Hist. Pl. vii. 376 = *Cephaëlis muscosa*.
Nathaliae, Baill. Adansonia, xii. (1879) 248.—N. Caled.
Nekouana, Baill. l. c. 287.—N. Caled.
noxia, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *P. noxia*.
officinalis, Baill. l. c. 376 = *P. officinalis*.
oleoides, Baill. Adansonia, xii. (1879) 252.—N. Caled.
Pancheri, Baill. l. c. 222.—N. Caled.
Paramaracarpus, Baill. l. c. 293.—N. Caled.
parasitica, Baill. l. c. 328 = *P. parasitica*.
Poissoniana, Baill. l. c. 230.—N. Caled.
Remyana, Baill. l. c. 253.—Ecuador.
reniformis, Baill. Hist. Pl. vii. 376 = *Geophila reniformis*.
rosmarinifolia, Baill. Adansonia, xii. (1879) 291.—N. Caled.
ruelliaefolia, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *P. ruelliaefolia*.
rupicola, Baill. Adansonia, xii. (1879) 288.—N. Caled.
sagittalis, Baill. l. c. 249.—N. Caled.
Simira, Baill. Hist. Pl. vii. 374 = *P. parviflora*.
Spachiana, Baill. Adansonia, xii. (1879) 285.—N. Caled.
stricta, Baill. l. c. 250.—N. Caled.
subuniflora, Baill. l. c. 292.—N. Caled.
tinctoria, Baill. Hist. Pl. vii. 374 = *Palicourea tinctoria*.
tortilis, Baill. Adansonia, xii. (1879) 325 = *P. tortilis*.
trichopodantha, Baill. l. c. 294.—N. Caled.
trilobata, Baill. l. c. 289.—N. Caled.
undata, Baill. Hist. Pl. vii. 371 = *P. undata*.
viburnifolia, Baill. Adansonia, xii. (1879) 330.—Mexic.
Vieillardii, Baill. l. c. 224.—N. Caled.

URALEPIS, Spreng. Neue Entdeck. i. 244 (1821) = seq.

URALEPSIS, Nutt. Gen. Am. i. 62 (1818) = *Triodia*, R. Br. (Gramin.).

- alba*, Steud. Syn. Pl. Gram. 248 = *Diplachne alba*.
alopecuroides, Steud. l. c. = *T. plumosa*.
ambigua, Kunth, Rév. Gram. i. 108 = *T. ambigua*.
arenaria, Steud. Syn. Pl. Gram. 248 = *Diplachne arenaria*.
aristulata, Nutt. Gen. Am. i. 63 = *Triplasis purpurea*.
avenacea, Kunth, Rév. Gram. i. 108 = *T. avenacea*.
brasiliensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 248.—Bras.
brevispicata, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 93 = *Diplachne dubia*.
capensis, Kunth, Enum. Pl. i. 319.—Afr. austr.
capensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 248.—Afr. austr.
ciliata, Steud. l. c. 247.—Afr. trop.
composita, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 94 = *Diplachne fascicularis*.
cornuta, Ell. Sketch, i. 580 = *Triplasis americana*.
cuprea, Kunth, Rév. Gram. i. 108 = *T. cuprea*.
densiflora, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 94 = *T. stricta*.
Drummondii, Steud. Syn. Pl. Gram. 247 = *Diplachne fusca*.
Eleusine, Steud. l. c. 248 = *Diplachne Eleusine*.
elongata, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 89 = *T. trinervium*.
flaccida, Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. iii. 95.—Bras.
fusca, Steud. Syn. Pl. Gram. 247 = *Diplachne fusca*.
livida, Steud. l. c. 248 = *Diplachne livida*.
mutica, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 569 = *T. mutica*.
pallida, Kunth, Rév. Gram. i. 108 = *Glyceria pallida*.
pilosa, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 94 = *T. acuminata*.
pilosa, Buckl. l. c. 95 = *T. mutica*.
poaeoides, Buckl. l. c. = *Sclerochloa californica*.

URALEPSIS:—

- pulchella*, Kunth, Rév. Gram. i. 108 = *Triodia pulchella*.
pungens, Kunth, l. c. = *Aeluropus arabicus*.
purpurea, Nutt. Gen. Am. i. 62 = *Triplasis purpurea*.
quadridentata, Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. iii. 240.—Bras.
Tricuspsis, Steud. Nom. ed. II. i. 564, in syn. = *T. cuprea*.
verticillata, Steud. Syn. Pl. Gram. 248 = *Diplachne verticillata*.
virens, Kunth, Enum. Pl. i. 319.—Bras.

URANANTHUS, Benth. Pl. Hartw. 46 (1840) = *Eustoma*, Salisb. (Gentian.).
chironioides, Benth. l. c. 46 = *E. silenifolium*.
glaucofolius, Benth. l. c. = *E. silenifolium*.
pallidus, Liebm. Ind. Sem. Hort. Hafn. (1845); ex Sond. in E. Otto, Allg. Gartenz. iv. (1848) 368 = *E. silenifolium*.
Russelianus, Benth. Pl. Hartw. 46 = *E. Russelianum*.

URANDRA, Thw. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 211 = *Lasianthera*, Beauv. (Olacinae).
apicalis, Thw. l. c. = *L. apicalis*.

URANIA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 100; et Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 309, sphalm. = *Uraria*, Desv. (Legumin.).

URANIA, Schreb. Gen. 212 (1789) = *Ravenala*, Adans. (Scitami).
amazonica, Mart. Reise Bras. iii. 946; Hort. ex Lem. Illustr. Hort. vii. (1860) t. 239 = *R. guyanensis*.
guyanensis, Rich. in Nov. Act. Nat. Cur. xv. (1831) Suppl. 21 = *R. guyanensis*.
madagascariensis, Raeusch. Nom. ed. III. 91 = *R. madagascariensis*.
Ravenalia, Rich. in Nov. Act. Nat. Cur. xv. (1831) Suppl. 19 = *R. madagascariensis*.
speciosa, Willd. Sp. Pl. ii. 7 = *R. madagascariensis*.

URANOSTACHYS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 128 = *Veronica*, Tourn. (Scrophul.).
prostrata, Fourr. l. c. 128 = *V. prostrata*.
Teucrium, Fourr. l. c. = *V. Teucrium*.

URANTHERA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 189 = *Acisanthera*, P. Br. (Melastom.).
alsinaefolia, Naud. l. c. = *A. alsinaefolia*.
dicranophora, Naud. l. c. xii. (1849) 283 = *A. quadrata*.
Hostmanni, Naud. l. c. 284 = *A. recurva*.
recurva, Naud. l. c. iii. (1845) 189 = *A. recurva*.
variabilis, Naud. l. c. 190. t. 7. f. 18 = *A. variabilis*.

URARIA, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 122. t. 5. f. 19. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 521.
DOODIA, Roxb. Hort. Beng. 99 (1814); Fl. Ind. iii. 365 (1832).

- acuminata*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) ii. 235, 236 = *picta*?
alopecuroides, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 149; Wight, l. c. t. 290 = *U. Lagopus*.
arborescens, G. Don, Gen. Syst. ii. 287 = *U. Lagopus*.
barbata, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 309 = *Desmodium barbatum*.
campanulata, Wall. Cat. n. 5685 = *Lourea campanulata*.
cercidifolia, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 309, sphalm. = seq.
cercifolia, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 123. t. 5. f. 19 = *lagopoides*.
comosa, DC. Prod. ii. 324 = *crinita*.
cordata, Wall. Cat. n. 5679 = seq.
cordifolia, Wall. Pl. As. Rav. i. 33.—Burma.
cornosa, Span. in Linnaea, xv. (1841) 193 = *crinita*.
crinita, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 123.—As. trop.
cylindracea, Benth. Fl. Austral. ii. 237.—Austral.
desmodioides, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5683 = *hamosa*.
hamosa, Wall. Cat. n. 5681 A, C = *U. Lagopus*, *lagopoides*.
hamosa, Wall. l. c. B.—Ind. or.; Malaya.
lagocephala, DC. Prod. ii. 324 = *Desmodium barbatum*.
lagopoda, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *U. Lagopus*.
lagopodioides, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 309 = *lagopoides*?
lagopodioides, Wall. Cat. n. 5676 = *U. Lagopus*.
lagopoides, DC. Prod. ii. 324.—As. et Austral. trop.
Lagopus, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 100.—Reg. Himal.; Burma.

URARIA:—

lanceolata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5682 = hamosa.
leptostachya, Wall. l. c. 5684 = hamosa.
leucantha, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 193 = picta.
linearis, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 61; Cat. Hort. Bog. Alt. 273 = picta.
macrostachya, Wall. Pl. As. Rar. ii. t. 110 = crinita.
obcordata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 305 = Desmodium obcordatum.
paniculata, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 273.—Java.
picta, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 123. t. 5. f. 19.—Geront. trop.
picta, Wight, Ic. t. 411 = crinita.
prunellaefolia, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5686.—Reg. Himal.
repanda, Wall. Cat. n. 5677.—Burma.
retrofracta, Wall. l. c. 5678 = Mecopus nidulans.
retusa, Wall. l. c. 5680 = lagopoides.
styracifolia, Wight & Arn. Prod. 222 = Desmodium retroflexum.

URASPERMUM, Nutt. Gen. Am. i. 192 (1818) = *Osmorhiza*, Rafin. (Umbell.).
Claytoni, Nutt. l. c. 193 = *O. longistylis*.
hirsutum, Bigel. Fl. Bost. ed. III. 120 = *O. brevistylis*.

URATEA, J. F. Gmel. Syst. 677 (1791) = **OURATEA**, Aubl. = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).

URBANIA, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 10 = **Lyperia**, Benth. (Scrophul.).
lyperiaeflora, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880–82) 306 = *Lindenbergia sinaica*.
lyperiaeflora, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 10.—Afr. trop.

URCEOLA, Roxb. in As. Res. v. (1798) 169. **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 716.
CHAVANNESIA, A. DC. in DC. Prod. viii. 444 (1844).
brachysepala, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 659.—Malacca.
elastica, Roxb. in As. Res. v. (1798) 169.—Malaya.
esculenta, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 658.—Burma.
lucida, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 716.—Burma; Ins. Penang.
Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 658.—Singapore.
malaccensis, Hook. f. l. c.—Malacca.
torulosa, Hook. f. l. c. 659.—Malacca.

URCEOLA, Vand. Fl. Lusit. 8. t. 1. f. 4 (1788) (Quid?).
Vandelli, Roem. & Schult. Syst. iii. 99.—Bras.

URCEOLARIA capensis, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iv. 396, sphalm. = *Utricularia capensis*.

URCEOLARIA, Herb. App. [Bot. Reg.] 28 (1821) = **Urceolina**, Reichb. (Amaryll.).
pendula, Herb. l. c. = *Urceolina pendula*.

URCEOLARIA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 136, 277 (1810) = **Sarmienta**, Ruiz & Pav. (Gesner.).
chilensis, Molina, ll. cc. = *S. repens*.

URCEOLARIA, Willd. ex Cothen. Disp. Veg. Meth. 10 (1790) = **Schradera**, Vahl (Rubiace.).
exotica, J. F. Gmel. Syst. 390 = *S. capitata*.

URCEOLINA, Reichb. Consp. 61 (1828). **AMARYLLIDAE**, Benth. & Hook. f. iii. 732.

COLLANIA, Schult. f. Syst. vii. II. p. liii, 893 (1830).
LEPERIZA, Herb. App. [Bot. Reg.] 41 (1821).
PENTLANDIA, Herb. in Bot. Reg. (1839) t. 68.
SPHAEROTILE, Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Berol. 95. t. 38 (1841).
URCEOLARIA, Herb. App. [Bot. Reg.] 28 (1821).
aurea, Lindl. in Gard. Chron. (1864) 627, 890 = *pendula*.
fulva, Herb. Amaryll. 194 = *pendula*.
latifolia, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 732.—Peruv.
lobata, Pritz. Ic. Ind. 1134, sphalm. = *Urena lobata*.
miniata, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 732.—Peruv.
pendula, Herb. Amaryll. 193.—Peruv.

URECHITES, Muell. Arg. in Bot. Zeit. xviii. (1860) 22. **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 727.
Andrieuxii, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 442.—Mexic.
Jaegeri, Muell. Arg. l. c. 443.—Ins. S. Doming.
jamaicensis, Miers, Apocyn. S. Am. 112 = *Echites jamaicensis*.
Karwinski, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 440.—Mexic.
Neriandra, Miers, Apocyn. S. Am. 111 = *Echites Andrewsii*.
suberecta, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 444.—Ins. S. Doming.

URENA, Dill. ex Linn. Syst. ed. I (1735). **MALVACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 205.
aculeata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *lobata*.
americana, Linn. Pl. Surin. 11; Amoen. Acad. viii. 259; Linn. f. Suppl. 308 = *lobata*.
Armitiana, F. Muell. Fragm. x. 78.—Austral.
Blumei, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xii. (1845) 78.—Java.
campestris, Vell. Fl. Flum. 286; vii. t. 47.—Bras.
cana, Wall. Cat. n. 1930 B = *lobata*.
chinensis, Osbeck, Voy. ed. Angl. i. 363 (Quid?).—China.
cordata, Herb. Heyne, ex Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 330 = *Pavonia glechomifolia*.
diversifolia, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 308 = *lobata*.
foetida, L'Hérit. ex DC. Prod. i. 444 = *Pavonia paniculata*.
glabra, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = *Pavonia glechomifolia*.
grandiflora, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 442 = *lobata*.
Haenkeana, Walp. Rep. i. 297 = *lobata*.
Hamiltoniana, Wall. Cat. n. 2700 = *repanda*.
hastata, Vell. Fl. Flum. 285; vii. t. 43.—Bras.
heteromorpha, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 180.—N. Caled.
heterophylla, Presl, Rel. Haenk. ii. 127 = *lobata*.
heterophylla, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 111 (Quid?).—Guian.
heterophylla, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1835). —Cf. Linnaea, xi. (1837) Litt. 90 = *phyllomorpha*.
heterophylla, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 86 = *sinuata*.
hirta, Vell. Fl. Flum. 286; vii. t. 45.—Bras.
hispida, Boj. ex Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 45 = *Pavonia Bojeri*.
Lappago, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 11; DC. Prod. i. 441 = *sinuata*.
leptocarpa, Linn. f. Suppl. 508 = *Pavonia Typhalaea*.
leucantha, Poepp. ex Garcke, in Eichl. Jahrb. Berl. i. (1881) 211 = *Pavonia leucantha*.
lobata, Linn. Sp. Pl. 692.—Cosmop. trop.
Loureiirii, Meissn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 732 = *Malachra Urena*.
malacoides, Hill, Veg. Syst. xv. 20 (Quid?).—China.
Manihot, Klotzsch, in Bot. Zeit. iv. (1846) 102, nomen = *sinuata*.
mauritaniana, Sieber, ex Colla, Hort. Ripul. 142 = *lobata*.
mediterranea, Vell. Fl. Flum. 285; vii. t. 42.—Bras.
Meyeri, F. Muell. Fragm. x. 79 = *Pavonia Columella*.
microcarpa, DC. Prod. i. 442 = *lobata*.
mollis, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = *Pavonia Kraussiana*.
monopetala, Lour. Fl. Cochinch. 418.—Cochinch.
morifolia, DC. Prod. i. 442 = *sinuata*.
multifida, Cav. Diss. vi. 336. t. 184. f. 2 = *sinuata*.
muricata, DC. Prod. i. 442 = *sinuata*.
obtusata, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 48 = *lobata*.
ovalifolia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 124 = *Hibiscus micranthus*.
palmata, Roxb. Hort. Beng. [97]; Fl. Ind. iii. 182 = *lobata*.
paradoxa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 278 = *sinuata*.
phyllomorpha, Steud. Nom. ed. II. ii. 732.—Java.
pilosa, Burch. ex DC. Prod. i. 438 = *Pavonia Columella*.
polyflora, Lour. Fl. Cochinch. 417 = *Malachra Urena*.
praemorsa, Salisb. Prod. 382 = *Pavonia praemorsa*.
procumbens, Linn. Sp. Pl. 692.—China.
repanda, Blume, Bijdr. 64 = *Blumei*.

URENA:—

repanda, Roxb. Hort. Beng. 51; Fl. Ind. iii. 182.—Ind. or.; Burma.
reticulata, Cav. Diss. vi. 335. t. 183. f. 2 = *lobata*.
Ribesia, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 5 = *lobata*.
ricinocarpa, Eckl. & Zeyh. Enum. 37.—Afr. austr.
rigida, Wall. Cat. n. 1929, partim.—Burma; Malaya.
rigida, Wall. l. c., partim = *repanda*.
scabriuscula, DC. Prod. i. 441 = *lobata*.
sidoides, Vell. Fl. Flum. 286; vii. t. 46.—Bras.
Sieberi, Colla, Hort. Ripul. 142. t. 30 = *lobata*.
sinuata, Linn. Sp. Pl. 692.—Reg. trop.
sinuata, Sw. Obs. Bot. 264 = *lobata*.
speciosa, Wall. Pl. As. Rar. i. 23. t. 26 = *repanda*.
stellata, Spreng. Neue Entdeck. ii. 163 = *Pavonia Typhalaea*.
stellipila, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852) t. 281.—Bras.
subtriloba, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 79.—Bras.
Swartzii, DC. Prod. i. 442 = *lobata*.
Swartzii, Macfad. Fl. Jamaica. i. 60 = *sinuata*.
tomentosa, Blume, Bijdr. 65.—Java.
tomentosa, Wall. Cat. n. 1933 H = *sinuata*.
tricuspis, Cav. Diss. vi. 334. t. 183. f. 1 = *lobata*.
trilobata, Vell. Fl. Flum. vii. 269. t. 44 = *lobata*.
Typhalaea, Linn. Mant. ii. 258 = *Pavonia Typhalaea*.
viminea, Cav. Diss. vi. 335. t. 184. f. 1 = *lobata*.
virgata, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 48 = *lobata*.
Xanthium, Vell. Fl. Flum. 284; vii. t. 41 (sp. dub.).—Bras.

URERA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 496 (1826). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 383.
CALOSTIMA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836).
SCEPOCARPUS, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 98 (1869).
acuminata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497.—Ins. Maurit. et Timor.
acuminata, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 190 = *alceaefolia*.
alceaefolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497.—Am. trop.
amberana, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 267.—Madag.
amplissima, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. t. 22 = *Laportea amplissima*.
armigera, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 193 = *baccifera*.
aurantiaca, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 201.—Bras.
baccifera, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497.—Am. austr.
cameroonensis, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 97.—Afr. trop.
capitata, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 201.—Peruv.
caracasana, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 154 = *alceaefolia*.
Commersoniana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 202 = *Laportea crenulata*.
corallina, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 90.—Costa Rica.
crassifolia, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 161.—Ins. Dominic.
crenulata, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 203 = *Laportea crenulata*.
densiflora, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 190 = *alceaefolia*.
denticulata, Miq. l. c. 192 = *baccifera*.
elata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 154 = *sinuata*.
excelsa, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 178 = *Laportea Gigas*.
expansa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 155.—Jamaic.
ficifolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = *Obetia ficifolia*.
Gaudichaudiana, Hensl. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 341 = *Fleurya aestuans*.
Gaudichaudiana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 177 = *Laportea Gaudichaudiana*.
gigantea, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = *Laportea crenulata*.
girardinoides, Seem. Bot. Voy. Herald, 194 = *lacinata*.
glabra, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 149 = *sandwicensis*.
grandifolia, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. iv. (1877) 310.—Paraguay.

URERA :—

- horrida*, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 192 = *baccifera*.
Humboldtii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 479.—Madag.
Hypselodendron, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 203.—Abyss.
Jacquinii, Wedd. l. c. 200 = *alceaefolia*.
javaensis, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = *Laportea crenulata*.
Kaalae, Wawra, in Flora, lvii. (1874) 542.—Ins. Sandvic.
laciniata, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 203.—Panama.
lamiifolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = *Boehmeria nivea*.
Leichardiana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 178 = *Laportea photiniphylla*.
longifolia, Wedd. l. c. 177.—Madag.
madagascariensis, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = *Obetia madagascariensis*.
membranacea, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 103 (Quid?).—Hab.?
microcarpa, Wedd. l. c. 156.—Jamaic.
microstigma, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 203 = *Laportea microstigma*.
mitis, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 191 = *alceaefolia*.
oblongifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 515 = *obovata*.
obovata, Benth. l. c. 516.—Afr. trop.
oligoloba, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 265.—Madag.
palmata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = *Girardinia palmata*.
parietariaefolia, Gaudich. l. c. (Quid?).—Hab.?
platycarpa, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 202 = *Laportea platycarpa*.
Punu, Wedd. l. c. 200.—Bras.
Radula, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 279.—Madag.
rotundifolia, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 177 = *Laportea Gigas*.
sandwicensis, Wedd. l. c. 178.—Ins. Sandvic.
scandens, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. v. (1878) 90; *Contrib.* 38.—Paraguay.
Schimperii, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 158 = *U. Hypselodendron*.
Schimperiana, Wedd. l. c. 582 = *praece*.
simplex, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 90.—N. Granat.
sinuata, Blume, Bijdr. 605 = *Laportea crenulata*.
sinuata, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 201.—Panama.
sphaerophylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 445.—Madag.
spicata, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 155 = *Gyrotaenia spicata*.
stimulans, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 231 = *Laportea stimulans*.
stimulans, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 98 = *Laportea microstigma*.
subpeltata, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 189 = *alceaefolia*.
- URETIA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1836) = **Digera**, Forsk. (Amarant.).
alternifolia, Rafin. l. c. = *D. arvensis*.

- URGINEA**, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 321. t. 14. **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 810.
FUSIFILUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27 (1836).
MONTASSA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 36 (1866).
PHYSODIA, Salisb. l. c. 37 (1866).
PILASIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 53 (1836).
SQUILLA, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 276.
SYPHARISSA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 37 (1866).
TENICROA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 52 (1836).
aloides, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 395 = *Notosceptrum aloides*.
altissima, Baker, l. c. xiii. (1873) 221.—Afr. trop.
angolensis, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 364.—Afr. trop.
anthericoides, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 328.—Marocc.
Beccarii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 223.—Abyss.
brevipes, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 364.—Afr. trop.

URGINEA :—

- chlorantha*, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 248.—Afr. trop.
ciliata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 218.—Afr. austr.
comosa, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 247.—Afr. trop.
congesta, Wight, l. c. 2065.—Ind. or.
coromandeliana, Wight, l. c. t. 2064 = *indica*.
exuviata, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 330.—Afr. austr.
filifolia, Steinh. l. c.—Afr. austr.
fragrans, Steinh. l. c.—Afr. austr.
ingax, Steinh. l. c. 328. t. 14. f. 1.—Reg. Mediterr.
grandiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 223.—Oriens.
Hesperia, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 399.—Ins. Canar.
indica, Kunth, Enum. Pl. iv. 333.—Ind. or.; Burma; Afr. trop.
japonica, Hort. Par. ex Rev. Hort. Sér. II. ii. (1843–44) 374 = *Scilla japonica*.
marginata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 218.—Afr. austr.
maritima, Baker, l. c. 221 = *U. Scilla*.
masarenensis, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 363.—Madag.
micrantha, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 294.—Afr. trop.
nematodes, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 218.—Afr. austr.
nigritana, Baker, l. c. 224.—Afr. trop.
Pancration, Nym. Consp. 729 = *U. Scilla*.
Petitiana, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 294.—Abyss.
physodes, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 217.—Afr. austr.
porphyrostachys, Baker, ex Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 411.—Ins. Socotra.
psilostachya, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 247.—Afr. trop.
pusilla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 217.—Afr. austr.
Quartiniana, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 284.—Abyss.
rigidifolia, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 323.—Afr. austr.
Scilla, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 321.—Afr. austr.
secunda, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 222.—Afr. austr.
senegalensis, Kunth, Ennm. Pl. iv. 334 = *indica*.
simensis, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 291.—Abyss.
undulata, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 330.—Reg. Mediterr.
zambesiaca, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 223.—Afr. trop.

URGINIA, Kunth, Enum. Pl. iv. (1843) 331 = *praece*.

URINARIA, Medic. Malv. 80 (1787) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).
erecta, Medic. l. c. = *P. Niruri*.

URMENETEA, Phil. Fl. Atac. 26. t. 3 (1860).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 487.
atacamensis, Phil. l. c. 27.—Chili.

URNECTIS, Rafin. Alsog. Am. 14 (1838) = **Salix**, Tourn.
hirta, Rafin. l. c. = *S. nigricans*.

UROCARPUS, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 54 = **Asterolasia**, F. Muell. (Rutac.).
phebaloides, J. Drumm. ex Harv. l. c. 55 = *A. phebalioides*.

UROCHLAENA, Nees, Fl. Afr. Anstr. 437 (1841).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1181.
pusilla, Nees, l. c. 438.—Afr. anstr.

UROCHLOA, Beauv. Agrost. 52. t. 11. f. 1 (1812) = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
aristatum, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 299 = *P. aristatum*.
cimicina, Kunth, Rév. Gram. i. 31 = *P. cimicinum*.
fasciculata, Kunth, l. c. = *P. fasciculiflorum*.

UROCHLOA :—

- glabra*, Brongn. Voy. Coq. Bot. ii. 121 = *Panicum glumare*.
mauritanica, Boj. Hort. Maurit. 363 = *P. javanicum*.
panicoides, Beauv. Agrost. 52. t. 11 = *P. javanicum*.
paniculata, Benth. in Hook. Niger Fl. 558.—Afr. trop.
paspaloides, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 319 = *P. ambiguum*, Trin.
pubescens, Kunth, Rév. Gram. i. 31 = *P. javanicum*.
semialata, Kunth, l. c. = *P. semialatum*.
uniseta, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 319 = *Setaria uniseta*.

URODESMIUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 338. **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 748.
huberioides, Naud. l. c. = *Bras*.

URODON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 16 = **Pultenaea**, Sm. (Legumin.).
capitatus, Turcz. 17 = *P. Urodon*.
dasyphyllus, Turcz. l. c. xxvi. (1853) i. 268 = *P. Urodon*.

UROMORUS, Bur. in DC. Prod. xvii. 236 (1873) = **Paratrophis**, Blume (Urtic.).
anthopophagorum, Bur. l. c.—Ins. Fiji.
philippinensis, Bur. l. c. 237 = *P. philippinensis*.
tahitensis, Bur. l. c. = *Pseudomorus Brunoniana*.

UROPAPPUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 424 = **Microseris**, D. Don (Compos.).
grandiflorus, Nutt. l. c. 425 = *M. linearifolia*.
heterocarpus, Nutt. l. c. = *M. Lindleyi*.
Lindleyi, Nutt. l. c. = *M. Lindleyi*.
linearifolius, Nutt. l. c. = *M. linearifolia*.

UROPEDIUM, Lindl. Orch. Linden. 28 (1846) = **SeIenipedium**, Reichb. f. (1854) (Orchid.).
Lindenii, Lindl. l. c. = *S. caudatum*.

UROPETALON, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. t. 156 (1816) = **Dipcadi**, Medic. (Liliac.).
Bourgaei, Nym. Consp. 731 = *D. serotinum*.
ciliare, Eckl. & Zeyh. ex Harv. Thes. Cap. ii. 45 = *D. ciliare*.
concanense, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 143 = *D. concanense*.
crispum, Burch. [ex Ker-Gawl.] in Bot. Reg. sub t. 156 = *D. crispum*.
depressum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 325.—Abyss.
erythraeum, Boiss. Fl. Orient. v. 286 = *D. erythraeum*.
fesoghense, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 204.—Afr. bor.
fulvum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 419 = *D. serotinum*.
glaucum, Burch. ex [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. t. 156; et Trav. i. 548 = *D. glaucum*.
hyacinthoides, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 135 = *D. hyacinthoides*.
hydsuricum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 397 = seq.
hysudricum, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 88 = *D. hydsuricum*.
longifolium, Lindl. in Bot. Reg. t. 974 = *D. longifolium*.
maritimum, Boj. Hort. Maurit. 346, nomen.—Madag.
minimum, Steud. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 325 = *D. minimum*.
montanum, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 142 = *D. montanum*.
serotinum, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. sub t. 156 = *D. serotinum*.
serotinum, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 341 = *D. erythraeum*.
tacazezanum, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 325 = *D. tacazezanum*.
umbonatum, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 17 = *D. umbonatum*.
unicolor, Stocks, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 180 = *D. unicolor*.
viride, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. sub t. 156 = *D. filamentosum*.
Welwitschii, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 16 = *D. Welwitschii*.

UROPETALUM, Burch. Trav. i. 548 (1822); Spreng. Syst. ii. 78 (1825) = *praece*.

UROPHYLLON, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 35 (1866) = *Ornithogalum*, Tourn. (Liliac.).
caudatum, Salisb. l. c. 36 = *O. caudatum*.
niveum, Salisb. l. c. = *O. niveum*.

UROPHYLLUM, C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz. xxv. (1857) 173, sphalm. = *Urospatha*, Schott (Aroid.).

UROPHYLLUM, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 184 (1824). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 71. *AXANTHES*, Blume, Bijdr. 1002 (1826).
AXANTHIOPSIS, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 195.

CYMELONEMA, Presl, Epim. Bot. 210 (1849).
MASCHALANTHE, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vi. (1828).
WALLICHIA, Reinw. ex Blume, in Cat. Gew. Buitenz. 11 (1823).

Afzelii, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 73.—Afr. trop.

arborescens, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 194 = *glabrum*.

biloculare, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) 11. 313 = *Diplospora Kurzii*.

Blumeanum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 99.—Malaya.

borneense, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 238.—Borneo.

callicarpoides, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 72.—Afr. trop.

coriaceum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 542 = *Randia densiflora*.

corymbosum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 194.—Java; Sumatra.

ellipticum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 419.—Zeylan.

elongatum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 225.—Borneo.

glabrum, Jack, ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 186.—Burma; Malaya.

glabrum, Wall. Cat. n. 8316 = *Blumeanum*.

Griffithianum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 98.—Malaya.

hirsutum, Hook. f. l. c.—Malaya.

hirtellum, Benth. in Hook. Niger Fl. 397.—Afr. trop.

insulare, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 73.—Afr. trop.

Korthalsii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 133.—Borneo.

longifolium, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 99.—Burma.

Lyallii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 165.—Madag.

macrophyllum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 194.—Java.

mamecyloides, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 63.—Ins. Philipp.

micranthum, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 74.—Afr. trop.

micranthum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 237.—Java.

moluccanum, Miq. l. c. 238.—Ins. Sunda.

parviflorum, Wall. Cat. n. 8320 = *streptopodium*.

paucinerve, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 74.—Afr. trop.

peltistigma, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 542.—Sumatra.

polyneurum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 239.—Borneo.

porphyraceum, Baill. Hist. Pl. vii. 378.—Java.

repandulum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 355 = *glabrum*.

rubens, Benth. in Hook. Niger Fl. 396.—Afr. trop.

streptopodium, Wall. Cat. n. 8317, partim.—Malaya.

streptopodium, Wall. l. c., partim = *Blumeanum*.

strigosum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 194.—Java; Borneo.

strigosum, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 53 = *longifolium*.

tomentosum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 224.—Ins. Malaya.

umbellulatum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 542.—Sumatra.

villosum, Jack & Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 184.—Malaya.

viridiflorum, Schum. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 74.—Afr. trop.

zeylanicum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 418.—Zeylan.

UROSKINNERA, Lindl. in Gard. Chron. (1857) 36.

SCROPHULARINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 942.

hirtiflora, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 34.—Mexic.

spectabilis, Lindl. in Gard. Chron. (1857) 36.—Guatemala.

UROSPATHA, Schott, Aroid. 3. tt. 7–10 (1853).

AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 996.

UROPHYLLUM, C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz. xxv. (1857) 173, sphalm.

UROSPATHA:—

affinis, Schott, Aroid. i. 3. t. 8 = *caudata*.

angustiloba, Engl. in Mart. Fl. Bras. iii. 11. 123. t. 23.—Bras.

caudata, Schott, Aroid. i. 3. t. 8.—Am. austr.

decipiens, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 128.—Bras.

desciscens, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 99.—Bras.

dubia, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 128.—Ind. occ.

Friedrichsthalii, Schott, Aroid. i. 3. t. 7.—Nicaragua.

grandis, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 128.—Panama.

Hostmannii, Schott, l. c.—Afr. trop.

Langsdorffiana, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 253.—Bras.

maculata, Linden.—Cf. Gard. Chron. (1865) 365 (Quid ?)—Bras.

marmorea, Linden.—Cf. l. c. (Quid ?)—Bras.

Meyeri, Schott, Aroid. i. 4.—Guian.

Poeppigiana, Schott, l. c.; et t. 10.—Bras.

quinquenervis, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 254 = *Spruceana*.

Riedeliana, Schott, l. c. 253.—Bras.

sagittaeifolia, Schott, Aroid. i. 4; et in Bonplandia, v. (1857) 128.—Bras.

Spruceana, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 128.—Bras.

UROSPERMUM, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 733 (1841), sphalm. = *UROSPERMUM*, Nutt. = *Osmorhiza*, Rafin. (Umbell.).

UROSPERMUM, Scop. Introd. 122 (1777). *COMPOSTAE*, Benth. & Hook. f. ii. 531.

ARNOPOGON, Willd. Sp. Pl. iii. 1496 (1803).

asperum, DC. Fl. Fr. iv. 63 = *picroides*.

capense, Spreng. Syst. iii. 662 = *picroides*.

Dalechampi, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. (1795) 276.—Europ. austr.

picroides, F. W. Schmidt, l. c. 275.—Europ. austr.

UROSTELMA, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 44; (in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 118) = *Metaplexis*, R. Br. (Asclep.).

chinense, Bunge, ll. cc. = *M. chinensis*.

UROSTIGMA, Gasp. Nov. Gen. Fici, 7 (1844) = *Ficus*, Tourn. (Urtic.).

abutifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 551 = *F. abutifolia*.

acampophyllum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 439 = *F. acampophylla*.

accedens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 347 = *F. superba*.

acrocarpum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 557 = *F. acrocarpa*.

aegeiophyllum, Miq. l. c. 565 = *F. infectoria*.

affine, Miq. l. c. 564 = *F. religiosa*.

aggregatum, Miq. l. c. 559 = *F. aggregata*.

altissimum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 90 = *F. altissima*.

amazonicum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 541 = *F. amazonica*.

amblyphyllum, Miq. l. c. 569 = *F. retusa*.

Ampelos, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 315 = *F. gibbosa*.

anacardiifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 587 = *F. anacardiifolia*.

angustifolium, Miq. l. c. 539 = *F. angustifolia*.

annulatum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 90 = *F. annulata*.

apiculatum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 570 = *F. apiculata*.

apiocarpum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 440 = *F. apiocarpa*.

arbutifolium, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 412 = *F. arbutifolia*.

Arnottianum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 564 = *F. Arnottiana*.

atrovirens, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 37 = *F. tristis*.

atrox, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 550 = *F. atrox*.

baccatum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 327 = *F. baccata*.

Backhousii, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 240.—Austral.

balicum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 348.—Malaya.

bengalense, Gasp. Nov. Gen. Fici, 7; Ricerche, 82. t. 7. f. 14–21 = *F. benghalensis*.

benjaminum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 583 = *F. benjaminia*.

bibracteatum, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 37 = *F. bibracteata*.

UROSTIGMA:—

bicorne, Miq. Pl. Jungh. 47 = *Ficus pilosa*.

Binderianum, Kotschy, in Sitzb. Akad. Wien, Math. Nat. li. (1865) 353 = *F. platyphylla*.

Binnendykii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 341 = *F. Binnendijkii*.

biverrucellum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 436 = *F. annulata*.

Bonplandianum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 323 = *F. Bonplandiana*.

botryapioides, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 538 = *F. botryapioides*.

brachypodium, Miq. l. c. 552 = *F. eugenioides*.

bracteatum, Miq. l. c. 576 = *F. bracteata*.

Burkei, Miq. l. c. 555 = *F. Burkei*.

callophyllum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 349 = *F. callophylla*.

calyptoceras, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 527 = *F. calyptoceras*.

calyptratum, Miq. l. c. 553 = *F. calyptrata*.

canaliculatum, Miq. l. c. 579 = *F. glabella*.

casapiense, Miq. l. c. 548 = *F. casapiensis*.

catalpaefolium, Miq. l. c. 551 = *F. umbellata*.

catappaefolium, Miq. l. c. 533 = *F. catappaefolia*.

caulobotryum, Miq. l. c. 568 = *F. Tjakela*.

caulocarpum, Miq. l. c. 568 = *F. caulobotrya*.

cestrifolium, Miq. l. c. 541 = *F. cestrifolia*.

ceylonense, Miq. l. c. 570 = *F. Tjakela*.

chiriquianum, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 412 = *F. chiriquiana*.

chrysophthalmum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 575 = *F. chrysophthalma*.

chrysotrix, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 90, 96 = *F. pilosa*.

circumscissum, Miq. Pl. Jungh. 292 = *F. elastica*.

clusiaefolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 543 = *F. clusiaefolia*.

clusioides, Miq. l. c. 579 = *F. clusioides*.

complicatum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 325 = *F. complicata*.

concinnum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 570 = *F. glabella*.

connivens, Miq. l. c. 573 = *F. tomentosa*.

conocarpum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 350 = *F. annulata*.

consanguineum, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 408 = *F. consanguinea*.

consociatum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 91 = *F. consociata*.

cordifolium, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 242 = *F. Arnottiana*.

cordifolium, Gasp. Nov. Gen. Fici, 7 = *F. cordifolia*.

cordifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1847) 564 = *F. Rumphii*.

costaricanum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 322 = *F. costaricana*.

cotinifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 530 = *F. cotinifolia*.

courtallense, Miq. l. c. 564 = *F. Arnottiana*.

crassinervium, Miq. l. c. 535 = *F. crassinervia*.

crassirameum, Miq. Pl. Jungh. 48 = *F. procera*.

crocatum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 531 = *F. crocata*.

cuneatum, Miq. l. c. 585 = *Erythroxylum burmanicum*.

Cunninghamii, Miq. l. c. 560 = *F. Cunninghamii*.

cycloneuron, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 438.—Sumatra.

cyclophyllum, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 91 = *F. cyclophylla*.

cystopodium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 532 (err. typ. 352) = *F. cystopoda*.

Dalhousiae, Miq. l. c. 571 = *F. Dalhousiae*.

dasycarpum, Miq. l. c. 574 = *F. mysorensis*.

Dekdekena, Miq. l. c. 558 = *F. Dekdekena*.

depressum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 351 = *F. pruniformis*.

depressum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 576 = *F. annulata*.

Diepenhorstii, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 439.—Sumatra.

diospyrifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 586 = *F. diospyrifolia*.

doliarium, Miq. l. c. 527 = *F. doliaria*.

drupaceum, Miq. l. c. 581 = *F. drupacea*.

elasticum, Miq. l. c. 578 = *F. elastica*.

elegans, Miq. in Hook. Niger Fl. 521 = *F. elegans*.

ellipticum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 528 = *F. elliptica*.

enorme, Miq. l. c. 544 = *F. enormis*.

eriobotryoides, Miq. l. c. 587 = *F. eriobotryoides*.

erythroctictum, Miq. l. c. 540 = *F. erythrocticta*.

UROSTIGMA:—

- eugeniaefolium*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 329 = *Ficus eugeniaefolia*.
eugenioides, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 238 = *F. eugenioides*.
euneuon, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 353 = *F. nervosa*.
euomphalum, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 103 = *F. euomphala*.
excelsum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 350 = *F. excelsa*.
eximium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 527 = *F. eximia*.
fagifolium, Miq. l. c. 544 = *F. fagifolia*.
fagineum, Miq. l. c. 537 = *F. faginea*.
fazokelense, Miq. l. c. 552 = *F. fazokelensis*.
ferrugineum, Miq. l. c. 534 = *F. ferruginea*.
flavescens, Miq. Pl. Jungh. 48 = *F. annulata*.
Fraseri, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 561 = *F. Cunninghamii*.
fuligineum, Miq. l. c. 545 = *F. hirsuta*.
fulvum, Miq. l. c. 528 = *F. holosericea*?
fuscescens, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 329 = *F. fuscescens*.
galactophorum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 533 = *F. galactophora*.
Gomelleira, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 94 = *F. Gomelleira*, *doliarium*.
gardeniaefolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 546 = *F. hirsuta*.
Gardnerianum, Miq. l. c. 530 = *F. Gardneriana*.
geminum, Miq. l. c. 547 = *F. gemina*.
giganteum, Miq. l. c. 530 = *F. gigantea*.
giganteum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 90, 96 = *F. stupenda*.
glabellum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 340 = *F. glabella*.
glaberrimum, Miq. l. c. = *F. glaberrima*.
glabrum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 536 = *F. eximia*.
glanduliferum, Miq. l. c. 550 (non *Ficus glandulifera*).—Bras.
glaucophyllum, Gasp. Nov. Gen. Fici. 7 = *F. cordata*.
glaucum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 322 = *F. glauca*.
globosum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 335 = *F. globosa*, *Blume*.
glumosum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 552 = *F. glumosa*.
glycicarpum, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 409 = *F. glycicarpa*.
Gomelleira, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 531 = *F. Gomelleira*.
griseum, Miq. l. c. 588 = *F. grisea*, *Vahl*.
guatemalanum, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 411 = *F. guatemalana*.
gummiferum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 529 = *F. gummifera*, *Miq.*
haematocarpum, Miq. l. c. 584 = *F. benjamina*.
Hartwegii, Miq. l. c. 545 = *F. Hartwegii*.
Hasseltii, Miq. Pl. Jungh. 46 = *F. pubinervis*.
hirsutum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 530 = *F. hirsuta*.
Hochstetteri, Miq. l. c. 555 = *F. Hochstetteri*.
holosericeum, Miq. l. c. 531 = *F. holosericea*.
Huegeli, Miq. l. c. 586 = *F. macrophylla*.
ilicinum, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 136 = *F. ilicina*.
infectarium, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 339 = *F. infectoria*.
infectarium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 566 = *F. Tjakela*.
infestum, Miq. l. c. 550.—Bras.
ingens, Miq. l. c. 554 = *F. Schimperiana*.
intramarginale, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 320 = *F. intramarginalis*.
involutum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 334 = *F. involu-crata*.
involutum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 320 = *F. involuta*.
javanicum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 334 = *F. cordifolia*.
Karet, Miq. l. c. 348 = *F. elastica*.
Kotschyannum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 553 = *F. Kotschyana*.
Kunthii, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 96 = *F. Kunthii*.
lacciferum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 575 = *F. altissima*.
lachnocaulon, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 238 = *F. platypoda*.
laevigatum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 539 = *F. laevigata*.
Lambertianum, Miq. l. c. 565 = *F. infectoria*.
lancifolium, Miq. l. c. 538 = *F. lancifolia*.

UROSTIGMA:—

- lapathifolium*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 319 = *Ficus lapathifolium*.
laurifolium, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 194 = *F. lentiginosa*.
laurifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 539 = *F. laurifolia*.
Leichhardtii, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 235 = *F. platypoda*.
lentiginosum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 323 = *F. lentiginosa*.
leucocarpum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 576 = *F. infectoria*.
leucostictum, Miq. l. c. 535 = *F. leucosticta*.
leucotrichum, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 234 = *F. leucotricha*.
Liebmannianum, Miq. in Seem. Bot. Voy. Herald, 195 = *F. Liebmanniana*.
littorale, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 91 = *F. retusa*.
longifolium, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 95 = *F. longifolia*.
longipes, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 321 = *F. longipes*.
lucescens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 341 = *F. infectoria*.
Luschnathianum, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 101 = *F. Luschnathiana*.
luteum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 554 = *F. lutea*.
macrocarpum, Walp. Ann. i. 684, sphalm. = *F. acrocarpa*.
macrophyllum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 560 = *F. macrophylla*.
magnificum, Regel, Gartenfl. (1858) 253; Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 37.—Afr. trop.
Manok, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 90, 96 = *F. globosa*, *Blume*.
Mathewii, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 549 = *F. Mathewii*.
Maximilianum, Miq. l. c. 529 = *F. Maximiliana*.
microcarpum, Miq. l. c. 583 = *F. retusa*.
modestum, Miq. l. c. 586 = *F. nervosa*.
monadenum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 437 = *F. sumatrana*.
Moritzianum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 91, 97 = *F. glabella*.
Muelleri, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 235 = *F. Muelleri*.
mysorensis, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 574 = *F. mysorensis*.
myxaefolium, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 410 = *F. myxaefolia*.
natalense, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 556 = *F. natalensis*.
neglectum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 347 = *F. benjamina*.
nervosum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 585 = *F. nervosa*.
nesophilum, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 237 = *F. glabella*.
Neumannii, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 534 = *F. Neumannii*.
nitidum, Gasp. Nov. Gen. Fici. 7 = *F. nitidum*.
nitidum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 582 = *F. retusa*.
nudum, Miq. l. c. 584 = *F. benjamina*.
nummularia, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 330 (sp. delend.)—Mexic.
nymphaefolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 527 = *F. nymphaefolia*.
obliquum, Miq. l. c. 563 = *F. obliqua*.
obtusifolium, Miq. l. c. 569 = *F. obtusifolia*.
obversum, Miq. l. c. 573 = *F. tomentosa*.
odoratum, Miq. Pl. Jungh. 49 = *F. elastica*.
Oerstediana, Miq. in Seem. Bot. Voy. Herald, 196, t. 36 = *F. Oerstediana*.
oligoneuron, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 438 = *F. oligoneura*.
onustum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 575 = *F. globosa*.
organense, Miq. l. c. 542 = *F. organensis*.
ottoniaefolium, Miq. l. c. 557 = *F. ottoniaefolia*.
ovale, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 324 = *F. ovalis*.
ovatum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 553 = *F. ovata*.
ovoideum, Miq. l. c. 581, (excl. syn.) = *F. retusa*.

UROSTIGMA:—

- padifolium*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 324 = *Ficus padifolia*.
pallidum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 530 = *F. pallida*.
paraense, Miq. l. c. 534 = *F. paraensis*.
parvifolium, Miq. l. c. 570 = *F. glabella*.
pedunculatum, Miq. l. c. 540 = *F. pedunculata*, [*Dryand.*].
peracutum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 343 = *F. prunifolmis*.
perseaeefolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 567 = *F. infectoria*.
pertusum, Miq. l. c. 548 = *F. pertusa*.
petiolare, Miq. l. c. 527 = *F. petiolaris*.
pilosum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 90 = *F. pilosa*.
pisiferum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 580 = *F. retusa*.
pisocarpum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 344 = *F. piso-carpa*.
planicostatum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 586 = *F. planicostata*.
platypodium, Miq. l. c. 561 = *F. platypoda*.
Pohlianum, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 100 = *F. Pohliana*.
politum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 553 = *F. polita*.
populifolium, Miq. l. c. 552 = *F. populifolia*.
populneum, Miq. l. c. 537 = *F. populnea*.
Princeps, Miq. l. c. 533 = *F. Princeps*.
prinoides, Miq. l. c. 540 = *F. prinoides*.
procera, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 336 = *F. procera*.
prolixum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 560 = *F. prolixa*.
protensum, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 4 = *F. protensa*.
prunifolmis, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 91, 97 = *F. prunifolmis*.
Pseudo-benjaminum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 566 = *F. Tsiela*.
Pseudo-rubrum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 343 = *F. indica*.
Pseudo-Tijela, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 566 = *F. Tsiela*.
psychotriaefolium, Miq. l. c. 561 = *F. Cunninghamii*.
puberulum, Miq. l. c. 562 = *F. puberula*.
pyrifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 338.—Java.
reflexum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 569 = *F. reflexa*.
religiosum, Gasp. Recherche Caprif. 82, t. 7, f. 1-5 = *F. religiosa*.
retusum, Gasp. Nov. Gen. Fici. 7; Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 581 = *F. retusa*.
rhododendrifolium, Miq. l. c. 579 = *F. rhododendrifolia*.
rigidum, Miq. l. c. 578 = *F. rigida*.
Rolandri, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 329, in nota = *F. Rolandri*.
rubescens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 338 = *F. indica*.
rubicundum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 553 = *F. rubicunda*.
rubiginosum, Gasp. Nov. Gen. Fici. 7 = *F. rubiginosa*.
rubrum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 559 = *F. rubra*.
rufum, Miq. l. c. 528 = *F. rufa*.
Rumphii, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 90 = *F. Rumphii*.
salicifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 556 = *F. salicifolia*.
Salzmannianum, Miq. l. c. 547 = *F. Salzmanniana*.
Stae-crucis, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 328, in nota = *F. Sancti-crucis*.
sapidum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 327 = *F. sapida*.
Saussureanum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 533 = *F. Saussureana*.
saxophilum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 333 = *F. saxophila*.
scandens, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 330 = *F. pumila*.
Schiedeanum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 539 = *F. ligustrina*.
Schimperii, Miq. l. c. 555 = *F. Hochstetteri*.
Schumacheri, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 328, in nota = *F. Schumacheri*.
simile, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 36.—Am. austr.

UROSTIGMA:—

- sphaeridiophorum*, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 543 = *Ficus sphaeridiophora*.
splendens, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 587 = *F. splendens*.
squamellosum, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 239 = *F. macrophylla*.
stipulosum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 568 = *F. infectoria*.
strictum, Miq. Pl. Jungh. 50 = *F. stricta*.
subapiculatum, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 101 = *F. subapiculata*.
subcordatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 349 = *F. subcordata*.
subcuspidatum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 91, 97 = *F. pilosa*.
subglaucescens, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 240.—Austral.
subnymphaeifolia, Miq. Cat. Hort. Amst. 107 = *F. subnymphaeifolia*.
subpanduraeforme, Miq. l. c. = *F. heterophylla*.
subtriplinerivium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 542 = *F. subtriplineria*.
sulcipes, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 413 = *F. sulcipes*.
sumatranum, Miq. Pl. Jungh. 49 = *F. sumatrana*.
sundaicum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 339 = *F. indica*.
superbum, Miq. Pl. Jungh. 46 = *F. superba*.
syringaeifolium, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 535 = *F. syringaeifolia*.
tecolutens, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 324 = *F. tecolutensis*.
terebratum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 558 = *F. terebrata*.
Thonningii, Miq. in Hook. l. c. 557 = *F. microcarpa*.
Thunbergii, Miq. l. c. 556 = *F. cordata*.
timorense, Miq. l. c. 569 = *F. infectoria*.
Tjakela, Miq. l. c. 567 = *F. Tjakela*.
Tjiela, Miq. l. c. 580 = *F. indica*.
Tjiela, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 265, partim = *F. Tri-neni*.
trigonatum, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 194; Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 297 = *F. crassinervia*.
trigonum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 548 = *F. trigona*.
tomentellum, Miq. l. c. 531 = *F. tomentella*.
tomentosum, Miq. l. c. 573 = *F. tomentosa*.
trichocarpum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 338 = *F. trichocarpa*.
truncatum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 91, 97 = *F. truncata*.
turbinatum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 328 = *F. turbinata*.
Tweedianum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 547. t. 21 = *F. Tweediana*.
validum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 336 = *F. annulata*.
velutinum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 531 = *F. velutina*.
venustum, Miq. l. c. 538 = *F. venusta*.
verrucosum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 321 = *F. verrucosa*, Hemsl.
virgatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 342 (stirps dub.)—Java.
vitellinum, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 237 = *F. puberula*.
Vogelii, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 553 = *F. Vogelii*.
volubile, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 242 = *F. gibbosa*.
Warszewiczii, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xiii. (1862) 410 = *F. Warszewiczii*.
Wightianum, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 566 = *F. infectoria*.
xanthophyllum, Miq. l. c. 554 = *F. lutea*.
xylophyllum, Miq. l. c. 577 = *F. xylophylla*.
Zollingerianum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 91, 97 = *F. obscura*.

UROSTYLIS, Meissn. Gen. 207; Comm. 133 (1839) = *Layia*, Hook. & Arn. (Compos.).
gaillardoides, Meissn. l. c.; Comm. 133 = *L. galardioides*.

URSINIA, Gaertn. Fruct. ii. 462. t. 174 (1791).
 COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 456.
 CHRONOBASIS, DC. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 457 (1873).

VOL. II.

URSINIA:—

- LEPTOTIS, Hoffm. Verz. Pl. 72 (1824).
 OLIGAERION, Cass. in Dict. Sc. Nat. ii. Suppl. 75 (1816).
 SPERMOPHYLLA, Neck. Elem. i. 24 (1790).
 SPHENOGYNE, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 142 (1813).
 THELYTHAMNOS, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 25 (1828).
abrotanifolia, Spreng. Syst. iii. 609.—Afr. austr.
abyssinica, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 182.—Abyss.
affinis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 151.—Afr. austr.
albicaulis, DC. Prod. v. 689.—Afr. austr.
annua, Less. in Linnaea, vi. (1831) 165, in Adnot.—Afr. austr.
anthemoides, Gaertn. Fruct. ii. 463, in obs.; Poir. Encyc. viii. 257.—Afr. austr.
apiculata, DC. Prod. v. 689.—Afr. austr.
cakilefolia, DC. l. c. 690.—Afr. austr.
calenduliflora, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 456.—Afr. austr.
chrysanthemoides, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 152.—Afr. austr.
crithmifolia, Spreng. Syst. iii. 609.—Afr. austr.
crithmoides, Poir. Encyc. viii. 258 = *pilifera*.
dentata, Poir. l. c. 256.—Afr. austr.
filicaulis, DC. Prod. v. 689.—Afr. austr.
filiformis, Griessl. in Linnaea, v. (1830) 414.—Afr. austr.
foeniculacea, Poir. Encyc. viii. 258.—Afr. austr.
indecora, DC. Prod. v. 690.—Afr. austr.
leucanthemifolia, Poir. Encyc. viii. 258.—Afr. austr.
montana, DC. Prod. v. 688.—Afr. austr.
nana, DC. l. c. 690.—Afr. austr.
odorata, Spreng. Syst. iii. 609.—Afr. austr.
paleacea, Moench, Meth. 608.—Afr. austr.
paradoxa, Gaertn. Fruct. ii. 462. t. 174. f. 4.—Afr. austr.
pedunculosa, DC. Prod. v. 689.—Afr. austr.
pilifera, Gaertn. Fruct. ii. 463, in obs.; Poir. Encyc. viii. 256.—Afr. austr.
pinната, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 456 = *filiformis*.
pygmaea, DC. Prod. v. 690.—Afr. austr.
radicans, DC. l. c. 689.—Afr. austr.
scariosa, Poir. Encyc. viii. 257.—Afr. austr.
serrata, Spreng. Syst. iii. 609.—Afr. austr.
speciosa, DC. Prod. v. 690.—Afr. austr.
tenuifolia, Poir. Encyc. viii. 259.—Afr. austr.
tenuiloba, DC. Prod. v. 689 = *foeniculacea*.
tridentata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 456.—Afr. austr.

URTICA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). URTICACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 381.

- ADICEA, Rafin. Cat. 13 (1824).
 ILDEFONSA, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. i. 802 (1840).
 RUTICA, Neck. Elem. ii. 202 (1790).
 SELEPSION, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48 (1836).
acerifolia, Zenker, Pl. Ind. Dec. i. tt. 3, 4 = *Girardinia palmata*.
acuminata, Poir. Encyc. Suppl. iv. 224 = *Ureia acuminata*.
adensis, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 21 = *Girardinia condensata*.
aestuans, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1396 = *Fleurya aestuans*.
aestuans, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 734 = *Ureia alceaefolia*.
affinis, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 69 = *Fleurya interrupta*.
alata, J. F. Gmel. Syst. 268, sphalm. = *elata*.
alba, Blume, Bijdr. 499 = *Leucosyke alba*.
alba, Korth, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 165 = *Leucosyke sumatrana*.
alba, Rafin. Fl. Ludov. 114 (Quid?)—Am. bor.
alba, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 165 = *Leucosyke celebica*.
alba, Zipp. ex Blume, l. c. = *Leucosyke ochroneura*.
albidopunctata, Steud. Nom. ed. II. ii. 734 = *Pipturus argenteus*.
alceaefolia, Poir. Encyc. Suppl. iv. 227 = *Ureia alceaefolia*.
alienata, Jacq. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 231 = *Pouzolzia confinis*, indica.
alienata, Linn. Syst. ed. XII. 622 = *Pouzolzia indica*.

URTICA:—

- alienata*, Roth, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 231 = *Pouzolzia Rothiana*.
alnifolia, Bert. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 709 = *Trema micrantha*.
americana, Deless. ex Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 498 = *Laportea americana*.
amoena, Wall. Cat. n. 4626 (*Conocephali* sp.)—Ind. or.
andicola, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 198 = *echinata*.
angulata, Blume, Bijdr. 494 = *Pilea stipulosa*.
angustata, Blume, l. c. 499 = *Debregeasia velutina*.
angustifolia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 60 = *Boehmeria macrophylla*.
angustifolia, Fisch. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 107 = *dioica*.
anisophylla, Wall. Cat. n. 4594 = *Pilea anisophylla*.
appendiculata, Wall. Cat. n. 4604 = *Villebrunea integrifolia*.
aquatica, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 291 = *dioica*.
aquatica, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = *Boehmeria malabarica*.
arborea, Linn. f. Suppl. 417 = *Gesnoulia arborea*.
arborea, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 208 = *Cypholophus macrocephalus*.
arborescens, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 483 = *Pipturus asper*.
arborescens, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 386.—Ins. Philipp.
arborescens, Poir. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 59 (*Leucosykes* sp.?).—Hab.?
ardens, Blume, Bijdr. 504 = *Laportea microstigma*?
ardens, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 385 = *parviflora*.
argentea, Forst. f. Prod. 65 = *Pipturus argenteus*.
arguta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 39 = *Pilea arguta*.
armata, Kunth, ex Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 101 = *Girardinia palmata*.
armigera, Presl, Bot. Bemerk. 110 = *Ureia baccifera*.
articulata, Juss. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 180 = *Pilea articulata*.
arvensis, Poepp. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 200 = *Pilea hyalina*.
atlantica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 149 = *urens*.
atrovirens, Req. ex Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 432.—Europ. austr.
atrox, Leschen. ex Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 498 = *Laportea peltata*.
aucklandica, Hook. f. Fl. Antarct. 68.—Ins. Auckland.
australis, Hook. f. l. c.—N. Zel.
azorica, Hochst. ex Seub. Fl. Azor. 28 = *membranacea*.
baccifera, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 695 = *Pipturus asper*.
baccifera, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1398 = *Ureia baccifera*.
balearica, Linn. Syst. ed. X. 1265 = *pilulifera*.
ballotaefolia, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 197.—N. Granat.
Berlandiera, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 151 = *chamaedryoides*.
Berteroana, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 235 = *echinata*.
betulaefolia, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 59 = *Pilea hederacea*.
bicolor, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 589 = *Debregeasia hypoleuca*.
bifida, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 79 = *Boehmeria biloba*.
biloba, Hort. ex Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 144 (Quid?).—Hab.?
blanda, Wall. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 365 = *Boehmeria platyphylla*.
Blitum, Salz. ex Wedd. l. c. 569 = *Phenax vulgaris*.
Bollae, Kanitz, in Flora, lv. (1872) 17 = *dioica*.
bonariensis, Pers. Syn. ii. 552 = *spatulata*.
Bovista, Riddell, ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 61 = *chamaedryoides*.
bracteata, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 258 = *magellanica*.
Breweri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 348.—Am. bor. occ.
bulbifera, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 214 = *Laportea bulbifera*.

URTICA :—

- bullata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 145 = grandidentata.
bullosa, Hochst. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 259 = Girardinia bulbosa.
caerulea, Blume, Bijdr. 495 = Cypholophus Blumeanus.
caffra, Thunb. Prod. Pl. Cap. 31 = Fleurya capensis?
callitrichoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 40 = Pilea muscosa.
calophylla, Schlecht. in Linnaea, xxvii. (1854) 488 (Quid?).—Hab.?
canadensis, Linn. Sp. Pl. 985 = Laportea canadensis.
candicans, Burm. f. Fl. Ind. 197 (err. typ. 297) = Boehmeria nivea.
candidissima, Blume, Bijdr. 498 = Leucosyke javanica.
cannabina, Linn. Sp. Pl. 984.—As. bor.; Persia.
capensis, Linn. f. Suppl. 417 = Leidesia capensis.
capensis, E. Mey. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 582 = Fleurya capensis.
capitata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 483 = Fleurya interrupta.
capitata, Linn. Sp. Pl. 985 = Leucosyke alba.
capitata, Schwein. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 214 = Boehmeria cylindrica.
capitellata, Poir. Encyc. Suppl. iv. 227 = Leucosyke alba.
caracasana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 87.—Reg. Argent.
caracasana, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 71. t. 386 = Urea alceaefolia.
caravellana, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 82 = Fleurya aestuans.
carolinensis, Deless. ex Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 498 = Laportea carolinensis.
cataractae, Steud. Nom. ed. II. ii. 734 = Pilea trinervia.
caudata, Burm. f. Fl. Ind. 198 (err. typ. 298) = Boehmeria platyphylla.
caudata, Vahl, Symb. Bot. ii. 96 = membranacea.
caudata, Wall. Cat. n. 4600 = Pouzolzia caudata.
caudigera, Wall. Cat. n. 4585 = Boehmeria platyphylla.
celebica, Blume, Bijdr. 492 = Boehmeria platyphylla.
cellulosa, Spreng. Neue Entdeck. iii. 21 = Pilea ciliaris.
chamaedryoides, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 113.—Am. bor.
Chesneyana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 153 = pilulifera.
Chiple, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4616 = Pouzolzia viminea.
Churta, Buch.-Ham. ex Wall. l. c. 4608 = Laportea crenulata.
ciliaris, Linn. Syst. ed. X. 1266 = Pilea ciliaris.
ciliata, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1787) 32 = Pilea Swartzii.
cilindrica, Crantz, Inst. i. 147 = Boehmeria cylindrica.
cinerascens, Blume, Bijdr. 497 = Pipturus argenteus.
cinerascens, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 204 = Pouzolzia cinerascens.
cinerascens, Poir. Encyc. Suppl. iv. 226.—Ind. or.
cinerascens, Wall. Cat. n. 4591 = Boehmeria platyphylla.
collina, Bert. ex Spreng. Syst. iii. 839 = Pilea Chamaedrys.
comosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4616 = Boehmeria sidaefolia.
condensata, Hochst. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 260 = Girardinia condensata.
conglobata, Blume, Bijdr. 500 = Pouzolzia conglobata.
conglobata, Pav. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 102 (Phenacis sp.).—Hab.?
contracta, Blume, Bijdr. 505 (Villebruniae sp.?).—Java.
convexa, Hornem. ex Spreng. Syst. iii. 839 = pilulifera.
corallina, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 295 = Urea corallina.
cordata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 498, in syn. = Fleurya aestuans.
cordatifolia, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 258.—China.
cordifolia, Moench, Meth. 351 = pilulifera.
corylifolia, Juss. ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 226 = Fleurya aestuans.
corymbosa, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 640 = Pilea corymbosa.
crassifolia, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 222 = Boehmeria platyphylla.

URTICA :—

- crassifolia*, Willd. Sp. Pl. iv. 349 = Pilea densiflora.
crenata, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 208 = Cypholophus macrocephalus.
crenulata, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 591 = Laportea crenulata.
crenulata, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1785) 35; ex ej. Fl. Ind. Occ. i. 319 = Pilea cuneifolia.
cubensis, Klotzsch, ex Herd. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 38.—Cuba.
cuneata, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 224 = Fleurya umbellata.
cuneifolia, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. viii. (1787) 70 = Pilea cuneifolia.
cuneiformis, Herb. Mus. Par. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 56 = Pilea insignis.
cuneiformis, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 640 = Pilea cuneiformis.
cuneiformis, Stend. Nom. ed. II. ii. 734 = Pilea cuneifolia.
cuspida, Willd. Sp. Pl. iv. 349 = Pilea lucens.
cylindrica, Linn. Sp. Pl. 984 = Boehmeria cylindrica.
cylindrica, Wall. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 61 = Boehmeria platyphylla.
cylindrica, Wedd. l. c. = Pilea cuneifolia.
cymosa, Hassk. Pl. Jav. Rar. 200 = Fleurya cymosa.
Darwinii, Hook. f. Fl. Antarct. 343 = magellanica.
dasyphylla, Poepp. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 178 = Pilea globosa.
dauciodora, Pav. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 223 = Pilea dauciodora.
debilis, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 37 = Parietaria debilis.
decumana, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 587 = Laportea decumana.
depressa, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. viii. (1787) 64 = Pilea depressa.
dichotoma, Blume, Bijdr. 499 = Debregeasia dichotoma.
dichroa, Poepp. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 61 = Pilea nummulariaefolia.
diffusa, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. viii. (1785) 30 = Pilea diffusa.
dioecia, Hill, Veg. Syst. xxvi. 23 = seq.
dioica, Linn. Sp. Pl. 984.—Reg. bor. temp.
dioica, Thunb. Fl. Jap. 69 = Thunbergiana.
dioica, Vell. Fl. Flum. x. t. 18 = spatulata.
diplotricha, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 234 = dioica.
distachya, Spreng. Syst. iii. 840 = Boehmeria cylindrica?
divaricata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 160 = Fleurya aestuans.
divaricata, Linn. Sp. Pl. 985 = Laportea canadensis.
divergens, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 264 = Fleurya aestuans.
diversifolia, Blume, Bijdr. 498 = Maoutia rugosa.
diversifolia, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 385 = Girardinia palmata.
Dodartii, Linn. Syst. ed. X. 1265 = pilulifera.
dubia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 121 = membranacea.
echinata, Benth. Pl. Hartw. 252.—Am. austr.
Eckloniana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 142 = dioica.
elata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 37 = Urea sinuata.
elevata, Banks, ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 15 = morifolia.
elongata, Blume, Bijdr. 494 = Pilea trinervia.
elongata, J. F. Gmel. Syst. 269 = Boehmeria platyphylla.
elongata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 385.—Ins. Philipp.
elongata, Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix, 306.—Ind. occ.
evitata, Wall. Cat. n. 4588 = Laportea terminalis.
excelsa, Bert. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 261 = Boehmeria excelsa.
expansa, Sw. Adnot. Bot. 60; et Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 155 = Urea expansa.
falcicrenata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 293 = subincisa.
fasciculata, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 640 = Pilea pumila, A. Gray.
fastigiata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 151.—Chili.
fernandeziana, Stend. Nom. ed. II. ii. 734 = Parietaria debilis.
ferocissima, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 363 = Girardinia heterophylla.
ferox, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 484 = Laportea Gaudichaudiana.

URTICA :—

- ferox*, Forst. f. Prod. 66.—N. Zel.
ficifolia, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 638 = Obetia ficifolia.
filiformis, Walt. Fl. Carol. 230 = Boehmeria cylindrica?
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 4644.—Siam?
flabellata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 40.—Ecuador.
floribunda, H. B. & K. l. c. 38 = Pilea multiflora.
foliolosa, Wall. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 103 = Pouzolzia scabra.
foliosa, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 142.—Japon.
freireaeformis, Steud. Nom. ed. II. ii. 734 = Parietaria debilis.
frutescens, Poir. Encyc. Suppl. iv. 226 (Quid?).—Am. austr.
frutescens, Thunb. Fl. Jap. 70 = Villebrunea frutescens.
fruticosa, Banks, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 283 = Botryomorus paniculata.
fruticosa, Wight, Ic. t. 694 = Pouzolzia indica.
furialis, Boj. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 159 = Obetia ficifolia.
galeopsifolia, Jacq. f. ex Blume, l. c. 145.—Hab.?
galeopsifolia, Wierzb. ex Opiz, Natural. n. ix. (1825) 107 = dioica.
Gaudichaudii, Steud. Nom. ed. II. ii. 734 = Fleurya interrupta.
gemina, Lour. Fl. Cochinch. 558 = Acalypha australis.
gibbosa, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 54 = Pilea trinervia.
gigantea, Poir. Encyc. Suppl. iv. 225 = Laportea crenulata.
gigantea, Teysm. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 232 = Laportea amplissima.
Gigas, A. Cunn. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 129 = Laportea Gigas.
Girardinia, Steud. Nom. ed. II. ii. 734 = Girardinia heterophylla.
glaberrima, Blume, Bijdr. 493 = Pilea smilacifolia.
glabrata, Clem. ex Vis. Fl. Dalm. i. 217 = dioica.
glandulifera, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 293.—Mexic.
globosa, Pav. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 208 = Pilea globosa.
globulifera, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 593.—Ind. or.
glomerata, Klein, ex Willd. Sp. Pl. iv. 361 = Pouzolzia indica.
glomerulaeflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 735; et in Flora, xxxiii. (1850) 257.—Ins. J. Fernand.
Goglado, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4593 = Pilea smilacifolia.
gracilentia, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, viii. (1881) 122.—Mexic.
gracilescens, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 151 = chamaedryoides.
gracilis, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 341 = dioica.
gracilis, Rafin. Atl. Journ. 16 = chamaedryoides.
grandidentata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 296 = Urea bacifera.
grandidentata, Miq. Pl. Jungh. 27.—Java.
grandidentata, Moris, Stirp. Sard. Elench. fasc. ii. 9 = atrovirens.
grandifolia, Linn. Syst. ed. X. 1266 = Pilea grandis.
grandifolia, Sw. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 159 = Pilea pubescens.
grandifolia, Thunb. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 213 = Boehmeria platyphylla.
grandis, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 95 = Boehmeria stipularis.
grossa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 228 = Fleurya grossa.
grossa, Wall. Cat. n. 4615 = Distemon indicum.
grossecrenata, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 199 = Pilea pubescens.
Hamiltoniana, Wall. Cat. n. 4590 = Pilea scripta, Boehmeria platyphylla.
hastata, Forst. ex Spreng. Syst. iii. 836 = inermis.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient. iv. 1146.—Cataonia.
hederacea, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 642 = Pilea hederacea.
heracleifolia, Juss. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 107 = Obetia ficifolia.
herniarifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 359 = Pilea muscosa.
herniaroides, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 64 = Pilea muscosa.

URTICA :—

- heterophylla*, Vahl, Symb. Bot. i. 76 = Girardinia heterophylla.
heterophylla, Wight, Ic. t. 687 = Girardinia palmata.
himalayensis, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 11 = parviflora.
hippurioides, Griff. Itin. Notes, 362 = Ponzolzia pentandra.
hirsuta, Pav. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 220 = Pilea hirsuta.
hirsuta, Vahl, Symb. Bot. i. 77 = Flenrya aestuans?
hirta, Blume, Bijdr. 495 = Ponzolzia hirta.
hirta, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 285 = Phenax urticaefolius.
hispida, DC. Fl. Fr. Suppl. 355 = dioica.
hispida, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 880, sphalm. = Acalypha Poiretii.
hispidula, Cariot, Etude des Flenrs, ii. 505 = dioica.
holosericea, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 183.—Am. bor. occ.
horrida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 41 = Urera baccifera.
horrida, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 385 = Girardinia heterophylla.
humilis, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 69 = Rousselia lappulacea.
hygrophila, Miq. Pl. Jungh. 28 = Pilea hygrophila.
hyperborea, Jacquem. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 68.—Reg. Himal.
Hypselerodendron, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 260 = Urera Hypselerodendron.
Ildefonsia, Steud. Nom. ed. II. ii. 735.—Bras.
inaequalis, Juss. ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 222 = Pilea inaequalis.
incana, Blume, Bijdr. 497 = Pipturus velutinus.
incisa, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 4603 = Girardinia heterophylla.
incisa, Poir. Encyc. Suppl. iv. 224.—Austral. ; N. Zel.
inermis, Spreng. Syst. iii. 836.—Ins. Pacif.
iners, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 160 = urens.
iners, Nees & Mart. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 271 = Pilea Maximiliani.
integerrima, Blume, in Flora, vii. (1824) 291 = Phytocrene macrophylla.
integrifolia, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 637 = pilulifera.
interrupta, Jacq. ex Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. ii. 220 = Boehmeria Jacquiniiana.
interrupta, Linn. Sp. Pl. 985 = Flenrya interrupta.
interrupta, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = ovalifolia.
involuta, Roxb. Hort. Beng. 67 ; Fl. Ind. iii. 592 = Macaranga involucreta.
involucrata, Sims, Bot. Mag. t. 2481 = Pilea pnescens.
involuta, Steud. Nom. ed. II. ii. 735 = Macaranga involucreta.
japonica, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 694 = Pouzolzia viminea.
japonica, Linn. f. Suppl. 418 = Boehmeria platyphylla.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 70 (non Urticaceae).—Japon.
javanensis, Poir. ex Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = Laportea crenulata.
javanica, Blume, Bijdr. 503 = Flenrya interrupta.
kioviensis, Bogowitch, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1843) n. II. p. 324 = dioica.
laciniata, Goudot, ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 203 = Urera laciniata.
laetevirens, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxii. (1877) 236.—Japon.
lamiifolia, Juss. ex Pers. Syn. ii. 555 = Boehmeria nivea.
lamiifolia, Poir. ex Wedd. in Arch. Mns. Par. ix. (1856) 103 (Debregeasiae sp.).—Hab.?
lanceolata, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 225 = Pilea nudicaulis.
lanceolata, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 639 = Pilea lanceolata.
lappulacea, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 69 = Rousselia lappulacea.
latifolia, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62, nomen.—Zeylan.
latifolia, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 113 = Flenrya aestuans.
laurifolia, Poir. Encyc. Suppl. iv. 224.—Reg. Magellan.
laurina, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 76 (Villebruneae sp.).—Ins. Amboin.
laxa, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 58 = Pilea laxa.
leptophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 39 = magellanica.

URTICA :—

- leptostachya*, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 65 = Droguetia ovata.
leptostachys, Juss. ex Pers. Syn. ii. 554 = Droguetia ovata.
leucophaea, Blume, Bijdr. 493 = Pilea leucophaea.
leucophylla, Wall. Cat. n. 4067 = Debregeasia Wallichiana.
leucotrys, Rafin. Fl. Ludov. 114 (Quid ?).—Am. bor.
limoniodora, Pav. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 216 = Pilea citriodora.
Lindeniana, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 225 = Pilea serrulata.
lineata, Roxb. Hort. Beng. [103] ; Fl. Ind. iii. 589.—Ins. Molucc.
Linkiana, Heynh. Nom. i. 832 = Girardinia heterophylla.
lobata, E. Mey. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 144 = Meyeri.
lobulata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 228 = Meyeri.
lomatacarpa, Hochst. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 260 = Fleurya interrupta.
longifolia, Bnrm. f. Fl. Ind. 197 (err. typ. 297) = Debregeasia velutina.
longifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 348 = Pilea verbascifolia.
longipes, Mart. ex Miq. Fl. Bras. iv. i. 201 = Pilea hyalina.
Lowei, Seub. Fl. Azor. 28 = morifolia.
lucens, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 641 = Pilea lucens.
lucida, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 369 = Pilea densiflora.
lucida, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1785) 31 = Pilea lucida.
lucifuga, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 285 = incisa.
lusitanica, Brot. Fl. Lusit. i. 205 = membranacea.
lutescens, Blume, Bijdr. 494 = Cypholophus rufescens.
Lyallii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 348.—Am. bor. occ.
macrophylla, Hort. ex Schlecht. in Linnaea, xxvii. (1854) 488 = calophylla.
macrophylla, Thunb. Fl. Jap. 69 = Boehmeria platyphylla.
macrostachya, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 60 = Boehmeria macrophylla.
maculata, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 644 (Pileae sp.).—Ins. S. Doming.
madagascariensis, Juss. ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 227 = Obetia madagascariensis.
magellanica, Juss. ex Poir. l. c. 223.—Reg. Magellan.
major, Kanitz, in Bot. Zeit. xx. (1862) 190 ; xxi. (1863) 54 = dioica.
malabarica, Wall. Cat. n. 4610 = Boehmeria malabarica.
manillensis, Walp. ex Bur. in DC. Prod. xvii. 256 = Fatoua pilosa.
marginata, Poepp. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 238 = Pilea marginata.
mariana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = Boehmeria cylindrica.
Masafueriae, Phil. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 647 ; et in Anal. Univ. Chil. (1856) 167.—Ins. Masafuer.
melanocarpa, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 210 = Cypholophus melanocarpus.
melastomoides, Hort. ex Spreng. Syst. iii. 842 = Leucosyke alba.
melastomoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 38 = Pilea multiflora.
melastomoides, Poir. Encyc. Suppl. iv. 223 = Pilea trinervia.
membranacea, Barbieri, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 149 = urens.
membranacea, Bourg. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 54 = morifolia.
membranacea, Poir. ex Savigny, in Lam. Encyc. iv. 638.—Reg. Mediterr.
membranacea, Sw. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 103 = Urera membranacea.
mexicana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 140 = dioica.
mexicana, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 291.—Mexic.
Meyeniana, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 422 = Laportea stimulans?
Meyeri, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 64.—Afr. austr.
micrantha, Kunth & Bouché, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vii. (1847) 182.—Hab.?

URTICA :—

- microphylla*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1147 = Haussknechtii.
microphylla, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 66 = Pilea microphylla.
Milletii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 214 (sp. dub.).—China.
minima, Roxb. Hort. Beng. [103] ; Fl. Ind. iii. 585.—Ins. Molucc.
minor, Lam. Fl. Fr. ii. 194 = urens.
minutifolia, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 112.—Reg. Argent.
mitis, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 228 = Fleurya capensis.
mitis, Vell. Fl. Flum. x. t. 19 = Urera alceaefolia.
mollis, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 222 = Boehmeria platyphylla.
mollis, Steud. Nom. ed. II. ii. 735 ; et in Flora, xxxiii. (1850) 258.—Chili.
mollissima, Blume, Bijdr. 501 = Pipturus mollissimus.
mollissima, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 54 = Pouzolzia laevigata.
moluccana, Blume, Bijdr. 492.—Ins. Molucc.
monilifera, Sm. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 445 = Pipturus rotundifolius.
monoica, Gilib. Exercit. ii. 450 = urens.
montana, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 227 = Boehmeria monticola.
morifolia, Poir. Encyc. Suppl. iv. 223.—Ins. Canar.
morifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 20 = ballotaefolia.
moroides, A. Cunn. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 142 = Laportea moroides.
multiflora, Poir. Encyc. Suppl. iv. 223 = Pilea multiflora.
muralis, Vahl, Symb. Bot. i. 77.—Arab.
muricata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4612 = Debregeasia velutina.
Mutisiana, Spreng. Syst. iii. 840 = Pilea multiflora.
Myrapi, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 227 = Boehmeria monticola.
nana, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 60 = Pouzolzia indica.
nana, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 232.—N. Granat.
nauciflora, Roxb. Hort. Beng. 67 ; Fl. Ind. iii. 592 = Conocephalus suaveolens.
neglecta, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825) 11 = membranacea.
nemorosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 42 = Fleurya aestuans.
nicaraguensis, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 292.—Nicaragua.
nitida, Hort. Berol. ex Walp. Ann. i. 647 = Pilea densiflora.
nitida, Vell. Fl. Flum. x. t. 20 = Urera baccifera.
nivea, Linn. Sp. Pl. 985 = Boehmeria nivea.
nudicaulis, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1785) 34 = Pilea nudicaulis.
nummularifolia, Sw. l. c. viii. (1787) 63. t. 1. f. 2 = Pilea nummulariaefolia.
nutans, Poepp. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 196 = Pilea nutans.
obesa, Wall. Cat. n. 4587 = Pilea Wightii.
oblongata, Koch, ex Maly, Fl. N. Steierm. 63 = urens.
obnoxia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 305 = Laportea microstigma?
obtusata, Vahl, ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 262 = Pilea obtusata.
ochroneura, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 165 = Leucosyke ochroneura.
orbiculata, Rich. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 735 (Pileae sp.).—Hab.?
oreophila, Miq. Pl. Jungh. 27 = Pilea trinervia.
Orizabae, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 292 = chamaedryoides.
ovalifolia, Blume, Bijdr. 504.—Java.
ovalifolia, Buching. in Flora, xxviii. (1845) 88 = Fleurya capensis.
ovalifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 372 = urens.
palmata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 159 = Girardinia heterophylla.
palustris, Juss. ex Pers. Syn. ii. 552 = Boehmeria cylindrica.
paniculata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = Fleurya ruderalis.
paniculata, Roxb. Hort. Beng. [103] ; Fl. Ind. iii. 589 = Wallichiana.
parasitica, Blume, Bijdr. 506 = Pellionia javanica?

URTICA:—

- parasitica*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 160 = muralis.
Parietaria, Linn. Sp. Pl. 985 = *Pilea ciliaris*.
Parietaria, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 639 = *Pilea articulata*.
parietariaefolia, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 735 = *Parietaria debilis*.
parietariaefolia, Deless. ex Presl, Rep. Bot. 162 = *Urena parietariaefolia*.
parva, Blume, Bijdr. 502 = *Pouzolzia indica*.
parviflora, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 581. — Reg. Himal.
parvifolia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4616 = *Pouzolzia viminea*.
parvula, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 150 = *urens*.
pauciflora, Hochst. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 258 = *Droguetia diffusa*.
peduncularis, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 228 = *Fleurya capensis*.
peduncularis, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 6 = *Pilea trinervia*.
pedunculata, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 118 = *Fleurya capensis*.
pellucida, Labill. Sert. Austro-Caled. 79. t. 80 = *Pipturus velutinus*.
peltata, Blume, Bijdr. 496 = *Laportea peltata*.
pendula, Willd. Sp. Pl. iv. 358 = *Pilea rupiendia*.
penduliflora, Wall. Cat. n. 4595 = *Boehmeria macrophylla*.
pentandra, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 583 = *Pouzolzia pentandra*.
pepoides, Steud. Nom. ed. II. ii. 735 = *Pilea pepoides*.
petiolaris, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 215 = *Pilea stipulosa*.
petiolata, Steud. Nom. ed. II. ii. 735 = *Flenrya aestnans*.
photiniphylla, A. Cunn. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 139 = *Laportea photiniphylla*.
pilosa, Lour. Fl. Cochinch. 558 = *Acalypha Poiratii*.
pilosiuscula, Blume, Bijdr. 491 = *Boehmeria platyphylla*.
pilulifera, Linn. Sp. Pl. 983. — Reg. Mediterr.; Oriens; Ind. or.
Pittoni, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 147 = *membranacea*.
platyphylla, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 60 = *Boehmeria platyphylla*.
platyphylla, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 86 = *dioica*.
polystachya, Wall. Cat. n. 4584 = *Boehmeria polystachya*.
portulacina, Spreng. Syst. iii. 838 = *Pilea muscosa*.
portulacoides, Spreng. Neue Entdeck. iii. 21 = *Pilea muscosa*.
procera, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 353 = *dioica*.
procridioides, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 228 = *Pouzolzia procridioides*.
propinqua, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 293 = *chamaedryoides*.
Pseudo-dioica, Steud. Nom. ed. II. ii. 735; et in Flora, xxxiii. (1850) 257 = *dioica*.
pubescens, Ledeb. Fl. Alt. iv. 240, in nota = *dioica*.
pubescens, Roxb. ex Wall. Cat. n. 4614, sphalm. = *frutescens*.
pulchella, Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 385. — Ind. or.
pulcherrima, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 588 = *Sarcochlamys pulcherrima*.
pulcherrima, Wall. Cat. n. 4596 = *Boehmeria macrophylla*.
pulegifolia, Poir. Encyc. Suppl. iv. 224 = *Pilea pulegifolia*.
Pulus, Steud. Nom. ed. II. ii. 735 = *Laportea microstigma*?
pumila, Euphras. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 159 = *Pilea hyalina*.
pumila, Linn. Sp. Pl. 984 = *Pilea pumila*.
pumila, Schwein. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 213 = *Boehmeria cylindrica*.
punctata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4616 = *Pouzolzia viminea*.
punctata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 38 = *Pilea punctata*.
purpurascens, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 169 = *chamaedryoides*.
pusilla, Poir. Encyc. Suppl. iv. 224 = *Australina pusilla*.
pustulata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 294 = *Laportea canadensis*.

URTICA:—

- Puya*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4605 = *Maoutia Puya*.
quadrifolia, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 263 = *Pilea quadrifolia*.
quadrastipulata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 150 = *urens*.
quinqueneris, Wall. Cat. n. 4601 = *Pouzolzia Bennetiana*.
racemosa, Burm. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 112 = *Fleurya aestuans*.
racemosa, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 497 = *Fleurya interrupta*.
radicans, Bolla, in Verh. Ver. Naturk. Pressburg, i. (1856) Abh. 9; Sitzb. 24 = *dioica*.
radicans, Pohl, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 199 = *Pilea pubescens*.
radicans, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1785) 29 = *Pilea radicans*.
radicans, Wight, Ic. t. 1974 = *Pilea Wightii*.
Radula, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 228 = *Australina capensis*.
reclinata, Hort. Par. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 219 = *Pilea crassifolia*.
recurvata, Otto, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 147 = *membranacea*.
repanda, Blume, Bijdr. 501 = *Pipturus repandus*.
repanda, Kolmann, ex Planch. in DC. Prod. xvii. 199 = *Trema amboinensis*.
repens, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. viii. (1787) 61 = *Pilea repens*.
repens, Wall. Cat. n. 4619 = *Pouzolzia indica*.
reticulata, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 70 = *Pilea reticulata*.
rhodopleura, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 168 = *Villebrunea rhodopleura*.
rhombea, Linn. f. Suppl. 417 = *Pilea rhombea*.
Riedlei, Steud. Nom. ed. II. ii. 736 = *Pilea lucens*.
rigida, G. Don, ex Benth. in Hook. Niger Fl. 519 = *Boehmeria rigida*.
rivularis, Schlecht. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 541 = *Droguetia diffusa*.
rotundifolia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 60 = *Boehmeria platyphylla*.
rotundifolia, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 644 = *Pipturus rotundifolius*.
Roxburghii, Steud. Nom. ed. II. ii. 736 = *Villebrunea frutescens*.
rubescens, Blume, Bijdr. 506 = *Villebrunea scabra*.
rubra, Rafin. Fl. Ludov. 113 (Quid?). — Am. bor.
rubra, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 203 = *Pouzolzia viminea*.
rubricaulis, Herd. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 34. — Hab.?
rubricaulis, Hornem. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 150 = *stachyoides*?
rubricaulis, Span. in Linnaea, xv. (1841) 344. — Ins. Timor.
ruderalis, Forst. f. Prod. 66 = *Flenrya ruderalis*.
rufa, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 59 = *Pilea rufa*.
rugosa, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 223 = *Boehmeria platyphylla*.
rugosa, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 60 = *Pilea rugosa*.
rugosissima, Reinw. in Blume, Bijdr. 490 = *Boehmeria platyphylla*.
rugosula, Wall. Cat. n. 4597 = *Boehmeria rugulosa*.
Rumphii, Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl. ii. 400 (Laportea sp.?). — Ins. Molucc.
rupestris, Guss. Adnot. Cat. Pl. Boccad. (1821) 15. — Sicil.
rupiendia, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 640 = *Pilea rupiendia*.
salicifolia, Roxb. Hort. Beng. 67 = *Debregeasia hypoleuca*.
salicifolia, Vahl, ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 334 = *Lecanthus Wightii*, *Elatostema papillosum*.
sandwicensis, Wedd. l. c. 67 = *Hesperocnide sandwicensis*.
sanguinea, Blume, Bijdr. 501 = *Pouzolzia viminea*.
saxicola, Mor. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 105 (al. ord.). — Hab.?
scabra, Blume, Bijdr. 504 (al. ord.). — Java.
scabra, Zoll. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 167 = *Villebrunea scabra*.
scabrella, Hornem. ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 29 = *U. Ildefonsia*.

URTICA:—

- scabrella*, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 581 = *Boehmeria platyphylla*.
Scalpe, Comm. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 198 = *spatulata*.
Schimperiana, Hochst. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 259 = *Fleurya aestuans*.
scripta, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 59 = *Pilea scripta*.
semicrenata, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 167 = *Villebrunea semicrenata*.
sementata, Juss. ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 222 = *Pilea seimentata*.
semiserrata, Sm. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 569 = *Phenax vulgaris*.
serpyllacea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 37 = *Pilea serpyllifolia*.
Serra, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 140. — Mexic.
serrulata, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 65 = *Pilea serrulata*.
sessiliflora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 696 = *Fleurya interrupta*.
sessiliflora, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1785) 33 = *Pilea sessiliflora*.
sessilifolia, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 642 = *Pilea sessilifolia*.
sessilifolia, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 105, sphalm. = *sessiliflora*, Blanco.
sicula, Gasp. ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 580 = *dioica*.
simensis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 260. — Abyss.
sinuata, Blume, Bijdr. 605 = *Laportea crenulata*.
smilacifolia, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 279 = *Pilea smilacifolia*.
spatulata, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 17. — Am. austr.
sphaerocephala, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 589 = *Leucosyke alba*.
spicata, Thunb. Fl. Jap. 69; Blume, Bijdr. 492 = *Boehmeria platyphylla*.
spicigera, Steud. Nom. ed. II. ii. 736 = *Fleurya interrupta*.
spinosa, Blume, Bijdr. 507 = *Taxotrophis javanica*.
spiralis, Domb. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 232 = *Myriocarpa densiflora*.
spirealis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 152. — Mexic.
quamigera, Wall. Cat. n. 4592 = *Chamaebainia cuspidata*.
stachydidifolia, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 11 = *chamaedryoides*.
stachyoides, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 259. t. 210. — Ins. Canar.
stachyophylla, Webb, ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 73 = *stachyoides*.
stimulans, Linn. f. Suppl. 418 = *Laportea stimulans*.
stipulacea, Bertol. Misc. Bot. ii. 24. — As. Min.
stipulosa, Miq. Pl. Jungh. 28 = *Pilea stipulosa*.
stolonifera, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. viii. (1787) 62 = *Pilea stolonifera*.
strigosa, Blume, Bijdr. 495 = *Pouzolzia indica*.
subcordata, Comm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 736 = *Pilea lucens*.
subincisa, Benth. Pl. Hartw. 293. — Mexic.
submitis, Boiss. Fl. Orient. iv. 1146 = *dioica*.
subperforata, Wall. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 383 = *Boehmeria subperforata*.
succulenta, Salzm. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 177 = *Pilea hyalina*.
suffruticosa, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 584 = *Pouzolzia indica*.
superba, Wall. Cat. n. 4625 (Conocephali sp.). — Ind. or.
sycophylla, Bory, Voy. i. 281 = *Obetia ficifolia*.
sylvatica, Blume, Bijdr. 506 = *Villebrunea sylvatica*.
tasmanica, F. Muell. First Gen. Rep. 18 = *Australina Muelleri*.
tenacissima, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 590 = *Boehmeria nivea*.
tenuis, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 257 = *Pouzolzia indica*.
ternata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4599 = *Pouzolzia Wightii*.
ternifolia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 59 = *Boehmeria platyphylla*.
tetraphylla, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 260 = *Pilea tetraphylla*.
Thunbergiana, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 214. — Japon.

URTICA :—

- thymifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 37 = *Pilea globosa*.
tiliaefolia, H. B. & K. l. c. 42 = *Urera alceaefolia*.
tomentosa, Juss. ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 367 = *Boehmeria platyphylla*.
trachycarpa, Wedd. l. c. 95 = *holosericea*.
triandra, Blume, Bijdr. 496 = *Pouzolzia parvifolia*.
trianthemoides, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. viii. (1787) 68 = *Pilea muscosa*.
trilobata, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 639 = *Pilea trilobata*.
trinervia, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 582 = *Pilea trinervia*.
triplinervia, Poir. Encyc. Suppl. iv. 224 = *Pilea lucens*.
triplinervia, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 220 = *Pouzolzia indica*.
triplinervis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. snb n. 4590 = *Pilea scripta*.
triplinervis, Juss. ex Pers. Syn. ii. 552 = *Pilea lucens*.
triplinervis, Wall. Cat. n. 4617 = *Pouzolzia indica*.
tuberculata, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 159 = *Fleurya aestuans*.
tuberosa, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 583 = *Pouzolzia tuberosa*.
ulmifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 42 = *Urera alceaefolia*.
ulmifolia, Vahl, ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 569 = *Phenax vulgaris*.
umbellata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 696 = *Laportea Gaudichaudiana*.
umbellata, Bory, Voy. iii. 173 = *Pilea insignis*.
umbrosa, Wall. Cat. n. 4598 = *Pilea umbrosa*.
uragera, Steud. Nom. ed. II. ii. 736 = *Boehmeria platyphylla*.
urens, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 736 = *spatulata*.
urens, Linn. Sp. Pl. 984.—Geront. temp.
urentissima, Comm. ex Pers. Syn. ii. 552 = *spatulata*.
urophylla, Wall. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 166 = *Villebrunea integrifolia*.
utilis, Hort. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 146 = *Boehmeria nivea*.
variegata, Spreng. Syst. iii. 839 = *Pilea sessiliflora*.
venosa, Wall. Cat. n. 4602 A = *Boehmeria polystachya*.
venosa, Wall. l. c. B = *Boehmeria rugulosa*.
verbascifolia, Savigny, in Lam. Encyc. iv. 641 = *Pilea verbascifolia*.
verna, Rafin. Atl. Journ. 16 = *chamaedryoides*.
veronicaefolia, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. x. 296 (Quid?).—Jamaic.
verrucosa, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 295 = *Urera alceaefolia*.
verrucosa, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62, nomen = *Debregeasia velutina*.
verticillata, Vahl, Symb. Bot. i. 76 = *urens*.
vesicaria, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 587 = *Pouzolzia vesicaria*.
villosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 695 = *Pouzolzia indica*.
villosa, Salzm. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 197 = *Fleurya aestuans*.
villosa, Thunb. Fl. Jap. 70.—Japon.
viminea, Wall. Cat. n. 4616 = *Boehmeria sidaefolia*, *Pouzolzia viminea*.
virgata, Forst. f. Prod. 66 = *Boehmeria platyphylla*.
virulens, Royle, Illustr. Bot. Himal. 333, 466 (Index), sphalm. = seq.
virulenta, Wall. Cat. n. 4586 = *parviflora*.
Wallichiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 736.—Ins. Molucc.
Whitlowi, Muhl. in Green, Cat. Pl. N. York; ex Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 123 = *Laportea canadensis*.

URUCU, Adans. Fam. ii. 381 (1763) = **Bixa**, Linn.

URUPARIA, Rafin. Sylva Tellur. 148 (1838) = OUROPARIA, Aubl. = **Uncaria**, Schreb. (Rubiaceae).
versicolor, Rafin. l. c. = *Uncaria guianensis*.

URVILLAEA, DC. Prod. i. 602 (1824) = seq.

URVILLEA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 105. t. 440 (1821). *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 392.
affinis, Schlecht. in *Linnaea*, xviii. (1844) 38 (err. typ. 54).—Bras.

URVILLEA :—

- Berteriana*, DC. Prod. i. 602.—N. Granat.
dasycarpa, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 265.—Mexic.
euryptera, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 79.—Reg. Argent.
euryptera, Griseb. l. c., partim = *Serjania hebecarpa*.
ferruginea, Lindl. Bot. Reg. t. 1077 = *Serjania cuspidata*.
glabra, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 192, in obs. = *Serjania tenuis*.
glabra, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 353.—Bras.
glabrata, Steud. Nom. ed. II. i. 736, sphalm. = praec. intermedia, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 263.—Bras.
laevis, Radlk. in Atti, Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 63.—Bras.
mexicana, A. Gray, Pl. Wright. i. 38.—Mexic.
pubescens, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1179, nomen (Quid?).—Guian.
rufescens, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 354.—Bras.
Schomburgkii, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1180, nomen = *Serjania paucidentata*.
Seriana, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 123 = *ulmacea*.
stipitata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 264.—Bras.
tenera, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 215.—Bras.
tridentata, Miq. in *Linnaea*, xix. (1847) 434 = *Serjania dentata*.
triphylia, Radlk. Monog. Serj. 47, 73.—Bras.
ulmacea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 105. t. 440.—Venezuela.
uniloba, Radlk. Monog. Serj. (1875) 173 = *ulmacea*.
villosa, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 265.—Bras.

USIONIS, Rafin. Alsog. Am. 14 (1838) = **Salix**, Tourn. *aquatica*, Rafin. l. c. = *S. cinerea*.
aurita, Rafin. l. c. = *S. aurita*.
Dicksoniana, Rafin. l. c. = *S. phlyicifolia*.
foliolosa, Rafin. l. c. = *S. foliolosa*.
fuscata, Rafin. l. c. = *S. petiolaris*.
grisea, Rafin. l. c. = *S. petiolaris*.
humilis, Rafin. l. c. 17 = *S. humilis*.
pedicellaris, Rafin. l. c. 14 = *S. myrtilloides*.
petiolaris, Rafin. l. c. = *S. petiolaris*.
rosmarinifolia, Rafin. l. c. = *S. repens*.
uliginosa, Rafin. l. c. = *S. aurita*.

USTERIA, Cav. Ic. ii. 15. t. 116 (1793) = **Maurandia**, Ortega (Scrophul.).
antirrhiniflora, Poir. Encyc. Suppl. v. 405 = *Antirrhinum maurandioides*.
scandens, Cav. Ic. ii. 15 = *M. semperflorens*.

USTERIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) = **Acalypha**, Linn. (Euphorb.).
racemosa, Dennst. l. c. = *A. paniculata*.

USTERIA, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 480 = **Scilla**, Linn. (Liliac.).
disperma, Medic. in Usteri, Ann. Bot. ii. (1791) 11 = *S. hispanica*.
hyacinthiflora, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 480 = *S. festalis*.
secunda, Medic. in Usteri, Ann. Bot. ii. (1791) 12 = *S. festalis*.

USTERIA, Willd. in Roem. & Usteri, Mag. (1790) 151; et ex Ges. Naturf. Fr. Berl. Schr. x. (1792) 51. t. 2. *LOGANIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 796.
MONODYNAMIS, J. F. Gmel. Syst. 10 (1791).
guianensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 736, sphalm. = seq.
guineensis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Schr. x. (1792) 55.—Afr. trop.
volubilis, Afzel. Gen. Guin. [27], cum ic. in titulo.—Afr. trop.

USUBIS, Burm. f. Fl. Ind. 89. t. 32. f. 1 (1768) = **Allophylus**, Linn. (Sapind.).
triphylia, Burm. f. l. c. = *A. Cobbe*.

UTANIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 663 (1837) = **Fagraea**, Thunb. (Logan.).
morindaefolia, G. Don, l. c. = *F. morindaefolia*.

UTANICA, Steud. Nom. ed. II. ii. 736 (1841), sphalm. = praec.

UTEA, Jaume St. Hil. Expos. ii. 203 (1805) = **OUTEA**, Aubl. = **Macrolobium**, Schreb. (Legumin.).

UTERVERIA, Bertol. Pl. Nov. Hort. Bonon. ii. 8 (1839) = **Capparis**, Tourn.

Breynia, Bertol. l. c. 10 = *C. Breynia*.
comosa, Bertol. l. c. 9 = *C. comosa*.
Cynophallophora, Bertol. l. c. = *C. Cynophallophora*.
Eustachiana, Bertol. l. c. = *C. Eustachiana*.
frondosa, Bertol. l. c. 8 = *C. frondosa*.
linearis, Bertol. l. c. 10 = *C. linearis*.
tenuisiliqua, Bertol. l. c. = *C. tenuisiliqua*.
verrucosa, Bertol. l. c. 9 = *C. verrucosa*.

UTLERIA, Bedd. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 743 (1876). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. l. c. *salicifolia*, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 7.—Ind. or.

UTRICULARIA, Linn. Syst. ed. I. (1735). *LENTIBULARIAE*, Benth. & Hook. f. ii. 987.

AKENTRA, Benj. in *Linnaea*, xx. (1847) 319.
ASKOFAKE, ENSKIDE, HAMULIA, LEPIACTIS, MEGOPIZA, MEIONULA, MELONEURA, NELIPUS, PERSONULA, PLECTOMIA, PLESISA, STOMOISIA, TRILOBULINA, TRIXAPIAS, VESICULINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 108–110 (1836).

DIUOSPERMUM, Edgew. in Proc. Linn. Soc. i. (1847) 351.

LENTIBULARIA, Adans. Fam. ii. 208 (1763).
acuta, Benj. in *Linnaea*, xx. (1847) 314 = *caerulea*.
adpressa, Salzm. ex A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 159.—Bras.

affinis, Wight, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 373; et l. c. t. 1580/1.—Ind. or.

alata, Benj. in Bot. Zeit. iii. (1845) 212.—Ind. or.
alba, Hoffmgg. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 54 = *obtusa*.

albiflora, R. Br. Prod. 431.—Austral.

albiflora, Griff. Notul. iv. 168.—Burma.

albo-coerulea, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 279.—Ind. or.

alpina, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 655.—Sibir. or.

alpina, Jacq. Enum. Pl. Carib. 11.—Am. trop.

ambigua, A. DC. in DC. Prod. viii. 9 = *exoleta*.
amethystina, Salzm. ex A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 162.—Am. trop.

andicola, Benj. in *Linnaea*, xx. (1847) 308.—Mexic.

angulosa, Poir. Encyc. viii. 273.—Guian.

angustifolia, Benj. in *Linnaea*, xx. (1847) 311.—Bras.

anomala, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 153.—Am. trop.

antirrhinoides, Wall. Cat. n. 1498 B = *bifida*.

aphylla, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 20. t. 31. f. d.—Peruv.

appressa, Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 244 = *adpressa*.

arcuata, Wight, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 372; et l. c. t. 1571/1.—Ind. or.

arenaria, A. DC. in DC. Prod. viii. 20.—Afr. trop.

aurea, Lour. Fl. Cochinch. 26.—Cochinch.

australis, R. Br. Prod. 430 = *flexuosa*.

barbata, R. Br. l. c. 432.—Austral.

Baueri, R. Br. l. c. 431.—Austral.

Benjaminiana, Oliver, in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 176.—Guian.

bicolor, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 162.—Bras.

bifida, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 25 = *hians*.

bifida, Linn. Sp. Pl. 18.—As. et Austral. trop.

bifida, Macrae, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 21 = *racemosa*.
bifida, Wight, l. c. t. 1584 f. 2 = *verticillata*.

biflora, Bonpl. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 10 = *obtusa*.

biflora, Lam. Illustr. i. 50.—Am. bor.

biflora, Nutt. Gen. Am. i. 13 = *longirostris*.

biflora, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 144 = *exoleta*.

biflora, Wall. Cat. n. 1498 = *bifida*.

biloba, R. Br. Prod. 432.—Austral.

bipartita, Chapm. Fl. S. U. St. 283 = *fibrosa*.

bipartita, Ell. Sketch, i. 22.—Am. bor.

bisquamata, Schrank, in Flora, vii. (1824) II. Beil. 9.—Afr. austr.

UTRICULARIA :—

- Blanchetii, A. DC. in DC. Prod. viii. 13.—Bras.
 Blumei, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 994 = flexuosa.
 Botecudorum, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 151.—Bras.
 brachiata, Oliver, in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 187.—Reg. Himal.
 brachypoda, Wight, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 373; et Ic. t. 1578/1 = affinis.
 Bremii, Heer, ex Koelliker, Verz. Phan. Gew. Zuer. 142 = minor.
 brevicaulis, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 303 = bifida.
 breviscapa, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 161.—Cuba.
 caerulea, Benth. Fl. Hongk. 256 = affinis.
 caerulea, A. DC. in DC. Prod. viii. 19 = racemosa.
 caerulea, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 1493 = reticulata.
 caerulea, Linn. Sp. Pl. 18.—Ind. or.
 calumpitensis, Llanos, Fragm. 11.—Ins. Philipp.
 calycifida, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 493.—Guian.
 campestris, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 333 = racemosa.
 capensis, Spreng. Syst. i. 50.—Afr. austr.
 capillacea, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 171 = Wallichiana.
 capillacea, Wall. Cat. n. 6399 = scandens.
 capillacea, Willd. Sp. Pl. i. 113.—Ind. or.
 capillaris, D. Don, Prod. Fl. Nep. 85.—Nepal.
 capillaris, Hoffmgg. ex A. Dietr. Sp. Pl. i. 466 = filiformis.
 ceratophylla, Michx. Fl. Bor. Am. i. 12 = inflata.
 cernua, Hoffmgg. ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 237 = oligosperma.
 Chamissonis, G. Weber, ex Benj. l. c. 241 = globulariaefolia.
 chrysantha, R. Br. Prod. 432.—Austral.
 clandestina, Nutt. ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 287.—Am. bor.
 coccinea, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 490.—Am. trop.
 coerulea, Auct. = caerulea.
 Colensoi, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 206.—N. Zel.
 colorata, Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 240.—Bras.
 complanata, Wall. Cat. n. 1497 = racemosa.
 compressa, R. Br. Prod. 431.—Austral.
 conferta, Hassk. in Versl. en Kon. Akad. Wetensch. iv. (1855) 137; Retzia, i. 90.—Java?
 conferta, Wight, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 372; et Ic. t. 1575 = caerulea.
 confervaeifolia, Jacks. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 84 = flexuosa.
 cornuta, Michx. Fl. Bor. Am. i. 12.—Am. bor. et austr.
 crenata, Vahl, Enum. i. 203 = aphylla.
 cucullata, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 152.—Bras.
 cyanea, R. Br. Prod. 431.—Austral.
 cymbantha, [Welw. ex] Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 147.—Afr. trop.
 decipiens, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 279 = affinis.
 dentata, G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 248 = polyschista.
 denticulata, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 492.—Mexic.
 diantha, A. DC. in DC. Prod. viii. 21 = bifida.
 diantha, Schult. Mant. i. 169 = exoleta.
 dichotoma, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 11. t. 8.—Austral.
 diflora, Roxb. Hort. Beng. 4 = exoleta.
 diploglossa, Welw. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 147.—Afr. trop.
 dubia, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 494.—N. Granat.
 dubia, Rosellini, ex Ces. Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital. 416 = vulgaris?
 Ecklonii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 336.—Afr. austr.
 elegans, Wall. Cat. n. 1502 = exoleta.
 emarginata, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 489.—Mexic.
 Endresii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1874) II. 582.—Costa Rica.
 erectiflora, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 159.—Bras.
 exilis, Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 154.—Afr. trop.
 exoleta, R. Br. Prod. 430.—As. et Austral. trop.
 extensa, Hance, in Walp. Ann. iii. 3 = flexuosa.
 fasciculata, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 143 = flexuosa.
 fibrosa, Chapm. Fl. S. U. St. 283 = biflora.

UTRICULARIA :—

- fibrosa, Walt. Fl. Carol. 64.—Am. bor.
 filicaulis, Wall. Cat. n. 1501 = racemosa.
 filiformis, Roem. & Schult. Syst. i. 199.—Bras.
 fimbriata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 225.—Venezuela.
 firmula, Welw. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 152.—Afr. trop.
 flaccida, A. DC. in DC. Prod. viii. 17.—Bras.
 flava, R. Br. Prod. 432 = chrysantha.
 flexuosa, Vahl, Enum. i. 198.—As. et Austral. trop.
 Fockeana, Miq. Stirp. Surin. Sel. 113.—Guian.
 foliosa, Linn. Sp. Pl. 18.—Am. trop.
 foliosa, Salzm. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 26 = Genlisea filiformis.
 fontana, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 163.—Bras.
 fornicata, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 76. t. 6. f. 6 = gibba.
 foveolata, Edgew. in Proc. Linn. Soc. i. (1847) 351.—Bengal.
 fulva, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. iii. (1858) 63.—Austral.
 furcata, Pers. Syn. i. 18 = aphylla.
 furcellata, Oliver, in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 189.—Reg. Himal.
 fusiformis, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1874) 9.—Bras.
 Gayana, A. DC. in DC. Prod. viii. 9.—Chill.
 geminiloba, Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 242.—Bras.
 geminiscapa, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 305 = clandestina.
 genliseoides, Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 250.—Bras.
 gibba, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 76 = minor.
 gibba, Linn. Sp. Pl. 18.—Am. bor.
 gibbosa, Hill, Veg. Syst. xx. 45 = praec.
 glandulosa, G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 254 = Genlisea violacea.
 globulariaefolia, Mart. ex Benj. l. c. 241.—Bras.
 glochidiata, Wight, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 373; et Ic. t. 1581 = orbiculata.
 Gomezii, A. DC. in DC. Prod. viii. 13.—Bras.
 gracilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 225 = obtusa.
 gracilis, Lepr. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 147 = exoleta.
 Grafiana, Koch, in Flora, xxx. (1847) 265 = intermedia.
 graminifolia, Banks & Soland, ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 179 = affinis?
 graminifolia, R. Br. Prod. 432 = cyanea.
 graminifolia, J. Grah. Cat. Pl. Bomb. 165 = reticulata.
 graminifolia, Vahl, Enum. i. 195 = caerulea.
 grandiflora, Pers. Syn. i. 18 = alpina.
 Greenei, Oakes, in Hovey, Mag. Hort. vii. (1841) 180 = resupinata.
 Griffithii, Wight, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 373; et Ic. t. 1576 = affinis.
 guianensis, Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 323.—Guian.
 guyanensis, A. DC. in DC. Prod. viii. 11.—Guian.
 Harlandi, Oliver, ex Benth. Fl. Hongk. 257.—Ins. Hongkong.
 heterosepala, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 310.—Ins. Philipp.
 hians, A. DC. in DC. Prod. viii. 25.—Madag.
 hirta, Klein, ex Link, Fahr. i. III. (1820) 55.—Ind. or.
 hirtella, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 156.—Bras.
 hispida, Lam. Illustr. i. 50.—Guian.
 Hookeri, Lehm. Pugill. viii. 47.—Austral.
 Humboldtii, Rob. Schomb. in Verh. Bevoerd. Gartenb. Preuss. xv. (1841) 141. t. 3.—Guian.
 humilis, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1495 = reticulata.
 humilis, Vahl, Enum. i. 203 = bifida.
 hydrocarpa, Vahl, l. c. 200.—Guian.
 ibarensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 427.—Madag.
 inaequalis, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 304 = flexuosa.
 inaequalis, Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 243 = subulata.
 inaequalis, A. DC. in DC. Prod. viii. 666 = Hookeri.
 inflata, Walt. Fl. Carol. 64.—Am. bor.
 inflexa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 9 = stellaris.
 integra, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 76 = biflora.
 intermedia, Hayne, in Schrad. Journ. (1800) I. 18; Roth, Catalect. fasc. ii. (1800) p. ante 1.—Europ.; As. et Am. bor.

UTRICULARIA :—

- intricata, Griff. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 179 = affinis.
 Jamesoniana, Oliver, l. c. iv. (1860) 169.—Ecuador.
 juncea, Vahl, Enum. i. 202.—Am. bor. et austr.
 kumaonensis, Oliver, in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 189.—Reg. Himal.
 laciniata, Mart. ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 251 = Polypompholyx laciniata.
 laciniata, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 157.—Bras.
 lagoënsis, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1874) 1.—Bras.
 lasiocaulis, F. Muell. in Melb. Chemist, (1885) 50.—Austral.
 lateriflora, R. Br. Prod. 431.—Austral.
 latilabata, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 315 = Hookeri.
 latiloba, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 82 = Polypompholyx multifida.
 laxa, A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 160.—Bras.
 Lehmanni, Benj. in Bot. Zeit. iii. (1845) 213.—Afr. trop.
 leptantha, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 313 = pnsilla.
 leptoplectra, F. Muell. in Melb. Chemist (1885), 50.—Austral.
 lilacina, Griff. Notul. iv. 168.—Burma.
 limosa, R. Br. Prod. 432.—Austral.
 linarioides, Welw. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 151.—Afr. trop.
 linearifolia, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 306 = Hookeri.
 lingulata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1888) 216.—Madag.
 lingulata, G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 246 = nana.
 livida, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 281.—Afr. austr.
 longecalcarata, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 314.—Afr. austr.
 longeciliata, A. DC. in DC. Prod. viii. 23 = Polypompholyx laciniata.
 longifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 545.—Bras.
 longirostris, Le Conte, in Ell. Sketch, i. 21 = fibrosa.
 longissima, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gu. 973, nomen.—Guian.
 Lundii, A. DC. in DC. Prod. viii. 14.—Bras.
 macrocarpa, Wall. Cat. n. 1494 = stellaris.
 macroceras, A. DC. in DC. Prod. viii. 666 = Menziesii.
 macrolepis, Wight, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 373; et Ic. t. 1580/2 = Wallichiana.
 macroptera, G. Brueckn. ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. III. 274 = minor.
 macrorrhiza, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 73 = foliosa.
 madagascariensis, A. DC. in DC. Prod. viii. 20.—Madag.
 major, Koen. ex Vahl, Enum. i. 200, in nota = hydrocarpa.
 major, Schmidel, Ic. Pl. ed. Bischof, 80. t. 21. ff. a-l.—Europ.
 Mannii, Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 149.—Afr. trop.
 maxima, G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 249.—Bras.
 media, Salzm. ex A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 155 = subulata.
 media, Schum. Enum. Pl. Saell. i. 9 = intermedia.
 Menziesii, R. Br. Prod. 431.—Austral.
 micrantha, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 495.—N. Granat.
 microcarpa, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. x. 305 = pusilla.
 micropetala, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 58.—Afr. trop.
 millefolia, Nutt. ex Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 28 = intermedia.
 minima, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1874) 6.—Bras.
 minor, Linn. Sp. Pl. 18.—Europ.; As. et Am. bor.
 minor, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 15 = gibba.
 minor, Thuill. Fl. Par. ed. II. 12 = intermedia.
 minutissima, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 25 = perpusilla.
 minutissima, Vahl, Enum. i. 204.—Malacca.
 modesta, A. DC. in DC. Prod. viii. 17.—Bras.

UTRICULARIA:—

- monantha, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 244.—Bras.
 monanthos, *Hook. f. Fl. Tasm.* i. 299.—Tasman.; N. Zel.
montana, Jacq. *Select. Am.* 7. t. 6 = alpina.
montana, *Poir. Encyc.* viii. 268.—Ins. Martinic.
multicaulis, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 188.—Reg. Himal.
multifida, *R. Br. Prod.* 432 = *Polypompholyx multifida*.
muscosa, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 489.—Guian.
myriocista, *A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 150.—Am. trop.
nana, *A. St. Hil. & Girard, l. c.* 156.—Bras.
natans, *Salzm. ex A. St. Hil. & Girard, l. c.* 154 = *pallens*.
neglecta, *Lehm. Ind. Scholar. Hamb.* (1828) 38 = *major*.
nelumbifolia, *Gardn. in Hook. Ic. Pl.* t. 505–506.—Bras.
neottioides, *A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 157.—Bras.
nephrophylla, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 246.—Bras.
nervosa, *G. Weber, ex Benj. l. c.* 247.—Bras.
nivea, *Vahl, Enum.* i. 203 = *racemosa*.
Novae-Zelandiae, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 206.—N. Zel.
obovata, *Miq. in Linnaea*, xix. (1847) 144 = *amethystina*.
obovata, *G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 253 = *Genlisea repens*.
obtusata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 14.—Am. trop.
obtusata, *Sw. Fl. Ind. Occ.* i. 41 = *praec.*
obtusiloba, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 312.—Ind. or.; China.
occidentalis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 95.—Am. bor. occ.
ochroleuca, *R. Hartm. in Bot. Notiser* (1857), 30.—Europ.
oligocista, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 491.—N. Granat.
oligosperma, *A. St. Hil. Voy. Distr. Diam.* ii. 427.—Bras.
olivacea, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 161.—Cuba.
oppositiflora, *R. Br. Prod.* 430 = *dichotoma*.
oppositifolia, *Spreng. Syst.* i. 50 = *dichotoma*.
orbiculata, *Wall. Cat. n.* 1500.—As. trop.
oryzatorum, *Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 331 = *reticulata*.
palatina, *G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 239.—Bras.
pallens, *A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 153.—Guian.
Parkeri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 216.—Madag.
Parkeriana, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 9.—Am. trop.
parviflora, *R. Br. Prod.* 431 = *lateriflora*.
pauciflora, *Blume, Bijdr.* 739.—Java.
paucifolia, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 309.—Ind. or.
pectinata, *Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848) 325.—Guian.
pedicellata, *Wight, in Hook. Kew Journ.* i. (1849) 373; et *Ic. t.* 1578/2 = *caerulea*.
peltata, *Spruce, ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 172.—Am. trop.
perminuta, *F. Muell. Fragm.* vi. 160 = *violacea*.
perpusilla, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 25.—Madag.
personata, *Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i.* (1824) 77. t. 6 = *cornuta*.
picta, *Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1874) 10.—Bras.
polygaloides, *Edgew. in Proc. Linn. Soc.* i. (1847) 351 = *reticulata*.
polyschista, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 248.—Bras.
porphyrophylla, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 162.—Cuba.
praelonga, *A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 161.—Bras.; Guian.
prehensilis, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 282.—Afr. austr.
Preissii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 666 = *Hookeri*.
protrusa, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 206.—N. Zel.
pterosperma, *Edgew. in Proc. Linn. Soc.* i. (1847) 352 = *exoleta*.

UTRICULARIA:—

- puberula*, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 248.—Bras.
pubescens, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxvii. n. 53.—Afr. trop.
pulchella, *C. B. Lehm. in Flora*, xxvi. (1843) 786 = *minor*.
pumila, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 313.—Am. bor.
pumila, *Walt. Fl. Carol.* 64 = *gibba*, *biflora*.
punctata, *Wall. Cat. n.* 2121.—Burma; Malaya.
punctifolia, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 493.—N. Granat.
purpurascens, *J. Grah. Cat. Bomb. Pl.* 165 = *caerulea*.
purpurea, *Walt. Fl. Carol.* 64.—Am. bor.
purpurea, *Willd. ex Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 309 = *paucifolia*.
purpureo-caerulea, *A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 154.—Bras.
pusilla, *J. Grah. Cat. Bomb. Pl.* 165 = *orbiculata*.
pusilla, *Vahl, Enum.* i. 202.—Am. trop.
pygmaea, *R. Br. Prod.* 432.—Austral.
quinqueradiata, *Spruce, ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 171 = *inflata*.
racemosa, *Wall. Cat. n.* 1496.—As. trop.
racemosa, *Wight, Ic. t.* 1584. f. 1 = *rosea*.
ramosa, *Vahl, Enum.* i. 204.—Ind. or.
reclinata, *Hassk. in Versl. Kon. Akad. Wetensch.* iv. (1855) 161; et *Retzia*, i. 92.—Java.
recurva, *Lour. Fl. Cochinch.* 26.—Cochinch.
reflexa, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 146.—Afr. trop.
reniformis, *A. St. Hil. Voy. Minas Geraes*, i. 224.—Bras.
resupinata, *B. D. Greene, ex Hitchcock, Cat. Pl. Massach.* (1835) 107, nomen; et *in Bigel. Fl. Bost.* ed. III. 10.—Am. bor.
reticulata, *Sm. Exot. Bot.* ii. 119. t. 119.—Ind. or.
rhodocnemis, *Mart. ex Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 237 = *oligosperma*.
rigida, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 303.—Afr. trop.
rosea, *Edgew. in Proc. Linn. Soc.* i. (1847) 352.—Ind. or.
rosulata, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 310.—Ins. Philipp.
Roxburghii, *Spreng. Syst.* i. 52 = *exoleta*.
saccata, *Le Conte, in Ell. Sketch*, i. 21 = *purpurea*.
sacciformis, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 302.—Ind. or.
saharunporensis, *Royle, ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 176 = *exoleta*.
Salzmanni, *A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 151.—Bras.
Sandersoni, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 155.—Afr. trop.
sanguinea, *Oliver, l. c.* 153.—Afr. trop.
scandens, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 309, partim.—Ind. or.
scandens, *Benj. l. c.*, partim = *Wallichiana*.
sclerocarpa, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 91.—Cuba.
secunda, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 308.—Mexic.
Selloi, *G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 250.—Bras.
setacea, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 12 = *subulata*.
setacea, *Wall. Cat. n.* 6398 = *hirta*, *racemosa*.
similis, *Lehm. Pugill.* viii. 666 = *Hookeri*.
simplex, *R. Br. Prod.* 431.—Austral.
simplex, *Wright & Sauv. Fl. Cub.* 91.—Ind. occ.
sinuata, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 491.—Mexic.
Smithiana, *Wight, in Hook. Kew Journ.* i. (1849) 373; et *Ic. t.* 1577 = *caerulea*.
spartea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 216.—Madag.
spatulata, *Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848) 324 = *amethystina*.
speciosa, *R. Br. Prod.* 430 = *dichotoma*.
spectabilis, *Madauss. ex Garcke, Fl. Deutschl.* ed. III. 274 = *major*.
spiralis, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxvii. n. 5.—Afr. trop.
spirandra, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 161.—Cuba.
spiricaulis, *Miq. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 180 = *reticulata*.
Spruceana, *Benth. ex Oliver, l. c.* iv. (1860) 173.—Bras.
squamosa, *Benj. in Bot. Zeit.* iii. (1845) 212.—Nepal.

UTRICULARIA:—

- squamosa*, *Wight, in Hook. Kew Journ.* i. (1849) 373; et *Ic. t.* 1579 = *caerulea*.
stellaris, *Linn. f. Suppl.* 86.—As.; Austral.; Afr. trop.
stolonifera, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 245.—Bras.
striata, *Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i.* (1824) 75 = *fibrosa*.
striata, *Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I.* xlv. (1843) 29 = *clandestina*.
striatula, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxvii. n. 17.—Zeylan.
stricta, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 14.—Guian.
suaveolens, *Afzel. ex Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 303 = *rigida*.
subsimilis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 334.—N. Zel.
subulata, *Linn. Sp. Pl.* 18.—Am. bor. et trop.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 998.—Sumatra.
superba, *G. Weber, ex Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 252 = *Genlisea ornata*.
tenella, *R. Br. Prod.* 432 = *Polypompholyx tenella*.
tenuifolia, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 304.—Ind. occ.
tenuis, *Cav. Ic. v.* 24. t. 440. f. 2.—Chili.
tertia, *Salzm. ex A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 158 = *pusilla*.
Thonningii, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 12 = *stellaris*.
tortilis, *Welw. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 150.—Afr. trop.
tremula, *Salzm. ex A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 155 = *subulata*.
tribracteata, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 18.—Abyss.
trichophylla, *Spruce, ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 173.—Am. trop.
tricolor, *A. St. Hil. Voy. Distr. Diam.* ii. 418.—Bras.
triloba, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 248.—Bras.
trinervia, *Benj. l. c.* 247.—Bras.
tubulata, *F. Muell. Fragm.* ix. 48.—Austral.
uliginoides, *Wight, in Hook. Kew Journ.* i. (1849) 372; et *Ic. t.* 1573 = *caerulea*.
uliginosa, *Benth. in Hook. l. c.* iv. (1852) 299 = *caerulea*.
uliginosa, *Vahl, Enum.* i. 203 = *reticulata*.
uniflora, *R. Br. Prod.* 431 = *dichotoma*.
uniflora, *Spruce, ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 173 = *Spruceana*.
unifolia, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* i. 20. t. 31 = *alpina*.
vaga, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 161.—Cuba.
versicolor, *Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 488 = *amethystina*.
verticillata, *Benj. l. c.* 312.—Malacca.
verticillata, *Salzm. ex A. St. Hil. & Girard, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xi. (1839) 151 (*verticiliata*) = *Salzmanni*.
violacea, *R. Br. Prod.* 431.—Austral.
viscosa, *Spruce, ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 172.—Bras.
volubilis, *R. Br. Prod.* 430.—Austral.
volubilis, *Hook. ex Benj. in Linnaea*, xx. (1847) 309 = *scandens*.
vulgaris, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 84 = *flexuosa*.
vulgaris, *Linn. Sp. Pl.* 18.—Europ.; As. et Am. bor.
vulgaris, *Vell. Fl. Flum.* 18; i. t. 44 = *oligosperma*.
Wallichiana, *Benj. in Bot. Zeit.* iii. (1845) 213 = *bifida*.
Wallichiana, *Wight, Ic. t.* 1572/1.—Ind. or.
Wallichii, *Wight, in Hook. Kew Journ.* i. (1849) 372 = *praec.*
Welwitschii, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 152.—Afr. trop.

- UVARIA, *Linn. Diss. Dass.* 21 (1747); *Amoen. Acad.* i. 404 (1749). *ANONACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 23.
FITZALANIA, *F. Muell. Fragm.* iv. 33 (1863).
MARENTERIA, *Thou. Gen. Nov. Madag.* 18 (1806).
NARUM, *Adans. Fam.* ii. 365 (1763).
PYRAGMA, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 3.
VARIA, *Aubl. Pl. Gui.* i. 604. t. 243 (1775).
Abermoa, *F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. x.* 311 = *Guatteria Abermoa*.
acrantha, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 368 = *ovalifolia*.
acuminata, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 21.—Afr. trop.
acuminatissima, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 6.—Borneo.

UVARIA:—

acuta, Teysm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 395 = *Unona acuta*.
aethiopica, Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 9 = *Xylopia aethiopica*.
Alphonstii, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 67 = *Unona Dasymaschala*.
Amuyon, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 463 = *Melodorum fulgens*.
amygdalina, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 31. —Ins. Fiji.
angolensis, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 23. —Afr. trop.
argentea, Blume, Fl. Fav. Anon. 24. —Java.
aromatica, Lam. Encyc. i. 596 = *Unona concolor*.
Asterias, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 289. —Afr. trop.
astrosticta, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 8. —Sumatra.
aurita, Blume, Fl. Fav. Anon. 15. —Java.
axillaris, Roxb. Hort. Beng. 94; Fl. Ind. ii. 667 = *Cananga odorata*.
Bada-jamba, Roxb. Hort. Beng. 43 (= *Guatteria Bada-jamba*). —Ind. or.
badiiflora, Hance, in Walp. Ann. ii. 19 = *microcarpa*.
bancana, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxii. (1871) 388. —Ins. Banca.
bicolor, Roxb. Hort. Beng. 94; Fl. Ind. ii. 662 = *Melodorum bicolor*.
bicolor, Wall. Cat. n. 6466 = *Melodorum Wallichii*.
Blumeana, Steud. Nom. ed. II. ii. 737 = *hirsuta*.
bracteata, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 660. —Ind. or.; Burma.
brasiliensis, Vell. Fl. Flum. 238; v. t. 122 (*Cymbopetalis* sp.). —Bras.
Burahol, Blume, Bijdr. 14. —Java.
caffra, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 8. —Afr. austr.
calamistrata, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 77. —China.
callicarpa, Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 347. —Madag.
canangioides, Reichb. f. & Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 378 = *Polyalthia Jenkinsii*.
cauliflora, Wall. Cat. n. 6476 = *Polyalthia cauliflora*.
cerasoides, Roxb. Pl. Corom. i. 30. t. 33 = *Polyalthia cerasoides*.
ceylanica, Heynh. Nom. i. 832 = *zeylanica*.
Chamae, Beauv. Fl. Owar. ii. 43. t. 83. f. 2. —Afr. trop.
ciliata, Heyne, ex Wight & Arn. Prod. 10 = *Miliusa indica*.
clavata, Walp. Rep. i. 80 = *Anaxagorea javanica*.
Commersoniana, Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 346. —Madag.
concaeva, Teysm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 406. —Java.
connivens, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1862) 465. —Afr. trop.
conoidea, Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) Misc. 12 = *Asimina triloba*.
cordata, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 255. —Afr. trop.
cordata, Wall. Cat. n. 6486 = *macrophylla*.
cordifolia, Roxb. Hort. Beng. 94; Fl. Ind. ii. 662 = *Unona discolor*.
coriacea, Vahl, Symb. Bot. iii. 72 = *zeylanica*.
costata, Wall. Cat. n. 6480 = *Polyalthia costata*.
crinata, R. Br. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 23. —Afr. trop.
cylindrica, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 256. —Afr. trop.
cyrtopoda, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 3. —Ins. Amboin.
dasychlamys, Miq. l. c. 2. —Sumatra.
decandra, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. i. 100 = *Guatteria decandra*.
dioica, Roxb. Hort. Beng. 94; Fl. Ind. ii. 659 = *Miliusa Roxburghiana*.
discolor, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 67 = *Unona Dasymaschala*.
diversifolia, Span. in Linnaea, xv. (1841) 168. —Ins. Timor.
dulcis, Dun. Mon. Anon. 90. t. 13. —Burma; Malaya.
ebracteolata, Presl, Rel. Haenk. ii. 77. —Ins. Luzon.
elegans, Wall. Cat. n. 6474 A = *Melodorum elegans*.
elliptica, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. v. (1832) 202 = *Bocagea elliptica*.

UVARIA:—

elongata, Roxb. Hort. Beng. 43, nomen (Quid?). —Ind. or.
esculenta, Roxb. ex Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 201 = *Artabotrys odoratissimus*.
excelsa, Vahl, ex Dun. Monog. Anon. 132 (= *Oxandra laurifolia*). —Ind. occ.
excelsa, Wall. Cat. n. 6477. —Ind. or.; Malaya.
farcta, Wall. Cat. n. 6460 = *Cananga odorata*.
fasciculata, Steud. Nom. ed. II. ii. 738 = *Polyalthia simiarum*.
febrifuga, Humb. & Bonpl. ex DC. Syst. i. 498 = *Unona xylopioides*.
ferruginea, Buch.-Ham. ex Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 96. —Burma.
ferruginea, Koen. ex Wall. Cat. n. 6485 D = *purpurea*.
flava, Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 419. —Ins. Banca.
flexuosa, Heyne, ex Wall. Cat. n. 6473 B = *U. Narum*.
fluminensis, Vell. Fl. Flum. 238; v. t. 121. —Bras.
foetida, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. i. 93. —Peruv.
fornicata, Roxb. Hort. Beng. 94; Fl. Ind. ii. 662 = *Oxymitra fornicata*.
fulgens, Wall. Cat. n. 6482 = *Melodorum fulgens*.
fulva, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 79 = *Melodorum rubiginosum*.
furfuracea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1882) 338. —Madag.
furfuracea, Walp. Rep. i. 79 = *Unona furfuracea*.
fusca, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1862) 466. —Afr. trop.
Gaertneri, DC. Syst. i. 482. —Zeylan.
gamopetala, Zoll. in Linnaea, xxix. (1857-58) 310. —Java.
gigantea, Wall. Cat. n. 6469 A, B = *Goniothalamus giganteus*.
glabra, Span. in Linnaea, xv. (1841) 162. —Ins. Timor.
glaucia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 175. —Java?
globosa, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 210. —Afr. trop.
Goezeana, F. Muell. Fragm. vii. 125. —Austral.
Gomeziana, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. v. (1832) 203 = *bracteata*.
gracilis, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 210. —Afr. trop.
grandiflora, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 665 = *purpurea*.
grandiflora, Wall. Cat. n. 6485 E = *Hamiltonii*.
guatterioides, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. v. (1832) 202. —Guian.
Hahniana, Baill. Adansonia, viii. (1868) 347. —Mexic.
hamata, Dun. Monog. Anon. 106. t. 27. —Zeylan.
hamata, Roxb. Fl. Ind. ii. 666 = *Artabotrys odoratissimus*.
Hamiltonii, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 96. —Reg. Himal.
Hasselti, Blume, Fl. Fav. Anon. 46. —Java.
heterocarpa, Blume, l. c. 41. —Java.
heteroclita, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 663 = *Kadsura Roxburghiana*.
heteropetala, F. Muell. Fragm. iii. 1. —Austral.
Heyneana, Wall. Cat. n. 6463 = *Mitrephora Heyneana*.
Heyneana, Wight & Arn. Prod. 8 = *zeylanica*.
Hiran, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6443 B (= *Guatteria Bada-jamba*). —Ind. or.
hirsuta, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 46. —Malaya.
hirsuta, Vell. Fl. Flum. 238; v. t. 124 = *Trigynaea oblongifolia*.
Holtzei, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, iii. (July 1883). —Austral.
hortensis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = *Cananga odorata*.
humilis, Blume, Bijdr. 17. —Java.
japonica, Linn. Sp. Pl. 536 = *Kadsura japonica*.
javana, Dun. Monog. Anon. 91. t. 14 = *dulcis*.
javanica, Steud. Nom. ed. II. ii. 738 = *praec.*
javanica, Thunb. Fl. Javan. 19 = *Unona tripetaloidea*.
Kirkii, Oliver, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 6006. —Afr. trop.
Laha, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 369 = *Ellipeia Laha*.

UVARIA:—

lamponga, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 22. —Sumatra.
lanceolata, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 3. —Ins. Celebes.
lanceolata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 87 (= *Oxandra virgata*). —Ind. occ.
Lanotan, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 464 = *Goniothalamus giganteus*.
lanuginosa, Wall. Cat. n. 6454. —Ind. or.
Larep, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 370. —Sumatra.
latifolia, Blume, Fl. Jav. Anon. 37. t. 15 = *Melodorum latifolium*.
laurifolia, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 1001 (= *Oxandra laurifolia*). —Ind. oce.
ligularis, Lam. Encyc. i. 597 = *Unona ligularis*.
littoralis, Blume, Fl. Fav. Anon. 26. —Ind. or.
Lobbiana, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 100. —Malaya.
longiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 738, sphalm. = *Polyalthia longifolia*.
longifolia, Blume, Bijdr. 13 = *Unona latifolia*.
longifolia, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. i. 100 = *Guatteria Pavonii*.
longifolia, Sonner. Voy. Indes, iii. 260 = *Polyalthia longifolia*.
lucida, Boj. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 14; Benth. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1862) 465. —Afr. trop.
lurida, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 3 = *U. Narum*, Wall.
lurida, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 101. —Reg. Himal.
lutea, Roxb. Pl. Corom. i. 32. t. 36 = *Alphonsea lutea*.
lutea, Wall. Cat. n. 6462 = *zeylanica*.
lutea, Wight & Arn. Prod. 8 = *Alphonsea zeylanica*, *Mitrephora Heyneana*.
mabiformis, Griff. Notul. iv. 709 = *Melodorum pisco-carpum*.
macrantha, Hassk. Retzia, i. 116. —Java.
macrocarpa, Vahl, ex DC. Syst. i. 489 = *U. Chamae*.
macrocarpa, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1873) 142. —Bras.
macrophylla, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 663. —As. trop.
macropoda, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 101. —Zeylan.
mangattensis, Dcnnst. Schluess. Hort. Malab. 31 = *Alphonsea zeylanica*.
manubriata, Wall. Cat. n. 6456 = *Melodorum manubriatum*.
Marenteria, Baill. Adansonia, viii. (1868) 304; Hist. Pl. i. 200. —Madag.
Melodorum, Racusch. Nom. ed. III. 162 = *Unona sylvatica*.
membranacea, Benth. Fl. Austral. i. 51. —Austral.
micrantha, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 103. —Burma; Malaya.
microcarpa, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 257. —China.
mollis, Wall. Cat. n. 6475 = *Unona pannosa*.
moluccana, Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl. v. 1707 = *Unona Musaria*.
monilifera, Gaertn. Fruct. ii. 156 = *Unona discolor*, *discreta*.
monopetala, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 8. t. 2 = *Hexalobus senegalensis*.
monosperma, Lam. Encyc. i. 596 = *Guatteria Ouregon*.
monosperma, Vell. Fl. Flum. 238; v. t. 123 = *Guatteria nigrescens*.
montana, Blume, Fl. Fav. Anon. 45. —Java.
montana, Dun. ex Wall. Cat. sub n. 6462 = *Alphonsea lutea*.
montana, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = *montana*.
monticola, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 5. —Borneo.
multiflora, Teysm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 394. —Ins. Bantam.
Musaria, A. DC. Mém. Anon. 29 = *Unona Musaria*.
Narum, A. DC. l. c. 29. —Ind. or.
Narum, Wall. Cat. n. 9 (sp. div.). —Ind. or.
neglecta, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 44. —Cuba.
nervosa, Wall. Cat. n. 6479 = *Melodorum rubiginosum*.
nicaraguensis, Baill. Hist. Pl. i. 195. —Nicaragua.
nitida, Roxb. Hort. Beng. 94; Fl. Ind. ii. 667. —Ins. Molucc.
nutans, Wall. Cat. n. 6481 = *Phaeanthus nutans*.

UVARIA:—

- obovata*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 6471 = *Goniothalamus cardiopetalus*.
obovata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 45 = *Asimina grandiflora*.
obtusa, Blume, Bijdr. 13 = *Mitrephora obtusa*.
ochroleuca, Zoll. in *Linnaea*, xxix. (1856) 307.—Java.
odorata, Lam. Encyc. i. 595 = *Cananga odorata*.
odoratissima, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 666 = *Artabotrys odoratissimus*.
olens, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6441 = *Miliusa velutina*.
ophthalmica, Roxb. ex G. Don, Gen. Syst. i. 93 = *Phacanthus nntans*.
ossea, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 322 = *Unona discolor*.
ovalifolia, Blume, Fl. Jav. Anon. 27.—Java.
ovata, A. DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. v. (1832) 205.—Afr. trop.
oxyantha, Wall. Cat. n. 6478 = *Xylopia oxyantha*.
paracaroensis, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 = *zeylanica*.
Parveana, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 48 (= *Gutteria Parveana*).—Sumatra.
parviflora, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 103 (*Cyathostematis* sp.).—Ins. Penang.
parviflora, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 9. t. 3. f. 1 = *Xylopia parviflora*.
parviflora, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 45 = *Asimina parviflora*.
pauciovulata, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 51.—Malacca.
pilosa, Roxb. Fl. Ind. ii. 665 = *hirsuta*.
platypetala, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 257 = *purpurea*.
polyantha, Wall. Cat. n. 6467 = *Melodorum polyanthum*.
polyprena, Blume, Fl. Jav. Anon. 35.—Java.
prismatica, Wall. Cat. n. 6455 = *Melodorum prismaticum*.
ptychocalyx, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 4.—Malaya.
purpurea, Blume, Bijdr. 11.—As. trop.
pygmaea, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 45 = *Asimina pygmaea*.
pyrifolia, Reinw. ex Blume, Fl. Jav. Schizand. 16 (= *Sphaerostema pyrifolium*).—Java.
reticulata, Blume, Fl. Jav. Anon. 50. t. 24 = *Mitrephora reticulata*.
rhodantha, Hance, in Walp. Ann. ii. 19 = *purpurea*.
Rosenbergiana, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 2 = *ovalifolia*?
Roxburghiana, Wall. Cat. n. 6423 A = *Oxymitra fornicata*.
rubiginosa, A. DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. v. (1832) 202 = *Melodorum rubiginosum*.
rufa, Blume, Fl. Jav. Anon. 19.—Java.
rufa, Wall. Cat. n. 6455 = *Melodorum prismaticum*.
rufescens, A. DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. v. (1832) 202 = *macrophylla*.
rugosa, Blume, Bijdr. 12.—Java.
Russelii, Wall. Cat. n. 6464 = *Alphonsea lutea*.
scabra, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 3.—Ins. Molucc.
scabrida, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 21.—Afr. trop.
sclerocarpa, A. DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. v. (1832) 203 = *Saccopetalum sclerocarpum*.
semecarpifolia, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 97.—Malaya.
sesquipedalis, Colebr. ex Wall. Cat. sub n. 6446 = *Goniothalamus sesquipedalis*.
sessiliflora, Zoll. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 312.—Malaya?
sessilis, Vell. Fl. Flum. 238; v. t. 125 = *Duguetia bracteosa*.
setigera, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 323 = *purpurea*.
simiarum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6440 = *Polyalthia simiarum*.
sinensis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 465 = *Artabotrys odoratissimus*.
solanifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 76.—Ins. Luzon.
sorzogonensis, Presl, l. c.—Ins. Luzon.
spectabilis, DC. Syst. i. 484.—Guian.
sphaerocarpa, Blume, Bijdr. 12.—Java.
sphenocarpa, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 98.—Zeylan.
subcordata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 9.—Ins. Molucc.?
VOL. II.

UVARIA:—

- suberosa*, Roxb. Pl. Corom. i. 31. t. 34 = *Polyalthia suberosa*.
subrepanda, Wall. Cat. n. 6483.—Singapore.
sumatrana, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 51.—Malaya.
sumatrana, Kurz, Andam. Rep. 29 = *micrantha*.
synsepala, Miq. in *Fourn. Bot. Néerl.* i. (1861) 128.—China.
timoriensis, Blume, Fl. Jav. Anon. 21.—Ins. Timor.
tomentosa, Roxb. Pl. Corom. i. 31. t. 35 = *Saccopetalum tomentosum*.
tomentosa, Vahl, ex DC. Syst. i. 504 (= *Gutteria rufa*).—Ind. occ.
tomentosa, Wall. Cat. n. 6454 = *Melodorum lanuginosum*.
trichomalla, Blume, Fl. Jav. Anon. 42. t. 18 = *hirsuta*.
trifoliata, Gaertn. Fruct. ii. 156. t. 114. f. 2 = *Gaertneri*.
trigyna, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 40.—Bras.
triloba, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 45 = *Asimina triloba*.
tripetala, Lam. Encyc. i. 597 = *Unona tripetaloides*.
tripetala, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 667 = *Phacanthus nutans*.
uncata, Lour. Fl. Cochinch. 349 = *Artabotrys odoratissimus*.
uncata, Vahl, ex DC. Syst. i. 492 = *Unona discolor*.
undulata, Lam. Encyc. i. 595 = *Cananga odorata*.
undulata, Roxb. Hort. Beng. 43 = *Unona discolor*.
Urege, Rausch. Nom. ed. III. 160 = *Gutteria Ouregon*.
velutina, Blume, Bijdr. 13 = *hirsuta*.
velutina, Dun. Monog. Anon. 91 = *Miliusa velutina*.
ventricosa, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 658 = *Alphonsea ventricosa*.
verrucosa, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 3.—Borneo.
villosa, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 664 = *Miliusa velutina*.
virgata, Blume, Fl. Jav. Anon. 43 = *Cananga virgata*.
virgata, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 999 (= *Oxandra virgata*).—Ind. occ.
viridiflora, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. i. 100.—Peruv.
viridiflora, Splitg. in *Nederl. Kruiddk. Arch.* i. (1849) 224.—Guian.
Vogelii, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 767.—Afr. trop.
zeylanica, Aubl. Pl. Gui. ii. 605. t. 243 = *Unona concolor*.
zeylanica, Deless. ex DC. Syst. i. 483 = *dulcis*.
zeylanica, Domb. ex DC. l. c. 504 = *Gutteria eriopoda*.
zeylanica, Lam. Encyc. i. 596 = *U. Narum*.
zeylanica, Linn. Sp. Pl. 536.—Ind. or.
Zippeliana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 4.—Ins. Amboin.

- UVA-URSI, Tourn. ex Moench, Meth. 470 (1794) = *Arctostaphylos*, Adans. (Ericac.).
alpina, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 401 = *A. alpina*.
buxifolia, S. F. Gray, l. c. 400 = *A. Uva-ursi*.
procumbens, Moench, Meth. 470 = *A. Uva-ursi*.

- UVEDALIA, R. Br. Prod. 440 (1810) = *Mimulus*, Linn. (Scrophul.).
linearis, R. Br. l. c. = *M. Uvedaliae*.
nana, E. Mey. ex Benth. in DC. Prod. x. 412 = *Torenia nana*.

- UVIRANDRA, Jaime St. Hil. Expos. i. 52 (1805) = *Ouvirandra*, Thou. = *Aponogeton*, Thunb. (Naiad.).

- UVULANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 356, sphalm. = *Uvularia*, Linn. (Liliac.).
angulata, Rafin. l. c. 356, nomen (Quid?).—Am. bor.

- UVULARIA, Linn. Gen. ed. I. 93 (1737). *LILIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 830.
BAIMO, Rafin. Fl. Tellur. iv. 27 (1836).
OAKESIA, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 269.
UVULANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 356.
acutifolia, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1817) 359, nomen (Quid?).—Am. bor.
amplexicaulis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *Streptopus distortus*.

UVULARIA:—

- amplexifolia*, Linn. Sp. Pl. 304 = *Streptopus distortus*.
Betula, Buch.-Ham. ex D. Don, in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 45 = *Disporum calcaratum*.
calcarata, Wall. Cat. n. 5087 = *Disporum calcaratum*.
chinensis, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 916 = *Disporum pullum*.
cirrrosa, Thunb. Fl. Jap. 136. t. 2 = *Fritillaria verticillata*.
distorta, Pers. Syn. i. 360 = *Streptopus distortus*.
flava, Sm. Exot. Bot. i. 97. t. 50 = *perfoliata*.
floridana, Chapm. Fl. S. U. St. 487.—Florida.
grandiflora, Sm. Exot. Bot. i. 99. t. 51.—Am. bor.
grandifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 231, sphalm. = *præc.*
Hamiltoniana, Wall. Cat. n. 5088 = *Disporum calcaratum*.
hirta, Thunb. Fl. Jap. 135 = *Tricyrtis hirta*.
lanceolata, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 434 = *perfoliata*.
lanuginosa, Pers. Syn. i. 360 = *Disporum lanuginosum*.
Leschenaultiana, Wall. Cat. n. 5089 = *Disporum Leschenaultianum*.
multiflora, Reinw. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 207 = *Disporum pullum*.
oppositifolia, Schlecht. ex Kunth, l. c. 254 = *Fritillaria camtchatcensis*.
parviflora, Wall. in As. Res. xiii. (1820) 378 = *Disporum pullum*.
perfoliata, Linn. Sp. Pl. 304.—Am. bor.
Pitsutu, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 50 = *Disporum pullum*.
puberula, Michx. Fl. Bor. Am. i. 199.—Am. bor.
puberula, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 5 = *Disporum Menziesii*.
rosea, Pers. Syn. i. 360 = *Streptopus roseus*.
sessiliflora, J. F. Gmel. Syst. 1642, sphalm. = *seq.*
sessilifolia, Linn. Sp. Pl. 304.—Am. bor.
sessilis, Thunb. Fl. Jap. 135 = *Disporum sessile*.
Smithii, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 174. t. 189 = *Disporum Menziesii*.
umbellata, Wall. in As. Res. xiii. (1820) 379 = *Disporum pullum*.
viridescens, Maxim. Prim. Fl. Amur. 273 = *Disporum smilacinum*.

- UWAROWIA, Bunge, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. vii. (1840) 278 = *Verbena*, Linn.
chrysanthemifolia, Bunge, l. c. 279 = *V. sulphurea*.
sulphurea, Schau. in DC. Prod. xi. 551 = *V. sulphurea*.

V

- VACCARIA, Medic. Phil. Bot. i. 96 (1789) = *Saponaria*, Linn. (Caryoph.).
arvensis, Link. Handb. ii. 240 = *S. Vaccaria*.
grandiflora, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 40. t. 231 = *S. Vaccaria*.
inclusa, Ledeb. Fl. Ross. i. 776 = *S. Vaccaria*?
oxyodonta, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 68 = *S. Vaccaria*.
parviflora, Moench, Meth. 63 = *S. Vaccaria*.
perfoliata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 51 = *S. Vaccaria*.
pyramidata, Medic. Phil. Bot. i. 96 = *S. Vaccaria*.
segetalis, Garke, ex Aschers. Fl. Brandenb. i. 84 = *S. Vaccaria*.
sessiliflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 739, sphalm. = *seq.*
sessilifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 51 = *S. Vaccaria*.
vulgaris, Host, Fl. Austr. i. 518 = *S. Vaccaria*.

- VACCINIUM, Linn. Syst. ed. I (1735). *VACCINI-ACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 573.
ACOSTA, Lour. Fl. Cochinch. 276 (1790).
BATODENDRON, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 261.
CAVINIUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 11 (1806).
EPIGYNIUM, Klotzsch, in *Linnaea*, xxiv. (1851) 49.
METAGONIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 263.
PICROCOCCUS, Nutt. l. c. 262 (1843).
POLYCODIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266.
VITIS-IDAEA, Tourn. ex Moench, Meth. 47 (1794).
Acosta, Rausch. Nom. ed. III. 109 (sp. dub.).—Cochinch.

VACCINIUM:—

acuminatissimum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 36.—Malaya.
acuminatum, Benth. *Pl. Hartw.* 222 = staphelioides.
acuminatum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 264.—N. Granat.
acuminatum, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1877) ii. 214 = *Corallobotrys acuminata*.
adenandrum, Decne. *Bot. Voy. Venus*, 23 = cereum.
affine, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 61.—Peruv.
affine, Wight, in *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 173 = *Donianum*.
agathosmoides, *Wedd. Chlor. And.* ii. 179.—N. Granat.
alaternoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 265.—Peruv.
alaternoides, Soland. ex Seem. *Fl. Vit.* 146 = cereum.
alatum, Domb. ex Dun. in *DC. Prod.* vii. 562 (= *Proclesia alata*).—Peruv.
albiflorum, Hook. *Bot. Mag.* t. 3428 = corymbosum.
album, Lam. *Encyc.* i. 73 = canadense.
album, Linn. *Sp. Pl.* 350 = *Lonicera ciliata*.
album, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 285 = stamineum.
amoenum, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. ii. 12 = corymbosum.
angulosum, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 460 = *V. Myrtillus*.
angustifolium, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. ii. 11 = *pensylvanicum*.
angustifolium, Benth. *Pl. Hartw.* 45.—Mexic.
arborescens, Lesch. ex Dun. in *DC. Prod.* vii. 555 = *Leschenaultii*.
arborescens, *Marsh. Arbust. Am.* 157.—Am. bor.
arbutoides, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 453.—Reg. Himal.
Arctostaphylos, Linn. *Sp. Pl.* 351.—Armen.; Reg. Cauc.
Arctostaphylos, Willd. *Sp. Pl.* ii. 353 = *maderense*.
ardisioides, Hook. f. ex *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 452.—Burma.
assimile, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 85.—Cuba.
attenuatum, Dun. in *DC. Prod.* vii. 571.—Peruv.
auriculatum, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1877) ii. 214 = *Agapetes auriculata*.
bancanum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 587.—Burma; Malaya.
bicolor, F. Muell. *Sel. Pl. Indust. Cult.* 249 = *Psammisia bicolor*.
brachycerum, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 234 = *Gaylussacia brachycera*.
brachystachyum, Benth. *Pl. Hartw.* 65 = confertum.
bracteatum, *Thunb. Fl. Jap.* 156.—Japon.
brasilense, Spreng. *Nov. Prov.* 42 = *Gaylussacia Pseudo-vaccinium*.
Buergeri, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 29.—Japon.
buxifolium, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 4 = *V. Vitis-Idaea*.
buxifolium, Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* t. 891.—Borneo.
buxifolium, Salisb. *Parad. Lond.* t. 4 = *Gaylussacia brachycera*.
caespitosum, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 234.—Am. bor.
callosum, Griseb. ex *Wedd. Chlor. And.* ii. 177 = *floribundum*.
calycinum, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 7 = *penduliflorum*.
campanulatum, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 85 = *Agapetes campanulata*.
canadense, Kalm, ex *Richards. in Frankl. 1st Journ.* ed. II. 12.—Am. bor.
cantabricum, Huds. *Fl. Angl.* ed. I. 143 = *Daboëcia polifolia*.
caracasannum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 266.—Venezuela.
caracasannum, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* ix. (1842) 530 = *leucanthum*.
carnosum, Pers. *Syn.* i. 479 = *crassifolium*.
cereum, *Forst. f. Prod.* 28.—Ins. Amicor.
cereum, Walp. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 360 = *penduliflorum*.
Chamissonis, Bong. in *Mém. Acad. Pétersb.* ii. (1833) 151 = *ovalifolium*.
chinense, Champ. ex Benth. in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 297 = *bracteatum*.
ciliatum, Gilib. *Exercit.* i. 11 = *uliginosum*.
ciliatum, *Thunb. Fl. Jap.* 156.—Japon.
confertum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 265.—Mexic.
consanguineum, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 64.—Panama.

VACCINIUM:—

Constablaei, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* xlii. (1842) 42 = corymbosum.
cordatum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 274.—Mexic.
coriaceum, Hook. f. in *Hook. Ic. Pl.* t. 892.—Borneo.
coriaceum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1062 = *Korthalsii*.
corymbiferum, *Miq. l. c. Suppl.* 588.—Sumatra.
corymbodendron, Dun. in *DC. Prod.* vii. 569.—Peruv.
corymbosum, Frank, ex Dun. l. c. 566 = *Gaylussacia frondosa*.
corymbosum, Linn. *Sp. Pl.* 350.—Am. bor.
crassifolium, *Andr. Bot. Rep.* t. 105.—Am. bor.
crenulatum, Dun. in *DC. Prod.* vii. 570.—Peruv.
croceum, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 739, in syn., sphalm. = cereum.
cubense, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1860) 171.—Cuba.
cuneifolium, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1062.—Java.
cuspidatum, *Planch. ex Wedd. Chlor. And.* ii. 180, in obs.—N. Granat.
cylindraceum, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 23.—Ins. Azores.
cyrtodon, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1062.—Java.
decamerocarpon, Dun. in *DC. Prod.* vii. 566, (excl. syn.) = *Gaylussacia frondosa*.
dempoense, *Fawcett, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 254.—Sumatra.
dendrophilum, Benth. *Pl. Hartw.* 219.—Ecuador.
densiflorum, Benth. l. c. 222.—N. Granat.
dentatum, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 31 = cereum.
dependens, Ruiz & Pav. ex G. Don, *Gen. Syst.* iii. 859 = *Gaylussacia dependens*.
dichotomum, Boj. ex Dun. in *DC. Prod.* vii. 570 = *secundiflorum*.
didymanthum, Dun. l. c. 575.—Peruv.
diffusum, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. ii. 11 = *arborescens*.
discolor, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* ix. (1842) 531.—Mexic.
disocarpon, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. i. 23 = corymbosum.
disomorphum, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 231 = corymbosum.
Donianum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 161 = *bracteatum*.
Donianum, Wight, in *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 174.—Reg. Himal.
dumosum, Andr. *Bot. Rep.* t. 112 = *Gaylussacia dumosa*.
Dunalium, Wight, in *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 175 (*Dunallium*).—Reg. Himal.
elevatum, Banks & Soland. ex Wikstr. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1823) 281 = *stamineum*.
Elliotii, Chapm. *Fl. S. U. St.* 260 = *virgatum*.
ellipticum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1060.—Java.
elongatum, Wats. *Dendrol. Brit.* t. 125 B = corymbosum.
emirnense, Hook. *Ic. Pl.* t. 131.—Madag.
empetrifolium, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 263 = *penaeoides*.
epacridifolium, Benth. *Pl. Hartw.* 221 = *penaeoides*.
eriocladum, Dun. in *DC. Prod.* vii. 571.—Mexic.
erythrinum, Hook. *Bot. Mag.* t. 4688.—Java.
erythrocarpum, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 227.—Am. bor.
exaristatum, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 86 = *bancanum*.
fasciculatum, Boj. ex Dun. in *DC. Prod.* vii. 570.—Madag.
fissum, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* i. ii. (1818) 15.—Labrador.
floribundum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 266.—Peruv.
floribundum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1060 = *Teysmanni*.
floridanum, Schwein. ex Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* viii. (1843) 262 = *stamineum*.
Forbesii, Fawcett, in *H. O. Forbes, Nat. Wand. East. Archip.* 506 = *dempoense*.
Forbesii, Hook. *Ic. Pl.* t. 345 = *emirnense*.
formosum, Andr. *Bot. Rep.* t. 97.—Am. bor.
fragrans, Wall. ex Voigt, *Hort. Suburb. Calc.* 333 = *Diospyros vaccinioides*.
frondosum, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. ii. 11 = *Gaylussacia dumosa*.
frondosum, Linn. *Sp. Pl.* 351 = *Gaylussacia frondosa*.
fuscatum, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. ii. 11 = corymbosum.

VACCINIUM:—

galegiformis, C. Koch, *Dendrol.* ii. 99, sphalm. = *galeformis*.
galeans, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 232 = *virgatum*.
galiformis, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 16 = *virgatum*.
geminiflorum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 267.—Mexic.
gilvum, *Meerb. Pl. Sel.* t. 18.—Hab.?
glabrum, Wats. *Dendrol. Brit.* t. 125 D = *Gaylussacia resinosa*?
glauco-album, Hook. f. ex *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 453.—Reg. Himal.
glaucum, Lam. *Encyc.* i. 73; Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 231 = *Gaylussacia frondosa*.
grandiflorum, Herb. Par. ex Dun. in *DC. Prod.* vii. 553 = *Ceratostema grandiflorum*.
grandiflorum, Wats. *Dendrol.* t. 125 A = corymbosum.
Griffithianum, Wight, in *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 174.—Reg. Himal.; China.
guadalupense, Sw. ex Wikstr. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1827) 63 = *Hornemannia martinicensis*.
gualtheriaefolium, Hook. f. ex *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 453.—Reg. Himal.
gualtherioides, Bigel. in *New Engl. Med. Journ.* v. (1816) 335 = *uliginosum*.
halleriaefolium, Lodd. *Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 156, nomen.—Am. bor.
Hasseltii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 40.—Java; Sumatra.
hatamense, Becc. *Malesia*, i. (1878) 210.—N. Guin.
hirsutum, *Buckl. in Am. Journ. Sc. Ser. I.* xlv. (1843) 175.—Am. bor.
hirsutum, Wight, in *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 170 = *Agapetes setigera*.
hirtellum, Ait. *Hort. Kew.* ed. II. ii. 357 = *Gaylussacia dumosa*.
hirtum, *Thunb. Fl. Jap.* 155.—Japon.
hispidulum, Linn. *Sp. Pl.* 352 = *Chiogenes serpyllifolia*.
hispidulum, Wangenh. *Beitr. Nordamer. Holzart.* 188. t. 30. f. 67 = *Oxycoecos macrocarpus*.
Humboldtii, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 57.—N. Granat.
humifusum, R. Grah. in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.—June, 1831) 193 = *Gaultheria Myrsinites*.
humile, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 21 = *pensylvanicum*.
Iduroei, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* ii. 425.—Japon.
Imrayi, Hook. *Ic. Pl.* t. 292 = *Hornemannia martinicensis*.
intermedium x, Ruthe, *Fl. Brandenb.* 377. t. 1.—Europ.
iteophyllum, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xviii. (1862) 223.—China.
japonicum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 28.—Japon.
javanicum, Hook. *Ic. Pl.* t. 740.—Java.
jesoense, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 28 = *V. Vitis-Idaea*.
Korthalsii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 40.—Java.
Kruhsianum, Fisch. ex Herd. in *Act. Hort. Petrop.* i. (1871-72) 320 = *uliginosum*.
Kunthianum, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 56.—Mexic.
laevigatum, Boj. ex Dun. in *DC. Prod.* vii. 571.—Madag.
lanceolatum, DC. ex Dun. l. c. 570 = *ovatum*.
latifolium, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 575.—Ind. occ.
latifolium, Hort. Angl. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 739 = *virgatum*.
laurifolium, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1061.—Java.
ledifolium, Pohl, *Pl. Bras. Ic.* ii. 36. t. 123 = *Gaylussacia ledifolia*.
Lenneanum, *Warsz. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xx. (1852) 292, nomen.—Bolivia.
leptanthum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 37.—Java; Sumatra.
Leschenaultii, Wight, *Ic. t.* 1188.—Ind. or.
leucanthum, *Schlecht. in Linnaea*, viii. (1833) 524.—Mexic.
leucostomum, Lindl. in *Gard. Chron.* (1848) 7.—Peruv.
ligustrinum, Linn. *Sp. Pl.* 351 = *Lyonia paniculata*.
ligustrinum, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 233; Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 288 = *virgatum*.

VACCINIUM:—

littoreum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 587.—Sumatra.
longeracemosum, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* ii. 425.—Japan.
longiflorum, *Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1823) 278.—Ins. Azor.
loranthiflorum, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 446 = *Agapetes loranthiflora*.
lucidum, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii.* 1061 = *Rollisoni*.
Macgillivrayi, *Seem. in Journ. Bot.* ii. (1864) 77.—N. Hebrid.
Macraeanum, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 59 = *cereum*.
macrocarpon, *Ait. Hort. Kew. ed. I. ii.* 13 = *Oxycoccus macrocarpon*.
macrophyllum, *Domb. ex Dun. in DC. Prod.* vii. 564 = *Thibaudia punctatifolia*.
macrostemon, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 85 = *Agapetes macrostemon*.
maderense, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 375.—Ins. Mader.
malaccense, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 172.—Malaya.
marginatum, *Dun. in DC. Prod.* vii. 570.—Peruv.
marianum, *Wats. Dendrol. Brit. t.* 124 = *corymbosum*.
marilandicum, *Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 739 = *corymbosum*.
melliflorum, *F. Muell. Sel. Pl. Indust. Cult.* 249, in obs. = *Eurygania melliflora*.
membranaceum, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 32 = *myrtilloides*.
meridionale, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 62.—Jamaic.
Merkii, *Fisch. ex Herd. in Act. Hort. Petrop.* i. (1871-72) 323 = *Arctostaphylos alpina*.
Meyenianum, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 59 = *penduliflorum*.
micranthum, *Dun. in DC. Prod.* vii. 568.—Mexic.
microcarpum, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1861) 334, err. typ. = *Oxycoccus palustris*.
microphyllum, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 851 = *Diplycosia microphylla*.
miniatum, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 85 = *Agapetes miniata*.
minutiflorum, *Wats. Dendrol. Brit. t.* 125 C = *pensylvanicum*.
Miquelii, *Boerl. in Veth, Midden-Sumatra*, iv. *Nat. Hist.* 22.—Sumatra.
montanum, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 38, t. 125.—Bras.
Moritzianum, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 63.—N. Granat.
Mortinia, *Benth. Pl. Hartw.* 221.—Ecuador.
mucronatum, *Linn. Sp. Pl.* 350 = *Nemopanthus fascicularis*.
multiflorum, *Dnn. in DC. Prod.* vii. 572 = *pensylvanicum*.
musculicola, *Hook. Ic. Pl. t.* 717.—Ecuador.
Myrsinites, *Lam. Encyc. i.* 73.—Am. bor.
myrtifolium, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 229 = *crassifolium*.
myrtifolium, *Willd. ex Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 58 = *Humboldtii*.
myrtilloides, *Ell. Sketch.* i. 500 = *virgatum*.
myrtilloides, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 32, partim; *A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V.* 291.—Am. bor.
myrtilloides, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 234 = *pensylvanicum*.
myrtilloides, *S. Wats. Bot. King's Exped.* 209 = *V. Myrtillus*.
myrtillum, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 136 = *V. Myrtillus*.
Myrtillus, *Cham. & Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 525 = *ovalifolium*.
Myrtillus, *Linn. Sp. Pl.* 349.—Reg. bor. temp. et arct.
myrtoides, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii.* 1062.—Ins. Molucc.; Sumatra.
neilgherrense, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 173.—Ind. or.
nemorosum, *Salisb. Prod.* 291 = *V. Vitis-Idaea*.
nigrum, *Desf. Tabl. ed. II.* 274, nomen (Quid ?).—Hab. ?
nitidum, *Andr. Bot. Rep. t.* 480.—Am. bor.
Nummularia, *Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 451.—Reg. Himal.
oblongifolium, *Hort. ex Dnn. in DC. Prod.* vii. 576 = *Oxycoccus macrocarpus*.
obovatum, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 174 = *Agapetes obovata*.

VACCINIUM:—

obtusum, *Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 290 = *Gaultheria Myrsinites* ?
obversum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 220.—Java.
occidentale, *A. Gray, in Bot. Calif.* i. 451.—Calif.
odontocerm, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1877) ii. 214 = *Agapetes angulata*.
odontocerm, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 173 = *Agapetes variegata*.
Oldhami, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii.* 161 = *bracteatum, ciliatum*.
orientale, *Sw. in Weber & Mohr, Beitr. i.* 6 = *V. Acosta*.
Ottonis, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 61 = *floribundum*.
ovalifolium, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 2.—Am. bor. occ.
ovatum, *Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 290.—Am. bor. occ.
Oxycoccus, *Linn. Sp. Pl.* 351 = *Oxycoccus palustris*.
pachyphyllum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii.* 275.—Costa Rica.
padifolium, *Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 740 = *longiflorum*.
padifolium, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxvi. n. 22 = *maderense*.
pallidum, *Ait. Hort. Kew. ed. I. ii.* 10 = *corymbosum*.
palustre, *Salisb. Prod.* 291 = *Oxycoccus palustris*.
paradiseum, *Becc. Malesia*, i. (1878) 209.—N. Guin.
parviflorum, *Andr. Bot. Rep. t.* 125 = *Gaylussacia resinosa*.
parvifolium, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 3.—Am. bor. occ.
penaeoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 264.—Ecuador.
penduliflorum, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. i.* 454, t. 68.—Ins. Sandvic.
pennsylvanicum, *Torr. Fl. N. U. St.* 416 = *vacillans*.
pennsylvanicum, *Lam. Encyc. i.* 74 (*pensylvanicum*).—Am. bor.
pennsylvanicum, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 3 = *Royena glabra*.
permytoides, *Griseb. ex Wedd. Chlor. And.* ii. 179.—Peruv.
polystachyum, *Benth. Pl. Hartw.* 140 = *floribundum*.
praestans, *Lamb. in Trans. Linn. Soc. x.* (1811) 264, t. 9.—Kamschat.
propinquum, *Salisb. Prod.* 291 = *Oxycoccus macrocarpus*.
prunifolium, *Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit.* 156; et *Loud. Encyc. Pl.* 1546 = *ovatum*.
puberulum, *Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 128.—Guian.
pubescens, *Wormsk. ex Hornem. in Fl. Dan.* t. 1516 = *uliginosum*.
pulchellum, *Fisch. ex Herd. in Act. Hort. Petrop.* i. (1871-72) 313 = *V. Vitis-Idaea*.
pnmilum, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 85.—Burma.
punctatum, *Lam. Fl. Fr.* iii. 396 = *V. Vitis-Idaea*.
punctifolium, *Stokes, Bot. Mat. Med.* ii. 363 = *V. Vitis-Idaea*.
Ramonii, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 52.—Cuba.
ramosissimum, *Dun. in DC. Prod.* vii. 571.—Peruv.
ramulosum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 20 = *pensylvanicum*.
reflexum, *Hook. f. Bot. Mag. t.* 5781.—Bolivia.
reflexum, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 60.—Madag.
resinosum, *Ait. Hort. Kew. ed. I. ii.* 12 = *Gaylussacia resinosa*.
reticulatum, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 30 = *cereum*.
retinsum, *Hook. f. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 451.—Reg. Himal.
Rollisoni, *Hook. Bot. Mag. t.* 4612.—Java.
rotundifolium, *Wight, Illustr. Ind. Bot.* ii. 119, t. 139 = *Leschenaultii*.
Roylei, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1877) ii. 214 = *Agapetes setigera*.
rubrum, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 460 = *V. Vitis-Idaea*.
rubrum, *Gilib. Fl. Lituan.* i. 4 = *uliginosum*.
rugosum, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. Bot. Mag.* sub t. 5198 = *Pentapterygium rugosum*.
rugosum, *Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 740, nomen (Quid ?).—Hab. ?
salicifolium, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 740.—Am. bor.

VACCINIUM:—

salicinum, *Aschers. in Flora*, xliii. (1860) 370 = *pennsylvanicum*.
salicinum, *Cham. & Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 525.—Unalashch.
salicinum, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 156 = *salicifolium*.
salignum, *Hook. f. Illustr. Himal. Pl. t.* 15 A = *Agapetes saligna*.
salvifolium, *Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 740, nomen (Quid ?).—Hab. ?
scabrum, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 37, t. 124 = *Gaylussacia Pseudo-gaultheria*.
Schlechtendalii, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 856.—Mexic.
secundiflorum, *Hook. Ic. Pl. t.* 134.—Madag.
secundum, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 62.—Am. centr.
sednense, *Pers. Syn. i.* 478 = *uliginosum*.
serpens, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 171 = *Pentapterygium serpens*.
serratum, *Wight, l. c.*—Reg. Himal.
sibiricum, *Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 740, nomen (Quid ?).—Sibir.
Sieboldi, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 29 = *ciliatum*.
sikkimense, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 451.—Reg. Himal.
Smallii, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi.* (1859) 398 = *hirtum*.
smilacifolium, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 144 = *Hornemannia smilacifolia*.
spicatum, *Poir. Encyc. Suppl. i.* 280 = *V. Acosta*.
splendens, *Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich.* iv. 56 = *uliginosum*.
Sprengelii, *Hort.*—Cf. *Gard. Chron.* (1883) i. 473 = *V. Myrsinites*.
Sprengelii, *Wall. Cat. n.* 6296 = *Agapetes obovata*.
stamineum, *Linn. Sp. Pl.* 350.—Am. bor.
staphelioides, *Planch. ex Wedd. Chlor. And.* ii. 180.—N. Granat.
stenophyllum, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 740 = *angustifolium*.
suaveolens, *Boj. ex Dun. in DC. Prod.* vii. 570 = *emirnense*.
subcrenulatum, *Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 128.—Guian.
sumatranum, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. vii. 18.—Snnatra.
tenellum, *Ait. Hort. Kew. ed. I. ii.* 12 = *virgatum*.
tenellum, *Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 288 = *pennsylvanicum*.
terniflorum, *Dun. in DC. Prod.* vii. 575.—Peruv.
Teysmanni, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii.* 1062.—Java.
Thibautii, *Regel, Gartenfl.* xv. (1866) 357; et in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* 1866 (1867) 96.—Am. trop.
thymifolium, *Klotzsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 62.—N. Granat.
timorense, *Fawcett, in H. O. Forbes, Nat. Wand. East. Archip.* 509.—Ins. Timor.
tomentosum, *Pursh, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. i. 19 = *Gaylussacia frondosa*.
trinerve, *Domb. ex Dun. in DC. Prod.* vii. 563 (= *Proclesia bracteata*).—Peruv.
uliginosum, *Linn. Sp. Pl.* 350.—Reg. bor. et arct.
ursinum, *M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. I.* xlv. (1843) 82 = *Gaylussacia ursina*.
vacillans, *Soland. ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I.* 261.—Am. bor.
variegatum, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 84 = *Agapetes macrantha*.
varingiaefolium, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii.* 1061.—Java.
venosum, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 172.—Reg. Himal.
venustum, *Ait. Hort. Kew. ed. I. ii.* 11 = *Gaylussacia frondosa*.
verticillatum, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 83.—Burma.
verticillatum, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 170 = *Agapetes setigera*.
villosum, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxvi. n. 29.—Mexic.
virgatum, *Ait. Hort. Kew. ed. I. ii.* 12.—Am. bor.
virgatum, *Bigel. Fl. Bost. ed. II.* 152 = *vacillans*.
virgineum, *J. F. Gmel. Syst.* 1643 (Index) = *Oxycoccus palustris* ?
Vitis-Idaea, *Linn. Sp. Pl.* 351.—Reg. bor. et arct.
Wallichianum, *Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 171 = *Agapetes setigera*.
Watsoni, *Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 330 = *Gaylussacia dumosa*.

VACCINIUM:—

- Wrightii*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1859) 398 = bracteatum.
Wrightii, Griseb. Cat. Pl. Cub. 52 = assimile.
Zollingeri, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 1061 = laurifolium.
- VACHELLIA**, Wight & Arn. Prod. 272 (1834) = *Acacia*, Tourn. (Legumin.).
Farnesiana, Wight & Arn. l. c. = *A. Farnesiana*.
- VACHENDORFIA**, Adans. Fam. ii. 47 (1763) = *Wachendorfia*, Burm. f. (Haemod.).
- VADA-KODI**, Adans. Fam. ii. 701 (1763) = *Justicia*, Houst. (Acanth.).
- VAGARIA**, Herb. Amaryll. 226 (1837). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 735.
VAGINARIA, Kunth, Enum. Pl. v. 693 (1850).
parviflora, Herb. Amaryll. 226.—Syria.
- VAGINARIA**, Kunth, Enum. Pl. v. 693 (1850) = praec.
- VAGINARIA**, Pers. Syn. i. 70 (1805) = *Fuirena*, Rottb. (Cyperac.).
Richardi, Pers. l. c. = *F. scirpoidea*.
- VAGNERA**, Adans. Fam. ii. 496 (1763) = *Smilacina*, Desf. (Liliac.).
- VAHEA**, Lam. Illustr. ii. 292 (1798?) = *Landolphia*, Beauv. (1806) (Apocyn.).
angustifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 394.—Sumatra.
comorensis, Boj. Hort. Maurit. 207; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 328.—Ins. Comor.
crassipes, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1883) 399.—Madag.
florida, F. Muell. Extra-trop. Pl. Indian ed. (1880) 344 = *L. florida*.
gummifera, Lam. Illustr. 292. t. 169 = *Urceola elastica*.
Heudelotii, F. Muell. Extra-trop. Pl. Indian ed. (1880) 344 = *L. Heudelotii*.
madagascariensis, Boj. Hort. Manrit. 207 (excl. syn.); et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 327.—Madag.
madagascariensis, Boj. l. c., partim = *Urceola elastica*.
owariensis, F. Muell. Extra-trop. Pl. Indian ed. (1880) 344 = *L. owariensis*.
senegalensis, A. DC. in DC. Prod. viii. 328.—Afr. trop.
- VAHLBERGELLA**, Blytt, Norges Fl. iii. 1070 (1876) = *WAHLBERGELLA*, Fries = *Lychnis*, Tourn. (Caryoph.).
- VAHLIA**, Dahl, Obs. Bot. 21 (1787) = *Dombeya*, Cav. (Sterculiac.).
fastuosa, Dahl, l. c. (*tastuosa*).—Ins. Maurit.
- VAHLIA**, Thunb. Nov. Gen. ii. 36 (1782). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 637.
BISTELLA, Delile, in Caill. Voy. Méroé (Cent. Pl. Afr.) 97. t. 63 (1826).
RUSSELLIA, Linn. f. Suppl. 24 (1781).
capensis, Thunb. Nov. Gen. ii. 36.—Afr. trop. et austr.
cordofana, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 43 = *oldenlandioides*.
macrantha, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 175 = *oldenlandioides*.
Oldenlandiae, DC. Prod. iv. 54 = *oldenlandioides*.
oldenlandioides, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. ii. 89.—As. et Afr. trop.
ramosissima, A. DC. ex DC. Prod. iv. 54 = *oldenlandioides*.
sessiliflora, DC. l. c. = *viscosa*.
silenoides, A. DC. ex DC. l. c. = *oldenlandioides*.
tomentosa, A. DC. ex DC. l. c.—Afr. trop.
verbasciflora, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 384, in obs. = *capensis*.
viscosa, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. ii. 89.—As. et Afr. trop.
Weddenii, Reichb. Ic. Bot. Exot. i. 62. t. 91 = *viscosa*.
- VAHLODEA**, Fries, in Bot. Notiser (1842), 141, 178 = *Deschampsia*, Beauv. (Gramin.).
atropurpurea, Fries, l. c. 178; et Summa Veg. Scand. 243 = *D. atropurpurea*.

- VAILLANTIA**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735) (*Valantia*); Gled. in Mém. Acad. Berl. v. (1751) 127. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 148.
aculeata, Tenore, Fl. Neap. Prod. App. iv. 33 = *muralis*.
alpina, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 86, nomen = *Galium vernum*.
Aparine, J. F. Gmel. Syst. 241 = *Galium tricornis*.
Aparine, Lam. Fl. Fr. iii. 383 = *Galium Aparine*.
Aparine, Linn. Sp. Pl. 1051 = *Galium saccharatum*.
aprica, Tausch, in Flora, xii. (1829) 647 = *Galium apricum*.
aristata, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 65 = *Galium apricum*.
articulata, Linn. Sp. Pl. 1052 = *Galium articulatum*.
aspera, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 219 = *Galium pedemontanum*.
Bauhini, Schur, Enum. Pl. Transs. 287 = *Galium vernum*.
chersonensis, Willd. Sp. Pl. iv. 951 = *Galium Cruciatum*.
ciliata, Opiz, ex J. & C. Presl, Fl. Čech. 34; et Natural. vi. (1824) 45 = *Galium Cruciatum*.
ciliata, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 266 = *hispidum*.
cordata, Pers. Syn. i. 129 = *Galium articulatum*.
Cruciatum, Linn. Sp. Pl. 1052 = *Galium Cruciatum*.
Cucullaria, Linn. Cent. Pl. i. 32; Amoen. Acad. iv. 296 = *Callipeltis Cucullaria*.
cucullata, Hill, Veg. Syst. vii. 27 = praec.?
filiformis, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 428 = *Galium filiforme*.
glabra, Linn. Sp. Pl. ed. II. 491 = *Galium vernum*.
granularis, Roem. & Schult. Syst. iii. 249, sphalm. = *granulata*, Spreng.
granulata, Roth, ex Willd. Sp. Pl. iv. 949 = *Galium pedemontanum*.
granulata, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) II. 200 = *Galium saccharatum*?
hirsuta, Gilib. Exercit. i. 25 = *Galium Cruciatum*.
hispidum, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1366 = *Galium Cruciatum*.
hispidum, Linn. Syst. ed. X. 1307.—Reg. Mediterr.
hispidum, Lamnitz, Fl. Poson. 454 = *Galium pedemontanum*.
hispidum, Pall. Tabl. Taur. 59 = *Galium coronatum*.
hispidum, Viv. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 278 = *lanata*.
humifusa, Willd. Sp. Pl. iv. 949 = *Galium coronatum*.
hypocarpia, Linn. Syst. ed. X. 1307 = *Relbunium hypocarpium*.
incrassata, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 78 = *hispidum*.
lanata, Delile, ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 278 (Quid?).—Aegypt.
muralis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 435 = *Galium articulatum*.
muralis, Linn. Sp. Pl. 1051.—Europ. austr.
pedemontana, Bell. in Mém. Acad. Sc. Turin, v. 1790–1791 (1793) 252 = *Galium pedemontanum*.
persica, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 473 = *Galium coronatum*.
pusilla, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. vii. (1829) 274 = *Galium articulatum*.
quadriflora, Moench, Meth. 640 = *muralis*.
rediviva, Hoffm. Hort. Mosq. (1808) n. 3387; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 640 = *Galium coronatum*.
rupestris, Lam. Fl. Fr. iii. 384 = *Galium murale*.
saccharata, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 781 = *Galium saccharatum*.
Scopolii, Bess. Enum. Pl. Volh. 51, 89 = *Galium vernum*.
spuria, Pers. Syn. i. 129 = *Galium tricornis*.
taurica, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 315 = *Galium coronatum*.
tricornis, Roth, Neue Beytr. i. 142 = *Galium tricornis*.
triflora, Lam. Fl. Fr. iii. 384 = *Galium tricornis*.
verna, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 411 = *Galium vernum*.

VAINILLA, Salisb. Parad. Lond. ii. II. sub t. 82 (1807) = *Vanilla*, Juss. (Orchid.).

VALANTIA, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Vaillantia*, Tourn. (Rubiace.).

VALARUM, Schur, Enum. Pl. Transs. 54 (1866) = *Sisymbrium*, Tourn. (Crucif.).
officinale, Schur, l. c. = *S. officinale*.

VALCARCELIA, Lag. ex Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 157 (1836). Genus ignotum *LEGUMINOSARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. i. 465.

VALCARCELLA, Steud. Nom. ed. II. 741 (1841), sphalm. = praec.

VALDESIA, Ruiz & Pav. Prod. 67 (1794) = *Blakea*, P. Br. (Melastom.).
latifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 407 = *B. latifolia*.
ovalis, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 121 = *B. ovalis*.
repens, Ruiz & Pav. l. c. = *B. repens*.
rosea, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 408 = *B. rosea*.
subconnata, Tafalla, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 148 = *B. subconnata*.

VALDIA, Plum. ex Adans. Fam. ii. 157 (1763) = *Clerodendron*, Linn. (Verben.).

VALDIVIA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 43. t. 29 (1847). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 644. *Gayana*, Remy, l. c. 44.—Chili.

VALENTIANA, Rafin. Speech. i. 87 (1814); ex DC. Prod. iv. 340. Genus dubium *CAPRIFOLIACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 2. *volubilis*, Rafin. l. c.—Abyss.

VALENTINIA, Neck. Elem. ii. 450 (1790) = *Tachigalia*, Aubl. (Legumin.).

VALENTINIA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 63 (1788) = *Casearia*, Jacq. (Samyd.).
coriacea, Griseb. Cat. Pl. Cub. 9.—Cuba.
ilicifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 63.—Ind. occ.
sylvestris, Raeusch. Nom. ed. III. 109 = *Erythraea sylvestris*.

VALENZUELA, Mutis, ex Caldas, in Seman. Nuev. Gran. iii. (1810) 21 = seq.?

VALENZUELIA, Bert. ex Cambess. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 236. t. 14. *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 394.
GUINDILIA, Gill, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 170. *trinervis*, Bert. ex Cambess. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 236.—Chili.

VALERANDA, Neck. Elem. ii. 33 (1790) = *Orphium*?, E. Mey. (Gentian.).

VALERIANA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *VALERIANEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 154.
ARETIASTRUM, Spach, Hist. Veg. Phan. x. 304 (1841).
OLIGACOCCE, Willd. ex DC. Prod. iv. 632 (1830).
PHU, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 214 (1745).
VEXIBIA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).
acuminata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 241 = *Hardwickii*.
adscendens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 173.—Ecuador.
aequiloba, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 223.—Chili.
affinis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 123.—Mexic.
affinis, Opiz, Natural. n. x. (1825) 243 = *dioica*.
alba, [Mazziari], in Ionios Anthol. ii. (1834) 450 = *Centranthus ruber*.
alliarifolia, Vahl, Enum. ii. 11.—Europ. or.; As. occ.
alpestris, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1814) 342.—Reg. Cauc.
alpigena, Schur, Enum. Pl. Transs. 290 = *montana*.
alpina, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 45 = *alpestris*.
alpina, Vell. Fl. Flum. 28; i. t. 68.—Bras.
alternifolia, Ledeb. Fl. Alt. i. 52 = *officinalis*.
alternifolia, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 291 = *Calorhabdos Brunonianus*.
altissima, Hornem. Hort. Hafn. ii. 950 = *sambucifolia*.
altissima, Mikan, ex Bess. Enum. Pl. Volh. 4 = *exaltata*.
alypifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 325.—Ecuador.
amoena, Salisb. Prod. 56 = *tripteris*.

VALERIANA:—

- Andonaegui, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1872) 733.—Chili.
angustifolia, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 24 = *Centranthus longiflorus*.
angustifolia, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 4 = *Centranthus angustifolius*.
angustifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* i. 22. t. 29 = *Centranthus Sibthorpil*.
angustifolia, Tausch, ex Host, *Fl. Austr.* i. 36 = officinalis.
angustiloba, DC. *Prod.* iv. 641.—Oriens.
annua, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 478 = *Centranthus Calcitrapa*.
apula, *Pourr. in Mém. Acad. Toul.* iii. (1788) 332.—Europ.
aquatica, Schlecht. ex C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 214 = *Leschenaultii*.
aretioides, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 324 = *Phyllactis aretioides*.
arizonica, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 81.—Arizona.
armeriaefolia, Schlecht. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 485.—Peruv.
Arnottiana, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 741 = *Hookeriana*.
Arnottiana, Wight, Ic. t. 1045, 1046 = *Hardwickii*.
asarifolia, Dufr. *Hist. Valér.* 44.—Ins. Creta.
astrephioides, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 53 = *Astrephia laxa*.
auriculata, Tardent, *Ess. Hist. Nat. Bessar.* 65 = *Valerianella Auricula*?
barbareaefolia, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. i. (1844) 121.—Mexic.
Beddomei, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 214.—Ind. or.
Berterii, Colla, in *Mem. Acc. Torin.* xxxviii. (1835) 5 = V. *Papilla*.
Berteroniana, Steud. & Hochst. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 741 = *Bridgesii*.
Bertisea, Panč. *Elench. Pl. Vasc. Crna-Gora*, 42.—Europ.
Bonplandiana, Wedd. *Chlor. And.* ii. 19.—Ecuador.
brachiata, Pers. *Syn.* i. 37 = *pinnatifida*.
bracteata, Benth. *Pl. Hartw.* 195 = *Phyllactis bracteata*.
bracteata, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 91 = *leucophaea*.
bracteata, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 241 = *pyrolaefolia*.
bracteosa, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 101.—Chili.
bractescens, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 57 = *Phyllactis bracteata*.
Bridgesii, Hook. & Arn. in *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 365.—Chili.
Brunoniana, Wall. *Cat. n.* 405 = *Calorhabdos Brunoniana*.
Brunoniana, Wight & Arn. *Prod.* 443 = *Leschenaultii*.
bulbosa, Pall. *Reise*, i. 148 = *tuberosa*.
bulbosa, Wedd. *Chlor. And.* ii. 24.—Bolivia.
Bustillosi, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 104.—Chili.
caespitosa, Rupr. *Sert. Tiansch.* 51.—As. centr.
Calcitrapa, Linn. *Sp. Pl.* 81 = *Centranthus Calcitrapa*.
calthaefolia, Sieber, ex Steud. *Nom.* ed. I. 868, nomen (Quid?).—Hab.?
Candolleana, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 112 = *scandens*.
capensis, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 7.—Afr. austr.
capitata, Pall. ex Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 66.—Reg. arct.
Cardamines, Bieb. *Fl. Tanr.-Canc.* i. 24 = *sisymbriifolia*.
carnosa, Sm. *Pl. Ic. Ined.* t. 52.—Reg. Magellan.
Catacata, Azara, *Voy.* ii. 490.—Reg. Andin.
celtica, Linn. *Sp. Pl.* 32.—Europ.
celtica, Vill. *Hist. Pl. Dauph.* ii. 285 = *saliunca*.
cephalantha, Schlecht. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 483.—Peruv.
ceratophylla, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 333.—Mexic.
chaerophylla, Pers. *Syn.* i. 37 = *Astrephia chaerophylloides*.
chaerophylloides, Sm. *Pl. Ic. Ined.* t. 53 = *Astrephia chaerophylloides*.
chamaedryfolia, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828) 129 = *Valerianopsis chamaedryfolia*.
chinensis, Linn. *Sp. Pl.* 33 = *Boerhaavia repanda*.
ciliata, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* ii. 49 = *edulis*.
clarionaeefolia, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 702.—Chili.

VALERIANA:—

- Clematitidis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 327.—N. Granat.
coarctata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 40. t. 68. f. a.—Peruv.
colchaguensis, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 104.—Chili.
collina, Wallr. in *Linnaea*, xiv. (1840) 537 (Beitr. *Fl. Hercyn.* 167) = officinalis.
compacta, Opiz, *Natural. n. x.* (1825) 244 = *dioica*.
connata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 39. t. 67. f. c.—Peruv.
cordata, Griseb. in *Goett. Abh.* vi. (1854) 126; *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 697.—Chili.
cordifolia, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 54 = *Phyllactis cordifolia*.
Cornucopiae, Linn. *Sp. Pl.* 31 = *Fedia Cornucopiae*.
coronata, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 11 = *Valerianella discoidea*.
coronata, Salisb. *Prod.* 56 = *Valerianella coronata*.
crassifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 328.—N. Granat.
crassipes, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 56 = *Phyllactis crassipes*.
Crinii, Orph. in Boiss. *Diagn. Ser. II.* ii. 119 = *montana*.
crispa, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 27 = *pterocarpa*.
crispa, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 41 = *Astrephia crispa*.
cuspidata, Bertol. ex DC. *Prod.* iv. 636 = *montana*.
dacica, Porc. in *Magyar Növényt. Lapok*, ix. (1885) 127 = *tripteris*.
daghestanica, Rupr. ex Boiss. *Fl. Orient.* iii. 87.—Reg. Canc.
decussata, Bonpl. ex Wedd. *Chlor. And.* ii. 19 = *Bonplandiana*.
decussata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 42. t. 70. f. b.—Peruv.
densa, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 55 = *Phyllactis densa*.
densiflora, Benth. *Pl. Hartw.* 39.—Mexic.
dentata, All. *Fl. Pedem. i.* 4 = *Valerianella dentata*.
denudata, Benth. *Pl. Hartw.* 20.—Mexic.
dichotoma, [Moq. & Sesse], ex DC. *Prod.* iv. 640 = *ceratophylla*.
dinorrhiza, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 54 = *Phyllactis dinorrhiza*.
dioica, Bess. *Prim. Fl. Galic.* i. 48 = *elongata*.
dioica, Linn. *Sp. Pl.* 31.—Europ.
dioica, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 727 = *sylvatica*.
Dioscoridis, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 21.—Graecia; As. Min.
discoidea, Willd. *Sp. Pl.* i. 184 = *Valerianella discoidea*.
divaricata, Hinter, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, viii. (1858) 333 = *exaltata*.
diversifolia, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 115.—Japan.
dubia, Bunge, in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 52 = officinalis.
dubia, Turcz. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 741 = *heterophylla*.
echinata, Linn. *Syst. ed. X.* 861 = *Valerianella echinata*.
edulis, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 48.—Am. bor. occ.
effusa, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 162.—Reg. Argent.
elata, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 159 = *Hardwickii*.
elegans, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 212.—Reg. Himal.
elegans, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 236.—Chili.
elongata, Geners. *Elench. Scepus.* n. 32; ex *Wahlenb. Fl. Carpat.* 11 = *tripteris*.
elongata, Jacq. *Enum. Pl. Vindob.* 7, 205.—Austr.
Engleriana, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 54 = *Phyllactis pinnatifida*.
eriocephala, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 1031 (Index), sphalm. = *Valerianella hirsutissima*.
erysimoides, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 16.—Peruv.
exaltata, Baumg. *Enum. Stirp. Transs.* 56 = *sambucifolia*.
exaltata, Mikan, f. ex Pohl, *Tent. Fl. Bohem.* i. 41.—Rossia.
excelsa, Poir. *Encyc. viii.* 301 = officinalis.
exscapa, Griseb. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 57, nomen.—Peruv.
exscapa, Willk. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* ii. 3 = *longiflora*, Willk.
ferax, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 55 = *Phyllactis ferax*.

VALERIANA:—

- ficariaefolia*, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 89.—Persia.
flaccidissima, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xii. (1868) 228.—Japon.
floribunda, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 701.—Chili.
florida, Salisb. *Prod.* 55 = *Centranthus ruber*.
foliosa, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 698.—Chili.
Fonki, *Phil. l. c.* 698.—Chili.
fragilis, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 226.—Chili.
Galeottianum, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* xi. i. (1844) 124 = *Phyllactis pratensis*.
Gesneri ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 114.—Europ.
glaucula, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* 19, in *syn.* = *apula*.
glaucula, Poepp. ex DC. *Prod.* iv. 639.—Chili.
globifera, Pers. *Syn.* i. 37 = seq.
globiflora, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 43. t. 65. f. b.—Peruv.
globulariaefolia, Ramond, ex DC. *Fl. Fr.* iv. 236 = *apula*.
globularis, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 322.—Peruv.
gracilipes, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 231.—Chili.
gracilis, Benth. *Pl. Hartw.* 196.—Ecuador.
grandiflora, Wall. *Cat. n.* 403, sphalm. = *Veronica himalensis*.
grandifolia, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 700.—Chili.
Grisiana, Wedd. *Chlor. And.* ii. 19.—Peruv.
Hardwickiana, Schult. *Mant.* i. 259 = *Hardwickii*.
Hardwickii, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 159 = *Wallichii*.
Hardwickii, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 159 = *Moonii*.
Hardwickii, Wall. in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, i. 166.—Reg. Himal.; Malaya.
hebecarpa, DC. *Prod.* iv. 638.—Chili.
heterophylla, Baumg. *Enum. Stirp. Transs.* 57 = *tripteris*.
heterophylla, Loisel. *Fl. Gall.* ed. I. 21 = *apula*.
heterophylla, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. vii. 153, nomen; xviii. (1845) i. 321.—Sibir. baical.
hirtella, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 327.—Ecuador.
hispidula, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 56 = *Phyllactis hispidula*.
hispidula, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) 11. 172.—N. Granat.
hispidula, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iii. 56 = officinalis.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in *Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 84 = *Hardwickii*.
Hookeri, Shuttl. in *Flora*, xx. (1837) 450 = *sitchensis*.
Hookeriana, Wight & Arn. *Prod.* 444.—Ind. or.
Hoppii, Reichb. Ic. *Fl. Germ.* xii. 34 = *tripteris*.
Hornschuchiana, Walp. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 357.—Chili.
hortensis, Lam. *Fl. Fr.* iii. 359 = V. *Phu*.
Humboldtii, Hook. & Arn. in *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 365.—Chili.
hyalinorrhiza, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 331 = *Humboldtii*.
hyalinorrhiza, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 41. t. 67. f. b.—Chili; Peruv.
inconspicua, Hoeck, in *Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 55 = *Phyllactis inconspicua*.
incrassata, Bory & Chaub. *Nouv. Fl. Pélop.* 2 = *Valerianella eriocarpa*.
intermedia, Sternb. & Hoppe, in *Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* i. II. (1818) 88, 89 = *montana*.
intermedia, Vahl, *Enum.* ii. 9 = *tripteris*.
interrupta, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 42. t. 67. f. a.—Peruv.
isophylla, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 34 (Quid?).—Gallia.
italica, Lam. *Illustr.* i. 92 = *Dioscoridis*.
Jaeschkii, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 212.—Reg. Himal.
japonica, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 115.—Japan.
Jatamansi, Jones, in *As. Res.* ii. (1790) 416; iv. (1795) 451 = *Wallichii*.
Jatamansi, Wall. *Cat. n.* 431 = *Nardostachys Jatamansi*.
javanica, Blume, *Bijdr.* 919 = *Hardwickii*.
Jetamansi, Dufr. *Hist. Valér.* 43, sphalm. = V. *Jatamansi*.
laciniata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 42 = *Astrephia chaerophylloides*.
laciniata, Salisb. *Prod.* 56 = *Centranthus Calcitrapa*.

VALERIANA:—

- laciniosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 121.—Mexic.
 laeta, Salisb. Prod. 56 = V. Phu.
 laevicaulis, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 95 = V. Phu.
 laevigata, Willd. ex Steud. Nom. ed. I. 869, nomen (Quid?).—Am. austr.
 lapathifolia, Vahl, Enum. ii. 11.—Reg. Magellan.
 lasiocarpa, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 160.—Reg. Argent.
 latifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 124.—Mexic.
 laurifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 328.—N. Granat.
 laxa, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 701.—Chili.
 laxiflora, DC. Prod. iv. 638.—Chili.
 laxiflora, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 734 = sparsiflora.
 lepidota, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 230.—Chili.
 Leschenaultii, DC. Prod. iv. 640.—Ind. or.
 leucocarpa, DC. l. c. 638.—Chili.
 leucophaea, DC. l. c. 644.—As. Min.; Persia.
 Lindleyana, Wall. Cat. n. 404 = Picrorhiza Kurroa.
 lobata, Hoeck, in Engl. Bot. Jahrb. iii. (1882) 53 = *Astrephia lobata*.
 Locusta, Linn. Sp. Pl. 33 = Valerianellae spp. variae.
 Locusta, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 46; ex Guss. Fl. Sic. Prod. i. 24 = Fedia Cornucopiae.
 longiflora, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 384.—Turkestan.
 longiflora, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 733.—Hispan.
 longifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 330.—N. Granat.
 lucida, Hort. Par. ex DC. Prod. iv. 641 = officinalis.
 lutescens, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 699.—Chili.
 lyrata, Phil. l. c. xxxiii. (1864-65) 103.—Chili.
 lyrata, Vahl, Enum. ii. 4.—Peruv.
 macrophylla, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. i. 25 = alliariae-folia.
 macrohiza, Poepp. ex DC. Prod. iv. 635 = Phyllactis macrohiza.
 macrosiphon, Vilms. Fl. Pl. Terre, ed. I. 916 = Centranthus macrosiphon.
 magellanica, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 54.—Reg. Magellan.
 magellanica, Lam. Illustr. i. 93 = carnosia.
 magna, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 227.—Chili.
 major, Pall. Reise, iii. 318 = officinalis.
 Mandoniana, Hoeck, in Engl. Bot. Jahrb. iii. (1882) 54 = Phyllactis Mandoniana.
 mexicana, DC. Prod. iv. 640.—Mexic.
 microphylla, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Scr. III. i. (1864) 50 = Beddomei.
 microphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 325.—Peruv.
 micropterina, Wedd. Chlor. And. ii. 26.—Bolivia.
 Mikaniae, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 316.—Guatemala.
 mixta, Linn. Sp. Pl. 34 = Valerianella dentata.
 monandra, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 280 = Centranthus angustifolius.
 monorrhiza, Dufr. Hist. Valér. 44 = tuberosa.
 montana, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. i. 25 = alpestris.
 montana, Geners. Elench. Scep. n. 31; ex Wahlenb. Fl. Carpat. 11 = dioica.
 montana, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 662 = capitata.
 montana, Linn. Sp. Pl. 32.—Europ.
 Montteana, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 191.—Chili.
 Moonii, Arn. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 213.—Zeylan.
 Morisoni, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 397, in syn., sphalm. = Valerianella dentata.
 multiceps, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 539 (Beitr. Fl. Hercyn. 169) = exaltata.
 multifida, Roem. & Schult. Syst. i. 363, in syn. = Valerianella membranacea.
 muriculata, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 102.—Chili.
 Mutisiana, Hoeck, in Engl. Bot. Jahrb. iii. (1882) 54 = Phyllactis Mutisiana.
 Napus, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 76.—Mexic.
 nasturtifolia, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 4 = dioica.
 nivalis, Wedd. Chlor. And. ii. 23.—Bolivia.

VALERIANA:—

- oblongifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 40. t. 65. f. a.—Peruv.
 obovata, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 221 = obtusifolia.
 obovata, Schult. Mant. i. 265 = edulis?
 obtusifolia, DC. Prod. iv. 635.—Chili.
 officinalis, Linn. Sp. 31.—Europ.; As. bor.
 olenaea, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 118.—Graecia.
 oligantha, Boiss. & Heldr. l. c. Ser. I. x. 72.—Graecia.
 olitoria, Willd. Fl. Berol. Prod. 19 = Valerianella olitoria.
 orbiculata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 21 = Centranthus Calcitrapa.
 oreocharis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 699.—Chili.
 organensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 112 = Valerianopsis organensis.
 organifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) 11. 171.—Peruv.
 paniculata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 41. t. 70. f. a.—Peruv.
 Papilla, Bert. ex DC. Prod. iv. 638.—Chili.
 parviflora, Hoeck, in Engl. Bot. Jahrb. iii. (1882) 57 (= *Porteria parviflora*).—Venezuela.
 parviflora, Micgév. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiv. (1867) 145 = Centranthus Calcitrapa.
 pauciflora, Hook. Fl. Bor. Am. i. 292. t. 101 = sitchensis.
 pauciflora, Michx. Fl. Bot. Am. i. 18.—Am. bor.
 Pavonii, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 16. t. 215.—Peruv.
 Pearcei, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 101.—Chili.
 peltata, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 229.—Chili.
 petrophila, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. i. 54.—Afghan.; Sibir. altaic.
 Phaseoli, A. Br. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1851) 13 (App. 2).—Mexic.
 phellocarpa, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 100.—Chili.
 Phu, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 18 = montana.
 Phu, Linn. Sp. Pl. 32.—Europ.; Reg. Cauc.
 pilosa, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 702.—Chili.
 pilosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 39. t. 66. f. a.—Peruv.
 pilosiuscula, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 122.—Mexic.
 pinnata, Gilib. Exercit. ii. 454 = officinalis.
 pinnatifida, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 40. t. 69. f. b.—Peruv.
 plantaginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 329.—Ecuador.
 polemonioides, H. B. & K. l. c. 332.—Ecuador.
 polybotrya, Hoeck, in Engl. Bot. Jahrb. iii. (1882) 55 = Phyllactis polybotrya.
 polygama, Bess. ex DC. Prod. iv. 637 = elongata.
 polystachya, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 51 = Valerianopsis polystachya.
 pratensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 742 = Phyllactis pratensis.
 procera, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 329.—Mexic.
 procurrens, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 540 (Beitr. Fl. Hercyn. 170) = officinalis.
 pterocarpa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 28, in nota.—Chili.
 pubescens, Germann, in Bot. Zeit. Regensb. iv. (1805) 359 = Valerianella uncinata.
 pubescens, Phil. Fl. Atac. 26.—Chili.
 pulchella, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 123.—Mexic.
 pulchella, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 102.—Chili.
 pumila, Willd. Sp. Pl. i. 184 = Valerianella membranacea.
 pusilla, Royle, Illustr. Bot. Himal. 241 = dioica.
 pycnantha, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 322.—Peruv.
 pygmaea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) 11. 172.—Ecuador.
 pyramidalis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 331.—Ecuador.
 pyrenaica, Linn. Sp. Pl. 33.—Mont. Pyren.
 pyrolae-folia, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 85. t. 93.—Reg. Himal.
 quadrangularis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 326.—Peruv.
 radiata, Willd. Sp. Pl. i. 184 = Valerianella radiata.
 radicalis, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 215.—Chili.
 ramosissima, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 122.—Mexic.

VALERIANA:—

- Regnellii, Sond. in Linnaea, xxii. (1849) 573.—Bras.
 regularis, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 225.—Chili.
 remota, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42.—Peruv.
 repens, Host, Fl. Austr. i. 35 = officinalis.
 repens, Wall. Cat. n. 434; et ex DC. Prod. iv. 640.—Nepal.
 rhizantha, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 322.—Peruv.
 rigida, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 39. t. 65. f. c = Phyllactis rigida.
 ringens, Salisb. Prod. 56 = Fedia Cornucopiae.
 rotundifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 31 = Centranthus Calcitrapa.
 rotundifolia, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 283 = montana.
 rotundiloba, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 233.—Chili.
 Roylei, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 83.—Reg. Himal.
 rubra, Linn. Sp. Pl. 31 = Centranthus ruber.
 rumicoides, Wedd. Chlor. And. ii. 22.—N. Granat.
 rupestris, Pall. Reise, iii. 266 = Patrinia rupestris (in Addend.).
 rupestris, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 734.—Chili.
 rupestris, Uspenski, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 426 = Patrinia sibirica.
 rupicola, Lag. in Varicd. Cienc. ii. iv. (1805) 212 = apula.
 rupicola, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 16. t. 217.—Chili.
 ruthenica, Willd. Sp. Pl. i. 181 = Patrinia sibirica.
 salicariaefolia, Vahl, Enum. ii. 16 = Valerianopsis salicariaefolia.
 salinca, All. Fl. Pedem. i. 3. t. 70. f. 1.—Europ. austr.
 sambucifolia, Eichw. Skizze, 152 = exaltata.
 sambucifolia, Mikan f. ex Pohl, Tent. Fl. Bohem. i. 41.—Europ.
 samolifolia, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 4. t. 21 = Valerianella samolifolia.
 Sanguisorbae, Pers. Syn. i. 37 = seq.
 sanguisorbaefolia, Cav. Ic. v. 34.—Chili.
 saxatilis, Georgi, Besch. Russ. Berol. III. iv. 662 = capitata.
 saxatilis, Linn. Sp. Pl. 33.—Europ.
 saxatilis, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 286 = celtica.
 saxicola, C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 49.—Reg. Cauc.
 scandens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 12 = Boerhaavia scandens.
 scandens, Loeffl. It. Hisp. 235.—Am. trop.
 sciophila, Schur, Enum. Pl. Transs. 289 = sambucifolia.
 scorpioides, DC. Prod. iv. 635.—Mexic.
 scrophulariaefolia, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 331 = montana.
 sedifolia, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 612 = Phyllactis sedifolia.
 sedoides, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 53 = Phyllactis sedifolia.
 senecioides, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 735.—Chili.
 serrata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 40. t. 68. f. c.—Peruv.
 sibirica, Linn. Sp. Pl. 34 = Patrinia sibirica.
 sibirica, Willd. Sp. Pl. i. 181 = Patrinia rupestris (in Addend.).
 siifolia, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 32 = Dioscoridis.
 simplex, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 224.—Chili.
 simplicifolia, Kab.—Cf. Verh. Bot. Ver. Brandenb. vi. (1864) 110 = dioica.
 sinensis, J. F. Gmel. Syst. 92 = chinensis.
 sisymbriifolia, Schur, Enum. Pl. Transs. 290 = tripteris.
 sisymbriifolia, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 260 = Dioscoridis.
 sisymbriifolia, Vahl, Enum. ii. 7.—As. Min.; Persia.
 sitchensis, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 145.—Am. bor. occ.
 sorbifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 332.—Mexic.
 sparsiflora, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 218.—Chili.
 spatulata, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1862) 11. 397.—Chili.
 spatulata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 40. t. 68. f. b = Phyllactis spatulata.

VALERIANA:—

- speluncaria, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 88.—Cilicia.
 sphaerocarpa, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 730.—Chili.
Spica, Vahl, *Enum.* ii. 13 = Wallichii.
Steveni, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 436 = *Centranthus Calcitrapa*.
stolonifera, Czern. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xviii. (1845) ii. 133, in nota = officinalis.
 Stracheyi, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 212.—Reg. Himal.
striata, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 241, nomen (Quid?).—Cashmere.
 stricta, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 235.—Chili.
subdentata, Opiz, ex Mert. & Koch, *Deutschl. Fl.* i. 394 = dioica.
 subincisa, Benth. *Pl. Hartw.* 39.—Mexic.
supina, DC. *Fl. Fr.* iv. 237 = salinca.
supina, Linn. *Mant.* i. 27.—Austria.
sylvatica, Banks, ex Richards, in *Frankl. 1st Journ.* ed. II. *App.* 2.—Am. bor.
sylvatica, F. W. Schmidt, *Fl. Böem.* ii. 2 = dioica.
sylvestris, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 478 = dioica.
sylvestris, Groschke, in Keyserl. & Dersch. *Beschr. Prov. Kurland*, (1805) 110 = officinalis.
tenera, Wall. ex DC. *Prod.* iv. 640 = Hardwickii.
tenuifolia, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 39. t. 65. f. d = *Phyllactis tenuifolia*.
tenuissima, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 288 = officinalis.
toluccana, DC. *Prod.* iv. 640.—Mexic.
tomentosa, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 327.—Ecuador.
transsilvanica, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 290 = tripteris.
triloba, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 115.—Japan.
trinervis, Viv. *Fl. Lib. Spec.* 67; *Fl. Cors.* 3 = *Centranthus nervosus*.
triphylla, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 326.—N. Granat.
 tripteris, Linn. *Sp. Pl.* 32.—Europ.
tuberosa, Linn. l. c. 33.—Europ. austr.; As. bor.
tuberosa, Sprun. ex Nym. *Consp.* 336 = *Dioscoridis*.
uncinata, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 26 = *Valerianella uncinata*.
undulata, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 742, sphalm. = *Veronica Anagallis*?
urticaefolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 330.—N. Granat.; Peruv.
 vaga, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 227.—Chili.
vaginata, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 331.—Mexic.
valdiviana, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 700.—Chili.
velutina, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 233.—Chili.
veronicaefolia, Willd. ex Steud. *Nom. ed. I.* 870 = *urticaefolia*?
verticillata, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 223.—Chili.
vesicaria, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 10 = *Valerianella vesicaria*.
Villarsii, Timb. in *Mém. Acad. Toul. Sér. IV.* vi. (1856) 104 (Quid?).—Gallia.
villosa, Moon, *Cat. Pl. Ceyl.* 5 = Moonii.
villosa, Thunb. *Fl. Jap.* 32 = *Patrinia villosa*.
villosa, Wall. *Cat. n.* 433; et ex DC. *Prod.* iv. 640 = Wallichii.
violifolia, Griff. *Notul.* iv. 213; *l.c.* Pl. *Asiat.* t. 465 = Wallichii.
virescens, Clos, in C. Gay, *Fl. Chil.* iii. 222.—Chili.
virgata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 42. t. 66. f. b.—Peruv.
 Volkmanni, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 733.—Chili.
volubilis, [Moq. & Sesse], ex DC. *Prod.* iv. 634 = scandens.
 Wallichii, DC. l. c. 640.—Reg. Himal.

- VALERIANELLA**, Tourn. ex Hall. *Enum. Stirp. Helv.* 666 (1742); Moench, *Meth.* 493 (1794), partim. **VALERIANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 156.
 BETCKEA, DC. *Mém. Valer.* 18 (1829); *Prod.* iv. 642 (1830).
 DUFRESNIA, DC. l. c. 8. t. 3 (1829); et *Prod.* l. c. 624 (1830).
 FEDIA, Gaertn. *Fruct.* ii. 36. t. 86. f. 3 (1791), partim.

VALERIANELLA:—

- LOCUSTA, Riv. ex Medic. *Phil. Bot.* i. 55 (1789).
 MASEMA, Dulac, *Fl. Hantes-Pyr.* 476 (1867).
 ODONTOCARPA, Neck. *Elem.* i. 123 (1790).
 PLECTRITIS, DC. *Mém. Valer.* 13 (1829); *Prod.* iv. 651 (1830).
 POLYPREMIUM, Adans. *Fam.* ii. 152 (1763).
abyssinica, Fresen. in *Mus. Senckenb.* ii. (1837) 116 = dentata.
affinis, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 837.—Ins. Socotra.
 Amarella, Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 31, 55.—Texas.
ambigua, J. Lange, ex Krok, l. c. 56 = fallax.
amblyotis, Fisch. & Mey. ex Hohen. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 263.—Reg. Cauc.; Persia.
angulosa, DC. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 654, nomen (Quid?).—Hab.?
anomala, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 83.—Am. bor. occ.
 aphanoptera, A. Gray, l. c.—Am. bor. occ.
Aucheri, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iii. 58 = Szovitsiana.
Auricula, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 492 = rimosa.
 Boissieri, Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 32, 81.—Phrygia.
brachystephana, Bertol. *Fl. Ital.* i. 193.—Ital.
bracteata, Lowe, *Man. Fl. Mad.* i. 407.—Ins. Mader.
caerulea, Eaton & Wright, *N. Am. Bot. ed. VIII.* 469 = olitoria.
calcarata, Stev. ex Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 51 = sclerocarpa.
campanulata, Bivona, *Stirp. Rar. Sicil. Manip.* iv. 18 = eriocarpa.
capitata, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* vi. 92.—Phrygia.
carinata, Loisel. *Not. Pl. Fr.* 149.—Europ.; Oriens.
chenopodifolia, DC. *Prod.* iv. 629.—Am. bor.
chlorodonta, Coss. & Dur. ex Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1856) 740.—Alger.
chlorostephana, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* vi. 93 = Boissieri.
chlorostephana, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 67.—Alger.
coerulea, Anct. vide *caerulea*.
congesta, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1094.—Am. bor. occ.
conjungens, Bunge, ex Boiss. *Fl. Orient.* iii. 109.—Persia.
corniculata, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 49.—Reg. Cauc.
Cornucopiae, Loisel. *Fl. Gall. ed. I.* 23 = Fedia.
Cornucopiae.
coronata, DC. *Fl. Fr.* iv. 241.—Europ.; Oriens.
coronata, DC. *Prod.* iv. 628 = discoidea.
corymbifera, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 107.—Pamphyl.
costata, DC. *Prod.* iv. 626.—Europ.
cucullata, Dufour, ex Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 40 = eriocarpa.
cymbaearca, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 49.—As. Min.; Persia.
dactylophylla, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I.* x. 75.—Syria; Persia.
dasycarpa, Link, *Ennm. Hort. Berol.* i. 63 = dentata.
dentata, Loisel. *Fl. Gall. ed. I.* 21 = rimosa.
dentata, Pollich, *Hist. Pl. Palat.* i. 30.—Europ.; As. bor.
dichotoma, Gilib. *Exercit.* ii. 456 = olitoria.
diodon, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iii. 57.—As. Min.
diplusodon, Boiss. l. c. x. 74.—Syria.
discoidea, Loisel. *Not. Pl. Fr.* 148.—Graec.; As. Min.
divaricata, Lange, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 61.—Hispan.
Dufresnia, Bunge, ex Boiss. *Fl. Orient.* iii. 109.—As. Min.; Pers.; Afghan.
echinata, DC. *Fl. Fr.* iv. 242.—Europ. austr.; As. Min.
eriocarpa, Desv. *Journ. Bot.* ii. (1809) 314. t. 11. f. 2.—Europ.; Afr. bor.
eriocephala, Hampe, in *Flora*, xxv. (1842) 64 = hirsutissima.
exscapa, Stev. in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 251 = *Hohenackeria bupleurifolia*.
Fagopyrum, Walp. *Rep.* ii. 527 = *chenopodifolia*.
fallax, Coss. & Dur. ex Coss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* v. (1856) 32, nomen; Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 56.—Ital.; Afr. bor.
gibbosa, DC. *Prod.* iv. 626 = costata.

VALERIANELLA:—

- gioelbaschiensis, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 109.—Lycia.
 glomerata, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* vi. 93.—As. Min.
gracilis, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 29 = membranacea.
gracilis, Haberl. ex Heynh. *Nom.* i. 835 (Quid?).—Tauria.
hamata, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 494 = coronata.
heterocarpa, Bisch. *Hort. Heidelb.* (1851) 6.—Cf. *Linnaea*, xxv. (1852) 317 = membranacea.
hirsutissima, Link, in *Linnaea*, ix. (1834) 580.—Graec.; As. Min.
hispidiuscula, Mérat, *Rev. Fl. Par.* 227 = dentata.
Huetii, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 101.—Armenia.
incrassata, Nym. *Syll.* 62 = eriocarpa.
 Kotschy, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iii. 60.—Syria.
lasiocarpa, Stev. ex Betcke, *Animad. Bot. Valer.* 26.—Reg. Cauc.; Mesopot.; Oriens.
lasioccephala, Stev. ex Betcke, l. c. 21 = coronata.
laticuspis, Bertol. *Fl. Ital.* i. 856 = membranacea.
laxa, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* ii. 121.—As. Min.; Syria.
laxa, Presl, *Repert. Bot. Syst.* i. 11, in nota = *Astrephia laxa*.
laxiflora, Dufur. *Hist. Valér.* 58. t. 3 = rimosa.
leiocarpa, Auct. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 743 = dentata.
leptocarpa, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 293.—Alger.
lingulata, Presl, *Bot. Bemerk.* 88 = dentata.
Locusta, Betcke, *Animad. Bot. Valer.* 10 = olitoria.
longiflora, Regel & Schmalh. ex Regel, *Pl. Nov. Fedtsch.* 43.—Turkestan.
longiflora, Walp. *Rep.* ii. 527.—Am. bor. occ.
lutea, Moench, *Meth.* 493 = *Patrinia sibirica*.
macrocera, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 83.—Am. bor. occ.
macrocyathus, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 69 = eriocarpa.
 membranacea, Loisel. *Not. Pl. Fr.* 150.—Europ.
microcarpa, Loisel. l. c. 151 = dentata.
microcephala, Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 77 = divaricata.
microcyathus, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 68 = eriocarpa.
microstephana, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* vi. 92 = lasiocarpa.
minuta, Steud. *Nom. ed. II.* i. 626, sphalm. = seq.
mixta, Dufur. *Hist. Valér.* 58. t. 3 = dentata.
monodon, C. Koch, in *Linnaea*, xvii. (1843) 34 = cymbaearca.
Morisonii, DC. *Prod.* iv. 627 = dentata.
multidentata, Losc. & Pard. *Ser. Inconf. Pl. Arag. ed. Willk.* 49 = coronata.
muricata, Bieb. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 654, nomen (Quid?).—Reg. Cauc.
muricata, Heldr. ex Nym. *Consp.* 339 = eriocarpa.
mutica, Kern, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xx. (1870) 357 = membranacea.
 Nuttallii, Walp. *Rep.* ii. 527.—Am. bor. occ.
obtusiloba, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iii. 59.—Graec.; As. Min.
olitoria, Pollich, *Hist. Pl. Palat.* i. 30.—Europ.; Oriens.
orientalis, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* ii. 120.—As. Min.
otodonta, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 68 = dentata.
oxyrhyncha, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 51.—As. Min.; Persia.
parviflora, Dougl. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* ii. 50 = congesta.
patellaria, Wood, *Class-Book* (1861), 405 = Woodsiana.
persica, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iii. 58.—Persia.
petrophila, Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 98 = *Valeriana petrophila*.
plagiocyathus, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 69 = eriocarpa.
plagiostephana, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 52.—Reg. Cauc.; Persia.
platyloba, Dufur. *Hist. Valér.* 59. t. 3. f. 1.—Reg. Mediterr.
praecox, Willk. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 104 = carinata.
pteroloba, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 743.—Iberia.
pterophila, Steud. l. c. = *Valeriana petrophila*.
puberula, DC. *Prod.* iv. 627 = dentata.
puberula, Reichb. ex Nym. *Consp.* 339 = eriocarpa.
pubescens, Krok, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* v. (1864) n. i. 48 = uncinata.

VALERIANELLA :—

- pubescens*, Mèrat, Nouv. Fl. Par. (1812) 13 = dentata.
pulchella, Fisch. ex Krok, in Vet. Akad. Handl. Stockh. v. (1864) n. i. 75 = membranacea.
pumila, DC. Fl. Fr. Suppl. 494 = membranacea.
punctata, Hort. Patav. ex Heynh. Nom. i. 836, nomen (Quid ?).—Hab. ?
pusilla, Miègev. in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 27 = olitoria.
quadrangularis, Steud. Nom. ed. II. i. 626 = carinata.
radiata, Dufur. Hist. Valér. 57.—Am. bor.
remota, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 75 = sclerocarpa.
rhombicarpa, Aiken, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 51 = olitoria.
rimosa, Bast. in Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 20.—Hispan.
rotata, Roem. & Schult. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 654 (Quid ?).—Hab. ?
rugulosa, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 43 = eriocarpa.
samolifolia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 83.—Am. bor. occ.
sclerocarpa, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 53.—Reg. Cauc. ; Persia.
Sheilii, Boiss. Fl. Orient. iii. 109 = membranacea.
sicula, Link, in Linnaea, ix. (1834) 579 = discoidea.
Soyeri, Buching. ex Boiss. Diagn. Ser. I. x. 74.—Graecia.
sphaerocarpa, DC. Prod. iv. 628 = membranacea.
stenocarpa, Krok, in Vet. Acad. Handl. Stockh. v. (1864) n. i. 64.—Texas.
stephanodon, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 741.—Alger.
Stocksii, Boiss. Fl. Orient. iii. 99.—Persia ; Beluchist.
striata, Link, in Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 43 = olitoria.
Szovitsiana, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 48.—Arab. ; Syria ; Persia.
trichocarpa, Steud. Nom. ed. II. ii. 743, sphalm. = turgida.
tridentata, Betcke, Animadv. Bot. Valer. 12 ; Reichb. Fl. Germ. Excurs. 198 = rimosa.
tridentata, Gasp. in Il Progresso, iv. (1833) 169 = membranacea.
trigonocarpa, DC. Prod. iv. 628 = turgida.
triparis, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 111.—Persia ; Afghan.
triquetra, Shutt. in Flora, xx. (1837) 211 = chenopodifolia.
truncata, Betcke, Animadv. Bot. Valer. 22 ; DC. Prod. iv. 627.—Europ. austr. ; Oriens.
truncata, Pett. ex Nym. Consp. 339 = eriocarpa.
tuberculata, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 59.—Syria ; Persia.
turgida, Betcke, Animadv. Bot. Valer. 14 ; DC. Prod. iv. 626.—Reg. Mediterr. ; Tauria.
turkestanica, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsh. 43.—Turkestan.
umbilicata, Wood, Class-Book (1861), 405 = Woodsiana.
uncinata, Dufur. Hist. Valér. 60.—Reg. Cauc. ; Persia.
vesicaria, Moench, Meth. 493.—Reg. Mediterr. ; Persia.
Woodsiana, Walp. Rep. ii. 527.—Am. bor.

VALERIANOIDES, Medic. Phil. Bot. i. 177 (1789) = *Stachytarpheta*, Vahl (Verben.).
indica, Medic. l. c. 178 = *S. indica*.
jamaicensis, Medic. l. c. = *S. indica*.

VALERIANOPSIS, C. A. Muell. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 345 (1885). **VALERIANACEAE**.
angustifolia, C. A. Muell. l. c. 346.—Bras.
chamaedryfolia, C. A. Muell. l. c. 349.—Bras.
Eichleriana, C. A. Muell. l. c. 348.—Bras.
foliosa, C. A. Muell. l. c. 347.—Bras.
organensis, C. A. Muell. l. c. 348.—Bras.
polystachya, C. A. Muell. l. c. 350.—Bras.
salicariaefolia, C. A. Muell. l. c. 347.—Bras.

VALIKAHA, Adans. Fam. ii. 84 (1763) = *Meme-cylon*, Linn. (Melastom.).

VALISNERIA, Scop. Introd. 68 (1777), sphalm. = *Vallisneria*, Mich. (Hydroch.).

VALKERA, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 447 (1812) = *Walkera*, Schreb. (Inc. Sed.).

VALLANTIA, A. Dietr. Syn. Pl. i. 420 (1839) = *Vallantia*, Tourn. (Rubiace.).

VALLARIS, Burm. f. Fl. Ind. 51 (1768). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 710.

- EMERICIA*, Roem. & Schult. Syst. iv. 33, 401 (1819).
PELTANTHERA, Roth, Nov. Pl. Sp. 132 (1821).
anceps, Wall. Cat. n. 1622 (al. ordin. ?).—Burma.
assamensis, Griff. Notul. iv. 77 = Heynii ?
clavata, G. Don, Gen. Syst. iv. 79.—Ins. Molucc.
controversa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 65 = *Lepistemon* Wallichii.
dichotoma, Wall. Cat. n. 1621; Griff. Notul. iv. 77 = Heynii.
divaricata, G. Don, Gen. Syst. iv. 79 = *Strophanthes* divaricata.
Heynii, Spreng. Syst. i. 635.—Ind. or. ; Burma.
indica, J. F. Gmel. Syst. 391 = *V. Pergulana*.
lancifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 651.—Malacca.
laxiflora, Blume, Bijdr. 1043 = *Pottisia cantonensis*.
Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 651.—Malacca.
ovalis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 427 = *V. Pergulana*.
Pergulana, Burm. f. Fl. Ind. 51.—Ind. or. ; Malaya.
Pergularia, Hook. Ic. Pl. t. 153, sphalm. = praec.
sinensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 79.—China.

VALLARIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 114 (1836) = *Euphorbia*, Linn.

- fimbriata*, Rafin. l. c. 115.—Hab. ?
Ipecacuana, Rafin. l. c. = *E. Ipecacuana*.
missurica, Rafin. l. c. (Quid ?).—Am. bor.
portulacoides, Rafin. l. c. = *E. portulacoides*.
uniflora, Rafin. l. c. = *E. uniflora*.

VALLEA, Mutis, ex Linn. f. Suppl. 42 (1781).

- TILIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 238.
Calomata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 439 = *Elaeocarpus* nitidus.
cernua, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 236.—N. Granat.
cordifolia, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 132.—Peruv.
glabra, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. ii. (1868) 48.—Peruv.
macrophylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 238.—N. Granat.
ovata, Turcz. l. c. 237.—N. Granat.
pubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 350.—N. Granat.
pyrifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 237.—Ecuador.
Schlimii, Turcz. l. c. xxxvi. (1863) i. 576.—N. Granat.
stipularis, Linn. f. Suppl. 266.—N. Granat.

VALLESIA, Ruiz & Pav. Prod. 28. t. 5 (1794) **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 696.
chiococcoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 233. t. 241 = *cymbaefolia*.
cymbaefolia, Ortega, Hort. Matr. Dec. 58.—Am. trop.
dichotoma, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 26. t. 151 = *cymbaefolia*.
glabra, Link, Enum. Hort. Berol. i. 207 = *cymbaefolia*.
hypoglauca, Ernst, in Journ. Bot. viii. (1870) 375.—Venezuela.
mexicana, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 393.—Mexic.
pubescens, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 195.—Ins. Galapag.
punctata, Spreng. Neue Entdeck. iii. 33.—Bras.

VALLISNERIA, Mich. ex Linn. Gen. ed. I. 300 (1737). **HYDROCHARIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 451 [bis].

- PHYSKIU*, Lour. Fl. Cochinch. 662 (1790).
aethiopica, Fenzl, in Flora, xviii. (1844) 311, nomen ; et in Sitzb. Akad. Wien, Math.-Nat. li. (1865) Abth. ii. 139.—Afr. trop.
alternifolia, Roxb. Hort. Beng. 71 ; Fl. Ind. iii. 750 = *Lagarosiphon* Roxburghii.
americana, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 220 = spiralis.
bulbosa, Poir. Encyc. viii. 321 = *Sagittaria sagittifolia*.
Jacquinii, Savi, Oss. (1816) 12 = spiralis.
Jacquiniana, Spreng. Syst. iii. 900 = praec.
Linnei, Bercht. & Presl, Rostl. i. Hydrochar. 7 = spiralis.
Micheliana, Spreng. Syst. iii. 900 = seq.
Michelii, Savi, Oss. (1816) 11 = spiralis.

VALLISNERIA :—

- nana*, R. Br. Prod. 345 = spiralis.
numidica, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 386.—Alger.
octandra, Roxb. Pl. Corom. ii. 34 = *Blyxa* Roxburghii.
Physcium, Fuss. ex Spreng. Syst. iii. 900.—Cochinch.
pusilla, Barbieri, ex Bertol. Fl. Ital. x. 299, 300 = spiralis.
spiralis, Linn. Sp. Pl. 1015.—Reg. temp. et calid.
spiraloides, Roxb. Hort. Beng. 71 ; Fl. Ind. iii. 750 = spiralis.
verticillata, Roxb. ll. cc. 71 ; 751 = *Hydrilla* verticillata.

VALLOTA, Herb. App. [Bot. Reg.] 29 (1821). **AMARYLLIDAE**, Benth. & Hook. f. iii. 729.
elata, M. Roem. Syn. Ens. 110 = purpurea.
eximia, Hort. ex Flor. Mag. iv. (1865) t. 225 = purpurea.
grandiflora, Carr. Rev. Hort. (1870) 50 = purpurea.
purpurea, Herb. App. [Bot. Reg.] 29.—Afr. austr.

VALLOTA, Steud. Nom. ed. II. ii. 744 (1841), sphalm. = *VALOTA*, Adans. = *Panicum*, Linn. (Gramin.).

VALORADIA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 23 ; xxv. (1842) 239 = *Ceratostigma*, Bunge (Plumbag.).
abyssinica, Hochst. ll. cc. 23 ; 239 = *C. abyssinicum*.
patula, Hochst. l. c. xxiv. (1842) 240.—Abyss.
plumbaginoides, Boiss. in DC. Prod. xii. 695 = *C. plumbaginoides*.

VALOTA, Adans. Fam. ii. 495 (1763) = *Panicum*, Linn. (Gramin.).

VALOTA, Dum. Anal. Fam. 58 (1829) = *Vallota*, Herb. (Amaryll.).

VALSONICA, Scop. Ann. iv. Hist. Nat. 97 (1770), sphalm. = *Watsonia*, Mill. (Irid.).

VALTETA, Rafin. Sylva Tellur. 53 (1838) = *Ioichroma*, Benth. (1845) (Solnac.).
fuchsoides, Rafin. l. c. = *I. fuchsoides*.
gesneroides, Rafin. l. c. = *I. gesneroides*.

VALVINTERLOBUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 459 (1867) = *Wahlenbergia*, Schrad. (Campan.).
filiformis, Dulac, l. c. = *W. hederacea*.

VANALPHIMIA, Lesch. ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1821) 419 = *Saurauja*, Willd. (Ternstr.).
Djinote, Lesch. ex DC. l. c. 424 = *S. crenulata*.
lanceolata, Lesch. ex DC. l. c. 421 = *S. lanceolata*.

VANALPIGHMIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 744 (1841), sphalm. = praec.

VANCOUVERIA, C. Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 351. **BERBERIDEAE**, Benth. & Hook. f. i. 44.
SCULERIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 51 (1836).
chrysantha, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. ii. (1885) 66.—Oregon.
hexandra, C. Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 351.—Am. bor. occ.

VANDA, Jones, in As. Res. iv. (1795) 302 ; R. Br. in Bot. Reg. t. 506 (1820). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 578.

- alpina*, Lindl. Fol. Orch. Vanda, 10.—Reg. Himal.
Batemannii, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 59 = *Staurospis* lissochiloides.
Bensoni, Batem. in Bot. Mag. t. 5611 ; Veitch & Reichb. f. in Gard. Chron. (1867) 180, cum f. —Burma.
bicaudata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 429 (= *Cottoniae* sp.).—Zeylan.
bicolor, Griff. Notul. iii. 354 ; Ic. Pl. Asiat. t. 330.—Reg. Himal.
Boxallii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) i. 366.—Ins. Philipp.
brunnea, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 138.—Burma.
Cathcarti, Lindl. Fol. Orch. Vanda, 8 ; Hook. f. Illustr. Himal. Pl. t. 23 = *Arachnantha* Cathcartii.
clitellaria, Reichb. f. in Flora, lv. (1872) 277.—Ins. Marian.

VANDA:

- coerulea, *Griff. ex Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t. 30.—Reg. Himal.
 coerulescens, *Griff. Notul.* iii. 352; *Id. Pl. Asiat.* t. 331.—Burma.
 coerulescens, [Lindl.] in *Journ. Hort. Soc.* vi. (1857) p. viii, lapsu = coerulea.
 concolor, *Blume, Rumphia*, iv. 49.—China.
 congesta, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) Misc. 61 = *Acampe congesta*.
 crassiloba, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 48, nomen.—Ins. Buru.
 cristata, *Lindl. in Wall. Cat. n.* 7328; *et Gen. et Sp. Orch.* 216.—Reg. Himal.
 cruenta, *Lodd. Cat. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I.* 388 (Quid?).—China.
 Cumingii, *W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 654 = lamellata.
 Denisoniana, *Benson & Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 528.—Burma.
 densiflora, *Lindl. in Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 21, sub t. 42.—Burma.
 falcata, *Beer, Prakt. Orch.* 317 = *Angraecum falcatum*.
 fasciata, *Gardn. ex Lindl. Fol. Orch. Acampe*, 2 = *Acampe Wightiana*.
 fimbriata, *Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 305 (= *Cleisostoma acaule*).—Zeylan.
 furva, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) Misc. 39, partim = concolor.
 furva, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 215.—Ins. Molucc.
 fuscoviridis, *Lindl. in Gard. Chron.* (1848) 351 = furva.
 gigantea, *Lindl. in Wall. Cat. n.* 7326 = *Staurospis gigantea*.
 Griffithii, *Lindl. in Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 22 = alpina.
 Guiberti, *Linden, ex Reichb. f. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 375 = *Cleisostoma Guiberti*.
 hastifera, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 30.—Hab.?
 helvola, *Blume, Rumphia*, iv. 49.—Java.
 Hindsii, *Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 237.—N. Guin.
 Hookeri, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1882) II 375, 558 = seq.
 Hookeriana, *Reichb. f. in Bonplandia*, iv. (1856) 324.—Malaya.
 insignis, *Blume, Rumphia*, iv. 49. t. 192.—Malaya.
 lamellata, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) Misc. 66.—Ins. Philipp.
 lilacina, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 325.—Siam.
 limbata, *Blume, Rumphia*, iv. 49.—Java.
 Lindlayana, *Griff. Notul.* iii. 353, err. typ. = seq.
 Lindleyana, *Griff. ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 22 = *Staurospis gigantea*.
 lissochiloides, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 216 = *Staurospis lissochiloides*.
 longifolia, *Lindl. in Wall. Cat. n.* 7322; *et in Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 21 = *Acampe longifolia*.
 Loweii, *Lindl. in Gard. Chron.* (1847) 239 = *Arachnanthe Loweii*.
 multiflora, *Lindl. Coll. Bot. t.* 38 = *Acampe longifolia*.
 paniculata, *R. Br. in Bot. Reg.* sub t. 506; *et Not. ad calcem tomi vi.* [3] = *Sarcanthus paniculatus*.
 Parishii, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 138.—Burma.
 parviflora, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) Misc. 45.—Ind. or.; Burma.
 pauciflora, *Breda, Orch. Kuhl. Hass.* [t. 13] (*Sarcocochili* sp.).—Java.
 peduncularis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 216 = *Cotonia macrostachya*.
 pulchella, *Wight, Ic. t.* 1671 = *Saccolabium calceolare*.
 pusilla, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1853) 493 = *Trichoglottis pusilla*.
 recurva, *Hook. Exot. Fl.* iii. t. 187 = *Sarcanthus rostratus*.
 rostrata, *Lodd. Bot. Cab. t.* 1008 = *Sarcanthus rostratus*.
 Roxburghii, *R. Br. in Bot. Reg.* t. 506.—Ind. or.; Burma.
 Sanderiana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) I. 588.—Ins. Philipp.
 scripta, *Spreng. Syst.* iii. 719 = *Grammatophyllum speciosum*.
 spathulata, *Spreng. l. c.*—Ind. or.
 Stangeana, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xvi. (1858) 351.—Assam.

VOL. II.

VANDA:

- Storiei*, *Storie, ex Reichb. f. in Gard. Chron.* (1880) II. 296 = *Renanthera Storiei*.
 striata, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 137 = cristata.
 suaveolens, *Blume, Rumphia*, iv. 49 = tricolor.
 suavis, *Lindl. in Gard. Chron.* (1848) 351.—Java.
 suavis, *F. Muell. Fragm.* vii. 135 = Hindsii.
 Sulingi, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 62 = *Renanthera Sulingi*.
 teres, *Lindl. in Wall. Cat. n.* 7324.—Ind. or.; Burma.
 teretifolia, *Lindl. Coll. Bot. t.* 6 = *Sarcanthus teretifolius*.
 tessellata, *Hook. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 372; *Lodd. ex Paxt. Mag. Bot.* vii. (1840) 265 = *Roxburghii*.
 tesselloides, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 864 = *Roxburghii*.
 testacea, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) II. 166 = parviflora.
 trichorhiza, *Hook. Exot. Fl. i. t.* 72 = *Luisia trichorhiza*.
 tricolor, *Hook. Bot. Mag. t.* 4432 = suavis.
 tricolor, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t. 59.—Java.
 undulata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 42 (*Stauropsidis* sp.).—Reg. Himal.
 unicolor, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 744 = lamellata, *Roxburghii*.
 Vidalii, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. Nov. App. 240 = lamellata.
 violacea, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) Misc. 12.—Ins. Philipp.
 Vipanii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 134.—Burma.
 Wightiana, *Lindl. ex Wight, Ic. t.* 1670 = *Acampe Wightiana*.
 Wightii, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 932.—Ind. or.

VANDALEA, *Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.* xvi. (1868) 331 = *Sisymbrium*, *Tourn. (Crucif.)*.
 rupestricola, *Fourr. l. c.* = *S. austriacum*.

VANDEA, *Griff. Notul.* iii. 352 (1851), sphalm. = Vanda, *R. Br. (Orchid.)*.

VANDELLIA, *Linn. Mant. i.* 12 (1767). *SCROPHULARINEAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 955.

- ANAGALLOIDES, *Krock. Fl. Siles.* ii. i. 398 (1790).
 DICEROS, *Blume, Bijdr.* 751 (1826).
 ELLOBUM, *Blume, l. c.* 746 (1826).
 HORNEMANNIA, *Link & Otto, Ic. Pl. Sel.* 9. t. 3 (1820?).
 ILYOGETON, *Endl. Gen.* 684 (1839).
 LINDERNIA, *All. Misc. Taur.* iii. (1775) 178. t. 5.
 MITRANTHUS, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 103.
 PYXIDARIA, *Rupp. Fl. Jen. ed. Hall.* 237 (1745).
 TITTMANNIA, *Reichb. Ic. Bot. Exot. i.* 27. t. 38 (1824).
 VRIESEA, *Hassk. in Flora*, xxv. (1842) II. Beibl. 27.
 alba, *Benth. Scroph. Ind.* 35 = crustacea.
 alsinoides, *Benth. in DC. Prod. x.* 415.—Austral.
 angustifolia, *Benth. Scroph. Ind.* 37.—As. trop.
 aridens, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xv. (1861) 226 = pedunculata.
 Brownii, *Benth. in DC. Prod. x.* 413 = crustacea.
 caespitosa, *Benth. l. c.* 415.—Java.
 Chamaedrys, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 549 = *Gratiola Chamaedrys*.
 clausa, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict.* iii. (1859) 60 = *Bonnaya clausa*.
 cordifolia, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 549 = pedunculata.
 corymbosa, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 221.—Madag.
 crustacea, *Benth. Scroph. Ind.* 35.—Cosmop. trop.
 cymulosa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 117.—Japon.
 diffusa, *Blanco, Fl. Filip. ed. I.* 505 = *Torenia parviflora*.
 diffusa, *Linn. Mant. i.* 89.—Am. trop.
 diffusa, *Willd. Sp. Pl.* iii. 343 = pedunculata.
 elata, *Benth. Scroph. Ind.* 36.—Burma.
 Ellobum, *Benth. in DC. Prod. x.* 417.—Java.
 erecta, *Benth. Scroph. Ind.* 36.—Europ.; Geront. trop. et subtrop.
 erecta, *Benth. l. c.*, partim = multiflora.
 glandulifera, *Benth. in DC. Prod. x.* 415.—Java.
 hirsuta, *Buch.-Ham. ex Benth. Scroph. Ind.* 36.—As. trop.
 hirta, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n.* 3942 = mollis.

VANDELLIA:

- Hookeri, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 280.—Reg. Himal.
 japonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 118.—Japon.
 latifolia, *Benth. in DC. Prod. x.* 415.—Java.
 laxa, *Benth. Scroph. Ind.* 36 = scabra.
 limosa, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 394.—China.
 lobelioides, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict.* iii. (1859) 61 = *Ilysanthes lobelioides*.
 lobelioides, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 120.—Afr. trop.
 Malurea, *Raesch. Nom. ed. III.* 180 = *Stemodia pusilla*.
 Matourea, *Steud. Nom. ed. I.* 870, sphalm. = praec.
 minima, *Royle, ex Benth. Scroph. Ind.* 37 = sessiliflora.
 minuta, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 691.—Java.
 mollis, *Benth. Scroph. Ind.* 37.—Reg. Himal.; China.
 molluginoides, *Benth. l. c.* 35.—Burma.
 monnerioides, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n.* 3945 = scabra.
 montana, *Benth. in DC. Prod. x.* 415.—Java.
 multiflora, *Blanco, Fl. Filip. ed. I.* 505 = *Torenia asiatica*.
 multiflora, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 549.—Ind. or.
 multiflora, *Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. Nov. App. 148 = hirsuta.
 nervosa, *Benth. in DC. Prod. x.* 417.—Java.
 nummularifolia, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 86.—Reg. Himal.; China.
 oblonga, *Benth. Scroph. Ind.* 35 = *Torenia oblonga*.
 obovata, *Walp. Rep. iii.* 294 = *Mazus rugosus*.
 obtusa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 691.—Java.
 ovata, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 394 = hirsuta.
 pachypoda, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* ii. 457.—Japon.
 palustris, *Benth. in DC. Prod. x.* 417, sphalm. = *pratensis*.
 pedunculata, *Benth. Scroph. Ind.* 37.—As. trop.
 plantaginea, *F. Muell. in Trans. Vict. Inst. iii.* (1859) 62 = *Hemiarthra plantaginea*.
 pratensis, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 48 = *Beyrichia villosa*?
 prostrata, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 966, nomen.—Guian.
 pubescens, *Benth. in DC. Prod. x.* 415.—Austral.
 Pyxidaria, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xx. (1875) 449 = erecta.
 racemosa, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 262.—Bras.
 repens, *Thou. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 744 = diffusa.
 Roxburghii, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 549 = pedunculata.
 scabra, *Benth. Scroph. Ind.* 36.—As. et Afr. trop.
 scapigera, *Benth. in DC. Prod. x.* 415.—Austral.
 senegalensis, *Benth. l. c.* 416.—Afr. trop.
 sessiliflora, *Benth. Scroph. Ind.* 37.—Reg. Himal.
 Soriana, *Blanco, Fl. Filip. ed. I.* 506.—Ins. Philipp.
 sphaerocarpa, *Benth. in DC. Prod. x.* 417.—Java.
 stachydfolia, *Walp. Rep. iii.* 294.—China.
 stemodioides, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 563.—Ins. Banca.
 strigosa, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 549 = *Gratiola strigosa*.
 subcrenulata, *Miq. in Journ. Bot. Néerl.* i. (1861) 113.—China.
 subulata, *Benth. in DC. Prod. x.* 415.—Austral.
 sulcata, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 744 = scabra.
 urticifolia, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 301.—China.
 varians, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 549 = crustacea.

VANDESIA, *Salisb. in Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 332 = *Bomarea*, *Mirb. (Amaryll.)*.
 edulis, *Salisb. l. c.* = *B. Salsilla*.

VANESSA, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 57 (1836) = *Manettia*, *Mutis (Rubiace.)*.
 cordifolia, *Rafin. l. c.* = *M. cordifolia*.

VANGUERIA, *Juss. Gen.* 206 (1789). *RUBIACEAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 111.

- LAGYNIA, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 197 (1843).
 MEYNA, *Roxb. ex Link, in Jahrb.* i. III. (1820) 32.
 RYTIGYNIA, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 178 (1850).

VANGUERIA:—

- VAVANGA, Rohr, in Skrivt. Nat. Selsk. ii. 1. (1792) 207, 208. t. 7.
 abyssinica, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 353.—Abyss.
atroviridis, Wall. Cat. n. 8412 = *Plectronia glabra*.
Barnimiana, Schweinf. Pl. Nilot. 30. t. 11 =
abyssinica.
canthioides, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 408.—Afr.
 trop.
Commersonii, Jacq. Hort. Schoenb. i. 20 = *madagas-*
cariensis.
concolor, Hiern, in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* iii. 150.—
 Afr. trop.
crassa, Schweinf. ex Hiern, l. c. 145 (= *Canthium*
crassum).—Afr. trop.
cymosa, Gaertn. f. Fruct. iii. 75. t. 193 = *madagas-*
cariensis.
dicocca, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 251 = *Plectronia*
didyma.
edulis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 313 = *spinosa*.
edulis, Vahl, Symb. Bot. iii. 36 = *madagascariensis*.
emirnesis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 168.
 —Madag.
euonymoides, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, *Fl. Trop.*
Afr. iii. 150.—Afr. trop.
infausta, Burch. Trav. ii. 258.—Afr. trop. et austr.
lasiantha, Sond. in Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 14.—
 Afr. austr.
latifolia, Sond. l. c. 15.—Afr. austr.
leiophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 250.—Java?
leucophloea, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, *Fl. Trop.*
Afr. iii. 153 = *Fadogia leucophloea*.
lucidula, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 544 = *Plectronia*
didyma.
macrocalyx, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 59.—Afr.
 austr.
madagascariensis, J. F. Gmel. *Syst.* 367.—Afr. trop.
membranacea, Hiern, in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* iii. 151.
 —Afr. trop.
Miqueliana, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1877)
 ii. 153, in obs. = *spinosa*.
mollis, Wall. Cat. n. 8411 = *spinosa*.
oligantha, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 251.—Ins. Sunda.
palembanica, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 544 = *Diplo-*
spora singularis.
parvifolia, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 58.—Afr.
 austr.
pauciflora, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, *Fl. Trop.*
Afr. iii. 151.—Afr. trop.
pubescens, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872)
 ii. 314 = *spinosa*.
senegalensis, Benth. & Hook. f. ex Hiern, in Oliver,
Fl. Trop. Afr. iii. 149.—Afr. trop.
spinosa, Roxb. Hort. Beng. 15; *Fl. Ind.* i. 536.—As.
 trop.
spirostylis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 250 = *Plectronia*
didyma.
stellata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 167 = *spinosa*.
tetraphylla, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, *Fl. Trop.*
Afr. iii. 152.—Afr. trop.
tomentosa, Hochst. in *Flora*, xxv. (1842) 238 =
infausta.
umbellulata, Hiern, in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* iii. 150.
 —Afr. trop.
velutina, Hiern, l. c. 151.—Afr. trop.
velutina, Hook. Bot. Mag. t. 3014 = *infausta*.
venosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 353 =
madagascariensis.
venosa, Sond. in Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 14.—Afr.
 austr.
verrucosa, Sieber, ex DC. Prod. iv. 455 (Quid?).—Ins.
 Maurit.
Zeyheri, Sond. in Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 15 =
Fadogia Zeyheri.

VANGUIERIA, Pers. Syn. i. 205 (1805) = *praeac*.

VANHALLIA, Schult. f. Syst. vii. p. xviii. 166 (1829) =
Bragantia, Lour. (Aristol.).
tomentosa, Schult. f. l. c. 166 = *B. tomentosa*.

VAN-HOUTTEA, Lem. in Bull. Soc. Hort. Orléans, i.
 (1845) 346 = *Houttea*, Decne. (Gesner.).

VANIERIA, Lour. Fl. Cochinch. 564 (1790). Genus
 dubium *URTICACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f.
 Gen. iii. 351.
alternifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 381 = *cochin-*
chinensis.

VANIERIA:—

chinensis, Lour. Fl. Cochinch. 564 (= *Procris canto-*
niensis).—China.
cochinchinensis, Lour. l. c. 565 (= *Procris cochinch-*
niensis).—China.

VANIERIA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 176
 = *Trisema*, Hook. f. (Dillen.).
tomentosa, Montr. l. c. = *T. coriacea*?

VANILLA, Plum. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI.
 (1752); Juss. Gen. 66 (1789); Sw. in Nov. Act. Soc.
 Sc. Upsal. vi. (1799) 66. t. 5; et in Schrad. Journ.
 (1799) II. 208. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f.
 iii. 590.

MYROBOMA, Salisb. Parad. Lond. t. 82 (1807).
 VANILLOPHORUM, Neck. Elem. iii. 134 (1790).
acutifolia, Lodd. Cat. ex W. Baxt. in Loud. Hort.
 Brit. Suppl. iii. 655, nomen (Quid?).—Venezuela.
africana, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 137.
 —Afr. trop.
albida, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 100; et Bijdr. 422.
 —Malaya.

anaromatica, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 638 = *aro-*
matica.
angustifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 121.—Java.
aphylla, Blume, Bijdr. 422.—Java.
aphylla, Wight, Ic. t. 931 = *Wightii*.
aromatica, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799)
 66; et in Schrad. Journ. (1799) II. 208.—Am.
 trop.

aromatica, Willd. Sp. Pl. iv. 121, partim = *plani-*
folia.
axillaris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Mexic.
barbellata, Reichb. f. in *Flora*, xlviii. (1865) 274 =
claviculata.
bicolor, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 37.—Guian.
calopogon, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 40.—Ins.
 Philipp.

Chamissonis, Klotzsch, in Bot. Zeit. iv. (1846) 564.—
 Bras.?
claviculata, Lindl. in Mem. Am. Acad. N. S. viii.
 (1861) 219, nomen = *Wrightii*.
claviculata, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi.
 (1799) 66; et in Schrad. Journ. (1799) II. 209.—
 Ind. occ.

Epidendrum, Mirb. Hist. Pl. ed. II. ix. 249 = *aro-*
matica.
Fasciola, Spreng. Pugill. ii. 83 = *Taeniophyllum*
Fasciola.

grandiflora, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 435 = *V. Pompona*.
grandifolia, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 138.
 —Afr. trop.
gratiosa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 267 = *Wrightii*.
Griffithii, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 88.—
 Ind. or.

guianensis, Splitg. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841)
 279.—Guian.
hamata, Klotzsch, in Bot. Zeit. iv. (1846) 563.—Peruv.
Humboldtii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1885) i. 726;
 et in *Flora*, lxviii. (1885) 378.—Afr. trop.

inodora, Schiede, in *Linnaea*, iv. (1829) 574 = *aro-*
matica.
lutea, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 267 = *pal-*
marum.

lutescens, Moq. ex Dupuis, in Rev. Hort. Sér. IV. v.
 (1856) 121. f. 24 = *V. Pompona*.
majajensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 593 = *plani-*
folia.

Methonica, Reichb. f. & Warsz. in *Bonplandia*, ii.
 (1854) 97.—N. Granat.
mexicana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *aromatica*,
planifolia.

Moonii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 312.—Zeylan.
odorata, Presl, Rel. Haenk. 101.—Ecuador.
ovalis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 448 = *aromatica*.
palembanica, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl.
 Ind. xxix. (1867) 243.—Sumatra.

palmarum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 436.—Bras.
Parishii, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 39.—Burma.
parvifolia, Rodrig. Orch. Nov. ii. 271.—Bras.
Paviana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) II. 230.—
 Mexic.

phaeantha, Reichb. f. in *Flora*, xlviii. (1865) 274.—
 Ind. occ.
Phalaenopsis, Reichb. f. ex Van Houtte, *Fl. des Serres*,
 xvii. (1867-68) 97. t. 1769-1770.—Ins. Seychelles.
planifolia, Andr. Bot. Rep. t. 538.—Ind. occ.

VANILLA:—

planifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 638 = *phae-*
antha.
Poitaei, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 65.—Ius. S.
 Doming.
Pompona, Schiede, in *Linnaea*, iv. (1829) 573.—
 Mexic.
pterosperma, Lindl. ex Wall. Cat. n. 7402 = *Galeola*
Hydra.

Roscheri, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 65.—Afr.
 trop.
rubiginosa, Griff. Notul. iii. 246 = *Galeola Hydra*?
Ruiziana, Klotzsch, in Bot. Zeit. iv. (1846) 563.—
 Peruv.

sativa, Schiede, in *Linnaea*, iv. (1829) 573 = *plani-*
folia.

speciosa, Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed.
 III. Nov. App. 248, nomen (Quid?).—Ins. Philipp.
surinamensis, Reichb. f. in Nederl. Kruidk. Arch. iv.
 (1859) 321 = *guianensis*.

sylvestris, Schiede, in *Linnaea*, iv. (1829) 573 = *plani-*
folia.

viridiflora, Blume, Bijdr. 422 = *planifolia*.
Walkeriae, Wight, Ic. t. 932.—Ind. or.
Wightii, Lindl. ex Wight, l. c. sub t. 931.—Ind. or.
Wrightii, Reichb. f. in *Flora*, xlviii. (1865) 273.—Ind.
 occ.

VANILLOPHORUM, Neck. Elem. iii. 134 (1790) =
praeac.

VANILLOSMA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 39 (1841);
 xiv. 424 (1848) = *Piptocarpha*, R. Br. (Compos.).
acuminatum, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II.
 128 = *P. leprosa*.

albidum, Mart. ex Baker, l. c. = *P. leprosa*.
argyrophyllum, Mart. ex Baker, l. c. 121 = *P. lucida*.
bicolor, Mart. ex Baker, l. c. 131 = *P. Lundiana*.
candicans, Mart. ex Baker, l. c. 128 = *P. leprosa*.
cinereum, Mart. ex Baker, l. c. 23 = *Vernonia discolor*.
firmum, Mart. ex Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863)
 424 = *P. rotundifolia*.

multiflorum, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II.
 21, 22 = *Vernonia oppositifolia*.
obtusum, Mart. ex Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi.
 (1863) 415 = *P. pyrifolia*.

pyrifolium, Mart. ex Sch. Bip. l. c. = *P. pyrifolia*.
rufulum, Mart. ex Sch. Bip. l. c. 417 = *P. axillaris*.

VANILLOSMOPSIS, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-
 xix. (1861) 166; xx-xxi. (1863) 397. *COMPO-*
SITAE, Benth. & Hook. f. ii. 226.

ALBERTINIA, DC. Prod. v. (1836) 82, partim.
albertinoides, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861)
 168.—Bras.

arborescens, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 16.—Bras.
bicolor, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 168 =
Eremanthus bicolor.

brasiliensis, Sch. Bip. l. c. xx-xxi. (1863) 401.—
 Bras.

Candolleana, Sch. Bip. l. c. xviii-xix. (1861) 168 =
erythropappa.

capitata, Sch. Bip. l. c. 167, partim.—Bras.
capitata, Sch. Bip. l. c., partim = *discolor*.
capitata, Sch. Bip. l. c. xx-xxi. (1863) 399, partim =
arborescens.

discolor, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 226; Baker, in
Mart. Fl. Bras. vi. II. 17.—Bras.

erythropappa, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861)
 167.—Bras.

glomerata, Sch. Bip. l. c. = *erythropappa*.
Pohlil, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 18.—Bras.

polycephala, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861)
 168.—Bras.

saligna, Sch. Bip. l. c. = *polycephala*.
syncephala, Sch. Bip. l. c. = *Lychnophora reticulata*.

VANTANEA, Aubl. Pl. Gui. i. 572. t. 229 (1775).
HUMIRIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 246.

HELLERIA, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xii.
 (1824) 38. t. 7.
 LEMNISCIA, Schreb. Gen. 358 (1789).
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 572. t. 229.—Guian.
guianensis, Poir. Encyc. viii. 334 = *parviflora*.
minor, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 99.—
 Guian.

obovata, Benth. l. c.—Bras.

ovalifolia, Benth. l. c.—Bras.

VANTANEA :—

paniculata, Urban, in Mart. Fl. Bras. xii. II. 450.—Bras.
parviflora, Lam. Journ. Hist. Nat. Par. i. (1792) 145.—Guian.

VARASIA, Phil. Fl. Atac. 35. t. 5 (1860) = **Gentiana**, Linn.

podocarpa, Phil. l. c. 36 = *G. podocarpa*.
sessilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1861) I. 534; et in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 179.—Chili.

VARECA, Gaertn. Fruct. i. 290. t. 60 (1788) = **Casearia**, Jacq. (Samyd.).
zeylanica, Gaertn. l. c. = *C. esculenta*.

VARECA, Roxb. Hort. Beng. 18 (1814); Fl. Ind. i. 647 (1832) = **Alsodeia**, Thou. (Violar.).
heteroclita, Roxb. II. cc. 18; 648 = *A. Roxburghii*.
lanceolata, Roxb. II. cc. 86; 648 = *A. lanceolata*.
moluccana, Roxb. II. cc. 18; 647.—Ins. Molucc.

VARENNEA, DC. Prod. ii. 522 (1825) = **Eysenhardtia**, H. B. & K. (Legumin.).
polystachya, DC. l. c. = *E. amorphoides*.

VARGASIA, Bert. ex Spreng. Syst. ii. 283 (1825) = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).
glabra, Bert. l. c. 388.—Ins. S. Doming.
tomentosa, Bert. l. c.—Ins. S. Doming.

VARGASIA, DC. Prod. v. 676 (1836) = **Galinsoga**, Ruiz & Pav. (Compos.).
caracasana, DC. l. c.—Venezuela.

VARGASIA, Ersnt, Vargas Consid. como Bot. 23 (1877). **TERNSTROEMACEAE**.
tremadena, Ernst, l. c.—Venezuela.
viridiflora, Ernst, l. c.—Venezuela.

VARILLA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 106. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 363.
mexicana, A. Gray, l. c.—Mexic.
texana, A. Gray, Pl. Wright. i. 123.—Texas.

VARINGA, Rafin. Sylva Tellur. 58 (1838) = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).
repens, Rafin. l. c. = *F. pumila*.

VARRONIA, P. Br. Hist. Jamaica. 172 (1756); Linn. Syst. ed. X. 916 (1759) = **Cordia**, Linn. (Borag.).
abyssinica, DC. Prod. ix. 469 = *C. Myxa*.
alba, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14; Select. Am. 41 = *C. alba*.
alnifolia, Hornem. Hort. Hafn. i. 227 = *C. alnifolia*.
angustifolia, West, Bidr. Ste-Croix, 2 = *C. angustifolia*.
Bonplandii, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 275 = *C. Bonplandii*.
bullata, Linn. Syst. ed. X. 916 = *C. globosa*.
calyptrata, DC. Prod. ix. 469 = *C. alba*.
canescens, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 203.—Ins. Galapag.
chamaedryoides, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 801, in obs. = *C. chamaedryoides*.
corymbosa, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 275 = *C. ulmifolia*.
crenata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 23 = *C. lantanoides*.
crenulata, Pav. ex DC. Prod. ix. 492 = *C. crenulata*.
curassavica, Bert. ex DC. l. c. 491; Mayc. Fl. Barb. 84 = *C. cylindristachya*.
curassavica, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14 = *C. curassavica*.
curassavica, Lam. Illustr. i. 419 = *C. angustifolia*.
curassavica, Vell. Fl. Flum. 79; ii. t. 85 = *C. salicina*.
cylindristachya, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 23 = *C. cylindristachya*.
dasycephala, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 274 = *C. dasycephala*.
dasycephala, Spreng. ex DC. Prod. ix. 496 = *C. globosa*.
dichotoma, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 23 = *C. bifurcata*.
divaricata, [Willd.] Roem. & Schult. Syst. iv. 802 = *C. divaricata*, dentata.
ferruginea, Lam. Illustr. i. 418 = *C. ferruginea*.
flava, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 201.—Ins. Galapag.
floribunda, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 267 = *C. floribunda*.
geniculata, Pers. Syn. i. 167 = *C. mirabiloides*.

VARRONIA :—

globosa, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 276 = *Cordia nlmifolia*.
globosa, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14; Select. Am. 41 = *C. globosa*.
globosa, Vell. Fl. Flum. 79; ii. t. 84 (Quid?).—Bras.
globulifera, Willd. ex Cham. in Linnaea, iv. (1829) 491 = *C. Bonplandii*.
grandiflora, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 273 = *C. grandiflora*.
guazumaefolia, Desv. l. c. 276 (*guazumaefolia*) = *C. urticifolia*.
guianensis, Desv. l. c. 270 = *C. guianensis*.
Humboldtii, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 801, in obs. = *C. floribunda*.
humilis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14; Select. Am. 41 = *C. ulmifolia*.
integerrima, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 424 = *C. Loureiri*.
integrifolia, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 271 = *C. integrifolia*.
lanceolata, Desv. l. c. 277 = *C. lanceolata*.
lanceolata, Willd. ex Cham. in Linnaea, iv. (1829) 492 = *C. maritimensis*.
lantanoides, Willd. ex Cham. l. c. = *C. grandiflora*.
leucophlyctis, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 203 = *C. leucophlyctis*.
Lima, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 278 = *C. Lima*.
linearis, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 204 = *C. linearis*, Hook.
linearis, Pav. ex DC. Prod. ix. 493 = *C. linearis*, A. DC.
lineata, Linn. Syst. ed. X. 916 = *C. ulmifolia*.
macrocephala, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 273 = *C. macrocephala*.
macrocephala, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 78 = *C. Neowediana*.
macrostachya, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14; Select. Am. 41 = *C. macrostachya*.
macrostachya, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. t. 147 = *C. cylindristachya*.
martinicensis, Anbl. Pl. Gui. i. 232 = *C. Aubletii*.
martinicensis, Bert. ex DC. Prod. ix. 483 = *C. salvifolia*.
martinicensis, Desf. Tabl. ed. I. 71 = *C. ferruginea*.
martinicensis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14; Select. Am. 41 = *C. martinicensis*.
martinicensis, Lam. Illustr. i. 419 = *C. curassavica*.
martinicensis, Crantz, Inst. ii. 380, sphalm. = *martinicensis*, Jacq.
microcephala, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 801, in obs. = *C. microcephala*.
microphylla, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 275 = *C. microphylla*.
mirabiloides, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14; Select. Am. 41 = *C. mirabiloides*.
mollis, Desf. Tabl. ed. I. 220 = *Melochiae* species?
mollis, Vest. ex DC. Prod. ix. 491 = *C. cylindristachya*.
monosperma, Jacq. Hort. Schoenb. i. 18 = *C. ulmifolia*.
obliqua, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 24 = *C. peruviana*.
paniculata, Wikst. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1827) 59 = *C. ulmifolia*.
parviflora, Ortega, Hort. Matr. Dec. 86 = *C. bifurcata*.
pilulifera, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 801, in obs. = *C. globosa*.
polycephala, Lam. Illustr. i. 418 = *C. ulmifolia*.
pyrifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 802 = *C. ferruginea*.
revoluta, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 204 = *C. revoluta*.
rotundifolia, A. DC. in DC. Prod. ix. 469 = *C. rotundifolia*.
rugosa, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 801, in obs. = *C. canescens*.
salvifolia, Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) 79 = *C. cylindristachya*.
scaberrima, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 202.—Ins. Galapag.
scaberrima, Bert. ex Spreng. Syst. i. 654 = *C. Lima*.
Scouleri, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 204 = *C. Scouleri*.
sinensis, Lour. Fl. Cochinch. 138 = *C. Loureiri*.
sphaerocephala, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 801, in syn. = *C. dasycephala*.
spicata, Salz. ex DC. Prod. ix. 489 = *C. cylindristachya*.
tomentosa, Lam. Illustr. i. 419 = *C. tomentosa*.
ulmifolia, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. ii. 148, in obs. = *C. monosperma*.

VARTHEIMIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 333 (1873), sphalm. = seq.

VARTHEMIA, DC. Prod. v. 473 (1836) = **Iphiona**, Cass. (Compos.).
arabica, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 74 = *I. arabica*.
arabica, Thoms. in Speke, Journ. App. 638 = *Pulicaria Grantii*.
candicans, Boiss. Fl. Orient. iii. 212.—Egypt.
conyzoides, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 10.—Arab.
iphionoides, Boiss. & Blanche, l. c. 9 = *I. iphionoides*.
Kotschy, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 161, 307 = *Vicoa auriculata*.
montana, Boiss. Fl. Orient. iii. 212 = *conyzoides*.
persica, DC. Prod. v. 473 = *I. persica*.

VASARGIA, Steud. Nom. ed. II. 745 (1841), sphalm. = **VARGASIA**, DC. = **Galinsoga**, Ruiz & Pav. (Compos.).
caracasana, Steud. l. c. (= *Vargasia caracasana*).—Venezuela.

VASCOA, DC. Mém. Légum. 186 (1825); Prod. ii. 119 (1825) = **Rafnia**, Thunb. (Legumin.).
acuminata, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 148 = *R. perfoliata*.
amplexicaulis, DC. Mém. Légum. 187; Prod. ii. 119 = *R. amplexicaulis*.
perfoliata, DC. II. cc. = *R. perfoliata*.

VASCOA, DC. Prod. i. 337, in obs. (1824) = **Mundtia**, H. B. & K. (Polygal.).

VASCONCELLEA, A. St. Hil. Mém. Réséd. ii. 12 (1837) = **Carica**, Linn. (Passifl.).
aurantiaca, Regel, Gartenfl. xxv. (1876) 184.—N. Granat.
Boissieri, A. DC. in DC. Prod. xv. i. 415 = *C. Boissieri*.
candicans, A. DC. l. c. 417 = *C. candicans*.
cauliflora, A. DC. l. c. 415 = *C. cauliflora*.
cestriflora, A. DC. l. c. 418.—N. Granat.
chilensis, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 259.—Chili.
glandulosa, A. DC. in DC. Prod. xv. i. 417 = *C. glandulosa*.
Goudotiana, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvii. (1873) 192.—N. Granat.
heterophylla, A. DC. in DC. Prod. xv. i. 417 = *C. heterophylla*.
Hookeri, A. DC. l. c. 418.—Hab.?
lanceolata, A. DC. l. c. 416 = *C. lanceolata* (in Addend.).
Manihot, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvii. (1873) 191.—N. Granat.
microcarpa, A. DC. in DC. Prod. xv. i. 418 = *C. microcarpa*.
monoica, A. DC. l. c. = *C. monoica*.
parviflora, A. DC. l. c. 417.—Peruv.
peltata, A. DC. l. c. 416 = *C. peltata*.
pubescens, A. DC. l. c. 419.—Peruv.
quercifolia, A. St. Hil. Mém. Réséd. ii. 13 = *C. quercifolia* (in Addend.).

VASCONCELLIA, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 12 (Herb. Fl. Bras. 252) = **Arrabidaea**, DC. (Bignon.).
acutifolia, Mart. ex DC. Prod. ix. 185 = *A. acutifolia*.
desertorum, Mart. l. c. = *A. desertorum*.
fasciculata, Mart. l. c. = *A. fasciculata*.
florida, Mart. l. c. 184 = *A. florida*.
Sego, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 12 = *A. Agnus-castus*.
subincana, Mart. ex DC. Prod. ix. 184 = *Bignonia subincana*.
tuberculata, Mart. l. c. = *A. tuberculata*.

VASCONCELLOSLA, Caruel, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. viii. (1876) 22. **PASSIFLOREAE**.
hastata, Caruel, l. c.—Bras.

VASCONELLA, Regel, Gartenfl. xxv. (1876) 184 = **VASCONCELLEA**, A. St. Hil. = **Carica**, Linn. (Passifl.).

VASEYA, Thurb. in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (1863) 79 = **Muehlenbergia**, Schreb. (Gramin.).
comata, Thurb. l. c. = *M. comata*.

VASIVAEA, Baill. *Adansonia*, x. (1872) 193. *TILIA-CEAE*.
alchorneoides, Baill. l. c. 194.—Am. trop.

VASQUEZIA, Phil. Fl. Atac. 31. t. 5 (1860) = **Villanova**, Lag. (Compos.).
bitermata, Phil. l. c. 31.—Chili.

VATAIREA, Aubl. Pl. Gui. ii. 755. t. 302 (1775) = **Pterocarpus**, Linn. (Legumin.).
guianensis, Aubl. l. c.—Guian.

VATERIA, Linn. Gen. ed. I. 153 (1737). *DIPTEROCARPEAE*, Benth. & Hook. f. i. 193.

HEMIPHRACTUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1859) i. 262.

STEMONOPORUS, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 67. t. 2.

acuminata, Hayne, *Arzn. Gew.* xi. sub t. 5.—Ind. or.
acuminata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403 = *jucunda*.

affinis, Thw. l. c.—Zeylan.

canaliculata, Thw. l. c. 403.—Zeylan.

ceylanica, Wight, *Illustr.* i. 88.—Zeylan.

cordifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 404 = *Monoporandra cordifolia*.

disticha, Thw. l. c. = *Vatica disticha*.

elegans, Thw. l. c. = *Monoporandra elegans*.

flexuosa, Lour. *Fl. Cochinch.* 334.—China.

Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403.—Zeylan.

indica, Gaertn. f. Fruct. iii. 53. t. 189 = *acuminata*.

indica, Linn. *Sp. Pl.* 515.—Ind. or.

jucunda, Thw. ex Dyer, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 314.—Zeylan.

lanceae-folia, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 625, sphalm. = *nitida*.

lanceae-folia, Roxb. Fl. Ind. ii. 601 = *Vatica lanceae-folia*.

lanceolaria, Roxb. Hort. Beng. 42 = *Vatica lanceae-folia*.

lanceolata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403.—Zeylan.

lanceolata, Wight & Arn. Prod. 84; Wall. Cat. n. 4405 = *Vatica lanceae-folia*.

lanceifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 404 = *nitida*.

malabarica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 29 = *indica*.

Moonii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403.—Zeylan.

nervosa, Thw. ex Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 206.—Zeylan.

nitida, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403.—Zeylan.

oblongifolia, Thw. l. c.—Zeylan.

papuana, Dyer, ex Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. III. 123 = *Vatica papuana*.

pauciflora, Walp. Rep. v. 126 = *Vatica pauciflora*.

petiolaris, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403.—Zeylan.

Rassak, Walp. Rep. v. 126 = *Vatica Rassak*.

reticulata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403.—Zeylan.

rigida, Thw. l. c.—Zeylan.

Roxburghiana, Wight, ex Arn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 155 = *Vatica Roxburghiana*.

scabriuscula, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 404 = *Vatica scabriuscula*.

seychellarum, Dyer, in Baker, *Fl. Maurit.* 526.—Ins. Seychelles.

Wightii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 403 = *ceylanica*.

zeylanica, Walp. Rep. v. 126 = *ceylanica*.

VATICA, Linn. Mant. ii. 152 (1771). *DIPTEROCARPEAE*, Benth. & Hook. f. i. 192.

ISAUXIS, Reichb. Nom. 210 (1841).

PTERANTHERA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 30. 1852 (1856).

RETINODENDRON, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 55. t. 8 (1839).

SEIDLIA, Kostel. Allg. Med. Pharm. Flora, v. 1945 (1836).

SUNAPTEA, Griff. Notul. iv. 56 (1854).

SYNAPTEA, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 65.

acuminata, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 622 = *Vateria jucunda*.

affinis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 404.—Zeylan.

africana, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 15. —Afr. trop.

apteranthera, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 281 = *Shorea Mangachapoi*.

astrotricha, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 241.—Cambodia.

bancana, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 348.—Ins. Banca.

VATICA :—

bantamensis, Benth. & Hook. f. Gen. i. 192.—Ins. Bantam.

Canaca, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4405 B = *lanceae-folia*.

canaliculata, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 621 = *Vateria canaliculata*.

chinensis, Linn. Mant. ii. 242.—Ind. or.

cordifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 404 (sp. dub.).—Zeylan.

disticha, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 620.—Zeylan.

eximia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 486 = *Shorea eximia*.

faginea, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 301.—Burma.

Gardneri, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 622 = *Vateria Gardneri*.

grandiflora, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 301.—Burma; Malaya.

Helferi, Dyer, l. c. 302.—Burma.

laccifera, Wight & Arn. Prod. 84 = *Shorea Talura*.

lanceae-folia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 31.—Reg. Himal.; Burma.

lanceolata, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 621 = *Vateria lanceolata*.

laurifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 745, sphalm. = *Shorea laccifera*.

lepidota, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 73 = *Shorea lepidota*.

Maingayi, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 302.—Malacca.

Mangachapoi, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 401 = *Shorea Mangachapoi*.

melanoxylon, Benth. & Hook. f. Gen. i. 192.—Borneo.

Moonii, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 622 = *Vateria Moonii*.

nitida, A. DC. l. c. = *Vateria nitida*.

oblonga, A. DC. l. c. 621 = *Vateria oblongifolia*.

oblongifolia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 160.—Borneo.

obscura, Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 203.—Zeylan.

obtusa, Steud. Nom. ed. II. ii. 745 = *Shorea obtusa*.

ovalis, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 73 = *Shorea ovalis*.

pallida, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 302.—Ins. Penang.

papuana, Dyer, in Journ. Bot. xvi. (1878) 100.—N. Guin.

pauciflora, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 31. t. 7.—Sumatra.

petiolaris, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 621 = *Vateria petiolaris*.

Rassak, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 31.—Borneo.

reticulata, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 620 = *Vateria reticulata*.

rigida, A. DC. l. c. 621 = *Vateria rigida*.

robusta, Steud. Nom. ed. II. ii. 745 = *Shorea robusta*.

Roxburghiana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 31. t. 7 = *chinensis*.

scabriuscula, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 620.—Zeylan.

Scaphula, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 301.—Burma.

Scaphula, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 21 = *Shorea Mangachapoi*.

Schouteniana, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxii. (1871) 408 = *bancana*.

sinensis, J. F. Gmel. Syst. 748 = *chinensis*.

stipulosa, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 486 (*Shorea* sp.).—Sumatra.

sublacunosa, Miq. l. c. = *Shorea eximia*.

Thwaitesii, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 621 = *Vateria affinis*.

trigyna, Griff. Notul. iv. 514 = *Dipterocarpus Griffithii*.

Tumbagaia, Wight & Arn. Prod. 84 = *Shorea Tumbagaia*.

venulosa, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 32.—Borneo.

Wightii, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 620 = *Vateria ceylanica*.

Zollingeriana, A. DC. l. c. 618.—Malaya.

VATKEA, Hildeb. & O. Hoffm. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxii. (1880) 45, 78 = **Martynia**, Houst. (Pedalin.).

diandra, O. Hoffm. in Linnaea, xliii. (1880–82) 554 (in indice) = *M. diandra*.

VAUANTHES, Haw. Rev. Pl. Succ. 18 (1821) = **Grammanthes**, DC. (1828) (Crassul.).
chlorae-folia, Haw. l. c. 19 = *G. gentianoides*.

chlorae-folia, Steud. Nom. ed. II. 746, sphalm. = *praec.*

VAUPELLIA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 460 (1861) = **Pentarhaphia**, Lindl. (Gesner.).

calycina, Griseb. l. c. = *P. calycina*.

VAUQUELINIA, Correa, ex Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 140. t. 40 (1808). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 615.

corymbosa, Correa, ex Humb. & Bonpl. l. c.—Mexic.

corymbosa, Torr. Bot. Mex. Bound. 64 = *Torreyi*.

Karwinsky, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 236.—Mexic.

Torreyi, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 147.—Mexic.

VAUTHIERA, A. Rich. Ess. Fl. N. Zél. 106. t. 20 (1832) = **Cladium**, P. Br. (Cyperac.).

australis, R. Rich. l. c. 107. t. 20.—N. Zel.

VAVAEA, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 212. *MELIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 331.

amicorum, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 212.—Ins. Amicor.

Harveyi, *Seem. Fl. Vit.* 35.—Ins. Fiji.

vitiensis, Seem. l. c. = *amicorum*.

VAVANGA, Rohr, in Skrivt. Nat. Selsk. ii. i. (1792) 207, 208. t. 7 = **Vangueria**, Juss. (Rubiace.).

chinensis, Rohr, l. c. 207 = *Vangueria madagascariensis*.

edulis, Vahl, l. c. 208 = *Vangueria madagascariensis*.

VAZQUEZIA, Pritz. Ic. Ind. ii. 282 (1865), err. typ. = **VASQUEZIA**, Phil. = **Villanova**, Lag. (Compos.).

VEATCHIA, A. Gray, in Bull. Calif. Acad. i. n. i. (1884) 4; et in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 290. *ANACARDIACEAE*.

cedrosensis, A. Gray, *ll. cc.* 4; 291.—Calif.

VEATCHIA, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 11 = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).

crystallina, Kellogg, l. c. = *B. lactea*.

VEDELA, Adans. Fam. ii. 502 (1763) (Quid?).

VEGELIA, Neck. Elem. iii. 385 (1790) = **WEIGELA**, Thunb. = **Diervilla**, Tourn. (Caprifol.).

VEITCHIA, Lindl. in Gard. Chron. (1861) 265 = **Picea**, Link (Conif.).

japonica, Lindl. l. c. = *P. Alcockiana*.

VEITCHIA, H. Wendl. in Seem. Fl. Vit. 270. t. 81 (1868). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 887.

Canterburyana, F. Muell. Fragm. vii. 101 = *Hedyscepe Canterburyana*.

Joannis, *H. Wendl. in Seem. Fl. Vit.* 271.—Ins. Fiji.

spiralis, H. Wendl. l. c. 270.—N. Hebrid.

Storckii, *H. Wendl. l. c.*—Ins. Fiji.

subglobosa, H. Wendl. l. c. 272.—Ins. Fiji.

VELAEA, DC. Mém. Ombell. 61 (1829); Prod. iv. 230 (1830) = **Arracacia**, Bancr. (Umbell.).

decumbens, Benth. Pl. Hartw. 38 = *A. decumbens*.

toluccensis, DC. Prod. iv. 231 = *A. tolucensis*.

VELAGA, Adans. Fam. ii. 398 (1763); Gaertn. Fruct. ii. 245. t. 133 (1791) = **Pterospermum**, Schreb. (Stercul.).

globosa, Gaertn. l. c. 246 = *Lagerstroemia indica*.

locarpa, Gaertn. l. c. 245 = *P. Heyneanum*.

VELARUM, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1103, 1165 (1828) = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).

officinale, Reichb. l. c. 1165 = *S. officinale*.

polyceratum, Reichb. l. c. = *S. polyceratum*.

supinum, Reichb. l. c. = *S. supinum*.

VELASQUEZIA, Pritz. Ic. Ind. 1147 (1855), sphalm. = **VELLASQUEZIA**, Bertol. = **Triplaris**, Linn. (Polygon.).

VELEZIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 332 (1753). *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 144.
arabica, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 746, nomen.—Arab.
clavata, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 284 = quadridentata.
fasciculata, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 92.—Syria.
hispidia, Boiss. et Bal. l. c. II. v. 57.—Phrygia.
latifolia, Eschsch. in Mém. Acad. Pétersb. x. (1823) 286 = *Frankenia grandifolia*.
quadridentata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 283; Fl. Graec. iv. 81. t. 391.—Graec.; As. Min.
rigida, Linn. Sp. Pl. 332.—Reg. Mediterr.; Oriens.

VELLA, Linn. Coroll. Gen. 12 (1737). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 85.
annua, Linn. Sp. Pl. 641 = *Carrichtera Vellae*.
aspera, Pers. Syn. ii. 185 = *Boleum asperum*.
glabrescens, Coss. Illustr. Fl. Atlant. i. 71. t. 48.—Alger.

hispidia, Vahl, ex DC. Syst. ii. 641 = *Boleum asperum*.
integrifolia, Salisb. Prod. 265 = *V. pseudocytisus*.
pseudocytisus, Linn. Sp. Pl. 641.—Hispan.
spinosa, Boiss. Elench. 14.—Hispan.
tatarica, Pall. Reise, iii. 521 = *Euclidium tataricum*.
tenuissima, Pall. l. c. 740 = *Euclidium tataricum*.

VELLASQUEZIA, Bertol. Fl. Guatim. 39. t. 11 (1840) = *Triplaris*, Loefl. (Polygon.).
melanodendron, Bertol. l. c. 40. t. 11.—Guatemala.

VELLEA, D. Dietr. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 746 (1841), sphalm. = *VELAEA*, DC. = *Arracacia*, Bancr. (Umbell.).

VELLEIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 217. *GOODENOVIÆAE*, Benth. & Hook. f. ii. [II.] 538.
EUTHALES, R. Br. Prod. 579 (1810).
MENOCERAS, Lindl. Veg. Kingd. 695 (1847).
arguta, R. Br. Prod. 580 = *paradoxa*.
connata, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 18.—Austral.
cynopotamica, F. Muell. Fragm. vi. 7.—Austral.
Daviesii, F. Muell. l. c. x. 10.—Austral.
dichotoma, Auct. ex DC. Prod. vii. 518 = *lyrata*.
discophora, F. Muell. Fragm. x. 10.—Austral.
lanceolata, Lindl. Swan River App. 26 = *Goodenia filiformis*.
lyrata, R. Br. Prod. 580.—Austral.
macrocalyx, De Vriese, in Mitch. Journ. Trop. Austral. 258.—Austral.
macrophylla, Benth. Fl. Austral. iv. 47.—Austral.
macropectra, F. Muell. Fragm. xii. 22.—Austral.
montana, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 265.—Austral.
panduriformis, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. iv. 46.—Austral.
paradoxa, R. Br. Prod. 580.—Austral.
perfoliata, R. Br. l. c. 581.—Austral.
pubescens, R. Br. l. c.—Austral.
spatulata, R. Br. l. c. 580.—Austral.
spathulata, A. Juss. in Ann. Mus. Par. xviii. (1811) 17. t. 1 = *lyrata*.
trinervis, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 54. t. 77.—Anstral.

VELLEJA, Schrad. Neues Journ. iii. i. (1809) 118 = *præc.*

VELLERUCA, Pomel, Mat. Fl. Atl. 12 (1860) = *Eruca*, Tourn. (Crucif.).
longistyla, Pomel, l. c. = *E. longistyla*.
setulosa, Pomel, l. c. = *E. setulosa*.
vesicaria, Pomel, l. c. = *E. vesicaria*.

VELLEYA, Walp. Ann. i. 471 (1848–49) = *Velleia*, Sm. (Gooden.).

VELLOSIA, Spreng. Syst. iii. 338 (1826) = *seq.*

VELLOZIA, Vand. Fl. Lusit. 32. t. 2 (1788). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 739.
SCHNIZLEINIA, Steud. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 31.
TALBOTIA, Balf. in Trans. Bot. Soc. Edinb. ix. (1868) 190.
XEROPHYTA, Juss. Gen. 50 (1789).
abietina, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 14. t. 6.—Bras.
albiflora, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 121. t. 96.—Bras.
aloaeifolia, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 15. t. 7.—Bras.
alutacea, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 130 = *variabilis*?

VELLOZIA :—

asperula, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 15. t. 8.—Bras.
barbaceniaefolia, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 79.—Bras.
brevifolia, Seub. l. c. 84. t. 10. f. 2.—Bras.
breviscapa, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293.—Bras.
candida, Mikan, Delect. Fl. et Faun. Bras. fasc. ii. [t. 7].—Bras.
capillaris, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 264.—Afr. trop.
caruncularis, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 78. t. 8. f. 1.—Bras.
cinerascens, Mart. ex Seub. l. c. 74.—Bras.
coerulescens, Hort. Belg. ex Gumbel. in Gard. Chron. (1874) 11. 623, 657 = *Barbacenia purpurea*.
compacta, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293.—Bras.
crassicaulis, Mart. l. c. 292 = *albiflora*.
cryptantha, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 80.—Bras.
dasyptus, Seub. l. c. 81.—Bras.
elegans, Talbot, ex Balf. in Trans. Bot. Soc. Edinb. ix. (1868) 79, nomen; Oliver, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 5803.—Afr. austr.
epidendroides, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 292.—Bras.
flavicans, Mart. l. c. 293 = *squamata*.
glabra, Mikan, ex Spreng. Syst. iii. 338 = *phalocarpa*.
glauca, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 125. t. 100.—Bras.
glochidea, Pohl, l. c. 129.—Bras.
gracilis, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 81.—Bras.
graminea, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 118. t. 93.—Bras.
hemisphaerica, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 80.—Bras.
incurvata, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293.—Bras.
intermedia, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 78.—Bras.
lanata, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 130.—Bras.
leptophylla, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 84.—Bras.
macrantha, Lem. Illustr. Hort. xii. (1865) Misc. 44.—Bras.
maritima, Vell. Fl. Flum. 219; v. t. 79.—Bras.
minima, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 119. t. 94.—Bras.
ornata, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293.—Bras.
papillosa, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 128 = *asperula*.
phalocarpa, Pohl, l. c. 123. t. 98.—Bras.
plicata, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 16. t. 9.—Bras.
punctulata, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 82.—Bras.
pusilla, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 122. t. 97.—Bras.
resinosa, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293.—Bras.
scabra, Spreng. Syst. iii. 338.—Bras.
Sellovii, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 75.—Bras.
Spekei, Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 156.—Afr. trop.
squalida, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 292.—Bras.
squamata, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 746 = *Veratrum Sabadilla*.
squarrosa, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 264.—Afr. trop.
stenophylla, Welw. ex Baker, l. c. 265.—Afr. trop.
sulphurea, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 120. t. 95.—Bras.
Talboti, Balf. in Trans. Bot. Soc. Edinb. ix. (1868) 190 = *elegans*.
taxifolia, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 75.—Bras.
tenella, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293 = *graminea*.
tertia, Spreng. Neue Entdeck. ii. 108 = *candida*.
tomentosa, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 130.—Bras.
tragacantha, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 75.—Bras.
triquetra, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 129.—Bras.
tubiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 155 = *Barbacenia tubiflora* (in Addend.).
variabilis, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293.—Bras.
velutina, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 265.—Afr. trop.
verruculosa, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 293.—Bras.

VELLOZOA, Lem. Jard. Fleur. iv. (1853), in obs. ad t. 390 = *præc.*

VELPEAULIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 109 (1844–52) = *Doilia*, Lindl. (Convolv.).
alibrexoides, Gaudich. l. c.—Hab. ?

VELTHAEIMIA, Thunb. Fl. Cap. ii. 278 (1818), sphalm. = *seq.*

VELTHEIMIA, Gled. in Mém. Acad. Berl. 1769 (1771) 66. *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 811.
abyssinica, [DC. in] Red. Lil. iv. t. 186 = *Kniphofia abyssinica*.
bracteata, Harv. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 411.—Afr. austr.
capensis, [DC. in] Red. Lil. iv. t. 193 = *viridifolia*.
glauca, Jacq. Hort. Schoenb. i. 40. t. 77.—Afr. austr.
intermedia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 409.—Afr. austr.
media, Donn, Hort. Cantab. ed. IV. 74 = *Kniphofia sarmentosa*.
pumila, Willd. Sp. Pl. ii. 182 = *Kniphofia pumila*.
repens, [Ker-Gawl.] Recens. Pl. 18 = *Kniphofia sarmentosa*.
sarmentosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 380 = *Kniphofia sarmentosa*.
speciosa, Roth, Nov. Pl. Sp. 190 = *Kniphofia aloides*.
undulata, Moench, Meth. 631 = *viridifolia*.
Uvaria, Willd. Sp. Pl. ii. 182 = *Kniphofia aloides*.
viridifolia, Jacq. Hort. Schoenb. i. 41. t. 78.—Afr. austr.

VELTIS, Adans. Fam. ii. 116 (1763) = *Centaurea*, Linn. (Compos.).

VEMONIA, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) ii. 1216, err. typ. = *Vernonia*, Schreb. (Compos.).

VENANA, Lam. Illustr. ii. 99. t. 131 (1800) = *Brexia*, Noronha (1806) (Saxifr.).
madagascariensis, Lam. l. c. = *B. madagascariensis*.

VENATRIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 47 (1836) = *Aster*, Tourn. (Compos.).
falcata, Rafin. l. c. = *A. falcatus*.
linifolius, Rafin. l. c. = *A. acris*.
pauciflorus, Rafin. l. c. = *A. pauciflorus*.
salicifolius, Rafin. l. c. = *A. diffusus* ?
tenuifolius, Rafin. l. c. = *A. tenuifolius*.

VENDREDIA, Baill. Hist. Pl. viii. 264 (1882) = *Rhetinodendron*, Meissn. (Compos.).
Berterii, Baill. l. c. 265 = *R. Berteroi*.

VENEGASIA, DC. Prod. vi. 43 (1837). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 397.
PARTHENOPSIS, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1875) 160.
carpesioides, DC. Prod. vi. 43.—Calif.

VENEGAZIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 397 (1873), sphalm. = *præc.*

VENIDIUM, Less. in Linnaea, vi. (1831) 91. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 459.
ANTROSPERMUM, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 773.
CLEITRIA, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1831).
—Cf. Linnaea, viii. (1833) Litt. 23.
angustifolium, DC. Prod. vi. 492.—Afr. austr.
arctotoides, Hort. Hamb. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 463 = *hirsutum*.
arctotoides, Less. Syn. Comp. 33.—Afr. austr.
aureum, DC. Prod. vi. 494.—Afr. austr.
calendulaceum, Less. Syn. Comp. 32 = *decurrens*.
canescens, DC. Prod. vi. 493 = *decurrens*.
cinerarium, DC. l. c. = *perfoliatum*.
decurrens, Less. Syn. Comp. 32.—Afr. austr.
discolor, Less. l. c. 31.—Afr. austr.
erosum, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 462.—Afr. austr.
fugax, Harv. l. c. 464.—Afr. austr.
hirsutum, Harv. l. c. 463.—Afr. austr.
hispidulum, DC. Prod. vi. 493 = *Kraussii*.
hispidulum, Less. Syn. Comp. 34.—Afr. austr.
Kraussii, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 773.—Afr. austr.
macrocephalum, DC. Prod. vi. 494.—Afr. austr.
macrosporum, DC. l. c. 492.—Afr. austr.
microcephalum, DC. l. c. 493.—Afr. austr.
perfoliatum, Less. Syn. Comp. 30.—Afr. austr.
plantagineum, Less. l. c. = *semipapposum*.

VENIDIUM :—

- puberulum*, DC. Prod. vi. 493 = *hispidulum*.
ramosissimum, Sch. Bip. in *Flora*, xxvii. (1844) 772.
 —Afr. austr.
scabrum, Less. Syn. Comp. 29 = *semipapposum*.
 Schraderi, DC. Prod. vi. 494. —Afr. austr.
semipapposum, DC. l. c. 491. —Afr. austr.
spathuligerum, DC. l. c. 493. —Afr. austr.
speciosum, Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 43.
 —Afr. austr.
subacaule, DC. Prod. vi. 493. —Afr. austr.
subcalvum, DC. l. c. 492 = *semipapposum*.
 Weyleyi, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 463. —
 Afr. austr.

VENIERA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 101 (1866) = **Nar-**
cissus, Tourn. (Amaryll.).
tenuior, Salisb. l. c. = *N. gracilis*.

VENILIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii.
 (1869) 125 = **Scrophularia**, Tourn.
vernalis, Fourr. l. c. = *S. vernalis*.

VENTENATA, Koel. Desc. Gram. 272 (1802).

- GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1159.
 HETERANTHUS, Dum. ex Fourr. in Ann. Soc. Linn.
 Lyon, N. S. xvii. (1869) 183.
 MALYA, Opiz, Seznam, 62 (1852).
avenacea, Koel. Desc. Gram. 274. —Europ.
 Blanchei, Boiss. Fl. Orient. v. 539. —Syria.
bromoides, Koel. Desc. Gram. 273 = *avenacea*.
dubia, Coss. Expl. Algér. 104 = *avenacea*.
macra, Balansa, ex Boiss. Fl. Orient. v. 540. —As.
 Min.; Mesopot.
quercetorum, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 130. —
 Phrygia.
subnervis, Boiss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv.
 (1857) 305. —Phrygia.
triflora, F. Schultz, ex Nym. Consp. 815 = *avenacea*.

VENTENATIA, Beauv. Fl. Owar. i. 29. t. 17 (1805) =
Oncoba, Forsk. (Bixin.).
glauca, Beauv. l. c. 30 = *O. glauca*.

VENTENATIA, Cav. Ic. iv. 79 (1797), err. typ. =
 VINTENATIA, Cav.

VENTENATIA, Sm. Exot. Bot. ii. 13. tt. 66, 67
 (1805) [1806?] = **Stylidium**, Sw. (Campan.).
major, Sm. l. c. 13. t. 66 = *S. graminifolium*.
minor, Sm. l. c. 15. t. 67 = *S. lineare*.

VENTENATIA, Tratt. Gen. Pl. Disp. 86 (1802) =
Pedilanthus, Neck. (Euphorb.).
bracteata, Tratt. l. c. 87 = *P. bracteatus*.

VENTILAGO, Gaertn. Fruct. i. 223. t. 49 (1788).

- RHAMNEAE, Benth. & Hook. f. i. 375.
 ENRILA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 709 (1837).
bombaiensis, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851)
 36. —Ind. or.
bracteata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4269 = *maderas-*
patana.
buxoides, Baill. *Adansonia*, xi. (1874) 268. —
 N. Caled.
calyculata, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857)
 124. —Ind. or.
cernua, Tul. l. c. 123. —Ins. Rawak.
cinerascens, G. Don, Gen. Syst. ii. 28 = *Rhamnus*
cinerascens.
denticulata, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii.
 (1801) 417 = *calyculata*.
ecorollata, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record (July
 1883). —Austral.
lanceata, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 121.
 —Ins. Seychelles.
leiocarpa, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 77. —
 As. or.
leptadenia, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii.
 (1857) 124. —Madag.
lucens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 330. —Sumatra.
macrantha, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857)
 123 = *calyculata*.
maderaspatana, Benth. in Hook. Kew Journ. iv.
 (1852) 42 = *leiocarpa*.
maderaspatana, Gaertn. Fruct. i. 223. t. 49. —Ind. or.

VENTILAGO :—

- maderaspatana*, Roxb. Pl. Corom. i. 55. t. 76 =
calyculata.
 Maingayi, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 631.
 —Malaya.
monoica, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 124 = *maderas-*
patana.
oblongifolia, Blume, Bijdr. 1144. —Java.
silhetiana, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 631,
 in syn. = *calyculata*.
Smithiana, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857)
 125 = *calyculata*.
sororia, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 243. —
 China.
sulphurea, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857)
 125 = *calyculata*.
viminialis, Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 369.
 —Austral.
vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 274. —
 Ins. Fiji.

VEPRECELLA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv.
 (1851) 312. t. 15. MELASTOMACEAE, Benth.
 & Hook. f. i. 752.

- hispidula*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 342.
 —Madag.
laxiflora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851)
 314. —Madag.
lutea, Naud. l. c. 313. —Madag.
macrophylla, Naud. l. c. 314. —Madag.
nigrescens, Naud. l. c. 313. —Madag.
schizocarpa, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 112. —
 Madag.
vestita, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 146. —
 Madag.

VEPRIS, Comm. ex A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii.
 (1825) 509 = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
inermis, Comm. l. c. 538 = *T. paniculata*.
lanceolata, G. Don, Gen. Syst. i. 806 = *T. lanceolata*.
obovata, G. Don, l. c. = *T. paniculata*.
querimbensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.
 Bot. 87 = *T. lanceolata*.
simplicifolia, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 89 = *Acronychia*
Endlicheri.

VERATAXUS, [Nelson,] Senilis, Pinaceae, 168 (1866) =
Taxus, Tourn. (Conif.).
adpressa, Carr. Conif. ed. II. 731 = *T. baccata*.

VERATRONIA, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 553 (1859) =
Susum, Blume (Flagell.).
malayana, Miq. l. c. = *S. anthelminticum*.

VERATRUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1737).

- LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 834.
 ACEDILANTHUS, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 834
 (1883), sphalm.
 ACELIDANTHUS, Trautv. & Mey. in Middend. Reise
 (Fl. Ochot. 94) (1847).
 ANEPSA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 31 (1836).
album, Linn. Sp. Pl. 1044. —Europ.; As. bor.
album, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 249 = *viride*.
album, S. Wats. Bot. King's Exped. 344 = *califor-*
nicum.
americanum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 =
Helonias bullata.
angustifolium, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 242 = *Stenan-*
thium angustifolium.
californicum, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.
 Ser. II. iii. (1855) 103. —Am. bor. occ.
caricifolium, Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal. (1838)
 8 = *Schoenocaulon officinale*.
Dubouzeti, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy.
 Astrol. et Zél. 17 = *Anthericum Rossii*.
Eschscholtzii, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iv. (1837)
 119 = *album*.
fimbriatum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868)
 391. —Calif.
flavum, Herb. ex Schult. f. Syst. vii. 1565 = *Chamae-*
lirium carolinianum.
frigidum, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831)
 46 = *Stenanthium frigidum*.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise,
 44. t. 96 = *Smilacina purpurea*.
intermedium, Chapm. Fl. S. U. St. 489. —Florida.

VERATRUM :—

- Lobelianum*, Bernh. in Schrad. Neues Journ. ii. II. (1807)
 356 = *album*.
luteum, Linn. Sp. Pl. 1044 = *Chamaelirium caroli-*
nianum.
Maackii, Regel, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. iv.
 (1861) iv. 154. —Sibir. or.
malayanum, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) v. n. II. 25
 = *Susum anthelminticum*.
Maximowiczii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879)
 472. —Japon.
nigrum, Linn. Sp. Pl. 1044. —Europ.; As. bor.
officinale, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 45
 = *Schoenocaulon officinale*.
oxysepalum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840)
 79 = *album*.
parviflorum, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.
 ii. (1833) 166 = *album*.
parviflorum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 250. —Am. bor.
polygamum, Gilib. Exercit. ii. 463 = *album*.
purpureum, Salisb. Prod. 214 = *nigrum*.
Sabadilla, Retz. Obs. i. 31 (err. typ. 29) (sp. dub.). —
 Mexic.
stamineum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871)
 230. —Japon.
tenuifolium, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix.
 II. (1842) 380 = *Schoenocaulon officinale*.
virescens, Mart. & Gal. l. c. 381 = *Zygadenus mexi-*
canus.
virginicum, Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 426 = *Melan-*
thum virginicum.
viride, Ait. l. c. ed. I. iii. 422. —Am. bor.
viride, Koehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 237 = *album*.
Woodii, Robbins, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St.
 ed. II. 477. —Am. bor.

VERBASCUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1737).

- SCROPHULARINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 928.
 BLATTARIA, [Tourn.] Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 247
 (1745).
 FLOMOSIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 89 (1836).
 LASIAKE, Rafin. l. c. (1836).
 LEOSANDRA, Rafin. l. c. (1836).
 LYCHNITIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.
 xvii. (1869) 125.
 THAPSUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 89 (1836).
abietinum, Borb. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xvii.
 (1875) 60 = *nigrum*.
acuminatum, Schrad. ex Steud. Nom. ed. I. 871
 (Quid ?). —Hab.?
Adeliae, Heldr. in Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 145. —
 Ins. Cyclad.
adenocaulon, Boiss. & Bal. l. c. vi. 128. —Cappadoc.
adenophorum, Boiss. & Bal. l. c. Ser. I. iv. 64. —Caria.
adenophorum, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect.
 Médic.) i. (1853) 442 = *glandulosum*.
adulterinum ×, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 512. —
 Europ.
aethiopicum, Ehrenb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 381.
 —Mons Sinai.
alatum, Lam. Fl. Fr. ii. 259 = *V. Thapsus*.
album, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *V. Lychnitis*.
alceoides, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv.
 306. —Kurdistan.
alepense, Benth. in DC. Prod. x. 241. —Syria.
alopecuroides, Bivona, ex Guss. Fl. Sic. Syn. i. 265. —
 Sicilia.
Alopecuros, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp.
 (Sect. Médic.) i. (1853) 440 = *eriophorum*.
alopecurus, Thuill. Fl. Par. ed. II. 110 = *nigrum*.
alpestre, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 317
 = *erionrhodon*.
alpestre, Hegetschw. Fl. Schw. 13. —Europ.
alpigenum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 724 =
pyramidatum.
alpinum, Salisb. Prod. 105 = *Ramondia pyrenaica*.
alpinum, Turra, Fl. Ital. Prod. 64 = *nigrum*.
alyssifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 58. —Armenia.
Amanum, Boiss. Fl. Orient. iv. 310. —Syria.
ambiguum, Lej. Rev. Fl. Spa, 229 = *adulterinum*.
amoenum, Salisb. Prod. 105 = *Celsia Arcturus*.
angustifolium, Tenore, Fl. Nap. iii. 218. t. 122. —Ital.
angustius, Schrank, in Hoppe, Taschenb. (1809) 90; ex
 Schrad. Monog. Verb. i. 18; ii. 57 = *V. Thapsus*.
annuum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11 = *vir-*
gatum.
Antinori, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 144. —
 As. Min.

VERBASCUM:—

antiochium, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 9.—Syria.
Arcturus, Linn. Sp. Pl. 178 = *Celsia Arcturus*.
argentatum, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 441.—Hab.?
argenteum, Tenore, Fl. Nap. iii. 220. t. 215. f. 1.—Ital.
argyrostachyon, Tenore, Relaz. Viagg. Abruzz. 52; Syll. Fl. Neap. 107 = *phlomoides*.
armeniaceum, Boiss. Fl. Orient. iv. 361 = *Celsia aurea*.
armenum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. l. c. 304.—Armenia.
asperulum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 57 = *cheiranthifolium*.
astrophyllum ×, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 13.—As. Min.
atheniense, Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 747 (Quid?).—Graecia?
auriculatum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 149 = *mucronatum*.
auritum ×, Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 129.—Gallia.
australe, Schrad. Monog. Verb. i. 28 = *phlomoides*.
austriacum, Schott, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 341 = *nigrum*.
bactrianum, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 422.—Turkestan.
banaticum, Schrad. Monog. Verb. ii. 28 = *nigrum*.
Barnadesii, Vahl, Symb. Bot. ii. 39 = *Celsia Barnadesii*.
barradense, Boiss. Fl. Orient. iv. 318 = *sinaiticum*.
basianicum, Boiss. et Haussk. ex Boiss. l. c. 341.—Mesopot.
Bastardi, Roem. & Schult. Syst. iv. 335 = *thapsiforme*.
beryeum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 28.—Syria.
betonicaefolium, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 54 = *nigrum*?
bicelle, Roem. & Schult. Syst. iv. 325 = *V. Thapsus*.
bicolle, Schrank, Baier. Fl. i. 465 = *thapsiforme*?
bicolor, Badaro, Osserv. 3; in Brugnat. Giorn. Fis. Dec. II. vii. (1824) 365 = *Boerhavi*.
Biebersteinii, Bess. Ind. Sem. Hort. Crem. (1821); et in Enum. Pl. Volh. 53 = *V. Lychnitis*.
bipinnatifidum, Sims, Bot. Mag. t. 1777 = *pinnatifidum*.
Bischoffii ×, G. F. Koch, in Pollichia, (1849) 23.—Europ.
biscutellaefolium, Benth. in DC. Prod. x. 241.—Armenia.
bithynicum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 63.—Bithynia.
Blancheanum, Boiss. Fl. Orient. iv. 345.—Syria.
Blattaria, Linn. Sp. Pl. 178.—Europ.; As. bor.
Blattaria, J. A. Schmidt, in Journ. Bot. vi. (1868) 243 = *V. Thapsus*.
Blattaria, Vell. Fl. Flum. 100; iii. t. 3 = *virgatum*.
blattariforme, Griseb. in Wieg. Archiv, xviii. (1852) 321 = *V. Blattaria*.
blattarioides, Gaud. Fl. Helv. ii. 127 = *Gaudini*.
blattarioides, Lam. Encyc. iv. 225 = *virgatum*.
blattarioides, Wahlenb. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 43 = *xanthophloeum*.
blattarium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = *V. Blattaria*.
Boerhavi, Linn. Mant. i. 45.—Reg. Mediterr.
Boerhavi, Frivald, ex Nym. Consp. 526 = *phlomoides*.
Boerhavi, Pall. Reise, iii. 540 = *ovalifolium*.
bohemicum, Borb. in Termész. Füzetek, ix. (1885) 276 = *phlomoides*.
bombyciferum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 52 = *V. Lagurus*.
bombyciferum, Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 165 = *longifolium*.
bombyciforme, Boiss. Fl. Orient. iv. 303 = *V. Lagurus*.
bracteatum, Kickx, ex Dum. Fl. Belg. Prod. 38 = *V. Thapsus*.
bracteatum, J. & C. Presl, Delic. Prag. 214 = *V. Lychnitis*.
bracteolatum, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. Suppl. (1840) 4; ex Godr. Fl. Juven. ed. II. 95.—Hab.?
brassicaefolium, Crantz, Inst. ii. 323 = *Celsia Arcturus*.
Brauneanum ×, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 315, 318.—Europ.
brevidentis, Benth. in DC. Prod. x. 235 = *lasianthum*.
Brockmuelleri ×, Ruhm. in Eichl. Jahrb. Berl. (1881) 248.—Europ.
bugulaefolium, Lam. Encyc. iv. 226 = *Celsia bugulifolia*.

VERBASCUM:—

bulbosum, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 345 = *beryeum*.
caesareum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 7.—Palaest.
calabricum, Thom. & Rich. ex Bertol. Fl. Ital. ii. 601 = *angustifolium*.
calaurium, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 313 = *plicatum*.
calvescens, Schur, Enum. Pl. Transs. 481 = *phlomoides*.
calvum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 338.—Kurdist.
calycinum, Ball, in Journ. Bot. xiii. (1875) 172.—Marocc.
calyculatum ×, Chaub. in St. Amans, Fl. Agen. 87.—Europ.
campestre, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 5.—Anatolia.
candelabrum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 717.—Sibir. altaic.
candidissimum, DC. Fl. Fr. Suppl. 413 = *mucronatum*.
canescens, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 470 = *V. Thapsus*.
Capusi, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xviii. (1884) 222.—Turkestan.
caucasicum, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 25 = *rubiginosum*.
caucasicum, Hort. ex Schrad. Monog. Verb. ii. 48 = *pyramidatum*.
caucasicum, Schult. Obs. Bot. 42 = *ferrugineum*.
Ceccarianum, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 322 = *sinuatum*.
Cedreti, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 19.—Syria.
Celsiae, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 444 = *virgatum*.
celsioides, Benth. in DC. Prod. x. 229.—Reg. Himal.
ceratophyllum, Schrad. Monog. Verb. ii. 7 = *pinnatifidum*.
cerinum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 21.—Lycaonia.
cestroides, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 331.—Mesopot.
Chaixi, Vill. Prosp. 22; Hist. Pl. Dauph. ii. 491 = *nigrum*.
cheiranthifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 56.—As. Min.
chium, Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 309 = *glomeratum*.
chryserium, Schrad. Monog. Verb. ii. 9.—Palaestin.
chrysochaete, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, 1. (1885) 89.—Lycia.
chrysorrhacis, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 58.—Caria.
chrysostallostemum, Steud. Nom. ed. II. ii. 748, sphalm. = *crystallostemum*.
cilicium, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 149.—Cilicia.
cisalpium, Birol. in Brugnat. Giorn. Fis. Dec. II. iv. (1821) 284 = *phoeniceum*.
claudiopolitanum ×, Simk. in Magyar Novényt. Lapok, ii. (1878) 150.—Europ.
Claytoni, Michx. Fl. Bor. Am. i. 148 = *V. Blattaria*.
coeruleum, Schanz, Cat. Sem. Hort. Vindob. (1822); ex Schrad. Monog. Verb. ii. 13 = *speciosum*.
collinum, Salisb. Prod. 104 = *phoeniceum*.
collinum, Schrad. Monog. Verb. i. 35 = *V. Thapsus*.
commutatum ×, Kern. ex Nym. Consp. 531.—Europ.
commutatum, Tenore, Relaz. Viagg. Abruzz. 121, nomen; Syll. 108.—Europ. austr.
comosum ×, Simk. in Termész. Füzetek, ii. (1878) 36.—Europ.
compactum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 159 = *ovalifolium*.
compactum, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 384 = *montanum*.
condensatum, Schrad. Monog. Verb. i. 31. t. 3 = *phlomoides*.
conocarpum, Moris, Elench. Fl. Sard. ii. 7.—Ins. Sardo.
cordatum, Desf. Fl. Atlant. i. 186.—Alger.
cordifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 381 = *nigrum*.
Cossonianum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 583.—Marocc.
cotoneum, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 440 = *glomeratum*.
crassifolium, DC. Fl. Fr. iii. 601 = *montanum*.
crassifolium, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 213. t. 26.—Lusitan.
crenatifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 51.—Bulgar.
crispum, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 341 = *Schimperianum*.
crystallostemon, [Weinm.]. Cat. Sem. Hort. Dorpat. (1818); ex Schrad. Monog. Verb. ii. 45 = *virgatum*.
cupreum, Sims. Bot. Mag. t. 1226 = *phoeniceum*.

VERBASCUM:—

cuspidatum, Schrad. Monog. Verb. i. 23 = *V. Thapsus*.
cylindrocarpum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 46.—Macedon.
daenense, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 38.—Persia.
damascenum, Boiss. l. c. xii. 19.—Syria.
danubiale ×, Simk. in Termész. Füzetek, ii. (1878) 36.—Europ.
decalvans ×, Borb. l. c. ix. (1885) 278.—Europ.
decurrens, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 378 = *V. Thapsus*.
Delileanum, Franch. Etud. Verb. 68.—Europ.
delphicum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 146.—Graecia.
densiflorum, Bertol. Pl. Rar. Ital. Dec. iii. 52 = *thapsiforme*.
dentatum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 114 = *nigrum*.
dentifolium, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1836) 28.—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 287.—Alger.
denudatum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 23.—Lycia.
denudatum ×, Pfund, Monog. Verb. Prod. 51; et Berch. & Opiz, Oek. Fl. Boehm. iii. 369, 397.—Europ.
detersile, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 15.—Lycia.
digitalifolium, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 342.—Mesopot.
dimorphum ×, Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 140.—Europ.
diphyon ×, Franch. l. c. 193.—Europ.
divaricatum ×, Kitt. Taschenb. ed. II. 352.—Europ.
diversifolium, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 335.—Mesopot.
dubium, Roem. & Schult. Syst. iv. 330.—Lusitania.
elegans, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 12.—As. Min.
elegans, Salisb. Prod. 105 = *Celsia orientalis*.
elongatum, Moench, Meth. 446 = *Boerhavi*.
elongatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 223 = *V. Thapsus*.
epixanthinum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 39.—Graecia.
erianthum, Benth. in DC. Prod. x. 235.—Afghan.
eriphorum, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 440.—Hab.?
eriorrhodon, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 4.—As. Min.
eristachyum, Buek, Ind. ad DC. Prod. iii. 492, sphalm. = *glabratum*.
erythrocaule, Schur, Enum. Pl. Transs. 483 = *glabratum*.
euphraticum, Benth. in DC. Prod. x. 241.—Cappadoc.
Euryale ×, Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 147.—Europ.
farinosum, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 542 = *pulverulentum*.
fasciculatum, Ehrenb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 381 = *sinaiticum*.
ferrugineum, Andr. Bot. Rep. t. 162 = *phoeniceum*.
ferrugineum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10.—Europ. austr.
firmum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 384 = *V. Lychnitis*.
flagriforme ×, Pfund, Monog. Verb. Prod. 49; Opiz, ex Bercht. & Opiz, Oek. Fl. Boehm. iii. 370, 399.—Europ.
floccosum, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 81 = *pulverulentum*.
foetidum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 141 (faetidum).—Graecia.
foliosum ×, Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 142.—Europ.
formosum, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 25, nomen; ex Schrad. Monog. Verb. ii. 37 = *ovalifolium*.
formosum, Fisch. ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 22 = *spectabile*.
Freynianum ×, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 88.—Europ.
Gaillardoti, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 128 = *sinuatum*.
galileum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 8.—Syria; Palaestin.
gallicum, Willd. Sp. Pl. i. 1005 = *nigrum*.
garganicum, Tenore, Relaz. Viagg. Abruzz. 53.—Italia.
Gaudini ×, Doell, ex Nym. Consp. 530.—Europ.

VERBASCUM:—

geminatum x, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 370.—Europ.
geminiflorum, Hochst. in Lorent, *Wanderungen*, 336.—Mesopot.
georgicum, Benth. in DC. *Prod.* x. 228.—As. Min.; Persia.
Germanicae, Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 334.—Cataonia.
germanum x, Franch. *Fl. Loir-et-Cher*, 409.—Europ.
giganteum, Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 51 = V. Thapsus.
glabratum, Frivald. in *Flora*, xix. (1836) 440.—Banat.
glabrum, Delarbre, in *Journ. Santé Bord.* ii. 166; ex Schrad. *Monog. Verb.* ii. 55.—Gallia.
glabrum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = V. Blattaria.
glabrum, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 225 = virgatum.
glanduligerum, Velen. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 424.—Europ.
glandulosum, Delile, *Ind. Sem. Hort. Monsp.* (1849).—Cf. *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xii. (1849) 367.—Europ.
glandulosum, Thore, ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 348 = virgatum.
globiflorum, Boiss. & Noé, *Diagn. Ser. II.* iii. 148.—Galatia.
glomeratum, Boiss. l. c. Ser. I. iv. 52.—As. Min.
gnaphalodes, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* iii. 152.—Tauria; Reg. Cauc.
Godronii x, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 472.—Gallia.
gossypinum, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* iii. 152.—Heria.
graciliflorum, Delile, ex Godr. in *Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.)* i. (1853) 443.—Hab.?
gracum, Heldr. & Sart. in Boiss. *Diagn. Ser. II.* iii. 148.—Graecia.
gracum, Pall. ex Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 161 = sinuatum.
granatense, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 441.—Hispan.
grandiflorum, Gueldenst. *Reisen*, ii. 65; ex Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 203.—Ross. austr.
grandiflorum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = phlomoides.
grandiflorum, Poir. *Encyc. Suppl.* iii. 715 = montanum.
grandiflorum, Schrad. *Hort. Gotting.* 19. t. 13 = virgatum.
grossum, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. IV. 36 (Quid?).—Europ.
Guicciardii, Heldr. ex Boiss. *Diagn. Ser. II.* vi. 127.—Graecia.
Gussonii, Tineo, in Guss. *Fl. Sic. Syn.* ii. 797 = sinuatum.
haemorrhoidale, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. i. 236 = pulverulentum.
Haenseleri, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 442.—Reg. Mediterr. occ.
Hausmanni x, Čelak, in *Arch. Naturw. Landesd. Boehm.* ii. (1873) 317.—Europ.
Haynaldianum x, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 213.—Europ.
Heldreichii, Boiss. *Diagn. Ser. II.* iii. 147.—Graecia.
heteromallum, Panč. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 305 = malacotrichum.
Henriquezii, Lange, ex Henriq. in *Soc. Geogr. Lisboa, Sec. Bot.* (1183) 80.—Lusitan.
heterophyllum x, Franch. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxii. (1868) 136.—Europ.
heterophyllum, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 49 = garganicum.
heterophyllum, J. Mill. *l. c.* t. 67 (Quid?).—Hab.?
heterophyllum, Moretti, in *Brugnat. Giorn. Fis. Dec.* II. v. (1822) 111 = pulverulentum.
Heuffelii, Neilr. *Aufz. Ung. Slav. Gefaesspfl. Nachtr.* 53 = longifolium.
Hinkei, Frivald, in *Flora*, xix. (1836) 440 = nigrum.
Hohenackeri, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* v. 42.—Reg. Cauc.
Hookerianum, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 584.—Marocc.
Hornemannii, Wierzb. in *Reichb. Ic. Fl. Germ.* xx. 17 = glabratum.
Hornemannii, Bess. ex Steud. *Nom.* ed. I. 872; ed. II. ii. 748.—Europ.
humile, Bernh. ex Steud. l. c. 872 = nigrum.

VERBASCUM:—

humile, Fanka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 241.—Thracia.
Humnickii x, Franch. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxii. (1868) 110.—Europ.
hybridum x, Brot. *Fl. Lusit.* i. 170.—Lusitan.
hybridum, Lej. *Fl. Spa.* ii. 299 = nigrum.
hyoseridifolium, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 325 = seq.
hyoseridifolium, Schrad. *Monog. Verb.* ii. 31. t. 3. f. 1 = speciosum.
hypoleucum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* iii. 147 = nigrum.
incanum, Gaud. *Fl. Helv.* ii. 121 = Schottianum.
indicum, Wall. in Roxb. *Fl. Ind.* ed. Carey, ii. 236 = V. Thapsus.
infidelium, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 342.—Cataonia.
insigne, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II.* vi. 129 = Wiedemannianum.
insulare, Boiss. & Heldr. l. c. Ser. I. xii. 14 = eriorrhodon.
integrifolium, Rochel, *Pl. Banat. Rar.* 57, in textu = speciosum.
interjectum, Pfund, *Monog. Verb. Prod.* 49.—Europ.
intermedium, Leman, ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 326 = V. Thapsus.
intermedium, Rupr. ex Pfund, *Monog. Verb. Prod.* 54 = nigrum?
isauricum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* xii. 22.—Phrygia.
italicum, Moric. *Fl. Venet.* i. 116 = phlomoides.
Jernacha, Hochst. ex Benth. in DC. *Prod.* x. 227 = phlomoides.
Juratzkae x, Dichtl, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* ii. (1884) 134.—Europ.
Kanitzianum, Simk. & Walz. in *Magyar Növényt. Lapok*, ii. (1878) 148, 149.—Europ.
khorrassanicum, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 319.—Persia.
Kickxianum, Dum. *Fl. Belg. Prod.* 38 = V. Thapsus.
Killasi x, Bruegg, in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 101.—Europ.
Klotzschianum x, Wirtg. *Fl. Preuss. Rheinprov.* 321.—Europ.
kochiaeforme, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 335.—Persia.
Kochianum x, Wirtg. *Fl. Preuss. Rheinprov.* 320.—Europ.
Koecheli, Fenzl, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 344 = lyratifolium.
Kotschy, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I.* iv. 56 = syriacum.
laetum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 338.—Mesopot.
laevigatum, *Enum. Sem. Hort. Prag.* (1822); ex Schrad. *Monog. Verb.* ii. 45 = virgatum.
Lagurus, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* v. 42.—Byzant.
Lagurus, Noé, ex Nym. *Consp.* 526 = crenatifolium.
Lamottei x, Franch. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxii. (1868) 124.—Gallia.
lanatum, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 40 = V. Thapsus.
lanatum, Schrad. *Monog. Verb.* ii. 28. t. 2. f. 1 = nigrum.
lanceolatum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 442 = virgatum.
lasianthum, Boiss. ex Benth. in DC. *Prod.* x. 234.—As. Min.
laxiflorum, Presl, *Delic. Prag.* 76 = pulverulentum.
laxiflorum, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 90.—Caria.
leianthum, Benth. in DC. *Prod.* x. 239.—Cilicia.
leiocaulon, Heuff. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 28 = glabratum.
leiotachyon, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 43 = glabratum.
Lemaitrei, Bor. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxii. (1868) 13.—Europ.
leptocladum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* xii. 10.—Pamphylia.
leptocladum, Panč. *Elench. Pl. Crna-Gora*, 69 = glabratum.
leptostachyon, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 415 = simplex.
leucanthemum, Duf. ex Gren. & Godr. *Fl. Fr.* ii. 552 = V. Lychnitis.
leuconeum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* xii. 27.—Phrygia.
leucophyllum, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 46.—Macedon.

VERBASCUM:—

Linnaei, Opiz, ex Bercht. & Opiz, *Oek. Fl. Boehm.* iii. 366, 371; Pfund, ex Nym. *Consp.* 527 = V. Thapsus.
longifolium, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 414 = speciosum.
longifolium, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* p. xvi.—Europ. austr.
longiracemosum x, Chaub. in *St. Amans, Fl. Agen.* 89.—Europ.
luridum, Salisb. *Prod.* 104 = V. Blattaria.
luteum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = Boerhavi.
lychnitideum, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 137 = V. Lychnitis.
Lychnitis, Linn. *Sp. Pl.* 177.—Europ.; Reg. Cauc.
Lychnitis, Schultz, *Prod. Fl. Starg. Suppl.* i. 14 = V. Thapsus.
lycium, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 89.—Lycia.
lydium, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iv. 62.—Lydia.
lyratifolium, [Roechel] Koch, ex Benth. in DC. *Prod.* x. 242.—Cilicia.
lyratum, Lam. *Encyc.* iv. 223 = Celsia cretica.
lyratum, Pourr. ex Nym. *Consp.* 530 = nigrum.
macilentum x, Franch. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxii. (1868) 176.—Europ.
macranthum, Hoffm. & Link, *Fl. Port.* i. 215. t. 27 = phlomoides.
macrocarpum, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xii. 6.—Persia.
macrophyllum, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 161.—Persia.
macrophyllum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 728 = nigrum.
macrophyllum, Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 315 = galilaeum.
macrosepalum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. l. c. 317 = eriorrhodon.
macrostachyum, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 58, in textu = longifolium.
macrurum, Tenore, *Prod. Fl. Nap. App.* v. 9 = thapsiforme.
magellense, Tenore, *Fl. Nap.* iii. 218.—Ital.
majale, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 415 = Boerhavi.
malacotrichum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* iii. 142.—Graecia.
mallophorum, Boiss. & Heldr. l. c. Ser. I. vii. 39.—Graecia.
Martini x, Franch. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxii. (1868) 172.—Europ.
medum, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 23.—Persia.
megaphyllum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* iii. 144 = speciosum.
mesopotamicum, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xii. 24.—Mesopot.
messanense, Tineo, in Guss. *Fl. Sic. Syn.* ii. 887 = thapsiforme.
micranthum, Moretti, in *Brugnat. Giorn. Fis. Dec.* II. v. (1822) 111 = V. Lychnitis.
microcalycinum, Fenzl, ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 338 = leianthum.
microcarpum, Benth. in DC. *Prod.* x. 230.—Mesopot.
millelacum, Boiss. in *Tchihai. Asie Min. Bot.* ii. 3 = pycnostachyum.
mixtum x, Ram. ex DC. *Fl. Fr.* iii. 603.—Europ.
mixtum, Thomas, *Cat. Pl. Suiss.* 31; et ex Gaud. *Fl. Helv.* ii. 121 = Schottianum.
Moenchii, Schultz, *Prod. Fl. Starg. Suppl.* i. 14 = V. Lychnitis.
molle, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 284 = georgicum.
monspessulanum, Pers. *Syn.* i. 215 = nigrum.
montanum, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 49 = phlomoides.
montanum, Schrad. *Hort. Gotting.* 18. t. 12.—Europ.
monticolum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* iv. 325 = cheiranthifolium.
mosellanum x, Wirtg. *Fl. Preuss. Rheinprov.* 316, 319.—Europ.
mucronatum, Lam. *Encyc.* iv. 218.—As. Min.; Creta.
Muhlenbeckii, Godr. *Bon. Cult. Nancy* (1846); ex Gren. & Godr. *Fl. Fr.* ii. 558 = V. Blattaria.
Myconi, Linn. *Sp. Pl.* 178 = Ramondia pyrenaica.
myrianthum, Boiss. *Fl. Orient.* iv. 330.—As. Min.
myriocarpum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* xii. 21.—Pamphylia.
napifolium, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iv. 60.—Caria.
neglectum, Guss. *Suppl. Fl. Sic. Prod.* 59 = V. Thapsus.

VERBASCUM:—

Neilreichii x, Reichardt, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 367.—Europ.
Neilreichii, Schur, Enum. Pl. Transs. 484 = *speciosum*.
nemorosum, Noë, ex Nym. Consp. 526 = *crenati-folium*.
nemorosum, Schrad. Monog. Verb. i. 32 = *phlomoides*.
nevadense, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 443.—Hispan.
nigrum, Linn. Sp. Pl. 178.—Europ.; As. bor.
nigrum, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 160 = *orientale*.
Nisus x, Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 150.—Europ.
nitidum, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 382 = *V. Blattaria*.
niveum, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xvi.—Italia.
nothum x, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 512.—Europ.
Novellianum x, Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 117.—Europ.
Novae-Hollandiae, Roem. Hort. Turic. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 748 (Quid ?).—Austral.?
numidicum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 95.—Alger.
obovatum, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 336.—Mesopot.
officinarium, Crantz, Inst. ii. 323 = *V. Thapsus*.
olympicum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 54.—Bithynia.
olympicum, Bunyard, in Gard. Chron. (1885) II. 19 (an praec. ?).—Graecia?
orchideum, Host, Fl. Austr. i. 288 = *nigrum*.
oreophilum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 726.—Armenia.
orgyale, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 15.—Lycia.
orientale, All. Fl. Pedem. i. 106 = *Celsia orientalis*.
orientale, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 160.—Reg. Cauc.
orientale, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 44 = *nigrum*.
Osbeckii, Linn. Sp. Pl. 179 = *Celsia bugulifolia*.
ovalifolium, Donn, Hort. Cantab. ed. IV. 42, nomen; Sims, Bot. Mag. t. 1037.—Reg. Cauc.
ovatum, Schrad. Hort. Gotting. 21. t. 15 = *nigrum*.
oxycarpum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 729 = *eriorrhodon*.
pallidum, Nees, in Flora, ii. (1819) 296 = *V. Thapsus*.
pannosum, Vis. & Panč. in Mem. Ist. Venet. xii. (1864) 475 = *longifolium*.
parisiense, Thuill. Fl. Par. ed. II. 110 = *nigrum*.
parviflorum, Lam. Encyc. iv. 222.—As. Min.
parviflore, Gilib. Fl. Lituan. i. 41 = *V. Lychnitis*.
peregrinum, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 872; ed. II. ii. 748 (Quid ?).—Hab.?
Pestalozzae, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 25.—Lycia.
petiolare, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 327.—Kurdistan.
phlomoides, Auct. ex Benth. in DC. Prod. x. 237 = *V. Lychnitis*.
phlomoides, Linn. Sp. Pl. 1194.—Europ.; As. Min.
phlomoides, Russ. ex Benth. in DC. Prod. x. 233 = *glomeratum*.
phlomoides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 19. t. 224 = *Boerhavi*.
phlomoides, Spreng. Fl. Hal. 73 = *montanum*.
phlomoides, Thuill. Fl. Par. ed. II. 109 = *pulverulentum*.
phlomoides, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 281 = *lasianthum*.
phoeniceum, Linn. Sp. Pl. 178.—Europ.; As. bor.
phoeniceum, Wallr. Ann. Bot. 29 = *Wallrothii*.
phyllostachyum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 331.—Kurdistan.
pilematophorum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 721 = *pyncnostachyum*.
pilosum x, Doell, in Flora, xxxii. (1849) 465.—Europ.
Pinardi, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 62.—Caria.
pinnatifidum, Vahl, Symb. Bot. ii. 39.—Graecia; Tauria; As. Min.
pisidicum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 16 = *cheiranthifolium*.
plantagineum, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 33 = *V. Thapsus*.
plantaginifolium, Schur, Enum. Pl. Transs. 484 = *phoeniceum*.
plicatum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 21. t. 226.—Graecia.
polystachyum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 716 = *songaricum*.
protractum, Fenzl, in Tchihat, Asie Min. Bot. ii. 6 = *V. Lychnitis*.

VOL. II.

VERBASCUM:—

prusianum, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 37.—Banat.
Pseudo-blattaria, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 36 = *V. Blattaria*.
Pseudo-lychnitis, Schur, Enum. Pl. Transs. 483 = *V. Lychnitis*.
Pseudo-nigrum, Bogenhard, in Flora, xxiv. (1841) 150 = *nigrum*.
Pseudo-phoeniceum x, Reichardt, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 403.—Europ.
pteroaulon x, Nym. Consp. 523.—Europ.
ptychophyllum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 8.—Syria.
pulverulentum, Nicotra, Prod. Fl. Mess. 349, partim = *sinuatum*.
pulverulentum, Salisb. Prod. 104; Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 160 = *V. Lychnitis*.
pulverulentum, Spreng. Fl. Hal. 74 = *phlomoides*.
pulverulentum, Vill. Prosp. 22; Hist. Pl. Dauph. 490.—Europ. austr.
pulvinatum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 109 = *pulverulentum*.
pumilum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 20.—As. Min.
punalense, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 161.—Persia.
punicum, Schrad. Hort. Gotting. 20. t. 14 = *phoeniceum*.
pyncnostachyum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 11.—As. Min.
pyncnostachyum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 64, nomen = *Cossonianum*?
pyramidale, Host, Fl. Austr. i. 287.—Austria.
pyramidale, March, ex Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 782 = seq.?
pyramidatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 161.—Reg. Cauc.
racemiferum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 332.—Assyria.
ramigerum, Link, ex Schrad. Monog. Verb. i. 37.—Germania.
ramosissimum, DC. Fl. Fr. Suppl. 416 = *thapsiforme*.
ramosissimum, Lloyd, ex Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 12 = *V. Blattaria*.
ramosissimum, Poir. Encyc. Suppl. iii. 718 = *V. Lychnitis*.
Rascheyanum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 18 = *Cedreti*.
Regelianum x, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 320.—Europ.
Reissekii x, Kern. ex Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 195.—Europ.
repandum, Rochel, Bot. Reise Banat, 86 = *V. Lychnitis*.
repandum, Willd. Enum. Hort. Berol. 226 = *V. Blattaria*.
repens, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 (Quid ?).—Java.
rhombifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 378 = *V. Lychnitis*.
rigidulum, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 442.—Hab.?
rigidum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 143 = *plicatum*.
ringens x, Boiss. & Heldr. l. c. I. xii. 13.—Lycia.
Rolletianum, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 333 = *phlomoides*.
rotundifolium, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. lxvi = *Boerhavi*.
rubiginosum, Diard, Cat. Pl. St. Calais, 151 = *V. Blattaria*.
rubiginosum x, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 216. t. 197.—Europ.; Reg. Cauc.
rubricaulis, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 23.—Phrygia.
ruderales, Pfeiff. in Bot. Zeit. iii. (1845) 329 = *nigrum*?
rugulosum, Willd. Enum. Hort. Berol. 224 = *phlomoides*.
saccatum, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 283 = *ovalifolium*.
salutans, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1847) 8 = *bracteolatum*.
salviaefolium, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 55.—Caria.
Samaritanii, Heldr. in Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 127 = *epixanthinum*.
samniticum, Tenore, Relaz. Viagg. Abruzz. 54 = *phlomoides*.
Sartorii, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 38 = *phlomoides*.

VERBASCUM:—

saxatile, Salisb. Prod. 104 = *phlomoides*.
scabrum, Presl, Fl. Sic. p. xxxv = *sinuatum*.
scaposum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 26.—Syria.
Schiedeanum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 592 = *nigrum*.
Schimperianum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 11.—Arab.
Schmidli x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 296.—Europ.
Schneideri, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 317 = *eriorrhodon*.
Schottianum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 591 = *Wirtgeni*.
Schottianum, Schrad. Monog. Verb. ii. 13 = *speciosum*.
Schraderi, G. F. W. Mey. Chlor. Hannov. 326 = *V. Thapsus*.
Schultzeanum x, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 316, 319.—Europ.
slavonicum, Steud. Nom. ed. II. ii. 749, sphalm. = *slavonicum*.
semialbum x, Chaub. in St. Amans, Fl. Agen. 88.—Europ.
semidecurrens, Kit. ex Nym. Consp. 526 = *phlomoides*.
semilanatum x, Borb. Vizsg. (1877) 68; ex Freyn, in Termész. Füzetek, iii. iv. (1879) 279.—Europ.
seminigrum, Fries, Nov. Fl. Suec. 68 = *V. Thapsus*.
seytunense, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 325 = *cheiranthifolium*.
simplex, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 216 = *dubium*, *thapsoides*.
simplex, Labill. Pl. Syr. Dec. iv. 10. t. 5.—Syria.
sinaiticum, Benth. in DC. Prod. x. 236.—Arab.
sinuatum, [Habl.] Desc. Phys. Taur. 156 = *pinnatifidum*.
sinuatum, Lemaître, ex Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 13 = *Lemaitrei*.
sinuatum, Linn. Sp. Pl. 178.—Reg. Mediterr.; Oriens.
sinuatum, Schur, Enum. Pl. Transs. 482 = *orientale*.
slavonicum, Kit. in Rochel, Pl. Banat. Rar. 26 = *phlomoides*.
Smithii, Cf. Flora, ii. (1819) 628 = *pulverulentum*.
smyrnaeum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 61.—Lydia.
songaricum, Schrenk, Enum. Pl. Nov. i. 26.—Soongaria.
speciosum, Opiz, Seznam, 102 = *denudatum*, Pfund.
speciosum, Schrad. Hort. Gotting. 22. t. 16.—Europ. austr.; As. Min.
spectabile, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 158.—Tauria.
spectabile, Salisb. Prod. 104 = *V. Thapsus*.
sphenandroides, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 731.—As. Min.
spinosum, Linn. Cent. Pl. ii. 10; Amoen. Acad. iv. 307.—Ins. Creta.
splendidum x, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 53.—As. Min.
spurium x, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 511.—Europ.
stachydifolium, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 25 = *sphenandroides*.
stachydiforme, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 159.—Reg. Cauc.
stenocarpum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 18.—Pamphylia.
stenophyllum, Boiss. & Heldr. l. c. 17 = *cheiranthifolium*.
Steveni, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 160.—Oriens.
Stevenii, [Trev.] Cat. Hort. Vindob. (1821); ex Schrad. Monog. Verb. 15; Spreng. ex Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. 226 = *gnaphalodes*.
strictum, Clarke, Trav. ii. 262.—Ins. Rhodus.
subalpinum x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 100.—Europ.
subalpinum, Schur, Enum. Pl. Transs. 481 = *V. Thapsus*.
sublyratum x, Borb. in Termész. Füzetek, ix. (1885) 278.—Europ.
subniveale, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 305.—Cataonia.
sulcatum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 396.—Hab.?
syriacum, Schrad. Monog. Verb. ii. 6. t. 1. f. 1.—Syria.
Szovitsianum, Boiss. Fl. Orient. iv. 333.—Persia; Reg. Cauc.
tabsoides, Krock, Fl. Siles. Suppl. i. 272, sphalm. = *thapsoides*.
talschense, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 160.—Sibir.
Tapsus, Neck, Delic. Gallo-Belg. i. 121 = *V. Thapsus*.
taraxacifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 59 = *parviflorum*.

7 L

VERBASCUM:—

- Tauri, Boiss. & Kotschy, *Diagn. Ser. II. iii. 145.*—Cilicia.
- tauricum, Hook. Bot. Mag. t. 3799 = rubiginosum.
- tenellum, Hegetschw. Fl. Schw. 14.—Helvet.
- Ternacha, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 108 = phlomoides.
- Thapsi x, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1669.—Europ.
- thapsiforme, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 260 = V. Thapsus.
- thapsiforme, Schrad. Monog. Verb. i. 21.—Europ.; As. Min.
- thapsoides, Balb. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 282 = montanum.
- thapsoides, Comolli, Prod. Fl. Com. 40 = thapsiforme.
- thapsoides, Host, Syn. Pl. Austr. 115 = speciosum.
- thapsoides, Linn. Syst. ed. XII. 169.—Europ.
- thapsoides, Schrank, ex Schrad. Monog. Verb. 19 = V. Thapsus.
- thapsoides, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 490 = phlomoides.
- thapsium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = V. Thapsus.
- Thapsus, Brot. Fl. Lusit. i. 270 = crassifolium.
- Thapsus, Linn. Sp. Pl. 177.—Europ.; Oriens; Reg. Himal.
- Thapsus, Plenk, Pl. Offic. ii. 10. t. 109 = phlomoides.
- Thapsus, Trev. Prosp. Fl. Eug. 24 = thapsiforme.
- Thomaeanum x, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 321.—Europ.
- thyrsoides, Host, Fl. Austr. i. 289 = nigrum.
- Tiberiadis, Boiss. *Diagn. Ser. I. xii. 26.*—Syria.
- tolosanum x, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. i. (1872-73) 132.—Europ.
- tomentosulum x, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 397.—Europ.
- tomentosum, Lam. Fl. Fr. ii. 260 = phlomoides.
- Tommasinianum x, Freyn, in Termész. Füzetek, iii. iv. (1879) 279 = semilaniatum.
- Tournefortii, Crantz, Inst. ii. 323 = Celsia bugulifolia.
- tripolitanum, Boiss. *Diagn. Ser. I. xii. 9.*—Syria.
- triste, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 151 = phoeniceum.
- turkestanicum, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xviii. (1884) 221.—Turkestan.
- turriculatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = Blumea appendiculata?
- undulatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 161 = sinuatum.
- undulatum, Lam. Encyc. iv. 221 = plicatum, ptychophyllum.
- urticaefolium, Lam. l. c. 220 = nigrum.
- ustulatum, Celak, in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ii. (1873) 318 = commutatum.
- valentinum, Burnat & Barbey, Voy. Bot. Baléares, 50.—Hispan.
- vernale, Wierzb. ex Rochel, Bot. Reise Banat, 86 = nigrum.
- versicolor, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 749 (Quid?).—Hab.?
- versiflorum, Schrad. Monog. Verb. i. 36.—Bohem.
- vestitum, Franch. ex Borb. in Termész. Füzetek, ix. (1885) 277.—Europ.
- vidavense x, Simk. l. c. v. (1881) 49.—Europ.
- villosum, Bernh. ex Steud. Nom. ed. I. 873 = nigrum.
- viminale, Guss. Pl. Rar. 101. t. 21 = phlomoides.
- virens, Host, Fl. Austr. i. 290 = orientale.
- virens, Reichb. ex Nym. Consp. 530 = nigrum?
- virgatum, Spreng. Syst. i. 621 = V. Blattaria.
- virgatum, Stokes, in With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. II. i. 227.—Europ.
- viscidulum, Pers. Syn. i. 215 = virgatum.
- Visianianum, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xx. 13 = V. Thapsus.
- vulcanicum, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I. xii. 8.*—Lycaonia.
- Wallichianum, Benth. in DC. Prod. x. 231 (sp. dub.).—Ind. or.
- Wallrothii, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 288.—Europ.
- Weldenii, Braun, ex Moretti, in Brugn. Giorn. Fis. Dec. II. v. (1822) 43 = V. Lychnitis.
- Wiedemannianum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 51.—As. Min.
- Wiersbickii, Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 167 = nigrum.
- Wilhelmianum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 724 = orientale.

VERBASCUM:—

- Wirtgeni x, Franch. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 160.—Europ.
- xanthophoeniceum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 42.—Banat.
- Zuccarinii, Nym. Consp. 531 = graecum.

VERBENA, Linn. Syst. ed. I (1737). VERBENA-CEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1146.

- BILLARDIERA, Moench, Meth. 369 (1794).
- BURSERIA, Loebl. It. Hisp. 194 (1758).
- GLANDULARIA, J. F. Gmel. Syst. 920 (1791).
- OBLETIA, Rozier, in Journ. Phys. i. (1773) 367.
- PATYA, Neck. Elem. i. 296 (1790).
- SHUTTLEWORTHIA, Meissn. Gen. 290 (1840).
- STYLEURODON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 104 (1836).
- STYLODON, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
- UWAROWIA, Bunge, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. vii. (1840) 278.
- affinis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 322 = litoralis.
- alata, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 258.—Bras.
- alopecurioides, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 749 = stricta.
- Alopecurus, Cav. Desc. 68.—Am. bor.
- alpigena, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 378 = Lippia scorodonioides.
- alternifolia, Hort. ex Schau. in DC. Prod. xi. 544.—Chili.
- americana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10.—Panama.
- amoena x, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) t. ad p. 3.
- Andrieuxii, Schau. in DC. Prod. xi. 553.—Mexic.
- angustifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 14.—Am. bor.
- angustifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = Stachytarpheta angustifolia.
- aphylla, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 161. t. 46.—Chili.
- aracana, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 520.—Chili.
- aristata, Vahl, Eclog. Am. ii. 2 = Stachytarpheta orubica.
- arizonica, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 95 = remota.
- Arraniana, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 749 = incisa.
- asparagoides, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 165.—Chili.
- aspera, Gill. & Hook. l. c. 163.—Chili.
- aspera, Kunze, ex Schau. in DC. Prod. xi. 540 = corymbosa.
- Aubletia, Jacq. Hort. Vindob. ii. 82.—Am. bor.
- barbata, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.-Dec. 1827) 176.—Mexic.
- Berterii, Schau. in DC. Prod. xi. 551.—Chili.
- bipinnatifida, Schau. l. c. 553.—Am. bor.
- biserrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 275 = Carolina.
- bonariensis, Linn. Sp. Pl. 20.—Reg. trop.
- bracteata, Cav. ex Lag. & Rodr. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 260.—Am. bor.; N. Mexic.
- bracteosa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 13 = praec.
- brasiliensis, Vell. Fl. Flum. 17; i. t. 40 = litoralis.
- bryoides, Phil. Fl. Atac. 40.—Chili.
- Buchnera, Vell. Fl. Flum. 17; i. t. 42 = lobata.
- caerulea, Vathe, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1876) App. 1 = xutha.
- caespitosa, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 165.—Chili.
- calicicola, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 378 = clavata.
- canescens, Chapm. Fl. S. U. St. 307 = bracteata.
- canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 274. t. 136.—Mexic.
- cannabifolia, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 152.—Japon.
- capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 96 = bonariensis.
- Lippia asperifolia.
- capitata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 10 = Lippia nodiflora.
- caracasana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 275 = litoralis.
- carnea, Medic. Beobacht. (1783) 131.—Am. bor.
- Carolina, Linn. Syst. ed. X. 852; Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Mexic.
- caroliniana, Hort. ex Schau. in DC. Prod. xi. 545 = carnea.
- caroliniana, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 14.—Am. bor.

VERBENA:—

- caroliniana, Willd. Sp. Pl. i. 119 = Carolina.
- Carroo, Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent. xv. (1883) 112.—Patagon.
- caudata, Salisb. Prod. 71 = Stachytarpheta indica.
- cayennensis, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 105 = Stachytarpheta cajanensis.
- chamaedryfolia, Fuss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 73.—Am. trop.
- Chamissonis, Walp. Rep. iv. 18 = intermedia.
- ciliata, Benth. Pl. Hartw. 21.—Mexic.
- cinerascens, Schau. in DC. Prod. xi. 545.—Chili.
- citriodora, Cav. Desc. 68 = Lippia citriodora.
- clavata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 21. t. 33.—Peruv.
- colchaguensis, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 521.—Chili.
- corymbosa, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 255 = lobata.
- corymbosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 22. t. 33.—Chili.
- crithmifolia, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 169.—Chili.
- cuneata, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 752 = Lippia nodiflora.
- cuneifolia, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 360 = stricta.
- cuneifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 22.—Peruv.
- cuneiformis, Spreng. Syst. ii. 750 = praec.
- Cunha, Vell. Fl. Flum. 17; i. t. 41 = phlogiflora.
- curassavica, Linn. Sp. Pl. 19 = Tamonea spinosa.
- delicatula, Mart. & Zucc. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ii. (1834) 245.—Mexic.
- dentata, Vis. Ort. Bot. Padova, 150 = Lippia chamaedryfolia.
- deserticola, Phil. Fl. Atac. 40.—Chili.
- Diceras, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 750 = sulphurea.
- dichotoma, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 23 = Stachytarpheta dichotoma.
- diffusa, Poir. Encyc. viii. 550 = urticifolia.
- dissecta, Poepp. ex Schau. in DC. Prod. xi. 551 = sulphurea.
- dissecta, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 750.—Chili.
- Doniana, Steud. Nom. ed. II. ii. 750 = venosa.
- Drummondii, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 680 = V. Aubletia.
- Echegarayi, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 66.—Chili.
- echinata, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 33 = seriphoides.
- Ehrenbergiana, Schau. in DC. Prod. xi. 548.—Mexic.
- elegans, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 273.—Mexic.
- elliptica, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 751 = Lippia canescens.
- ellipticifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 38 = Stachytarpheta indica.
- elongata, Salisb. Prod. 71 = bonariensis.
- ephedroides, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 261.—Bras.
- erinacea, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 164. t. 48.—Chili.
- erinoides, Lam. Illustr. i. 57.—Peruv.
- erinoides, Poepp. ex Schau. in DC. Prod. xi. 551 = Berterii.
- exilis, Schau. l. c. 553.—Mexic.
- fasciculata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 153.—Peruv.
- filicaulis, Schau. in DC. Prod. xi. 549.—Bras.
- flava, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 170.—Chili.
- fluminensis, Vell. Fl. Flum. 17; i. t. 38 = Bouchea Pseudo-gervao.
- foetida, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 19.—Chili.
- Forskälai, Vahl, Symb. Bot. iii. 6 = Priva leptostachya.
- fragrans, Salisb. Prod. 71 = Lippia citriodora.
- fruticosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 14.—Mexic.
- geraniaefolia, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1198 = tenera.
- glabrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 276 = litoralis.
- glabrata, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 32.—Chili.
- glandulosa, Moris, in Ann. Stor. Nat. iv. (1830) 39 = hispida.
- glaucha, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 163.—Chili.
- globiflora, L'Hérit. Stirp. Nov. 23. t. 12 = Lippia asperifolia.
- globiflora, Nocca, ex Spreng. Syst. ii. 751 = Lippia reptans.
- globulifera, Spreng. Syst. ii. 751, sphalm. = Lippia asperifolia.
- gracilis, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 262 = intermedia.

VERBENA:—

gracilis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 393 = canescens. grandiflora, *Ortega*, Hort. Matr. Dec. 2.—Cuba. grandiflora, Steud. Nom. ed. I. 873 = V. Aubletia. gratissima, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 160 = Lippia lycioides. gynobasis, Wedd. Chlor. And. ii. 156.—Peruv. hastata, Linn. Sp. Pl. 20.—Am. bor. heterophylla, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 749 = inflata. hirsuta, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 321 = Carolina. hirta, Spreng. Syst. ii. 749.—Reg. Argent. hispida, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 22. t. 34.—Am. austr. humifusa, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 271.—Bras. hybrida x, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, Suppl. 195. hyderabadensis, Rottl. ex Wall. Cat. n. 6318 = Bouchea hyderabadensis. incarnata, Rafin. Atl. Journ. 153 (Quid ?).—Am. bor. incisa, Hook. Bot. Mag. t. 3628.—Panama. indica, Jacq. Obs. iv. 7. t. 86 = Stachytarpheta angustifolia. indica, Linn. Syst. ed. X. 851 = Stachytarpheta indica. inflata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 273.—Ecuador. integrifolia, Michx. ex Walp. Rep. iv. 13 = angustifolia. intermedia, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 166.—Chili. intermedia x, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 602. jamaicensis, Linn. Sp. Pl. 19 = Stachytarpheta indica. jamaicensis, Vell. Fl. Flum. 16; i. t. 37 = Stachytarpheta dichotoma. javanica, Burm. f. Fl. Ind. 12 = Lippia javanica. juncea, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 162 = Baillonia juncea. juniperina, Lag. Gen. et Sp. Nov. 19.—Chili. Lamberti, Sims, Bot. Mag. t. 2200 = V. Aubletia. lanata, Willd. ex Walp. Rep. iv. 48 = Lippia canescens. lanceolata, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 748 = litoralis. lancifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 750 = Stachytarpheta indica. Landbecki, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 194.—Chili. lantanoides, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 763 = Lippia geminata. lappulacea, Linn. Sp. Pl. 19 = Priva echinata. lasiostachys, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 122 = prostrata. lavandulaefolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 521.—Chili. ligustrina, Lag. Gen. et Sp. Nov. 18 = Lippia lycioides. lilacina, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. IV. (1885) 210.—Ins. Cedros. Lindleyana, Walp. Ann. iii. 232 = Buddleia Lindleyana. lipozygioides, Walp. Rep. iv. 16.—Chili. litoralis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 276. t. 137.—Am. trop. lobata, Vell. Fl. Flum. 18; i. t. 43.—Bras. lobelioides, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xxix. (1840) 175 = Priva laevis. longiflora, Lam. Illustr. i. 57 = V. Aubletia. longifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 323.—Mexic. Lorentzii, Niederl. ex Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iii. (1879) 370.—Reg. Argent. Lucaeana, Walp. Rep. iv. 23 = xutha. macrostachya, F. Muell. Fragm. i. 60 = officinalis. Mahoneti, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 938 = tenera. marrubiioides, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 266.—Bras. Matthesii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 196.—Texas. mayorensis, Wight, ex Wall. Cat. n. 6318 = Bouchea hyderabadensis. megapotamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 230 = phlogiflora. melindres, Gill. in Lindl. Bot. Reg. t. 1184 = chamaedryfolia. melindroides, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 270 = chamaedryfolia.

VERBENA:—

melissoides, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 750 = chamaedryfolia. mendocina, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 33.—Chili. menthaefolia, Benth. Pl. Hartw. 21 = officinalis. mexicana, Linn. Sp. Pl. 19 = Priva hispida. microphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 272. t. 133.—Am. austr. microphylla, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 21.—Chili. minima, Meyen, Reise, i. 451.—Peruv. mollis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 323 = Carolina. mollis, Rafin. Atl. Journ. 146 (Quid ?).—Am. bor. montevidensis, Spreng. Syst. ii. 747 = stellarioides. moranensis, Willd. ex Spreng. I. c. 750 = elegans. multifida, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 21 = erinoides. mutabilis, Jacq. Coll. ii. 334 = Stachytarpheta mutabilis. mysorensis, Wight, ex Wall. Cat. n. 6318 A = Bouchea hyderabadensis. Negundo, Royle, Illustr. Bot. Himal. 466 (Index), sphalm. = Vitex Negundo. nervosa, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 352 = Buchnera elongata. Nivenii, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 938 = teucrioides. nodiflora, Linn. Sp. Pl. 20 = Lippia nodiflora. nodiflora, Petagn. ex Spreng. Syst. ii. 752 = Lippia repens. nudiflora, Nutt. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 195.—Ins. Sandvic. Oblaetia, Retz. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1773) 143 = V. Aubletia. Oblaetia, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. iii. Phys. (1775) 194. t. 7 = praec. odorata, Desf. ex Steud. Nom. ed. I. 898, in syn. = Lippia asperifolia. odorata, Meyen, Reise, i. 480 = erinoides. officinalis, Linn. Sp. Pl. 20.—Amphig. temp. orchoides, Hort. ex Walp. Rep. iv. 36 = Priva laevis. origenes, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 20.—Chili. orubica, Linn. Sp. Pl. 18 = Stachytarpheta orubica. ovata, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 263.—Bras. paniculata, Lam. Encyc. viii. 548 = hastata. parviflora, Ruiz, ex Walp. Rep. iv. 25 = canescens. patagonica, Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent. xv. (1883) 114.—Patagon. pauciflora, Walp. Rep. vi. 687 = seq. paucifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 324 = Carolina. paucifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 196.—Texas. phlogiflora, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 266.—Bras. pinnatifida, Lam. Illustr. i. 57 = hastata. pinnatisecta, Schau. in DC. Prod. xi. 549.—Bras. platanis, Spreng. Syst. ii. 748 = teucrioides. pogonostoma, Klotzsch, ex Schau. in DC. Prod. xi. 550 = seq. pogostoma, Klotzsch, ex Walp. Rep. iv. 31.—Reg. Argent. polycephala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 194.—Chili. polycnemoides, Lag. Gen. et Sp. Nov. 18 = minima. polystachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 274 = Carolina. porrigens, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 195.—Chili. prismatica, Linn. Sp. Pl. 19 = Bouchea Ehrenbergii. procumbens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 10 = supina. prostrata, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 41.—Am. bor. Pseudo-gervao, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. t. 40 = Bouchea Pseudo-gervao. Pseudo-juncea, C. Gay, Fl. Chil. v. 19.—Chili. pulchella, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. iii. t. 295 = tenera. pulcherrima, Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 937 = erinoides. quadrangularis, Vell. Fl. Flum. 16; i. t. 39 = bonariensis. radicans, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 170.—Chili. radicans, Moench, Meth. 369 = supina. recta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 277 = Carolina. remota, Benth. Pl. Hartw. 21 = canescens. repens, Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec. ii. 27 = Lippia nodiflora.

VERBENA:—

repens, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 750 = bracteata. reptans, Loisel. ex Spreng. Pugill. ii. 70 = Zapania reptans. rhinanthifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 323.—Mexic. ribifolia, Walp. Rep. iv. 29.—Chili. rigens, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 14 = stricta. rigida, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 230 = venosa. Roemeriana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 755 = canescens. rubra, Salisb. Prod. 71 = V. Aubletia. rugosa, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. iv. t. 318 = venosa. rugosa, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 18.—Mexic. rugosa, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 633 = angustifolia. Sabini, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. iv. sub t. 347 = erinoides. sagittalis, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 259.—Bras. salviaefolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 42 = Lippia chilensis. sarmentosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 632 = Lippia nodiflora. scaberrima, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 267 = venosa. scabra, Muhl. ex Spreng. Syst. ii. 752 = Lippia lanceolata. scabra, Vahl, Eclog. Am. ii. 2 = urticifolia. scoparia, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 161. t. 47.—Chili. scoparia, Tausch, in Flora, xix. (1836) 390 = stricta? scordoides, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 269 = teucrioides. scrobiculata, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 275.—Reg. Argent. selaginoides, Kunth, ex Walp. Rep. iv. 15 = alternifolia. Selloi, Spreng. Syst. ii. 750 = erinoides. seriphoides, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 164.—Chili. setosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 321 = officinalis. simplex, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1825) 17.—Cf. Linnaea, iii. (1828) Litt. 10 = angustifolia. sororia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 104 = officinalis. spartioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 195.—Chili. spathulata, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 162.—Chili. spicata, Gilib. Fl. Lituan. i. 92 = officinalis. spuria, Linn. Sp. Pl. 20 = officinalis. squamosa, Jacq. Hort. Schoenb. i. 3. t. 5 = Elytraria tridentata. squarrosa, Roth, Catalect. fasc. iii. 3 = bracteata. stellarioides, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 264.—Bras. stenophylla, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 352 = Buchnera rosea. stoechadifolia, Linn. Sp. Pl. 19 = Lippia stoechadifolia. stricta, Vent. Jard. Cels. 53. t. 53.—Am. bor. strigosa, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 256.—Bras. strigosa, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 176 = xutha. Struthionum, Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent. xv. (1883) 116.—Reg. Argent. subfruticosa, Aubl. Pl. Gui. i. 16 = Lippia stoechadifolia. suffruticosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 750 = praec. sulphurea, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. iii. t. 221.—Am. austr. supina, Linn. Sp. Pl. 21.—Geront. trop. tenera, Spreng. Syst. ii. 750.—Reg. Argent. tenuis, Steud. Nom. ed. II. ii. 751 = intermedia. tenuispicata, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 34.—Persia. teucriifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 322.—Mexic. teucrioides, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 167.—Chili. thymifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 19.—Paraguay. thymoides, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 257.—Bras. trichotoma, Moench, Meth. Suppl. 131 = bonariensis.

VERBENA :—

- tridactylites, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 19.—Ins. Falkland.
 tridens, *Lag. l. c.*—Paraguay.
 trifida, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 273. t. 134.—Mexic.
 trifurcata, *Phil. in Linnaea*, xxix. (1857–58) 21.—Chili.
 triphylla, L'Hérit. *Stirp. Nov.* 21 = *Lippia citriodora*.
 tuberosa, R. Grah. in *Edinb. N. Phil. Journ.* xxix. (1840) 174 = *Priva laevis*.
 Tweediana, Niven, ex Hook. *Bot. Mag.* t. 3541 = phlogiflora.
 uniflora, *Phil. in Linnaea*, xxix. (1857–58) 20.—Chili.
 urticifolia, *Linn. Sp. Pl.* 20.—Am. temp. et trop.
 valerianoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 277.—N. Granat.
 venosa, *Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 167.—Reg. Argent.
 veronicaefolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 275 = Carolina.
 veronicaefolia, Sm. in *Rees, Cycl.* xxxvi. n. 28 = chamaedryfolia.
 virgata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* i. 20 = *Lippia urticoides*.
 Wrightii, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. i. 337.—Mexic.
 xutha, *Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb.* (1834).—*Cf. Linnaea*, x. (1835–36) *Litt.* 115.—Am. bor.

VERBESINA, *Linn. Syst. ed. I* (1735). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 379.

- ABESINA, Neck. *Elem.* i. 33 (1790).
 ANCISTROPHORA, A. Gray, in *Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1857) 457.
 DITRICHUM, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1817) 33.
 HAMULIUM, Cass. l. c. (1820) 173; et in *Dict. Sc. Nat.* xx. 260 (1821).
 HINGSTONIA, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, II. v. (1808) 352.
 LOCHERIA, Neck. *Elem.* i. 41 (1790).
 OCHRONELIS, Rafin. *Atl. Journ.* 153 (1832).
 PHAETHUSA, Gaertn. *Fruct.* ii. 425. t. 169 (1791).
 PLATYPTERIS, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 200 (1820).
 SAUBINETIA, Remy, in C. Gay, *Fl. Chil.* iv. 282. t. 49 (1849).
 TEPION, Adans. *Fam.* ii. 131 (1763).
 XIMENESIA, Cav. *l. c.* ii. 60. t. 178 (1793).
 abscondita, Klatt, in *Leopoldina*, xx. (1884) 93.—Mexic.
 abyssinica, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 409 = *Coreopsis abyssinica*.
 Acmeia, *Linn. Sp. Pl.* 901 = *Spilanthes Acmeia*.
 acuminata, *DC. Prod.* v. 614.—Venezuela.
 aestuans, *Lam. Encyc.* iii. 262.—Am. trop.
 alata, *Linn. Sp. Pl.* 901.—Am. trop.
 alata, Neuenh. in *Roem. Arch.* i. II. (1797) 31 = *Rudbeckia alata*.
 alba, *Linn. Sp. Pl.* 902 = *Eclipta erecta*.
 Ancistrophora, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 14 = *Wrightii*, Griseb.
 aquatica, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. IV. 28 = *Sesuvium Portulacastrum*.
 arborea, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 202.—Ecuador.
 argentea, Bertol. *Fl. Guatimal.* 35.—Guatemala.
 argentea, Gaud. in *Frey. Voy. Bot.* 463.—Ins. Marian.
 Arnottii, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 215.—Paraguay.
 aspilioides, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 194.—Reg. Argent.
 asteroides, *Linn. Sp. Pl.* 902 = *Amellus Lychnitis*.
 atriplicifolia, Poir. *Encyc.* viii. 460 = *Montañoa arborescens*.
 aurea, *DC. Prod.* v. 613 = *Zexmenia aurea*.
 auriculata, *DC. l. c.* 617.—Mexic.
 auriculata, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 315 = subcordata.
 australis, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 215.—Bras.
 biflora, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 1272 = *Wedelia biflora*.
 biflora, Wall. *Cat. n.* 3204 E = *Wedelia Wallichii*.
 bipinnatifida, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 213.—Bras.
 Bosvallea, *Linn. f. Suppl.* 379 = *Glossocardia linearifolia*.
 Boswellia, Roxb. *Hort. Beng.* [101]; *Fl. Ind.* iii. 443 = *pracc*.

VERBESINA :—

- brasiliiana, Pers. *Syn.* ii. 472 = *Adenostemma brasiliianum*.
 bupththalmoides, Link & Otto, *l. c.* Pl. Sel. 105. t. 49 = *Spilanthes arnicoides*.
 calendulacea, *Linn. Sp. Pl.* 902 = *Wedelia calendulacea*.
 canescens, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 463 = *Wedelia Chamissonis*.
 Capitaneja, Nees, in *Linnaea*, xix. (1847) 729.—Mexic.
 ceanothifolia, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 299 = *Zexmenia ceanothifolia*, Benth. & Hook. f.
 ceanothifolia, Willd. *Sp. Pl.* iii. 2225 = *Zexmenia ceanothifolia*, Sch. Bip.
 chinensis, *Linn. Sp. Pl.* 901 = *Anisopappus chinensis*.
 ciliata, Schum. in *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 391.—Afr. trop.
 Clauseni, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 211 = glabrata.
 Clauseni, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 212.—Bras.
 coahuilensis, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 106.—Am. bor. occ.
 connata, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 464 = *Lipochaeta connata*.
 conyzoides, [Moq. & Sesse,] ex *DC. Prod.* v. 616 = virgata.
 conyzoides, Trew, *Pl. Rar.* 8. t. 6.—Hab.?
 Coreopsis, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 134 = *Actinomeris squarrosa*.
 Coulteri, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 13.—Mexic.
 crocata, Less. *Syn. Comp.* 232.—Mexic.
 Cumingii, Sch. Bip. in *Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 528, nomen.—Bolivia.
 debilis, Spreng. *Neue Entdeck.* ii. 137 = *Eclipta pusilla*.
 decurrens, Vell. *Fl. Flum.* viii. t. 114.—Bras.
 dentata, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 205.—Ecuador.
 dichotoma, Murr. in *Comm. Gotting.* (1779) 15. t. 4 = *Blainvillea rhomboidea*.
 dichotoma, Reinw. ex Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 75 = *Wollastonia moluccana*.
 dichotoma, Sieber, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 751 = *Synedrella nodiflora*.
 dichotoma, Wall. *Cat. n.* 3204 = *Blainvillea rhomboidea*, *Wedelia biflora*.
 dissita, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 299.—Calif.
 diversifolia, *DC. Prod.* v. 615.—Bras.
 elegans, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 204.—Ecuador.
 encelioides, Benth. & Hook. f. ex A. Gray, in *Bot. Calif.* i. 350.—Am. bor. et austr.
 floribunda, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 407.—Bras.
 foliacea, Spreng. *Syst.* iii. 578 = *Eleutheranthera ovata*.
 Fraseri, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 187.—Mexic.
 fruticosa, Burm. ex Spreng. *Syst.* iii. 602 = *Wulffia stenoglossa*?
 fruticosa, Desf. *Cat. Hort. Par. ed. III.* 185; et ex *DC. Prod.* v. 610 = *Zexmenia monocephala*.
 fruticosa, *Linn. Syst. ed. X.* 1226 = *ilicifolia*.
 fruticosa, Willd. *Sp. Pl.* iii. 577 = *tridentata*.
 gigantea, Jacq. *l. c.* Pl. Rar. i. 17. t. 175.—Am. trop.
 glabrata, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 315.—Bras.
 Grayi, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 188.—Mexic.
 Grisebachii, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 214.—Reg. Argent.
 guianensis, Baker, l. c. 211.—Guian.
 hastata, Kellogg, ex Curran, in *Bull. Calif. Acad.* i. III. (1885) 140 = *venosa*.
 hastulata, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 87 = *Lipochaeta hastulata*.
 helianthoides, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 424 = glabrata.
 helianthoides, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 194 = *Grisebachii*.
 helianthoides, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 316 = *Arnottii*.
 helianthoides, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 204.—Am. bor. et austr.
 helianthoides, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 135 = *Actinomeris helianthoides*.

VERBESINA :—

- heterophylla, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 12.—Am. bor.
 heterosperma, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 193 = *encelioides*.
 Hookerii, Klatt, in *Leopoldina*, xx. (1884) 92 = *Arnottii*.
 Humboldtii, Spreng. *Syst.* iii. 577 = *helianthoides*.
 hypoleuca, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 37.—Mexic.
 ilicifolia, Poir. *Encyc.* viii. 459.—Ins. S. Doming.
 involucreta, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 409.—Abyss.
 laciniata, Nutt. *Gen. Am.* ii. 170 = *virginica*.
 laciniata, Walt. *Fl. Carol.* 213 (Quid?).—Am. bor.
 lanceolata, Poir. *Encyc.* viii. 460 = *Blainvillea rhomboidea*.
 lancifolia, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 406 = *diversifolia*.
 lavarum, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 464 = *Lipochaeta lavarum*.
 Lavenia, *Linn. Sp. Pl.* 902 = *Adenostemma viscosum*.
 Lavenia, Roxb. *Hort. Beng.* 62; *Fl. Ind.* iii. 442 = *Blainvillea rhomboidea*.
 leprosa, Klatt, in *Leopoldina*, xx. (1884) 93.—Ins. Martinic.
 lineata, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 410 = *Coreopsis Prestinaria*.
 linifolia, *Linn. Syst. ed. X.* 1226.—Jamaic.
 lobata, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 464 = *Lipochaeta lobata*.
 longifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 12 = *Actinomeris longifolia*.
 longipes, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 188.—Mexic.
 macrantha, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 408 = *Coreopsis macrantha*.
 maneana, André, in *Rev. Hort.* (1885) 14, f. 5.—Ecuador.
 Mandonii, Sch. Bip. in *Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 528, nomen.—Bolivia.
 megapotamica, Spreng. *Syst.* iii. 578.—Bras.
 membranifolia, Poir. *Encyc. Suppl.* iii. 18 = *Wulffia stenoglossa*.
 mexicana, Cerv. ex *DC. Prod.* v. 609 = *Perymenium Cervantesii*.
 microcephala, Benth. ex Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 98.—Mexic.
 microcephala, Sch. Bip. ex A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 12 = *pinnatifida*.
 microptera, *DC. Prod.* v. 616 = *virginica*.
 mollis, Alam. ex *DC. l. c.* 588 = *Viguiera buddleiaeformis*.
 mollis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 203.—Mexic.
 moluccana, Blume, *Bijdr.* 912 (= *Wollastonia moluccana*).—Ins. Molucc.
 montana, Blume, l. c. 911 (= *Wollastonia montana*).—Java.
 montevidensis, Spreng. *Syst.* iii. 578 = *Aspilula bupththalmiflora*.
 monticola, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 200 = *Coreopsis monticola*.
 mutica, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 1273 = *Chrysanthellum procumbens*.
 mutica, Sieber, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 751 = *Wulffia stenoglossa*.
 nerifolia, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 188.—Mexic.
 nicaraguensis, Benth. ex Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 97 = *pinnatifida*.
 nicotianaefolia, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 212.—Bras.
 nodiflora, *Linn. Cent. Pl.* i. 28; *Amoen. Acad.* iv. 290 = *Synedrella nodiflora*.
 nudicaulis, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 12.—Am. bor.
 oaxacana, *DC. Prod.* v. 614.—Mexic.
 occidentalis, Walt. *Fl. Carol.* 213.—Am. bor.
 Oerstediana, Benth. ex Oerst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 96.—Costa Rica.
 olivacea, Klatt, in *Leopoldina*, xx. (1884) 93.—Mexic.
 oppositiflora, Poir. *Encyc.* viii. 460 = *Wulffia stenoglossa*.
 ovata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 13 = *Actinomeris ovata*.
 ovata, Hort. Par. ex Poir. *Encyc.* viii. 454 = *Heliopsis bupththalmoides*.

VERBESINA:—

- ovatifolia, A. Gray, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 189.—Mexic.
 pallens, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 97.—Mexic.
 paniculata, Poir. Encyc. viii. 456 = virginica.
 pauciflora, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 189.—Mexic.
 persicifolia, DC. Prod. v. 614.—Mexic.
 Phaetusa, Cass. ex DC. l. c. 615 = occidentalis.
 pinnata, Clark, ex DC. l. c.—Hab. ?
 pinnatifida, Cav. Ic. i. 67. t. 100.—Mexic.
 pinnatifida, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 114 = gigantea.
 platyptera, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 350, in obs.—Am. trop.
 podocephala, A. Gray, Pl. Wright. ii. 92 = Zexmenia podocephala.
 polycephala, DC. Prod. v. 616 = virginica.
 populifolia, Hill, Hort. Kew. 31.—China.
 prostrata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 195.—China.
 prostrata, Linn. Sp. Pl. 902 = Eclipta erecta.
 Pseudo-acmella, Linn. l. c. 901 = Spilanthes Acmella.
 pterocaula, [Moc. & Sesse.] ex DC. Prod. v. 616.—Mexic.
 pusilla, Poir. Encyc. viii. 459 = Eclipta pusilla.
 repanda, Pers. Syn. ii. 471 = Anthemis repanda.
 Rueppellii, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 410 = Coreopsis chrysanthia.
 salicifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 205.—Mexic.
 Sartori, Hort. ex André, in Rev. Hort. (1885) 15 = pinnatifida.
 sativa, Roxb. ex Sims, Bot. Mag. t. 1017; et Fl. Ind. iii. 441 = Guizotia abyssinica.
 Saubinetia, Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 92.—Chili.
 scaberrima, Wall. Cat. n. 3208 = Wedelia Wallichii.
 scabra, Benth. Pl. Hartw. 41 = Actinomeris tetraptera.
 scabra, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 28 = encelioides.
 scandens, Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 441.—Ind. or.
 Schomburgkii, Sch. Bip. in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1078, nomen.—Guian.
 Seemannii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 306.—Mexic.
 semiserrata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 214 = sordescens.
 sericea, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 14.—Mexic.
 serrata, Cav. Ic. iii. 7. t. 214.—Mexic.; Cuba.
 Siegesbeckia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 134 = occidentalis.
 sinensis, J. F. Gmel. Syst. 1256 = chinensis.
 sinuata, Ell. Sketch, ii. 411 = virginica.
 solitaria, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 (Wedeliae sp.).—Java.
 Soratae, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 528, nomen.—Bolivia.
 sordescens, DC. Prod. v. 613.—Bras.
 sororia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 37.—Mexic.
 spicata, Lour. Fl. Cochinch. 507 = Eclipta spicata.
 stricta, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 13 = Actinomeris stricta.
 strigulosa, Gaudich. in Freye. Voy. Bot. 463 = Wedelia aristata.
 subcordata, DC. Prod. v. 614.—Bras.
 sublobata, Benth. Pl. Hartw. 76.—Mexic.
 subpanduriformis, Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 92 = subcordata.
 succulenta, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 87 = Lipochaeta succulenta.
 tetraptera, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 13 = Actinomeris tetraptera.
 texana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862), 458 = virginica.
 tomentosa, DC. Prod. v. 614.—Am. austr.
 tridentata, Spreng. Syst. iii. 577.—Am. austr.
 triplinervia, Vis. in Nuov. Sagg. Acc. Sc. Fis. Padov. v. (1840) 264.—Mexic.
 triradiata, Vell. Fl. Flum. viii. t. 115.—Bras.
 turbacensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 203.—N. Granat.
 urticaefolia, Blume, Bijdr. 911 = Wedelia urticaefolia.
 urticaefolia, Span. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 73 = Wedelia aristata.
 venosa, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 110.—Ins. Cedros.
 verbascifolia, Walp. in Bot. Zeit. ix. (1851) 63.—Venezuela.

VERBESINA:—

- veris, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 407 = Coreopsis Prestinaria.
 viguieroides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 215.—Paraguay.
 villosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 370 = virginica.
 virgata, Cav. Ic. iii. 38. t. 275.—Mexic.
 virginica, Linn. Sp. Pl. 901.—Am. bor.
 Warei, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 12.—Am. bor.
 Wrightii, A. Gray, l. c.—Am. bor.
 Wrightii, Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Cuba.

VERBIASCUM, Fenzl, Diagn. Pl. Or. 47 (1880), sphalm. = Verbascum, Tourn. (Scrophul.).

VEREA, Willd. Sp. Pl. ii. 471 (1799) = seq.

VEREIA, Andr. Bot. Rep. t. 21 (1797) = Kalanchoë, Adans. (Crassul.).

- acutiflora, Andr. l. c. t. 560 = K. acutiflora.
 aegyptiaca, Steud. Nom. ed. II. ii. 751 = K. crenata.
 alternans, Spreng. Syst. ii. 260 = K. alternans.
 ceratophylla, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1328 = K. ceratophylla.
 crenata, Andr. Bot. Rep. t. 21 = K. Afzeliana.
 floribunda, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1328 = K. floribunda, Wight & Arn.
 grandiflora, D. Dietr. l. c. = K. grandiflora, Wight & Arn.
 heterophylla, D. Dietr. l. c. = K. glandulosa.
 laciniata, Willd. Enum. Hort. Berol. 433 = K. laciniata.
 lanceolata, Spreng. Syst. ii. 260 = K. lanceolata.
 nudicaulis, Spreng. l. c. = K. crenata.
 pinnata, Spreng. l. c. = Bryophyllum calycinum.
 rotundifolia, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1328 = K. rotundifolia.
 spathulata, D. Dietr. l. c. 1327 = K. spathulata.

VERHUELLIA, Miq. Syst. Pip. 47 (1843). PIPERA-CEAE, Benth. & Hook. f. iii. 131.

- MILDEA, Griseb. Cat. Pl. Cub. 63 (1866).
 brasiliensis, Miq. Syst. Pip. 48 = Peperomia brasiliensis.
 cordifolia, C. DC. in DC. Prod. xvi. i. 391.—Cuba.
 elegans, Miq. Syst. Pip. 48.—Ind. occ.
 Knoblochiana, C. DC. in DC. Prod. xvi. i. 391.—Afr. trop.
 serpens, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 164 = elegans.
 serpens, Miq. Syst. Pip. 49.—Jamaic.

VERINEA, Pomel, Mat. Fl. Atl. 1 (1860) = Asphodelus, Tourn. (Liliac.).

- fistulosa, Pomel, l. c. 2 = A. fistulosus.
 tenuifolia, Pomel, l. c. = A. tenuifolius.

VERLANGIA, Neck. Elem. ii. 125 (1790); Rafin. Sylva Tellur. 33 (1838) = Argania, Roem. & Schult. (Sapot.).

- Argan, Rafin. l. c. 34 = A. Sideroxylon.
 indica, Rafin. l. c. = Flacourtia sepiaria.
 sicula, Rafin. l. c. = A. Sideroxylon.

VERLOTIA, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 324 (1885). ASCLEPIADEAE.

- dracontea, Fourn. l. c. 325.—Bras.
 heterophylla, Fourn. l. c.—Bras.
 macrocalyx, Fourn. l. c.—Bras.
 suberosa, Fourn. l. c. 324.—Bras.
 virgultorum, Fourn. l. c.—Bras.
 Weddellii, Fourn. l. c. 326.—Bras.

VERMICULARIA, Moench, Meth. Suppl. 150 (1802) = Stachytarpheta, Vahl (1805) (Verben.).

- decurrens, Moench, l. c. = S. indica.
 lancifolia, Moench, l. c. = S. indica.

VERMIFUGA, Ruiz & Pav. Prod. 114. t. 24 (1794) = Flaveria, Juss. (Compos.).

- corymbosa, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 216 = F. Contrayerba.

VERMONETA, Comm. ex Juss. Gen. 343, in obs. (1789) = Homalium, Jacq. (Samyd.).

- decadenia, Comm. ex Juss. l. c. = H. paniculatum.

VERMONIA, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 172, err. typ. = Vernonia, Schreb. (Compos.).

VERMONTEA, Steud. Nom. ed. I. 111, 874 (1821), sphalm. = Homalium, Jacq. (Samyd.).
 decandra, Steud. l. c. 111 = H. paniculatum.

VERNASOLIS, Rafin. Atl. Journ. 152 (1832) = Gailardia?, Fouger. (Compos.).

- auriculata, glauca, heterophylla, Rafin. l. c. (Quid?).
 —Am. bor.

VERNICIA, Lour. Fl. Cochinch. 586 (1790) = Aleurites, Forst. (Euphorb.).

- montana, Lour. l. c. = A. triloba.

VERNISECKIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 752 (1841) = WERNISECKIA, Scop. = Humiria, Aubl.

VERNIX, Adans. Fam. ii. 347 (1763) = Rhus, Tourn. (Anacard.).

VERNONELLA, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 62 = Vernonia, Schreb. (Compos.).

- africana, Sond. l. c. = Vernonia Vernonella.

VERNONIA, Schreb. Gen. ii. 541 (1791). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 227.

- ACHYROCOMA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxvi. 21 (1823); lvii. 341 (1828).

ACILEPIS, D. Don, Prod. Fl. Nep. 169 (1825).

AMBASSA, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 364 (1863).

ASCARICIDA, Cass. in Dict. Sc. Nat. iii. Suppl. 38 (1816).

BACCHAROIDES, Moench, Meth. 578 (1794).

BECHUM, DC. Prod. v. 70 (1836).

BEHEN, Hill, Veg. Syst. iv. 41 (1762).

BRACHEILEMA, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 (1814).

CANDIDEA, Tenore, in Atti Acc. Nap. iv. (1839) 104, tt. 1, 2.

CENTRAPALUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 10; et in Dict. Sc. Nat. vii. 382 (1817).

CHELIUSIA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 26.

CLAOTRACHELUS, Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 565.

CRITONIOPSIS, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 340.

CRYSTALLOPOLLEN, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 363 (1863).

CYANOPIS, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vi. (1828); et in DC. Prod. v. 69 (1836).

CYANOPSIS, Endl. Ench. 232 (1841).

CYANTHILLIUM, Blume, Bijdr. 889 (1826).

DISTEPHANUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 151.

FLUSTULA, Rafin. Sylva Tellur. 116 (1838).

GYMNANTHEMUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 10.

HOLELEPIS, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 189. t. 6.

ISOMERIA, D. Don, ex DC. Prod. v. 24 (1836).

ISONEMA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 152.

KERINGA, Rafin. Sylva Tellur. 144 (1838).

LEIBOLDIA, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 742.

LEPIDAPLOA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 66; et in Dict. Sc. Nat. xxvi. 16 (1823).

LEUCOMERIS, Blume, ex DC. Prod. v. 21 (1836).

LINZIA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 26.

LLERASIA, Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ix. (1858) 37.

LYSISTEMMA, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 340 (1863).

MONOSIS, DC. Prod. v. 77 (1836).

PLECTRECA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 119 (1836).

POLYDORA, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312.

PUNDUANA, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 345 (1863).

STENGELIA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 26.

STENOCEPHALUM, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 385.

STROBOCALYX, Sch. Bip. l. c. xviii-xix. (1861) 170.

SUPRAGO, Gaertn. Fruct. ii. 402. t. 166 (1791).

VERNONIA:—

- TEICHOSTEMMA, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 (1814).
 TEPIROTHAMNUS, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 431.
 TRIANTHAEA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 39 (1841).
 TURPINIA, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 24 (1824).
 VERNONELLA, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 62.
 WEBBIA, DC. Prod. v. 72 (1836).
 XIPHOLEPIS, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 344 (1863).
abbreviata, DC. Prod. v. 25 = cinerea.
abyssinica, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 26, nomen; et in Walp. Rep. ii. 947.—Abyss. accedens, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 18.—Java.
Achyrocoma, Less. in Linnaea, iv. (1829) 313.—Am. bor.?
Acilepis, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 68.—Nicaragua.
acuminata, DC. Prod. v. 32 = volkameriaefolia.
acuminata, Less. in Linnaea, vi. (1831) 663.—Ind. occ.
acuminata, Willd. ex Less. l. c. iv. (1829) 284 = canescens.
acutangula, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 225.—Bras.
acutangula, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 123 = Piptocarpha macropoda.
acutifolia, Hook. Bot. Mag. t. 3062 = sericea.
adamantium, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 222.—Bras.
adenophylla, Mart. ex DC. Prod. v. 17.—Bras.
adenosticta, Fenzl, ex Walp. Rep. vi. 98 = amygdalina.
adoensis, Sch. Bip. ex Walp. l. c. ii. 946.—Abyss.
adproximata, Less. in Linnaea, vi. (1831) 655 = diffusa.
affinis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 39.—Peruv.
affinis, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 119, nomen (Quid?).—Malaya.
Alamani, DC. Prod. v. 61.—Mexic.
alata, Heyne, ex DC. l. c. 448 = Laggera alata.
albicans, DC. in Wight, Contrib. 6 = cinerea, chinensis.
albicanlis, Vahl, ex Pers. Syn. ii. 404 = longifolia.
albicola, Steud. Nom. ed. II. ii. 752, sphalm. = *alpicola*.
albiflora, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 224 = geminata.
albiflora, Rafin. Herb. 29 (Quid?).—Am. bor.
alpestris, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 55.—Bras.
alpicola, Mart. ex DC. Prod. v. 17 = Piptolepis buxoides.
altissima, Nutt. Gen. Am. ii. 134.—Am. bor.
altissima, Walp. Rep. ii. 540 = angustifolia.
amara, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 165 = Saussurea amara.
ambigua, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 35. t. 17 B.—Afr. trop.
ammophila, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 227.—Bras.
amygdalina, Delile, Cent. Pl. Mèroë, 41.—Afr. trop.
anceps, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 233.—Zeylan.
Andersonii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 27 = Cumingi-ana.
Andrieuxii, DC. Prod. v. 16 = Liabum Andrieuxii.
andromachioides, Less. in Linnaea, vi. (1831) 397 = Liabum andromachioides.
angulifolia, DC. Prod. v. 29.—Afr. austr.
angustifolia, D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 236 = nudiflora.
angustifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 94.—Am. bor.
anisochaetoides, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 61.—Afr. austr.
anthelmintica, Willd. Sp. Pl. iii. 1634.—Reg. Himal.
aphanantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 176.—Madag.
apiculata, Mart. ex DC. Prod. v. 51.—Bras.
apocynifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 175.—Madag.
appendiculata, Less. in Linnaea, vi. (1831) 636.—Madag.
approximata, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 23 = diffusa.
arabica, Decne. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 154 = atriplicifolia.

VERNONIA:—

- araneosa, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 32.—Bras.
 ararana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 227.—Bras.
 araripensis, Gardn. l. c. 222.—Bras.
 arborea, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1824) 218.—As. trop.
 arborescens, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 1320.—Ind. occ.
 Arbuscula, Less. in Linnaea, vi. (1831) 664.—Ins. Mauriti.
 arbutifolia, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 169, in obs.—Madag.
 arctioides, Less. in Linnaea, vi. (1831) 400.—Mexic.
 arcuata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 220 = linearis.
 arenaria, Gardn. l. c. 221 = grisea.
 arenaria, Mart. ex DC. Prod. v. 54.—Bras.
 argentea, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 108 = Hyalis argentea.
 argentea, Less. in Linnaea, vi. (1831) 672.—Bras.
 arguta, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 175.—Madag.
 argyropappa, Buek, Index ad DC. Prod. ii. Praef. p. v = Salzmanni.
 argyrophylla, Less. in Linnaea, vi. (1831) 627.—Bras.
 argyrotrichia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 96.—Bras.
 ariaefolia, Mart. ex DC. Prod. v. 30 = argyrophylla.
 aristata, Less. in Linnaea, iv. (1829) 313.—Hab.?
 aristata, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 130 = moluccensis.
 aristata, Sch. Bip. in Flora, xviii. (1844) 667 = natalensis.
 arkansana, DC. Prod. vii. 264.—Am. bor.
 Arnottiana, Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 20 = salvifolia.
 Aschenborniana, S. Schau. in Linnaea, xix. (1847) 714.—Mexic.
 Ascheronii, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 161.—Afr. trop.
 aspera, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1824) 219, partim = divergens, Roxburghii.
 aspera, DC. Prod. v. 31 = Roxburghii.
 aspera, Less. in Linnaea, vi. (1831) 643 = divergens?
 assans, Mart. ex DC. Prod. v. 38 = scabra.
 asteriflora, Mart. l. c. 29.—Bras.
 asterotrichia, Benth. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 124 = Piptocarpha opaca.
 asterotrichia, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 41. t. 247 = Piptocarpha asterotrichia.
 atriplicifolia, Fieb. & Spach, Illustr. iv. 94. t. 359.—Arab.
 attenuata, DC. Prod. v. 33.—Reg. Himal.; Burma.
 aurea, Mart. ex DC. l. c. 58.—Bras.
 auriculata, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 163.—Reg. Argent.
 aurifodinarum, Mart. ex DC. Prod. v. 48 = obscura.
 axillaris, Less. in Linnaea, iv. (1829) 256.—Bras.
 axillaris, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 418 = Piptocarpha macropoda.
 axilliflora, Mart. ex Less. in Linnaea, iv. (1829) 297 = V. Cotoneaster.
 baccharoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 40.—N. Granat.
 bahamensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 352.—Ins. Baham.
 Bainesii, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 272.—Afr. trop.
 Bakeri, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 119.—Madag.
 Baldwinii, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 211.—Am. bor.
 barbata, Less. in Linnaea, iv. (1829) 287.—Bras.
 barbinervis, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 297.—Mexic.
 bardanoides, Less. in Linnaea, vi. (1831) 669.—Bras.
 Baroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 173.—Madag.
 Beddomei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 231.—Ind. or.
 Benthamiana, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 282.—Afr. trop.
 Berteriana, DC. Prod. v. 52 = arborescens.
 Beyrichii, Less. in Linnaea, iv. (1829) 275.—Bras.
 Biafrae, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 270.—Afr. trop.
 bifrons, Vahl, ex Less. in Linnaea, v. (1830) 261 = Anastrophia ilicifolia.
 Bipontini, Vatke, l. c. xxxix. (1875) 478 = Lcopoldi.

VERNONIA:—

- Blanchetiana, DC. Prod. v. 20 = Piptocarpha Lundiana.
 blanda, DC. l. c. 32.—Burma.
 blandula, C. B. Clarke, Comp. Ind. 26 = praec.
 Blumeana, DC. Prod. v. 22 = arborea.
 blumeoides, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 198.—Afr. trop.
 Bojeri, Less. in Linnaea, vi. (1831) 676.—Afr. trop.
 Bolleana, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 297.—Mexic.
 borneensis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 16.—Borneo.
 Bottae, Fieb. & Spach, Illustr. iv. 92.—Arab.
 brachiata, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 67.—Costa Rica.
 brachylepis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 164.—Reg. Argent.
 brachyscypha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 178.—Madag.
 bracteata, Wall. Cat. n. 2921.—Reg. Himal.
 bracteolata, DC. Prod. v. 62 = subsessilis.
 brasiliensis, Less. in Linnaea, vi. (1831) 682 = Albertinia brasiliensis.
 brasiliensis, Mart. ex DC. Prod. v. 39 = polyanthes.
 brasiliensis, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 161 = Vanillosmopsis brasiliensis.
 brevifolia, Less. in Linnaea, iv. (1829) 285.—Bras.
 brevifolia, Rafin. New Fl. Am. iv. 77 (Quid?).—Am. bor.
 brevipetiolata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 85.—Bras.
 brunioides, Less. in Linnaea, iv. (1829) 248 = Lychno-phora brunioides.
 Buchingeri, Sch. Bip. ex Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 359.—Abyss.
 buddleiaefolia, Mart. ex DC. Prod. v. 45.—Bras.
 bullata, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 67.—Nicaragua.
 bupleurifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 87 = obtusata.
 Burchelliana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 209 = Piptolepis Oleaster.
 Burtoni, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 281.—Afr. trop.
 buxifolia, Less. in Linnaea, iv. (1829) 313.—Ins. S. Doming.
 buxoides, Less. l. c. 247 = Piptolepis buxoides.
 caducissima, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 73 = Salzmanni.
 callicephala, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 32 = V. Radula.
 Calvoana, Hook. f. Bot. Mag. t. 5698.—Afr. trop.
 calycina, Wall. Cat. n. 2924.—Burma.
 Camara, Liai, Brés. 627.—Bras.
 campestris, DC. Prod. v. 43 = desertorum.
 campestris, Mart. ex DC. l. c. 45 = grandiflora.
 cana, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. ii. (1847) 1216 = atriplicifolia?
 Candolleana, Wight & Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 346.—Ind. or.
 Candollei, DC. Prod. v. 21.—Bras.
 Candollei, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 119.—Madag.
 canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 35.—Peruv.
 canescens, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 667 = pinifolia.
 capitata, Less. in Linnaea, iv. (1829) 270 = Vanillosmopsis capitata.
 capitellata, DC. Prod. v. 20 = Piptocarpha leprosa.
 capituliflora, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 19.—Ins. Sunda.
 carbonaria, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 28 = megapotamica.
 carduoides, Baker, l. c. 34.—Bras.
 celebica, DC. Prod. v. 21 = arborea.
 centauroides, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 536, nomen.—Bolivia.
 centriflora, Link & Otto, Ic. Pl. Sci. 117. t. 55 = scorpioides.
 Cephalotes, DC. Prod. v. 57.—Bras.
 cernua, Boj. ex DC. l. c. vii. 24 (= Moquinia Bojeri).—Afr. trop.
 chalybaea, Mart. ex DC. l. c. v. 54.—Bras.
 Chamaedrys, Less. in Linnaea, iv. (1829) 259.—Bras.
 Chamaepeuces, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 31.—Bras.
 Chamissonis, Less. in Linnaea, iv. (1829) 304.—Bras.
 chilantha, Walp. l. c. xiv. (1840) 508.—Peruv.; Chili.
 chinensis, Less. l. c. vi. (1831) 105, 674.—Malaya; China.

VERNONIA:—

- chromolepis*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 224 = rubricaulis.
chrysophylla, Gardn. l. c. vi. (1847) 417 = obovata.
cincta, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 162.—Reg. Argent.
cinerascens, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 162.—Ind. bor. occ.; Abyss.
cinerea, Less. in Linnaea, iv. (1829) 291.—Amphig. trop.
cirsiflora, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 36 = bardanoides.
cirsiiifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 753 = Pacourina cirsiiifolia.
clarenceana, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 11 = Conyza clarenceana.
clavata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 220.—Bras.
clivorum, Hance, in Journ. Bot. vii. (1869) 164.—China.
Cockburniana, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 837.—Ins. Socotra.
coelestina, Schrad. ex DC. Prod. v. 62 = pauciflora.
cognata, Less. in Linnaea, vi. (1831) 670.—Bras.
collina, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 213 = mucronulata.
compacta, Gardn. l. c. 216.—Bras.
compactiflora, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 44.—Bras.
complanata, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 104 = densiflora.
complicata, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 143.—Cuba.
condensata, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 202.—Bras.
conferta, Benth. in Hook. Niger Fl. 427.—Afr. trop.
conferta, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 124 = Piptocarpha Riedelii.
congesta, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 487 = Inula Cappa.
conyzoides, DC. in Wight, Contrib. 6 = cinerea.
conyzoides, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 160 = Hookeriana.
conyzoides, Wight, l. c. 829 = Candolleana.
corcovadensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 218 = polyanthes.
cordata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 39.—Mexic.
cordiaefolia, H. B. & K. l. c. 38.—N. Granat.
cordifolia, Willd. ex Less. in Linnaea, iv. (1829) 267 = cordata.
cordigera, Mart. ex DC. Prod. v. 58.—Bras.
coriacea, Less. in Linnaea, vi. (1831) 661.—Bras.
corymbiformis, DC. Prod. v. 62.—Mexic.
corymbosa, Less. in Linnaea, vi. (1831) 647.—Afr. austr.
corymbosa, Schweinf. in Long, Exped. Winnep. ii. 394 = fasciculata.
corymbulosa, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 113 = viscidula.
Cotoneaster, Less. in Linnaea, iv. (1829) 298.—Bras.
Coulonii, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 93.—Bras.
crenata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 218 = ferruginea.
crenulata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 96 = ignobilis.
crinita, Rafin. New Fl. Am. iv. 77 (Quid?).—Am. bor.
crotonoides, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 166.—Bras.
cubensis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 144 = hieracioides.
cuiabensis, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 37.—Bras.
Cumingiana, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 232.—Reg. Himal.; China.
cuneata, Less. in Linnaea, vi. (1831) 644 = scandens.
cuneifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 215.—Bras.
cuspidata, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. v = volkameriaefolia.
cuspidata, Steud. Nom. ed. II. ii. 753 = arborea?
cyanonioides, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 509 = cinerea.
cyanopidea, Hochst. ex Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 161 = Aschersonii.
cyanopioides, Walp. Rep. ii. 541, sphalm. = cinerea.

VERNONIA:—

- cylindrica*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 374 = podocoma.
cylindrica, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 945.—Afr. trop.
cymosa, Blume, Bijdr. 894.—Java.
daphnoides, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 510.—Bras.
davalliaefolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 422 = obscura.
debilis, Mart. ex DC. Prod. v. 54 = V. Cotoneaster.
decantha, Sch. Bip. in Linnaea, xx. (1847) 512 = ehretifolia.
decumbens, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 115.—Bras.
decussata, Mart. ex DC. Prod. v. 58 = pycnostachya.
delapsa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 172.—Madag.
demulans, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 195.—Afr. trop.
dendigulensis, DC. Prod. vii. 263 = Candolleana.
densevillosa, Mart. ex DC. l. c. v. 43 = obovata.
densiflora, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 114.—Bras.
denticulata, DC. Prod. v. 36 = Beyrichii.
Deppiana, Less. in Linnaea, vi. (1831) 398.—Mexic.
desertorum, Mart. ex DC. Prod. v. 43.—Bras.
dichocarpa, Less. in Linnaea, iv. (1829) 269.—Mexic.
dichotoma, Sch. Bip. l. c. xxx. (1859-60) 173.—N. Granat.
diffusa, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 408 = cinerea.
diffusa, Less. in Linnaea, iv. (1829) 272.—Bras.
discolor, Less. l. c. 274.—Bras.
dissoluta, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 174.—Madag.
divaricata, Less. in Linnaea, iv. (1829) 306 = arborescens.
divaricata, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1319 = arborescens, acuminata.
divergens, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 172, nomen; Benth. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 14.—Ind. or.; Burma.
diversifolia, Boj. ex DC. Prod. v. 26.—Madag.
domingensis, DC. l. c. 30 = buxifolia.
Doniana, DC. l. c. 23.—Afr. trop.
Dregeana, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 947.—Afr. austr.
dura, Mart. ex DC. Prod. v. 59.—Bras.
Echinops, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. iv. II. 167 = Eremanthus sphaerocephalus.
echioides, Less. in Linnaea, iv. (1829) 278.—Bras.
echitifolia, Mart. ex DC. Prod. v. 60.—Bras.
edulis, Steud. Nom. ed. II. ii. 753 = Pacourina edulis.
Ehrenbergiana, Sch. Bip. in Linnaea, xx. (1847) 513.—Mexic.
ehretiaefolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 420 = varroniaefolia.
ehretifolia, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 39.—Guian.
elaegnifolia, DC. Prod. v. 22.—Burma.
elaegnoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 42 = Piptocarpha elaeagnoides.
elaegnoides, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 668 = Kraussii.
Elaeagnus, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 166 = Eremanthus Elaeagnus.
elegans, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 421.—Bras.
elliptica, DC. in Wight, Contrib. 5 = elaeagnifolia.
elongata, Willd. ex Less. in Linnaea, iv. (1829) 302 = gracilis.
emarginata, Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1827) 73 = rigida.
eminens, Bisch. Cat. Sem. Hort. Heidelb. (1847).—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 320.—Afr. bor.
ensifolia, Mart. ex DC. Prod. v. 53 = glabrata.
eremophila, Mart. ex DC. l. c. 54.—Bras.
ericaefolia, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 236 = brevifolia.
ericoides, Less. in Linnaea, iv. (1829) 247 (excl. syn.) = Piptolepis ericoides.
erigeroides, DC. Prod. v. 25 = cinerea.
Erigerontis, Mart. ex DC. l. c. 43 = simplex.
erioclada, DC. l. c. 44.—Bras.
erirolepis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 224.—Bras.

VERNONIA:—

- eriosematoides*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 254 = Inula Cappa.
erubescens, Hochst. ex Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 280 = Aschersonii.
Ervendbergii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 203.—Mexic.
erythrophila, DC. Prod. v. 57.—Bras.
erythrophiloides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 52 = praec.
estrellensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 215 = puberula.
eupatoriifolia, DC. Prod. v. 37.—Bras.
eupatorioides, Blume, Bijdr. 894.—Java.
exaltata, Hort. ex Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 14 = Verbesina sericea.
exilis, Mig. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 98.—China.
exsucca, Mart. ex DC. Prod. v. 85 = Eremanthus exsuccus.
extensa, DC. l. c. 33.—Reg. Himal.
extraxillaris, DC. l. c. 56 = linearis.
fagifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 216.—Bras.
farinosa, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 84.—Bras.
fasciculata, Blume, Bijdr. 893, in nota = cinerea.
fasciculata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 94.—Am. bor.
fastigiata, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 282.—Afr. trop.
ferruginea, Less. in Linnaea, iv. (1829) 271.—Bras.
filifolia, Mart. ex DC. Prod. v. 44 = brevifolia.
filigera, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 288.—Afr. trop.
fimbrillifera, Less. in Linnaea, iv. (1829) 313 (= Decaneurum fimbrilliferum).—Ins. Borbon.
firma, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 290.—Afr. trop.
firma, Mart. ex DC. Prod. v. 59 = dura.
flagellaris, Vatke, in Linnaea, xxxix. (1875) 479 = urticaefolia.
flavescens, Less. l. c. vi. (1831) 657 = scorpioides.
flexuosa, Sims, Bot. Mag. t. 2477.—Bras.
floccosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 225.—Bras.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 38.—Am. trop.
florida, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 212 = nitidula.
flotowioides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 81.—Bras.
foliosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 210.—Bras.
foliosa, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 161.—Mexic.
Fortunei, Sch. Bip. in Flora, xxxv. (1852) 48 = solanifolia.
fragrans, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 24.—Mexic.
Francavillana, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 296.—Afr. trop.
frangulaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 37.—N. Granat.
frondosa, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 294.—Afr. trop.
fruticosa, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1323 = rigida.
fruticulosa, Mart. ex DC. Prod. v. 53.—Bras.
fulva, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 164.—Reg. Argent.
fusco-pilosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 179.—Madag.
galamensis, Less. in Linnaea, iv. (1829) 314 = pauciflora.
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 161.—Zeylan.
Garnieriana, Klatt, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 508.—Madag.
Gaudichaudiana, DC. Prod. v. 21 = Piptocarpha umbellulata.
geminata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 35 = canescens.
geminata, Less. in Linnaea, iv. (1829) 303.—Bras.
geminiflora, Poepp. in Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 42 = Salzmanni.
gerberaeformis, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 285.—Afr. trop.
Gerrardi, Harv. Thes. Cap. ii. 36.—Afr. austr.
glabra, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 194.—Afr. trop.

VERNONIA:

- glabrata, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 294.—Bras.
 glandulosa, DC. *Prod.* v. 22.—Madag.
 glauca, Willd. *Sp. Pl.* iii. 1633 = noveboracensis.
 Glazioviana, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 41.—Bras.
 glomerata, Sch. Bip. in *Bot. Zeit.* iii. (1845) 155 = *Vanillosmopsis erythropappa*.
 glomerulifera, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 123 = seq.
 glomeruliflora, Walp. in *Linnaea*, xiv. (1840) 311 = *Piptocarpha macropoda*.
 glutinosa, DC. *Prod.* v. 18.—Madag.
 gnaphaliifolia, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 34.—Cuba.
 gnaphalioides, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 78.—Bras.
 gochnatioides, Hook. & Arn. ex DC. *Prod.* vii. 264.—Reg. Argent.
 Gomphrena, Walp. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 253.—China.
 gracilis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 34.—Am. trop.
 gracilis, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 465 = *Liatris gracilis*.
 graminifolia, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 421.—Bras.
 grandiflora, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 660.—Bras.
 grandifolia, DC. *Prod.* v. 39 = serrata.
 grandis, Boj. ex DC. l. c. 68 (= *Decaneurum grande*).—Madag.
 Grantii, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) 92.—Afr. trop.
 gratioia, Hance, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 290.—China.
 Greggii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 204.—Mexic.
 grisea, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 61.—Bras.
 Grisebachii, Sch. Bip. in *Journ. Bot.* i. (1863) 231.—Cuba.
 guineensis, Benth. in *Hook. Niger Fl.* 427.—Afr. trop.
 Haenkeana, DC. *Prod.* v. 37.—Peruv.
 hakeaefolia, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 249 = *Lychnophora hakeaefolia*.
 halimifolia, Mart. ex DC. *Prod.* v. 150 = *Eupatorium halimifolium*.
 Halimodendron, Mart. ex DC. l. c. 85 = *Eremanthus pycnocephalus*.
 havanensis, DC. l. c. 37.—Cuba.
 hebeclada, DC. l. c. 36 = *Westiniana*.
 hecatantha, DC. l. c. 53 = *coriacea*.
 Helferii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 231.—Burma.
 helophila, Mart. ex DC. *Prod.* v. 50.—Bras.
 heptantha, DC. l. c. 42.—Peruv.
 heterophylla, Poir. *Encyc. Suppl.* v. 465 = *Liatris scariosa*.
 hexantha, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 26.—Bras.
 hieracioides, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1862) 511.—Cuba.
 Hilaiana, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 113 = *petiolaris*.
 Hildebrandtii, Vatke, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 323 = *Gongrothamnus Hildebrandtii*.
 hirsuta, Sch. Bip. ex Walp. *Rep.* ii. 947.—Afr. austr.
 hirsutiflora, Poir. *Encyc.* viii. 502 = *Liatris pycnostachya*?
 hirtiflora, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 70.—Bras.
 Hochstetteri, Sch. Bip. ex Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 26.—Abyss.
 holosericea, Mart. ex DC. *Prod.* v. 43.—Bras.
 Hookeriana, Arn. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836) 346.—Zeylan.
 hoveaefolia, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 423.—Bras.
 hymenolepis, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 378.—Afr. trop.
 hymenolepis, Vatke, in *Linnaea*, xxxix. (1875) 477 = *filigera*.
 Hypochaeris, DC. *Prod.* v. 45.—Bras.
 hypoleuca, DC. l. c. 27.—Mexic.
 icosantha, DC. l. c. 49 = *arborescens*.
 ignobilis, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 658.—Bras.
 ilicifolia, Boj. ex Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 333 = *Iphiaea ilicifolia*.

VERNONIA:

- imbricata, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 209 = *Piptolepis imbricata*.
 immunis, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 163.—Reg. Argent.
 imponens, Mart. ex DC. *Prod.* v. 46 = *sericea*.
 inaequiserrata, Sch. Bip. in *Journ. Bot.* i. (1863) 232.—Cuba.
 incana, DC. *Prod.* v. 82, sphalm. = *Eremanthus incanus*.
 incana, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 277.—Bras.
 incanescens, Mart. ex DC. *Prod.* v. 82 = *Vanillosmopsis capitata*.
 inconspicua, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 65 = *helophila*.
 indica, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 753, sphalm. = *Veronica Anagallis*.
 indica, Wall. ex C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 16.—Ind. or.
 infundibularis, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 285.—Afr. trop.
 insignis, Oliver & Hiern, l. c. 292.—Afr. trop.
 interjecta, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 28.—Bras.
 intermedia, DC. *Prod.* v. 27.—Bras.
 inulaefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 180 = *Bakeri*.
 inulaefolia, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 753; et ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 375.—Abyss.
 inuloides, DC. *Prod.* v. 62.—Mexic.
 involucreta, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 246 = *pedunculata*.
 iodopappa, Sch. Bip. in *Bot. Zeit.* iii. (1845) 155 = *crotonoides*.
 isotrichia, DC. *Prod.* v. 18.—Bras.
 isotrichia, Mart. in *Flora*, xx. (1837) II. Beibl. 126 = *Piptocarpha umbellulata*.
 jaceaeoides, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 376 = *purpurea*.
 Jamesii, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* ii. 58.—N. Mexic.
 javanica, DC. *Prod.* v. 22 = *arborescens*.
 jugalis, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 270.—Afr. trop.
 karaguensis, Oliver & Hiern, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) 91.—Afr. trop.
 Karstenii, Sch. Bip. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 169.—N. Granat.
 Karwinskiana, DC. *Prod.* v. 62.—Mexic.
 Karwinskiana, Hort. ex Kunth, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1848) 14 = *Verbesina sericea*.
 Kingii, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 12 = *clivorum*.
 Kirkii, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 274.—Afr. trop.
 Koestlinii, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 26 = *Hochstetteri*.
 Kotschyana, Sch. Bip. ex Walp. *Rep.* ii. 947.—Afr. trop.
 Kotschyi, Sch. Bip. ex Schweinf. *Beitr. Fl. Aethiop.* 287 = *praece.*?
 Kraussii, Sch. Bip. ex Walp. *Rep.* ii. 947.—Afr. austr. et trop.
 Kroneana, Miq. in *Journ. Bot. Néerl.* i. (1861) 98.—China.
 Kursii, C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 24 = *solanifolia*.
 lacunosa, Mart. ex DC. *Prod.* v. 56.—Bras.
 laevigata, Mart. ex DC. l. c.—Bras.
 lanceolaris, DC. l. c. 37.—Mexic.
 lanuginosa, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 219 = *scorpioides*.
 lappoides, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 35.—Bras.
 latifolia, Lem. *Illustr. Hort.* ii. (1855) Misc. 39 = *argyrophylla*.
 laurifolia, DC. *Prod.* v. 30.—Bras.
 laxa, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 214.—Bras.
 laxiflora, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 646 = *cinerea*.
 Lechleri, Sch. Bip. in *Bonplandia*, iii. (1855) 236.—Peruv.
 Leiboldiana, Schlecht. in *Linnaea*, xix. (1847) 742.—Mexic.
 leiocarpa, DC. *Prod.* v. 34.—Mexic.
 Leopoldi, Vatke, in *Linnaea*, xxxix. (1875) 478.—Afr. trop.
 lepidota, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 145.—Cuba.
 leprosa, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 252 = *Piptocarpha leprosa*.

VERNONIA:

- leptoclada, Sch. Bip. in *Journ. Bot.* i. (1863) 233.—Cuba.
 leptophylla, DC. in *Wight, Contrib.* 6 = *cinerea*.
 leptospermoides, Mart. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 143 = *Piptolepis ericoides*.
 leptospermoides, Mart. ex DC. *Prod.* v. 17 = *Piptolepis leptospermoides*.
 Lessingiana, Mart. ex DC. l. c. 60 = *barbata*.
 lessingoides, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 92.—Bras.
 Lettermanni, Engelm. ex A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 78.—Am. bor. occ.
 leucophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 176.—Madag.
 liatroides, DC. *Prod.* v. 34.—Mexic.
 liatroides, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 181, (excl. syn.) = *Ervendbergii*.
 ligulaefolia, Mart. ex DC. *Prod.* v. 45.—Bras.
 lilacina, Mart. ex DC. l. c. 48.—Bras.
 linariaefolia, DC. l. c. 28 = *psilophylla*.
 linarifolia, DC. l. c. 57, sphalm. = *linearifolia*.
 Lindbergii, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 105.—Bras.
 Lindheimeri, Gray & Engelm. in *Proc. Am. Acad.* i. (1848) 46.—Texas.
 linearifolia, Hook. & Arn. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 237 = *intermedia*.
 linearifolia, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 287.—Bras.
 linearis, D. Don, ex Hook. & Arn. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 237 = *rubricaulis*.
 linearis, Spreng. *Syst.* iii. 437.—Bras.
 linifolia, Blume, *Bijdr.* 893 = *cinerea*.
 lithospermoides, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 66.—Bras.
 Livingstoniana, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 295.—Afr. trop.
 Lobbi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 231.—Burma.
 lobelioides, Wall. *Cat. n.* 2927 = *Ainsliaea pteropoda*.
 longeracemosa, Mart. ex DC. *Prod.* v. 42 = *scorpioides*.
 longicaulis, DC. l. c. 33 = *saligna*.
 longifolia, Pers. *Syn.* ii. 404.—Ind. occ.
 lucida, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 260.—Bras.
 Lundiana, Less. l. c. vi. (1831) 631 = *Piptocarpha Lundiana*.
 Luschmuthiana, Walp. l. c. xiv. (1840) 312 = *Piptocarpha Lundiana*.
 Lyallii, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 174.—Madag.
 macranthele, Mart. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 83 = *elegans*.
 macrocephala, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 298.—Bras.
 macrocephala, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 377 = *adoensis*.
 macrophylla, Boj. ex DC. *Prod.* v. 27 = *appendiculata*.
 macrophylla, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 668.—Bras.
 macropoda, DC. *Prod.* v. 19 = *Piptocarpha macropoda*.
 madagascariensis, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 644.—Madag.
 malabarica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 230.—Ind. or.
 Mandonii, Sch. Bip. in *Linnaea*, xxxiv. (1865–66) 534, nomen.—Bolivia.
 Mannii, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 198 = *Inula Mannii*.
 Mansoana, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 84.—Bras.
 marginata, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 278.—Afr. trop.
 marginata, Rafin. *Atl. Journ.* 146 (Quid?).—Am. bor.
 Mariana, Mart. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 107.—Bras.
 Marrubiastrum, Mart. ex Baker, l. c. 77 = *lacunosa*.
 Martiana, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 210 = *Piptolepis Martiana*.
 megapotaamica, Spreng. *Syst.* iii. 437.—Bras.
 melanopappa, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. II. 28 = *megapotaamica*.
 Melleri, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 282.—Afr. trop.
 membranacea, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 217 = *rufigoma*.
 menthaefolia, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 268.—Cuba.
 Merana, Baker, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 139.—Madag.
 mespillifolia, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 641.—Afr. austr.

VERNONIA :—

- Metziana*, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 234 = divergens.
mexicana, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 680.—Mexic.
micans, Benth. Pl. Hartw. 196 = *Piptocarpha elaeagnoides*.
micradenia, DC. Prod. v. 38.—Am. austr.
micrantha, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 37 = canescens.
microcephala, DC. Prod. v. 39.—Am. trop.
microdonta, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 76 = glabrata.
Miersiana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 115 = Salzmanni.
misera, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 278.—Afr. trop.
missionis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 422.—Bras.
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 36.—Am. austr.
mollissima, D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 237.—Reg. Argent.
moluccensis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 19.—Ins. Molucc.
monocephala, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 418.—Bras.
monocephala, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 53.—Afr. austr.
Monosis, Benth. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 24 = arborea.
Monosis, Sch. Bip. in *Linnaea*, xx. (1847) 507.—Mexic.
montana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 234, sphalm. = cinerea.
montevidensis, Nees, ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 229.—Reg. Argent.
monticola, Mart. ex DC. Prod. v. 18.—Bras.
moquinioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 177.—Madag.
moquinioides, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 116 = mucronulata.
Moramballae, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 278.—Afr. trop.
Moritziana, Sch. Bip. in *Linnaea*, xx. (1847) 511.—Venezuela.
mossambiquensis, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 292.—Afr. trop.
mucronifolia, DC. Prod. v. 55.—Bras.
mucronulata, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 266.—Bras.
multiflora, Less. l. c. vi. (1831) 642 = divergens?
multiflosculosa, Mart. ex DC. Prod. v. 50 = macrophylla.
muricata, DC. l. c. 55.—Bras.
myriantha, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 198.—Afr. trop.
myriocephala, DC. Prod. v. 40.—Peruv.?
myriocephala, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 374.—Abyss.
natalensis, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 947.—Afr. austr.
neilgherryensis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 160 = setigera.
nemoralis, Thw. l. c. 161.—Zeylan.
neriifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 217 = ruficoma.
nigrescens, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 28 = megapota mica.
nigritiana, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 288.—Afr. trop.
nilgherryensis, DC. Prod. v. 32 = divergens.
nitens, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 221.—Bras.
nitens, Steud. Nom. ed. I. 875 = arborescens.
nitidula, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 260.—Bras.
notata, Less. l. c. 256 = *Piptocarpha notata*.
noveboracensis, Willd. Sp. Pl. iii. 1632.—Am. bor.
nudicaulis, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 637.—Madag.
nudiflora, Less. l. c. iv. (1829) 258.—Bras.
Nyassae, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1349.—Afr. trop.
oaxacana, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 74.—Mexic.
obconica, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 286.—Afr. trop.
oblonga, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 211 = *Piptocarpha oblonga*.
oblonga, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 416 = *Piptocarpha axillaris*.
oblongifolia, Pohl, ex Mart. in Flora, xxiv. (1841) 11. Beibl. 107 = Riedelii, geminata.
obovata, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 279.—Bras.
obscura, Less. l. c. 296.—Bras.

VOL. II.

VERNONIA :—

- obtusata*, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 662.—Bras.
obtusifolia, Less. l. c. iv. (1829) 308.—Bras.
ochroleuca, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 179.—Madag.
octangularis, Meyen, Reise, i. 444 = *Baccharis Meyeniana*.
octantha, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 87.—Bras.
odoratissima, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 41 = scabra.
Oleaster, DC. Prod. v. 17 = *Piptolepis Oleaster*.
Oleaster, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 210 = *Piptolepis Gardneri*.
oligactoides, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 648.—Bras.
oligocephala, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 63 = revoluta.
oligocephala, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 420 = aurea.
oligocephala, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 947 = Kraussii.
oligolepis, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 56.—Bras.
oligophylla, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 94.—Am. bor.
onopordioides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 36.—Bras.
opaca, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 39 = *Piptocarpha opaca*.
oppositifolia, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 273.—Bras.
Ottonis, Sch. Bip. l. c. xx. (1847) 508.—Cuba.
ovalifolia, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 59 = noveboracensis.
ovata, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 294.—Bras.
oxylepis, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 70.—Bras.
oxyphylla, DC. Prod. v. 19 = *Piptocarpha oxyphylla*.
pachyclada, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 178.—Madag.
pacchensis, Benth. Pl. Hartw. 134.—Peruv.
palensis, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 161.—Mexic.
paludosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 113.—Bras.
palustris, Gardn. l. c. v. (1846) 215 = serrata.
pandurata, Hort. Vindob. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 296.—Afr. trop.
paniculata, DC. Prod. v. 23.—Mexic.
paradoxa, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 432, in syn.—Venezuela.
Parishii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 240.—Burma.
parviflora, Klatt, in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 508.—Madag.
parviflora, Reinw. ex Blume, Bijdr. 893 = cinerea.
patens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 41.—Am. austr.
patens, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 276, partim = polyanthes.
patula, Mart. ex DC. Prod. v. 55 = remotiflora.
pauciflora, Boj. ex DC. Prod. v. 18 = glutinosa.
pauciflora, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 292.—Afr. trop.
pauciflora, Poir. Encyc. Suppl. v. 465 = *Liatri pauciflora*.
Paulina, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 754 = psilophylla.
pectinata, DC. Prod. v. 31.—Ind. or.
pectiniformis, DC. in Wight, Contrib. 6.—Ind. or.
pectoralis, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 139.—Madag.
pedunculata, DC. Prod. v. 16.—Bras.
peguensis, C. B. Clarke, Comp. Ind. 13.—Burma.
pellita, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 36.—Venezuela.
pellucida, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 128 = *Piptocarpha pellucida*.
peninsularis, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 233.—Ind. or.
pentacantha, DC. Prod. v. 30 = seq.
pentacantha, DC. l. c. 696.—Bras.
Perrottetii, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 947.—Afr. trop.
persicifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 400 = sericea.
Petersii, Oliver & Hiern, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873) 90.—Afr. trop.
petiolaris, DC. Prod. v. 37.—Bras.
Petitiana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 373 = pauciflora.

VERNONIA :—

- philippinensis*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 312.—Ins. Philipp.
phylicaeformis, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 252.—Peruv.
physalifolia, DC. in Wight, Contrib. 6 = cinerea.
Pinaster, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 249 = *Lychnophora ericoides*.
pinguis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 165.—Reg. Argent.
pinifolia, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 257.—Afr. austr.
piptocarphoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 177.—Madag.
plantaginifolia, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 251 = *Eremanthus plantaginifolius*.
plantaginoides, DC. Prod. v. 27, in syn. = squarrosa.
platensis, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 312.—Bras.
platycephala, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 212 = *Albertinia brasiliensis*.
plumbaginifolia, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312.—Afr. trop.
podocoma, Sch. Bip. ex Schweinf. & Aschers. in Beitr. Fl. Aethiop. 287, nomen; et Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 296.—Afr. trop.
Poeppigiana, DC. Prod. v. 20 = *Piptocarpha Poeppigiana*.
Poeppigiana, DC. l. c. 55 = Salzmanni.
Pohliana, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 113 = cuneifolia.
polyantha, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = seq.
polyanthes, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 651.—Bras.
polycephala, DC. Prod. v. 39 = ferruginea.
polygalaefolia, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 628.—Madag.
polygalaefolia, Licht. ex Less. Syn. Comp. 200 = *Iphia polygalifolia*.
polymorpha, Vatke, in *Linnaea*, xxxix. (1875) 476 = abyssinica, tigrensis, adoënsis, mossambiquensis.
polyphylla, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 63.—Bras.
polytricholepis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 415.—Madag.
populifolia, Spreng. Syst. iii. 434.—Ins. Maurit.
Poskeana, Vatke & Hildeb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 324.—Afr. trop.
praecalta, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 95, partim; et DC. Prod. v. 63, partim = altissima.
praecalta, Willd. Sp. Pl. iii. 1633 = noveboracensis.
procumbens, Boj. ex DC. Prod. v. 18 = polygalaefolia.
profuga, De Not. Ind. Sem. Hort. Genuen. (1840).—Cf. *Linnaea*, xv. (1841) Litt. 92.—Amer.?
prolifera, Decue. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 408.—Ins. Timor.
proteaeformis, Less. in *Linnaea*, iv. (1829) 249 = *Lychnophora ericoides*.
Proteopsis, DC. Prod. v. 16 = *Proteopsis argentea*.
Pseudomyrtus, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 94, 367 = *Piptolepis buxoides*.
psilophylla, DC. Prod. v. 28.—Bras.
psilostachya, DC. l. c. 43.—Bras.
psittacorum, DC. l. c. 36 = polyanthes.
pterocaulon, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 77.—Reg. Argent.
pteropoda, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 283.—Afr. trop.
puberula, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 649.—Bras.
pulverulenta, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 42.—Bras.
pumila, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 37. t. 17 A.—Afr. trop.
punctata, Sw. ex Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1827) 72 = longifolia.
puncticulata, DC. Prod. vii. 264 = pectiniformis.
punduana, DC. l. c. v. 32 = *volkameriaefolia*.
pungens, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 418.—Bras.
purpurascens, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 945.—Mexic.
purpurea, Sch. Bip. ex Walp. l. c. 946.—Afr. trop.
pycnantha, Benth. Pl. Hartw. 134.—Peruv.
pycnocephala, Mart. ex DC. Prod. v. 85 = *Eremanthus pycnocephalus*.
pycnostachya, DC. l. c. 58.—Bras.
pyrifolia, DC. l. c. 19 = *Piptocarpha pyrifolia*.
pyrifolia, D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238.—Am. austr.
quadriflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 173.—Madag.

7 M

VERNONIA:—

- Quartiniana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 379.—Abyss.
quercifolia, Vathe, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvii.
 (1877) 194 = senegalensis.
quindecimflora, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865–66)
 535, nomen.—Bolivia.
quinqueflora, *Less. l. c.* vi. (1831) 656.—Bras.
racemosa, *Delponte, in Mem. Acc. Torin.* Ser. II.
 xiv. (1854) 396.—Ins. S. Doming.
Radula, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847)
 428 = carduoides.
Radula, *Mart. ex DC. Prod.* v. 52.—Bras.
ramiflora, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 255 = Piptocarpha
Sellowii.
reflexa, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846)
 223.—Bras.
Reinwardtiana, *De Vriese & Miq. ex Miq. Fl. Ind.*
Bat. ii. 15.—Ins. Celebes.
remotiflora, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i.
 (1792) 112 (err. typ. 105).—Bras.
resinosa, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847)
 419 = fruticulosa.
reticulata, *Gardn. l. c.* v. (1846) 226 = bardanoides.
reticulata, *Willd. ex Less. in Linnaea*, v. (1829) 284
 = canescens.
revoluta, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1824)
 218.—Reg. Himal.
rhaponticoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888)
 180.—Madag.
Rheedii, *Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl.* ii. 641 (Quid?).
 —Ind. or.
rhodolepis, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 139.—
 Madag.
rhomboidea, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 62
 = cinerea.
Riedeliana, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v.
 (1846) 213 = Stilpnopappus bicolor.
Riedelii, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 64.—Bras.
rigida, *Sw. Fl. Ind. Occ.* iii. 1322.—Ind. occ.
rigida, *Wall. Cat. n.* 2925 = teres.
rigiophylla, *DC. Prod.* v. 15 = teres.
rigiophylla, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi.
 II. 118.—Bras.
riparia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 230, sphalm. = teres.
rosea, *Mart. ex DC. Prod.* v. 59.—Bras.
rosmarinifolia, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 286.—Bras.
Rothii, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii.
 293.—Afr. trop.
rotundifolia, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 254 =
 Piptocarpha rotundifolia.
Roxburghii, *Less. l. c.* vi. (1831) 674.—Reg. Himal.
ruboides, *Less. l. c.* iv. (1829) 290.—Bras.
rubricaulis, *Humb. & Bonpl. Pl. Aequin.* ii. 66. t. 99.
 —Am. trop.
rubricaulis, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 299, partim =
 squarrosa.
rubiramea, *Mart. ex DC. Prod.* v. 38.—Bras.
Rueppellii, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* ii. 946.—Abyss.
ruficoma, *Schlecht. ex Mart. in Flora*, xxiv. (1841) II.
Beibl. 110, nomen; et ex *Baker, in Mart. Fl. Bras.*
 vi. II. 105.—Bras.
rufogrisea, *A. St. Hil. Voy. Distr. Diam.* ii. 306, 453.
 —Bras.
Rugeliana, *Shuttl. ex A. Gray, Pl. Wright.* i. 82 =
 noveboracensis.
rugosa, *Blume, Bijdr.* 894.—Java.
rugulosa, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 83.—Bras.
rupestris, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv.
 (1845) 114.—Bras.
Sagraana, *DC. Prod.* v. 55 = rigida.
salicifolia, *Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot.*
Mag. i. (1835) 237 = rubricaulis.
salicifolia, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 249 = Lychno-
 phora salicifolia.
salicifolia, *Sch. Bip. l. c.* xx. (1847) 507.—Mexic.
saligna, *DC. Prod.* v. 33.—Reg. Himal.; Burma.
salvifolia, *Wight, Ic. t.* 1079.—Ind. or.
Salviniae, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 73.—
 Guatemala
Salzmanni, *DC. Prod.* v. 55.—Bras.
Sancti-Antonii, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.*
 vi. II. 66 = adamantium.
Sarmentiana, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v.
 (1846) 221 = arenaria.
saxicola, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 81.—Bras.

VERNONIA:—

- scaberrima*, *Nutt. Gen. Am.* ii. 134 = angustifolia.
scabra, *Pers. Syn.* ii. 404.—Bras.
scandens, *DC. Prod.* v. 32.—Reg. Himal.; Burma.
scandens, *Less. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 124
 = Piptocarpha Riedelii.
scapigera, *Baker, l. c.* 55.—Bras.
scapigera, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 250 = Ereman-
 thus scapigerus.
scariosa, *Arn. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836) 346.
 —Zeylan.
scariosa, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 169.—
 Madag.
scariosa, *Poir. Encyc.* viii. 502 = Liatris scariosa.
Schaffneri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882)
 204.—Mexic.
Schiedeana, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 399, 663.—
 Mexic.
Schimperi, *DC. Prod.* vii. 264.—Arab.
Schimperi, *Sch. Bip. ex Hochst. in Flora*, xxiv. (1841)
 I. Intell. 26 = inulaefolia.
Schlechtendaliana, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.*
 vi. II. 41 = ligulaefolia.
Schomburgkiana, *Sch. Bip. in Linnaea*, xx. (1847) 509
 = ehretifolia.
Schultzii, *Karst. ex Sch. Bip. l. c.* xxx. (1859–60) 168.
 —N. Granat.
Schweinfurthii, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop.*
Afr. iii. 285.—Afr. trop.
Schwaenitzii, *Steud. Nom. ed.* II. ii. 755 = fasciculata.
schwenkiaefolia, *Mart. ex DC. Prod.* v. 44.—Bras.
sclearaeifolia, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxx. (1859–60)
 170.—N. Granat.
scorpioides, *Pers. Syn.* ii. 404.—Am. trop.
sechellensis, *Baker, Fl. Maurit.* 162.—Ins. Sey-
 chelles.
secunda, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 93.—Bras.
secundifolia, *Boj. ex DC. Prod.* v. 22.—Madag.
Seemanniana, *Steetz, in Seem. Bot. Voy. Herald*, 139.
 —Panama.
Sellowii, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 301.—Bras.
senecioides, *Mart. ex DC. Prod.* v. 54 = cognata.
senegalensis, *Desf. Cat. Hort. Par. ed.* III. 400 =
 pauciflora.
senegalensis, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 265; vi.
 (1831) 641.—Afr. trop.
senescens, *Mart. ex DC. Prod.* v. 59 = barbata.
sericea, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792)
 112 (err. typ. 105).—Bras.
serrata, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 275.—Bras.
serratuloides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 33.—
 Mexic.
serrulata, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 22 = puberula.
sessiliflora, *Willd. ex Less. in Linnaea*, iv. (1829) 309
 = remotiflora.
sessilifolia, *Less. l. c.* vi. (1831) 659.—Bras.
setigera, *Arn. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836) 345.
 —Zeylan.
shirensis, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii.
 291.—Afr. trop.
simplex, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 280.—Bras.
Sinclairi, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 109.—Mexic.
sinulata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 18.—Java.
Smithiana, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 638.—Afr.
 trop.
solanifolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i.
 (1842) 486.—Burma; China.
solidaginifolia, *Boj. ex DC. Prod.* v. 30 = Gongro-
 thamnus solidaginifolius.
somalensis, *Franch. in Revoil, Çomali*, 34.—Afr.
 trop.
sordida, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 107 = mariana.
Sorocabae, *Sch. Bip. ex Baker, l. c.* 58 = oligac-
 toides.
sororia, *DC. Prod.* v. 40 = scorpioides.
sparsiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 172.
 —Madag.
spathulaefolia, *Mart. ex DC. Prod.* v. 83 = Eremanthus
 plantaginifolius.
spathulata, *Hochst. ex Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl.*
Aethiop. 162 = cinerascens.
spathulata, *Sch. Bip. ex Aschers. in Schweinf. l. c.*, in
 nota = atriplicifolia.
speciosa, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 290 = Stilpnopappus
 patulus.

VERNONIA:—

- sphaeroidea*, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii.
 (1841) 283 = Baldwini.
Spixiana, *Mart. ex DC. Prod.* v. 53.—Bras.
splendens, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 252 = Pipto-
 carpha lucida.
Sprengeliana, *Sch. Bip. in Journ. Bot.* i. (1863) 232.
 —Ins. S. Doming.
squamosa, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi.
 (1847) 419 = buddleiaefolia.
squamulosa, *Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.*
 ii. (1836) 44.—Reg. Argent.
squarrosa, *Baill. Hist. Pl.* viii. 296 = Serratula Scor-
 dium.
squarrosa, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 627 = teres.
squarrosa, *Less. l. c.* 678.—Bras.
staavioides, *Less. l. c.* iv. (1829) 249 = Lychnophora
 staavioides.
Stachyanthus, *Mart. ex DC. Prod.* v. 84 = Eremanthus
 Martii.
staehelinoides, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 75 = linearis.
stahelinoides, *Harv. Thes. Cap.* ii. 36.—Afr. austr.
Steetziana, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*
 iii. 273.—Afr. trop.
Steetzii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald*, 297.—
 Mexic.
stellaris, *La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg.*
Desc. fasc. i. 23.—Mexic.
stenocephala, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 1349.—Afr.
 trop.
stenophylla, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 667.—Ins.
 S. Doming.
stictophylla, *Wright, in Sawv. Fl. Cub.* 74.—Cuba.
stoechadifolia, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* vi. 98 =
 Perrottetii.
Stoechas, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 49.—Bras.
streptoclada, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885)
 416.—Madag.
stricta, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846)
 219.—Bras.
suaveolens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 38.—
 N. Granat.
subcordata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v.
 (1846) 226 = helophila.
subrepanda, *Pers. Syn.* ii. 404 = scorpioides.
subsessilis, *DC. Prod.* v. 62.—Ind. or.
subsessilis, *Walp. in Linnaea*, xiv. (1840) 312 = dnra?
subsimplex, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 535.—Sumatra.
subsquarrosa, *DC. Prod.* v. 41 = geminata.
subulata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 108.—
 Bras.
subverticillata, *Sch. Bip. ex Baker, l. c.* 99.—Bras.
Sutherlandii, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 52.
 —Afr. austr.
syncephala, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.*
 vi. II. 64.—Bras.
talaumifolia, *Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke,*
Comp. Ind. 25.—Reg. Himal.
tanalensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881)
 271.—Madag.
tarchonanthifolia, *Sch. Bip. in Linnaea*, xx. (1847)
 507.—Mexic.
Tenoreana, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873)
 92.—Afr. trop.
teres, *Wall. Cat. n.* 2926.—Reg. Himal.; Burma.
tereticaulis, *DC. Prod.* v. 20 = Piptocarpha tereti-
 caulis.
terniflora, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 633.—Madag.
Teysmanniana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 14.—Java.
theophrastifolia, *Schweinf. ex Oliver & Hiern, in*
Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 294.—Afr. trop.
Thomae, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*
 (1852) 66.—Ins. S. Thomas.
Thomsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 232.—Burma.
Thomsoniana, *Oliver & Hiern, ex Oliver, in Trans.*
Linn. Soc. xxix. (1873) 91.—Afr. trop.
Thwaitesii, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 11.—Zeylan.
tigrensii, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii.
 290.—Afr. trop.
toluccana, *DC. Prod.* v. 30.—Mexic.
tomentella, *Mart. ex DC. l. c.* 59.—Bras.
tomentosa, *Ell. Sketch.* ii. 288 = noveboracensis.
tomentosa, *Sinning, in Nees & Sinning, Amoen. Hort.*
Bonn. ii. (1824) 10. t. 5 = arborescens.
tournefortioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 34 =
 scorpioides.

VERNONIA :—

- tragiaefolia, *DC. Prod.* v. 60.—Bras.
 travancorica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 240.—Ind. or.
 triantha, *S. Schau. in Linnaea*, xix. (1847) 714.—
 Mexic.
 tricephala, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v.
 (1846) 223.—Bras.
 trichantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885)
 416.—Madag.
 trichocarpha, *Spreng. Syst.* iii. 437 = *Lychnophora*
trichocarpha.
 tricholepis, *DC. Prod.* v. 54 = *remotiflora*.
 tricholepis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 354 = *arari-*
ensis.
 trifoluculosa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 40.—
 Mexic.
 triplinervia, *Spreng. Syst.* iii. 435 = *Baccharis tripli-*
nervis.
 turbinata, *Oliver & Hiern, ex Oliver, in Trans. Linn.*
Soc. xxix. (1873) 90. t. 56. f. B.—Afr. trop.
 Tweedleana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 99.—
 Reg. Argent.
 umbellata, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 255 = *Pipto-*
carpha ramiflora.
 uncinata, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*
 iii. 277.—Afr. trop.
 undulata, *Oliver & Hiern, l. c.* 276.—Afr. trop.
 undulata, *Steud. Nom. ed. II. ii. 753*, in syn., sphalm.
 = *Veronica Anagallis*.
 uniflora, *Sch. Bip. in Linnaea*, xx. (1847) 506.—
 Mexic.
 unionis, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* ii. 945.—Abyss.
 urticaefolia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 378.—
 Abyss.
 vagans, *DC. Prod.* v. 32 = *scandens*.
 Vahlana, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 306 = *longi-*
folia.
 Valenzuelana, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 33.—
 Cuba.
 varroniaefolia, *DC. Prod.* v. 56.—Bras.
 Vauthierana, *DC. l. c.* 21 = *Piptocarpha Vauthieriana*.
 venosissima, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.*
 vi. II. 30.—Bras.
 vepretorum, *Mart. ex DC. Prod.* v. 59.—Bras.
 verbascifolia, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 310.—
 Bras.
 verbascoides, *Walp. l. c.* xiv. (1840) 313.—Bras.
 verbenacea, *DC. Prod.* v. 35 = *ignobilis*.
 Vernonella, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 53.—
 Afr. austr.
 vepretorum, *Steud. Nom. ed. II. ii. 755*, sphalm. =
vepretorum.
 vestita, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 83.—Bras.
 vialis, *DC. Prod.* v. 25.—Madag.
 villosissima, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 249 = *Lychno-*
phora villosissima.
 vindex, *Mart. ex DC. Prod.* v. 160 = *Eupatorium*
vindex.
 violacea, *Oliver & Hiern, ex Oliver, in Trans. Linn.*
Soc. xxix. (1873) 91.—Afr. trop.
 virens, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II.
 71.—Bras.
 virgulata, *Mart. ex DC. Prod.* v. 42.—Bras.
 viscidula, *Less. in Linnaea*, iv. (1829) 289.—Bras.
 Vogeliana, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 427.—Afr.
 trop.
 Vogeliana, *Thoms. in Speke, Journ. App.* 637 = *Thom-*
soniana.
 volkameriaefolia, *Bedd. Fl. Sylv.* t. 225 = *travan-*
corica.
 volkameriaefolia, *DC. Prod.* v. 32.—Reg. Himal.;
 Burma.
 voluta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 415.
 —Madag.
 vulgaris, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 240, sphalm. =
volkameriaefolia.
 Walpersiana, *Steud. Nom. ed. II. ii. 755* = *dura*?
 Warmingiana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 68.—
 Bras.
 Westiniana, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 650.—Bras.
 Wightiana, *Arn. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836)
 345.—Zeylan.
 Wightiana, *Wall. Cat. n.* 2923 = *Laggera alata*.
 Wrightii, *Sch. Bip. in Journ. Bot.* i. (1863) 234.—
 Cuba.
 xanthophylla, *Mart. ex DC. Prod.* v. 58.—Bras.
 zanzibarensis, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 637.—
 Afr. trop.

VERNONIA :—

- zeylanica, *Less. l. c.* iv. (1829) 344.—Zeylan.; Madag.
Zollingeriana, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.*
 119 = *cinerea*.
 zollingerianoides, *Sch. Bip. l. c.*, nomen.—Java?
 Zuccariniana, *Mart. ex DC. Prod.* v. 55.—Bras.

VERONICA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).

- SCROPHULARINEAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 964.
 AGERELLA, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.*
 xvii. (1869) 129.
 AIDELUS, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 17 (1827).
 ALLOPLEIA, *Rafin. Med. Fl. ii.* 109 (1830).
 AZURINIA, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.*
 xvii. (1869) 128.
 BECCABUNGA, *Fourn. l. c.* (1869).
 CALISTACHYA, *Rafin. in Med. Repos. N. York, II.*
 v. (1808) 60, 352.
 CARDIA, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 387 (1867).
 COCHLIDIOSPERMUM, *Reichb. Consp.* 121 (1828).
 COERULINIA, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.*
 xvii. (1869) 128.
 CYMBOPHYLLUM, *F. Mucll. in Hook. Kew Journ.*
 vii. (1856) 202.
 DERWENTIA, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 55 (1836).
 DIPLOPHYLLUM, *Lehm. in Ges. Naturf. Fr. Berl.*
 Mag. viii. (1814) 310.
 EUSTACHIA, *Rafin. Cat.* 14 (1824).
 HEBE, *Comm. ex Juss. Gen.* 105 (1789).
 HEDYSTACHYS, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon,*
N. S. xvii. (1869) 128.
 LEPTANDRA, *Nutt. Gen. Am. i.* 7 (1818).
 LIMNASPIDIUM, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon,*
N. S. xvii. (1869) 128.
 ODICARDIS, *Rafin. Fl. Tellur. iv.* 55 (1836).
 OMPHALOSPORA, *Bartl. Ord.* 171 (1830).
 PANOXIS, *Rafin. Med. Fl. ii.* 109 (1830).
 PETRODORA, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.*
 xvii. (1869) 128.
 POCILLA, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.*
 xvii. (1869) 129.
 PONARIA, *Rafin. Med. Fl. ii.* 109 (1830).
 PSEUDOLYSIMACHION, *Opiz, Seznam,* 80 (1852).
 PYGMAEA, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 217
 (1864).
 URANOSTACHYS, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon,*
N. S. xvii. (1869) 128.
 VERONICASTRUM, *Heist. ex Fabr. Hort. Helmst.*
 111 (1759).
 VERONICELLA, *Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon,*
N. S. xvii. (1869) 128.
 abrotanifolia, *Link, ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 755
 (Quid?).—Sibir.
 abrotanifolia, *Stokes, Bot. Comment. i.* 58 = *multi-*
fida.
 abyssinica, *Fresen. in Bot. Zeit.* ii. (1844) 356.—
 Abyss.
 acinifolia, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 19.—Europ.; As.
 Min.
 acinifolia, *F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i.* 31 = *arvensis*.
 acinifolia, *Willd. Fl. Berol. Prod.* 11 = *praecox*.
 acuminata, *Link, Jahrb. i.* III. (1820) 34 = *spicata*.
 acuta, *Mart. Hort. Erlang.* (1814) 12 = *longifolia*.
 acutiflora, *Benth. in DC. Prod.* x. 460 = *ligustri-*
folia.
 acutiflora, *Lapeyr. ex Roem. & Schult. Syst. i.* 112;
Suppl. Hist. Pl. Pyr. 7.—Mont. Pyren.
 acutifolia, *Gilib. Exercit. i.* 119 = *V. Anagallis*.
 africana, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 208.
 —Afr. trop.
 agrestis, *Gouan, ex Nym. Consp.* 548 = *didyma*.
 agrestis, *Linn. Sp. Pl.* 13.—Europ.; As. et Afr. bor.
 alba, [Mazziani,] in *Ionios, Anthol.* ii. (1834) 442 =
 agrestis.
 alba, *Opiz, ex Schult. Mant. i. Add. II.* 229, in syn. =
 prostrata.
 albanica, *C. Koch, in Linnaea*, xxii. (1849) 701 =
 amoena.
 aleppica, *Boiss. Diagn. Ser. II. iii.* 169.—As. Min.;
 Assy.
 Allionii, *F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i.* 6 = *officinalis*.
 Allionii, *Vill. Prosp.* 20; *Hist. Pl. Dauph.* ii. 8.—
 Europ. austr.
 alpestris, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* ii.
 (1851) 170 = *serpyllifolia*.
 alpina, *Georgi, Reise, i.* 195 = *ciliata*.
 alpina, *Linn. Sp. Pl.* 11.—Reg. bor. et arct.
 alpipila, *Arv. Ess. Pl. Dauph.* 55 (Quid?).—Gallia.

VERONICA :—

- altaica, *Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II.* (1812) 19 =
 spuria.
 alternifolia, *Lej. Fl. Spa, ii.* 286 = *spicata*.
 ambigua, *Lucé, Topog. Nachr. Oesel,* 4 = *V. Ana-*
gallis.
 ambigua, *Mart. Hort. Erlang.* (1814) 13 = *longifolia*.
 americana, *Schwein. ex Benth. in DC. Prod.* x. 468.—
 Am. bor.
 amethystina, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 17 = *spuria*.
 amoena, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. i.* 14.—Reg. Cauc.
 amoena, *Heldr. ex Nym. Consp.* 548 = *glauc.*
 amplexicaulis, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii.
 (1881) 352.—N. Zel.
 Anagallis, *Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* ii.
 (1833) 157 = *americana*.
 Anagallis, *Linn. Sp. Pl.* 12 (*Anagallis-aquatica*).—
 Reg. bor. temp.
 anagalloides, *Guss. Pl. Rar.* 5. t. 3.—Graecia; Oriens.
 Anarrhinum, *Cat. Hort. Dresd.; ex Reichb. Fl.*
Germ. Excurs. 371 = *longifolia*.
 Andersonii, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-
 52) 3.
 angulata, *Opiz, Natural. n.* ix. (1825) 112, nomen =
 latifolia.
 angustata, *Opiz, l. c.* 111, nomen = *spicata*.
 angustifolia, *Bernh. Ehrenp.* 35 = *austriaca*.
 angustifolia, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I.* i.
 (1838) 458 = *ligustifolia*.
 angustifolia, *Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol.* i. 19
 = *spuria*.
 angustifolia, *S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 306 =
 scutellata.
 angustifolia, *A. Rich. Ess. Fl. N. Zél.* 187 = *parvi-*
flora.
 angustifolia, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 756 = *tubiflora*.
 anisophylla, *C. Koch, in Linnaea*, xvii. (1843) 287 =
 orientalis.
 anomala, *Armstr. in Trans. N. Z. Inst.* iv. (1872) 291.
 —N. Zel.
 apennina, *Tausch, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 247.—
 Italia.
 aphylla, *Linn. Sp. Pl.* 11.—Europ. austr.
 aquatica, *Benquerel, in Neuch. Bull.* v. (1859-61)
 449, nomen = *V. Anagallis*?
 aquatica, *S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 306 =
 V. Anagallis.
 arborea, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* vi. (1874)
 242.—N. Zel.
 arbustula, *Hassk. Allg. Regist. Flora,* 864, sphalm. =
 seq.
 arbustulosa, *Hoffmigg. Preisverz.* (1841) 85; et ex
 Reichb. *Pl. Crit.* x. 2 = *fruticulosa*.
 arenaria, *A. Cunn. ex Benth. in DC. Prod.* x. 463.—
 Austral.
 arguta, *Benth. l. c.* 478 = *notabilis*.
 arguta, *R. Br. Prod.* 435.—Austral.
 arguta, *Moretti, in Syll. Ratisb.* i. (1824) 103 =
 spicata.
 arguta, *Schrad. Comm. Veron. Spic.* 22 = *longifolia*.
 arguteserrata, *Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop.*
 v. (1877) 626 = *biloba*.
 aristata, *Walp. Rep.* iv. 797, sphalm. = *Vernonia nata-*
lensis.
 armena, *Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii.* 166.—
 Armenia.
 Armstrongii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xi. (1879)
 464.—N. Zel.
 arvensis, *Linn. Sp. Pl.* 13.—Europ.; As. et Afr. bor.
 arvensis, *Thunb. Fl. Jap.* 20 = *agrestis*.
 ascendens, *G. Don, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 397.
 —Hab.?
 aspera, *Pritz. Ic. Ind.* i. 1153, sphalm. = *longifolia*.
 Assoana, *Willk. in Linnaea*, xxx. (1859-60) 120.—
 Hispan.
 atlantica, *Ball, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 174 = *cunei-*
folia.
 atlantica, *Pers. Syn. i.* 12 = *rosea*.
 Aucheri, *Boiss. Diagn. Ser. I. iv.* 80.—Persia.
 aurifolia, *Dicks. ex Roem. & Usteri, Mag.* iv. 10tes
 St. 190 (Quid?).—Britan.
 australis, *Schrad. Comm. Veron. Spic.* 24 = *spicata*.
 austriaca, *Linn. Syst. ed. X.* 849.—Europ.; Reg. Cauc.
 azurea, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 22 = *longifolia*.
 Bachofenii, *Heuff. in Flora*, xviii. (1835) i. 253 =
 grandis.
 Barrelieri, *Schott, ex Roem. & Schult. Syst.* i. 94 =
 spicata.

VERONICA:—

- bartsiaefolia*, Boiss. Fl. Orient. iv. 464 = biloba.
Bastardi, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 487 = V. Teucrium.
Baumgartenii, Roem. & Schult. Syst. i. 100.—Banat.
Beccabunga, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 180 = V. Anagallis.
Beccabunga, Auct. Am. ex A. Gray, Syn. Fl. Am. ii. 1. 287 = americana.
Beccabunga, Linn. Sp. Pl. 12.—Reg. bor. temp.
Bellardi, All. Fl. Pedcm. i. 77 = arvensis.
bellidioides, Linn. Sp. Pl. 11.—Europ. austr.
Benthami, Hook. f. Fl. Antarct. i. 60.—Ins. Dom. Auckland.
Benthami, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 439 = peduncularis.
bibarbata, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 31 = V. Chamaedrys.
Bidwillii, Hook. Ic. Pl. t. 814.—N. Zel.
Biebersteinii, Hassk. Allg. Regist. Flora, 865 = *Verbasum Biebersteinii*.
Biebersteinii, Richter, in Denkschr. Akad. Wien, 1. (1885) 24 = multifida.
bihariensis, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1873) 371 = austriaca.
Billardieri, Kotschy, ex Benth. in DC. Prod. x. 480 = Kotschyana.
Billardieri, Vahl, Enum. i. 70 = orientalis.
biloba, Bourg. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 464 = campylopoda.
biloba, Linn. Mant. ii. 172.—Reg. Himal. et Cauc.; Sibir.
biserrata, Schur, Enum. Pl. Transs. 497 = grandis.
Bodardi, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 41 = V. Cymbalaria.
bombycina, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iii. 171.—Syria.
Bonarota, Linn. Sp. Pl. 11 = Paederota Bonarota.
borealis, Laest. ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1861) 336 = serpyllifolia.
Brachtii, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 110 = longifolia.
brachyphylla, Schult. Mant. i. 96 = spicata.
brachysepala, Sch. Bip. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 43 = V. Teucrium.
brachystyla, Rehm, in Spraw. Kom. Fis. Krakow, vii. (1873) 89 = V. Teucrium.
bracteata, Opiz, Natural. n. x. (1825) 244 = longifolia.
bracteata, Schult. Mant. i. 116 (Quid?).—Hab.?
bracteata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 756.—Hungar.?
brevicaulis, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 247 = V. Teucrium.
brevifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 6 = spuria.
brevifolia, Link, Enum. Hort. Berol. i. 21 = spicata.
brevi-pedunculata, Gilib. Fl. Lituan. i. 119 = arvensis.
brevistyla, Moris, in Mem. Acc. Torin. Ser. II. ii. (1840) 361.—Ins. Sardoia.
Brownei, Roem. & Schult. Syst. i. 118 = arguta.
Brunoniana, Wall. Cat. n. 405 = Calorhabdos Brunoniana.
Buchanani, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 211.—N. Zel.
Bungabacca, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 241 = serpyllifolia.
Bungei, Boiss. Fl. Orient. iv. 463.—Persia.
Buxbaumi, F. W. Schmidt, in Mayer, Samml. Phys. Aufs. i. (1791) 187 = pectinata.
Buxbaumiana, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 9 = gentianoides.
Buxbaumii, Tenore, Fl. Nap. i. 7. t. 1 = Tournefortii.
buxifolia, Benth. in DC. Prod. x. 462.—N. Zel.
caesaraugustiana, Echeand. Fl. Caesaraug. (1861) 21.—Hispan.
caespitosa, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 79.—Graecia; As. Min.; Syria.
callistachya, Ledeb. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 555 (Quid?).—Podolia.
Calvertii, Boiss. Fl. Orient. iv. 450 = telephifolia.
calycida, Fries, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 365 = agrestis.
calycina, R. Br. Prod. 435.—Austral.
calycina, A. Cunn. in Bot. Mag. sub t. 3461 = plebeia.
campylopoda, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 80.—Oriens.
camtschatica, J. F. Gmel. Syst. 29 = kamtschatica.
cana, Wall. Cat. n. 401; Benth. Scroph. Ind. 45.—Reg. Himal.; Japan; Formosa.
candida, Lodd. Cat. (1823); ex Schult. Mant. i. Add. ii. 228 (Quid?).—Hab.?

VERONICA:—

- candidissima*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terr. ed. I. 932 = incana.
canescens, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 21 = V. Teucrium.
canescens, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 503.—N. Zel.
canescens, Presl, ex Schult. Mant. i. Add. ii. 229, in syn. = prostrata.
canescens, Schrad. Comm. Veron. Spic. 19 = incana.
canterburiensis, Armst. in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 355.—N. Zel.
capensis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 1 = serpyllifolia.
capensis, Fenzl, in Linnaea, xvii. (1843) 332.—Afr. austr.
capitata, Royle, ex Benth. Scroph. Ind. 45.—Reg. Himal.
capitulata, Poir. Encyc. Suppl. v. 466 = spuria.
cardiocalpa, Walp. Rep. iii. 335 = biloba.
cariensis, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 75 = cuneifolia.
carnea, Armst. in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 357.—N. Zel.
carnea, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 459 = longifolia.
carnea, Opiz, ex Schult. Mant. i. Add. ii. 229, in obs. = prostrata.
carnea, Vitm. Summa Pl. i. 34 = alpina.
carnosula, Hook. f. Bot. Mag. t. 6587 = pinguifolia.
carnosula, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 210.—N. Zel.
carnosula, Lam. Illustr. i. 47 = peregrina.
caroliniana, Poir. Encyc. viii. 520 = Mitreola petiolata.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 61 = peregrina.
cartilaginea, Ledeb. Fl. Alt. i. 28, in adnot. = spuria.
catarractae, Forst. f. Prod. 3.—N. Zel.
caucasica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 13.—Reg. Cauc.
čechica, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 105 (Quid?).—Bohem.
ceratocarpa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 106.—Reg. Casp.
cespitosa, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 79 = caespitosa.
Chaixii, Lapeyr. Suppl. Hist. Abr. Pl. Pyr. 6 = V. Teucrium.
chamaedrya, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = V. Chamaedrys.
chamaedryoides, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. i. t. 1 = V. Chamaedrys.
Chamaedrys, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 211 = melissaeifolia.
Chamaedrys, Linn. Sp. Pl. 13.—Europ.; As. Min.; Syria.
chamaepithyoides, Desf. Tabl. ed. I. 50 = verna.
chamaepithyoides, Lam. Illustr. i. 47 = digitata.
Chamaepitys, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 25.—Byzant.; As. Min.
Chamaepitys, Pers. Syn. i. 13 = verna.
Chamaedris, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 9 = V. Chamaedrys.
chathamica, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. vii. (1875) 338.—N. Zel.
Chaubardi, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 174.—Graecia.
Cheesmani, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1366. f. A.—N. Zel.
chillensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 390 = peregrina.
cibiniensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 498 = longifolia.
ciliaria, Hoffm. in Comm. Gotting. xv. (1804) 121. t. 5 = longifolia.
ciliata, Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 56.—Reg. Himal.; As. bor.
ciliata, Schloss. & Vukot. Syll. Fl. Croat. 90 = acinifolia.
cinerea, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 131.—As. Min.
cinerea, Rafin. New Fl. Am. iv. 39 (Quid?).—Am. bor.
circaeoides, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 7 (Quid?).—Helvet.
Clarkeana, Schult. Mant. i. Add. ii. 193 = alpina.
Clusii, Schott, ex Roem. & Schult. Syst. i. 94 = spicata.
Colensoi, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 209.—N. Zel.
collina, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 108 = triphyllus.
colocensis, Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt. 134.—Hungar.
commutata, Seidl, ex Bercht. Oek. Fl. Boehm. i. 31 = longifolia.

VERONICA:—

- comosa*, Richter, in Denkschr. Akad. Wien, 1. (1885) 24.—Persia.
complicata, Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 98 = longifolia.
condensata, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 372 = longifolia.
conferta, Boiss. Fl. Orient. iv. 459 = glaberrima.
confusa, Roem. & Schult. Syst. i. 95 = longifolia.
coniosperma, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 533 (Beitr. Fl. Hercyn. 163) = acinifolia.
connata, Rafin. Med. Fl. ii. 110 = scutellata.
cordata, Opiz, ex Schult. Mant. i. Add. ii. 229, in syn. = prostrata.
corymbosa, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 6, nomen (Quid?).—Hab.?
Crantzii, Schult. Obs. Bot. 3 = orchidea.
crassifolia, Kit. ex Roem. & Schult. Syst. i. 16 = orchidea.
crassifolia, Wierzb. ex Heuff. in Flora, xviii. (1835) 251 = spicata.
crassifolia, Zeyh. ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 23.—Hungar.
crenata, Lodd. Cat. (1823); ex Schult. Mant. i. Add. ii. 228 (Quid?).—Hab.?
crenulata, Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 95 = longifolia.
cretica, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 41 = thymifolia.
crinita, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 26 = V. Teucrium.
crispa, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 368 = latifolia.
crispa, Lodd. Cat. (1823); ex Schult. Mant. i. Add. ii. 228 (Quid?).—Hab.?
Crista-galli, Stev. in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 408. t. 31.—Reg. Cauc.
cristata, Bernh. Ehrenp. 14 = orchidea.
cuneata, Guss. Enum. Pl. Inar. 241. t. 3. f. 2 = V. Cymbalaria.
cuneifolia, D. Don, in Fellows, Discov. in Lycia, 291; et in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vii. (1841) 457.—As. Min.
cupressoides, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 212.—N. Zel.
Cusickii, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 288.—Am. bor. occ.
cuspidata, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 36 = longifolia.
cynorum, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 342 = calycina.
Cymbalaria, Bodard, Mém. Vénérionique Cymbalaire, 3; ex Bertol. Amoen. Ital. 56.—Reg. Méditerran.; As. Min.
cymbalariaefolia, Vahl, Enum. i. 81 = V. Cymbalaria.
cymbalarifolia, J. F. Gmel. Enum. Stirp. Tubing. 6 = hederacifolia.
cymbalarifolia, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 26 = Tournefortii.
cymbalariaioides, Blanche, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 468.—Syria; Mesopot.
Dabneyi, Hochst. ex Seub. Fl. Azor. 39. t. 8. f. 1.—Ins. Azor.
daurica, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 339.—Dahuria.
decorosa, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 430.—Austral.
decumbens, Armst. in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 352.—N. Zel.
decussata, Moench, Verz. 137.—Ins. Falkland.
decussata, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 20 = elliptica.
deflectans, Krock. Fl. Siles. Suppl. i. 42 = V. Chamaedrys.
deltigera, Wall. Cat. n. 402; Benth. Scroph. Ind. 45.—Reg. Himal.; Afghan.
deltioidea, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 17 = plebeia.
densiflora, Ledeb. Fl. Alt. i. 34.—Sibir. altaic.
densifolia, F. Muell. Fragm. ii. 137.—Austral.
dentata, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 20 = V. Teucrium.
dentosa, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 372 = longifolia.
depauperata, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 272 = aphylla.
depressa, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 32.—Hungar.
depressa, Schur, Enum. Pl. Transs. 495 = officinalis.
Derwentia, Andr. Bot. Rep. t. 531.—Austral.

VERONICA:—

dianthifolia, A. Cunn. in Loud. Hort. Brit. 467 = arenaria.
dichrus, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 205 = cuneifolia.
didyma, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* p. vi.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
Dieffenbachii, Benth. in DC. *Prod.* x. 459.—N. Zel.
diffusa, Hook. f. in Hook. *IC. Pl.* t. 645.—N. Zel.
diffusa, Rafin. New Fl. Am. iv. 38 (Quid?).—Am. bor.
digitata, Lam. Fl. Fr. ii. 445 = triphyllus.
digitata, Vahl, *Symb. Bot.* i. 2.—Gall. austr.; Hispan.
Dillenii, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. II. fasc. iv. 352 = verma.
diosmaefolia, Knowles & Westc. *Flor. Cab.* iii. (1839) 65. t. 106 = formosa.
diosmifolia, R. Cunn. in *Bot. Mag.* sub t. 3461.—N. Zel.
distans, R. Br. *Prod.* 435.—Austral.
divaricata, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser.* II. iii. 173.—Cilicia.
divaricata, Tausch, in *Flora*, iv. (1821) 561 = V. Chamaedrys.
diversifolia, Pantoč, in Verh. Ver. Natur. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 70 = prostrata.
diversifolia, Steud. *Nom.* ed. I. 876 = virginica.
Drummondii, Benth. in DC. *Prod.* x. 478 = distans.
Dryadis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 54 = officinalis.
Drymeja, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 495 = peduncularis.
dubia, Chaix, ex Lapeyr. *Suppl. Hist. Pl. Pyr.* 6 = V. Teucrium.
dubia, DC. Fl. Fr. iii. 462 = V. Chamaedrys.
elata, Host, Fl. Austr. i. 3 = longifolia.
elator, Ehrh. ex Willd. *Enum. Hort. Berol.* 17 = longifolia.
elbursensis, Boiss. *Diagn. Ser.* I. xii. 46 = biloba.
elegans, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 154 = spuria.
elliptica, Forst. f. *Prod.* 3.—N. Zel.; Reg. Magell.
elongata, Benth. in DC. *Prod.* x. 478 = plebeia.
epacridea, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 213.—N. Zel.
ericetorum, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, nomen = V. Chamaedrys.
erinoides, Boiss. & Sprun. *Diagn. Ser.* I. iv. 78 = thessalica.
euphrasiaefolia, Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 41.—Persia.
exaltata, Maund, *Bot. Gard.* iv. (1834-35) n. 543.—Sibir.
excelsa, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 391 = longifolia.
exilis, Schott, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 464 = biloba.
falcata, Mart. Hort. Erlang. (1814) 10 = longifolia.
fallacina, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc.* i. 42 = V. Cymbalaria.
filiformis, DC. Fl. Fr. *Suppl.* 388 = Tournefortii.
filiformis, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 195.—As. Min.
finastrina, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 28 = Benthami.
fistulosa, Krock. Fl. Siles. *Suppl.* i. 20 = longifolia.
flexuosa, Host & Moretti, in Bibl. Ital. xii. (1818) 369 = longifolia.
floribunda, R. Br. ex Walp. *Rep.* iii. 346 = parviflora.
florida, Salisb. *Prod.* 92 = V. Teucrium.
florida, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 23 = V. Chamaedrys.
fluminensis, Vell. Fl. Flum. 11; i. t. 25.—Bras.
foliosa, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 106 = spuria.
Fonki, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 110.—Chili.
fontana, Willd. ex Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 41 = serpyllifolia.
fontinalis, Salisb. *Prod.* 91 = V. Beccabunga.
formosa, R. Br. *Prod.* 434.—Tasmania.
fragilis, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 446.—Persia.
Friesiana, Knaf, in *Flora*, xxix. (1846) 305 = agrestis.
Friesii, Nem. ex Chaub. in Act. Linn. Soc. Bord. xix. (1853) 232.—Gallia.
Froelichiana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 367 = V. Chamaedrys.
frutescens, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 19 = fruticulosa.
fruticans, Jacq. *Enum. Stirp. Vindob.* 2, 200 = fruticulosa.
fruticosa, Wulf. ex Steud. *Nom.* ed. II. ii. 757 = seq.

VERONICA:—

fruticulosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 15.—Europ.; Groenland.
gadensis, Gueldenst. *Reisen*, i. 426; ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 256.—Reg. Cauc.
galactites, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 232 = spuria.
galathica, Boiss. Fl. Orient. iv. 448.—Reg. Cauc.
galeopsifolia, Gilib. Fl. Lituan. i. 104 = spicata.
Gebhardiana, Vest, ex Schult. Mant. i. 104 = alpina.
geniculata, Host, Fl. Austr. i. 5 = longifolia.
gentianifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 397 = gentianoides.
gentianoides, Vahl, *Symb. Bot.* i. 1.—Reg. Cauc.; As. Min.
glaberrima, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser.* II. iii. 172.—Cilicia.
glabra, Ehrh. ex Schrad. *Comm. Veron. Spic.* 25 = longifolia.
glabriuscula, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, nomen = V. Chamaedrys.
glandulifera, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 371 = V. Cymbalaria?
glandulifera, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111 = spicata.
glandulosa, Hochst. ex Benth. in DC. *Prod.* x. 482.—Abys.
glauca, Sibth. & Sm. Fl. Graec. *Prod.* i. 9.—Graecia.
glauca, Ung. ex Nym. *Consp.* 548 = peloponnesiaca.
glauco-caerulea, Armst. in *Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 353 = pimeleoides.
gorumsensis, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 458 = acinifolia.
Gouani, Moretti, in Brugnat. Giorn. Fis. Dec. II. v. (1822) 41, in obs. = Ponae.
gracilis, R. Br. *Prod.* 435.—Austral.
gracca, Sprun. ex Benth. in DC. *Prod.* x. 484 = glauca.
graminea, [Mazzari], in Ionios, *Anthol.* ii. (1834) 442 = V. Anagallis.
grandiflora, D. Don, in *Fellows, Discov. in Lycia*, 292; et in *Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. I. vii. (1841) 458.—Caria.
grandiflora, Gaertn. in *Comm. Acad. Petrop.* xiv. (1770) 531. t. 18. f. 1 = kamtschatica.
grandiflora, Wall. Cat. n. 403 = himalensis.
grandifolia, Vest, ex Schult. Mant. i. 103 = alpina.
grandis, Fisch. ex Spreng. *Neue Entdeck.* ii. 122.—Europ.
Grayi, Armst. in *Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 354.—N. Zel.
Griffithii, Benth. in DC. *Prod.* x. 485 = biloba.
grossa, Mart. Hort. Erlang. (1814) 12 = longifolia.
Guentheri, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, nomen = officinalis.
Gunnii, Benth. in DC. *Prod.* x. 477 = calycina.
Haastii, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 213.—N. Zel.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient. iv. 438.—Mesopot.
Hectori, Hook. f. *Handb. N. Zel. Fl.* 212.—N. Zel.
hederaefolia, Linn. Sp. Pl. 13.—Europ.; Oriens; As. bor.
hederaefolia, Miq. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 510 = agrestis.
hederifolia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 190 = hederaefolia.
herniarioides, Pourr. ex Lapeyr. *Suppl. Hist. Pl. Pyr.* 4 = alpina.
Henningii, Opiz, ex Walp. *Rep.* iii. 363, in nota, sphalm. = Nennigii.
heterophylla, Salisb. Ic. Stirp. Rar. 7 = orientalis.
heterophylla, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 757 = latifolia.
heterophyllos, Boeber, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 256, sphalm. = tetraphyllos.
Hillebrandii, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 49 = distans.
himalensis, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 92.—Reg. Himal.
hirsuta, Hopkirk, Fl. Glott. 9 = officinalis.
hirsuta, Lucé, Topogr. Nachr. Oesel, 5 = arvensis.
hirsuta, Vukot. ex Nym. *Consp.* 548 = acinifolia.
hirsutissima, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, nomen = V. Chamaedrys.
hispanica, Meerb. Pl. Rar. t. 11 = pinnata.
hispanica, Pourr. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* ii. 601 = Assoana.
hispidula, Boiss. & Huet, *Diagn. Ser.* II. iii. 173.—Armenia.
Hookeriana, Walp. *Rep.* iii. 341.—N. Zel.

VERONICA:—

hortensis, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, nomen = V. Chamaedrys.
hospita, Mert. & Koch, *Deutschl. Fl.* i. 332 = Tournefortii.
Hostii, Moretti, in Bibl. Ital. xii. (1818) 369 = longifolia.
Hulkeana, F. Muell. ex Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 213.—N. Zel.
humifusa, Dicks. ex With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 15 = serpyllifolia.
humile, Janka, in *Termész. Füzetek*, iv. (1880) 294.—Europ.
hybrida, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 8 = orchidea.
hybrida, Georgi, *Beschr. Russ. Reich. Nachtr.* 256 = longifolia.
hybrida, Linn. Sp. Pl. 11 = spicata.
hyssopifolia, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 493 = austriaca.
imbricata, Woerlein, in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 199.—Europ.
imperfoliata, Benth. in DC. *Prod.* x. 463 = perfoliata.
incana, Linn. Sp. Pl. 10.—Europ. anstr. or.; As. bor.
incana, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 5 = longifolia.
incana, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 271. t. 244 = spicata.
incarnata, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 6 = spuria.
incarnata, Stokes, Bot. Comm. i. 85 = longifolia.
incisa, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, nomen = latifolia.
incisa, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 19 = spuria.
indica, Roxb. ex A. Dietr. Sp. Pl. i. 522 = V. Anagallis.
integrifolia, Opiz, ex Schult. Mant. i. Add. II. 229, in syn. = V. Teucrium.
integrifolia, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 20 = alpina.
intermedia, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. viii. (1824) 268 = americana.
intermedia, Sternb. ex Schult. Mant. i. 110 = V. Chamaedrys.
intermedia, Terrac. ex Ann. Acc. Asp. Napol. Ser. III. vi. (1866).—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) Bibl. 57.—Europ. austr.
irregularis, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* i. 6 = nummularia.
irrigans, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* ii. (1870) 94.—N. Zel.
ixodes, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser.* II. iii. 172.—Cappadoc.
Jacquinii, Baumg. *Enum. Stirp. Transs.* i. 26 = austriaca.
japonica, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 757 = virginica.
javanica, Blume, Bijdr. 742.—Reg. Himal.; Malaya.
Jungbauri, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 110 = longifolia.
kamtschatica, Linn. f. *Suppl.* 83.—Kamtchat.; Ins. Aleut.
kermesina, Loud. *Encyc. Pl.* 1546 = speciosa.
Kirkii, Armst. in *Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 356.—N. Zel.
Koeleri, Roem. & Schult. *Syst.* i. 127 (sp. dub.).—Hab.?
Kosteleckii, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 109 = longifolia.
Kotschyana, Benth. in DC. *Prod.* x. 480.—Cilicia.
kurdica, Benth. l. c. 473.—As. Min.; Persia.
labiata, R. Br. *Prod.* 434 = V. Derwentia.
laciniata, Moench, Meth. 435 = austriaca.
laciniata, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 19 = spuria.
laeta, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 370 = spicata.
laeta, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 414.—Sibir.
laevis, Benth. in DC. *Prod.* x. 461.—N. Zel.
laevis, Lam. Fl. Fr. ii. 444 = peregrina.
lamiifolia, Hayne, in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 132 = V. Chamaedrys.
lanceolata, Benth. in DC. *Prod.* x. 462.—N. Zel.
lanceolata, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, nomen = officinalis.
lanosa, Royle, ex Benth. *Scroph. Ind.* 45 = deltigera.
lanuginosa, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 293.—Reg. Himal.
Lappago, Schrank, Baier. Fl. i. 218 = hederaefolia.
latifolia, Linn. Herb. ex Nym. *Consp.* 545 = V. Teucrium.
latifolia, Linn. Sp. Pl. 13.—Europ.; Reg. Cauc.

VERONICA:—

- Lavandiana, *Raoul, Choix Pl. Nouv. Zél.* 16. t. 10.—N. Zel.
 laxa, *Benth. Scroph. Ind.* 45.—Reg. Himal.; Japan.
 laxiflora, *Lej. Rev. Fl. Spa.* 4.—Belgium.
 leiocarpa, *Boiss. Diagn. Ser. I. xii.* 45=stenobotrys.
 leptostachya, *Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 371=spuria.
 leucantha, *Helm. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* ii. (1809) 104. t. 8=spuria.
 Lewisii, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 357.—N. Zel.
 ligustrifolia, *A. Cunn. in Bot. Mag.* sub t. 3461.—N. Zel.
 lilacina, *Towns. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxv. (1878) 16=bellidioides.
 limosa, *Lej. Rev. Fl. Spa.* 2=V. Beccabunga.
 linariaefolia, *Pall. ex Link, Jahrb.* i. III. (1820) 35=spuria.
 linariaefolia, *Vis. in Att. Ist. Venet.* Ser. III. iv. (1858-59) 134.—Hab.?
 Linastrum, *Arv. Ess. Pl. Dauph.* 55 (Quid?).—Gallia.
 Lindleyana, *Paxt. Mag. Bot.* xii. (1846) 247=salici-folia.
 Lindleyana, *Wall. Cat. n.* 404=Picrorhiza Kurroa.
 linifolia, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 214.—N. Zel.
 litoralis, *Vell. Fl. Flum.* 10; i. t. 24.—Bras.
 liwanensis, *C. Koch, in Linnaea*, xxii. (1849) 698=telephiifolia.
 loganioides, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 359.—N. Zel.
 longebracteata, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 20=spicata.
 longe-pedunculata, *Gilib. Fl. Lituan.* i. 118=agrestis.
 longiflora, *Roem. & Schult. Syst.* i. 95.—Hab.?
 longifolia, *Hoffm. Phytog. Blaetter*, i. (1803) 92=spicata?
 longifolia, *Linn. Sp. Pl.* 10.—Europ.; As. Min.; Sibir.
 longifolio-repens, *Gilib. Fl. Lituan.* i. 117=V. Anagallis.
 longipes, *Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc.* i. 41=V. Cymbalaria.
 longistyla, *Ball. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* v. (1850) 47=aphylla.
 lucens, *T. Kirk, ex Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 355=canterburiensis.
 lucida, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iii. (1852) 88=serpyllifolia.
 Luetkeana, *Rupr. Ser. Tiansch.* 62.—Turkestan.
 lutetiana, *Schult. Mant.* i. 109=V. Teucrium.
 luxurians, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 27, in *Adnot.*=longifolia.
 Lyallii, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 196.—N. Zel.
 lycopodioides, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 211.—N. Zel.
 lysimachioides, *Boiss. Diagn. Ser. II. iii.* 165.—Lydia.
 macrantha, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 213.—N. Zel.
 macrocalyx, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 353.—N. Zel.
 macrocarpa, *Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 371=longifolia.
 macrocarpa, *Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 758=ciliata.
 macrocarpa, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 4.—N. Zel.
 macrodonta, *Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiv. (1884) 73=prostrata.
 macropoda, *Boiss. Diagn. Ser. I. iv.* 79.—Persia.
 macrostachya, *Vahl, Enum.* i. 71=polifolia.
 macrostemon, *Bunge, ex Ledeb. Fl. Alt.* i. 35.—Reg. Himal.; As. bor.
 macroura, *Hook. f. ex Benth. in DC. Prod.* x. 459.—N. Zel.
 Maddenii, *Edgew. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 296=javanica.
 major, *Presl, ex Schult. Mant.* i. Add. II. 229, in syn.=serpyllifolia.
 Mannii, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 19.—Afr. trop.
 marilandica, *Linn. Sp. Pl.* 14=Polypremum procumbens.
 marilandica, *Murr. in Comm. Gotting.* (1782) 11. t. 3=peregrina.
 maritima, *Linn. Sp. Pl.* 10=longifolia.
 maxima, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 11=latifolia.
 maxima, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* ii. (1809) 179=melissaeifolia.

VERONICA:—

- media, *Lej. Rev. Fl. Spa.* 4=spicata.
 media, *Schrad. Comm. Veron. Spic.* 23=longifolia.
 melancholica, *Desf. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II.* 397=seq.
 melincolica, *Hort. Par. ex Schult. Mant.* i. 117 (Quid?).—Hab.?
 melissaeifolia, *Poir. Encyc.* viii. 526.—As. Min.; Reg. Cauc.
 menthaefolia, *Schott, ex Roem. & Schult. Syst.* i. 94=spicata.
 Menziesii, *Benth. in DC. Prod.* x. 461=elliptica.
 mesotypa, *Link, Handb.* i. 522.—Europ.
 Michauxii, *Lam. Illustr.* i. 44.—Persia.
 micrantha, *Hoffm. & Link, Fl. Port.* i. 286=V. Chamaedrys.
 micrantha, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 978 (Index)=arvensis.
 microcarpa, *Boiss. Diagn. Ser. I. iv.* 76.—Armen.; Persia.
 microcoma, *Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 134.—Europ.
 microphylla, *Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II.* i. 20=serpyllifolia.
 microtheca, *Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi.* 131=biloba.
 minima, *Echeand. Fl. Caesaraug.* (1861) 21.—Hispan.
 minima, *C. Koch, in Linnaea*, xxii. (1849) 700=hispidula.
 minor, *Vahl, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl.* i. 317=V. Anagallis.
 minuta, *Krock. Fl. Siles. Suppl.* i. 47 (Quid?).—Europ.
 minuta, *C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc.* 105.—Reg. Cauc.
 missurica, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1818) 175.—Am. bor.
 mollis, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 38 (Quid?).—Am. bor.
 mollis, *Willd. ex Link, Jahrb.* i. III. (1820) 39=spuria.
 mollis, *Zea, ex Roem. & Schult. Syst.* i. 112=V. Chamaedrys.
 mollissima, *Hornem. Suppl. Hort. Hafn.* 3=praec.
 mollissima, *Link, Handb.* i. 527; *Hort. ex Steud.* Nom. ed. II. ii. 758=V. Chamaedrys.
 monstrosa, *Hort. ex Schult. Mant.* i. 100=orchidea.
 monstrosa, *Opiz, ex Schult. Mant.* i. Add. II. 229, in syn.=officinalis.
 montana, *Linn. Cent. Pl.* i. 3; *Amoen. Acad.* iv. 263.—Europ.
 montana, *Pall. Reise*, ii. 522=austriaca.
 monticola, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 354.—N. Zel.
 monticola, *Trautv. in Bull. Acad. Pétersb.* x. (1866) 398.—Reg. Cauc.
 montioides, *Boiss. Diagn. Ser. I. vii.* 43=V. Anagallis.
 Muellieri, *♀. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* xiv. (1882) 351.—N. Zel.
 Muellieri, *Mart. ex Walp. Rep.* iii. 361=longifolia.
 Muellieri, *Vest, ex Schrank, in Flora*, vii. (1824) II. Beibl. 8=seq.
 Muellieriana, *Vest, ex Schult. Mant.* i. 107=officinalis.
 multicaulis, *Bernh. ex Walp. Rep.* iii. 362=longifolia.
 multifida, *Colm. Cat. Pl. Catalun.* 118=Assoana.
 multifida, *Jacq. Fl. Austr.* iv. 15=austriaca.
 multifida, *Linn. Sp. Pl.* 13.—As. Min.; As. bor.
 murorum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 508.—Japan.
 muscosa, *Hort. ex Schult. Mant.* i. 117=orchidea.
 myrtifolia, *Banks & Soland. ex Benth. in DC. Prod.* x. 460=macrocarpa.
 neglecta, *Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II.* i. 17=spicata.
 neglecta, *F. W. Schmidt, Fl. Boëm.* i. 12=serpyllifolia.
 neglecta, *Vahl, Enum.* i. 59=incana.
 nemorosa, *Kastrop, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xvii. (1867) 107.—Europ.
 nemorum, *Pall. ex Link, Jahrb.* i. III. (1820) 42, in textu=peduncularis.
 Nennigii, *Opiz, Natural. n.* ix. (1825) 110=longifolia.
 nigricans, *C. Koch, in Linnaea*, xvii. (1843) 288=peduncularis.
 Nimrodi, *Richter, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, l. (1885) 91.—Mesopot.

VERONICA:—

- nitens, *Host, Fl. Austr.* i. 7=spicata.
 nitens, *Schult. Mant.* i. 97=longifolia.
 nitida, *Ehrh. ex Roem. & Schult. Syst.* i. 87=spuria.
 nitida, *Hort. ex Poir. Encyc. Suppl.* v. 467=V. Teucrium.
 nitida, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 20=longifolia.
 nitidula, *Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 755, in syn.=agrestis.
 nitidula, *Reichb. ex Walp. Rep.* iii. 336=didyma.
 nivalis, *Benth. in DC. Prod.* x. 477, sphalm.=Hookeriana.
 nivalis, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 55; x. (1859) 139=alpina.
 nivea, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* t. 640=Hookeriana.
 nivea, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) Misc. 42.—Austral.
 nodiflora, *Pritz. Ic. Ind.* i. 1155=Verbena nodiflora.
 Noëana, *Boiss. Diagn. Ser. II. iii.* 168=orientalis.
 notabilis, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* iv. 511.—Austral.
 nova, *Koel. ex Roem. Collect.* 306=Kocleri.
 Novae-Hollandiae, *Poir. Encyc.* viii. 526=distans?
 nudicaulis, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 415.—Persia; Soongar.
 nudicaulis, *Lam. Fl. Fr.* ii. 437=aphylla.
 Nummularia, *Gouan, Illustr.* l. t. 1. f. 2.—Mont. Pyren.
 nummulariaefolia, *Nym. Consp.* 547=V. Nummularia.
 nummulariaefolia, *Thuill. Fl. Par. ed. II.* 6=serpyllifolia.
 nutans, *Bong. in Mém. Acad. Pétersb.* ii. (1833) 157=alpina.
 obliqua, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 445 (Quid?).—Hungar.
 obovata, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (1877) 502.—N. Zel.
 obscura, *Dum. Fl. Belg.* 35=agrestis.
 obtusiuscula, *Opiz, Natural. n.* ix. (1825) 110, nomen=spicata.
 ocymifolia, *Thuill. Fl. Par.* (1824) 10=praecox.
 odora, *Hook. f. Fl. Antarct.* i. 62. t. 41=buxifolia.
 officinalis, *Linn. Sp. Pl.* 11.—Europ.; As. Min.; As. bor.
 officinarum, *Crantz, Stirp. Austr.* ed. II. fasc. iv. 336=praec.
 olympica, *Pall. ex Link, Jahrb.* i. III. (1820) 40=gentianoides.
 Onoei, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* ii. 457.—Japan.
 opaca, *Fries, Novit. Fl. Suec.* ed. II. 3=agrestis.
 oppositifolia, *Gilib. Exercit.* i. 107=spicata.
 orbicularis, *Fisch. ex Trautv. in Bull. Acad. Pétersb.* x. (1866) 397=telephiifolia.
 orbiculata, *Kern. ex Nym. Consp.* 545=prostrata.
 orchidea, *Crantz, Stirp. Austr.* ed. II. fasc. iv. 333.—Reg. Danub. et Cauc.
 orientalis, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. n. 10; *Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 23.—As. Min.; Persia.
 orientalis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* i. 22=austriaca.
 Orsiniana, *Tenore, App.* v. 4; et *Succ. Relaz.* 43=prostrata.
 osiliensis, *Lucé, Topog. Nachr. Oesel*, 4=V. Anagallis.
 ossetica, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* ii. (1809) 180=caucasica.
 ovalifolia, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 496=spicata.
 oxycarpa, *Boiss. Diagn. Ser. I. vii.* 44=V. Anagallis.
 oxyphylla, *Stev. ex Bess. Enum. Pl. Volh.* 45=longifolia.
 Paederotae, *Boiss. Diagn. Ser. I. iv.* 78.—Persia.
 pallens, *Host, Fl. Austr.* i. 6=spicata.
 pallescens, *Gater. Desc. Pl. Montaub.* 27=peregrina.
 pallida, *Hornem. Hort. Hafn.* i. 17=gentianoides.
 palmatiloba, *Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiv. (1867) 146=verna.
 paludosa, *Lej. Fl. Spa.* i. 22=spicata.
 palustris, *Salisb. Prod.* 92=V. Anagallis.
 paniculata, *Linn. Syst. ed. X.* 849=spuria.
 paniculata, *Willd. Sp. Pl.* i. 71=V. Teucrium.
 pannonica, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 5=orchidea.
 panormitana, *Tineo, in Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* 4=V. Cymbalaria.
 parmlaria, *Poit. & Turp. Fl. Par.* 16. t. 14=scutellata.
 parviflora, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 4.—N. Zel.
 parviflora, *Vahl, Enum.* i. 72, sphalm.=seq.
 parvifolia, *Vahl, l. c.* 362=orientalis.

VERONICA:—

- pauciflora*, Kit. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 42 = Baumgartenii.
pectinata, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 652 = orientalis.
pectinata, Linn. Mant. i. 24.—Oriens.
pectinata, Opiz, ex Schult. Mant. i. Add. II. 229 = prostrata.
peduncularis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 11.—As. Min.; Reg. Cauc.
peduncularis, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 1 = Chaubardi.
peduncularis, Stev. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 369, in obs. = caucasia.
pedunculata, Labill. Ic. Pl. Syn. Dec. v. 8 = syriaca.
pedunculata, Vahl, Enum. i. 77 = V. Chamaedrys.
peloponnesiaca, Boiss. & Orph. in Boiss. Fl. Orient. iv. 462.—Graecia.
peregrina, Linn. Sp. Pl. 14.—Am. bor.
perfoliata, R. Br. Prod. 434.—Austral.
perfoliata, Rafin. New Fl. Am. iv. 37 (Quid ?).—Am. bor.
perpusilla, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 43 = nudicaulis.
persica, Hort. ex Poir. Encyc. viii. 542 = Tournefortii.
persicifolia, Schott, ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 21 = longifolia.
peruviana, Willd. ex A. Dietr. Sp. Pl. i. 534 = peregrina.
Petersii, Opiz, in Weitenw. Beitr. i. (1836) 67 (err. typ. 76) = *Petersii*.
petiolaris, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyren. i. 5 = longifolia.
petiolata, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 111, nomen = V. Chamaedrys.
Petitiana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 127.—Abyss.
petraea, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 21 = Baumgartenii.
petraea, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 250.—Reg. Cauc.
Petersii, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 109; et x. (1825) 245 = longifolia.
phoenicantha, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 690 = peduncularis.
pilocarpa, Link, Enum. Hort. Berol. i. 25 = austriaca.
pilosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1663 = V. Chamaedrys.
pimeleoides, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 195.—N. Zel.
pinguifolia, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 210.—N. Zel.
pinnata, Linn. Mant. i. 24.—Sibir. altaic.
pinnata, Schur, Enum. Pl. Transs. 494 = multifida.
pinnatifida, Lam. Illustr. i. 47 = verna.
pinnatifida, Pohl, Tent. Fl. Bohem. i. 17 = austriaca.
pinnatifida, Salisb. Prod. 90 = pinnata.
pinnatifida, Willd. ex Schult. Mant. i. 117 (Quid ?).—Hab. ?
plebeia, R. Br. Prod. 435.—Austral.
plena, Opiz, ex Schult. Mant. i. Add. II. 229, in syn. = officinalis.
plicata, Pohl, Tent. Fl. Bohem. i. 15. f. 1 = V. Chamaedrys.
polifolia, Benth. in DC. Prod. x. 473.—As. Min.; Syria.
polita, Fries, Novit. Fl. Suec. ed. II. 1 = didyma.
polyanthos, Thuill. Fl. Par. ed. II. 9 = arvensis.
polygonoides, Lam. Illustr. i. 47 = verna.
polymorpha, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 2 = austriaca.
polystachya, Link, Enum. Hort. Berol. i. 23 = longifolia.
Ponac, Gouan, Illustr. i. 1. t. 1. f. 1.—Europ.
praealta, Lodd. Cat. (1823); Sweet, Hort. Brit. ed. II. 397 (Quid ?).—Hab. ?
praecox, All. Auct. Fl. Pedem. 5. t. 1. f. 1.—Reg. Medit.
praetutiana, Moretti, in Bibl. Ital. lxii. (1833) 217 = officinalis.
prasifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 82 = longifolia.
pratensis, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. iv. 344 = prostrata.
praecox, Rafin. Atl. Journ. 79 (Quid ?).—Am. bor.
procerior, Presl, ex Schult. Mant. i. Add. II. 229 = verna.
procumbens, Clarke, Trav. i. 747, nomen.—Tauria.
prostrata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 22.—Europ.
prostrata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 7 = V. Teucrium.
Pseudo-arvensis, Tineo, Pl. Rar. Sicil. 34 = arvensis.

VERONICA:—

- Pseudo-chamaedrys*, Jacq. Fl. Austr. i. 37. t. 60 = V. Teucrium.
Pseudo-incana, Schur, Enum. Pl. Transs. 496 = spicata.
pubescens, Banks & Soland. ex Benth. in DC. Prod. x. 461.—N. Zel.
pulchella, Bast. Fl. Maine-et-Loire, 144 = agrestis.
pulchella, Bernh. ex Roem. & Schult. Syst. i. 126.—Hab. ?
pulchella, Salisb. Prod. 92 = V. Chamaedrys.
pulchra, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 7 = arenaria.
pumila, All. Fl. Pedem. i. 75 = alpina.
pumila, Clarke, Trav. iv. 554, 559.—Bulgaria.
punctata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 93 = V. Anagallis.
purpurea, Steud. Nom. ed. II. ii. 759 = virginica.
Purshii, G. Don, Gen. Syst. iv. 573 (an generis ?).—Am. bor.
pusilla, Benth. in DC. Prod. x. 468 = V. Anagallis.
pusilla, Hohen. & Boiss. ex Benth. in DC. Prod. x. 490 = nudicaulis.
pusilla, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 449 (Quid ?).—Hungar.
pygmaea, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 20 = alpina.
pyrenaica, All. Fl. Pedem. i. 73 = Allionii.
quadrifolia, Schkuhr, Handb. i. 9 = longifolia.
quinquefida, Gilib. Fl. Lituan. i. 120 = triphyllus.
quinquefolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 28 = virginica.
racemifolia, Perez-Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xi. (1882) 401.—Hispan.
rakaiensis, Armst. in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 356.—N. Zel.
ramosa, Pall. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 38 = spuria.
Raoulii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 214.—N. Zel.
recta, Benth. in DC. Prod. x. 474 = austriaca.
reniformis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 10 = Purshii.
reniformis, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 360; Journ. Bot. i. (1808) II. 228.—Am. bor.
repens, All. ex Roem. & Schult. Syst. i. 110 = Allionii.
repens, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 469 = apennina.
repens, DC. Fl. Fr. iii. 727.—Ins. Corsic.
repens, Gilib. Fl. Lituan. i. 108 = officinalis.
reticulata, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 702 = ceratocarpa.
Reuteriana, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 46.—Mesopot.
rigens, Mart. Hort. Erlang. (1814) 13 = longifolia.
ringens, Steud. Nom. ed. II. ii. 759, sphalm. = praec.
riparia, Seidl, ex Bercht. Oek. Fl. Boehm. i. 30 = longifolia.
romana, All. Fl. Pedem. i. 79 = verna.
romana, Linn. Sp. Pl. 14 = peregrina.
romana, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 31 = arvensis.
rosea, Desf. Fl. Atlant. i. 13.—Alger.
rotundifolia, Gilib. Exercit. i. 120 = V. Beccabunga.
rotundifolia, Lucé, Fl. Osil. 3 = serpyllifolia.
rotundifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 6 = Sibthorpia pichinchensis.
rotundifolia, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 21 = alpina.
rotundifolia-erecta, Gilib. Fl. Lituan. i. 116 = V. Anagallis.
rubella, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 38 = spuria.
rubicunda, Ledeb. Fl. Alt. i. 28, in Adnot. = spuria.
rubrifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 46.—Persia.
ruderalis, Vahl, Enum. i. 66 = serpyllifolia.
Rudolphiana, Hayne, in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1818) 133 = V. Chamaedrys.
rugosa, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 370 = spicata.
rupestris, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 180. t. 25 = deltigera.
rupestris, Salisb. Prod. 91 = fruticulosa.
rupestris, Tardent, Ess. Hist. Nat. Bessarab. 49.—Ross. austr.
ruthenica, Roem. & Schult. Syst. i. 96 = longifolia.
ruthenica, Spreng. ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 22, 23 = praec. ?
salicifolia, A. Cunn. ex Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 207 = macrocarpa.
salicifolia, Forst. f. Prod. 3.—N. Zel.
salicoides, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 212.—N. Zel.
salina, Schur, Enum. Pl. Transs. 492 = anagalloides.
Sartoriana, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 171.—Graecia.
satureiaefolia, Poit. & Turp. Fl. Par. 18. t. 17 = prostrata.

VERONICA:—

- satureioides*, Vis. Fl. Dalm. ii. 168. t. 33. f. 2 c.—Dalmat.
saxatilis, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 11 = fruticulosa.
scardica, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 31 = V. Beccabunga.
Schmidtiana, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1864) 22.—Ins. Sachalin.
Schmidtii, Pohl, ex Schult. Mant. i. 108 = V. Chamaedrys.
Schmidtii, Roem. & Schult. Syst. i. 115 = V. Teucrium.
Schreberi, Baumg. Fl. Lips. 6 = longifolia.
Schreberiana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 371 = praec.
sciaphila, Menyh. Kalocsa Vidék. Növenyt. 131.—Hungar.
scrophularioides, Wall. Cat. sub n. 401 = cana.
scutellata, Linn. Sp. Pl. 12.—Reg. bor. temp.
secundiflora, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 288 = peduncularis.
segetalis, Pers. in Usteri, Ann. Bot. xiv. (1795) 38 = praecox.
sempervirens, Lam. Fl. Fr. ii. 436 = Ponae.
serotina, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. i. 89 = longifolia.
serpyllifolia, Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 598 = apennina.
serpyllifolia, Linn. Sp. Pl. 12.—Reg. bor. temp.
serpylloides, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 345.—Turkestan.
serrulata, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 38 = spuria.
sessiliflora, Bunge, in Ledeb. Fl. Atl. i. 32.—Sibir. altaic.
sessilifolia, Opiz, Natural. n. ix. (1825) 111, nomen = spicata, V. Chamaedrys.
setigera, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 297 = officinalis.
sibirica, Linn. Sp. Pl. ed. II. 12 = virginica.
sibthorpieifolia, Chaub. in Act. Linn. Soc. Bord. xix. (1853) 233.—Gallia.
Sieboldiana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 119.—Japon.
simensis, Fresen. in Bot. Zeit. ii. (1844) 356 = violae-folia.
simplex, Opiz, ex Schult. Mant. i. Add. II. 229 = hederæfolia, arvensis.
Simpsoni, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 526.—Chili.
spadana, Lej. Fl. Spa, i. 22 = officinalis.
sparsiflora, Rafin. Atl. Journ. 79 (Quid ?).—Am. bor.
spatulata, Benth. in DC. Prod. x. 477.—N. Zel.
speciosa, R. Cunn. in Bot. Mag. sub t. 3461.—N. Zel.
spicata, Linn. Sp. Pl. 10.—Europ.; As. bor.
spicato-racemosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 107 = serpyllifolia.
spuria, Linn. Sp. Pl. 10.—Europ.
spuria, Schkuhr, Handb. i. 9 = longifolia.
squamosa, J. & C. Presl, Fl. Čech. 2 = spicata.
stachyoides, Schur, Enum. Pl. Transs. 497 = spicata.
stenobotrys, Boiss. & Blanche, Diagn. Ser. II. iii. 166.—Cilicia; Syria.
stenophylla, Steud. Nom. ed. II. ii. 760 = parviflora.
Stephaniana, Roem. & Schult. Syst. i. Mant. 96 = spuria.
Stelleri, Pall. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 40.—Ins. Aleut.
Sternbergiana, Bernh. Ehrenp. 21 = spicata.
stolonifera, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1820); (1824) 20; et Pl. Preiss. i. 342 = calycina.
stricta, Banks & Soland. ex Benth. in DC. Prod. x. 459 = salicifolia.
stricta, Lodd. Cat. (1823); ex Schult. Mant. i. Add. II. 228 (Quid ?).—Hab. ?
strictiflora, Steud. Nom. ed. I. 879 = nummularia.
subacaulis, Lam. Illustr. i. 44 = aphylla.
subarctica, Schur, Enum. Pl. Transs. 495 = officinalis.
subbiscutata, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. iv. 343 = montana.
subincana, Hoffm. in Comm. Gotting. xv. (1804) 125. t. 7.—Europ.
sublaciniata, G. Don, Gen. Syst. iv. 567 = spuria.
succulenta, All. Fl. Pedem. i. 78 = verna.
surculosa, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iii. 170.—Cilicia.
syriaca, Roem. & Schult. Syst. i. 116.—As. Min.; Syria.

VERONICA :—

- sympirensis*, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 698 = *kurdica*.
taurica, Willd. *Sp. Pl.* i. 70 = *orientalis*.
telephifolia, Vahl, *Enum.* i. 65. —Reg. Cauc.
tenella, All. *Fl. Pedem.* i. 75 = *serpyllifolia*.
tenella, Jan, ex Ces. Passer. & Gib. *Comp. Fl. Ital.* 350 = *anagalloides*.
tenella, Viv. *Fl. Cors. Spec. Nov.* 3 = *repens*.
tenerima, F. W. Schmidt, in Mayer, *Samml. Phys. Auf.* i. (1791) 198 = *V. Anagallis*.
tenuifolia, Asso, *Syn. Stirp. Arag.* 2. t. 1 = *Assoana*.
tenuifolia, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 13 = *multifida*.
tenuifolia, Desf. ex Steud. *Nom. ed. I.* 879 (Quid ?). —Hab. ?
tenuis, Ledeb. *Fl. Alt.* i. 38 = *anagalloides*.
ternifolia, Opiz, ex Schult. *Mant. i. Add. II.* 229, in *syn.* = *V. Teucrium*.
tetragona, Hook. *Jc. Pl.* i. 580. —N. Zel.
tetraphyllos, Boeber, ex Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. iv. 653 (Quid ?). —Ross. austr.
tetrasticha, Hook. *f. Handb. N. Zeal. Fl.* 212. —N. Zel.
teucrioides, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* iii. 169 = *thymifolia*.
teucriophylla, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 137 = *V. Teucrium*.
Teucrium, Brot. *Fl. Lusit.* i. 13 = *V. Chamaedrys*.
Teucrium, Crantz, *Stirp. Austr. ed. II. fasc. iv.* 337, *partim* = *alpina*.
Teucrium, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 16. —Europ.; As. bor.
Teucrium, Pollich, *Hist. Pl. Palat.* i. 12 = *latifolia*.
Teucrium, Savi, *Due Cent.* 5 = *prostrata*.
thessalica, Benth. in *DC. Prod.* x. 480. —Graecia.
Thunbergii, A. Gray, in *Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1859) 402 = *laxa*.
thymifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 6. —Graecia; Creta.
thymifolia, Willd. ex Link, *Jahrb. i. III.* (1820) 41 = *euphrasiaefolia*.
thyrsiflora, Wall. *Cat. n.* 6393 = *Scrophularia calycina*.
ticinensis, Pollini, *Fl. Veron.* iii. App. 768 = *longifolia*.
Toumefortii, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* i. 39. —Europ.; As. temp.; Afr. bor.
Toumefortii, Vill. *Prosp.* 20; *Hist. Pl. Dauph.* ii. 9 = *officinalis*.
Townsendii, Gremli, ex Dalla Torre, *Atl. Alpenfl.* 174 = *bellidioides*.
transilvanica, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 55 = *longifolia*.
Traversii, Hook. *f. Handb. N. Zeal. Fl.* 208. —N. Zel.
trichadena, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc. i.* 42 = *V. Cymbalaria*.
trichocarpa, Schult. *Mant. i.* 106 = *austriaca*.
trifida, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 121 = *verna*.
triloba, Opiz, *Natural.* 103; et in *Lotos*, iv. (1854) 157 = *hederaefolia*.
triphyllus, Gouan, ex Nym. *Consp.* 547 = *verna*.
triphyllus, Linn. *Sp. Pl.* 14. —Europ.; Afr. bor.; As. Min.
triquetra, Kit. ex Walp. *Rep. iii.* 363 = *spuria*.
triseptala, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 324. —N. Zel.
tubiflora, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 53. —Dahuria.
tymphrestea, Boiss. & Sprun. *Diagn. Ser. I.* iv. 77 = *thymifolia*.
uliginosa, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1818) 175 = *scutellata*.
umbrosa, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 11 = *peduncularis*.
umbrosa, Reichb. ex Schult. *Mant. i. Add. II.* 229, in *syn.* = *hederaefolia*.
undulata, Wall. in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, i. 147 = *V. Anagallis*.
upsaliensis, Hort. ex Schult. *Mant. i.* 95 = *spuria*.
urticaefolia, Jacq. *Fl. Austr.* i. 37 = *latifolia*.
urticifolia, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, viii. (1881) 190 = *praece*.
Vaillantii, Reichb. ex Nym. *Consp.* 544 = *spicata*.
variegata, Hort. ex Vis. in *Att. Ist. Venet. Sc. Ser. III.* iv. (1858-59) 135 = *versicolor*.
Verbenae, Hort. ex Schult. *Mant. i.* 95 = *spuria*.
verna, Linn. *Sp. Pl.* 14. —Europ.; Oriens; As. bor.
vernica, Hook. *f. Handb. N. Zeal. Fl.* 208. —N. Zel.
versicolor, Drej. in *Fl. Dan.* t. 2221 = *agrestis*.

VERONICA :—

- versicolor*, Vis. in *Att. Ist. Venet. Sc. Ser. III.* iv. (1858-59) 134 (an hybr. ?). —Hab. ?
verticillata, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 97 = *longifolia*.
Vestiana, Schult. *Mant. i.* 111 = *melissaeefolia*.
villosa, Schrad. *Comm. Veron. Spic.* 31 = *longifolia*.
villosa, Steud. *Nom. ed. I.* 879 = *scutellata*.
villosa, Wormsk. ex Roem. & Schult. *Syst. i.* 101 = *alpina*.
villosiuscula, Krock. *Fl. Siles. Suppl. i.* 31 = *serpyllifolia*.
violaeefolia, Hochst. ex Benth. in *DC. Prod.* x. 488. —Abyss.
virgata, Krock. *Fl. Siles. Suppl. 22* (Quid ?). —Europ.
virgata, Willd. ex Link, *Jahrb. i. III.* (1820) 39 = *spuria*.
virgata, Menyh. *Kalocsa Vidék. Növényt.* 134 = *hederaefolia*.
virginica, Linn. *Sp. Pl.* 9. —Am. bor.
viridis, Presl, ex Schult. *Mant. i. Add. II.* 229, in *syn.* = *prostrata*.
viscida, Waldst. ex Roem. & Schult. *Syst. i.* 124 = *praece*.
viscosa, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xii. 47. —Syria; Mesopot.
viscosa, Kit. ex A. Dietr. *Sp. Pl. i.* 529 = *praece*.
viscosa, Willd. ex Link, *Jahrb. i. III.* (1820) 34 = *spicata*.
vitifolia, Sm. ex Walp. *Rep. iii.* 367 = *plebeia*.
wogerensis, Walp. *Ann. iii.* 196 = *wogerensis*.
vilgaris, Opiz, *Natural. n. ix.* (1825) 111, *nomen* = *officinalis*, *V. Chamaedrys*.
Waldsteiniana, Schott, ex Schult. *Mant. i.* 117 (Quid ?). —Europ.
Wolfiana, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 55 = *serpyllifolia*.
wogerensis, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 126. —Abyss.
Wormskoldi, Roem. & Schult. *Syst. i.* 101 = *alpina*.
xalapensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp. ii.* 389 = *peregrina*.
yedoensis, Franch. & Sav. *Enum. Pl. Jap.* ii. 458. —Japan.

- VERONICASTRUM**, Heist. ex Fabr. *Hort. Helmst.* 111 (1759) = *Veronica*, Tourn. (*Scrophul.*).
album, Moench, *Meth.* 437 = *Veronica virginica*.
alpinum, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 128 = *Veronica alpina*.
dentatum, Opiz, *Seznam*, 102 = *Veronica Teucrium*.
diversifolium, Moench, *Meth. Suppl.* 158 = *Veronica virginica*.
incisum, Moench, l. c. = *Veronica spuria*.
laciniatum, Moench, l. c. = *Veronica spuria*.
latifolium, Opiz, *Seznam*, 103 (err. typ. 203) = *Veronica latifolia*.
prostratum, Opiz, l. c. 102 = *Veronica prostrata*.
rubellum, Moench, *Meth.* 437 = *Veronica virginica*.
serpyllifolium, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 128 = *Veronica serpyllifolia*.

- VERONICELLA**, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 128 = *Veronica*, Tourn. (*Scrophul.*).
Chamaedrys, Fourr. l. c. = *Veronica Chamaedrys*.
urticaefolia, Fourr. l. c. = *Veronica latifolia*.

- VERREAUXIA**, Benth. *Fl. Austral.* iv. 105 (1869).
GOODENOVIEAE, Benth. & Hook. f. ii. [II.] 540.
paniculata, Benth. *Fl. Austral.* iv. 105. —Austral.
Reinwardtii, Benth. l. c. —Austral.

- VERRUCARIA**, Medic. *Malv.* 103 (1787) = *Tournefortia*, Linn. (*Borag.*).
volubilis, Medic. l. c. 104 = *T. volubilis*.

- VERRUCULARIA**, A. Juss. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. xiii. (1840) 327. **MALPIGHIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 255.
glaucophylla, Juss. l. c. —Bras.

- VERSCHAFFELTIA**, H. Wendl. in *Illustr. Hort.* xii. (1865) Misc. 5. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 908.
REGELIA, Hort. ex H. Wendl. in *Illustr. Hort.* xii. (1865) Misc. 6.
melanochaetes, H. Wendl. ex André, l. c. xviii. (1871) 54. t. 54 = *Roscheria melanochoetes*.
splendida, H. Wendl. l. c. xii. (1865) Misc. 6. —Ins. Seychelles.

- VERTICILLARIA**, Ruiz & Pav. *Prod.* 81. t. 15 (1794) = *Rheedia*, Linn. (*Guttif.*).
acuminata, Ruiz & Pav. *Syst. Veg.* 140 = *R. acuminata*.
peruviana, G. Don, *Gen. Syst.* i. 615 = *R. acuminata*.

- VERTICORDIA**, DC. in *Dict. Class.* xi. 400 (1826).
MYRTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 697.

- CHRYSORHOË**, Lindl. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 357.
DIPLACHNE, R. Br. ex Desf. in *Mém. Mus. Par. v.* (1819) 272.
acerosa, Lindl. *Swan River App.* 6. —Austral.
brachypoda, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) i. 158 = *multiflora*.
brachystylis, F. Muell. *Fragm.* i. 164 = *habrantha*.
Brownii, DC. *Prod.* iii. 209. —Austral.
callitricha, Meissn. in *Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 39 = *monadelphae*.
carinata, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) ii. 19 = *Drummondii*.
cespitosa, Turcz. l. c. xx. (1847) i. 157 = *densiflora*.
chrysanthia, Endl. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 195. —Austral.
chrysostachys, Meissn. in *Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 41. —Austral.
compta, Endl. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 194 = *insignis*.
conferta, Benth. *Fl. Austral.* iii. 22 = *fastigiata*.
Cunninghamii, Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* ii. (1841) 207. —Austral.
cuspidata, A. Cunn. ex Schau. l. c. 212 = *pennigera*.
demissa, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iii. 25 = *oxylepis*.
densiflora, Lindl. *Swan River App.* 6. —Austral.
Drummondii, Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* ii. (1841) 208. —Austral.
Endlicheriana, Schau. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 101 = *Preissii*.
fastigiata, Turcz. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* x. (1852) 327. —Austral.
fimbriolepis, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) i. 158. —Austral.
fimbriopetala, Turcz. l. c. xxii. (1849) ii. 19 = *Huegelii*.
Fontanesii, DC. *Prod.* iii. 209. —Austral.
Forrestii, F. Muell. in *Wing, South. Sc. Record*, iii. (March, 1883). —Austral.
Gilbertii, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) i. 160 = *chrysanthia*.
grandiflora, Endl. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 195. —Austral.
grandis, Drum. in *Hook. Kew Journ.* v. (1853) 119. —Austral.
habrantha, Schau. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 99. —Austral.
Harveyi, Benth. *Fl. Austral.* iii. 22. —Austral.
heliantha, Lindl. *Swan River App.* 6 = *grandiflora*.
helichrysantha, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iii. 21. —Austral.
hirta, Turcz. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* x. (1852) 327 = *Preissii*.
Huegelii, Endl. in *Enum. Pl. Hueg.* 46. —Austral.
Hughani, F. Muell. *Fragm.* xi. 10. —Austral.
humilis, Benth. *Fl. Austral.* iii. 26. —Austral.
insignis, Endl. in *Enum. Pl. Hueg.* 47. —Austral.
integriseptala, F. Muell. *Fragm.* iv. 57; et ex Benth. *Fl. Austral.* iii. 15 = *Darwinia verticordina*.
Jamiesonii, F. Muell. in *Wing, South. Sc. Record*, iii. (March, 1883). —Austral.
Lehmanni, Schau. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 99. —Austral.
lepidophylla, F. Muell. *Fragm.* i. 228. —Austral.
Lindleyi, Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* ii. (1841) 210 = *Drummondii*.
minutiflora, F. Muell. *Fragm.* iv. 58. —Austral.
monadelphae, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) i. 158. —Austral.
multiflora, Turcz. l. c. 159. —Austral.
nitens, Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* ii. (1841) 223. —Austral.
nobilis, Meissn. in *Journ. Linn. Soc. i.* (1856) 39 = *grandiflora*.
oculata, Meissn. l. c. 41. —Austral.
ovalifolia, Meissn. l. c. 40. —Austral.
oxylepis, Turcz. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* x. (1852) 327. —Austral.

VERTICORDIA :—

- pectinata, Turcz. in Bull. Acad. Pétersb. x. (1852) 327.—Austral.
 penicillaris, F. Muell. Fragm. i. 226.—Austral.
 pennigera, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 46.—Austral.
 pentandra, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 157 = picta.
 pholidophylla, F. Muell. Fragm. i. 227.—Austral.
 picta, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 194.—Austral.
 platystigma, A. Cunn. ex Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1841) 214 = Huegelii.
 polytricha, Benth. Fl. Austral. iii. 25.—Austral.
 Preissii, Schau. in Lehm. Pl. Preiss. i. 101.—Austral.
 Roei, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 194 = insignis.
 serrata, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1841) 222.—Austral.
 setigera, Lindl. Swan River App. 7 = pennigera.
 Sieberi, Dies. ex Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1841) 201 = Fontanesii.
 spicata, F. Muell. Fragm. i. 226.—Austral.
 stelluligera, Meissn. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 38.—Austral.
 stylosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 160 = Huegelii.
 umbellata, Turcz. l. c. 159 = habrantha.
 Wilhelmii, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 122.—Austral.

VERULAMIA, DC. ex Poir. Encyc. viii. 543 (1808) = **Pavetta**, Linn. (Rubiaceae).
 corymbosa, DC. ex Poir. l. c. = P. Baconia.

VERUTINA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 38 (1826); lvi. 8 (1829) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
 heterophylla, Cass. l. c. lvi. 9 = C. Verutum.

VERZINUM, Rafin. Sylva Tellur. 23 (1838) = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).
 arboreum, Rafin. l. c. = C. arboreus.
 patens, Rafin. l. c. = C. patens.

VESALEA, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 242 = **Abelia**, R. Br. (Caprifol.).
 floribunda, Mart. & Gal. l. c. = A. floribunda.
 hirsuta, Mart. & Gal. l. c. = A. speciosa.

VESICARIA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 420 (1763).
CRUCIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 73.
 ALYSSOIDES, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 419 (1763).
 CISTOCARPIUM, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 471 (1838).
 CLASTOPUS, Boiss. Fl. Orient. i. 261 (1867).
 PHYLOPTYCHIS, Boiss. l. c. 260 (1867).
 alpina, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 102.—Am. bor. occ.
 andicola, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 138 = arctica.
 angustifolia, A. Gray, Pl. Wright. ii. 13, partim = Gordoni.
 angustifolia, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 101 = gracilis.
 angustifolia, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 584 = recurvata.
 arctica, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 161 = mendocina.
 arctica, Coulter, in Hayden, Rep. (1872) 760 = ludoviciana?
 arctica, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 9 = Fendleri.
 arctica, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 743; et App. ed. II. 26.—Am. bor. et arct.
 arenosa, Richards. l. c. = arctica.
 argentea, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 720.—Mexic.
 argyrea, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 146.—Texas.
 auriculata, Engelm. & Gray, l. c. v. (1847) 240.—Texas.
 Barrelieri, Parl. Enum. Sem. Hort. Bot. Florent. (1863) 25 = graeca.
 Berlandieri, A. Gray, in S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 75.—Texas.
 brevistyla, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 101 = grandiflora.
 canescens, Schrank, in Syll. Ratish. ii. (1828) 63.—Podolia.
 VOL. II.

VESICARIA :—

- cochlearioides, Spreng. Syst. ii. 872 = Cochlearia flava.
 corymbosa, Nym. Syll. 202 = Alyssum corymbosum.
 cretica, Poir. Encyc. viii. 570 = Alyssum creticum.
 dasycarpa, Poir. l. c. 571 = Alyssum dasycarpum.
 deltoidea, Poir. l. c. 572 = Aubrietia deltoidea.
 densiflora, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 145.—Texas.
 dentata, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 1 = Coluteo-carpus reticulatus.
 didymocarpa, Hook. Fl. Bor. Am. i. 49 = Physaria didymocarpa.
 digitata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 180.—Reg. Cauc.
 edentula, Poir. Encyc. viii. 572 = Alyssum gemonense.
 Engelmanni, A. Gray, Gen. Am. Bor. Or. Illustr. i. 162. t. 70.—Texas.
 Fendleri, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 9.—N. Mexic.
 frigida, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 296.—Venezuela.
 fruticulosa, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 171 = Alyssum corymbosum?
 gemonensis, Poir. Encyc. viii. 571 = Alyssum gemonense.
 Geyeri, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 70. t. 5 = Physaria Geyeri.
 glabrescens, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 32.—Cilicia.
 globosa, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 171, 184 = ludoviciana.
 gnaphalodes, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 161.—Persia.
 Gordoni, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 149.—Am. bor. occ.
 gracilis, Hook. Bot. Mag. t. 3533.—Am. bor. occ.
 graeca, Reut. in Cat. Hort. Genév. (1858); ex Boiss. Fl. Orient. i. 262.—Ital.; Graec.
 grandiflora, Hook. l. c. t. 3464.—Texas; Mexic.
 incana, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 171 = Alyssum incanum.
 Kingii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 353.—Calif.
 lanuginosa, Poir. Encyc. viii. 572 = Clypeola eriocarpa.
 lasiocarpa, Hook. Bot. Mag. sub t. 3464.—Texas.
 Lescurii, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 38 = Alyssum Lescurii.
 Lindheimeri, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 145.—Texas.
 ludoviciana, DC. Syst. ii. 297.—Am. bor. occ.
 mendocina, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 12.—Chili.
 microcarpa, Vis. Fl. Dalm. ii. t. 32. f. 2 = Alyssum gemonense.
 montana, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864), 58.—Am. bor. occ.
 montevidensis, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 302 = mendocina.
 Newberryi, A. Gray, Colorado Expl. Surv. (1861) Bot. 6 = Physaria Newberryi.
 Nuttallii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 101.—Am. bor. occ.
 occidentalis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 353.—Calif.
 pallida, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 668.—Am. bor.
 paniculata, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 171.—Ins. Creta.
 physiphora, Andr. ex DC. Syst. ii. 300.—Hab.?
 polyantha, Schlecht. in Bot. Zeit. xi. (1853) 620 = gracilis?
 pulchella, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 15 = Engelmanni.
 purpurea, A. Gray, Pl. Wright. ii. 14.—N. Mexic.
 recurvata, Engelm. in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 147.—Am. bor. occ.
 repanda, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 101.—Am. bor. occ.
 reticulata, Lam. ex Poir. Encyc. viii. 572 = Coluteo-carpus reticulatus.
 Schaffneri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 320.—Mexic.
 Shortii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 102.—Am. bor. occ.
 sinuata, Cav. Desc. 404; Poir. Encyc. viii. 570 = Alyssum sinuatum.
 stenophylla, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 149 = Fendleri.
 utriculata, DC. Fl. Fr. iv. 696; Poir. Encyc. viii. 571.—Europ.
 utriculata, Puccin. Syn. Fl. Lucens. 335, partim = graeca.
 vestita, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 171.—Persia.

VESICULINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 109 (1836) = **Utricularia**, Linn. (Lentib.).
 albiflora, Rafin. l. c. = U. albiflora?
 compressa, Rafin. l. c. = U. compressa.
 gibba, Rafin. l. c. = U. gibba.
 graminifolia, Rafin. l. c. = U. cyanea.
 purpurea, Rafin. l. c. = U. purpurea.
 pygmaea, Rafin. l. c. = U. pygmaea.
 saccata, Rafin. l. c. = U. purpurea.
 setacea, Rafin. l. c. = U. subulata.
 tenella, Rafin. l. c. = Polypompholyx tenella.

VESLINGIA, Heist. Syst. 11 (1748); Fabric. Hort. Helmst. 363 (1759) = **Aizoon**, Linn. (Ficoid.).
 cauliflora, Moench, Meth. Suppl. 299 = A. canariense.
 Heisteri, Fabric. ex Willd. Sp. Pl. ii. 1053 = A. canariense.

VESLINGIA, Vis. in Nuov. Sagg. Acc. Sc. Padov. v. (1840) 269 = **Guizotia**, Cass. (Compos.).
 scabra, Vis. l. c. = G. abyssinica.

VESPUCCIA, Parl. Nuov. Gen. e Spec. 55 (1854) = **Hydrocleys**, Rich. (Alismac.).
 Humboldtii, Parl. l. c. 56 = H. Commersonii.

VESTIA, Willd. Enum. Hort. Berol. 208 (1809) **SOLANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 906.
 foetida, Hoffmgg. Verz. Pfl. 119 = lycioides.
 lycioides, Willd. Enum. Hort. Berol. 208.—Chili.

VETIVERIA, Thou. ex Virey, in Journ. Pharm. Sér. I. xiii. (1827) 499 = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
 arundinacea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 559 = A. squarrosus.
 muricata, Griseb. l. c. 560 = A. squarrosus.
 odorata, Virey, in Journ. Pharm. Sér. I. xiii. (1827) 499 = A. squarrosus.

VETRIX, Rafin. Alsog. Am. 13 (1838) = **Salix**, Tourn.
 Forbiana, Rafin. l. c. = S. purpurea.
 Helix, Rafin. l. c. = S. purpurea.
 Lambertiana, Rafin. l. c. = S. purpurea.
 linearifolia, Rafin. l. c. 17 = S. purpurea?
 purpurea, Rafin. l. c. 13 = S. purpurea.
 sicula, Rafin. l. c. = S. purpurea?

VEXIBIA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825) = **Valeriana**, Tourn.

VEXILLARIA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 119 (1824); Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 117 = **Centrosema**, DC. (Legumin.).
 arborea, Hoffmgg. ex Benth. l. c. 115 = Clitoria Hoffmansseggii.
 brasiliensis, Hoffmgg. Verz. Pfl. 119 = C. brasilianum.
 glycinoides, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 117 = Clitoria glycinoides.
 grandiflora, Benth. l. c. = C. platycarpum.
 laurifolia, Benth. l. c. = Clitoria cajanifolia.
 rubiginosa, Benth. l. c. = Clitoria glycinoides.
 triquetra, Hoffmgg. ex Benth. l. c. 122 = C. triquetrum (in Addend.).
 villosa, Benth. l. c. 117 = Clitoria glycinoides.

VEXILLARIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 = **Clitoria**, Linn. (Legumin.).
 Mariana, Rafin. l. c. = C. Mariana.

VIALIA, Vis. Ind. Sem. Hort. Patav. (1840).—Cf. Linnaea, xv. (1841) Litt. 103 = **Melhania**, Forsk. (Stercul.).
 macrophylla, Vis. l. c. = M. macrophylla.

VIBEXIA, Rafin. Atl. Journ. 144 (1832) = **Sophora**, Linn. (Legumin.).
 sericea, Rafin. l. c. = S. sericea.

VIBO, Medic. Phil. Bot. i. 178 (1789) = **Emex**, Neck. (Polygon.).
 spinosa, Medic. l. c. = E. spinosa.

VIBONES, Rafin. Fl. Tellur. iii. 45 (1836) = **Rumex**, Tourn. (Polygon.).
 auratus, Rafin. l. c. = R. sanguineus.

VIBORGIA, Moench, Meth. 132 (1794) = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).
 austriaca, Moench, l. c. 133 = C. austriacus.
 capitata, Moench, Meth. Suppl. 43 = C. capitatus.
 hirsuta, Moench, Meth. 132 = C. biflorus.
 purpurea, Moench, Meth. Suppl. 43 = C. purpureus.
 supina, Moench, Meth. 132 = C. supinus.

VIBORGIA, Spreng. Anleit. ii. 11. 748 (1818) = *Wiborgia*, Thunb. &c.

VIBORGIA, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 41 (1801) = WIBORGIA, Roth = *Galinsoga* Ruiz & Pav. (Compos.).

VIBORQUIA, Ortega, Hort. Matr. Dec. 66 (1798) = *Eysenhardtia*, H. B. & K. (Legumin.). *polystachya*, Ortega, l. c. = *E. amorphoides*.

VIBURNUM, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 86 (1737). CAPRIFOLIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 3.

IRAUPALOS, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 87.

LENTAGO, Rafin. l. c. (1820) 87.

MICROTINUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 293.

OPULUS, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 86 (1737).

OREINOTUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 281.

SOLENOFINUS, Spach, Hist. Vég. Phan. viii. 305 (1839).

THYRSOSMA, Rafin. Sylva Tellur. 130 (1838).

TINUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).

TYNUS, J. S. Presl, Rostl. ii. 93 (1823).

acerifolium, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1833) 144 = *pauciflorum*.

acerifolium, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 385 = *orientale*.

acerifolium, Linn. Sp. Pl. 268.—Am. bor.

acuminatum, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 880 = *dentatum*.

acuminatum, Wall. Cat. n. 465; et ex DC. Prod. iv. 325 = *punctatum*.

acutifolium, Benth. Pl. Hartw. 59.—Mexic.

adenophyllum, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 398, nomen (Quid ?).—Hab. ?

alnifolium, Marsh. Arbust. Am. 162 = *lantanoides*.

alpinum, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 201 = *glabratum*.

altmifolium, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 59.—Java.

ambloides, Rafin. Alsog. Am. 55 (Quid ?).—Am. bor.

americanum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = *V. Opulus*.

atro-cyanum, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 7.—Reg. Himal.

Awabuki, Hort. Berol. ex C. Koch, Wochenschr. x. (1867) 109 = *odoratissimum*.

ayavacense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 428.—Peruv.

Buergeri, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 263.—Japan.

burejaeticum, Regel & Herd. in Gartenfl. (1862) 407.—China.

burejanum, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liii. (1878) i. 11 = *praec.*

capitatum, Rafin. Alsog. Am. 56 (Quid ?).—Am. bor.

capitellatum, Wight & Arn. Prod. 388 = *coriaceum*.

cassinoides, Linn. Sp. Pl. ed. II. 384.—Am. bor.

cassinoides, Willd. Sp. Pl. i. 1491 = *obovatum*, Walt.

chinense, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 190 = *Premna integrifolia*.

chinense, Zeyh. ex Steud. Nom. ed. I. 880 = *odoratissimum*.

Colebrookeanum, Wall. Cat. n. 460; et ex DC. Prod. iv. 325.—Reg. Himal.

cordifolium, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 175, partim = *furcatum*.

cordifolium, Wall. Cat. n. 462; et ex DC. Prod. iv. 327.—Reg. Himal.

coriaceum, Blume, Bijdr. 656.—Reg. Himal.; Malaya.

corylifolium, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 174.—Reg. Himal.

costaricanum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 2.—Costa Rica.

cotinifolium, D. Don, Prod. Fl. Nep. 141.—Reg. Himal.

cuspidatum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 171 = *tomentosum*.

cuspidatum, Thunb. Fl. Jap. 125 = *Hydrangea cuspidata*.

cylindricum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 142 = *coriaceum*.

davuricum, Maxim. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ix. (1859) 135 = *burejaeticum*.

davuricum, Pall. Fl. Ross. i. II. 30.—Dahuria.

delicatulum, Vatke, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 718.—Montenegro.

densiflorum, Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 624.—Florida.

VIBURNUM:—

densum, Benth. Pl. Hartw. 59.—Mexic.

dentatum, Linn. Sp. Pl. 268.—Am. bor.

dentatum, Thunb. Fl. Jap. 122 = *tomentosum*.

dichotomum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 142 = *Viscum articulatum*.

dilatatum, Thunb. Fl. Jap. 124.—China; Japon.

discolor, Benth. Pl. Hartw. 83.—Guatemala.

divaricatum, Benth. l. c. 132.—Peruv.

dubium, Steud. Nom. ed. II. ii. 762.—Hab. ?

edule, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 354; Pursh, Fl. Am. Sept. i. 203 = *V. Opulus*.

elatum, Benth. Pl. Hartw. 59.—Mexic.

elegans, Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 36 = *monogynum*?

ellipticum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 280.—Am. bor. occ.

erosum, A. Gray, in Perry, Jap. Exped. ii. 313 = *dilatatum*.

erosum, Thunb. Fl. Jap. 124.—China; Japon.

erubescens, Wall. Cat. n. 459, 7474; et ex DC. Prod. iv. 329.—Reg. Himal.; Ind. or.

farinosum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 168 = *V. Lantana*.

ferrugineum, Rafin. Alsog. Am. 52 (Quid ?).—Am. bor.

foetens, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 75. t. 84.—Reg. Himal.

foetidum, Wall. Cat. n. 466; Pl. As. Rar. i. 49.—Reg. Himal.; Burma.

Forbesii, Fawc. in Forbes, Wander. Natural. 506.—Ins. Timor.

Fordiae, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 321.—China.

fragrans, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 107.—China.

fragrans, Loisel. Herb. Amat. vii. 466 = *dubium*.

furcatum, Blume, ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 175, in syn.; et ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 483.—China; Japon.

fuscum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 2.—Mexic.

glabratum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 428.—Am. trop.

glabrum, Willd. ex Schult. Syst. vi. 639 = *glabratum*.

glandulosum, Salisb. Prod. 172 = *V. Opulus*.

glaucum, Rafin. Alsog. Am. 53 (Quid ?).—Am. bor.

glomeratum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 483.—China.

grandiflorum, Wall. Cat. n. 464; et ex DC. Prod. iv. 329 = *nervosum*.

grandifolium, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 14 = *lantanoides*.

Griffithianum, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 4.—Reg. Himal.

Hanceanum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 487.—China.

Hartwegi, Benth. Pl. Hartw. 84.—Mexic.; Guatemala.

Hasseltii, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 123.—Java.

hebanthum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 136, partim = *coriaceum*.

hebanthum, Wight & Arn. Prod. 388.—Ind. or.

heterophyllum, Rafin. Alsog. Am. 52 (Quid ?).—Am. bor.

hirtum, Thunb. Fl. Jap. 124 = *Hydrangea hirta*.

hyemale, Salisb. Prod. 172 = *V. Tinus*.

integerrimum, Wall. Cat. n. 457; et ex DC. Prod. iv. 324 = *sambucinum*.

involutum, Chapm. in Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 5.—Florida.

involutum, Wall. Cat. n. 458; et ex DC. Prod. iv. 327 = *stellatum*.

Irabutha, Blume, ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 177 = *odoratissimum*.

Jacquemontii, Planch. Hort. Donat. 29.—Reg. Himal.

japonicum, Spreng. Syst. i. 934 = *Cornus japonica*.

Junghuhnii, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 123.—Java.

Kanbok, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 70.—Japan.

Keteleeri, Carr. in Rev. Hort. (1863) 269 = *macrocephalum*.

laevigatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 371 = *obovatum*, Walt.

laevigatum, Willd. Berl. Baumz. 401 = *nudum*.

lanceolatum, Hill, Hort. Kew. 457; Veg. Syst. xiii. 64 = *obovatum*, Walt.

Lantana, Linn. Sp. Pl. 268.—Europ.; Reg. Cauc.; Afr. bor.

Lantana, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 141 = *nervosum*.

lantanoides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 179.—Am. bor.

lantanoides, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 265 = *furcatum*.

VIBURNUM:—

lasiophyllum, Benth. Pl. Hartw. 189.—N. Granat.

latifolium, Hort. ex Schult. Syst. vi. 630 = *rigidum*.

laurifolium, C. Koch, Dendrol. ii. i. 63 = *V. Tinus*.

laurifolium, Rafin. Alsog. Am. 52 = *nudum*.

lauriforme, Lam. Fl. Fr. iii. 363 = *V. Tinus*.

lentaginum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *V. Lentago*.

Lentago, Duroi, Harbk. Baumz. ii. 485 = *prunifolium*.

Lentago, Linn. Sp. Pl. 268.—Am. bor.

lentagoides, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 354 = *V. Lentago*.

lentum, S. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 136 = *V. Lantana*.

lobatum, Lam. Fl. Fr. iii. 363 = *V. Opulus*.

longifolium, Lodd. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 67 = *pubescens*.

longifolium, Rafin. Alsog. Am. 56 (Quid ?).—Am. bor.

lucidum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *V. Tinus*.

lutescens, Blume, Bijdr. 655.—Java.

lutescens, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 176 = *Colebrookeanum*.

luzonicum, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 310.—Ins. Philipp.

macrocephalum, Fortune, in Journ. Hort. Soc. ii. (1847) 244; et in Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 43.—China.

macrodon, Rafin. Atl. Journ. 17 (Quid ?).—Am. bor.

macrophyllum, Thunb. Fl. Jap. 125.—Japon.

macrophyllum, Van Hall, in Fl. Jard. Roy. Pays-Bas, ii. (1859) 97 = *Buergeri*.

maculatum, Pantoë, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 266 = *V. Lantana*.

medium, Hort. Belv. ex Steud. Nom. ed. I. 880. nomen (Quid ?).—Hab. ?

membranaceum, Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot. ii. 2.—Mexic.

membranaceum, Rafin. Alsog. Am. 51 (Quid ?).—Am. bor.

microcarpum, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 170.—Mexic.

microphyllum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 3.—Mexic.

molle, Michx. Fl. Bor. Am. i. 180.—Am. bor.

monogynum, Blume, Bijdr. 655.—Java.

Mullaha, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 141 = *stellatum*.

multistratum, x, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 54.

nervosum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 141.—Reg. Himal.

nervosum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 190 = *sempervirens*.

nitidum, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 371 = *nudum*.

nudum, Linn. Sp. Pl. 268.—Am. bor.

obliquatum, Rafin. Alsog. Am. 54 (Quid ?).—Am. bor.

obovatum, Ruiz & Pav. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 286 (err. typ. 386).—Peruv.

obovatum, Walt. Fl. Carol. 116.—Am. bor.

odoratissimum, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 456.—Reg. Himal.; China.

oleaeifolium, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 733 = *nudum*.

opuloides, Muhl. Cat. 32 = *V. Opulus*.

Opulus, Linn. Sp. Pl. 268.—Europ.; As. et Am. bor.

orientale, Pall. Fl. Ross. i. II. 31.—As. Min.

Oxyccocos, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 203 = *V. Opulus*.

pallidum, Salisb. Prod. 172 = *V. Lantana*.

palustre, Rafin. Alsog. Am. 56 = *V. Opulus*?

parviflorum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 243.—Mexic.

pauciflorum, La Pylaie, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 17.—Am. bor.

pauciflorum, Rafin. Alsog. Am. 58 (Quid ?).—Am. bor.

phlebotrichum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 173.—Japon.

pinchinense, Benth. Pl. Hartw. 188.—Ecuador.

pinnina, Rafin. Alsog. Am. 57 = *V. Opulus*.

plicatum, A. Gray, in Perry, Jap. Exped. ii. 313 = *furcatum*.

plicatum, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 332 = *tomentosum*.

polycarpum, Wall. Cat. n. 455; et ex DC. Prod. iv. 328 = *cotinifolium*.

premnaceum, Wall. II. cc. 461; 325 = *foetidum*.

primina, Rafin. in Med. Repos. N. York, ii. v. (1808) 354 = *V. Opulus*.

prunifolium, Linn. Sp. Pl. 268.—Am. bor.

pubescens, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 202.—Am. bor.

pubigerum, Wight & Arn. Prod. 389 = *erubescens*.

VIBURNUM:—

pubinerve, Blume, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 265 = phlebotrichum.
punctatum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 142.—Reg. Himal.
punctatum, Rafin. ex DC. Prod. iv. 326 = cassinoides.
punicifolium, Desf. Hist. Arb. i. 345 = nudum.
pyrifolium, Poir. Encyc. viii. 653 = prunifolium.
pyrifolium, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 201 = cassinoides.
Rafinesquianum, Schult. Syst. vi. 630 = pubescens.
repandum, Rafin. Alsog. Am. 53 (Quid?).—Am. bor.
reticulatum, Ruiz & Pav. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 286 (err. typ. 386).—Peruv.
retusum, Rafin. Alsog. Am. 53 (Quid?).—Am. bor.
rhombifolium, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 3.—Mexico.
rigidum, Vent. Gard. Malm. 98.—Ins. Canar.
roseum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 762 = seq.
roseum, Steud. l. c. ed. I. 880 = V. Opulus.
rotundifolium, Rafin. Alsog. Am. 54 (Quid?).—Am. bor.
rudidulum, Rafin. l. c. 56 (Quid?).—Am. bor.
rugosum, Pers. Syn. i. 326 = rigidum.
sambucinum, Reinw. ex Blume, Bijdr. 656.—Malaya.
Sandankwa, Hassk. Retzia, i. 37.—China.
scabrellum, Chapm. Fl. S. U. St. 172 = molle.
scandens, Linn. f. Snppl. 184 = Hydrangea virens.
schensianum, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxvi. (1880) 480.—China.
sempervirens, C. Koch, Hort. Dendr. 300; Wochenschr. x. (1867) 109.—China.
serratum, Thunb. Fl. Jap. 124 = Hydrangea hortensis.
setigerum, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 261.—China.
sibiricum, Nois. ex Stend. Nom. ed. I. 880, nomen.—(Quid?).—Sibir.?
Sieboldi, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 267.—Japan.
Simonsii, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 177.—Reg. Himal.
sinensis, Zeyh. ex Colla, Hort. Ripul. 145 = odoratissimum.
squamatum, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 327 = cassinoides.
stellato-pilosum, Polak. in Linnaea, xli. (1877) 564.—Costa Rica.
stellato-tomentosum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 3.—Costa Rica.
stellatum, Hemsl. l. c.—Mexico.
stellatum, Wall. Cat. n. 463; et ex DC. Prod. iv. 327.—Reg. Himal.
stenocalyx, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 3.—Mexico.
strictum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 288 = rigidum.
strictum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 195 = V. Tinus.
strigosum, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 145, nomen (Quid?).—Hab.?
sulcatum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 3.—Mexico.
sumatranum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 537.—Sumatra.
sundaicum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 121 = lutescens.
suspensum, Lindl. in Journ. Hort. Soc. viii. (1853) 130.—Hab.?
tiliaefolium, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 3.—Mexico.
tinoides, Linn. f. Suppl. 184.—Am. austr.
tinoides, Mutis, ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 428 = ayavacense?
Tinus, Linn. Sp. Pl. 267.—Reg. Mediterr.
tomentosum, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 273 = Hanceanum.
tomentosum, Lam. Fl. Fr. iii. 363 = V. Lantana.
tomentosum, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 354 = pubescens.
tomentosum, Thunb. Fl. Jap. 123.—China; Japon.
trilobum, Marsh. Arbust. Am. 162 = V. Opulus.
triphyllum, Benth. Pl. Hartw. 188.—N. Granat.
urceolatum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 172.—Japan.
venulosum, Benth. Fl. Hongk. 142 = sempervirens.
villosum, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 361 = pubescens.
villosum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 54.—Am. trop.
virens, Thunb. Fl. Jap. 123 = Hydrangea virens.
Wendlandi, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 3.—Costa Rica.
Wightianum, Hohen. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 5 = punctatum.
Wightianum, Wall. Cat. n. 3729; Pl. As. Rar. ii. 29 = erubescens.

VIBURNUM:—

Wrightii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 267 = phlebotrichum.
zeylanicum, Gardn. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 300 = coriaceum.
Zippelii, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 122.—N. Guin.?

VICARYA, Stocks, in Proc. Linn. Soc. i. (1848) 367, nomen (Malvac.).

VICARYA, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 544 (1845) = **Myriopterion**, Griff. (Asclep.).
cristata, Wall. l. c. = M. paniculatum.

VICATIA, DC. Prod. iv. 243 (1830). **UMBELLI-FERAE**, Benth. & Hook. f. i. 883.
coniifolia, DC. l. c.—Reg. Himal.
millefolia, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 671.—Reg. Himal.
Stewartii, C. B. Clarke, l. c.—Reg. Himal.

VICENTIA, Allem. Diss. cum tab. (1844).—Cf. Bot. Zeit. xii. (1854) 435 = **Terminalia**, Linn. (Combret.).
acuminata, Allem. l. c.—Bras.

VICIA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). **LEGU-MINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 524.
ABACOSA, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 102.
ATOSSA, Alef. l. c. (1861) 100.
COPPOLERIA, Todaro, in Atti Acc. Sc. Palermo, N. S. i. (1845) 14.
CRACCA, [Riv.] Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 359.
CUJUNIA, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 101.
ENDIUSA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 359.
ERVILIA, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 240 (1822).
ERVUM, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 217 (1737).
FABA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
HYPECHUSA, Alef. in Bot. Zeit. xviii. (1860) 164.
OROBELLA, Presl, in Weitenw. Beitr. ii. (1837) 27. t. 4.
PARALLOSA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 359.
RHYNCHIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 290 (1767).
SELLUNIA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 358.
SWANTIA, Alef. l. c. (1859) 365.
TUAMINA, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 102.
VICILLA, Schur, Enum. Pl. Transs. 170 (1866).
VICIOIDES, Moench, Meth. 135 (1794).
WIGGERSIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 6, 33 (1801).
abbreviata, Fisch. ex Spreng. Pugill. i. 50.—Reg. Cauc.
abbreviata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 146 = cassubica.
abyssinica, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 72 = sativa.
acerosa, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 137.—Chili.
acutifolia, Ell. Sketch, ii. 225.—Am. bor.
agrigentinum, Link, Handb. ii. 190 = V. Bivonea.
aintabensis, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 577.—Syria; Mesopot.
alba, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Gen. ii. (1787) 359 = sativa?
alba, Moench, Meth. 148 = sativa.
albicans, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 33 = atropurpurea.
alpestris, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 93.—Reg. Cauc.; As. Min.
alpina, Pall. Reise, ii. 568 = multicaulis.
alternans, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 631.—Banat.
alternifolia, Kit. l. c. = alternans.
altissima, Desf. Fl. Atlant. ii. 163.—Reg. Mediterr. occ.
ambigua, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 435 = varia.
americana, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1096.—Am. bor.
amoena, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. ii. 355.—Sibir.
amphicarpa, Dorthes, in Journ. Phys. xxxv. (1789) 131 = sativa.
amphicarpos, Gouan, Herbor. 48 = Lathyrus setifolius.
andicola, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 498 = graminea.
andina, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 692.—Chili.
angulata, Bout. ex Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 429 = calcarata.
angulosa, Gater. Desc. Pl. Montaub. 129 = bithynica.

VICIA:—

angustifolia, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 135.—Chili.
angustifolia, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 249 = lathyroides.
angustifolia, Linn. Moench. Acad. iv. 105; Reich. Fl. Moench. Franc. ii. 44 = sativa.
angustifolia, Moench, Meth. 148 = calcarata.
anisodonta, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. ii. 41 = alpestris.
anomala, Boenn. Prod. Fl. Monast. 218 = sepium.
aphylla, C. Sm. in Buch, Besch. Canar. Ins. 157 = Lathyrus aphyllus.
aquitana, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxvii. (1883) p. vi, 554 = atropurpurea.
araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 693.—Chili.
arenivaga, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 214 = lathyroides.
argentea, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 417.—Hispan.
aristata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 287 = V. Orobis.
armena, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 102 = persica.
articulata, Hornem. Enum. Pl. Hort. Hafn. (1807) 41; Hort. Hafn. ii. 690.—Hab.?
articulata, Willd. Enum. Hort. Berol. 764 = monanthos.
assyriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 123.—Armenia.
astragaloides, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 637 = Astragalus striatellus.
atlantica, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 193.—Alger.
atropurpurea, Desf. Fl. Atlant. ii. 164.—Algeria.
atropurpurea, Steud. Nom. ed. II. ii. 763 = Nissoliana.
Aucheri, Jaub. & Spach, Illustr. i. 80. t. 41 = variegata.
aurantia, Boiss. Fl. Orient. ii. 578.—As. Min.
australis, Tenore, Fl. Nap. v. 112 = Gerardi.
azurea, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 66 = alpestris.
azurea, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 191 = V. Cracca.
Bacla, Moench, Meth. 148.—Hab.?
bactra, Zuccagni, in Roem. Collect. 151.—Hab.?
baetica, Lange, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 306.—Hispan.
baetica, Schousb. ex Willk. l. c. 298 = lutea.
Balansae, Boiss. Fl. Orient. ii. 569.—Reg. Cauc.
Barbazitae, Guss. & Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1839) 12. n. 15.—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. (1840) 381.—Graecia; Sicil.
benghalensis, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 239 = Nissoliana.
benghalensis, Linn. Sp. Pl. 736 = atropurpurea?
Berteroana, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 622.—Chili.
bicolor, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 51, nomen; et ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 81.—Hab.?
bidentata, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 215 = graminea.
Biebersteini, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 297 = pubescens.
Biebersteini, Bess. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 472 = grandiflora.
Biebersteini, C. A. Mey. Verz. Pl. Cauc. 147 = hyrcanica.
biennis, Linn. Sp. Pl. 736.—Sibir.
biflora, Desf. Fl. Atlant. ii. 166. t. 197.—Afr. bor.
biflora, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 147 = calcarata.
biflora, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 105. t. 65 B = atropurpurea.
bifoliolata, Rodrig. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. (1878) 239.—Ins. Minorc.
bijuga, Guill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 197.—Chili.
bipartita, Moench, Meth. 149.—Hab.?
bithynica, Linn. Syst. ed. X. 1166.—Reg. Mediterr.
Bivonae, Ser. in DC. Prod. ii. 357 = V. Pseudo-cracca.
Bivonea, Rafin. Préc. Découv. 37.—Sicilia.
Bobartii, E. Forst. in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 442 = sativa.
boetica, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. ii. 365, nomen (Quid?).—Hab.?
boetica, Schousb. ex Nym. Consp. 209 = lutea.
bohemica, J. F. Gmel. Syst. 1110.—Bohem.
Boissieri, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 40 = villosa.
branchitropis, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 412.—Sibir. altaic.
Broteriana, Ser. in DC. Prod. ii. 357 = atropurpurea.
bythynica, Schrank, Baier. Fl. ii. 262 = bithynica.
caesarea, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 69.—Cappadoc.
calcarata, Desf. Fl. Atlant. ii. 166.—Reg. Medit.; Persia.
campestris, Schur, Enum. Pl. Transs. 169 = sativa.

VICIA :—

- canadensis*, Zuccagni, in Roem. Collect. 151 = sativa.
canariensis, Alef. in *Bonplandia*, ix. (1861) 72.—Ins. Canar.
Candolleana, Tenore, Fl. Nap. v. 111 = Gerardi.
canescens, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. i. 17. t. 7.—Syria.
canescens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 71 = Gerardi.
capensis, Berg. Desc. Pl. Cap. 215 = Lessertia pulchra.
cappadocica, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 68.—Cappadoc.
capreolata, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838), reimpr. 23.—Ins. Mader.
carnea, Kotschy, in Unger & Kotschy, Cypem, 386 = Michauxii.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 182.—Am. bor.
Cassia, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 119.—Syria; Ins. Cyprus.
cassubica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 466 = truncatula.
cassubica, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. ii. 417 = Gerardi.
cassubica, Linn. Sp. Pl. 735.—Europ.
cassubica, Oeder, in Fl. Dan. t. 98 = V. Orobus.
chaetocalyx, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 106.—Ins. Canar.
chilensis, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1107 = pallida, Hook. & Arn.
chlorantha, Heuff. ex Nym. Consp. 209 = truncatula.
ciceroides, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 47.—Persia.
ciliaris, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 621.—Chili.
ciliaris, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 71.—As. Min.
ciliata, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 20 = lutea.
cilicia, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 122 = canescens.
cinerea, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 470 = calcarata.
cirrhosa, C. Sm. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 103.—Ins. Canar.
Closiana, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 62 = angustifolia.
Clymenum, S. G. Gmel. Reise, iii. 306. t. 33. f. 1.—Sibir.
consentina, Reichb. ex Nym. Consp. 207 = V. Pseudocracca.
consentina, Spreng. Pugill. ii. 74 = variegata.
consobrina, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 192.—Alger.
conspicua, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) reimpr. 22.—Ins. Mader.
cordata, Wulf. ex Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 32 = sativa.
Coris, Thouin, ex Mart. Hort. Erlang. (1814) 156, nomen (Quid ?).—Hab. ?
cornigera, Chaub. in St. Amans, Fl. Agen. 294.—Gallia.
corsica, Nym. Syll. 310, in syn.; *Fanka*, in Termész. Füzetek, ix. (1885) 137.—Ins. Corsic.
Cosentini, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 426 = sativa.
costata, Ledeb. Fl. Alt. iii. 346.—Sibir. altaic.
Cracca, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 200 = tenuifolia.
Cracca, Linn. Sp. Pl. 735.—Europ.; As. et Am. bor.
cracoides, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 194 (*cracoides*) = caroliniana.
cretica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. ix. 118.—Graecia.
cuneata, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 428.—Sicil.
cuspidata, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 104.—As. Min.; Syria.
cypria, Kotschy, in Unger & Kotschy, Cypern, 384.—Ins. Cyprus.
dasycarpa, Tenore, Viagg. Abruzz. (1829) 81 = varia.
daurica, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 674 = megalotropis.
debilis, Perez Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xi. (1882) 402.—Hispan.
debilis, Steud. Nom. ed. II. ii. 763 = graminea.
Dennesiana, H. C. Wats. in Godman, Nat. Hist. Azor. 154, 155.—Ins. Azor.
dentata, Fisch. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 80 = dumetorum.
dentata, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 197.—Reg. Argent.
depauperata, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 132 = accrota.
desertorum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 238 = dumetorum.
Diomedis, Gren. ex Nym. Consp. 210 = sativa.
disperma, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 154.—Gall. austr.
disticha, Jacq. Enum. Pl. Carib. 27 (Quid ?).—Ind. occ.

VICIA :—

- djimalensis*, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 569 = Balansae.
Douglasii, Torr. in Am. Journ. Sc. Ser. I. iv. (1822) 66 (*Douglasii*) = V. Cracca ?
Drymeja, Schur, Enum. Pl. Transs. 167 = sepium.
dubia, Schult. Obs. Bot. 149 = articulata.
dumetorum, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 200 = rigidula.
dumetorum, Linn. Sp. Pl. 734.—Europ.; Sibir.
dumetorum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 366 = sepium.
dumicola, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 288 = dumetorum.
Durandi, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 116.—Mauritan.
ecirrhosa, Rupr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 583.—Reg. Caucas.
elegans, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 438 = tenuifolia.
equina, Steud. Nom. ed. I. 881; Reichb. Fl. Germ. Excurs. 532 = V. Faba.
erecta, Perez Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xi. (1882) 402.—Hispan.
erviformis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 191.—Reg. Medit. occ.
erviformis, Winkl. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 306 = baetica.
Ervilia, Willd. Sp. Pl. iii. 1103.—Europ.; Afr. bor.
Ervilla, Medic. Boobacht. (1783) 179 = praec. ?
ervoides, Hampe, in Flora, xxv. (1842) 61 = pubescens.
esculenta, Salisb. Prod. 339 = V. Faba.
excisa, Schur, Enum. Pl. Transs. 169 = sativa.
exigua, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 272.—Am. bor. occ.
exigua, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 162 = pulchella.
exstipulata, S. G. Gmel. Reise, iii. 307. t. 33. f. 2 = Lathyrus Aphaca.
Faba, Linn. Sp. Pl. 737.—Hab. ?
Fagonii, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 419 = pyrenaica.
ferruginea, [Bess.], ex Mart. Hort. Erlang. (1814) 156, nomen (Quid ?).—Hab. ?
filicaulis, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 102.—Ins. Canar.
fimbriata, Auch. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 237 = Astragalus conduplicatus.
Fischeri, Steud. Nom. ed. II. ii. 763 = dumetorum.
flavida, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 20 = lutea.
Fleischeri, Hochst. & Steud. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 592 = palaestina.
floridana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 292.—Florida.
fodinarum, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 692.—Chili.
foetens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 103 = sylvatica.
Fontanesiana, Tenore, ex Nym. Consp. 207 = Gerardi.
Forsteri, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 172 = sativa.
frutescens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 104 = cassubica.
fulgens, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 338.—Afr. bor.
galeata, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 103.—Syria.
galegifolia, Andr. Bot. Rep. t. 319 = Swainsona coronillaefolia.
galloprovincialis, Poir. Encyc. Suppl. v. 471 = Gerardi.
Gayi, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 623.—Chili.
gemella, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 389.—Europ.; Oriens.
geminiflora, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. 1. (1875) 42.—Dahuria.
Gerardi, Jacq. Fl. Austr. iii. 16 = cassubica.
Gerardi, A. St. Hil. in Bull. Soc. Agric. Orléans, i. (1810) 281 (Not. 43) = V. Cracca.
Gerardi, Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 256.—Europ. austr.
Gerardi, Willd. Fl. Berol. Prod. 239 = tenuifolia.
gigantea, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 93.—China.
gigantea, Hook. Fl. Bor. Am. i. 157.—Am. bor. occ.
glabra, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 37 = sativa.
glauca, Presl, Delic. Prag. 37.—Reg. Mediterr.
globosa, Retz. Obs. iii. 39.—Hab. ?
Graccha, Lepch. Reisen, iii. 42, sphalm. = V. Cracca.
gracilis, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 460.—Europ.; Syria.
gracilis, Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 34 = Loweanum.
gracilis, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 259 (Quid ?).—Syria.
graminea, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 27.—Chili; Bras.

VICIA :—

- grandiflora*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 65.—Europ. austr.; Oriens.
grandiflora, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 7 = Menziesii.
grata, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 622.—Chili.
gregaria, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. ix. 121.—As. Min.
Griffithii, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 178.—Ind. bor. occ.
Halleri, Crantz, Inst. ii. 30 = sylvatica ?
hedysaroides, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 672 = amoena.
helvetica, Hort. Prag. ex Ser. in DC. Prod. ii. 361 = sativa.
heterophylla, Presl, Delic. Prag. 37 = sativa.
heterophylla, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 531 = narbonensis.
Hexameri, Alef. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 231 = caroliniana.
hirsuta, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. ii. 365, nomen (Quid ?).—Hab. ?
hirsuta, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 614.—Europ.; As. et Afr. bor.
hirsutissima, Cyrilli, ex Mart. Hort. Erlang. (1814) 154, nomen; et ex Tenore, Fl. Nap. v. 119.—Ital.
hirta, Balb. ex Pers. Syn. ii. 308 = lutea.
hirta, Tenore, Fl. Med. i. 578 = hirsutissima.
Hookeri, G. Don, Gen. Syst. ii. 319.—Chili.
Hookeriana, Presl, Repert. Bot. Syst. i. 8, in nota = Hookeri.
Hookeriana, Walp. Rep. i. 715 = gigantea, Hook.
humilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 498.—Mexic.
hungarica, Heuff. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 26.—Hungar.
hybrida, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1169 = pannonica.
hybrida, Huds. Fl. Angl. ed. II. 319 = lutea.
hybrida, Linn. Sp. Pl. 737.—Europ.; Syria; Afr. bor.
hypoleuca, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 92 = alpestris.
hyrcanica, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 53.—Reg. Caucas.
imbricata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 104 = V. Cracca.
incana, Lam. Fl. Fr. ii. 560 = atropurpurea.
incana, Thuill. Fl. Par. ed. II. 367 = V. Cracca.
incana, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 449 = Gerardi.
incisa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 471 = sativa.
incisa, Orph. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 574 = V. Barbazitae.
inconspicua, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 623.—Chili.
incurva, Roth, Beytr. ii. 98 = Lathyrus incurvus.
intermedia, Viv. Fl. Lib. Spec. 42. t. 19. f. 1 = sativa.
iranica, Boiss. Fl. Orient. ii. 581.—Persia.
japonica, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1859) 385 = pallida, Turcs.
Jauberti, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 71 = hyrcanica.
jeniseensis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 672 = amoena.
Keatingi, Steud. Nom. ed. II. ii. 764 = americana.
Kingii, Hook. f. Fl. Antart. ii. 258 = graminea.
Kitaibeliana, Schur, Enum. Pl. Transs. 168 = grandiflora.
Kitaibellii, Reichb. ex Nym. Consp. 206 = V. Cracca.
kokanica, Regel & Schmalh. in Regel, Pl. Nov. Fedesch. 20.—Turkestan.
Kotschyana, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 47.—Persia.
laeta, Cesati, in Friderichst. Reise Griech. 280 = V. Barbazitae.
laevigata, Sm. Engl. Bot. t. 483 = lutea.
Lagopus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 193.—Alger.
lanceolata, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 51.—Chili.
lanciformis, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 183 = sativa.
lathyroides, All. Fl. Pedem. i. 326 = sativa.
lathyroides, Linn. Sp. Pl. 736.—Europ.; As. Min.; Afr. austr.
latifolia, Moench, Meth. 149 = narbonensis.
laxiflora, Boiss. Fl. Orient. ii. 586 = tenuifolia.
laxiflora, Brot. Phyt. Lusit. i. 125. t. 52 = gracilis.
Leavenworthii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 271.—Am. bor. occ.

VICIA :—

- Lens*, Coss. & Germ. Fl. Par. ed. I. 143 = *Lens esculenta*.
Lenticula, Janka, in Termész. Füzetek, ix. (1885) 138 = *Lens Lenticula*.
lentiformis, Schur, Enum. Pl. Transs. 168 = *lutea*.
leptocarpa, Bianca, in Atti Acc. Gioen. Sc. Nat. Ser. II. xiv. (1858) 51.—Sicil.
leptophylla, Rafin. Caratteri, 71.—Sicil.
Lerchenfeldiana, Schur, Enum. Pl. Transs. 168 = *lutea*.
leucantha, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. i. [9] = *V. Bivonea*.
leucophaea, Greene, in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 217. —N. Mexic.
leucosperma, Moench, Meth. 148 = *sativa*.
Leyboldi, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 51.—Chili.
lilacina, Ledeb. Fl. Alt. iii. 348.—Sibir. altaic.
linearifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 20.—Chili.
lineata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 473 = *pannonica*.
littoralis, Jacq. Enum. Pl. Carib. 27 = *Tephrosia cinerea*.
littoralis, Salzm. in Flora, iv. (1821) 110 = *V. Pseudo-cracca*.
littoralis, Tenore, Fl. Nap. iv. 103 = *varia*.
Loiseleurii, Boiss. Fl. Orient. ii. 595, sphalm. = *Meyeri*.
longifolia, Poir. Encyc. viii. 557.—Syria.
longifolia, Schur, Enum. Pl. Transs. 169 = *sativa*.
Loweana, Steud. Nom. ed. II. ii. 764.—Ins. Mader.
ludoviciana, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 271. —Am. bor.
luganensis, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 31 = *sativa*.
lunata, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 594.—Lydia.
lutea, Linn. Sp. Pl. 736.—Reg. Medit. ; Oriens.
lutea, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 162 = *grandiflora*.
lutescens, Muhl. Cat. 68 = *acutifolia*.
Macraei, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833). 195.—Chili.
macrocarpa, Bertol. Fl. Ital. vii. 511.—Europ. austr.
maculata, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 191.—Alger.
maculata, Presl, Fl. Sic. p. xxiii = *sativa*.
magellanica, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 257.—Reg. Magellan.
magnifolia, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 135.—Chili.
Martini, Gren. ex Nym. Consp. 210 = *sativa*.
Matthewsii, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 419.—Peruv.
media, Host, Fl. Austr. ii. 335.—Europ.
megalosperma, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 161 = *peregrina*.
megalotropis, Ledeb. Fl. Alt. iii. 344.—Sibir. altaic.
melanops, Sibth. & Sm. Fl. Grace. Prod. ii. 72.—Europ. austr.
Menziesii, Spreng. Syst. iii. 267.—Ins. Sandvic.
mexicana, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 47.—Mexic.
Meyeri, Boiss. Fl. Orient. ii. 595.—Reg. Casp.
Michauxii, Schrank, ex Steud. Nom. ed. I. 882, nomen (Quid ?).—Am. bor. ?
Michauxii, Spreng. Fl. Hal. Mant. 48.—Syria ; Persia.
Michelli, Desv. Journ. Bot. iv. (1814) 269, sphalm. = *Mitchelli*.
micrantha, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 197 = *Hookeri*.
micrantha, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1833) 33 = *Loweana*.
micrantha, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 271. —Am. bor. occ.
microphylla, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 343.—Graecia.
militans, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 388 = *cassubica*.
minima, Gilib. Fl. Lituan. ii. 106 = *lathyroides*.
minuta, Moench, Meth. Suppl. 50 = *bithynica*.
minutiflora, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1107 = *micrantha*.
Mitchelli, Rafin. Préc. Découv. 37 = *hirsuta*.
modesta, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 49.—Chili.
mollis, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 177.—Reg. Himal.
mollis, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 576.—Syria.
monadelpha, Roth, Catalecta, fasc. ii. 97 = *narbonensis*.

VICIA :—

- monantha*, Retz. Obs. iii. 39 = *calcarata*.
monanthos, Desf. Fl. Atlant. ii. 165.—Reg. Mediterr.
monanthos, Ucria, in Roem. Arch. i. i. (1796) 69 (Quid ?).—Sicil. ?
monanthos, Viv. Fl. Lib. Spec. 42 = *peregrina*.
Monardi, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 131. —Alger.
monosperma, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 721 = *cassubica*.
montana, Froel. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 215 = *sepium*.
Montbreti, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. x. 59.—Mesopot.
montevidensis, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 110 = *obscura*.
montevidensis, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 34 = *dentata*.
Morisiana, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 172, in obs. = *macrocarpa*.
mucronata, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 139.—Chili.
multicaulis, Ledeb. Fl. Alt. iii. 345.—Sibir. altaic.
multicaulis, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 625 (Beitr. Fl. Hercyn. 255) = *lathyroides*.
multifida, Wallr. Ann. Bot. 85 = *monanthos*.
multiflora, Lam. Fl. Fr. ii. 560 = *V. Cracca*, Gerardi.
multiflora, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 307 = *cassubica*.
Musquines, Bosc, ex Steud. Nom. ed. I. 882, nomen (Quid ?).—Europ.
nana, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. vii. i. (1877) 89 = *Lathyrus nevadensis*.
nana, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 37.—Reg. Argent.
narbonensis, Linn. Sp. Pl. 737.—Reg. Mediterr. ; Oriens.
nebrodensis, Huet, ex Nym. Consp. 210 = *cuneata*.
nemoralis, Steud. Nom. ed. I. 882 = *sativa*.
nigra, Steud. I. c. = *sativa*.
nigricans, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 20.—Chili.
Nissoliana, Gouan, Herbor. 51 (excl. syn.) = *pannonica*.
Nissoliana, Linn. Sp. Pl. 735.—Europ.
nodosa, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. ii. 365, nomen (Quid ?).—Hab. ?
nodosa, Gaertn. Fruct. ii. t. 151 = *globosa* ?
Noëana, Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 572.—Syria.
Nordmanniana, Ower, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 251 = *Balansae* ?
notata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 105 = *sativa*.
obcordata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 530 = *sativa*.
obscura, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 36.—Bras.
occulta, Lehm. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 184, nomen (Quid ?).—Europ.
ochroleuca, Gilib. Fl. Lituan. ii. 102 = *pisiformis*.
ochroleuca, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xlii.—Italia.
olbiensis, Reut. ex Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) p. cli = *cuneata*.
onobrychioides, Linn. Sp. Pl. 735.—Reg. Mediterr.
onusta, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 623 (Beitr. Fl. Hercyn. 253) = *tenuifolia*.
oregana, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 270 = *americana*.
oroboides, Wulf. in Jacq. Coll. iv. 323.—Europ. austr.
Orobis, DC. Fl. Fr. Suppl. 577.—Europ.
oxyphylla, Schur, Enum. Pl. Transs. 167 = *sepium*.
palaestina, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 116.—Syria ; Mesopot.
pallens, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 529 (Quid ?).—Helvet.
pallida, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 196.—Chili.
pallida, Jacquem. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 178 = *sativa*.
pallida, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 789. —Dahuria ; Reg. Himal.
pannonica, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 393.—Europ. austr. ; Oriens.
paposana, Phil. Fl. Atac. 15.—Chili.
parviflora, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 73.—Marocc.
parviflora, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 20 = *Hookeri*.
parviflora, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 418 = *hirsuta*.
parviflora, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 460 = *disperma*.
parviflora, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 69 = *caroliniana*.
patagonica, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 259.—Patagon.
patula, Moench, Meth. 147 = *dumetorum*.

VICIA :—

- pauciflora*, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 196 = *graminea*.
pauciflora, Presl, Fl. Sic. p. xxii.—Sicil.
paucifolia, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 173.—Afr. trop.
pectinata, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 205.—Ins. Mader.
peduncularis, Rojas Clem. Pl. Espont. Titag. 16.—Hispan.
pedunculata, Gueldenst. Reisen, i. 195 ; ex Ledeb. Fl. Ross. i. 679 (Quid ?).—Rossia.
pedunculata, Peyr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 80.—Mexic.
pedunculata, Shuttlew. ex Roux, in Bull. Soc. Bot. et Hort. Prov. iii. (1881) 124.—Hab. ?
pellucida, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 50 = *Lessertia falci-formis*.
peregrina, Linn. Sp. Pl. 737.—Reg. Mediterr. ; Oriens ; Ind. bor. occ.
perennis, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 155 = *atro-purpurea*.
persepolitana, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 48 = *Michauxii*.
persica, Boiss. l. c. ii. 103.—As. Min.
picta, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 41.—Armenia.
pilisensis, Aschers. & Janka, in Aschers. & Kanitz, Cat. Corm. Serb. 105 (= *Orobis ochroleucus*).—Hungar.
pilosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 161 = *sativa*.
pimpinelloides, Mauri, Pl. Rom. Cent. xiii. 35 = *sativa*.
Pinardi, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 120.—As. Min.
pinetorum, Boiss. & Sprun. l. c. ii. 104.—Graecia.
Piscidia, Forst. ex DC. Prod. ii. 379 (= *Orobis Piscidia*).—N. Caled.
pisiformis, Linn. Sp. Pl. 734.—Europ.
platycarpus, Roth, Bot. Abh. 10. t. 1.—Hab. ?
plumosa, Martr. Fl. Tarn, 179 = *varia*.
podocarpa, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 571 = *sericocarpa*.
polymorpha, Godr. Fl. Lorr. ed. I. i. 179 = *sativa*.
polyphylla, Desf. Fl. Atlant. ii. 162 = *tenuifolia*.
polyphylla, Jan. ex Nym. Consp. 207 = *Gerardi*.
polyphylla, Moç. & Sesse, ex G. Don, Gen. Syst. ii. 318 = *Sessei*.
polyphylla, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 527 = *varia*.
polyphylla, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vii. 86. t. 699 = *Sibthorpii*.
polyphylla, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 282. t. 254 = *villosa*.
polysperma, Tenore, Fl. Neap. Prod. App. v. 22 = *altissima*.
pontica, Willd. Sp. Pl. iii. 1094 = *V. Cracca*.
porphyrea, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 532, in obs.—Hab. ?
pratensis, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 626 (Beitr. Fl. Hercyn. 256) = *sepium* ?
Pseudo-cracca, Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec. iii. 58.—Italia.
Pseudo-cracca, Fritze, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 306 = *baetica*.
Pseudo-cracca, Méral, Fl. Par. ed. III. t. 2 = *varia*.
Pseudo-lutea, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 189.—Europ.
Pseudo-orobis, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 41.—Dahuria.
Pseudo-sepium, Nym. in Linnaea, xviii. (1844) 648.—Sicil.
Pseudo-villosa, Schur, Enum. Pl. Transs. 166 = *varia*.
pubescens, Link, Handb. ii. 190 ; Boiss. Fl. Orient. ii. 596.—Reg. Mediterr.
pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 499.—Am. bor. occ.
punctata, Schleich. ex Pers. Syn. ii. 307 = *onobrychioides*.
purpurascens, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 155 = *pannonica*.
purpurea, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 93 = *alpestris*.
pusilla, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1106 = *gemella*.
pygmaea, Link, Handb. ii. 191 = *sativa*.
pyrenaica, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 333. —Mont. Pyren.
quinquenervia, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 50.—Japon.
Rapunculus, Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord. xxxi. (1877) 144 = *amoena*.
repens, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 344.—Ins. Cyclad.

VICIA :—

remrevillensis, Hussenot, Chard. Nanc. 98; ex Godr. Fl. Lorr. ed. II. i. 196 = sativa.
retusa, Steud. Nom. ed. II. ii. 764.—Chili.
Reuteriana, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 73 = villosa.
Reverchoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 291.—Texas.
rigida, Herbach, Stirp. Rar. Bucov. 50 = cassubica.
rigidula, Royle, Illustr. Bot. Himal. 200.—Reg. Himal.
Rosani, Tenore, Fl. Nap. v. 115.—Ital.
rotundifolia, Gilib. Fl. Lituan. ii. 106 = sepium.
salaminia, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 39.—Graecia.
Salisii, J. Gay, ex Nym. Consp. 212 = pubescens.
Sallei, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) p. cxlix = cuneata.
sativa, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 425 = macrocarpa.
sativa, Linn. Sp. Pl. 736.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
scepusiensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 629.—Europ.
segetalis, Thuill. Fl. Par. ed. II. 367 = sativa.
Seguenzae, Huet, ex Nym. Consp. 208 = sicula.
Selloi, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 33 = graminea.
semiglabra, Rupr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 583.—Reg. Caucas.
separia, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 287 = sepium.
sepium, Linn. Sp. Pl. 737.—Europ.; As. bor.; Reg. Himal.
sericea, Moench, Mch. 147 = Nissoliana.
seriocarpa, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 4.—As. Min.; Persia.
serrata, Pantoč. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 80 = grandiflora.
serratifolia, Jacq. Fl. Austr. v. 30 = narbonensis.
Sessei, G. Don, Gen. Syst. ii. 318.—Mexic.
sessiliflora, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 129.—Chili.
setifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 500 = graminea.
Sibthorpii, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 122.—Graecia.
sicula, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 292.—Ins. Sicil.
singarensis, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 594.—Mesopot.
sitchensis, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1833) 129 = gigantea, Hook.
smyrnaca, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 38.—As. Min.
Solisi, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1865) ii. 326.—Chili.
sordida, Salisb. Prod. 339 = sepium.
sordida, Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 133 = grandiflora.
sparsiflora, Tenore, Fl. Nap. v. 110.—Ital.
sparsifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 270 = americana.
Spruneri, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 119 = cretica.
spuria, Rafin. Caratteri, 72 = hybrida.
Stabiana, Tenore, Fl. Nap. v. 112 = Gerardi.
stenophylla, Bianca, in Atti Acc. Gioen. Sc. Nat. Ser. II. xiv. (1858) 56.—Sicil.
stenophylla, Schur, Enum. Pl. Transs. 169 = sativa.
stenophylla, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 35.—Reg. Argent.
stipulacea, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 739 = Lathyrus polymorphus.
striata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 162 = pannonica.
subrotunda, Schur, Enum. Pl. Transs. 167 = sepium.
subserata, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 624.—Chili.
subulata, Moç. & Sesse, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 765, nomen (Quid?).—Mexic.
subvillosa, Boiss. Fl. Orient. ii. 580.—Persia.
sylvatica, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 200 = pallida, Turcz.
sylvatica, Linn. Sp. Pl. 734.—Europ.
sylvatica, Nutt. Gen. Am. ii. 97 = americana.
syriaca, Medic. Beobacht. (1783) 178 = seq.?
syriaca, Weinm. Hort. Dorp. (1810) 162 = calcarata.
syrtica, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 151.—Hispan.
Talpa, Raym. ex Poir. Encyc. viii. 563 = pyrenaica.
Tanaka, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 103; ii. 326 = V. Pseudo-orobus.
tenera, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5928.—Reg. Himal.
Tenoreana, Mart. Pl. Crit. Tarn. 20 = gracilis, Loisel.
tenuifolia, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 309.—Europ.; Oriens; As. bor.
tenuifolia, Tenore, Fl. Nap. v. 113 = varia.
tephrosioides, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 32.—Reg. Argent.

VICIA :—

Terronii, Steud. Nom. ed. II. ii. 765, sphalm. = hirsuta.
tetragona, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 410.—Hab.?
tetrasperma, Moench, Meth. 148 = gemella.
tetrasperma, Moris, Fl. Sard. i. 567 = pubescens.
thessala, Spiun. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 574 = V. Barbazitae.
Thouini, Mart. Hort. Erlang. (1814) 156, nomen (Quid?).—Hab.?
Timbali, Loret, in Loret & Barr. Fl. Monsp. 187, 804 = cuneata.
tomentosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 883; ed. II. ii. 765 = Coursetia tomentosa.
torulosa, Boiss. Fl. Orient. ii. 589 = caesarea.
torulosa, Desf. Tabl. ed. I. 196, nomen (Quid?).—Hab.?
torulosa, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 173 = sativa.
trichocalyx, Moris, Stirp. Sard. Elench. Fasc. iii. 7 = atropurpurea.
trichomera, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 70 = truncatula.
tricolor, Schur, Enum. Pl. Transs. 167 = sepium.
tricolor, Sebast. & Mauri, Fl. Rom. Prod. 245. t. 4 = melanops.
tricuspidata, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 158.—Tauria.
tridentata, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 93.—China.
tridentata, Gater, Desc. Pl. Montaub. 129 = lutea.
tridentata, Schwein. in Long, Exped. Winneb. ii. 392 = americana.
trifida, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1112 = americana.
triflora, Sieber, in Ind. Sem. Hort. Pesth. (1825); ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 357 (Quid?).—Hab.?
triflora, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xlii = calcarata.
trijuga, A. Br. & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 13.—Hab.?
truncata, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 270 = americana.
truncata, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 50.—Chili.
truncatula, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 72; Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 473.—Bannat; Reg. Caucas.; Persia.
ucrainica, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. 1. (1874) 44 (sp. dub).—Ross.
uncinata, Desf. ex Nym. Consp. 210 = sativa.
uncinata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 530 = pannonica.
ungiculata, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxvii. (1883) p. vi, 552.—Gallia.
unijuga, A. Br. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 12.—Sibir.
valdiviana, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 681.—Chili.
varia, Host, Fl. Austr. ii. 332.—Europ.; Oriens; Afr. bor.
variegata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 103 = dumetorum.
variegata, Sibth. & Sm. Fl. Gracc. Prod. ii. 69 = villosa.
variegata, Willd. Sp. Pl. iii. 1096.—As. Min.; Persia.
venosa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 395.—Sibir.
venulosa, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. ix. 123.—Persia.
versicolor, Salisb. Prod. 339 = V. Cracca.
vestita, Boiss. Elench. 39 = lutea.
vestita, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 134.—Chili.
vicina, Clos, l. c. 138.—Chili.
villosa, Brot. Fl. Lusit. ii. 150 = atropurpurea.
villosa, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 182.—Europ.; Oriens.
violacea, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 287 = onobrychioides.
virginica, Mart. Hort. Erlang. (1814) 156, nomen (Quid?).—Hab.?
vulcanica, Huet, ex Nym. Consp. 207 = V. Pseudo-cracca.
vulgaris, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 617 = V. Faba.
vulgaris, Uspensky, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vii. (1834) 378 = sativa.

VICILLA, Schur, Enum. Pl. Transs. 170 (1866) = **Vicia**, Tourn. (Legumin.).
cassubica, Schur, l. c. = *Vicia cassubica*.
Orobis, Schur, l. c. 171 = *Vicia Orobis*.
pisiformis, Schur, l. c. 170 = *Vicia pisiformis*.
sylvatica, Schur, l. c. = *Vicia sylvatica*.

VICIOIDES, Moench, Meth. 135 (1794) = **Vicia**, Tourn.

(Legumin.).
hirsuta, Moench, l. c. 137 = *Vicia pannonica*.
hybrida, Moench, l. c. 136 = *Vicia hybrida*.
lutea, Moench, l. c. = *Vicia lutea*.
sepium, Moench, l. c. = *Vicia sepium*.
striata, Moench, l. c. 137 = *Vicia pannonica*.
sylvatica, Moench, l. c. 136 = *Vicia sylvatica*.
uncinata, Moench, l. c. = *Vicia pannonica*.

VICOA, Cass. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xvii. (1829) 418.

COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 334.
PENTANEMA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 74.
appendiculata, DC. Prod. v. 474 = auriculata.
auriculata, Cass. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xvii. (1829) 418.—Ind. or.; Burma.
aurita, DC. Prod. v. 474 = auriculata.
cernua, Dalz. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 126.—Ind. or.
chrysopsioides, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 335 (chrysophthalmoides) = *Pulicaria petiolaris*.
divaricata, Benth. & Hook. f. Gen. l. c.; *Oliver* & *Hiern*, in *Oliver*, Fl. Trop. Afr. iii. 362.—Afr. trop.
indica, DC. in Wight, Contrib. 10 = auriculata.
Kotschy, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 335.—Afr. trop.
multicaule, Benth. & Hook. f. l. c.—Persia.
radiata, Benth. & Hook. f. l. c. = seq.
vestita, Benth. & Hook. f. l. c.—Ind. or.

VICTORIA, Lindl. Monog. 3 (1837). **NYMPHAE-**

CEAE, Benth. & Hook. f. i. 47.
amazonica, Sowerby, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vi. (1850) 310 = regia.
Amazonum, Klotzsch, in Bot. Zeit. v. (1847) 245 = regia.
Cruziana, Orbig. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiii. (1840) 57 = regia.
Fitzroyana, Hort. ex Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1388 = *Nymphaea gigantea*.
regalis, Schomb. in Mag. Zool. & Bot. xi. (1837) t. 12 = regia.
regia, Lindl. Monog. 3; et Bot. Reg. (1838) Misc. 9.—Guian.
Regina, J. E. Gray, in Mag. Zool. & Bot. ii. (1837) p. iv; Schomb. in Proc. Bot. Soc. Lond. i. (1839) 44 = regia.
Reginae, Hook. Kew Journ. ii. (1850) 314, in nota = praec.

VICTORIPERREA, Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astr. & Zél. 83 (1853) = **Freycinetia**, Gaudich. (Pandani.).
impavida, Homb. l. c. 83.—Hab.?

VIDALIA, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 17 (1880) = **Kayea**, Wall. (Guttif.).
Garciae, F. Villar, l. c. 18.—Ins. Philipp.
lepidota, F. Villar, l. c. = K. lepidota.
Navesii, F. Villar, l. c.—Ins. Philipp.

VIEILLARDIA, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 375 = **Timeroysa**, Montr. (Nyctag.).
austro-caledonica, Brongn. et Gris, l. c. 376.—N. Caled.

VIEILLARDIA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 196 = **Castanospermum**, A. Cunn. (Legumin.).
grandiflora, Montr. l. c.—N. Caled.

VIEILLARDIA, Benth. & Hook. f. Gen. 556 (1865); et iii. 10 (1880), sphalm. = **VIEILLARDIA**, Montr., et **VIEILLARDIA**, Brongn. & Gris.

VIERAEA, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 225 (1835-41). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 334.

VIERA, Webb & Berth. l. c. t. 84 (1835-41).
laevigata, Webb & Berth. l. c. 226 [t. 84].—Ins. Canar.

VIEREYA, Steud. Nom. ed. II. ii. 774 (1841), sphalm. = **VIREYA**, Blume = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.); et **VIREYA**, Rafin. = **Alloplectus**, Mart. (Gesner.).

VIERIA, Webb & Berth. Phyt. Canar. Ic. t. 84 (1836-41) = **Vieraea**, Sch. Bip. (Compos.).

VIEUSSEUXIA D. Delar. Desc. Pl. Nov. 31. t. 5 (1766) = **Moraea**, Mill. (Irid.).
angustifolia, Eckl. Top. Verz. 12.—Afr. austr.
aristata, D. Delar. Desc. Pl. Nov. 33 = M. edulis.
aristata, Houtt. Handleid. xii. 105. t. 80 = M. tricuspis.

VIEUSSEUXIA :—

- aurantiaca*, Eckl. Top. Verz. 13 = *Moraea aurantiaca*.
Bellenderi, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 395 = *M. Pavonia*.
bituminosa, Eckl. Top. Verz. 14 = *M. viscaria*.
Brehmii, Eckl. l. c. 12.—Afr. austr.
ciliata, Eckl. l. c. 11 = *M. papilionacea*.
collina, Eckl. l. c. 12 = *Homeria collina*.
crispa, Eckl. l. c. = *M. fimbriata*, *crispa*.
curvata, Eckl. l. c. 13.—Afr. austr.
edulis, Link, Enum. Hort. Berol. i. 56 = *M. edulis*.
Freuchenia, Steud. Nom. ed. II. ii. 765 = *M. ramosa*.
fugax, D. Delar. Desc. Pl. Nov. 33 = *M. fugax*.
fugax, Roem. & Schult. Syst. i. 489 = *M. edulis*.
geniculata, Eckl. Top. Verz. 12.—Afr. austr.
glaucopis, DC. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 141 = *M. glaucopis*.
gracilis, Eckl. Top. Verz. 12 = *M. gracilis*.
graminifolia, Eckl. l. c. 11 = *M. polyanthos*.
grandiflora, Eckl. l. c. 14 = *M. grandiflora*.
intermedia, Eckl. l. c. 12.—Afr. austr.
iridioides, [Delar. in] Red. Lil. vi. t. 340 = *M. Candolleana*.
iridioides, Link, Enum. Hort. Berol. i. 56 = *M. iridioides*.
junceae, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 765.—Afr. austr.
longifolia, Eckl. Top. Verz. 14 = *M. edulis*.
lurida, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 395 = *M. lurida*.
lutea, Eckl. Top. Verz. 14.—Afr. austr.
martiniensis, DC. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 138 = *Trimeza lurida*.
multiflora, Eckl. Top. Verz. 12 = *M. multiflora*.
multifolia, Eckl. l. c.—Afr. austr.
mutila, Eckl. l. c.; A. Dietr. Sp. Pl. ii. 494 = *Iris mutila*.
mutila, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 621 = *M. tripetala*.
nervosa, Eckl. Top. Verz. 12 = *M. papilionacea*.
pauciflora, Eckl. l. c. = *M. pauciflora*.
Pavonia, DC. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 139 = *M. Pavonia*.
plumaria, Eckl. Top. Verz. 14 = *M. iriopedata*.
polystachya, Eckl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 131 = *M. polystachya*.
pulchra, Eckl. Top. Verz. 13.—Afr. austr.
ramosa, Eckl. l. c. 12 = *M. ramosa*.
riovularis, Eckl. l. c. 11.—Afr. austr.
Schimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 305 = *M. diversifolia*.
serrata, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 765.—Afr. austr.
setacea, Eckl. Top. Verz. 13 = *M. setacea*.
spiralis, D. Delar. Desc. Pl. Nov. 31. t. 5 = *M. Pavonia*.
tabularis, Eckl. Top. Verz. 13.—Afr. austr.
tenuifolia, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 765.—Afr. austr.
tenuis, Roem. & Schult. Syst. i. 491 = *M. tenuis*.
tricuspis, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ex Spreng. Syst. i. 165 = *M. tricuspis*.
tridentata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 305 = *M. diversifolia*.
tripetaloides, DC. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 138 = *M. tripetala*.
tristis, Eckl. Top. Verz. 11 = *M. tristis*.
unguicularis, Roem. & Schult. Syst. i. 491 = *M. unguicularis*.
villosa, Spreng. Syst. i. 166 = *M. Pavonia*.
viscaria, Eckl. Top. Verz. 12 = *M. viscaria*.

VIGIA, Vell. Fl. Flum. ix. t. 128 (1827) = **Plukenetia**, Linn. (Euphorb.).
serrata, Vell. l. c. (= *Fragariopsis scandens*).—Bras.

VIGIERA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 644 (1865), err. typ. = seq.

VIGIERIA, Vell. Fl. Flum. 76 (1825); ii. tt. 73, 74 (1827) = **Escallonia**, Linn. (Saxifr.).
hispida, Vell. l. c. 76; ii. t. 73.—Bras.
laevis, Vell. l. c. 77; ii. t. 74.—Bras.

VIGINEIXIA, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 12 (1874) = **Pieris**, Linn. (Compos.).
Balansae, Pomel, l. c. (= *Helminthia Balansae*, Coss. & Dur.).—Afr. bor.

- VIGNA**, Savi, Mem. Phas. iii. 7 (1826?). **LEGU-MINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 539.
CALLICYSTHUS, Endl. Prod. Fl. Norf. 90 (1833).
OTOPTERA, DC. Prod. ii. 240 (1825).
PLECTROTROPIS, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 338 (1827).
SCYTTALIS, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 144 (1835).
SPHENOSTYLIS, E. Mey. l. c. 148 (1835).
STROPHOSTYLES, E. Mey. l. c. 147 (1835).
Afzelii, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 202.—Afr. trop.
ambacensis, Welw. ex Baker, l. c. 201.—Afr. trop.
andongensis, Baker, l. c. 197.—Afr. trop.
angivensis, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 69.—Madag.
angustifolia, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 240.—Afr. austr.
angustifolia, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 311 = *capensis*.
anomala, Walp. Rep. i. 779 = *retusa*.
Benthami, Vathe, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii (1878) 262.—Afr. trop.
brachycarpa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. II. (1874) 185.—Burma.
brachystachys, Benth. Bot. Voy. Sulph. 86 = *glabra*.
brasilienis, Mart. ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 194 = *glabra*.
Burchellii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 239.—Afr. austr.
calcarata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 247 = *Phaseolus calcaratus*.
capensis, Walp. in Linnaea, xliii. (1839) 533.—Geront. trop.
carinalis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 86 = *capensis*.
Catjang, Walp. in Linnaea, xliii. (1839) 533.—Cosmop. trop.
coerulea, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 203.—Afr. trop.
comosa, Baker, l. c. 202.—Afr. trop.
crinita, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 217.—Abyss.
decipiens, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 241 (excl. syn.).—Afr. austr.
decipiens, Harv. l. c., partim = *triloba*.
dolichoides, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 206.—Reg. Himal.; Java.
Donii, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 202.—Afr. trop.
frutescens, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 218.—Abyss.
gangetica, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 185 = *glabra*.
glabra, Savi, Mem. Phas. iii. 8.—Cosmop. trop.
golungensis, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 199.—Afr. trop.
gracilis, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 311.—Afr. trop.
hasitata, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 187 = *V. Catjang*.
hastifolia, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 200.—Afr. trop.
helicopus, Walp. in Linnaea, xliii. (1839) 534 = *glabra*.
heterophylla, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 218.—Abyss.
hirsuta, Feay, ex Wood, Bot. & Fl. 96 = *glabra*?
hirta, Hook. Ic. Pl. t. 637 = *capensis*.
hispida, Walp. in Linnaea, xliii. (1839) 534.—Afr. austr.
holosericea, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 200.—Afr. trop.
huillensis, Welw. ex Baker, l. c. 204.—Afr. trop.
Kotschy, Schweinf. Reliq. Kotschy. (1863) 29. t. 22.—Afr. trop.
lanceolata, Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 350.—Austral.
lancifolia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 221.—Abyss.
linearifolia, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 309 = *reticulata*.
lobata, Endl. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 188.—Afr. austr.; Ins. Timor.?
lobatifolia, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 199.—Afr. trop.
lobelifolia, Baker, l. c. 613, sphalm. = *praec.*
lucens, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 207.—Burma.
lutea, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 452 = *retusa*.
luteola, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 194. t. 50. f. 2 = *glabra*.
marginata, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 240.—Afr. austr.
membranacea, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 219.—Abyss.

VIGNA :—

- monachalis*, Endl. ex Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 279 = *V. Catjang*.
multiflora, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 308.—Afr. trop.
nigritia, Hook. f. l. c. 310 = *glabra*.
nilotica, Hook. f. l. c. 311.—Afr. trop.
oahuensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 450 = *owahuensis*.
oblonga, Benth. Bot. Voy. Sulph. 86.—Am. trop.; Afr. trop.
oblongifolia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 220.—Abyss.
opistotricha, A. Rich. l. c. = *Phaseolus Mungo*.
ornata, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 203.—Afr. trop.
owahuensis, Vog. in Linnaea, x. (1836) 585.—Ins. Sandvic.
paraguariensis, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 195.—Am. austr.
Parkeri, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 69.—Madag.
parviflora, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 201.—Afr. trop.
parvifolia, Planch. ex Baker, l. c. 206.—Afr. trop.
phaseoloides, Baker, l. c. 200.—Afr. trop.
pilosa, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 207.—Ind. or.
pubigera, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 201.—Afr. trop.
radicans, Welw. ex Baker, l. c. 198.—Afr. trop.
repens, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 205.—Burma.
reticulata, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 310.—Afr. trop.
retusa, Walp. in Linnaea, xliii. (1839) 534.—Cosmop. trop.
rotundifolia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 279.—Java.
sandwicensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 451.—Ins. Sandvic.
scabra, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 32 = *capensis*.
Schimperi, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 201.—Abyss.
sinensis, Endl. ex Hassk. Pl. Jav. Rar. 386 = *V. Catjang*.
suberecta, Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 388.—Austral.
syndwicensis, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 563, sphalm. = *sandwicensis*.
tenuis, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1197.—Afr. austr.
tenuis, Franch. in Revoil, Comali, 29.—Afr. trop.
Thonningii, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 311 = *capensis*.
tranquebarica, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1198 = *V. Catjang*.
triloba, Walp. in Linnaea, xliii. (1839) 534.—Afr. trop. et austr.
tuberosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 217. t. 42 = *capensis*.
unguiculata, Walp. Rep. i. 779 = *V. Catjang*.
venulosa, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 203.—Afr. trop.
vexillata, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 440 = *capensis*.
villosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 81 = *owahuensis*.
villosa, Savi, Mem. Phas. iii. 9 = *glabra*.
Wightii, Benth. ex Bedd. in Trans. Linn. Soc. xxv. (1865) 215.—Ind. or.

VIGNALDIA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 357 (1847) = **Pentas**, Benth. (Rubiace.).
luteola, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 282 = *Mussaenda luteola*.
occidentalis, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 197 = *P. occidentalis*.
Quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 357 = *P. carnea*.
Schimperi, A. Rich. l. c. 358 = *P. Schimperiana*.
Schimperiana, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 45 = *praec.*

VIGNANTHA, Schur, Enum. Pl. Trans. 705 (1866) = **Carex**, Dill. (Cyperac.).
acuta, Schur, Enum. Pl. Transs. 706 = *C. acuta*.
dacica, Schur, l. c. 705 = *C. caespitosa*.
Dreyeri, Schur, l. c. 706 = *C. caespitosa*.
Moenchiana, Schur, l. c. = *C. acuta*.
mucronata, Schur, l. c. 705 = *C. mucronata*.
prolixa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 176 = *C. acuta*.

VIGNANTHA :—

- rigida*, Schur, Enum. Pl. Transs. 705 = *Carex caespitosa*.
stricta, Schur, l. c. 707 = *C. stricta*.
touranginiana, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 176 = *C. acuta*.
vulgaris, Schur, Enum. Pl. Transs. 706 = *C. vulgaris*.

VIGNAUDIA, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 282 (1867)
 sphalm. = VIGNALDIA, A. Rich. = *Pentas*, Benth.
 (Rubiaceae).

VIGNEA, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 22 (1819);

et in Flora, iv. (1821) 17 = *Carex*, Dill. (Cyperac.).
acroandra, Schur, Enum. Pl. Transs. 699 = *C. acroandra*.

acuta, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1626 = *C. acuta*.

altissima, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 79 = *C. muricata*.

ammophila, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1615 = *C. divisa*.

appressa, Reichb. l. c. 1621 = *C. paniculata*.

aquatilis, Reichb. l. c. 1624 = *C. aquatilis*.

arenaria, Reichb. l. c. 1618 = *C. arenaria*.

argyroglochis, Reichb. l. c. 1612 = *C. leporina*.

axillaris, Reichb. l. c. 1617 = *C. axillaris*.

Bertolonii, Reichb. l. c. 1608 = *C. divisa*.

bicolor, Reichb. l. c. 1624 = *C. bicolor*.

Boenninghausiana, Reichb. l. c. 1616 = *C. axillaris*.

bracteosa, Reichb. l. c. 1619 = *C. bracteosa*.

brizoides, Reichb. l. c. 1611 = *C. brizoides*.

caespitosa, Reichb. l. c. 1625 = *C. caespitosa*.

canescens, Reichb. l. c. 1612 = *C. canescens*.

capitata, Reichb. l. c. 1606 = *C. capitata*.

cephalophora, Reichb. l. c. 1607 = *C. cephalophora*.

cerina, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140⁷ = *C. vulgaris*.

chlorocarpa, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 193 = *C. vulgaris*.

chordorrhiza, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1608 = *C. chordorrhiza*.

compacta, Reichb. l. c. 1623 = *C. vulgaris*.

conjugata, Reichb. l. c. 1622 = *C. brunnea*.

crassinervis, Schur, Enum. Pl. Transs. 704 = *C. vulgaris*.

curta, Opiz, Seznam, 103 (err. typ. 203) = *C. canescens*.

curvula, Opiz, l. c.; Schur, in Verh. Siebenb. Ver.

Naturw. iv. (1853) 78 = *C. Schreberi*.

cyperoides, Peterm. Fl. Lips. Excurs. 49 = *C. cyperoides*.

dacica, Fuss, Fl. Transs. 681 = *C. caespitosa*.

Davalliana, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1605 = *C. Davalliana*.

dioica, Reichb. l. c. 1604 = *C. dioica*.

disticha, Peterm. Fl. Bienitz, 16 = *C. disticha*.

divisa, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1615 = *C. divisa*.

divulsa, Reichb. l. c. 1619 = *C. divulsa*.

Drejeri, Fuss, Fl. Transs. 680 = *C. caespitosa*.

echinata, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii.

(1869) 176 = *C. echinata*.

elongata, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1617 = *C. elongata*.

festuacea, Reichb. l. c. 1614 = *C. straminea*.

foenea, Reichb. l. c. = *C. straminea*.

foetida, Reichb. l. c. 1607 = *C. foetida*.

Gaudiniana, Pritz. Ic. Ind. i. 1161 = *C. Gaudiniana*.

Gebhardi, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1613 = *C. elongata*.

glareosa, Reichb. l. c. 1626 = *C. glareosa*.

grypos, Reichb. l. c. 1608 = *C. echinata*.

guestphalica, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140⁷ = *C. muricata*.

Heleonastes, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1609 = *C. Heleonastes*.

hydrophila, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140⁷ = *C. echinata*.

incurva, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1607 = *C. incurva*.

intermedia, Reichb. l. c. 1618 = *C. disticha*.

juncoides, Opiz, Seznam, 104 = *C. juncoides*.

lagopina, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1609 = *C. lagopina*.

lagopodioides, Reichb. l. c. 1614 = *C. lagopodioides* (cf. Addend.).

leiorhyncha, Pritz. Ic. Ind. i. 1161 = *C. leiorhyncha*.

leporina, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1613 = *C. leporina*.

loliacea, Reichb. l. c. 1610 = *C. loliacea*.

lucorum, Reichb. l. c. 1614 = *C. lucorum*.

VIGNEA :—

maritima, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1623 = *Carex maritima*.

microstachya, Reichb. l. c. = *C. microstachya*.

microstylis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140⁶ = *C. microstylis*.

Moenchiana, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1626 = *C. acuta*.

mucronata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140⁷ = *C. mucronata*.

multiflora, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1621 = *C. vulpinoidea*.

muricata, Reichb. l. c. 1611 = *C. muricata*.

neglecta, Peterm. Fl. Bienitz, 17 = *C. caespitosa*.

memorosa, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1620 = *C. vulpina*.

Nenningiana, Opiz, Seznam, 103 (err. typ. 203) = *C. Nenningiana* (in Addend.).

norvegica, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1610 = *C. norvegica*.

Ohmuelleriana, Pritz. Ic. Ind. i. 1161 = *C. arenaria*.

pacifica, Reichb. ex Nym. Consp. 777 = *C. vulgaris*.

paniculata, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1622 = *C. paniculata*.

paradoxa, Reichb. l. c. 1621 = *C. paradoxa*.

Persoonii, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 78 = *C. canescens*.

psammophila, Schur, Enum. Pl. Transs. 700 = *C. brizoides*.

Pseudo-arenaria, Reichb. Ic. Fl. Germ. viii. t. 208 = *C. arenaria*.

Pseudo-brizoides, Schur, Enum. Pl. Transs. 700 = *C. Pseudo-brizoides*.

Pseudo-Schreberi, Schur, l. c. = *C. brizoides*.

pulicaris, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1606 = *C. pulicaris*.

pulla, Reichb. l. c. 1624 = *C. saxatilis*.

remota, Reichb. l. c. 1616 = *C. remota*.

repens, Reichb. l. c. 1618 = *C. repens*.

repens, Schur, Enum. Pl. Transs. 701 = *C. arenaria*.

retroflexa, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1610 = *C. rosea*.

rigida, Fuss, Fl. Transs. 681 = *C. vulgaris*.

rivularis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 78 = *C. divisa*.

rosea, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1611 = *C. rosea*.

salina, Reichb. l. c. 1623 = *C. salina*.

saxatilis, Reichb. l. c. 1624 = *C. saxatilis*.

Schreberi, Reichb. l. c. 1614 = *C. Schreberi*.

scirpoides, Reichb. l. c. 1611 = *C. echinata*.

scoparia, Reichb. l. c. 1613 = *C. scoparia*.

setifolia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 175 = *C. divisa*.

squarrosa, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1606 = *C. squarrosa*.

stellulata, Reichb. l. c. 1610 = *C. echinata*.

stenophylla, Reichb. l. c. 1607 = *C. stenophylla*.

stipata, Reichb. l. c. 1620 = *C. stipata*.

striata, Reichb. l. c. 1625 = *C. lacistoma*.

stricta, Reichb. l. c. 1624 = *C. stricta*.

strictifolia, Opiz, Seznam, 103 (err. typ. 203) = *C. acuta*.

tenuissima, Schur, Enum. Pl. Transs. 979 (Index) = *C. muricata*.

teretiuscula, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1621 = *C. paniculata*.

trinervis, Reichb. l. c. 1625 = *C. trinervis*.

tripartita, Reichb. l. c. 1609 = *C. curvula*.

virens, Reichb. l. c. 1611 = *C. muricata*.

vulgaris, Fuss, Fl. Transs. 680 = *C. vulgaris*.

vulpina, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1620 = *C. vulpina*.

VIGOLINA, Poir. Encyc. viii. 613 (1808) = *Galinsoga*, Ruiz & Pav. (Compos.).

Acmella, Poir. l. c. = *G. parviflora*.

Armella, Steud. Nom. ed. II. i. 656, in syn. sphalm. = *praec.*

VIGUIERA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 224. t. 379 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 375.

BAHIOPSIS, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 35.

HARPALIMUM, DC. Prod. v. 583 (1836).

LEIGHIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxv. 435 (1822).

VIGUIERA :—

acuminata, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 91 = *Oyedaea acuminata*.

anchusaefolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 222.—Bras.

arenaria, Baker, l. c. 226.—Bras.

asperima, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 401.—Bras.

aspilioides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 228.—Bras.

attenuata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 400 = *Aspilia asperima*.

blepharolepis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 5.—N. Mexic.

Bonplandiana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 399 = *Oyedaea Bonplandiana*.

bracteata, Gardn. l. c. 404.—Bras.

brevipes, DC. Prod. v. 579 = *helianthoides*.

buddleiaeformis, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 177.—Mexic.

calva, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 375.—Bolivia.

canescens, DC. Prod. v. 579.—Mexic.

cordifolia, A. Gray, Pl. Wright. i. 107.—Mexic.

decurrens, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 5.—Am. bor.

deltoidea, A. Gray, l. c. v. (1859) 161.—Calif.

densifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 219.—Paraguay.

dentata, Spreng. Syst. iii. 615 = *helianthoides*.

discolor, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 228.—Bras.

dissitifolia, Baker, l. c. 225.—Bras.

elegans, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 398 = *Aspilia foliacea*.

elliptica, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 194 = *Aspilia Burchellii*.

excelsa, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 375; et ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 177.—Mexic.

filifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 219.—Bras.

floribunda, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 401 = *Aspilia floribunda*.

foliacea, Spreng. Syst. iii. 616 = *Aspilia foliacea*.

Gardneri, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 224.—Bras.

Ghiesbreghtii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 6.—Mexic.

Gilliesii, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 39.—Chili.

glabra, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 398 = *Aspilia glabra*.

glandulosa, Bertol. Misc. Bot. vii. 45 = *Baldwinia uniflora*.

gracilis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 402 = *Aspilia gracilis*.

grammatoglossa, DC. Prod. v. 580.—Mexic.

grandiflora, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 404.—Bras.

helianthoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 226. t. 379.—Mexic.; Ind. occ.

hirsuta, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 397 = *Aspilia foliacea*.

hispida, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 220.—Bras.

Humboldtiana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 398 = *Oyedaea Humboldtiana*.

imbricata, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 220.—Bras.

Kunthiana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 399.—Bras.

lacinata, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 89.—Calif.

lanata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 218.—Calif.

laxa, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 222.—Bras.

laxa, DC. Prod. v. 580 = *helianthoides*.

linearis, Sch. Bip. ex Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot. ii. 178.—Mexic.

macrophylla, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 92 = *Oyedaea macrophylla*.

macrorrhiza, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 225.—Bras.

Mandonii, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 528, nomen.—Bolivia.

microcline, DC. Prod. v. 579 = *helianthoides*?

mollis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 183.—Reg. Argent.

nervosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 403.—Bras.

VIGUIERA:—

- nivea*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 378, in nota sub Encelia = tephrodes.
nonneaeifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 222.—Bras.
nudicaulis, Baker, l. c. 228.—Bras.
oblonga, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 374, in nota sub Oyedaea = Aspilila oblonga.
oblongifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 402.—Bras.
obtusifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 226.—Bras.
oppositipes, DC. Prod. v. 580.—Mexic.
ovalifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 226.—Bras.
pachycephala, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 178.—Mexic.
Parishii, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 15.—Arizona.
peruviana, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1859) 124.—Peruv.
pilosa, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 223.—Bras.
platyphylla, Baker, l. c. 227.—Bras.
Poeppigii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 6.—Am. bor.
Pohlana, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 202 = Aspilila laevis.
prostrata, DC. Prod. v. 579 = Helianthus trachelifolius.
pusilla, Less. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 194 = Aspilila pusilla.
Radula, Baker, l. c. 223.—Bras.
ramosissima, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 402 = Aspilila floribunda.
reflexa, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 196 = Aspilila reflexa.
reticulata, S. Wats. in Am. Natural. vii. (1873) 301.—Am. bor. occ.
retifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 223.—Bras.
rigida, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1881) II. 396 = Helianthus rigidus.
robusta, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 403.—Bras.
rugosa, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 375; et ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 178.—Mexic.
Sagraana, DC. Prod. v. 579 = helianthoides.
scabra, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 227 = robusta.
Seemannii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 305.—Mexic.
sessilifolia, DC. Prod. v. 579.—Mexic.
sphaerocephala, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 179.—Mexic.
stenophylla, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 193.—Reg. Argent.
subincisa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 27.—Calif.
tenuifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 399.—Bras.
tephrodes, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 218.—Calif.
texana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 318 = helianthoides.
tomentosa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 161.—Calif.
tripinervis, Less. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 191 = Aspilila glabra.
triquetra, DC. Prod. v. 579 = helianthoides.
tuberosa, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 388.—Bolivia.
tuberosa, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 193.—Reg. Argent.
tucumanensis, Griseb. l. c. xix. (1874) 183.—Reg. Argent.
urticiformis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 179.—Mexic.
vernonioides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 223.—Bras.
wedelioides, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 226.—Madag.

VILARIA, Guett. Mém. Minéral. Dauph. i. Pref. 108; ii. t. 19 (1779) = *Berardia*, Vill. (Compos.).
subacaulis, Guett. l. c. 170 = *B. subacaulis*.

VILFA, Adans. Fam. ii. 495 (1763) = *Agrostis*, Linn. (Gramin.).

VILFA, Beauv. Agrost. 16. t. 5. f. 8 (1812) = *Sporobolus*, R. Br. (Gramin.).

actinoclada, F. Muell. Fragm. vi. 84 = *S. actinoclada*.
 VOL. II.

VILFA:—

- acuminata*, Trin. Sp. Gram. iii. t. 348.—Bras.
acutigluma, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56.—Peruv.
adusta, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 80.—Bras.
aemula, Beauv. Agrost. 16 = Deyeuxia Forsteri.
aenea, Trin. Sp. Gram. i. t. 23 = Sporobolus aeneus.
affinis, Steud. Nom. ed. II. ii. 766 = *S. affinis*, Kunth.
africana, Beauv. Agrost. 16 = *S. capensis*.
agrostidea, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 88 = *S. cryptandrus*.
airoides, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 766 = *S. airoides*.
alba, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis alba*.
alba, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 89 = *Eatonia obtusata*.
albicans, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 101 = *S. albicans*.
algida, Trin. Gram. Unifl. 159 = *Phippsia algida*.
alopecuroides, Beauv. Agrost. 16 = *Polypogon monspeliensis*.
alpicola, Steud. Syn. Pl. Gram. 154 = *S. alpicola*.
angustifolia, Steud. l. c. 160 = *S. angustifolius*.
arabica, Steud. l. c. 421 = *S. arabicus*.
arachnoidea, Beauv. Agrost. 147 = *Muehlenbergia expansa*.
arenaria, Trin. Gram. Unifl. 160 = *S. pungens*.
arguta, Nees, Agrost. Bras. 395 = *S. argutus*.
arkansana, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 64 = *S. argutus*.
articulata, Beauv. Agrost. 16 = *Chaeturus fasciculatus*.
arundinacea, Trin. Gram. Unifl. 157 = *Arctagrostis latifolia*.
aspera, Beauv. Agrost. 16 = *S. asper*.
asperifolia, Meyen, Reise, i. 349, 408 = *S. asperifolius*.
atrovirens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. t. 685 = *S. atrovirens*.
atrovirens, H. B. & K. l. c. i. 138 = *S. atrovirens*.
australis, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis australis*.
barbata, Beauv. l. c. = *S. virginicus*.
Berteroana, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 100 = *Ins. S. Doming*.
Billardieri, Beauv. Agrost. 16 = Deyeuxia Billardieri.
brachystachys, Presl, Fl. Sic. p. xlv = *Agrostis brachystachys*.
brevifolia, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 294 = *S. tenellus*.
Brongniartii, Steud. Nom. ed. II. ii. 766 = *S. darus*.
caespitosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 72 = *S. caespitosus*.
capensis, Beauv. Agrost. 16 = *S. capensis*.
capillaris, Arn. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 25 = *S. pulchellus*.
capillaris, Beauv. Agrost. 147 = *Agrostis delicatula*.
Carmichaeli, Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *Agrostis Carmichaeli*.
centrifuga, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 57 = *S. centrifugus*.
ciliata, Beauv. Agrost. 16 = *Festuca Thunbergii*.
ciliata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 63 = *S. ciliatus*.
clandestina, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *S. asper*.
coarctata, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis alba*.
commutata, Trin. Gram. Unifl. 156 = *S. commutatus*.
composita, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis composita*.
compressa, Beauv. l. c. = *S. compressus*.
conferta, Steud. Syn. Pl. Gram. 160 = *S. confertus*.
confertiflora, Steud. l. c. 155 = *S. confertiflorus*.
confinis, Steud. l. c. 160 = *S. affinis*, A. Rich.
consimilis, Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *S. consimilis*.
coromandelina, Beauv. Agrost. 16 = *S. coromandelianus*.
crinita, Beauv. l. c. = *Dichelachne crinita*.
cruciata, Beauv. l. c. = *Chloris cruciata*.
cryptandra, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 69 = *S. cryptandrus*.
cuspidata, Torr. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 238 = *S. cuspidatus*.
cylindrica, Beauv. Agrost. 16 = Deyeuxia cylindrica.
debilis, Beauv. l. c. = Deyeuxia Forsteri.
decipiens, Beauv. l. c. = Deyeuxia scabra.
decumbens, Beauv. l. c. = *Agrostis alba*?
densa, Beauv. l. c. = *Agrostis verticillata*.
depauperata, Torr. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 257. t. 236 = *S. depauperatus*.

VILFA:—

- diandra*, Trin. Gram. Unifl. 154 = *Sporobolus orientalis*.
dianthera, Steud. Syn. Pl. Gram. 162 = *Agrostis dianthera*.
discospora, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 59 = *S. commutatus*.
dispar, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis elata*?
distichophylla, Trin. Gram. Unifl. 160 = *Agrostis distichophylla*.
divaricata, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 146 = *Agrostis vulgaris*?
domingensis, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 59 = *S. domingensis*.
Drummondii, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 106 = *S. Drummondii*.
dulcis, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis verticillata*.
dura, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 54 = *S. virginicus*?
elator, Nees, Agrost. Bras. 396 = *S. Sprengelii*.
elegans, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 139 = *Agrostis Humboldtiana*.
elongata, Beauv. Agrost. 16 = *S. indicus*.
eminens, Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *S. eminens*.
erosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 86 = *S. diander*.
exilis, Trin. l. c. 89 = *S. indicus*.
eximia, Nees, ex Trin. l. c. 77.—Bras.
familiaris, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56.—Peruv.
fasciculata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 139 = *Agrostis fasciculata*.
fastigiata, [Nees, in] Meyen, Reise, i. 484 = *S. fastigiatus*.
festiva, Steud. Syn. Pl. Gram. 158 = *S. festivus*.
filiculmis, Thurb. ex Vasey, Cat. Gr. U. St. 44 = *S. filiculmis*.
fimbriata, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 69 = *S. fimbriatus*.
frondosa, Beauv. Agrost. 16 = *Muehlenbergia mexicana*.
frondosa, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 23 = *Agrostis vulgaris*.
fulvescens, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 76.—Am. bor.
Funckii, Steud. Syn. Pl. Gram. 159.—Venezuela.
gaditana, Steud. l. c. 154 = *S. pungens*.
Gaudichaudii, Steud. Nom. ed. II. ii. 767.—Ins. Falkland.
gavana, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56.—Peruv.
geniculata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 156.—Ind. or.
gigantea, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis alba*.
gigantea, Turcz. ex Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 435 = *Arctagrostis latifolia*.
Gigas, Steud. Syn. Pl. Gram. 160 = *S. Gigas*.
glaucia, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 52 = *helvola*.
glaucescens, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 23 = *Agrostis sicula*.
glaucifolia, Steud. Syn. Pl. Gram. 154 = *S. glaucifolius*.
glomerata, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 239 = *Agrostis glomerata*.
gracilis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 104.—Am. bor.
gracilis, Trin. l. c. 74 = *subsetacea*.
gracillima, Thurb. in Bot. Calif. ii. 268 = *S. gracillimus*.
grandiflora, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 158.—Chili.
helvola, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 52.—Arab.; Abyss.
heterolepis, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 233 = *S. heterolepis*.
heterolepis, Lapham, in Trans. Wisconsin St. Agric. Soc. iii. 1853 (1854) 426, sphalm. = praec.
hispida, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis vulgaris*.
Hookeri, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 106 = *S. asper*.
humifusa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 137 = *S. humifusus*.
humilis, Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *S. humilis*.
hybrida, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis canina*.
indica, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *S. indicus*.
insularis, Steud. Syn. Pl. Gram. 156 = *S. insularis*.
intermedia, Trin. Gram. Unifl. 156.—Ind. occ.
involuta, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis involuta*.
ioclados, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 65 = *S. ioclados*.
Jacquemontii, Trin. l. c. 92 = *S. Jacquemontii*.

VILFA:—

- junceus*, Trin. Gram. Unifl. 157 = *Sporobolus junceus*.
laterifolia, Beauv. Agrost. 16 = *Muehlenbergia mexicana*.
laxiflora, Beauv. l. c. = *Agrostis laxiflora*.
lenta, Beauv. l. c. = *Panicum filiforme*.
Lindleyi, Steud. Syn. Pl. Gram. 162 = *S. Lindleyi*.
linearis, Beauv. Agrost. 16 = *Cynodon Dactylon*.
littoralis, Beauv. l. c. = *S. virginicus*.
lobata, Beauv. l. c. = *Deyeuxia quadriseta*.
longifolia, Torr. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 107 = *S. asper*.
Ludwigii, Steud. Syn. Pl. Gram. 155 = *S. Ludwigii*.
lutosus, Beauv. Agrost. 16 = *Polypogon littoralis*.
luxurians, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56.—Peruv.
macra, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 79.—Am. bor.
macusaniensis, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56.—Peruv.
magellanica, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis magellanica*.
mangalorica, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 24 = *S. minutiflorus*.
marginata, Steud. Syn. Pl. Gram. 155 = *S. marginatus*.
maritima, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis alba*.
Matrella, Nees, Agrost. Bras. 400 = *S. Matrella*.
mauritanica, Steud. Syn. Pl. Gram. 157.—Ins. Maurit.
mexicana, Beauv. Agrost. 16 = *Muehlenbergia mexicana*.
minima, Trin. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 162 = *Agrostis minima*.
minima, Vasey, in Monthly Rep. U. St. Dep. Agric. 1874 (1875) 155; et in Rothr. Rep. Bot. U. St. Surv. vi. 282 = *S. Wolfii*.
minuta, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 84 = *S. minutus*.
minutiflora, Trin. Gram. Unifl. 158 = *S. minutiflorus*.
Mitchellii, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 53.—Austral.
monandra, Trin. Gram. Unifl. 159 = *Phippsia algida*.
montana, Beauv. Agrost. 16; Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 228 = *Deyeuxia montana*.
Muehlenbergii, Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *S. Muehlenbergii*.
muricata, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 240 = *Agrostis muricata*.
murina, Sieber, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 157 = *S. virginicus*.
myriantha, Steud. l. c. 158 = *S. myrianthus*.
natalensis, Steud. l. c. 154.—Afr. austr.
neglecta, Beauv. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 767 = *Agrostis alba*.
nigra, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 145 = *Agrostis vulgaris*.
noterophila, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 227 = *S. noterophila*.
Novae-Hollandiae, Beauv. Agrost. 181 = *Deyeuxia Forsteri*.
nutans, Beauv. l. c. = *Ichnanthus pallens*.
orientalis, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 65 = *S. orientalis*.
Orizabae, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 227.—Mexic.
pallida, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 62 = *S. arabicus*.
palustris, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis alba*.
panicea, Beauv. l. c. = *Gastridium australe*.
panicoides, Beauv. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *Panicum Lamarckii*.
paniculata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 67.—Afr. trop.
parviflora, Beauv. Agrost. 16 = *S. parviflorus*.
parvula, Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *S. minutus*.
patula, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis alba*.
pilifera, Trin. Gram. Unifl. 157 = *S. piliferus*.
pilosa, Beauv. Agrost. 16 = *Calamagrostis tenella*.
plebeia, Beauv. l. c. = *Deyeuxia plebeia*.
plumbea, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 98 = *S. plumbeus*.
Preslii, Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *S. ciliatus*.
procera, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis procera*.
pulchella, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 23 = *Agrostis elegans*.
pulchella, Trin. Gram. Unifl. 160 = *S. pulchellus*.
pumila, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis vulgaris*.
pungens, Beauv. l. c. = *S. pungens*.
pungens, Trin. Sp. Gram. i. t. 47 = *S. virginicus*.

VILFA:—

- purpurascens*, Beauv. Agrost. 16 = *Sporobolus purpurascens*.
pyramidalis, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *S. pyramidalis*.
racemosa, Beauv. Agrost. 16 = *Muehlenbergia glomerata*.
ramosissima, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 58 = *S. ramosissimus*.
ramulosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 137 = *S. ramulosus*.
rara, Beauv. Agrost. 16 = *Dichelachne sciurea*.
repens, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 102 = *S. repens*.
retrofracta, Beauv. Agrost. 16 = *Deyeuxia Forsteri*.
Retzii, Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *S. diander*.
rhizomatosa, Steud. Syn. Pl. Gram. 421.—Madag.
Richardi, Steud. l. c. 153.—Ind. occ.
Richardsonis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 103.—Am. bor.
Riehlui, Steud. Syn. Pl. Gram. 154.—Am. bor.
rigens, Trin. Sp. Gram. iii. t. 250 = *S. rigens*.
rigida, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 89 = *Ammophila longifolia*?
rigidifolia, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 80.—Ind. or.
robusta, Trin. l. c. 54 = *S. robustus*.
Roxburghiana, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *S. commutatus*.
Roxburghii, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 59 = *S. commutatus*.
rupestris, Trin. l. c. 66 = *S. rupestris*.
rupestris, Trin. Gram. Panic. 22 = *S. indicus*.
Ruppelliana, Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *S. Ruppelliana*.
sabeana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 90 = *S. coromandelianus vel argutus*.
scabra, Beauv. Agrost. 16 = *Deyeuxia scabra*.
Schiedeana, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 73.—Am. bor.
sciurea, Beauv. Agrost. 16 = *Dichelachne sciurea*.
scoparia, Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *S. scoparius*.
serotina, Torr. ex Trin. Sp. Gram. iii. t. 251 = *S. serotinus*.
setacea, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis setacea*.
setulosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 55.—Arab.
sicula, Steud. Nom. ed. II. ii. 768 = *Festuca sicula*.
Spartinae, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 82.—Texas.
spicata, Beauv. Agrost. 16 = *S. spicatus*.
Sporobolus, Trin. Gram. Unifl. 160 = *S. Sprengelii*.
squarrosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 100.—Am. bor.
stachydantha, Steud. Syn. Pl. Gram. 156 = *S. stachydanthus*.
stellata, Beauv. Agrost. 16 = *Cynodon Dactylon*.
stolonifera, Beauv. l. c. = *Agrostis stolonifera*.
stolonifera, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 22 = *Agrostis verticillata*.
subpyramidalis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 61.—Texas.
subsetacea, Trin. l. c. 133, in nota.—Am. bor.
subtilis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 88 = *S. subtilis*.
sylvatica, Beauv. Agrost. 182 = *Agrostis alba*.
tenacissima, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 138 = *S. indicus*.
tenera, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 87 = *S. serotinus*.
tenuissima, Schult. Mant. ii. 479 = *S. minutiflorus*.
tremula, Trin. Gram. Unifl. 155 = *S. tremulus*.
trichodes, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 139 = *Agrostis trichodes*.
tricholepis, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 155 = *S. tricholepis*.
Triniana, Steud. Syn. Pl. Gram. 156 = *S. rupestris*?
truncatella, Steud. l. c. 159 = *S. truncatella*.
utilis, Torr. in Pacif. Rail. Rep. v. 365 = *S. depauperatus*.
vaginiflora, Torr. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 56 = *S. vaginaeflorus*.
varians, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 89 (Quid?).—Am. bor.
verticillata, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis verticillata*.
verticillata, Steud. Syn. Pl. Gram. 158 = *S. verticillatus*.
Villarsii, Beauv. Agrost. 16 = *Agrostis verticillata*.
villifera, Steud. Syn. Pl. Gram. 159 = *S. ciliatus*.

VILFA:—

- villosa*, Trin. Sp. Gram. iii. t. 252 = *Sporobolus villosus*.
vinealis, Beauv. Agrost. 182 = *Agrostis canina*.
Vincenti, Steud. Syn. Pl. Gram. 155.—Texas.
virginica, Beauv. Agrost. 16 = *S. virginicus*.
vulgaris, Beauv. l. c. = *Agrostis vulgaris*.
vulgaris, Wight, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 168 = *Agrostis Wightii*.
xerampelina, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. (1840) 103.—Hab.?

VILLAMILLA, Ruiz & Pav. [Fl. Per. et Chil. Ic. Ined. t. 402] ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 10 (1849).
PHYTOLACCACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 81.
TRICHOSTIGMA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. ii. 306 (1845).
octandra, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 81.—Am. trop.
peruviana, Hook. f. l. c.—Peruv.
tinctoria, Ruiz & Pav. [Fl. Per. et Chil. Ic. Ined. t. 402] ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 10.—Peruv.

VILLANOVA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 31 (1816).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 404.
 • **CHLAMYSFERMA**, Less. Syn. Comp. 256 (1832).
 UNXIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 279. tt. 401, 402 (1820).
 VASQUEZIA, Phil. Fl. Atac. 31. t. 5 (1860).
achillaeoides, Less. Syn. Comp. 256.—Mexic.
altamifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 21.—Peruv.
anemonefolia, Less. Syn. Comp. 256 = *oppositifolia*.
chrysanthemoides, A. Gray, Pl. Wright. ii. 96.—N. Mexic.
dissecta, DC. Prod. v. 75.—Peruv.
oppositifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 21.—Mexic.
pinnatifida, Lag. l. c.—Reg. Magellan.
pratensis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 405.—Mexic.
titicacensis, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 296.—Peruv.

VILLANOVA, Ortega, Hort. Matr. Dec. 47 (1789) = **Parthenium**, Linn. (Compos.).
bipinnatifida, Ortega, l. c. = *P. Hysterophorus*.

VILLANOVA, Pourr. ex Cutaunda, Comp. Fl. Madr. 595 (1861) = **Securinega**, Comm. (Euphorb.).
buxifolia, Pourr. l. c. = *S. buxifolia*.

VILLAREZIA, Ruiz & Pav. Prod. 35 (1794).
OLACINAEAE, Benth. & Hook. f. i. 353.
 CHARISSA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 794 (1855).
 CITRONELLA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xiii. (1832) 243.
 PLEUROPETALON, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 248 (1850).
 VILLAREZIA, Roem. & Schult. Syst. p. xxvii. 331, sphalm. (1819).
Congonha, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ix. (1862) 112; Contrib. ii. 117. t. 69.—Bras.
cuspidata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ix. (1862) 113.—Bras.
dichotoma, Miers, l. c. 114.—Bras.
emarginata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 64.—Peruv.
Gonghona, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 569, sphalm. = *V. Congonha*.
grandiflora, Fisch. ex Regel, Gartenfl. (1856) 61; (1857) 1. t. 180.—Bras.
grandifolia, Fisch. & Mey. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 54 = *megaphylla*.
macrocarpa, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 13 = *Gonocarpum macrocarpum*.
megaphylla, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ix. (1862) 114.—Bras.
 Moorei, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 396.—Austral.
mucronata, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 75. t. 22 = *V. Congonha*.
mucronata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 9. t. 231 = *emarginata*.
paniculata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ix. (1862) 114.—Bras.
pungens, Miers, l. c. 112.—Chili.
ramiflora, Miers, l. c. 116.—Bras.
scandens, Hassk. Retzia, i. 152 = *Chaillietia timoriensis*.
 Smythii, F. Muell. Fragm. v. 156.—Austral.
virescens, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ix. (1862) 115.—Bras.

VILLAREZIA, Roem. & Schult. Syst. v. p. xxvii. 331 (1819), sphalm. = praece.

VILLARIA, Bally, Notice Hist. sur Villar (1858).—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 309 = **Villarsia**, Vent. (Gentian.).

VILLARIA, DC. Prod. vi. 542 (1887) = **VILARIA**, Guett. = **Berardia**, Vill. (Compos.).

VILLARIA, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 311. **RUBIACEAE**.
littoralis, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 180.—Ins. Philipp.
philippinensis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 311.—Ins. Philipp.
 Rolfe, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 180.—Ins. Philipp.

VILLARSIA, J. F. Gmel. Syst. 447 (1791) = **Limnanthemum**, S. T. Gmel. (Gentian.).
aquatica, J. F. Gmel. l. c. = *L. lacunosum*.

VILLARSIA, Neck. Elem. ii. 110 (1790) = **Cabomba**, Aubl. (Nymph.).

VILLARSIA, Vent. Choix, t. 9 (1803), partim. **GENTIANEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 819.
RENEALMIA, Houtt. Handleid. viii. 335. t. 47. f. 1 (1777).
 VILLARIA, Bally, Notice Hist. sur Villar (1858).—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 309.
albiflora, F. Muell. Fragm. ii. 21.—Austral.
calthifolia, F. Muell. l. c. vi. 140.—Austral.
cambodiana, Hance, in Journ. Bot. xv. (1877) 335.—Cambodia.
capitata, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 365.—Austral.
chilensis, Lodd. Bot. Cab. t. 1994 = *parnassifolia*?
communis, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. ii. 413 = *Limnanthemum Humboldtianum*.
congestiflora, F. Muell. Fragm. vi. 141.—Austral.
cordata, Ell. Sketch, i. 230 = *Limnanthemum lacunosum*.
crenata, F. Muell. Fragm. iv. 127 = *Limnanthemum crenatum*.
Crista-galli, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 70; Griseb. Gen. et Sp. Gent. 338 = *Menyanthes Crista-galli*.
cristata, Spreng. Syst. i. 582 = *Limnanthemum cristatum*.
eglandulosa, Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 385 = *Limnanthemum indicum*.
exaltata, G. Don, Gen. Syst. iv. 169 = *parnassifolia*.
exaltata, F. Muell. Fragm. vi. 140 = *reniformis*.
excelsa, Loisel. Herb. Gén. Amat. v. t. 292 = *parnassifolia*.
exigua, F. Muell. Fragm. vi. 137 = *Limnanthemum exiguum*.
exiliflora, F. Muell. l. c. v. 46 = *Limnanthemum exiliflorum*.
geminata, R. Br. Prod. 457 = *Limnanthemum geminatum*.
glandulosa, Griff. Notul. iv. 89 = *Limnanthemum indicum*.
grandifolia, Fisch. & Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 78.—Bras.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 368 = *Liparophyllum Gunnii*.
Humboldtiana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 187 = *Limnanthemum Humboldtianum*.
hydrocharoides, F. Muell. Fragm. vi. 139 = *Limnanthemum hydrocharoides*.
Hydrophyllum, Roem. & Schult. Syst. iv. 181 = *Limnanthemum Hydrophyllum*.
indica, Vent. Choix, sub t. 9 = *Limnanthemum indicum*.
indica, Wall. Cat. n. 4352 = *Limnanthemum cristatum*.
involucrata, Hook. Ic. Pl. t. 725 = *capitata*.
lacunosa, Vent. Choix, sub t. 9 = *Limnanthemum lacunosum*.
lasiosperma, F. Muell. Fragm. vi. 137.—Austral.
latifolia, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 81.—Austral.
macrophylla, Roem. & Schult. Syst. iv. 180 = *Limnanthemum indicum*.
microphylla, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. ii. 413 = *Limnanthemum microphyllum*.
minima, F. Muell. Fragm. iv. 128 = *Limnanthemum minimum*.
minor, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 168.—Ind. or.
nymphaeifolia, Fras. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 257 = *Limnanthemum indicum*.

VILLARSIA :—

Nymphoides, Vent. Choix, sub t. 9 = *Limnanthemum peltatum*.
orbiculata, G. Don, Gen. Syst. iv. 169 = *Limnanthemum indicum*?
ovata, Vent. Choix, t. 9.—Afr. austr.
parnassifolia, R. Br. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 136 = *reniformis*.
parnassifolia, R. Br. Prod. 457.—Austral.
parviflora, G. Don, Gen. Syst. iv. 169, sphalm. = *seq.*
parvifolia, Wall. Cat. n. 4351 = *Limnanthemum parvifolium*.
peltata, Roem. & Schult. Syst. iv. 178 = *Limnanthemum peltatum*.
platiphylla, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. ii. 413 = *Limnanthemum Humboldtianum*.
pumila, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 70. t. 157; Griseb. Gen. et Sp. Gent. 338 = *Hesperochiron californicus*.
reniformis, R. Br. Prod. 437.—Austral.
reniformis, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 364 = *albiflora*.
Rheedii, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 1031 = *Limnanthemum indicum*?
rotundifolia, Hort. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 136 = *parnassifolia*.
sarmentosa, Sims, Bot. Mag. t. 1328 = *Limnanthemum geminatum*.
senegalensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 169 = *Limnanthemum indicum*.
Simsii, G. Don, l. c. = *Limnanthemum indicum*.
Swartzii, G. Don, l. c. = *Limnanthemum indicum*.
trachysperma, Ell. Sketch, i. 230 = *Limnanthemum trachyspermum*.
trachysperma, F. Muell. Fragm. vi. 136 = *Limnanthemum indicum*.
violifolia, F. Muell. l. c. 138.—Austral.

VILLEBRUNEA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, tt. 91, 92 (1844–66). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 390.

OREOCNIDE, Miq. Pl. Jungh. i. 39. (1851).
appendiculata, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 235²⁰ = *integrifolia*.
crenulata, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 92.—Hab.? *frutescens*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 168.—Reg. Himal.; China; Japon.
glomerata, Blume, l. c. 167.—Java.
integrifolia, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 91.—Ind. or.; Malaya.
murina, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 168.—N. Guin.
pilosula, Blume, l. c. = *glomerata*.
rhodopleura, Blume, l. c. (al. gen. ?).—N. Guin.
rubescens, Blume, l. c. 167 = *scabra*.
rufescens, Blume, l. c. 166.—N. Guin.
scabra, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 196.—Java.
semicrenata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 167.—Ins. Amboin.
sylvatica, Blume, l. c. 167. f. 15 = *integrifolia*.
trinervis, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 195.—Ins. Philipp.

VILMETETIA, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 206. t. 9 = **VILMETETIA**, Maerkl. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

VILMORINIA, DC. Prod. ii. 239 (1825). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 499.
multiflora, DC. l. c.—Ins. S. Doming.

VILSHENICA, Thou. ex Reichb. Consp. 212^d (1828) (Quid?).

VIMEN, P. Br. Hist. Jamaic. 369. t. 22. f. 5 (1756) (Quid?).

VIMEN, Rafin. Alsog. Am. 13 (1838) = **Salix**, Tourn.
acuminata, Rafin. l. c. 14 = *S. cinerea*.
Andersoniana, Rafin. l. c. = *S. nigricans*.
bicolor, Rafin. l. c. = *S. phlyicifolia*.
cinerea, Rafin. l. c. = *S. cinerea*.
cotinifolia, Rafin. l. c. = *S. nigricans*.
discolor, Rafin. l. c. = *S. discolor*.
Fosteriana, Rafin. l. c. = *S. nigricans*.

VIMEN :—

hastata, Rafin. Alsog. Am. 14 = *Salix hastata*.
involutea, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.? *malifolia*, Rafin. l. c. = *S. hastata*.
Muhlenbergiana, Rafin. l. c. = *S. tristis*?
myricoides, Rafin. l. c. = *S. cordata*.
parvifolia, Rafin. l. c. = *S. repens*.
phlyicifolia, Rafin. l. c. = *S. chlorophylla*?
prinoides, Rafin. l. c. = *S. brachystachys*.
prostrata, Rafin. l. c. = *S. repens*?
pyrenaica, Rafin. l. c. = *S. pyrenaica*.
repens, Rafin. l. c. = *S. repens*.
retusa, Rafin. l. c. = *S. retusa*.
Russelliana, Rafin. l. c. = *S. fragilis*.
silesiaca, Rafin. l. c. = *S. silesiaca*.
Starkeana, Rafin. l. c. = *S. livida*.
Uva-ursi, Rafin. l. c. = *S. Cutleri*.
violacea, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.? *Wulfeniana*, Rafin. l. c. = *S. phlyicifolia*?

VIMINARIA, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 507. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 469.

denudata, Sm. l. c.—Austral.
juncea, Hoffm. Verz. Pd. 200 = *denudata*.
lateriflora, Link. Enum. Hort. Berol. i. 403 = *Jacksonia scoparia*.
Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 57 (Quid?).—Austral.

VINCA, Linn. Syst. ed. I (1735). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 703.

CATHARANTHUS, G. Don, Gen. Syst. iv. 95 (1837).
LOCHNERA, Reichb. Consp. 134 (1828).
PERVINCA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 172 (1763).
acutiflora, Bertol. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 557 = *minor*.
acutiflora, Bertol. Fl. Ital. ii. 751 = *difformis*.
alba, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = *Tabernaemontana coronaria*.
Bottae, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 104. t. 186 = *libanotica*.
difformis, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 333.—Lusitan.
elegantissima, Hort. ex Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. 107, nomen (Quid?).—Hab.? *ellipticifolia*, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 495 = *minor*.
erecta, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 330.—Turkestan.
foetida, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = *Voacanga foetida*.
grandiflora, Salisb. Prod. 146 = *major*.
Gulielmi-Waldemarii, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 89 = *rosea*.
herbacea, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 8. t. 9.—Europ. or.; As. Min.
humilis, Salisb. Prod. 146 = *minor*.
intermedia, Tausch, in Flora, xix. (1836) 386 = *minor*.
lancea, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 382.—Madag.
libanotica, Zucc. in Denkschr. Akad. Muench. iii. (1840) 247. t. 8.—As. Min.; Persia.
lutea, Linn. Cent. Pl. ii. 12; Amoen. Acad. iv. 309 = *Gonolobus carolinensis*.
major, Brot. Fl. Lusit. i. 280 = *difformis*.
major, Linn. Sp. Pl. 209.—Reg. Mediterr.
media, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 376. t. 70 = *difformis*.
minor, Linn. Sp. Pl. 209.—Europ.
minor, Sm. Fl. Graec. Prod. i. 164 = *herbacea*.
ovatifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 497 = *major*.
parviflora, Retz. Obs. ii. 14 = *pusilla*.
pubescens, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 282 = *major*.
pumila, Clarke, Trav. iv. 555 = *herbacea*.
pusilla, Murr. in Comm. Gotting. iii. 1772 (1773) 66. t. 2. f. 1.—Ind. or.
rosea, Linn. Syst. ed. X. 944.—Cosmop. trop.
Schottii, Mikan, ex Steud. Nom. ed. I. 884 (Quid?).—Hab.? *sessilifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 383 = *libanotica*.
speciosa, Salisb. Prod. 147 = *rosea*.
sterilis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 (Nerii sp.).—Java.
trichophylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 204.—Madag.

VINCENTIA, Boj. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 293. t. 62 = *Grewia*, Linn. (Tiliac.).
triflora, Boj. = *G. triflora*.

VINCENTIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 417 (1826) = *Cladium*, P. Br. (Cyperac.).
anceps, Kunth, Enum. Pl. ii. 315 = *C. iridifolium*.
angustifolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 417.—Ins. Sandvic.
gladiata, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 250 = *C. Sinclairii*.
latifolia, Kunth, Enum. Pl. ii. 314 = *C. iridifolium*.
scirpoidea, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 250 = *C. scirpoideum*.

VINCETOXICUM, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 25 (1745). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 761.
 ALEXITOXICON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 67.
 AMPHISTELMA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 417 (1861).
 BLYTTIA, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1837) 420.
 BUNBURIA, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. I. 416 (1838).
 CYATHIELLA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 332. t. 12.
 CYNCTONUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 215 (1837).
 HAPLOSTEMMA, Endl. Gen. Suppl. iii. 75 (1843).
 LYONIA, Ell. Sketch, i. 316 (1817).
 ORTHOSIA, Decne. in DC. Prod. viii. 526 (1844).
 SCHIZOSTEPHANUS, Hochst. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762 (1876).
 SEUTERA, Reichb. Consp. 131 (1828).
acanthocarpus, Walt. Fl. Carol. 104 = *Gonolobus hirsutus*.
acuminatum, C. Morr. & Decne. in DC. Prod. viii. 524.—Japan.
albidum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 38 = officinale.
album, Aschers. Fl. Brandenb. i. 421 = officinale.
alpicolum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 39 = officinale.
alpinum, Schott, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 56 = fuscum.
ambiguum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 366.—Japan.
amplexicaule, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 162.—Japan.
amplifolium, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 592 = nigrum.
anatolicum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 39.—As. Min.; Persia; Afghan.
aristolochoides, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 445.—Japan.
Arnottianum, Wight, Ic. t. 1614 = *Cynanchum Arnottianum*.
atratum, Morr. & Decne. in Bull. Acad. Brux. (1836) 17.—China; Japon.
atrum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 40 = nigrum.
beugesiacum, Jord. & Fourr. l. c. 38 = officinale.
Brandtii, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 440.—Japan.
canescens, Decne. in DC. Prod. viii. 523 = *Cynanchum glaucum*.
carnosum, Benth. Fl. Austral. iv. 331.—Austral.
chinense, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 228.—China.
contiguum, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 480 = officinale.
corymbosum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762.—Ind. or.
croaticum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 37 = officinale.
dumeticolum, Jord. & Fourr. l. c. 38 = officinale.
elegans, Benth. Fl. Austral. iv. 330.—Austral.
floribundum, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 444.—Japan.
Fradini, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 82 = officinale.
fruticulosum, Decne. in DC. Prod. viii. 525.—Arab.
funebre, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. I. xi. 79 = medium.
fuscum, Reichb. Ic. Fl. Germ. xvii. 17.—Europ. or.; As. Min.
gonocarpus, Walt. Fl. Carol. 104 = *Gonolobus carolinensis*.
Guilleminianum, Decne. in DC. Prod. viii. 526 (= *Orthosia virgata*).—Bras.
heterophyllum, Kunth, in Linnaea, xl. (1876) 212.—Afr. trop.

VINCETOXICUM:—

hirundinaria, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 404 = officinale.
Huteri, Vis. & Aschers. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 67.—Europ.
inamoenum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 361.—Manchur.
japonicum, C. Morr. & Decne. in Bull. Acad. Brux. (1836) 17.—Japan.
kenourienne, Wight, Contrib. 58 = officinale.
Krameri, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 440.—Japan.
Kunthii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 328.—Mexico.
latifolium, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 591 = medium.
latifolium, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) i. 331.—Tauria.
laxum, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 590, in obs.; Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 480 = officinale.
leptocladum, Decne. in DC. Prod. viii. 526.—Am. austr.
leptolepis, Benth. Fl. Austral. iv. 331.—Austral.
linifolium, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 79.—Ins. Socotra.
luridum, Stocks, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 22 = *Cynanchum Arnottianum*.
luteolum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 39 = officinale.
luteum, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 381.—Lusitan.
luteum, Sieber, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 52 = *Cynanchum glaucum*.
macrophyllum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 162.—Japan.
mandschuricum, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 227.—Manchuria.
medium, Decne. in DC. Prod. viii. 523.—Reg. Cauc.; Persia.
medium, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 1093 = nigrum.
melanthum, Decne. in DC. Prod. viii. 526.—Bras.
melanthum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 40 = nigrum.
mexicanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 115.—Mexico.
Meyeri, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762.—Afr. austr.
microphyllum, Decne. in DC. Prod. viii. 525.—Am. trop.
minus, Walp. Rep. vi. 483 = fuscum.
mongolicum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 356.—Mongol.
montanum, Decne. in DC. Prod. viii. 525 = *Cynanchum Arnottianum* vel *Tylophora Govanii*.
multinerve, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 319.—Japan.
nigrescens, Jord. ex Nym. Consp. 496 = nigrum.
nigricans, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 133 = melanthum.
nigrum, Moench, Meth. Suppl. 313.—Europ. austr.; As. Min.
nikoense, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 445.—Japan.
nivale, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 20.—Graecia.
ochroleucum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 38 = officinale.
officinale, Moench, Meth. 717.—Europ.; Reg. Cauc.
ovatum, Benth. Fl. Austral. iv. 330.—Austral.
palustre, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 102.—Am. bor.
parviflorum, Decne. in DC. Prod. viii. 525.—As. Min.
pauciflorum, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 127.—Japan.
petrophilum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 39 = officinale.
pisidicum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xi. 79 = fuscum.
pubens, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. i. (1872-73) 97 = officinale?
puberulum, Timb. l. c. 386 = officinale.
pumilum, Decne. in DC. Prod. viii. 525.—Persia.
purpurascens, C. Morr. & Decne. in Bull. Acad. Brux. (1836) 17.—Japan.
pyrenaicum, Timb. & Jeanb. ex Nym. Consp. 496 = officinale.
racemosum, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. i. (1872-73) 97 = officinale?
Rehmanni, Boiss. Fl. Orient. iv. 53.—Reg. Cauc.
roseum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762.—Dahuria.
rubellum, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 442.—Japan.

VINCETOXICUM:—

ruscimonensis, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. i. (1872-73) 97 = officinale?
Rutenbergianum, Vathe, in Bremen, Abh. ix. (1885) 126.—Afr. trop.
salinarum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762.—Cuba.
scoparium, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 102.—Ind. occ.; Mexic.
sepium, Decne. in DC. Prod. viii. 526.—Mexic.
sibiricum, Decne. l. c. 525.—Sibir.; China.
Sieboldii, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 444.—Japan.
speciosum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. iv. 39.—Graecia.
stelliflorum, Boiss. & Kotschy, l. c. Ser. II. iii. 120 = parviflorum.
sublanceolatum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 367.—Japan.
Tanaka, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 444.—Japan.
Thirceanum, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 591 = speciosum.
tmoleum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 38.—As. Min.
triste, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 68 = speciosum.
undulatum, Heldr. in Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 121 = nivale.
Verreyi, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 438.—Japan.
versicolor, Decne. in DC. Prod. viii. 524.—China.
volubile, Maxim. Prim. Fl. Amur. 195.—Manchuria.
vulgare, Bernh. Syst. Verz. Erf. 311 = officinale.
Wilfordi, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 445 = *Cynanchum Wilfordi*.

VINDICTA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 51 (1836) = *Jeffersonia*, Bart. (Berber.).
begonifolia, Rafin. l. c. = *J. binata*.

VINSONIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, tt. 17, 23, 31 (1844-66) = *Pandanus*, Rumph.
acuminata, Gaudich. ex Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 40 = *P. acuminatus*.
consanguinea, Gaudich. ex Balf. f. l. c. 65 = *P. utilis*.
drupacea, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 31 = *P. purpurascens*.
elegans, Gaudich. l. c. t. 17 = *P. sylvestris*.
humilis, Gaudich. l. c. t. 17, f. 12, 13 = *P. sylvestris*.
lucida, Gaudich. l. c. t. 17, f. 14, 15 = *P. sylvestris*.
macrostigma, Gaudich. ex Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 65 = *P. utilis*.
media, Gaudich. ex Balf. f. l. c. = *P. utilis*.
palustris, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 17, f. 18-23 = *P. utilis*.
Pervilleana, Gaudich. l. c. t. 31, f. 1-7 = *P. Boucheanus*.
propinqua, Gaudich. ex Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 65 = *P. utilis*.
purpurascens, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 17 = *P. purpurascens*.
stephanocarpa, Gaudich. l. c. t. 23, f. 2-5, 7, 8 = *P. utilis*.
striata, Gaudich. ex Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 65 = *P. utilis*.
sylvestris, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 17, ff. 16, 17 = *P. Barkleyi*.
Thouarsii, Gaudich. ex Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 65 = *P. utilis*.
utilis, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 17, f. 1-5 = *P. utilis*.

VINTENATIA, Cav. Ic. iv. 28, t. 349, f. 1 (1797), *postea* VENTENATIA, l. c. 79 = *Astroloma*, R. Br. et *Melichrus*, R. Br. (Epacrid.).
humifusa, Cav. l. c. = *A. humifusum*.
procumbens, Cav. l. c. = *M. rotatus*.

VINTERA, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. t. 58 (1805) = WINTERA, Humb. & Bonpl. = *Drimys*, Forst. (Magnol.).

VINTICENA, Steud. Nom. ed. II. ii. 769 (1841) = *Grewia*, Linn. (Tiliac.).
triflora, Steud. l. c. = *G. triflora*.

VIOLA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 267 (1737). *VIOLARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 117.
 CHRYSION, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 509 (1836).
 DISCHIDIUM, Reichb. Handb. 269 (1837).

VIOLA:—

ERPETION, DC. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. ii. t. 170 (1826).
 ION, Medic. Malv. 102 (1787).
 JONIUM, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 815 (1840).
 LOPHION, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 516 (1836).
 MNEMON, Spach, l. c. 510 (1836).
abortiva, Jord. Pugill. Pl. Nov. 14 = hirta.
abyssinica, Steud. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 105. — Abyss.
acaulis, Roem. & Schult. Syst. v. 389, in syn. = cornuta.
acuminata, Ledeb. Fl. Ross. i. 252 = canina.
acuta, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 95 = primulifolia.
adriatica, Freyn, in Flora, lxvii. (1884) 679. — Europ. austr.
adulterina, Godr. Thèse Hybrid. 18 = alba.
adulterina ×, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 108. — Europ.
adunca, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 63 = canina.
aetolica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 24. — Graecia.
affinis, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 138 = cucullata.
agrestis, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 15 = tricolor.
alata, Burgersdyk, in Miq. Pl. Jungh. 121. — Java.
alba, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 171. — Europ.
albiflora, Link, Enum. Hort. Berol. i. 241 = canadensis.
algida, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391 = Lysipomia reniformis.
alleganensis, Roem. & Schult. l. c. 360 = sagittata.
Allionii, Pio, Viola Spec. Bot. Med. 20 = arenaria.
alpestris, Hegetschw. Fl. Schw. 245. — Helvet.
alpestris, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 32, in textu = tricolor.
alpina, All. Fl. Pedem. ii. 98 = canisia.
alpina, Huds. Fl. Angl. ed. I. 331 = canina.
alpina, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 159, 291. — Carinth.
alpina, Ruiz & Pav. ex Ging. in DC. Prod. i. 300 = pygmaea.
alpina, Salisb. Prod. 130 = calcarata.
altaica, [Ker-Gawl.] Bot. Reg. t. 54; Pall. ex Sims, Bot. Mag. t. 1776. — As. Min.; Reg. Cauc.; Sibir.
ambigua, Barc. Fl. Balear. 53 (Quid?). — Ins. Balear.
ambigua, Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 203 = campestris.
amoena, T. F. Forst. in Symons, Syn. 198 = lutea.
amoena, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 144 = blanda, Willd.
angustifolia, Banks, ex Ging. in DC. Prod. i. 307 = Ionidium heterophyllum.
angustifolia, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 612. — Chili.
apetala, Gilib. Fl. Lituan. ii. 124 = mirabilis.
apetala, Roxb. Hort. Beng. 18; Fl. Ind. i. 650 = Patrinii.
apetala, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i. (1791) 61 = canina.
appendiculata, Steud. Nom. ed. II. ii. 770 = occulta.
aprica, Spreng. Syst. i. 800 = arenaria.
arborea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxx. — Arab.
arborea, Linn. Syst. ed. X. 1239 = Corynostylis Loefflingii.
arborescens, Linn. Sp. Pl. 935. — Reg. Mediterr. occ.
arborescens, Loeffl. ex Ging. in DC. Prod. i. 289 = Corynostylis Loefflingii.
arcuata, Blume, Bijdr. 58. — Java.
arenaria, DC. Fl. Fr. iv. 806. — Europ.; As. bor.; Am. bor.
arenicola, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xviii. (1871) 196 = sylvestris.
arguta, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391. — Am. austr.
armena, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 48. — Reg. Cauc.; Persia.
aratica, Jord. Pugill. Pl. Nov. 24 = tricolor.
arvensioides, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 224. — Italia.
arvensis, Murr. Prod. Stirp. Gotting. 73 = tricolor.
asarifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 732 = cucullata.
asarifolia, Schreb. ex Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 178 = canina.
aspera, Ging. in DC. Prod. i. 295 = serpens.
Asterias, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 145. t. 99. — Chili.
atlantica, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 215 = tricolor.

VIOLA:—

atropurpurea, Leybold, in Anal. Univ. Chil. (1858) 159. — Chili.
atropurpurea, Rafin. ex Ging. in DC. Prod. i. 291 = pedata.
attenuata, Steud. Nom. ed. I. 884 = Ionidium oppositifolium.
attenuata, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 54 = lanceolata.
Aubletii, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 123 = Corynostylis Hybanthus.
aurantiaca, Leybold, in Flora, xlvii. (1864) 41. — Chili.
aurasiaca, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 342 = gracilis.
aurea, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 185. f. 54. — Calif.
Auricula, Leybold, in Flora, xlvii. (1864) 40. — Chili.
auriculata, Leybold, in Anal. Univ. Chil. (1863) II. 672; ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 20 = praec.
austriaca, A. & J. Kern. in Ber. Nat. Verh. Innsbr. iii. (1872) 71 = odorata.
Averyi, Kellogg, in Pacif. Rural Press (May 1879); ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 131 = Patrinii.
badensis ×, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 225. — Europ.
Balbisi, Re, Fl. Segus. 73 = arenaria.
balsaminoides, Gardn. in Hook. Ic. Pl. t. 217 = cerasifolia.
banatica, Kit. ex Roem. & Schult. Syst. v. 382 = tricolor.
barbata, Muhl. Cat. 25; Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 356 = cucullata.
Barroetiana, Schaffn. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 20. — Mexic.
Baumgarteniana, Schur, Enum. Pl. Transs. 87 = alpina.
bavarica, Schrank, Baier. Fl. i. 491. — Bavaria.
Beckwithii, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 119. t. 1. — Am. bor. occ.
begoniaefolia, Benth. Pl. Hartw. 161. — Peruv.
bella, Gren. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 184 = tricolor.
Beraudii, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 76 = sepincola.
Berteroniana, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 422 = V. Portalesia.
Bertoloni, Pio, Viola Spec. Bot. Med. 34 = gracilis.
Bertoloni, De Salis, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 116. — Corsica.
Besseri, Rupr. Fl. Cauc. 151. — Reg. Cauc.
betonicaefolia, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 10 = Patrinii.
betonicifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 7. — Austral.; Ins. Norfolk.
bicolor, Gilib. Fl. Lituan. ii. 123; Pursh, Fl. Am. Sept. i. 175 = tricolor.
Bielziana, Schur, Enum. Pl. Transs. 86. — Transsylv.
biflora, Linn. Sp. Pl. 936. — Reg. bor. temp.
Billotiana, F. Schultz, ex Nym. Consp. 77 = seq.
Billotii, F. Schultz, in Flora, xxiii. (1840) 120 = persicifolia.
Bisetti, Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) I. 5. — Japon.
biturigenis, Bor. ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xiv. (1863) 104 (Quid?). — Gallia.
blanda, Salisb. Prod. 130 = cornuta?
blanda, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 166. — Montenegr.
blanda, Willd. Hort. Berol. t. 24. — Am. bor.
Blumii, Korth. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 76 = serpens.
borealis, Weinm. in Linnaea, x. (1835–36) 66 = Selkirkii.
brachyceras, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 301 = blanda.
brachypetala, C. Gay, Fl. Chil. i. 212. — Chili.
brachyspala, Maxim. Prim. Fl. Amur. 50. — Reg. Amur.
brevicaulis, Raensch. Nom. ed. III. 258 (Quid?). — Siles.
Brooksii, Kellogg, in Calif. Hort. ix. (1879) 281; ex Bot. Calif. ii. 433. — Calif.
Broussonetiana, Roem. & Schult. Syst. v. 371. — Ins. Canar.
Bruneauniana, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 946 = odorata.
Bubanii, Timb. in Congr. Sc. Fr. xix. (1852) 280 = tricolor.
Buchaniana, DC. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 206 = serpens.
bulbosa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 334. — China.
Bungeana, Rupr. Fl. Cauc. 147, in textu. — Reg. Cauc.

VIOLA:—

Burgersdijkii, Oudem. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 77. — Java.
bustillosia, C. Gay, Fl. Chil. i. 211. — Chili.
buxifolia, Poir. Encyc. viii. 646 = Ionidium buxifolium.
caespitosa, D. Don, Prod. Fl. Nep. 205 = Patrinii.
caespitosa, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 701. — Hispan.
calabra, Huet, ex Nym. Consp. 77 = arenaria.
calamaria, Steud. Nom. ed. II. ii. 770, sphalm. = seq.
calaminaria, Lej. Rev. Fl. Spa, 49 = tricolor.
calcarata, Linn. Sp. Pl. 935. — Europ.
calcarata, Munby, Fl. Algér. 99 = gracilis.
calcarata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 147 = Clementiana.
calcarata, Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 238; ii. 666; Robs. Brit. Fl. 107 = tricolor.
Calceolaria, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1327 = Ionidium Ipecacuanha.
Caleyana, G. Don, Gen. Syst. i. 329. — Austral.
callosa, Benth. Hartw. 161, in nota. — Peruv.
calthaefolia, Poir. Fl. Encyc. viii. 627. — Hab.?
calycina, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 53. — Pisidia.
campestris, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 171. — Europ.; As. Min.
canadensis, Linn. Sp. Pl. 936. — Am. bor.
canariensis, Berth. in Mém. Soc. Linn. Par. v. (1827) 420 = teydea.
canescens, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 450 = serpens.
canina, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 146 = sylvestris.
canina, Linn. Sp. Pl. 935. — Reg. bor. temp.
cano-barbata, Leybold, in Flora, xlix. (1866) 285. — Chili.
capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 40 = Ionidium capense.
capillaris, Pers. Syn. i. 256. — N. Granat.
cassinensis, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 228. — Ital.
caulescens, Molina, ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 20 = rubella?
celtica, Sauzé & Maillard, ex Nym. Consp. 78 = canina.
cenisia, Lag. & Rodr. in Anal. Cienc. v. (1802) 270 = nevadensis.
cenisia, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1325. — Europ. austr.
cenisia, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 103 = tricolor.
cerasifolia, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 277. — Bras.
chamaedrifolia, Ruiz & Pav. ex Ging. in DC. Prod. i. 306 = rubella.
Chamaedrys, Leybold, in Flora, xlvii. (1864) 41. — Chili.
Chamissoniana, Ging. in Linnaea, i. (1826) 408. — Ins. Sandvic.
cheiranthifolia, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 111. t. 32. — Ins. Canar.
chelmea, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 54. — Graecia.
chinensis, G. Don, Gen. Syst. i. 322 = Patrinii.
Christii, Wolf, in Bull. Soc. Murith. x. (1881) 43. — Helvet.
chrysantha, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 770 = altaica.
chrysantha, Hook. Ic. Pl. t. 49. — Am. bor. occ.
chrysantha, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 15. — Chili.
chrysantha ×, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 709. — Europ.
ciliata, Muhl. Cat. ed. I. 25 = sagittata.
ciliata, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 202. — Mexic.
ciliata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 360 = cucullata.
cinerascens, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xviii. (1868) 20 = arenaria.
cinerea, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 7. — Arab.; Persia.
circaeoides, Steud. Nom. ed. I. 885 = Ionidium circaeoides.
clandestina, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 173 = blanda.
claytonioides, Steud. Nom. ed. I. 885 = Ionidium claytonioides.
Clementiana, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 55. — Macedon.
collina, Bess. Enum. Pl. Volh. 10. — Europ.
Commersonii, DC. ex Ging. in DC. Prod. i. 297. — Reg. Magellan.
Comollia, Messara, Prod. Fl. Valtell. 203. — Ital.
concolor, Forst. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 309 = Ionidium concolor.
conferta, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 279 = cerasifolia.

VIOLA:—

confinis, Jord. ex Nym. Consp. 80 = tricolor.
confusa, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 260 = serpens.
congener, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 140 = cucullata.
congesta, Gill. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 144. t. 97.—Peruv.
Conilii, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 285.—Japon.
consanguinea, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 166.—Dalmat.
consimilis, Jord. Pugill. Pl. Nov. 18 = odorata.
conspersa, Reichb. Pl. Crit. i. 44 = canina.
contempta, Jord. Pugill. Pl. Nov. 24 = tricolor.
corallensis, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 16.—Chili.
corchorifolia, Domb. ex Ging. in DC. Prod. i. 304.—Peruv.
cordata, Walt. Fl. Carol. 219 = cucullata.
cordata, Willd. Enum. Hort. Berol. 264 = Broussonetiana.
cordifolia, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 114 = arenaria.
cordifolia, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 62 = cucullata.
cornuta, Desf. Fl. Atlant. ii. 313 = gracilis.
cornuta, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1325.—Europ. austr.
coralensis, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 16.—Chili.
corsica, Jord. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, i. (1857) 86 (nomen) = seq.?
corsica, Nym. Syll. 228 = Bertolonii.
Cotyledon, Ging. in DC. Prod. i. 300.—Chili.
crassifolia, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 12.—As. Min.
crassiuscula, Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. iii. (1820) 16 = nevadensis.
cretica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 51.—Ins. Creta.
cucullata, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 288.—Am. bor.
cucullata, Bigel. ex Ging. in DC. Prod. i. 294 = palustris.
cucullata, Moç. & Sessé, ex Ging. l. c. 289 = Corynostylis Berterii.
cucullifolia, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 771 (Quid ?).—Hab.?
cuneata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 290.—Am. bor.
Cunninghamii, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 16.—Tasman.; N. Zel.
Curtisii, E. Forst. in Engl. Bot. Suppl. t. 2693 = tricolor.
cyanea, Čelak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 349 = odorata.
dactyloides, Roem. & Schult. Syst. v. 351.—Sibir.
debilis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 150 = striata.
debilis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 174 = canina.
declinata, Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 248.—Hungar.
decora, Kellogg, in Pacif. Rural Press (May 1879); ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. iii. (1885) 131 = Beckwithii.
decumbens, J. F. Gmel. Syst. 413 = brevicaulis.
decumbens, Linn. f. Suppl. 397.—Afr. austr.
decumbens, Moench, Meth. Suppl. 73 = calcarata.
degener, Schweigg. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 264 = sylvestris.
Dehnhardtii, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 12; ex ej. Syll. 117 = odorata.
delphinantha, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 7.—Graecia.
delphinensis, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 3 = sciaphila.
delphinifolia, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 136.—Am. bor.
Demetria, Prologo, ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 73 = tricolor.
deminuta, Schur, Enum. Pl. Transs. 87 = tricolor.
dentata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 172 = sagittata.
derelecta, Jord. in Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem. 101 = tricolor.
Deseglisei, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 82 = tricolor.
diandra, Murr. Syst. ed. XIII. 669 = Corynostylis diandra.
dichotoma, [Moç. & Sessé,] ex Ging. in DC. Prod. i. 297 = scandens.
dichroa, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 48.—Armen.
diffusa, Ging. in DC. Prod. i. 298.—Reg. Himal.; China.

VIOLA:—

diffusa, Vell. Fl. Flum. viii. t. 163 = cerasifolia.
digitata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 171 = pedata.
digitata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 352 = dactyloides.
dissecta, Ledeb. Fl. Alt. i. 255 = pinnata.
distans, Wall. Cat. n. 4022.—Ind. or.; Malaya.
Dombeyana, DC. ex Ging. in DC. Prod. i. 305.—Am. austr.
Domeikoana, C. Gay, Fl. Chil. i. 220.—Chili.
Douglasii, Steud. Nom. ed. II. ii. 771 = chrysantha, Hook.
Drymeia, Schur, Enum. Pl. Transs. 79 = hirta.
dubia, Wall. Cat. n. 1450 = serpens?
dumetorum, Jord. Pugill. Pl. Nov. 16 = alba.
dumetorum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 612.—Chili.
ebracteolata, Fenzl, Illustr. Taur. 49.—Syria; Persia.
edulis, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 508 = palmata.
Einseleana, F. Schultz, ex Nym. Consp. 77 = Schultzei.
elata, Gueldest. Reisen, i. 421; ex Ledeb. Fl. Ross. i. 258 (Quid ?).—Rossia.
elator, Fries, Mant. iii. 126.—Europ.; As. bor.; Oriens.
elator, Wimm. Fl. Schles. (1841) 46 = canina.
elegantula, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 167 = gracilis.
elongata, Huet, ex Nym. Consp. 80 = gracilis.
elongata, Poir. Encyc. viii. 644.—‘Am.’
emarginata, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 142 = sagittata.
emirnenis, Boj. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 105 = abyssinica.
enneasperma, Linn. Sp. Pl. 937 = Ionidium heterophyllum.
epipsila, Fries, ex Nym. Consp. 79 = suecica.
epipsila, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1820) 5 = palustris.
erecta, Gilib. Fl. Lituan. ii. 124 = elatior.
erecta, Roth, Nov. Pl. Sp. 165 = Ionidium heterophyllum.
ericetorum, Schrad. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 240 = sylvestris.
eriocarpa, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 75 = pubescens.
esculenta, Ell. Sketch, i. 300 = palmata.
etbaica, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 665.—Afr. trop.
Eugeniae, Parl. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. vii. (1875) 68 = calcarata.
excelsa, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391 = Corynostylis Hybanthus.
excisa, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 296 = verecunda.
exigua, Vell. Fl. Flum. viii. 164.—Bras.
exilis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 672.—Chili.
Falconeri, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 185.—Reg. Himal.
fennica, Nyland. Spicil. Pl. Fenn. Cent. i. 28 = palustris.
fennica, Steph. ex Nym. Consp. 79 = uliginosa.
ferrariensis, Campana, Cat. Pl. Ferrar.; ex Pio, Viola Spec. Bot. Med. 22 = canina.
filicaulis, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 16.—N. Zel.
filiformis, Ruiz & Pav. ex DC. Prod. i. 310 = Ionidium glutinosum.
fimbriata, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 423.—Chili.
fimbriatula, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 16 = sagittata.
Fischeri, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 44 = Gmeliniana.
flabellifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 777 = pedata.
flagelliformis, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 20.—Mexic.
flavicans, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 292.—Bolivia.
flavicornis, E. Forst. ex Nym. Consp. 77 = sylvestris.
flavicornis, Sm. Engl. Fl. i. 304 = canina.
flavida, Jord. Pugill. Pl. Nov. 25 = tricolor.
flavida, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 119.—Europ.
flexuosa, Moretti, ex Roem. & Schult. Syst. v. 370 = persicifolia.
floribunda, Jord. Pugill. Pl. Nov. 19 = odorata.
Flos-Idae, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 5.—Reg. Argent.
Flos-Marjae, Hieron. l. c. 8.—Reg. Argent.
foliosa, Čelak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iii. (1875) 477 = odorata.
formosa, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxvi. (1883) 20 = sylvestris.
Foucaudii, Sav. Cat. Pl. Charente-Inf. 49 = tricolor.

VIOLA:—

Foudrasi, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 4 = hirta.
fragrans, Sieber, Reise Kreta, ii. 320.—Ins. Creta.
fragrans, Wiesb. ex Sabransky, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 133 = Wiesbaurii.
fraterna, Hegetschw. Fl. Schw. 241.—Helvet.
frigida, Phil. Fl. Atac. 9.—Chili.
frutescens, Roth, Nov. Pl. Sp. 166 = Ionidium suffruticosum.
frutescens, Ruiz & Pav. ex Ging. in DC. Prod. i. 308 = Ionidium oppositifolium.
fusiformis, Sm. in Rees, Cyclop. xxxvii. n. 9 = Gmeliniana.
Ganderi, Hausm. ex Nym. Consp. 79 = campestris.
garganica, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 224 = tricolor.
gibbosa, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 356, nomen = hastata.
glabella, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 142.—Am. bor. occ.
glacialis, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 49. t. 165.—Chili.
glandulifera, Hook. Ic. Pl. t. 67.—Ecuador.
glandulifera, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 452 = serpens.
glandulosa, Domb. ex Ging. in DC. Prod. i. 297 = maculata.
glauca, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 165 = arenaria.
glaucescens, Oudem. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 74 = distans.
glechomoides, Leybold, in Flora, xlvi. (1864) 40.—Chili.
glutinosa, Poir. Encyc. viii. 647 = Ionidium glutinosum.
Gmeliniana, Roem. & Schult. Syst. v. 354.—Sibir.
gracilescens, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 20 = tricolor.
gracilis, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. iv. 25 = calcarata.
gracilis, R. Br. ex Ging. in DC. Prod. i. 305 = hederacea.
gracilis, Clem. Sert. Orient. 16 = Clementiana.
gracilis, Martx. ex Nym. Consp. 88 = tricolor.
gracilis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 709 = declinata.
gracilis, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 146.—Graecia.
gracillima, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 275.—Bras.
Grahami, Benth. Pl. Hartw. 35.—Mexic.
grandiflora, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 238 = Clementiana.
grandiflora, ‘Linn.’ Herb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 771 = altaica.
grandiflora, Linn. Mant. ii. 518 = tricolor.
grandifolia, Wall. Cat. n. 1447 = Patrini.
granulosa, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 292.—Bolivia.
Grayi, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 288 = sylvestris.
Griffithiana, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 54 = serpens.
Grisebachiana, Vis. in Mem. Ist. Venet. x. (1861) 436.—Serbia.
Gronovii, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 359, in textu = primulifolia.
grypoceras, A. Gray, in Perry, Jap. Exped. ii. 308 = sylvestris.
guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 133 = Ionidium heterophyllum.
gymnocarpa, Janka, in Linnaea, xxx. (1859–60) 559 = collina.
Hallii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 377.—Am. bor. occ.
Hamiltoniana, D. Don, Prod. Fl. Nep. 206 = serpens.
hastata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 149.—Am. bor.
hebecarpa, Schur, Enum. Pl. Transs. 79 = hirta.
hederacea, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 66. t. 91.—Austral.
Heldreichiana, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 53.—As. Min.
helvetica ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii–xxiv. (1880) 72.—Europ.
heterophylla, Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec. iii. 53 = gracilis, calcarata.
heterophylla, Muhl. Cat. 25 = palmata.
heterophylla, Poir. Encyc. viii. 646 = Ionidium heterophyllum.
heterosepala, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 23 = aetolica.
hirtuta, Crantz, Inst. ii. 430; Roem. & Schult. Syst. v. 361 = hirta.
hirta, Linn. Sp. Pl. 934.—Europ.; As. bor.

VIOLA:—

- hirta*, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 50 = hastata.
hirtaeformis ×, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 190.—Europ.
hirtipes, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 379. t. 16.—China.
hirto-alba, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 176 = *hirta*.
hispida, Lam. Fl. Fr. ii. 679 = rothomagensis.
hispida, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 123 = *lutea*.
Hladnikii, Reichb. ex Nym. Consp. 77 = Schultzi.
Holubyi, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 107.—Europ.
Hookeri, Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 183.—Reg. Himal.
Hookeriana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 369.—Mexic.
Hornemanniana, Roem. & Schult. Syst. v. 370 = canina.
hortensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 82 = odorata.
Huidobrii, C. Gay, Fl. Chil. i. 214.—Chili.
Humboldtii, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 121.—N. Granat.
humifusa, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxi. (1883) 16.—Europ.
humilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 369.—Mexic.
Hybanthus, Aubl. Pl. Gui. ii. 811. t. 319 = *Corynostylis Hybanthus*.
Hybanthus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1325 = *Corynostylis Loeflingii*.
hybrida, Krock. Fl. Siles. Suppl. i. 291 (Quid?).—Europ.
hybrida, Schur, Enum. Pl. Transs. 79 = odorata.
hybrida, Wulf. ex Roem. & Schult. Syst. v. 357 = uliginosa.
hydrocotyloides, Armst. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 360.—N. Zel.
hymettia, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 57 = tricolor.
ignobilis, Rupr. Fl. Cauc. 148.—Reg. Cauc.
imberbis, Ledeb. Fl. Alt. i. 257 = Selkirkii.
incisa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 302.—Sibir.
incomparabilis, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 99.—Europ.
incompta, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 11 = odorata.
inconspicua, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 57; Bijdr. 58.—Java.
ingrica, Bieb. ex Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. iv. 48.—Rossia.
inodora, Gilib. Fl. Lituan. ii. 123 = palustris.
insularis, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 178 = sylvestris.
insularis, Gren. & Godr. l. c. 185 = Bertolonii.
integerrima, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 672.—Chili.
integerrima, Spreng. Pugill. i. 21.—Hab.?
integrifolius, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 179 = *cenisia*.
intermedia, Krock. Fl. Siles. Suppl. i. 289 (Quid?).—Europ.
intermedia, Lej. Rev. Fl. Spa, 51 = rothomagensis.
intricata, Arv. in Bull. Soc. Dauph. vii. (1880) 264.—Gallia.
Ipecacuanha, Linn. Mant. ii. 484 = *Ionidium Ipecacuanha*.
ireutiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 298.—Sibir.
italica, Voigt, ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1206 = odorata.
Itoubou, Aubl. Pl. Gui. ii. 808 = *Ionidium Ipecacuanha*.
Jacquiniana, Steud. Nom. ed. I. 885 = *Ionidium Jacquinianum*.
japonica, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 857 (sp. dub.).—Java (cult.).
japonica, Langsd. ex Ging. in DC. Prod. i. 295.—Japon.
Jaubertiana, Marés & Vigin. Cat. Pl. Balcar. 37. t. 2.—Ins. Balear.
Jooli, Fanka, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 198.—Transsylv.
jucunda, Jord. Pugill. Pl. Nov. 20 = odorata.
Julia ×, Bruegg. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. ix. (1860) 62.—Europ.
Juressi, Link, ex Steud. Nom. ed. I. 885 (Quid?).—Hab.?
kalksburgensis ×, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 153.—Europ.
kamtshatica, Ging. in Linnaea, i. (1826) 406 = Selkirkii.

VIOLA:—

- kauaensis*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 85.—Ins. Sandvic.
kauensis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ii. (1852) 325 = *praeac*.
Keiskei, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 153.—Japon.
Kernerii ×, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 189.—Europ.
Kitaibeliana, Roem. & Schult. Syst. v. 383 = tricolor.
Kochii, Kirschl. in Mém. Strassb. iii. n. II. (1840) 12. t. 1.—Europ.
Krokeri, J. F. Gmel. Syst. 412 = *arenaria*.
kunawurensis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 75. t. 18. f. 3.—Reg. Himal.
labiosa, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 48.—Austral.
labradorica, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. II. (1818) 12 = canina.
laciniosa, A. Gray, in Perry, Jap. Exped. ii. 308.—Japon.
lactea, Koch & Ziz, Cat. Pl. Palat. 6; Fries, Nov. Fl. Succ. 86 = *pratensis*.
lactea, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 707 = *persicifolia*.
lactea, Sm. Fl. Brit. i. 247.—Europ.
lamiifolia, Pritz. Ic. Ind. 1163 = *lancifolia*, Thore.
lancea, Poir. Encyc. viii. 635 = *pratensis*.
lanceifolia, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 134 = *Ionidium enneaspermum*?
lanceolata, Linn. Sp. Pl. 934.—Am. bor.
lanceolata, Pall. Reise, iii. 223 = *Gmeliniana*.
lancifolia, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 173 = canina.
lancifolia, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. iii. 165 = *Ruppii*.
lancifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 772, sphalm. = *Corynostylis Hybanthus*.
lancifolia, Thore, Chlor. Land. 357 = *lactea*.
Langsdorffii, Fisch. ex Ging. in DC. Prod. i. 296.—Sibir. or.; Am. bor. occ.
latistipula, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 21.—Mexic.
laurifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 58 = *Corynostylis Hybanthus*.
Lechlerii, Griseb. in Goett. Abh. vi. (1854) 116.—Chili.
Leconteana, G. Don, Gen. Syst. i. 324 = *blanda*.
Lejeunii, Jord. Pugill. Pl. Nov. 27 = tricolor.
lepida, Jord. l. c. 28 = tricolor.
leptoceras, Schur, Enum. Pl. Transs. 87 = tricolor.
leucantha, Schur, l. c. 82 = odorata.
Lewisiana, Ging. in DC. Prod. i. 298 = *striata*.
Leyboldiana, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 16.—Chili.
libanotica, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 52.—Syria.
lilascens, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. i. 466 = tricolor.
linariifolia, Vahl, Eclog. Am. ii. 18 = *Ionidium strictum*.
Lindeniana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 336.—N. Granat.
lineariaefolia, Poir. Encyc. viii. 648 = *Ionidium strictum*.
linearifolia, Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix, 303 = *Ionidium strictum*.
lineata, Ortega, Hort. Matr. Dec. 49 = *Ionidium lineatum*.
linguaeifolia, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 141 = *Nuttallii*.
linifolia, Juss. in Poir. Encyc. viii. 647 = *Ionidium linifolium*.
litoralis, Phil. Fl. Atac. 9.—Chili.
litoralis, Spreng. Nov. Prov. 43 = *pratensis*.
livida, Kit. ex Roem. & Schult. Syst. v. 363 = *arenaria*.
Lloydii, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 80 = tricolor.
lobata, Benth. Pl. Hartw. 298.—Calif.
Loeflingiana, Steud. Nom. ed. I. 885 = *Ionidium Ipecacuanha*.
longepedunculata, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 286.—Japon.
longicaulis, Krock. Fl. Siles. Suppl. i. 295 (Quid?).—Europ.
longifolia, R. Br. ex Ging. in DC. Prod. i. 294 = *betonicifolia*.
longifolia, Poir. Encyc. viii. 649 = *Noisetia longifolia*.
longipes, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 140 = canina.
longiscapa, DC. ex G. Don, Gen. Syst. i. 322 = *betonicifolia*.
longivola, Pourr. ex Roem. & Schult. Syst. v. 380 = *arborescens*.
lucorum, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 698 = canina.

VIOLA:—

- ludovicea*, Jan, ex Ging. in DC. Prod. i. 303 = *prostrata*.
lusitana, Brot. Fl. Lusit. i. 306 = *lactea*.
lutea, Comm. ex Ging. in DC. Prod. i. 297 = *maculata*.
lutea, Huds. Fl. Angl. ed. I. 331; Sm. Fl. Brit. i. 248 = tricolor.
lutea, Lam. Fl. Fr. ii. 680 = *biflora*.
lutea, Vell. Fl. Flum. viii. t. 162.—Bras.
luteola, Jord. Pugill. Pl. Nov. 27 = tricolor.
Lyallii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 16.—N. Zel.
macedonica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 56.—Macedon.
macrantha, Huet, ex Nym. Consp. 81 = *calcarata*.
macroceras, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. i. 256.—Sibir.
macrostipulata, Schur, Enum. Pl. Transs. 84 = *Schultzi*.
maculata, Cav. Ic. vi. 20. t. 539.—Chili.
maculata, Patrin, ex Ging. in DC. Prod. i. 293 = *variegata*.
maderensis, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 36.—Ins. Mader.
madonia, Presl, ex Reichb. Pl. Crit. iii. 60 = *calcarata*.
magellanica, Forst. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) 41. t. 8.—Reg. Magellan.
magellensis, Porta & Rigo, ex Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 223 = *cenisia*.
magniflora, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 283 = *magellanica*.
marina, Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 205 = *Campanula Medium*.
maritima, Spreng. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 272 = tricolor.
martia, Gilib. Fl. Lituan. ii. 122; S. T. Gmel. Reise, i. 65 = odorata.
Martii ×, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 190.—Europ.
Massoni, Banks, ex Ging. in DC. Prod. i. 308 = *Ionidium capense*.
Mauritii, Heplouchlow, in Bull. Soc. Oural. Amat. Sc. Nat. vii. III. 37.—Rossia.
maviensis, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 150.—Ins. Sandvic.
media, Chaillet, ex Roem. & Schult. Syst. v. 382 = tricolor.
meduanensis, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 80 = tricolor.
melanosperma, Bert. ex Ging. in DC. Prod. i. 308 = *Ionidium oppositifolium*.
mendanca, Vell. Fl. Flum. viii. t. 160 = *Schweiggeria fruticosa*.
mentita, Jord. in Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem. 101 tricolor.
Metziana, Hohen. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 184 = *distans*.
micrantha, Albert, in Bull. Soc. Sc. Draguign. (1884) (reimpr. 6).—Gallia.
micrantha, Bertol. Misc. Bot. i. 15 = tricolor.
micrantha, Presl, Delic. Prag. 27 = *parvula*.
micrantha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 183 = canina.
micranthella, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 291.—Bolivia.
microceras, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 22. t. 1. f. 2.—Sibir.
microceras, Schur, Enum. Pl. Transs. 80 = *collina*.
microphylla, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 611.—Chili.
microphylla, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 394 = *alpina*.
microphylla, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391 = *Ionidium glutinosum*.
microphyllus, Poir. Encyc. viii. 628.—Reg. Magellan.
Miersii, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 772 = *V. Asterias*.
Minae, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 225 = *calcarata*.
minuta, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 173.—Reg. Cauc.
mirabilis, Linn. Sp. Pl. 936.—Europ.; As. bor.
mixta, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xviii. (1868) 21.—Europ.
modesta, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 300 = *tezensis*.
modesta, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 12.—Syria.
mongolica, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 42.—China.
monopetala, Roem. & Schult. Syst. v. 400 = *Ionidium filiforme*.
Montagnei, C. Gay, Fl. Chil. i. 222.—Chili.
montana, DC. Fl. Fr. iv. 807 = *elator*.
montana, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. ed. II. (1873) 55 = *lobata*.

VIOLA:—

montana, Ledeb. Fl. Alt. i. 261 = *pratensis*.
montana, Linn. Sp. Pl. 935 = *canina*.
montana, Plan. Ens. Fl. Gallega, 206 = *persicifolia*.
monticola, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 37 = *tricolor*.
Mucuzii, Orph. ex Nym. Consp. 80 = *tricolor*.
Muhlenbergiana, Ging. in DC. Prod. i. 297 = *canina*.
Muhlenbergii, Torr. Fl. U. St. i. 256 = *canina*.
multicaulis, Jord. Pugill. Pl. Nov. 15 = *odorata*.
multifida, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *pedata*.
multifida, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 352 = *pinnata*.
Munbyana, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 15 = *gracilis*.
muscoides, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 672. — Chili.
mutabilis, Rochel, Pl. Banat. Rar. (Index) = *tricolor*.
mysurensis, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1446 = *Patrinii*.
nana, Godr. in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xix. (1875) 166 = *tricolor*.
Nannei, Polak. in *Linnaea*, xli. (1877) 547. — Costa Rica.
nebrodensis, Presl, Delic. Prag. 26 = *calcarata*.
neglecta, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 172 = *syvestris*.
neglecta, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 55 = *canina*.
nemausensis, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 18 = *tricolor*.
nemoralis, Jord. Pugill. Pl. Nov. 21 = *syvestris*.
nemoralis, Kuetz. in *Linnaea*, vii. (1832) 46 = *Ruppii*.
nepaulensis, DC. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 205 = *Patrinii*.
nephrodes, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 356, nomen (Quid?). — Am. bor.
nevadensis, Boiss. *Elench.* 26. — Hispan.
Nicolai, Pantoë. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 4 = *Orphanidis*.
nigricans, Schur, ex Nym. Consp. 78 = *alba*.
nilagrica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 556 = *Patrinii*.
nitens, Host, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 705 = *uliginosa*.
nivalis, Benth. Pl. Hartw. 160. — Bolivia.
nivalis, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 611. — Chili.
nivalis, Vest, ex Roem. & Schult. Syst. v. 365. — Hab.?
Notoniana, Wall. Cat. n. 1449 = *distans*.
nubigena, Leybold, in *Flora*, xlvii. (1864) 40. — Chili.
nummularia, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxi. (1883) 16 = *nummularifolia*?
nummulariaefolia, Vill. Prosp. 26 = *seq.*?
nummularifolia, All. Fl. Pedem. ii. 98, t. 9. f. 4. — Europ.
nummularifolia, Panč. Verz. Serb. Phan. n. 438 = *Grisebachiana*.
nummularifolia, Schleich. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 240 = *arenaria*.
nummularifolia, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 47 = *canina*.
Nuttallii, Benth. Pl. Hartw. 298 = *aurea*.
Nuttallii, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 174. — Am. bor. occ.
obliqua, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 288 = *cucullata*.
obliqua, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 172 = *blanda*.
obliquifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 337. — Venezuela.
obscura, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 10 = *collina*.
occulta, Hort. Argent. ex Otto, in Ind. Sem. Hort. Hamb. (1853) 8 = *tricolor*.
occulta, Lehm. l. c. (1829). — Cf. *Linnaea*, v. (1830) Litt. 46. — As. occ. et bor.
ocellata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 142. — Calif.
ochroleuca, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 69 = *striata*.
odontocalycina, Boiss. Fl. Orient. i. 461. — Armen.
odora, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 367 = *seq.*
odorata, Linn. Sp. Pl. 934. — Europ.; Afr. et As. bor.
odorata, Thunb. Fl. Jap. 326 = *japonica*, *Langsd.*
oetolica, Boiss. Fl. Orient. i. 464, err. typ. = *aetolica*.
officinalis, Crantz, Inst. ii. 431 = *odorata*.
olimpia, Beggiat. in Att. Soc. Ital. Sc. Nat. viii. (1865) 174, t. 1 = *olympica*?
olonensis, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 178 = *tricolor*.
olympica, Boiss. *Diagn.* Ser. II. i. 55. — As. Min.
Opizii, Knaf, ex Nym. Consp. 78 = *collina*.
oppositifolia, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1327 = *Ionidium oppositifolium*.
orbicula, Panč. *Elem.* 16. — Europ. austr.

VIOLA:—

orbiculata, Geyer, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 11. — Am. bor. occ.
Orbignyana, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 353. — Chili.
orchidiflora, Rudge, Pl. Gui. i. 11, t. 10 = *Noisetia longifolia*.
Oreades, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 167 = *altaica*.
Orphanidis, Boiss. Fl. Orient. i. 464. — Macedon.
orthoceras, Ledeb. Fl. Ross. i. 258. — Reg. Cauc.
ovata, Nutt. Gen. Am. i. 148 = *sagittata*.
ovata, Rafin. ex Ging. in DC. Prod. i. 293 = *primulifolia*.
pachyrhiza, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 84. — Japon.
pachyrhiza, Boiss. & Hohen. *Diagn.* Ser. I. vi. 21. — Kurdistan.
Paillouxi, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 36 = *tricolor*.
Pallasii, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 886 = *altaica*.
pellens, Forst. ex Roem. & Schult. Syst. v. 359 = *blanda*.
pallescens, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 10 = *tricolor*.
pallda, Salisb. Prod. 130 = *hirta*.
palldiflora, Huert, ex Nym. Consp. 81 = *calcarata*.
palmaesii, Knowles & Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 165 = *palmensis*.
palmaris, Buch.-Ham. ex Ging. in DC. Prod. i. 298 = *distans*.
palmata, Linn. Sp. Pl. 933. — Am. bor.
palmata, Patrin, ex Ging. in DC. Prod. i. 293 = *dactyloides*.
palmensis, Webb & Berth. *Phyt. Canar.* i. 112, in syn. — Ins. Canar.
paludosa, [Clairv.] Man. Herb. 67 = *seq.*
palustris, Linn. Sp. Pl. 934. — Reg. bor. temp.
papilionacea, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 173 = *cucullata*.
papillaris, Boiss. & Hohen. *Diagn.* Ser. I. viii. 52 = *spatulata*.
paradoxa, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) reimp. 28. — Ins. Mader.
pariaetariaefolia, Banks, ex Ging. in DC. Prod. i. 308 = *Ionidium oppositifolium*.
Parkeri, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 261 = *diffusa*.
parmensis, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 946 = *odorata*.
parviflora, Kit. ex Roem. & Schult. Syst. v. 383 = *tricolor*.
parviflora, Linn. f. Suppl. 360 = *Ionidium glutinosum*.
parviflora, Benth. Pl. Hartw. 161. — Ecuador.
parvifolia, Roem. & Schult. Syst. v. 391 = *Ionidium glutinosum*.
parvula, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 32; Natural. n. vi. (1824) 45 = *hirta*.
parvula, Tineo, Pl. Rar. Sicil. Pugill. i. 5. — Europ. austr.; Syria.
Patrinii, Ging. in DC. Prod. i. 293. — Russia; As. bor.; Reg. Himal.
pedata, Linn. Sp. Pl. 933. — Am. bor.
pedatifida, G. Don, Gen. Syst. i. 320 = *delphinifolia*?
peduncularis, Langsd. ex Ging. in DC. Prod. i. 297 = *Langsdorfii*.
pedunculata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 141. — Am. bor. occ.
pedunculata, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 68, partim = *aurea*.
pensylvanica, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 149 = *pubescens*.
pentadactyla, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 12. — Syria.
peregrina, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 82 = *tricolor*.
perennis, Miegév. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 340 = *odorata*?
perennis, Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 949 = *tricolor*.
perexigua, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 326. — N. Zel.
permixta x, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 6. — Europ.
perplexa, Gremli, Excurs. Schweiz, ed. II. 106 = *odorata*.
persicaefolia, Kirschl. in Mém. Strasb. iii. n. II. (1840) 13 = *persicifolia*?
persicariaefolia, Poir. Encyc. viii. 628 = *stipularis*.
persicifolia, Ledeb. Fl. Alt. i. 260 = *clatior*.
persicifolia, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. I. 271. — Europ.
Pesneau, Lloyd, Fl. Ouest Fr. ed. III. 43 = *rothomagensis*.
phalacrocarpa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 318. — Japon.

VIOLA:—

philippica, Cav. Ic. vi. 19, t. 529, f. 2. — Ins. Philipp.
Philippii, Leybold, in Anal. Univ. Chil. (1859) 681 = *microphylla*.
phyteumaefolia, DC. ex G. Don, Gen. Syst. i. 322 = *betonifolia*.
pichinchensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 335. — Ecuador.
picta, Gillot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 241. — Gallia.
pilosa, Blume, Bijdr. 57 = *serpens*.
pilosa, Pers. Syn. i. 255 = *rothomagensis*.
pinnata, Linn. Sp. Pl. 934. — Europ.; As. bor.
pinnata, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. 734 = *pedata*.
pinnatifida, All. Misc. Taur. iii. t. 5. — Europ.
podolica, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 124, nomen (Quid?). — Europ.
poëtica, Boiss. & Sprun. *Diagn.* Ser. I. vi. 21. — Graecia.
polychroma, Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 89. — Austria.
polygalaefolia, Poir. Encyc. viii. 647 = *Ionidium polygalaefolium*.
polypoda, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 555. — Chili.
porphyrea, Uechtritz, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. XIII. 51 = *sciaphila*.
Portalesia, C. Gay, Fl. Chil. i. 209, t. 6. — Chili.
portulacea, Leybold, in *Flora*, xlviii. (1865) 381. — Chili.
praecox, Heuff. ex Fuss, Fl. Transs. 81 = *alba*.
praemorsa, Dougl. in Bot. Reg. t. 1254 = *aurea*.
pratensis, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 267. — Europ.
primulifolia, Linn. Sp. Pl. 934. — Am. bor.
primulifolia, Lour. Fl. Cochinch. 513 = *Patrinii*.
primulifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 173 = *sagittata*.
primulifolia, Schult. Obs. Bot. 48 = *uliginosa*.
prionantha, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 82 = *Patrinii*.
procera, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 251 = *clatior*.
procumbens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 123 = *canina*.
procumbens, J. F. Gmel. Syst. 413 = *decumbens*.
propera, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 6 = *collina*.
propinqua, Jord. Pugill. Pl. Nov. 18 = *odorata*.
prostrata, Roem. & Schult. Syst. v. 382. — Ital.; Ins. Canar.
Provostii, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 82 = *tricolor*.
prunellaefolia, Fisch. ex Ging. in DC. Prod. i. 293 = *Patrinii*.
prunellaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 370. — N. Granat.
prunifolia, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391 = *Ionidium anomalum*.
psammophila, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 14. — Chili.
Pseudo-canina, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 113 = *canina*.
Pseudo-gracilis, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 227 = *gracilis*.
Pseudo-lutea, Schur, Enum. Pl. Transs. 87 = *tricolor*.
Pseudo-suavis, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 103 = *odorata*.
pteropoda, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 20. — Mexic.
puberula, Lange, in Kjöeb. Vidensk. Meddel. (1881) 102. — Hispan.
pubescens, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 290. — Am. bor.
pulchella, Salisb. Prod. 130 = *canina*.
pumila, Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 339 = *pratensis*.
pumila, Fries, ex Nym. Consp. 78 = *canina*.
pumila, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 114 = *arenaria*.
punctata, Humb. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391 = *Polygala glandulosa*.
punctata, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 67 = *canina*.
punica, Ruiz & Pav. ex Ging. in DC. Prod. i. 304 = *corchorifolia*.
purpurascens, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 49 = *arenaria*.
purpurea, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. ed. II. (1873) 55 = *aurea*.
purpurea, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) i. 310, in textu. — Reg. Cauc.
pusilla, Hook. & Arn. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 145. — Chili.
pusilla, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 61 = *arenaria*.
pusillima, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 291. — Bolivia.

VIOLA:—

pyncophylla, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 285.—Japon.
 pygmaea, Juss. ex Poir. Encyc. viii. 630.—Peruv.
 pyrenaica, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 803.—Mont. Pyren.
 pyrenaica, Willk. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 697 = Willkommii.
 pyrolaefolia, Poir. Encyc. viii. 636 = maculata.
 Raddeana, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) ii. 463, 501.—Reg. Amur.; China.
 radicans, DC. ex Ging. in DC. Prod. i. 297 = canina.
 ramosissima, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 336.—Ecuador.
 ranunculifolia, Juss. ex Poir. Encyc. viii. 626 = palmata.
 recta, Garcke, Fl. Deutschl. ed. III. 47 = persicifolia.
 Reichenbachiana, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 78 = sylvestris.
 renifolia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 288.—Am. bor.
 reniformis, R. Br. ex Ging. in DC. Prod. i. 305.—Austral.
 reniformis, Wall. Cat. n. 1443 = biflora.
 repens, Buch.-Ham. ex Ging. in DC. Prod. i. 296 = serpens.
 repens, Domb. ex Ging. l. c. 305 = Dombeyana.
 repens, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 70 = striata.
 repens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 88 = palustris.
 reptans, Presl, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 705 = odorata.
 resupinata, Moench, Meth. 230 = cucullata.
 reticulata, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 201.—Mexic.
 revoluta, Heuff. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 705 = campestris.
 rhombifolia, Leybold, in Anal. Univ. Chil. (1859) 680.—Chili.
 riparia, Hartm. f. Handb. 128; ex Nym. Syll. Suppl. 41 = uliginosa.
 riphaea, J. F. Gmel. Syst. 413; Roem. & Schult. Syst. v. 368, in textu = arenaria.
 Riviniana, Reichb. Pl. Crit. i. 81 = sylvestris.
 Rogovici, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 125, nomen (Quid?).—Rossia.
 rostrata, Muhl. Cat. 26; Pursh, Fl. Am. Sept. i. 174.—Am. bor.
 rosulata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 49. t. 166.—Chili.
 rothomagensis, Desf. Tabl. ed. I. 153.—Europ.
 rotundifolia, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 73 = sarmentosa.
 rotundifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 150.—Am. bor.
 Roxburghiana, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 76 = Patrinii.
 Royleana, Wall. Cat. n. 1448 = serpens.
 rubella, Cav. Ic. vi. 20. t. 351. f. 1.—Chili.
 rubella, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 144 = V. Portalesia.
 rubra, Aubl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 773 = hirta.
 rupestris, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i. (1791) 60 = arenaria.
 Ruppii, All. Fl. Pedem. ii. 99.—Europ.
 Ruppii, J. & C. Presl, Fl. Čech. 53 = pratensis.
 Ruppii, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 707 = canina.
 ruralis, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 81 = tricolor.
 sabulosa, Bor. Not. 3; Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 353 = tricolor.
 sagittaeifolia, Salisb. Prod. 130 = seq.
 sagittata, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 287.—Am. bor.
 Sagoti, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 34 = tricolor.
 salina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 299 = Selkirkii.
 sarmentosa, Bieb. Fl. Taur.-Cauc. i. 172 = odorata.
 sarmentosa, Burgersdijk, in Miq. Pl. Jungh. 120 = Burgersdijkii.
 sarmentosa, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 80.—Am. bor. occ.
 saxatilis, Hoffm. ex Roem. & Schult. Syst. v. 380 = saxicola.
 saxatilis, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 60 = tricolor.
 saxicola, Roem. & Schult. Syst. v. 380.—Reg. Mediterr. occ.
 saxigena, Schur, Enum. Pl. Transs. 84 = arenaria.
 scabra, Braun, in Flora. iii. (1820) 469 = hirta?
 scandens, Bert. ex DC. Prod. i. 289 = Corynostylis Berterii.
 VOL. II.

VIOLA:—

scandens, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391; H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 371. t. 493.—Mexic.
 scanica, Fries, Summa Veg. Scand. 35, 153 = palustris.
 scardica, Nym. Consp. 81 = cenisia.
 scaturiginosa, Wallr. Sched. Crit. 97 = uliginosa.
 Schleideniana, Bogenh. Taschenb. Fl. Jena, 162.—Europ.
 Schmidtiana, Roem. & Schult. Syst. v. 363 = canina.
 Schultzei, Billot, ex F. W. Schultz, in Flora, xxiii. (1840) 121.—Europ.
 sciaphila, Joo, ex Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 198 = Jooi.
 sciaphila, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 90.—Europ.
 scorpiuroides, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) 80.—Tripoli.
 scotophylla, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 9 = odorata.
 Scouleri, Dougl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 773 = canadensis.
 scrotiformis, DC. ex Ging. in DC. Prod. i. 299.—Afr. austr.
 segetalis, Jord. Obs. Pl. Crit. ii. (1846) 12; Schur, Enum. Pl. Transs. 85 = tricolor.
 Selkirkii, Pursh, ex Goldie, in Edinb. Phil. Journ. vi. (Apr. 1822) 324.—Reg. bor. et frigid.
 semperflorens, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 887 = odorata.
 Sempervivum, C. Gay, Fl. Chil. i. 226.—Chili.
 sepicola, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 8.—Europ.
 septemloba, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 141 = palmata.
 sequoiensis, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 185 = lobata.
 serpens, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 449.—Ind. or.; Malaya; China.
 serpyllifolia, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391.—Am. austr.
 setosa, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 60.—Chili.
 Sheltonii, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 67. t. 2.—Calif.
 sicula, Schur, Enum. Pl. Transs. 86 = Bielziana.
 Sieberi, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 274.—Austral.
 Sieberiana, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 96 = hederacea.
 Sieboldi, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 320.—Japon.
 silvatica, Fries, ex Hartm. f. in Bot. Notiser (1841), 81 = sylvestris.
 somchetica, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 251 = uliginosa.
 soongorica, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 257 = tricolor.
 sororia, Willd. Hort. Berol. i. 72 = cucullata.
 spatulata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 353.—Reg. Casp.; Persia.
 speciosa, Pantoč, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 79.—Serbia.
 speciosa, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 708 = altaica.
 spectabilis, C. Richt. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 419 = odorata.
 Sprengeliana, Steud. Nom. ed. I. 887 = Ionidium concolor.
 spuria x, Čelak in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iii. (1875) 478.—Europ.
 stagnina, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 426 = persicifolia.
 stellata, Miers, Trav. ii. 531 = V. Asterias.
 Steveni, Bess. ex Faucon. Excurs. Bot. Valais, 96 = odorata.
 stipularis, Cav. Ic. vi. 21 = capillaris, setosa.
 stipularis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 117.—Ind. occ.
 Stocksii, Boiss. Fl. Orient. i. 453.—Afghan.; Beluch.
 stolonifera, Rodrig. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. (1878) 238.—Ins. Balear.
 striata, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 290.—Am. bor.
 striata, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 72 = glabella.
 stricta, Hornem. Hort. Hafn. ii. 958, Add. = Ruppii.
 stricta, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 178; et ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 175 = Ionidium concolor.
 stricta, Poir. Encyc. viii. 648 = Ionidium strictum.
 suaveolens, Perrier & Songeon, in Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem. 183 = ambigua.
 suaveolens, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 107 = odorata?
 suaveolens x, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 190.—Europ.
 suavis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 164 = odorata.

VIOLA:—

suavis, Fisch. ex Ging. in DC. Prod. i. 294 = Gmeliniana.
 suavisissima, Jord. Pugill. Pl. Nov. 21 = odorata.
 subcarnea, Jord. l. c. 17 = odorata.
 subdimidiata, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 276.—Bras.
 suberosa, Desf. Fl. Atlant. ii. 313 = arborescens.
 subtilis, Jord. in Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem. 101 = tricolor.
 sudetica, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 12 = tricolor.
 suecica, Fries, Summa Veg. Scand. 556.—Europ. bor.
 suffruticosa, Linn. Sp. Pl. 937 = Ionidium heterophyllum.
 sulfurea, Cariot, Etud. des Fleurs, ed. VII. ii. 81 = odorata.
 sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 389.—Sumatra.
 summa, Vell. Fl. Flum. viii. t. 161 = Anchietea salutaris.
 sylvatica, Auct. = seq.
 sylvestris, Lam. Fl. Fr. ii. 680.—Europ.; As. temp.
 Symei, Baker, in Thirsk, Bot. Exch. Rep. (1859) 8 = tricolor.
 taurica, C. A. Mey. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 44.—Tauria.
 tenella, Muhl. Cat. 25; Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 78 = tricolor.
 tenella, Poir. Encyc. viii. 644 = parvula?
 tenella, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354, nomen; et in Am. Monthly Mag. (1819) 191 (Quid?).—Am. bor.
 tenerrima, Wiesb. ex Nym. Consp. 78 = hirta.
 tenuis, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 482 = diffusa.
 tetrapetala, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 133 = maculata.
 teucrifolia, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 391 = rubella.
 teydea, Berth. in Mém. Soc. Linn. Par. v. (1827) 420. t. 7.—Ins. Canar.
 tezensis, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 350.—Marocc.
 thesifolia, Juss. ex Poir. Encyc. viii. 649 = Ionidium heterophyllum.
 thessala, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. viii. 51 = alba.
 thessala, Heldr. ex Nym. Consp. 78 = odorata.
 thianschanica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 427.—As. centr.
 Thibaudieri, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 290.—Japon.
 Thomasiana, Songeon & Perrier, in Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem. 183 = campestris.
 Thomsoni, Oudem. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 74.—Ind. or.
 Timbali, Jord. Pugill. Pl. Nov. 22 = tricolor.
 tolosana, Timb. Et. Hist. Bot. Viola (1854), 6 = sepicola.
 trachelifolia, Ging. in Linnaea, i. (1826) 409 = Chamissoniana.
 transsilvanica, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 184 = Jooi.
 tricolor, Linn. Sp. Pl. 935.—Europ.; As. et Am. bor.
 tridentata, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 76.—Reg. Magellan.
 trifida, Spreng. Pugill. i. 22 = hastata.
 triloba, Schwein. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 57 = palmata.
 trinervis, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 357 = inconspicua.
 tripartita, G. Don, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 657, nomen = seq.?
 tripartita, Ell. Sketch, i. 302 = hastata.
 truncata, Meyen, Reise, i. 314 = volcanica.
 tuberosa, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 773 = arborescens.
 turfosa, Kirschl. ex F. Schultz, in Flora, xxiii. (1840) 121 = Schultzei.
 turkestanica, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 12.—Turkestan.
 uliginosa, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 169; Schrad. Neues Journ. iv. (1810) 80.—Europ.
 uliginosa, Muhl. Cat. 25 = canina.
 umbraticola, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 370.—Mexic.
 umbrosa, Fries, Novit. 271 = Selkirkii.
 umbrosa, Hoppe, in Flora, xi. (1828) 648 = collina.
 umbrosa, Saut. in Flora, xxii. (1839) 259 = sciaphila.
 uniflora, Linn. Sp. Pl. 936.—Sibir.

VIOLA :—

- uniflora*, Vand. ex Roem. Script. 147 (Quid ?).—Bras.
vaginata, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 324.—Japon.
Valderia, All. Fl. Pedem. ii. 98 = *cenisia*.
Valderia, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 709 = *gracilis*.
variata, Jord. in Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem. 166 = *tricolor*.
variegata, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 240.—Dahur.; China.
variegata, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xlv. (1878) 198 = *tricolor*?
vegetalis, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 215, sphalm. = *segetalis*.
verecunda, A. Gray, in Mem. Acad. Am. N. S. vi. (1858) 382.—Japon.
veronicaefolia, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 121.—N. Granat.
versicolor, Salisb. Prod. 130 = *tricolor*.
verticillata, Cerv. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1803) 195.—Chili.
verticillata, Ortega, Hort. Matr. Dec. 50 = *Ionidium polygalaeifolium*.
vicina, Mart. Fl. Tarn. 80 = *sylvestris*.
Villarsiana, Roem. & Schult. Syst. v. 388 = *tricolor*.
villosa, Walt. Fl. Carol. 219 = *cucullata*.
vindobonensis ×, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 191.—Europ.
vinealis, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 75 = *odorata*.
violacea, Wiesb. ex Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. iii. (1885) 45 = *alba*.
virescens, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 77 = *alba*.
virgata, Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 184 = *tricolor*.
vivariensis, Jord. Obs. Pl. Crit. i. (1846) 17 = *tricolor*.
volcanica, Gill. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 145. t. 98.—Peruv.
vulgaris, Rupr. Fl. Ingr. 135 = *sylvestris*.
Wahlenbergii, Beurl. ex Nym. Consp. 77 = *canina*.
Walkerii, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 42 = *Patrinii*.
Wallichiana, Ging. in DC. Prod. i. 300 = *biflora*.
Wiedemannii, Boiss. Fl. Orient. i. 457.—Anatolia.
Wiesbauriana, Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. iii. (1885) 45 = *seq.*
Wiesbaurii ×, Sabransky, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 131. in nota.—Europ.
Wightiana, Wall. Cat. n. 4021 = *serpens*.
Willkommii, De Roem. ex Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 10.—Hispan.
Willkommii, Teplouchow, in Bull. Soc. Oural. Amat. Sc. Nat. vii. II. 24 (Quid ?).—Rossia.
Wrightiana, Watt, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 379.—Reg. Himal.
yezoënsis, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 325.—Japon.
Zongia, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ix. (1868) 300.—Madag.
Zoysii, Wulf. in Jacq. Coll. iv. 297 = *calcarata*.

VIOLAEOIDES, Michx. ex DC. Prod. i. 280 (1824) = **Noisetia**, H. B. & K. (Violar.).

VIONAEA, Neck. Elem. i. 107 (1790) = **Leucadendron**, Berg. (Proteac.).

VIORNA, Reichb. Handb. 277 (1837) = **Clematis**, Dill. (Ranunc.).
urnigera, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 270 = *C. Viorna*.

VIRAEA, 'Vahl,' ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 512 (1873), sphalm. = **VIREA**, Adans. = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

VIRAYA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 466. t. 89 (1826) = **Waitzia**, Wendl. (Compos.).
Podolepis, Gaudich. l. c. = *W. Podolepis*.

VIRCHOWIA, Schenk, Sel. Sem. Wirceb. Adn. Crit. (1852) 1; ex Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. ii. (1884) 432. **SCROPHULARINEAE**.
cubensis, Bartl. & Schenk, l. c.—Hab. ?

VIRDIKA, Adans. Fam. ii. (19) (1763) = **Albuea**, Linn. (Liliac.).

VIREA, Adans. Fam. ii. 112 (1763) = **Leontodon**, Linn. (Compos.).
asplenioides, Vahl, ex Hornem. Hort. Hafn. 759 = *Picris asplenioides*.
autumnalis, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 430 = *L. autumnalis*.
hastilis, Gaertn. Fruct. ii. 365. t. 159. f. 3 = *L. hastilis*.
hispida, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 429 = *L. hispidus*.
incana, S. F. Gray, l. c. = *L. incanus*.
pyrenaica, S. F. Gray, l. c. = *L. pyrenaicus*.
scabra, Scop. Delic. Insubr. ii. 25. t. 13 = *Picris asplenioides*.

VIRECTA, Afzel. ex Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. partim (1817). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 55.

PHYTEUMOIDES, Smeathm. ex DC. Prod. iv. 414 (1830).
angustifolia, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 48.—Afr. trop.
carnea, Baill. Hist. Pl. vii. 331 = *Pentas carnea*.
clatior, DC. Prod. iv. 415 = *procumbens*?
fasciculata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 136 = *Ophiorrhiza fasciculata*.
lanceolata, Baill. Hist. Pl. vii. 380 = *Mussaenda luteola*.
lutea, G. Don, Gen. Syst. iv. 52.—Afr. trop.
multiflora, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 4.—Afr. trop.
paniculata, G. Don, Gen. Syst. iv. 521.—Afr. trop.
procumbens, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 2.—Afr. trop.
prostrata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 136 = *Ophiorrhiza Harrisiana*.
setigera, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 48.—Afr. trop.
suffruticosa, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 136 = *Ophiorrhiza fasciculata*.

VIRECTA, Linn. f. Suppl. 17 (1781) = **Sipanea**, Aubl. (Rubiace.).

biflora, Linn. f. l. c. 134 = *S. biflora*.
dichotoma, Spreng. Syst. i. 702 = *S. pratensis*.
erythraeoides, Steud. Nom. ed. II. ii. 774 = *S. erythraeoides*.
glomerata, Spreng. Syst. i. 702 = *S. glomerata*.
pratensis, Vahl, Eclog. Am. ii. 11 = *S. pratensis*.
radicans, Steud. Nom. ed. II. ii. 774 = *S. biflora*.
virens, Vahl, Symb. Bot. ii. 38 = *S. biflora*.

VIREYA, Blume, Bijdr. 854 (1826) = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).

alba, Blume, l. c. 855 = *R. album*.
celebica, Blume, l. c. = *R. malayanum*.
javanica, Blume, l. c. 854 = *R. javanicum*.
retusa, Blume, l. c. 856 = *R. retusum*.
tubiflora, Blume, l. c. 855 = *R. malayanum*.

VIREYA, Rafin. Specch. i. 194 (1814) = **Alloplectus**, Mart. (1829) (Gesner.).
sanguinolenta, Rafin. l. c. = *A. sanguineus*.

VIRGA, Hill, Veg. Syst. v. 12 (1763) = **Dipsacus**, Linn.
pilosa, Hill, Hort. Kew. 75 = *D. pilosus*.

VIRGA-AUREA, [Tourn.] Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 181 (1745) = **Solidago**, Vaill. (Compos.).

VIRGARIA, Rafin. ex DC. Prod. v. 243 (1836) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
concolor, Rafin. ex DC. l. c. = *A. concolor*.

VIRGAUREA, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 178 (1745) = **Erigeron**, Linn. (Compos.).

VIRGILIA, Lam. Illustr. ii. 454. t. 326 (1793). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 554.
ANDRASTIS, Rafin. ex Benth. in Ann. Mus. Wien. ii. (1838) 86.

APHORA, Neck. Elem. iii. 50 (1790).
argentea, Poir. Encyc. viii. 679 = *Ammodendrum Sieversii*.

aurea, Lam. Illustr. ii. 454 = *Calpurnia lasiogyne*.
capensis, Lam. l. c.—Afr. austr.
genistoides, Poir. Encyc. viii. 679 = *Cyclopia genistoides*.

VIRGILIA :—

grandis, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 1 (Quid ?).—Afr. austr.
intrusa, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 4 = *Calpurnia intrusa*.
lasiogyne, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1501 = *Calpurnia lasiogyne*.
lutea, Michx. f. Hist. Arb. Am. iii. 266. t. 3 = *Cladrastis tinctoria*.
robinoides, DC. Prod. ii. 98 = *Calpurnia robinoides*.
rubiginosa, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 98 (Quid ?).—Ins. Guadalupe.
secundiflora, Cav. Ic. v. 1 = *Sophora secundiflora*.
sylvatica, DC. Prod. ii. 98 = *Calpurnia sylvatica*.

VIRGILIA, L'Hérit. Diss. [1788 ?].—Cf. Dryand. Cat. Bibl. Banks, iii. 313 = **Gaillardia**, Foug. (Compos.).
grandiflora, [Nutt.] in Fras. Cat. (1813) n. 87 = *G. bicolor*.
heloides, L'Hérit. Diss. [1788 ?]; et ex DC. Prod. v. 652 = *G. bicolor*.

VIRGULARIA, Ruiz & Pav. Prod. 92. t. 19 (1794) = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).

alpestris, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 10. t. 205 = *G. brachyphylla*.
campestris, Mart. l. c. 7. t. 203 = *Esterhazyia splendida*.
genistifolia, Mart. l. c. 11 = *G. genistifolia*.
lanceolata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 161.—Peruv.
Mansonii, Lhotzky, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 276 = *Esterhazyia splendida*.
montana, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 9. t. 204 = *Esterhazyia splendida*.
revoluta, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 161.—Peruv.
sebifera, Pritz. Ic. Ind. 1167, sphalm. = *Viola sebifera*.
splendida, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 11 = *Esterhazyia splendida*.

VIRGULUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 46 (1836) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
concolor, Rafin. l. c. = *A. concolor*.

VIRLETIA, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 402 (1873) = **Bahia**, Lag. (Compos.).

VIROLA, Aubl. Pl. Gui. ii. 904. t. 345 (1775) = **Myristica**, Linn.
sebifera, Aubl. l. c. = *M. sebifera*.

VISCAGO, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 373 (1742) = **Silene**, Linn. (Caryoph.).

aspera, Hornem. Hort. Hafn. 409 = *S. apetala*?
baccifera, Vest. Man. Bot. 668 = *Cucubalus bacciferus*.
Behen, Hornem. Hort. Hafn. 409; Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 395 = *S. inflata*.
catholica, Hornem. l. c. 410 = *S. catholica*.
chlorantha, Moench, Meth. 704 = *S. chlorantha*.
clavata, Moench, l. c. = *S. italica*.
Fabaria, Hornem. Hort. Hafn. 409 = *S. Fabaria*.
fimbriata, Hornem. l. c. = *S. fimbriata*.
fusca, Moench, Meth. 704 = *S. catholica*.
gigantea, Moench, l. c. 705 = *S. gigantea*.
glutinosa, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 395 = *S. viscosa*.
italica, Hornem. Hort. Hafn. 410 = *S. italica*.
maritima, Hornem. in Fl. Dan. t. 857 = *S. maritima*.
mollissima, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 396 = *S. italica*.
mollissima, Moench, Meth. Suppl. 303 = *S. mollissima*.
multiflora, Hornem. Hort. Hafn. 410; Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 396 = *S. multiflora*.
nutans, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 344 = *S. nutans*.
Otites, Hornem. Hort. Hafn. 411 = *S. Otites*.
paradoxa, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 344 = *S. paradoxa*.
parviflora, Hornem. Hort. Hafn. 411 = *S. Otites*.
pilosa, Hornem, l. c. 410 = *S. italica*.
polygama, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 533 = *S. Otites*.
sibirica, Hornem. Hort. Hafn. 410 = *S. sibirica*.
stellata, Reichb. Ic. Desc. Pl. t. 27 = *S. stellata*.
tartarica, Hornem. Hort. Hafn. 410 = *S. tatarica*.
unilateralis, Moench, Meth. 704 = *S. tatarica*.
viscosa, Moench, Meth. Suppl. 303 = *S. viscosa*.
vulgaris, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 325 = *Lychnis Viscaria*.
wolgensis, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 48 = *S. wolgensis*.

VISCARIA, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 126 (1745) = *Lychnis*, Tourn. (Caryoph.).
acutata, Walp. Ann. vii. 290, sphalm. = *oculata*.
alba, Hort. ex G. Don, in Lond. Hort. Brit. 186 = *L. Viscaria*.
albiflora, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 54; ed. III. 66 = *L. Viscaria*.
alpina, G. Don, Gen. Syst. i. 415 = *L. alpina*.
aspera, Poir. Encyc. Suppl. iii. 537 = *L. Coeli-rosa*.
atropurpurea, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 166 = *L. atropurpurea*.
Burridgii, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 957 = *L. Coeli-rosa*.
cardinalis, Hort. ex Vilm. l. c. ed. III. 302 = *L. Coeli-rosa*.
Dunnetti, Hort. ex Vilm. l. c. 1220 = *L. Coeli-rosa*.
elegans, Hort. ex Vilm. l. c. 301 = *L. Coeli-rosa*.
helvetica, G. Don, Gen. Syst. i. 415 = *L. alpina*.
intermedia, Ledeb. Fl. Ross. i. 329. — Sibir.
Lagrangei, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 243 = *L. Lagrangei* (in Addend.).
magellanica, G. Don, Gen. Syst. i. 415 = *L. magellanica*.
neglecta, G. Don, l. c. = *L. Viscaria*.
oculata, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 53 = *L. Coeli-rosa*.
purpurea, Wimm. Fl. Schles. (1841) 67 = *L. Viscaria*.
Sartorii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 79. — Graecia.
Sigeri, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 299 = *Silene nivalis*?
suecica, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 66 = *L. alpina*.
viscosa, Aschers. Fl. Brandenb. i. 85 = *L. viscosa*.
vulgaris, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 275 = *L. Viscaria*.

VISCOIDES, Jacq. Select. Am. 73. t. 51 (1763) = *Psychotria*, Linn. (Rubiaceae).
pendulum, Jacq. l. c. = *P. parasitica*.

VISCUM, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 284 (1737).
LORANTHACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 213.
affine, Pohl, ex DC. Prod. iv. 281 = *Phoradendron rubrum*.
album, Linn. Sp. Pl. 1023. — Europ.; As. temp.
album, Thunb. Fl. Jap. 64 = *Kaempferi*.
album, Walt. Fl. Carol. 241 = *Phoradendron flavescens*.
album, Webb, Iter Hisp. 42 = *cruciatum*.
ambiguum, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 356 = *Eubrachion Arnottii*.
anceps, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 229 = *articulatum*.
anceps, Spreng. Syst. i. 487 = *Phoradendron hexastichon*?
angulatum, Heyne, ex DC. Prod. iv. 283. — As. et Austral. trop.
angustifolium, Bert. ex Spreng. Syst. i. 487 = *Phoradendron rubrum*.
angustifolium, DC. Prod. iv. 281 = *Phoradendron angustifolium*.
antarcticum, Forst. f. Prod. 70 = *Tupeia antarctica*.
aoraiense, Nadeaud, Enum. Pl. Tahiti, 64 = *articulatum*.
aphyllum, Griff. Notul. iv. 634 = *articulatum*.
apodum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 439. — Madag.
articulatum, Burm. f. Fl. Ind. 311. — As. et Austral. trop.
articulatum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 133 = *japonicum*.
articulatum, Pohl, ex DC. Prod. iv. 284 = *Phoradendron tunaeforme*.
attenuatum, DC. Prod. iv. 284 = *articulatum*.
austriacum, Wiesb. ex Dichtl, in Deutsche Bot. Monatsschr. ii. (1884) 154 = *album*.
benghalense, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 379 = *monoicum*.
Berterianum, DC. Prod. iv. 281 = *Phoradendron Berterianum*.
Bolleianum, Seem. Bot. Voy. Herald, 295. t. 63 = *Phoradendron Bolleanum*.
brachystachyum, DC. Prod. iv. 280 = *Phoradendron brachystachyum*.
buxifolium, Lam. Encyc. iii. 56 = *Dendrophthora buxifolia*.
buxifolium, Spreng. Syst. i. 488 = *torulosum*.
capense, Bory, Voy. i. 320 = *triflorum*.
capense, Linn. f. Suppl. 426. — Afr. austr.
capillare, Blume, Bijdr. 667 (Psiloti sp. — CRYPT.).
capitellatum, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 18. — Ind. or.

VISCUM:—
caucasicum, Steud. Nom. ed. I. 888 = *Arceuthobium Oxycedri*.
chilense, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 28. — Chili.
chrysostachyum, Presl, Epim. Bot. 254 = *Phoradendron chrysostachyum*.
clavatum, Benth. Pl. Hartw. 189 = *Phoradendron clavatum*.
compressum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 861 = *articulatum*.
confertum, Roxb. Hort. Beng. [105]; Fl. Ind. iii. 764 = *monoicum*.
continuum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 229, nomen. — Afr. austr.
cordifolium, Presl, Epim. Bot. 253. — Panama.
cornifolium, A. Cunn. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 103 = *Notothixos cornifolius*.
cornifolium, Presl, Epim. Bot. 254 = *Phoradendron Schottii*?
crassifolium, Pohl, ex DC. Prod. iv. 280 = *Phoradendron crassifolium*.
Crassulae, Eckl. & Zeyh. Enum. 357. — Afr. austr.
crassuloides, Presl, Epim. Bot. 252 = *Phoradendron crassuloides*.
cruciatum, Sieber, ex Spreng. Syst. i. 488, in syn.; Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 274. — Hispan.
cryptophlebium, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 245. — Madag.
Cumingianum, Presl, Epim. Bot. 255 = *Ginalloa Cumingiana*.
cuneifolium, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 438. — Madag.
cupressoides, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 197 = *Dendrophthora cupressoides*.
cupulatum, DC. Prod. iv. 285 = *Dendrophthora cupulata*.
dichotomum, Bert. ex Spreng. Syst. i. 488 = *Phoradendron Berterianum*.
dichotomum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 147 = *articulatum*.
dichotomum, Gilib. Exercit. ii. 394 = *album*.
dimidiatum, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 58. — Guian.
dimidiatum, Sagot, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 126 = *Phoradendron Schottii*.
distichum, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 61. — Ins. Norfolk.
domingense, Spreng. Syst. i. 487 = *Dendrophthora domingensis*.
echinocarpum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 248. — Madag.
ellipticum, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Pot. iv. (1845) 106 = *Phoradendron ellipticum*.
elongatum, Wall. Cat. n. 495; DC. Prod. iv. 284 = *articulatum*.
ensifolium, Pohl, ex DC. l. c. 281 = *Phoradendron ensifolium*.
Eucleae, Eckl. & Zeyh. Enum. 357. — Afr. anstr.
Euphorbiae, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 229 = *V. Crassulae*.
falcatum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 172 = *Phoradendron angustifolium*.
falcatum, Hook. Ic. Pl. t. 368 = *Phoradendron falcatum*.
falcatum, Wall. Cat. n. 492; DC. Prod. iv. 278 = *monoicum*.
falcifrons, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 356. — Uruguay.
flagelliforme, Descourt. Fl. Antill. v. 204 = *Dendrophthora gracilis*.
flavens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 32 = *Phoradendron chrysocladon*.
flavescens, Comm. ex DC. Prod. iv. 286 = *Myzodendron punctulatum*.
flavescens, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 114 = *Phoradendron flavescens*.
floccosum, Thw. Ennm. Pl. Zeyl. 418 = *Notothixos floccosus*.
florianum, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 219. — Ins. Galapag.
Fockeanum, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 60 = *Phoradendron Schottii*.
Fockeanum, Sagot, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 89, 90 (= *Oryctanthus botryostachys*) = *Loranthus ruficaulis*.
fragile, Wall. Cat. n. 498; DC. Prod. iv. 284 = *articulatum*.
galapageium, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 216. — Ins. Galapag.

VISCUM:—
geminatum, Korth. in Verh. Batav. Gen. xvii. (1839) 259. — Borneo.
glandulosum, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 60. — Guian.
glaucum, Eckl. & Zeyh. in South. Afr. Journ. (1830) 375; ex eor. Enum. 357 = *rotundifolium*.
globuliflorum, Presl, Epim. Bot. 251. — Peruv.
gracile, DC. Prod. iv. 285 = *Dendrophthora gracilis*.
granulosum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 438. — Madag.
grossum, Wight, in Wall. Cat. n. 6879. — Ind. or.
guyanense, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1161 (= *Phthirusa guyanensis*). — Guian.
Helferi, Presl, Epim. Bot. 256 = *Ginalloa Helferi*.
Henslovii, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 216. — Ins. Galapag.
heteranthum, Wall. Cat. n. 488; DC. Prod. iv. 279 = *Henslowia heterantha*.
hexastichum, DC. l. c. 282 = *Phoradendron hexastichon*.
Heyneanum, DC. l. c. 278 = *orientale*.
incanum, Hook. Ic. Pl. t. 73 = *Notothixos incanus*.
interruptum, DC. Prod. iv. 282 = *Phoradendron interruptum*.
jamaicense, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 195 = *Phoradendron trinervium*.
japonicum, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 329. — As.; Afr.; Austral. trop. et subtrop.
Kaempferi, DC. Prod. iv. 285. — Japon.
Kunthianum, DC. l. c. 283 = *Phoradendron rubrum*.
lanceolato-ellipticum, Pohl, ex DC. l. c. 282 = *Phoradendron interruptum*.
latifolium, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 142 = *Henslowia heterantha*.
latifolium, Lam. Encyc. iii. 57 = *Phoradendron hexastichon*.
latifolium, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 268 = *Phoradendron Schottii*.
laurifolium, Presl, Epim. Bot. 255 = *Phoradendron laurifolium*.
laxum, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 16. — Hispan.
leptostachyum, DC. Prod. iv. 280 = *Dendrophthora leptostachya*.
leucarpum, Rafin. Fl. Ludov. 79 = *Phoradendron flavescens*.
leucocarpum, DC. Prod. iv. 280, in syn. = *praec.*
Liga, Gill, ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 355. — Chili.
ligulatum, Blume, Bijdr. 667 (Psiloti sp. — CRYPT.).
ligustrinum, Presl, Epim. Bot. 252. — Mexic.
Lindsayi, Oliver, ex Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 108. — N. Zel.
linifolium, Presl, Epim. Bot. 251. — Mexic.
lophiocladum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 437. — Madag.
macrophyllum, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 195 = *Phoradendron chrysocladon*.
macrophyllum, Spreng. Syst. i. 488 = *Phoradendron hexastichon*?
macrostachyon, Jacq. Coll. ii. 109. t. 5. f. 3 = *Dendrophthora macrostachya*.
macrostachyon, Spreng. Syst. i. 487 = *Dendrophthora leptostachya*.
Mangiferae, Wight, in Wall. Cat. n. 6878 = *capitellatum*.
martinicense, DC. Prod. iv. 280 = *Phoradendron hexastichon*?
microphyllum, Pohl, ex DC. l. c. 283 = *Phoradendron rubrum*.
microstachyum, Presl, Epim. Bot. 252 = *Phoradendron rubrum*?
minimum, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 581. — Afr. austr.
moniliforme, Blume, Bijdr. 667 = *articulatum*.
moniliforme, Wight & Arn. Prod. 380 = *japonicum*.
monoicum, Roxb. Hort. Beng. [105]; Fl. Ind. iii. 763. — Ind. or.; Burma.
monoicum, Wight, ex Wall. Cat. n. 6875 = *verruculosum*.
monstrosum, Bert. ex DC. Prod. iv. 284 = *Dendrophthora opuntioides*.
montanum, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 39 = *orientale*.
mucronatum, DC. Prod. iv. 282 = *Phoradendron rubrum*.
multicostatum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 248. — Madag.

VISCUM :—

- myriophlebium, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 248.—Madag.
myrtilloides, Willd. Sp. Pl. i. 739 = *Phoradendron rubrum*.
navicellatum, Korth. in Verh. Batav. Gen. xvii. (1839) 256 = orientale.
nepalense, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 47 = articulatum.
nervosum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 388 = triflorum.
nitidum, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 105 = *Phoradendron nitidum*.
obliquum, Presl, *Epim. Bot.* 253.—Mexic.
oblongifolium, DC. Prod. iv. 283.—Ins. Guadaloup.
oblongifolium, Rafn. New Fl. Am. iii. 23 = *Phoradendron rubrum*?
obovatum, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 579.—Afr. austr.
obscurum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 31 (sp. dub.).—Afr. austr.
obtusatum, Wall. Cat. n. 494; DC. Prod. iv. 279 = ovalifolium.
obtusissimum, Miq. in *Linnaea*, xviii. (1844) 602.—Bras.
ochroleucum, Rafn. in New Fl. Am. iii. 23 = *Phoradendron flavescens*.
oliganthum, Presl, Bot. Bemerk. 75 = obscurum?
Opuntia, Thunb. Fl. Jap. 64 = japonicum.
opuntioides, Heyne, ex DC. Prod. iv. 284; Roxb. Fl. Ind. iii. 764 = articulatum.
opuntioides, Linn. Sp. Pl. 1023 = *Dendrophthora opuntioides*.
orbiculatum, Wight, Ic. t. 1016.—Ind. or.
orientale, DC. Prod. iv. 278 = cruciatum.
orientale, Willd. Sp. Pl. iv. 737.—As. et Austral. trop.
ovalifolium, Wall. Cat. n. 489; DC. Prod. iv. 278.—Burma; China; Malaya.
Oxycedri, DC. Fl. Fr. iv. 274 = *Arceuthobium Oxycedri*.
Pamattonis, Korth. in Verh. Batav. Gen. xvii. (1839) 255 = orientale.
pauciflorum, Linn. f. Suppl. 246 (sp. dub.).—Afr. austr.
pauciflorum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 229 = obscurum.
penninervium, Steud. Nom. ed. II. ii. 775, sphalm. = seq.
penninervium, DC. Prod. iv. 282 = *Phoradendron penninervium*.
pentanthum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 249.—Madag.
Perrottetii, DC. Prod. iv. 280 = *Phoradendron Perrottetii*.
philippense, Llanos, Fragn. 52 = articulatum.
piperoides, DC. Prod. iv. 281 = *Phoradendron Schottii*.
platycaulon, Bert. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 744 = articulatum.
platyphyllum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 47 = *Henslowia heterantha*.
portulacoides, Presl, *Epim. Bot.* 252.—Ecuador.
pubigerum, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 208; R. Cunn. ex Miq. in *Linnaea*, xviii. (1844) 86 = *Tupeia antarctica*.
purpureum, Linn. Sp. Pl. 1023 = *Loranthus uniflorus*.
quadrangulare, DC. Prod. iv. 283 = *Phoradendron rubrum*?
quernum, Auct. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 203 = *Loranthus europaeus*.
racemosum, Aubl. Pl. Gui. ii. 895 = *Phoradendron hexastichon*.
Radula, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 439.—Madag.
ramosissimum, Wall. Cat. n. 6876.—Ind. or.
ramosissimum, Wight, Ic. t. 1017 = angulatum.
Randiae, Bello, in *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 278.—Porto Rico.
Reichenbachianum, Secm. Bot. Voy. Herald. 294. t. 62 = *Phoradendron Reichenbachianum*.
rhytidocarpum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 438.—Madag.
robustum, Eckl. & Zeyh. Enum. 358.—Afr. austr.
rotundifolium, Bory, Voy. i. 320 = triflorum.
rotundifolium, Eckl. & Zeyh. Enum. 357 = obscurum.
rotundifolium, Linn. f. Suppl. 426.—Afr. austr.
Roxburghianum, Korth. in Verh. Batav. Gen. xvii. (1839) 257 = orientale.
rubrum, Burm. f. Fl. Ind. 311 (*Hederae* sp.).—Ind. or.
rubrum, Griseb. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 115 = *Phoradendron corynarthron*.

VISCUM :—

- rubrum*, Linn. Sp. Pl. 1023 = *Phoradendron rubrum*.
rugosum, Rafn. New Fl. Am. iii. 24 = *Loranthus uniflorus*?
salicifolium, Presl, *Epim. Bot.* 254 = *Phoradendron salicifolium*.
salicornoides, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 208 = articulatum.
saururoides, DC. Prod. iv. 280 (excl. syn.) = *Phoradendron Schottii*.
Schiedeanum, DC. l. c. 670 = *Phoradendron angustifolium*.
Schottii, Pohl, ex DC. l. c. 281 = *Phoradendron Schottii*.
serotinum, Rafn. New Fl. Am. iii. 22 (Quid?).—Am. bor.
Sertularia, Presl, Bot. Bemerk. 75 = articulatum.
spathulifolium, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 136 = *Ginalloa spathulifolia*.
squamigerum, Benth. Pl. Hartw. 190 = *Phoradendron squamigerum*.
stellatum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 142 = album.
stenophyllum, Spreng. Syst. i. 487 = *Phoradendron angustifolium*.
subaureum, F. Muell. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 103 = *Notothixos subaureus*.
surinamense, G. W. Schilling, Desc. Pl. Leprae, 201. t. 3.—Guian.
taenioides, Comm. ex Thou. Obs. Pl. Afr. in Mélang. 43 = japonicum.
tereticaule, DC. Prod. iv. 280 = *Phoradendron Schottii*.
teretifolium, Hensl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 85, sphalm. = praec.
terrestre, Linn. Sp. Pl. 1023 = *Lysimachia stricta*.
tetragonum, DC. Prod. iv. 232 = *Phoradendron rubrum*.
thymifolium, Presl, *Epim. Bot.* 251.—Afr. austr.
tomentosum, DC. Prod. iv. 670 = *Phoradendron tomentosum*.
toruloides, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 107, in nota = torulosum.
torulosum, DC. Prod. iv. 279.—Ecuador.
trachycarpum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 439.—Madag.
tricostatum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 229, nomen; et ex Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 580.—Afr. austr.
triflorum, DC. Prod. iv. 279.—Ins. Maurit.
trigonum, D. Dietr. Syn. Pl. i. 546 = *Phoradendron rubrum*.
trinervium, Lam. Encyc. iii. 57 = *Phoradendron trinervium*.
trinervium, Spreng. Syst. i. 488 = *Phoradendron rubrum*.
tuberculatum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 338.—Abyss.
tunaefolium, Steud. Nom. ed. II. ii. 775, sphalm., in syn. = seq.
tunaeforme, DC. Prod. iv. 284 = *Phoradendron tunaeforme*.
umbellatum, Blume, Bijdr. 666.—Java.
undulatum, Pohl, ex DC. Prod. iv. 282 = *Phoradendron undulatum*.
vaginatum, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 740 = *Arceuthobium vaginatum*.
vaginatum, Spreng. Syst. i. 487 = *Dendrophthora cupulata*.
velutinum, DC. Prod. iv. 281 = *Phoradendron velutinum*.
venosum, DC. l. c. 279 = triflorum.
verrucosulum, Steud. Nom. ed. II. ii. 776, sphalm. = verruculosum.
verrucosum, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 581.—Afr. austr.
verruculosum, Wight & Arn. Prod. 379.—Ind. or.
verticillatum, Lam. Encyc. iii. 57 (*Rhipsalidis* sp.?).—Jamaic.
verticillatum, Linn. Sp. Pl. 1023 = *Phoradendron trinervium*.
verticillatum, Nutt. Gen. Am. ii. 235, partim = *Phoradendron flavescens*.
verticillatum, Roxb. Hort. Beng. [105]; Fl. Ind. iii. 764 = orientale.
verticilliflorum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 235 = orientale?
villosum, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 654 = *Phoradendron flavescens*.
Wallichianum, Wight & Arn. Prod. 379.—Ind. or.
Wightianum, Wall. Cat. n. 6877 = japonicum.
Wightianum, Wight & Arn. Prod. 380.—Ind. or.

VISCUM :—

- Willdenowianum*, Molkenb. in Miq. Pl. Fungh. 108.—Palaestin.
xanthophyllum, A. Cunn. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 103 = *Notothixos cornifolius*.

VISENA, Schult. Syst. vi. 736 (1820), sphalm. = seq.

VISENIA, Hoult. Handleid. viii. 308 (1777) = **Melochia**, Dill. (Stercul.).

- alba*, Endl. ex Walp. Rep. i. 351.—Java.
Berteriana, Spreng. Syst. iii. 30 = *Walteria glabra*.
caracasana, Spreng. l. c. = M. caracasana.
concatenata, Spreng. l. c. 31 = M. corchorifolia.
corchorifolia, Spreng. l. c. 30 = M. corchorifolia.
corymbosa, Spreng. l. c. 29 = M. corymbosa (in Addend.).
crenata, Spreng. l. c. 30 = M. tomentosa.
depressa, Spreng. l. c. = M. depressa.
graminifolia, Spreng. l. c. iv. Cur. Post. 248 = M. graminifolia.
hirsuta, Spreng. l. c. iii. 30 = M. hirsuta, Cav.
indica, J. F. Gmel. Syst. 515 = M. odorata.
inflata, Spreng. Syst. iii. 30 = M. lupulina.
javanica, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 302 = M. odorata.
lupulina, Spreng. Syst. iii. 31 = M. lupulina.
madagascariensis, Spreng. l. c. 30.—Madag.
mollis, Spreng. l. c. = M. mollis.
nodiflora, Spreng. l. c. = M. nodiflora.
polystachya, Spreng. l. c. = M. venosa.
sericea, Spreng. l. c. iv. Cur. Post. 248 = M. venosa.
serrata, Spreng. l. c. iii. 30 = M. hirsuta, Cav.
supina, Spreng. l. c. 31 = M. corchorifolia.
tomentosa, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 4 = M. arborea.
Ulmariae, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 248 = M. ulmarioides.
umbellata, Hoult. Handleid. viii. 309. t. 46. f. 3 = M. odorata.
umbellata, Wight, Ic. 509 = M. arborea.
velutina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 212 (= *Riedlea velutina*).—Ind. or.
venosa, Spreng. Syst. iii. 30 = M. venosa.

VISIANIA, DC. Prod. viii. 289 (1844) = **Ligustrum**, Tourn. (Oleac.).

- glomerata*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 549 = L. glomeratum.
grandiflora, DC. Prod. viii. 289 = L. nepalense.
paniculata, DC. l. c. = L. glomeratum.
phyllothyrsa, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 558.—Sumatra.
pubinervis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 548 = L. robustum.
robusta, DC. Prod. viii. 289 = L. robustum.
robusta, Wight, Ic. t. 1242 = L. Roxburghii.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 549.—Sumatra.
undulata, Miq. l. c. 548 = L. undulatum.

VISIANIA, Gasp. Nov. Gen. Fici, 9 (1844) = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).
elastica, Gasp. l. c. = F. elastica.

VISINIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 382, sphalm. = seq.

VISMIA, Vand. Fl. Lusit. 51. t. 3. f. 24 (1788).
HYPERICINEAE, Benth. & Hook. f. i. 166.

- ACROSSANTHES**, Presl, Bot. Bemerk. 22 (1844).
CASPIA, Pison. ex Scop. Introd. 276 (1777).
acuminata, Kunth, ex Spreng. Syst. iii. 350 = glabra.
acuminata, Pers. Syn. ii. 86.—Guian.
affinis, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 161.—Afr. trop.
alternifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 579 (*Psorospermi* sp.?).—Sumatra.
angusta, Miq. in *Linnaea*, xviii. (1844) 27 = ferruginea.
arborescens, Choisy, Prod. Hyp. 36 = *Cratoxylon Blancoi*.
baccifera, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 300 = dealbata.
baccifera, H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 204.—Bras.
Billbergiana, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 117.—Panama.
brasiliensis, Choisy, Prod. Hyp. 35. t. 2.—Bras.
Caparosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 182 = acuminata.
cayennensis, Pers. Syn. ii. 86.—Am. trop.
cochinchinensis, Spreng. Syst. iii. 350 = *Cratoxylon polyanthum*.
confertiflora, Spruce, ex H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 205.—Bras.

VISMIA :—

- cuspidata*, Steud. Nom. ed. II. i. 787, in syn. = ferruginea.
dealbata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 184. t. 454.—N. Granat.
decipiens, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 116.—Bras.
ferruginea, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 117 = Billbergiana.
ferruginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 183.—Am. trop.
frondosa, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 161.—Afr. trop.
glabra, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 183.—Am. trop.
guianensis, DC. Prod. i. 542.—Am. trop.
guianensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 88 = viridiflora.
guineensis, Choisy, Prod. Hyp. 36.—Afr. trop.
guttifera, Pers. Syn. ii. 86; Salzm. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 382 = baccifera.
Hilairii, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 334 = magnoliaefolia.
japurensis, H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 209.—Bras.
laccifera, Mart. Reise Bras. i. 552 = brasiliensis.
laevis, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 303.—N. Granat.
lanceolata, Pers. Syn. ii. 86 = glabra.
lasiantha, Klotzsch, ex H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 198 = brasiliensis.
latifolia, Choisy, Prod. Hyp. 36.—Guian.
latifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 183 = ferruginea vel dealbata.
laurifolia, Pers. Syn. ii. 86.—Bras.
lauriformis, Choisy, Prod. Hyp. 35.—N. Granat.
laxiflora, H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 203.—Guian.
leonensis, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 243.—Afr. trop.
Lindeniana, Decne. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 381.—N. Granat.
longifolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 326. t. 68 = brasiliensis.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 184.—Venezuela.
macrophylla, Salzm. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 111 = ferruginea.
magnoliaefolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 118.—Bras.
Martiana, H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 204.—Bras.
mexicana, Schlecht. in Linnaea, x. (1828) 245.—Mexic.
micrantha, Mart. Reise Bras. i. 552 = parviflora.
micrantha, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 327.—Bras.
obtusata, Spruce, ex H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 207.—Bras.
panamensis, Duchass. & Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 748 = ferruginea.
parviflora, Cham. & Schlecht. l. c. iii. (1828) 119.—Bras.
petiolata, Choisy, Prod. Hyp. 36 = laurifolia.
ramuliflora, Miq. Stirp. Surin. Sel. 88 = cayennensis.
reticulata, Choisy, Prod. Hyp. 34 = latifolia.
rubescens, Oliver, Fl. Afr. trop. i. 160.—Afr. trop.
rufescens, Pers. Syn. ii. 86.—Guian.
Sellowiana, Klotzsch, ex H. G. Reich. in Mart. Fl. Bras. xii. i. 198 = brasiliensis.
sessilifolia, Choisy, Prod. Hyp. 34 = rufescens.
sessilifolia, DC. Prod. i. 542.—Guian.
Sieberiana, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 999, nomen.—Guian.
tomentosa, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 183.—Peruv.
viridiflora, Duchass. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 302.—N. Granat.

VISNAGA, Gaertn. Fruct. i. 92. t. 21 (1788) = **Ammi**, Tourn. (Umbell.).

daucoides, Gaertn. l. c. = A. Visnaga.
meoides, Rafin. New Fl. Am. iv. 23 = A. anethifolium?
vera, Rafin. l. c. = A. Visnaga.

VISNEA, Linn. f. Suppl. 36 (1781). **TERNSTROE-MIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 182.
Mocanera, Juss. Gen. 318 (1789).
Mocanera, Linn. f. Suppl. 251.—Ins. Canar.

VISNEA, Steud. ex Endl. Gen. 173 (1836) = **Barbacenia**, Vand. (Amaryll.).

VISSADALI, Adans. Fam. ii. 145 (1763) = **Knoxia**, Linn. (Rubiace.).

VISTNU, Adans. Fam. ii. 245 (1763) = **Evolvulus**, Linn. (Convolv.).

VITELLARIA, Gaertn. f. Fruct. iii. 131. t. 205 (1805) = **Lucuma**, Juss. (Sapot.).

Casaretti, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 326 = L. Casaretti.
curvifolia, Radlk. l. c. = L. curvifolia.
glabrescens, Radlk. l. c. = L. glabrescens.
grandiflora, Radlk. l. c. = L. grandiflora.
littoralis, Radlk. l. c. = L. littoralis.
mammosa, Radlk. l. c. 321, 323, 325 = L. mammosa.
marginata, Radlk. l. c. 326 = L. marginata.
multiflora, Radlk. l. c. 320, 326 = L. multiflora.
nervosa, Radlk. l. c. 326 = L. Rivicoa.
paradoxa, Gaertn. f. Fruct. iii. 131. t. 205 = L. paradoxa.
pauciflora, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 320, 326 = L. pauciflora.
procera, Radlk. l. c. 325, 326 = L. procera.
pulverulenta, Radlk. l. c. 326 = L. pulverulenta.
retusa, Radlk. l. c. = L. retusa.
Rivicoa, Radlk. l. c. 323, 326 = L. Rivicoa.
serpentaria, Radlk. l. c. 320, 326 = L. serpentaria.
sphaerocarpa, Radlk. l. c. 326 = L. sphaerocarpa.
Valenzuelana, Radlk. l. c. 320, 326 = L. Valenzuelana.
venosa, Radlk. l. c. 326 = L. venosa.

VITENIA, Noronha, ex Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 10.—Cf. **UITENIA**, Noronha = **Erioglossum**, Blume (Sapind.).
edulis, Steud. Nom. ed. II. ii. 776 = E. edule.
stilaginea, Noronha, ex Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 10.—Hab. ?

VITEX, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). **VERBENACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1154.

CASARETTOA, Walp. Rep. iv. 91 (1844).
CHRYSOMALLUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 8 (1806).
EPHALIS, Banks & Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 461.
LIMIA, Vand. Fl. Lusit. 42. t. 3. f. 21 (1788).
NEPHRANDRA, Willd. in Cothen. Disp. Veg. 8 (1790).
PSILOGYNE, DC. in Bibl. Univ. Genève. xvii. (1838) 132 (Rev. Bign. 16).
PYROSTOMA, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 219 (1818).
WALLROTHIA, Roth, Nov. Pl. Sp. 317 (1821).
acuminata, R. Br. Prod. 512.—Austral.
Agnus, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 413 = V. Agnus-castus.

Agnus-castus, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 269, partim = trifolia.

Agnus-castus, Linn. Sp. Pl. 638.—Reg. Mediterr.; Oriens.

alata, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 72 = peduncularis.

alata, Schau. in DC. Prod. xi. 685 = limonifolia.

alata, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 203; Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 316.—Ind. or.

altissima, Linn. f. Suppl. 294.—Ind. or.

altissima, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 160 = littoralis, Decne.

appendiculata, Rottl. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 584 = alata.

arborea, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 391 = V. Negundo.

arborea, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 73 = pubescens.

articulata, Steud. Nom. ed. II. ii. 777 = pubescens.

avicennioides, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 149.—Cuba.

axillaris, Wall. Cat. n. 1760.—Burma.

Babula, Buch.-Ham. ex Wall. l. c. n. 1745 = heterophylla.

bahiensis, Schau. in DC. Prod. xi. 687.—Bras.

Balbisi, Spreng. Syst. ii. 756.—Ins. S. Doming.

beraviensis, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880–82) 535.—Madag.

bicolor, Willd. Enum. Hort. Berol. 660 = V. Negundo.

bignonioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 246.—Venezuela.

Bojeri, Schau. in DC. Prod. xi. 694.—Madag.

bombacifolia, Wall. Cat. n. 1749 = glabrata.

bracteata, Herb. Horsf. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 862 = pubescens.

brasiliensis, Juss. ex Steud. Nom. ed. I. 888.—Bras.

brasiliensis, Mart. ex Schau. in DC. Prod. xi. 690 = Sellowiana.

VITEX :—

- californica*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 10, sphalm. = Vitis californica.
canescens, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 101.—Burma.
canescens, Wall. Cat. n. 1757 (= an praec. ?).—Burma.
cannabifolia, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 152 (Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 28).—Japon.
capitata, Vahl, Eclog. Am. ii. 50. t. 18.—Am. trop.
caribaea, Benth. Bot. Voy. Sulph. 10, sphalm. = Vitis californica.
chinensis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = V. Negundo.
chrysocarpa, Planch. in Hook. Niger Fl. 486.—Afr. trop.
chrysoclada, Boj. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 268.—Afr. trop.
Chrysomallum, Steud. Nom. ed. II. ii. 777.—Madag.
Cienkowski, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 27. n. 42. t. 12.—Afr. trop.
Cofassus, Reinw. ex Blume, Bijdr. 813.—Ins. Molucc.
compressa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 224.—N. Granat.
coriacea, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 586.—Malacca.
cuneata, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 289.—Afr. trop.
Cunninghami, Schau. in DC. Prod. xi. 691 = glabrata.
cymosa, Bert. ex Spreng. Syst. ii. 757.—Bras.
Dalrympleana, F. Muell. Fragm. iv. 128 = Gmelina macrophylla.
dentata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 265.—Afr. trop.
digitata, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 777 = pubescens.
divaricata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 93.—Ind. occ.; Guian.
diversifolia, Kurz, Andam. Rep. App. A 45; B 14.—Ins. Andaman.
Doniana, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 323.—Afr. trop.
elegans, Griff. Notul. iv. 740.—Burma (cult.).
ferruginea, Boj. ex Schau. in DC. Prod. xi. 694 = Bojeri.
ferruginea, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 288.—Afr. trop.
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 6314 = vestita.
flavens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 246.—Peruv.
floridula, Duchass. & Walp. in Walp. Ann. iii. 240.—Panama.
gamosepala, Griff. Notul. iv. 178.—Malacca.
Gardneriana, Schau. in DC. Prod. xi. 687.—Bras.
geniculata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 514.—Ins. Philipp.
gigantea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 245.—Ecuador.
glaberrima, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 330 = littoralis, Decne.
glabrata, R. Br. Prod. 512.—As. et Austral. trop.
glabrata, F. Muell. Fragm. v. 35 = littoralis, A. Cunn.
gracilis, Salisb. Prod. 107 = V. Negundo.
grandiflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 223.—N. Granat.
Haynga, Roxb. Hort. Beng. 46, nomen.—Ind. or.
heptaphylla, A. Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 77.—Ins. Dominic.
heterophylla, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 862 = pubescens.
heterophylla, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 75.—Assam; Burma; Malaya.
heterophylla, Schau. in DC. Prod. xi. 686, partim = urceolata.
Hildebrandtii, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880–82) 534.—Afr. trop.
hypoleuca, Schau. in DC. Prod. xi. 690.—Bras.
ibarensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 226.—Madag.
ilicifolia, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 148.—Cuba.
inaequifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 223 = pubescens.
incisa, Lam. Encyc. ii. 612 = V. Negundo.
incisa, Wall. Cat. n. 1746, partim = trifolia.
indica, Mill. Gard. Dict. ed. VIII, in errat. = trifolia.
integerrima, Mill. l. c. n. 3 = trifolia.
integra, Medic. Beobacht. (1782) 313 = V. Agnus-castus.
involutus, Presl, Bot. Bemerk. 148 = Sphenodesme unguiculata.
laciniata, Hort. ex Schau. in DC. Prod. xi. 684 = V. Negundo.

VITEX:—

- laciniosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 11. 225.—Bras.
laevigata, Herb. Madr. ex Wight & Arn. Prod. 433 = *Psychotria connata*.
lanceolata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 11. 224.—Java.
lanigera, Schau. in DC. Prod. xi. 695.—Madag.
lasiophylla, Benh. Bot. Voy. Sulph. 155 = *mollis*.
latifolia, Lam. Encyc. ii. 613 = *pubescens*.
latifolia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *V. Agnus-castus*.
latifolia, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 777 = *altissima*.
Leichhardtii, F. Muell. Fragm. iii. 58 = *Gmelina Leichhardtii*.
lepidota, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 11. 225.—Bras.
Leucoxydon, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 516 = *V. Negundo*.
Leucoxydon, Linn. f. Suppl. 293.—Ind. or.
Leucoxydon, Schau. in DC. Prod. xi. 692, partim = *glabrata*.
Leucoxydon, Span. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 863 = *littoralis*, Decne.
Lignum-vitae, A. Cunn. ex Schau. in DC. Prod. xi. 692.—Austral.
limonifolia, Wall. Cat. n. 1754.—Burma; Siam.
Lindenii, Hook. f. Bot. Mag. t. 6230.—N. Granat.
littoralis, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 461.—N. Zel.
littoralis, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 401 (cf. *timoriensis*).—Ins. Timor.
Loureirii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 206. t. 48.—China.
Loureirii, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 585 = *urceolata*.
lupinifolia, Salisb. Prod. 106 = *V. Agnus-castus*.
macrophylla, R. Br. Prod. 512 = *Gmelina macrophylla*.
madiensis, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 134.—Afr. trop.
melicopea, F. Muell. Fragm. v. 35 = *acuminata*.
Melleri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 227.—Madag.
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 245.—Mexic.
moluccana, Blume, Bijdr. 813.—Ins. Molucc.
Mombassae, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880–82) 533.—Afr. trop.
montevidensis, Cham. l. c. vii. (1832) 373.—Bras.
Morava, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 1752 = *peduncularis*.
multiflora, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 739 = *divaricata*.
multinervis, Schau. in DC. Prod. xi. 688.—Bras.
Negundo, Linn. Sp. Pl. 638.—As. trop. et subtrop.
Negundo, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 86 = *pubescens*.
obovata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. i. 273.—Afr. austr.
orinocensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 247.—Venezuela.
ovata, Thunb. Fl. Jap. 257 = *trifolia*.
pachyclada, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 227.—Madag.
pallida, Wall. Cat. n. 1751 = *glabrata*.
paludosa, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880–82) 534.—Afr. trop.
paniculata, Lam. Encyc. ii. 612 = *V. Negundo*.
parviflora, A. Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 76.—Ins. Philip.
peduncularis, Wall. Cat. n. 1753.—Ind. or.; Burma.
Pervillei, Baker, Fl. Maurit. 256.—Ins. Seychelles.
Petersiana, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 264.—Afr. trop.
phillyraefolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 226.—Madag.
pinnata, Linn. Sp. Pl. 638 = *Aglaia odorata*.
polygama, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 371.—Bras.
pteropoda, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 567.—Malaya.
pubescens, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1755 = *altissima*.
pubescens, Vahl, Symb. Bot. iii. 85.—As. trop.
punctata, Schau. in DC. Prod. xi. 687.—Ins. Molucc.
repens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 513 = *trifolia*.
Rheidi, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 826 = *V. Leucoxydon* ?
rigens, Griseb. Cat. Pl. Cub. 216.—Cuba.
robusta, Lebas, in Rev. Hort. (1869) 30 = *V. Agnus-castus*.
rotundifolia, Linn. f. Suppl. 294 = *trifolia*.

VITEX:—

- rufescens*, A. Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 77.—Bras.
saligna, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 75 = *V. Leucoxydon*.
Sampsoni, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 115.—China.
scabra, Wall. Cat. n. 1758.—Burma.
Schomburgkiana, Schau. in DC. Prod. xi. 690.—Guian.
Sellowiana, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 108.—Bras.
sexdentata, Wall. Cat. n. 1759 = *Caryopteris grata*.
simplicifolia, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 586.—Malacca.
simplicifolia, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 133.—Afr. trop.
sinuata, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. iv. Phys. (1780) 202. t. 8 = *V. Agnus-castus* ?
spicata, Lour. Fl. Cochinch. 390.—China; Cochinch.
Strickeri, Vatke & Hildebr. in Linnaea, xliii. (1880–82) 532.—Afr. trop.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 567.—Sumatra.
Taruma, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 55 = *montevidensis*.
tettensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 264.—Afr. trop.
timoriensis, Walp. Rep. iv. 84 = *littoralis*, Decne.
Tracyana, F. Muell. Fragm. v. 61 = *Clerodendron Tracyanum*.
trichantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 434.—Madag.
triflora, Vahl, Eclog. Am. ii. 49.—Guian.
tiifolia, Linn. Sp. Pl. 638.—As. et Austral. trop.
triphylla, Royle, Illustr. Bot. Himal. 299 = *praec.*
umbrosa, G. Don, ex Sabine, in Traus. Hort. Soc. v. (1824) 455 = *Doniana*.
umbrosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 93.—Ind. occ.
undulata, Wall. Cat. n. 1756 = *heterophylla*.
uniflora, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 221.—Madag.
urceolata, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 585.—Malacca.
variifolia, Salisb. Prod. 107 = *trifolia*.
Vauthieri, DC. ex Schau. in DC. Prod. xi. 690.—Bras.
verticillata, Lam. Fl. Fr. ii. 363 = *V. Agnus-castus*.
vestita, Wall. Cat. n. 1750.—Malaya.
vitiensis, Seem. Fl. Vit. 190.—Ins. Fiji.
Wimberleyi, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 271.—Ins. Andaman.
zanzibarensis, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880–82) 533.—Afr. trop.
Zeyheri, Sond. ex Schau. in DC. Prod. xi. 693.—Afr. austr.
zeylanica, Burm. f. Fl. Ind. 138 (*Stereospermi* sp. ?).—Zeylan.
zeylanica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 11. 223 = *altissima*.
- VITICASTRUM**, Presl, Bot. Bemerk. 147 (1844) = **Sphenodesme**, Jack (Verben.).
racemosum, Presl, l. c. 148 = *S. barbata*.
- VITICELLA**, Dill. ex Moench, Meth. 296 (1794) = **Clematis**, Dill. (Ranunc.).
campaniflora, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunc. 11 = *C. campaniflora*.
crispa, Bercht. & Presl, l. c. = *C. crispa*.
deltoidea, Moench, Meth. 297 = *C. Viticella*.
florida, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunc. 10 = *C. florida*.
- VITICELLA**, Mitch. in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 220 = **Hydrophyllum**, Linn.
- VITICENA**, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 57, sphalm. = **VITICENA**, Steud. = **Grewia**, Linn. (Tiliac.).
- VITIPHONIX**, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 91, 126. **PALMAE**.
filifera, Becc. l. c. —Ins. Fiji.
- VITIS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 56 (1737). **AMPELIDEAE**, Benth. & Hook. f. i. 387.
ADENOPETALUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1858) i. 417.
ALLOSAMPELA, Rafin. Med. Fl. ii. 122 (1830).
AMPELOPSIS, [Rich. in] Michx. Fl. Bor. Am. i. 159 (1803), ex parte.
BOTRIA, Lour. Fl. Cochinch. 153 (1790).

VITIS:—

- CAUSONIS**, Rafin. Med. Fl. ii. 122 (1830).
CAYRATIA, Juss. ex Guill. in Dict. Class. Hist. Nat. iv. 346 (1823).
CISSUS, Linn. Diss. Dass. 6 (1747); Amoen. Acad. i. 389 (1749).
COLUMELLA, Lour. Fl. Cochinch. 85 (1790).
GONOLOMA, Rafin. Sylva Tellur. 86 (1838).
INGENHOUSIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 33 (1818).
IRSIOLA, P. Br. Hist. Jamaic. 147. t. 4. f. 2 (1756).
ITUTERION, Rafin. Sylva Tellur. 86 (1838).
KEMOXIS, Rafin. l. c. (1838).
NEKEMIAS, Rafin. l. c. 87 (1838).
PEDASTIS, Rafin. l. c. (1838).
QUINARIA, Rafin. Med. Fl. ii. 122 (1830).
RINXOSTYLIS, Rafin. Sylva Tellur. 87 (1838).
SAELANTHUS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 33 (1775).
SPINOVITIS, Romanet, in Compt. Rend. Par. xcii. (1881) 1096.
SPONDYLANTHA, Presl, Rel. Haenk. ii. 35. t. 53 (1834).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 112.—Abyss.
acapulcensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 230.—Mexic.
acerifolia, Rafin. Med. Fl. ii. 130 = *riparia*, *rotundifolia*.
acetosa, F. Muell. Pl. Vict. i. 94, in textu.—Austral.
acida, Chapm. Fl. S. U. St. 70.—Am. bor.
acida, Thunb. Fl. Javan. 11 (Quid ?).—Java.
aconitifolia, Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 77 = *serjanafolia*.
acris, F. Muell. Fragm. ii. 75.—Austral.
aculeata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 88.—Ins. Timor.
acuminata, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 37 = *caribaea*.
acuminata, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 255.—Ins. Fiji.
adenantha, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 403.—Afr. trop.
adenocaulis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79.—Abyss.
adnata, Wall. Cat. n. 5998.—As. et Austral. trop.
adstricta, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 258 = *vinifera*.
aegirophylla, Boiss. Fl. Orient. i. 956.—Turkestan.
aestivalis, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 230.—Am. bor.
aestivalis, Torr. in Pacif. Rail. Rep. vii. 9 = *arizonica*.
africana, Spreng. Syst. i. 778.—Afr. trop.
Azelii, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 389.—Afr. trop.
albida, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 212.—Bras.
alexandrina, Fisch. Hort. Gorenk. cd. II. (1812) 53 = *vinifera* ?
amara, Rafin. Med. Fl. ii. 132 = *cordifolia*.
amboinensis, Aliq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 76.—Ins. Amboin.
amplexa, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 403.—Afr. trop.
amurensis, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 266 = *vinifera*.
anamalayana, Bedd. in Trans. Linn. Soc. xxv. (1865) 213.—Ind. or.
andongensis, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 406.—Afr. trop.
anemonifolia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 80.—Ins. Timor.
angolensis, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 410.—Afr. trop.
angulata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 176, in nota = *repanda*.
angulata, Rafin. Med. Fl. ii. 133 = *rotundifolia*.
angustifolia, Benth. Fl. Hongk. 54 = *corniculata*.
angustifolia, Wall. Cat. n. 6033.—Reg. Himal.; Malaya; China.
angustissima, F. Muell. Fragm. i. 141.—Austral.
antarctica, Benth. Fl. Austral. i. 447; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 83.—Austral.
apiana, Rafin. Med. Fl. ii. 140 = *vinifera*.
apiifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 777 = *vinifera*.
apyrena, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. v. 300 = *vinifera*.
aquosa, Wall. Cat. n. 6000 = *repanda*.
arachnoidea, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 37 = *caribaea*.
aralioides, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 411.—Afr. trop.

VITIS:—

araneosa, *Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 41.—Ind. or.
 araneosa, *Le Conte, in Proc. Acad. Philad.* 1852-53 (1854) 272.—Am. bor.
 araneosa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 94.—Sumatra.
 arborea, *Linn. Sp. Pl.* 203.—Oriens; Am. bor.
 arcuata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 414.—Afr. trop.
 arguta, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 392.—Afr. trop.
 arizonensis, [Parry,] in Rep. Commiss. Agric. 1870 (1871) 416=seq.
 arizonica, *Engelm. in Am. Natural.* ii. (1869) 321; ix. (1875) 268.—Am. bor.
 articulata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 76.—Borneo.
 asarifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 396.—Afr. trop.
 asperifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 207.—Bras.
 assamica, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 648.—Assam.
 assimilis, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) ii. 302=lanceolaria.
 atroviridis, *Wall. Cat. n.* 6040=Gynostemma pedatum.
 augustissima, *F. Muell. Census*, 24, err. typ.=angustissima.
 auriculata, *Wall. Cat. n.* 6031.—Reg. Himal.; Burma; Java.
 Bainesii, *Hook. Bot. Mag.* t. 5472.—Afr. trop.
 barbata, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 478.—Reg. Himal.; Burma.
 Barteri, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 390.—Afr. trop.
 Baudiniana, *F. Muell. Fragm.* iv. 136=antarctica.
 Berlanderi, *Planch. in Compt. Rend. Par.* xci. (1880) 425.—Texas; N. Mexic.
 bicolor, *Rafin. Med. Fl.* ii. 140; *Le Conte, in Proc. Acad. Philad.* 1852-53 (1854) 272=aestivalis.
 bifida, *Rafin. l. c.* 128=aestivalis?
 bipinnata, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 243=arborea.
 biternata, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 51.—Madag.
 blanda, *Rafin. Med. Fl.* ii. 128=V. Labrusca.
 blanda, *Sweet, Hort. Brit.* ed. i. 73.—Am. bor.
 Blumeana, *F. Muell. Sel. Pl. Indust. Cult.* 255=pallida.
 bombycina, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 399.—Afr. trop.
 borensis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 411.—Afr. trop.
 brachypoda, *F. Muell. Fragm.* ix. 125.—Austral.
 bracteata, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. i. Art. iv. 28=discolor?
 bracteata, *Rafin. Med. Fl.* ii. 125; *Le Conte, in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1852-53 (1854) 271=V. Labrusca?
 bracteolata, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 483.—Reg. Himal.
 bryoniaefolia, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1835) 85=vinifera.
 Burchellii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 201.—Bras.
 caesia, *Sabine, in Trans. Hort. Soc.* v. (1824) 447.—Afr. trop.
 californica, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 10 (sphalm. Vitex).—Calif.
 californica, [Parry] in Rep. Commiss. Agric. 1870 (1871) 415=arizonica.
 callosa, *Rafin. Med. Fl.* ii. 125=rotundifolia.
 campestris, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 200.—Bras.
 campestris, [Nutt.] in *Fras. Cat.* (1813) n. 88=riparia?
 campylocarpa, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) ii. 302.—Assam; Burma.
 cana, *Rafin. Med. Fl.* ii. 140=V. Labrusca?
 canariensis, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 123.—Ind. or.
 candicans, *Engelm. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 166.—Am. bor.
 canina, *Rafin. Med. Fl.* ii. 127=V. Labrusca.
 cantoniensis, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 370.—Malacca; China.
 capensis, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 7; *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 44.—Afr. austr.
 capreolata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 188.—Reg. Himal.
 cardiophylla, *F. Muell. Fragm.* ii. 73=repens.

VITIS:—

caribaea, *DC. Prod.* i. 634.—Am. bor.; Ind. occ.
 caribaea, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 327=californica.
 carnososa, *Wall. Cat. n.* 6018=trifolia.
 Catawba, *Hort. ex C. Koch, Dendrol.* i. 551=V. Labrusca.
 cavicaulis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 400.—Afr. trop.
 cebennensis, *Jord. ex Nym. Consp.* 136=vinifera.
 cerasiformis, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 251.—Java.
 cerifera, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 168, sphalm.=praec.
 Chantini, *Lécard, ex Carr. in Rev. Hort.* (1881) 457.—Afr. trop.
 chloroleuca, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 406.—Afr. trop.
 chontalensis, *Seem. in Journ. Bot.* vii. (1869) 332.—Nicaragua.
 ciliata, *Rafin. Med. Fl.* ii. 129=V. Labrusca?
 cinerea, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. i. Art. iv. 28 (cineracea)=flexuosa.
 cinnamomea, *Wall. Cat. n.* 5989 C=tomentosa.
 cinnamomea, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 483.—Malaya.
 cirrhosa, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 44.—Afr. austr.
 clematidea, *F. Muell. Fragm.* ii. 74.—Austral.
 coccinea, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 216.—Bras.
 coffeaecarpa, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 168, nomen.—Java.
 Coignetiae, *Pulliat, ex Planch. in Journ. Vigne Amer.* (1883) 186.—Japon.
 columbina, *Rafin. Med. Fl.* ii. 131=riparia.
 Commersoni, *Baker, Fl. Maurit.* 54.—Ins. Maurit.
 compositifolia, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 659.—Penang; Malacca.
 concinna, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 413.—Afr. trop.
 concolor, *Rafin. Med. Fl.* ii. 130=riparia.
 congesta, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 412.—Afr. trop.
 constricta, *Baker, l. c.* 409.—Afr. trop.
 coralloides, *Hook. f. ex M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 659=elegans.
 cordata, *Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II.* iv. 619=indivisa.
 cordata, *Wall. Cat. n.* 6001; *Voigt, Hort. Suburb.* Calc. 28=repens.
 cordifolia, *Darlingt. Fl. Cestr.* 151=riparia?
 cordifolia, *Lam. Illustr.* ii. 134.—Am. bor.
 cordifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 231=praec.?
 cordifolia, *Roth, ex Roem. & Schult. Syst.* v. 318=lanata.
 coriacea, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 78.—Ins. Celebes.
 coriacea, *Shuttl. ex C. Koch, Dendrol.* i. 550=can-dicans.
 corinthiaca, *Rafin. Med. Fl.* ii. 141=vinifera.
 corniculata, *Benth. Fl. Hongk.* 54.—Ins. Hongkong.
 cornifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 390.—Afr. trop.
 corylifolia, *Baker, l. c.* 396.—Afr. trop.
 costata, *Wall. Cat. n.* 6011=discolor?
 crassifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 391.—Afr. trop.
 crassiuscula, *Baker, l. c.* 406.—Afr. trop.
 crenata, *Thunb. ex Sw. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1825) 428.—Ind. occ.
 crenata, *Wall. Cat. n.* 6021=trifolia.
 Cumingiana, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 416.—Ins. Philipp.
 Curreri, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 401.—Afr. trop.
 curvipoda, *Baker, l. c.* 413.—Afr. trop.
 cuspidata, *Lynch, in Proc. Linn. Soc.* (1875-80) 38=inconstans.
 cuspidifera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 91, in adnot.—Reg. Himal.
 cylindrica, *Rafin. Med. Fl.* ii. 141=vinifera.
 cymosa, *Blume, Bijdr.* 195.—Java.
 cymosa, *Wall. Cat. n.* 6017=japonica.
 cyphopetala, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 407.—Afr. trop.
 dapsilis, [Roxas Clem. in] *Herrera, Agric.* (1818) i. 327=orientalis.
 debilis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 403.—Afr. trop.

VITIS:—

dentata, *Link. Enum. Hort. Berol.* i. 236.—Hab.?
 denticulata, *Rafin. Ann. Nat.* 11 (Quid?).—Am. bor.
 dichotoma, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 77.—Java.
 Diepenhorstii, *Miq. l. c.* 77, in textu.—Sumatra.
 diffusa, *Miq. l. c.* 83.—Malaya.
 diffusiflora, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 390.—Afr. trop.
 digitata, *Rafin. Med. Fl.* ii. 125=V. Labrusca?
 dimidiata, *Rafin. l. c.* 129=riparia.
 discolor, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 39.—Ind. or.; Malaya.
 dissecta, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 414.—Afr. trop.
 divaricata, *Wall. Cat. n.* 5994=lanata, indica.
 diversifolia, *Wall. Cat. n.* 5996=discolor.
 Duarteana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 204.—Bras.
 dubia, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 661.—Reg. Himal.
 Durandii, *Lécard, ex Carr. in Rev. Hort.* (1881) 456=rufescens.
 elegans, *C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) App. 16=heterophylla.
 elegans, *Kurz, in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxviii. (1865) 166.—Singapore.
 elliptica, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 203.—Mexic.
 elongata, *Wall. Cat. n.* 6016.—Ind. or.
 enneaphylla, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 217.—Bras.
 erioclada, *Wight & Arn. Prod.* 130.—Ind. or.
 eriopoda, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 95.—Sumatra.
 erosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 210.—Am. trop.
 erythroclada, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) ii. 301.—Burma.
 erythrodes, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 284.—Abyss.
 Faidherbii, *Lécard, ex Carr. in Rev. Hort.* (1881) 457.—Afr. trop.
 farinosa, *Rafin. Med. Fl.* ii. 140=vinifera.
 farinosa, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 394.—Afr. trop.
 ferruginea, *Rafin. Med. Fl.* ii. 128=V. Labrusca.
 ficifolia, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1835) 86=V. Labrusca.
 Figariana, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 415.—Afr. trop.
 filiformis, *Lam. Illustr.* ii. 135=pentaphylla.
 flavicans, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 413.—Afr. trop.
 flexuosa, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1882) ii. 491=V. Labrusca.
 flexuosa, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 332.—Ind. or.; China; Japon.
 floribunda, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 50.—Madag.
 floridana, *Rafin. Med. Fl.* ii. 133=vulpina?
 fluminicola, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 777=repanda.
 Forsteniana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 86.—Ins. Amboin.
 fulva, *Rafin. Med. Fl.* ii. 124=aestivalis?
 furcata, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 646.—Malaya.
 Gardneri, *M. Laws. l. c.* 656.—Zeylan.
 geniculata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 81.—Java.
 Gibertii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 211.—Uruguay.
 gigantea, *Bedd. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1865) 212.—Ind. or.
 glaberrima, *Wall. Cat. n.* 5991, partim=hastata.
 glaberrima, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 476.—Malaya.
 glabrata, *Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp.* 156=latifolia.
 glandulosa, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 479.—Reg. Himal.
 glauca, *Rafin. Med. Fl.* ii. 126=aestivalis.
 glauca, *Wall. Cat. n.* 5990=repens.
 glauca, *Wight & Arn. Prod.* 126.—Ind. or.
 glaucophylla, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 392.—Afr. trop.
 glomerata, *Rafin. Med. Fl.* ii. 142=caribaea.
 glyptocarpa, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 645.—Zeylan.

VITIS:—

- gongyloides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 209.—Bras.; Peruv.
 gorgonobotrys, *Webb, in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 313.—Afr. trop.
 gracilis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 404.—Afr. trop.
 gracilis, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 477.—Singapore.
 Grantii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 400.—Afr. trop.
 granulosa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 80.—Peruv.
 grisea, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 395.—Afr. trop.
 Hancockii, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 4.—China.
 Hardyi, *Lécard, ex Carr. in Rev. Hortic.* (1881) 458.—Afr. trop.
 hastata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 85, in adnot.—Ind. or.; Java.
 havanica, *Ehrh. Beitr.* vi. (1791) 85.—Am. bor.
 hederacea, *Wall. Cat. n. 6019* = obtecta, capreolata.
 Helferii, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 662.—Burma.
 helvola, [*Roxas Clem. in*] *Herrera, Agric.* (1818) i. 327 = orientalis.
 heptaphylla, *Linn. Mant.* ii. 212.—Ind. or.
 heracleifolia, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 398.—Afr. trop.
 heterophylla, *Thunb. Fl. Jap.* 103.—China; Japon.
 heterophylla, *Wall. Cat. n. 6036* = Rheedei.
 Heyneana, *Roem. & Schult. Syst.* v. 318; *DC. Prod.* i. 634 = lanata.
 Heyneana, *Wall. Cat. n. 5988*.—Ind. or.
 hiemalis, *Auct. = hyemalis*.
 himalayana, *Brandis, For. Fl.* 100.—Ind. or.
 hispida, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 56.—Afr. austr.
 Hochstetteri, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 83.—Abyss.
 Hookeri, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 661.—Reg. Himal.
 humulifolia, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1882) ii. 491 = heterophylla.
 hyemalis, *Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iv.* 619 = cordifolia?
 hyemalis, *Rafin. Med. Fl. ii.* 125 = rotundifolia.
 hypoglauc, *F. Muell. Pl. Vict.* i. 94.—Austral.
 ibuens, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 402.—Afr. trop.
 imperialis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 518.—Sumatra.
 inaequalis, *Wall. Cat. n. 6010* = discolor.
 incarnata, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 168, nomen.—Sumatra.
 incisa, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 14 = riparia.
 incisa, *Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 243.—Texas.
 inconstans, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 91.—Japon.
 indica, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 260 = lanata.
 indica, *Linn. Sp. Pl.* 202.—Ind. or.
 indica, *Sw. Obs. Bot.* 95 (excl. syn.) = caribaea.
 indica, *Thunb. Fl. Jap.* 103 = flexuosa.
 indica, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 63 = erioclada.
 indivisa, *Willd. Berl. Baumz.* ii. 538.—Am. bor.
 integrifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 391.—Afr. trop.
 integrifolia, *Rafin. Fl. Ludov.* 89 (Quid?).—Am. bor.
 intermedia, *Muhl. Cat.* 26 = aestivalis.
 intricata, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 404.—Afr. trop.
 inundata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 205.—Bras.
 ipomoeifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 395.—Afr. trop.
 irawadyana, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 778 = japonica.
 Isabella, *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 353 = vinifera?
 japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 104.—China; Japon.; Malaya.
 jatrophioides, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 400.—Afr. trop.
 javalensis, *Seem. in Journ. Bot.* vii. (1869) 332.—Nicaragua.
 javanica, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 90.—Java.

VITIS:—

- juncea, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 401.—Afr. trop.
 Kanguruh, *Hort. ex DC. Prod.* i. 629 = antarctica.
 Kleinii, *Wall. Cat. n. 6008* = glauca, latifolia.
 Labrusca, *Linn. Sp. Pl.* 203.—Am. bor.
 Labrusca, *Linn. l. c.*, partim = caribaea.
 Labrusca, *Lour. Fl. Cochinch.* 155 = triloba?
 Labrusca, *Scop. Fl. Carn. ed. II. i.* 169 = vinifera.
 Labrusca, *Thunb. Fl. Jap.* 103 = Coignetiae.
 Labrusca, *Walt. Fl. Carol.* 242 = aestivalis.
 labruscoides, *Muhl. Cat.* 26 = aestivalis.
 labruscoides, *Muhl. & Rafin. in Rafin. Med. Fl. ii.* 127 = V. Labrusca.
 laciniata, *Linn. Sp. Pl.* 203 = vinifera.
 laciniata, *Marsh. Arbust. Am.* 165 = aestivalis.
 laeta, *Wall. Cat. n. 6002* = repanda.
 laevigata, *F. Muell. Sel. Pl. Indust. Cult.* 255 = auriculata.
 lanata, *Roxb. ex Wall. Cat. n. 5995 C, D* = barbata.
 lanata, *Roxb. Hort. Beng.* 18; *Fl. Ind.* i. 660.—Ind. or.; China.
 lanata, *Wall. Cat. n. 5995 A* ? = tomentosa.
 lanceolaria, *Wall. Cat. n. 6013*, partim.—Ind. or.; Malaya.
 lanceolaria, *Wall. l. c. H* = rumicisperma.
 lanceolaria, *Wight, Ic. t.* 28 = sulcata.
 Landuk, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 90.—Java.
 latifolia, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5994 G* = barbata.
 latifolia, *Lam. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 778 = glauca.
 latifolia, *Rafin. Med. Fl. ii.* 126 = V. Labrusca.
 latifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 18; *Fl. Ind.* i. 661.—Ind. or.
 latifolia, *Vahl, ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 778 = adnata.
 Lecardii, *Carr. in Rev. Hortic.* (1881) 456.—Afr. trop.
 lecooides, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xix. (1874) 158 = cantoniensis.
 lenticellata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 122.—Madag.
 leonensis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 398.—Afr. trop.
 leucostaphyla, *Dennst. Schluess. Hort. Malab.* 33 = lanceolaria.
 leucostyla, *Stend. Nom. ed. II. ii.* 778, sphalm. = praec.
 Linnaei, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1875) ii. 176 = repanda.
 Linnaei, *Wall. Cat. n. 5987*.—Ind. or.
 Linsecomii, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1861 (1862) 451 = aestivalis.
 lonchiphyla, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 646.—Zeylan.
 longepedunculata, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 168.—Ins. Ceram.
 longifolia, *Rafin. Med. Fl. ii.* 129 = cordifolia?
 Lowii, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 165.—Borneo.
 lucida, *Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 778 = antarctica.
 luteola, *Rafin. Med. Fl. ii.* 127 = V. Labrusca.
 macrophylla, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 145 = himalayana.
 macropus, *Hook. Bot. Mag. t.* 5479.—Afr. trop.
 macrostachya, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 94.—Malaya.
 Mannii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 412.—Afr. trop.
 Mappia, *Baker, Fl. Maurit.* 54.—Ins. Maurit.
 maritima, *Rafin. Med. Fl. ii.* 142 = caribaea.
 maura, *Rafin. l. c.* 141 (Quid?).—Marocc.
 Metziana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 84.—Sumatra.
 mexicana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 203.—Mexic.
 microdiptera, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 266.—Madag.
 microdonta, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 50.—Madag.
 Miqueliana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 210.—Am. trop.
 modesta, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 84.—Sumatra.
 mollis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 413 = serpens.
 mollis, *Wall. Cat. n. 6025*.—Reg. Himal.; Malaya.
 mollissima, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 482.—Malaya.
 monosperma, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 28 = adnata.

VITIS:—

- montana, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 652.—Reg. Himal.
 montana, *Rafin. Med. Fl. ii.* 130 = riparia.
 monticola, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1861 (1862) 450 = aestivalis.
 mossambicensis, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 180.—Afr. trop.
 Motleyi, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 165.—Borneo.
 mucronata, *Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 778 = lanceolaria.
 multiloba, *Rafin. Med. Fl. ii.* 125 = aestivalis.
 multistriata, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 410.—Afr. trop.
 muricata, *Wall. Cat. n. 6015* = lanceolaria.
 muscadina, *Rafin. Med. Fl. ii.* 132 = rotundifolia.
 mustangensis, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1861 (1862) 451 = candicans.
 mutabilis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 75.—Java.
 neilgherrensis, *Wight, Ic. t.* 965 = himalayana.
 nepalensis, *Koyle, Illustr. Bot. Himal.* 149 = capreolata.
 nervosa, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 650.—Reg. Himal.
 neurosa, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1875) ii. 204 = planicaulis.
 nitens, *F. Muell. Fragm.* ii. 73.—Austral.
 nitida, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 662.—Malaya.
 nodosa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 87.—Malaya.
 novemfolia, *Wall. Cat. n. 6030*.—Singapore.
 nymphaefolia, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 393.—Afr. trop.
 obliqua, *Rafin. Med. Fl. ii.* 128 = V. Labrusca?
 oblonga, *Benth. Fl. Austral.* i. 447.—Austral.
 obovata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 207, in obs.—Guatemala.
 obovata, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 658.—Reg. Himal.
 obovata, *Rafin. Med. Fl. ii.* 135 = V. Labrusca.
 obtecta, *Wall. Cat. n. 6026*.—Reg. Himal.; Burma; China.
 obtusata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 414.—Afr. trop.
 obtusifolia, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n.* 6004 = tomentosa.
 occidentalis, *Bartram, ex Le Conte, in Rep. Commiss. Patents (Agric.)*, 1857 (1858) 229 = V. Labrusca.
 ochracea, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 388.—Ins. Celebes.
 odoratissima, *Doan, Cat. Hort. Cantab. ed. IX.* 71 = riparia.
 opaca, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* i. 450.—Austral.
 oppositifolia, *Buch.-Ham. ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 778 = tomentosa.
 orientalis, *Boiss. Fl. Orient.* i. 956 = arborea.
 orientalis, [*Roxas Clem. in*] *Herrera, Agric.* (1818) i. 327.—Hispan. (cult.).
 oxydonta, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 50.—Madag.
 oxyphylla, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 114.—Abyss.
 oxyphylla, *Wall. Cat. n. 6035* = bracteolata.
 Pagnuccii, *Romanet, in Congr. Géog. Toul.* (1884); *et in Journ. Vigne Amér.* (1885) 283, nomen.—China.
 pallida, *Wight & Arn. Prod.* 125.—As. et Afr. trop.
 palmata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 216.—Bras.
 palmata, *Le Conte, in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1852-53 (1854) 274 = V. Labrusca.
 palmata, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 42 = aestivalis.
 palmatifida, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 397.—Afr. trop.
 paniculata, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 507.—Ins. Socotra.
 paniculata, *Heyne, ex Wall. Cat. n. 6022* = japonica, repanda.
 pannosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 206.—Bras.
 pannosa, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 402.—Afr. trop.
 papillata, *Hance, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 226.—China.
 papuana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 74.—N. Guin.
 Parkeri, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. ii. 209.—Guian.

VITIS:—

parviflora, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 392, sphalm. = seq.
parvifolia, Roxb. Hort. Beng. 18; Fl. Ind. i. 662 = flexuosa.
patens, Colmeiro, Enum. Pl. Hisp.-Lusit. i. 545, sphalm. = seq.
patiens, [Roxas Clem. in] Herrera, Agric. (1818) i. 327 = orientalis.
paucidentata, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 410. —Afr. trop.
pedata, Vahl, ex Wall. Cat. n. 6027. —As. trop.
pedicellata, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 650. —Reg. Himal.
peduncularis, Wall. Cat. n. 6024. —Malaya.
peltata, Rafin. Med. Fl. ii. 133 = rotundifolia, riparia?
pendula, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 407. —Afr. trop.
penninervis, F. Muell. Fragm. vi. 177. —Austral.
pentagona, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5994 F = lanata.
pentagona, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 28. —Burma.
pentaphylla, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 135 = multistriata.
pentaphylla, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 91 = serjanaefolia.
pentaphylla, Thunb. Fl. Jap. 105. —Japon.
pergamacea, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 73. —Ins. Celebes.
persica, Boiss. Fl. Orient. i. 955. —Persia; Afghan.
Piasezkii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 461. —China.
pinnata, Vahl, Symb. Bot. iii. 43. —Hab.?
pisicarpa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79. —N. Guin.
planicaulis, Hook. f. Bot. Mag. t. 5685. —Reg. Himal.
platanifolia, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 398. —Afr. trop.
Pohlil, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 205. —Bras.
Poiretiana, Rafin. Med. Fl. ii. 134 = rotundifolia, riparia?
polita, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 95 = Pterisanthes polita.
polydactyla, Miq. l. c. 80. —Sumatra.
polystachya, Wall. Cat. n. 6028, partim. —Burma; Malaya.
polystachya, Wall. l. c., partim, et n. 9031 = nitida.
polythysa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 89. —Sumatra.
populifolia, Lindh. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 165 = rupestris.
populifolia, Rafin. Med. Fl. ii. 131 = riparia.
populnea, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 83. —Afr. trop.
producta, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 389. —Afr. trop.
prolifera, Rafin. Med. Fl. ii. 134 = V. Labrusca.
pruriens, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 408. —Afr. trop.
psoralifolia, F. Muell. Fragm. ii. 75 = trifolia.
pterisantha, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 94 = Pterisanthes cissoides.
pterophora, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 213. —Bras.
pubescens, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 90. —Mexic.
pubiflora, Miq. l. c. 74. —Sumatra.
pulcherrima, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 217. —Bras.
pullaria, Le Conte, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1852-53 (1854), 273. —Am. bor.
punctata, Rafin. Med. Fl. ii. 140 (Quid?). —Hab.?
Purani, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 188 = flexuosa.
quadrangularis, Wall. Cat. n. 5992. —As. et Afr. trop.
quadricomuta, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 85. —Java.
quinquefolia, Lam. Illustr. ii. 135 = hederacea.
quinquefolia, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = japonica.
racemifera, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 94. —Sumatra.
radiata, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 184, nomen = adnata.
Raffesia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 76. —Sumatra.
repanda, Wight & Arn. Prod. 125. —Ind. or.
repens, Wall. Cat. n. 5999 B = adnata.
repens, Wight & Arn. Prod. 125. —Ind. or.; Austral.

VOL. II.

VITIS:—

reticulata, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 655. —Zeylan.
Rheedei, Wight & Arn. Prod. 127. —Ind. or.
rhombifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 207. —Am. trop.
riparia, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 30 = arizonica.
riparia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 231. —Am. bor.
riparia, Wall. Cat. n. 6038 = repanda.
Romaneti, Romanet, in Compt. Rend. Par. (1881) 1096. —China.
rosea, Royle, Illustr. Bot. Himal. 149 = repanda.
rostrata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 85. —Borneo.
rotundifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 231. —Am. bor.; Mexic.
Roxburghii, Wight & Arn. Prod. 127. —Ind. or.
Royleana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 556 = capreolata.
rubifolia, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 480. —Reg. Himal.
rubiginosa, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 394. —Afr. trop.
rubra, Desf. Tabl. ed. I. 140 = riparia.
rufa, Rafin. Med. Fl. ii. 140 = V. Labrusca?
rufescens, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 83. —Afr. trop.
rufula, Miq. l. c. 94. —Sumatra.
rugosa, Hook. f. & Thoms. ex M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 650 = nervosa.
rugosa, Rafin. Med. Fl. ii. 127 = V. Labrusca.
rugosa, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 480 = lanata, indica.
rumicisperma, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 661. —Reg. Himal.
rupestris, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 591. —Texas.
saccharina, Rafin. Med. Fl. ii. 140 = vinifera?
sagittifolia, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 645 = hastata.
salmonea, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 394. —Afr. trop.
salutaris, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 211. —Am. trop.
saponaria, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 254. —Austral.; Ins. Pacif.
sarcocephala, Schweinf. ex Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1253. —Afr. trop.
saxatilis, Rafin. Med. Fl. ii. 124 = aestivalis.
scabra, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 202. —Bras.
scabricaulis, Baker, l. c. 213. —Bras.
scabriuscula, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 778 (Quid?). —Ind. or.
Schimperiana, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 112. —Abyss.
Selloana, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 204. —Bras.
semicordata, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 481 = himalayana.
semiglaba, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 24. —Afr. austr.
serjanaefolia, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 159. —Japon.
serotina, Rafin. Med. Fl. ii. 126 = aestivalis?
serpens, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 412. —Afr. trop.
serratifolia, Wight & Arn. Prod. 128 = lanceolaria.
serrulata, Wall. Cat. n. 6034 = capreolata.
sessilifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 205. —Bras.
setosa, Wall. Cat. n. 6009. —Ind. or.
sicyoides, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 83. —Am. trop.
Sieboldii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 549 = V. Labrusca.
sikkimensis, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 650. —Reg. Himal.
silvestris, Roth, Enum. Pl. Phan. Germ. i. 746 = vinifera.
Simsiana, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 214. —Bras.
sinica, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 125 = heterophylla.
sinuata, G. Don, Gen. Syst. i. 711 = aestivalis.
sinuosa, Bosc, ex [Roxas Clem. in] Herrera, Agric. (1818) i. 326 = vinifera?

VITIS:—

Smithiana, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 390. —Afr. trop.
spectabilis, Kurz, in Journ. Bot. xii. (1874) 196. —Reg. Himal.
spinosa, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 204. —Bras.
stenoloba, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 408. —Afr. trop.
stercoracea, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = indica.
sterculifolia, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 450. —Austral.
stipulacea, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 408. —Afr. trop.
striata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79. —Chili.
subaphylla, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 506. —Ins. Socotra.
subciliata, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 409. —Afr. trop.
suberecta, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 206. —Bras.
suberosa, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 392. —Afr. trop.
subrhomboidea, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 208. —Bras.
succinea, Rafin. Med. Fl. ii. 140 = vinifera?
succisa, Hance, ex Walp. Ann. ii. 231 = flexuosa.
sulcata, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 661. —Ind. or.
sulcicaulis, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 208. —Bras.
sylvestris, Bartram, ex Le Conte, in Rep. Commiss. Patents (Agric.), 1857 (1858), 229 = V. Labrusca.
sylvestris, Blume, Bijdr. 194 = flexuosa.
sylvestris, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 543 = vinifera.
taurina, Walt. Fl. Carol. 242 = V. Labrusca.
tenuicaulis, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 404. —Afr. trop.
tenuifolia, Le Conte, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1852-53 (1854) 271 = V. Labrusca.
tenuifolia, Wight & Arn. Prod. 129 = japonica.
ternata, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 216. —Bras.
ternata, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. v. 319 = tomentosa.
tetragnia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 78. —Ins. Celebes.
Teysmanni, Miq. l. c. 82. —Java.
Thomsoni, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 657. —Reg. Himal.
Thonningii, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 407. —Afr. trop.
Thunbergii, Regel, Gartenfl. (1864) 34. t. 424 = vinifera.
Thunbergii, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 198 = V. Labrusca.
thyrsiflora, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 88. —Sumatra.
tiliacea, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 204. —Mexic.
tiliaefolia, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 320 = caribaea.
tomentosa, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 157. —Ind. or.
trichophora, Wall. Cat. n. 6039 = Gynostemma pedatum.
tricuspidata, Lynch, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1879) 308 = inconstans.
tricuspis, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 209. —Bras.
trifida, Roth, Nov. Pl. Sp. 157 = tomentosa.
trifolia, Linn. Sp. Pl. 203. —As. et Austral. trop.
trifoliata, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 212. —Am. trop.
trifoliata, Thunb. Fl. Javan. 11 (Quid?). —Java.
triloba, Roth, Nov. Pl. Sp. 157 = tomentosa.
triphylla, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = Vitex trifolia.
triternata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 123. —Madag.
truncata, Blume, Bijdr. 195 = flexuosa.
truncata, Wall. Cat. n. 6032 = tenuifolia.
tuberculata, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 656. —Burma; Java.
tuberculata, Wall. Cat. n. 6014 = rumicisperma.
tuberosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 204. —Mexic.
turbinata, Rafin. Med. Fl. ii. 140 = vinifera?
Tweediana, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 214. —Reg. Argent.

7 Q

VITIS:—

- ulmifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 213.—Peruv.
 ursina, *Rafin. Med. Fl.* ii. 124 = aestivalis.
 uvifera, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 391.—Afr. trop.
 Veitchii, *Lynch, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 308 = inconstans.
 verrucaria, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = nodosa.
 verrucosa, *Rafin. Med. Fl.* ii. 133 = rotundifolia.
 Vicaryana, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1875) II. 204.—Reg. Himal.
 vinifera, *Linn. Sp. Pl.* 202.—Oriens.; Ind. bor. occ.
 vinifera, *Marsh. Arbust. Am.* 166 = aestivalis.
 virginiana, *Hort. ex Poir. Encyc.* viii. 608 = riparia.
 virginiana, *Poir. l. c.* 808 = aestivalis.
 vitensis, *Seem. Mission Viti*, 434; *Fl. Vit.* 44.—Ins. Fiji.
 Vogelii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 409.—Afr. trop.
 vulpina, *Bartram, ex Le Conte, in Rep. Commiss. Patents (Agric.)*. 1857 (1858) 229 = V. Labrusca.
 vulpina, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 13. t. 425 = aestivalis.
 vulpina, *Linn. Sp. Pl.* 203 = riparia, rotundifolia.
 vulpina, *Muhl. Cat.* 26 = cordifolia.
 Wallichii, *DC. Prod.* i. 634 = flexuosa.
 Wallichii, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 302 = pallida.
 Warmingii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 201.—Bras.
 Welwitschii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 363.—Afr. trop.
 Wightiana, *Wall. Cat. n.* 6003 = repanda.
 zeylanica, *Russ. ex Wall. Cat. sub n.* 5993 D = latifolia.

- VITIS-IDAEA, *Tourn. ex Moench, Meth.* 47 (1794) = *Vaccinium*, *Linn. (Vaccin.)*.
 alba, *Moench, l. c.* = *Lonicera ciliata*.
 Kablikiana, *Opiz, Seznam*, 104 = *Vacc. intermedium*.
 Myrtillus, *Moench, Meth.* 47 = *Vacc. Myrtillus*.
 punctata, *Moench, l. c.* = *Vacc. Vitis-Idaea*.
 punctifolia, *S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 406 = *Vacc. Vitis-Idaea*.

- VITMANIA, *Turra, ex Cav. Ic.* iii. 53, in obs. (1794) = *Oxybaphus*, *Vahl (Nyctag.)*.
 viscosa, *Turra, ex Steud. Nom. ed. I.* 140, in syn.; 889 = *O. viscosus*.

- VITMANNIA, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 51. t. 60 (1794) = *Samadera*, *Gaertn. (Simarub.)*.
 elliptica, *Vahl, l. c.* = *S. indica*.
 lucida, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 779 = *S. lucida*.
 polyandra, *Steud. l. c.* = *Brownlowia lanceolata*.

- VITMANNIA, *Wight & Arn. Prod.* 166 (1834) = *Noltea*, *Reichb. (Simarub.)*.
 africana, *Wight & Arn. l. c.* = *N. africana*.

- VITTADENIA, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 779 (1841), sphalm. = seq.

- VITTADINIA, *A. Rich. Ess. Fl. Nouv.-Zél.* 250 (1832). *COMPOSITAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 281.
 EURYBIOPSIS, *DC. Prod.* v. 260 (1836).
 MICROGYNE, *Less. Syn. Comp.* 190 (1832).
 arenaria, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 120.—Ins. Sandvic.
 australis, *A. Rich. Ess. Fl. Nouv.-Zél.* 251.—Austral.; N. Zél.
 brachycomoides, *F. Muell. Fragm.* v. 86.—Austral.
 Chamissonis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 119.—Ins. Sandvic.
 consanguinea, *A. Gray, l. c.* 120.—Ins. Sandvic.
 conyzoides, *A. Gray, l. c.* 120.—Ins. Sandvic.
 cuneata, *DC. Prod.* v. 281 = australis.
 dentata, *DC. l. c.* = australis?
 hispidula, *F. Muell. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 118 = scabra.
 humilis, *A. Gray, l. c.*—Ins. Sandvic.
 lobata, *Hort. ex Vilhm. Fl. Pl. Terre, ed. I.* 959 = australis?
 macrorrhiza, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 118.—Austral.
 multifida, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 171.—Reg. Argent.
 Remyi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 119.—Ins. Sandvic.

VITTADINIA:—

- scabra, *DC. Prod.* v. 281.—Austral.
 scabra, *Hook. f. Fl. Tasman.* i. 181 = australis.
 spatulata, *F. Muell. ex Sond. in Linnaea*, xxv. (1852) 457.—Austral.
 tenerrima, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 119.—Ins. Sandvic.
 trifurcata, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 178.—Reg. Argent.
 triloba, *DC. Prod.* v. 281 = australis.

- VITTMANNIA, *Turra, ex Endl. Gen.* 311 (1837) = *Oxybaphus*, *Vahl (Nyctag.)*.

- VIVIANIA, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* vii. (1804) 211. t. 49. *GERANIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 275.
 CAESAREA, *Cambess. in Mém. Mus. Par.* xviii. (1829) 373. t. 18.
 CISSAROBRYON, *Kunze, ex Poepp. Fragm. Syn. Pl.* Chile, 29 (1833).
 LINOSTIGMA, *Klotzsch, in Linnaea*, x. (1836) 438.
 MACRAEA, *Lindl. in Brand. Journ.* xxv. (1828) 104.
 XEROPETALON, *Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 174.
 aristulatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1872) 687.—Chili.
 australis, *Phil. l. c.* 683.—Chili.
 brevipedunculata, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864–65) 33.—Chili.
 calycina, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. 104 = *Wendtia calycina*.
 crenata, *G. Don, ex Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 149.—Chili.
 grandiflora, *G. Don, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 657, sphalm. = seq.
 grandifolia, *Hook. & Arn. Bot. Misc.* iii. (1833) 149.—Chili.
 marifolia, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* vii. (1804) 212.—Chili.
 ovata, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 677.—Chili.
 parviflora, *G. Don, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 657, sphalm. = seq.
 parvifolia, *Klotzsch, in Linnaea*, x. (1836) 435.—Chili.
 petiolata, *Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 149.—Chili.
 rosea, *Klotzsch, in Linnaea*, x. (1836) 435 = marifolia.
 spinescens, *Presl, Symb. Bot.* ii. 7.—Chili.
 tenuicaulis, *Barn. in C. Gay, Fl. Chil.* i. 402. t. 12.—Chili.

- VIVIANIA, *Colla, in Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 25 = *Biliottia*, *DC. (Rubi.)*.
 psychotrioides, *Colla, l. c.* = *B. psychotrioides*.

- VIVIANIA, *Rafin. Specch.* i. 117 (1814); ex *DC. Prod.* iv. 458 = *Guettarda*, *Linn. (Rubi.)*.
 domingensis, *Rafin. l. c.* = *G. coriacea*?

- VIVIANIA, *Willd. ex Less. in Linnaea*, iv. (1829) 318; *DC. Prod.* v. 95 (1836) = *Liabum*, *Adans. (Compos.)*.
 bicolor, *Willd. ex Less. l. c.* = *L. melastomoides*.

- VLAMINGIA, *De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss.* i. 398 (1845) = *Ionidium*, *Vent. (Violar.)*.
 australasica, *De Vriese, l. c.* 399 = *I. calycinum*.

- VLECKIA, *Rafin. in Med. Repos. N. York*, v. (1808) 352 = *Lophanthus*, *Benth. (Labi.)*.
 anisata, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 89 = *L. anisatus*.
 bracteata, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 94 = *L. anisatus*?
 chinensis, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 89.—*L. chinensis*.
 multiflora, *Rafin. l. c.* = *Nepeta lavandulacea*?
 nepetoides, *Rafin. in Med. Repos. N. York*, v. (1808) 352 = *L. nepetoides*.
 scrophularifolia, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 89 = *L. scrophulariaefolius*.
 urticaefolia, *Rafin. l. c.* = *L. urticifolius*.

- VOACANGA, *Thou. Gen. Nov. Madag.* 10 (1806).
 APOCYNACEAE, [*Benth. & Hook. f.* ii. 707].
 ANNULARIA, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) 670.
 CYCLOSTIGMA, *Hochst. ex Endl. Gen. Suppl.* ii. 56 (1842); et in *Flora*, xxvii. (1844) 828.
 DICRUS, *Reinw. in Blume, Cat. Hort. Buitenz.* 47 (1823).
 ORCHIPEDA, *Blume, Bijdr.* 1026 (1826).
 PIPTOLAENA, *Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. 25 (1842).
 POOTIA, *Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch.* vi. (1857) 192; *Fl. Ind. Bat.* ii. 417 ('1856').

VOACANGA:—

- Cumingiana, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 313.—Ins. Philipp.
 Dregei, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 189.—Afr. austr.
 foetida, *Rolfe, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 202.—Java.
 grandifolia, *Rolfe, l. c.*—Java.
 Thouarsii, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 439.—Madag.

- VOANDZEIA, *Thou. Gen. Nov. Madag.* 23 (1806).
 LEGUMINOSAE, *Benth. & Hook. f.* i. 539.
 CRYPTOLOBUS, *Spreng. Syst.* iii. 152 (1826).
 GEOLOBUS, *Rafin. New Fl. Am.* i. 81 (1836).
 subterranea, *Thou. Gen. Nov. Madag.* 23.—Afr. trop. et austr.

- VOCHISIA, *Juss. Gen.* 424 (1789). *VOCHYSIACEAE*, *Benth. & Hook. f.* i. 976.
 CUCULLARIA, *Schreb. Gen.* 6 (1789).
 SALMONIA, *Scop. Introd.* 209 (1777).
 STRUKERIA, *Vell. Fl. Flum.* i. t. 20 (1827).
 VOCHY, *Aubl. Pl. Gui.* i. 18 (1775), nomen prius.
 VOCHYA, *Vell. ex Vand. Fl. Lusit.* i. t. 1. f. 1 (1788); et in *Roem. Script.* 69. t. 6 (1796).
 VOCHYSIA, *Poir. Encyc.* viii. 681 (1808).
 acuminata, *Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat.* iii. II. (1839) 5 (sp. dub.).—Am. trop.
 alpestris, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 145. t. 87.—Bras.
 arcuata, *Garcke, in Linnaea*, xxii. (1849) 58.—Guian.
 bifalcata, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 84.—Bras.
 calophylla, *Spruce, ex Warm. l. c.* 98.—Bras.
 cayennensis, *Warm. l. c.* 80.—Guian.
 cinnamomea, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 29.—Bras.
 citrifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 491.—Bras.
 costata, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 100.—Guian.
 crassifolia, *Warm. l. c.* 77.—Guian.
 cuiabensis, *Liais, Brésil*, 601.—Bras.
 cuneata, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 26 = *thyrsoides*.
 curvata, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1099, nomen (Quid?).—Guian.
 dasyantha, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 95.—Bras.
 densiflora, *Spruce, ex Warm. l. c.* 101.—Bras.
 discolor, *Warm. l. c.* 81.—Bras.
 divergens, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 19.—Bras.
 elliptica, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 141. t. 84.—Bras.
 elongata, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 25.—Bras.
 emarginata, *Vahl, ex Poir. Encyc.* viii. 682.—Bras.
 excelsa, *A. Dietr. Sp. Pl.* i. 103 = *guianensis*.
 fastigiata, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 91.—Bras.
 ferruginea, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 151. t. 92.—Bras.
 ferruginea, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 31 = *pyramidalis*.
 floribunda, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 149. t. 91.—Bras.
 Fontanesii, *Zucc. ex Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 104 = *emarginata*.
 Gardneri, *Warm. l. c.* 70.—Bras.
 glaberrima, *Warm. l. c.* 78.—Guian.
 glabrescens, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1099, nomen (Quid?).—Guian.
 Glazioviana, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 86.—Bras.
 grandis, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 146. t. 88.—Bras.
 guianensis, *Aubl. Pl. Gui.* i. 18. t. 6 (*Vochy guianensis*).—Guian.
 gummifera, *Mart. ex Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 82.—Bras.
 Haenkeana, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 147. t. 89.—Am. trop.
 herbacea, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 27.—Bras.
 laurifolia, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 96.—Bras.
 lucida, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 12.—Am. trop.
 magnifica, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 85.—Bras.
 maliformis, *Klotzsch, ex Warm. l. c.* 24 = *Callisthene fasciculata*.
 micrantha, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 20.—Bras.
 oblongifolia, *Warm. in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 84.—Bras.
 obscura, *Warm. l. c.* 73.—Bras.

VOCHISIA :—

- opaca*, Pohl, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 91, in obs. = *tucanorum*.
oppugnata, Warm. l. c. 87.—Bras.
parviflora, Spruce, ex Warm. l. c. 75.—Bras.
petraea, Warm. l. c. 63.—Bras.
pruinosa, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 22.—Bras.
pumila, Pohl, l. c. 21.—Bras.
punctata, Spruce, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 102.—Bras.
pygmaea, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. iii. ii. (1839) 7. t. 4.—Am. trop.
pyramidalis, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 148. t. 90.—Bras.
quadrangulata, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867) 39; et in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 97.—Bras.
racemosa, Poir. Encyc. viii. 682.—Guian.
rectiflora, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 96.—Bras.
rotundifolia, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 140. t. 83.—Bras.
rufa, Mart. l. c. 144. t. 86.—Bras.
Schomburgkiana, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1013. nomen (Quid?).—Guian.
Schomburgkii, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 78.—Guian.
Selloi, Warm. l. c. 86.—Bras.
sericea, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 28 = *rufa*.
sessilifolia, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 67.—Bras.
speciosa, Warm. l. c. 79.—Guian.
splendens, Spruce, ex Warm. l. c. 101.—Bras.
Sprucei, Warm. l. c. 99.—Peruv.
tetraphylla, DC. Prod. iii. 27.—Guian.
thyrsoides, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 24.—Bras.
tomentosa, DC. Prod. iii. 26 = *ferruginea*.
tucanorum, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 142. t. 85.—Bras.
venulosa, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 74.—Bras.
verticillata, A. Dietr. Syn. Pl. i. 22.—Bras.
vismiaefolia, Spruce, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 99.—Peruv.
- VOCHY, Aubl. Pl. Gui. i. 18 (1775) = *praec*.
- VOCHYA, Vell. ex Vand. Fl. Lusit. i. t. 1. f. i (1788); et in Roem. Script. 69. t. 6 (1796) = *praec*.
- VOCHYSIA, Poir. Encyc. viii. 681 (1808) = *praec*.
- VOELCKERIA, Klotzsch & Karst. in Endl. Gen. Suppl. iv. 66 (1850) = *Ternstroemia*, Linn.
- VOGELIA, J. F. Gmel. Syst. 107 (1791) = *Burmannia*, Linn.
capitata, J. F. Gmel. l. c. = *B. capitata*.
- VOGELIA**, Lam. Illustr. ii. 147. t. 149 (1792).
PLUMBAGINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 628.
africana, Lam. l. c. 149.—Afr. austr.
arabica, Boiss. in DC. Prod. xii. 696 = *indica*.
indica, Gibs. ex Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 17; l. c. t. 1075.—Ind. or.; Arab.
pendula, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 76.—Ins. Socotra.
perfoliata, Stocks, ex Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 17 = *indica*.
- VOGELIA, Medic. Pflanzeng. 32. t. 1. f. 6 (1792) = *Neslia*, Desv. (Crucif.).
paniculata, Hornem. Hort. Hafn. ii. 594 = *N. paniculata*.
sagittata, Medic. Pflanzeng. 32; Bernh. Syst. Verz. Erf. 190 = *N. paniculata*.
- VOGLERA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 480 (1800) = *Genista*, Linn. (Legumin.).
germanica, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 195 = *G. germanica*.
hispanica, Fourr. l. c. = *G. hispanica*.
spinosa, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 500 = *G. germanica*.
- VOHIRIA, Juss. Gen. 141 (1789) = *Voyria*, Aubl. (Gentian.).

- VOIGTIA, Klotzsch, in Hayne, Arzn. Gew. xiv. adnot. ad t. 15 (1846) = *Bathysa*, Presl (Rubiace.).
australis, Klotzsch, l. c.—Bras.
- VOIGTIA, Roth, in Roem. & Usteri, Mag. iv. St. x. (1790) 17 = *Andryala*, Linn. (Compos.).
tomentosa, Roth, l. c. = *A. Rothia*.
- VOIGTIA, Spreng. Syst. iii. 673 (1826) = *Barnadesia*, Mutis (Compos.).
laurifolia, Spreng. l. c. (= *Fulcaldea laurifolia*).—Peruv.
- VOLKAMERIA, P. Br. Hist. Jamaic. 214. t. 21. f. 1 (1756) = *Clethra*, Gronov. (Ericac.).
- VOLKAMERIA, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 347 (1737) = *Clerodendron*, Linn. (Verben.).
Acerbiana, Vis. Pl. Aegypt. 23. t. 4. f. 1 = *C. Acerbiana*.
aculeata, Linn. Sp. Pl. 637 = *C. aculeatum*.
alternifolia, Burm. f. Fl. Ind. 137 = *C. calamitosum*.
angulata, Lour. Fl. Cochinch. 389 = *C. paniculatum*.
angustifolia, Andr. Bot. Rep. t. 554 = *C. heterophyllum*.
angustifolia, Poir. Encyc. viii. 688 = *C. angustifolium*.
Buchanani, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 60 = *C. foetidum*.
buxifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 658 = *C. buxifolium*.
capensis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17 = *Capparis Volkameriae*.
capitata, Willd. Sp. Pl. iii. 384 = *C. capitatum*?
Casopanguii, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 356 = *C. intermedium*.
coccinea, Herb. Amat. ex Schau. in DC. Prod. xi. 669 = *C. squamatum*.
Commersonii, Poir. Encyc. viii. 688 = *C. Commersonii*.
cordifolia, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 227, in nota = *C. cordifolium*.
dentata, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 61 = *C. squamatum*.
diversifolia, Vahl, Symb. Bot. ii. 75 = *C. paniculatum*.
farinosa, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 64 = *C. venosum*.
foetida, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 103 = *C. foetidum*.
fragrans, Vent. Jard. Malm. 70 = *C. fragrans*.
grandiflora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 512 = *C. macrostegium*.
herbacea, Roxb. Hort. Beng. 46 = *C. serratum*.
heterophylla, Poir. Encyc. viii. 687 = *C. heterophyllum*.
inermis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 511 = *C. intermedium*.
inermis, Linn. Sp. Pl. 637 = *C. nereifolium*.
inermis, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 239 = *Geniostoma rupestre*.
infortunata, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 59 = *C. infortunatum*.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 255 = *C. fragrans*.
Kaempferi, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. t. 500 = *C. squamatum*.
laurifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 890 = *C. viscosum*.
ligustrina, Jacq. Coll. Suppl. 118. t. 5. f. 1 = *C. ligustrinum*.
Madaeera, Roxb. Hort. Beng. 46, nomen = *C. Madaeera*.
multiflora, Burm. f. Fl. Ind. 137 = *C. phlomoides*.
nereifolia, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 64 = *C. nereifolium*.
obovata, Roxb. ll. cc. [95]; 62 = *C. obovatum*.
odorata, [Buch.-Ham.] Roxb. Hort. Beng. 46 = *Caryopteris Wallichiana*.
odoratissima, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 890.—Hab. ?
Petasites, Lour. Fl. Cochinch. 388.—China.
pumila, Lour. l. c. = *C. pumilum*.
scandens, Linn. f. Suppl. 292.—Zeylan.
serrata, Linn. Mant. i. 90 = *C. serratum*.
spinosa, Juss. in Ann. Mus. Par. fasc. 37. p. 76; ex Pers. Syn. ii. 144.—Peruv.
tomentosa, Vent. Jard. Malm. t. 84 = *C. tomentosum*.
urticifolia, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 61 = *C. squamatum*.
verticillata, Ruiz & Pav. ex Walp. Rep. iv. 73.—Peruv.
- VOLKMANNIA, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 48. t. 338 (1798) = *Clerodendron*, Linn. (Verben.).
japonica, Jacq. l. c. = *C. fragrans*.

- VOLUTARELLA**, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 36 (1826). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 476.
AMBERBOA, Less. Syn. Comp. 8 (1832).
AMBERBOI, Adans. Fam. ii. 117 (1763), nomen prius.
CYANASTRUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 39 (1826).
CYANOPSIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 200.
LACELIA, Viv. Fl. Lib. Spec. 58. t. 22. f. 2 (1824).
OLIGOCHAETA, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1813) 42.
PARAPHYSIS, Steud. Nom. ed. II. ii. 267 (1841).
PHAENOPAPPUS, DC. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 313 (1841).
STEPHANOCHILUS, Coss. & Dur. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 477 (1873).
VOLUTARIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 200.
abyssinica, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 198.—Abyss.
bicolor, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 250.—Afr. bor.
crupinoides, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 525 = *bicolor*.
divaricata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 476.—Ind. or.; Afghan.
erucifolia, Cass. in Dict. Sc. Nat. lviii. 453.—Hab. ?
leucantha, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 526.—Marocc.
Lippii, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 39.—Am. austr.; Ins. Canar.
muricata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 476; Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 526.—Marocc.
omphalodes, Benth. & Hook. f. l. c. 477.—Alger.
- VOLUTARIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 200 = *Volutarella*, Cass. (1826) (Compos.).
Lippii, Cass. l. c. = *Volutarella Lippii*.
- VOLUTELLA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 84 (1775) = *Cassytha*, Linn. (Filiformis).
aphylla, Forsk. l. c. = *C. filiformis*.
- VOLVULUS, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys. Oek. Ges. i. (1791) 202 = *Calystegia*, R. Br. (Convolv.).
sepium, Medic. Phil. Bot. ii. 42 = *C. sepium*.
- VORMIA, Adans. Fam. ii. 284 (1763) = *Selago*, Linn.
- VOSACAN, Adans. Fam. ii. 130 (1763) = *Helianthus*, Linn. (Compos.).
- VOSAKAN, Adans. Fam. ii. 619 (Index) (1763) = *praec*.
- VOSSIA**, Wall. & Griff. in Journ. As. Soc. Beng. v. (1836) 572. t. 23. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1131.
EREMOCHLOA, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 357 (1854).
cuspidata, Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 153.—Ind. or.
hordeoides, Munro, in Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 442.—Afr. austr.
procera, Wall. & Griff. in Journ. As. Soc. Beng. v. (1836) 573. t. 23.—Ind. or.; Afr. trop.
speciosa, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 70.—Ind. or.
- VOTOMITA**, Aubl. Pl. Gui. i. 90. t. 35 (1775). Genus dubium *RUBIACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 29.
GLOSSOCOMA, Endl. Gen. 799, in syn. (1839).
GUILLEMINIA, Neck. Elem. ii. 132 (1790).
guianensis, Aubl. Pl. Gui. i. 90. t. 35.—Guian.
- VOUACAPOUA, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 9. t. 373 (1775) = *Andira*, Lam. (1783) (Legumin.).
americana, Aubl. l. c. = *A. excelsa*.
- VOUAPA, Aubl. Pl. Gui. i. 25. t. 7 (1775) = *Macrolobium*, Schreb. (1789) (Legumin.).
acaciaefolia, Baill. Hist. Pl. ii. 109 = *M. acaciaefolium*.
angustifolia, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 239 = *M. chrysostachyum*.
bifolia, Aubl. Pl. Gui. i. 25. t. 7 = *M. Vuapa*.
chrysostachya, Miq. Stirp. Surin. Sel. 11 = *M. chrysostachyum*.
crassifolia, Baill. Adansonia, vi. (1865) 179 (= *Anthonia crassifolia*).—Afr. trop.
demonstrans, Baill. l. c. 180. t. 3 = *M. demonstrans*.
elegans, Miq. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 40 = *M. Vuapa*.
explicans, Baill. Adansonia, vi. (1865) 181 = *M. Heudelotii*.
macrophylla, Baill. l. c. 178 = *M. Palisoti*.

VOUAPA:—

phaseolaecarpa, Hayne, Arzn. Gew. xi. t. 20 = *Cynometra racemosa*.
Simira, Aubl. Pl. Gui. i. 27. t. 8 = *Macrolobium Simira*.
staminea, DC. Prod. ii. 511 = *M. Vuapa*.
violacea, [Lam.] Poir. Encyc. viii. 700 = *M. Simira*.

VOUARANA, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 12. t. 374 (1775) = *Cupania*, Plum. (Sapind.).
guianensis, Aubl. l. c. = *C. Voua-rana*.

VOUAY, Aubl. Pl. Gui. ii. App. 99 (1775) = *Geonoma*, Willd. (Palm.).

VOUCAPOUA, Steud. Nom. ed. II. ii. 780 (1841), sphalm. = *VOUCAPOUA*, Aubl. = *Andira*, Lam. (Legumin.).

VOYARA, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 26 (1775) (Quid?).
montana, Aubl. l. c. = Guian.

VOYRA, Reichb. Consp. 133 (1828) = seq.

VOYRIA, Aubl. Pl. Gui. i. 208. t. 83 (1775). *GEN-TIANEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 806.
CIMINALIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 19 (1836).
DISADENA, Miq. Stimp. Surin. Sel. 150 (1850).
HUMBOLDTIA, Neck. Elem. ii. 16 (1790).
LEANTHOSTEMON, Miq. Stimp. Surin. Sel. 147 (1850).
LEIPHAIMOS, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 387.
LITA, Schreb. Gen. 795 (1791).
PNEUMONANTHOPSIS, Miq. Stimp. Surin. Sel. 150 (1850).
acuminata, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 46. —Guian.
angustiflora, Steud. in Flora, xxvi. (1843) 765 = *aurantiaca*.
angustiloba, Spruce, ex Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 197. —Bras.
aphylla, Pers. Syn. i. 284. —Am. trop.
araguensis, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 415. —Venezuela.
aurantiaca, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 135. —Guian.
brachyloba, Griseb. Cat. Pl. Cub. 181. —Cuba.
breviflora, Lam. Illustr. i. 491. —Guian.
caerulea, Aubl. Pl. Gui. i. 211. t. 83. f. 2. —Guian.
calycina, Splitg. ex A. DC. in DC. Prod. ix. 562, in obs. —Guian.
chionea, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 197. —Bras.
clavata, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 133. —Guian.
coerulea, Auct. = *caerulea*.
corymbosa, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 136. —Guian.
disadenantha, Griseb. Cat. Pl. Cub. 181. —Cuba.
flavescens, Griseb. in DC. Prod. ix. 85. —Bras.
leucantha, Miq. in Tijdschr. Wetensch. ii. (1849) 124. —Guian.
mexicana, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 208. —Mexic.
nivea, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 140. —Guian.
nivea, Spruce, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 223 = *chionea*.
nuda, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 134. —Guian.
obconica, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 221. —Bras.
pallida, Garcke, in Linnaea, xxii. (1849) 65 = *aphylla*.
parviflora, Miq. in Tijdschr. Wetensch. ii. (1849) 123. —Guian.
rosea, Aubl. Pl. Gui. i. 209. t. 83. f. 1. —Guian.
simplex, Griseb. in Seem. Bot. Voy. Herald, 170. —Panama.
spathacea, Lam. Illustr. i. 491; Poir. Encyc. viii. 771. —Guian.
spathacea, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 137 = *calycina*.
Spruceana, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 197. —Bras.
sulphurea, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 221. —Bras.
tenella, Guild. ex Hook. Bot. Misc. i. (1830) 47. —Ins. S. Vincent.
tenera, Hook. l. c. t. 25 B, sphalm. = *praec.*
tenuiflora, Griseb. in DC. Prod. ix. 85. —Guian.

VOYRIA:—

trinitensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 425. —Ins. Trinit.
uniflora, Pers. Syn. i. 284 = *aphylla*.

VOYRIELLA, Miq. Stimp. Surin. Sel. 146 (1850).
GENTIANEAE, Benth. & Hook. f. ii. 806.
parviflora, Miq. l. c. 147. —Guian.

VRENA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27, err. typ. = *Urena*, Dill. (Malvac.).

VRIESEA, Beer, Bromel. 91 (1857) = *VRIESIA*, Lindl. = *Tillandsia*, Linn. (Bromel.).

VRIESEA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 27 = *Vandellia*, Linn. (Scrophul.).
monticola, Hassk. l. c. = *Ilysanthes refracta*.
nervosa, Hassk. l. c. 28 = *Vand. nervosa*.
sphaerocarpa, Hassk. l. c. 27 = *Vand. sphaerocarpa*.

VRIESIA, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 10 = *Tillandsia*, Linn. (Bromel.).
aloefolia, Beer, Bromel. 95 = *T. flexuosa*.
amethystina, E. Morr. Belg. Hort. xxxiv. (1884) 330. t. 15–16. —Bras.
anceps, Lem. in Fl. des Serres, v. (1849) sub t. 432 = *T. anceps*.
Barilleti, E. Morr. Belg. Hort. xxxiii. (1883) 33. t. 3. —Ecuador.
bellula, Linden, Cat. n. 109 (1883) 7; et in Gard. Chron. (1884) i. 140 = *heliconioides*.
Billbergiae, Lem. Illustr. Hort. xvi. (1869) Misc. 91. —Mexic.
billbergioides, E. Morr. ex Antoine, Bromel. 17. —Bras.
bituminosa, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 347 = *T. platynema*.
Botteri, Hort. ex Regel, Gartenfl. xxxiii. (1884) 293 = *T. xiphostachys*.
brachystachys, Regel, Gartenfl. xv. (1866) 258. t. 518 = *carinata*.
bracteosa, Beer, Bromel. 263 = *T. bracteosa*.
carinata, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 349. —Bras.
chrysostachys, E. Morr. Belg. Hort. xxxi. (1881) 87. —Peruv.
conferta, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 65 = *T. ensiformis*.
corallina, Regel, Gartenfl. xix. (1870) 354. t. 671 = *T. corallina*.
Duvaliana, E. Morr. Belg. Hort. xxxiv. (1884) 105. tt. 7, 8. —Bras.
ensiformis, Beer, Bromel. 92 = *T. ensiformis*.
Falkenbergii, Hort. Bull. —Cf. Gard. Chron. (1880) i. 759 = *T. heliconioides*.
fenestralis, Linden & André, in Illustr. Hort. xxii. (1875) 124. t. 215. —Bras.
geniculata, Wawra, Bot. Ergeb. Reise Bras. 156. t. 25 = *T. Regina*.
gigantea, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 70. —Bras.
gigantea, Lem. Illustr. Hort. xiv. (1867) t. 516 = *T. Regina*.
gladioliflora, Antoine, in Wien. Illustr. Garten-Zeit. v. (1880) 97. t. 1; et Bromel. 23. t. 15 = *T. gladioliflora*.
glaucophylla, Hook. Bot. Mag. t. 4415. —N. Granat.
Glaziouana, Lem. Illustr. Hort. xiv. (1867) Misc. 43 = *T. Regina*.
glutinosa, Lindl. in Gard. Chron. (1856) 388 = *T. glutinosa*.
gracilis, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 67 = *T. procera*.
guttata, Linden & André, in Illustr. Hort. xxii. (1875) 43. t. 200. —Bras.
heliconioides, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 10, in obs.; et ex E. Morr. in Illustr. Hort. xxx. (1883) t. 490 = *T. heliconioides*.
hieroglyphica, E. Morr. Illustr. Hort. xxxi. (1884) 41. t. 514. —Bras.
imbricata, Beer, Bromel. 94 = *T. imbricata*.
incurvata, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 68 = *T. caespitosa*.
incurvata, E. Morr. Belg. Hort. xxxii. (1882) 52. t. 2 = *inflata*.
inflata, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 161. —Bras.
Itatiaiae, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 221. —Bras.
Jongheii, E. Morr. Belg. Hort. xxviii. (1878) 257 = *T. Jongheii*.

VRIESIA:—

Krameri, E. Morr. Belg. Hort. xxxiv. (1884) 369 = *Tillandsia psittacina*.
Lindenii, Lem. Illustr. Hort. xvi. (1869) t. 610. —Peruv.
maculata, Beer, Bromel. 98 = *T. maculata*.
Malzinei, E. Morr. Belg. Hort. xxxiv. (1874) 313. t. 14 = *T. Malzinei*.
Morreni, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 219. —Bras.
Morreniana, Hort. ex E. Morr. Belg. Hort. xxxii. (1882) 287 = *T. psittacina*.
musica, Cogn. & March. Pl. Ornament. ii. (1874) t. 39. —N. Granat.
paraibica, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 160. —Bras.
Philippocoburgi, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 219. —Bras.
platynema, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 66 = *T. platynema*.
Platzmanni, E. Morr. Belg. Hort. xxv. (1875) 349. t. 23. —Bras.
Princeps, E. Morr. ex Regel, Gartenfl. xxvi. (1877) 158. —Bras.
prodigiosa, Lem. Illustr. Hort. xvi. (1869) Misc. 92. —Mexic.
psittacina, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 10 = *T. psittacina*.
ramosa, Beer, Bromel. 265 = *T. utriculata*.
recurvata, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 69. —Bras.
Regina, Beer, Bromel. 97 = *T. Regina*.
Rodigasiana, E. Morr. Illustr. Hort. xxix. (1882) 171. t. 467. —Bras.
rubra, Beer, Bromel. 98 = *T. rubra*.
sanguinolenta, Cogn. & March. Pl. Ornament. ii. (1874) t. 52; et ex André, in Illustr. Hort. xxii. (1875) 44. —N. Granat.
Saundersi, E. Morr. Belg. Hort. xxv. (1875) 350. nomen. —Hab.?
scalaris, E. Morr. l. c. xxix. (1879) 301; xxx. (1880) 309. t. 15. —Bras.
simplex, Beer, Bromel. 97 = *T. simplex*.
speciosa, Hook. Bot. Mag. t. 4382 = *T. splendens*.
splendens, Lem. in Fl. des Serres, vi. (1850–51) 162 = *T. splendens*.
tenuifolia, Beer, Bromel. 96 = *T. flexuosa*.
tessellata, E. Morr. Belg. Hort. xxxii. (1882) 381. t. 14–16 = *T. tessellata*.
utriculata, Regel, in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1869) 34 = *T. utriculata*.
viminialis, E. Morr. Belg. Hort. xxviii. (1878) 257. t. 14–15 = *T. viminialis*.
Warmingii, E. Morr. l. c. xxxiv. (1884) 260. t. 12–13. —Bras.
Wawraea, Antoine, Bromel. l. t. 1, 2. —Bras.
Xiphion, Platzmann, ex Antoine, l. c. 25 = *T. Jongheii*.
xiphostachys, Hook. Bot. Mag. t. 5287 = *T. xiphostachys*.

VROLICKIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 780 (1841), sphalm. = seq.

VROLIKIA, Spreng. Syst. iii. 149 (1826) = *Heteranthia*, Nees (Scrophul.).
polygaloides, Spreng. l. c. 157 = *H. decipiens*.

VRTICA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 28 = *Urtica*, Tourn.

VRYDAGZENIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 598 (1883), err. typ. = seq.

VRYDAGZYNEA, Blume, Orch. Archip. Ind. 71. tt. 17, 19, 20 (1858). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 598.
albida, Blume, l. c. 75. —Malaya.
elongata, Blume, l. c. 74. —N. Guin.
gracilis, Blume, l. c. 72. —Malaya.
nuda, Blume, l. c. 74. —Java.
purpurea, Blume, l. c. 73. —Java.
sandwicensis, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 599. —Ins. Sandvic.
uncinata, Blume, Orch. Archip. Ind. 76. —Java.
vitiensis, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 51. —Ins. Fiji.

VULNERARIA, Tourn. ex Hall, Enum. Stirp. Helv. ii. 569 (1742) = *Anthyllis*, Riv. (Legumin.).
Anthyllis, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 55 = *A. Vulneraria*.
argentea, Lam. Fl. Fr. ii. 651 = *A. Barba-Jovis*.

VULNERARIA :—

- Barba-Jovis*, Link, Handb. ii. 194 = *Anthyllis Barba-Jovis*.
cornicina, Link, l. c. 195 = *A. cornicina*.
Dillenii, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 359 = *A. Vulneraria*.
hamosa, Link, Handb. ii. 195 = *A. hamosa*.
heterophylla, Moench, Meth. 146 = *A. Vulneraria*.
lagopodium, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 348 = *A. Vulneraria*.
lotoides, Link, Handb. ii. 195 = *A. lotoides*.
montana, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 56 = *A. montana*.
nudiflora, Lam. Fl. Fr. ii. 650 = *A. Gerardi*.
polyphylla, Link, Handb. ii. 195 = *A. Vulneraria*.
rubriflora, Link, l. c. = *A. Vulneraria*.
rustica, Lam. Fl. Fr. ii. 649 = *A. Vulneraria*.
sericea, Link, Handb. ii. 194 = *A. sericea*.
tetraphyllum, Moench, Meth. 146 = *A. tetraphylla*.
vesicaria, Lam. Fl. Fr. ii. 650 = *A. tetraphylla*.

VULPIA, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 8 (1805) = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).

- aetnensis*, Tineo, Pl. Rar. Sicil. (1846) 22 = *F. ciliata*.
agrestis, Duval-Jouve, in Rev. Sc. Nat. (Juin, 1880) 49 = *F. bromoides*.
alopecura, Dum. Obs. Gram. Belg. 100 = *F. Alopecuroides*.
ambigua, A. G. More, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 190 = *F. Myuros*.
antucensis, Trin. in Linnaea, x. (1836) 303 = *F. antucensis*.
attenuata, Parl. Giorn. Bot. i. II. (1844) 349 = *F. attenuata*.
Brauniana, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 419 = *Agropyrum scabrum*.
brevis, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. 139 = *F. inops*.
bromoides, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 124 = *F. bromoides*.
Broteri, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 128 = *F. Myuros*.
Browniana, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 107 = *Agropyrum scabrum*.
ciliata, Link, Hort. Berol. i. 147; Dum. Obs. Gram. Belg. 100 = *F. ciliata*.
cynosuroides, Coss. ex Battand. & Trab. Fl. Alger. (1884) 92 = *F. cynosuroides*.
delicatula, Dum. Obs. Gram. Belg. 100 = *F. delicatula*.
geniculata, Link, Hort. Berol. i. 148 = *F. clavata*.
gypsophila, Nym. Consp. 821 = *F. gypsophila*.
hirtiglumis, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. v. 629.—Mesopot.
hispidula, De Not. ex Parl. Fl. Ital. i. 429 = *F. ligustica*.
incrassata, Parl. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 298 = *F. clavata*.
inops, Hack. in Flora, lxiii. (1880) 476 = *F. inops*.
Lachenalii, Heynh. Nom. i. 853 = *F. Poa*.
ligustica, Link, Hort. Berol. i. 148 = *F. ligustica*.
ligustica, Reichb. Ic. Fl. Germ. i. 25 = *F. clavata*.
Linneana, Parl. in Giorn. Bot. Ital. i. i. (1844) 346 = *F. bromoides*.
longiseta, Hack. Cat. Gram. Portugal, 24 = *F. bromoides*.
longiraginata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = *F. Myuros*.
maritima, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 124 = *F. bromoides*.
megastachya, Nees, Fl. Afr. Austr. 441.—Afr. austr.
membranacea, Dum. Obs. Gram. Belg. 100 = *F. bromoides*.
Michelii, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 1403 = *Avellinia Michelii*.
microstachya, Munro, in Benth. Pl. Hartw. 342 = *F. microstachya*.
muralis, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 694 = *F. muralis*.
murorum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 123 = *F. Myuros*.
Myuros, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 37 = *F. ciliata*.
Myuros, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 8 = *F. Myuros*.
Nardus, Dum. Fl. Belg. 159 = *F. tenuiflora*.
panormitana, Parl. Fl. Palerm. i. 188 = *F. bromoides*.
patens, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 62 = *F. pectinella*.
pectinata, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 419 = *Agropyrum pectinatum*.
pectinella, Boiss. Fl. Orient. v. 631 = *F. pectinella*.
pilosa, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 9, in obs. = *F. Myuros*.

VULPIA :—

- Pseudomyurus*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 37 = *Festuca Myuros*.
quadriflora, Trin. ex Steud. Nom. II. ii. 780 = *F. quadriflora*.
reclinata, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. xii. (1873) 204 = *F. Myuros*?
rectiseta, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 107 = *Agropyrum scabrum*.
scabra, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 419 = *Agropyrum scabrum*.
sciuroides, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 9, in obs. = *F. bromoides*.
setacea, Parl. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 297 = *F. setacea*.
sicula, Link, Hort. Berol. ii. 272 = *F. sicula*.
stipoides, Dum. Obs. Gram. Belg. 100.—Belgium.
subciliata, Link, in Linnaea, xvii. (1843) 402 = *F. subciliata*.
tenella, Heynh. Nom. i. 854 = *F. tenella*, Willd.
tenuicula, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 27 = *Avellinia tenuicula*.
tenuiflora, Heynh. Nom. i. 854 = *F. tenuiflora*.
tenuis, Parl. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 299 = *F. tenuis*, Nym.
ulochaeta, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 305 = *F. ulochaeta*.
uniglumis, Dum. Obs. Gram. Belg. 101 = *F. bromoides*.

VVARIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 28, err. typ. = **Uvaria**, Linn. (Anonac.).

- VYENOMUS, Presl, Bot. Bemerck. 32 (1844) (in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 462) = **Euonymus**, Linn. (Celastr.).
pendula, Presl, l. c. = *E. pendulus*.

W

WACCHENDORFIA, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 2 (1768), sphalm. = seq.

WACHENDORFIA, Burm. Wachend. (1757); et ex Linn. Syst. ed. X. 864 (1759). **HAEMODORACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 673.

PEDILONIA, Presl, Pedil. Nov. Pl. Gen. (1829); et in Flora, xii (1829) 568.

- brevifolia*, Soland. ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1066 = *hirsuta*.
Breyniana, D. Dietr. Syn. Pl. i. 170 = *hirsuta*.
corymbosa, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3.—Afr. austr.
elata, Salisb. Prod. 45 = *thyrsiflora*.
graminea, Thunb. Prod. Pl. Cap. 12 = *graminifolia*.
graminifolia, Linn. f. Suppl. 101.—Afr. austr.
Herberti, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 400 = *paniculata*.
Hibberti, Loud. Hort. Brit. 18, sphalm. = *praec.*
hirsuta, Linn. Syst. ed. XII. 735 = *Dilatris corymbosa*.
hirsuta, Thunb. Prod. Pl. Cap. 12.—Afr. austr.
humilis, Salisb. Prod. 45 = *paniculata*.
lugubris, Salisb. l. c. (Quid?)—Hab.?
orinocensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 319.—Venezuela.
pallida, Salisb. Prod. 45.—Afr. austr.
paniculata, Linn. Syst. ed. X. 864.—Afr. austr.
tenella, Thunb. Prod. Pl. Cap. 12.—Afr. austr.
thyrsiflora, Linn. Syst. ed. X. 864.—Afr. austr.
umbellata, Linn. Mant. ii. 320 = *Dilatris corymbosa*.
villosa, Andr. Bot. Rep. t. 398 = *hirsuta*.
villosa, Linn. Syst. ed. X. 864 (Quid?)—Hab.?

WACHENDORFIA, Loeffl. It. Hisp. 177 (1758) = **Callisia**, Linn. (Commel.).WADAPUS, Rafn. Fl. Tellur. iii. 77 (1836) = **Gomphrena**, Linn. (Amarant.).WADDINGTONIA, Phil. Fl. Atac. 41. t. 5 (1860) = **Petunia**, Juss. (Solan.).
floribunda, Phil. l. c. = *P. parviflora*.WADEA, Rafn. Sylva Tellur. 56 (1838) = **Cestrum**, Linn. (Solan.).
latifolia, Rafn. l. c. = *C. latifolium*.WAGATEA, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 90. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 568.
spicata, Dalz. l. c.—Cf. 89.—Ind. or.WAGENERIA, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 112. t. 10 C = **Begonia**, Tourn.

- brasiliensis*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 119 = *B. polygonifolia*.
convolvulacea, Klotzsch, ll. cc. 126; 116 = *B. convolvulacea*.
deflexa, Klotzsch, ll. cc. 126; 113 = *B. scandens*.
dichotoma, Klotzsch, ll. cc. 126; 117 = *B. dichotoma*.
fagifolia, Klotzsch, ll. cc. 126; 113 = *B. fagifolia*.
glabra, Klotzsch, ll. cc. 126; 115 = *B. scandens*.
glandulosa, Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod. xv. i. 339 = *B. glandulosa*.
hispida, Klotzsch, ex A. DC. l. c. 363 = *B. hispida*.
Huegelii, Klotzsch, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 2 = *B. Huegelii*.
inciso-serrata, A. DC. in Mart. Fl. Bras. iv. i. 374, sphalm. = *B. inciso-serrata*.
longiceps, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126 = *B. longipes*.
longipes, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 117 = *B. longipes*.
lucida, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 114 = *B. scandens*.
montana, Klotzsch, ll. cc. 126; 115 = *B. scandens*.
Moritziana, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126 = *B. meridenis*.
reniformis, Klotzsch, l. c.; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 118 = *B. longipes*.
rugosa, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126 = *B. rugosa*.
scabrida, Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod. xv. i. 367 = *B. scabrida*.
scandens, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126, nomen = *B. scandens*?
Schottiana, Klotzsch, l. c. = *B. convolvulacea*.
tomentosa, Klotzsch, l. c. = *B. tomentosa*.
vitifolia, Klotzsch, l. c.; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 116 = *B. vitifolia*.

WAGNERIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 126 = *praec.*WAGNERIA, Lem. Illustr. Hort. iv. (1857) sub t. 115 = **Diervilla**, Tourn. (Caprifol.).
Middendorffiana, Lem. l. c. = *D. Middendorffiana*.WAHABIA, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312, nomen = **Barleria**, Linn. (Acanth.).
longiflora, Fenzl, l. c., nomen = *B. acanthoides*.WAHLBERGELLA, Fries, in Bot. Notiser (1843), 143 = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).

- affinis*, Fries, l. c. = *L. affinis*.
albiflora, Rupr. in Hofm. Noerdl. Ural. ii. Anhang, 30 = *L. apetalata*?
angustiflora, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 24 = *L. affinis*.
apetalata, Fries, Summa Veg. Scand. 155 = *L. apetalata*.
involutrata, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 24 (= *Gasterolychnis involutrata*).—Reg. Ural.
macropetalata, Rupr. in Hofm. Noerdl. Ural. ii. Anhang, 30 = *L. apetalata*?
triflora, Fries, Summa Veg. Scand. 155, in obs. = *L. affinis*.
uniflora, Fries, in Bot. Notiser (1843), 143.—Europ.?
uralensis, Rupr. in Hofm. Noerdl. Ural. ii. Anhang, 17, 31 (= *Gasterolychnis uralensis*).—Reg. Ural.
Vahlia, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 24 = *L. affinis*.

WAHLBOMIA, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1790) 215. t. 9 = **Tetracera**, Linn. (Dilleniac.).
indica, Thunb. l. c. = *T. Wahlbomia*.WAHLENBERGIA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 14 (1823) = **Tarenna**, Gaertn. (Rubiace.).
fragrans, Blume, l. c. 15 (= *Webera fragrans*).—Malaya.WAHLENBERGIA, R. Br. in Wall. Cat. p. 262.—Cf. n. 4342 (1831) = **Chailletia**, DC.

WAHLENBERGIA, Schrad. Cat. Hort. Gotting. (1814); et in Comm. Gotting. vi. (1823-27) 123.
CAMPANULACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 555.
AIKINIA, Salisb. ex A. DC. Monog. Camp. 135, 141 (1830).
CERVICINA, Delile, Fl. Egypte, 150. t. 5. f. 2 (1813).
EDRAIANTHUS, A. DC. in DC. Prod. vii. 448 (1839).
HECALE, Rafin. Fl. Tellur. ii. 79 (1836).
HEDRAEANTHUS, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 292 (1844).
PETALOSTIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 79 (1836).
PILOREA, Rafin. l. c. 80 (1836).
SCHULTESIA, Roth, Enum. Pl. Phan. Germ. i. 690 (1827).
STRELESKIA, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 226.
VALVINTERLOBUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 459 (1867).
acaulis, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 9, nomen; A. DC. in DC. Prod. vii. 430.—Afr. austr.
adpressa, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 583.—Afr. austr.
agrestis, A. DC. Monog. Camp. 145 = *gracilis*.
albomarginata, Hook. Ic. Pl. t. 818 = *saxicola*.
androsacea, A. DC. Monog. Camp. 150. t. 19. f. 1.—Afr. austr.
angustifolia, A. DC. l. c. 162.—Ins. S. Helen.
annularis, A. DC. in DC. Prod. vii. 437.—Afr. austr.
arenaria, A. DC. l. c. 436 = *androsacea*.
arguta, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 15.—Afr. trop.
arida, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 200.—Reg. Argent.
arvatica, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 593 = *hederacea*.
Banksiana, A. DC. Monog. Camp. 154.—Afr. austr.
Berteroi, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 279.—Ins. J. Fernand.
bilocularis, A. DC. in DC. Prod. vii. 439 = *undulata*.
Bojeri, A. DC. l. c. 435.—Ins. Madag.
Bowkeriae, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 577.—Afr. austr.
brasiliensis, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 318.—Bras.
Burchellii, A. DC. in DC. Prod. vii. 438.—Ins. S. Helen.
caffra, A. DC. l. c. 432.—Afr. austr.
caledonica, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 579.—Afr. austr.
californica, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 158 = *Campanula linnaeifolia*.
calycina, Schlecht. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58, nomen.—Peruv.
campanuloides, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 700 = *W. Cervicina*.
capensis, A. DC. Monog. Camp. 136. t. 18.—Afr. austr.
capillacea, A. DC. l. c. 156.—Afr. austr.
capillaris, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 419 = *gracilis*.
capillifolia, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen (Quid?).—Afr. austr.
cartilaginea, Hook. f. Handb. N. Zael. Fl. 170.—N. Zel.
cernua, A. DC. Monog. Camp. 148.—Afr. austr.
cernua, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 9; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 439 = *Meyeri*.
Cervicina, A. DC. Monog. Camp. 156.—Afr. bor.
Chamissoniana, G. Don, Gen. Syst. iii. 740 = *undulata*.
chondrophylla, Buck, in Eckl. & Zeyh. Enum. 381 = *Lobelia aspera*.
ciliolata, A. DC. in DC. Prod. vii. 436 = *cernua*.
claviculata, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 9, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 432 = *exilis*.
clematidea, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 38 = *Codonopsis ovata*.
clivosa, A. DC. Monog. Camp. 161 = *angustifolia*.
corymbosa, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 432 = *Lightfootia capillaris*.
costata, A. DC. in DC. Prod. vii. 427.—Afr. austr.
crispa, Nees, Del. Sem. Hort. Vratisl. (1850) 3.—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 237.—Armenia.
dalmatica, A. DC. Monog. Camp. 134.—Dalmat.

WAHLENBERGIA :—
debilis, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 378.—Afr. austr.
decipiens, A. DC. in DC. Prod. vii. 427.—Afr. austr.
dehiscens, A. DC. Monog. Camp. 145 = *gracilis*.
denticulata, A. DC. l. c. 152. t. 16 = *Lightfootia capillaris*.
denudata, A. DC. l. c. 147.—Afr. austr.
dicentrifolia, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 430.—Reg. Himal.
dichotoma, A. DC. in DC. Prod. vii. 437 = *androsacea*.
diffusa, A. DC. Monog. Camp. 137 = *Microcodon lineare*.
divaricata, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 430.—Afr. austr.
divergens, A. DC. in DC. Prod. vii. 427.—Afr. austr.
diversifolia, A. DC. Monog. Camp. 139 = *procumbens*.
Dregeana, A. DC. in DC. Prod. vii. 428 = *Ecklonii*.
Dunantii, A. DC. Monog. Camp. 152 = *paniculata*.
Ecklonii, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 380.—Afr. austr.
Elatines, Link, Handb. i. 631 = *Campanula Elatines*.
elongata, Schrad. Cat. Hort. Gotting. (1814); ex Roth, Nov. Sp. Pl. 399 = *capensis*.
emimensis, A. DC. in DC. Prod. vii. 432.—Madag.
ensifolia, A. DC. Monog. Camp. 162.—Ins. Bourbon.
epacridea, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 584.—Afr. austr.
Erinus, Link, Handb. i. 631 = *Campanula Erinus*.
etbaica, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 700.—Afr. trop.
exilis, A. DC. Monog. Camp. 151. t. 16.—Afr. austr.
fernandeziana, A. DC. l. c. 160.—Ins. J. Fernand.
flaccida, A. DC. l. c. 138.—Afr. austr.
flaccida, Presl, Symb. Bot. 29. t. 18 = *Campanula garganica*.
foliosa, A. DC. Monog. Camp. 160 = *linifolia*.
garganica, G. Don, Gen. Syst. iii. 738 = *Campanula garganica*.
gracilis, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 435 = *cernua*.
gracilis, Schrad. Blumenb. 38, in obs.; A. DC. Monog. Camp. 142.—Geront. trop. et temp. austr.
Grahamae, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. III. 46.—Ins. J. Fernand.
graminifolia, A. DC. Monog. Camp. 130.—Italia.
grandiflora, Schrad. Cat. Hort. Gotting. (1814); et ej. Blumenb. 38, in obs. = *Platycodon grandiflorum*.
hederacea, Reichb. Pl. Crit. v. 47; A. DC. Monog. Camp. 140.—Europ.
Hilsenbergii, A. DC. in DC. Prod. vii. 429.—Madag.
hirsuta, Steud. Nom. ed. II. ii. 782.—Chili.
hispidula, Eckl. & Zeyh. Enum. 381 = *paniculata*.
hispidula, Schrad. Blumenb. 38, in obs.; A. DC. Monog. Camp. 155 = *Microcodon depressum*.
hispidula, Schrad. ex A. DC. Monog. Camp. 128 = *Microcodon sparsiflorum*.
homallanthina, A. DC. in DC. Prod. vii. 425.—Sibir. or.
huillana, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. vi. (1866) 333.—Afr. trop.
humilis, A. DC. Monog. Camp. 147.—Afr. trop.
inconspicua, A. DC. in DC. Prod. vii. 430.—Afr. austr.
indica, A. DC. Monog. Camp. 146 = *gracilis*.
ingrata, A. DC. in DC. Prod. vii. 432.—Afr. austr.
inhambanensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 308.—Afr. trop.
integrifolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 428 = *stellarioides*.
Kitaibelii, A. DC. Monog. Camp. 131.—Banat; Transsylv.
Krebsii, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 195 = *Zeyheri*.
Kruhsiana, Fisch. ex A. DC. Monog. Camp. 126 = *homallanthina*.
Larrainii, A. DC. in DC. Prod. vii. 438, sphalm., in syn. = *fernandeziana*.
lavandulaefolia, A. DC. Monog. Camp. 144 = *gracilis*.
linarioides, A. DC. l. c. 158.—Am. austr.
linearis, A. DC. l. c. 137 = *Microcodon lineare*.
linearis, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen (Quid?).—Afr. austr.
linifolia, A. DC. Monog. Camp. 162.—Ins. S. Helen.
lobelioides, Link, Handb. i. 632; A. DC. l. c. 157 = *pendula*.
lurida, Schouw. Hort. Haun.—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 161 = *Codonopsis lurida*.

WAHLENBERGIA :—
madagascariensis, A. DC. Monog. Camp. 139.—Madag.
Mannii, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 700.—Afr. trop.
marginata, A. DC. Monog. Camp. 143 = *gracilis*.
Massonii, A. DC. l. c. 153 = *paniculata*.
Meyeri, A. DC. in DC. Prod. vii. 439.—Afr. austr.
micrantha, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 9; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 411 = *Laurentia micrantha*.
montana, A. DC. in DC. l. c. 430.—Afr. austr.
multicaulis, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 75 = *gracilis*.
namaquana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 582 = *annularis*.
nudicaulis, A. DC. Monog. Camp. 149.—Afr. austr.
nudicaulis, Eckl. & Zeyh. Enum. 380 = *androsacea*.
nutabunda, A. DC. Monog. Camp. 151.—Ital.
oocarpa, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 576.—Afr. austr.
oppositifolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 429.—Afr. austr.
ovata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 156.—Nepal.
oxyphylla, A. DC. in DC. Prod. vii. 427.—Afr. austr.
**paniculata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 380 = *Ecklonii*.
paniculata, Schrad. Blumenb. 38, in obs.; A. DC. Monog. Camp. 153.—Afr. austr.
parviflora, A. DC. in DC. Prod. vii. 437 = *androsacea*.
patula, A. DC. l. c. 436.—Afr. austr.
pauciflora, A. DC. l. c. 437.—Afr. austr.
peduncularis, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 22.—Reg. Himal.
pendula, Schrad. Cat. Hort. Gotting. (1814) 3, nomen; et ej. Blumenb. 38, in obs.—Ins. Mader. et Canar.
pentamera, A. DC. in DC. Prod. vii. 428 = *Ecklonii*.
perotifolia, Wight & Arn. Prod. 405 = *Cephalostigma Schimperii*.
peruviana, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 152.—Peruv.
pilosa, Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum. 381.—Afr. austr.
pilosa, DC. in DC. Prod. vii. 431 = *polyclada*.
polyclada, A. DC. l. c. 789.—Afr. austr.
polyclada, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 15 = *Manuil*.
Preissii, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 241 = *gracilis*?
procumbens, A. DC. Monog. Camp. 140. t. 15.—Afr. austr.
prostrata, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 9, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 431.—Afr. austr.
Pumilio, A. DC. Monog. Camp. 134.—Dalmatia.
purpurea, A. DC. in DC. Prod. vii. 425 = *Codonopsis purpurea*.
pusilla, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 2.—Abyss.
quadrifida, A. DC. Monog. Camp. 144 = *gracilis*.
ramulosa, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 432.—Afr. austr.
reflexa, Steud. Nom. ed. II. ii. 782.—Chili.
repens, Schrad. Blumenb. 37 = *procumbens*.
rigida, Bernh. in Flora, xxvii. (1844) 820.—Afr. austr.
riparia, A. DC. Monog. Camp. 146.—Afr. trop.
robusta, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 584 = *rigida*.
rotundifolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 425 = *Codonopsis rotundifolia*.
Roxburghii, A. DC. Monog. Camp. 162.—Ins. S. Helen.
Roylei, A. DC. in DC. Prod. vii. 425 = *Codonopsis ovata*.
rudis, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 431 = *paniculata*.
Rutenbergiana, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 123.—Madag.
saxicola, A. DC. Monog. Camp. 144.—Austral.; N. Zel.
Saxifraga, A. DC. in DC. Prod. vii. 427 = *Ecklonii*.
Schimperii, Hochst. ex Hemsl. in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 472 = *Cephalostigma hirsutum*.
semiglabra, A. DC. in DC. Prod. vii. 437 = *androsacea*.
Sieberi, A. DC. Monog. Camp. 144 = *gracilis*.
silenoides, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 3.—Abyss.
simplicicaulis, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 241 = *gracilis*.

WAHLENBERGIA :—

- sphaerocarpa*, A. DC. in DC. Prod. vii. 436 = androsacea.
spicata, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen; A. DC. in DC. Prod. vii. 441 = *Lightfootia juncea*.
spinulosa, A. DC. *Monog. Camp.* 155.—Afr. austr.
stellarioides, Cham. in *Linnaea*, viii. (1833) 196.—Afr. austr.
striata, A. DC. in DC. Prod. vii. 439 = *undulata*.
stricta, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 593 = *gracilis*.
swellendamensis, Buck, in Eckl. & Zeyh. Enum. 381 = Ecklonii.
tenuifolia, A. DC. *Monog. Camp.* 133.—Croatia.
tenuis, A. DC. in DC. Prod. vii. 440 = *debilis*.
thalictrifolia, A. DC. l. c. 425 = *Codonopsis thalictrifolia*.
tuberosa, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 6155.—Ins. J. Fernand.
turbinata, A. DC. in DC. Prod. vii. 427 = Ecklonii.
undulata, A. DC. *Monog. Camp.* 148.—Afr. austr.
variabilis, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exsicc. Afr. Austr. (1837) 8, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. vii. 436.—Afr. austr.
Verreauxii, A. DC. in DC. Prod. vii. 436 = androsacea.
vincaeflora, Decne. in Rev. Hort. Sér. III. iii. (1849) 41 = *gracilis*.
viridis, A. DC. in DC. Prod. vii. 424 = *Codonopsis viridis*.
Wyleyana, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 583.—Afr. austr.
Zeyheri, Buck, in Eckl. & Zeyh. Enum. 379.—Afr. austr.

WAHLENBERGIA, Schum. in Schum. & Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* 387 (1827) = *Enhydra*, Lour. (Compos.).
globularis, Schum. in Schum. & Thonn. l. c. = *E. fluctuans*.
glomerata, DC. Prod. v. 497, in syn., *sphalm.* = *praece.*

WAILESIA, Lindl. in *Journ. Hort. Soc.* iv. (1849) 261 = *Dipodium*, R. Br. (Orchid.).
paludosa, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 92 = *D. paludosum*.
picta, Lindl. in *Journ. Hort. Soc.* iv. (1849) 261 = *D. pictum*.

WAITZIA, Reichb. *Consp.* 60 (1828) = *Tritonia*, Ker-Gawl. (Irid.).
aequimaculata, Heynh. *Nom.* i. 854 (= *Montbretia aequimaculata*).—Hab. ?
anigozanthaeiflora, Heynh. l. c. = *T. anigozanthiflora*.
concolor, Heynh. l. c. = *Ixia paniculata*.
crispa, Heynh. l. c. = *T. crispa*.
crocata, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. iii. 14 = *T. crocata*.
deusta, Heynh. *Nom.* i. 854 = *T. deusta*.
fenestrata, Heynh. l. c. = *T. fenestrata*.
flava, Heynh. l. c. = *T. flava*.
fucata, Heynh. l. c. = *Antholyza fucata*.
lineata, Heynh. l. c. = *T. lineata*.
longiflora, Heynh. l. c. = *Ixia paniculata*.
miniata, Heynh. l. c. = *T. crocata*.
odorata, Heynh. l. c. = *Freesia refracta*.
pallida, Heynh. l. c. 855 = *T. pallida*.
pectinata, Heynh. l. c. = *T. crispa*.
refracta, Heynh. l. c. = *Freesia refracta*.
Rochensis, Heynh. l. c. = *Ixia paniculata*.
rosea, Heynh. l. c. = *T. capensis*.
squalida, Heynh. l. c. = *T. squalida*.
striata, Heynh. l. c. = *Gladiolus striatus*.
tenuiflora, Heynh. l. c. = *Ixia paniculata*.
viridis, Heynh. l. c. = *T. viridis*.
xanthospila, Heynh. l. c. (= *Anomatheca xanthospila*).—Afr. austr.

WAITZIA, Wendl. *Coll. Pl.* ii. 13. t. 42 (1808).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 307.
MORNA, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1941 (1837); et (1838) t. 9.
PTEROCHAETA, Steetz, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 455 (1845).
VIRAYA, Gaudich. in *Freye. Voy. Bot.* 466. t. 89 (1826).
acuminata, Steetz, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 453 = *corymbosa*.
aurea, Steetz, l. c. 452.—Austral.
brachyrrhyncha, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 407 = *Helipterum incanum*.

WAITZIA :—

- brevirostris*, Steetz, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 451 = Steetziana.
citrina, Steetz, l. c. = Steetziana.
corymbosa, Wendl. *Coll. Pl.* ii. 13. t. 42.—Austral.
dasycarpa, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 77 = Steetziana.
discolor, Turcz. l. c. (1851) i. 194 = *corymbosa*.
grandiflora, Naud. in *Rev. Hort.* (1865) 185.—Austral.
nivea, Benth. *Fl. Austral.* iii. 636 = *odontolepis*.
odontolepis, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 77.—Austral.
paniculata, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iii. 637.—Austral.
Podolepis, Steetz, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 450.—Austral.
Steetziana, *Lehm. ex Steetz, l. c.* 454.—Austral.
sulphurea, Steetz, l. c. 453 = Steetziana.
tenella, Hook. *Bot. Mag.* t. 5342 = Steetziana.

WALAFRIDA, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 272 (1837) = *Selago*, Linn.
nitida, E. Mey. l. c.—Afr. austr.
trimera, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 70.—Afr. austr.

WALAFRIDIA, Endl. *Gen.* 642 (1839) = *praece.*

WALCOTTIA, F. Muell. *Fragm.* i. 241 (1859) = *Lachnostachys*, Hook. (Verben.).
eriobotrya, F. Muell. l. c. = *L. Walcottii*.

WALCUFFA, J. F. Gmel. *Syst.* 1029 (1791) = *Dombeia*, Cav. (Stercul.).
Pentapetes, Bruce, ex Steud. *Nom. ed.* I. 891 = *D. Bruceana*.
torrida, J. F. Gmel. *Syst.* 1029 = *D. Bruceana*.

WALDEMARIA, Klotzsch, in *Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 99 (1862) = *Rhododendron*, Linn. (Ericac.).
argentea, Klotzsch, l. c. = *R. grande*.

WALDHEIMIA, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 125 = *Albardia*, Decne. (Compos.).
glabra, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 308, 309 = *A. glabra*.
Korolkowi, Regel & Schmalh. l. c. 308, 310.—Turkestan.
nivea, Regel, l. c. 308, 309 = *A. nivea*.
Stracheyana, Regel, l. c.—Reg. Himal.
tomentosa, Regel, l. c. 308, 310 = *A. tomentosa*.
tridactylites, Kar. & Kir. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 126 = *A. glabra*.

WALDSCHMIDIA, [Weber, in] *Wigg. Prim. Fl. Holsat.* 19 (1780) = *Limnanthemum*, S. T. Gmel. (Gentian.).
nymphoides, [Weber, in] *Wigg. l. c.* 20 = *L. nymphoides*.

WALDSCHMIDTIA, Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* i. 265 (err. typ. 465) (1825) = *praece.*

WALDSCHMIDTIA, Scop. *Introd.* 100 (1777) = *Crudia*, Schreb. (1789) (Legumin.).

WALDSTEINIA, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* ii. (1799) 105. t. 4. **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 619.
COMAROPSIS, Rich. in *Nestl. Potent.* 16. t. 1 (1816).
Doniana, Tratt. *Ros. Monog.* iii. 109 = *fragarioides*.
fragarioides, Tratt. l. c. 107.—Am. bor.
geoides, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* ii. (1799) 106.—Hungar.; Tauria.
lobata, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 426.—Am. bor.
Moenchii, Tratt. *Ros. Monog.* iii. 106.—Hab. ?
sibirica, Tratt. l. c. 108.—Sibir. baical.
trifolia, Rochel, ex Koch, in *Linnaea*, xiii. (1839) 337, 338 = *sibirica*.
trifoliata, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 783, *sphalm.* = *praece.*

WALKERA, Schreb. *Gen.* 378 (1789) = *Gomphia*, Schreb. (Ochnac.).
integrifolia, DC. *Prod.* i. 737.—Gnain.
serrata, Willd. *Sp. Pl.* i. 1145 = *G. angustifolia*.
zeylonensis, Hort. ex DC. in *Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 421 = *G. angustifolia*.

WALKERIA, Mill. ex Ehret, in *Phil. Trans.* liii. (1763) 130 = *Nolana*, Linn. (Convolv.).

WALKUFFA, Bruce, ex Steud. *Nom. ed.* I. 891 (1821) = *WALCUFFA*, J. F. Gmel. = *Dombeya*, Cav. (Stercul.).

WALLACEA, Spruce, ex Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 320 (1862). **OCHNACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c. insignis, Spruce, ex Benth. & Hook. f. l. c. 321.—Bras.

WALLÉNIA, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 31 (1788).
MYRSINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 643.
PETESIOIDES, Jacq. *Stirp. Am.* 17 (1763).
angularis, Jacq. *Hort. Schoenb.* i. t. 30 = seq.
angulata, Jacq. l. c. i. 13.—Hab. ?
angustifolia, Nees & Mart. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 87 = *Ardisia semicrenata*.
clusiifolia, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 394.—Ind. occ.
laurifolia, Balb. ex Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 394 = *clusiifolia*.
laurifolia, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 31.—Ind. occ.
laxiflora, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 89. t. 237 = *Conomorpha laxiflora*.
myrianthos, Reichb. ex A. DC. in *Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 102 = *Cybianthus myrianthos*.
nemoralis, Mart. in *Flora*, xxiv. (1841) ii. *Beibl.* 21.—Bras.
venosa, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 394.—Jamaica.

WALLERIA, J. Kirk, in *Trans. Linn. Soc.* xxiv. (1864) 497. t. 52. **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 831.
angolensis, Baker, l. c. Ser. II. i. (1878) 262 = *Mackenzii*.
Mackenzii, J. Kirk, l. c. Ser. I. xxiv. (1864) 497. t. 52. f. 2.—Afr. trop.
nutans, J. Kirk, l. c. t. 52. f. 1 = *Mackenzii*.

WALLIA, Alef. in *Bonplandia*, ix. (1861) 335 = *Juglans*, Linn.
cinerea, Alef. l. c. 336 = *J. cinerea*.
fraxinifolia, Alef. l. c. = *Pterocarya caucasica*.
nigra, Alef. l. c. = *J. nigra*.
pyriformis, Alef. l. c. = *J. pyriformis*.
regia, C. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 136, in syn., *sphalm.* = *J. regia*.

WALLICHIA, DC. in *Mém. Mus. Par.* x. (1823) 104. t. 6 = *Eriolaena*, DC. (Stercul.).
quinquelocularis, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 783 = *E. quinquelocularis*.
spectabilis, DC. in *Mém. Mus. Par.* x. (1823) 104. t. 6 = *E. spectabilis*.

WALLICHIA, Reinw. ex Blume, in *Cat. Gew. Buitenz.* 11 (1823) = *Urophyllum*, Wall. (Rubiace.).
arborea, Reinw. l. c. = *U. glabrum*.
porphyracea, Mart. ex Rosenth. *Syn. Pl. Diaphor.* 333 = *U. porphyraceum*.

WALLICHIA, Roxb. *Pl. Corom.* iii. 91. t. 295 (1819).
PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 916.
HARINA, Buch.-Ham. in *Mem. Wern. Soc.* v. (1826) 317.
WRIGHTIA, Roxb. *Hort. Beng.* 68 (1814); *Fl. Ind.* iii. 621 (1832).
caryotoides, Roxb. *Pl. Corom.* iii. 91. t. 295.—Reg. Himal.
caryotoides, Wall. *Cat. n.* 8596 B = *densiflora*.
caudata, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 315 = *Didymosperma caudatum*.
densiflora, Mart. l. c. 190.—Reg. Himal.
disticha, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 6.—Reg. Himal.
excelsa, Karst. ex Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) 32, nomen (Quid?).—N. Granat.
Horsfieldii, Blume, *Rumphia*, ii. 112, in obs. = *Didymosperma Horsfieldii*.
nana, Griff. in *Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 488 = *Didymosperma nanum*.
oblongifolia, Griff. l. c. 486 = *densiflora*.
Oranii, Blume, *Rumphia*, ii. 113 = *Didymosperma porphyrocarpum*.
porphyrocarpa, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 190, 315 = *Didymosperma porphyrocarpum*.

WALLICHIA :—

Reinwardtiana, Miq. Pl. Jungh. 157 = *Didymosperma Reinwardtiana*.
tremula, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 315 = *Didymosperma tremula*.
Yomae, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 533 = *disticha*.
zebrina, Hort. Williams.—Cf. Gard. Chron. (1880) i. 759 (Quid ?).—Hab. ?

WALLINIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 143 (1849) = *Lophiocarpus*, Turcz. (Chenop.).
polystachya, Moq. l. c. = *L. polystachys*.

WALLISIA, E. Morr. in Belg. Hort. (1870) 97. t. 5 = *Tillandsia*, Linn. (Bromel.).
Hamaleana, E. Morr. l. c. = *T. Hamaleana*.

WALLISIA, Regel, Gartenfl. xxiv. (1875) 230. t. 839 = *Lisianthus*, Aubl. (Gentian.).
Princeps, Regel, l. c. = *L. Princeps*.

WALLROTHIA, Roth, Nov. Pl. Sp. 317 (1821) = *Vitex*, Tourn. (Verben.).
articulata, Roth, l. c. 317 = *V. pubescens*.
Leucoxydon, Roth, l. c. 319 = *V. Leucoxydon*.

WALLROTHIA, Spreng. Pugill. ii. 52 (1815) = *Seseli*, Linn. (Umbellif.).
divaricata, Presl, Delic. Prag. 134 = *Carum alpinum*.
splendens, Spreng. in Schult. Syst. vi. 557.—Mont. Pyren.
tenuifolia, DC. Prod. iv. 162 = *splendens*.
tuberosa, Spreng. Pugill. ii. 52 = *Carum alpinum*.

WALPERSIA, Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 26 (1861).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 473.
burtonioides, Harv. & Sond. l. c. = *Afr. austr.*

WALPERSIA, Meissn. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 357 = *Rhynchosia*, Lour. (Legumin.).
villosa, Meissn. ex Krauss, l. c. = *R. sigmodes*.

WALPERSIA, Reiss. in Endl. Gen. 1100 (1840) = *Phyllia*, Linn. (Rhamnac.).
capitata, Presl, Bot. Bemerk. 37, 38 = *P. spicata*.
curvifolia, Presl, l. c. 38 = *P. reclinata*.
Dregeana, Presl, l. c. = *P. stipularis*.
hirtifolia, Presl, l. c. = *Afr. austr.*
rhipophora, Presl, l. c. 37 = *P. stipularis*.
rigida, Presl, l. c. 38 = *P. rigida*.
spicata, Reiss. in Endl. Gen. 1100 = *P. spicata*.
squarrosa, Presl, Bot. Bemerk. 38 = *P. plumosa*.
stipularis, Reiss. in Endl. Gen. 1100 = *P. stipularis*.

WALSURA, Roxb. Hort. Beng. 32 (1814) ; Fl. Ind. ii. 386 (1832). *MELIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 336.

MONOCYCLIS, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 135 (1845).

SURWALA, M. Roem. Syn. Hesper. 108 (1846).
Antila, Wight & Arn. Prod. 120 = *ternata*.
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 61.—Zeylan.
hypoleuca, Kurz, Rep. Veget. Andam. ed. II. 33, nomen ; et in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 296.—Ins. Andaman.
lanceolata, Wall. Cat. n. 4886 = *Aglaia Roxburghiana*.
neurodes, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 564.—Malacca.

oxycarpa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1875) ii. 200.—Ins. Andaman.

pinnata, Hassk. Retzia, i. 147.—Java.
piscidia, Roxb. Hort. Beng. 32 ; Fl. Ind. ii. 387.—Ind. or.

pubescens, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 297 = *Heynea trijuga*.
robusta, Roxb. Hort. Beng. 32 ; Fl. Ind. ii. 386.—Reg. Himal. ; Burma.

ternata, Roxb. Hort. Beng. [90] ; Fl. Ind. ii. 389.—Ind. or.

Thwaitesii, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 635 = *W. Piscidia*.

trichostemon, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 60.—Burma ; Siam.

trijuga, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1875) ii. 148 = *Heynea trijuga*.

tubulata, Hiern, in Hook. Fl. Brit. Ind. i. 563.—Reg. Himal.

WALSURA :—

villosa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. II. (1870) 72 = *trichostemon*.
villosa, Wall. Cat. n. 1264 ; Wight & Arn. Prod. 120.—Burma.

WALTERIANA, Fraser, ex Endl. Gen. 1413 (1841) = *Cliftonia*, Banks (Cyrill.).

WALTHERIA, Linn. Gen. ed. I. 203 (1737). *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 224.

ASTROPUS, Spreng. Neue Entdeck. iii. 64 (1822).

LOPHANTHUS, Forst. Char. Gen. 27. t. 14 (1776).

africana, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 296 = *indica*.

albicans, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 214.—Bras.

americana, Linn. Sp. Pl. 673 = *indica*.

angustifolia, Linn. Syst. ed. X. 1140 ; H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 332 = *indica*.

arborescens, Cav. Diss. vi. 316 = *indica*.

Astropus, Spreng. Syst. iii. 31.—Bras.

boliviensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 571.—Bolivia.

brachypetala, Turcz. l. c. xxxi. (1858) i. 215 = *ferruginea*.

bracteosa, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 37.—Bras.

brevipes, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 213.—Mexic.

capitata, Vell. Fl. Flum. 274 ; vii. t. 4.—Bras.

caroliniana, Walt. Fl. Carol. 175 = *Piriqueta fulva*.

carpinifolia, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 38.—Bras.

cinerascens, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 152.—Bras.

communis, A. St. Hil. l. c. 155.—Bras.

corymbifolia, Pers. Syn. ii. 216 = *indica*.

cordata, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. n. 8.—Ind. occ.

debilis, Boj. Hort. Maurit. 39, nomen (Quid ?).—Ins. Comor.

detonsa, A. Gray, Pl. Wright. ii. 24.—N. Mexic.

Douradinha, A. St. Hil. Fl. Us. Bras. t. 36.—Bras.

elliptica, Cav. Diss. vi. 316. t. 171. f. 2 = *indica*.

eriolada, DC. Prod. i. 493 = *indica*.

excelsa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 215.—Bras.

ferruginea, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 150.—Bras.

fruticosa, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 296.—Guian.

glabra, Poir. Encyc. viii. 325.—Ins. Guadeloup.

glabriuscula, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 155 = *communis*.

glomerata, Presl, Rel. Haenk. ii. 152.—Panama.

gracilis, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 154 = *communis*.

guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 295 = *indica*.

Haenkeana, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 756 = *Preslii*.

hirsuta, Presl, Rel. Haenk. ii. 152.—Mexic.

indica, Linn. Sp. Pl. 673.—Cosmop. trop.

intricata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 214.—Cuba.

involuta, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 125.—Guian.

laevis, D. Wolf, ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 55 = *glabra*.

lanata, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 154 = *communis*.

lanceolata, R. Br. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 235.—Afr. trop.

lantanaefolia, A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 38.—Bras.

longifolia, DC. Prod. i. 493.—Ind. occ.

longiramea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 571.—Ind. or.

lophantha, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = *seq.*

Lophanthus, Forst. f. Prod. 47.—Ins. Marques.

macropoda, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 216.—Bras.

maritima, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 153.—Bras.

microphylla, Cav. Diss. vi. 317. t. 170. f. 2 = *indica*.

microphylla, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 144 = *Coldenia procumbens*.

monogynia, Vell. Fl. Flum. 274 ; vii. t. 6.—Bras.

obtusa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 783 = *indica*.

ovata, Cav. Diss. vi. 317. t. 171. f. 1 = *indica*.

paniculata, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 126.—Guian.

WALTHERIA :—

pauciflora, Hochst. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 235 = *indica*.

pedunculata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 783 = *indica*.

pentagynia, Vell. Fl. Flum. 274 ; vii. t. 5.—Bras.

Preslii, Walp. Rep. i. 340.—Mexic.

pyrolaefolia, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 190.—Ins. Sandvic.

reticulata, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 231.—Ins. Galapag.

rotundifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 151 = *Preslii*.

rotundifolia, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 65.—Bras.

sericea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 214.—Ecuador.

surinamensis, Turcz. l. c. xxxvi. (1863) i. 571.—Guian.

terminalis, Vell. Fl. Flum. 275 ; vii. t. 7 = *Turnera ulmifolia*.

viscosissima, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 150.—Bras.

WANGENHEIMIA, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. x. 536 (1810) = *Gilibertia*, Ruiz & Pav. (Araliac.).
umbellata, F. G. Dietr. l. c. 537 = *G. umbellata*.

WANGENHEIMIA, Moench, Meth. 200 (1794). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1170.

disticha, Moench, l. c. = *Hispan*.

Lima, Trin. Fund. Agrost. 132 = *disticha*.

WARBURTONIA, F. Muell. Fragm. i. 229 t. 9 (1859) = *Hibbertia*, Andr. (Dillen.).
potentillina, F. Muell. l. c. 230. t. 9 = *H. grossulariaefolia*.

WARCZEWICZELLA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 635 = *Zygopetalum*, Hook. (Orchid.).

amazonica, Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia, ii. (1854) 97 = *Z. amazonicum*.

aromatica, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 654 = *Z. aromaticum*.

candida, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 636 = *Z. candidum*.

cochlearis, Reichb. f. l. c. 714 = *Z. cochleare*.

discolor, Reichb. f. l. c. 636 = *Z. discolor*.

Lueddemanniana, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 179 = *Z. Lueddemanniana*.

marginata, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 636 = *Z. marginatum*.

picta, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) ii. 8 = *Z. pictum*.

velata, Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia, ii. (1854) 97 = *Z. velatum*.

vittata, Gard. Chron. (1878) ii. 627, sphalm. = *prae*.

Waillesiana, E. Morr. Belg. Hort. xxviii. (1878) 183. t. 10. f. 1 = *Z. Waillesianum*.

WARCZEWITZIA, Skinner, in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850–51) 45 = *Catasetum*, Rich. (Orchid.).

WAREA, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 127 = *Biswarea*, Cogn. (Cucurb.).

tonglensis, C. B. Clarke, l. c. 129 = *B. tonglensis*.

WAREA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 83. t. 10. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 80.

amplexifolia, Nutt. l. c. = *Am. bor.*

cuneifolia, Nutt. l. c. 84.—*Am. bor.*

WARIA, Aubl. Pl. Gui. i. 604. t. 243 (1775) = *Uvaria*, Linn. (Anonac.).

zeylanica, Aubl. l. c. 604 = *Uvaria zeylanica*.

zeylanica, Aubl. l. c. t. 243 = *Unona discolor*.

WARIONIA, Benth. & Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) 165. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 474.

Saharae, Benth. & Coss. l. c. 166.—*Afr. bor.*

WARMINGIA, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 281 (1874) = *Spondias*, Linn. (Anacard.).

pauciflora, Engl. l. c. = *S. purpurea*.

WARMINGIA, Reichb. f. *Otia Bot. Hamb.* 87 (1881).
ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 477.
 Eugenii, Reichb. f. l. c.—Bras.

WARNERA, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. (1768) =
Hydrastis, Ellis (Ranunc.).
canadensis, Mill. l. c. = *H. canadensis*.
diphylla, Rafin. Med. Fl. i. 253 = *H. canadensis*.
tinctoria, Rafin. l. c. = *H. canadensis*.

WARREA, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 14. *ORCHI-*
DEAE, Benth. & Hook. f. iii. 545.
bahiensis, Hort. ex Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852)
 931 = *Paradisanthus bahiensis*.
bidentata, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 76; et in
 Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 73.—N.
 Granat.
candida, Lindl. & Paxt. l. c. 32 = *Zygopetalum*
candidum.
cinerea, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 321,
 sphalm. = *Aganisia cyanea* (in Addend.).
cyanea, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 2; (1845) t. 28
 = *Aganisia cyanea* (in Addend.).
digitata, Lem. Illustr. Hort. iii. (1856) Misc. 70; iv.
 (1857) t. 152 = *Zygopetalum Wailesianum*.
discolor, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iv. (1849) 265 =
Zygopetalum discolor.
Lindeniana, Henfrey, in Moore & Ayres, Gard. Mag.
 Bot. i. (1850) 177 = *bidentata*.
marginata, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 636 =
Zygopetalum marginatum.
quadrata, Lindl. in Gard. Chron. (1853) 647 = *Zygope-*
talum marginatum.
tricolor, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 14.—Bras.
unijugata, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1855) 22
 = *tricolor*.
Wailesiana, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iv. (1849) 264
 = *Zygopetalum Wailesianum*.

WARSCIEWICZELLA, Reichb. f. *Xenia Orch.* i. 61, in
 obs. (1858) = *WARCIEWICZELLA*, Reichb. f. =
Zygopetalum, Hook. (Orchid.).

WARSEWICZELLA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 543
 (1880) = *praec.*

WARSZEWICZIA, Klotzsch, in Monatsb. Akad.
 Berl. (1853) 496. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f.
 ii. 48.
coccinea, Klotzsch, l. c. 497.—Am. trop.
macrophylla, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854)
 72 = *coccinea*.
maynensis, Wedd. l. c. = *coccinea*.
peltata, Wedd. l. c. 73.—N. Granat.
Poeppigiana, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1853)
 497 = *coccinea*.
pulcherrima, Klotzsch, l. c. = *coccinea*.
Schomburgkiana, Klotzsch, l. c. = *coccinea*.
splendens, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 72
 = *coccinea*.

WARTHEMIA, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 74 (1845) =
WARTHEMIA, DC. = *Iphia*, Cass. (Compos.).

WARTMANNIA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-
 66) 218 = *Homalanthus*, A. Juss. (Euphorb.).
stillingiaefolia, Muell. Arg. l. c. 219 = *H. stillingi-*
folius.

WASHINGTONIA, H. Wendl. in Bot. Zeit. xxxvii.
 (1879) 68. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 923.
filifera, H. Wendl. l. c.—Calif.
robusta, H. Wendl. in Berl. Garten-Zeit. ii. (1883)
 198; et in Rev. Hort. (1885) 401. f. 73 = *filif-*
era?

WASHINGTONIA, Winsl. in Calif. Farm. (Sept.
 1854); ex Hook. Kew Journ. vii. (1855) 29 =
Sequoia, Endl. (Conif.).
americana, Hort. ex Gord. Pinet. Suppl. 106 = *S.*
gigantea.
californica, Winsl. in Calif. Farm. (Sept. 1854); ex
 Hook. Kew Journ. vii. (1855) 29 = *S. gigantea*.
gigantea, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 217 = *S.*
gigantea.

VOL. II.

WATSONIA, Mill. Gard. Dict. ed. VII (1759). *IRI-*
DEAE, Benth. & Hook. f. iii. 705.
BEILIA, Eckl. Top. Verz. 43 (1827).
LOMENIA, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788)
 74. t. 5.
MERIANA, Trew, Pl. Sel. Ehret. 11. t. 40 (1750).
NEUBERIA, Eckl. Top. Verz. 37 (1827).
VALSONICA, Scop. Ann. iv. Hist. Nat. 97 (1770).
aletroides, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 533.—Afr. austr.
amoena, Pers. Syn. i. 43 = *Gladiolus hirsutus*.
angusta, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i.
 (1804) 230.—Afr. austr.
atrosanguinea, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 738 =
angusta.
brevifolia, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 601.—Afr. austr.
campanulata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv.
 (1882) 354 = *Ixia columellaris*.
coccinea, Herb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi.
 (1877) 158.—Afr. austr.
compacta, Lodd. Bot. Cab. t. 1577 = *Micranthus*
alopecuroideus.
cylindrica, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 336.—
 Madag.
densiflora, Baker, l. c.—Afr. austr.
dubia, Eckl. Top. Verz. 36 = *W. Meriana*.
erubescens, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub
 t. 631 = *humilis*.
filifolia, E. Mey. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi.
 (1877) 159 = *punctata*.
fulgens, Pers. Syn. i. 42 = *W. Meriana*.
fulgida, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 323 =
angusta.
humilis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Afr. austr.
humilis, Pers. Syn. i. 42 = *Antholyza Merianella*.
hyacinthoides, Pers. l. c. 43 = *brevifolia*.
iridifolia, Eckl. Top. Verz. 35, nomen (Quid?).—Afr.
 austr.
iridifolia, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 600 = *W. Meriana*.
Jacquini, Pers. Syn. i. 42 = *aletroides*.
laccata, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 631; Pers.
 Syn. i. 43 = *humilis*.
Lamarckii, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 570.—Afr. austr.
litura, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)
 353 = *W. Meriana*.
longifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 784 = *Gladiolus*
Ecklonii.
lucens, Pers. Syn. i. 42 = *Antholyza lucidior*.
lucidior, Eckl. Top. Verz. 36 = *Antholyza lucidior*.
maculata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv.
 (1882) 352 = *humilis*.
marginata, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 608.—Afr. austr.
Meriana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1; Ker-Gawl.
 in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 230.—Afr. austr.
Merianella, Eckl. Top. Verz. 36 = *Gladiolus hirsutus*.
minuta, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)
 353.—Afr. austr.
natalensis, Eckl. Top. Verz. 34 = *Gladiolus psitta-*
cinus.
palustris, Pers. Syn. i. 43 = *Dierama ensifolium*.
pellucida, Eckl. Top. Verz. 36 = *coccinea*.
pilosa, Klatt, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. iii. (1885) 200
 = *Antholyza Merianella*.
plantaginea, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 553 =
Micranthus alopecuroideus.
pottbergensis, Eckl. Top. Verz. 36, nomen (Quid?).—
 Afr. austr.
praecox, Pers. Syn. i. 42 = *Antholyza revoluta*.
punctata, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i.
 (1804) 229.—Afr. austr.
racemosa, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)
 354 = *Ixia columellaris*?
recurva, Pers. Syn. i. 43 = *Antholyza revoluta*.
retusa, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)
 354.—Afr. austr.
revoluta, Pers. Syn. i. 42 = *Antholyza revoluta*.
rosea, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804)
 230.—Afr. austr.
roseo-alba, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 537 = *W.*
Meriana.
rubens, Ker-Gawl. l. c. t. 1072 = *punctata*.
spicata, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i.
 (1804) 229 = *Micranthus alopecuroideus*.
striata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)
 352 = *rosea*.
stricta, Spreng. Nov. Prov. 43.—Afr. austr.
strictiflora, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1406.—Afr. austr.
subulata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)
 353 = *punctata*.

WATSONIA :—
tabularis, Eckl. Top. Verz. 35, nomen (Quid?).—
 Afr. austr.
tigrina, Eckl. l. c. 36, nomen (Quid?).—Afr. austr.
triticea, Spreng. Syst. i. 150 = *punctata*, *Micranthus*
alopecuroideus.
tubulosa, Drège, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi.
 (1877) 158 = *humilis*.
tubulosa, Eckl. Top. Verz. 36 = *marginata*.
tubulosa, Pers. Syn. i. 42 = *aletroides*.

WATTAKAKA, Hassk. in Flora, xl. (1857) 99 =
Dregea, E. Mey. (Asclep.).
pubescens, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 496.—Java.
viridiflora, Hassk. in Flora, xl. (1887) 99 = *D. volu-*
bilis.

WEBBIA, DC. Prod. v. 72 (1836) = **Vernonia**, Schreb.
 (Compos.).
aristata, DC. l. c. 73 = *V. natalensis*.
elaegnoides, DC. l. c. = *V. Kraussii*.
hirsuta, DC. l. c. = *V. hirsuta*.
nudicaulis, DC. l. c. = *V. Dregeana*.
oligocephala, DC. l. c. = *V. Kraussii*.
pinifolia, DC. l. c. 72 = *V. pinifolia*.
serratuloides, DC. l. c. = *V. Perrottetii*.
Smithiana, DC. l. c. = *V. Smithiana*.

WEBBIA, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 970 (1843) =
Conyza, Linn. (Compos.).
Kraussii, Sch. Bip. l. c. 971 = *C. obscura*.

WEBBIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 356
 = **Hypericum**, Tourn.
canariensis, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 48 =
H. canariense.
floribunda, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836)
 356 = *H. floribundum*.
heterophylla, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 409 = *H.*
canariense.
platypetala, Spach, l. c. 410, sphalm. = *seq.*
platysepala, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836)
 356 = *H. canariense*.

WEBERA, Cramer, Disp. Syst. 38 (1803) = **Electronia**,
 Linn. (Rubiace.).

WEBERA, J. F. Gmel. Syst. 820 (1791) = **Bellucia**,
 Neck. (Melastom.).
quinquenervia, J. F. Gmel. l. c. = *B. Aubletii*.

WEBERA, Schreb. Gen. 794 (1791) = **Tarenna**, Gaertn.
 (Rubiace.).
asiatica, Bedd. Forest. Man. Bot. 133 = *T. zeylanica*.
attenuata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 104.—China.
auriculata, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 537
 = *Anomanthodia auriculata*.
bispinosa, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 49 = *Randia*
longiflora.
campaniflora, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 106.—
 Ind. or.
canarica, Hook. f. l. c.—Ind. or.
cerifera, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 19 = *T. zeylanica*.
coriacea, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 784 = *grandi-*
folia.
corymbosa, Sm. ex Wight & Arn. Prod. 429 = *Ixora*
parviflora.
corymbosa, Willd. Sp. Pl. i. 1224 = *T. zeylanica*.
costata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 103.—Malaya.
Cumingiana, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 178.—
 Ins. Philipp.
cymosa, Willd. Sp. Pl. i. 1224 = *Electronia didyma*.
Dallachiana, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 412.
 —Austral.
densiflora, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 536
 = *Randia densiflora*.
disperma, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 102.—Reg.
 Himal.
expandens, F. Muell. Fragm. vi. 25.—Austral.
fasciculata, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 49 = *Randia*
fasciculata.
fragrans, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 103.—Malaya.
glomeriflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng xli. (1872)
 ii. 311 = *T. zeylanica*.
grandifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 105.—
 Malaya.
Helferi, Hook. f. l. c. 107.—Burma.
hispidula, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 137.—
 Madag.

WEBERA:—

- Kurzii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 105.—Ins. Andam. et Nicobar.
lanceolata, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 19 = *Plectronia didyma*.
longiflora, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 48 = *Randia longiflora*.
longifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 105.—Ins. Penang.
lucens, Hook. f. l. c. 106.—Ind. or.
luzoniensis, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 179.—Ins. Philipp.
macrophylla, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 697 = *odorata*.
Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 103.—Malacca.
mollis, Hook. f. l. c. 104.—Malaya.
mollissima, Benth. ex Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 105.—China.
monosperma, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 103.—Ind. or.
myrtifolia, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 49.—Burma.
nilagirica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 106.—Ind. or.
odorata, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 699.—Reg. Himal.; Penang.
oppositifolia, Roxb. II. cc. 85; 698 = *Randia densiflora*.
pavettoides, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 95, in nota sub *Kraussia*.—Afr. trop.
pumila, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 103.—Reg. Himal.
scandens, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 698 = *Randia longiflora*.
sechellensis, Baker, Fl. Maurit. 139.—Ins. Seychelles.
siamensis, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 48 = *Randia longiflora*.
stellulata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 104.—Malaya.
subsessilis, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 166.—Ins. Bonin.
sumatrana, Boerl. in Veth, Midden-Sumatra, iv. II. Flora, 21.—Sumatra.
tetrandra, Wall. Cat. n. 8265 = *Plectronia Rheedii*.
tetrandra, Willd. Sp. Pl. i. 1224 = *Plectronia parviflora*.
thyrsoides, Roth, Nov. Pl. Sp. 149 = *Wendlandia Notoniana*.
truncata, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 538 = *Trisciadia truncata*.
Wallichii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 105.—Ins. Penang.

WEDDELLINA, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi (1849) 113. *PODOSTEMACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 109.
squamulosa, Tul. l. c.—Guian.
uaupensis, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 109.—Bras.

WEDELA, Steud. Nom. ed. II. ii. 784 (1841), sphalm. = **VEDELA**, Adans. = *Ardisia*, Sw. (Myrsin.).

WEDELIA, Jacq. Enum. Pl. Carib. 8 (1760); Select. Am. 217 (1763). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 370.
ANTHEMIOPSIS, Boj. ex DC. Prod. v. 547, 548 (1836).
MENOTRICHE, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 472 (1863).
NIEBUHRIA, Neck. Elem. i. 30 (1790).
STEMMODONTIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 11.
TRICHOSTEMMA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. (1827) 399, 409.
TRICHOSTEPHIUM, Cass. l. c. lv. 266, in obs. (1828).
TRICHOSTEPHUS, Cass. l. c. lx. 618 (1830).
WOLLASTONIA, DC. ex Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 414 (Herb. Tim. Desc. 86).
abyssinica, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 327.—Afr. trop.
acapulcensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 215.—Mexic.
acuminata, DC. Prod. v. 541.—Cuba.
affinis, DC. l. c.—Ins. S. Thomas (Ind. occ.).
africana, Beauv. Fl. Owar. ii. 19. t. 69.—Afr. trop.
alagoënsis, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 187.—Bras.
alutacea, Pohl, ex Baker, l. c. 200 = *Aspilina asperima*.

WEDELIA:—

- ambigua*, DC. Prod. v. 541.—Ins. Guadaloup.
aristata, Less. in Linnaea, vi. (1831) 160.—Ins. Molucc.
asperima, Benth. Fl. Austral. iii. 539.—Austral.
aurea, D. Don, ex Hook. Bot. Mag. t. 3384 = *Zexmenia aurea*.
bengalensis, Rich. in Pers. Syn. ii. 490 = *calendulacea*.
biflora, C. B. Clarke, Comp. Ind. 137 = *Wallichii*.
biflora, DC. in Wight, Contrib. 18.—Geront. trop.
brachycarpa, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 181.—Paraguay.
brachylepis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 190.—Reg. Argent.
buphtalmiflora, Lor. in Roca, Exped. Rio-Negro, ii. 237.—Patagon.
buphtalmoides, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 235.—Ind. occ.
calendulacea, Less. Syn. Comp. 222.—As. et Austral. trop.
calendulacea, Rich. in Pers. Syn. ii. 490 = *hispida*.
calycina, Rich. l. c. = *affinis vel acapulcensis*.
calycina, Spreng. Syst. iii. 580 = *ambigua*.
caracasana, DC. Prod. v. 541 = *Zexmenia caracasana*.
caribaea, Spreng. Syst. iii. 580 = *cruciana*.
carnosa, Pers. Syn. ii. 490.—Am. trop.
Chamissonis, Less. in Linnaea, vi. (1831) 161.—Ins. Guahan.
chrysostephana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 190.—Reg. Argent.
cordata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 435 = *Gymnolomia patens*.
cordifolia, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 261 = *Calea hispida*.
crenata, Rich. in Pers. Syn. ii. 490 = *carnosa*.
cruciana, Rich. in Pers. l. c.—Ind. occ.
Cunninghami, DC. Prod. v. 540 = *urticifolia*.
discoidea, Less. in Linnaea, vi. (1831) 728 = *Eleutheranthera ovata*.
ecliptoides, F. Muell. Pl. Vict. sub t. 39 = *Eclipta platyglossa*.
Ehrenbergii, Less. in Linnaea, vi. (1831) 729.—Ins. S. Doming.
elongata, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 121.—Madag.
equatorialis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 350, in obs.—Am. trop.
filipes, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 170.—Guatemala.
Forsteriana, Endl. Prod. Fl. Norf. 51.—Ins. Norfolk.
fruticosa, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28 = *frutescens*.
frutescens, Hook. f. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 439 (an *tenuicaulis*?).—Ins. Galapag.
frutescens, Jacq. Select. Am. 217. t. 130.—N. Granat.
frutescens, Sieber, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 372 = *Sieberi*.
frutescens, Spreng. ex DC. Prod. v. 541 = *reticulata*.
Gaudichaudii, DC. Prod. v. 542.—Peruv.
goyazensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 288.—Bras.
gracilis, Rich. in Pers. Syn. ii. 490.—Ind. occ.
grandiflora, Benth. Bot. Voy. Sulph. 115.—Ecuador.
helianthoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 216 = *Zexmenia helianthoides*, Benth. & Hook. f. hispida, H. B. & K. l. c. 215.—Mexic.
Hookeriana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 289.—Bras.
Horsfieldiana, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 371.—Java.
humilis, Schweigg. Enum. Pl. Hort. Regiom. 79.—Hab.?
Jacquini, Rich. in Pers. Syn. ii. 490 = *reticulata*.
laevissima, Less. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 202 = *Aspilina laevissima*.
lanceolata, DC. Prod. v. 541.—Ins. Porto Rico.
latifolia, DC. l. c. 542.—Am. austr.
linearifolia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 182.—Bras.
linearis, Zoll. in Flora, xxx. (1847) 534.—Java.
longifolia, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 182.—Bras.
Lundii, DC. Prod. v. 539.—Bras.
macrodonata, DC. l. c.—Bras.
Menotriche, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 377.—Afr. trop.
minor, Hornem. Hort. Hafn. 855 = *Melampodium paludosum*.
modesta, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 185.—Bras.
mollis, Pers. Syn. ii. 490.—Am. austr.

WEDELIA:—

- mossambicensis*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873) 97.—Afr. trop.
natalensis, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 63.—Afr. austr.
oblongifolia, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 256 = *Calea Candolleana*.
oligocephala, Baker, l. c. 182.—Bras.
ovatifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 61 = *Melampodium paludosum*.
pallida, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 288 = *macrodonata*.
paludicola, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 50.—Cuba.
paludosa, DC. Prod. v. 538.—Bras.
paniculata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 69.—Ecuador.
parviflora, Rich. in Pers. Syn. ii. 490.—Ins. Guadaloup.
pedunculosa, DC. Prod. v. 484, sphalm. = *paludosa*.
perfoliata, Willd. Sp. Pl. iii. 2335 = *Melampodium perfoliatum*.
phyllocephala, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 170.—Guatemala.
pilosa, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 181.—Bras.
Pohlui, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 183 = *Vauthieri*.
populifolia, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 435.—Nicaragua.
pratensis, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 121.—Madag.
psammophila, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 50.—Bras.
puberula, DC. Prod. v. 540.—Bras.
pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 214.—Am. austr.
pumila, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 194 = *Aspilina procumbens*.
radiosa, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 610.—Bras.
reticulata, DC. Prod. v. 540.—Ins. Porto Rico.
reticulata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 154 = *Zexmenia reticulata*.
rudis, Benth. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 189 = *Zexmenia rudis*.
scaberrima, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 110.—Guian.
scaberrima, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 307, sphalm., in syn. = *Wallichii*.
scaberrima, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 255 = *Calea elongata*.
scandens, C. B. Clarke, Comp. Ind. 136 (excl. syn.) = *biflora*.
scandens, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 125 = *subvelutina*.
Schultziana, Mig. Fl. Ind. Bat. ii. 69.—Ins. Bali.
Serra, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 184 = *macrodonata*.
serrata, Rich. in Pers. Syn. ii. 490.—Ins. S. Doming.
sessilifolia, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 196 = *Aspilina reflexa*.
sessilifolia, Pohl, ex Baker, l. c. 180 = *paludosa*.
Sieberi, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 372, in obs.—Ind. occ.
spilanthoides, F. Muell. Fragm. v. 64.—Austral.
strigosa, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 435 = *Aspilina strigosa*.
subflexuosa, Hook. & Arn. l. c. = *Gymnolomia subflexuosa*.
subvelutina, DC. Prod. v. 540.—Bras.
tenuicaulis, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 213 = *Blainvillea tenuicaulis*.
titicacensis, Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 269 = *Villanova titicacensis*.
Trichostemma, Steud. Nom. ed. II. ii. 703, in syn., sphalm. = seq.
Trichostephia, DC. Prod. v. 540.—Bras.
urticaefolia, DC. in Wight, Contrib. 18.—Ind. or.
Vauthieri, DC. Prod. v. 539.—Bras.
verbesinoides, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 538.—Austral.
veronicaefolia, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 53.—Cuba.
villosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 289, partim.—Bras.
villosa, Gardn. l. c., partim = *alagoënsis*.
Wallichii, Less. in Linnaea, vi. (1831) 162.—Reg. Himal.; Java.
Zollingeriana, Sch. Bip. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 136 = *calendulacea*.

WEDELIA, Loebl. It. Hisp. 180 (1758) = *Allionia*, Loebl. (Nyctag.).
incarnata, Linn. Syst. ed. X. 890.—Am. bor. et austr.
malachroides, Benth. Bot. Voy. Sulph. 114 = *incarnata*.
violacea, Linn. Syst. ed. X. 890.—Venezuela.

WEDELIOPSIS, Planch. ex Benth. in Hook. Niger Fl. 351 (1849) = *Dissotis*, Benth. (Melastom.).

WEHLIA, F. Muell. Fragm. x. 22 (1876). MYRTACEAE.
coarctata, F. Muell. l. c. 23.—Austral.
staminosa, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, iii. (1884) 282.—Austral.
thryptomenoides, F. Muell. Fragm. x. 22.—Austral.

WEIGELA, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1780) 137. t. 5 = *Diervilla*, Tourn. (Caprifol.).
alba, Carr. in Rev. Hort. (1861) 331 = *D. florida*.
amabilis, Hort. ex Carr. l. c. Sér. IV. ii. (1853) 305 = *D. florida*.
biformis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 42 = *D. coraënsis*.
candida, Carr. in Rev. Hort. (1879) 130.—Hab.?
coraënsis, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 331 = *D. coraënsis*.
Desboisii, Carr. in Rev. Hort. (1861) 332 = *D. coraënsis*.
excelsa, Carr. l. c. (1873) 279.—Hab.?
fallax, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 128.—Java.
floribunda, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Pétersb. xiii. (1855) 219 = *D. floribunda*.
florida, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 241 = *D. florida*.
Groenewegenii, Carr. in Rev. Hort. (1861) 332 = *D. coraënsis*.
hortensis, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Pétersb. xiii. (1855) 219 = *D. hortensis*.
intermedia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 42 = *D. coraënsis*.
Isolinae, Van Houtte, in Fl. des Serres, xiv. (1861) t. 1445 = *D. rosea*.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 90 = *D. japonica*.
Lavallei x, Lescuyer, in Hérincq, L'Hort. Franç. (1870) 145. [t. 5].
Lowii x, Hort. ex Hérincq, l. c. 232.
Metelerkampii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 42 = *D. coraënsis*.
Middendorffiana, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. ii. (1853) 306 = *D. Middendorffiana*.
pauciflora, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1839) 241 = *D. florida*.
rosea, Lindl. in Journ. Hort. Soc. i. (1846) 65, 189. t. 6 = *D. florida*.
splendens, Hort. ex Carr. in Fl. des Serres, viii. (1852-53) 292 = *D. sessilifolia*.
Stelsneri, Van Houtte, l. c. xiv. (1861) 142 = *D. rosea*?

WEIGELIA, Pers. Syn. i. 176 (1805) = *prae*.

WEIGELTIA, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 102 = *Cybianthus*, Mart. (Myrsin.).
Blanchetii, A. DC. in DC. Prod. viii. 115.—Bras.
capitellata, Miq. in Mart. Fl. Bras. x. 300 = *C. myrianthos*.
detergens, Mart. Pl. Med. Bras. Ined. t. 43 = *C. detergens*.
Gardneri, A. DC. in DC. Prod. viii. 115.—Bras.
longifolia, Benth. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. x. 299 = *C. longifolius*.
myrianthos, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 102 = *C. myrianthos*.
obovata, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 21 = *C. obovatus*.

WEIGELTIA, Reichb. Consp. 155 (1828), nomen. LEGUMINOSAE.

WEIHEA, Eckl. Top. Verz. 22 (1827) = *Geissorhiza*, Ker-Gawl. (Irid.).
elatiior, Eckl. l. c. = *G. excisa*.
excisa, Eckl. l. c. = *G. excisa*.

WEIHEA, Reichb. Consp. 212^b (1828) = *Burtonia*, R. Br. (Legumin.).

WEIHEA, Spreng. Syst. ii. 559 (1825). RHIZOPHOREAE, Benth. & Hook. f. i. 681.

ANSTRUTHERIA, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. vi. (1846) 344. t. 4.

RICHAEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 25 (1806).
africana, Benth. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 410.—Afr. trop.

Azelii, Oliver, l. c. 411.—Afr. trop.
ceylanica, Hensl. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 441 = *zeylanica*.

lanceolata, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 39.—Ins. Comor.

leptoclada, Baill. l. c.—Madag.
madagascariensis, Spreng. Syst. ii. 594.—Madag.
microphylla, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 39.—Madag.

myriocarpa, Baill. l. c.—Madag.
ovata, Baill. l. c.—Ins. Comor.

phocotricha, Baill. l. c.—Madag.
plumosa, Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 411.—Afr. trop.

sessiliflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 341.—Madag.

zeylanica, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 38.—Zeylan.

WEILBACHIA, Klotzsch & Oerst. in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 119. t. 11 A = *Begonia*, Tourn.

pustulata, Klotzsch, l. c. 121 = *B. pustulata*.
reptans, Klotzsch & Oerst. l. c. 120 = *B. reptans*.

WEINGAERTNERIA, Bernh. Syst. Verz. Erf. 23, 51 (1800) = *Corynephorus*, Beauv. (1812) (Gramin.).
canescens, Bernh. l. c. 51 = *C. canescens*.

WEINGARTNERIA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 95, sphalm. = *prae*.

WEINMANNIA, Linn. Syst. ed. X. 1005 (1759). SAXIFRAGEAE, Benth. & Hook. f. i. 653.

ARNOLDIA, Blume, Bijdr. 868 (1826).
 LEOSPERMUM, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 91.

PTEROPHYLLA, D. Don, l. c. 93 (1830).
 WINDMANNIA, P. Br. Hist. Jamaic. 212 (1756).

affinis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 674.—Ins. Fiji.

alnifolia, Dombey, ex Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 597 = *heterophylla*.

alpestris, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 183 = *pinnata*.
arbores, Sm. in Rees, Cycl. xxxviii. sub n. 3 = *tinctoria*.

Arnoldia, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 676, in obs. = *Blumei*.

auriculata, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 87 = *dryadifolia*.

australis, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 353 = *Acrophyllum venosum*.

Bulbisan, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 51.—Peruv.

Benthani, F. Muell. Fragm. v. 180 = *Geissois Benthani*.

betulina, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 357 = *sylvicola*.

Biagiana, F. Muell. Fragm. v. 16.—Austral.
bifida, Poepp. ex Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 608.—Peruv.

biglandulosa, A. Cunn. in Hook. Ic. Pl. t. 301 = *Anodopetalum biglandulosum*.

Blumei, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 676, in obs. = *sundana*.

Blumei, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 470.—Java.

Boiviniana, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 154 (*Biviniana*) = *tinctoria*.

Bojeriana, Tul. l. c. 155.—Madag.

brachystachya, Willd. ex Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 606 = *microphylla*.

caripensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 58 = *pinnata*.

chilensis, DC. Prod. iv. 665 = *Caldcluvia paniculata*.

cinerea, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 332.—Peruv.

comorensis, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 153.—Ins. Comor.

cordata, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 87.—Am. austr.

corymbosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 330 = *Caldcluvia paniculata*.

crassifolia, Ruiz & Pav. l. c. t. 331.—Am. austr.

crenata, Presl, Rel. Haenk. ii. 51.—Peruv.

WEINMANNIA:—

decora, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 154.—Madag.

Denhami, Seem. Fl. Vit. 109.—N. Hebrid.

dentata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 334 = *trichosperma*.

dichotoma, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 73.—N. Caled.

dioica, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 13 = *Hippobromus alatus*.

discolor, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 104.—Bras.

diversifolia, Moric. ex Ser. in DC. Prod. iv. 10 = *cinerea*?

dryadifolia, Moric. ex Ser. l. c. 9.—Peruv.

elliptica, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 50.—Peruv.

eriocarpa, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 156.—Madag.

fagaroides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 54.—Peruv.

floribunda, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 138.—Madag.

fraxinea, Sm. ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 93.—Ins. Molucc.

fraxinifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 339.—Madag.

fraxinifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 1095.—Java.

fuchsoides, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 357 = *sylvicola*.

glabra, Lam. Encyc. vii. 578 = *tinctoria*.

glabra, Linn. f. Suppl. 228 = *pinnata*.

glabra, Sieber, ex Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 618 = *hirta*.

glomerata, Presl, Rel. Haenk. ii. 52.—Peruv.

guyanensis, Klotzsch, ex Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 605.—Guian.

Haenkeana, Engl. l. c. 632.—Peruv.

heterophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 53.—N. Granat.

heterophylla, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 331 = *cordata*.

Hildebrandtii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 475.—Madag.

hirsuta, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 89, sphalm. = *seq.*

hirta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 63.—Jamaic.

hirtella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 56.—N. Granat.

Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 718.—Java.

Humboldtii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 475.—Madag.

humilis, Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 620.—Bras.

intermedia, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1836) 555.—Mexic.

Itatiaiae, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 280.—Bras.

Kunthiana, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 86 = *ovata*.

lachnocarpa, F. Muell. Fragm. viii. 7.—Austral.

Lansbergiana, Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 628.—Venezuela.

Lantziana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 472.—Madag.

latifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 51.—Peruv.

latifolia, Willd. ex Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 602 = *macrophylla*.

laurina, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 51.—Am. austr.

Lechleriana, Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 630.—Peruv.

lentiscifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 52.—Peruv.

lucens, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 70.—Madag.

Macgillivrayi, Seem. Fl. Vit. 109.—N. Hebrid.

macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 52.—Ecuador.

macrostachya, DC. ex Ser. in DC. Prod. iv. 10 = *tinctoria*.

madagascariensis, DC. ex Ser. l. c. 9 = *mauritanica*.

marginata, Moric. ex Ser. l. c. 10.—Peruv.

mauritanica, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 88.—Ins. Maur.

microphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 54.—Peruv.

microphylla, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 334 = *parvifolia*.

minutiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 339.—Madag.

nitida, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.—June, 1830) 89 = *hirta*.

WEINMANNIA :—

- oppositifolia*, Willd. ex Engl. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 600 = ovata.
organensis, Gardn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 104.—Bras.
ovalis, DC. ex Engl. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 600 = ovata.
ovalis, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iv. t. 333 = elliptica.
ovata, Cav. *Ic.* vi. 45. t. 566.—Peruv.
ovata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iv. t. 333 = dryadifolia.
paniculata, Cav. *Ic.* vi. 44 = Caldecluvia paniculata.
paniculata, F. Muell. *Fragm.* ii. 83 = Ackama Muellieri.
paniculosa, F. Muell. l. c. 175 = Ackama Muellieri.
parviflora, Forst. *f. Prod.* 26.—Ins. Tahiti.
parviflora, Pers. *Syn.* i. 438 = Clethra guianensis.
parvifolia, Ruiz, ex D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-June, 1830) 89.—Peruv.
paullinaefolia, Pohl, ex Ser. in *DC. Prod.* iv. 11.—Bras.
pentaphylla, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iv. t. 330.—Peruv.
pinnata, Linn. *Syst.* ed. X. 1005.—Am. trop.
pinnata, Ruiz, ex Engl. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 611 = cinerea.
polyphylla, Moric. ex Ser. in *DC. Prod.* iv. 11.—Peruv.
polystachia, Ruiz, ex D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-June, 1830) 90 = subsessiliflora.
producta, Moric. ex Ser. in *DC. Prod.* iv. 11.—Peruv.
pubescens, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 56.—Venezuela.
pubescens, Ruiz, ex D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-June, 1830) 89 = reticulata.
racemosa, Linn. *f. Suppl.* 227; Forst. *f. Prod.* 29.—N. Zel.
reticulata, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iv. t. 332.—Peruv.
rhodoxylon, Tul. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. viii. (1857) 152.—Ins. Marian.
Richii, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 675. t. 85.—Ins. Fiji.
Riviniiana, Engl. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 635, sphalm. = tinctoria.
rosaefolia, A. Cunn. in *Ann. Nat. Hist. Ser. I.* ii. (1839) 358; A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 671 = Ackama rosaefolia.
rubifolia, Benth. *Fl. Austral.* iii. 445.—Austral.
rugosa, Benth. Pl. Hartw. 132 = latifolia.
Rutenbergii, Engl. in *Bremen, Abh.* vii. (1880) 16.—Madag.
sambucina, Ruiz, ex D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-June, 1830) 90 = cinerea.
samoensis, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 677.—Ins. Pacif.
serrata, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 73.—N. Caled.
sessiliflora, Pav. ex Ser. in *DC. Prod.* iv. 11 = producta.
sorbifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 57.—N. Granat.
spatiata, Hook. *f. Fl. N. Zel.* i. 80, err. typ. = seq.
speciosa, Banks & Soland. ex A. Cunn. in *Ann. Nat. Hist. Ser. I.* ii. (1839) 358 = racemosa.
spiraeoides, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 677.—Ins. Fiji.
Spruceana, Engl. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 607.—Ecuador.
subcordata, Moric. ex Ser. in *DC. Prod.* iv. 8.—Peruv.
subsessiliflora, Ruiz & Pav. *Fl. Per.* iv. t. 334.—Am. austr.
sulcata, Engl. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 624.—Ecuador.
sundana, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 718.—Java.
sylvicola, Soland. ex A. Cunn. in *Ann. Nat. Hist. Ser. I.* ii. (1839) 357.—N. Zel.
ternata, Engl. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 603.—Peruv.
tinctoria, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxxviii. n. 2.—Ins. Mascar.
tomentosa, Linn. *f. Suppl.* 227.—N. Granat.
Trianaea, Wedd. *Chlor. And.* ii. 211. t. 72.—N. Granat.
trichosperma, Cav. *Ic.* vi. 45. t. 567.—Peruv.; Chili.
trifoliata, Lam. *Encyc.* vii. 579 = mauritiana.
trifoliata, Linn. *f. Suppl.* 227 = Platylophus trifolius.
trigyna, Baker, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 109.—Madag.
venosa, Knowles & Westc. *Flor. Cab.* ii. (1838) 81 = Acrophyllum venosum.
vitiensis, Seem. *Fl. Vit.* 110.—Ins. Fiji.

WEINREICHIA, Reichb. *Consp.* 152 (1828) = *Pterocarpus*, Linn. (Legumin.).

WEITENWEBERA, Opiz, Seznam, 104 (1852) = *Campanula*, Tourn.
Cervicaria, Opiz, l. c. 105 = *C. Cervicaria*.
glomerata, Opiz, l. c. = *C. glomerata*.

WELDANIA, Schult. *f. in Flora*, xii. (1829) 3. t. 1 A. *COMMELINACEAE*, Benth. & Hook. *f. iii.* 856.
LAMPRA, Benth. Pl. Hartw. 95 (1842).
RUGENDASIA, Schiede, ex Schlecht. *Hort. Halens.* 14 (1841).

candida, Schult. *f. in Flora*, xii. (1829) 3. t. 1 A.—Mexic.
Schultesii, Schlecht. *Hort. Halens.* 14 = *candida*.

WELEZIA, Neck. *Elem.* iii. 394 (1790), sphalm. = *Velezia*, Linn. (Caryoph.).

WELFIA, H. Wendl.—Cf. *Gard. Chron.* (1869) 1236; et ex André, *Illustr. Hort.* xviii. (1871) 93. t. 62. *PALMAE*, Benth. & Hook. *f. iii.* 915.
Georgii, H. Wendl. ex André, l. c. 94.—Costa Rica.
regia, H. Wendl.—Cf. *Gard. Chron.* (1869) 1236; et ex André, l. c. 93. t. 62.—N. Granat.

WELLINGTONIA, Lindl. in *Gard. Chron.* (1853) 819, 823 = *Sequoia*, Endl. (Conif.).
californica, Sargent, *Rep. For. N. Am. (U. St. Census, ix.)* 184 = *S. gigantea*.
gigantea, Lindl. in *Gard. Chron.* (1853) 819, 823 = *S. gigantea*.

WELLINGTONIA, Meissn. *Gen. Comm.* 207, in nota (1840) = *Meliosma*, Blume (Sabiace.).
Arnottiana, Meissn. l. c. = *M. Arnottiana*.

WELLSTEDIA, Balf. *f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 407. *BORAGINEAE*.
socotrana, Balf. *f. l. c.* 408.—Ins. Socotra.

WELWITSCHIA, Hook. *f. in Gard. Chron.* (1862) 71; et in *Trans. Linn. Soc.* xxiv. (1863) 6. tt. 1-14. *GNETACEAE*, Benth. & Hook. *f. iii.* 418.
TOUMBOA, Naud. in *Rev. Hort.* (1862) 186.
TUMBOA, Welw.—Cf. *Gard. Chron.* (1861) 75, nomen prius.
Bainesii, Carr. *Conif. ed. II.* 783 = *mirabilis*.
mirabilis, Hook. *f. in Trans. Linn. Soc.* xxiv. (1863) 7.—Afr. trop.

WELWITSCHIA, Reichb. *Handb.* 194 (1837) = *Gilia*, Ruiz & Pav. (Polemon.).

WENDEROTHIA, Schlecht. in *Linnaea*, xii. (1838) 330 = *Canavalia*, DC. (Legumin.).
discolor, Schlecht. l. c. 331 = *C. villosa*.
glabra, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 193.—Mexic.
hirsuta, Mart. & Gal. l. c. 192.—Mexic.
pilosa, Mart. & Gal. l. c. 191.—Mexic.

WENDIA, Hoffm. *Gen. Pl. Umbell.* ed. I. 136 (1814) = *Heracleum*, Linn. (Umbell.).
alpina, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 268 = *H. alpinum*.
austriaca, Schur, l. c. = *H. austriacum*.
Chorodanum, Hoffm. *Gen. Pl. Umbell.* ed. I. 139. t. 1 = *H. Chorodanum*.
siifolia, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 268 = *H. austriacum*.

WENDLANDIA, Bartl. *Ord.* 211 (1830); et ex DC. *Prod.* iv. 411. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. *f. ii.* 50.

SESTINIA, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I.* iii. 55 (1843).
angustifolia, Wight, ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* iii. 40.—Ind. or.

appendiculata, Wall. ex Hook. *f. l. c.* 38 = *puberula*.
bicuspidata, Wight & Arn. *Prod.* 403 = *Notoniana*.
bifaria, Wall. *Cat. n.* 6278 = *Urophyllum hirsutum*.
budleoides, Wall. in *Wight & Arn. Prod.* 402 = *tinctoria*.
cinerea, DC. *Prod.* iv. 412; Wall. *Cat. n.* 6268 = *exserta*.
coriacea, DC. l. c.—Reg. Himal.
corymbosa, DC. l. c. 413; Wall. *Cat. n.* 6276 = *Greenia Jackii*.

WENDLANDIA :—

- dasythyrsa*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 159.—Java.
densiflora, DC. *Prod.* iv. 412 (dentiflora).—Java.
exserta, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 104 = *paniculata*.
exserta, DC. *Prod.* iv. 411.—Ind. or.
glabrata, DC. l. c.—As. trop.
glomerulata, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 310.—Burma.
Heyneana, Wall. *Cat. n.* 6274; et ex Wight & Arn. *Prod.* 403 = *glabrata*.
Junghuhniana, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 159.—Java.
Kotschyi, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I.* iii. 55.—Kurdist.
laevigata, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 346 = *glabrata*.
Lawii, Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* iii. 40.—Ind. or.
Lawsoniae, DC. *Prod.* iv. 413.—Cochinch.
ligustrina, Wall. *Cat. n.* 6272.—Burma.
longifolia, DC. *Prod.* iv. 412 = *Adenosacme longifolia*.
luzoniensis, DC. l. c. = *paniculata*.
malayana, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 519 = *Adenosacme longifolia*.
multiflora, Bartl. ex DC. *Prod.* iv. 412 = *paniculata*.
nitens, Wall. *Cat. n.* 6271.—Burma.
Notoniana, Wall. l. c. n. 6273; et ex Wight & Arn. *Prod.* 403.—Ind. or.
paniculata, DC. *Prod.* iv. 411.—Ind. or.; Malaya.
pendula, DC. l. c. 412.—Reg. Himal.
pilosa, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 519 = *Bertiera africana*.
proxima, DC. *Prod.* iv. 411 = *tinctoria*.
puberula, DC. l. c. 412.—Reg. Himal.; Burma.
racemosa, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 519 = *Bertiera macrocarpa*.
rufescens, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 160.—Java.
scabra, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 310 = *puberula*.
scandens, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 520 = *Rondeletia scandens*.
secunda, Griff. *Notul.* iv. 266 = *Greenia Wightiana*.
spicata, DC. *Prod.* iv. 412 = *Greenia Jackii*.
sulcata, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 519.—Afr. trop.
sumatrana, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 159 = *glabrata*.
tenuiflora, Miq. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* iii. 39 = *glabrata*.
tetrandra, DC. *Prod.* iv. 412 = *Hedyotis macrophylla*.
Teysmanniana, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 346.—Sumatra.
thyrsoides, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 786 = *Notoniana*.
tinctoria, DC. *Prod.* iv. 411.—Reg. Himal.; Burma.
trichantha, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 347.—Java.
uvatifolia, Hance, in *Journ. Bot.* viii. (1870) 73 = *paniculata*.
virgata, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 519 = *Pouchetia africana*.
Wallichii, Wight & Arn. *Prod.* 402, in obs.—Reg. Himal.
Wightiana, Wall. *Cat. n.* 6277 = *Greenia Wightiana*.

WENDLANDIA, Willd. *Sp. Pl.* ii. 275 (1799) = *Cocculus*, DC. (1818) (Menisip.).
caroliniana, Nutt. *Gen. Am.* i. 241 = *C. carolinus*.
populifolia, Willd. *Sp. Pl.* ii. 275 = *carolinus*.

WENDTIA, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 328 (1844) = WENDIA, Hoffm. = *Heracleum*, Linn. (Umbellif.).

WENDTIA, Meyen, *Reise*, i. 307 (1834). *GERANIACEAE*, Benth. & Hook. *f. i.* 275.
HYPERUM, Presl, *Epim. Bot.* 211 (1850).
MARTINIERA, Guill. in *Deless. Ic. Sel.* iii. 23. t. 40 (1837).

aphanifolia, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 71.—Reg. Argent.
argentea, Griseb. l. c. 70 = *calycina*.
calycina, Griseb. l. c.—Reg. Argent.
gracilis, Meyen, *Reise*, i. 308.—Chili.
Poeppigiana, Klotzsch, in *Linnaea*, x. (1835-36) 432.—Chili.
Reynoldsii, Endl. in *Walp. Rep.* i. 460.—Chili.

WENSEA, Wendl. *Coll. Pl.* iii. 24. t. 84 (1819) = *Pogostemon*, Desf. (Labiata).
pyramidata, Wendl. l. c. 26. t. 84 = *P. plectrantoides*.

WERNERIA, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 189. tt. 368, 369 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. *f. ii.* 451.
ORESIGONIA, Willd. ex DC. *Prod.* vi. 323 (1837).
ORIBASIA, Moq. & Sesse, ex DC. l. c. (1837).
africana, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 422.—Abyss.

WERNERIA :—

- apiculata*, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen = pygmaea.
aretioides, Wedd. *Chlor. And.* i. 86.—Bolivia.
brachypappa, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1873) 501.—Chili.
brachypappa, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 53, 55, nomen = pygmaea.
caespitosa, Wedd. *Chlor. And.* i. 83.—Peruv.
calyculata, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) i. 204.—Ecuador.
canaliculata, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 52, 53, 55, nomen = staticaefolia, pumila.
carnulosa, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 140.—Peruv.
caulescens, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 208.—Reg. Argent.
celmisoides, Sch. Bip. ex Wedd. *Chlor. And.* i. 82 = staticaefolia.
cherlerioides, Sch. Bip. l. c. 84 = pygmaea.
ciliata, Wedd. ex Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 530 = ciliolata.
ciliolata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 140.—Peruv.
cochlearis, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 208.—Reg. Argent.
cortusifolia, Griseb. l. c. xix. (1874) 194 = Senecio werneroides.
dactylophylla, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 53, 55, nomen; et ex Wedd. *Chlor. And.* i. 87.—Peruv.
densa, Benth. *Pl. Hartw.* 211.—N. Granat.
digitata, Wedd. *Chlor. And.* i. 86.—Peruv.
disticha, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 193. t. 369.—Ecuador.
Ellisii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 357.—Reg. Himal.
frigida, DC. *Prod.* vi. 323, sphalm. = rigida.
glandulosa, Wedd. *Chlor. And.* i. 85.—Peruv.
graminifolia, Benth. *Pl. Hartw.* 211 = pygmaea.
graminifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 192. t. 368. f. 1.—Ecuador.
Haenkei, Sch. Bip. ex Wedd. *Chlor. And.* i. 83, in obs. = caespitosa.
heteroloba, Wedd. l. c. 88.—Peruv.
humilis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 191.—Ecuador.
Lechleri, Sch. Bip. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 57.—Peruv.
Mandoniana, Wedd. ex Sch. Bip. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 80, nomen.—Bolivia.
melanandra, Wedd. *Chlor. And.* i. 88.—Bolivia.
minima, Walp. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 277 = pygmaea.
Mocinniana, DC. *Prod.* vi. 324.—Mexic.
nana, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 451.—Reg. Himal.
nubigena, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 193.—Ecuador.
nuda, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 139 = Orbignyana.
Orbignyana, Wedd. *Chlor. And.* i. 85.—Bolivia; Peruv.
pinnatifida, Remy, in C. Gay, *Fl. Chil.* iv. 216.—Chili.
plantaginifolia, Wedd. ex Sch. Bip. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 80, nomen.—Bolivia.
pumila, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* Am. iv. 192. t. 368. f. 2.—Ecuador.
pygmaea, Gill. ex Hook. ex Arn. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 348.—Chili; Peruv.
rhizoma, Remy, in C. Gay, *Fl. Chil.* iv. 215 = pygmaea.
rigida, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 191.—Ecuador.
setosa, Wedd. ex Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865–66) 530 = strigosissima.
solivaefolia, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 53, 55, nomen; et ex Wedd. *Chlor. And.* i. 87.—Peruv.
spathulata, Wedd. l. c. 85.—Bolivia.
staticaefolia, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 53, 55, nomen; et ex Wedd. l. c. 81.—Peruv.
strigosissima, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 140.—Peruv.
villosa, A. Gray, l. c. 139.—Peruv.

WERNISEKIA, Scop. *Introd.* 273 (1777) = **Humiria** Aubl.

WERRINUWA, Heyne, *Tracts on India*, 49 (1814) = **Guizotia**, Cass. (Compos.).

WESTIA, Vahl, in *Skrivt. Nat. Selsk.* vi. (1810) 117. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 583.
grandiflora, Vahl, l. c. 118.—Afr. trop.
parviflora, Vahl, l. c. 119.—Afr. trop.

WESTONIA, Spreng. *Syst.* iii. 152, 230 (1826) = **Rothia**, Pers. (Legumin.).
humifusa, Spreng. l. c. 230 = R. trifoliata.

WESTRINGIA, Sm. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1797) 171; et *Tracts*, 279. t. 3 (1798). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1219.

angustifolia, R. Br. *Prod.* 501 = rigida.
brevifolia, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 459.—Tasman.
capitata, Bartl. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 362 = Microcorys capitata.
cephalantha, F. Muell. *Fragm.* vi. 110.—Austral.
cinerea, R. Br. *Prod.* 501 = rigida.
Dampieri, R. Br. l. c.—Austral.
eremicola, A. Cunn. ex Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 459.—Austral.
glabra, R. Br. *Prod.* 501.—Austral.
grandifolia, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* v. 128.—Austral.
grevillina, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 49 = rigida.
longifolia, R. Br. *Prod.* 501.—Austral.
longifolia, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1481 = eremicola.
rigida, R. Br. *Prod.* 501.—Austral.
rosmarinacea, Andr. *Bot. Rep.* t. 214 = rosmariniformis.
rosmariniformis, Labill. ex Benth. in *DC. Prod.* xii. 570 = Dampieri.
rosmariniformis, Sm. in *Vetensk. Akad. Handl. Stockh.* (1797) 171; et *Tracts*, 277. t. 3.—Austral.
rubiaefolia, R. Br. *Prod.* 501.—Tasman.
senifolia, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 49.—Austral.
serpyllifolia, Bartl. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 362 = Microcorys purpurea?
triphylla, Ait. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 681, nomen (Quid?).—Austral.
violacea, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 49 = glabra.

WETRIA, Baill. *Etud. Gén. Enph.* 409 (1858) = **Alchornea**, Sw. (Euphorb.).
trewioides, Baill. l. c. = A. Blumeana.

WETTINIA, Poepp. ex Endl. *Gen.* 243 (1837). **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 902.
augusta, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 39. t. 153.—Peruv.
illaqueans, Spruce, in *Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 191 = Catoblastus maynensis.
maynensis, Spruce, l. c. = Catoblastus maynensis.
Poeppigii, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 109 = augusta.

WHIPPLEA, Torr. in *Pacif. Rail. Rep.* iv. 90 (1856). **SAXIFRAGEAE**, Benth. & Hook. f. i. 644.
modesta, Torr. l. c.—Calif.
utahensis, S. Wats. in *Am. Natural.* vii. (1873) 300 = Fendlera utahensis (in Addend.).

WHITEFIELDIA, Nees, in *DC. Prod.* xi. 220 (1847), sphalm. = **Whitfieldia**, Hook. (Acanth.).

WHITEHEADIA, Harv. *Gen. S. Afr. Pl.* ed. II. 396 (1868). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 807.
bifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 226 = latifolia.
latifolia, Harv. *Gen. S. Afr. Pl.* ed. II. 396.—Afr. austr.

WHITFIELDIA, Hook. *Bot. Mag.* t. 4155 (1845). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1085.
lateritia, Hook. l. c.—Afr. trop.
longifolia, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 27.—Afr. trop.

WHITIA, Blume, *Cat. Gew. Buitenz.* 16 (1823) = **Cyrtandra**, Forst. (Gesner.).
carnosa, Blume, *Bijdr.* 775 = C. carnosa.
longifolia, Blume, *Cat. Gew. Buitenz.* 86 = C. oblongifolia.
oblongifolia, Blume, l. c. 17 = C. oblongifolia.
pilosa, Zipp. ex C. B. Clarke, in *DC. Monog. Phan.* v. 206 = C. oblongifolia.

WHITLAVIA, Harv. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 311 = **Phacelia**, Juss. (Hydroph.).
gloxinioides, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. III. 1226 = P. Whitlavia.
grandiflora, Harv. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 312 = P. Whitlavia.
minor, Harv. l. c. = P. Whitlavia.

WHITLEYA, D. Don, in *News Lit. and Fashion*, iii. 108; ex Sweet, *Brit. Flow. Gard. Ser. I.* t. 125 (1825) = **Scopoia**, Jacq. (Solan.).
stramonifolia, D. Don, l. c. = S. lurida.

WHITNEYA, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* vi. (1865) 549. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 400.
dealbata, A. Gray, l. c. 550.—Calif.

WIASEMSKYA, Klotzsch, in *Bot. Zeit.* iv. (1847) 594, absque desc. **RUBIACEAE** (Quid?).

WIBELIA, Gaertn. Mey. & Scherb. *Fl. Wett.* iii. i. 97 (1801) = **Crepis**, Vail. (Compos.).
chondrilloides, Hoppe & Hornsch. *Tageb.* 278; et ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. ii. 304 = C. chondrilloides.
foetida, Sch. Bip. *Cich.* 64 = C. foetida.
graveolens, Gaertn. Mey. & Scherb. *Fl. Wett.* iii. i. 144 = C. foetida.

WIBELIA, Pers. *Syn.* i. 210 (1805) = **Pappayrola**, Aubl. (Violar.).
brasiliensis, Spreng. *Neue Entdeck.* iii. 63 = P. brasiliensis.
guianensis, Pers. *Syn.* i. 210 = P. guianensis.

WIBELIA, Roehl. *Deutschl. Fl.* ed. II. ii. 426 (1813) = **Chondrilla**, Tourn. (Compos.).
apargioides, Roehl. l. c. = C. Peltidium, stipitata.
hieracioides, Roehl. l. c. 427 = Crepis tectorum?
setosa, Roehl. l. c. 582 = Crepis setosa.

WIBORGIA, Roth, *Catalect. fasc.* ii. 112 (1800) = **Galinsoga**, Ruiz & Pav. (Compos.).
Acmelea, Roth, l. c. = G. parviflora.
armella, Steud. *Nom. ed.* II. i. 656, in syn., sphalm. = praec.
brachystephana, Heynh. *Nom.* ii. 767 = G. brachystephana.
oblongifolia, Hook. *Bot. Misc.* ii. (1831) 226 = G. oblongifolia.
parviflora, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 256 = G. parviflora.
triloba, Spreng. *Nachtr.* i. *Bot. Gart. Halle*, 41 = Tridax trilobata.
urticaefolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 257. t. 389 = Sabazia urticaefolia.

WIBORGIA, Thunb. *Nov. Gen.* x. 137 (1800). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 477.
LOETHAINIA, Heynh. *Nom.* i. 883 (1840), sine char.
PELTARIA, Burm. ex DC. *Prod.* ii. 420 (1825).
angustifolia, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 365 = tenuifolia.
armata, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 91 = spinescens.
cuspidata, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 364.—Afr. austr.
flexuosa, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 28.—Afr. anstr.
floribunda, E. Mey. l. c. = obcordata.
fusca, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 194 = obcordata.
fusca, Thunb. *Nov. Gen.* x. 138.—Afr. austr.
fusca, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 464 = Ralfia cuneifolia.
grandiflora, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 31 = Lebeckia sessilifolia.
heteroclados, E. Mey. l. c. 29 = spinescens.
incurvata, E. Mey. l. c. 31.—Afr. austr.
lanceolata, E. Mey. l. c. 29 = sericea.
monoptera, E. Mey. l. c. 30 = spinescens.
obcordata, Thunb. *Nov. Gen.* x. 137.—Afr. austr.
obcordata, Willd. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 787 = Loddigesia oxalidifolia.
oblongata, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 31 = fusca.
parviflora, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 364, sphalm. = parvifolia.
parvifolia, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 31.—Afr. austr.
sericea, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 194 = obcordata.
sericea, Thunb. *Nov. Gen.* x. 139.—Afr. austr.

WIBORGIA :—

spinescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 194.—Afr. austr.
tenuifolia, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 153.—
 Afr. austr.
tetraptera, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 29 = *tenui-*
folia.

WICHURAEA, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 290 (1847) = *Cryptandra*, Sm. (Rhamn.).
arbutiflora, Nees, l. c. = *C. arbutiflora*.
tubulosa, Nees, l. c. = *C. arbutiflora*.

WICHURAEA, M. Roem. Syn. Ens. 277 (1847) = *Bomarea*, Mirb. (Amaryll.).
acicularis, M. Roem. l. c. 280 = *B. glaucescens*.
andimarcana, M. Roem. l. c. 279 = *B. andimarcana*.
dulcis, M. Roem. l. c. 278 = *B. glaucescens*.
glaucescens, M. Roem. l. c. 279 = *B. glaucescens*.
involuta, M. Roem. l. c. 278 = *B. glaucescens*.
parvifolia, M. Roem. l. c. 279 = *B. glaucescens*.
puberula, M. Roem. l. c. = *B. glaucescens*.

WICHUREA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 383 (1862),
 sphalm. = WICHURAEA, Nees = *Cryptandra*, Sm.
 (Rhamn.).

WICKSTROEMIA, Reichb. Consp. 209 (1828), sphalm.
 = *Wikstroemia*, Schrad. (Thymel.).

WIDDRINGTONIA, Endl. Cat. Hort. Vindob. i. 209
 (1842); Syn. Conif. 31 (1842) = *Callitris*, Vent.
 (Conif.).
Commersonii, Endl. Syn. Conif. 34.—Madag.
cupressoides, Endl. Cat. Hort. Vindob. i. 209 =
C. cupressoides.
ericoides, Knight, Syn. Conif. 13 = *Thuya sphaeroidalis*.
glauca, Carr. Conif. ed. II. 61 = *Thuya orientalis*.
juniperoides, Endl. Syn. Conif. 32 = *C. arborea*.
natalensis, Endl. l. c. 34.—Afr. austr.
Wallichiana, Gord. Pinet. Suppl. 107 = seq.
Wallichii, Endl. Syn. Conif. 34.—Afr. austr.

WIEDEMANNIA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort.
 Petrop. iv. 51 (1837). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f.
 ii. 1210.
erythroricha, Benth. in DC. Prod. xii. 503 = *orientalis*.
multifida, Benth. l. c. —Armenia.
orientalis, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv.
 52.—Armenia.

WIEGMANNIA, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed.
 II. ii. 787 (1841) = *Maerua*, Forsk. (Cappar.).
arabica, Hochst. & Steud. l. c. = *M. crassifolia*.

WIEGMANNIA, Meyen, Reise, ii. 129 (1835) = *Kadua*,
 Cham. & Schlecht. (Rubiace.).
glauca, Meyen, l. c. = *K. cordata*.

WIELANDIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 568. t. 22
 (1858). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f.
 iii. 270.
elegans, Baill. l. c. 569. t. 22.—Ins. Seychelles.
oblongifolia, Baill. l. c. = *Savia oblongifolia*.

WIERZBICKIA, Reichb. Nom. 205 (1841) = *Arenaria*,
 Rupp. (Caryoph.).
laricifolia, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 30. t. 212 =
A. laricifolia.
liniflora, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi.
 (1868) 347 = *A. laricifolia*.
macrocarpa, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 30. t. 211 =
A. laricifolia.
striata, Reichb. l. c. 30 = *A. capillacea*, etc.

WIESTIA, Boiss. Fl. Orient. v. 559 (1884) = *Boissiera*,
 Hochst. (Gramin.).

WIESTIA, Sch. Bip. in Herb. & Winckl. Jahrb. Pharm.
 iv. (1841) 154, in nota = *Lactuca*, Tourn. (Compos.).
acuminata, Sch. Bip. l. c. = *L. acuminata*.
canadensis, Sch. Bip. l. c. = *L. canadensis*.
elongata, Sch. Bip. l. c. = *L. canadensis*.
floridana, Sch. Bip. l. c. = *L. floridana*.
graminifolia, Sch. Bip. l. c. = *L. graminifolia*.
spectabilis, Sch. Bip. l. c. = *L. Scariola*?
tatarica, Sch. Bip. l. c. = *L. tatarica*.
tenerrima, Sch. Bip. l. c. = *L. tenerrima*.
tuberosa, Sch. Bip. l. c. = *L. tuberosa*.
virosa, Sch. Bip. l. c. = *L. virosa*.

WIGANDA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881)
 177 = seq.

WIGANDIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 126
 (1818). *HYDROPHYLLACEAE*, Benth. & Hook. f.
 ii. 831.

COHIBA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 75 (1836).
californica, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 364 =
Eriodictyon glutinosum.
caracasana, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III.
 1225 = *urens*, H. B. & K.
caracasana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 128.—
 Mexic.; Venezuela.
crispa, H. B. & K. l. c. 129.—Ecuador.
herbacea, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833)
 117.—Reg. Argent.
Kunthii, Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1823)
 246 = *urens*, H. B. & K.
leucocephala, Sch. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861)
 180 = *Stoebe leucocephala*.
macrophylla, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vii.
 (1832) 382 = *urens*, H. B. & K.
pruritiva, Spreng. Syst. i. 865 = *crispa*.
scorpioides, Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx.
 (1833) 249.—Mexic.; Nicarag.
urens, Choisy, l. c. 246.—Mexic.
urens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 127.—
 Mexic.
Vigieri, Carr. in Rev. Hort. (1866) 340.—Hab. ?

WIGANDIA, Neck. Elem. i. 95 (1790) = *Disparago*,
 Gaertn. (Compos.).
disparaginoides, Less. Syn. Comp. 362 = *D. lasio-*
carpa.

WIGGERSIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii.
 i. 6, 33 (1801) = *Vicia*, Tourn. (Legumin.).
cuspidata, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 69 = *V.*
cuspidata.
lathyroides, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. i.
 34 = *V. lathyroides*.
lutea, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. 36 = *V. lutea*.
minima, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 69 = *V. lathy-*
roides.
sepium, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. i. 34 =
V. sepium.
sylvatica, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. = *V. sylvatica*.

WIGHTIA, Spreng. ex DC. Prod. v. 67 (1836) =
Centratherum, Cass. (Compos.).
formosa, Spreng. l. c. = *C. molle*.

WIGHTIA, Wall. Pl. As. Rar. i. 71. t. 81 (1830).
SCROPHULARINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 938.
borneensis, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1444.—
 Borneo.
gigantea, Wall. Pl. As. Rar. i. 71.—Reg. Himal.
madagascariensis, Boj. ex Decne. in DC. Prod. viii.
 500 = *Pentopetia androsaemifolia*.

WIGMANNIA, Walp. Rep. vi. 27 (1847), sphalm.
 = WIEGMANNIA, Meyen = *Kadua*, Cham. &
 Schlecht. (Rubiace.).

WIKSTROEMIA, Endl. Prod. Fl. Norf. 47 (1833).
THYMELAEACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 193.
 CAPURA, Linn. Mant. ii. 149 (1771).
 DIPLOMORPHA, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges.
 Regensb. iii. (1841) 289.
androsaemifolia, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 146.—
 Java.
australis, Endl. Prod. Fl. Norf. 47.—Ins. Norfolk.
buxifolia, A. Gray, in Journ. Bot. iii. (1865) 304 =
W. Uva ursi.
Candolleana, Meissn. in DC. Prod. xiv. 544.—Java.
canescens, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. iii.
 (1841) 288.—Reg. Himal.; Zeylan.; China.
Chamaedaphne, Meissn. in DC. Prod. xiv. 547.—
 China.
chinensis, Meissn. l. c. 546 = *canescens*?
coriacea, Seem. Fl. Vit. 206 = *viridiflora*.
Cunninghamii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 545.—Ins.
 Norfolk.
elongata, A. Gray, in Journ. Bot. iii. (1865) 303.—
 Ins. Sandvic.
foetida, A. Gray, l. c. 302 = *viridiflora*.

WIKSTROEMIA :—

Forsteri, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 145 = *viridi-*
flora.
hypericifolia, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.
 iii. (1841) 287 = *Stellera Chamaejasme*.
inamoena, Meissn. in DC. Prod. xiv. 547 = *canescens*.
indica, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.
 i. (1843) 357 = *viridiflora*.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 134.—
 Japon.
Junghuhniana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 879.—Java.
Monnula, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 13.—
 China.
nutans, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. v.
 (1853) 195.—Ins. Hongkong.
ovalifolia, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 146.—Afr.
 austr.
ovata, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.
 i. (1843) 357.—Ins. Philipp.
ovata, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov.
 App. 182 = *viridiflora*.
pauciflora, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 406 =
canescens.
phillyreaefolia, A. Gray, in Journ. Bot. iii. (1865)
 304.—Ins. Sandvic.
retusa, A. Gray, l. c. 303.—Ins. Luchu.
rotundifolia, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad.
 Pétersb. i. (1843) 357.—Ins. Pacif.
salicifolia, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 144. t. 149 =
canescens.
sandwichensis, Meissn. in DC. Prod. xiv. 545.—Ins.
 Sandvic.
Shuttleworthiana, Meissn. l. c. 544 = seq.
Shuttleworthii, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.
 iii. (1841) 287 = *viridiflora*.
sikokiana, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 481.—
 Japon.
Spanoghii, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 146.—Ins.
 Timor.; China?
subspicata, Meissn. in DC. Prod. xiv. 547.—Afr. austr.
tenuiramis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 141, 354.—
 Ins. Banca.
Uva-ursi, A. Gray, in Journ. Bot. iii. (1865) 304.—
 Ins. Sandvic.
virgata, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. iii.
 (1841) 289 = *canescens*.
viridiflora, Meissn. l. c. 286.—As. trop.; Austral.

WIKSTROEMIA, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) 11.
 710 (Wickstroemia) = *Laplacea*, H. B. & K.
 (Ternstr.).
fruticosa, Schrad. l. c. 711 = *L. semiserrata*.
fruticosa, Spreng. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1821)
 168, in obs. = *praece*.

WIKSTROEMIA, Spreng. in Vet. Acad. Handl. Stockh.
 (1821) 167. t. 3; Syst. iii. 434 (1826) = *Eupatorium*,
 Tourn. (Compos.).
glandulosa, Spreng. ll. cc. = *E. Dalea*.

WILBERFORCIA, Hook. f. ex Planch. in Hook. Ic. Pl.
 t. 796 (1848) = *Breweria*, R. Br. (Convolv.).

WILBRANDIA, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828)
 273. *BORAGINEAE*.
paniculata, Berl. l. c. —Ins. Martinic.

WILBRANDIA, Silva Manso, Enum. 30 (1836).
CUCURBITACEAE, Benth. & Hook. f. i. 831.
drastica, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 80 = Riedeli.
ebracteata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 33.—
 Bras.
fluminensis, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii.
 (1863) 109 = Riedeli.
hibiscoides, Silva Manso, Enum. 30.—Bras.
linearis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 34.—Bras.
longibracteata, Cogn. l. c. 32.—Bras.
Riedeli, Silva Manso, Enum. 50.—Bras.
sagittifolia, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 145 =
villosa.
scabra, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 81 = Riedeli.
verticillata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 30 =
 Riedeli.
villosa, Cogn. l. c. 34. t. 7.—Bras.

WILCKEA, Scop. Introd. 170 (1777) = *Vitis*? Linn.
 (Ampel.).

WILCKIA, Scop. Introd. 317 (1777) = **Malcomia**, R. Br. (1812) (Crucif.).
africana, F. Muell. Nat. Pl. Vict. i. 33 = *M. africana*.
maritima, Scop. Introd. 317 = *M. maritima*.

WILDENOWIA, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xi. (1790) 26. t. 2, sphalm. = **Willdenowia**, Thunb. (Restiac.).

WILHELMSIA, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 400 = **Koeleria**, Pers. (Gramin.).
caucasica, C. Koch, l. c. = *K. phleoides*.

WILHELMSIA, Reichb. Consp. 206 (1828) = **Arenaria**, Rupp. (Caryoph.).

WILIBALDA, Sternb. in Flora, ii. (1819) 6 = **Coleanthus**, Seid. (Gramin.).
subtilis, Roth, Enum. Pl. Phan. Germ. i. 92 = *C. subtilis*.

WILKESIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ii. (1852) 160. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 393.
Gymnoxiphium, A. Gray, l. c. — Ins. Sandvic.

WILKIA, F. Muell. Census, 5 (1882), sphalm. = WILCKIA, Scop. = **Malcomia**, R. Br. (Crucif.).

WILKIEA, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 64 = **Kibara**, Endl. (Monim.).
calyptrocalyx, Muell. l. c. = *K. macrophylla*.
Hugeliana, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 669 = *Mollinedia Hugeliana*.
macrophylla, A. DC. l. c. = *K. macrophylla*.

WILDENOVIA, J. F. Gmel. Syst. 362 (1791) = **Rondeletia**, Linn. (Rubiace.).
Schreberi, J. F. Gmel. l. c. — Hab. ?

WILDENOVIA, Thunb. Fl. Cap. i. 312 (1807) = **Willdenowia**, Thunb. (Restiac.).

WILDENOWA, Cav. Ic. i. 61. t. 89 (1791) = **Adenophyllum**, Pers. (Compos.).
glandulosa, Cav. l. c. 89 = *A. coccineum*.

WILDENOWIA, Steud. Nom. ed. I. 892 (1821) = *prae*.

WILDENOWIA, Steud. Nom. ed. I. 892 (1821) = **Rondeletia**, Linn. (Rubiace.).

WILDENOWIA, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xi. (1790) 26. t. 2 (Willdenowia); Willd. Sp. Pl. iv. 717 (1805). **RESTIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1036.

ANTOCHORTUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 451 (1836).

NEMATANTHUS, Nees, in Linnaea, v. (1830) 661.
 SPIROSTYLIS, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 271.

arescens, Kunth, Enum. Pl. iii. 454. — Afr. austr.
 brevis, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 269. — Afr. austr.

compressa, Steud. in Flora, xii. (1829) 134 = *Chrysitrix capensis*.

compressa, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xi. (1790) t. 2. f. 3 = *Cannamois Cephalotes*.

cuspidata, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 271. — Afr. austr.

Ecklonii, Kunth, Enum. Pl. iii. 456 = *striata*.
 fimbriata, Kunth, l. c. 455. — Afr. austr.

humilis, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 272. — Afr. austr.

Lucaeana, Kunth, Enum. Pl. iii. 455. — Afr. austr.
 neglecta, Steud. Syn. Pl. Cyp. 263 = *striata*.

striata, Spreng. Syst. i. 188 = *Hypodiscus Willdenovia*.

striata, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xi. (1790) 57. t. 2. f. 1. — Afr. austr.

sulcata, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 270. — Afr. austr.

teres, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xi. (1790) 28. t. 2. f. 2. — Afr. austr.

tristachya, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 410 = *Restio bifidus*.

WILLEMETIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. x. (1827) 370. t. 16. f. 1 = **Noltea**, Reichb. (Rhamn.).
africana, Brongn. l. c. 371 = *N. africana*.
scandens, Eckl. & Zeyh. Enum. 130 = *N. africana*.

WILLEMETIA, Maerkl. in Schrad. Journ. iii. i. (1800) 329 = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

arenaria, Maerkl. l. c. 330 = *Kochia arenaria*.

caspica, Lehm. ex Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vi. (1857) 279 (= *Echinopsilon caspicus*). — Reg. Casp.

eriophora, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 209 = *Kochia eriophora*.

hirsuta, Moq. l. c. 210 = *Kochia hirsuta*.

lanata, Maerkl. in Schrad. Journ. iii. i. (1800) 330 = *Kochia hyssopifolia*.

muricata, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 208 = *Kochia muricata*.

sedoides, Moq. l. c. 210 = *Kochia sedoides*.

WILLEMETIA, Neck. Elem. i. 50 (1790) = **Chondrilla**, Tourn. (Compos.).

apargioides, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 428 = *C. Peltidium*, stipitata.

hieracioides, Monn. Ess. Hierac. 80 = *C. stipitata*.

prenanthoides, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 315 = *C. prenanthoides*.

stipitata, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlviii. 428 = *C. stipitata*.

tuberosa, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vii. 150. — Reg. Casp.

WILLIAMIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 559. t. 27 (1858) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

pruinosa, Baill. l. c. 560. t. 27 = *P. discolor*.

WILLIBALDA, Steud. Nom. ed. II. ii. 787 (1841), sphalm. = WILIBALDA, Sternb. = **Coleanthus**, Seid. (Gramin.).

WILLICHIA, Mutis, ex Linn. Mant. ii. 553 (1737) = **Sibthorpia**, Linn. (Scrophul.).

callitrichoides, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 26 = *Hydranthelium callitrichoides*.

repens, Mutis, ex Linn. Mant. ii. 558 = *S. pichinchensis* ?

WILLISELLUS, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 736 (1821) = **Elatine**, Linn.

WILLKOMMIA, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 357 (1879) = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

minuta, Sch. Bip. l. c. = *S. minutus*.

WILLOUGHBEIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 623 (1883), sphalm. = **Willughbeia**, Roxb. (Apocyn.).

WILLUGBAEYA, Neck. Elem. i. 82 (1790) = **Mikania**, Willd. (Compos.).

WILLUGHBEIA, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 281 (1861) = **Landolphia**, Beauv. (Apocyn.).

cordata, Klotzsch, l. c. 283 = *L. florida* ?

Petersiana, Klotzsch, l. c. 281 = *L. Petersiana*.

senensis, Klotzsch, l. c. 282. — Afr. trop.

WILLUGHBEIA, Roxb. Pl. Corom. iii. 77. t. 280 (1819). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 691.

ANCYLOCLADUS, Wall. Pl. As. Rar. iii. 45 (1832).

apiculata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 551. — Sumatra.

Burbridgei, [Dyer,] in Kew Gard. Rep. (1880) 44 = *firma*.

celebica, Blume, Bijdr. 1024. — Ins. Celebes.

ceylanica, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 191. — Zeylan.

coriacea, Wall. Cat. n. 1620. — Malaya.

drupacea, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 132 = *Ardisia humilis*.

edulis, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 57. — Reg. Himal.; Burma; Malaya.

firma, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 154. — Malaya.

flavescens, [Dyer,] in Kew Gard. Rep. (1881) 45; et ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 624. — Singapore.

grandiflora, Dyer, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 625. — Malaya.

Gudara, Steud. Nom. ed. II. ii. 787 = *edulis*.

WILLUGHBEIA:—

javanica, Blume, Bijdr. 1024. — Java.

martabanica, Wall. Cat. n. 1619; Pl. As. Rar. iii. 45. t. 272 = *edulis*.

multilocularis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 131. — Ins. Philipp.

oblonga, Dyer, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 625. — Malacca.

pubescens, Mart. Reise Bras. ii. 789 = *Hancornia speciosa*.

rufescens, Dyer, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 626. — Malacca.

tenuiflora, Dyer, l. c. 625. — Malacca.

Treacheri, [Dyer,] in Kew Rep. (1880) 44, nomen. — Borneo.

umbrosa, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 154. — Java.

WILLUGHBEIA, Scop. in Schreb. Gen. 162 (1789) = **Ambelania**, Aubl. (Apocyn.).

acida, J. F. Gmel. Syst. 434 = *A. acida*.

auriculata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 71 = *Fagraea auriculata*.

elliptica, Spreng. l. c. = *Fagraea elliptica*.

fragrans, Spreng. l. c. = *Fagraea fragrans*.

guianensis, J. F. Gmel. Syst. 434 (= *Pacouria guianensis*). — Guian.

obovata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 71 = *Fagraea obovata*.

racemosa, Spreng. l. c. = *Fagraea racemosa*.

scandens, Willd. Sp. Pl. i. 1231 (= *Pacouria guianensis*). — Guian.

volubilis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 71 = *Fagraea racemosa*.

zeylanica, Spreng. Syst. i. 672 = *Fagraea ceilanica*.

WILSONIA, R. Br. Prod. 490 (1810). **CONVOLVULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 880.

Backhousii, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 275. — Austral.

humilis, R. Br. Prod. 490. — Austral.

rotundifolia, Hook. Ic. Pl. t. 410. — Austral.

WILSONIA, Gill. & Hook. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 172. t. 49 = **Dipyrena**, Hook. (Verben.).

glaberrima, Gill. & Hook. l. c. 173 = *D. glaberrima*.

WIMMERIA, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 65 (1864) = **Beilschmiedia**, Nees (Laurin.).

thomaea, Nees, l. c. = *B. thomaea*.

WIMMERIA, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 427. **CELASTRINEAE**, Benth. & Hook. f. 369.

concolor, Cham. & Schlecht. l. c. 428. — Mexic.

confusa, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 6. — Mexic.

discolor, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1837) 428. — Mexic.

integerrima, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 451 = *Zinowiewia integerrima*.

pallida, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 379 = *confusa*.

persicifolia, Radlk. l. c. — Mexic.

pubescens, Radlk. l. c. 378. — Mexic.

serrulata, Radlk. l. c. 379. — Reg. Argent.

WINCHIA, A. DC. in DC. Prod. viii. 326 (1844). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 695.

atroviridis, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 170 = *Chilocarpus atroviridis*.

calophylla, A. DC. in DC. Prod. viii. 326. — Burma.

cirrifer, Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 191 = *Willughbeia ceylanica*.

WINDMANNIA, P. Br. Hist. Jamaic. 212 (1756) = **Weinmannia**, Linn. (Saxifr.).

WINDSORIA, Nutt. Gen. Am. i. 70 (1818) = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).

ambigua, Nutt. l. c. = *T. ambigua*.

pallida, Torr. Cat. Pl. N. York, 91 = *Glyceria pallida*.

poaeformis, Nutt. Gen. Am. i. 70 = *T. cuprea*.

stricta, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 147. — Am. bor.

WINKLERIA, Reichb. Nom. 236 (1841) = **Mertensia**, Roth (Borag.).

WINTERA, Murr. Syst. ed. XIV. 507 (1784) = *Drimys*, Forst. (Magnol.).
aromatica, Murr. l. c. = *D. Winteri*.
axillaris, J. F. Gmel. Syst. 852; Willd. Sp. Pl. ii. 1239 = *D. axillaris*.
granadensis, J. F. Gmel. l. c. 853; Willd. l. c. 1240 = seq.
granatensis, Murr. Syst. ed. XIV. 507 = *D. Winteri*.

WINTERANA, Linn. Syst. ed. X. 1045 (1759) = seq.

WINTERANIA, Linn. Hort. Cliff. 488 (1737) = *Canella*, P. Br.
Canella, Linn. Syst. ed. X. 1045 = *C. alba*.
lanceolata, Poir. Encyc. viii. 799 = *Drimys aromatica*.

WINTERLIA, Dennst. Schlus. Hort. Malab. 27 (1818) = *Limonia*, Linn. (Rutac.).
aromatica, Dennst. l. c. = *L. Winterlia*.

WINTERLIA, Moench, Meth. 74 (1794) = *Ilex*, Tourn.
glabra, C. Koch, Dendrol. ii. l. 225 = *I. glabra*.
triflora, Moench, Meth. 74 = *I. glabra*.

WINTERLIA, Spreng. Syst. i. 519 (1825) = *Anman-*
nia, Linn. (Lythrar.).
uliginosa, Spreng. l. c. 788 = *A. pentandra*.

WIRTGENIA, Jungh. ex Hassk. in Flora, xxvii. (1844)
 624 = *Spondias*, Linn. et Odina, Roxb. (Anacard.).
decandra, Jungh. l. c. 625 = *S. Mangifera*.
octandra, Jungh. l. c. 624 = *Odina Wodier*.

WIRTGENIA, Nees, ex Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. 11.
 40 (1877) = *Paspalum*, Linn. (Gramin.).
paspaloides, Nees, ex Doell, l. c. = *P. malacophyllum*.

WIRTGENIA, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) 433 =
Aspilula, Thou. (Compos.).
abyssinica, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 146 = *A.*
abyssinica.
frutescens, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
 287 = *Wedelia abyssinica*.
Kotschyii, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) 435 =
A. Kotschyana.
longeradiata, Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.
 287 = *A. Kotschyana*?
mexicana, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 304 =
A. mexicana.
multiflora, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312 =
A. multiflora.
Schimperi, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.
 i. 412 = *A. Schimperi*.
texana, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 304 =
Wedelia hispida.

WISERIA, J. F. Gmel. Syst. 515 (1791) = *WISERIA*,
 Houtt. = *Melochia*, Dill. (Stercul.).

WISLIZENIA, Engelm. in Wisliz. Tour N. Mexico,
 99 (1848). *CAPPARIDAE*, Benth. & Hook. f. i. 106.
 Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 622.
 —Am. bor. occ.
refracta, Engelm. in Wisliz. Tour N. Mexico, 99.—
 Texas.

WISNERIA, M. Micheli, in DC. Monog. Phan. iii.
 82 (1881). *ALISMACEAE*, Benth. & Hook. f. iii.
 1007.
filifolia, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1007.
 —Madag.
Schweinfurthii, Hook. f. l. c. —Afr. trop.
triandra, M. Micheli, in DC. Monog. Phan. iii. 82.—
 Ind. or.

WISSADULA, Medic. Malv. 24 (1787). *MALVA-*
CEAE, Benth. & Hook. f. i. 204.
divergens, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 204.—
 Am. trop.
excelsior, Presl, Rel. Haenk. ii. 118 = *zeylanica*.
gymnostachya, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi.
 (1858) i. 202 = *spicata*.
heterosperma, Hochst. ex Mast. in Oliver, Fl. Trop.
 Afr. i. 182 = *rostrata*.
hirsuta, Presl, Rel. Haenk. ii. 118.—Bras.
Jamesonii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi.
 (1858) i. 202 = *spicata*.

WISSADULA :—

Leschenaultiana, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 325
 = *rostrata*.
mucronulata, A. Gray, ex Torr. Bot. Mex. Bound. 39.
 —Am. bor. occ.
nudiflora, Benth. Bot. Voy. Sulph. 69.—Am. centr.
periplocifolia, Griseb. Cat. Pl. Cub. 25, partim =
mucronulata.
periplocifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 27 = *zeylanica*.
rostrata, Planch. in Hook. Niger Fl. 229.—Cosmop.
 trop.
rostrata, Planch. l. c., partim = *zeylanica*.
scabra, Presl, Rel. Haenk. ii. 117. t. 69. f. 1-14.
 —Mexic.
spicata, Presl, l. c. 117.—Am. trop.
zeylanica, Medic. Malv. 25.—Cosmop. trop.

WISTARIA, Nutt. Gen. Am. ii. 115 (1818) (*Wister-*
ia); Spreng. Syst. iii. 255 (1826). *LEGUMI-*
NOSAE, Benth. & Hook. f. i. 499.
BRADBURYA, Rafin. Fl. Ludov. 104 (1817).
DIPLONYX, Rafin. l. c. 108, ex desc. (1817).
KRAUNHIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v.
 (1808) 352, nomen prius.
THYRSANTHUS, Ell. in Journ. Acad. Philad. i. (1817)
 371.
australis, F. Muell. in Journ. Bot. xxii. (1884) 290.—
 Austral.
Barkhausiana, Hort. Cels, ex Pasq. Cat. Orto Bot.
 Nap. 108.—Hab.?
brachybotrys, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 92.—Japon.
chinensis, DC. Prod. ii. 390.—China.
consequana, Loud. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 315
 = *chinensis*.
dubia, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.
 (1843) 324.—China.
floribunda, DC. Prod. ii. 390 = *chinensis*.
frutescens, Poir. in Lam. Illustr. iii. 674 = *speciosa*.
japonica, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 88 = *Millettia*
japonica.
macrostachya, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i.
 283 = *speciosa*.
megasperma, F. Muell. Fragm. i. 13 = *Millettia mega-*
sperma.
multijuga, Van Houtte, in Fl. des Serres, xix. (1869-
 70) 126 = *chinensis*.
pallida, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 61 = *Millettia race-*
mosa.
racemosa, Dalz. & Gibs. l. c. = *Millettia racemosa*.
sinensis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 121 = *chinensis*.
speciosa, Nutt. Gen. Am. ii. 116.—Am. bor.

WISTERIA, Nutt. Gen. Am. ii. 115 (1818) = *praec.*

WITHANIA, Pauq. Diss. Bellad. (1824) 14. *SOLA-*
NACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 893.
DEPREA, Rafin. Sylva Tellur. 54 (1838).
EPLATEIA, Rafin. l. c. (1838).
HYPNOTICUM, Rodrig. ex Meissn. Gen. Comm. 184
 (1840).
OPSAGO, Rafin. Sylva Tellur. 54 (1838).
PHYSALOIDES, Moench, Meth. 473 (1794).
PUNERIA, Stocks, in Journ. As. Soc. Bombay, iii.
 (1849) 55.
SCLEROPHYALOS, Griff. Notul. iv. 96 (1854).
adpressa, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 64,
 nomen.—Afr. bor.
anonacea, Dun. in DC. Prod. xxii. i. 463 = *Athenaea*
anonacea.
arborescens, Dun. l. c. 455.—Hab.?
aristata, Pauq. Diss. Bellad. (1824) 15.—Ins. Canar.
coagulans, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 685.—Afghan.
Coronopus, Torr. Bot. Mex. Bound. 155 = *Chamae-*
saracha Coronopus.
frutescens, Pauq. Diss. Bellad. (1824) 15.—Hispan.
hirsuta, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 463 = *Athenaea*
hirsuta.
Martiana, Dun. l. c. 462 = *Athenaea Martiana*.
micrantha, Dun. l. c. 460 = *Athenaea micrantha*.
mollis, Dun. l. c. 460.—Bras.
Morisoni, Dun. l. c. 454 = *somnifera*.
novo-friburgensis, Dun. l. c. 462.—Bras.
oocarpa, Dun. l. c. 463.—Bras.
orinocensis, Dun. l. c. 455.—Venezuela.
picta, Dun. l. c. 458 = *Athenaea picta*.
pogogena, Dun. l. c. 459 = *Athenaea pogogena*.
Pohlana, Dun. l. c. 461 = *Athenaea Pohlana*.
pulvinata, Dun. l. c. 457.—Bras.

WITHANIA :—

pyrifolia, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 461.—Bras.
ramosa, Dun. l. c. 456.—Honduras.
Riebeckii, Schweinf. ex Balf. f. in Proc. Roy. Soc.
 Edinb. xii. (1884) 83.—Ins. Socotra.
Schottiana, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 461 = *Athenaea*
Schottiana.
somnifera, Dun. l. c. 453.—Reg. Mediterr.; Oriens.
sordida, Dun. l. c. 456 = *Chamaesaracha sordida*.
suberosa, Endl. Gen. 666 = *frutescens*.
subtriflora, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 455.—Peruv.
villosa, Pauq. Diss. Bellad. (1824) 15 = *frutescens*.
xalapensis, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 455 = *Athenaea*
xalapensis.

WITHARIA, Reichb. Consp. 126 (1828), sphalm. =
praec.

WITHERINGIA, L'Hérit. Sert. Angl. 1, 33. t. 1 (1788)
 = *Bassovia*, Aubl. (Solan.).
acuminata, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 403.—Bras.
acutifolia, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.
 xi. (1853) 92 (= *Saracha acutifolia*).—Am. austr.
alata, Miers, l. c. = *Saracha alata*.
allogona, Miers, l. c. = *Saracha allogona*.
angustifolia, Dun. Syn. Solan. 2; H. B. & K. Nov.
 Gen. et Sp. iii. 17 = *Solanum cotopaxense*.
aspera, Spreng. Neue Entdeck. i. 266.—Bras.
auriculata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.
 xi. (1853) 22 = *Saracha auriculata*.
Berteroana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 65 =
Solanum Berterianum.
biflora, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi.
 (1853) 92 = *Hebecladus biflorus*.
Candollii, Miers, l. c. = *Saracha laxa*.
chenopodioides, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 69 =
Solanum nigrum.
ciliata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 15 = *Brach-*
isthus ciliatus.
ciliata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi.
 (1853) 92 = *Saracha ciliata*.
conica, Steud. Nom. ed. II. ii. 788.—Bras.
conspersa, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.
 ix. (1853) 92 = *Saracha conspersa*.
contorta, Miers, l. c. = *Saracha contorta*.
crassifolia, Dun. Hist. Solan. 108 = *Solanum crassi-*
folium.
crispa, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 66 = *Solanum*
crispum.
dentata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi.
 (1853) 92 = *Saracha dentata*.
diffusa, Miers, l. c. = *Saracha laxa*.
diploconos, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 76. t. 229 =
Cyphomandra diploconos.
divaricata, Mart. l. c. 75. t. 228 = *Cyphomandra*
divaricata.
diversifolia, Klotzsch, in Walp. Rep. iii. 29 = *Brach-*
isthus diversifolius.
dumetorum, Dun. Syn. Solan. 1; H. B. & K. Nov.
 Gen. et Sp. iii. 16 = *Brachisthus dumetorum*.
flexuosa, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 70 = *Solanum*
flexuosum Phil. f. (in Addend.).
Fournieri, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.
 91.—Mexic.
furcata, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 67 = *Solanum*
furcatum.
Gaudichaudiana, Remy, l. c. 71 = *Solanum Gaudi-*
chaudi.
Gayana, Remy, l. c. 67 = *Solanum Gayanum*.
glabrata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi.
 (1853) 92 = *Saracha glabrata*.
glandulosa, Miers, l. c. = *Saracha glandulosa*.
hirsuta, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842)
 541 = B. Gardneri.
Jaltomata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. xi.
 (1853) 92 = *Saracha Jaltomata*.
lanceolata, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 404.—Bras.
laxa, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi.
 (1853) 92 = *Saracha laxa*.
macrophylla, Dun. Syn. Solan. 1; H. B. & K. Nov.
 Gen. et Sp. iii. 14 = *Brachisthus macrophyllus*.
maritima, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 72 = *Solanum*
maritimum.
Menziesii, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 159 = *Solanum*
Menziesii.
microphylla, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58.
 —Peruv.
mollis, Dun. in DC. Prod. xiii. i. 459 = *Athenaea picta*.

WITHERINGIA:—

- mollis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 15 = *Brachisthus mollis*.
montana, Dun. Syn. Solan. 24 = *Solanum montanum*.
multifida, Dun. l. c. 3 = *Solanum multifidum*.
peridula, Roem. & Schult. Syst. iii. 522 = *aspera*.
phyllantha, Dun. Syn. Solan. 2 = *Solanum phyllanthum*.
picta, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 74. t. 227 = *Athenaea picta*.
pinnata, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 72 = *Solanum pinnatum*.
pinnatifida, Dun. Syn. Solan. 2 = *Solanum pinnatifidum*.
pogonandra, Lem. Illustr. Hort. vii. (1860) t. 242; et in Rev. Hort. Sér. IV. ix. (1860) 587. —Mexic.
procumbens, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi. (1853) 92 = *Saracha procumbens*.
propinqua, Miers, l. c. = *Saracha propinqua*.
purpurea, Lodd. Bot. Cab. t. 1892. —Chili.
rhomboidea, Dun. Syn. Solan. 13; H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 15 = *Brachisthus rhomboideus*.
riparia, H. B. & K. l. c. 16 = *Brachisthus riparius*.
rubra, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 68 = *Solanum nigrum*.
ruderalis, Remy, l. c. 69 = *Solanum ruderales*.
salicifolia, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 231 = *Capraria biflora*.
Selloviana, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 123 = *Saracha Sellowiana*.
solanacea, L'Hérit. Sert. Angl. 1, 33. t. 1 = *Brachisthus solanaceus*.
solanacea, Miers, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 891, in nota = *Bassovia solanacea*.
stramonifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 13 = *Brachisthus stramonifolius*.
Tomatillo, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 64 = *Solanum Tomatillo*.
tomentosa, Remy, l. c. 71 = *Solanum tomentosum*.
Phil. f.
umbellata, Dun. Syn. Solan. 2 = *Solanum umbellatum*.
umbellata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi. (1853) 92 = *Saracha umbellata*.
vestita, Miers, l. c. = *Saracha vestita*.
villosa, Miers, l. c. = *Saracha villosa*.
viscosa, Miers, l. c. = *Saracha viscosa*.
Zuccagniana, Miers, l. c. = *Saracha Zuccagniana*.

WITHERINGIA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. iii. (1849) 145 = *Athenaea*, Sendt. (Solan.).

- anonacea*, Miers, l. c. 146 = *A. anonacea*.
hirsuta, Miers, l. c. = *A. hirsuta*.
Martiana, Miers, l. c. = *A. Martiana*.
micrantha, Miers, l. c. 145 = *A. micrantha*.
pogogena, Miers, l. c. = *A. pogogena*.
Pohlana, Miers, l. c. 146 = *A. Pohlana*.
Schottiana, Miers, l. c. = *A. Schottiana*.

WITSENIA, Thunb. Gen. Nov. ii. 34. t. 17 (1782) (Witsena); Prod. Pl. Cap. i. 7 (1794). *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 701.

- capitata*, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 546 = *Aristea fruticosa*.
corymbosa, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 895 = *Aristea corymbosa* (in Addend.).
fruticosa, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 237 = *ramosa*.
magellanica, Pers. Syn. i. 42 = *Tapeinia magellanica*.
maura, Thunb. Nov. Gen. ii. 34. —Afr. austr.
partita, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1804) 237 = *Klattia partita*.
pumila, Vahl, Enum. ii. 48 = *Tapeinia magellanica*.
pyramidalis, Pers. Syn. i. 42 = *Lapeyrousia compressa*.
ramosa, Vahl, Enum. ii. 47. —Afr. austr.
spicata, E. Mey. ex Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 267 = *Aristea racemosa*.
tomentosa, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 312 = *maura*.

WITTELSBACHIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 80. t. 55 (1824) = *Cochlospermum*, Kunth (Bixin.).

- Gossypium*, Mart. l. c. 82 = *C. Gossypium*.
insigne, Mart. l. c. 81. t. 55 = *C. insigne*.
orinocensis, Mart. l. c. 83 = *C. orinocense*.
vitifolia, Mart. l. c. 82 = *C. vitifolium*.

VOL. II.

WITTSTEINIA, F. Muell. Fragm. ii. 136 (1861); iii. 166. *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 577.

vacciniacea, F. Muell. l. c. 136. —Austral.

WOEHLERIA, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861)

11. *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 39. *serpyllifolia*, Griseb. l. c. —Cuba.

WOLFFIA, Horkel, ex Schleid. in Linnaea, xiii. (1839) 389. *LEMNACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1001.

- BRUNIERA*, Franch. in Billotia (1864), 25.
GRANTIA, Griff. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 632 (1845); et Notul. iii. 223 (1851).

HORKELIA, Reichb. ex Bartl. Ord. Nat. 76 (1830).
arrhiza, Wimm. Fl. Schles. (1857) 140 = *Michellii*.
brasiliensis, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 170. —Bras.

columbiana, Karst. Bot. Unters. i. (1865) 103. —Mexic.

conguensis, Welw. ex Trimen, in Journ. Bot. iv. (1866) 223, nomen = *Welwitschii*.

cylindracea, Hegelm. Lemnac. 123. —Afr. trop.

Delilii, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 429 = *Michellii*.

Delilii, Schleid. in Linnaea, xiii. (1839) 390. —Aegypt.

denticulata, Hegelm. Lemnac. 133. —Afr. austr.

gladiata, Hegelm. l. c. t. 3. f. 24. —Mexic.

hyalina, Hegelm. l. c. 128 = *Delilii*.

lingulata, Hegelm. l. c. 132. t. 4. f. 31, 32. —Bras.

Michellii, Schleid. Beitr. Bot. 233. —Geront. temp.; Austral.

microscopica, Kurz, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 265. —Ind. or.

oblonga, Hegelm. Lemnac. 131. —Chili.

punctata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 512 = *brasiliensis*.

repanda, Hegelm. in Journ. Bot. iii. (1865) 114. —Afr. trop.

Schleideni, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 428 = *Michellii*.

Welwitschii, Hegelm. in Journ. Bot. iii. (1865) 113. —Afr. trop.

WOLFIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 38 (1818).

SCITAMINEAE.
spectabilis, Dennst. l. c. (an *Renealmia* sp. ?). —Ind. or.

WOLFIA, Kunth, Enum. Pl. iii. 4 (1841), sphalm. = *Wolffia*, Horkel (Lemnac.).

WOLFIA, Spreng. Syst. i. 808 (1825) (Quid ?).

brasiliensis, Spreng. l. c. —Bras.

WOLKENSTEINIA, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1864) 19; Gartenfl. xiv. (1865) 131. t. 471 = *Gomphia*, Schreb. (Ochnac.).

Theophrasta, Regel, ll. cc. = *G. gigantophylla*.

WOLLASTONIA, DC. ex Decne, in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 414; (Herb. Tim. Desc. 86) = *Wedelia*, Jacq. (Compos.).

asperima, Decne, l. c. = *Wedelia asperima*.

biflora, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 128 = *Wedelia urticaefolia*.

biflora, DC. Prod. v. 546 = *Wedelia biflora*.

canescens, DC. l. c. 547 = *Wedelia Chamissonis*.

ecliptoides, F. Muell. Pl. Vict. ii. sub t. 39 = *Eclipta platyglossa*.

elongata, DC. Prod. v. 548 = *Wedelia elongata*.

Forsteriana, DC. l. c. = *Wedelia Forsteriana*.

glabrata, DC. Coll. Mém. ix. t. 7. —Ins. Timor.

Horsfieldiana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 72 = *Wedelia Horsfieldiana*.

insularis, DC. Prod. v. 548. —Ins. Pacif.

javana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 11. 70. —Java.

javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 1078 = *praec.*

Junghuhniana, Miq. Pl. Jungh. 502. —Java.

lantanoides, DC. Prod. v. 548. —Ind. occ.

moluccana, DC. l. c. 547. —Ins. Molucc.

montana, DC. l. c. —Java.

peduncularis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 11. 69. —Java.

procumbens, DC. Prod. v. 548 = *Chrysogonum procumbens*.

prostrata, DC. l. c. 549. —Bras.

WOLLASTONIA:—

prostrata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 195. —Mexic.
scaberrima, C. B. Clarke, Comp. Ind. 138 = *Wedelia Wallichii*.

scabriuscula, DC. ex Decne, in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 414 = *Wedelia biflora*.

scabriuscula, Sch. Bip. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 70 = *Wedelia Schultziana*.

serrulata, Miq. l. c. 74. —Sumatra.

strigulosa, DC. ex Decne, in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 414 = *Wedelia aristata*.

urticaefolia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 99 = *Wedelia urticaefolia*.

zanzibarensis, DC. Prod. v. 547 = *Wedelia biflora*.

Zollingeriana, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 123, nomen. —Ins. Sunda.

WOODFORDIA, Salisb. Parad. Lond. t. 42 (1806).

LYTHRARIEAE, Benth. & Hook. f. i. 778.

floribunda, Salisb. l. c. —As. et Afr. trop.

fruticosa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) 56 = *floribunda*.

tomentosa, Bedd. Fl. Sylv. Madr. 117 = *floribunda*.

uniflora, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 334. —Afr. trop.

WOODVILLEA, DC. Prod. v. 318 (1836) = *Erigeron*, Linn. (Compos.).

calendulacea, DC. l. c. = *E. glaucus*.

WOOLLSIA, F. Muell. Fragm. viii. 52, 55 (1872) = *Lysinema*, R. Br. (Epacrid.).

pungens, F. Muell. l. c. 55 = *L. pungens*.

WORMIA, Rottb. in Nye Samml. Vidensk. Selsk. Skrift. ii. (1783) 532. *DILLENIAEAE*, Benth. & Hook. f. i. 13.

CAPELLIA, Blume, Bijdr. 5 (1825).

LENIDIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 17 (1806).

alata, R. Br. ex DC. Syst. i. 434. —Austral.; N. Guin.

apetala, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 476. t. 99. —Ins. Molucc.

artocarpifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 88. —Madag.

augusta, Steud. Nom. ed. II. ii. 789 = *Dillenia pentagyna*.

biflora, Seem. Fl. Vit. 3. —Ins. Fiji.

bracteata, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 68 = *Dillenia bracteata*.

Burbridgei, Hook. f. Bot. Mag. t. 6531. —Borneo.

castaneaefolia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 78. —N. Guin.

coromandelina, Spreng. Syst. ii. 631 = *Dillenia pentagyna*.

dentata, DC. Syst. i. 434 = *triquetra*.

excelsa, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 67 = *suffruticosa*.

excelsa, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 69. —Sumatra.

ferruginea, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 268. —Ins. Seychelles.

floribunda, Steud. Nom. ed. II. ii. 789 = *Dillenia floribunda*.

grandiflora, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 619. —Sumatra.

integra, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 68 = *Dillenia retusa*.

madagascariensis, DC. Syst. i. 433. —Madag.

membranifolia, Seem. Fl. Vit. 4. —Ins. Fiji.

oblonga, Wall. Cat. n. 951. —Malaya.

obovata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 213 = *Dillenia aurea*.

ochreatea, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 77. —Ins. Celebes.

pteropoda, Miq. l. c. —Ins. Molucc.

pulchella, Jack, in Malay. Misc. ii. (1820) vii. 70. —Malaya.

retusa, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 68 = *Dillenia retusa*.

revoluta, Hort. Bog. ex Miq. Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 364 = *suffruticosa*.

scabrella, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 213 = *Dillenia scabrella*.

subsessilis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 619 = *suffruticosa*.

suffruticosa, Griff. Notul. iv. 706. —Malaya.

triquetra, Rottb. in Nye Samml. Vidensk. Selsk. Skrift. ii. (1783) 532. t. 1. —Zeylan.

WORMIA, Vahl, in Skrift. Nat. Selsk. Kjoeb. vi. (1810) 104 = *Ancistrocladus*, Wall. (Dipteroc.).

hamata, Vahl, l. c. = *A. Vahlia*.

WORMSKIOLDIA, Thonn. in Schum & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 165 (1827). *TURNERACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 807.

SCUMACHERIA, Spreng. Gen. 232 (1830).

TRICLICERAS, Thonn. ex DC. Pl. Rar. Jard. Genève. 56 (1829).

TRICLISIA, Thonn. ex DC. l. c. 50 (1829).

abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 299 = *Streptopetalum serratum*.

Biviniana, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ix. (1868) 324.—Madag.

brevicaulis, Urban, in Eichl. Jahrb. Bot. Berl. ii. (1883) 51.—Afr. trop.

diversifolia, A. Rich. in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 36. t. 11 = *heterophylla*.

glandulifera, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 146. t. 26.—Afr. trop.

heterophylla, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 165.—Afr. trop.

Hildebrandtii, Urban & Rolfe, ex Urban, in Eichl. Jahrb. Bot. Berl. ii. (1883) 57 = *Streptopetalum Hildebrandtii*.

lobata, Urb. l. c. 52.—Afr. trop.

longepedunculata, Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 502.—Afr. trop.

pilosa, Schweinf. ex Urban, in Eichl. Jahrb. Bot. Berl. ii. (1883) 54 = *heterophylla*.

serrata, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 666 = *Streptopetalum serratum*.

tanacetifolia, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 147.—Afr. trop.

WORNIA, J. F. Gmel. Syst. 1646 (Index), sphalm. = **Wormia**, Rottb. (Dilleniac.).

WREDOWIA, Eckl. Top. Verz. 16 (1827) = **Aristea**, Soland. (Irid.).

pulchella, Steud. Nom. ed. II. ii. 789, sphalm. = seq.

pulchra, Eckl. Top. Verz. 16 = *A. Wredowia*.

WRENCIALA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 180, in obs. (1854) = **Plagianthus**, Forst. (Malvac.).

WRIGHTIA, Roxb. Hort. Beng. 68 (1814); Fl. Ind. iii. 621 (1832) = **Wallichia**, Roxb. (Palm.).

caryotoides, Roxb. ll. cc. = *Wallichia caryotoides*.

WRIGHTIA, Tussac, Fl. Antill. sub t. 78 (1808) = **Meriania**, Sw. (Melastom.).

rosea, Tussac, l. c. = *Meriania leucantha*.

WRIGHTIA, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 73. *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 712.

BALFOURIA, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 70. *angustifolia*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 193.—Zeylan.

antidysenterica, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 73 = *zeylanica*.

antidysenterica, J. Grah. Cat. Bomb. Pl. 114 = *Holarrhena antidysenterica*.

calycina, A. DC. in DC. Prod. viii. 406.—Java.

Candollei, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 186 (Cadollei).—Ins. Philipp.

coalita, Buch.-Ham. ex Pritz. Ic. Ind. i. 1175 (= *Periploca arborea*).—Ind. or.

coccinea, Sims, Bot. Mag. t. 2696.—Reg. Himal.; Ins. Philipp.

Coraia, Wall. Cat. n. 1615 = *tomentosa*.

Cunninghamii, Benth. Fl. Austral. iv. 317.—Austral.

dubia, Spreng. Syst. i. 638.—Ind. or.?

flavido-rosea, Trimen, Syst. Cat. Fl. Pl. Ceyl. 54 = seq. *flavo-rosea*, Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 238.—Zeylan.

Hamiltoniana, Wall. Cat. n. 4461 = *tomentosa*.

javanica, A. DC. in DC. Prod. viii. 405.—Java.

laciniata, A. DC. l. c. 406.—Hab.?

laevis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 654.—Malacca.

madagascariensis, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 408.—Madag.

mollissima, Hort. Pondich. ex A. DC. l. c. 406 = *tinctoria*.

mollissima, Wall. Cat. n. 1627 = *tomentosa*.

multiflora, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 325 = *tinctoria*.

ovata, A. DC. in DC. Prod. viii. 405.—Ins. Philipp.

Piscidia, G. Don, Gen. Syst. iv. 86 = *Melodinus monogynus*.

pubescens, Blume, Bijdr. 1045 = *javanica*.

pubescens, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 73.—Malaya; Austral.

WRIGHTIA:—

pubescens, Roth, Nov. Pl. Sp. 120, 397 = *tomentosa*.

religiosa, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 713.—Siam.

Rothii, G. Don, Gen. Syst. iv. 86 = *tinctoria*.

saligna, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 316.—Austral.

Spanogheana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 434.—Ins. Timor.

timorensis, Miq. l. c. 433.—Ins. Timor.

tinctoria, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 73.—Ind. or.

tomentosa, Roem. & Schult. Syst. iv. 414.—Ind. or.

Wallichii, A. DC. in DC. Prod. viii. 405 = *tomentosa*.

zeylanica, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 73.—Zeylan.

WRIGHTIA, Soland. ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 124 = **Meriania**, Sw. (Melastom.).

alba, Soland. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 65 = *M. leucantha*.

coccinea, Soland. ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 126 = *M. leucantha*.

nana, Soland. ex Naud. l. c. = *M. leucantha*.

superba, Soland. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 65 = *M. purpurea*.

WRIXONIA, F. Muell. Fragm. x. 18 (1876). **LABIATAE**.

prostantheroides, F. Muell. l. c.—Austral.

WUERSCHMITTIA, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 27 = **Melanthera**, Rohr (Compos.).

abyssinica, Sch. Bip. ex Hochst. l. c. = *M. abyssinica*.

WUERTHIA, Regel, in Bot. Zeit. ix. (1851) 595 = **Ixia**, Linn. (Irid.).

elegans, Regel, l. c. 596 = **I. columellaris**.

WULFENIA, Jacq. Misc. ii. 62 (1781). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 963.

Ageria, Sm. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 96 = *Paederota Ageria*.

Amherstiana, Benth. Scroph. Ind. 46.—Reg. Himal.

Bonarota, Sm. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 96 = *Paederota Bonarota*.

carinthiaca, Jacq. Misc. ii. 62. t. 8. f. 1; *Ic. Pl. Rar.* i. 1. t. 2.—Carinth.

chamaedrifolia, Host, Fl. Austr. i. 19 = *Paederota Bonarota*.

intermedia, Wall. Cat. n. 408 = *Rhyncoglossum obliquum*.

lutea, Host, Fl. Austr. i. 19 = *Paederota Ageria*.

Notoniana, Wall. Cat. n. 409 = *Klugia Notoniana*.

obliqua, Wall. Cat. n. 407 = *Rhyncoglossum obliquum*.

orientalis, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 75.—Syria.

reniformis, Dougl. ex Benth. Scroph. Ind. 46; *et in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 102. t. 71.—Am. bor. occ.

WULFFIA, Neck. Elem. i. 35 (1790). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 367.

CHATIAKELLA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxix. 491 (1823).

CHYLODIA, Rich. ex Cass. l. c. (1823).

CRODISPERMA, Poit. ex Cass. l. c. xlv. 403 (1827).

TELESIA, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 251 (1818).

Blanchetii, DC. Prod. v. 564.—Bras.

capitata, Sch. Bip. in Linnaea, xxi. (1848) 246 = *stenoglossa*.

elongata, Miq. Stirp. Surin. Sel. 193 = *stenoglossa*.

havanensis, DC. Prod. v. 563 = *stenoglossa*.

longifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 293 = *stenoglossa*.

maculata, DC. Prod. v. 563 = *stenoglossa*.

oblongifolia, DC. l. c. 564 = *stenoglossa*.

platyglossa, DC. l. c. 563 = *stenoglossa*.

quitensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 182.—Ecuador.

Salzmanni, DC. Prod. v. 563 = *stenoglossa*.

scandens, DC. l. c. 564.—Peruv.

stenoglossa, DC. l. c. 563.—Am. trop.

strigosa, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 174 = *stenoglossa*.

suffruticosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 292 = *stenoglossa*.

WULLSCHLAEGELIA, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxi. (1863) 131. **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 594.

aphylla, Reichb. f. l. c.—Jamaic.

calcarata, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 342.—Bras.

WUNDERLICHIA, Riedel, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 489 (1873). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 489.

Glaziovii, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 225.—Bras.

insignis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1881) 285.—Bras.

mirabilis, Riedel, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 343.—Bras.

WURFBAEINIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 789 (1841), sphalm. = seq.

WURFBAINIA, Giseke, Prael. Linn. 199, 206 (1792) = **Amomum**, Linn. (Scitam.).

'uliginosa, Giseke, l. c. 199 = *A. uliginosum*.

WURMBAEA, Steud. Nom. ed. II. ii. 789 (1841), sphalm. = seq.

WURMBEA, Thunb. Nov. Gen. i. 18. t. 1 (1781). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 823.

SKIZIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 32. (1836).

bullata, Willd. Hort. Berol. i. 8 = *Aletris aurea*.

campanulata, Willd. Sp. Pl. ii. 265 = *capensis*.

capensis, Thunb. Nov. Gen. i. 18.—Afr. austr.

dioica, F. Muell. Fragm. x. 119.—Austral.

Drummondii, Benth. Fl. Austral. vii. 28.—Austral.

inusta, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 694.—Afr. austr.

Kraussii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 437.—Afr. austr.

longiflora, Willd. Sp. Pl. ii. 266 = *capensis*.

pumila, Willd. l. c. 265 = *capensis*.

purpurea, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 694; [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 326 = *capensis*.

purpurea, Drège, ex Kunth, Enum. Pl. iv. 156 = *Dipidax ciliata*.

pygmaea, Benth. Fl. Austral. vii. 28.—Austral.

remota, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 694 = *capensis*.

revoluta, Banks, l. c. = *capensis*.

stigmiosa, Banks, l. c.—Afr. austr.

tenella, Benth. Fl. Austral. vii. 28.—Austral.

tenuis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 436.—Afr. trop.

truncata, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 93 = *capensis*.

tubulosa, Benth. Fl. Austral. vii. 28.—Austral.

WURMSCHNITTIA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 441, sphalm. = **WUERSCHMITTIA**, Sch. Bip.

= **Melanthera**, Rohr (Compos.).

WURTZIA, Baill. Adansonia, i. (1860–61) 186. t. 7 = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

tetracocca, Baill. l. c. 187 = *P. virens*.

WYDLERIA, DC. Coll. Mém. v. 36. t. 7 (1829); Prod. iv. 103 (1830) = **Carum**, Rupp. (Umbell.).

chilensis, Fisch. & Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. vii. 58.—Chili.

humilis, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864–65) 92.—Chili.

portoricensis, DC. Coll. Mém. v. 36. t. 7 = *C. Petroselinum*.

WYETHIA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 39. t. 5. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 374.

ALARCONIA, DC. Prod. v. 537 (1836).

MELARHIZA, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. ed. II. (1873) 37.

amplexicaulis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 352.—Am. bor. occ.

angustifolia, Nutt. l. c.—Am. bor. occ.

arizonica, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 655.—Am. bor. occ.

californica, Nutt. ex Walp. Rep. ii. 608, nomen.—Calif.

WYETHIA:—

- coriacea, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 77.—Calif.
glabra, *A. Gray, l. c.* vi. (1865) 543.—Calif.
helenioides, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 353.—Calif.
helianthoides, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 38.—Am. bor. occ.
longicaulis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 4.—Calif.
mollis, *A. Gray, l. c.* vi. (1865) 544.—Calif.
ovata, *Torr. & Gray, ex Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois.* 143.—Calif.
reticulata, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. i. (1884) 9.—Calif.
robusta, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 352 = angustifolia.
scabra, *Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 245.—Am. bor. occ.

- WYLIA, Hoffm. Gen. Umb. ed. I. 3. t. 2 (1814) = **Scandix**, Tourn. (Umbell.).
australis, Hoffm. l. c. 5. t. 2. f. 1 = *S. australis*.
grandiflora, Hoffm. l. c. 15. t. 2. f. 3 = *S. grandiflora*.
iberica, Hoffm. l. c. i. 19. t. 2. f. 4 = *S. iberica*.
radians, Hoffm. l. c. 11. t. 2. f. 2 = *S. grandiflora*.

X

- XAIASME, Rafin. Fl. Tellur. iv. 106 (1836) = **Stellera**, Linn. (Thymel.).
bicolor, Rafin. l. c. = *S. Chamaejasme*.

- XALKITIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 71 (1836) = **Aster**, Tourn. (Compos.).
ciliata, Rafin. l. c. = *A. ciliatus, Walt.*

- XAMACRISTA, Rafin. Sylva Tellur. 127 (1838) = **Cassia**, Linn. (Legumin.).
triflora, Rafin. l. c. = *C. Chamaecrista*.

- XAMESIKE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 115 (1836) = **Euphorbia**, Linn.
scordifolia, Rafin. l. c. = *E. scordifolia*.
vulgaris, Rafin. l. c. = *E. Chamaesyce*.
xamobala, Rafin. l. c. = *E. Chamaesyce*?

- XANTHAEA, Reichb. Nom. 132 (1841) = **Erythraea**, Renealm. (Gentian.).

- XANTHANTHOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 189 = **Anthoxanthum**, Linn. (Gramin.).

- XANTHE, Schreb. Gen. 710 (1791) = **Clusia**, Linn. (Guttif.).
oblonga, Raeusch. Nom. ed. III. 292 = *C. macrocarpa*.
parviflora, Willd. Sp. Pl. iv. 877 = *C. macrocarpa*.
scandens, Willd. l. c. = *C. macrocarpa*.

- XANTHIDIUM, Delpino, Studi sopra Artemis. 62 (1871) = **Franseria**, Cav. (Compos.).
ambrosioides, Delpino, l. c. 63 = *F. ambrosioides*.
artemisioides, Delpino, l. c. = *F. artemisioides*.
discolor, Delpino, l. c. = *F. discolor*.
rhombophyllum, Delpino, l. c. 64.—Peruv.
tenuifolium, Delpino, l. c. 62 = *F. tenuifolia*.

- XANTHISMA**, DC. Prod. v. 94 (1836). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 253.
CENTAURIDIUM, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 246 (1840).
Drummondii, Hook. f. Bot. Mag. sub t. 6275 = texanum.
texanum, DC. Prod. v. 95; Torr. in Marcy, Rep. (1852) 303. t. 10.—Texas.

- XANTHIUM**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 286 (1737). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 355.
ACANTHAXANTHIUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 110.
LAPPARIA, Heist. Syst. 11 (1748).
STRUMARIUM, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 89.

XANTHIUM:—

- abyssinicum, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 230 = *X. Strumarium*.
ambrosioides, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 310.—Chili.
americanum, Walt. Fl. Carol. 231 = canadense.
anatolicum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xi. 32, in nota = *X. Strumarium*.
annuum, Georgi, Reise, ii. 713 = *X. Strumarium*.
antiquorum, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 229 = *X. Strumarium*.
arenarium, Lasche, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 411.—Am.?
armatum, Humb. & Bonpl. ex Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 242 = spinosum.
brachyacanthum, Wallr. l. c. 244 = spinosum.
brasilicum, Vell. Fl. Flum. x. t. 23 = *X. Strumarium*.
brevirostre, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 405.—Abyss.
brevirostre, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 235 = *X. Strumarium*.
canadense, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Am. bor. et austr.
canadense, Sabbat. ex Nym. Consp. 475 = spinosum.
catharticum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 274 = spinosum.
Cavanillesii, Schouw, Ind. Sem. Hort. Haun. (1849) 14.—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 357 = canadense.
chinense, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *X. Strumarium*.
cordifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 380 = *X. Strumarium*.
cuneatum, Moench, Meth. Suppl. 300 = canadense.
discolor, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 232 = *X. Strumarium*.
echinatum, Murr. in Comm. Gotting. vi. (1783–84) 32. t. 4 = canadense.
eriocarpon, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 242 = ambrosioides.
fruticosum, Linn. f. Suppl. 418 = *Franseria artemisioides*.
fuscescens, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 36 = *X. Strumarium*.
homothalamum, Spreng. Neue Entdeck. i. 259.—Bras.
humile, Heynh. Nom. i. 858 (Quid?).—Am. austr.?
inaequilaterum, DC. Prod. v. 523 = *X. Strumarium*.
indicum, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 601 = *X. Strumarium*.
italicum, Moretti, in Brugnati. Giorn. Fis. Dec. II. v. (1822) 326 = orientale.
laevigatum, Muhl. ex Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 231 = *X. Strumarium*.
longirostre, Wallr. l. c. 237 = canadense.
macrocarpum, DC. Fl. Fr. Suppl. 356 = canadense.
maculatum, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 344; Am. Journ. Sc. Ser. I. i. (1819) 151 = canadense.
monoicum, Gilib. Fl. Lituan. i. 170 = *X. Strumarium*.
numidicum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 37 = *X. Strumarium*.
occidentale, Bertol. Lucub. 38 = canadense.
orientale, Blume, Bijdr. 915 = *X. Strumarium*.
orientale, Cav. Ic. iii. 11. t. 221 = canadense.
orientale, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1400.—China; Japon.; Zeylan.
oviforme, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 240 = orientale.
parvifolium, DC. Prod. v. 524.—Am. austr.
pensylvanicum, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 236.—Am. bor.
pungens, Wallr. l. c. 231 = *X. Strumarium*.
Revelieri, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 36 = orientale.
riparium, Lasche, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 412 = orientale.
Roxburghii, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 233 = *X. Strumarium*.
saccharatum, Wallr. l. c. 238 = orientale.
sphaerocephalum, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 503 = *X. Strumarium*.
spinosum, Linn. Sp. Pl. 987.—Cosmop.
Strumarium, Ell. Sketch, ii. 479; Bigel. Fl. Bost. ed. II. 342 = canadense.
Strumarium, Linn. Sp. Pl. 987.—Cosmop.
vulgare, Lam. Fl. Fr. ii. 56 = *X. Strumarium*.
xanthocarpum, Wallr. Beitr. Bot. i. (1842) 241 = spinosum.

- XANTHO, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 191 = **Lasthenia**, Cass. (Compos.).
glabrata, Remy, l. c. 192 = *L. glabrata*.

- XANTHOCEPHALUM**, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 249.
GRINDELIOPSIS, Sch. Bip. in Bonplandia, vi. (1858) 356.
GUENTHERA, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1857) 42; et Gartenfl. (1858) 44.
XANTHOCOMA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 310. t. 412 (1820).
Alamani, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 249.—Mexic.
Benthamianum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 110.—Mexic.
Bonplandianum, Benth. Pl. Hartw. 16 = Benthamianum.
Bonplandianum, DC. Prod. vi. 44 = centauroides.
centauroides, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140.—Am. austr.
conoideum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 110.—Mexic.
dentatum, Schau. ex Hemsl. l. c. 111.—Mexic.
gymnospermoides, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 249.—Mexic.
humile, Benth. & Hook. f. l. c.; Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 111.—Mexic.
microglossum, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 249.—Bras.?
sericocarpum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 31.—Mexic.
suffruticosum, DC. Prod. vi. 44.—Mexic.
Wrightii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 632.—Am. bor. occ.

- XANTHOCERAS**, Bunge, (Enum. Pl. Chin. Bor. 11) in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1834) 85. **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 408.
sorbifolia, Bunge, l. c.—China.

- XANTHOCERCIS**, Baill. Adansonia, ix. (1870) 293. **LEGUMINOSAE**.
madagascariensis, Baill. l. c. 294.—Madag.

- XANTHOCHRYSUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 199 = **Helichrysum**, Vaill. (Compos.).
filifolium, Turcz. l. c. = *H. filifolium*.

- XANTHOCHYMUS, Roxb. Pl. Corom. ii. 51. t. 196 (1798) = **Garcinia**, Linn. (Guttif.).
dubius, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 790 (Quid?).—Ind. or.
dulcis, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 631 = *G. dulcis*.
elegans, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 178.—Ins. Timor.
guineensis, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 320, nomen (Quid?).—Afr. trop.
javanensis, Blume, Bijdr. 216 = *G. dulcis*.
luteus, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 320, nomen (Quid?).—Ind. or.
macrophyllum, Lodd. l. c. (Quid?).—Ind. or.
madagascariensis, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 305 = *G. madagascariensis*.
ovalifolius, Bedd. Fl. Syn. Gen. p. xxi = *G. spicata*.
ovalifolius, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 632 = *G. ovalifolia*.
pictorius, Roxb. Pl. Corom. ii. 51. t. 196 = *G. Xanthochymus*.
purpureus, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 320 (Quid?).—Ind. or.
quadrifarius, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 168 = *G. quadrifaria*.
spicatus, Wight & Arn. Prod. 102 = *G. ovalifolia*.
tinctorius, DC. Prod. i. 562 = *G. Xanthochymus*.

- XANTHOCOMA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 310. t. 412 (1820) = **Xanthocephalum**, Willd. (Compos.).
dentata, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 723.—Mexic.
gymnospermoides, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 250, lapsu = *Xanthocephalum gymnospermoides*.
humilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 311. t. 112 = *Xanthocephalum humile*.

- XANTHOCROMYON, Karst. in Bot. Zeit. v. (1847) 694 = **Trimeza**, Salisb. (Irid.).
Herberti, Karst. l. c. = *T. lurida*.

XANTHO GALUM, Avé-Lall. in Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 73 (1842) = *Dorema*, D. Don (Umbell.).
purpurascens, Avé-Lall. l. c. = *D. Aucheri*.

XANTHOLEPIS, Willd. ex Less. in Linnaea, iv. (1829) 338 = *Cacosmia*, H. B. & K. (Compos.).
tomentosa, Willd. ex Less. l. c. = *C. rugosa*.

XANTHOLINUM, Reichb. Handb. 306 (1837) = *Linum*, Tourn.
arborescens, Reichb. l. c. 307 = *L. arborescens*.
campanulatum, Reichb. l. c. = *L. campanulatum*.
capitatum, Reichb. l. c. = *L. capitatum*.
flavum, Reichb. l. c. = *L. flavum*.
nodiflorum, Reichb. l. c. = *L. nodiflorum*.
tauricum, Reichb. l. c. = *L. tauricum*.

XANTHONANTHOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119; viii. (1881) 189 = *Anthoxanthum*, Linn. (Gramin.).
odoratum, St. Lag. l. c. = *A. odoratum*.

XANTHOPHTHALMUM, Sch. Bip. Tanacet. 17 (1844) = *Chrysanthemum*, Tourn. (Compos.).
macrocephalum, Sch. Bip. in Bonplandia, viii. (1860) 369 = *C. trifurcatum*.
segetum, Sch. Bip. Tanacet. 17 = *C. segetum*.
trifurcatum, Sch. Bip. in Bonplandia, viii. (1860) 369 = *C. trifurcatum*.

XANTHOPHYLLON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 70 = *Zanthoxylum*, Linn. (Rutac.).
Clava-Herculis, St. Lag. l. c. = *Z. Clava-Herculis*.
clavatum, St. Lag. l. c. = *X. Clava-Herculis*.

XANTHOPHYLLUM, Roxb. Hort. Beng. [28] (1814); Pl. Corom. iii. 81. t. 284 (1819). *POLY-GALEAE*, Benth. & Hook. f. i. 139.
JACKIA, Blume, Bijdr. 60 (1825).
KAULFUSSIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818).
MACINTYRIA, F. Muell. Fragm. v. 8 (1865).
SKAPHIUM, Miq. Fl. Bat. Ind. Suppl. 357 (1860).
acuminatissimum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 276.—Sumatra.
adenopodium, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 393.—Sumatra.
adenotus, Miq. l. c.—Sumatra.
affine, Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 271.—Burma; Malaya.
ancolanum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 394.—Sumatra.
angustifolium, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 50 = *flavescens*.
Arnottianum, Wight, l. c. = *flavescens*.
borneense, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 277.—Borneo.
cordatum, Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 274.—Borneo.
c glandulosum, Griff. Notul. iv. 537.—Burma.
ellipticum, Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 276.—Malaya.
euryhynchum, Miq. l. c. 277.—Sumatra.
excelsum, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 112.—Java.
flavescens, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 222.—Ind. or.; Malaya.
flavescens, Wall. Cat. n. 4198 = *affine*.
glaucescens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 394.—Sumatra.
glaucum, Wall. Cat. n. 4199.—Burma.
Griffithii, Hook. f. ex A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 210.—Burma; Malaya.
insigne, A. W. Benn. l. c. 211.—Malacca.
Korthalsianum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 277.—Borneo.
lateriflorum, Miq. l. c. 318.—Sumatra.
longifolium, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1277.—Java.
Macintyrii, F. Muell. Fragm. v. 57.—Austral.
Maingayi, Hook. f. ex A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 210.—Malacca.
obscurum, A. W. Benn. l. c. 211.—Singapore.
palembanicum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 317.—Sumatra.
paniculatum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 393 = *flavescens*.

XANTHOPHYLLUM:—

Roxburghianum, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 50 = *flavescens*.
rufum, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 210.—Malacca.
stipitatum, A. W. Benn. l. c.—Malacca.
sumatranum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 275.—Sumatra.
undulatum, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 50 = *flavescens*.
virens, Roxb. Hort. Beng. [28]; Fl. Ind. ii. [221] = *flavescens*.
virescens, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1277 = *excelsum*.
vitellinum, D. Dietr. l. c.—Java.

XANTHOPHYTUM, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 57 (1823); et Bijdr. 989. *RUBACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 53.
calycinum, Benth. & Hook. f. l. c.—Ins. Pacif.
fruticulosum, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 57; et Bijdr. 989.—Java.
spicatum, Blume, ex DC. Prod. iv. 413.—Java.

XANTHOPSIS, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 422 = *Centaura*, Linn. (Compos.).
xanthocephala, C. Koch, l. c. = *C. xanthocephala*.

XANTHORIZA, Woodhouse, in Med. Repos. N. York, v. (1802) 160, sphalm. = seq.

XANTHORRHIZA, Marsh. Arbust. Am. 167 (1785) = *Zanthorhiza*, L'Hérit. (Ranunc.).

XANTHORRHOEA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 219. *FUNCACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 865.
arborea, R. Br. Prod. 288.—Austral.
australis, R. Br. l. c.—Austral.
bracteata, R. Br. l. c.—Austral.
Brunonis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39 = *Preissii*.
Drummondii, Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 57 = *Preissii*.
gracilis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39.—Austral.
hastilis, R. Br. Prod. 288.—Austral.
hastilis, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 219 = *media*.
humilis, Steud. Nom. ed. II. ii. 790, sphalm. = *X. Pumilio*.
macronema, F. Muell. Fragm. iv. 112.—Austral.
media, R. Br. Prod. 288.—Austral.
minor, R. Br. l. c.—Austral.
pecoris, F. Muell. Fragm. iv. 110 = *Preissii*.
Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39.—Austral.
Pumilio, R. Br. Prod. 288.—Austral.
quadrangulata, F. Muell. Fragm. iv. 111.—Austral.
quadrangulata, Tate, in Trans. Roy. Soc. Austral. vi. (1882-83) 168 = *Tateana*.
resinosa, Pers. Syn. i. 370 = *media*.
simiplana, F. Muell. Fragm. iv. 111.—Austral.
Tateana, F. Muell. in Zeitschr. Oesterr. Apoth. Ver. xxiii. (1883) 294.—Austral.

XANTHOSELINUM, Schur, Enum. Pl. Transs. 264 (1866) = *Peucedanum*, Tourn. (Umbell.).
alsaticum, Schur, l. c. = *P. alsaticum*.

XANTHOSIA, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 301. t. 22. *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 874.
CRUCIELLA, Leschen. ex DC. Prod. ii. 74 (1830).
LEUCOLAENA, R. Br. App. Flind. Voy. 557 (1814).
PENTAPELTIS, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 292 (1845).
SCHOENOLAENA, Bunge, l. c. 289 (1845).
Atkinsoniana, F. Muell. Fragm. ii. 127.—Austral.
candida, Steud. Nom. ed. II. ii. 790; Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 291.—Austral.
ciliata, Hook. Ic. Pl. t. 726.—Austral.
dissecta, Hook. f. in Hook. l. c. t. 302.—Austral.
fruticulosa, Benth. Fl. Austral. iii. 361.—Austral.
glabrata, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 290 = *pusilla*.
hederifolia, Benth. Fl. Austral. iii. 359.—Austral.
hirsuta, DC. Prod. iv. 74 = *pilosa*.
Huegelii, Steud. Nom. ed. II. ii. 791; Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 291.—Austral.
junceae, Benth. Fl. Austral. iii. 359.—Austral.
leiophylla, F. Muell. ex Klatt, in Linnaea, xxix. (1857-58) 710 = *dissecta*.
montana, Sieber, ex DC. Prod. iv. 74 = *pilosa*.
pannosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 791 = *pilosa*.
peduncularis, Benth. Fl. Austral. iii. 362.—Austral.

XANTHOSIA:—

peltigera, Steud. Nom. ed. II. ii. 791; Benth. Fl. Austral. iii. 359.—Austral.
pilosa, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 301. t. 22. f. 1.—Austral.
pinnatisecta, F. Muell. ex Klatt, in Linnaea, xxix. (1857-58) 711 = *dissecta*.
pusilla, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 291.—Austral.
rhomboidea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) 11. 32 = *Actinotus rhomboideus*.
rotundifolia, DC. Prod. iv. 75.—Austral.
singuliflora, F. Muell. Fragm. iv. 184.—Austral.
tenuior, Benth. Fl. Austral. iii. 359.—Austral.
tridentata, DC. Prod. iv. 75.—Austral.
vestita, Benth. Fl. Austral. iii. 363.—Austral.
villosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) 11. 32 = *pusilla*.

XANTHOSOMA, Schott, Melet. i. 19 (1832).
AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 976.
ACONTIAS, Schott, Melet. i. 19 (1832).
PHYLLOTAENIUM, André, in Illustr. Hort. ix. (1872) 3. t. 88.
appendiculatum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 417 = *atrovirens*.
atrovirens, C. Koch & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 3.—Venezuela.
auriculatum, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. 1868 (1869) 81.—Bras.
Barilleti, Carr. in Rev. Hort. (1882) 259. f. 58.—Bras.?
belophyllum, Kunth, Enum. Pl. iii. 44; Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853) 369.—Am. trop.
blandum, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 346 = *X. Mafaffa*.
caracasana, Schott, Syn. Aroid. 60 = *belophyllum*.
Caracu, C. Koch & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 3.—Am. austr.
conspuratum, Schott, Syn. Aroid. 61.—Guian.
cubense, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 33, nomen; Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 485.—Cuba.
edule, Hort. ex Schott, Syn. Aroid. 70 = *Syngonium affine*.
edule, Schott, Melet. i. 19.—Guian.
gracile, Miq. Hort. Amstclod. (1853); et ex Schott, Syn. Aroid. 70 = *Syngonium affine*.
hastatum, Eggers, Fl. Ste-Croix (1879), 99 (sp. dub.).—Ind. occ.
hastifolium, C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 2.—Bras.
helleborifolium, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 33.—Am. trop.
Hoffmanni, Schott, l. c.—Costa Rica.
Holtonianum, Schott, l. c. xix. (1859) 39.—N. Granat.
ianthinum, C. Koch & Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 2 = *violaceum*.
Jacquinii, Schott, Melet. i. 19.—Venezuela.
Lindenii, S. Moore, in Flor. & Pom. (1872) 4; Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 482.—N. Granat.
Mafaffa, Schott, Aracene, ii. (1855) 5.—Bras.
Maximilianum, Schott, in Bonplandia, x. (1882) 322.—Bras.
mexicanum, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1849) 15.—Mexic.
mirabile, Mast. in Gard. Chron. (1874) 258. f. 53 (an gen.?).—Am. trop.
mucronatum, Schott, Syn. Aroid. 63 = *Alocasia macrorrhiza*.
pedatum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 418.—Guatemala.
pentaphyllum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 33, nomen; Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 484.—Bras.
peregrinum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 511 = *atrovirens*.
pilosum, C. Koch & August. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 2.—Costa Rica.
platylobum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 33, nomen; Engl. in Mart. Fl. Bras. iii. 11. 196. t. 45.—Bras.
Plumieri, Schott, l. c.—Ind. occ.
Poeppigii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 417 = *X. Mafaffa*.
pubescens, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 89. t. 299.—Peruv.
Riedelianum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 33.—Bras.
robustum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853) 370.—Mexic.

XANTHOSOMA :—

- roseum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. (1858) 178.—Costa Rica.
sagittifolium, C. Koch, in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) App. 2=X. Mafaffa.
sagittifolium, Liebm. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1849) 15=Jacquini.
sagittifolium, *Schott, Melet.* i. 19.—Am. trop.
striolatum, *Schott, Syn. Aroid.* 61.—Bras.
subandinum, *Schott, l. c.* 60=X. Mafaffa.
sylvestre, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xii. (1888) 114.—Ins. Porto Rico.
undipes, C. Koch, in *Bonplandia*, iv. (1856) 4=Jacquini.
utile, C. Koch & Bouché, in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) App. 2=sagittifolium.
variegatum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xv. (1865) 33=helleborifolium.
violaceum, *Schott, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) 370.—Ind. occ.
Wallisi, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1869) 587 (sphalm. *Wallichi*).—N. Granat.
Wendlandii, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xv. (1865) 33, nomen=Hoffmanni.
xanthorrhizon, C. Koch, in *Bonplandia*, iv. (1856) 4=sagittifolium.

- XANTHOSTEMON**, F. Muell. in *Hook. Kew Journ.* ix. (1857) 17. *MYRTACEAE*, Beuth. & Hook. f. i. 711.
DRAPARNAUDIA, Montr. in *Mem. Acad. Lyon*, x. (1860) 205.
FREMYA, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* x. (1863) 372.
SALISIA, Panch. ex Brongn. & Gris, l. c. 373 (1863).
chrysanthus, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iii. 268.—Austral.
eucalyptoides, F. Muell. *Fragm.* i. 81=Metrosideros eucalyptoides.
Pancheri, Panch. & Sebert, Not. Bois N. Caléd. 253.—N. Caléd.
paradoxus, F. Muell. in *Hook. Kew Journ.* ix. (1857) 18.—Austral.
ruber, Panch. & Sebert, *Not. Bois N. Caléd.* 252=Metrosideros rubra.
Verdugonianus, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. *Nov. App.* 82.—Ins. Philipp.

- XANTHOXYLON**, Spreng. *Anleit.* ii. ii. 655 (1818)=seq.

- XANTHOXYLUM**, J. F. Gmel. *Syst.* 509 (1791)=**Zanthoxylum**, Linn. (*Rutac.*).

- XANTIUM**, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 170 (1781), sphalm.=**Xanthium**, Linn. (*Compos.*).

- XANTOLIS**, Rafin. *Sylva Tellur.* 35 (1838)=**Sideroxylon**, Dill. (*Sapot.*).
tomentosa, Rafin. l. c.=S. tomentosum.

- XANTOPHTALMUM**, Sang. in *Att. Acc. Pont. Lincei*, Ser. I. xvii. (1862) 41, 199=**Chrysanthemum**, Tourn. (*Compos.*).

- XARITONIA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 9 (1836)=**Oncidium**, Sw. (*Orchid.*).
elegans, Rafin. l. c.=O. quadripetalum.

- XATARDIA**, Meissn. *Gen.* 145 (1838). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 902.
PETITIA, J. Gay, in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* xxvi. (1832) 219.
scabra, *Meissn. Gen.* 145.—Mont. Pyren.

- XATARTA**, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, viii. (1881) 176=praec.

- XATATIA**, Bubani, in *Nouv. Ann. Sc. Nat. Bologn.* ix. (1843) 92, sphalm.=**Xatardia**, Meissn. (*Umbell.*).
pyrenaica, Bubani, l. c.=Xatardia scabra.

- XAVERIA**, Endl. *Gen. Suppl.* iv. iii. 30 (1850)=**Anemonopsis**, Sieb. & Zucc. (*Ranunc.*).
macrophylla, Endl. ex Walp. *Ann.* ii. 12=A. macrophylla.

- XELLYATHUM**, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 62 (1836)=**Oncidium**, Sw. (*Orchid.*).
altissimum, Rafin. l. c.=O. altissimum.

- XENIATRUM**, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 58 (1866)=**Clintonia**, Rafin. (*Liliac.*).
umbellatum, Salisb. l. c.=C. umbellata.

- XENISMIA**, DC. *Prod.* v. 509 (1836)=**Oligocarpus**, Less. (*Compos.*).
acanthosperma, DC. l. c.—Afr. austr.

- XENOCARPUS**, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* lix. 108 (1829)=**Cineraria**, Linn. (*Compos.*).
geifolius, Cass. l. c. 109=Senecio geifolius.

- XENOCHLOA**, Licht. in *Roem. & Schult. Syst.* ii. 29, 501 (1817). Genus *GRAMINEARUM* delendum.—Cf. Benth. & Hook. f. iii. 1096.
arundinacea, Licht. l. c. 501 (=Phragmites Xenochloa).—Afr. austr.

- XENOPHONTA**, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 484 (1873), err. typ.=seq.

- XENOPHONTIA**, Vell. *Fl. Flum.* 346 (1825); *l. c.* viii. t. 85 (1827)=**Barnadesia**, Mutis (*Compos.*).
caryophylla, Vell. ll. cc. 347; t. 85=B. rosea.
obovata, Regel, *Cat. Pl. Hort. Aksakov.* 147 (Quid?).—Hab.?

- XENOPHYA**, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 124 (1863-64). *AROIDEAE*, Beuth. & Hook. f. iii. 972.
brancaefolia, *Schott, l. c.*—N. Guin.

- XENOPOMA**, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* v. (1811) 399=**Micromeria**, Benth. (1829) (*Labi.*).
bolivianum, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 272=M. boliviana.
eugenioides, Griseb. l. c. xix. (1874) 237=M. eugenioides.
obovatum, Willd. in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* v. (1811) 399=M. obovata.
odorum, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 236=M. odora.
verticillatum, Griseb. l. c. 237=Bystropogon mollis.

- XEODOLON**, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 18 (1866)=**Scilla**, Linn. (*Liliac.*).
revolutum, Salisb. l. c.=S. revoluta.

- XERACINA**, Rafin. *Sylva Tellur.* 98 (1838)=**Adelobotrys**, DC. etc. (*Melastom.*).
aquatica, Rafin. l. c.=Nepsera aquatica.
scandens, Rafin. l. c.=A. scandens.
villosa, Rafin. l. c.=Desmoscelis villosa.

- XERALIS**, Rafin. *Sylva Tellur.* 82 (1838)=**Charachera**, Forsk. (*Inc. sed.*).

- XERALSINE**, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvi. (1868) 347=**Arenaria**, Rupp. (*Caryoph.*).
fasciculata, Fourr. l. c.=A. fasciculata.
mucronata, Fourr. l. c.=A. mucronata.

- XERANDRA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iii. 43 (1836)=**Iresine**, P. Br. (*Amarant.*).
celosioides, Rafin. l. c.=I. celosioides.
elator, Rafin. l. c.=I. elator.

- XERANTHEMUM**, Tourn. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 463.
HARRISONIA, Neck. *Elem.* i. 84 (1790).
XEROLOMA, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* lix. 120 (1829).
angustifolium, Lam. *Encyc.* iii. 241=Helichrysum paniculatum.
Annettae, Kalen. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1834) 194=squarrosus.
annuum, Asso, *Syn. Pl. Arag.* 118=inapertum.
annuum, Linn. *Sp. Pl.* 957.—Europ. austr.
annuum, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. ii. 180=cylindraceum.
argenteum, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 152=Helichrysum argenteum.
australe, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 33=inapertum.
bellidioides, Forst. f. *Prod.* 55=Helichrysum bellidioides.
bracteatum, Vent. *Jard. Malm.* 2=Helichrysum bracteatum.
caespitosum, Thou. *Fl. Tristan d'Acugn.* 39. t. 8 (*caespitosum*)=Chevreulia stolonifera.
canescens, Linn. *Pl. Afr. Rar.* 20; *Amoen. Acad.* vi. 100=Helipterum canescens.

XERANTHEMUM :—

- chinense, *Lour. Fl. Cochinch.* 498.—China.
ciliatum, Linn. *Sp. Pl.* 859=Cullumia decurrens.
corymbosum, Lam. *Encyc.* iii. 242=Helichrysum fulgidum.
crucifolium, Hill, *Veg. Syst.* ii. 95, sphalm.=erucifolium.
cylindraceum, Colm. *Apunt. Fl. Castell.* 85=inapertum.
cylindraceum, Sm. *Fl. Graec. Prod.* ii. 172.—Europ. austr.; As. Min.
cylindricum, Spreng. *Syst.* iii. 485=praec.
erectum, Presl, *Delic. Prag.* 106=inapertum.
ericoides, Lam. *Encyc.* iii. 240=Helichrysum ericoides.
erucifolium, Linn. *Sp. Pl.* 858=Serratula xeranthemoides.
fasciculatum, Andr. *Bot. Rep.* t. 242=Helichrysum sesamoides.
ferrugineum, Lam. *Encyc.* iii. 237=Helipterum ferrugineum.
foetidum, Moench, *Meth.* 582=inapertum.
fragrans, Andr. *Bot. Rep.* t. 561.—Afr. austr.
frigidum, Labill. *l. c.* Pl. *Syr. Dec.* ii. 9=Helichrysum frigidum.
fulgidum, Linn. f. *Suppl.* 365=Helichrysum fulgidum.
herbaceum, Andr. *Bot. Rep.* t. 487=Helichrysum squamosum.
heterophyllum, Lam. *Encyc.* iii. 239=Helichrysum sesamoides.
humile, Andr. *Bot. Rep.* t. 652=Helichrysum humile.
imbricatum, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 25=Metalsia uniflora.
imbricatum, Linn. *Pl. Rar. Afr.* 20; *Amoen. Acad.* vi. 100=Helipterum canescens.
inapertum, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 302=cylindraceum.
inapertum, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 2; Willd. *Sp. Pl.* iii. 1902.—Reg. Mediterr. et Cauc.
incanum, Crantz, *Inst.* i. 290=Helipterum canescens.
incomptum, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* lix. 115=inapertum.
inodorum, Moench, *Meth.* 582=annuum.
lancifolium, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 152=Helichrysum lancifolium.
leucanthemifolium, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 26=Conyza pinnatilobata.
longepapposum, Fisch. & Mey. in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* iv. (1835) 337.—As. Min.; Persia.
modestum, Ball, in *Journ. Bot.* xi. (1873) 368.—Marocc.
moniliforme, Houtt. ex DC. *Prod.* vi. 172=Helichrysum ericoides.
Neumayeri, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 266.—Europ. austr.
nobile, Grauer, *Dec.* 16.—Afr. austr.
orientale, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 3=Chardinia xeranthemoides.
ornatum, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* lix. 114=annuum.
paniculatum, Linn. *Sp. Pl.* 859=Helichrysum paniculatum.
pinifolium, Lam. *Encyc.* iii. 240=Helichrysum humile.
polyfolium, Crantz, *Inst.* i. 290=Helichrysum retortum.
proliferum, Linn. *Sp. Pl.* 858=Phaenocoma prolifera.
pungens, Lam. *Encyc.* iii. 236=Siebera pungens.
pungens, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 791=Serratula xeranthemoides.
radiatum, Lam. *Fl. Fr.* ii. 48=annuum.
radicans, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 153=Helichrysum retortum.
ramosum, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 26 (Quid?).—Afr. austr.
recurvatum, Linn. f. *Suppl.* 366=Helichrysum recurvatum.
regale, Salisb. *Prod.* 193=Phaenocoma prolifera.
retortum, Linn. *Sp. Pl.* 858=Helichrysum retortum.
retortum, Lour. *Fl. Cochinch.* 498=Helichrysum cochinchinense.
rigidum, Andr. *Bot. Rep.* t. 387=Helichrysum striatum.
serpyllifolium, Lam. *Encyc.* iii. 238=Helipterum canescens.
sesamoides, J. Gay, ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* ii. 128=cylindraceum.
sesamoides, Linn. *Sp. Pl.* 859=Helichrysum sesamoides.

XERANTHEMUM :—

- speciosissimum*, Linn. Sp. Pl. 858 = *Helipterum speciosissimum*.
speciosum, L'Hérit. ex DC. Prod. vi. 530 = *Chardinia xeranthemoides*.
speciosum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 153 = *Helipterum speciosissimum*.
spinosum, Linn. Sp. Pl. 859 = *Dicoma Burmanni*.
spirale, Andr. Bot. Reg. t. 262 = *Helipterum variegatum*.
squamosum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 152 = *Helichrysum squamosum*.
squarrosum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 101.—As. Min.; Persia.
squarrosum, Lam. Encyc. iii. 241 = *Metalasia umbellata*.
Stachelina, DC. Prod. vi. 212, sphalm. = *Helipterum virgatum*.
Stachelina, Linn. Syst. ed. XII. 546; Thunb. Prod. Pl. Cap. 153.—Afr. austr.
stoloniferum, Linn. f. Suppl. 366 = *Helichrysum stoloniferum*.
striatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 152.—Afr. austr.
tenuifolium, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 26 = *Helichrysum mucronatum*.
variegatum, Berg. Desc. Pl. Cap. 271 = *Helichrysum vestitum*.
vermiculatum, Lam. Encyc. iii. 240 = *Metalasia uniflora*.
vestitum, Linn. Sp. Pl. 858 = *Helichrysum vestitum*.
vestitum, Steud. Nom. ed. II. ii. 791 = *Helipterum variegatum*.
virgatum, Berg. Desc. Pl. Cap. 275 = *Helipterum virgatum*.

XERANTHIUM, Lepech. Reise Russ. i. 240 (1774) = **Xanthium**, Linn. (Compos.).

XERANTHUS, Miers, Trav. Chil. ii. 529 (1826), nomen = **Grahamia**, Gill. (Portulac.).
salicosus, Miers, l. c. = *G. bracteata*.

XERIS, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys-Oek. Ges. i. (1791) 256 = *Iris*, Tourn.

XEROBIUS, Cass. in (Bull. Soc. Philom. (1817) 153; fide Pfeiff. Nom. ii. 1629) Dict. Sc. Nat. lix. 127 (1829) = **Egletes**, Cass. (Compos.).
lanatus, Cass. l. c. 128 = *E. bellidiflora*.

XEROBOTRYS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 267 = *Arctostaphylos*, Adans. (Ericac.).
argutus, Nutt. l. c. 268 = *A. tomentosa*.
cordifolius, Nutt. l. c. = *A. tomentosa*.
glaucus, Nutt. l. c. = *A. glauca*.
tomentosus, Nutt. l. c. 267 = *A. tomentosa*.
venulosus, Nutt. l. c. 268 = *A. Hookeri*.

XEROCARPA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 583 (1840) = **Scaevola**, Linn. (Gooden.).

XEROCARPUS, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 169. t. 44 (1832) = **Rothia**, Pers. (Legumin.).
abyssinicus, Schweinf. Beitr. Pl. Aethiop. 21 = *Lotononis Leobordea*.
hirsutus, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 170 = *R. hirsuta*.

XEROCHLAMYS, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 45. **CHLAENACEAE**.
pilosa, Baker, l. c.—Madag.

XEROCHLOA, R. Br. Prod. 196 (1810). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1108.
barbata, R. Br. l. c. 197.—Austral.
imberbis, R. Br. l. c.—Austral.
laniflora, Benth. Fl. Austral. vii. 502.—Austral.
latifolia, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 2; Cat. Hort. Bog. Alt. 21.—Java.

XEROCLADIA, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 278 (1861-62). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 591.
Zeyheri, Harv. l. c.—Afr. austr.

XEROCOCCUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 52. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 70. *congestus*, Oerst. l. c. 52.—Costa Rica.

XERODERA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324 = **Ranunculus**, Tourn.
graminea, Fourr. l. c. = *R. gramineus*.

XEROGONA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 103 (1836) = **Passiflora**, Linn.
biloba, Rafin. l. c. = *P. capsularis*.

XEROLOPHUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 160 (1867) = **Thesium**, Linn. (Santal.).
alpinus, Dulac, l. c. 161 = *T. alpinum*.
pratense, Dulac, l. c. = *T. pratense*.
trinervis, Dulac, l. c. = *T. intermedium*.

XEROLOMA, Cass. in Dict. Sc. Nat. lix. 120 (1829) = **Xeranthemum**, Tourn. (Compos.).
foetidum, Cass. l. c. 121 = *Xeranth. cylindraceum*.
inapertum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 93 = *Xeranth. inapertum*?

XEROMALON, Rafin. New Fl. Am. iii. 11 (1836) = **Amelanchier**, Medic. (Rosac.).
obovatum, Rafin. l. c. 12 = *A. canadensis*.

XEROMPHIS, Rafin. Sylva Tellur. 21 (1838) = **Randia**, Houtt. (Rubiace.).
Retzi, Rafin. l. c. = *A. dumetorum*.

XERONEMA, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 316. **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 781.
SCLERONEMA, Brongn. & Gris, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. ii. (1864) 166.
Moorei, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 317.—N. Caled.

XEROPAPPUS, Wall. Cat. n. 2980 (1830?) = **Dicoma**, Cass. (Compos.).
lanuginosus, Wall. l. c. = *D. tomentosa*.

XEROPETALON, Hook. Bot. Misc. i. (1830) 174 = **Viviania**, Cav. (Geran.).

XEROPETALUM, Delile, Cent. Pl. Méroé, 84 (1826) = **Dombeya**, Cav. (Stercul.).
Brucei, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 29, nomen = *D. Bruceana*.
hirsutum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 78 = *D. Schimperiana*.
minus, Endl. Nov. Stirp. Dec. 37 = *D. multiflora*.
multiflorum, Endl. l. c. 36 = *D. multiflora*.
quinquesetum, Delile, Cent. Pl. Méroé, 84 = *D. multiflora*?
rotundifolium, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 295 = *D. rotundifolia*.
tiliaceum, Endl. Nov. Stirp. Dec. 37 = *D. tiliaea*.

XEROPETALUM, Reichb. Consp. 154 (1828) = **Dillwynia**, Sm. (Legumin.).
cinerascens, Steud. Nom. ed. II. ii. 791 = *D. cinerascens*.

XEROPHYLLUM, Michx. Fl. Bor. Am. i. 210 (1803). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 826.
asphodeloides, Nutt. Gen. Am. i. 235.—Am. bor.
asphodeloides, Spreng. Syst. ii. 144 = *setifolium*.
Douglasii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 284.—Am. bor. occ.
gramineum, Nutt. Gen. Am. i. 235 = *Stenanthium angustifolium*.
Sabadilla, D. Don, ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 712 = *Veratrum Sabadilla*.
setifolium, Michx. Fl. Bor. Am. i. 211.—Am. bor.
tenax, Nutt. Gen. Am. i. 235 = *setifolium*.

XEROPHYSA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 150 = **Astragalus**, Tourn. (Legumin.).
physodes, Stev. l. c. = *A. physodes*.

XEROPHYTA, Juss. Gen. 50 (1789) = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).
abietina, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 137 = *V. abietina*.
capillaris, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 264 = *V. capillaris*.
cinerascens, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. 292 = *V. cinerascens*.
clavata, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 233.—Afr. austr.

XEROPHYTA :—

- dasyliroides*, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 235.—Madag.
elegans, Baker, l. c. 234 = *V. elegans*.
equisetoides, Baker, l. c. 233.—Afr. austr.
madagascariensis, J. F. Gmel. Syst. 530.—Madag.
Melleri, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 234.—Afr. trop.
minima, Baker, l. c. 235 = *V. minima*.
minuta, Baker, l. c. 234.—Afr. austr.
neglecta, Schult. f. Syst. vii. 289.—Ins. Franciae.
pectinata, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 270.—Madag.
pinifolia, Lam. ex Poir. Encyc. viii. 804 = *madagascariensis*.
plicata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 137 = *V. plicata*.
Pohlana, Schult. f. Syst. vii. Add. 1666 = *V. minima*.
retinervis, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 233.—Afr. austr.
Schnitzleinia, Baker, l. c. 235.—Abyss.
Selloi, Baker, l. c. 236 = *V. Sellovi*.
sessiliflora, Baker, l. c. xx. (1882) 271.—Madag.
Spekei, Baker, l. c. xiii. (1875) 234.—Afr. trop.
spinulosa, Kidl. in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 333.—Madag.
squarrosa, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 264 = *V. squarrosa*.
stenophylla, Baker, l. c. 265 = *V. stenophylla*.
taxifolia, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. 291 = *V. pusilla*?
tragacantha, Mart. ex Schult. f. l. c. 290 = *V. tragacantha*.
triquetra, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 236 = *V. triquetra*.
velutina, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 265 = *V. velutina*.
viscosa, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875) 235.—Afr. austr.

XEROSIPHON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 55 = **Gomphrena**, Linn. (Amarant.).
gracilis, Turcz. l. c. = *G. angustiflora*.

XEROSOLLYA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 362 = **Sollya**, Lindl. (Pittosp.).
Gilbertii, Turcz. l. c. = *S. parviflora*?

XEROSPERMUM, Blume, Rumphia, iii. 99 (1850). **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 405.
acuminatum, Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 95.—Borneo.
glabratum, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 300, 310; ix. (1879) 516 = *Noronhianum*.
laevigatum, Radlk. l. c. 305, 310 (*Sapindi* sp.?).—Ind. or.
lanceolatum, Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 95.—Borneo.
muricatum, Radlk. l. c.—Ind. or.
Noronhianum, Blume, Rumphia, iii. 100.—Malaya.

XEROTES, R. Br. Prod. 252 (1810). **FUNACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 863.
LOMANDRA, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 92 (1804), nomen prius.
aemula, R. Br. Prod. 262 = *multiflora*.
arenaria, R. Br. l. c. = *longifolia*.
asparagoides, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 49 = *pauciflora*.
Banksii, R. Br. Prod. 263.—Austral.
Brownii, F. Muell. Fragm. viii. 206 = *multiflora*.
caespitosa, Benth. Fl. Austral. vii. 104.—Austral.
collina, R. Br. Prod. 260.—Austral.
decomposita, R. Br. l. c. 262 = *multiflora*.
denticulata, R. Br. l. c. 261 = *filiformis*.
distans, R. Br. l. c. 262 = *multiflora*.
Drummondii, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 99.—Austral.
dura, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 42.—Austral.
echinata, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. vii. 112 = *Acanthocarpus Preissii*.
efusa, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 101.—Austral.
elongata, Benth. Fl. Austral. vii. 106.—Austral.
Endlicheri, F. Muell. Fragm. viii. 205.—Austral.
filamentosa, Brongn. in Duper. Voy. Coq. Bot. 183. t. 35 = *leucocephala*.
filiformis, R. Br. Prod. 261.—Austral.
fimbriata, F. Muell. Fragm. viii. 211 = *Chamaexeros fimbriata*.

XEROTES :—

- flexifolia*, R. Br. *Prod.* 260.—Austral.
fluvialis, R. Br. l. c. 262 = longifolia.
fragrans, F. Muell. ex Sond. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 219 = effusa.
glauca, R. Br. *Prod.* 260.—Austral.
gracilis, R. Br. l. c. 261 = filiformis.
graminea, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 48 = pauciflora.
hastilis, R. Br. *Prod.* 263.—Austral.
Hystrix, R. Br. l. c. 262 = longifolia.
juncea, F. Muell. in *Trans. Vict. Inst.* i. (1855) 135.—Austral.
latifolia, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 65, in syn., sphalm. = longifolia.
laxa, R. Br. *Prod.* 261 = filiformis.
lencocephala, R. Br. l. c. 260.—Austral.
longifolia, R. Br. l. c. 262.—Austral.
media, R. Br. l. c. = multiflora.
micrantha, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 49.—Austral.
montana, R. Br. *Prod.* 262 = longifolia.
mucronata, R. Br. l. c. 260 = *Acanthocarpus* Preissii ?
mucronata, Sieber, ex Benth. *Fl. Austral.* vii. 106 = glauca.
multiflora, R. Br. *Prod.* 262.—Austral.
odora, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 50.—Austral.
Ordii, F. Muell. *Fragm.* xi. 23.—Austral.
pauciflora, R. Br. *Prod.* 261.—Austral.
Preissii, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 50.—Austral.
purpurea, Endl. l. c. 49.—Austral.
rigida, R. Br. *Prod.* 261.—Austral.
rigida, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 50 = *Sonderi*.
rupestris, Endl. l. c.—Austral.
sericea, Endl. l. c. 51.—Austral.
Serra, Endl. l. c. 49 = *Chamaexeros* Serra.
Sonderi, F. Muell. *Fragm.* viii. 206.—Austral.
sororia, F. Muell. *First Gen. Rep.* 15; *Benth. Fl. Austral.* vii. 100.—Austral.
spartea, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 51.—Austral.
suaveolens, Endl. l. c. 50.—Austral.
tenuifolia, R. Br. *Prod.* 261 = filiformis.
tenuifolia, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 49 = *Endlicheri*.
Thunbergii, F. Muell. *Fragm.* viii. 208 = filiformis.
turbinata, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 51.—Austral.
typhina, Lindl. in *Mitch. Three Exped.* ii. 41 = *leucocephala*.
umbrosa, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 50 = *suaveolens*.

XEROTHAMNUS, DC. *Prod.* v. 311 (1836) = **Osteospermum**, Linn. (Compos.).
Ecklonianus, DC. l. c. = *O. scabrum*.

XEROTIS, Hoffm. *Verz. Pfl. Nachtr.* ii. 38 (1826) = **Xerotes**, R. Br. (Juncac.).

XEROTIUM, Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ. ed. I.* ii. 343 (1825) = **Filago**, Linn. (Compos.).
gallicum, Bluff & Fingerh. l. c. 344 = *F. gallica*.
minimum, Bluff & Fingerh. l. c. 345 = *F. minima*.
montanum, Bluff & Fingerh. l. c. 344 = *F. minima*.
subulatum, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 514 = *F. gallica*.

XESTAEA, Griseb. in *Linnaea*, xxii. (1849) 35 = **Schultesia**, Mart. (Gentian.).
lisianthoides, Griseb. l. c. 36 = *S. lisianthoides*.

XETOLA, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 95 (1836) = **Cephalaria**, Schrad. (Dipsac.).
transylvanica, Rafin. l. c. = *C. transylvanica*.
trenta, Rafin. l. c. = *C. transylvanica*.

XETOLIGUS, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 74 (1836) = **Stevia**, Cav. (Compos.).
brevifolius, Rafin. l. c.—Am. bor.
salicifolius, Rafin. l. c. = *S. salicifolia*.

XILOPIA, Juss. *Gen.* 284 (1789) = **Xylopi**, Linn. (Anonac.).

XIMENESIA, Cav. *IC.* ii. 60. t. 178 (1793) = **Verbesina**, Linn. (Compos.).
australis, Hook. & Arn. ex DC. *Prod.* vii. 291 = *V. australis*.
Cavanillesii Spreng. *Syst.* iii. 605 = *Iostephane heterophylla*.

XIMENESIA :—

- cordata*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 228 = *Encelia cordata*.
encelioides, Cav. *IC.* ii. 60. t. 178 = *Verbesina encelioides*.
foetida, Spreng. *Syst.* iii. 606 = *Encelia foetida*.
heterophylla, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 227. t. 280 = *Encelia heterophylla*.
hirta, Mart. ex DC. *Prod.* v. 578 = *Encelia mexicana*.
hispida, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 227 = *Encelia hispida*.
microptera, DC. *Prod.* v. 627 = *V. australis*.
procumbens, Boj. ex DC. l. c. 561 = *Aspilia Bojeri*.

XIMENIA, Plum. ex Linn. *Gen. ed. I.* 361 (1737).

- OLACINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 346.
HEYMASSOLI, Aubl. *Pl. Gui.* 324. t. 125 (1775).
PIMECARIA, Rafin. *Alsog. Am.* 64 (1838).
ROTTBOELIA, Scop. *Introd.* 233 (1777).
aculeata, Crantz, *Inst.* ii. 381 = americana.
aegyptiaca, Juss. *Gen.* 260 = *Balanites Roxburghii*.
aegyptiaca, Linn. *Sp. Pl.* 1194 = *Balanites aegyptiaca*.
Agihaliid, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 2 = *Balanites aegyptiaca*.
americana, Linn. *Sp. Pl.* 1193.—Cosmop. trop.
arborescens, Crantz, *Bot. Himal.* 154 = *Zygophyllum arboreum*.
arborescens, Tussac, ex Walp. *Rep. i.* 377, sphalm. = americana.
borneensis, Baill. *Adansonia*, xi. (1873-76) 271 = *Scorodocarpus borneensis*.
caffra, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 21.—Afr. austr.
coriacea, Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. ii. 10.—Bras.
elliptica, Forst. f. *Prod.* 27 = americana.
elliptica, Spreng. *Syst.* ii. 217, partim = verrucosa.
exarmata, F. Muell. in *Trans. Phil. Inst. Vict.* iii. (1859) 22.—Austral.
ferox, Poir. *Encyc.* viii. 805 = *Balanites aegyptiaca*.
fluminiensis, M. Roem. *Syn. Hesper.* 22 = americana.
inermis, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 497 = americana.
lanceolata, DC. *Prod.* i. 533 = *Acronychia laurifolia*.
laurina, Delile, in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xx. (1843) 89 = americana.
loranthifolia, Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 177 = americana.
montana, Macfad. *Fl. Jamaica.* i. 121 = americana.
multiflora, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 19 = americana.
oblonga, Lam. ex Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* i. 185 = americana.
oblongifolia, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 792.—Austral.
olacoides, Wight & Arn. *Prod.* 89 = *Opilia amentacea*.
parviflora, Benth. *Pl. Hartw.* 7.—Mexic.
rigidum, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 154, 466 = *Zygophyllum rigidum*.
Russelliana, Wall. *Cat. n.* 6784 = americana.
spinosa, Salisb. *Prod.* 276 = americana.
subscandens, Griff. *Notul.* iv. 691.—Ind. or.
verrucosa, M. Roem. *Syn. Hesper.* 23.—Ins. S. Doming.

XIPHIDIUM, Loeffl. *It. Hisp.* 179 (1758); Aubl. *Pl. Gui.* 33. t. 11 (1775). **HAEMODORACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 675.

- albidum*, Lam. *Illustr.* i. 131 = caeruleum.
album, Willd. *Sp. Pl.* i. 248 = caeruleum.
angustifolium, Willd. ex Link. *Jahrb.* i. III. (1820) 73 = *Wachendorfia orinocensis*.
caeruleum, Aubl. *Pl. Gui.* i. 33. t. 11.—Am. trop.
floribundum, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 17 = caeruleum.
giganteum, Lindl. *Bot. Reg.* (1846) t. 66 = caeruleum.
rubrum, D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Oct. 1832) 235.—Peruv.
xanthorrhizon, Wright, ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 252.—Cuba.

XIPHION, Tourn. ex Mill. *Gard. Dict. ed. VI* (1752) = **Iris**, Tourn.
acroides, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. Pseudacorus*.
Aitchisoni, Baker, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 108 = *I. Aitchisoni*.
alatum, Baker, l. c. ix. (1871) 108 = *I. alata*.
Aucherii, Baker, l. c. 110 = *I. fumosa*.
brachycuspis, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. setosa*.

XIPHION :—

- caucasicum*, Baker, in *Journ. Bot.* ix. (1871) 109 = *Iris caucasicum*.
Danfordiae, Baker, l. c. xiv. (1876) 265 = *I. Danfordiae*.
diversifolium, Klatt, in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 572 = *Moraea diversifolia*.
Donianum, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. ensata*.
filifolium, Klatt, in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 571 = *I. filifolia*.
fimbriatum, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. japonica*.
flaccidum, Alef. l. c. = *I. versicolor*.
flexuosum, Alef. l. c. = *I. sibirica*.
foetidissimum, Parl. *Nuov. Gen. e Spec.* 45 = *I. foetidissima*.
Fontanesii, Baker, in *Gard. Chron.* (1876) 559 = *I. Fontanesii*.
gramineum, Schrank, in *Flora*, vii. (1824) II. Beibl. 17 = *I. graminea*.
Gueldenstedtii, Schrank, l. c. 18 = *I. Gueldenstaediana*.
Histrio, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 6033 = *I. Histrio*.
Jacquinii, Schrank, in *Flora*, vii. (1824) II. Beibl. 17 = *I. xiphoides*.
juncea, Klatt, in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 570 = *I. juncea*.
Kolpakowskianum, Baker, in *Bot. Mag.* t. 6489 = *I. Kolpakowskiana*.
Krelagi, Klatt, in *Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 361 = *I. reticulata*.
latifolium, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 3; Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. xiphoides*.
lusitanicum, Alef. l. c. = *I. juncea*.
mellifolium, Medic. in *Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys.* (1790) 419, nomen (Quid?).—Hab. ?
Monnieri, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. Monnieri*.
nothum, Alef. l. c. = *I. spuria*.
ochroleucum, Alef. l. c. = *I. ochroleucum*.
ochroleucum, Schrank, in *Flora*, vii. (1824) II. Beibl. 18 = *I. Gueldenstaediana*.
orientale, Schrank, l. c. 19 = *I. sibirica*.
palaestinum, Baker, in *Journ. Bot.* ix. (1871) 108 = *I. palaestina*.
Pallasii, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. ensata*.
papilionaceum, Schrank, in *Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 174 = *Moraea papilionacea*.
persicum, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 1 = *I. persica*.
planifolium, Mill. l. c. n. 4 = *I. alata*.
pratense, Parl. *Nuov. Gen. e Spec.* 45 = *I. sibirica*.
Pseudo-acorus, Schrank, *Fl. Monac.* i. t. 99 = *I. Pseudo-acorus*.
reticulatum, Klatt, in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 572 = *I. reticulata*.
ruthenicum, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. ruthenica*.
sibiricum, Schrank, in *Flora*, vii. (1824) II. Beibl. 19 = *I. sibirica*.
Sisyrinchium, Baker, in *Journ. Bot.* ix. (1871) 42 = *I. Sisyrinchium*.
sordidum, Salisb. in *Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 303 = *I. juncea*.
spurium, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. spuria*.
stenogynum, Alef. l. c. 297 = *I. Gueldenstaediana*.
Stocksii, Baker, in *Gard. Chron.* (1876) 723 = *I. Stocksii*.
tenuifolium, Schrank, in *Flora*, vii. (1824) II. Beibl. 19, 20 = *I. tenuifolia*.
tingitanum, Baker, in *Journ. Bot.* ix. (1871) 13 = *I. tingitana*.
tingitanum, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5981 = *I. filifolia*.
triflorum, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. ensata*.
tripetalum, Alef. l. c. = *I. tripetala*.
versicolor, Alef. l. c. = *I. versicolor*.
verum, Schrank, in *Flora*, vii. (1824) II. Beibl. 16 = *I. Xiphium*.
virginicum, Alef. in *Bot. Zeit.* xxi. (1863) 297 = *I. versicolor*.
vulgare, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 2 = *I. Xiphium*.

XIPHIIUM, Mill. *Gard. Dict. ed. VII.* (1759) = *prae*.

XIPHIZUSA, Reichb. f. in Bot. Zeit. ix. (1852) 919 = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
chloroptera, Reichb. f. l. c. 919 = B. meridense.
gladiata, Reichb. f. l. c. = B. meridense.
Weddellii, Reichb. f. l. c. = B. Weddellii.

XIPHOCARPUS, Presl, Symb. Bot. i. 13. t. 7 (1830) = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).
candidus, Endl. Gen. 1273; Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 76 = T. candida.
martinicensis, Presl, Symb. Bot. i. 14. t. 7 = T. candida.
minor, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 76.—Java.

XIPHOCHAETA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 44. t. 250 (1842) = **Stilplopappus**, Mart. (Compos.).
aquatica, Poepp. & Endl. l. c. = S. viridis.

XIPHOCOMA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) ii. 270, in textu; xxv. (1852) i. 537. t. 7 = **Ranunculus**, Tourn.
dasycarpa, Stev. l. c. (1852) 539. t. 7. f. 3 = R. dasy-carpus.
heterophylla, Stev. l. c. f. 2 = R. orientalis.
leptalea, Stev. l. c. 541 = R. leptaleus.
orientalis, Stev. l. c. 538 = R. orientalis.
tenuifolia, Stev. l. c. 540. t. 7. f. 4 = R. orientalis.

XIPHOLEPIS, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 344 (1863) = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
aspera, Steetz, l. c. = V. Roxburghii.
silhetensis, Steetz, l. c. 345 = V. bracteata.

XIPHOPHYLLUM, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789) = **Cephalanthera**, Rich. (Orchid.).

XIPHOSIUM, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. 364 (1845) = **Eria**, Lindl. (Orchid.).
acuminatum, Griff. l. c. = E. carinata.
roseum, Griff. l. c. = E. rosea.

XIPHOTHECA, Eckl. & Zeyh. Enam. 166 (1836) = **Priestleya**, DC. (Legumin.).
axillaris, Eckl. & Zeyh. l. c. 167 = Amphithalea cuneifolia.
lanceolata, Eckl. & Zeyh. l. c. = P. sericea?
polycarpa, Eckl. & Zeyh. l. c. 166 = P. tecta.
rotundifolia, Eckl. & Zeyh. l. c. = P. tecta.
sericea, Eckl. & Zeyh. l. c. 167 = P. sericea.
tomentosa, Eckl. & Zeyh. l. c. 166 = P. villosa.
villosa, Eckl. & Zeyh. l. c. = P. villosa.

XOLANTHA, Rafin. Caratteri, 73 (1810) = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.).
racemosa, Rafin. l. c. = H. variabile.

XOLANTHES, Rafin. Sylva Tellur. 132 (1838) = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.).
guttatus, Rafin. l. c. = H. guttatum.
racemosa, Rafin. l. c. = H. variabile.

XOLEMIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 22 (1836) = **Gentiana**, Tourn.
acuminata, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
albiflora, Rafin. l. c. = G. albiflora.
axillaris, Rafin. l. c. = G. axillaris.
Catesbei, Rafin. l. c. = G. Saponaria.
clausa, Rafin. l. c. = G. Andrewsii.
Collinsiana, Rafin. l. c. = G. Collinsiana.
Elliottea, Rafin. l. c. = G. Elliottea.
enervis, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
fistulosa, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
heterophylla, Rafin. l. c. = G. ochroleuca.
latifolia, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
longiflora, Rafin. l. c. = G. altaica.
obovata, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
palustris, Rafin. l. c. = Erythraea ramosissima.
rotundifolia, Rafin. l. c. = G. bavarica.
rubella, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
serpentaria, Rafin. l. c. = G. ochroleuca.
Shortiana, Rafin. l. c. = G. Shortiana.
striata, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
terniflora, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?
trachiloma, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab.?

XOLISMA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 193 = **Andromeda**, Linn. (Ericac.).

XUAREZIA, Pers. Syn. i. 176 (1805) = seq.

XUAREZIA, Ruiz & Pav. Prod. 24. t. 4 (1794) = **Capraria**, Tourn. (Scrophul.).
biflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 13 = C. biflora.

XURIS, Adans. Fam. ii. (20) (1763) = **Xyris**, Gronov.
fistulosa, Rafin. Fl. Tellur. ii. 14 (Quid?).—Hab.?

XYLADENIUS, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 41 (1825) = **Banara**, Aubl. (Samyd.).
glandulosus, Desv. ex Ham. l. c. = B. guianensis.

XYLANTHEMA, Neck. Elem. i. 67 (1790) = **Cnicus**, Linn. (Compos.).

XYLIA, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 417. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 594.
dolabriformis, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 417.—Burma; Malaya.
Hildebrandtii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 353.—Madag.
longipes, Baill. l. c. 354.—Madag.

XYLOBIUM, Lindl. Bot. Reg. sub t. 897 (1825). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 547.
ONKERIPUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 42 (1836).
PENTULOPS, Rafin. l. c. (1836).
brachypus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 252.—Nicaragua.
concaum, Hemsl. l. c.—Guatemala.
elongatum, Hemsl. l. c.—Am. centr.
longifolium, Lindl. ex Spreng. Syst. iii. 733.—N. Granat.
squalens, Lindl. Bot. Reg. sub t. 897.—Bras.
stachyobium, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 252.—Nicaragua.

XYLOCALYX, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 84. **SCROPHULARINEAE**.
asper, Balf. f. l. c.—Ins. Socotra.

XYLOCARPUS, Koen. in Naturf. xx. (1784) 2; et ex A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 243 = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).
Antila, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4893 = Walsura ternata.
Carapa, Spreng. Syst. ii. 213 = C. guianensis.
carnulosus, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 582.—Java.
Forstenii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 62.—Ins. Celebes.
Granatum, Koen. in Naturf. xx. (1784) 2 = C. moluccensis.
guineensis, M. Roem. Syn. Hesper. 124 = C. procera, moluccensis.
moluccensis, M. Roem. l. c. = C. moluccensis.
obovatus, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 244 = C. moluccensis.
procerus, Steud. Nom. ed. II. ii. 793 = C. procera.
Touloucouina, Steud. l. c. 793 = C. procera.

XYLOCOCCUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 258 = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).
bicolor, Nutt. l. c. 259 = A. bicolor.

XYLOLAENA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1884) 410 = XYLOOLAENA = **Scleroolaena**, Baill. (Chlaen.).

XYLOMELUM, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 214. **PROTEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 179.
angustifolium, Kipp. ex Meissn. in Hook. Journ. Bot. (1852) 209.—Austral.
occidentale, R. Br. Prot. Nov. 31.—Austral.
pyriforme, Knight, Prot. 105; R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 189.—Austral.
salicinum, A. Cunn. ex R. Br. Prot. Nov. 31.—Austral.
Scottianum, F. Muell. Fragm. v. 174 = salicinum.

XYLON, Linn. Gen. ed. I. 53 (1737) = **Bombax**, Linn. (Malvac.).

XYLON, [Tourn.] Medic. Malv. 43 (1787) = **Gossypium**, Linn. (Malv.).
hirsutum, Medic. l. c. = G. herbaceum.
indicum, Medic. l. c. = G. herbaceum.
leoninum, Medic. l. c. = G. herbaceum.
religiosum, Moench, Meth. 616 = G. herbaceum.
strictum, Medic. Malv. 43 = G. herbaceum.

XYLOOLAENA, Baill. Dict. ii. 2, in obs. (1879) = **Scleroolaena**, Baill. (Chlaen.).
Richardi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1884) 412 = S. Richardi.

XYLOPHYLLA, Linn. Mant. ii. 147 (1771); Schreb. Gen. 200 (1789) = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).
angustifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 23 = P. angustifolius.
Arbuscula, Sw. l. c. = P. speciosus.
artensis, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 250 (Exocarpi sp.).—N. Caled.
asplenifolia, Salisb. Prod. 390 = P. latifolius.
elongata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 53 = P. angustifolius.
ensifolia, Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 249 = Exocarpus xylophyllodes.
falcata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 28 = P. epiphyllanthus.
latifolia, Linn. Mant. ii. 221 = P. latifolius.
latifolia, Sims, Bot. Mag. t. 1021 = P. speciosus.
latifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 28 = P. montanus.
linearis, Steud. Nom. ed. II. ii. 793 = P. linearis.
longifolia, Linn. Mant. ii. 221 = Exocarpus ceramicus.
Lucena, Roth, Nov. Pl. Sp. 185 = Fluggia Leucopyrus.
media, Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 391, nomen.—Jamaic.
montana, Sims, Bot. Mag. t. 2652 = P. angustifolius.
montana, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 28 = P. montanus.
obovata, Willd. Enum. Hort. Berol. 329 = Fluggia microcarpa.
obtusata, Thunb. Pl. Bras. Dec. i. 12 = P. obtusatus.
ramiflora, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 376 = Securinea ramiflora.
speciosa, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 360 = P. speciosus.

XYLOPIA, Linn. Syst. ed. X. 1250 (1759). **ANONACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 28.
BULLIARDA, Neck. Elem. ii. 321 (1790).
COELOCLINE, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. v. (1832) 208.
HABZELIA, A. DC. l. c. 207 (1832).
KROCKERIA, Neck. Elem. ii. 317 (1790).
PARARTABOTRYS, Miq. Fl. Ind. Bot. Suppl. 154 (1860).
PATONIA, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 18 (1838).
XYLOPICRUM, P. Br. Hist. Jamaica. 250 (1756).
acuminata, Dun. Mon. Anon. 122. t. 16.—Ind. occ.
acutiflora, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1862) 478 = Dunaliana.
acutiflora, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 55, in adnot.—Afr. trop.
aethiopica, A. Rich. l. c. 53.—Afr. trop.
africana, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 30.—Afr. trop.
amplexicaulis, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 142.—Madag.
aromatica, Baill. Hist. Pl. i. 278 = Unona concolor.
barbata, Hoffm. ex Mart. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 43.—Bras.
Blancoi, Vidal, Sinops. Atlas, p. xii. t. 5. f. C.—Ins. Philipp.
brasilensis, Spreng. Neue Entdeck. iii. 50.—Bras.
buxifolia, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 143.—Madag.
Cacanes, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1873) 155.—Bras.
caudata, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 125.—Malaya.
Championii, Hook. f. & Thoms. l. c. 126.—Zeylan.
cubensis, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 36.—Cuba.
dicarpa, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 85.—Singapore.
Dunaliana, Vallot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1883) 219.—Afr. trop.
elliptica, Maing. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 86.—Malacca.
emarginata, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 42.—Bras.
ferruginea, Baill. Hist. Pl. i. 225.—Malacca.
frutescens, Aubl. Pl. Gu. ii. 602. t. 292.—Am. trop.

XYLOPIA:—

- frutescens*, Gaertn. Fruct. i. 339. t. 69. f. 7 = *muricata*.
frutescens, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273 = *Anona cinerea*.
fusca, Maing. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 83.—Malacca.
glabra, Linn. *Syst.* ed. X. 1250.—Jamaic.
grandiflora, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* i. 40. t. 8.—Bras.
Humboldtiana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 340.—Madag.
jamaicensis, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 6.—Jamaic.
javanica, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 793.—Java.
Lamarckii, Baill. *Adansonia*, iv. (1863-64) 142.—Madag.
Langsdorffiana, A. St. Hil. & Tul. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. xvii. (1842) 133.—Bras.
Lastelliana, Baill. *Adansonia*, iv. (1863-64) 144.—Madag.
ligustrifolia, Dun. *Mon. Anon.* 121. t. 18.—Ecuador.
longifolia, A. DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève.* v. (1832) 210.—Panama.
lucida, Baill. *Hist. Pl.* i. 278.—Bras.
Maccraei, F. Muell. *Fragm.* vi. 176 = *Melodorum Maccraei*.
macrantha, Planch. & Triana, in *Ann. Sc. Nat. Sér.* IV. xvii. (1862) 38.—N. Granat.
magna, Maing. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* i. 84.—Malacca.
Maingayi, Hook. f. & Thoms. l. c. 85.—Malacca.
malayana, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 125.—Malaya.
martinicensis, Spreng. *Syst.* ii. 636.—Ins. Martinic.
micrantha, Scheff. in *Ann. Jard. Buitenz.* ii. (1885) 27.—N. Guin.
muricata, Linn. *Syst.* ed. X. 1250.—Jamaic.
muricata, Vell. *Fl. Flum.* ix. t. 127 = *frutescens*.
nigricans, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 125.—Zeylan.
nitida, Dun. *Mon. Anon.* 122. t. 20.—Guian.
obtusifolia, Hook. f. & Thoms. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 83.—Malacca.
obtusifolia, A. Rich. *Ess. Fl. Cub.* 39.—Cuba.
ochrantha, Mart. *Fl. Bras.* xiii. i. 43.—Bras.
odoratissima, Welw. ex Oliver, *Fl. Afr. Trop.* i. 31.—Afr. trop.
orientalis, Spreng. *Syst.* ii. 636 = *Unona selanica*.
oxyantha, Hook. f. & Thoms. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 83.—Singapore.
pallenscens, Baill. *Adansonia*, xi. (1873-76) 178.—N. Caled.
Pancheri, Baill. l. c. 177.—N. Caled.
parviflora, Benth. in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 479 = *Dunaliana*.
parviflora, Spruce, in *Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 6.—Bras.
parviflora, Valtot, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 219.—Afr. trop.
parvifolia, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 125.—Zeylan.
parvifolia, Schlecht. in *Linnaea*, ix. (1834) 327 = *brasilensis*.
Pierrei, Hance, in *Journ. Bot.* xv. (1877) 328.—Cambodia.
polycarpa, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 32.—Afr. trop.
prinosides, Dun. *Mon. Anon.* 122. t. 15.—Guian.
pustulata, Hook. f. & Thoms. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 85.—Malacca.
pygmaea, Warm. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1873) 151.—Bras.
Richardi, Boiv. ex Baill. *Adansonia*, iv. (1863-64) 145.—Ins. Mascar.
rubescens, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 30.—Afr. trop.
ruscifolia, Humb. & Bonpl. ex DC. *Syst.* i. 500 = *ligustrifolia*.
salicifolia, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 63.—Am. austr.
sericea, A. St. Hil. *Pl. Us. Bras.* t. 33.—Bras.
setosa, Poir. *Encyc.* viii. 812 = *frutescens*.
Spruceana, Benth. ex Spruce, in *Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 5.—Bras.
Thomsoni, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 31.—Afr. trop.
Tooropiana, Scheff. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxii. (1871) 392.—Malaya.
trunciflora, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, vi. (1831) 417.—Mexic.
undulata, Beauv. *Fl. Owar.* i. 27. t. 16.—Afr. trop.
Viellardi, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 202.—N. Caled.
Vielana, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* t. 34.—Cochinch.

VOL. II.

XYLOPICRON, Adans. Fam. ii. 365 (1763) = *Xylopi*, Linn. (*Anonac.*).

- glabrum*, Crantz, *Inst.* ii. 202 = *Xylopi glabra*.
muricatum, Crantz, l. c. = *Xylopi muricata*.

XYLOPICRUM, P. Br. *Hist. Jamaic.* 250 (1756) = *præc.*

- XYLOPLEURUM*, Spach, *Hist. Vég. Phan.* iv. 378 (1835) = *Oenothera*, Linn. (*Onagrar.*).
Berlandieri, Spach, in *Nouv. Ann. Mus. Par.* iv. (1835) 370 = *O. Delessertiana*.
Drummondii, Spach, l. c. 371 = *O. speciosa*.
hirsutum, Spach, l. c. 370 = *O. hirsuta*.
Nuttallii, Spach, l. c. 371 = *O. speciosa*.
obtusifolium, Spach, l. c. 372 = *O. speciosa*.

XYLORHIZA, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 297 = *Aster*, Tourn. (*Compos.*).
glabruscula, Nutt. l. c. = *A. Xylorhiza*.
villosa, Nutt. l. c. 298 = *A. Xylorhiza*.XYLORHIZA, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 89 (1866) = *Allium*, Tourn. (*Liliac.*).
angulosa, Salisb. l. c. = *A. angulosum*.
senescens, Salisb. l. c. = *A. senescens*.XYLOSMA, Forst. f. *Prod.* 72 (1786). *BIXINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 128.

- BESSERA, Spreng. *Pugill.* ii. 90 (1815).
 CERAPOLOPHUM, Karst. *Fl. Columb.* 123. t. 61, 62 (1859?).
 HISINGERA, Hellen. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1792) 32. t. 2.
 KOELERA, Willd. *Sp. Pl.* iv. 750 (1805).
 LIMACIA, F. G. Dietr. *Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr.* iv. 383 (1818).
 MYROXYLON, Forst. *Char. Gen.* 125 (1776).
 RUMEA, Poit. in *Mém. Mus. Par.* i. (1815) 62. t. 4.
 Benthami, Griseb. in *Goett. Abh.* ix. (1861) 27.—Am. trop.
buxifolium, A. Gray, in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1860) 155.—Cuba.
calophyllum, Griseb. in *Goett. Abh.* ix. (1861) 27.—Bras.
ciliatifolium, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 449.—Bras.
cinereum, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* i. 57.—Mexic.
conicarpum, Clos, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* viii. (1857) 232 = *suaveolens*.
controversum, Clos, l. c. 231.—Reg. Himal.
 Cumingii, Clos, l. c.—Ins. Philipp.
digynum, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 447.—Bras.
elegans, Planch. & Triana, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 97.—N. Granat.
ellipticum, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* i. 57.—Mexic.
ellipticum, Tul. in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* ix. (1868) 343.—Madag.
flexuosum, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* i. 57.—Mexic.
fragrans, Decne. in *Bot. Voy. Venus*, t. 25.—Hab.?
hawaiense, Seem. *Fl. Vit.* 7.—Ins. Sandvic.
 Hillebrandi, Wawra, in *Flora*, lvi. (1873) 171.—Ins. Sandvic.
infestum, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1860) 155.—Cuba.
integrifolium, Clos, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* viii. (1857) 230 = *orbiculatum*.
intermedium, Griseb. in *Goett. Abh.* ix. (1861) 27; *Triana & Planch. l. c.* xvii. (1861) 100.—Veraguas.
japonicum, A. Gray, in *Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1859) 381 = *racemosum*.
lanceolatum, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 553.—Mexic.
latifolium, Hook. f. & Thoms. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 194.—Ind. or.
Lepinei, Clos, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* viii. (1857) 233 = *suaveolens*.
leprosipes, Clos, l. c. 230.—Java.
longifolium, Clos, l. c.—Reg. Himal.
luzonensis, Clos, l. c. 231.—Ins. Philipp.
molle, Planch. & Triana, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 98.—N. Granat.
monospora, Harv. *Thes. Cap.* ii. 52.—Afr. austr.
nitidum, A. Gray, ex Griseb. in *Fl. Brit. W. Ind.* 21.—Am. trop.
obovatum, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 97.—N. Granat.
orbiculatum, Forst. f. *Prod.* 72.—Ins. Amicor.

XYLOSMA:—

- ovatum*, Benth. *Fl. Austral.* i. 108.—Austral.
panamensis, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 554.—Panama.
prunifolium, Griseb. in *Goett. Abh.* ix. (1861) 27; *Planch. & Triana*, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 98.—N. Granat.
pubescens, Griseb. l. c. xxiv. (1879) 20.—Reg. Argent.
racemosum, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 155.—Ind. or.
Salzmanni, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 448.—Bras.
schaefferioides, A. Gray, in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1860) 155.—Cuba.
Seemannii, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 99.—Panama.
senticosum, Hance, in *Journ. Bot.* vi. (1868) 328.—China.
spiculiferum, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 96.—N. Granat.
suaveolens, Forst. f. *Prod.* 72.—Ins. Pacif.
velutinum, Triana & Karst. in *Karst. Fl. Columb.* i. 123. t. 97.—N. Granat.

XYLOSTEON, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 157, 501 (1763) = *Lonicera*, Linn. (*Caprif.*).

- alpigenum*, Fuss, *Fl. Transs.* 284 = *L. alpigena*.
alpinum, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II. iv. 336 = *L. alpigena*.
arborescens, Webb, *Iter Hisp.* 42 = *L. arborescens*.
asperifolium, Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 77. t. 85 = *L. asperifolia*.
caeruleum, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II. iv. 336 = *L. caerulea*.
campaniflorum, Lodd. *Bot. Cab.* t. 1361 = *L. nigra*.
canadense, Duham. ex DC. *Prod.* iv. 337 = *L. caerulea*.
ciliatum, Pursh, *Fl. Am. Sept.* 161 = *L. ciliata*.
ciliolum, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 793 = *L. ciliosa*.
coeruleum, Auct. = *caerulea*.
cordatum, Moench, *Meth.* 502 = *L. tatarica*.
dumetorum, Moench, l. c. = *L. Xylosteum*.
gibbiflorum, Rupr. & Maxim. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* xv. (1856) 136 = *L. chrysantha*.
ibericum, Fisch. *Cat. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 44 = *L. iberica*.
involutum, Richards. in *Frankl. Narr.* 1st Journ. App. 733 = *L. involutata*.
Karelini, Rupr. *Sert. Tiansch.* 50 = *L. Karelini*.
ligustrinum, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 140 = *L. ligustrina*.
Loureirii, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 172 = *L. acuminata*.
Maackii, Rupr. in *Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* xv. (1857) 369 = *L. Maackii*.
Maximowiczii, Rupr. l. c. (1856) 136 = *L. Maximowiczii*.
mexicanum, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 426. t. 297 = *L. gibbosa*.
Naisoca, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 140 = *L. ligustrina*.
nigrum, Medic. *Pfl. Anat.* 97; Roehl. *Deutschl. Fl.* ed. II. ii. 176 = *L. nigra*.
oblongifolium, Goldie, in *Edinb. Phil. Journ.* vi. (Apr. 1822) 323 = *L. caerulea*.
puniceum, Rafin. *New Fl. Am.* iii. 21 = *Symphoricarpos puniceus*.
purpurascens, Jacquem. *Voy. Bot.* 79. t. 87 = *L. purpurascens*.
pyrenaicum, Dum.-Cours. *Bot. Cult.* ed. II. iv. 336 = *L. pyrenaica*.
scandens, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 140 = *L. macrantha*.
Solonis, Eaton, *Man. Bot. N. Am.* ed. VI. 398; ed. VII. 518 = *L. caerulea*.
spinosum, Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 78. t. 86 = *L. spinosa*.
tartaricum, Medic. *Pfl. Anat.* 97 = *L. tatarica*.
tataricum, Michx. *Fl. Am. Bor.* i. 106 = *L. ciliata*.
villosum, Michx. l. c. = *L. caerulea*.
vulgare, Roehl. *Deutschl. Fl.* ed. II. ii. 176 = *L. Xylosteum*.

XYLOSTEUM, Rupp. *Fl. Jen.* ed. Hall. 250 (1745) = *præc.*XYLOTHECA, Hochst. in *Flora*, xxvi. (1843) 69 = *Oncoba*, Forsk. (*Bixin.*).
Kraussiana, Hochst. l. c. = *O. Kraussiana*.

XYNOPHYLLA, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860)
250 = *Exocarpus*, Labill. (Santal.).
artensis, Montr. l. c. — N. Caled.

XYOMALOBUM, Weale, in Journ. Linn. Soc. xiii.
(1873) 50, err. typ. = *Xysmalobium*, R. Br.
(Asclep.).

XYPHANTHUS, Rafin. Fl. Ludov. 103 (1817) =
Erythrina, Linn. (Legumin.).
hederifolius, Rafin. l. c. — Am. bor.

XYPHIDIUM, Neck. Elem. iii. 168 (1790) = *Xiphidium*, Aubl. (Haemod.).

XYPHIDIUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 793 (1841) =
XIPHION, Tourn. = *Iris*, Tourn.
sordidum, Steud. l. c. = *I. juncea*.

XYPHION, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi.
Phys. (1790) 418 = XIPHION, Tourn. = *Iris*, Tourn.

XYPHOSTYLIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 52 (1836) =
Canna, Linn. (Scitam.).
angustifolia, Rafin. l. c. = *C. angustifolia*.
lutea, Rafin. l. c. = *C. lutea*.

XYRIDANTHE, Lindl. Swan River App. 23 (1839) =
Helipterum, DC. (Compos.).
stricta, Lindl. l. c. = *H. strictum*.

XYRIDION, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii.
(1869) 163 = *Iris*, Tourn.

acoroideum, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 500 =
I. Pseudacorus.

aureum, Klatt, l. c. 501 = *I. aurea*.
flexuosum, Klatt, l. c. 500 = *I. sibirica*.
foetidissimum, Klatt, l. c. = *I. foetidissima*.
gramineum, Klatt, l. c. = *I. graminea*.
Gueldenstaedtianum, Klatt, l. c. 501 = *I. Gueldenstaediana*.

halophilum, Klatt, l. c. 500 = *I. Gueldenstaediana*.
laevigatum, Klatt, l. c. = *I. laevigata*.
Monnieri, Klatt, l. c. = *I. Monnieri*.
nothum, Klatt, l. c. = *I. spuria*.
ochroleucum, Klatt, l. c. = *I. ochroleuca*.
Pseudacorus, Klatt, l. c. = *I. Pseudacorus*.
Reichenbachianum, Klatt, l. c. = *I. spuria*.
setosum, Klatt, l. c. = *I. setosa*.
sibiricum, Klatt, l. c. = *I. sibirica*.
spurium, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii.
(1869) 163 = *I. spuria*.

stenogynum, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 500 =
I. Gueldenstaediana.

tridentatum, Klatt, l. c. = *I. tridentata*.
ventricosum, Klatt, l. c. = *I. ventricosa*.
violaceum, Klatt, l. c. = *I. laevigata*.

XYRIDION, Steud. Nom. ed. II. ii. 793 (1841) = *praec.*

XYRIS, Gronov. ex Linn. Gen. ed. I. 11 (1737).

XYRIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 842.

JUPICA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 15 (1836).

KOTSJILETTI, Adans. Fam. ii. 60 (1763).

RAMOTHA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 15 (1836).

SCHISMATON, Steud. in Bot. Zeit. xvi. (1856) 391.

SYNOLIGA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 15 (1836).

XYROIDES, Thou. Nov. Gen. Madag. 4 (1806).

acuminata, Miq. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 284 =

communis.

aemula, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 54 = *flexifolia*.

altissima, Lodd. Bot. Cab. t. 1900 = *Bobartia indica*.

ambigua, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 13. — Am. bor.

americana, Aubl. Pl. Guai. i. 40. — Am. trop.

americana, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 12 =

laxifolia.

americana, Vahl, Enum. ii. 205 = *glabrata*.

anceps, Lam. Illustr. i. 132. — Ind. or.; Malaya.

anceps, Pers. Syn. i. 56 = *caroliniana*.

anceps, Vahl, Enum. ii. 204 = *complanata*.

aphylla, Vell. Fl. Flum. 29; i. t. 72 (sp. dub.). —

Bras.

arescens, Kunth, Enum. Pl. iv. 3 = *hymenachne*.

asperata, Kunth, l. c. 6 = *trachyphylla*.

asperula, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 57. —

Bras.

asperula, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 219. — Bras.

asterocephala, Seub. l. c. = *involuta*.

XYRIS :—

bahiensis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 287 = *anceps*.

Baldwiniana, Schult. Mant. i. 351. — Am. bor.

bancana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 608. — Malaya.

bicarinata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 223. — Cuba.

blepharophylla, Kunth, Enum. Pl. iv. 5 = *pterygoblephara*.

blepharophylla, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 56. — Bras.

bracteata, R. Br. Prod. 256 = *operculata*?

brasiliensis, Spreng. Nov. Prov. 48 = *Fimbristylis monostachya*.

brevifolia, Ell. Sketch, i. 52 = *Elliottii*.

brevifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 23. — Am. bor.

brevifolia, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 390. — Bras.

Brownei, Kunth, Enum. Pl. iv. 22. — Austral.

bulbosa, Kunth, l. c. 11 = *flexuosa*.

caerulea, Lam. Illustr. i. 132 = *americana*.

calocephala, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 527. — Java.

canadensis, Schnizl. Ic. i. t. 47 = *caroliniana*.

capensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 276. — Madag.

capensis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 12. — Afr. austr.

capensis, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 16 =

humilis.

Capito, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 262. —

Cambodia.

caroliniana, Walt. Fl. Carol. 69. — Am. bor.

castanea, Klotzsch, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 220 = *rigida*.

caulescens, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1064, nomen. — Guian.

ciliata, Thunb. Pl. Bras. Dec. iii. 27. — Bras.

communis, Kunth, Enum. Pl. iv. 12. — Am. trop.

complanata, R. Br. Prod. 256. — Austral.

compressa, Willd. ex A. Dietr. Sp. Pl. ii. 372 =

anceps.

conocephala, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 159 (an

torta?). — Cuba.

consanguinea, Kunth, Enum. Pl. iv. 8. — Bras.

denticulata, R. Br. Prod. 256 = *pauciflora*.

desertorum, Pohl, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 214 = *rupicola*.

difformis, Chapm. Fl. S. U. St. 500. — Florida.

elata, Chapm. l. c. 501. — Florida.

Elliottii, Chapm. l. c. 500. — Am. bor.

elongata, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 289. t. 15 = *complanata*.

eriphora, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1117 = *Fimbristylis lanata*.

eriphophylla, Reichb. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 4. —

Guian.

Falx, Griseb. Cat. Pl. Cub. 223. — Cuba.

filiformis, Lam. Illustr. i. 132. — Afr. trop.

fimbriata, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 12 =

caroliniana.

fimbriata, Ell. Sketch, i. 52. — Am. bor.

flabelliformis, Chapm. Fl. S. U. St. 499. — Florida.

flexifolia, R. Br. Prod. 256. — Austral.

flexuosa, Muhl. Cat. 5 (1813); ex Ell. Sketch, i. 51 =

platylepis.

Fontanesiana, Kunth, Enum. Pl. iv. 10 = *anceps*.

glabrata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 525. — Am. trop.

gracilis, R. Br. Prod. 256. — Austral.

gracillima, F. Muell. Fragm. viii. 203. — Austral.

graminosa, Pohl, ex Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 55. — Bras.

grandiceps, Griseb. Cat. Pl. Cub. 223. — Cuba.

guianensis, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 896, nomen = *communis*.

guianensis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 285. — Guian.

gymnoptera, Griseb. Cat. Pl. Cub. 223 = *communis*.

humilis, Kunth, Enum. Pl. iv. 15. — Ins. Mascar.

hymenachne, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 55. — Bras.

Hystrix, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 219. — Bras.

indica, Linn. Sp. Pl. 42. — Ind. or.; Malaya.

indica, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 33 = *flexuosa*.

indica, Vell. Fl. Flum. 29; i. t. 71 = *communis*.

indica, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 19 = *anceps*.

insularis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 288 (sp. dub.). —

Madag.

involuta, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 397. — Guian.

iridifolia, Chapm. Fl. S. U. St. 501. — Am. bor.

juncea, Baldw. in Ell. Sketch, i. 53 = *Baldwiniana*.

juncea, R. Br. Prod. 256 = *gracilis*.

Jupicai, Michx. Fl. Bor. Am. i. 23 = *caroliniana*.

XYRIS :—

Jupicai, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792)

106 = *americana*.

ladera, R. Br. Prod. 257. — Austral.

lacerata, Pohl, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 216. — Bras.

laevis, R. Br. Prod. 256 = *complanata*.

laevis, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 380 = *Mesomelaena sphaerocephala*.

lanata, R. Br. Prod. 257. — Austral.

lanuginosa, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 214. — Bras.

lappacea, Heyne, ex Mart. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 30 = *anceps*?

laxiflora, F. Muell. Fragm. viii. 203. — Austral.

laxifolia, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 53 =

communis.

lomatophylla, Mart. l. c. 57. — Bras.

longifolia, Mart. l. c. 54. — Bras.

macrocephala, Vahl, Enum. ii. 204. — Guian.

malaccensis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 287 = *complanata*.

Martiana, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 216 =

blepharophylla.

melanocephala, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 528. — Java;

Sumatra.

metallica, Klotzsch, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 213. — Bras.

microcephala, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 119 (sp. dub.). — Java.

Minarum, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 215. — Bras.

minima, Steud. Syn. Pl. Cyp. 288 = *humilis*.

montivaga, Kunth, Enum. Pl. iv. 7. — Bras.

navicularis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 223. — Cuba.

nilagiriensis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 288 = *capensis*.

nitida, Willd. ex A. Dietr. Sp. Pl. ii. 372 = *anceps*.

nubigena, Kunth, Enum. Pl. iv. 3. — Bras.

oligantha, Steud. Syn. Pl. Cyp. 288 = *pauciflora*.

operculata, R. Br. Prod. 257 = *Brownei*.

operculata, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 14. t. 10. —

Austral.

oryzatorum, Miq. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 288 = *pauciflora*.

pallescens, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 57 =

anceps.

paludosa, R. Br. Prod. 256 = *pauciflora*.

paraensis, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 9. — Bras.;

Guian.

pauciflora, Wall. Cat. n. 6083 = *Wallichii*.

pauciflora, Willd. Phytogr. i. 2. t. 1. — As. et Austral.

trop.

Perrottetii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 319 = *anceps*.

pilosa, Kunth, Enum. Pl. iv. 6. — Bras.

plantaginea, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 514. — Bras.

platicaulis, Poir. Encyc. viii. 820 = *anceps*.

platylepis, Chapm. Fl. S. U. St. 501. — Am. bor.

pterygoblephara, Steud. Syn. Pl. Cyp. 285. — Bras.

pubescens, Poir. Encyc. viii. 819 (sp. dub.). — Ind. occ.

pumila, Pohl, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 217 =

savanensis.

Purshii, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 546 = *torta vel*

flexuosa.

pusilla, R. Br. Prod. 256 = *pauciflora*.

restiacea, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 57 =

ciliata.

rhomboipetala, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 160 =

ambigua.

rigida, Kunth, Enum. Pl. iv. 15. — Bras.

robusta, Mart. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 30; et in Cat. n. 6087. — Reg. Himal.

rupicola, Kunth, Enum. Pl. iv. 5. — Bras.

savanensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 605. —

Am. trop.

scabra, R. Br. Prod. 256 = *complanata*.

scabra, Engelm. in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845)

235 = *flexuosa*.

schizachne, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 56. — Bras.

schoenoides, Mart. in Wall.

XYRIS:—

- spiralis*, Pohl, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. 1. 213 = tortula.
stricta, Chapm. Fl. S. U. St. 500.—Florida.
strobilifera, Kunth, Enum. Pl. iv. 4 = ciliata.
subulata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 46. t. 7. f. 6.—Peruv.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xvii. (1843) 58 = communis.
surinamensis, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 2 (sp. dub.).—Guian.
tenella, Kunth, Enum. Pl. iv. 9.—Bras.
tenuifolia, Chapm. Fl. S. U. St. 502 = Baldwiniana.
tenuis, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352, nomen (Quid ?).—Am. bor.
teretifolia, R. Br. Prod. 257 = lacera ?
torta, Sm. in Rees, Cyclop. xxxix. n. 11.—Am. bor.
tortula, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 55.—Bras.
trachyphylla, Mart. l. c. 56.—Bras.
vaginata, Spreng. Syst. i. 183 = Abolboda brasiliensis.
vivipara, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 253 (sp. dub.).—Venezuela.
Walkeri, Wight, ex Kunth, Enum. Pl. iv. 19 = complanata.
Wallichii, Kunth, l. c. 16.—Reg. Himal. ; Burma.

XYROIDES, Thou. Gen. Nov. Madag. 4 (1806) = praec.

XYROPLEURUM, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 794 (1841), err. typ. = XYLOPLEURUM, Spach = Oenothera, Linn. (Onagrar.).

XYSMALOBIMUM, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 38. ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 752.

- albens*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 902 = Gomphocarpus albens.
appendiculatum, D. Dietr. l. c. = Gomphocarpus appendiculatus.
concolor, D. Dietr. l. c. = Gomphocarpus concolor.
coronarium, D. Dietr. l. c. = Gomphocarpus coronarium.
crispum, D. Dietr. l. c. = Gomphocarpus crispus.
dealbatum, D. Dietr. l. c. = Gomphocarpus dealbatus.
gomphocarpoides, D. Dietr. l. c. (sp. dub.).—Afr. austr.
grandiflorum, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 39 = Gomphocarpus grandiflorus.
Heudelotianum, Decne. in DC. Prod. viii. 520.—Afr. trop.
humile, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 902 = Gomphocarpus humilis.
involutum, Decne. in DC. Prod. viii. 520.—Afr. austr.
lapathifolium, Decne. l. c. 519 = undulatum.
ligulatum, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 902 = Gomphocarpus dealbatus.
linguaeforme, Harv. ex Weale, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 50.—Afr. austr.
marginatum, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 902 = Gomphocarpus marginatus.
orbiculare, D. Dietr. l. c.—Afr. austr.
pedunculatum, Harv. Thes. Cap. ii. 8. t. 112.—Afr. austr.
prunelloides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 1. 254.—Afr. austr.
reflectens, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 902 = Gomphocarpus reflectens.
rigidum, D. Dietr. l. c. = Gomphocarpus rigidus.
sessile, Decne. in DC. Prod. viii. 519.—Afr. austr.
undulatum, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 39.—Afr. austr.
vepillare, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 902 = Gomphocarpus dealbatus.
viridiflorum, D. Dietr. l. c. = Gomphocarpus viridiflorus.

XYSTIDIUM, Trin. Fund. Agrost. 102 (1820) = Perotis, Ait. (Gramin.).
barbatum, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 228 = P. latifolia.
maritimum, Trin. Fund. Agrost. 102. t. 2 = P. rara.

XYSTRIS, Schreb. Gen. i. 138 (1789) (Quid ?).
Schreberi, J. F. Gmel. Syst. 390.—Hab. ?

Y

YAMALA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 75 (1836) = Heuchera, Linn. (Saxifr.).
cylindrica, Rafin. l. c. = H. cylindrica.

YANGAPA, Rafin. Sylva Tellur. 20 (1838) = Gardenia, Ellis (Rubiace.).
flava, Rafin. l. c. = G. coronaria.

YANGUA, Spruce, in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 197 = Cybistax, Mart. (Bignon.).
tinctoria, Spruce, l. c. 198.—Peruv.

YERMOLOFFIA, Bélanger. Voy. Ind. or. t. absque num. (1838 ?) = Lagochilus, Bunge (Labiat.).
hispida, Bélanger. l. c. = L. hispidus, Boiss.
insignis, Bélanger. l. c. = L. insignis.

YERMOLOFIA, Endl. Gen. 625 (1838) = praec.

YGRAMELA, Rafin. Atl. Journ. 199 (1833) = Limosella, Linn. (Scrophul.).
maritima, Rafin. l. c. = L. maritima.

YMNOSTEMA, Neck. Elem. i. 132 (1790) = Lobelia, Flum. (Campan.).

YMNOSTEMMA, Steud. Nom. ed. II. ii. 794 (1841) sphalm. = praec.

YOANIA, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 68. ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 617.
japonica, Maxim. l. c. 69.—Reg. Himal. ; Japon.

YODES, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 298, err. typ. = Iodes, Blume (Olacin.).

YOUNGIA, Cass. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xliii. (1831) 88 = Crepis, Vail. (Compos.).

acaulis, DC. Prod. vii. 193 = C. acaulis.
affinis, Zoll. & Mor. in Nat. en Genesk. Arch. Néerl. Ind. ii. (1845) 566 = Prenanthes affinis.
ambigua, DC. Prod. vii. 193 = C. japonica.
aspera, Steud. Nom. ed. II. ii. 393, in syn. = Chondrilla aspera.
chinensis, DC. Prod. vii. 194 = Lactuca Fischeriana.
chrysantha, Maxim. Prim. Fl. Amur. 181 = Lactuca denticulata.

debilis, DC. Prod. vii. 194 = Lactuca debilis.
denticulata, DC. l. c. 193 (excl. syn.) = Lactuca denticulata.
diversifolia, Ledeb. Fl. Ross. ii. 837 = C. tenuifolia.
fastigiata, DC. Prod. vii. 193 = C. japonica.
flexuosa, Ledeb. Fl. Ross. ii. 838 = C. nana.
fuscipappa, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 168 = C. fuscipappa.
glauca, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 79 = C. flexuosa.

gracilis, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 106 = C. japonica ?

hastata, DC. Prod. vii. 194 = Lactuca denticulata.
humilis, DC. l. c. 194.—Japon.

humilis, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 106.—China.

integra, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1859) 396 = C. integra.

integrifolia, Cass. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xliii. (1831) 89 = C. japonica.

japonica, DC. Prod. vii. 194 = C. japonica.
Kochiana, Ledeb. Fl. Ross. ii. 837 = Phacelium lampsanoides.

lanceolata, DC. Prod. vii. 193 = C. integra.
lyrata, Cass. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xliii. (1831) 88 = C. japonica.

mauritanica, DC. Prod. vii. 192 = C. japonica.
multiflora, DC. l. c. 194 = C. japonica.

napiifolia, DC. l. c. 193 = C. japonica.
Paosia, Steud. Nom. ed. II. ii. 794, sphalm. = seq.

Paosia, DC. Prod. vii. 193 = C. japonica.
procumbens, DC. l. c. = Launaea nudicaulis.

pygmaea, Ledeb. Fl. Ross. ii. 838 = C. nana.
runcinata, DC. Prod. vii. 192 = C. japonica.

serotina, Maxim. Prim. Fl. Amur. 180 = Lactuca denticulata.

sonchifolia, Maxim. l. c. = Lactuca denticulata.
Stenoma, Ledeb. Fl. Ross. ii. 837 = C. Stenoma.

striata, DC. Prod. vii. 193 = C. japonica.
Thunbergiana, DC. l. c. 192 = C. japonica.

YPOMAEA, Robin, Voy. Louis. iii. 402 (1807), sphalm. = Ipomoea, Linn. (Convolv.).

YUCCA, Dill. ex Linn. Gen. ed. I. 99 (1737). LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 778.

CODONOCRINUM, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 718 (1829).

acaulis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 289.—Venezuela.
acrotricha, Schiede, in Linnaea, iv. (1829) 230 = Dasylirion acrotrichum.

acuminata, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. viii. (1859) 398 = flexilis.

acuminata, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 195 = gloriosa.

acutifolia, Truff. in Rev. Hort. (1869) 320.—Hab. ?
agavoides, Hort. ex Carr. l. c. Sér. IV. vii. (1858) 580 = Treculeana.

albo-spica, Hort. ex Van Houtte, in Fl. des Serres, xvii. (1867-68) 110. f. 1612 = constricta.

aletriformis, Haw. in Phil. Mag. (1831) 415 (al. gen.).—Afr. austr.

aloifolia, Linn. Sp. Pl. 319.—Am. bor. ; Ind. occ.

aloifolia, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 147 = Whipplei.

angustifolia, Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. ix. (1860) 20. f. 3, 4 = constricta.

angustifolia, Hort. ex Carr. l. c. viii. (1859) 398 = flexilis.

angustifolia, Karw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 707, nomen = stenophylla.

angustifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 227 = glauca.

antwerpensis, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 228 = filamentosa.

arcuata, Haw. Suppl. Pl. Succ. 33 = aloifolia.

argospatha, Verlot, in Rev. Hort. (1868) 393.—Hab. ?

armata, Steud. Nom. ed. II. ii. 795 = aloifolia.

aspera, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 24 ; Gartenfl. (1859) 14 = Treculeana.

Atkinsi, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 221 = aloifolia.

baccata, Torr. Bot. Mex. Bound. 221.—Am. bor. occ. ; Mexic.

Barrancasecca, Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 108, nomen (Quid ?).—Hab. ?

Boerhaavii, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1217.—Mexic.

Boscai, Desf. Tabl. ed. II. 28 = Agave geminiflora.

brevifolia, Engelm. in S. Wats. Bot. King's Exped. 496.—Calif.

brevifolia, Schott, ex Torr. Bot. Mex. Bound. 221 = Schottii.

californica, Lem. Illustr. Hort. x. (1863) sub t. 372 = Whipplei.

canaliculata, Hook. Bot. Mag. t. 5201 = Treculeana.

circinata, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1088 = baccata.

concaua, Haw. Suppl. Pl. Succ. 34 = filamentosa.

concaua, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 226 = Treculeana.

conspicua, Haw. Suppl. Pl. Succ. 32 = aloifolia.

conspicua, Hort. ex Regel, Gartenfl. xx. (1871) 149.—Hab. ?

constricta, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863), 8.—Mexic.

contorta, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 579, 580 = rupicola, Treculeana.

cornuta, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 226 = Treculeana.

crassifolia, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1873) 44 = baccata.

crenulata, Haw. Suppl. Pl. Succ. 33 = aloifolia.

De-Smetiana, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1217.—Mexic.

Draco, Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. viii. (1859) 389 = Dracaena Draco ?

Draconis, Linn. Amoen. Acad. iii. 407 = Dracaena Draco.

Draconis, Linn. Sp. Pl. 319 = aloifolia.

Ehrenbergii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 538, nomen.—Hab. ?

elata, Engelm. in Coult. Bot. Gaz. vii. (1881) 17.—Am. bor. occ.

Ellacombei, Hort. ex Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 317 = gloriosa.

Engelmanni, Mast. in Gard. Chron. (1880) II. 43, sphalm. = Whipplei.

ensifolia, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 318 = flexilis vel gloriosa.

YUCCA:—

- exigua*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 314 = filamentosa.
Eylesii, Hort. Peacock, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 224 = flexilis.
falcata, Hort. Peacock, ex Baker, l. c. = flexilis.
filamentosa, Linn. Sp. Pl. 319.—Am. bor.
filamentosa, Wood, in Proc. Acad. Sc. Philad. (1868) 167 = baccata.
filifera, Hort. ex Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1873) 46; Chabaud. in Rev. Hort. (1876) 432. f. 97 = baccata.
flaccida, Haw. Suppl. Pl. Succ. 34 = filamentosa.
flexilis, Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. viii. (1859) 398. f. 89.—Mexic.
fragilifolia, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1088 = baccata.
funifera, Lem. Illustr. Hort. xiii. (1866) Misc. 99.—Mexic.
Ghiesbreghtii, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 222 = guatemalensis.
gigantea, Lem. Illustr. Hort. vi. (1859) Misc. 91.—Mexic.
glauca, Nois. ex Sims, Bot. Mag. t. 2662 = filamentosa.
glauca, [Nutt.] in Fras. Cat. (1813) n. 89.—Am. bor.
glaucescens, Haw. Suppl. Pl. Succ. 35 = filamentosa.
gloriosa, Linn. Sp. Pl. 319.—Am. bor.
gracilis, Link. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 597 (Quid ?).—Mexic.
graminifolia, Wood, in Proc. Acad. Sc. Philad. (1868) 167 = Whipplei.
graminifolia, Zucc. in Cat. Hort. Monac. (1837); et in Abb. Akad. Muench. iii. (1837-43) 226 = Dasy-lirion graminifolium.
guatemalensis, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 313.—Guatemala; Mexic.
Haruckiana, Crantz, Duab. Drac. Arbor. 29 = aloifolia.
horrida, Humb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 795 = spinosa.
integerrima, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 267 = gloriosa.
japonica, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. viii. (1859) 488 = gloriosa.
laetevirens, Karw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 707, nomen (Quid ?).—Mexic.
Lenneana, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 538.—Hab. ?
longifolia, [Engelm.] ex Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 8 = Treculeana.
longifolia, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1859) 398 = flexilis.
longifolia, Karw. ex Schult. f. Syst. vii. 1715 = Nolina longifolia.
lutescens, Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 579 = rupicola.
macrocarpa, Engelm. in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 224.—Arizona.
mexicana, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 224 = flexilis.
Mooreana, Hort. Peacock, ex Baker, l. c. 222 = guatemalensis.
nobilis, Hort. Peacock, ex Baker, l. c. 224 = flexilis.
obliqua, Haw. Syn. Pl. Succ. 69 = gloriosa.
orchioidea, Carr. in Rev. Hort. (1861) 369. t. 89 = filamentosa.
Parmentieri, Hort. ex Carr. l. c. Sér. IV. viii. (1859) 389 = aloifolia.
parviflora, Torr. Bot. Mex. Bound. 221 = Hesperaloe yuccaeifolia.
patens, André, Illustr. Hort. xvii. (1870) 120 = gloriosa.
Peacockii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 223.—Mexic.
pendula, Sieber, ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. viii. (1859) 488. t. 104 = gloriosa.
periculosa, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1088 = baccata.
pitcairniifolia, Karw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 707, nomen (Quid ?).—Mexic.
plicata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 345 = gloriosa.
plicatilis, Hort. ex C. Koch, l. c. = gloriosa.
polyphylla, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1088 = constricta.
pruinosa, Baker, l. c. 1122 = gloriosa.
puberula, Haw. in Phil. Mag. (1828) 186 = filamentosa.
puberula, Torr. Bot. Mex. Bound. 221 = Schottii.
purpurea, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 221 = aloifolia.

YUCCA:—

- quadrifolia*, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 221 = aloifolia.
recurva, Haw. Syn. Pl. Succ. 69 = gloriosa.
recurvata, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 580 = Treculeana.
recurvifolia, Salisb. Parad. Lond. t. 31 = gloriosa.
revoluta, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 580 = Treculeana.
Roeslii, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 222 = guatemalensis.
rufocincta, Haw. Suppl. Pl. Succ. 37 = gloriosa.
rupicola, Scheele, in Linnaea, xxiii. (1850) 143.—Texas.
scabrifolia, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1088 = baccata.
Schottii, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1873) 46.—Arizona.
semicylindrica, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1217 = flexilis.
serratifolia, Karw. ex Schult. f. Syst. vii. 1716.—Mexic.
serrulata, Haw. Syn. Pl. Succ. 70 = aloifolia.
spinosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 289.—Mexic.
stenophylla, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. viii. (1859) 398 = flexilis.
stenophylla, Steud. Nom. ed. II. ii. 795.—Mexic.
striata, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1865) 365 (Quid ?).—Hab. ?
stricta, Sims, Bot. Mag. t. 2222 = glauca.
superba, Haw. Suppl. Pl. Succ. 36 = gloriosa.
superba, Roxb. Hort. Beng. 25 = Furcraea tuberosa.
tenuifolia, Haw. Suppl. Pl. Succ. 34 = aloifolia.
Tonelliana, Lem. Illustr. Hort. xii. (1865) Misc. 52.—Mexic.
tortifolia, Lindheimer, ex Torr. in Bot. Mex. Bound. 221 = rupicola.
tortilis, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 579 = rupicola.
tortulata, Baker, in Gard. Chron. (1870) 1122 = gloriosa.
Treculeana, Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 580; et ex Héring, Hort. Franç. (1864) 235. t. 16.—Mexic.
tricolor, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 221 = aloifolia.
undulata, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 580 = Treculeana.
Whipplei, Torr. in Bot. Mex. Bound. 222, in textu.—Calif.
yucatanica, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1873) 37.—Mexic.

YULANIA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 462 (1839) = **Magnolia**, Linn.
conspicua, Spach, l. c. 464 = M. Yulan.
japonica, Spach, l. c. 466 = M. obovata.
Lenneana x, Lem. Illustr. Hort. i. (1854) t. 37 = M. Lennei.

Z

ZACINTHA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gaertn. Fruct. ii. 358. t. 157 (1791). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 511.
pendula, Raesch. Nom. ed. III. 229 = verrucosa.
verrucosa, Gaertn. Fruct. ii. 358. t. 157. f. 7.—Europ. austr.; As. Min.

ZACINTHA, Vell. Fl. Flum. 276; vii. t. 9 (1825) = **Clavija**, Ruiz & Pav. (Myrsin.).
nutans, Vell. ll. cc. = C. integrifolia ?

ZACYNTHA, Adans. Fam. ii. 112 (1763) = **Zacantha**, Tourn. (Compos.).

ZAGA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 33 (1836) = **Abrus**, Linn. (Legumin.).
latifolia, Rafin. l. c. = A. precatorius.
parvifolia, Rafin. l. c. = A. precatorius.

ZAHLEBRUCKERA, Steud. Nom. ed. II. ii. 795 (1841), sphalm. = **Zahlbrucknera**, Reichb. (Saxifrag.).

ZAHLEBRUCKNERA, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 16, etc. (1847) (Acanthac.).
achyranthoidea, Pohl, ex Nees, l. c. 73 (= *Teliostachya microcarpa*).—Bras.
conferta, Pohl, ex Nees, l. c. 21 = Hygrophila conferta.
fruticosa, Pohl, ex Nees, l. c. 16 = Ebermaiera mandioc-cana.
longifolia, Pohl, ex Nees, l. c. 21 = Hygrophila costata.
lutea, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 210 (= *Arrhox-toxylum glabrum*).—Bras.
Maranhonis, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 25 = Calophanes Maranhonis.
micrantha, Pohl, ex Nees, l. c. 22 = Hygrophila costata.
oblongifolia, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 86 = Hygrophila costata.
pilosa, Pohl, ex Nees, l. c. 113 (= *Homotropium erythrorhizum*).—Bras.
repens, Pohl, ex Nees, l. c. 66 = Nelsonia campestris.
salicifolia, Pohl, ex Nees, l. c. 214 = Ruellia costata.

ZAHLEBRUCKNERA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 551 (1832). **SAXIFRAGEAE**, Benth. & Hook. f. i. 636.
OREOSPLENIUM, Zahlb. ex Endl. Gen. 814, 1446 (1841).
paradoxa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 551.—Europ.

ZALA, Lour. Fl. Cochinch. 405 (1790) = **Pistia**, Linn.
asiatica, Lour. l. c. = P. Stratiotes.

ZALACCA, Rumph. Amboin. v. 57. t. 2 (1747).
PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 932.
SALACCA, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 3.
SALAKKA, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 112 (1823).
affinis, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 9.—Malaya.
Blumeana, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 201. t. 123 = edulis.
conferta, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 16.—Malaya.
edulis, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1334; Mart. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 14.—Burma; Malaya.
glabrescens, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 14.—Ins. Penang.
macrostachya, Griff. l. c. 13 = edulis.
Rumphii, Wall. Pl. As. Rar. iii. t. 223, 224 = edulis.
secunda, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 12.—Assam.
Wagneri, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 258, nomen (Quid ?).—Hab. ?
Wallichiana, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 200. tt. 118, 119, 136 = edulis.

ZALEIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 795 (1841) = seq.

ZALEIJA, Burm. f. Fl. Ind. 110. t. 31 (1768) = **Trianthema**, Sauv. (Ficoid.).
decandra, Burm. l. c. = T. decandra.

ZALITEA, Rafin. New Fl. Am. iv. 98 (1836) = **Euphorbia**, Linn.
linearis, Rafin. l. c. 99 (Quid ?).—Am. bor.

ZALLIA, Roxb. Fl. Ind. iii. 74 (1832) = **ZALEIJA**, Burm. f. = **Trianthema**, Sauv. (Ficoid.).

ZALMARIA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 85 = **Rondeletia**, Linn. (Rubiace.).

ZALUCANIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 795 (1841), sphalm. = **Zaluzania**, Pers. (Compos.).

ZALUZANIA, Comm. ex Gaertn. f. Fruct. iii. 74. t. 192 (1805) = **Bertiera**, Aubl. (Rubiace.).

ZALUZANIA, Pers. Syn. ii. 473 (1807). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 362.
CHILIOPHYLLUM, DC. Prod. v. 554 (1836).
CHRYSOPHANIA, Kunth, ex Less. Syn. Comp. 224 (1832).
FERDINANDA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 31 (1816).
HYBRIDEA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 12; et in Dict. Sc. Nat. xxii. 86 (1821).
angusta, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 362, sphalm. = angusta.
asperima, Sch. Bip. in Flora, xlvii. (1864) 218.—Mexic.
angusta, Sch. Bip. l. c. xlv. (1861) 562.—Mexic.
cinerascens, Sch. Bip. l. c. xlvii. (1864) 218, 219 = Gymnolomia cinerascens.

ZALUZANIA:—

- Coulteri, *Hemsl. Diagn. Sp. Nov.* 33.—Mexic.
ensifolia, Sch. Bip. in *Flora*, xlvii. (1864) 216 = *Gymnolomia ensifolia*.
globosa, Sch. Bip. l. c. xlv. (1861) 564.—Mexic.
indica, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 239 = *Geniostoma rupestre*.
megacephala, Sch. Bip. in *Flora*, xlv. (1861) 563 = *augusta*.
mollissima, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 35.—Mexic.
montagnaefolia, Sch. Bip. in *Flora*, xlv. (1861) 563.—Mexic.
myriophylla, Sch. Bip. l. c. 565 = *globosa*.
oppositifolia, Sch. Bip. l. c. 562 = *Calea scabrifolia*.
pinnatifida, Sch. Bip. l. c. xlvii. (1864) 218, 219 = *Gymnolomia pinnatifida*.
squarrosa, Sch. Bip. l. c. 216, 217 = *Gymnolomia squarrosa*.
triloba, Pers. *Syn.* ii. 473.—Mexic.
trilobata, Hoffmgg. *Verz. Pfl. Nachtr.* II. 231 = *praec.*

ZALUZIANSKIA, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 944 (1876), sphalm. = *seq.*

ZALUZIANSKYA, F. W. Schmidt, *Neue u. Selt. Pfl.* 11 (1793). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 944.

- NYCTERINIA, D. Don, in *Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II.* t. 239 (1834).
Benthiana, Walp. *Rep.* iii. 309.—Afr. austr.
capensis, Walp. l. c. 307.—Afr. austr.
coriacea, Walp. l. c. 306.—Afr. austr.
dentata, Walp. l. c. 307.—Afr. austr.
divaricata, Walp. l. c. 308.—Afr. austr.
longiflora, Walp. l. c. 307.—Afr. austr.
lychnidea, Walp. l. c.—Afr. austr.
maritima, Walp. l. c.—Afr. austr.
natalensis, Bernh. in *Flora*, xxvii. (1844) 834.—Afr. austr.
ovata, Walp. *Rep.* iii. 307.—Afr. austr.
peduncularis, Walp. l. c. 308.—Afr. austr.
pumila, Walp. l. c. 307.—Afr. austr.
pusilla, Walp. l. c. 308.—Afr. austr.
selaginoides, Walp. l. c.—Afr. austr.
spathacea, Walp. l. c. 306.—Afr. austr.
villosa, F. W. Schmidt, *Neue u. Selt. Pfl.* 11.—Afr. austr.

ZAMARIA, Rafin. in *Ann. Gén. Sc. Phys.* vi. (1820) 85 = *Randia*, Houst. (Rubiace).

- ZAMIA**, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 1659 (1763). *CYCADACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 447.
AULACOPHYLLUM, Regel, *Gartenfl.* xxv. (1876) 140.
acuminata, Oerst. ex Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 194.—Nicaragua.
Altensteinii, Heynh. *Nom.* i. 862 = *Encephalartos Altensteinii*.
amplifolia, Hort. Bull. ex Mast. in *Gard. Chron.* (1878) II. 810 = *Wallisii*.
angustifolia, Jacq. *Coll.* iii. 263.—Ins. Baham.
angustissima, Miq. in *Verh. Nederl. Inst.* III. iv. (1851) 184 = *angustifolia*.
atropurpurea, Parment. ex Miq. *Prod. Syst. Cycad.* 23 = *Ceratozamia mexicana*.
aurea, Hort. ex Miq. in *Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 297 = *Encephalartos horridus*.
Baraquiniana, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1868) 349; et *Regel, Gartenfl.* xxvii. (1878) 7.—Hab.?
Beeldsnijderiana, Beelds. *Cat. t. 1*; ex Pritz. *Ind.* i. 1179 (Quid?).—Hab.?
boliviana, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 540 = *Brongniartii*.
Brongniartii, Wedd. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xiii. (1850?) 249, t. 4.—Bolivia; Bras.
caffra, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 92 = *Encephalartos caffer*.
calocoma, Miq. in *Fl. des Serres*, vii. (1851–52) Misc. 141 = *Microcycas calocoma*.
caracasana, Lodd. *Cat. ex Miq. in Linnaea*, xvii. (1843) 738 = *Loddigesii*.
Chigua, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 201. t. 43.—N. Granat.
concinna, Hort. Booth, ex Regel, *Gartenfl.* xxvii. (1878) 9 = *pumila*.
concinna, Hort. Par. ex H. Wendl. *Ind. Palm.* 52, nomen (Quid?).—Hab.?
corallipes, J. Versch. *Cat. n. 17* (1873–74) 5, 7 = *Macrozamia spiralis*.

ZAMIA:—

- Corsoniana*, G. Don, in *Loud. Gard. Mag.* xviii. (1842) 371 = *Cycas Rumphii*.
crassifolia, Hort. ex T. Moore, *Fl. & Pom.* (1877) 14, 15.—Hab.?
cycadifolia, S. Brunn. in *Flora*, viii. (1825) 733 = *Macrozamia Fraseri*.
cycadifolia, Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 195.—Mexic.
cycadifolia, Jacq. *Fragm.* 27 = *Encephalartos cycadifolius*.
cycadifolia, Lodd. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 719 = *Encephalartos caffer*.
Cycadis, Linn. f. *Suppl.* 443 = *Encephalartos caffer*.
cylindrica, Hort. Booth, ex Regel, *Gartenfl.* xxvii. (1878) 9 = *pumila*.
cylindrica, Liebm. ex Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 195 = *Leiboldii*.
debilis, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. iii. 478.—Ind. occ.
debilis, Linn. f. ex Salisb. *Prod.* 400 = *laeta*.
debilis, Lodd. *Bot. Cat. t. 155* = *angustifolia*.
dentata, Hort. Angl. ex Link. *Enum. Hort. Berol.* ii. 432, nomen (Quid?).—Hab.?
dentata, Voigt, in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 53 = *tenuis*.
elegans, Hort. ex Yates, in *Proc. Linn. Soc.* ii. (1849) 18, 19 = *Encephalartos caffer*.
elliptica, Lodd. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 723 = *Encephalartos caffer*.
elongata, Heynh. *Nom.* i. 862 = *Encephalartos elongatus*.
erilepis, Hort. ex Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 195 = *Leiboldii*.
Fischeri, Miq. in *Hort. Houttean.* 20; et in *Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 201.—Am. caled.
floridana, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 544 = *angustifolia*.
Fraseri, Van Houtte, ex Regel, *Gartenfl.* xxv. (1876) 229 = *Macrozamia spiralis*.
Friderici-Guilielmi, Hort. Parment. ex Miq. *Prod. Syst. Cycad.* 22 = *Dioon edule*.
furfuracea, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. iii. 477.—Mexic.
fusca, Hort. Paull. ex Regel, *Gartenfl.* xxv. (1876) 261 = *Ceratozamia Katzeriana*.
Galeotti, De Vriese, in Hoev. & De Vriese, *Tijdschr.* xii. (1845) 24 = *Ceratozamia mexicana*.
gleina, Hort. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 729 = *Encephalartos horridus*.
grandis, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1865) 365 (Quid?).—Hab.?
Gutierrezii, Sauv. *Anal. Acad. Cienc. Nat. Haban.* (1868) (reimp. 2).—Cuba.
horrida, Jacq. *Fragm.* 27 = *Encephalartos horridus*.
horrida, Lodd. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 725 = *Encephalartos lanuginosus*.
humilis, Salisb. *Prod.* 400 = *pumila*.
integrifolia, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. iii. 478.—Ind. occ.
integrifolia, A. Gray, ex A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 544 = *angustifolia*.
integrifolia, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 648 = *pumila*.
integrifolia, Rich. *Conif. et Cycad.* 191. t. 27 = *media*.
Kickxii, Miq. *Monogr. Cycad.* 71. t. 8.—Cuba.
laeta, Salisb. *Prod.* 400 (sp. dub.).—Hab.?
lanuginosa, Jacq. *Fragm.* 28 = *Encephalartos lanuginosus*.
latifolia, Lodd. *Cat. n. 187*; ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 733.—Honduras.
Lawsoniana, Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 195.—Mexic.
Lehmanniana, Eckl. & Zeyh. ex Eckl. in Otto & Dietr. *Allg. Gartenz.* i. (1833) 158; et ex Lehm. *Pugill.* vi. 7 = *Encephalartos Lehmanni*.
Leiboldii, Miq. in *Linnaea*, xix. (1847) 425.—Mexic.
Lindenii, Regel, ex André, in *Illustr. Hortic.* xxii. (1875) 23. t. 195.—Ecuador.
Lindleyana, H. Wendl. *Ind. Palm.* 53 = *Z. Chigua*.
Lindleyi, Warsz. in Otto & Dietr. *Allg. Gartenz.* xix. (1851) 146 = *Z. Chigua*.
linearifolia, Linden, in *Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 32, nomen (Quid?).—Cuba.
linifolia, Hort. Pawl. ex Regel, *Gartenfl.* xxvii. (1878) 12 = *angustifolia*.
Loddigesii, Miq. in Hoev. & De Vriese, *Tijdschr.* x. (1843) 72.—Mexic.
longifolia, Jacq. *Fragm.* 28 = *Encephalartos longifolius*.
Mackenzii, Hort. ex Miq. in *Verh. Kon. Akad. Wetensch.* II. iii. (1869) 55 = *Macrozamia Pauli-Guilielmi*.

ZAMIA:—

- Macleani*, Regel, *Gartenfl.* xxv. (1876) 371, sphalm. = *Maeleni*.
macrophylla, Parment. ex Miq. *Prod. Syst. Cycad.* 23 = *Ceratozamia mexicana*.
Maeleni, Miq. in *Linnaea*, xvii. (1844) 97 = *Dioon edule*.
manicata, Linden, ex Regel, *Gartenfl.* (1878) 8; et in *Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 32, nomen.—Bras.
media, Jacq. *Hort. Schoenb.* iii. 77. tt. 397, 398.—Ind. occ.
media, Sims, *Bot. Mag.* t. 1838 = *pumila*.
mexicana, Miq. *Prod. Cycad.* 13, 28 = *Loddigesii*.
Miqueli, Hort. Adelaide, ex Regel, *Gartenfl.* xxv. (1876) 230 = *Macrozamia Miquelii*.
montana, A. Br. in *Monatsb. Akad. Berl.* (1875) 376.—N. Granat.
multifoliolata, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 545.—Cuba.
muricata, Willd. *Sp. Pl.* iv. 847.—Am. trop.
nana, Hort. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 729 = *Encephalartos horridus*.
obliqua, A. Br. in *Monatsb. Akad. Berl.* (1875) 376; *Regel, in Illustr. Hortic.* xxiv. (1877) 140. t. 289.—N. Granat.
occidentalis, Lodd. *Cat. n. 177*; ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 711 = *Encephalartos pungens*.
Otonis, Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 740.—Cuba.
pallida, Salisb. *Prod.* 401 (sp. dub.).—Hab.?
parasitica, Poepp. ex Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* iv. I. 414 = *Poeppigiana*.
picta, Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 194.—Mexic.?
Poeppigiana, Mart. & Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* iv. I. 414. t. 109.—Peruv.
Potemkini, Hort. ex Miq. in *Verh. Kon. Akad. Wetensch.* II. iv. (1870) 30.—Hab.?
prasina, Bull. *Cat.* (1882) 20; ex Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 194 = *latifolia*.
Princeps, Hort. Bull. ex Dyer, l. c. = *Z. Chigua*.
prunifera, Lodd. *Cat.* ex G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 403, nomen = *Encephalartos pruniferus*.
Pseudo-parasitica, Yates, in *Seem. Bot. Voy. Herald*, 202, 253.—Panama.
pumila, Hort. ex Regel, *Gartenfl.* xxvii. (1878) 11 = *pygmaea*.
pumila, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 1659.—Ind. occ.
pungens, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. iii. 478 = *Encephalartos pungens*.
pungens, Hort. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 725 = *Encephalartos lanuginosus*.
pungens, Linn. f. ex Salisb. *Prod.* 401 = *pallida*.
pungens, Lodd. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 725 = *Encephalartos elongatus*.
pygmaea, Sims, *Bot. Mag.* t. 1741.—Ind. occ.
repanda, Lodd. *Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 403, nomen.—Hab.?
Roesli, Regel, in *Linden, Cat. n. 90* (1873) 10; et in *Illustr. Hortic.* xx. (1873) 126. t. 133–134 = *Pseudo-parasitica*.
serrulata, Lodd. *Cat.* ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 738 = *Loddigesii*.
Sieboldi, Cf. *Gard. Chron.* (1878) II. 594, sphalm. = *Leiboldii*.
Skinneri, Warsz. in Otto & Dietr. *Allg. Gartenz.* xix. (1851) 146.—Am. centr.
spartea, A. DC. in *DC. Prod.* xvi. II. 539.—Mexic.
spinosa, Lodd. *Cat. n. 168*; ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 721 = *Encephalartos Altensteinii*.
spinosissima, Hort. ex Miq. l. c. = *praec.*
spinulosa, Heynh. *Nom.* i. 862 = *Encephalartos Lehmanni*.
spinulosa, Hort. ex Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 721 = *Encephalartos Altensteinii*.
spiralis, R. Br. *Prod.* 348 = *Macrozamia spiralis*, *Fraseri*.
spiralis, Salisb. *Prod.* 401 = *Macrozamia spiralis*.
stricta, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 217 = *multifoliolata*.
stricta, Miq. in *Verh. Nederl. Inst.* III. iv. (1851) 183 = *angustifolia*.
tenuifolia, Fisch. ex Miq. in *Linnaea*, xix. (1847) 429 = *Fischeri*.
tenuis, Willd. *Sp. Pl.* iv. 846.—Ins. Baham.
terrestris, Hort. ex Dyer, in *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 195 = *Loddigesii*.
tonkinensis, Linden & Rodigas, in *Illustr. Hortic.* xxxii. (1885) 27. t. 547.—Tonkin.

ZAMIA :—

- tricuspidata*, Hort. in Verh. Ver. Bef. Gartenb. v. 186 = *Encephalartos horridus*.
tridentata, Willd. Sp. Pl. iv. 846 = *Encephalartos tridentatus*.
unidentata, Hort. ex Miq. in Linnaea, xvii. (1843) 715 = *Encephalartos tridentatus*.
variegata, Warsz. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xiii. (1845) 253, nomen.—Hab.?
vernicaosa, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1868) 349 (Quid?).—Hab.?
Verschaffeltii, Miq. in Arch. Néerl. v. (1870) 82; et in Verh. Kon. Akad. Wetensch. II. iv. (1870) 31.—Mexic.
vestita, Van Houtte, Cat. 10; ex Miq. in Tijdschr. Wetensch. iii. (1849) 300.—Am. centr.
villosa, Gaertn. Fruct. i. t. 3 = *Encephalartos cycadifolius*.
villosa, Herb. Van Royen, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 546 = *Encephalartos cafer*.
Wallisii, Hort. Veitch, ex A. Br. in Monatsb. Akad. Berl. (1875) 376.—N. Granat.
Yatesii, Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. iv. (1851) 182 = *angustifolia*.

- ZAMIOCULCAS**, Schott, Syn. Aroid. 71 (1856).
AKOIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 993.
GONATOPUS, Engl. in DC. Monog. ii. 208 (1879).
Boivini, Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. (1870) 321.—Afr. trop.
Loddigesii, Schott, Syn. Aroid. 71.—Afr. trop.

- ZAMZELA**, Rafin. Sylva Tellur. 90 (1838) = *Hirtella*, Linn. (Rosac.).
racemosa, Rafin. l. c. = *H. americana*?
rugosa, Rafin. l. c. = *H. rugosa*.

- ZANICHELIA**, Gilib. Exercit. ii. 419 (1792), sphalm. = seq.

- ZANICHELLIA**, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. II. 420 (1793), err. typ. = seq.

- ZANNICHALIA**, Reut. in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1854-56) 129, sphalm. = seq.

- ZANNICHELLA**, Linn. Syst. ed. I. (1735) = seq.

- ZANNICHELLIA**, Mich. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 278 (1737). *NAIADACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1016.

- PELTA*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 43 (1867).
aculeata, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 203 = palustris.
brachystemon, J. Gay, ex Reut. Cat. Gr. Jard. Genève. (1854) 4 = palustris.
contorta, Cham. in Linnaea, ii. (1827) 231 = palustris.
cylindrocarpa, Koern. ex C. Muell. in Walp. Ann. vi. 3 = *Lepilaena cylindrocarpa*.
dentata, Willd. Sp. Pl. iv. 181 = palustris.
digyna, J. Gay, ex Bréb. Fl. Norm. ed. II. 252; ed. III. 289 = palustris.
geniculata, Gilib. Exercit. ii. 419 = palustris.
gibberosa, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1591 = palustris.
graminifolia, Gilib. Exerc. Bot. in Schola Princip. Univ. Viln. (1772) 31 = palustris?
intermedia, Nielsen, in Bot. Tidsskr. Scr. II. i. (1872) 205 = seq.?
intermedia, Torr. in Beck, Bot. N. & M. St. 385 = palustris.
laevis, Presl, Bot. Bemerk. 112.—Afr. austr.
indica, Rottl. ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 404 (Quid?).—Ind. or.
macrostemon, J. Gay, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 26 = palustris.
major, Boenn. ex Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1591 = palustris.
marina, Nielsen, in Bot. Tidsskr. Ser. II. i. (1872) 204 = palustris.
maritima, Nolte, Novit. Fl. Holsat. 75 = palustris.
palustris, Linn. Sp. Pl. 969.—Europ.; Am. bor.
pedicellata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5185; Fries, Mant. iii. 133 = palustris.
pedunculata, Fuss, Ber. Phan. Fl. Siebenb. (1854) 13 = *Ruppia rostellata*.

ZANNICHELLIA :—

- pedunculata*, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1591 = palustris.
pellata, Bertol. Fl. Ital. x. 10 = palustris.
polycarpa, Nolte, Novit. Fl. Holsat. 75 = palustris.
Preissii, Lehm. Fl. Preiss. ii. 3 = *Lepilaena Preissii*.
pumila, Le Gall, Fl. Morb. 568 (Quid?).—Gallia.
radicans, Wallm. in Liter. Bot. Ges. Regensb. xi. (1841) 20 = palustris.
repens, Boenn. Prod. Fl. Monast. 272 = palustris.
Rosenii, Wallm. in Liter. Bot. Ges. Regensb. xi. (1841) 18 = palustris.
stylaris, Presl, Bot. Bemerk. 112.—Afr. austr.
tenuis, Reut. Cat. Gr. Jard. Genève. (1854) 4; et in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1854-56) 129 = palustris.
tuberosa, Lour. Fl. Cochinch. 543.—Cochinch.
vaginalis, Delile, ex Kunth, Enum. Pl. iii. 126 = *Althenia filiformis*.

- ZANONIA**, Linn. Coroll. Gen. 19 (1737). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 839.
angulata, Wall. Pl. As. Rar. ii. 28 = indica.
capricornica, F. Muell. Fragm. vii. 61 = *Alsomitra capricornica*.
cissoides, Wall. Pl. As. Rar. ii. 28 = *Gynostemma pedatum*.
clavigera, Wall. l. c. = *Alsomitra clavigera*.
heterosperma, Wall. l. c. 29 = *Gomphogyne heterosperma*.
Hookeri, F. Muell. Census, 76 = *Alsomitra Hookeri*.
indica, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1457.—Ind. or.; Malaya.
integerrima, Wall. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 931 = *Alsomitra clavigera*.
laxa, Wall. Pl. As. Rar. ii. 29 = *Gynostemma Wightianum*.
macrocarpa, Blume, Bijdr. 937.—Java.
oblonga, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 796, nomen (Quid?).—Ind. or.
pedata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 683 = *Gynostemma pedatum*.
sarcophylla, Wall. Pl. As. Rar. ii. 28 = *Alsomitra sarcophylla*.
Stephensiana, F. Muell. Fragm. viii. 181 = *Alsomitra Stephensiana*.
timorana, Span. in Linnaea, xv. (1841) 205 = *Alsomitra timorana*.
timorensis, Walp. Rep. ii. 194, sphalm. = praec.
Wightiana, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 356 B = *Gynostemma Wightianum*.

- ZANONIA**, [Plum.] Cram. Disp. Syst. 75 (1803) = *Campelia*, Rich. (Commel.).
bibracteata, Cram. l. c. = *C. Zanonia*.

- ZANTEDESCHIA**, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 9, partim = *Schismatoglottis*, Zoll. & Mor. (Aroid.).
alba, C. Koch, l. c. = *Homalomena alba*.
calyptata, C. Koch, l. c. = *S. calyptata*.
cordata, C. Koch, l. c. = *Homalomena aromatica*.
foetida, C. Koch, l. c. = *Homalomena rubescens*.
rubens, C. Koch, l. c. = *Homalomena rubescens*.
virosa, C. Koch, l. c. = *Colocasia virosa*.

- ZANTEDESCHIA**, Spreng. Syst. iii. 765 (1826) = *Richardia*, Kunth (Aroid.).
aethiopica, Spreng. l. c. = *R. africana*.
albo-maculata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1880) 254; et ex Engl. Bot. Jahrb. iv. (1883) 64 = *R. albo-maculata*.
angustiloba, Engl. l. c. = *R. angustiloba*.
aromatica, Spreng. Syst. iii. 765 = *Homalomena aromatica*.
asperata, C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 5 = *Philodendron asperatum*.
hastata, Engl. Bot. Jahrb. iv. (1883) 64 = *R. hastata*.
macrocarpa, Engl. l. c. = Afr. austr.
melanoleuca, Engl. l. c. = *R. melanoleuca*.
occulta, Spreng. Syst. iii. 765 = *Homalomena aromatica*.
Rehmanni, Engl. Bot. Jahrb. iv. (1883) 63.—Afr. austr.

- ZANTHORHIZA**, L'Hérit. Stirp. Nov. 79. t. 38 (1784). *RANUNCULACEAE*, [Benth. & Hook. f. i. 9.].
XANTHORHIZA, Marsh. Arbust. 167 (1785).

ZANTHORHIZA :—

- apiifolia*, L'Hérit. Stirp. Nov. 79. t. 38.—Am. bor.
simplicissima, Marsh. Arbust. 168 = *apiifolia*.
tinctoria, Woodh. in Med. Repos. N. York, v. (1802) 160 = *apiifolia*.

- ZANTHOXILON**, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 72 (1875), sphalm. = seq.

- ZANTHOXYLON**, Walt. Fl. Carol. 52, 243 (1788) = seq.

- ZANTHOXYLUM**, Linn. Hort. Cliff. 487 (1737). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 297.

- AUBERTIA*, Bory, Voy. i. 356. t. 18 (1804).
BLACKBURNIA, Forst. Char. Gen. t. 6 (1776).
CURTISIA, Schreb. Gen. 199 (1789).
DORATIUM, Soland. ex Jaume St. Hil. Expos. ii. 267 (1805).
FAGARA, Linn. Syst. ed. X. 897 (1759).
LACURIS, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7119 (1849).
LANGSDORFIA, Leand. Sacram. in Denkschr. Akad. Muench. (1819) 229.
MIOTRILA, Rafin. Am. Man. Mulb. 37 (1839).
OCHROXYLUM, Schreb. Gen. 826 (1791).
PENTANOME, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 725, in syn.
POHLANA, Leand. Sacram. in Denkschr. Akad. Muench. (1819) 229.
PSEUDOPETALON, Rafin. Fl. Ludov. 107 (1817).
PTEROTA, P. Br. Hist. Jamaic. 146. t. 5 (1756).
TENOREA, Rafin. Specch. i. 193 (1814).
TIPALIA, Dennst. Schlusss. Hort. Malab. 31 (1818).
TOBINIA, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 56 (1825).
XANTHOXYLON, Spreng. Anleit. ii. II. 655 (1818).
acanthopodium, DC. Prod. i. 727.—Reg. Himal.
accedens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 671 = *Evodia accedens*.
aculeatissimum, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 176.—Bolivia.
aculeatum, Macfad. Fl. Jamaic. i. 191 = *acuminatum*.
acuminatum, Macfad. l. c. 192 = *coriaceum*.
acuminatum, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 575.—Jamaic.
acutifolium, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 170.—Bras. affine, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 3.—Mexic.
ailanthoides, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1846) 138.—Formosa; Japon.
alatum, Roxb. Hort. Beng. 72; Fl. Ind. iii. 768.—Reg. Himal.; China.
alatum, Steud. Nom. ed. II. ii. 796.—Afr. austr.
alatum, Wall. Cat. n. 1209, partim = *acanthopodium*.
album, Vahl, Eclog. Am. iii. 47.—Am. austr.
alveolatum, Shubl. ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot. 156 = *Z. Clava-Herculis*.
americanum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Am. bor.
amoyense, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vii. (1847) 277.—N. Granat.
andamanicum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) II. 199.—Ins. Andaman.
araliaceum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 274 = *Casimiroa edulis*.
arenarium, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 164.—Bras.
argenteum, Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 398, nomen (Quid?).—Hab.?
armatum, DC. Prod. i. 727, sphalm. = *alatum*.
Arnottianum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 146.—Ins. Bonin.
aromaticum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 138 = *cari-baeum*.
aromaticum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 670 = *Evodia glabra*.
aromaticum, Willd. Sp. Pl. iv. 755 = *Z. Clava-Herculis*.
articulatum, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 161.—Bras.
Aubertia, DC. Prod. i. 725.—Ins. Borbon.
Aubertianum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = praec.
australasicum, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 503 = *Geijera parviflora*.
australe, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 398.—Austral.
Avicennae, DC. Prod. i. 726.—China.
Bajarnandia, Wall. Cat. n. 7118 (sp. dub.).—Assam.
Balansae, Baill. *Adansonia*, xi. (1875) 300.—Ins. Loyalt.

ZANTHOXYLUM:—

- Blackburnia, *Benth. Fl. Austral.* i. 363.—Anstral.
bombacifolium, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 329. t. 35.—Cuba.
borbonicum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 440.—Ins. Borbon.
brachyacanthum, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict.* ii. (1858) 65.—Austral.
Bretschneideri, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1883) 73.—China.
Budrunga, *DC. Prod.* i. 728 (= seq. ?).—Ind. or.
Budrunga, *Wall. Cat. n.* 1211.—Reg. Himal.; Burma.
Bungeanum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xvi. (1871) 212 = Bungei.
Bungei, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v.* (1866) 209 = alatum.
Bungei, *Planch. l. c. Sér. III.* xix. (1853) 82.—China.
camphoratum, *Planch. & Linden, l. c.*—Venezuela.
capense, *Hav. in Hav. & Sond. Fl. Cap.* i. 446.—Afr. austr.
caribaeum, *Gaertn. Fruct.* i. 333 = americanum.
caribaeum, *Lam. Encyc.* ii. 39.—N. Granat.
carolinianum, *Gaertn. Fruct.* i. 333 = caribaeum.
carolinianum, *Lam. Encyc.* ii. 39 = Z. Clava-Herculis.
Catesbianum, *Rafin. Med. Fl.* ii. 114 = Z. Clava-Herculis.
cauliflorum, *Steud. Nom. ed. I.* 897 = americanum.
Chiloperone, *Mart. ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 170.—Bras.
ciliatum, *Engl. l. c.* 180.—Venezuela.
cinereum, *Engl. l. c.* 172.—Bras.
Clava-Herculis, *DC. Prod.* i. 727 = caribaeum.
Clava-Herculis, *Lam. Encyc.* ii. 38 = americanum.
Clava-Herculis, *Linn. Sp. Pl.* 270.—Ins. Carib.
Clava-Herculis, *Lour. Fl. Cochinch.* 659 = Avicennae.
clavatum, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon.* vii. (1880) 137 = Z. Clava-Herculis.
Coco, *Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 168.—Reg. Argent.
connaroides, *Wight & Arn. Prod.* 148 = Heynea trijuga.
coriaceum, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 326. t. 34 = emarginatum.
coriaceum, *Walp. Rep.* i. 521.—Jamaic.
coriaceum, *Wright, ex A. Gray, Pl. Wright.* i. 31 = Z. Clava-Herculis.
corymbosum, *DC. Prod.* i. 726.—Ind. occ.
crenatum, *Wall. Cat. n.* 1216 = Z. Budrunga.
cribrosus, *Spreng. Syst.* i. 946.—Ins. S. Doming.
cuiabense, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 163.—Bras.
Culantrillo, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 2.—Am. trop.
cuspidatum, *Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 329.—China.
Danielli, *Benn. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser.* III. x. (1862) 201. t. 5 (Evodia sp.).—China.
digynum, *Engelm. ex A. Gray, Pl. Wright.* i. 31 = Z. Clava-Herculis.
dipetalum, *H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* x. (1866) 319.—Ins. Sandvic.
dumosus, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 327.—Cuba.
duplicipunctatum, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 49.—Cuba.
elegans, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 159.—Bras.
elegans, *A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvii. (1842) 141.—Bras.
elephantiasis, *Macfad. Fl. Jamaic.* i. 193 = caribaeum.
emarginatum, *Sav. Fl. Ind. Occ.* i. 572.—Ind. oc.
emarginellum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 22.—Japon.
euneuron, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 532 = Evodia euneura.
Finlaysonianum, *Wall. Cat. n.* 7114.—Siam ?
flavum, *Vahl, Eclog. Am.* iii. 48.—Am. austr.
floribundum, *Wall. Cat. n.* 1206 = Toddalia aculeata.
floridanum, *Nutt. Sylva.* iii. 14. t. 85 = caribaeum.
fraxineum, *Willd. Sp. Pl.* iv. 757 = americanum.
fraxinifolium, *Marsh. Arbust.* 167 = americanum.
fraxinifolium, *Walt. Fl. Carol.* 243 = Z. Clava-Herculis.
furfuraceum, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* vii. (1847) 272.—N. Granat.
Gardneri, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 165.—Bras.
Ghisbreghtii, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxii. (1859) i. 274.—Mexic.

ZANTHOXYLUM:—

- glandulosum, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 234, nomen.—Java.
gracile, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 19.—Cuba.
grandifolium, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* vii. (1847) 273.—N. Granat.
guianense, *Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1189, nomen.—Guian.
Hamiltonianum, *Wall. Cat. n.* 7117.—Reg. Himal.
hostile, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 796, sphalm. = hostile.
hermaphroditum, *Willd. Sp. Pl.* iv. 756.—Guian.
heterophyllum, *Sm. in Rees, Cycl.* xxxix. n. 14.—Ins. Mascar.
hirsutum, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1861 (1862) 450 = Z. Clava-Herculis.
horridum, *DC. Prod.* i. 728.—Japon.
Horsfieldii, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 597.—Java.
hostile, *Wall. Cat. n.* 1210 = alatum, acanthopodium.
hyemale, *A. St. Hil. Pl. Us. Bras.* t. 37.—Bras.
javanicum, *Walp. Rep.* i. 519 = Picrosma javanica.
juglandifolia, *Willd. Sp. Pl.* iv. 756.—Ins. S. Doming.
juniperinum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 77.—Am. trop.
kauaense, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 354.—Ins. Sandvic.
khasianum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 494.—Reg. Himal.
Kibada, *Siebold, in Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 48 = alatum ?
Lamarckianum, *Cham. in Linnaea.* v. (1830) 58 = Evodia triphylla.
lanceolatum, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 293 = Z. Clava-Herculis.
Langsdorffii, *Mart. in Flora.* xx. (1837) 11. Beibl. 97 = rhoifolium.
lanuginosum, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora.* v. 1783 = Evodia latifolia.
latespinosum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 173.—Bras.
latifolium, *G. Don, Gen. Syst.* i. 804 = Evodia latifolia.
lentiscifolium, *Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 329 = Z. Avicennae.
Leprieurii, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* 141.—Afr. trop.
Limoncello, *Planch. & Oerst. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V.* xiv. (1872) 312.—N. Granat.
limonifolium, *Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 185, nomen.—Reg. Himal.
longifolium, *Wall. Cat. n.* 7115 = myriacanthum.
lucidum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 532 = Evodia lucida.
lucidum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 92, in nota.—Bras.
lucidum, *Wall. Cat. n.* 1212 = ovalifolium.
macrocarpum, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 527, sphalm. = microcarpum.
macrophyllum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 11. 670 = Evodia accedens.
macrophyllum, *Nutt. Sylva.* iii. 10 = Z. Clava-Herculis.
macrophyllum, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 304.—Afr. trop.
macrophyllum, *Ryan, ex Eggers, Fl. St. Croix* (1879), 38 = Z. Ochroxylum.
macrosperrum, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* vii. (1847) 276.—N. Granat.
mantchuricum, *Benn. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser.* III. x. (1862) 200 = schinifolium.
Marambong, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 533 = Evodia Roxburghiana.
martinicense, *DC. Prod.* i. 726.—Ins. Martinic.
maviense, *H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* x. (1866) 319.—Ins. Sandvic.
Mayu, *Bert. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* xxi. (1830) 345.—Ins. J. Fernand.
melanacanthum, *Planch. l. c. Sér. III.* xix. (1853) 82; et ex *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 305.—Afr. trop.
melanostictum, *Schlecht. & Cham. in Linnaea.* v. (1830) 231.—Mexic.
microcarpum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 138.—Ins. Dominic.
microphyllum, *Desf. Cat. Hort. Par. ed. III.* 256, nomen (Quid ?).—Hab. ?
minutiflorum, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* vii. (1847) 278.—N. Granat.
mite, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 1013 = americanum.
monogynum, *A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom.* (1823) 129.—Bras.

ZANTHOXYLUM:—

- montanum, *Blume, Bijdr.* 248.—Java.
myriacanthum, *Wall. Cat. n.* 1214.—Malaya.
Naranjillo, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 76.—Reg. Argent.
natalense, *Hochst. in Flora.* xxvii. (1844) 304 = Cnestis natalensis.
nemorale, *Mart. in Flora.* xxiv. (1841) 11. Beibl. 92.—Bras.
nigrum, *Mart. l. c.* xxii. (1839) i. Beibl. 11.—Bras.
nilagiricum, *Miq. Anal. Bot. Ind.* iii. 6 = Evodia Roxburghiana.
nitidum, *Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor.* 13 = Bungei.
nitidum, *DC. Prod.* i. 727.—China.
nitidum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 77 = lucidum.
nitidum, *Wall. Cat. n.* 1207 = Toddalia aculeata.
Novae-Zelandiae, *A. Rich. Ess. Fl. N. Zél.* 291 = Hedycarya arborea.
oblongum, *Wall. Cat. n.* 1218 = Z. Rhetsa.
obscurum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 169.—Bras.
obtusifolium, *G. Don, Gen. Syst.* i. 804 = Evodia obtusifolia.
obtusifolium, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 293.—Ind. or.
Ochroxylum, *DC. Prod.* i. 725.—Am. trop.
oppositifolium, *DC. l. c.* 728 = Boronia alata.
ovalifolium, *Wight, Illustr.* i. 169.—Ind. or.
oxyphyllum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 42.—Reg. Himal.
paniculatum, *Balf. f. in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 12.—Ins. Rodriguez.
parviflorum, *Benth. Fl. Austral.* i. 363.—Austral.
pauciflorum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 164.—Bras.
Peckoltianum, *Engl. l. c.* 155.—Bras.
peltophorum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 442 = rhoifolium.
Pentanome, *DC. Prod.* i. 725.—Mexic.
Perrottetii, *DC. l. c.* 726 = rhoifolium ?
petiolare, *A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvii. (1842) 140.—Bras.
phyllopterum, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 19.—Cuba.
pimpinelloides, *DC. Prod.* i. 726.—Ins. S. Doming.
piperitum, *Benn. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser.* III. x. (1862) 200 = Avicennae.
piperitum, *DC. Prod.* i. 725.—China; Japon.
piperitum, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 261 = Arnottianum.
pistacifolium, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 49.—Cuba.
planispinum, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. 11. (1846) 138 = alatum.
Pohlianum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 166.—Bras.
polyacanthum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 443 = stelligerum.
polygamum, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 433 = senegalense.
praecox, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 76.—Bras.
pteleaefolium, *Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 330 = Evodia triphylla.
Pterota, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 3.—Ind. occ.
Pterota, *Seem. Bot. Voy. Herald.* 94 = Z. Limoncello.
pterotum, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon.* vii. (1880) 137 = Z. Pterota.
pubescens, *A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvii. (1842) 141 = rhoifolium.
pumilum, *Zipp. ex Span. in Linnaea.* xv. (1841) 185, nomen (Quid ?).—Ins. Timor.
punctatum, *Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix.* 310.—Ind. occ.
quinduense, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* vii. (1847) 275.—N. Granat.
ramiflorum, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 235 = americanum.
Regnellianum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 174.—Bras.
Rhetsa, *DC. Prod.* i. 728.—Ind. or.
rhetsum, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon.* vii. (1880) 137 = praec.
rhizoides, *Blume, Bijdr.* 248.—Java.
rhoifolium, *Lam. Encyc.* ii. 39.—Am. trop.
ricinoides, *Walp. Rep.* i. 520, sphalm. = rhizoides.
Riedelianum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 162.—Bras.
rigidum, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 756.—Am. austr.
Roxburghianum, *Cham. in Linnaea.* v. (1830) 58 = Evodia Roxburghiana.
rubescens, *Planch. ex Hook. Niger Fl.* 270.—Afr. trop.

ZANTHOXYLUM :—

- rufescens, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 407.—Hab. ? rugosum, A. St. Hil. & Zucc. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 140.—Bras.
Ruizianum, Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 170 = obscurum.
Rumphianum, Cham. in Linnaea, v. (1830) 58 = *Evodia latifolia*.
sapindifolium, Wall. Cat. n. 1215.—Burma.
sapindoides, DC. Prod. i. 728 = *emarginatum*.
scandens, Blume, Bijdr. 249.—Java.
schinifolium, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ii. (1846) 137.—China; Japon.
Selloi, Spreng. Syst. i. 947.—Bras.
senegalense, DC. Prod. i. 726.—Afr. trop.
sepiarium, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 169 = *ovalifolium*.
Serra, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 440 = *Saurauja napaulensis*.
serrulatum, Blume, Bijdr. 249.—Java.
simplicifolium, Vahl, Eclog. Am. iii. 45 = *Z. Ochroxylum*.
simulans, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 208 = Bungei.
sorbifolium, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 75 = *rhoifolium*.
Spinifex, DC. Prod. i. 728.—Ind. occ.; Venezuela.
spinosum, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 574.—Ind. occ.
spondiaefolium, Wall. Cat. n. 1217.—Burma.
Sprucei, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 167.—Peruv.
stelligerum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 442.—Bras.
stenopterum, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 19.—Cuba.
stipitatum, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 161.—Bolivia.
snbserratum, Engl. l. c. 160.—Bras.
Sumach, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 138, in obs.—Ins. Guadeloup.
Sumach, Macfad. Fl. Jamaica. i. 195 = *Brunellia comocladiifolia*.
syncarpum, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vii. (1847) 279.—N. Granat.
taediosum, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 330.—Cuba.
tenuifolium, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 160.—Bras.
terebinthoides, Bertol. f. in Mem. Acad. Sc. Bologn. v. (1854) 470.—Afr. trop.
ternatum, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 570.—Ind. occ.
tetraspermum, Wight & Arn. Prod. 148.—Ind. or.
texanum, Buckl. in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 90.—Texas.
Thunbergii, DC. Prod. i. 726.—Afr. austr.
tidorensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 246.—Ins. Molucc.
Timbor, Wall. Cat. n. 7116 = *acanthopodium*.
timoriense, Span. in Linnaea, xv. (1841) 185.—Ins. Timor.
Tingoassuba, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 78.—Bras.
tomentellum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 493.—Reg. Himal.
torvum, F. Muell. Fragm. vii. 140.—Austral.
tragodes, DC. Prod. i. 725.—Ins. S. Doming.
tricarpum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 118 = *americanum*.
tricarpum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 235 = *Z. Clava-Herculis*.
triflorum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 597 = *Melicope indica* ?
trifoliatum, Linn. Sp. Pl. 270 = *Acanthopanax aculeatum*.
triphyllum, G. Don, Gen. Syst. i. 804 = *Evodia triphylla*.
triphyllum, Wight, Ic. t. 204 = *Evodia Roxburghiana*.
triplinerve, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 597.—Ins. Philipp.
tuberculatum, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 166.—Bras.
undulatum, Wall. Cat. n. 1208 = *Toddalia lanceolata*.
varians, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 214.—Ins. Fiji.
velutinum, Benth. Pl. Hartw. 167 = *rigidum*.
violaceum, Wall. Cat. n. 1213 = *oxyphyllum*.
Wallichianum, Steud. Nom. ed. II. ii. 797 = *ovalifolium*.
zeylanicum, DC. Prod. i. 728 = *Evodia Roxburghiana*.
- ZANTHYRSIS**, Rafin. New Fl. Am. iii. 84 (1836) = *Sophora*, Linn. (Legumin.).
paniculata, Rafin. l. c. = *S. tomentosa*.

ZANTORRHIZA, Steud. Nom. ed. II. ii. 796 (1841) = *Zanthorhiza*, L'Herit. (Ranunc.).

ZAPAMIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 796 (1841), sphalm. = seq.

- ZAPANIA**, Lam. Illustr. i. 58. t. 17. n. 42 (1791) = *Lippia*, Houtt. (Verben.).
angustifolia, Poir. Encyc. viii. 841 = *Stachytarpheta angustifolia*.
arabica, Poir. l. c. 844 = *Priva leptostachya*.
aristata, Mirb. Hist. Nat. Pl. ed. II. xv. 240 = *Stachytarpheta orubica*.
bracteosa, Poir. Encyc. viii. 843 = *Verbena bracteata*.
cajenensis, Mirb. Hist. Nat. Pl. ed. II. xv. 241 = *Stachytarpheta cajenensis*.
canescens, Gibert, Enum. Pl. Montev. 44 = *L. canescens*.
citriodora, Lam. Illustr. i. 59 = *L. citriodora*.
corymbosa, Poir. Encyc. viii. 844 = *Verbena corymbosa*.
cuneifolia, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 234 = *L. cuneifolia*.
curassavica, Lam. Illustr. i. 59 = *Tamonea spinosa*.
dichotoma, Mirb. Hist. Nat. Pl. ed. II. xv. 240 = *Stachytarpheta dichotoma*.
Echinus, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 71. t. 5 = *Hyptis Sidentis*.
geminata, Gibert, Enum. Pl. Montev. 44 = *L. geminata*.
globiflora, Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 72 = *L. asperifolia*.
hispidia, Zuccagni, in Roem. Collect. 118 = *Priva hispidia*.
indica, Lam. Illustr. i. 59 = *Stachytarpheta indica*.
jamaicensis, Lam. l. c. = *Stachytarpheta dichotoma*.
javanica, Lam. l. c. = *L. javanica*.
lanceolata, Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 72 = *L. lanceolata*.
lantanoidea, Lam. Illustr. i. 58 = *L. asperifolia*.
lappulacea, Lam. l. c. 59 = *Priva echinata*.
marginata, Mirb. Hist. Nat. Pl. ed. II. xv. 240 = *Stachytarpheta indica*.
mexicana, Lam. Illustr. i. 59 = *Priva hispidia*.
mutabilis, Lam. l. c. = *Stachytarpheta mutabilis*.
nodiflora, Lam. l. c. = *L. nodiflora*.
nudiflora, Spreng. Pugill. ii. 70, in obs., sphalm. = *praece*.
odorata, Pers. Syn. ii. 140 = *L. asperifolia*.
odoratissima, Scop. Delic. Insub. i. 34 = *L. asperifolia*.
orubica, Mirb. Hist. Nat. Pl. ed. II. xv. 241 = *Stachytarpheta orubica*.
prismatica, Lam. Illustr. i. 59 = *Bouchea Ehrenbergii*.
reclinata, Lam. l. c. 58 = *L. stoechadifolia*.
repens, Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec. iii. 27 = *L. nodiflora*.
reptans, Spreng. Pugill. ii. 70, in obs. = *L. reptans*.
scaberrima, Juss. ex Pers. Syn. ii. 140.—Hab. ?
squamosa, Mirb. Hist. Nat. Pl. ed. II. xv. 241 = *Elytraria tridentata*.
staechadifolia, Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 72 = *L. stoechadifolia*.
strigosa, Mirb. Hist. Nat. Pl. ed. II. xv. 241 = *Stachytarpheta strigosa*.
suberosa, Spreng. Pugill. ii. 69 = *L. reptans*.
urticifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 520 = *Stachytarpheta dichotoma*.
virgata, Poir. Encyc. viii. 845 = *L. urticoides*.

ZAPPANIA, Zuccagni, in Roem. Collect. 117 (1809), sphalm. = *praece*.

ZARA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 964 (1883), err. typ. = *ZALA*, Lour. = *Pistia*, Linn.

ZARABELLIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. lix. 240 (1829) = *Melampodium*, Linn. (Compos.).
rhomboidea, Cass. l. c. = *M. paludosum*.

ZARABELLIA, Neck. Elem. i. 10 (1790) = *Berkheya*, Ehrh. (Compos.).

ZARCOA, Llanos, in Bot. Zeit. xv. (1857) 423 = *Bridelia*, Willd. (Euphorb.).
philippica, Llanos, l. c. = *Glochidion philippense*.

ZATARENDIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 86 (1836) = *Origanum*, Tourn. (Labi.).
egyptiaca, Rafin. l. c. = *O. Maru*.

ZATARIA, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 18 (1844). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1186.

bracteata, Boiss. l. c. Ser. II. iv. 12 = *multiflora*.
humilis, Benth. in DC. Prod. xii. 183 = *Nepeta bracteata*.
multiflora, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 18.—Persia.

ZAUSCHERIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 797 (1841), sphalm. = seq.

ZAUSCHNERIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 28. t. 52 (1831). *ONAGRARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 788.
californica, Presl, l. c.—Calif.
mexicana, Presl, l. c. 29 = *californica*.

ZAZINTHA, Hall. in Rupp. Fl. Jen. 209 (1745), sphalm. = *Zacintha*, Tourn. (Compos.).

ZEA, Linn. Gen. ed. I. 279 (1737). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1114.

- MAYS, Tourn. ex Gaertn. Fruct. i. 6. t. 1 (1788).
THALYSIA, Linn. Syst. ed. I (1735).
alba, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Z. Mays*.
altissima, Gmel. ex Steud. Nom. ed. I. 898 = *Z. Mays*.
americana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *Z. Mays*.
amylacea, Sturtev.—Cf. Gard. Chron. (1883) ii. 443 = *Z. Mays*.
Caragua, Steud. Nom. ed. II. ii. 797, sphalm. = *Z. Curagua*.
cryptosperma, Bonaf. Hist. Nat. Mais, 30. t. 5 bis = *Z. Mays*.
Curagua, Molina, Sagg. Chil. 129, 354.—Chili.
erythrolepis, Bonaf. Hist. Nat. Mais, 30. t. 5.—Am. bor. (cult.).
evarta, Sturtev.—Cf. Gard. Chron. (1883) ii. 443 = *Z. Mays*.
hirta, Bonaf. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xvii. (1829) 158.—Calif.
indentata, Sturtev.—Cf. Gard. Chron. (1883) ii. 443 = *Z. Mays*.
indurata, Sturtev. l. c. = *Z. Mays*.
japonica, Van Houtte, Fl. des Serres, xvi. (1865–67) 121. t. 1673–74.—Japon.
macrospema, Klotzsch, in Bot. Zeit. ix. (1851) 718.—Peruv.
Mais, Vell. Fl. Flum. x. t. 3 = seq.
Mays, Linn. Sp. Pl. 971.—Paraguay.
minor, Gmel. ex Steud. Nom. ed. I. 898 = *Z. Mays*.
mucronata, Poit. ex Viln. in Rev. Hortie. Sér. II. i. (1843) 246, in nota = *rostrata*.
praecox, Steud. Nom. ed. I. 898 = *Z. Mays*.
rostrata, Bonaf. in Ann. Soc. Agric. Lyon, v. (1842) 197; et ex Viln. in Rev. Hortie. Sér. II. i. (1843) 245.—Peruv.
saccharata, Sturtev.—Cf. Gard. Chron. (1883) ii. 443 = *Z. Mays*.
segetalis, Salisb. Prod. 28 = *Z. Mays*.
vaginata, Sturtev.—Cf. Gard. Chron. (1883) ii. 443 = *Z. Mays*.
vulgaris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *Z. Mays*.

ZEBRINA, Schnizl. in Bot. Zeit. vii. (1849) 870. *COMMELINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 856.

leandra, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 318.—Mexic.
pendula, Schnizl. in Bot. Zeit. vii. (1849) 870.—Mexic.

ZEDOARIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 53 (1836) = *Amomum*, Linn. (Scitam.).

ZEDUBA, Ham. ex Meissn. Gen. Comm. 280 (1842) = *Calanthe*, R. Br. (Orchid.).

ZEHNERIA, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 69 (1833) = *Melothria*, Linn. (Cucurb.).

- affinis*, Endl. ex Walp. Rep. ii. 196 = *M. punctata*.
angolensis, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 559 = *M. angolensis*.
Baueriana, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 624 = *M. mucronata*.
Baueriana, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 69 = *M. Baueriana*.
cerasiformis, Stocks, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 149 = *Blastania fimbriatipula*.
connivens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 656 = *M. heterophylla*.

ZEHNERIA :—

- cordata*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 486 = *Melothria cordata*.
Cunninghamii, F. Muell. in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 50 = *M. Cunninghamii*.
cuspidata, Endl. ex Walp. Rep. ii. 196 = *M. punctata*.
debilis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 488 = *Trochomeria debilis*.
deltoidea, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 560 = *M. Mannii*.
deltoidea, Miq. Pl. Jungh. 397 = *M. Rauwenhoffii*.
dilatata, Endl. ex Walp. Rep. ii. 196 = *M. cordata*.
Ecklonis, Endl. ex Walp. l. c. = *M. punctata*.
erythrocarpa, F. Muell. in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 51 = *Bryonopsis laciniosa*.
exasperata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. r. 655 = *M. punctata*.
filiformis, Miq. l. c. = *M. heterophylla*.
Garcini, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 487 = *Trochomeria Garcini*.
Garcini, Stocks, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 149 = *Blastania Garcini*.
hastata, Miq. Pl. Jungh. 398; Fl. Ind. Bat. i. r. 656 = *M. heterophylla*.
hederacea, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 487 = *M. hederacea*.
Hookeriana, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 275 = *M. perpusilla*.
Hookeriana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 80 = *M. japonica*.
longepedunculata, Hochst. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 612 = *M. longepedunculata*.
longepedunculata, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 287 = *M. scrobiculata*.
lucida, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 559 = *M. lucida*.
macrocarpa, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 488 = *Trochomeria macrocarpa*.
maysurensis, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 275 = *M. mucronata*.
membranacea, Endl. ex Walp. Rep. ii. 196 = *M. punctata*.
micrantha, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 560 = *M. minutiflora*.
micrantha, F. Muell. Fragm. i. 182 = *M. Muelleri*.
microsperma, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 559 = *M. microsperma*.
mucronata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. r. 656 = *M. mucronata*.
mysorensis, Wight, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. viii. (1842) 268 = *M. mucronata*.
obtusiloba, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 487 = *M. obtusiloba*.
pectinata, Sond. l. c. = *Trochomeria pectinata*.
racemosa, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 561 = *M. racemosa*.
scabra, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 486 = *M. punctata*.
scrobiculata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 287 = *M. scrobiculata*.
suavis, Endl. ex Walp. Rep. ii. 196 = *M. punctata*.
umbellata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 125 = *M. heterophylla*.
velutina, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 275; Endl. ex Walp. Rep. ii. 196 = *M. velutina*.
velutina, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 287 = *M. tomentosa*.
Wyleyana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 488 = *Trochomeria Wyleyana*.

ZELEA, Hort. ex Tenore, Atti 3^a Reun. Sc. Ital. (1841) 504 = *Carapa*, Aubl. (Meliac.).
splendens, Hort. ex Tenore, l. c. = *C. procera*.

ZELKOVA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 356. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 353.

ABELICEA, Reichb. Consp. 84 (1828); Baill. Hist. Pl. vi. 185 (1875).

HEMIPTELEA, Planch. in Compt. Rend. Acad. Par. lxxiv. (1872) 131.

Abelicea, Boiss. Fl. Orient. iv. 1159 = *cretica*.

acuminata, Planch. in Compt. Rend. Acad. Par. lxxiv. (1872) 1496; et in DC. Prod. xvii. 166. — Japon.

crenata, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 358. — Reg. Cauc.

cretica, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. 121. — Ins. Creta.

Keaki, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 288 = *acuminata*.

stipulacea, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 489 (err. typ. 984). — Japon.

VOL. II.

ZELMIRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 50 (1836) = *Calathea*, G. F. W. Mey. (Scitum.).
violacea, Rafin. l. c. = *C. violacea*.

ZELONOPS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 102 (1836) = *Phoenix*, Linn. (Palm.).
pusilla, Rafin. l. c. = *P. farinifera*.

ZENKERIA, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 548 = *Apuleia*, Mart. (Legumin.).
dalbergioides, Arn. l. c. = *A. praecox*.
Lundii, F. Didr. in Kjoeb. Viddensk. Meddel. (1853) 88 = *A. praecox*.

ZENKERIA, Reichb. Nom. 236 (1841) = *Parmentiera*, DC. (Bignon.).

ZENKERIA, Trin. in Linnaea, xi. (1837) 150. t. 3. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1155.

AMPHIDONAX, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 196 (1855).

elegans, Trin. in Linnaea, xi. (1837) 150. t. 3. — Ind. or.

obtusiflora, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 93. — Zeylan.

ZENOBIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 158. *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 587.

dealbata, D. Don, ex Steud. Nom. ed. II. i. 89, in syn.; ii. 797 = *speciosa*.

floribunda, DC. Prod. vii. 598 = *Pieris floribunda*.

racemosa, DC. l. c. = *Leucothoe racemosa*.

speciosa, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 158. — Am. bor.

ZENOPOGON, Link, Handb. ii. 481 (1831) = *Anthyllis*, Riv. (Legumin.).

cytisoides, Link, l. c. 481, 146 = *A. cytisoides*.

Genistae, Link, ll. cc. = *A. Genistae*.

Herrmanniae, Link, ll. cc. = *A. Hermanniae*.

ZEOCRITON, Beauv. Agrost. 114. t. 21. f. 2 (1812) = *Hordeum*, Tourn. (Gramin.).

commune, Beauv. l. c. 182 = *H. Zeocriton*.

complanatum, Beauv. l. c. 115 = *H. complanatum*.

distichum, Beauv. l. c. = *H. distichum*.

Hystrix, Beauv. l. c. = *H. maritimum*.

maritimum, Beauv. l. c. = *H. maritimum*.

murinum, Beauv. l. c. = *H. murinum*.

nodosum, Beauv. l. c. = *H. pratense*.

pratense, Beauv. l. c. = *H. secalinum*.

rigidum, Beauv. l. c. = *H. maritimum*.

secalinum, Beauv. l. c. = *H. capense*.

strictum, Beauv. l. c. = *H. bulbosum*.

vulgare, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 90 = *H. Zeocriton*.

ZEPHYRA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct. 1832) 236. *HAEMODORACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 680.

DICOLUS, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 550; (Desc. Pl. Nuev. ii. 74).

amoena, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 503 = *elegans*.

elegans, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct. 1832) 236. — Peruv.; Chili.

ZEPHYRANTHES, Herb. App. [Bot. Reg.] 36 (1821). *AMARYLLIDAE*, Benth. & Hook. f. iii. 723.

ARGYROPSIS, M. Roem. Syn. Ens. 125 (1847).

ARVIELA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 135 (1866).

HABRANTHUS, Herb. in Bot. Mag. t. 2464 (1824); et in Bot. Reg. t. 1345 (1830), partim.

MESCHLOA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 10 (1836).

PLECTRONEMA, Rafin. l. c. (1836).

POGONEMA, Rafin. l. c. (1836).

PYROLIRION, Herb. App. [Bot. Reg.] 37 (1821).

Ackermannia, M. Roem. Syn. Ens. 124 = *verecunda*.

acuminata, Herb. in Bot. Reg. sub t. 1345 = *mesochloa*.

Akermanniana, Herb. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 671, nomen (Quid ?). — Mexic.

Andersoniana, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 724. — Reg. Argent.

Andersonii, Nichols. Dict. Gard. ii. 107 = *praecox*.

Atamasco, Herb. App. [Bot. Reg.] 36. — Amer.

aurea, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 724. — Peruv.

ZEPHYRANTHES :—

aurea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 161 = *longifolia*.

bifolia, M. Roem. Syn. Ens. 125 = *rosea*.

candida, Herb. in Bot. Mag. t. 2607. — Reg. Argent.

carinata, Herb. l. c. t. 2594. — Am. centr.; Jamaic.

carnea, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1175 = *rosea*.

chloroleuca, Herb. App. [Bot. Reg.] 36. — Afr. austr. ?

chlorosolen, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1176 = *Cooperia Drummondii*.

citrina, Baker, in Bot. Mag. t. 6605. — Guian.

Commersoniana, Herb. Amaryll. 174. t. 29. f. 3. — Reg. Argent.

concolor, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 724, in nota. — Mexic.

depauperata, Herb. Amaryll. 171. — Chili.

Drummondii, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 328 = *Cooperia pedunculata*.

flava, Ind. Kew. i. 102 (perperam citata, post 1885 publici juris facta).

flavescens, Herb. in Lindl. in Bot. Reg. sub t. 1345 = *mesochloa*.

gracilifolia, Nichols. Dict. Gard. ii. 107. — Reg. Argent.

gracilis, Herb. Amaryll. 172. t. 29. f. 1. — Peruv.

Grahamiana, Herb. l. c. 175. t. 29. f. 2 = *verecunda*.

grandiflora, Lindl. Bot. Reg. t. 902 = *carinata*.

Herbertiana, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1176 = *Cooperia Drummondii*.

lilacina, Liebm. Ind. Sem. Hort. Haun. (1844). — Cf. Linnaea, xviii. (1844) 509 = *verecunda*?

Lindleyana, Herb. Amaryll. 174. t. 35. f. 5. — Mexic.

longifolia, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 55. — Mexic.

lutea, Herb. App. [Bot. Reg.] 36 = *Hippeastrum chilense*.

macrosiphon, Baker, in Gard. Chron. (1881) II. 70. — Mexic.

mesochloa, Herb. in Bot. Reg. sub t. 1345; et t. 1361. — Reg. Argent.

minima, Herb. Amaryll. 172. t. 24. f. 3. — Bras.

minuta, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1176 = *Amaryllis minuta*.

nervosa, D. Dietr. l. c. = *verecunda*.

nervosa, Herb. Amaryll. 172 = *tubispatha*.

nervosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 114 = *Lindleyana*.

nivea, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1176 = *candida*.

pallida, M. Roem. Syn. Ens. 124 = *verecunda*.

pubida, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1176 = *Amaryllis Belladonna*.

pumila, M. Roem. Syn. Ens. 122. — Hab. ?

purpurea, Phil. in Linnaea, xxix. (1857–58) 65 = *Hippeastrum roseum*.

pusilla, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1176 = *Haylockia pusilla*.

rosea, Lindl. in Bot. Reg. t. 821. — Cuba.

sessilis, Herb. Amaryll. 175 = *verecunda*.

spofforthiana ×, Herb. in Bot. Reg. t. 1746.

striata, Herb. in Bot. Mag. t. 2593 = *verecunda*.

texana, Herb. l. c. sub t. 3482. — Texas.

Treatiae, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 300. — Florida.

tubispatha, Herb. App. [Bot. Reg.] 36. — Am. trop.

verecunda, Herb. in Bot. Mag. t. 2583. — Mexic.

versicolor, Nichols. Dict. Gard. ii. 107. — Uruguay.

ZERDANA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 84. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 80.

anchonioides, Boiss. l. c. — Persia.

ZERNA, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 296 = *Bromus*, Dill. et *Festuca*, Tourn. (Gramin.).

angustifolia, Bess. in Mém. Soc. Nat. Mosc. vi. (1823) 203 = *B. erectus*.

aspera, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 297 = *B. asper*.

bromoides, Panz. l. c. = *Festuca bromoides*.

distachyos, Panz. l. c. = *Brachypodium distachyum*.

erecta, Panz. l. c. = *B. erectus*.

gigantea, Panz. l. c. = *B. giganteus*.

ligustica, Panz. l. c. = *B. rubens*, scoparius, *Festuca clavata*.

macrostachys, Panz. l. c. = *B. macrostachys*.

madritensis, Panz. l. c. = *B. madritensis*.

Myuros, Panz. l. c. = *Festuca Myuros*.

sterilis, Panz. l. c. = *B. sterilis*.

tectorum, Panz. l. c. = *B. tectorum*.

ZERUMBET, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 329 = *Zingiber*, Adans. (Scitum.).

Zingiber, Lestib. l. c. = *Zingiber Zerumbet*.

ZERUMBET, Wendl. Sert. Hannov. fasc. iv. 3. t. 19 (1798) = *Alpinia*, Linn. (Scitam.). *speciosum*, Wendl. l. c. = *A. nutans*.

ZETOCAPNIA, Link & Otto, Ic. Pl. Rar. i. t. 18 (1828), sphalm. = COETOCAPNIA, Link & Otto = *Bravoa*, Lex. (Amaryll.). *geminiflora*, Link & Otto, l. c. = *B. geminiflora*.

ZEUGITES, P. Br. Hist. Jamaica. 341 (1756); Schreb. Gen. 810 (1791). GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1191.

DESPRETZIA, Kunth, Rév. Gram. ii. 485. t. 157 (1830).

GALEOTTIA, Rupr. ex Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 247.

KROMBHOLZIA, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 247.

SENITES, Adans. Fam. ii. 39 (1763).

americana, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 247 = mexicana.

americana, Willd. Sp. Pl. iv. 204. —Jamaic. colorata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 536, in obs. —Venezuela.

Galeottiana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 577. —Mexic.

Hartwegi, Fourn. ex Hemsl. l. c. —Guatemala. jamaicensis, Kausch. Nom. ed. III. 270 = americana.

latifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 577. —Mexic.

mexicana, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 798. —Mexic. Munroana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 577. —Guatemala.

ZEUXINE, Lindl. Orchid. Scel. 9 (1826) (Zeuxina); Reichb. Consp. 67 (1828). ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 599.

ADENOSTYLIS, Blume, Bijdr. 414 (1825).

HAPLOCHILUS, Endl. Ench. 113 (1841); Gen. Suppl. ii. 20 (1842).

MONOCHILUS, Wall. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 486 (1840).

PSYCHECHILUS, Breda, Orch. Kuhl. et Hass. [t. 9] (1827).

STRATEUMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 89 (1836).

TRIPLEURA, Lindl. in Wall. Cat. n. 7391 (1832); et Bot. Reg. sub t. 1618 (1833).

africana, Reichb. f. in Flora, l. (1867) 103. —Afr. trop. bracteata, Wight, Ic. t. 1724, bis. = sulcata.

brevifolia, Wight, Ic. t. 1725 = sulcata.

clandestina, Blume, Orch. Archip. Ind. 70. —Java. emarginata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 485 = sulcata.

flava, Trimen, Cat. Pl. Ceyl. 90. —Ind. or.; Malaya. Godefroyi, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 34. —Cambodia.

goodyeroides, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 486. —Reg. Himal.; Burma.

gracilis, Blume, Orch. Archip. Ind. 69. —Java. integerrima, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 486 = sulcata.

longilabris, Trimen, Cat. Pl. Ceyl. 90. —Ind. or. membranacea, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 486 = sulcata.

moniliformis, Griff. Notul. iii. 397 = Cheirostylis pusilla.

nervosa, Trimen, Cat. Pl. Ceyl. 90. —Reg. Himal. procumbens, Blume, Orch. Archip. Ind. 68 = sulcata.

purpurascens, Blume, l. c. 71. —Sumatra; Borneo. regia, Trimen, Cat. Pl. Ceyl. 90. —Zeylan.

robusta, Wight, Ic. t. 1726 = sulcata.

sulcata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 485. —Ind. or.; Malaya; China.

Tripleura, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 186 = sulcata.

ZEXMENIA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 13 (1824). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 373.

LASIANTHAEA, DC. Prod. v. 607 (1836).

LASIANTHUS, Zucc. ex DC. l. c. (1836).

TELESIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 41 (1836).

aurea, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 371, in nota sub Wedelia. —Mexic.

brevifolia, A. Gray, Pl. Wright. i. 112. —Mexic. caracasana, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 371, in nota sub Wedelia. —Venezuela.

ceanothifolia, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 305. —Mexic.

costaricensis, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 95. —Am. centr.

ZEXMENIA:—

crocea, A. Gray, Pl. Wright. i. 114. —Mexic. elegans, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373. —Hab.?

fasciculata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 172. —Mexic. Ghiesbreghtii, A. Gray, Pl. Wright. i. 113. —Mexic.

gnaphalioides, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 36. —Mexic.

goyazensis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373. —Bras. Grayi, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 305 = Verbesina Grayi.

Greggii, A. Gray, Pl. Wright. i. 113. —Mexic. helianthoides, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373. —Ecuador.

helianthoides, A. Gray, Pl. Wright. i. 113. —Mexic. hispida, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 10 = Wedelia hispida.

hispidula, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 458 = Blainvillea tampicana.

imbricata, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 306. —Mexic.

lantaniifolia, Sch. Bip. l. c. —Mexic. Lindenii, Sch. Bip. l. c. —Mexic.

longipes, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 95. —Costa Rica.

macrocephala, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373; Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 173. —Mexic.

microcephala, Hemsl. l. c. —Mexic. monocephala, Heynh. Nom. i. 863; ii. 772; Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 306. —Mexic.

nicaraguensis, C. Muell. in Walp. Ann. v. 226, sphalm. = costaricensis.

ovata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373. —Mexic. podocephala, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 286. —Arizona.

reticulata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373. —Cuba. rudis, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 188. —Bras.

salmoides, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 381 = Otopappus curviflorus.

Salvinii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 173. —Guatemala.

scaberrima, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373. —Guian. scandens, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 174. —Mexic.

Seemannii, A. Gray, Pl. Wright. i. 114. —Mexic. serrata, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 13. —Mexic.

stenantha, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 174. —Mexic.

strigosa, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 306. —Mexic.

tagetiflora, D. Don, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 309, nomen. —Mexic.

texana, A. Gray, Pl. Wright. i. 112 = Wedelia hispida. trachylepis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 175. —Mexic.

umbellata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 373 = ceanothifolia.

villosa, Polak, in Linnaea, xli. (1877) 579. —Costa Rica.

wedelioides, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 328. —Peruv.

zinniioides, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 175. —Mexic.

ZEYHERA, DC. in Bibl. Univ. Genève. xvii. (1838) 123; Prod. ix. 211 = Zeyheria, Mart. (Bignon.).

ZEYHERA, Less. Syn. Comp. 199 (1832) = ZEYHERIA, Spreng. f. = Geigeria, Griessel. (Compos.).

ZEYHERIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 65. t. 159 (1826). BIGNONIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1043.

barbata, Miq. in Flora, xxv. (1842) 430 = Tecoma barbata.

digitata, Miq. l. c. 431 = Tecoma Meyeriana. fluvialis, Miq. l. c. 428 = Tabebuia fluvialis.

montana, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 66. t. 159. —Bras. surinamensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 250. —Guian.

tuberculosa, Bur. ex Verlot, in Rev. Hort. (1868) 154 = montana.

Villosiana, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 201, in obs. = montana.

ZEYHERIA, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 26 (1828) = Geigeria, Griessel. (Compos.).

acaulis, Spreng. f. l. c. = G. africana.

ZICHIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 798 (1841), sphalm. = seq.

ZICHYA, Hueg. Bot. Archiv, t. 1 (1837) = *Kennedya*, Vent. (Legumin.).

angustifolia, Lindl. Bot. Reg. (1839) sub t. 52 = K. coccinea.

coccinea, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 123 = K. coccinea.

dilatata, Pritz. Ic. Ind. i. 1181 = K. coccinea.

glabrata, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 123 = K. glabrata.

glabrata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 92 = K. coccinea.

heterophylla, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 187 = K. coccinea.

inophylla, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 123 = K. coccinea.

Latrobeana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 94 = Glycine Latrobeana.

microphylla, W. Baxt, in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 659, nomen = K. microphylla?

Molly, Hueg. Bot. Archiv, t. 1 = K. coccinea. pannosa, Paxt. Mag. Bot. viii. (1841) 147 = K. coccinea.

sericea, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 123 = K. coccinea.

tricolor, Lindl. Bot. Reg. (1839) t. 52 = K. coccinea. villosa, Lindl. l. c. (1841) Misc. 41 = K. coccinea.

ZIEGERA, Rafin. Sylva Tellur. 94 (1838) = *Miconia*, Ruiz & Pav. (Melast.).

levigata, Rafin. l. c. = M. laevigata.

ZIERIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 216. RUTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 291.

arborescens, Sims, Bot. Mag. sub t. 1395 = Smithii. aspalathoides, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. i. 305. —Austral.

canescens, R. Br. ex Benth. l. c. = pilosa. commutata, Schult. Mant. iii. 324. —Austral.

cytisoides, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. n. 4. —Austral. Frankliniae, Millig. ex Kipp. in Proc. Linn. Soc. ii. (1852) 201 = Acradenia Frankliniae.

Fraseri, Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 339. —Austral.

furfuracea, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. i. 306. —Austral.

granulata, C. Moore, ex Benth. l. c. 307. —Austral. hirsuta, DC. Prod. i. 723 = pilosa.

involuta, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. i. 306. —Austral.

laevigata, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. n. 2. —Austral. lanceolata, R. Br. ex Sm. l. c. n. 1 = Smithii.

macrophylla, Bonpl. Desc. Pl. Rar. Malm. 64 = Smithii.

microphylla, Bonpl. l. c. —Austral. microphylla, Sieber, ex Schult. Mant. iii. 324 = commutata.

obcordata, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 330. —Austral.

octandra, Sweet, ex G. Don, Gen. Syst. i. 794. —Austral.

pauciflora, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. n. 3 = pilosa. pilosa, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 293. t. 17. f. 2. —Austral.

revoluta, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 330 = laevigata.

Smithii, Andr. Bot. Rep. t. 606. —Austral. trifoliata, Loisel. Herb. Amat. iii. t. 190 = Smithii.

veronica, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 11. —Austral.

ZIERIDIUM, Baill. Adansonia, x. (1872) 303. RUTACEAE.

gracile, Baill. l. c. 304. —N. Caled.

ZIERVOGLIA, Neck. Elem. i. 254 (1790) = *Cynanchum*, Linn. (Asclep.).

ZIETENIA, Gled. Syst. 185 (1764) = *Stachys*, Tourn. (Labi.).

lavandulifolia, Link, Enum. Hort. Brol. ii. 110 = S. lavandulaefolia.

orientalis, Gled. in Mém. Acad. Berl. (1766) 3 = S. lavandulaefolia.

ZIGADENUS, Michx. Fl. Bor. Am. i. 213. t. 22 (1803) = *Zygadenus*, Michx.

ZIGMALOBA, Rafn. *Sylva Tellur.* 120 (1838) = *Acacia*, Willd. (Legumin.).
sulcata, Rafn. l. c. = *A. sulcata*.

ZILLA, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 121 (1775). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 98.
Chamaerapistrum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 381 = *Physorhynchus brahuicus*.
macrocarpa, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 678 = *myagroides*.
macroptera, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 670.—Alger.
microcarpa, Vis. in Bibl. Ital. lxxxiii. (1836) 67 = *myagroides*.
myagroides, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 121.—Aegypt.; Arab.
schouwiooides, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 382 = *Physorhynchus brahuicus*.

ZINGIBER, Adans. Fam. ii. 66 (1763). *SCITAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 646.
CASSUMUNAR, Colla, Nov. Scit. Gen. Comm. Taur. 9 (1830).
DIETRICHIA, Giseke, Prael. Linn. 208 (1792).
DYMCZEWICZIA, Horan. Prod. Scitam. 26 (1862).
JAEGERA, Giseke, Prael. Linn. 203 (1792).
LAMPUJANG, Koen. in Retz. Obs. iii. 62 (1783).
THUMUNG, Koen. l. c. (1783).
ZERUMBET, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 329.
amaricans, *Noronha*, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 28; *Blume*, *Enum. Pl. Fav.* 43.—Java.
Anthorrhiza, Hort. Hafn. ex Horan, Prod. Scitam. 27 = *Z. Cassumunar*.
aquosum, *Noronha*, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 28; *Blume*, *Enum. Pl. Fav.* 43.—Java.
aromaticum, *Noronha*, l. c. = officinale.
barbatum, *Wall.* *Pl. As. Flor.* i. 46. t. 55.—Burma.
Blancoi, *Hassk.* in *As. Res.* xi. (1864) 20.—Ins. Philipp.
capitatum, *Roxb.* in *As. Res.* xi. (1810) 348.—As. trop.
Cassumunar, *Roxb.* l. c. 347.—As. trop.
cernuum, *Dalz.* in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 342.—Ind. or.
chrysanthum, *Rosc.* *Scitam.* t. 86.—Reg. Himal.
Clarkii, *King*, ex *Benth.* & *Hook. f.* *Gen.* iii. 646.—Reg. Himal.
Cliffordiae, *Andr.* *Bot. Rep.* ix. t. 555 = *Z. Cassumunar*.
coloratum, *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* (1879) II. 166.—Borneo.
confine, *Miq.* in *Journ. Bot. Néerl.* i. (1861) 94.—China.
corallinum, *Hance*, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 301.—China.
corynostachyum, *Steud.* *Nom.* ed. II. ii. 798 = *Amomum corynostachyum*.
cylindricum, *Aloon*, *Cat. Pl. Ceyl.* 1, nomen; *Thw.* *Enum. Pl. Zeyl.* 315.—Zeylan.
dubium, *Afzel.* *Remed. Guin.* ii. 9.—Afr. trop.
elatum, *Roxb.* *Hort. Beng.* 1; *Fl. Ind.* i. 57 = *capitatum*.
Ensal, *Gaertn.* *Fruct.* i. 35 = *Elettaria major*.
flavescens, *Link.* ex *A. Dietr.* *Sp. Pl.* i. 54 = *chrysanthum*?
Galanga, *Stokes.* *Bot. Mat. Med.* i. 72 = *Alpinia galanga*.
globosum, *Stokes*, l. c. = *Alpinia globosa*.
gracile, *Jack*, in *Malay. Misc.* i. (1820) n. i. 1.—Ins. Penang.
gramineum, *Noronha*, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 28; *Blume*, *Enum. Pl. Fav.* 45.—Java.
inflexum, *Blume*, l. c. 43.—Java.
insipidum, *Noronha*, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 28 = *Elettaria paludosa*.
integrilabrum, *Hance*, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 80.—China.
ligulatum, *Roxb.* in *As. Res.* xi. (1810) 348.—Ind. or.
ligulatum, *Wall.* *Cat. n.* 6566 = *chrysanthum*.
luridum, *Salisb.* in *Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 284 = *Z. Cassumunar*.
macrostachyum, *Dalz.* in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 342.—Ind. or.
marginatum, *Roxb.* in *As. Res.* xi. (1810) 349.—Reg. Himal.
medium, *Stokes.* *Bot. Mat. Med.* i. 72 = *Alpinia alba*.

ZINGIBER :—

Meleguetta, *Gaertn.* *Fruct.* i. 34. t. 12. f. 11 = *Amomum angustifolium*.
Mijooka, *Siebold*, in *Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 18 = *Z. Mioga*.
minus, *Gaertn.* l. c. 35 = *Amomum Cardamon*.
Mioga, *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 348.—Japan.
missionis, *Wall.* *Cat. n.* 6565 = officinale.
montanum, *Link.* ex *A. Dietr.* *Sp. Pl.* i. 52 = *Z. Cassumuna*.
nigrum, *Gaertn.* *Fruct.* i. 35 = *Alpinia Allughas*.
Nimmonii, *Dalz.* in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 341.—Ind. or.
odoriferum, *Blume*, *Enum. Pl. Fav.* 44.—Java.
officinale, *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 348.—Trop. cult.
ovoideum, *Blume*, *Enum. Pl. Fav.* 43.—Java.
panduratum, *Roxb.* *Hort. Beng.* 1; *Fl. Ind.* i. 55.—Burma.
pardocheillum, *Wall.* ex *Voigt*, *Hort. Suburb. Calc.* 562, nomen.—Burma.
Parishii, *Hook. f.* *Bot. Mag.* t. 6019.—Burma.
purpureum, *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 348 = *Z. Cassumunar*.
Railleti, *T. Durand*, in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 401.—Hab.?
ramosum, *Noronha*, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 28 = *Alpinia Pinanga*.
roseum, *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 348.—Ind. or.
rubens, *Roxb.* in *As. Res.* xi. (1810) 348.—Ind. or.
Sjooka, *Siebold*, in *Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 18.—Japan.
spectabile, *Griff.* *Notul.* iii. 413.—Malaya.
spurium, *Koen.* in *Retz.* *Obs.* iii. 60 = *Z. Zerumbet*.
squarrosus, *Roxb.* in *As. Res.* xi. (1810) 348.—Burma.
squarrosus, *Wight*, *l. c.* 2004 = *Wightianum*.
sylvestre, *Gaertn.* *Fruct.* i. 34 = *Alpinia alba*.
truncatum, *Stokes.* *Bot. Mat. Med.* i. 68 = *Z. Zerumbet*.
uncinatum, *Stokes*, l. c. 73 = *Renealmia racemosa*.
Wightianum, *Thw.* *Enum. Pl. Zeyl.* 315.—Ind. or.
xanthorrhizon, *Hort.* *Hafn.* ex *Steud.* *Nom.* ed. II. ii. 799 = *Z. Cassumunar*.
Zerumbet, *Rosc.* ex *Sm.* *Exot. Bot.* ii. 105, t. 112; *et in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 348.—As. trop.

ZINNIA, Linn. Syst. ed. X. 1221 (1759). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 357.
CRASSINA, Scep. in Sched. Acid. Veget. 42 (1758).
DIPLOTHRIX, DC. Prod. v. 611 (1836).
LEJICA, DC. Prod. v. 534, in syn. (1836).
LEPIA, Hill, Veg. Syst. ii. 97 (1761).
SANVITALIOPSIS, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 357 (1873).
acerosa, *A. Gray*, *Pl. Wright.* i. 105, 106.—Texas; Mexic.
ambigua, *Hort.* *Berol.* ex *Salm-Dyck*, *Hort.* *Dyck.* (1834) 293 (Quid ?)—Hab.?
angustifolia, *H. B. & K.* *Nov. Gen. et Sp.* iv. 251.—Mexic.
anomala, *A. Gray*, *Pl. Wright.* i. 106.—Texas.
aurea, *Hort.* ex *Vilm.* *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 971 = *Haageana*?
bicolor, *Hemsl.* *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 153.—Mexic.
bicuspidis, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. v. 535 = *Tragoceros zinnoides*.
bidens, *Retz.* *Obs.* v. 28 = *Glossocardia linearifolia*.
Darwinii, *Haage & Schmidt*.—Cf. *Gard. Chron.* (1875) II. 782 = *Glossogyne pinnatifida*.
discolor, *Hort.* *Hal.* ex *Heynh.* *Nom.* i. 864, nomen (Quid ?)—Hab.?
elegans, *Jacq. Coll.* iii. 152.—Mexic.
florida, *Salisb.* *Prod.* 205 = *pauciflora*.
floridana, *Rafin.* *New Fl. Am.* iv. 70 (Quid ?)—Am. bor.
fulva, *Schrank*, in *Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* i. (1815) 146 = *pauciflora*.
Ghiesbreghtii, *Verlot*, in *Rev. Hort.* (1862) 368.—Mexic.
grandiflora, *Hort.* ex DC. Prod. v. 536 = *hybrida*.
grandiflora, *Nutt.* in *Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 348.—Am. bor. occ.
Haageana, *Regel.* *Gartenfl.* x. (1861) 355.—Am. trop.
hybrida, *Hort.* *Par.* ex *Poir.* *Encyc.* viii. 862 = *verticillata*.

ZINNIA :—

hybrida, *Roem. & Usteri*, *Mag. Bot.* i. ltes St. (1787) 49; *Sims*, *Bot. Mag.* t. 2123.—Am. austr.
intermedia, *Engelm.* in *Wisliz.* *Tour N. Mexic.* 107 = *pauciflora*.
juniperifolia, *A. Gray*, *Pl. Wright.* i. 105.—Mexic.
leptopoda, DC. Prod. v. 535 = *pauciflora*.
linearifolia, *Moench*, *Meth. Suppl.* 261 = *pauciflora*.
linearis, *Benth.* *Pl. Hartw.* 17.—Mexic.
lutea, *Gaertn.* *Fruct.* ii. 459, t. 172 = *pauciflora*.
maritima, *H. B. & K.* *Nov. Gen. et Sp.* iv. 251.—Mexic.
mendocina, *Phil. Sert. Mendoc. Alt.* 27.—Chili.
mexicana, *Hort.* ex *Vilm.* *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 971 = *Haageana*?
multiflora, *Linn.* *Sp. Pl.* ed. II. 1239 = *pauciflora*.
pauciflora, *Linn.* l. c.—Am. bor. et austr.
peruviana, *Linn.* *Syst.* ed. X. 1221 = *pauciflora*.
pumila, *A. Gray*, in *Mem. Am. Acad. N. S.* iv. (1849) 81.—Am. bor. occ.
revoluta, *Cav.* *l. c.* 26 = *pauciflora*.
Roerii, *Hort.*—Cf. *Gard. Chron.* (1872) 1392.—Mexic.
tenuiflora, *Jacq.* *l. c.* *Pl. Rar.* iii. 15. t. 590 = *pauciflora*.
verticillata, *Andr.* *Bot. Rep.* iii. t. 189.—Mexic.
verticillata, *Cav.* *Desc.* 209 = *pauciflora*.
violacea, *Cav.* *l. c.* i. 57 = *elegans*.

ZINOWIEWIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) 1. 275. *CELASTRINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 364.
integerrima, *Turcz.* l. c. 276.—Mexic.

ZIPANIA, Pers. Syn. ii. 140 (1807), sphalm. = **ZAPANIA**, Scop. = **Lippia**, Linn. (Verben.).

ZIPPELIA, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1614 (1830). *PIPERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 128.
begoniaefolia, *Blume*, l. c. 1651.—Java.
lappacea, *Benn.* *Pl. Jav. Rar.* 76 = *begoniaefolia*.

ZIPPELIA, Reichb. ex Endl. Gen. Suppl. ii. 6 (1842) = **Brugmansia**, Blume (Cytinac.).

ZIZANIA, Gronov. ex Linn. Gen. ed. II. 455 (1742). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1115.
ELYMUS, Mitchell, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 210.
FARTIS, Adans. Fam. ii. 37 (1763).
HYDROPYRUM, Link. Hort. Berol. i. 252 (1827).
MELINUM, Link. Handb. i. 96 (1829).
ZIZANIOPSIS, Doell & Aschers. in Mart. Fl. Bras. ii. 12. t. 3 (1871).
aquatica, *Linn.* *Sp. Pl.* 991.—Am. bor.
aristata, *Kunth*, *Rév. Gram.* i. 8 = *Hygroryza aristata*.
bonariensis, *Balansa & Poitrass.* in *Bull. Soc. Hist. Nat. Toul.* xii. (1878) 228.—Reg. Argent.
ciliata, *Spreng.* *Syst.* ii. 136 (Quid ?) = *Leersia hexandra*.
clavulosa, *Michx.* *Fl. Bor. Am.* i. 75 = *aquatica*.
dahurica, *Turcz.* ex *Steud.* *Syn. Pl. Gram.* 4.—*Dahuria*.
effusa, *Herb.* *Linn.* ex *Munro*, in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 52 = *aquatica*.
fluitans, *Michx.* *Fl. Bor. Am.* i. 75 = *Hydrochloa carolinensis*.
latifolia, *Turcz.* in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 105; xxix. (1856) 1. 2 = *aquatica*.
lenticularis, *Michx.* ex *Steud.* *Nom.* ed. I. 898, nomen (Quid ?)—Am. bor.
microstachya, *Nees*, ex *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. v. Sc. Nat. ii. (1839) 183 = *miliacea*.
miliacea, *Michx.* *Fl. Bor. Am.* i. 74.—Am. bor.; Ind. occ.
natans, *Bosc.* ex *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. v. Sc. Nat. ii. (1839) 186 = *Hydrochloa carolinensis*?
nutans, *Steud.* *Nom.* ed. II. ii. 799, sphalm. = *præc.*
palustris, *Linn.* *Mant.* ii. 295 = *aquatica*.
Retzii, *Spreng.* *Syst.* ii. 136 = *aristata*.
subtilis, *Rasp.* in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* v. (1825) 452 = *Coleanthus subtilis*.
terrestris, *Linn.* *Sp. Pl.* 991 (Quid ? al. ord.?).—Ind. or.

ZIZANIOPSIS, Doell & Aschers. in Mart. Fl. Bras. ii. 12. t. 3 (1871) = **Zizania**, Gronov. (Gramin.).
microstachya, *Doell & Aschers.* l. c. 13 = *Zizania miliacea*.

ZIZIA, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. 1. (1824) 128 = *Carum*, Rupp. (Umbell.).
aurea, Koch, l. c. 129 = *Thaspium aureum*.
cordata, Koch, ex DC. Prod. iv. 100 = *Thaspium trifoliatum*.
integerrima, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 493 = *Pimpinella integerrima*.
parvifolia, Rafin. New Fl. Am. iv. 31 = *Thaspium trifoliatum*.
pinnatifida, Buckl. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 175 = *Thaspium Walteri*.

ZIZIPHORA, Linn. Hort. Cliff. 305 (1737). *LA-BIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1198.
FALDERMANNIA, Trautv. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. vi. (1840) 185.

HEDYOSMOS, Mitchell, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 211.

acinoides, Linn. Sp. Pl. 22.—Hispan.
acinoides, Pall. Reise, iii. 362 = *clinopodioides*.
acutifolia, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 43.—Syria.
alpina, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *capitata*.
bracteolata, Schult. Mant. i. 179 = *Micromeria bracteolata*.

Brantii, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 294 = *clinopodioides*.

canescens, Benth. Lab. Gen. et Sp. 321 = *clinopodioides*.
capitata, Falk, Beitr. ii. 98 = *clinopodioides*.

capitata, Linn. Sp. Pl. 21.—Reg. Mediterr.; Oriens.
cleonoides, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 14.—As. Min.
clinopodioides, Lam. Illustr. i. 63; Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 17.—As. Min.; Persia; Sibir.

compacta, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 336 = *capitata*.

Cunila, Desf. Tabl. ed. I. 55 = *clinopodioides*.
dasyantha, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 18 = *clinopodioides*.

fasciculata, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 586 = *clinopodioides*.

glabella, Roem. & Schult. Syst. i. 209 = *Calamintha glabella*.

glomerata, Frivald. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 370 = *capitata*.

Gundelsheimeri, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 293 = *clinopodioides*.

hispanica, Linn. Cent. Pl. i. 3; Amoen. Acad. iv. 262.—Reg. Mediterr.

hispida, Schult. Mant. i. 179 = *Hedeoma hispida*.
javanica, Blume, Bijdr. 822.—Java.

lanceolata, Boiss. Fl. Orient. iv. 588 = *taurica*.
Mariana, Roem. & Schult. Syst. i. 208 = *Cunila Mariana*.

media, Link, Enum. Hort. Berol. i. 17 = *clinopodioides*.
Mussini, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. (1805) 43 = *clinopodioides*.

nummularia, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33 = *clinopodioides*.

odoratissima, Lodd. ex Schult. Mant. i. 178 = *clinopodioides*.

persica, Bunge, Lab. Pers. 39 = *tenuior*.

pulegioides, Desf. Tabl. ed. I. 55, nomen; ed. II. 66 = *Hedeoma pulegioides*.

pungens, Bunge, ex Ledeb. Fl. Atl. i. 23 = *Nepeta pungens*.

Puschkini, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. (1805) 42 = *clinopodioides*.

serpyllacea, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 18 = *clinopodioides*.

serpyllacea, Tenore, Syll. Fl. Neap. 16 = *tenuior*.
siliquosa, Lour. Fl. Cochinch. 27 = *Justicia diffusa*?

spicata, Cav. Desc. 20 = *hispanica*.
spicata, Lag. & Rodr. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 259 = *tenuior*.

taurica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 414; iii. 21.—As. Min.; Persia.

taurica, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 294 = *tenuior*.

tenuior, Falk, Beitr. ii. 98 = *clinopodioides*.
tenuior, Linn. Sp. Pl. 21.—As. occ.

thymifolia, Salisb. Prod. 72 = *acinoides*.
thymoides, Roem. & Schult. Syst. i. 209 = *Thymus Serpyllum*.

verticillata, Steud. Nom. ed. I. 899 = *Cunila verticillata*.

ZIZYPHUS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I. (1735) = *Zizyphus*, Tourn. (Rhamn.).

ZIZYPHON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 70, 137 = *Zizyphus*, Tourn. (Rhamn.).
jujubum, St. Lag. l. c. = *Zizyphus Jujuba*.

ZIZYPHORA, Dum. Anal. Fam. 22 (1829), sphalm. = *Ziziphora*, Linn. (Labiata).

ZIZYPHUS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735) (*Zizyphus*); Adans. Fam. ii. 304 (1763). *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. i. 375.

DECORIMA, Rafin. Sylva Tellur. 31 (1838).
JUJUBA, Burm. Thes. Zeyl. 131. t. 61 (1737).

MANSANA, J. F. Gmel. Syst. 580 (1791).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 136 = *Z. Jujuba*.

acuminata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 78.—Mexic.
acuminata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 168, nomen = *oxyphylla*.

adelensis, Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choï, 341.—Afr. trop.

africana, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *Z. Spina-Christi*.

agrestis, Roem. & Schult. Syst. v. 341.—China.
albans, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 607 = *Z. Oenoplia*.

angulata, Lam. Encyc. iii. 320.—Hab.?

apetala, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 635.—Reg. Himal.
Aubletii, D. Dietr. Syn. Pl. i. 810 = *Paliurus ramosissimus*.

Aucherii, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 5.—Persia.
Baclei, DC. Prod. ii. 20 = *mucronata*.

Baenchia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4249 (Quid?).
 —Ind. or.

Bhunder, Royle, Illustr. Bot. Himal. 168, nomen = *horrida*?

bubalina, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. v. 334 = *mucronata*.

Buraea, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4240 G = *rugosa*.

Burmammiana, D. Dietr. Syn. Pl. i. 810 = *Berchemia Burmanniana*.

calophylla, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 366.—Malaya.

capensis, Thunb. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 193 = *Scutia Commersonii*.

Caracutta, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 612 = *Z. Xylopyrus*.

celtidifolia, DC. Prod. ii. 20 = *Z. Oenoplia*.
chinensis, Spreng. Syst. i. 770 = *sativa*.

Cinnamomum, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 380.—N. Granat.

commutata, Roem. & Schult. Syst. v. 336 = *Celtis aculeata*.

cotinifolia, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. 1. 87.—Bras.
cuneata, Wall. Cat. n. 7268 = *Z. Xylopyrus*.

Dalanta, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 121.—Ins. Philipp.
domingensis, Duham. Arb. ed. Nov. iii. 56 = *Ceanothus reclinatus*.

elegans, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 366.—Singapore.

elliptica, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 610 = *Z. Xylopyrus*.

emarginata, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1954 = *Scutia ferrea*.
exserta, DC. Prod. ii. 21.—Ins. Philipp.

ferruginea, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4246 B, partim = *Z. Oenoplia*.

flavescens, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 367 = *Berchemia flavescens*.

flexuosa, Wall. l. c. 365 = *sativa*.

floribunda, Wall. l. c. 368 = *Berchemia floribunda*.
funiculosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4234.—Ind. or.; Malaya.

Gardenii, Steud. Nom. ed. II. ii. 800, sphalm. = seq.

Gardneri, Reiss. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 30 = *Z. Joazeiro*.

glabra, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 614 = *rugosa*.

glabrata, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 159.—Ind. or.
Glaziovii, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1880) 373.—Bras.

globularis, Wall. Cat. n. 4248.—Burma.
guatemalensis, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 6.—Guatemala.

hamosa, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 369 = *Sageretia hamosa*.

havanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 57 = *Sarcophallus havanensis*.

ZIZYPHUS:—

helvola, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 476.—Afr. austr.

heterogenea, Poir. Encyc. Suppl. iii. 193 = *Z. Spina-Christi*.

heterogenea, Russ. ex Wall. Cat. sub n. 4239 = *Z. Xylopyrus*.

heteroneura, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 3.—Panama.

horrida, Roth, Nov. Pl. Sp. 159.—Ind. or.
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 643 = *rugosa*.

Iguanea, Lam. Encyc. iii. 318 = *Celtis aculeata*.
illucida, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 587, sphalm. = *lucida*.

incurva, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 614.—Ind. or.

insularis, C. Sm. in Tuckey, Congo, 250, nomen.—Ins. Cap. Verd.

javanensis, Blume, Bijdr. 1142.—Java.
Joazeiro, Mart. Reise Bras. ii. 581.—Bras.

Jujuba, Lam. Encyc. iii. 318.—Ind. or.; Malaya.
latifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 121 = *Z. Oenoplia*.

latifolia, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 607 = *rugosa*.

lineata, Willd. Sp. Pl. i. 1102 = *Berchemia lineata*.
 Linnaei, M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 635.—Zeylan.

lotoidea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 137 = *Z. Lotus*.

Lotus, Aitch. Cat. Pl. Punjab. 33 = *rotundifolia*.
Lotus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 121 = *Z. Oenoplia*.

Lotus, Lam. Encyc. iii. 317.—Reg. Mediterr.
Loureiriana, D. Dietr. Syn. Pl. i. 811 = *Berchemia Loureiriana*.

lucida, Moench, Meth. Suppl. 101 = *Rhamnus prino-*
ides.

lucida, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 17, nomen; Thw. Enum. Pl. Zeyl. 74.—Zeylan.

lycioides, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 168.—Am. bor.; Mexic.

mauritaniana, Lam. Encyc. iii. 319 = *Z. Jujuba*.
melanogona, Boj. Hort. Maurit. 69 = *Z. Jujuba*?

melastomoides, A. Cunn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 800, nomen (*Celtidis* sp.).—Austral.

microphylla, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 613 = *rotundifolia*.

mirtoides, Ortega, Hort. Matr. Dec. 119 = *Condalia microphylla*.

mirzaporiensis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 168, nomen (Quid?).—Reg. Himal.

Mistol, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 99.—Reg. Argent.

mitis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 137 = *mucronata*.

mucronata, Willd. Enum. Hort. Berol. 251.—Afr. trop. et austr.

myrtoides, Auct. = *mirtoides*.
Nabeca, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 200 sphalm. = seq.

Napeca, Lam. Encyc. iii. 320 = *Z. Spina-Christi*.
Napeca, Linn. Herb. ex M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 635 = Linnaei.

Napeca, Roxb. Fl. Ind. i. 612 = *Z. Oenoplia*.
Napeca, Willd. Sp. Pl. i. 1104.—Zeylan.?

Nats'me, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 48 = *sativa*.

nitida, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 609 = *sativa*.

nummularia, DC. Prod. ii. 21, in syn.; Wight & Arn. Prod. 162 = *rotundifolia*.

obliqua, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 160 = *rugosa*.
obtusifolia, A. Gray, Gen. Illustr. ii. 170.—Texas.

Oenoplia, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3.—As. et Austral. trop.

officinatum, Medic. Bot. Beobacht. (1782) 333 = *sativa*.

oppositifolia, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 370 = *Sageretia oppositifolia*.

orbicularis, Roem. & Schult. Syst. v. 338 = *Z. Xylopyrus*.

ornata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 642.—Ins. Banca.
orthacantha, DC. Prod. ii. 21 = *Z. Jujuba*.

oxycarpa, DC. l. c.—Malaya.
oxyphylla, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 43.—Reg. Himal.

Paliurus, Willd. Berl. Baumz. 415; Host, Fl. Austr. i. 306 = *Paliurus Spina-Christi* (cf. Addend.).

pallens, Wall. Cat. n. 4247 = *Z. Oenoplia*.

ZIZYPHUS—

- paniculata*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 190 = incurva.
paniculata, Roth, Nov. Pl. Sp. 161 = rugosa.
Parryi, Torr. Bot. Mex. Bound. 46.—Calif.
parvifolia, Delile, Cent. Pl. Méroé, 89.—Aegypt.
pedicellata, Wall. Cat. n. 4243 = *Z. Oenoplia*.
peruviana, Lam. Encyc. iii. 320 = *Maytenus octogona*.
platyphylla, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 87.—Bras.
Poiretiana, D. Dietr. Syn. Pl. i. 811 = *Berchemia racemosa*.
Poiretii, G. Don, Gen. Syst. ii. 26.—Ins. S. Doming.
podaveroideis, Fenzl, in Enum. Pl. Hueg. 20 = *Alphitonia excelsa*.
pubiflora, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 479.—Ins. Timor.
quadrilocularis, F. Muell. Fragm. iii. 57.—Austral.
racemosa, Wall. Cat. n. 7878 D = *Bridelia stipularis*.
ramosissima, Spreng. Syst. i. 771 = *Paliurus ramosissimus*.
reticulata, DC. Prod. ii. 20.—Am. austr.
Rignonii, Delpon, in Mem. Acc. Tor. xiv. (1854) 404.—Hab. ?
rotundata, DC. Prod. ii. 21 = *Z. Jujuba*.
rotundifolia, Lam. Encyc. iii. 319.—Persia; Ind. or.
rotundifolia, Roth, Nov. Pl. Sp. 160 = *Z. Xylopyrus*.
Roxburghiana, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 146 = *rugosa*.
rufa, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 65 = *Rhamnus ruffa* ?
rufula, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 643 = *Z. Oenoplia*.
rugosa, Lam. Encyc. iii. 319.—Ind. or.; Burma.
ruminata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4236 = *Z. Xylopyrus*.
sativa, Gaertn. Fruct. i. 202.—Reg. Mediterr.; As. temp.
scandens, Roxb. Hort. Beng. 17; et in Wall. Cat. n. 7269 = *Z. Oenoplia*.
sinensis, Lam. Encyc. iii. 317 = *sativa*.
soporifera, Roem. & Schult. Syst. v. 340 = *sativa*.
Sororia, Roem. & Schult. l. c. 337 = *Z. Jujuba*.
sphaerocarpa, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 119.—Ins. Mascari.
Spina-Christi, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 795 = *Paliurus aculeatus*.
Spina-Christi, Willd. Sp. Pl. i. 1105.—Afr. bor.; Oriens.
spinosa, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 70 = *præc.*
strychnifolia, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 380.—N. Granat.
subquinenervia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 330.—Sumatra.
sylvestris, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Z. Lotus*.
thyrsiflora, Benth. Bot. Voy. Sulph. 78.—Ecuador.
timoriensis, DC. Prod. ii. 20.—Ins. Timor.
tomentosa, Poir. Encyc. Suppl. iii. 192 = *Poiretii*.
tomentosa, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 611 = *rugosa*.
trinervia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 192 = *exserta*.
trinervia, Roth, Nov. Pl. Sp. 168 = *Z. Jujuba*.
trinervia, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 606 = *glabrata*.
tripartita, Roem. & Schult. Syst. v. 342 = *Rhus albida*.
umbellata, Poir. Encyc. Suppl. iii. 193 = *Karwinskia Humboldtiana*.
undulata, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 88.—Bras.
venulosa, Wall. Cat. n. 4235 = *funiculosa*.
virgata, D. Dietr. Syn. Pl. i. 810 = *incurva*.
volubilis, Willd. Berl. Baumz. 415 = *Berchemia volubilis*.
vulgaris, Lam. Encyc. iii. 316 = *sativa*.
wynadensis, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 42.—Ind. or.
Xylopyrus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 136 = *Z. Jujuba*.
Xylopyrus, Willd. Sp. Pl. i. 1104.—Ind. or.
Zeyheriana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 476.—Afr. austr.
zonulatus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 120 = *Z. Xylopyrus*.

ZIZZIA, Roth, Man. Bot. ii. 896 (1830) (Crucif.).
pyrenaica, Roth, l. c. = *Draba pyrenaica*.
tortuosa, Roth, l. c. 897 = *Alyssum tortuosum*.

ZODUBA, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 30 (1825) = *Calanthe*, R. Br. (Orchid.).
Masuca, Buch.-Ham. l. c. = *C. Masuca*.

ZOËGEA, Linn. Mant. i. 15 (1767). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 477.
aleppica, Jacq. Coll. i. 89.—Hab. ?
aristata, DC. Prod. vi. 562 = *purpurea*.
capensis, Linn. f. Suppl. 382 = *Relhania pedunculata*.
crinita, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 63.—Persia; Afghan.
deluensis, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 698 = *crinita*.
Leptaurea, Linn. Mant. i. 117.—Syria; Mesopot.
mianensis, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 697.—Persia.
purpurea, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1833) 86. t. 5.—Persia; Afghan.; Arab.

ZOLLERNIA, Maximil. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. ii. (1827) praef. p. xiii. t. C, D. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 560.

COQUEBERTIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1833) 111.
discolor, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 166 = *falcata*.
falcata, Maximil. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. ii. (1827) praef. p. xvi.—Bras.
Houlletiana, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 190 = *ilicifolia*.
ilicifolia, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 166.—Bras.
latifolia, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. ii. 9.—Bras.
securidacifolia, Benth. l. c.—Bras.
splendens, Maximil. & Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. ii. (1827) praef. p. xv.—Bras.
Vogelii, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 192 = *ilicifolia*.

ZOLLIKOFERIA, DC. Prod. vii. 183 (1838) = *Launaea*, Cass. (Compos.).
acanthodes, Boiss. Fl. Orient. iii. 827.—Persia.
angustifolia, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 254 = *arabica*.
arabica, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 12.—Afr. bor.
Candolleana, Coss. ex Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 8 = *L. chondrilloides*.
Cassiniana, Boiss. Fl. Orient. iii. 822.—Aegypt.; Arab.
chondrilloides, DC. Prod. vii. 183 = *L. chondrilloides*.
fallax, Boiss. Fl. Orient. iii. 824.—Aegypt.; Persia; Afghan.
glomerata, Boiss. l. c. 826 = *L. glomerata*.
leucodon, Fisch. & Mey. ex Boiss. l. c. 824 = *fallax*.
longiloba, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 70 = *resedifolia*.
massavensis, Boiss. Fl. Orient. iii. 825.—Afr. bor.; Arab.
mucronata, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 12 = *L. chondrilloides*.
nudicaulis, Boiss. Fl. Orient. iii. 824 = *L. nudicaulis*.
polyclada, Boiss. l. c. 827.—Persia; Beluchist.
prenanthoides, Hochst. ex Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 459 = *Sonchus prenanthoides*.
pumila, DC. Prod. vii. 183.—Hispan.; Arab.
quercifolia, Coss. & Kral. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 369 = *Sonchus quercifolius*.
resedifolia, Coss. Notes Crit. 120 = *Sonchus chondrilloides*.
spinosa, Boiss. Fl. Orient. iii. 826 = *L. spinosa*.
stenocephala, Boiss. l. c. 823.—Beluchist.
Stockiana, Boiss. l. c. 825.—Beluchist.
tenuiloba, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 50.—Syria; Arab.

ZOLLIKOFERIA, Nees, in Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 305 (1825) = *Chondrilla*, (Compos.).
hieracioides, Nees, l. c. = *C. Peltidium*.
Peltidium, Gaud. Fl. Helvet. v. 143 = *C. Peltidium*.

ZOLLINGERIA, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 303. *SAPINDACEAE*.
macrocarpa, Kurz, l. c.—Burma.
macrocarpa, F. Villar, in Blanco, Fl. Filip. ed. III. Nov. App. 53 = *Tristira triptera*.
triptera, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 309 = *Tristira triptera*.

ZOLLINGERIA, Sch. Bip. in Flora, xxxvii. (1854) 273 = *Rhychospermum*, Reinw. (Compos.).
scandens, Sch. Bip. l. c. 275 = *R. verticillatum*.

ZOMICARPA, Schott, Syn. Aroid. 33 (1856).
AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 970.
Pythonium, Schott, l. c.—Bras.
Riedelianum, Schott, Gen. Aroid. t. 23. f. 18, 34.—Bras.
Steigeriana, Ferd. Maxim. ex Schott, in Bonplandia, x. (1862) 86.—Bras.

ZOMICARPELLA, N. E. Br. in Gard. Chron. (1881) ii. 266. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 970.
maculata, N. E. Br. l. c.—N. Granat.

ZONABLEPHIS, Rafin. Sylva Tellur. 143 (1838) = *Acanthus*, Tourn.
polistachys, Rafin. l. c. 144 = *A. polystachyus*.

ZONANTHUS, Griseb. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 145. *GENTIANAEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 813.
cubensis, Griseb. l. c.—Cuba.

ZONARIA, Steud. Nom. ed. II. i. 101 (1840), sphalm. = *Zornia*, J. F. Gmel. (Legumin.).

ZOOPHORA, Bernh. Syst. Verz. Erf. 308 (1800) = *Orehis*, Tourn.
atropurpurea, Bernh. l. c. 311 = *O. militaris*.
rubella, Bernh. l. c. = *O. militaris*.

ZOOPHTHALMUM, P. Br. Hist. Jamaica. 295. t. 31 (1756) = *Mucuna*, Adans. (1763) (Legumin.).

ZORNIA, J. F. Gmel. Syst. 1076, 1096 (1791). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 518.

MYRIADENUS, Desv. Journ. Bot. iii. (1813) 121. t. 4.
andicola, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 106.—Reg. Argent.
angustifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. n. 1 = *diphylla*.
barbata, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 325.—Peruv.
biarticulata, G. Don, Gen. Syst. ii. 280 = *diphylla*.
brachycarpa, Walp. Rep. i. 726, sphalm. = *trachycarpa*.
bracteata, J. F. Gmel. Syst. 1096.—Am. bor.; Afr. austr.
brasiliensis, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 62.—Bras.
capensis, Pers. Syn. ii. 318 = *bracteata*.
ceylanica, Heynh. Nom. i. 865 = *diphylla*.
chaetophora, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 56 = *diphylla*.
conjugata, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. n. 3 = *diphylla*.
diphylla, Pers. Syn. ii. 318.—Cosmop. trop.
disperma, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5663 = *Geissaspis cristata*.
dyctiocarpa, DC. Prod. ii. 317 = *diphylla*.
echinocarpa, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 85.—Bras.
elegans, Pers. Syn. ii. 318 = *Desmodium elegans*.
flemmingioides, Moric. Pl. Nouv. Am. 127. t. 76.—Bras.
Gardneriana, Moric. l. c. 129. t. 77.—Bras.
gemella, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 61 = *diphylla*.
gibbosa, Span. l. c. xv. (1841) 192 = *diphylla*.
glabella, Span. l. c. = *diphylla*.
glabra, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 325.—Bras.
glauca, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 228 = *Phylacium bracteosum*.
glochidiata, Reichb. ex DC. Prod. ii. 316 = *diphylla*.
gracilis, DC. l. c. 316 = *diphylla*.
graminea, Span. in Linnaea, xv. (1841) 192 = *diphylla*.
havanensis, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 423.—Cuba.
heterophylla, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. n. 5 = *bracteata*.
inermis, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 325.—Hab. ?
laevis, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 582 = *diphylla*.
latifolia, DC. Prod. ii. 317 = *diphylla*.
linearis, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 122 = *bracteata*.
lutescens, Steud. Nom. ed. I. 900 = *Desmodium lutescens*.
maranhamensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 280.—Bras.
microphylla, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 325 = *diphylla*.
myriadena, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 85.—Bras.
nuda, Vog. in Linnaea, x. (1836) 587 = *diphylla*.

ZORNIA :—

- ovata*, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 58 = diphylla.
perforata, Vog. l. c. 59 = diphylla.
pubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 515 = diphylla.
pulchella, Pers. Syn. ii. 318 = *Desmodium pulchellum*.
reticulata, Sm. in Rees, Cycl. xxxix. n. 2 = diphylla.
sericea, Moric. Pl. Nouv. Am. 126. t. 75 = diphylla.
 Sloanei, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 709. —Cuba.
strobilifera, Pers. Syn. ii. 319 = *Flemingia strobilifera*.
surinamensis, Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xi. (1843) 14 = diphylla.
tenuifolia, Moric. Pl. Nouv. Am. 132. t. 79. —Bras.
tetraphylla, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 76. t. 41 = bracteata.
thymifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 514 = diphylla.
trachycarpa, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 60 = diphylla.
venusta, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 801, nomen (Quid ?). —Ind. or.
virgata, Moric. Pl. Nouv. Am. 131. t. 78. —Bras.
Walkeri, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 330 = diphylla.
zeylonensis, Pers. Syn. ii. 318 = diphylla.

- ZORNIA**, Moench, Meth. 410 (1794) = **Lallemantia**, Fisch. (Legumin.).
canescens, Moench, l. c. 411 = *L. canescens*.
linearifolia, Moench, Meth. Suppl. 139 = *Dracocephalum Ruyschiana*.
nutans, Moench, Meth. 411 = *Dracocephalum nutans*.
partita, Moench, Meth. Suppl. 139 = *Dracocephalum austriacum*.
parviflora, Moench, Meth. 411 = *Dracocephalum thymiflorum*.
peltata, Moench, l. c. = *L. peltata*.

- ZOROXUS**, Rafin. New Fl. Am. iv. 88 (1836) = **Polygala**, Tourn.

- ZOSIMA**, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 145. t. 4 (1814).
UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 924.
absinthifolia, Link, Enum. Hort. Berol. i. 274 (*apsinthifolia*); DC. Prod. iv. 195 = *orientalis*.
anethifolia, DC. l. c. 196 = *Ducrosia anethifolia*.
dichotoma, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 63. —Persia.
frigida, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 1038. —Persia.
humilis, Fenzl, ex Boiss. l. c. 1062 (= *Pastinaca zozimoides*). —Cilicia.
lasiocarpa, Boiss. l. c. 1038. —Afghan.
Nuttallii, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 973 = *Polytaenia Nuttallii*.
orientalis, Hoffm. Gen. Umbell. ed. I. 148. t. 4. —As. occ.
radians, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 43 = *orientalis*.
tragoides, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 341. —Persia.

- ZOSIMA**, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 29 (1871) = **Philibertia**, H. B. & K. (Asclep.).
violacea, Phil. l. c. = *P. solanoides*.

- ZOSIMIA**, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 229 (1819) = **Zosima**, Hoffm. (Umbellif.).

- ZOSTER**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 159 = seq.

- ZOSTERA**, Linn. Diss. Dass. 27 (1747); Amoen. Acad. i. 411 (1749). **NAIADACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1017.

- ALGA, Lam. Fl. Fr. iii. 539 (1778).
angustifolia, Loser, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 383 = *nana*.
angustifolia, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 3 = *marina*.
bullata, Delile, Fl. Egypte, 289. t. 53. f. 6 = *Halophila stipulacea*?
ciliata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 157 = *Cymodocea ciliata*.
emarginata, Ehrenb. & Hempr. ex Aschers. in Linnaea, xxxv. (1867–68) 167 = *nana*.
marina, R. Br. Prod. 338 = *tasmanica*.
marina, Linn. Sp. Pl. 968. —Europ.
marina, Targ. Tozz. Cat. Veg. Marin. (1826) 87 = *Cymodocea aequorea*.
marina, Vis. Stirp. Dalm. Spec. 51 = *Posidonia Caulini*.

ZOSTERA :—

- maritima*, Gaertn. Fruct. i. 76. t. 19 = *marina*.
mediterranea, DC. Fl. Fr. iii. 154 = *Cymodocea aequorea*.
minor, Nolte, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 2 = *nana*.
Muelleri, Irmsch, ex Aschers. in Linnaea, xxxv. (1867–68) 168 = *nana*.
nana, Roth, Enum. Pl. Phaen. Germ. i. 8. —Reg. temp.
nodosa, Guss. Pl. Sic. Syn. ii. 565 = *nana*.
nodosa, Ucria, in Roem. Arch. i. I. (1796) 70 = *Cymodocea aequorea*.
Noltti, Hornem. in Fl. Dan. t. 2041 = *nana*.
oceanica, Linn. Mant. i. 123 = *Posidonia Caulini*.
oceanica, [Weber], in Wigg. Prim. Fl. Holsat. 65 = *marina*.
pumila, Le Gall, in Congr. Sc. Fr. xvi. I. (1850) 96, 144 = *nana*.
serrulata, Bertol. Fl. Ital. x. 5 = *marina*.
serrulata, Targ. Tozz. Cat. Veg. Marin. (1826), 85 = *Cymodocea aequorea*.
stenophylla, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175 = *marina*.
stipulacea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 158 = *Halophila ovata*.
tasmanica, Martens, ex Aschers. in Linnaea, xxxv. (1867–68) 168. —Austral.
tridentata, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 196 = *Halodule australis*.
trinervis, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 319 = *marina*.
uninervis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 157 = *Halodule australis*.
uninervis, Vahl, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 137 = *nana*.

- ZOSTEROSPERMUM**, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 28 (1819) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).
gracile, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 14 = *R. glauca*?

- ZOSTEROSTYLIS**, Blume, Bijdr. 418. t. 32 (1825) = **Cryptostylis**, R. Br. (Orchid.).
Arachnites, Blume, l. c. 419. t. 32 = *C. Arachnites*.
filiformis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 721 = *C. filiformis*.
Walkeræ, Wight, Ic. t. 1748 = *C. Arachnites*.
zeylanica, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 446 = *C. Arachnites*.

- ZOUCHIA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 22 (1836) = **Pancreaticum**, Dill. (Amaryll.).
illyrica, Rafin. l. c. = *P. illyricum*.

- ZOZIMA**, DC. Prod. iv. 195 (1830), sphalm. = **Zosima**, Hoffm. (Umbellif.).

- ZOZIMIA**, DC. Prod. iv. 195 (1830) = *præc.*

- ZOYSIA**, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 440. **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1124.

- MATRELLA, Pers. Syn. i. 73 (1805).
 OSTERDAMIA, Neck. Elem. iii. 218 (1790).
aristata, C. Muell. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 272 = *pungens*.
Brownii, C. Muell. l. c. = *pungens*.
Griffithiana, C. Muell. l. c. 273 = *pungens*.
japonica, Steud. Syn. Pl. Gram. 414 = *pungens*.
macrantha, Desv. Opusc. 54 = *pungens*.
macrostachya, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 608 = *pungens*?
pungens, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 441. —As. or.; Austral.; Ins. Mascar.; Maurit.
rigida, Willd. ex Kunth, Rév. Gram. i. 156 = *Leptothrium rigidum*.
sedoides, C. Muell. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 273 = *pungens*.
setacea, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 801 = *pungens*.
sinica, Hance, in Journ. Bot. vii. (1869) 168 = *pungens*.
tenuifolia, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. Sc. Nat. ii. (1836) 96 = *pungens*.
tremula, Beauv. Agrost. 148 = *Sporobolus virginicus*.

- ZSCHOKKEA**, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 20. t. 6, 7 (1860) = **Lacmeilia**, Karst. (Apocyn.).
arborescens, Muell. Arg. l. c. 22. —Bras.
floribunda, Muell. Arg. l. c. 23 = *L. floribunda*.
gracilis, Muell. Arg. l. c. 21. —Bras.

ZSCHOKKEA :—

- guyanensis*, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859–60) 391 = *Lacmeilia floribunda*.
microcarpa, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 23. —Bras.
monosperma, Muell. Arg. l. c. 22. —Bras.
ramosissima, Muell. Arg. l. c. 21. —Bras.

- ZSCHOKKIA**, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 694 (1876), sphalm. = *præc.*

- ZUCCA**, Comm. ex Juss. Gen. 398 (1789) = **Momordica**, Tourn. (Cucurb.).
Commersoniana, Ser. in DC. Prod. iii. 319 = *M. cochinchinensis*.

- ZUCCAGNIA**, Cav. Ic. v. 2. t. 403 (1799). **LEGU-MINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 587.
angulata, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 22. —Chili.
eremophila, Phil. Fl. Atac. 17. t. 1 B. —Chili.
microphylla, Vog. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 38. —Chili.
mucronata, Phil. Fl. Atac. 17. —Chili.
punctata, Cav. Ic. v. 2. t. 403. —Chili.

- ZUCCAGNIA**, Thunb. Nov. Gen. ix. 127 (1798) (*Zuccagnia*) = **Dipcadi**, Medic. (Liliac.).
viridis, Thunb. l. c. = *D. filamentosum*.

- ZUCCARINIA**, Blume, Bijdr. 1006 (1826). **RUBIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 97.
macrophylla, Blume, l. c. 1007. —Java.

- ZUCCARINIA**, Maerckl. in Ann. Ges. Wetterau, ii. (1811) 252 (Gen. dub.).
verbenacea, Maerckl. l. c. 253 (Quid ?). —Hab. ?

- ZUCCARINIA**, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 50, 81 (1827) = **Jackia**, Wall. (Rubiace.).
ornata, Spreng. l. c. 81 = *J. ornata*.

- ZUCHELLIA**, Buek, Index, in DC. Prod. iii. 508 (1858), sphalm. = *seq.*

- ZUCHELLIA**, Decne. in DC. Prod. viii. 492 (1844) = **Raphionacme**, Harv. (Asclep.).
angolensis, Decne. l. c. —Afr. trop.

- ZUCKERTIA**, Baill. Etud. Gén. Euph. 495. t. 4 (1858) = **Tragia**, Plum. (Euphorb.).
cordata, Baill. l. c. 496 = *T. Bailloniana*.

- ZUELANIA**, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 88. t. 12 (1845) = **Casearia**, Jacq. (Samyd.).
crenata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 9. —Cuba.
icosandra, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 242, in obs. = *C. icosandra*.
laetioides, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 89 = *C. icosandra*.
tremula, Griseb. Cat. Pl. Cub. 9. —Cuba.

- ZUGILUS**, Rafin. Fl. Ludov. 159 (1817) = **Ostrya**, Mich. (Cupul.).
virginica, Rafin. l. c. 159 = *O. virginica*.

- ZULATIA**, Neck. Elem. ii. 117 (1790) = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melastom.).
alata, Rafin. Sylva Tellur. 97 = *M. alata*.
grandiflora, Rafin. l. c. = *Rhynchanthera grandiflora*.
levigata, Rafin. l. c. = *M. laevigata*.

- ZURLOA**, Tenore, Atti 3^a Riun. Sc. Ital. 503 (1841) = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).
insignis, Tenore, l. c. = *C. procera*.
splendens, Tenore, Cat. Orto Bot. Nap. (1845) 99 = *C. procera*.

- ZWAARDEKRONIA**, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 252 = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).
lurida, Korth. l. c. = *Chasalia curviflora*.

- ZWACKHIA**, Sendt. in Reichb. Ic. Fl. Germ. xviii. 65. t. 115, 1316 (1858). **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 862.
aurea, Sendt. l. c. —Banat.

ZWARDEKRONIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 177 (1880), err. typ., in syn. = ZWAARDEKRONIA, Korth. = *Psychotria*, Linn. (Rubiace.).

ZWINGERA, Neck. Elem. iii. 385 (1790) = *Nolina*, Linn. (Convolv.).

ZWINGERA, Schreb. Gen. ii. 802 (1791) = *Simaba*, Aubl. (Simarub.).
amara, Willd. Sp. Pl. ii. 569 = *Simaruba amara*.
Aruba, Spreng. Syst. ii. 319 = *Simaba guianensis*.
bahiensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 802 = *Simaba ferruginea*?
bicolor, Steud. l. c. = *Simaba bicolor*.
ferruginea, Spreng. Syst. ii. 319 = *Simaba ferruginea*.
floribunda, Spreng. l. c. = *Simaba floribunda*.
orinocensis, Spreng. l. c. = *Simaba orinocensis*.
quassioideis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 163 = *Picrasma quassioideis*.
suaveolens, Spreng. Syst. ii. 319. — Bras.
trichilioides, Spreng. l. c. = *Simaba trichilioides*.
undulata, Steud. Nom. ed. II. ii. 802 = *Simaba undulata*.

ZYGADENUS, Michx. Fl. Bor. Am. i. 213. t. 22 (1803) (*Zigadenus*). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 835.

AMANTANTHIUM, Kunth, Enum. Pl. iv. 179 (1843).
 AMANTHUM, Rafin. Fl. Tellur. iv. 27 (1836).
 ANTICLEA, Kunth, Enum. Pl. iv. 191 (1843).
 CHITONIA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 51 (1866).
 CHROSPERMA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).
 ENDOCLES, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 51 (1866).
 GEISELERIA, Kunth, in Abh. Berl. Akad. (1842) 3.
 GOMPHOSTYLIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 30 (1836).
 MONADENUS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 51 (1866).
angustifolius, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 280. — Am. bor.

bracteatus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 429; Schult. f. Syst. vii. 1559 = *elegans*.
canadensis, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 482 = *elegans*.

chloranthus, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 736 = *elegans*.

commutatus, Schult. f. Syst. vii. 1560 = *elegans*.
Douglasii, Torr. in Pacif. Rail. Rep. vii. 20 = *Fremontii*.

elegans, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 241. — Am. bor.
Fremontii, Torr. ex S. Wats. Bot. King's Exped. 343. — Calif.

frigidus, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct. 1832) 233 = *Stenanthium frigidum*.

fuscatus, Rafin. Fl. Tellur. ii. 30 (Quid?). — Hab.?
glaberrimus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 160 = *Fremontii*.

glaberrimus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 214. t. 22. — Am. bor.

glaucus, Nutt. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 480 = *Fremontii*.

glaucus, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 56 = *elegans*.

hybridus, Endl. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 196 = *Melanthium virginicum*.

japonicus, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. II. ii. (1868) 88 = *Veratrum Maackii*.

leimanthoides, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 476. — Am. bor.

mexicanus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 382. — Mexic.

monoeus, Kunth, Enum. Pl. iv. 196 = *Veratrum parviflorum*.

muscitoxicum, Regel, Gartenfl. xxxii. (1883) 164. — Am. bor.

Nuttallii, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 476, in obs. — Calif.

Nuttallii, S. Wats. in Bot. King's Exped. 343, partim = *venosus*.

paniculatus, S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.

porifolius, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, viii. (1881) 123. — N. Mexic.

sachalinensis, F. Schmidt, Reisen Amurl. 88 = *Stenanthium sachalinense*.

sibiricus, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iv. (1837) 112. — Sibir.

speciosus, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 177 = *elegans*.

venosus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 279. — Am. bor. occ.

ZYGADENUS:—

virginicus, Endl. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 195 = *Melanthium virginicum*.
volcanicus, Benth. Pl. Hartw. 96. — Guatemala.
volcanicus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 165 = *mexicanus*.

ZYGIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1188 (1876), err. typ. = ZYGIS, Desv. = *Micromeria*, Benth. (Labiata.).

ZYGIA, P. Br. Hist. Jamaic. 279. t. 22 (1789) = *Pithecolobium*, Mart. (Legumin.).

ZYGIA, Walp. Rep. i. 928 (1842); Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 92 = *Albizia*, Durazz. (Legumin.).

Browniei, Schweinf. Rel. Kotsch. 10. t. 10 = A. Welwitschii.

Browniei, Walp. Rep. i. 928 = A. Browniei.

fastigiata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 165 = A. fastigiata.

Petersiana, Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot. t. 1 = A. Petersiana.

Sassa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 93, in obs. = A. fastigiata.

virgultosa, E. Mey. ex Walp. Rep. i. 928 (Ingae sp.). — Afr. austr.

ZYGIS, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 46 (1825) = *Micromeria*, Benth. (Labiata.).

aromatica, Desv. l. c. = M. obovata.

ZYGODIA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 716 (1876). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

axillaris, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1184. — Afr. trop.

myrtifolia, Benth. l. c. xii. 73. — Afr. trop.

subsessilis, Benth. l. c. — Afr. trop.

ZYGOGLOSSUM, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 100 (1823), nomen; et in Syll. Ratisb. ii. (1828) 4 = *Cirrhopetalum*, Lindl. (Orchid.).

umbellatum, Reinw. ll. cc. 100; 5 = C. Thouarsii.

ZYGOGYNUM, Baill. Adansonia, vii. (1867) 298. *MAGNOLIACEAE*.

pomiferum, Baill. l. c. x. (1872) 334. — N. Caled.

stipitatum, Baill. l. c. — N. Caled.

Vieillardii, Baill. l. c. vii. (1867) 298. — N. Caled.

ZYGOLEPIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 1. 573 = *Ratonia*, DC. (Sapind.).

rufescens, Turcz. l. c. 574 = R. Zygolepis.

ZYGOMENES, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 271 = *Cyanotis*, D. Don (Commel.).

abyssinica, Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 211 = C. hirsuta.

axillaris, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 271 = C. axillaris.

caespitosa, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. t. 22⁴ = C. longifolia.

parasitica, Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 214 = C. parasitica.

pauciflora, Hassk. l. c. 213 = C. pauciflora.

polyrrhiza, Hassk. l. c. 214 = C. polyrrhiza.

ZYGOMERIS, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 315 (1825) = *Amicia*, H. B. & K. (Legumin.).

flava, [Moq. & Sesse,] ex DC. l. c. = A. Zygomeris.

ZYGOON, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 113 (1877). *RUBIACEAE*.

graveolens, Hiern, l. c. 114. — Afr. trop.

ZYGOPELTIS, Fenzl, ex Endl. Gen. Suppl. ii. 107 (1842) = *Heldreichia*, Boiss. (Crucif.).

ZYGOPETALON, Reichb. Consp. 69 (1828) = seq.

ZYGOPETALUM, Hook. Bot. Mag. t. 2748 (1827). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 542.

BOLLEA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 667.

CHAUBARDIA, Reichb. f. l. c. (1852) 671.

COCHLEANTHES, Rafin. Fl. Tellur. iv. 45 (1836).

GALEOTTIA, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 25.

HUNTLEYA, Batem. ex Lindl. Bot. Reg. (1837) sub t. 1991.

ZYGOPETALUM:—

KEFERSTEINIA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 633.

MENADENIUM, Rafin. Fl. Tellur. iv. 45 (1836).

PESCATORIA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 667.

PROMENAEA, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 13.

WARCZEWICZELLA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 635.

ZYGOSEPALUM, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 665 (1863).

africanum, Hook. Bot. Mag. t. 3812 = *Odontoglossum bictoniense*.

amazonicum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 655. — Am. trop.

aromaticum, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 668. — Panama.

Backhousianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) 11. 456, in syn. — Ecuador?

bellum, Reichb. f. l. c. (1878) 1. 492, in nota. — N. Granat.

bicallosum, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 9. — Ecuador.

bidentatum, Reichb. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 251. — Mexic.

brachypetalum, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 9. — Bras.

brachystalix, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 660. — Ins. Trinit.

Burkei, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) 11. 684. — Guian.

Burtii, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 251. — Costa Rica.

candidum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 656. — Bras.

cerinum, Reichb. f. l. c. 651. — Panama.

Clayi x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) 1. 684.

cochleare, Lindl. in Bot. Reg. t. 1857. — Am. trop.

cochleata, Paxt. Mag. Bot. iv. (1838) 279 (Index), err. typ. = *praec.*

coeleste, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 5. — N. Granat.

coloratum, Linden & Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 662. — N. Granat.

conchaceum, Hoffm. ex Reichb. f. l. c. 653 = *cochleare*.

coronarium, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 108. — N. Granat.

crinitum, Lodd. Bot. Cab. t. 1687. — Bras.

Dayanum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1872) 1618, in syn. — N. Granat.

discolor, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 655. — Costa Rica.

euglossum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) 11. 808, in syn. = *intermedium*.

expansum, Reichb. f. l. c. (1878) 1. 168. — Ecuador?

flabelliforme, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 652 = *cochleare*.

flaveolum, Linden & Reichb. f. in Walp. l. c. 662. — N. Granat.

forcipatum, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1885) 11. 70 = *laminatum*.

forcipatum, Reichb. f. l. c. (1883) 11. 360. — Hab.?

fragrans, Linden, Cat. n. 6 (1851) 9 = *marginatum*.

Gairianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) 1. 684, in syn. — Hab.?

Gautieri, Lem. Illustr. Hort. xiv. (1867) t. 535. — Bras.

Gemma, Reichb. f. in Gard. Chron. (1874) 1. 406, in syn. — Hab.?

gramineum, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 10. — N. Granat.

grandiflorum, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 251. — Mexic.

guttatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 659. — Hab.?

intermedium, Hort. Petrop. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1855) 22, 23 = *Mackaii*.

intermedium, Lodd. Cat. n. 1136; ex Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 9. — Bras.

ionoleucum, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxiii. (1865) 99. — N. Granat.

Kegelii, Reichb. f. l. c. x. (1852) 668. — Guian.

Klabochii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1885) 11. 391. — N. Granat.

Klabochorum, Reichb. f. l. c. (1879) 1. 684. — Hab.?

lacteum, Reichb. f. l. c. (1872) 1290. — Panama.

Lalindei, Reichb. f. l. c. (1874) 11. 33, in nota. — N. Granat.

lamellosum, Reichb. f. l. c. (1875) 11. 225, in nota. — N. Granat.

laminatum, Reichb. f. l. c. (1885) 11. 70. — Hab.?

Lawrenceanum, Reichb. f. l. c. (1878) 11. 266, in nota. — Hab.?

ZYGOPETALUM :—

- Lehmanni, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1879) II. 424, in syn.—Reg. Andin.
 lentiginosum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 659.—Bras. Lueddemannianum, *Reichb. f. l. c.* 653.—Am. trop.
 Mackaii, *Hook. Bot. Mag.* t. 2748.—Bras.
 mandibulare, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) I. 684 = maxillare.
 marginatum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 654.—Am. centr.
 Massangei, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1876) I. 603.—Hab. ?
 maxillare, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1776; *Paxt. Mag. Bot.* iv. (1838) 271.—Bras.
 Meleagris, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 321; *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 546, in nota.—Bras.
 micranthum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 109 = *Paradisanthus paranaënsis*.
 microphyllum, *Rodrig. l. c.*—Bras.
 micropterum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) II. 134, in nota.—Hab. ?
 microtus, *Hoffmgg. ex Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 661 = crinitum.
 Moritzii, *Reichb. f. l. c.* 658.—Am. centr.
 Mosenianum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 108.—Bras.
 Murrayanum, *Gardn. ex Hook. Bot. Mag.* t. 3674.—Bras.
 Mystacinum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) I. 530, in nota.—N. Granat.
 obtusatum, *Reichb. f. l. c.* (1878) II. 300.—Hab. ?
 pardinum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 662.—Reg. And.
 Patini, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1874) II. 34, in nota.—Hab. ?
 pentachromum ×, *Reichb. f. l. c.* (1885) I. 532.
 pictum, *Reichb. f. l. c.* (1883) II. 8, in nota.—Am. trop.
 pubescens, *Hoffmgg. Verz. Orch.—Cf. Bot. Zeit.* i. (1843) 835 = crinitum.
 pulvinare, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 107.—N. Granat.
 quadratum, *Pfizer, Vergl. Morph. Orch.* 58 = marginatum.
 Rivieri, *Carr. in Rev. Hort.* (1873) 191, cum ic. = intermedium.
 Roelsii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) I. 620 = intermedium.
 Rollissonii, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 659.—Bras.
 rostratum, *Hook. Bot. Mag.* t. 2819.—Guian.
 Russelianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) II. 524, in syn.—Hab. ?
 sanguinolentum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 658.—Venezuela.
 Sedeni ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1874) II. 290.
 Sellowii, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 660.—Bras.
 stapelioides, *Reichb. f. l. c.* 658.—Bras.
 stenochilum, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1923 = crinitum.
 taurinum, *Reichb. f. in Linnaea*, xlii. (1877) 5.—N. Granat.
 tricolor, *Lindl. Bot. Reg.* (1846) t. 64 = *Acacallis cyanea*.
 triste, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 108.—Bras.
 triumphans, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 652.—N. Granat.
 velatum, *Reichb. f. l. c.* 655.—N. Granat.
 velutinum, *Hoffmgg. Verz. Orch.—Cf. Bot. Zeit.* i. (1843) 835 = intermedium.
 violaceum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 650.—Guian.
 Wailsonianum, *Reichb. f. l. c.* 656.—Bras.
 Wallisii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 710, in syn.; et *Van Houtte, in Fl. des Serres*, xviii. (1869) 17, t. 1828.—Ecuador.
 Wendlandi, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 74.—Costa Rica.
 xanthinum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 659.—Bras.

ZYGOPHYLLON, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 137 = seq.

ZYGOPHYLLUM, *Linn. Syst. ed. I* (1735). *ZYGOPHYLLEAE*, *Benth. & Hook. f. i.* 266.
AGOPHYLLUM, *Neck. Elem.* ii. 227 (1790).
AGOPHYLLUM, *Endl. Gen.* 1164 (1841).
FABAGO, *Tourn. ex Adans. Fam.* ii. 507 (1763).
ROEPERA, *A. Juss. in Mém. Mus. Par.* xii. (1825) 454, t. 5, f. 3.

ZYGOPHYLLUM :—

- aestuas, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 552 (Quid ?).—Guian.
 alatum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230 = fulvum.
 album, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 552.—Cilicia; Afr. bor.; Ins. Canar.
 altaicum, *Steph. ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 484 = pterocarpum.
 ammophilum, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 376 = Billardierii.
 apiculatum, *F. Muell. l. c.* 373.—Austral.
 arboreum, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 20; *Select. Am.* 130 = *Guaiacum arboreum*.
 arboreum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 154 (Quid ?).—Reg. Himal.
 atriplicoides, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 41.—Armen.; Persia.
 aurantiacum, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 376, in nota = fruticosum.
 australasicum, *Miq. in Lehm. Pl. Preiss.* i. 164 = *Nitraria Schoberi*.
 Billardierii, *DC. Prod.* i. 705.—Austral.
 brachypterum, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 397.—Persia; Soongar.
 capense, *Lam. Encyc.* ii. 443 = microphyllum.
 carnosum, *Wall. Cat. n.* 1192 (Quid ?).—Ind. or.
 coccineum, *Lepech. It. ed. Germ.* i. 310 = *Eichwaldi*.
 coccineum, *Linn. Sp. Pl.* 386.—Afr. bor.; Arab.; Sind.
 Commelini, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 97 = sessilifolium, flexuosum.
 connaroides, *Wight & Arn. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 565 = *Heynea trijuga*.
 cordatum, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 12 (Quid ?).—Afr. austr.
 cordifolium, *Linn. f. Suppl.* 232.—Afr. austr.
 cornutum, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 364.—Alger.
 crenatum, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 374 = glaucescens.
 cuneifolium, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 97.—Afr. austr.
 debile, *Cham. in Linnaea*, v. (1830) 45.—Afr. austr.
 decumbens, *Delile, Fl. Egypte*, 221, t. 27, f. 3.—Aegypt.
 desertorum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 87, t. 11 = coccineum.
 dichotomum, *Licht. ex Cham. in Linnaea*, v. (1830) 48.—Afr. austr.
 divaricatum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 97.—Afr. austr.
 Dregeanum, *Presl, Bot. Bemerk.* 30 = simplex.
 Dregeanum, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 365.—Afr. austr.
 dumosum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* viii. 125.—Arab.
 Eichwaldi, *C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc.* 15.—Reg. Casp.
 eurypterum, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 49.—Syria; Persia; Afghan.
 fabagifolium, *Baill. Hist. Pl.* iv. 417 = fruticosum.
 fabagineum, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 137 = seq.
 Fabago, *Linn. Sp. Pl.* 385.—Hispan.; Afr. bor.; As. occ.
 Fabago, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult.* 543 = foetidum.
 fasciculatum, *Licht. ex Cham. in Linnaea*, v. (1830) 48, nomen (al. gen.).—Afr. austr.
 flexuosum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 97.—Afr. austr.
 foetidum, *Eckl. & Zeyh. l. c.* 96 = debile.
 foetidum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230 = Meyeri.
 foetidum, *Schrad. & Wendl. Sert. Hanov.* 17, t. 9.—Afr. austr.
 Fontanesii, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* i. 17.—Ins. Canar.; Afr. bor.
 fruticosum, *DC. Prod.* i. 705.—Austral.
 fulvum, *Linn. Sp. Pl.* 386.—Afr. austr.
 fulvum, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 4 = sessilifolium.
 furcatum, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 106.—Sibir. altaic.
 garipense, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230 = microcarpum.
 Geslini, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1856) 705.—Alger.
 glaucescens, *F. Muell. Pl. Vict.* i. 228.—Austral.
 glaucum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230, nomen; et *ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 362.—Afr. austr.
 glaucum, *F. Muell. in Trans. Vict. Inst.* i. (1855) 29 = glaucescens.

ZYGOPHYLLUM :—

- horridum, *Cham. in Linnaea*, v. (1830) 46 = microphyllum.
 horridum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 98 = retrofractum.
 Howittii, *F. Muell. Fragm.* iii. 150.—Austral.
 incrustatum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230, nomen; et *ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 362.—Afr. austr.
 insuave, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 96 = uitenhagense.
 insuave, *Sims, Bot. Mag.* t. 372 = foetidum.
 iodocarpum, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 372.—Austral.
 Karelini, *Fisch. ex Karel. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1839) 149, nomen; *Boiss. Fl. Orient.* i. 910.—Reg. Casp.
 lanatum, *Willd. Sp. Pl.* ii. 564 = *Seetzenia africana* ?
 latifolium, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* ii. (1844) 198.—Soongar.
 Lehmannianum, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga*, i. 11. (1847) 202 = Karelini.
 leptopetalum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230, nomen; et *ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 363.—Afr. austr.
 Lichtensteinianum, *Cham. in Linnaea*, v. (1830) 47.—Afr. austr.
 Lichtensteinianum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 96 = *Z. Morgsana*, foetidum.
 limosum, *Eckl. & Zeyh. l. c.* = sessilifolium.
 macrophyllum, *Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch.* 16.—Turkestan.
 macropterum, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 102.—Persia; Soongar.
 maculatum, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 60.—Afr. austr.
 maritimum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 96 = fulvum, uitenhagense.
 Melongena, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 104.—Sibir. altaic.
 Meyer, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 364.—Afr. austr.
 microcarpum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 98 = retrofractum.
 microcarpum, *Licht. ex Cham. in Linnaea*, v. (1830) 46.—Afr. austr.
 microcarpum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230 = simplex.
 micronatum, *Opiz, Natural. n.* vi. (1824) 42 = *Z. Fabago* ?
 microphyllum, *G. Don, Gen. Syst.* i. 771, in syn., sphalm. = microcarpum.
 microphyllum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 98 = simplex.
 microphyllum, *Linn. f. Suppl.* 232.—Afr. austr.
 miniatum, *Cham. in Linnaea*, v. (1830) 49.—Turkestan.
 Morgsana, *Linn. Sp. Pl.* 385.—Afr. austr.
 mucronatum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 438.—China.
 Nitraria, *Linn. in Amoen. Acad.* iii. 409 = *Nitraria Schoberi* ?
 Novae-Zeelandiae, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 802, sphalm. = *Zanthoxylum Novae-Zeelandiae* ?
 obtusum, *Vicary, in Proc. Linn. Soc.* i. (1848) 367 = simplex.
 orbiculatum, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 285.—Afr. trop.
 ovigerum, *Fisch. & Mey. ex Karel. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1839) 142, nomen; *Boiss. Fl. Orient.* i. 914.—Reg. Casp.
 parvifolium, *G. Don, Gen. Syst.* i. 771 = microcarpum.
 pinnatum, *Cham. in Linnaea*, v. (1830) 48 = macropterum.
 portulacoides, *Cham. l. c.* 50 = *Miltanthus portulacoides*.
 portulacoides, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 88 = simplex.
 Potanini, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 438.—Soongar.
 prismaticum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230, nomen = prismatocarpum.
 prismatocarpum, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 357.—Afr. austr.
 prismatocarpum, *F. Muell. in Linnaea*, xxv. (1852) 375.—Austral.
 proliferum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 87 = album.
 propinquum, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér.* II. iii. (1835) 283 = coccineum.
 prostratum, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230 = microcarpum.
 prostratum, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 189 = *Seetzenia africana*.
 pterocarpum, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 103.—Sibir. altaic.

ZYGOPHYLLUM:—

- pygmaeum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 97.—Afr. austr.
 Retama, *Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc.*
 iii. (1833) 166.—Chili.
 retrofractum, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 96=foetidum.
 retrofractum, *Jacq. Hort. Schoenb.* t. 354=flexuo-
 sum.
 retrofractum, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 80.—Afr. austr.
 rigescens, *F. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 230=
 cuneifolium.
 rigidum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 154 (Quid?).—
 Ind. bor. occ.
 Rosowii, *Bunge, in Linnaea*, xvii. (1843) 5.—
 Mongol.
 semiteres, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 97=fulvum.
 sessilifolium, *Linn. Sp. Pl.* 385.—Afr. austr.
 sessilifolium, *Sims, Bot. Mag.* t. 2184=fulvum.
 Sieversianum, *Steph. ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 484=
 macropterum.
 simplex, *Linn. Mant.* i. 68.—Afr. bor. et austr.; As.
 occ.
 spatulatum, *D. Don, Gen. Syst.* i. 771.—Afr. austr.
 spinosum, *Linn. Sp. Pl.* 386.—Afr. austr.
 stellulatum, *C. Sm. in Tuckey, Congo*, 250, nomen.
 —Ins. Cap. Virid.
 steropterum, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad.*
Petersb. iii. (1845) 308.—Soongar.
 subtrijugum, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 105.—
 Sibir. altaic.
 succulentum, *Salisb. Prod.* 319=Z. Morgsana.
 terminale, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858)
 i. 437=apiculatum.

ZYGOPHYLLUM:—

- Thunbergianum*, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 97=Lichten-
 steinianum.
 tridentatum, [Moç. & Sesse,] ex DC. *Prod.* i. 706=
 Larrea mexicana.
 turcomanicum, *Fisch. ex Karel. in Bull. Soc. Nat.*
Mosc. (1839) 149, nomen; *Boiss. Fl. Orient.* i. 914.
 —Reg. Casp.
 uitenhagense, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 361.
 —Afr. austr.
Webbianum, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855)
 365, in obs.=Fontanesii.
 ZYGOSEPALUM, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 665
 (1863)=Zygopetalum, *Hook. (Orchid.)*.
Kegelii, *Reichb. f. l. c.* 666=Zygopetalum *Kegelii*.
rostratum, *Reichb. f. l. c.*=Zygopetalum rostratum.
 ZYGOSPERMUM, *Thw. ex Baill. Etud. Gén. Euph.* 620.
 t. 27 (1858)=Phyllanthus, *Linn. (Euphorb.)*.
zeylanicum, *Thw. ex Baill. l. c.*=P. cyanospermus.
 ZYGOSTATES, *Lindl. Bot. Reg. sub t.* 1927 (1837).
 ORCHIDEAE, *Benth. & Hook. f. iii.* 569.
 DACTYLOSTYLES, *Scheidw. in Otto & Dietr. Allg.*
Gartenz. vii. (1839) 405.
 cornuta, *Lindl. Bot. Reg. sub t.* 1927.—Bras.
 Greeniana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 988.—
 Bras.
 lunata, *Lindl. Bot. Reg. sub t.* 1927.—Bras.
 pellucida, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 564.—Bras.

ZYGOSTELMA, *Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii.*
 740 (1876). ASCLEPIADEAE, *Benth. & Hook. f. l. c.*

ZYGOSTELMA, *Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv.* 232
 (1885). ASCLEPIADEAE.
 calcaratum, *Fourn. l. c.*—Bras.

ZYGOSTIGMA, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 150 (1839).
 GENTIANEAE, *Benth. & Hook. f. ii.* 810.
 australe, *Griseb. l. c.*—Bras.
 uniflorum, *Griseb. l. c.* 151.—Reg. Argent.

ZYMUM, *Noronha, ex Thou. Hist. Vég. Isles Afr.*
Austr. 69. t. 23 (1806)=Tristellateia, *Thou.*
(Malpig.).
 madagascarense, *Juss. ex Spreng. Syst.* ii. 329=
 T. madagascariensis.
 tristellatum, *Noronha, ex Thou. Hist. Vég. Isles Afr.*
Austr. 69. t. 23=T. madagascariensis.

ZYRPHELIS, *Cass. in Ann. Sc. Nat. Ser. I.* xvii. (1829)
 420=Mairia, *Nees (Compos.)*.
 amoena, *Cass. l. c.* 421=M. taxifolia.
 microcephala, *Nees, Gen. et Sp. Aster.* 252=M.
 microcephala.
 taxifolia, *Nees, l. c.* 250=M. taxifolia.

ZYZOPHYLLUM, *Salisb. Prod.* 319 (1796), err. typ.=
 Zygophyllum, *Linn. (Rutac.)*.

ZYZYGIUM, *Brongn. Enum. Genr.* 123 (1843), sphalm.=
 SYZYGIUM, *Gaertn. = Eugenia, Mich. (Myrtac.)*.

APPENDIX

ADDENDA ET EMENDANDA GRAVIORA

HACTENUS NOTATA

VOLUME I

(MENDA NON COMMEMORATA LECTOR BENEVOLENS IPSE CORRIGET)

a. = adde. d. = dele. l. = lege. p. = pone.

PAG.

ABELMOSCHUS.

- 1³. l. *aculeatus*, Walp. . . = H. *surattensis*, *cannabina*.
angustifolius, Walp. Rep. i. 308 = H. *angustifolius*.
cryptocarpus, Walp. . . = H. *Abelmoschus*.
cubensis, Walp. . . = H. *Abelmoschus*.

ABIES.

- 2³. l. *Khutrow*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 353; Loud. etc.
 3¹. *Pindrow*, Royle (l. c.) 350. t. 86; *Spach*, etc.

ABILDGAARDIA.

- 3². l. *polygama*, Spreng. . . = *Pharus angustifolius*.

ABRONIA.

- 3³. a. *TRIPTEROCALYX*, Hook. Kew Journ. v. (1853) 261.

ABRUS.

- 4¹. a. *HULTHENIA*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 160 (1855).

ABSINTHIUM.

- 4². l. *camphoratum*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 451; Bess. etc.
grandiflorum, Roehl. (l. c.) = *Mutellina*, Steud.
 a. *mutellinum*, Roehl. (l. c.) 450 =

ABUTILON.

- 4³. a. *BOGENHARDIA*, Reichb. Nom. 200 (1841). *asiaticum*, G. Don, Gen. Syst. i. 503.—Reg. trop.
 5¹. l. *australe*, Presl, Bot. Bemerk. 20; Garcke, etc.
 a. *Berlandieri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 358, in obs.—Mexic.
 l. *ceratocarpum*, C. Gay, Fl. Chil. i. 331.—Chili. *depauperatum*, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 230.—Ins. Galapag.
 5³. l. *oxyphyllum*, Presl, Bot. Bemerk. 20; Edgew. etc.

ACACIA.

- 6¹. a. *PHYLLODOCE*, Link, Handb. ii. 132 (1831).
 6². a. *adenanthera*, Zeyh. ex Steud. Nom. ed. I. 532.—Hab.?
 7¹. a. *biglobosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 182 = *Parkia Roxburghii*, africana.
 l. *brevipes*, A. Cunn. . . t. 3358, etc.
 7². l. *Cebil*, Griseb. . . 136 = *Piptadenia Cebil*.
 8¹. l. *decussata*, Tenore, . . (1845) 77, etc.
 8³. l. *gigantea*, Noronha, etc.

PAG.

ACACIA :—

- 8³. a. *Kaeringa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 153 = *A. leucophyloea*.
 10². post lineam 49 insere, *melanoceroideis*, Beurl. l. c. = *præc.* ?
 12². a. *stipulacea*, Royle, (l. c.) (Quid ?).—Ind. or.
 13¹. *tamariscifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 149, sphalm. = *tamarindifolia*.
 l. *tomentella*, Zipp. etc.
tortilis, Hayne, Arn. Gew. x.
 a. post lin. 68 insere, *tortuosa*, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 124 = *Prosopis dulcis*.

ACALYPHA.

- 14³. l. *boehmerioides*, Miq. . . 459 = *fallax*.
 15¹. *Commersoniana*, Baill. . . = *integrifolia*.
 15³. *hispida*, Blume, . . = *fallax*.
indica, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 10; Herb. Linn. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 872 = *fallax*.
leptostachya, H. B. & K. etc.
 16¹. a. *Macafeana*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1878) I. 10 = *Wilkesiana*.
musaiica, Hort. (l. c.) (1877) I. 520; (1878) I. 10 = *Wilkesiana*.
 17¹. *tenera*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 327 (Quid ?).—Reg. Himal.
 17². l. *ACAMPTOPAPPUS* . . . = *Aplopappus*, Cass. (Compos.).

ACANTHODIUM.

- 17³. l. *grossum*, Nees, . . 274 = *B. grossa*.
hirtum, Hochst. . . = *B. linearifolia*.

ACANTHOLIPPIA.

- 18². l. *salsoloides*, Griseb. . . = *L. salsoloides*.

ACANTHOMINTHA.

- l. *lanceolata*, Curran, . . i. I. (1884), etc.

ACANTHOPHOENIX.

- 18³. l. *crinita*, H. Wendl. etc.
rubra, H. Wendl. etc.

- 19³. l. *ACANTHYLLIS*, Pomel.

ACARNA, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 195 (1760); All. etc.
gummifera, Willd. . . = *Atractylis gummifera*.
macrocephala, Willd. . . = *Atr. macrocephala*.
macrophylla, Willd. . . = *Atr. macrophylla*.

PAG.

ACER.

- 20². a. *lactescens*, Steud. Nom. ed. II. i. 11 = *platanoides*.
Leopoldi, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 528 = *A. Pseudo-platanus*.
liburnicum, Hort. ex C. Koch, (l. c.) 539 = *monspessulanum*.
 20³. *lobatum*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 11 = *platanoides*.
 l. *lobatum*, Rafin. . . 48 = *Negundo aceroides* ?
 a. *microphyllum*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 536 = *italum*.
nanum, Steud. Nom. ed. II. i. 11 = *campestre*.
Pavia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 541 = *dasyacarpum*.
 21¹. *pulverulentum*, Hort. ex C. Koch, (l. c.) 535 = *campestre*.
splendens, Hort. ex C. Koch, (l. c.) 543 = *rubrum*.
tomentosum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 12 = *dasyacarpum*.
 l. *trifoliatum*, Rafin. . . 48 = *Negundo aceroides* ?

ACERAS.

- 21². l. *angustifolia*, Lindl. . . = *Herminium longicrura*.
longicruris, C. Wright, . . = *Herminium longicrura*.

ACETOSA.

- 21³. a. *arvensis*, Montand. Guide Bot. 269 = *R. Acetosella*.

ACHAETA.

- l. *geniculata*, Fourn. . . 553 = *Koehleria cristata*.

ACHILLEA.

- 22¹. l. *alpina*, Linn. . . 899.—Europ.
 22³. a. *firma*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 430 (Quid ?).—Gallia.
 23³. l. *pectinata*, Willd. etc.
 24¹. *sylvatica*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1827); Fl. Nap. etc.

ACHIMENES.

- 24². a. *alba*, Hort. Padov. ex Walp. Ann. ii. 1067 = *Niphaea oblonga*.
atrosanguinea, Hort. ex Regel, in Flora, xxxii. (1849) 180 = *amoena*.
 l. *magnifica*, Lindl. . . 116.—Am. centr.
 a. *Kleei*, E. Otto, ex Regel, in Flora, xxxii. (1849) 182 = *hirsuta*.
 24³. l. *picta*, Benth. . . t. 4126 = *Isoloma picta*.
viscida, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851) 59 = *Heppiella atrosanguinea*.

- PAG. **ACHRAS.**
25¹. l. *Caimito*, Ruiz & Pav. . . 18 = *Lucuma Caimito*.
a. *occidentalis*, Hort. Cels. ex Tenore, Cat. Ort. Nap. (1845) 77 (Quid?).—Hab.?
l. *Pohlmaniana*, F. Muell. . . 184 = *Sideroxylon Pohlmanianum*.
a. *Tchicomame*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 95 = *A. Sapota*.
- ACHYRANTHES.**
25². d. *CODIVALIA*, et *ECLOTORIPA*, Rafin. (nunc *Pupalia*).
- ACHYROCLINE.**
26³. l. *satureoides*, Gardn. . . = *Stenoclinesatureoides*.
- 26³. l. **ACHYROCHOMA**, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxvi. 21 (1823); lvii. 341 (1823) =
l. **ACHYROMA**, Wendl. Bot. Beobacht. ; etc.
- ACHYROPAPPUS.**
26³. a. *ambiguus*, Steud. Nom. ed. II. i. 437, in syn. = *Achyrophorus ambiguus*.
- ACHYROPHORUS.**
27¹. l. *albiflorus*, Sch. Bip.
cryptocephalus, Sch. Bip. . . 57 = *Werneria ambigua*.
a. *Gayii*, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. i. (1845) 116 = *H. chrysantha*.
d. *helveticus*, Less.
l. *Hohenackeri*, Sch. Bip. (l. c.) 57 = *Werneria ambigua*.
27². a. *taraxacoides*, Steud. Nom. ed. II. ii. 226, in syn. = *H. Scorzonerae*.
l. *taraxacoides*, Walp. (l. c.) 336 = *H. taraxacoides*.
uniflorus, F. W. Schmidt, . . . Aufs.
- 27³. l. **ACICALYPTUS.**
- ACIDANTHERA.**
27³. a. **SOLEANTHUS**, Steud. teste Klatt, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 159.
capensis, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 706 = *Tritonia capensis*.
28¹. a. *pauciflora*, Benth. & Hook. f. (l. c.) = *Tritonia pauciflora*.
28¹. l. **ACINODENDRUM**, Linn. . . = *Miconia*, Ruiz & Pav. (1794) (*Melastom.*).
- ACINOS.**
28². a. *Siso*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 32 = *Perilla arguta*?
- ACIPHYLLA.**
28³. l. **GINGIDIUM**, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. etc. quoad glacialis, procumbens, simplicifolia, dele *F. Muell. ex*
- ACMENA.**
29³. a. *pendula*, G. Benn. Gather. Natural. 327, nomen.—Austral.
- ACOKANTHERA.**
30¹. a. *oblongifolia*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 696.—Afr. trop.
Schimper, Benth. & Hook. f. (l. c.)—Abyssin.
- 30¹. a. **ACOME**, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 18, sphalm. = *Cleome*, Linn. (Cappar.).
- ACORUS.**
32¹. a. **CALAMUS**, Auct. ex Linn. Gen. ed. I. 104 (1737).
l. *cochinchinensis*, Schott, . . . 22 = *A. Calamus*.
- 32¹. l. **ACOSTA**, Lour. . . = *Vaccinium*, Linn.
- 32³. insere, **ACRIVIOLA**, Boerh. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 192 (1747) = *Tropaeolum*, Linn.
- ACRIDOCARPUS.**
32³. l. *orientalis*, A. Fuss. . . —Arab.
- ACRODICLIDIUM.**
33² l. *Ita-uba*, Meissn. . . = *Endiandra Ita-uba*.
- PAG. **ACROELYTRUM.**
33². a. *Urville*, Steud. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 400 = *L. gracile*.
- 33³. l. **ACROLOBUS**, Klotzsch, in Abh. etc.
- 34¹. l. **ACROSSANTHES**, Presl, Bot. Bemerk. 22 (1844) = *Vismia*, Vand. (Hypericin.).
- 34¹. l. **ACROTAPHROS**, Steud. ex Hochst. in Flora, xxix. (1846) 599 ; et ex A. Rich. etc.
- ACROTREMA.**
34². l. *Wightianum*, Wall. . . = *Arnottianum*.
a. *Wightianum*, Wight & Arn. Prod. 6 = *costatum*.
- ACTAEA.**
34². l. *dahurica*, Turcz. . . = *Cimicifuga dahurica* (in Addend.).
daurica, Franch. . . = *praec.*
34³. *pterosperma*, Fisch. & Mey. . . = *Cimicifuga dahurica* (in Addend.).
racemosa, Walt. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 373, etc.
- ACTINELLA.**
35¹. a. *californica*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 415, in nota = *Baeria coronaria*.
l. *Richardsonii*, A. Gray, in Bot. Calif. i. 394, partim = *biennis*.
Richardsonii, Nutt. . . 379.—Am. bor. occ.
- ACTINOLEPIS.**
35³. l. *anthemoides*, A. Gray, . . . 378 = *Baeria coronaria*.
coronaria, A. Gray, . . . 197 = *Baeria coronaria*.
lanosa, A. Gray, l. c. = *Eriophyllum lanosum*.
mutica, A. Gray, . . . 197 = *Baeria mutica*.
tenella, A. Gray, l. c. = *Baeria tenella*.
Wallacei, A. Gray, l. c. = *Eriophyllum Wallacei*.
- ACTINOMERIS.**
35³. l. *alternifolia*, DC. . . 575 =
helianthoides, Nutt. . . 181 = *Verbesina helianthoides*.
36¹. *Wrightii*, A. Gray, . . . 85 = *Verbesina Wrightii*.
36¹. post lineam 19 insere
- ACTINOPHLOEUS**, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 126, in obs. *PALMAE*.
ambiguus, Becc. l. c.—N. Guinea.
propinquus, Becc. l. c.—Ins. Arn.
- ACTINOPHYLLUM.**
36¹. l. *pedicellatum*, Pav. . . 195, etc.
- ACTINOSPORA.**
36¹. l. *dahurica*, Turcz. . . = *C. dahurica*.
pterosperma, Walp. . . = *C. dahurica*.
- ACTINOSTEMON.**
36². l. *acuminatus*, Baill. . . = *caribaeus*.
angustifolius, Klotzsch, . . . = *caribaeus*.
- 36³. l. **ACTINOSTIGMA**, Welw. . . [1859] = *Symphonia*, Linn. f. (Guttif.).
- ACTINOTUS.**
36². l. *leucocephalus*, Benth. etc.
- ADELSTIGMA.**
37³. a. **CANCELLARIA**, Sch. Bip. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 32 (1877).
- ADENANDRA.**
37³. l. **GLANDULIFOLIA**, Wendl. Collect. 35. t. 10 (1808).
- 38². a. **ADENGBIUM**, Steud. Nom. ed. II. ii. 346 (1841), sphalm. = **ADENOBASIUM**, Presl.
- ADENOGRYUS.**
39². l. *Braunii*, Klotzsch, ll. cc. (= *Phoberos Mundtii*).—Afr. austr.
- ADENONCOS.**
39³. l. *virens*, Blume, etc.
- PAG. **ADENOPHYLLUM.**
40¹. a. *Cavanillesii*, Steud. Nom. ed. II. i. 534, sphalm. = *coccineum*.
- 40¹. a. **ADENOPOGON**, Welw. Synopse, 27 (1862) = *Swertia*, Linn. (Gentian.).
stellaroides, Welw. l. c.—Afr. trop.
- ADENOROPHIUM.**
40². a. *coccinea*, Steud. Nom. ed. II. i. 799, in syn. = *J. coccinea*.
- d. **ADENOSTEMMA**, Forst.
- 41¹. d. *glandulosum*, Benth. (vide infra).
- a. **ADENOSTEMMA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 242 (1874), sphalm. = **ODONTOSTEMMA**, Benth. = *Arenaria*, Rupp. (Caryoph.).
glandulosum, Hook. f. l. c. = *A. Benthami*.
- ADENOSTEPHANUS.**
41¹. l. *austro-caledonicus*, Brongn. & Gris, . . . 229 = *Kermadecia austro-caledonica*.
Bleasdalii, Benth. . . 417 = *Roupala Bleasdalii*.
incanus, Klotzsch, etc.
laxiflorus, Meissn. etc.
- ADESMIA.**
41². a. **HETEROLOMA**, Desv. ex Reichb. Consp. 152 (1828).
42¹. l. *glabriuscula*, Vog. . . 592.—Chili.
42². *radicans*, Bert. . . l. c. = *glabriuscula*.
- ADHATODA.**
42³. l. *chrysotrichoma*, Nees, . . . 408 = *Justicia chrysotrichoma*.
43¹. l. *Gilliesii*, Nees, l. c. 395 = *Justicia Gilliesii*.
orchioides, Nees, l. c. 393 = *Justicia orchioides*.
43². *Tweediana*, Nees, l. c. 395 = *Justicia Tweediana*.
- ADONIS.**
44². a. *Walziana* ×, Simk. in Magyar Növényt. Lapok, ii. (1878) 151.—Hungar.
- ADRIANA.**
44³. a. **MEALISA**, Rafin. Sylva Tellur. 63 (1838).
- 44³. l. **ADUPLA**, Bosc, . . . (1805) = *Mariseus*, Ehrh. (Cyperac.).
- AECHMEA.**
45¹. a. **CHEVALIERIA**, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, tt. 61, 62 (1852?).
- AEGOPOGON.**
47². a. **ATHEROPHORA**, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 167 (1840).
- AELUROPUS.**
47². a. *niloticus*, Edgew. ex Aitch. Cat. Punj. Pl. 169, sphalm. = *niliacus*.
- 48¹. l. **AERANTHES**, . . . *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 576.
Arachnitis, Lindl. . . sub t. 817, etc.
filiformis, Griseb. etc.
- AERANTHUS.**
48¹. l. *jamaicensis*, Reichb. f. . . = *Angraecum jamaicense*.
- AERIDES.**
48³. l. *latifolium*, Thw. . . 429 = *Doritis latifolia*.
- AERVA.**
49². l. *brachiata*, Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 291 ; etc.
incana, Mart. (l. c.).
Monsonia, Mart. (l. c.).
pnescens, Mart. (l. c.).
setacea, Mart. (l. c.).
- AESCHYNOMENE.**
50². a. *aculeata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 191, nomen (Quid?).—Ind. or.
cassioideis, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 327.—Guian.
50³. *falcata*, Desv. (l. c.) 323.—Ind. or.

PAG.

AESCHYNOMENE :—

- 51¹. *microphylla*, Desv. (l. c.).—Ind. or.
 1. *miniata*, Ortega, . . . = *Piscidia Sesbania*.
 a. *monosperma*, Desv. (l. c.).—Bras.
muricata, Desv. (l. c.) 326 = *Adesmia muricata*.
onobrychifolia, Desv. (l. c.) = *Adesmia bicolor*.
 1. *patagonica*, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 249; etc.
 a. *pimpinellaefolia*, Desv. (l. c.) = *Adesmia muricata*.
 1. *platycarpa*, Michx. : . . = *Sesbania platycarpa*.

AESCULUS.

- 51². 1. *PAVIA*, Boerh. ex Linn. Syst. ed. I (1735); etc.
 51³. a. *octandra*, Marsh. Arbust. 4 = flava.

AETHIONEMA.

- 52¹. 1. *Diastrophis* (non *diastrophis*).
 52². a. *AETHULIA*, A. Gray, Syn. Fl. i. ii. 92, in syn. (1884), sphalm. = *Ethulia*, Linn. (Compos.).

AFZELIA.

- 52³. 1. *INTSIA*, Thou. . . (1806).
 a. *MACROLOBIUM*, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 80 (1855).

AGANISEA.

- 53¹. a. *cinerea*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 321; Benth. & Hook. f. Gen. iii. 544, sphalm. = *cyanea*.
cyanea, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 545.—N. Granat.
graminea, Benth. & Hook. f. l. c. = *Zygopetalum gramineum*.
 53³. 1. *AGARISTA*, DC. . . (1836) = *Leptosyne*, DC. (Compos.).
calliopsidea, DC. l. c. = *L. calliopsidea*.

AGARISTA.

- 53³. 1. *eriphylla*, G. Don, l. c. = *Gaultheria ferruginea*.
 54¹. a. *AGASTACHYS*, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789) = *Carex*, Dill. (Cyperac.).

AGATHAEA.

- 54¹. 1. *spathulata*, Fisch. . . Sem. Hort. Petrop. etc.

AGATHOSMA.

- 54². 1. *acerosa*, Eckl. & Zeyl.
 54³. *apiculata*, G. F. W. Mey.
bifida, Bartl. & Wendl. f. . . —Afr. austr.
 55¹. *hybrida*, Bartl. & Wendl. f. . . = *pubescens*.
mollis, Bartl. & Wendl. f. . . = *pubescens*.

AGAVE.

- 57². a. *sebastiana*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iii. (1885) 214.—Calif.

AGERATUM.

- 58¹. 1. *domingense*, Spreng.
 58³. 1. *AGGEIANTHUS*, Wight,

AGLAIA.

- 59¹. 1. *inequalis*, Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1885) 409;
 59². *Sipannas*, Miq. . . Suppl. 506.

AGLAODORUM.

- 59². 1. *Griffithii*, . . . = *Aglaonema Griffithii*.

- 59². 1. *AGLAONEMA*, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 892; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 53.

1. *acutispathum*, N. E. Br. . . 39 = *modestum*.
 a. *Griffithii*, Schott, Syn. Aroid. 123.—Malacca.
 1. *integrifolium*, Schott, . . . 20 = *oblongifolium*.
marantifolium, Blume, . . . 66 = *oblongifolium*.
nitidum, Kunth, . . . 56 = *oblongifolium*.
oblongifolium, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 892; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 53.—Malaya.
palustre, Teijsm. & Binn. . . 399 = *Griffithii*.

AGONIS.

- 59³. 1. *glabra*, Turcz. in Bull. Phys. Math. etc.

AGRIMONIA.

- 60¹. 1. *Eupatoria*, Thw.
 60². *javanica*, Jungh. Java, i. 664; et ex Miq. etc.
seylanica, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 37 = *Alchemilla indica*.

PAG.

AGROPYRON.

- 60³. a. *CYNOPHA*, Ehrh. Phytophyl. n. 72 (1780); Beitr. iv. (1789) 148.
 KRATZMANNIA, Opiz, Seznam, 56 (1852).
 1. *attenuatum*, Roem. & Schult.
 Caldesii, Goiran, etc.
 61¹. a. *Goiranicum*, Vis. ex Goiran, Pl. Vasc. Nov. Veron. (1874) 21.—Italia.
 1. *Roegnerii*, Boiss. . . (Raegnerii).
 61². a. *trachycaulon*, Hort. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 344 = *Richardsoni*.
 1. *violaceum*, Vasey, . . . = *Richardsoni*.

AGROSTEMMA.

- 61². a. *infesta*, Salisb. Prod. 304 = *L. Agrostemma*.

AGROSTIS.

- 61³. a. *abyssinica*, Ehrenb. & Hempr. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. ii. (1840) 54 = *Sporobolus robustus*.
aequalis, Ehrenb. & Hempr. (l. c.) 52 (= *Vilfa helvola*).—Arab.
 1. *altissima*, Tuckerm.
 62¹. 1. *brachystachys*, Schult. . . ii.
 62². *Carmichaelii*, Schult. . . ii.
 62³. a. *collina*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 6 (Quid ?).—Helv.
 1. *composita*, Poir. Encyc. Suppl.
congesta, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 46.—Afr. trop.
 1. *crinita*, R. Br. . . = *Dichelachne crinita*.
cylindrica, R. Br. . . = *Deyeuxia cylindrica*.

- 63¹. *divaricata*, Hort. ex DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 93, etc.
 a. *elatior*, Ehrenb. & Hempr. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. ii. (1840) 55 (= *Vilfa setulosa*).—Arab.
extensa, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 45.—Afr. trop.
 63². 1. *glutinosa*, Fisch. ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 58, etc.
 63³. *koelerioides*, E. Desv. . . 317 = *Deyeuxia anomala* ?

- 64¹. a. *Novae-Angliae*, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 44 = *elata*.
 64². 1. *patula*, Gaud. in Alpina, iii. (1808) 14;
 64³. *purpurea*, Gaud. (l. c.) 11;
Royleana, Trin. . . 125 = *Deyeuxia Royleana* (in Addend.).
 65¹. 1. *sciurea*, R. Br. . . = *Dichelachne sciurea*.
sesquiflora, E. Desv. . . 318 = *Deyeuxia sesquiflora*.
 a. *sesquivalvis*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 91, sphalm. = *prae*.
 65². a. *subspicata*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 67 (Quid ?).—Gallia.
 65³. 1. *seylanica*, Klein, . . . 83 = *Panicum sparsicomum*.

AICHRYSON.

- 66². 1. *pulchellum*, C. A. Mey. . . 55 = *S. pulchellum*.

AILANTHUS.

- 66³. a. *simplex*, Panch. ex Brongn. & Gris, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. iii. (1865) 231 = *Soulamea Pancheri*.
AINSLIAEA.
 66³. 1. *glumacea*, Sch. Bip. . . ; Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) i. 97, etc.
AIRA.
 67¹. a. *CARYOPHYLLEA*, Opiz, Seznam, 27 (1852).
 d. *PERIBALLIA*, Trin. (nunc *Deschampsia*).
 a. *SALMASIA*, Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 317.
 67². 1. *atropurpurea*, Wahlenb. . . 37 = *Deschampsia atropurpurea*.
 a. *brachyphylla*, Steud. Nom. ed. II. i. 766, in syn. = *Sporobolus tenellus*.
 1. *chinensis*, Retz. . . 10 = *Panicum megalanthum*.
 67³. *distichophylla*, Spreng. Nov. Prov. 47.
filiformis, Roxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 326.
 68¹. *hirsuta*, Schleich. ex Gaud. in Alpina, iii. (1808) 48.
Kingii, Hook. f. . . t. 135.

PAG.

AIRA :—

- 68². *neutralis*, Walp. Ann. i. 932, sphalm. = *australis*, Raoul.
 68³. *spicata*, Linn. . . 63 = *Panicum indicum*.
spicata, Linn. . . 64 = *Trisetum subspicatum*.
subtriflora, Lag. . . ii. iv. (1805).
 a. *subviolaceum*, Ehrenb. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. ii. (1840) 84 = *Sporobolus minutus*.
 1. *viatica*, Griff. . . 54 = *Panicum semialatum*.

AJUGA.

- 69³. 1. *BUGULA*, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
 a. *BULGA*, Linn. l. c. (1735).
 70¹. a. *caespitosa*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 6 = *pyramidalis*.
 1. *Chamaepitys*, Guss.
Chamaepitys, Schreb.
chia, Schreb.
humilis, Miq. . . 114 = *Lamium humile*.
 a. *laxa*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 109 = *Teucrium laxum*.
 70². *microphylla*, Hegetschw. Fl. Schw. 561 = *reptans* ?
 1. *rupestris*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 6 = *pyramidalis*.

AKENTRA.

- 70³. 1. *inflata*, Benj. l. c. = *U. Benjaminiana*.

ALAFIA.

- 70³. a. *landolphioides*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 708, in obs.—Afr. trop.

ALANGIUM.

- 70³. 1. *cordifolium*, Zoll. & Mor. . . 63 = *Marlea virgata*.

ALATERNUS.

- 71¹. 1. *sempervirens*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 176 =

ALBERTA.

- 71¹. a. *isosepala*, Baker, in Journ. Bot. xix. (1882) 138.—Madag.
 1. *laurifolia*, Baker, . . . 271 = *minor*.

- 71². 1. *ALBINEA*, Hombr. & Jacquinot, Bot. Voy. Astrol. et Zél. Dicot. Phan. t. 4 (1845); et ex Decne. etc.
oresigenesa, . . . = *P. criniferum*.

ALBUCA.

- 72². 1. *VIRDIKA*, Adans.

ALBUCEA.

- 72³. a. *neapolitana*, Montand. Guide Bot. 315 = *O. nutans*.

ALCHEMILLA.

- 73². a. *splendens* x, Christ, ex Gremli, Excurs. Fl. Schw. ed. II. 179.—Helvet.

- 73². a. *ALCHIMILLA*, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 184 (1742) = *prae*.

- 74². a. *ALEPYRUM*, Hieron. Centrolep. 103 (1873) = *Gaimardia*, Gaudich. (Centrol.).

ALISMA.

- 75³. d. *BALDELLIA*, Parl. (nunc *Echinodorus*).
NECTALISMA, Fourr. (nunc *Elisma*).

ALKANNA.

- 76³. 1. *syriaca*, Boiss. & Hohen.

ALLARDIA.

- 77². 1. *incana*, Klatt, . . . (1878) i. 88.

ALLIUM.

- 77³. d. *PERILOBA*, Rafin. . . 87 (nunc *Nothoscordum*).
 78¹. 1. *atropurpureum*, Waldst. & Kit. . . 17.—Hungar.; Reg. Cauc.; As. centr.
 78². *borbonicum*, Regel, . . . 218 = *Nothoscordum fragrans*.
 a. *calcareum*, Montand. Guide Bot. 317 = *ochroleucum*.
 79¹. 1. *Cyrelli*, Tenore, . . . *Graecia*

PAG.

ALLIUM :—

- 79³. *Gardinia*, Bert. . . 664 (= *Triteleia violacea*).
—Chili.
a. *graminifolium*, Montand. Guide Bot. 320 =
rotundum.
80¹. 1. *Grayi*, Regel,
80². a. *lilacinum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 392 =
rubens.
longistamineum, Royle (l. c.) (Quid ?).—Reg.
Himal.
80³. 1. *montanum*, F. W. Schmidt, . . . = *angulosum*.
81². a. *ovatum*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 65 (Quid ?).—
Gallia.
81³. *pratense*, Montand. Guide Bot. 317 = fallax.
Rakkjoo, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830)
16 = Bakeri.
1. *reticulatum*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 1,
nomen; et
82¹. a. *rubrifolium*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 65 (Quid ?).—
Gallia.
82². 1. *stellatum*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 2;
et

ALLMANIA.

- 83². a. *BELUTTA*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 39 (1836).

ALLOPLECTUS.

- 84². a. *splendens*, G. Don, ex Loud. Encyc. Pl. ii. 1402
= dichrous.

ALNUS.

- 84³. a. *DUSCHEKIA*, Opiz, Seznam, 38 (1852).
85¹. *elongata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 343, nomen
(Quid ?).—Reg. Himal.
1. *microphylla*, Arv. Add. Monog. Pilos. 20.—
Cf.
a. *obtusifolia*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 343,
nomen (Quid ?).—Himal.
ovata, Lange, ex Kjellm. in Nordensk. Vega-
Exped. Vidensk. Iatt. i. 555 = viridis.

ALOCASIA.

- 85². a. *SCHIZOCASIA*, Schott, in Bonplandia, x. (1862)
148.
illustris, Bull. Cat. (1873) 4; Flor. Mag. (1874)
107 = *Colocasia antiquorum*.
85³. 1. *Regina*, N. E. Br. . . 711; et in *Illustr. Hort.*
(1885) 11. t. 544.
a. *singaporensis*, Linden, ex Regel, *Gartenfl.* (1865)
252 (Quid ?).—Singapore.

ALOXYLUM.

- 88¹. 1. = Aq. *Agallocha* (bis in syn.).

ALOMIA.

- 88¹. d. *ORSINIA*, Bertol. (nunc *Clibadium*).
1. *Armani*, Baker, . . . 191 = *Clibadium rotundi-*
folium.

ALONA.

- 88¹. 1. *tomentosa*, Lindl. . . 46 = *Dolia tomentosa*.

ALOPECURUS.

- 88². a. *CERDOSURUS*, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
88³. 1. *caesius*, Schur, . . . syn. = *aristulatus*.
fulvus, Sm. . . t. 1467 = *aristulatus*.
89¹. *otiporensis*, Griff. . . 94 = *Phalaris minor*.
paludosus, Beauv. . . 481 = *aristulatus*.

ALOYSIA.

- 89². a. *triphylla*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 299 =
Lippia citriodora.

ALPHITONIA.

- 89³. 1. *zizyphoides*, A. Gray, . . . 278 = *excelsa*.

ALPHONSEA.

- 89³. a. *verrucosa*, Baill. Hist. Pl. i. 215 = *ventricosa*.

ALPINIA.

- 89³. d. *BOJERIA*, Rafin. (nunc *Amomum*).
1. *CENOLOPHON*, Blume, . . . Jav. i. 60 (1827).
alata, A. Dietr. . . China; Java.
90². a. *vittata*, Hort. Bull. ex Dallièr, Pl. Ornament.
i. t. 29.—Hab.?

ALSEODAPHNE.

- 90³. 1. *semecarpifolia*, Nees.

PAG.

ALSINASTRUM.

- 90³. a. *americanum*, Torr. & Gray, ex Rupr. Fl. Ingr.
197, in obs. = *E. americanus*.

ALSINE.

- 92¹. a. *subnivalis*, Hegetschw. Fl. Schw. 422 (Quid ?).
—Europ.

ALSODEIA.

- 92³. a. *DRIPAX*, Noronha, ex Thou. Hist. Vég. Afr. ii.
58 (1807).
93¹. 1. *Physiphora*, Mart.

ALSTROEMERIA.

- 94¹. 1. *exserens*, Meyen, Reise, i. 311.
94². *montana*, Ker-Gawl. in [Quart.] Journ. Roy.
Inst. i. (1816) 183;
pulchella, Sims, . . . t. 2353.
pulchra, Sims,

ALTENSTEINIA.

- 94³. 1. *nubigena*, Reichb. f. . . —Ecuador.
95¹. *pilifera*, H. B. & K. . . 73 (*Stenopterae* sp.).—
Ecuador.

ALTERNANTHERA.

- 95¹. a. *EVERION*, Rafin. Sylva Tellur. 124 (1838).
1. *argentata*, Moq. . . 352 = *Hebanthe parvi-*
flora?
dubia, H. B. & K. . . 209 = *Iresine canescens*.
frutescens, R. Br. . . syn. = *Telanthera frutes-*
cens?
glabra, Moq. . . 361 = *nodiflora*?
a. *grandiflora*, Moq. ex Benth. & Hook. f. Gen.
iii. 41 = *Hebanthe decipiens*.

ALTHAEA.

- 95³. 1. *Froloviana*, Fisch. . . 467 = *ficifolia*.
Kraussiana, Buching. . . xxvii.

ALTINGIA.

- 96¹. 1. *chinensis*, Oliver, etc.
caerulea, Poir. . . = *excelsa*.

ALVARDIA.

- 96². a. *arborea*, Welw. Apont. 590 = seq.
96². a. *ALWISIA*, Thw. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc.
iii. (1838) 42, in obs. = *Taeniophyllum*,
Blume (Orchid.).
minuta, Thw. ex Lindl. l. c. = *T. Alwisii*.

ALYSICARPUS.

- 96². 1. *cylindricus*, Desv. in Mém. . . = *rugosus*.

ALYSSOPSIS.

- 96³. 1. *sagittata*, Boiss. . . = *deflexa*.

ALYSSUM.

- 97¹. 1. *Besseri*, Stev.
97³. *filifolium*, Wahlenb. in Bergg. Resor. ii. Bihang,
54.

ALYXIA.

- 99¹. 1. *actinophylla*, A. Cunn. . . = *Alstonia verti-*
cillosa.

AMAIOUA.

- 99². a. *fusifera*, *genipoides*, *oocarpa*, *pallens*, *petiolaris*.
Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 82 =
Duroia spp.?
1. *saccifera*, Mart. . . 91 = *Duroia saccifera*.
surinamensis, Steud. . . 763 = *Duroia surina-*
mensis.

AMALIA, Reichb.

- 99². a. *acuminata*, *albida*, *anceps*, *aurantiaca*, *autum-*
nalis, *cinnabarina*, *flava*, *fulva*, *furfuracea*,
Galeottiana, *gigantea*, *grandiflora*, *majalis*,
peduncularis, *Perrinii*, *purpurea*, *rubescens*,
superbiens, Heynh. Nom. ii. 29, omnes
Laeliae homonymae.

AMANOA.

- 99³. 1. *brasiliensis*, Baill. . . (= *Gonatogyne brasi-*
liensis).—Bras.

AMARANTHUS.

- 100¹. a. *Berchtholdi*, Hort. ex Mart. in Nov. Act. Nat.
Cur. xiii. (1826) 290 (Quid ?).—Hab.?
100². 1. *emarginatus*, Salzmann.
100³. a. *miniatus*, Hort. Avign. ex Hook. f. Fl. Brit.
Ind. iv. 721 = *A. Blitum*.

PAG.

AMARYLLIS.

- 101³. 1. *andicola*, Poepp. . . —Chili.
a. *Carnarvoniana* x, DC. Pl. Rar. Hort. Genev.
t. 9.
102². *Harrisonii*, Bury, Hexand. Pl. 27 = *Hippeas-*
trum solandriiflorum.
Johnsoni, Bury, (l. c.) t. 1 = *Hippeastrum*
solandriiflorum.
marmorata x, Hort. ex C. Morr. Ann. Bot. Gand,
i. (1845) 148. t. 16.
Mendeli, Hort. ex Flor. Mag. (1875) t. 167
= *Hippeastrum Reginae*.
102³. *picta*, Bury, Hexand. Pl. t. 5 = *Hippeastrum*
solandriiflorum.

AMBERBOA.

- 103². 1. *xanthocephala*, DC. l. c. 561 = *Centaurea*
xanthocephala.

AMBLYOPOGON.

- 104². a. *aristata*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 66 = *Cent.*
aristata.
integrifolia, Boiss. (l. c.) = *Cent. integrifolia*.
microcephala, Boiss. (l. c.) = *Cent. micro-*
cephala.

AMBROSIA.

- 105¹. a. *purpurascens*, Tenore, Ind. Ser. Hort. Neap.
(1825) 1.—Hab.?

AMBULIA.

- 105¹. a. *ebracteata*, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit.
Ind. iv. 268 = *L. hirsuta*.

AMELANCHIER.

- 105². 1. *PERAPHYLLUM*, Nutt. (nunc genus proprium).
105³. 1. *AMERIMNON*, P. Br. . . = *Dalbergia*,
Linn. f. (Legumin.).

- 105³. a. *AMERIMNUM*, Scop. Introd. 305 (1777) =
praec.

AMIANTHIUM.

- 106¹. in syn. lege *Z. muscitoxicus* (bis).

AMMANNIA.

- 106². a. *DITHECA*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 615 (1855).
EUTELIA, R. Br. ex DC. Prod. iii. 76, in syn.
(1828).
MIRKOOA, Wight, Ic. i. t. 217, in textu
(1840).
NESOEAE, Wight, (l. c.) (1840).
auriculata, Rafin. Atl. Journ. 146 (Quid ?).—
Am. bor.

AMMI.

- 107². a. *paucifolium*, Steud. Nom. ed. II. ii. 592, in syn.,
sphalm. = *indicum*.
1. *trachycarpum*, C. A. Mey. ex Boiss.

AMOGETON.

- 108¹. 1. = *Aponogeton*, Linn. (Naiad.).

AMOMUM.

- 108¹. a. *BOJERIA*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 50 (1836).
1. *DIRACODES*, Blume, . . . (1827).
GEANTHUS, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Buitenz.
29 (1823); et
108². *echinatum*, Willd. Sp. Pl.
medium, Lour. . . 4 = *Alpinia alba*.

AMORPHA.

- 109². a. *BONAFIDIA*, Neck. Elem. iii. 46 (1790).
1. *canescens*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 4,
nomen.
nana, [Nutt. in] . . . n. 5, nomen.

AMORPHOPHALLUS.

- 109³. a. *DUNALIA*, Montr. in Act. Soc. Linn. Bord. xxvi.
(1866) 576.
1. *difformis*, Blume, . . . 149 = *Anchomanes*
Hookeri.
Konjac, C. Koch, . . . 166.—Cochinch.; Japon.
Lacourii, Linden & André, . . . 90. t. 316 =
Pseudodracontium Lacourii.
Peyri, Linden.—Cf.
Rivieri, Dur. . . 15 = *A. Konjac*.

AMPHIBOLIS.

- 110³. d. *GRAUMUELLERA*, Reichb. (nunc *Cymodocea*).

PAG.

AMPHIDONAX.

- 111¹. 1. *tenella*, Wight & Arn. . . 197 = *Z. elegans*.

- 111³. 1. AMPHISTELMA, Griseb. . . (1861).
salinarum, Wright, . . . 175 = *V. salinarum*.

AMPHITHALIA.

- 112¹. 1. *spinosa*, Steud. . . = *Coelidium spinosum* (in Addend.).

AMYGDALUS.

- 112³. 1. *arabica*, Olivier, Voy. Atlas, t. 47.—Arab.

AMYRIS.

- 113¹. 1. *acuminata*, DC. Prod. ii. 78, in syn. (= *Icica acuminata*).—Guian.

ANABASIS.

- 114¹. a. *ramosissima*, Boiss. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 70 = *Haloxylon ramosissimum*.

ANACAMPSEROS.

- 114². 1. *paucidens*, Haw. . . 242 = *S. paucidens*.

ANACHARIS.

- 115¹. 1. *callitrichoides*, Rich. . . 2 = *E. callitrichoides chilensis*, Planch. l. c. = *E. chilensis*.
Matthewsii, Planch. . . 73 = *E. chilensis*.

ANADENIA.

- 115³. 1. *Manglesii*, R. Grah. . . 337 = *G. glabrata*.

ANAGALLIS.

- 116¹. 1. *caerulea*, Schreb. Fl. Lips. (1771) 5; Lam. *parviflora*, Loisel. . . 401.

ANALECTIS.

- 116². a. *speciosa*, Vahl, in Danske Nat. Selsk. Skrivt. vi. (1810) 94 = *S. involucreatum*.

ANAMIRTA.

- 116². 1. *Baueriana*, Endl. . . = *paniculata*.
flavescens, Miq. . . = *paniculata*.

- 116². 1. ANAMOMIS, Griseb. . . (1860).

ANANTHERIX.

- 116³. 1. *Nuttalliana*, G. Don,
pumila, Nutt. . . l. c. = *Podostigma pubescens*.

ANAPHALIS.

- 117¹. a. MARGARITARIA, Opiz, Seznam, 63 (1852).
1. *aristata*, DC. l. c. 274.

ANARRHINUM.

- 117². 1. *pedicellatum*, T. Anders. . . 26 = *Schwein-furthia pedicellata*.

ANAXAGOREA.

- 118². a. *canescens*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 314, 315.
—Afr. trop.

- 119¹. 1. *ciliata*, Cham. . . 400 = *Moritzia ciliata*.
a. *confertiflora*, DC. Prod. x. 55 = *Lycopsis confertiflora*.
1. *dasyantha*, Cham. l. c. 437 = *Moritzia dasyantha*.

ANCHUSA.

- 119¹. 1. *flava*, Forsk. . . 40.—Arab.
119². 1. *Sellowiana*, Cham. . . 115 = *Moritzia Sellowiana*.

- 119³. 1. ANCISTROCARPHUS, A. Gray, . . . 355 = *Stylocline*, Nutt. (Compos.).
flagineus, A. Gray, . . . 356 = *S. filaginea*.

ANCYLOGYNE.

- 120². 1. *longiflora*, Hook. . . t. 5588 = *S. longiflora*.
munita, Nees, l. c. = *S. munita*.

ANDERSONIA.

- 120². 1. *Homalostoma* (non *homalostoma*).
120³. *subsessilis*, Panch. . . 67 = *Leucopogon subsessilis*.

ANDERSONIA, Roxb.

- 120³. a. *Rohitoca*, Griff. Notul. iv. 507, err. typ. = seq.

ANDRACHNE.

- 121¹. 1. *fruticosa*, Linn. Sp. Pl. 1014 (= *Melanthesopsis fruticosa*).—China.
121². *rotundifolia*, Eichw. . . = *A. Telephioides*.
Telephioides, Linn. (non *telephioides*).

VOL. II.

PAG.

ANDRIAPETALUM.

- 121². 1. *polystachyum*, Schott,

ANDRIEUXIA.

- 121². 1. *quitensis*, Benth. . . 206 = *Gymnolomia quitensis*.

ANDROMACHIA.

- 122¹. 1. *sessiliflora*, H. B. & K. etc.
sessilifolia, DC. Prod. v. 96, sphalm. = praec.

ANDROMEDA.

- 122¹. 1. *campanulata*, Miq. . . = *Enkianthus campanulatus*.

- 122². a. *cordata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 258 = *Pieris ovalifolia*?

1. *coriifolia*, Thunb. Pl. Bras., etc.

- 122³. 1. *japonica*, Thunb. . . = *Pieris ovalifolia littoralis*, Steud. . . 88 (*Agauriae* sp.).—Malaya.

- 123¹. 1. *revoluta*, Bouton, . . . 603 = (*Agauriae* sp.).—Madag.

- a. *rupestris*, R. Cunn. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 49 = *Gaultheria antipoda*.

ANDROPOGON.

- 123³. 1. *anthistirioides*, et *anthistirioides*.

- 124¹. *aristulatus*, Hochst.

- 125³. d. *guineensis*, Steud.

- 126¹. 1. *Iwarancusa*, Jones, in As. Res. iv. (1795) 109.
—Ind. or.; Afr. trop.

- 126². *montanus*, Roxb.

- 126³. *nutans*, Linn.

- peduncularis*, Baker, . . . 444.—Ins. Borbon.

- pilosus*, Klein, . . . 920 = *Ischaemum pilosum*.
Pseudograyi, *Pseudohirtus*, *Pseudoischaemum*.

- 127². d. *Schoenanthus*, Benth.

- 127³. a. *stypticus*, Welw. Synopse, 27 (Quid ?).—Afr. trop.

1. *speciosus*, Steud. . . 375 (*Rottbolliae* sp.).—Reg. Himal.

- 128¹. a. *Trachypogon*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 417, nomen (Quid ?).—Reg. Himal.

- tristis*, Royle, (l. c.) nomen (Quid ?).—Reg. Himal.

- 128². 1. *virginicus*, Linn.

ANDROSACE.

- 128². a. *aretioides*, Hegetschw. Fl. Helv. 187.—Helvet.

- 129¹. *nidulans*, Koyle, Illustr. Bot. Himal. 310, nomen (Quid ?).—Reg. Himal.

- reptans*, Royle, (l. c.) nomen (Quid ?).—Reg. Himal.

ANDROSAEMUM.

- 129². 1. *Cambessedesii*, Cass. . . 131 = *H. Cambessedesii*.

ANDROTRICHUM.

- 129². a. *montevidense*, Steud. Nom. ed. II. i. 587, in syn. = seq.

ANDRYALA.

- 129³. a. *rosea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 779, in syn., sphalm. = *A. Rothia*.

ANEILEMA.

- 130³. 1. *tacazezanum* (bis).

ANEMONE.

- 131². d. *ambigua*, (sphalm. pro *Pulsatilla*).

- 132². 1. *thalictroides*, Linn. . . 542 = *Thalictrum anemonoides*.

- 132³. a. *Zichyi*, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1863) 317 = *pratensis*.

- 132³. 1. ANEMONOPSIS, Pritz. . . = ANEMOPSIS, Hook. = *Houttuynia*, Thunb. (Piperac.).

- 132³. a. ANEMONOSPERMOS, Boerh. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 192 (1760); Adans.

ANETANTHUS.

- 133¹. 1. *alata*, Benth. & Hook. f.

ANGELICA.

- 133². a. *Physolophium*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) ii. 728.

- 133³. *decursiva*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 187 = *Peucedanum decursivum*.

PAG.

ANGELONIA.

- 134². 1. *lobelioides*, Mart. Reise Bras. i. 397, nomen;

ANGIANTHUS.

- 134³. 1. *Pleuropappus*, Benth. (non *pleuropappus*).

- 134³. 1. ANGOSTURA, Roem. & Schult. . . (1819) = *Cusparia*, Humb. (Rutac.).
Cuspare, Roem. & Schult. l. c. = *C. febrifuga*.

ANGRAECUM.

- 135¹. a. GUSSONEA, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 67.

- crenatum*, Reichb. f. ex Williams, Man. Orchid. ed. VI. 115.—Afr. trop.

- crystallinum*, Henshall, Pract. Treat. Orchid. 106 (*chrysalinum*), nomen.—Afr. trop.

1. *falcatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 237, in obs.

- 135². *jamaicense*, Reichb. f. & Wulfschl.

- a. *Leonii*, André in Rev. Hort. (1885) 294 = *Humblotii*.

- Leonis*, Hort. . . . *Humblotii*.

ANGULO.

- 136¹. 1. *squalida*, Poepp. & Endl. . . 74 = *Lycomormium squalidum*.

ANGURIA.

- 136². d. *Warmingii*, Cogn. l. c.—Bras.

ANHALONIUM.

- 136². 1. *areolosum*, Lem. . . 35 = *M. areolosa*.
fissipedum, Monv. . . = *sulcatum*.

- Kotchubeyi*, Lem. . . = *M. sulcata*.

ANIA.

- 136³. 1. *angustifolia*, Lindl. . . n. 3740 = *Tainia angustifolia*.

- 136³. 1. ANIBA, Aubl. Pl. Gui. 327 (1775). LAURINEAE.

- guianensis*, Aubl. l. c.—Guian.

- 136³. insere, ANIL, March. ex Ludw. Defin. Pl. 117 (1737) = *Indigofera*, Linn. (Legumin.).

ANISANTHUS.

- 137¹. 1. *abyssinicus*, Klatt, . . . xv. (non xii).
huillensis, Klatt, . . . xv.

ANISEIA.

- 137¹. 1. *aurea*, Kellogg, . . . 83 = *I. aurea* (in Addend.).

ANNESORHIZA.

- a. *caffra*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 902.—Afr. austr.

1. *capensis*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 399.—Afr. austr.

ANOECTOCHILUS.

- 140². 1. *sandwicensis*, Lindl. . . 500 = *Vrydagzynea sandwicensis*.

ANOMATHECA.

- 140³. 1. *calamifolia*, Klatt, . . . xv.
xanthospila, Ker-Gawl. in [Quart.] Journ. Roy. Inst. i. (1816) 171 = *Freesia xanthospila*.

ANOMOCARPUS.

- 140³. 1. *tenuifolius*, Miers, . . . = *C. tenuifolia*.

ANONA.

- 141¹. 1. *conophylla*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 58, sphalm. = *ionophylla*.

- 141². a. *Kraussiana*, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 69 = *Oncoba Kraussiana*.

1. *polycarpa*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 32 = *Xylopia polycarpa*.

- 141³. a. *uncata*, Baill. Hist. Pl. i. 232 = *Artabotrys odoratissimus*.

- 143¹. 1. ANSERINA, Dum. . . *Chenopodium*, Tourn.

- a. *betaefolia*, Montand. Guide Bot. 264 = *C. polyspermum*.

- candicans*, Montand. (l. c.) 262 = *C. album*.

- ficifolia*, Montand. l. c. 264 = *C. ficifolium*.

- foetida*, Montand. l. c. = *C. Vulvaria*.

- muralis*, Montand. (l. c.) 263 = *C. murale*.

- opulifolia*, Montand. l. c. = *C. opulifolium*.

- stramonifolia*, Montand. l. c. = *C. hybridum*.

- urbica*, Montand. l. c. = *C. urticum*.

- PAG. **ANTENNARIA.**
 143¹. l. *andina*, A. Gray, . . . 138 = *Mniodes andina*.
linearifolia, Wedd. . . 150 = *Leontopodium*
linearifolium.
magellanica, Sch. Bip. . . 117 = chilensis.
 143². l. *monoica*, Wedd. . . 150 = *Leontopodium monoi-*
cum.
 143³. l. **ANTHÉEISCHIMA.**
- ANTHEMIS.**
 144¹. l. **LYONNETIA**, Cass. . . xxxiv. 166 (1825).
 144². a. *comosa*, Peterm. Fl. Bienitz, 42 (Quid ?).—
 Europ.
coronata, Peterm. (l. c.) 43 (Quid ?).—Europ.
 144³. l. *discoidea*, Willd.
 145². *parthenoides*, Bernh.
 145³. *salvifolia*, Boj. . . 3 = *Sphacophyllum mada-*
gascariense.
- ANTHERICUM.**
 146². l. **LILIAGO**, [Caesalp.] Linn. Class. Pl. 22
 (1747); Salisb., etc.
 d. **BLEPHANTHERA**, Rafin. (nunc *Bulbine*).
 147². l. *pomeridianum*, Ker-Gawl. in [Quart.] Journ.
 Roy. Inst. i. (1816) 181; et Bot. Reg.
 147³. *Rossii*, Hook. f.
 a. *striatellum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 228, sphalm.
 = *Allium striatellum*.
 l. *subtrigynum*, Jacq. . . = *Zygadenus musci-*
toxicus.
- ANTHISTIRIA.**
 148². l. *anathera*, Nees, in Royle, *Illustr. Bot. Himal.*
 417.—Ind. or.
 Forskålili, Kunth, . . . 162.—Arab.
 148³. a. *semiberbis*, Nees, Fl. Afr. Austr. 125 = ciliata.
- ANTHOCEPHALUS.**
 148³. a. **PLATANOCEPHALUS**, Vaill. ex Crantz, Inst. i.
 349 (1766).
 149¹. post **ANTHOCHLAMYDAM**, pone
- ANTHOCHLOA**, Nees & Meyen, Reise, ii. 14
 (1845); et in Lindl. *Introd. Nat. Syst. ed. II.* 450
 (1836); *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii.
 1189.
lepida, Nees & Meyen, in *Nov. Act. Nat. Cur.*
 xix. *Suppl.* i. (1843) 165.—Peruv.; Boliv.
lepidula, Nees & Meyen, Reise, ii. 14 = praec.
rupestris, Remy, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.*
 vi. (1846) 347.—Bolivia.
- ANTHOCOMA.**
 149¹. l. *flavescens*, Zoll. & Mor. . . 570 = *Cymaria*
acuminata.
- ANTHODON.**
 149². l. *Selloanum*, Schult. . . 411 = *S. brasiliensis*.
 a. *Wrightianum*, Miers, ex Triana & Planch. in
Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 372, in
 nota = *H. malpighiaefolia*?
- ANTHOLYZA.**
 149². l. *bicolor*, Gasparr, in *Ann. Civ. i.* (1833) 118, etc.
- ANTHOSPERMUM.**
 150¹. l. *Crocylis*, Sond. . . 32 = *Crocylis antho-*
spermoides.
- ANTHURIUM.**
 152¹. a. *laciniatum*, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol.
 (1855) 4 = *podophyllum*.
 153¹. a. post **ANTHURIUM** pone
ANTHYLLIS, Adans. Fam. ii. 271 (1763) =
Polycarpaea, Lam. et *Polycarpon*, Loeff.
 (Caryoph.).
- ANTHYLLIS.**
 153². a. *rubriflora*, Hegetschw. Fl. Schw. 693.—Helvet.
 153³. lin. lma l. **ANTHYLLIS**.
- ANTIARIS.**
 153³. a. **TOXICARIA**, Aepnel. ex Steud. Nom. ed. I.
 434, in syn. (1821).
- ANTICHARIS.**
 153³. a. *scoparia*, Hiern, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii.
 928.—Afr. austr.
- PAG. **ANTIDESMA.**
 154¹. a. *glabella*, Koen. ex Benn. Pl. Jav. Rar. 192
 (Quid ?).—Java.
 155¹. **ANTIRRHOEA** (ponitur post **ANTIRRHI-**
NUM).
 155². l. *borbonica*, J. F. Gmel. ex C. DC. in DC. Monog.
 Phan. i. 43 = *Quivisia Sieberi*.
 a. *borbonica*, J. F. Gmel. Syst. i. 244.—Ins.
 Borbon.
- ANTIRRHINUM.**
 155¹. a. **SACULARIA**, Kellogg, in Proc. Calif. Acad.
 ii. (1863) 17.
 155³. l. *elatiniflorum*, Wahlenb. in Bergg. Resor. ii.
 Bihang, 37;
glandulosum, Kellogg, ex Curran, in Bull.
 Calif. Acad. i. III. (1885) 144 = *vexillo-*
calyculatum.
 a. *glutinosum*, Brot. Phyt. Lusit. i. 129 = *Linaria*
filifolia.
 156². l. *Nuttallianum*, Benth.
- ANTITAXIS.**
 157¹. l. *longifolia*, Miers, . . . 357 = *Pycnarrhena longi-*
folia.
 157¹. a. **ANTOCHLOA**, Nees & Meyen, in Lindl. *Introd.*
Nat. Syst. ed. II. 450 (1836) = *Anthochloa*,
 Nees & Meyen (Gramin.).
 157². l. **ANTONIANA**, Tuss. Fl. Antill. ii. 62. t. 16
 (1818) = *Faramea*, Aubl. (Rubiace.).
- ANTROLEPIS.**
 157². l. *leucocephala*, Welw.
- ANYCHIA.**
 157². d. **BUINALIS**, Rafin. (nunc *Paronychia*).
- APALOCHLAMYS.**
 157³. a. *spectabilis*, Steud. Nom. ed. II. i. 255, in syn.,
 sphalm. = *Cassinia spectabilis*.
- APERA.**
 158³. a. *Liebmanni*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1153,
 sphalm. = *Deyeuxia Liebmanni*.
- APERULA.**
 159¹. a. *lucida*, Blume, . . . 366 (= *Litsea lucida*).—
 Java.
 l. *oxyphylla*, Blume, l. c.—Ins. Penang.
- 159³. l. **APHANOCHAETA**, A. Gray, . . . (1857) =
Pentachaeta, Nutt. (Compos.).
exilis, A. Gray, l. c. 100 = *P. exilis*.
- APHELANDRA.**
 159³. d. **HEMITOME**, Nees, et **SYNANDRA**, Schrad.
 (nunc *Stenandrium*).
 l. *Hydromestus*, Hemsl.
 160¹. l. *mediaurata*, Cogn. & March. in *Dallière*,
pumila, Bull. Cat. n. 143 (1878) 4; *Bot. Mag.*
 t. 6467.—Bras.
- APHYLLOCLADUS.**
 160². l. *spartioides*, Wedd. l. c. = *H. spartioides*.
- APHYLLON.**
 160³. l. **GYMNOCAULIS**, Nutt. in Journ. Acad. Philad.
 N. S. i. (1847) 180.
- APIUM.**
 161². l. **CICLOSPERMUM**, Lag. . . (1821).
 a. *decumbens*, Soland. ex Forst. f. in Comm.
 Gotting. ix. (1789) 45 (Quid ?).—Reg.
 Magell.
- APLOPAPPUS.**
 162¹. l. **ACAMPTOPAPPUS**, A. Gray,
 a. **ERICAMERIA**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.
 N. S. vii. (1841) 318.
 162². l. *ericoides*, DC. . . 346.
 162³. l. *junceus*, Greene, . . . IV. (1884).
nevadensis, Kellogg, . . . 9 = *acaulis*.
- APODYTES.**
 164³. a. **HEMILOBIUM**, Welw. Synopse, 20 (1862).
- APOLLONIAS.**
 165¹. l. *Barbusana*, R. Br.
- PAG. 166¹. l. **APOZIA**, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi.
 (1837) 328.
chamaedryoides, *herniariodes*, *serpyllacea*,
 Willd. ex Benth. l. c.
- APPENDICULA.**
 166¹. l. *membranacea*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr.
Nederl. Ind. v. (1853) 491; et in *Nederl.*
Kruidk.
- ARABIS.**
 168¹. d. **PILOSELLA**, Kostel. (nunc *Sisymbrium*).
 168³. d. *Dregeana*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 103 =
perfoliata.
 168³. a. *Ermani*, Kjellm. in Nordensk. Vega-Exped.
 Vidensk. Iakt. i. 537 = *Parrya Ermani*.
 169². a. *parryoides*, Kjellm. (l. c.) = *Parrya Ermani*.
- ARACHNITES.**
 170³. a. *limbata*, Link, Handb. i. 247 = *O. limbata*.
 l. **ARACHNOPOGON**, Berg, . . . = *Hypo-*
choeris, Linn. (Compos.).
 l. *heterospermum*, Berg, l. c. = *H. glabra*.
- 171¹. a. **ARAGALLUS**, Neck. Elem. iii. 12 (1790) =
Astragalus, Tourn. (Legumin.).
 171¹. a. **ARAGO**, Endl. Ench. 340 (1841), sphalm. =
 seq.
 171¹. a. **ARAGOA**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii.
 154 (1818). *SCROPHULARINEAE*, Benth.
 & Hook. f. ii. 975.
abietina, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 156.
 t. 217.—N. Granat.
cupressina, H. B. & K. l. c. 156. t. 216.—
 N. Granat.
juniperina, H. B. & K. ex Steud. Nom. ed. II.
 i. 118 = *cupressina*.
lycopodioides, Benth. ex Oliver, in Hook. Ic.
 Pl. t. 1325.—N. Granat.
- ARALIA.**
 171¹. a. **GINSENG**, Wood, Am. Bot. & Flor. 142 (1871).
 171². *elegans*, Linden, ex Decne. & Planch. in Rév.
Hortic. Sér. IV. iii. (1854) 108 = *Oreopanax*
elegans.
 171³. *parasitica*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl.
 Nep. 138 = *Pentapanax parasiticum*.
Reginae, Linden, ex André, *Illustr. Hortic.*
 (1879) 25. t. 337.—N. Caled.
 172¹. l. *trigyna*, Gaudich. . . = *Panax Gaudichaudii*.
- ARCTUM.**
 173³. l. *nemorosum*, Lej. in Court. Mag. Hortic. 289;
 ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. iii. 129.—
 Europ.
- ARCTOSTAPHYLOS.**
 174¹. l. *alpina*, Spreng. . . Reg. bor. et arct.
- ARCTOTIS.**
 174². l. **ANEMONOSPERMOS**, Boerh. ex Boehm. in
 Ludw. Def. Gen. Pl. 192 (1760); Adans.
 a. *acaulis*, Brot. Fl. Lusit. i. 401 = *Cryptostemma*
calendulaceum.
- ARDISIA.**
 175². a. **STRANGULA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v.
 (1790) ed. I. Art. IV. 4.
 175³. l. *Blumei*, DC.
 176¹. l. *fuliginosa*, Blume, . . . 692 = *Pimelandra fuli-*
ginosa.
 177¹. l. *scrobiculata*, Seem. . . 150.—N. Hebr.; N.
 Caled.
 177². l. *Teysmanniana*, Scheff. . . 253 = *Pimelandra*
Teysmanniana.
- ARECA.**
 177². l. *Alicae*, F. Muell. in Gard. Chron. (1879) i.
 760; et in *Gartenfl.*
 177³. a. *gigantea*, Reinw. Reise Ind. Arch. 500 = *Gulubia*
moluccana.
minor, W. Hill, ex F. Muell. *Fragm. viii.* 235
 = *Kentia minor*.
- ARENARIA.**
 178². a. **DUFOUREA**, Gren. in Act. Soc. Linn. Bord. ix.
 (1837) 25.
Allionii, Raensch. Nom. ed. III. 130, nomen
 (Quid ?).—Italia.

PAG.

ARENARIA:—

- 179¹. l. *Cerviana*, Cham. & Schlecht.
 180¹. a. *massiliensis*, Fenzl, ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 262 = A. Gouffiea.
miquelonensis, La Pylaie, ex Lebel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 58 = *Spergularia miquelonensis*.
 181¹. l. *sedoides*, Froel. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 794, in syn.—Tyrol.
 181². a. *Spergula*, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 538 = *Spergula arvensis*.
sperguloides, Mutel, Fl. Fr. 165.—Europ.
 1. *triandra*, Schrank, . . . t. 30.
 181³. l. *viscida*, Hall. f. ex Loisel.

ARGITHAMNIA.

- 182³. a. *ODOTALON*, Rafin. Sylva Tellur. 66 (1838).

ARGOSTEMMA.

- 183¹. a. *javanicum*, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 117. t. 39. f. D.—Jav.

- 183². l. *ARGUSIA*, Amm. ex Linn. Hort. Upsal. 36 (1748) = seq.

- 183². l. *ARGUZIA*, Rafin. Sylva Tellur. 167 (1836); Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1851) i. 558 = *Tournefortia*, Linn. (Borag.).

ARGYLIA.

- 183². a. *OXYMITUS*, Presl, Bot. Bemerk. 92 (1844).
tenuifolia, Presl, (l. c.) 93, in obs. = *canescens*.

ARGYREIA.

- 183³. l. *festiva*, Wall. . . . 76 = *Lettsomia festiva*.

ARGYROLOBIUM.

- 184². a. *LOTOPHYLLUS*, Link, Handb. ii. 156 (1831), nomen prius.

ARISAEMA.

- 185³. a. *Dioscoridis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 407 = *Arum Dioscoridis*.
 1. *nepenthoides*, Mart. in Flora, xv. (1831) II. 458, 459; et ex
speciosum, Mart. (l. c.); et ex
utile, Hook. f. ex Schott, Prod. Aroid. 30.

ARISARUM.

- 186¹. a. *multicarinatum*, Wall. ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 406.—Reg. Himal.

ARISTEA.

- 186¹. a. *corymbosa*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 701.—Afr. austr.

ARISTIDA.

- 181²–188¹. l. *passim*, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1843).
 186². l. *barbicollis*, Trin. & Rupr. . . . 152.—Afr. austr.
 186³. *cyanantha*, Steud. Nom. ed. II. ii. 131; *Syn. divaricata*, Lag. Gen. & Sp. Nov. 3.
 187¹. l. *hirtigluma*, Steud. . . VI. Sc. Nat. v. (1842) 171.—Afr. trop.
hystricula, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 208.—Ind. or.
 187². a. *longiflora*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 48.—Afr. trop.
 187². a. *mallica*, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 209 = *funiculata*.
 188¹. a. *submucronata*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 47.—Afr. trop.
 1. *trichodes*, Steud. Syn. Pl. Gram. 140 = *Cumin-giana*.

ARISTOLOCHIA.

- 188². l. *aethiopica*, Welw. . . . 548 = *albida*.
 a. *arborea*, Linden, Cat. n. 13 (1858) 6; Hook. f. Bot. Mag. t. 5295.—N. Granat.
 1. *Bonplandii*, Tenore, in Rendic. Acc. Sc. Nap. i. (1842) 345; et ex
 188³. a. *dodecandra*, Rafin. Med. Fl. i. 62 = A. *Serpentaria*?
 189¹. a. *hyperborea*, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 53.—Hab.?
 190¹. l. *ringens*, Vahl, . . . —Ind. occ.
 190². insere *ARISTOTELIA*, Comm. ex Lam. Encyc. i. 349 (1784) = *Terminalia*, Linn. (Combret.).

PAG.

ARMENIACA.

- 190³. l. *Mume*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 69; De Vriese,

ARMERIA.

- 191¹. l. *Pseudo-armeria*, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 365 = *latifolia*.

- 191². a. *ARMOLA*, Montand. Guide Bot. 261 (1868) = *Atriplex*, Tourn. (Chenop.).
campestris, Montand. l. c. = *Atr. patula*.
deltoidea, Montand. l. c. = *Atr. hastata*.
mixta, Montand. l. c. = *Atr. patula*.

ARMORACIA.

- 191³. a. *americana*, Hook. & Arn. Brit. Fl. ed. VI. 28, in nota = *Nasturtium lacustre*.
natans, Hook. & Arn. l. c. = *Nasturtium natans*.

ARNEBIA.

- 192¹. a. *tetrastigma*, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 56 = *tinctoria*.

ARNICA.

- 192¹. l. *austriaca*, [Hoppe] Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 462 =

ARRACACIA.

- 193³. a. *arguta*, Benth. & Hook. f. ex S. Wats. Bibliog. Ind. Bot. N. Am. 419.—Am. bor.

- 193³. insere *ARRASCHKOOLIA*, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 144 = *ARASCHCOOLIA*, Sch. Bip. = *Geigeria*, Griessel. (Compos.).

ARRHENATHERUM.

- 193³. l. *kentuckense*, Torr. Fl. U. St. 131, in nota.

ARRHOSTOXYLUM.

- 194¹. a. *grandiflorum*, Nees, in DC. Prod. xi. 158 = *R. grandiflora*.

ARROZIA.

- 194¹. l. *micrantha*, Schrad. l. c. = *L. micrantha*.

ARTEMISIA.

- 195³. a. *DRACUNCULUS*, [Rupp.] Ledeb. Fl. Ross. ii. 566, in syn., cum cit. falsa (1846).
 196¹. l. *Absinthium*, Linn. . . —Geront temp.
 196². d. *campestris*, Ledeb.
 196³. a. *doonense*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 250 = *A. Absinthium*.
 197². a. *Ibukijomogi*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 70 = *vulgaris*.
 197³. l. *kohatica*, Klatt, . . . (1878) i. 91.
 198³. l. *pedemontana*, Balb. in Mém. Acad. Taur. (1810) reimpr. 21. t. 3;
 199¹. l. *Schlagintweitiana*, Klatt, . . . (1878) i. 90.
 199³. a. *trifida*, Pav. ex Delpino, Studi Artemis. 64 (= *Xanthidium rhombophyllum*).—Peruv.

ARTHAXON.

- 200¹. l. *PSILOPOGON*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 20.

ARTHROSOLEN.

- 200³. a. *TRIMEIANDRA*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836).

ARTHROSTEMA.

- 201¹. a. *Humboldtianum*, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1844) 11.—Cf. Linnaea, xviii. (1844) 504 = *Monochaetum Humboldtianum*.

ARTOCARPUS.

- 201³. l. *exculpta*, Hort. . . . 84 = *Ficus exculpta*.

ARTROLOBIUM.

- 202¹. a. *parviflorum*, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 304 = *Coronilla parviflora*.
repandum, Desv. (l. c.) = *Coronilla repanda*.

ARUBA.

- 202². l. *guianensis*, Aubl. l. c. = *S. guianensis*.

ARUM.

- 202². l. *bulbiferum*, Roxb. . . = *Amorphophallus bulbifer*.
 202³. a. *compressum*, G. Don, in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 344 (= *Corynophallus Afzelii*?).—Afr. trop.

PAG.

ARUM:—

- 202³. a. *crinitum*, Ait. . . = *Helicodiceros crinitus*.
 203¹. *hastatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 406, nomen (Quid?).—Ind. or.
insignifolium, Royle, l. c. nomen (Quid?).—Ind. or.
 1. *integrifolium*, Link, . . . 394 = *Aglaonema oblongifolium*.

ARUNDINA.

- 204¹. l. *pulchella*, Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. v. (1853) 492; et in
speciosa, Blume, . . . 73 = *densa*.

ARUNDINELLA.

- 204². l. *flammida*, Trin. . . . 267 = *Trichopteryx flammida*.
 a. *gigantea*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 293 (Quid?).—Ind. or.
 204³. l. *holcoides*, Trin. . . . 71.—Burma.
 a. *miliacea*, Nees, ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 417, nomen (Quid?).—Reg. Himal.
 1. *nervosa*, Nees, . . . 237.—China.

ARUNDO.

- 205¹. l. *australis*, Cav. . . = *Phragmites communis*.
 205². *festucoides*, Desf. . . = *Ampelodesma tenax*.
madagascariensis, Kunth, . . . 48.—Geront. trop.
 a. *montana*, Gaud. in Alpina, iii. (1808) 19; Agrost. Helv. i. 91 = *Deyeuxia acutifolia*.
 205³. *nigricans*, Méral, Fl. Par. ed. II. 33 = *Phragmites communis*.
Pseudo-arundinacea, Schleich. ex Gaud. in Alpina, iii. (1808) 19 = *Deyeuxia acutiflora*.
 206¹. l. *ARUNGANA*, Pers. . . = *Haronga*, Thou. . . (1806).
crenata, Pers. . . = *Psorospermum cordiaefolium*.
mollusca, Pers. . . = *Psorospermum cuspidatum*.

ARYTERA.

- 206². l. *littoralis*, Blume, . . . 170 = *Ratonia littoralis* (in Addend.).

ASCLEPIAS.

- 207². a. *amoena*, Ruiz & Pav. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 325 = *neglecta*.
 1. *acornuta*, Kellogg, . . . 54 = *Gomphocarpus cordifolius*.
 208¹. a. *filiformis*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 753, in nota sub *Schizoglossa*.—Afr. austr.
 1. *filiformis*, Jacq. . . —Afr. austr.
fragrans, Rafin. . . = *A. syriaca* (syn. *Cornuti*).
 208². *lanceolata*, Walt. . . . 105.—Am. bor.
longicornis, Kellogg, . . . 65 = *Gomphocarpus cordifolius*.
 208³. a. *odoratissima*, Breon, ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 30 = *Stephanotis floribunda*.
 1. *paupercula*, Michx. . . . 118 = *lanceolata*.
 209¹. *Pseudosarsa*, Roxb.
scandens, Beauv. . . . 56 = *Daemia scandens*.

ASCOLEPIS.

- 209³. l. *ericauloides*, Nees,

ASCYRUM.

- 209³. l. *HYPERICOIDES*, Plum. ex Adans.
 210¹. *nummularifolium*, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 273 =

ASPALATHUS.

- 210². d. *NEFRAKIS*, Rafin. (nunc *Brya*).

ASPARAGUS.

- 212³. l. *cuscutoides*, Burch. . . . 606 = *Schizobasis cuscutoides*.
davuricus, Fisch. . . . 340.
 213². a. *ramosus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 447 (Index) sphalm. = *racemosus*.
 213³. *sarmentosus*, [Delile, in] Red. Liliac. t. 460, quoad fig.; Herb. Linn. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1875) 625.—Afr. austr.
 1. *sarmentosus*, Linn. . . . 314.—Zeylan.

ASPERELLA.

- 214¹. a. *californica*, Benth. ex Vasey, Cat. Gr. U. St. 46.—Calif.
 1. *Hystrix*, Humb. in Roem. & Ust. Mag. iii. vii. (1790) 5.—Am. bor.

- PAG. **ASPERULA.**
214³. 1. involucreta, *Wahlenb. in Bergg. Resor.* ii. *Bihang*, 21; et in
- ASPHODELINE.**
215². 1. liburnica, *Reichb.*
- ASPHODELUS.**
216¹. a. pyramidalis, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 392, nomen.—Reg. Himal.
- ASPIDOSPERMA.**
216². a. THYROMA, *Miers, Apocyn. S. Am.* 22 (1878).
- ASPILIA.**
217¹. d. abyssinica, *Oliver & Hiern* (=seq.).
1. *Gayana*, *Benth. & Hook. f.* . . . 372 = helianthoides.
Prieureana, *Benth. & Hook. f.* . . . 372 = Kotschyana.
- ASTELIA.**
217³. 1. grandis, *Hook. f.* . . . i. ed. II. (1871).
trinervia, *T. Kirk.* . . . i. ed. II. (1871).
- ASTER.**
218². a. COELESTINA, *Hill, Hort. Kew.* 8 (1769).
GALATELLA, *Cass. in Dict. Sc. Nat.* xxxvii. 463 (1825).
d. HOMOSTYLUM, *Nees (nunc Microglossa)*.
a. acer, *Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii.* 462 = acris.
218³. 1. andinus, *Nutt.* . . . 290.—Reg. Andin.
219¹. 1. Bellidiastrum, *Meyen, Reise*, i. 311, nomen; *Nees*, etc.
219³. a. confusus, *Harv. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 75.—Afr. austr.
220¹. 1. diplostephioides, *Benth. ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 45.
220³. 1. Gerlachii, *Hance, glabriusculus*, *Torr. & Gray*, . . . = A. Xylorrhiza.
221¹. *Heterochaeta*, *C. B. Clarke*.
imbricatus, *Walp.* . . . 574.—Chili.
222³. 1. Pseudamellus, *Pseudodifusus*, *Pseudodumosus*, etc.
223¹. a. *Rivesii*, *Hort.*—Cf. *Linnaea*, xxiv. (1851) 235 = Felicia Reevesii.
223². 1. scaposus, *Klatt.* . . . (1878) i. 84.
scorzonerifolius, *Regel.* . . . 308 = Andersoni, *A. Gray*.
224¹. 1. tenuis, *Kellogg.* . . . 114 = exilis?
a. tuberosus, *Less. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 22.—Bras.
224². 1. Xylorrhiza, *Torr. & Gray*.
- ASTEROCHAETE.**
225². 1. arundinacea, *Kunth.* . . . = Schoenus arundinaceus.
nitens, *Kunth.* . . . = Cyclocampe nitens.
- ASTRAGALUS.**
226². a. ASTRAGALOIDES, *Adans. Fam.* ii. 323 (1763).
226³. PHYLLOLOBUM, *Fisch. ex Spreng. Nov. Prov.* 33 (1818).
d. SPIESIA, *Neck. (nunc Oxytropis)*.
a. TRAGACANTHA, *Tourn. ex Linn. Syst. ed. I.* (1735); *Mill. Gard. Dict. ed. VI.* (1752).
227². 1. anemophilus, *Greene.* . . . Acad. i. IV. (1885).
227³. 1. Arnacantha, *Bieb.*
228³. Candolleanus, *Royle.* . . . 199.—Reg. Himal.
229². clandestinus, *Roth, ex Spreng. in Schrad. Journ.* (1800) ii. 195 =
229³. crassicaulus, [*Nutt. in*] *Fras. Cat.* (1813) n. 6, nomen; et
230¹. dasyglottis, *Fisch.* . . . = hypoglottis.
230². Dipelta, *Bunge*,
231¹. fastidiosus, *Greene.* . . . i. IV. (1885).
233¹. Kentrophyta, *A. Gray*,
233³. a. longipes, *Arv. Ess. Pl. Dauph.* 23 (Quid?).—Gallia.
236¹. 1. Pattersoni, *A. Gray.* . . . 235.
a. phacaceus, *Arv. (l. c.)* 24 (Quid?).—Gallia.
236². prusianus, *Boiss.* . . . 88.—As. Min.
1. Pseudaustralis, *Pseudocaspicus*, *Pseudocicer*, *Pseudonobrychis*, *Pseudopentaglottis*, *Pseudostella*.
236³. Pseudotragacantha, (bis).
237¹. rotundifolius, *J. & C. Presl, Fl. Čech.* 151 =
238². a. subverticillaris, *R. Grah. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* vi. 62, in obs.—Hab.?
- PAG. **ASTRANTIA.**
240¹. 1. pallida, *J. & C. Presl, Fl. Čech.* 62 = major.
- ASTREPHIA.**
240¹. d. OLIGACOCE, *Willd. (nunc Valeriana)*.
- ASTROCARPUS.**
240². a. SESAMOIDES, *Tourn. ex Reichb. Consp.* 186 (1828).
1. Sesamoides, *Colm.*
Sesamoides, *DC.*
- ASTROCARYUM.**
240³. a. pictum, *Hort. ex Balf. f. in Baker, Fl. Maurit.* 388 = *Stevensonia grandifolia*.
- ASTRONIUM.**
241². a. MYRACRODRUON, *Allem. in Trab. Comm. Sc. Expl. Cearà*; *Secc. Bot.* 3. tt. 1, 2 (1862).
241². 1. gracile et macrocalyx . . . 45.
- 241². 1. ASTROPHYTUM, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 3
- ASYSTASIA.**
241³. a. bella, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 1095.—Afr. austr.
242¹. 1. Thysacanthus, *Klotzsch*,
- ATALAYA.**
242². a. australis, *F. Muell. ex Baill. Hist. Pl.* v. 419 = multiflora.
242². 1. ATAXIA, *R. Br. in Parry, 1st Voy. App.* 193 (non 202).
- ATHAMANTA.**
243². 1. sicala, *Linn. l. c.* = Tinguarra sicala.
- ATHANASIA.**
243³. 1. parviflora, *J. F. Gmel. Syst.* 1207; *Thunb.*
- ATHENAEA.**
244¹. a. viscosa, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 891, in nota (*Physalidis* sp.).—Mexic.
- 244¹. 1. ATHEROLEPIS, *Hook. f.*
- ATHRIXIA.**
244². 1. rosmarinifolia, *Oliver & Hiern*,
- ATRAPHAXIS.**
245². a. ACARNA, *Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl.* 195 (1760); *All. Fl. Pedem.* i. 153 (1785).
- ATRIPLEX.**
245³. a. ARMOLA, *Montand. Guide Bot.* 261 (1868).
246¹. 1. Babingtonii, *Woods, Tourists' Fl.* 316 =
246². deltoidea, *Bab. Prim. Fl. Sarn.* 82;
247³. a. ucenica, *Arv. Ess. Pl. Dauph.* 59 (Quid?).—Gallia.
- ATROPA.**
248². 1. spinosa, *Meyen.* . . . 469 =
- ATTALEA.**
248². 1. Humboldtiana, *Spruce, in Fourn. Linn. Soc.* xi. (1869) 163.
248³. racemosa, *Spruce (l. c.)* 166 =
- AUBRIETIA.**
249¹. a. Campbellii, *Hort.*—Cf. *Gard. Chron.* (1864) 1133; *Lem. Illustr. Hort.* xii. (1865) t. 455 = deltoidea.
- AUDIBERTIA.**
249². 1. Dorrii, *Kellogg.* . . . 190 = incana.
- AUGEA.**
249². a. PIOTES, *Soland. ex Britt. in Journ. Bot.* xxii. (1884) 147.
249³. 1. AULACOPHYLLUM, *Regel.* . . . 140 =
- AULAYA.**
250¹. 1. capensis, *Harv. l. c.* 250.—Afr. austr. (non = H. capensis).
scarlatina, . . . = H. scarlatina.
- AUSTRALINA.**
251³. 1. flaccida, *Wedd.* . . . ix. (1856).
Muelleri, Wedd. . . . ix. (1856).
- PAG. **AVENA.**
252¹. a. PREISSIA, *Opiz, Seznam.* 79 (1852).
252³. deusta, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 719, in obs. = barbata.
1. elatior, *Linn.* . . . = Arrhenatherum avenaceum.
253¹. hybrida, *Peterm. Fl. Bienitz*, 13 =
253². Loeftlingiana, *Cav.* . . . 1 = Trisetum Cavanillesii.
longifolia, *Thore, Promen. Gascogne*, 92 =
mysorensis, *Spreng.* . . . 337 = Enteropogon melicoides.
253³. pilosa, *J. Presl.* . . . 253 = Preslii.
254². 1. spicata, *Linn.* . . . = Danthonia spicata.
a. spicata, *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* i. 71 = Trisetum subspicatum.
254³. a. AVENASTRUM, *Jess. Deutschl. Graes.* 214 (1863). (*Gramin.*)
caryophyllum, *Jess. l. c.* 217 = Aira caryophyllaea.
elatius, *Jess. l. c.* 215 = Arrhenatherum avenaceum.
flavescens, *Jess. l. c.* = Trisetum flavescens.
planiculme, *Jess. l. c.* 216 = Avena planiculmis.
praecox, *Jess. l. c.* 217 = Aira praecox.
pratense, *Jess. l. c.* 216 = Avena pratensis.
pubescens, *Jess. l. c.* = Avena pubescens.
- AVERRHUA.**
254³. a. minima, *Perr. in Mém. Soc. Linn. Par.* iii. (1825) 101 (Quid?).—China.
255². insere, AXINOPUS, *Kunth, Enum. Pl.* i. 48 (1833), sphalm. = AXONOPUS, *Beauv. = Paspalum*, *Linn. (Gramin.)*.
- AXYRIS.**
255². 1. villosa, *Moq.* . . . 117 = Kirilowia villosa.
- AZALEA.**
256¹. a. alticlavensis, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) t. 27.
balsaminaeflora, *Hort. ex Carr. in Rev. Hort.* (1882) 432, cum tab.—Hab.?
1. bullata, *Forst. ex Hook. Ic. Pl.* t. 30.
256². a. Laetitiae, *Herb. in Bot. Reg.* (1845) t. 51.
marginata, *Paxt. Mag. Bot.* ii. (1842) 121.
pulchra, *Paxt. (l. c.)* i. (1841) 126.
rosea, *Hort. ex Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov.* v. 224. t. 64 = R. nudiflorum.
- AZORELLA.**
257². 1. reniformis, *Pers. Syn.*
- BABIANA.**
257³. 1. densiflora, *Ecklonii*, lineolata, parviflora, punctata, quadrupartita, scabra, et undulato-venosa, . . . xv.
a. longiflora, *Steud. Nom. ed. II. i.* 683, in syn. = Ixia paniculata.
- BACCAUREA.**
258¹. 1. pyrrhodasya, *Muell. Arg.*
- BACCHARIS.**
260¹. 1. Myrsinites, *Pers.*
261². a. tomentosa, *Thunb. Pl. Bras. Dec.* iii. 38.—Bras.
- BACTRIS.**
262¹. a. leptocarpa, *Trail, ex im Thurn, in Timehri*, iii. (1884) 253.—Guian.
262². megalocarpa, *Trail, ex im Thurn, (l. c.)* i. (1882) 242; iii. (1884) 256.—Guian.
- BADUSA.**
263¹. 1. corymbifera, *A. Gray*,
- BAECKEA.**
263¹. a. DROSODENDRON, *M. Roem. Syn. Hesper.* 140 (1846).
264¹. a. BAECHORTUS, *Ehrh. Beitr.* iv. 149 (1789) = Carex, *Dill. (Cyperac.)*.
- BAEOMETRA.**
264¹. a. EPIONIX, *Rafin. Fl. Tellur.* ii. 31 (1836).
- BAHIA.**
264³. 1. Woodhousei, *A. Gray*,
- BAHIOPSIS.**
264³. 1. lanata, *Kellogg, l. c.* = V. lanata.

PAG.

BALANITES.

- 265¹. a. *arborescens*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 447 (Index) (= *Zygophyllum arborescens*).—Reg. Himal.
rigidum, Royle, (l. c.) (= *Zygophyllum rigidum*).—Reg. Himal.

- 265³. l. BALDELLIA, Parl. . . . = *Echinodorus*, Rich. (Alismac.).
ranunculoides, Parl. . . . = *E. ranunculoides*.

BALLOTA.

- 266¹. l. *frutescens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 155 = *integri-folia*.
 266². a. *royleoides*, Benth. . . . 520 = *Lasiocorys arabica rupestris*, Vis. . . . 216 = *hirsuta*?

BALSAMEA.

- 266². a. *Commiphora*, Engl. l. c. 41, nomen. = *C. Agallocha*.
 l. *caudata*, Engl. l. c. 42 =
 a. *erythraea*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 42 = *C. erythraea*.
 l. *Harveyi*, Engl. l. c. = *C. Harveyi*.
 a. *Kataf*, Engl. l. c. = *C. Kataf*.
mossambicensis, Engl. l. c. = *C. mossambicensis*.
pubescens, Engl. l. c. = *C. pubescens*.
Playfairii, Engl. l. c., nomen. = *C. Myrrha*.

BALSAMODENDRUM.

- 267¹. a. *Commiphora*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 175 = *C. Agallocha*.

BALTIMORA.

- 267². l. *Scolospermum*, Steetz,

BAMBUSA.

- 268¹. a. *Matake*, *Metake*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 4; *Hatsik*, *Yataki*, *Kantsik*, *Kin-meitsik*, *Kurotake*, *Moosoo*, *Narihiratke*, *Nigamatake*, *Sinotake*, *Suwootsik*, *Tootsik*, Siebold, (l. c.) 5; *Ginmeisasa*, *Hoteitsik*, *Kumasasa*, *Sikak'take*, Siebold, (l. c.) 6.—Japon.

BANARA.

- 268³. l. *XYLADENIUS*, Desv. . . . Pl.
 269¹. *brevifolia*, . . . *Scolopia Dasyanthera*.
ibaguensis, Tul. . . . 290.

BANISTERIA.

- 269². a. *brachiata*, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 118 = *Billbergiana*.

BANKSIA.

- 270³. l. *ISOSTYLIS*, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 402 (1840).

BARBACENIA.

- 272¹. l. *squamata*, Lindl. . . . 64 = *Vellozia squamata*.
 a. *tubiflora*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 740.—Bras.

BARKHAUSIA.

- 273¹. l. *Clausonis*, Pomel, . . . = *C. Clausonis*.
 273². *juvenalis*, Delile, . . . —Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 286 . . .
 273³. *Roylei*, DC. . . . 157 = *Pterotheca bifida*.

BARLAEA.

- 273³. l. *calcarata*, Reichb. f. l. c. = *H. calcarata* (in Addend.).

BARLERIA.

- 273³. a. *alba*, Lodd. Bot. Cab. t. 360.—Ins. Maurit.
 274¹. *elegans*, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 269.—Afr. austr.
 274². l. *limnogeton*, S. Moore, . . . Afr. trop.
 274³. a. *polyphylla*, Steud. Nom. ed. II. i. 386, sphalm. = *Barbieria polyphylla*.
 l. *pyramidalis*, Lam. . . . Prod. xi.
 a. *pyramidata*, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. i. 209, in syn., sphalm. = *praece*.

BARRINGTONIA.

- 275³. a. COMMERSONA, Sonner. Voy. tt. 8, 9 (1782).
 MICHELIA, Linn. Syst. ed. I (1735).
acutangula, Blume, Bijdr. 1097 = *insignis*.
acutangula, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 206 = *reticulata*.
acutangula, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 488 = *serrata*.

PAG.

BARRINGTONIA :—

- 275³. l. *augusta*, Kurz,
 d. *Butonica*, Forst.
 276¹. a. *calypttrata*, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. iii. 288, in nota.—Austral.
 l. *elongata*, Korth. . . . 206 = *macrocarpa*.
 a. *Levequii*, Jardin, in Mém. Soc. Sc. Cherb. v. (1857) 296, 311 = *speciosa*.
 l. *luzonensis*, Vidal, . . . 43, 113.
luzoniensis, Vidal, l. c. 13 = *praece*.
 a. *racemosa*, Hort. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 488 = *insignis*.
 l. *speciosa*, Forst. Char. Gen. 76. t. 38; Linn. f. . . . 312.—Ins. Pacif.

- 276¹. l. BARROTIA, Gaudich. . . . (1848?).

- 276². a. BARTERIA, Welw. in Bibl. Univ. Genève. (1861) 200 = *Brasenia*, Schreb. (Nymphac.).
africana, Welw. l. c. = *Brasenia Schreberi*.

BASELLA.

- 277². d. *cananifolia*, (err. typ. loco *crassifolia*).

BASILIMA.

- 277². l. *pygmaea*, Rafin. l. c. 76 = *S. sorbifolia*?

BASSIA.

- 277³. d. *Ersikineana*, F. Muell. (vide infra.).

BASSIA.

- 277³. l. *albescens*, Griseb. . . . 164 = *Labourdonnaisia albescens*.
 a. *Ersikineana*, F. Muell. in Melb. Chem. & Drug. (Apr. 1885).—N. Guin.
 278¹. *Junghuhniana*, De Vriese, Pl. Reinw. 62 = *Payena Junghuhniana*.
retusa, Rich. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861-62) 327 = *Isonandra Richii*.

BASSOVIA.

- 278¹. a. *anonacea*, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi. (1853) 94, in obs. = *Athenaea anonacea*.
hirsuta, Miers, (l. c.) = *Athenaea hirsuta*.
Martiana, Miers, (l. c.) = *Athenaea Martiana*.
micrantha, Miers, l. c. = *Athenaea micrantha*.
mollis, Miers, l. c. = *Withania mollis*.
novo-friburgensis, Miers, l. c. = *Withania novo-friburgensis*.
oocarpa, Miers, l. c. = *Withania oocarpa*.
pogogena, Miers, l. c. = *Athenaea picta*.
Pohlana, Miers, l. c. = *Athenaea Pohlana*.
pyrifolia, Miers, (l. c.) = *Withania pyrifolia*.
Schottiana, Miers, (l. c.) = *Athenaea Schottiana*.

BATATAS.

- 278². l. *incurva*, Benth. . . . = *I. carnosa*.

BATEMANNIA.

- 278³. l. *Meleagris*, Reichb. f. . . . = *Zygopetalum Meleagris*.

BATRACHIUM.

- 278³. a. *argutum*, Opiz, Seznam, 21 = *R. aquatilis*.
 279¹. l. *oleucos*, Bossch, . . . 6 =
 279². *trichophyllum*, Bossch, . . . 5;

BATSCHIA.

- 279². a. *fimbriata*, [Nutt. in] Fras. Cat. n. 11, nomen = *L. angustifolium*.

BAUHINIA.

- 279³. l. *armata*, Thunb. Pl. Bras. Dec. iii. 33.
 280³. a. *inermis*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 102 (Quid?).—Archip. Ind.

BEAUFORTIA.

- 282². a. *MANGLESIA*, Lindl. Swan River App. t. 3 (1839).

BECKMANNIA.

- 282³. l. BRUCHMANNIA, Nutt.

BEGONIA.

- 283². l. *AUGUSTIA*, . . . Berl. 1854 (1855).
 283³. a. *Ameliae* ×, André, in Rev. Hortic. (1885) 512. f. 89, 90.
 l. *anemonoides*, Azara, Voy. ii. 503.—Reg. Andin.

PAG.

BEGONIA :—

- 284¹. a. *Chelsoni* ×, Hort. ex T. Moore, Flor. et Pom. (1871) 234, cum fig.
 284². l. *Cumingiana*, A. DC. . . . 320.—Ins. Philipp.
 285². *incarnata*, Link & Otto, Ic. Pl. Rar.
 a. *Ingramii* ×, T. Moore & Ayres, Gard. Mag. Bot. ii. (1850) 153.
intermedia ×, Veitch, ex Van Houtte, in Fl. des Serres, xix. (1873) 39, cum fig.
Leopoldii ×, Lem. Illustr. Hortic. vi. (1859) t. 205.
 285³. l. *Lindleyana*, Warsz.
magnifica, Warsz. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 129 =
Martiana, Link & Otto, Ic. Pl. Rar.
 286³. *platanifolia*, Schott,
 a. *prestoniensis* ×, T. Moore, ex Planch. in Fl. des Serres, viii. (1852-53) 189. t. 819.
 287¹. l. *rubro-nervia*, Hort. . . . 40 = *rubro-venia*.
rufa, Thunb. Pl. Bras. Dec. i. 11.
 287². *semperflorens*, Link & Otto, . . . 9. t. 5.
 287³. a. *stipularis*, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) II. 195.—Hab.?
Teysmanniana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 1092, in obs.—Sumatra.
 288¹. *Worthiana* ×, Carr. in Rev. Hortic. (1874) 117. f. 15.
zeylanica, Van Houtte, ex Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiv. (1856) 204.—Zeylan.

BEIHEN, Moench.

- 288². l. *angustifolius*, Link, Handb. 245; Schott, etc.
 a. *fabarius*, Link, l. c. = *S. Cucubalus*.
fimbriatus, Link, l. c. = *S. fimbriata*.
lanuginosus, Link, (l. c.) = *S. lanuginosa*.
maritimus, Link, l. c. = *S. maritima*.
Pumilio, Link, (l. c.) = *S. Pumilio*.
uniflorus, Link, (l. c.) = *S. maritima*.

BEILSCHMIEDIA.

- 288². a. *WIMMERIA*, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 65 (1864).
gaboonensis, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 158.—Afr. trop.
Mannii, Benth. & Hook. f. (l. c.)—Afr. trop.
minutiflora, Benth. & Hook. f. (l. c.)—Afr. trop.

- 289¹. l. BELLENDENIA, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 245 =

BELLUCIA.

- 290¹. l. WEBERA, J. F. Gmel. . . . (1791).

BELOPERONE.

- 290³. l. *longepetiolata*, Nees.

BERARDIA.

- 291³. l. *phylicoides*, Brongn. l. c. = *Raspalia phylicoides*.

BERBERIS.

- 292². a. *Chirisigui*, Azara, Voy. ii. 514.—Boliv.
 292³. l. *laurina*, Thunb. Pl. Bras. Dec.
 293². *Roemeriana*, Scheele, . . . 154, 352 =

- 294³. BERINIA, . . . l. 30 (non 50).
 l. *andryaloides*, Brignol. . . . 30 (non 50).

BERKHEYA.

- 295¹. a. *incana*, Spreng. ex Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 774 (= *Stobaea adenocarpa*).—Afr. austr.
 l. *Zeyheri*, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 429 = *subulata*.

BERNIERA.

- 295³. l. *nepalensis*, DC. l. c. = *G. nepalensis*.

BESLERIA.

- 296³. d. DRUPINA, Linn. (nunc Curanga).
 297¹. l. *crassifolia*, Schott, in Flora, iv. (1821) 198.—Bras.
grandifolia, Schott, (l. c.) 197.—Bras.
mollissima, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) II. 196.—Am. austr.
 297². *serrulata*, Jacq. . . . 21 = *Drymonia serrulata*.

- PAG.
297³. 1. BETCKEA, DC. . . (1829) et Prod. iv. 642 (1830) = *Valerianella*, Tourn. (Rubiaceae).
major, Fisch. & Mey. . . V. *samolifolia*.
samolifolia, DC. . . V. *samolifolia*.
samolifolia, Gill. . . = *Gilliesii*.

BETONICA.

- 298¹. 1. *pradica*, Zanted. in Comm. Ateneo Brescia, 1815 (1818), 88

BETULA.

- 298². 1. *antarctica*, Forst. f.
299¹. a. *resinifera*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 343, 345 = *utilis*?

BEZANILLA.

- 299³. 1. *chilensis*, Remy, . . . 110 = *P. chilensis*.

BIASOLETTA.

- 300¹. 1. *tuberosa*, Koch, . . . xix.

- 300². 1. *BICORNELLA*, Lindl. . . (1835) . . . Benth. & Hook. f. iii. 624.

BIDENS.

- 300³. 1. *Bandana*, Wall.
Bardana, Steud. Nom. ed. II. ii. 202, sphalm. = praec.
301¹. *graveolens*, Mart. Reise Bras. i. 286.
301². *pulcherrima*, Sch. Bip. . . . nomen = *Cosmos diversifolius*.
301³. a. *serratula*, Jardin, in Mém. Soc. Sc. Cherb. v. (1857) 296, sphalm. = *serrata*.
301³. 1. *tuberosa*, Sch. Bip. . . 1 = *Viguiera tuberosa*, Benth. & Hook. f.

BIFORA.

- 302¹. a. *ANIDRUM*, Neck. Elem. i. 188 (1790), nomen prius.

BIGELOWIA.

- 302³. 1. *Bigelovii*, A. Gray, l. c. 642; xvii.
Douglasii, A. Gray, l. c. 645 =
oppositifolia, A. Gray, . . . 32 = *Eupatorium mygindaefolium*.

BIGNONIA.

- 303¹. d. *HIERANTHES*, Rafin. (*nunc Stereospermum*).
ODISCA, Rafin. (*nunc Colea*).
1. *alba*, Aubl. . . = *Macfadyena bracteosa*.
a. *alliaeca*, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 138 = *Sagraeana*.
303². 1. *binata*, Thunb. Pl. Bras. Dec. iii. 35,
303³. *Coito*, Vell. . . = *Macfadyena Coito*.
304¹. 1. *elliptica*, Thunb. (l. c.) 34.
Ferdinandii, Welw. . . 584 (= *Ferdinandia superba*).—Afr. trop.
304². a. *lanata*, R. Br. ex Fresen. in Flora, xxi. (1838) 607 = *discolor*.
304³. 1. *myriantha*, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 684.
305¹. *populifolia*, DC. . . 159 = *Melloa populifolia*.
305³. *Telfairiae*, Boj. . . t. 2976 = *Colea Telfairiae*.

BIKKIA.

- 306¹. a. *tetrandra*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 307 = *grandiflora*.

- 306². 1. *BILLARDIERIA*, Vahl,

BILLBERGIA.

- 307¹. 1. *speciosa*, Thunb. Pl. Bras. Dec. iii. 30.

- 307². a. *BINIA*, Noronha, ex Thou. Gen. Nov. Madag. 8 (1806) = *Noronhia*, Stadm. (Oleaceae).

BIOPHYTUM.

- 307³. 1. *Umbraculum*, Welw. . . 590 = *sensitivum*.

BIPINNULA.

- 307³. a. *bipinnata*, Reichb. f. Xenia Orch. 62, in obs. = *bonariensis*.

BIXA.

- 309¹. a. *ORLEANIA*, Commel. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 380 (1760).

BLAKEA.

- 310³. 1. *Pyxidanthus*, Triana,

BLENNOSPERMA.

- 311². 1. *UNXIA*, Bert. ex Colla,

PAG.

- 312¹. post *BLEPHARISTEMMA*, Benth. pone
BLEPHARIZONIA, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. iv. (1885) 279. *COMPOSITAE*.
laxa, Greene, l. c.—Calif.
plumosa, Greene, l. c.—Calif.

BLEPHAROCALYX.

- 312¹. 1. *cisplatensis*, Griseb. . . = *Eugenia cisplatensis*.

BLETIA.

- 312³. d. *DILOMILIS*, Rafin. (*nunc Octadesmia*).
HECABE, Rafin. (*nunc Phaius*).
1. *fulgens*, Linden & Reichb. f.
313¹. 1. *guineensis*, G. Don, in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 344 (*guineense*), nomen = *Eulophia guineensis*.
a. *Jongheana*, Reichb. f. in Flora, iv. (1872) 158 = *Laelia Jongheana*.
313². 1. *Wageneri*, Reichb. f.

BLETILLA.

- 313². a. *striata*, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxxvi. (1878) 75 = *Bletia hyacinthina*.

BLIGHIA.

- 313². a. *BONANNIA*, Rafin. Specchio, xv. 115 (1814).

- 313². a. *BLISMUS*, Montand. Guide Bot. 346 (1868), sphalm. = *BLYSMUS*, Panz. = *Scirpus*, Tourn. (Cyperaceae).

BLOOMERIA.

- 313³. a. *montana*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 281.—Calif.

BLUFFIA.

- 313³. 1. *Eckloniana*, Nees, . . . 447 = *P. semialatum*.

BLUMENBACHIA.

- 314³. a. *contorta*, Benth. & Hook. f. ex Hieron. Pl. Diaphor. 120.—Reg. Argent.
contorta, Hook. f. Bot. Mag. t. 6134 =
lateritia, Benth. & Hook. f. ex Hieron. (l. c.) =
Loasa compressa.

BLYSMUS.

- 315¹. a. *distichus*, Montand. Guide Bot. 346 = *S. Caricis*.

BLYXA.

- 315¹. a. *HYDROTROPHUS*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1873) 8. t. 1.

BOBEA.

- 315². a. *ferruginea*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) II. 211, nomen.—Malaya.
Forsteri, Korth. l. c. 211, 212 = *Timonius Forsteri*.
fusca, Korth. l. c. 213.—Malaya.
Gaertneri, Korth. l. c. = *Timonius Forsteri*.
setosa, Korth. (l. c.).—Malaya.

BOEA.

- 316¹. 1. *flocculosa*, C. B. Clarke,

BOEHMERIA.

- 316³. 1. *Didymogyne*, Wedd.
Janagi-itsigo, Siebold,

BOERHAAVIA.

- 317³. a. *DANTIA*, Lipp. ex Choisy, in DC. Prod. xiii. II. 449 (1849).

- 318¹. 1. *plicata*, Boj. . . *Maurit.* (1841) 43.
318². *spicata*, Choisy, . . . 456 = *Senkenbergia erecta*.

BOJERIA.

- 318³. a. *lanceolata*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 334.—Afr. austr.

BOLDUS.

- 319². 1. *chilensis*, Schult. f. l. c. 56 = *P. Boldus*.

BOLTONIA.

- 319³. 1. *incisa*, Benth. . . 173.—As. or.
indica, Benth. . . 174.—Malaya; China.

BOMBYCELLA.

- 320³. 1. *bicolor*, Welw. . . 589 = *H. micranthus*.

BONAMIA.

- 321¹. 1. *Menziesii*, A. Gray, l. c. = *Breweria Menziesii*.

PAG.

BONATEA.

- 321². a. *benghalensis*, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. vi. (1844) 382 = *H. digitata*.

- 322¹. 1. *BONPLANDIA*, Willd. . . = *Cusparia*, Humb. (Rutac.).

- Angostura*, Rich. . . 10 = *C. febrifuga*.
Candolleana, Spreng. l. c. = *C. Candolleana*.
cuneifolia, Spreng. l. c. = *C. cuneifolia*.
Erythrochiton, Spreng. l. c. = *C. pentandra*.
Fontanesiana, Spreng. l. c. = *C. Fontanesiana*.
heterophylla, Spreng. l. c. = *C. heterophylla*.
Lasiostemon, Spreng. l. c. = *C. silvestris*.
pentagyna, Spreng. l. c. = *C. pentagyna*.
resinosa, Spreng. l. c. = *Rauia resinosa*.
trifoliata, Spreng. l. c. = *C. febrifuga*.

BORAGO.

- 322³. 1. *cretica*, Willd. . . 778 = *Trachystemon creticum*.
orientalis, Linn. . . 188 = *Trachystemon orientale*.

BORRERIA.

- 324³. 1. *simplex*, Griseb. . . 350 = *S. simplex*.
strictissima, DC. . . 547 = *S. strumphioides*.

- 325². 1. *BOTRYANTHE*, Klotzsch, . . . vii.

BOTRYANTHUS.

- 326². 1. *Kernerii*, Marches. in Boll. Adriat. Soc. Sc. Trieste, vii. (1882) 266 =
speciosa, Marches. (l. c.) 267 =

BOURRERIA.

- 327³. 1. *domingensis*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 482.

BOUVARDIA.

- 328³. a. *semperflorens* ×, Joly, in Wien. Garten-Zeit. (1885) 149. t. 1.

BOWLESIA.

- 329¹. 1. *diversifolia*, Meyen, Reise, i. 447 =

BRACHIARIA.

- 329². 1. *eruciformis*, Griseb. l. c. = *P. eruciforme*.

BRACHYCOME.

- 330². 1. *xanthocomoides*, Less. Syn. Comp. 192; et in

BRACHYLOMA.

- 331¹. a. *leucomallon*, Hanst. in Linnaea, xxix. (1857–58) 528.—N. Granat.
Moritzianum, Hanst. l. c. 524.—N. Granat.
rhodomallon, Hanst. (l. c.) 526.—Venezuela.
ventricosum, Hanst. (l. c.) 528.—Hab. ?

BRACHYPODIUM.

- 331². d. *HEMIBROMUS*, Steud. (*nunc Glyceria*).

BRACHYRAMPHUS.

- 332¹. a. *Schimperi*, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 283, 307 = *Sonchus Spachii*.

BRACHYRHYNCHOS.

- 332¹. 1. *eupatorioides*, DC. . . 439 = *S. eupatorioides*.
a. *pinceus*, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702, sphalm. = *juncus*.

BRACHYSPATHA.

- 332². 1. *Konjac*, C. Koch, . . . (1855) 166, etc.

BRAGANTIA, Vand.

- 333². 1. *Vandelli*, Mart. Reise Bras. 280.

BRANDESIA.

- 333³. 1. *elongata*, Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 313 =
porrigens, Mart. (l. c.) 314 =
serpyllifolia, Mart. (l. c.) =

BRASENIA.

- 333³. a. *BARTERIA*, Welw. in Bibl. Univ. Genève. (1861) 20.

BRASSAVOLA.

- 334¹. 1. *grandiflora*, Lindl. l. c. 16.—Ind. occ.
334². a. *stricta*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1885) I. 501. f. 92 (sp. dub.).—Hab. ?

PAG.

BRASSIA.

- 334³. 1. *spathacea*, Linden & Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 279.

BRASSICA.

- 334³. a. *CONIROSTRUM*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 195 (1867).
1. *antarctica*, Molina, ... 292 = *Sisymbrium magellanicum*.
apula, Janka, l. c. 180 = *Diploaxis apula*.
335¹. a. *corsica*, Jord. Esp. Vég. Affin. 7 = *insularis*.
335². 1. *foliosa*, Hook. f. & Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 157 = *alba*.
fragilis, Sieber, ... = *Diploaxis Sieberi*.
magellanica, Pers. ... 207 = *Sisymbrium magellanicum*.
335³. *nigra*, Koch, ... 713 = *sinapoides*.
oxyrrhina, Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 854.
a. *patens*, Murr. ex Moench, Meth. 251 = *Sisymbrium patens*?
1. *Pseudoerucastrum*, Brot.
336¹. a. *sinapioides*, Roth, Man. ii. 957; *et ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl.* iv. 713.—Orb. vet. (Cosmop. cult.).
Sinapis, Noul. Fl. Sous-Pyr. 32 = *sinapioides*.
1. *Sinapis*, Vis. Fl. Dalm. iii. 136 = *B. Sinapistrum*.
- BREWERIA.**
337². a. *intermedia*, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) *Bes. Beil.* 8.—Arab.
1. *latifolia*, Hochst. (l. c.); *Benth.*
337³. *minima*, A. Gray, ... 228 = *Convolvulus pentapetaloides*.
virgata, Hochst. (l. c.); *Vatke*,

BREYNIA.

- 338¹. a. *patens*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 359.—Ins. Formosa.

BRICKELLIA.

- 338². a. *reticulata*, A. Gray, *Pl. Wright.* i. 84.—Mexic.

BRIZOPYRUM.

- 339³. a. *mucronatum*, Aitch. Cat. Punj. Pl. 169 (*Aeluropi* sp.?).—Ind. or.
mucronatum, Nees, in Wall. Cat. n. 8898 = *Eragrostis mucronata*, *Benth. & Hook. f.*
1. *obtusiflorum*, Fourn. ... 579 = *Uniola paniculata*.
a. *unioloides*, Munro, in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1861) 45 = *Eragrostis Uniolae*.

BRODIAEA.

- 340¹. a. *TULOPHOS*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 71 (1836).

BROMELIA.

- 340². a. *Forstroemii*, Beurl. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1856), 110, in nota.—Ins. Guadeloup.
340³. *Pigna*, Perr. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iii. (1825) 103 = *Ananas sativa*.
Mai-pouri, Perr. (l. c.) = *Ananas sativa*.
strobilina, Beurl. (l. c.).—Panama.

BROMIDIUM.

- 341¹. 1. *anomalum*, Doell, ... 103 = *Deyeuxia anomala*.

BROMUS.

- 341¹. a. *CALLIAGROSTIS*, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).
341². 1. *bohemicus*, F. W. Schmidt, in Meyer, *Samml. Phys. Aufs.* i. (1791) 189 =
341³. *decumbens*, Koel. ... = *Triodia decumbens*.

BROSIMUM.

- 344². 1. *Galactodendron*, D. Don, in *Edinb. N. Phil. Journ.* (Oct.—Dec. 1829) 171.—
spurius, Sw. ... 12 = *Pseudolmedia havanensis*.

BROTERA.

- 344². 1. *Leprieurii*, Guill. & Perr. l. c. = *M. abyssinica*.

BROWALLIA.

- 345¹. 1. *humifusa*, Forsk. ... = *Cynium humifusum*.
Jamesonii, Benth. ... = *Streptosolen Jamesonii*.

BRUCEA.

- 345². d. *NIMA*, Buch.-Ham. (*nunc Picasma*).

PAG.

BRUNFELSIA.

- 345³. a. *MARTIA*, Lacerda, ex J. A. Schmidt, in *Mart. Fl. Bras.* viii. 26 (1862).

- 346³. 1. *BRUNSVIGIA*, Heist. Disc. Brunsvig. 1 (1753); *Beschr.*

BRYA.

- 347¹. a. *NEFRAKIS*, Rafin. *Sylva Tellur.* 69 (1838).

BRYANTHUS.

- 347¹. a. *PHYLLODOCE*, Salisb. *Parad. Lond.* t. 36 (1806).

BRYONIA.

- 348². a. *Tajuja*, [Mart.] Hort. Reg. Monac. Seminifer, (1836).—Cf. *Linnaea*, xii. (1838) Litt. 86 = seq.

BUBON.

- 348³. 1. *hypoleucus*, Meissn. ... 536 = *S. hypoleucus*.
pimpinellifolius, Eckl. & Zeyh. ... 353 (*Annesorhizae* sp.).
a. *tortuosus*, Hoffmgg. & Link, *Fl. Port.* ii. 452 = *Pimpinella villosa*.

BUCHNERA.

- 349³. 1. *MICALIA*, Rafin. (*nunc Escobedia*).
350¹. 1. *humifusa*, Vahl, ... 81 = *Cynium humifusum*.

BUCHOLZIA.

- 350³. 1. *lupulina*, Mart. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xiii. (1826) 315 =
philoxeroides, Mart. (l. c.) 316 =

BUCKLEYA.

- 350³. a. *lanceolata*, *Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat.* 79. —China; Japon.
Quadriala, Benth. & Hook. f. *Gen.* iii. 227 = *lanceolata*.

BUDDLEIA.

- 351¹. a. *TOXINA*, Noronha, in *Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 4.

- 352¹. 1. *BUEKIA*, Nees, ... 300 = *Tetraria*, Beauv. (Cyperac.).
punctoria, Nees, l. c. (= *Elynanthus punctorius*) (in *Addend.*).

BUETTNERIA.

- 352². a. *WATSONIA*, Boehm. in *Ludw. Def. Gen. Pl.* 278 (1760).
1. *dasyphylla*, J. Gay, in *Mém. Mus. Par.* x. (1823) 200;
hermanniaefolia, J. Gay, (l. c.) 204;
353³. a. *triplineria*, Bivona, ex Baill. *Adansonia*, x. (1871) 106 = *Ropalocarpus triplinervius*.

- 353². 1. *BUGULA*, Tourn. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735); *et ex*

BULBOCODIUM.

- 354¹. 1. *autumnale*, Lapeyr.
dentatum, Schur, ... 166 = *ruthenicum*.
Fontanesii, Heynh. ... 81 = *Merendera filifolia*.
lusitanicum, Heynh. ... 81 = *Merendera Bulbocodium*.
persicum, Regel, ... t. 1058 = *Merendera persica*.
robustum, Bunge, ... 491 = *Merendera robusta*.
vernium, Linn. *Sp. Pl.* 294.—Europ.

BULBOPHYLLUM.

- 354². a. *SARCOPODIUM*, Lindl. in *Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i.* (1850) 155, partim.
1. *biflorum*, *Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1853) 488; *et* ... 397.
355¹. *lasiochilum*, Par. ... 153 = *Cirrhopetalum lasiochilum*.
355². 1. *membranaceum*, *Teysm. & Binn. (ut supra)* 481; *et* ... 397.

BULBOSTYLIS.

- 356³. a. *stenophyllus*, Nees, ex Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869–70) 752.—Am. bor.?

- 356². insere *BULGA*, Linn. *Syst. ed. I* (1735) = *BUGULA*, Tourn. = *Ajuga*, Linn. (*Labiata*).

PAG.

BULLIARDA.

- 356². 1. *brevifolia*, Eckl. & Zeyh. ... 290 = *T. brevifolia*.
elatinoides, Eckl. & Zeyh. (l. c.) = *T. elatinoides*.
356³. *trichotoma*, Eckl. & Zeyh. (l. c.) = *T. trichotoma*.

BUMELIA.

- 356³. a. *ROBERTIA*, Scop. *Introd.* 154 (1777).
d. *SPONDOGONA*, Rafin. (*nunc Dipholis*).
a. *Berterii*, Balb. ex Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 56 = *Schefferia Berterii*.
confertiflora, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 12, nomen (Quid ?)—Am. bor.

BUPHTHALMUM.

- 359¹. 1. *stenophyllum*, Link, ... = *Odontospermum stenophyllum*.

BUPLEURUM.

- 359². a. *brassicaefolium*, Arv. *Monog. Pilos.* 50 (Quid ?). —Gallia.
1. *difforme*, Linn. ... 238 = *Rhyticarpus difformis*.

BURMANNIA.

- 361². a. *bifaria*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 373 = *coclestis*?

BURSA.

- 361³. 1. *Pastoris*, [Weber, in]

BURSERIA.

- 362¹. 1. *Aloëxylon*, *bicolor*, *bipinnata*, *cuneata*, *gorullensis*, *penicillata*, *Schiedeana*, (omnes) *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 44; *et*
Galeottiana, *grandifolia*, *Karsteniana*, *lancifolia*, *ovalifolia*, (omnes) *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 43; *et*
obovata, Turcz. ... 614 = *Protium Copal*.
Sellowii, Turcz. ... 613 = *Protium Icariba*.

BURSINOPETALUM.

- 362². a. *Gardnerianum*, Baill. *Adansonia*, iii. (1862–63) 83 = *M. arborea*.

BUTOMOPSIS.

- 363¹. 1. *lanceolata*, Kunth, ... 165.—Geront. trop.; Austral.

BUTONICA.

- 363¹. 1. *Rumphiana*, Miers, ... = *Barringt. speciosa*.

BUXUS.

- 363². 1. *cordifolia*, *Spreng. l. c.*—Ind. occ.
a. *fruticosa*, Borkh. in *Rhein. Mag.* i. (1793) 544 = *sempervirens*.
1. *Harlandi*, Hance, ... 123 = *sempervirens*.
japonica, Muell. Arg. ... 23 = *microphylla*.
microphylla, Sieb. & Zucc. ... 142.—China; Japon.
stenophylla, Hance, ... 331 = *sempervirens*.

BYBLIS.

- 363². a. *DROSANTHUS*, R. Br. ex Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ix. (1848) 305.
DROSOPHORUS, R. Br. ex Planch. (l. c.) 306 (1848).
1. *caerulea*, R. Br. ... = *liniflora*.
filifolia, Planch. ... = *liniflora*.

CACALIA.

- 365². 1. *Arbuscula*, Thunb. ... = *Othonna Arbuscula*.
candicans, Vell. ... = *S. candicans*.
365³. a. *flava*, Buch.-Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 333 = *Gynura nepalensis*.
366¹. 1. *ilicifolia*, H. B. & K. ... 163 = *Gynoxys ilicifolia*.

CACHRYS.

- 367². 1. *pterochlaena*, DC. ... 237 = *Hippomarathrum siculum*?

CACOUCIA.

- 367³. a. *coccinea*, M. Laws. in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 434 = *velutina*.
racemosa, Steud. *Nom. ed. II.* i. 836, sphalm. = *Lumnitzera racemosa*.

CACTUS.

- 367³. a. *Ayrampe*, Azara, *Voy.* ii. 526.—Reg. Andin.
Berteri, Colla, in *Mem. Acc. Torin.* xxxvii. (1834) 77. t. 17. f. 2 = *Echinocactus Berterii*.

- PAG. CACTUS:—
 368¹. 1. *ferox*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 23, nomen; Nutt.
 368². 1. *fragilis*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 24, nomen; Nutt.
 a. *horridus*, Colla, (ut supra) 76. t. 17. f. 1 = *Echinocactus horridus*.
 369². *viviparus*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 22, nomen; Nutt.
- CADABA.
 369¹. a. *farinosa*, Fenzl, in Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 24 (= *Streblanthus Fenzlii*).—Afr. trop.
- CADIA.
 369². a. MOZAMBE, Rafin. Sylva Tellur. 112 (1833).
 370¹. a. CAËLA, Adans. Fam. ii. 209 (1763) = *Torenia*, Linn. (Scrophul.).
- CAESALPINIA.
 370². 1. *Berterii*, Spreng. . . . 370 = *bijuga*.
 370³. a. *laevigata*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 104 (Quid?).—Ins. Philipp.
 371¹. 1. *pectinata*, Cav. Desc. 467 = *tinctoria*.
 a. *pilosa*, Ruiz, ex G. Don, Gen. Syst. ii. 434 = *Hoffmanseggia pilosa*.
- CAIOPHORA.
 371². 1. *lateritia*, Benth. . . . iii. t. 119 = *B. lateritia* ?
 372¹. 1. CALACANTHUS, T. Anders.
- CALADIUM.
 373². 1. *petiolatum*, Hook. . . . t. 3728
- CALAMAGROSTIS.
 374³. 1. *Humboldtiana*, Steud. . . . 250 = *Deyeuxia stricta*.
montana, Host, Gram. iv. t. 46.
 375¹. *pumila*, Hook. f. . . . 176 = *Leptochloa Lindleyana*.
 375². *sylvatica*, Host, . . . 48; DC. . . . Suppl. 253 = *varia*.
- CALAMINTHA.
 375³. 1. *Clinopodium*, Spenn. Handb. ii. 429; Benth. *Fenzlii*, Vis. . . . 7 = *Mentha Pulegium*.
 376¹. a. *pauciflora*, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 10 = *officinalis*.
- CALAMOSAGUS.
 376². 1. in syn. K. polystachya (bis) et K. scaphigera.
- CALAMUS.
 377³. a. *Regis-Daniae*, *Kamphoev. ex Rink, Nicob. Ins.* 132, nomen.—Ins. Nicobar.
- CALANTHE.
 379². 1. *speciosa*, Vieill. . . . 44 = *Phaius grandifolius*.
 379². a. CALANTHEA, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864) 161 = *Capparis*, Tourn.
pulcherrima, Miers, l. c. = *Capp. pulcherrima*.
- CALATHEA.
 379³. a. Baraquinii, Regel, Gartenfl. xviii. (1869) 99.—Bras.
Baraquiniana, Regel, l. c. xxviii. (1879) 301 = *praec.*
 380¹. 1. *macilentia*, Lindl. . . . t. 1210 = *Myrosma cannaefolium*.
Myrosma, Koern. . . . 87 = *Myrosma cannaefolium*.
 a. *strobilacea*, Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) l. 111, sphalm. = *praec.*
 380². *varians*, Koern. (l. c.) 136.—Am. trop.
- CALCEOLARIA.
 381¹. 1. *fuchsiaefolia*, Hemsl. in The Garden (1879), 258.—Hab. ?
 381². *nudicaulis*, Meyen, Reise, i. 355, nomen; et
 382¹. *verbascifolia*, Bert. . . . nomen = *andina*.
 382¹. insere CALCEOLARIA, Loebl. It. Hisp. 183 (1758) = *Ionidium*, Vent. (1803) (*Violar.*).
- CALCITRAPA.
 382². a. *Jacea*, Peterm. Fl. Bienitz, 48 = *Cent. Jacea*.
pratensis, Peterm. (l. c.) 49 = *Cent. pratensis*.
tinctoria, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 436, in obs. = *Carthamus tinctorius*.
- PAG. CALEA.
 383¹. 1. *spectabilis*, Labill. . . . 186 = *Cassinia spectabilis*.
Suriani, Cass. . . . 33 = *Neurolaena lobata*.
 383². a. CALEATIA, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 76, in syn. (1841) = *Lucuma*, Molina (Sapotac.).
Caimito, Mart. l. c. = *L. Caimito*.
- CALIMERIS.
 384². 1. *flexuosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 251. t. 58. f. 2 =
- CALINEA.
 384². a. *Bentegati*, Walp. & Duchass. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 71 (= *Pinzona calineoides*).—Ins. Guadeloup.
- CALIPHURIA.
 384³. 1. *subdentata*, Baker,
- CALLA.
 384³. a. CALLAION, Rafin. New Fl. Am. ii. 90 (1836).
 1. *nitida*, Jack, . . . 24 = *Aglanema oblongifolia*.
oblongifolia, Roxb. . . . 516 = *Aglanema oblongifolia*.
 385¹. a. CALLAION, Rafin. New Fl. Am. ii. 90 (1836) = *Calla*, Linn. (Aroid.).
bispatha, *brevis*, *heterophylla*, *palustris*, Rafin. l. c. = *Calla palustris*.
 385¹. a. CALLIAGROSTIS, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146 = *Bromus*, Dill. (Gramin.).
- CALLICOMA.
 387¹. 1. Stutzeri, F. Muell. . . . 31
- CALLIGONUM.
 387¹. d. TRAXILISA, Rafin. (nunc *Tetracera*).
 387³. a. WACHENDORFIA, Loebl. It. Hisp. 177 (1758).
 388³. a. CALLITHRONUM, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148 = *Cephalanthera*, Rich. (Orchid.).
- CALLITRICHE.
 389¹. 1. *intermedia*, Hoppe,
 389². *spuria*, Rafin. . . . 354 = *verna*.
 389³. 1. CALLITRIS, Endl. Cat. Hort. Vindob. i. 209 (1842); et
 389³. a. CALLOBUXUS, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 372 = *Tristania*, R. Br. (Myrtac.).
- CALODENDRUM.
 390². 1. *capense*, Thunb.
- CALODRACON.
 390². 1. *Sieberi*, Planch. . . . 132 = *Cord. terminalis*.
- CALOGYNE.
 390³. 1. *Distylis*, F. Muell.
- CALONYCTION.
 390³. 1. *comospermum*, Boj.
- CALOPHANES.
 391¹. 1. *Hildebrandtii*, S. Moore, . . . (1880) 8.—
 391². *thunbergiaeflora*, S. Moore, . . . (1880) 8.—
- CALOPHYLLUM.
 391². 1. *Bintagor*, Roxb.
- CALOSCORDUM.
 392³. a. *exsertum*, Herb. l. c. (1847) sub t. 5 = *Allium Bakeri*.
 1. *neriniflorum*, Herb. l. c. (1844) Misc. 67.
- CALTHA.
 394¹. a. *nepalensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 22 = *palustris*.
himalayanus, Royle, (l. c.) 44 = *himalensis*.
pusilla, Herb. Lamb. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 390 = *natans*.
- CALYCADENIA.
 394². 1. *plumosa*, Kellogg, . . . 49 = *Blepharizonia plumosa*.
- PAG. CALYCERA.
 394². a. *andina*, Miers, Trav. Chil. ii. 531; et in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. iv. (1860) 186 (= *Nastanthus agglomeratus*).—Chili.
 1. *herbacea*, Cav.
 a. *lanata*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 102.—Chili.
- CALYCOPTERIS.
 395². a. Joan, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 23.—Japon.
- CALYPTRANTHES.
 396³. *nitida*, Raesch. . . . 144 = *Eugenia lucida*, Banks.
- CALYSTEGIA.
 398². 1. *villosa*, Kellogg, . . . 17 = *Convolvulus villosus*.
- CAMASSIA.
 399². 1. CYANOTRIS, Rafin. . . . Mag. (1818) 356; QUAMASIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 265;
- CAMELINA.
 399³. a. *incana*, J. & C. Presl, Fl. Čech. 134.—Europ.
- CAMELLIA.
 400¹. 1. *oleifolia*, Wall.
- 400². a. CAMERARIA, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 56 (1760) = *Hemerocallis*, Linn. (Liliac).
- CAMERARIA.
 400². a. *havanensis*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 705.—Cuba.
- CAMOENSIA.
 400². a. GIGANTHEMUM, Welw. Apont. 585 [1859], nomen prius.
- CAMPANULA.
 401³. 1. *clivosa*, Banks, . . . = *Wahlenbergia angustifolia*.
 404². *nitida*, [Soland.] . . . 346 = *pyramidalis* ?
 405¹. *porosa*, Thunb. . . . 39 = *Samolus porosus*.
 406¹. a. *Smithii* x, T. Moore, Flor. & Pomol. (1875) 209.
 406³. *thalictriflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 271, sphalm. = *seq.*
 1. *thalictrifolia*, Spreng.
- CAMPANUMOEAE.
 407². 1. *lanceolata*, Sieb. & Zucc. . . . 91 = *Codonopsis lanceolata*.
- 407². 1. CAMPHORATA, Tourn. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 230 (1747) = *Camphorosma*, Linn. (Chenop.).
- CAMPHOROSMA.
 407³. 1. CAMPHORATA, Tourn. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 230 (1747).
- CAMPNOSPERMA.
 408¹. a. CYRTOSPERMUM, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 13.
DREPANOSPERMUM, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 425 (1862).
- CAMPSIDIUM.
 408². 1. *chilense*, Reiss. & Seem. . . . 147 = *T. valdiviana*.
- 410¹. a. CANANGIUM, Baill. Hist. Pl. i. 213, in nota (1868) = *praec.*
- CANARIUM.
 410². a. STRANIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4.
- CANAVALIA.
 411¹. d. *incurva*, DC.
 1. *Moneta*, Welw. . . . 62 = *obtusifolia*.
- CANNA.
 412². a. *Annaei*, Hort. Par.—Cf. Rev. Hort. (1861) 470. f. 111 = *indica*.
 413¹. a. *textoria*, Noronha, Prod. Phytol. (in Thou. Mélang.) (1811).—Madag.
- 413¹. 1. CANNABINA, Tourn. ex Linn. Amoen. Acad. i. 415 (1749) = *Datisca*, Linn.

PAG.

CANSCORA.

- 413². 1. *FLEMINGIA*, Roxb. ex Wall. Cat. sub nn. 4 61, 4364 (1830 ?).

CANTHAROSPERMUM.

- 413³. a. *paucifolium*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 192, sphalm. = *pauciflorum*.

- 413³. 1. *CANTHIOPSIS*, Seem. . . (1866)

CANTHIUM.

- 413³. 1. *acuminatum*, D. Dietr. . . 779 (= *Gynopachis acuminata*).—Java.
414³. a. *sinense*, Steud. Nom. ed. II. i. 663, in syn. = *chinense*.

CAPELLENIA.

- 415¹. 1. *moluccana*, Teysm. & Binn. . . 1. c. = *E. moluccanum*.

- 415³. 1. *CAPNOREA*, Rafin. . . = *Hesperochiron*, S. Wats. (1871) (Hydrophyll.).
nana, Rafin. 1. c. = *H. californicus*.

CAPPARIS.

- 415³. a. *CALANTHEA*, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864) 161.
d. *TRICLANTHERA*, Rafin. (*nunc Crataeva*).

CAPRIFOLIUM.

- 418². 1. *germanicum*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 176 =
perfoliatum, Roehl. (1. c.) ed. II. ii. 176 =

CAPSELLA.

- 418³. 1. *Berengeriana*, Hort. . . 234 = elliptica.
elliptica, *C. A. Mey.* . . 199.—Reg. temp.
procumbens, Fries, . . 14 = elliptica.

- 419². 1. *CAPURA*, Blanco, . . 264 (1837).
d. *OTOPHORA*, Blume, (*nunc genus proprium*).
a. *alata*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor. 214 =
Otophora alata.
a. *multijuga*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 405.—
Borneo.
spectabilis, Teijsm. & Binn. 1. c. = *Otophora spectabilis*.
Zollingerianus, Teijsm. & Binn. 1. c. 215 =
Otophora Zollingeriana.

CARAGANA.

- 419³. *sylvatica*, Hoffmgg. Nachtr. Preisverz. (1842) 28.
—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 282 = frutescens ?

CARALLIA.

- 420². 1. *Symmetria*, Blume,

- 420². 1. *CARAMANICA*, Tineo, Pl. Rar. Sic. fasc. i. 3 (1846).

CARDAMINE.

- 421¹. 1. *bracteata*, S. Moore, . . 130 = *Eutrema Wasabi*.

- chelidonioides*, S. Moore, . . 130 = *C. Tanakae*.
421³. *Heyneana*, Welw. . . 676 (*Hayneana*).

- 421³. *javanica*, Miq. . . 17. t. 10.

- 422². a. *rotundifolia*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 30.—
Am. bor.

- 423². a. *CARDIOPHYLLUM*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148 = *Listera*, R. Br. (Orchid.).

CARDIOSPERMUM.

- 423³. a. *RHODIOLA*, Lour. Fl. Cochinch. 627 (1790).
1. *triphylum*, Vell. . . 25 = *Urvillea triphylla*.

CARDUNCCELLUS.

- 424¹. a. *lanatus*, Moris, Fl. Sard. ii. 439 = *Carthamus lanatus*.

CARDUUS.

- 424². 1. *arenarius*, DC. . . 457 = *Decandollei*.
424³. *Candollei*, DC. Prod. vi. 625 = *Decandollei*.

- 425¹. *Decandollei*, Moretti, in *Brugnat. Giorn. Fis. Dec. II. v.* (1822) 45.—Europ.

- 425³. *litigiosus*, Nocca & Balb. . . 12 = *Decandollei*.
montanus, Suffr. . . 625 = *Decandollei*.

- 426². *Sanctae-Balmae*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 426 = *Decandollei*.

VOL. II.

PAG.

- 427¹. insere *CARELIA*, Cav. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1862) 317 = *Mikania*, Willd. (1803) (Compos.).
saturiaefolia, Cav. 1. c. = *M. amara*.

CAREX.

- 427¹. a. *AGASTACHYS*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146.
BAEOCHORTUS, Ehrh. (1. c.) 149 (1789).
CHORDORRHIZA, Ehrh. (1. c.) 148 (1789).

1. *PHYLLOSTACHYS*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 404, in obs.

- 428². a. *bengalensis*, Thw. Enum. Fl. Zeyl. 355 = *indica*.

1. *Benthamiana*, Boott, . . Himal. 412 = *notha*.
428³. *brevicaulis*, Thou. Fl. Trist. d' Acugn. 35 = *Uncinia brevicaulis*.

- 429¹. *Brownii*, Tuckerm. . . 15 (non 21).

- 430³. *divisa*, Oed. . . = *Oederi*.

- 431¹. *excurva*, Boott, . . 57 = *nemostachys*.

- 431². *ferruginea*, Stev. . . Nat.

- filifolia*, Nutt. . . 204.—Am. bor.

- flacca*, Schreb. Spicil. App. n. 669.

- 431³. *fusca*, All. . . 269.—Europ.

- 432². *Halleriana*, Asso, *Stirp. Arag.* 133. t. 9.

- a. *hamosa*, Thou. Fl. Trist. Acugn. 35 = *Uncinia brevicaulis*.

- 433². 1. *lagopodioides*, Schkuhr, . . 20.

- 434¹. *lithosperma*, Linn. . . XII. 618; Murr. Syst. ed. XIII. 706.

- a. *longiaristata*, Boott, ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 350 = *indica*.

- 435¹. *Moritzii*, Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. 60; Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 350 = *indica*.

- 435². *Nenningiana*, Opiz, Seznam, 103 (err. typ. 203) (Quid ?).—Europ.

- 436². *parasitica*, Kunze, in *Schkuhr, Riedgr. Suppl.* i. 1. 83, in nota.—Abyss.

- pendula*, Schreb. Spicil. 62 = *glaucia*.

- 437¹. *Pseudo- et Pseudo-* (passim).

- 437². *psilochloa*, Wall. Cat. n. 3534.—Burma.

- 438³. 1. *simpliciuscula*, Wahlenb. . . 141 = *Kobresia caricina*.

- 439¹. a. *stramentitia*, Boott, ex Boeck. in *Linnaea*, xl. (1876) 351.—Reg. Himal.

1. *strictifolia*, Opiz, Seznam, 103 (err. typ. 203) = *acuta*.

- 439³. a. *tenuissima*, Schur, Enum. Pl. Transs. 704 = *muricata*.

1. *tribuloides*, Wahlenb. . . 145.—Am. bor.

- 440³. a. *xanthosperma*, Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xlii. (1866) 334 = *flaccosperma*.

CARICA.

- 441¹. 1. *VASCONCELLEA*, A. St. Hil. . . 12.

- a. *hastata*, Brign. in *Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II.* i. (1862) 77.—Bras.

- lanceolata*, Benth. & Hook. f. ex Hieron. Pl. Diaph. 122.—Reg. Argent.

1. *Posoposa*, Linn.

- a. *quercifolia*, Benth. & Hook. f. ex Hieron. (1. c.).—Reg. Argent.

CARISSA.

- 441². 1. *oblongifolia*, Hochst. . . 827 = *Acokanthera oblongifolia*.

- Schimperi*, A. DC. . . 675 = *Acokanthera Schimperii* (in Addend.).

- a. *sepiaria*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 15, nomen = *C. spinarum*.

CARLUDOVICA.

- 442¹. 1. *angustifolia*, Ruiz & Pav. 1. c. 292 = *Cyclanthus Plumierii*.

- a. *angustifolia*, Seem. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 513 = *Oerstedii* ?

- a. *gracilis*, Liebm. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 513.—Ind. occ.; Mexic.

- 442². *jamaicensis*, Lodd. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 630 (sp. dub.).—Ind. occ.

- palmaefolia*, Sweet, (1. c.) = *Plumerii*.

- Plumerii*, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 259 = *gracilis*.

1. *Plumieri*, Griseb. . . 513 = *Plumerii*.

CARPINUS.

- 443³. a. *lacera*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 449, sphalm. = *Corylus lacera*.

PAG.

CARPOPOGON.

- 444². 1. *anguineum*, Roxb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 119, nomen; et

CARRICHTERA.

- 444³. 1. *Vellae*, DC.

- 445². 1. *CARUM*, Rupp.

- a. *TRAGIOPSIS*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 139. (1874).

- 445³. 1. *Lomatocarum*, Boiss.

- a. *nigrum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 229 (Quid ?).—Reg. Himal.

- 446¹. 1. *Panattjan*, Baill. . . = *Pimpinella Pruatjan*.

CARYA.

- 446². 1. *texana*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861) 444; C. DC.

CARYOPHYLLUS, Linn.

- 447¹. 1. *pterocarpus*, Vieill. . . 256 = *E. pterocarpa*.
a. *rugosus*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 437 = *E. zeylanica*.

CARYOSPERMUM.

- 447¹. 1. *arborescens*, F. Muell. *Fragm.* vi. 202; viii. 279.

CARYOTA.

- 447¹. a. *THUESSINKIA*, Korth. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 41 (1855).

- 447². 1. *mitis*, Lour. . . 569; ed. Willd. 697.

CASEARIA.

- 447³. 1. *GUIDONIA*, Plum. ex Adans. Fam. ii. 305 (1763).

- 448¹. *Cheela*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 170 = *tomentosa*.

- 448³. *pauciflora*, Royle, (1. c.) = *tomentosa*.
piscidia, Buch.-Ham. ex Royle, (1. c.) = *tomentosa*.

- 449². 1. *CASPIA*, Pison. ex Scop. . . = *Vismia*, Vand.

CASSIA.

- 449³. 1. *GRIMALDIA*, Schrank, in Allg. Bot. Biblioth. iv. (1805) 184.

- a. *acacalis*, Royle, in Journ. As. Soc. Beng. i. (1832) 462 (err. typ. 452) = *C. Absus*.

- 445¹. *artemisiaefolia*, R. Br. in Sturt, Centr. Austral. ii. App. 77 = *artemisioides*.

1. *aversiflora*, Hook. . . t. 2638 =

- 450². *canaliculata*, R. Br. . . ii. App. 77 =

- 450³. 1. *conspicua*, G. Don, in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 344; Vog.

- 451³. a. *glaucescens*, A. Cunn. ex R. Br. in Sturt, Centr. Austral. ii. App. 77 = *artemisioides* ?

- 453¹. 1. *phyllodinea*, R. Br. . . ii. App. 78.

- platypoda*, R. Br. . . ii. App. 78 =

- 454¹. *Sturtii*, R. Br. . . ii. App. 77.

CASSIPOUREA.

- 455². 1. *gummifera*, Tul. . . 123 = *Dactylopetalum sessiliflorum*.

- lanceolata*, Tul. 1. c. 121 = *Weihea lanceolata*.
leptoclada, Tul. 1. c. 125 = *Weihea leptoclada*.

- madagascariensis*, DC. 1. c. = *Weihea madagascariensis*.

- microphylla*, Tul. . . 124 = *Weihea microphylla*.
myriocarpa, Tul. . . 162 = *Weihea myriocarpa*.

- ovata*, Tul. . . 121 = *Weihea ovata*.

- phaeotricha*, Tul. 1. c. 122 = *Weihea phaeotricha*.
serrata, Benth. . . 223 = *macrophylla*.

CASSYTHA.

- 455². a. *SPIRONEMA*, Rafin. 1. c. (1836).

CASTANEA.

- 456¹. a. *cochinchiensis*, Steud. Nom. ed. II. i. 624, in syn. = *sativa*.

- sinensis*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 108 = *sativa* ?

CATALPA.

- 458². 1. *cordifolia*, Faume St. Hil. . . 5.—Am. bor.
speciosa, Warder, . . 1 = *cordifolia*.

CATAPODIUM.

- 458³. a. *filiforme*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417 = *F. filiformis*, Steud.

7 Z

- PAG. **CATASETUM.**
459¹. 1. *purum*, Nees & Sinning, *Amoen. Bot. Bonn.* ii. (1824) i. t. 1.
- CATESBAEA.**
459². 1. *macracantha*, Wright,
- CATHA.**
459³. 1. *campestris*, Presl, . . . 34 = *Putterlickia pyracantha*.
- CATTLEYA.**
461³. a. *violacea*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) ii. 424, in nota.—Guian.
- CAUCALIS.**
462². a. *grandiflora*, Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 929.—Oriens.
1. *grandiflora*, Linn. . . . =
stifolia, Roehl. *Deutschl. Fl.* ed. II. ii. 214 =
- CAULINIA**, Willd.
462¹. 1. *composita*, Buch.-Ham. . . . n. 5184 = *Cerato-phyllum demersum*.
- CAYAPONIA.**
463². a. *ARKEZOSTIS*, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 100 (1836).
- CEANOTHUS.**
464¹. a. *DIPLISCA*, Rafin. *Sylva Tellur.* 31 (1838).
1. *azureus*, Kellogg, . . . 54 =
californicus, Kellogg, . . . 54 =
a. *divergens*, Poepp. ex Endl. *Gen.* 1099 = *Sageretia divergens*.
464². *riparius*, Poepp. ex Endl. (l. c.) = *Sageretia riparia*.
464³. 1. *thyrsiflora*, Eschscholtz,
a. *venosus*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 169, nomen (Quid ?).—Reg. Himal.
- CECROPIA.**
465¹. a. *peltata*, Billb. ex Beurl. in *Vet. Akad. Handl.* Stockh. 1854 (1856), 148 = *Humboldtiana*.
- CEDRELA.**
465¹. 1. *Cedro*, M. Roem. *Syn. Hesper.* 136, in syn. =
465². *Rosmarinus*, Lour. . . . = *Baeckea cochinchinensis*.
- CEDRUS.**
465². 1. *Deodara*, Loud. *Hort. Brit.* 338; Arbor.
Libani, Loud. *Hort. Brit.* 338.—
- CELASTRUS.**
465³. a. *EUONYMIDES*, Isnard, ex *Medic. Phil. Bot.* i. 173 (1789).
1. *campestris*, Eckl. & Zeyh. . . . = *Putterlickia pyracantha*.
Colpoon, Hort. . . . = *Putterlickia pyracantha*.
466¹. *integer*, Thunb. . . . = *Putterlickia pyracantha*.
466². *linearis*, Linn. f. . . . (Gymnosporiae sp.).—Afr. austr.
obtusius, Thunb. . . . = *Putterlickia pyracantha*.
466³. *pyracanthus*, Linn. . . . 197 = *Putterlickia pyracantha*.
quadrangulatus, Schrad. . . . 716 = *Elaeodendron quadrangulatum*.
467¹. a. *venustus*, Soland. ex Forst. f. in *Comm. Gotting.* ix. (1789) 44 (Quid ?).—Reg. Magell.
1. *verrucosus*, E. Mey. . . . 453 (*Putterlickia* sp.).
- CELOSIA.**
467². 1. *gnaphalioides*, Linn. f. . . . 161 = *Pfaffia gnaphalioides*.
laxa, Schum. & Thonn.
- CELSIA.**
468¹. a. *DITOXIA*, Rafin. *Préc. Découv.* 39 (1814); et in *Desv. Journ. Bot.* iv. (1814) 270.
- CELTIS.**
468³. a. *alpina*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 341 = *australis*?
1. *biflora*, Ruiz, ex Klotzsch, l. c. 539.
469¹. 1. *dichotoma*, Ruiz, ex Klotzsch, in *Linnaea*, xx. (1847) 539.
a. *Inglisii*, Royle, (l. c.) = *australis*?
469². *Muku*, Siebold, in *Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 28 = *Aphananthe aspera*.
469³. 1. *pubescens*, Spreng. *Syst. i.* 931.
spinosa, Ruiz, ex Klotzsch, in *Linnaea*, xx. (1847) 539 =
- PAG. **CENCHRUS.**
470². 1. *macrostachyus*, Hochst. . . . 109 = *Pennisetum Prieuri*.
- 470³. 1. *CENOLOPHON*, Blume, . . . i. 60 (1827).
- CENTAUREA.**
471². 1. *acromaura*, Hoffmgg. *Nachtr. Preisverz.* (1842) 30.—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) *Litt.* 283.
471³. *armena*, Boiss.
472². *cerinthifolia*, Sibth. & Sm.
a. *chlorosperma*, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 39 = *serratula*.
473¹. 1. *cyanooides*, Wahlenb. in *Bergg. Resor.* ii. *Bihang*, 65; et in *Isis*, xxi.
Debeauxii, Gren. & Godr.
474¹. *horrida*, Badaro, . . . *Fis. Dec.* II. vii. (1824) 367
474³. a. *microcephala*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 568, in syn., sphalm. = *aspera*.
475². 1. *napulifera*, Rochel, ex *Frivald. in Magyar Tud. Társ. Evkón.* ii. (1835) 250
475³. *Picris*, Pall.
Pseudo-behen, *Pseudo-collina*; *Pseudo-crupina*, *Pseudo-philostizus*, *Pseudo-phrygia*, *Pseudo-scabiosa*, *Pseudo-uniflora*.
476². a. *serratula*, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 38 (Quid ?).—Gallia.
476³. *spinoso-ciliata*, Seenus, *Reise Istrien*, 65 = *nigra*.
stenocarpa, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 39 (Quid ?).—Gallia.
477³. insere *CENTINODIUM*, Montand. *Guide Bot.* 270 (1868) = *Polygonum*, Tourn.
axillare, Montand. l. c. = *P. aviculare*.
- CENTRATHERUM.**
478². a. *frutescens*, Benth. ex C. B. Clarke, *Comp. Ind.* 5.—Java.
- CENTROPOGON.**
479¹. a. *barbatus*, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 547.—Peruv.; N. Granat.
erianthus, Benth. & Hook. f. (l. c.).—Ecuador.
479². *Hartwegi*, Benth. & Hook. f. (l. c.).—Ecuador.
popayanensis, Benth. & Hook. f. (l. c.).—N. Granat.
- CENTROSEMA.**
479³. a. *triquetrum*, Spruce, ex Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 528.—Peruv.
- CENTUNCULUS.**
480¹. a. *indicus*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 310 = *tenellus*.
- CEPHAELIS.**
480². d. *IPECACUANHA*, Arruda (*nunc Psychotria*).
1. *EVEA*, Aubl. . . . i. 100.
TAPOGOMEA, Aubl. . . . i. 157.
a. *asthmatica*, Baill. *Hist. Pl.* vii. 376, in adnot.—Hab.?
guianensis, Baill. (l. c.).—Guian.
- CEPHALANTHERA.**
481¹. a. *LORCHOPHYLLUM*, Ehrh. *Beitr.* iv. (1789) 148.
XIPHOPHYLLUM, Ehrh. l. c. (1789).
- CEPHALARIA.**
481². a. *XETOLA*, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 95 (1836).
graminifolia, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 651, in syn., sphalm. = *Scabiosa graminifolia*.
- 481³. 1. *CEPHALIDIUM*, A. Rich. . . . 290 =
a. *citrifolium*, A. Rich. l. c. = *A. morindaefolius*.
- CEPHALOSCHOENUS.**
482². a. *longirostris*, Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 101, in obs. = seq.
1. *longisetis*, Nees, in *Linnaea*, ix. (1834) 296.
- CERASTIUM.**
483². a. *DOERRIENA*, Borkh. in *Rhein. Mag.* i. (1793) 528.
d. *DUFUREA*, Gren. (*nunc Arenaria*).
a. *acutifolium*, Dufour, *Lettr. Mont. Maudit.* 372 = *alpinum*.
- PAG. **CERASTIUM** :—
484¹. *dahuricum*, Schrank, *Pl. Rar. Hist. Monac.* t. 75 = *davuricum*?
485¹. *microcarpum*, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 22 (Quid ?).—Gallia.
485². *Ramondi*, Fenzl, ex Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 149 = *Arenaria purpurascens*.
- CERASUS.**
486². 1. *Hixa*, C. Sm. . . . = *P. lusitanica*.
- CERATANDRA.**
487¹. a. *atrata*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 415, sphalm. = *chloroleuca*.
- CERATOSTEMA.**
488². a. *coronaria*, Hort. Linden, ex Hook. f. *Bot. Mag.* sub t. 5575 = *Themistoclesia coronilla*.
- CERATOZAMIA.**
488³. 1. *boliviana*, Brongn. . . . 9 = *Zamia Brongniarti muricata*, Miq. . . . nomen = *Zamia muricata*.
- CERBERA.**
489¹. d. *NEIOSPERMA*, Rafin. (*nunc Ochrosia*).
1. *chinensis*, Spreng. l. c. (*Rauwolfia* sp.).—China.
fruticosa, Roxb. . . . Ker-Gawl. . . . =
- 489². insere *CERDOSURUS*, Ehrh. *Beitr.* iv. (1789) 148 = *Alopecurus*, Linn. (*Gramin.*).
- CERESIA.**
489³. a. *biflora*, Rasp. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* v. (1825) 301 = *Paspalum biflorum*.
- CEREUS.**
491¹. a. *Hermannianus*, Suring. in *Versl. en Meddel. Kon. Akad.* III. ii. (1885) 194.—Ind. occ.
491². 1. *lumbrioides*, Lem. . . . 60 = *Rhipsalis sarmen-tosa*.
491³. a. *Martini*, Dupuis, in *Rev. Hort. Sér. IV.* ix. (1860) 657. f. 123 = *Martinianus*.
1. *obtusius*, Haw. . . . 70.—Afr. austr.
493¹. *variabilis*, Pfeiff. . . . 105 = *obtusius*.
- CERINTHE.**
493². a. *pyrenaica*, Arv. *Ess. Pl. Dauph.* 52 (Quid ?).—Gallia.
- CESTRUM.**
495². a. *macrophyllum*, Billb. ex Beurl. in *Vet. Akad. Handl.* Stockh. 1854 (1858), 140 = *Billbergianum*.
496¹. 1. *thyrsoides*, H. B. & K.
- CHAENOSTOMA.**
497². 1. *SUTERA*, Roth, . . . (1807).
a. *gilanicum*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 175, in syn., sphalm. = *macrospermum*.
- CHAEROPHYLLUM.**
498². 1. *Sphallerocarpus*, Kar. & Kir.
- CHAETACHME.**
498³. 1. *nitida*, Planch. & Harv. . . . 16 = *aristata*.
- CHAETANTHERA.**
498³. 1. *dealbata*, Hook. & Arn. . . . 104 = *Trichocline dealbata*.
- CHAETARIA.**
499¹. 1. *Forskollii*, Nees, . . . = *A. barbicollis*.
- CHAETOCALYX.**
499². 1. *acutifolia*, Benth.
latisiliqua, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* i. 268.
- CHAETOSPORA**, R. Br.
500³. 1. *Burmanni*, Schrad. . . . 4 = *S. Burmanni*.
501¹. d. *pterosperma*, H. B. & K.
- CHAETOSPORA**, H. B. & K. (post praec. ponitur).
500². a. *pterosperma*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 128 = praec.
- CHAETOTHYLAX.**
501². a. *eustachiana*, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 1110.—Ind. occ.

PAG.

CHAILLETIA.

- 501². 1. *Bojeri*, Tul. . . . Madag.
 501³. *gelonioides*, Hook. f. . . . 570 = *sumatrana*.
reflexa, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 343, sphalm. =
deflexa.
sumatrana, Miq. . . . 328.—Ind. or.; Malaya.

CHALCANTHUS.

- 501³. 1. *renifolius*, . . . = *H. renifolia*.
 502¹. 1. *CHALEPOA*, Hook. f. in Hook. Ic.
 502². 1. *CHAMAECLEMA*, Boerh. ex Boehm. in Ludw.
 Def. Gen. Pl. 115; Moench,

CHAMAECYPARIS.

- 502². 1. *breviramea*, Maxim. . . . = *Cupressus obtusa*.
Keteleri, Stand. . . . = *Cupressus obtusa*.
 502³. *nana*, Hort. . . . = *Cupressus thuyoides*.
pendula, Maxim. . . . = *Cupressus pendula*.
Pseudo-squarrosa, Parl. . . . = *Cupressus thuyoides*.
pumila, Hort. . . . = *Cupressus thuyoides*.
sphaeroidea, Spach. . . . = *Cupressus thuyoides*.
squarrosa, Hort. . . . = *Cupressus thuyoides*.
variegata, Hort. . . . = *Cupressus thuyoides*.

CHAMAEDOREA.

- 503¹. 1. *Ghiesbreghtii*, Hort. . . . 239, nomen = *Gaussia Ghiesbreghtii*.

CHAMAEMELUM, Vis.

- 504¹. 1. *auriculatum*, Boiss. . . . 23 = *M. auriculatum*.
 504². insere *CHAMAEMORUS*, Ehrh. Beitr. iv. (1789)
 147 = *Rubus*, Tourn. (Rosac.).

CHAMAEPUCE.

- 504³. a. *cretica*, Steud. Nom. ed. II. ii. 630, in syn.,
 sphalm. = *mutica*.
 1. *Diacantha*, DC. l. c. = *Cn. Diacantha*.

CHAMAERAPHIS.

- 504³. a. *PSEUDORAPHIS*, Griff. Notul. iii. 29 (1851).

CHAMAEROPS.

- 505¹. 1. *Birao*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830)
 11;
excelsa, Thunb. . . . 130 =
 505². insere *CHAMAESCHOENUS*, Ehrh. Beitr. iv.
 (1789) 147 = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).

CHAMAESPACOS.

- 505². a. *TAPEINANTHUS*, Boiss. ex Benth. in DC. Prod.
 xii. 436 (1848).

CHAMITIS.

- 506¹. 1. *complicata*, Soland. ex Forst. f. in Comm.
 Gotting. ix. (1789) 45;
 506². 1. *CHAPTALIA*, Royle, . . . Himal. 251.

CHAPTALIA.

- 506². d. *piloselloides*, Baker, . . . —Bras.

CHASALIA.

- 507¹. 1. *amicorum*, A. Gray, . . . 43 = *Ixora carnea*.

CHAVICA.

- 508². 1. *petiolata*, C. DC. . . . 389 = *P. reticulatum*.
 510². 1. *CHEIRISANTHERA*, Hort. ex Lindl. & Paxt.
 Flow. Gard. ii. (1851) 59;
atrosanguinea, Hort. ex Lindl. & Paxt. l. c.;

CHELIDONIUM.

- 510³. 1. *hybridum*, Linn. . . . = *Roemeria violacea*.
 511¹. *violaceum*, Lam. . . . = *Roemeria violacea*.

CHENOPODIUM.

- 512¹. 1. *Atriplicis*, Linn. f. . . . = *album*?

CHILOCHLOA.

- 514³. 1. *dentata*, Trin. . . . = *Prionanthium rigidum*.

CHIMARRHIS.

- 515¹. a. *cyrrhosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 88, in syn.,
 sphalm. = *cymosa*.

CHIONANTHUS.

- 515³. 1. *Ghaeri*, Gaertn. . . . 190 = *Scirpodendron costa-*
tum.

PAG.

CHIONANTHUS.

- 515³. 1. *angustifolia*, Rafin. ante *chinensem*, Maxim.
 ponenda.

CHIONOLAENA.

- 516¹. 1. *Arbuscula*, DC.
larandulacea, Hemsl.
lavandulifolia, Benth. & Hook. f.

CHIRONIA.

- 517². a. *purpurascens*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 805.—
 Afr. austr.

CHLAMYDOSTYLUS.

- 518¹. 1. *Medusa*, Baker, l. c. = *N. Medusa*.

CHLORAEA.

- 518³. 1. *densa*, A. Rich. . . . 454 = *membranacea*.

CHLORIS.

- 519². a. *LANGSDORFFIA*, Fisch. ex Regel, Ind. Sem.
 Hort. Petrop. (1863) 26.
 520². 1. *Roxburghiana*, Schnlt. . . . 339.

CHLOROPHORA.

- 520³. a. *excelsa*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 363.—Afr.
 trop.

- 520³. insere *CHLOROPHYLLUM*, Liais, Brés. 613
 (1872), sphalm. = *Chrysophyllum*, Linn.
 (Sapotac.).

CHLOROPHYTUM.

- 521¹. 1. *Schidospermum*, Baker.

CHONDRILLA.

- 522². 1. *PELTIDIUM*, Zollikof. in Nat. Anz. Schw. Ges.
 iv. (1820) 13.

- 522³. 1. *CHONDROLAENA*, Nees, . . . = *Prionan-*
thium, Desv. (Gramin.).
phalaroides, Nees, . . . *P. rigidum*.

CHONDRORHYNCHA.

- 522³. 1. *fimbriata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) II.,
 648, in nota;

- 523². insere *CHORDORRHIZA*, Ehrh. Beitr. iv.
 (1789) 148 = *Carex*, Dill. (Cyperac.).

CHORIZANTHE.

- 524¹. a. *insignis*, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. iv.
 (1885) 275.—Calif.

CHRISTOPHORIANA.

- 525². 1. *spicata*, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 458;
 Moench,

CHRYSANTHELLUM.

- 525³. 1. *HINTERHUBERA*, Sch. Bip. in Flora, xxiv.
 (1841) i. Intell. 42.

CHRYSANTHEMUM.

- 526¹. d. *OTOSPERMUM*, Willk. (*nunc* *Matricaria*).
 1. *artemisiaefolium*, Klatt, . . . (1878) l.
 526³. *Hermintii*, Hoffmgg. & Link, . . . ii. 331. t.
 102.

- larvatum*, Griseb. . . . 266 = *coronopifolium*.
setabense, Dufour, . . . = *paludosum*.
sylvaticum, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii.
 329 =
trichophyllum, Boiss. . . . 10 = *Matricaria tricho-*
phylla.
Turreanum, Vis. Stirp. Dalm. Rev.
viscidum, Steud. Nom. ed. II. i. 755, in syn. =
viscosum.

- 527². insere *CHRYSASTRUM*, Willd. ex Wedd.
 Chlor. And. i. 211, in nota (1855) = *Liabum*,
 Adans. (Compos.).
sagittatum, Willd. ex Wedd. l. c. (= *Munozia*
sagittata).—Reg. Andin.

CHRYSOCOMA.

- 528². a. *GUNDLACHIA*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi.
 (1881) 100.

- 529³. 1. *CHRYSOPHTHALMUM*, Sch. Bip.

CHRYSOPHYLLUM.

- 530². a. *philippense*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii.
 (1825) 109 (Quid?).—Ins. Philipp.

PAG.

CHRYSOPOGON.

- 530². a. *DIPOGON*, Willd. in Steud. Nom. ed. II. i. 518
 (1840).

CHRYSURUS.

- 531³. 1. *Lamarkia*, Moench,
 531³. insere *CHRYSIS*, Renealm. ex DC. Prod. v. 585
 (1836) = *Helianthus*, Linn. (Compos.).

CIMICIFUGA.

- 535². d. *PITYROSPERMA*, Sieb. & Zucc. . . . iii. iv.
 a. *dahurica*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 28.—Reg.
 Amur.; China.
 1. *japonica*, Spreng.

CINCHONA.

- 536². 1. *macrophylla*, Karst. . . . 151 = *Remija macro-*
phylla.
 536³. *prismatostylis*, Karst. . . . 7 = *Remija primato-*
stylis.

CINERARIA.

- 537². 1. *aurita*, Andr. . . . = *Senecio cruentus*.
 a. *cladobotrys*, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv,
 xviii. (1852) 343, in obs. = *Senecio cladobo-*
trys.
 537³. 1. *cruenta*, Mass. . . . = *Senecio cruentus*.
 a. *elegantissima*, Hoffmgg. Nachtr. Preisverz.
 (1842) 26.—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 280
 (an hybr.?).—Hab.?
 1. *Fussii*, Nym. Syll. 2 =
 538¹. *lanata*, Link, . . . = *Senecio cruentus*.
 538². a. *longifolia*, Griseb. & Schenk, (ut supra) 343 =
Senecio cladobotrys.
 539¹. 1. *Webberiana* ×, Paxt. . . . 125.

CINNAMOMUM.

- 539³. 1. *Maruba*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830)
 24; Meissn. . . . —Japon.

CIPURA.

- 540². 1. *Northiana*, Endl. . . . 6 = *Marica Northiana*.

CIRSIIUM.

- 541². 1. *acanthifolium*, Arv. Monog. Pilos. 52; et in
 Bull.
 a. *angustatum*, Peterm. Fl. Bienitz, 56 (Quid?).—
 Europ.
bifrons, Arv. Monog. Pilos. 52 (Quid?).—Gallia.
bracteosum, Arv. Add. Monog. Pilos. 18 (Quid?).
 —Gallia.
 541³. *capitatum*, Arv. Monog. Pilos. Suppl. 36 =
variegatum.
carduophilum, Arv. Ess. Pl. Dauph. 38, in obs.
 (Quid?).—Gallia.
cenisium, Arv. Monog. Pilos. Suppl. 38 (Quid?).
 —Gallia.
cirsioophilum, Arv. Ess. Pl. Dauph. 38, in obs.
 (Quid?).—Gallia.

- 542¹. 1. *dentatum*, DC. . . . 654 = *Carthamus dentatus*.
 542³. a. *laceratum*, Arv. Monog. Pilos. Suppl. 37 (Quid?).
 —Gallia.

- 543². *orophilum*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 37 (Quid?).—
 Gallia.

- 544². *variegatum*, Arv. Monog. Pilos. 51 (Quid?).—
 Gallia.

CISSAMPELOS.

- 544³. 1. *discolor*, DC. . . . = *Stephania discolor*.
glabra, Buch.-Ham. . . . = *Stephania discolor*,
 rotunda.
hernandifolia, Willd. . . . = *Stephania discolor*.
 545¹. *umbellata*, E. Mey. . . . = *Stephania discolor*.

CISSUS.

- 546¹. 1. *hederacea*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 149 =
 547¹. *quinquefolia*, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793)
 595; Desf.
rosea, Royle, Illustr. Bot. Himal. 145, 149.
 t. 26. f. 1 = *V. repanda*.
 547². a. *Tweediana*, Hieron. Pl. Diaph. 66 = *V. Twee-*
dieana.

CISTANCHE.

- 547². a. *violacea*, Hoffmgg. & Link, Fl. Pont. i. 320.—
 Reg. Mediterr.

CISTUS.

- 548¹. 1. *corsicus*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi.
 (1827) 416.
 549². *strigosus*, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol.
 ii. 75.

- PAG. **CITRIOBATUS.**
550². 1. *pauciflorus*, A. Cunn.
- CITRULLUS.**
550³. a. **COLOCYNTHIS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1785).
- CITRUS.**
551¹. 1. *Daidai*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 59
Kunep, Siebold,
551². *Papeda*, Miq.
a. *Sabou*, Siebold, (l. c.) (Quid?).—Japon.
Toomikan, Siebold, (l. c.) (Quid?).—Japon.
Sarcodactylus, Siebold, (l. c.); Nooten, Fleurs
Fr. Java, t. [29] = C. Medica.
- CLADIUM.**
551³. a. **VAUTHIERA**, A. Rich. Fl. N. Zel. 106. t. 20 (1830).
552². insere **CLADOSPERMA**, Griff. Notul. iii. 165 (1851) = *Pinanga*, Blume (Palm.).
- CLARKIA.**
553². 1. *Eiseneana*, Kellogg, . . . 94 = *pulchella*.
- CLAUSENA.**
553³. 1. **COOKIA**, Sonner. Voy. Ind. iii. 258. t. 130 (1782).
- CLAVIJA.**
554¹. a. *pungens*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. iii. (1876) 145, in obs. = *ornata*.
554³. 1. **CLEACHNE**, Roland. ex Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 285 =
- CLEISTES.**
555³. a. *bella*, Reichb. f. & Warm. Otia Bot. Hamb. 81 = P. *bella*.
caloptera, Reichb. f. & Warm. l. c. = P. *caloptera*.
1. *lutea*, Lindl. . . 409 = P. *grandiflora*.
a. *Mantiqueirae*, Reichb. f. & Warm. Otia Bot. Hamb. 81 = P. *Mantiqueirae*.
paludosa, Benth. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 637 = P. *tenuis*.
1. *parviflora*, Lindl. . . 410 = P. *parviflora*.
- CLEMATIS.**
556¹. 1. **SIEBOLDIA**, Hoffmgg. Preisverz. (1842) Nachtr. 28.—Cf. Linnaea, xvi. (1842) Litt. 281.
a. *atroviolacea* ×, Carr. in Rev. Hort. (1879) 350.
556². 1. *depauperata*, Colenso, . . . (1868) ed. I. *Essays*, n. iv. 18; ed. II. (1871) 248.
556³. d. *glauca*, Claus,
557¹. 1. *Jackmanni* ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1864) 773, 823; et ex Lem. Illustr. Hort. xi. (1864) t. 414;
558¹. 1. *sibirica*, Mill. . . 12 = C. *Flammula*.
d. *tubulosa*, Hook.
- CLEOME.**
558³. d. **MOZAMBE**, Rafin. (*nunc* *Cadaba*).
PODOGYNE, Hoffmgg. (*nunc* *Gynandropsis*).
1. *aphylla*, Thunb. . . = *Cadaba juncea*.
559¹. a. *dumosa*, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 18. —Madag.
559². *micrantha*, Baker, (l. c.)—Madag.
560¹. 1. *semitetrandra*, Sond. . . (semitetrandra).
stenophylla, Klotzsch, . . . 1164 = Guian.; Bras.
- CLERODENDRON.**
561². 1. *hemiderma*, F. Muell. . . 61 = *Glossocarya hemiderma*.
Kaempferi, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 31 (err. typ. 51); Fisch.
Linnaei, F. Muell. . . 151 = *Glossocarya hemiderma*.
562¹. a. *violaceum*, Zeyh. Hort. Schwetzing. 54; ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 127.—Hab.?
562². post **CLETHROSPERUM** pone
CLEVELANDIA, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. iv. (1885) 182 (Scrophul.).
Bildingi, Greene, l. c. = Calif.

- PAG. **CLIBADIUM.**
563¹. 1. *neriifolium*, DC. . . 507 = *Espeletia neriifolia*.
- CLIDEMIA.**
563³. 1. *Epibaterium*, DC. . . = *Ossaea Epibaterium*.
564². *Xantholasia*, DC. = *Oxymeria Xantholasia*.
Xantholasia, Gardn.
- CLINOGYNE.**
565². a. **ILYTHURIA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 51 (1836).
Blumei, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 650.—Java.
- CLITORIA.**
566³. a. *philippensis*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 110 (Quid?).—Ins. Philipp.
- CLUSIA.**
567². a. *Galactodendron*, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 315. t. 8.—Venezuela.
567³. *longifolia*, Rich. . . 113 = *Tovomita clusiae-folia*.
- CLUYTIA.**
568². 1. *hirta*, Linn. f. . . = *Lachnostylis capensis*.
568³. a. *vaccinioides*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 436 = *heterophylla*.
- CLYPEA.**
568³. 1. *hernandifolia*, Wight & Arn. . . = S. *discolor*.
venosa, Blume, l. c. = S. *rotunda*.
- CNEMIDOSTACHYS.**
569². 1. *Vahlui*, Spreng.
- CNIDIUM.**
572¹. a. *tortuosum*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 902 = *Foeniculum tortuosum*.
- COBAEA.**
572¹. a. *campanulata*, Hemsl. in The Garden, xvii. (1880) 352.—N. Granat.
1. *gracilis*, Hemsl. l. c.—Costa Rica.
572². a. *Trianae*, Hemsl. (l. c.) 353.—N. Granat.
- COCCOCYPSELUM.**
573¹. 1. *violaceum*, Desf. . . 404 = *campanuliflorum*.
- COCCOLOBA.**
573². a. **GUAIBARA**, Plum. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 402 (1760).
- COCCULUS.**
574¹. d. **LEGNEPHORA**, Miers, (*nunc* *Pericampylus*).
574². 1. *coriaceus*, Blume,
a. *diversifolius*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 10.—Japon.
1. *Forsteri*, DC. 517 = *Stephania discolor*.
a. *indicus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 61 = *Anamirta paniculata*?
1. *longifolius*, Decne. . . 84 = *Pycnarrhena longifolia*.
574³. *planiflorus*, Wall. . . = *Pycnarrhena planiflorus*.
planifolius, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 44, sphalm. = *planiflorus*.
- COCHLEARIA.**
575¹. 1. **IONOPSIDIUM**, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 26. t. 649 (1829) (an genus proprium?).
flava, Roxb. . . nomen; et ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 72.—Ind. or.
575². *polysperma*, Costa, . . . 86.—Hispan.
575³. a. *Wasabi*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 54 = *Eutrema Wasabi*.
- COCHLIODA.**
575³. a. *rosea*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 560.—Ecuador,
sanguinea, Benth. & Hook. f. l. c.—Peruv.
Ecuador.
- COCOS.**
576². a. *indica*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 395 = *nucifera*.
- CODIAEUM.**
576³. 1. *Inophyllum*, Muell. Arg.
a. *undulatum*, Cogn. & March. in Dallière, Pl. Ornement. i. (1873) t. 15 = *Croton undulatus* Weismanni, Cogn. & March. (l. c.) t. 22.—Hab.?

- PAG. **CODONOPHORA.**
577². a. *Selloi*, Hanst. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1003 = *praece*.
- CODONOPSIS.**
577². a. *cashmeriana*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 450 (Index), sphalm. = *Campanula cashmiriana*.
- COELIDIUM.**
578¹. a. *spinosum*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 25.—Afr. austr.
- COELOGYNE.**
578². d. *angustifolia*, Wight,
579¹. 1. *Lowii*, Paxt.
rhombophora, Reichb. f. . . 116 = *Pholidota rhombophora*.
- COFFEEA.**
579³. a. *herbacea*, Aubl. ex Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 176, in syn. = *Faramaea herbacea*.
- COIX.**
581¹. 1. *cryptoides*, C. Muell. . . 334 = *Polytoca barbata*.
in syn. *passim* = C. *Lacryma-Jobi*.
- COLAX.**
581¹. 1. *jugosus*, Lindl. . . 51 = *Lycaste jugosa*.
Puydtii, Linden & André, . . . 369 = *Lycaste Puydtii*.
- COLBERTIA.**
581². 1. *coromandeliana*, DC.
- COLCHICUM.**
581². a. **EUDESMIS**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1836).
- COLDENIA.**
582¹. 1. *angolensis*, Welw. . . 591 = *procumbens*.
- COLEA.**
582¹. a. **ODISCA**, Rafin. Fl. Tellur. 80 (1838).
582². 1. *Telfairiae*, Boj.
- COLEANTHERA.**
582². 1. *myrtoides*, Stschégl.
- COLEBROOKIA.**
582². a. **SUSSODIA**, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 104 (1825).
- COLEUS.**
583¹. 1. *africanus*, Benth. . . 54 = *Solenostemon ocyroides*.
a. *Marshallii* ×, T. Moore, in Gard. Chron. (1868) 376; et in Floral World (1878), 353.
Veitchii ×, Hort. ex Dombr. Flor. Mag. vi. (1867) t. 345.
- COLLADONIA, DC.**
583³. 1. *anisoptera*, Boiss. . . 946 = P. *anisopetala*?
microcarpa, Boiss. . . 946.—Syria.
- COLLETTIA.**
584¹. 1. *Ephedra*, Bert. . . = *Trevoa Frutilla*.
Ephedra, Vent. . . 16 = *Retanilla Ephedra*.
584². *obcordata*, Vent. . . 92 = *Retanilla obcordata*.
- COLLINSIA.**
584³. 1. *divaricata*, Kellogg, . . . 36 = *sparsiflora*.
- COLLOMIA.**
584³. 1. *coccinea*, Lehm. . . t. 1622 = *Gilia coccinea*.
585¹. *grandiflora*, Dougl. . . t. 1174 = *Gilia grandiflora*.
- COLOBANTHUS.**
585¹. 1. *Benthamianus*, Fenzl, . . . 49.—Ins. Antarct.
585². *pulvinatus*, F. Muell. . . = *Benthamianus*.
subulatus, Hook. f. . . 13 = *Benthamianus*.
- COLOCASIA.**
585². a. *himalensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 407 = *antiquorum*.
1. *humilis*, Hassk. in Hoen. . . 160; Cat. Hort. Bog. Alt. 56.
indica, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 494.—Malaya.
neo-guineensis, André, . . . 68 = *Schismatoglottis neo-guineensis*.

PAG.

- COLOCASIA** :—
 585². 1. *odorata*, Hook. Bot. Mag. t. 3935 = *Alocasia macrorhiza*.
prunipes, C. Koch. & Bouché, . . . = anti-quorum.
 585³. 1. *ramosa*, Schott, . . . = *Alocasia cucullata*.
rapiformis, Kunth, . . . 40 = *Alocasia rapiformis*.
vivipara, Thw. . . 336 = *Remusatia vivipara*.

COLPODIUM.

- 586¹. 1. *latifolium*, R. Br. . . p. clxxxvi = *Arctagrostis latifolia*.

COLPOON.

- 586¹. 1. *RHOIACARPOS*, A. DC. in DC. Prod.
 586¹. insere *COLUBRINA*, Brun. ex Montand. Guide Bot. 268 (1868) = *Polygonum*, Tourn.
intorta, Montand. l. c. = *P. Bistorta*.
vivipara, Montand. l. c. = *P. vivipara*.

COLUBRINA.

- 586¹. d. *DIPLISCA*, Rafin. (*nunc Ceanothus*).

COLUMNEA.

- 586³. a. *bicolor*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 57 = *hirsuta*.
 587¹. 1. *scabrosa*, Soland. . . = *Rhabdothermus Solandri*.
 587². *trifoliata*, Link, . . . = *Stemodia trifoliata*.
 Warszewicziana, Klotzsch & Hanst.

COLURIA.

- 587². 1. *LAXMANNIA*, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 67.

COMATOGLOSSUM.

- 588². 1. *strictum*, Karst. & Triana, l. c. 437 = *T. stricta*.

COMBRETUM.

- 589¹. 1. *ferrugineum*, Hoffmgg. ex Mart. in Flora, xxii (1839) i. Beibl. 64, in obs. =

COMMELINA.

- 590³. a. *angustifolia*, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 150 = *dianthifolia*?

COMPARETTIA.

- 594¹. 1. *saccata*, Poepp. & Endl. . . 72 = *Scelochilus saccatus*.

CONANTHERA.

- 594². a. *biflora*, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 282, in syn., sphalm. = *bifolia*.

CONCEVEIBA.

- 594². 1. *africana*, Muell. Arg. . . 530 = *Neoboutonia Mannii*.
Martiana, Baill. . . 221 = *Alchornea Martiana terminalis*, Muell. Arg. . . 167 = *Gavarretia terminalis*.

CONOCARPUS.

- 596³. d. *RHIZAERIS*, Rafin. (*nunc Laguncularia*).

CONOPODIUM.

- 597³. 1. *SPHALLEROCARPUS*, Bess. ex DC. Mém. Ombell. 60 (1829); et Prod.

CONRADIA.

- 599¹. 1. *exserta*, Mart. . . . = *P. catalpiflora*.

CONRINGIA.

- 599¹. 1. *orientalis*, Dum. . . 123 = *perfoliata*.
perfoliata, Link, . . . 172. —Europ.; Oriens.

CONVALLARIA.

- 599². d. *GLOBERIA*, Rafin. (*nunc Liriope*).
 1. *bifolia*, Linn. . . = *Maianthemum Convallaria*.

CONVOLVULUS.

- 599³. d. *PENTANTHUS*, Rafin. (*nunc Jacquemontia*).
 600². 1. *angulatus*, Salzm. . . Genév. viii. (1838) 59 =
 600³. *bifidus*, Vell. . . = *Jacquemontia grandiflora*.
 601². *cirrhosus*, R. Br. . . 475 = *arvensis*.
congestus, R. Br. . . 64 = *glomeratus*, Choisy.
 601³. *cymosus*, Roem. & Schult. . . = *Ipomoea Senegambiae*.
 602¹. *elongatus*, Willd. . . —Ins. Canar.; Afr. bor.
 602². a. *fruticulosus*, Bolle, in Bonplandia, ix. (1861) 54 = *Perraudieri* (in Addend.).
 1. *fulcratus*, Greene, . . . i. IV.

PAG.

- CONVOLVULUS** :—
 602³. a. *hirtus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10. —Jamaica.
 603¹. 1. *Imperati*, Vahl, . . . = *Ipomoea carnosae*.
 603³. *macrostegius*, Greene, . . . i. iv.
mauritanicus, Boiss. . . t. 122 = *elongatus*.
 604². a. *ovatifolius*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 90 = *Jacquemontia sandwicensis*, et *Breweriae* sp. (= *Bonamia Menziesii*).
 604³. *Perraudieri*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 58. —Ins. Canar.
 606². *tenuis*, Tenore, Ind. Hort. Sem. Neap. (1839) 11. n. 3, nomen. —Hab.?
 1. *translucens*, Hance, in Journ.

CONYZA.

- 607¹. 1. *ambigua*, DC. . . = *Erigeron linifolius*.
 607². *aspera*, Bory,
 607³. a. *calophylla*, Willd. ex Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 432 (= *Tephrothamnus calophyllus*). —Venezuela.
 608¹. 1. *dichotoma*, Pers. . . = *Allagopappus dichotomus*.
 608². a. *florida*, Steud. Nom. ed. II. i. 583, in syn., sphalm. = *falcata*?
 608³. 1. *inuloides*, [Dryand.] . . = *Allagopappus dichotomus*.
 609¹. *Mursa*, Steud. Nom. ed. II. i. 414, sphalm. = seq.
Mursa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3095.
 609³. *salicina*, Kellogg, . . 36 = *Baccharis viminea*.

COOPERIA.

- 610³. 1. *SCEPTRANTHES*, R. Grah. . . (1836).
chlorosolen, Herb. . . = *Drummondii*.

COPERNICIA.

- 611¹. a. *campestris*, Burmeister. Reise La Plata Staaten, ii. 48 = *Trithrinax campestris*.
 1. *hospita*, Mart. l. c. 243.

COPISMA.

- 611¹. 1. *trichodes*, E. Mey. . . = *R. totta*.

CORALLORHIZA.

- 612². a. *occidentalis*, La Pilaye, in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 502 = *innata*.

CORCHORUS.

- 613¹. a. *prostratus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 103, nomen (Quid?). —Ind. or.
sloanoides, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iv. (1840) 23 = *Entelea arborescens*.

CORDIA.

- 613². a. *americana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 309, in syn. = *Patagonula americana*.
 613³. 1. *geraschanthoides*, Rich. . . = *C. Gerascanthus*.
Geraschanthus, Sw. . . 478 = *geraschanthoides*.
 614¹. *Geraschanthus*, Jacq. . . = *C. Gerascanthus*.
 614³. *Perrottetii*, A. DC. . . 482 = *Premna tomentosa*.
 a. *Perrottetii*, Wight, Ic. t. 1381. —Ind. or.
 615¹. d. *ulmifolia*, Fuss.

CORDYLINE.

- 615³. a. *EUPHYLEIA*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 16 (1836).
amabilis ×, Cogn. & March. in Dallière, Pl. Ornament. i. (1873) t. 49.
Baptisti ×, Cogn. & March. (l. c.) t. 37.
Hendersoni ×, Cogn. & March. (l. c.) t. 31.
 616¹. 1. *spectabilis*, Kunth & Bouché, . . (1847) 11 =
 616². a. *Weismanni* ×, Cogn. & March. in Dallière, Pl. Ornament. i. (1873) t. 14.

COREOPSIS.

- 616³. 1. *HETERODONTA*, Nutt. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 385 (1873).
 617¹. *hirta*, Rafin. . . 15 = *Rudbeckia triflora*?

CORETHROGYNE.

- 617². a. *cana*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. IV. (1885) 223 = *Diplostephium canum*.

CORMUS.

- 618³. a. *florentina*, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. (1874) 157 = *P. crataegifolia*.
trilobata, Decne. l. c. = *P. trilobata*.

PAG.

- CORNUS.**
 619². d. *florentina*, Decne. (*quae* *Cornus*).
 a. *nervosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 234, nomen (Quid?). —Ind. or.
 d. *trilobata*, Decne. (*quae* *Cornus*).
 619³. post **COROKIAM** pone
CORONA, Fisch. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xxi. (1836) 157 = *Fritillaria*, Tourn. (Liliac.).
leucantha, Fisch. ex R. Grah. l. c. 158 = *F. ruthenica*.
verticillata, Fisch. ex R. Grah. l. c. 159 = *F. verticillata*.

CORONILLA.

- 620². 1. *Securigera*, Salisb. . . 341 = *praec.*

CORONOPUS.

- 620². 1. *Raddii*, Savi, . . 33 = *S. Raddii*.

CORREA.

- 620². a. *Harrisii* ×, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 79.
longiflora ×, Paxt. (l. c.) 195.

CORTIA.

- 621¹. 1. *Lindleyi*, DC. . . 187 (Lindleyi).

CORVISARTIA.

- 621¹. 1. *indica*, DC. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 234; et

CORYANTHES.

- 621¹. 1. *elegantissima*, Mast.

CORYDALIS.

- 621². a. *ODOPTERA*, Rafin. Cat. 15 (1824).
 622². *parviflora*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 374 (Quid?). —Ind. or.
Pseudocava, *Pseudo-pumila*.

- 623². 1. **CORYNANTHE**, Welw. Apont. 590, nomen [1859]; et in

CORYNELLA.

- 623². a. *domingensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 461, in syn. = *paucifolia*.

CORYTHOLOMA.

- 624². 1. *gracile*, Brongn. . . 466 = *G. punctata*.

COSMANTHUS.

- 624². a. *Purshii*, Wood, Class-Book (1861), 566 = *P. Purshii*.

COSTUS.

- 625¹. a. *PYXA*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3.

COTINUS.

- 625³. a. *radicans*, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1793) 592 = *R. Toxicodendron*.
Toxicodendron, Borkh. l. c. = *R. Toxicodendron*.

COTONEASTER.

- 625³. 1. *emarginata* ×, Hoffmgg. Nachtr. Preisverz. (1842) 29; —Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 282;

COTULA.

- 626². 1. *Featherstonii*, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 27, in syn. —
 626³. *Gymnogyne*, F. Muell.
 627¹. *tridentata*, Benth. & Hook. f. . . 429.

COTYLEDON.

- 627². a. *calyculata*, Soland. ex Sims, Bot. Mag. sub t. 1409 = *praec.*
 627³. 1. *hybrida*, Hort. Par. ex DC. Pl. Grass. t. 65; et *libanotica*, Labill.

COUMA.

- 628³. a. *oblonga*, Benth. ex Muell. Arg. in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 390. —Venezuela.

COUSSAPOA.

- 630³. 1. *dealbata*, . . 17 (non 16).

COVELLIA.

- 631³. a. *ulmifolia*, Gasp. Nov. Gen. Fici (1844), 10 = *F. ulmifolia*.

PAG.

CRAMBE.

- 632³. 1. *Tataria*, *Sedok*, in *Jacq.*
a. *tatarica*, Willd. Sp. Pl. iii. 418 = praec.

CRANIOLARIA.

- 633¹. 1. *unibracteata*, Nees & Mart. . . 67 = Martynia
spathacea.

CRASSULA.

- 633³. a. *conspicua*, *Harv. Rev. Pl. Succ.* 204.—Afr.
austr.
634¹. 1. *decumbens*, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.*
ii. 353.—Afr. austr.

CRATAEGUS.

- 635¹. a. *OXYACANTHA*, *Medic. Phil. Bot.* i. 150 (1789).
635². 1. *brachyacantha*, *Sargent & Engelm.*
a. *Carrierei* ×, Carr. in *Rev. Hort.* (1883) 108,
cum ic.
caucasica, C. Koch, in *Verh. Ver. Bef. Gartenb.*
II. i. (1853) 286 = C. *Oxyacantha*, *pectinata*.
Cosansasi, *Herb. Lugd. Bat. ex C. Koch*,
Wochenschr. v. (1862) 396 = sanguinea.
635². a. *flabellata*, Bosc, ex M. Roem. *Syn. Rosifl.* 136
= coccinea.
germanica, Hort. ex C. Koch, in *Verh. Ver.*
Bef. Gartenb. II. i. (1853) 225 = *Pyrus ger-*
manica.
1. *grandiflora*, C. Koch, (l. c.) 226; et in
a. *Lambertiana*, C. Koch, (l. c.) 229 = mexi-
cana.
Loddigesiana, C. Koch, (l. c.) 228 = mexi-
cana.
636¹. *media*, Pechst. *Forstbot.* 150 = C. *Oxyacantha*.
microphylla, C. Koch, (l. c.) 288.—Reg. Cauc.
peruviana, C. Koch, (l. c.) 297.—Peruv.
1. *pontica*, C. Koch, . . . II. i. (1853)
636². a. *riularis*, Brew. & S. Wats. in *Bot. Calif.* i. 189
= Douglasii.
sicula, C. Koch, (l. c.) 288.—Sicil.
songarica, C. Koch, (l. c.) 287 = *laciniata*.
636³. *suecica*, Auct. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 423, in
syn. = *Pyrus intermedia*.
1. *uniflora*, Muenchh. . . v. II. (1770) 566 =

CRATAEVA.

- 636³. a. *TRICLANTHERA*, Rafin. *Sylva Tellur.* 108
(1838).

CRAWFURDIA.

- 637². a. *speciosa*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xiv.
(1875) 442, partim = *campanulacea*.

CREMANIUM.

- 637³. 1. *Sieberi*, Griseb.

CREPIS.

- 639². 1. *bulbosa*, *Tausch*, . . . (1828).
639³. a. *curiensis* ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges.*
Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 110.—Europ.
1. *djilimensis*, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 833.—Reg.
Cauc.
640¹. a. *helvetica* ×, Bruegg. (l. c.)—Europ.
640². 1. *hieracioides*, Ledeb. . . 126 = *lyrata*.
hieracioides, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* i.
42. t. 70; Willd.
hispidissima, Bartl. in *Bartl. & Wendl. f. Beitr.*
ii. 125
640³. a. *Muretiana* ×, Bruegg. (l. c.)—Europ.
1. *Novae-Zelandiae*, Hook. f. . . 164 = *Sonchus*
Novae-Zelandiae.
641². *Stenoma*, Turcz.
641³. a. *turicensis* ×, Bruegg. (l. c.)—Europ.

CRINUM.

- 642². 1. *anomalum*, *Herb. in Bot. Mag.* sub t. 2121; et
642³. a. *Binsii*, *Hoffm. Preisverz.* (1841) 77.—Cf.
Linnaea, xvi. (1842) *Litt.* 267.—Bras.
643¹. *himalense*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 374 =
amoenum?
643². *Roxburghii*, Dalz. & Gibs. *Bomb. Fl.* 275 =
defixum.
644². post **CROCKERIAM** insere

CROCOCYLUM, Steud. *Nom. ed. II.* i. 803,
sphalm. = **CROCOXYLON**, Eckl. & Zeyh. =
Elaeodendron, Jacq. (Tiliac.).

PAG.

CROCUS.

- 646¹. 1. *vitellinus*, *Wahlenb. in Bergg. Resor.* ii. Bihang,
59; et

CROTALARIA.

- 647¹. a. *arida*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 191 =
C. *Burhia*?
647². *cannabinus*, Royle, (l. c.) 82 = *juncea*?
647³. 1. *cytisifolia*, *Hoffm. Nachtr. Preisverz.* (1842)
25.—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) *Litt.* 279.—
Peruv.

CROTON.

- 651². d. *MEIALISA*, Rafin. (*quae Adriana*).
ODOTALON, Rafin. (*nunc Argithamnica*).
1. *PALANOSTIGMA*, Mart.
651³. a. *appendiculatus*, *Hort. Veitch. ex Rev. Hort.*
(1877) 87. f. 13.—Polynes.
652¹. *Bergmani* ×, Chantrier, ex André, in *Illustr.*
Hortic. xxvii. (1880) 102. t. 389.
Camaza, Perr. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iii.
(1825) 112 = C. *Tigilium*?
652². 1. *crassifolius*, *Geisel.* . . 19.—China.
654¹. a. *imperialis*, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1875) II.
192; et ex T. Moore, *Flor. & Pomol.* (1876)
209.—N. Hebrid.
interruptus, Hort. (l. c.) (1871) f. 31 = *Codiaeum*
variegatum.
Johannis, Veitch, ex Regel, *Gartenfl.* xxii.
(1873) 251 = *Codiaeum variegatum*.
655¹. *multicolor*, Veitch, ex André, *Illustr. Hort.* xix.
(1872) 120 = *Codiaeum variegatum*?
musaicum ×, André, in *Rev. Hort.* (1882) 240.
655². 1. *Palanostigma*, *Klotzsch*,
655³. *philippensis*, Lam.
656¹. a. *polystachyus*, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.*
270 = *Cumingii*.
656². 1. *ricinocarpus*, Linn. . . = *Leidesia capensis*.
656³. *Siraki*, Siebold, in *Verh. Batav. Gen. xii.* (1830)
30; Sieb. & Zucc.
657³. a. *Weismanni*, Cogn. & March. in *Dallière, Pl.*
Ornament. i. (1873) t. 22 = *Codiaeum Weis-*
manni.

CRUCIANELLA.

- 658¹. a. *MAPPA*, *Habl. ex Ledeb. Fl. Ross. ii.* 403 (1844).
RUBEOLA, [Tourn.] *Ludw. Def. Pl.* 2 (1737).
658². 1. *stylosa*, Trin. . . = *Phuopsis stylosa*.
658³. 1. *CRUCIATA*, [Tourn.] *Ludw. Def. Pl.* 2 (1737) =

CRUPINA.

- 659¹. 1. *alpestris*, Arv. *Add. Monog. Pilos.* 19 = vul-
garis.

CRYPTANGIUM.

- 660². a. *LERISCA*, Schlecht. in *Bot. Zeit.* iii. (1845)
476.

CRYPTOCARYA.

- 661¹. a. *kawaiensis*, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 158.—
Ins. Sandvic.

CTENIUM.

- 662³. 1. *americanum*, Spreng.
sechellense, Baker, . . . = *Enteropogon meli-*
coides.

CUCUBALUS.

- 663². a. *SCRIBAEA*, Borkh. in *Rhein. Mag.* i. (1793)
591.
663³. 1. *saxifragus*, Schreb. *Ic. Pl. Desc. Dec. i.* 9. t. 5;
Linn.

CUCUMIS.

- 664¹. 1. *ambiguus*, Fenzl.
664². *Bicirra*, Forst.
chrysocarpus, Welw. . . 63, sphalm. = seq.
cognatus, Fenzl,
a. *himalensis*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 218,
nomen (Quid ?)—Reg. Himal.
664³. *Melopepo*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 303, in syn. =
C. *Melo*.
665¹. *verrucosus*, Hort. ex Steud. *Nom. ed. I.* 244 =
C. *Melo*.

CUCURBITELLA.

- 665³. a. *PRASOPEPON*, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.*
v. (1866) 26.

PAG.

CUMINUM.

- 666³. a. *aethiopicum*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 230 =
Ammi majus.
regium, Royle, (l. c.) = *Ammi majus*.

CUNONIA.

- 667¹. d. *OOSTERDYKIA*, Burm. *Rar. Pl. Afr.*
1. *celebica*, Blume, . . . 868 = *Spiraeopsis celebica*.

CUPANIA.

- 667³. 1. *cupanioides*, Cambess. . . 29 = *laevis*.

CUPRESSUS.

- 671¹. 1. *breviramis*, F. Muell. . . [ed. II.] 64, in obs. =
obtusa.
a. *Corneyana*, Knight, *Syn. Conif.* 19 = *torulosa*.
671². 1. *obtusa*, C. Koch, . . . 168.—Japon.
pendens, F. Muell. . . [ed. II.] 64, in obs. =
obtusa.
pisifera, C. Koch, . . . 170.—Japon.
squarrosa, Laws. . . = *pisifera*.
thyoides, Linn. . . 1003.—Am. bor.

CURCULIGO.

- 671³. 1. *latifolia*, [Dryand.]
a. *petiolata*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 376 =
orchidioides?

CURCUMA.

- 672¹. 1. *KUA*, Rheede, ex *Medic.*
a. *Kuchoor*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 357, 359 =
caesia.

CURTIA.

- 672². a. *HACKELIA*, Pohl, ex Griseb. in *DC. Prod.* ix.
56 (1845).

- 674³. 1. *CUSSAMBIUM*, Rumph. ex Lam. *Encyc.* ii.
230 (1786); Buch.-Ham.

CUSSONIA.

- 675¹. a. *quercifolia*, Hort. Cels, ex Colla, Hort. *Ripul.*
43 = triptera.

- 676². 1. *CYANOTRIS*, Rafin. . . (1818) 356;

- 676³. 1. *CYATHIDIUM*, Lindl. . . (1835).

- 677¹. post **CYATHOGYNEM** pone

CYATHOMISCUS, Turcz. in *Bull. Soc. Nat.*
Mosc. (1863) i. 562, in obs. = **Marianthus**.
Hueg. (Pittosp.).

CYATHULA. Phil.

- 677². 1. *angustifolia*, Moq. l. c. 328 = *Sericocoma*
angustifolia.

CYCAS.

- 677³. 1. *circinalis*, Linn.
d. *circinalis*, Thou.
a. *circinnclis*, Auct. = *circinalis*.
hypoleuca, Presl, . . . (al. ord.).

CYCLANTHUS.

- 678³. a. *bifolius*, Perr. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iii.
(1825) 112, sphalm. = seq.

CYCLEA.

- 678³. d. *PERAPHORA*, Miers (*nunc Lophophyllum*).

CYCLOSTIGMA. Phil.

- 680². 1. *tenue*, Phil. l. c. = *L. tenuis*.

CYCNOCHES.

- 680³. a. *Lindleyi*, Hort. ex Linden, *Pescatorea* (1860),
sub t. 22 = *Lueddemannia Pescatorei*.

CYMBIDIUM.

- 682¹. d. *OLGASIS*, Rafin. (*nunc Oncidium*).
TRICHORHIZA, Lindl. (*nunc Limia*).
682². 1. *grandiflora*, Sw. l. c. 76 = *Pogonia grandiflora*.
683¹. *stapelioides*, Link & Otto, . . . 111. t. 52.
683³. 1. *CYMELONEMA*, Presl, . . . = **Urophyllum**,
Wall. (Rubiaceae).
memecyloides, Presl, l. c. = *U. memecyloides*.

CYMODOCEA.

- 683³. d. *HALODULE*, Endl. (genus proprium).
a. *australis*, Trimen, *Cat. Pl. Ceyl.* 99 = *Halodule*
australis.
1. *ciliata*, *Ehrenb.* . . 3.—Mar. Ind. et Pacif.
isoetifolia, *Aschers. l. c.*—Mar. Ind. et Pacif.

PAG.

CYNANCHUM.

- 684¹. a. *SARCOCYPHULA*, Harv. Thes. Cap. ii. 58. t. 191 (1863).
 684². 1. *aphyllum*, Vell. . . = *Amphistelma*
 685¹. a. *kunawurensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 274, nomen (Quid ?).—Ind or.
 1. *molle*, Steud. . . 905 = *Anisotoma cordifolia* ?
 685². 1. *pendulum*, Poir. . . 429 = *Daemia extensa*.

CYNOCOTONUM.

- 686². 1. *molle*, E. Mey. . . 216 = *Anisotoma cordifolia* ?
 a. *tuberculatum*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 478.—Java.

CYNOGLOSSUM.

- 686². 1. *Berteri*, Colla, . . . 153 = *Selkirkia Berteroi*.
 687¹. *glomeratum*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 18, nomen; et ex
 687². *javanicum*, Lehm. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle, iii. ii. (1817) 21 =
macrophyllum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 305 =
Paracaryum glochidiatum.
 688¹. *zeylanicum*, Thunb. ex Lehm. (ut supra) 20 =

CYNOSORCHIS.

- 688². a. *arnottioides*, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1853) 213.—Ins. Borbon.
Commersoni, Reichb. f. (l. c.), in obs.—Hab. ?
parviflora, Reichb. f. (l. c.).—Ins. Borbon.

CYNOSURUS.

- 688². 1. *capillaceus*, Beauv. . . = *Leptochloa capillacea*.
capillaris, Hort. . . = praec.

CYPERORCHIS.

- 689². a. *Wallichii*, Blume, Orch. Ind. Archip. 92 =
Cymbidium cyperifolium ?

CYPERUS.

- 689². d. *OPETIOLA*, Gaertn. (*nunc Mariscus*).
TORULINIUM, Desv. (*nunc Mariscus*).
 a. *UNGERIA*, Nees, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 34.
 689³. 1. *aequalis*, Vahl, . . . 320 = prolifer.
 a. *Amane*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 384 = *Fimbristylis aestivalis*.
 691². 1. *consocius*, Steud. . . 299, 324 = *ferax*.
 693². a. *frondosus*, Salisb. Prod. 30 = *alternifolius*.
 1. *Ginge*, Welw. . . 586 = *flabelliformis*.
 694¹. a. *horizontalis*, Salisb. Prod. 30 = *Schoenus compressus*.
 695². 1. *macreilema*, Steud. . . 298, 324 = *Mariscus albescentis*.
 696¹. a. *niger*, Salisb. Prod. 30 = *Schoenus nigricans*.
 696². *ovatus*, Baldw. in Trans. Am. Phil. Soc. Philad. ii. (1825) 168 = *Mariscus uniflorus*.
 697¹. *politus*, Welw. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (18) 125 = *flavescens*.
 697². 1. prolifer, Lam. . . 147.—Afr. austr.; Ins. Mascar.
Pseudo-bromoides, *Pseudo-giganteus*, *Pseudo-strigosus*, *Pseudo-vegetus*.
 697³. *puncticulatus*, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 189 =
Renschii (non Reinschii).
 698¹. a. *riparius*, Salisb. Prod. 30 = *pannonicus*.
 698². *scirpinus*, Salz. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; et Syn. Pl. Cyp. 108 =
Fimbristylis bahiensis.
 698³. 1. *soongoricus*, Kar. & Kir. . . = *difformis*.
 a. *sparsiflorus*, Baldw. in Trans. Am. Phil. Soc. Philad. ii. (1825) 168 = *Mariscus glomeratus*.
 699³. 1. *umbellatus*, Benth.
 700². 1. *Wolfii*, Wood, in Bull. Torrey Bot. Club, vi. (1876) 72; et in

CYPHOMATTIA.

- 701¹. 1. *lanata*, Boiss. l. c. = *R. lanata*.

- 701². a. *CYPRIPEDILUM*, Aschers. Fl. Brandenb. 700 (1864) = seq. \

CYPRIPEDIUM.

- 701². a. *Ainsworthii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) 1. 748 = *Selenipedium Ainsworthii*.
albo-purpureum, Reichb. f. (l. c.) (1877) II. 38 =
Selenipedium albo-purpureum.
Arthurianum ×, Reichb. f. (l. c.) (1874) II. 676.

PAG.

CYPRIPEDIUM:—

- 701². a. *Ashburtoniae* ×, Reichb. f. (l. c.) (1871) 1647. f. 348.
calanthum ×, Reichb. f. (l. c.) (1880) II. 652.
calophyllum ×, Reichb. f. (l. c.) (1881) I. 169.
calurum ×, Reichb. f. (l. c.) 41; et T. Moore, Flor. & Pomol. (1884) 145, cum ic.
Chantini, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1882) II. 750 = *insigne*.
chloroneurum ×, Reichb. f. (l. c.) (1880) II. 525.
conchiferum ×, Reichb. f. (l. c.) (1881) I. 330.
Crossianum ×, Reichb. f. (l. c.) (1873) 877.
Dauthieri ×, Reichb. f. (l. c.) (1882) I. 218, nomen; Kittel, in Berl. Garten-Zeit. (1885) 272, 273 = *Harrisianum*.
Dominianum, Reichb. f. (l. c.) (1870) 1181 =
Selenipedium Dominicanum.
discolor ×, Reichb. f. (l. c.) (1882) I. 218.
elatum, Poit. ex Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) (Quid ?).—Guian.
euryandrum ×, Reichb. f. (l. c.) (1875) II. 772.
 701³. *gemmiferum* ×, Reichb. f. (l. c.) (1881) I. 814.
Godefroyae, Hort. ex Godefr.-Lebeuf, Orchidoph. (1883) 830, cum ic.—Malaya.
 1. *hirsutum*, Mill. . . 3 = *pubescens*.
humile, Salisb. . . (1791).
 a. *Leeanum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1884) I. 50, 140.
leucorrhodum ×, Reichb. f. (l. c.) (1885) I. 270.
lucidum ×, Reichb. f. (l. c.) (1877) II. 521.
macropterum ×, Reichb. f. (l. c.) (1882) II. 552.
marmorophyllum ×, Reichb. f. (l. c.) (1876) II. 130.
Maulei, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1882) II. 750 = *insigne*.
Meirax ×, Reichb. f. (l. c.) (1880) II. 524.
melanophthalmum ×, Reichb. f. (l. c.) 525.
Morganiae ×, Reichb. f. (l. c.) (1880) II. 134.
nitens ×, Reichb. f. (l. c.) (1878) I. 398.
 1. *palmifolium*, Lindl. . . 527 = *Selenipedium palmifolium*.
paulistanum, Rodrig. . . 263 = *Selenipedium vittatum*.
 a. *porphyreum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) I. 366 = *Selenipedium porphyrium*.
porphyrospilum ×, Reichb. f. (l. c.) (1879) II. 489.
pycnopterum ×, Reichb. f. (l. c.) (1876) I. 622.
radiosum ×, Reichb. f. (l. c.) (1885) II. 424 (*radissum*).
Reichenbachii, Bull. Cat. n. 48 (1869–70) 4 =
Selenipedium longifolium.
 702¹. *Sedeni*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1873) 1431 =
Selenipedium Sedeni.
selligerum ×, [Reichb. f.] in Rev. Hort. (1877) 88; Gard. Chron. (1880) I. 776.
stenophyllum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) I. 461 = *Selenipedium stenophyllum*.
superciliare ×, Reichb. f. (l. c.) II. 795.
Swanianum ×, Reichb. f. (l. c.) (1876) II. 36.
tessellatum ×, Reichb. f. (l. c.) (1875) II. 614.
vernixium ×, Reichb. f. (l. c.) (1879) I. 398.
vexillarium ×, Reichb. f. (l. c.) (1870) 1373.
Williamsonianum ×, Reichb. f. (l. c.) (1882) I. 218.
 702¹. post CYRBASIUM pone
 CYRETHRUM, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 25 (1879), err. typ. = PYRETHRUM, Hall. =
Chrysanthemum, Tourn. (Compos.).

CYRTANTHUS.

- 704¹. 1. *sanguineus*, Walp.
striatus, Herb. . . t. 2534.

CYRTOPODIUM.

- 705¹. 1. *plantagineum*, Benth.

CYSTACANTHUS.

- 705². 1. *turgidus*, Nichols.

- 705³. 1. CYSTOGYNE, Gasp. Nov. Gen. Fici (1844); et Ricerch.
leucosticta, Gasp. II. cc.

PAG.

CYTINUS.

- 706¹. 1. *HYPOCISTIS*, [Tourn.] Adans.

CYTISUS.

- 706². 1. *cinereus*, Vis. Fl. Dalmat. iii. 270, in obs.; Vukot.
 707¹. 1. *Laburnum*, Linn. . . = *Laburnum anagyroides*.
 a. *longissimus*, Hoffm. Preisverz. (1841) 83.
 —Cf. *Linnaea*, xvi. (1841) Litt. 276.—Hab. ?
 708¹. 1. *Weldenii*, Vis. . . = *Petteria ramentacea*.
virgatus, Steud. Nom. ed. II. i. 478 = *grandiflorus*.

CZACKIA.

- 708¹. a. *litiiflora*, Montand. Guide Bot. 316 = *P. Liliastrum*.

- 708². post DACTIPHYLLUM pone

DACTYLADENIA, Welw. Apont. 572 [1859] = *Griffonia*, Hook. f. (1865) (Rosac.).
floribunda, Welw. l. c. = *G. Bellayana*.

- 708³. 1. DACTYLANTHERA, Welw. . . [1859] =
Symphonia, Linn. f. ? (Guttif.) (*vel* *Garcinia punctata*, Oliver).

- 708³. a. DACTYLETHRIA, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148 = *Digitalis*, Tourn. (Scrophul.).

DACTYLIS.

- 708³. a. *disticha*, Ball, in Ann. & Mag. Nat. Hist. xi. (1843) 348 = *Wangenheimia disticha*.

DAEDALACANTHUS.

- 709³. a. UPUDALIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 66 (1836), nomen prius.

DAEMIA.

- 709³. 1. *aethiopica*, Decne. . . 544 = *extensa*.
guineensis, G. Don, . . . = *extensa*.
Kempeana, F. Muell. . . 94 = *Pentatropis Kempeana*.
scandens, G. Don, . . . 94 = *extensa*.

DAEMONORHOPS.

- 710¹. a. *plumosus*, Hort. Bull.—Cf. Gard. Chron. (1870) 1086. f. 206 (an *Sagus* sp. ?).—Hab. ?

DAHLIA.

- 710². a. *lutea*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1879) II. 521. f. 83.—Hab. ?

DAIS.

- 710². 1. *disperma*, Forst. f. . . 33 = *Phaleria disperma*.
octandra, Linn. . . 2 = *Phaleria octandra*.

DALBERGIA.

- 711³. 1. *Thomsoni*, Benth.

DALEA.

- 712¹. 1. *aurea*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 29, nomen; et ex ej.
 712². *enneandra*, [Nutt. in] (l. c.) n. 30; et ex

DALRYMPELEA.

- 714¹. a. *nepalensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 166 =
T. pomifera ?

DAMMARA, Rumph.

- 714². a. *Brownii*, Hort. Angl. ex Lem. Illustr. Hort. ii. (1855) Misc. 60 = *A. australis* ?

DANTHONIA.

- 715³. 1. *flaccida*, T. Kirk, . . . 224 = *Agrostis avenoides*.
 716². 1. *Thouarsii*, Nees, . . . 337 = *tortuosa*.
Thuarii, Desv. . . 99 = *praec.*

DAPHNE.

- 716³. d. *GASTRILIA*, Rafin. (*nunc* *Thymelaea*).
 a. *canescens*, Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1818) 308 = *Thymelaea canescens*.
 717¹. 1. *euphorbioides*, Pusch. ex Wikstr. (l. c.) 307
 717². *osyroides*, Vahl, ex Wikstr. (l. c.) 328
 a. *pubescens*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 247 =
alpina ?
 717³. *tinctoria*, Wikstr. (l. c.) 308 = *Passerina tinctoria*.

DAPHNIDIUM.

- 717³. 1. *bibracteatum*, Nees, . . . 615 = *Litsaea tenuiramis* ?

- PAG. **DASISTOMA.**
719¹. a. *flava*, Wood, Class-Book (1861), 529 = G. *flava grandiflora*, Wood, Am. Bot. & Flor. 231 = G. *grandiflora*, Benth.
- 719³. 1. **DATISCA**, Linn.
a. *CANNABINA*, Tourn. ex Linn. Amoen. Acad. i. 415 (1749).
- DATURA.**
720¹. 1. *dubia*, Bianca, in Atti Acc. Gioen. Ser. II. i. (1844) 330; et
- DAUCUS.**
720². a. *POMELIA*, Durando, ex Pomel, Mat. Fl. Atl. 7 (1860).
- DECAISNEA.**
722³. a. *SLACKIA*, Griff. Itin. Notes, 187 (1848).
- DECAISNEA**, Lindl.
722³. 1. *angulosa*, Lindl. l. c. = T. *angulosa*.
- 723⁴. post **DECALOPHIUM** pone
DECAMERIA, Welw. Apont. 579, in obs. [1859] = *Gardenia*, Ellis (Rubiaceae).
Jovis-tonantis, Welw. l. c. = G. *Jovis-tonantis*.
- DECANEURUM.**
723¹. 1. *frutescens*, DC. l. c. 66.—Java.
- DELPHINIUM.**
725². a. *Actaea*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 452 (Index), sphalm., nomen delendum.
725³. distichum, Geyer, ex Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 68.—Am. bor. occ.
726¹. 1. *flammeum*, Kellogg, . . . 22 = cardinale.
- DEMAZERIA.**
727¹. a. *tuberculosa*, Battand. & Trab. Fl. Algér. (1884) 100.—Alger.
- 727². 1. **DENDRIUM**, Desv. . . . iii. (1814)
- DENDROBIUM.**
727³. 1. *alpestre*, Lindl. in Royle, . . . 370. t. 88. f. 2.
728³. a. *denudatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 371, sphalm. = *denudans*.
729¹. *grandiflorum*, Sw. Adnot. Bot. 54 = *Stanhopea Bucephalus*.
- DENDROMECON.**
732². 1. *Harfordii*, Kellogg, . . . 102 = rigidum.
- DENDROPHTHOË.**
733¹. 1. *verticillata*, Scheff. . . . 27 = L. *verticillatus*, Benth. & Hook. f.
- DENDROPHTHORA.**
733¹. a. *squamigera*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 214 = *Phoradendron squamigerum*.
- DEROEMERA.**
734². a. *unifolia*, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 213.—Abyss.
- DERRIS.**
734². a. *NOTHODERRIS*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 148 (1855).
734³. nobilis, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 245.—Afr. trop.
oblonga, Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879) 10.—China.
- DESCHAMPSIA.**
735¹. 1. *grandis*, Bess. . . . = caespitosa.
montana, Parl. . . . = caespitosa.
735². a. *versicolor*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 68 = caespitosa.
1. *Wahlenbergiana*, Scheele, l. c. = caespitosa.
- DESMANTHUS.**
735². a. *ACUAN*, Medic. Theod. 62 (1786).
flavescens, Steud. Nom. ed. II. ii. 418, sphalm. (= *Desmochaete flavescens*) = *Pupalia lap-pacea*.
735³. 1. **DESMAZERIA**, . . . = *Demazeria*,
- DESMODIUM.**
736¹. d. *HETEROLOMA*, Desv. (nunc *Adesmia*).
- PAG. **DESMODIUM.**
736³. 1. *diffusum*, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 100; et Prod. ii. 335 = *laxiflorum*.
diffusum, DC. Prod. ii. 336.—Ind. or.; Burma.
737¹. a. *heterocarpum*, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 185.—Ins. Societ.
lagopodioides, Endl. (l. c.).—N. Caled.
737². 1. *macrophyllum*, Desv. . . . nomen; et in Mém. Linn. Soc. Par. iv. (1826) 306.—Ind. or.
737³. a. *peripterum*, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 172 = *Pseudarthria viscida*.
- DESMONCUS.**
738³. a. *macrantha*, im Thurn, in Timehri, iii. (1884) 259, sphalm. = seq.
- DEUTZIA.**
739³. a. *californica*, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. (1866) 339 = *Philadelphus Gordonianus*.
- DEYEUXIA.**
740³. a. *Royleana*, Trimen, Syst. Cat. Pl. Ceyl. 108.—Ind. or.
- DIANELLA.**
741³. 1. *RHUACOPHILA*, Blume, . . . (1827).
a. *philippensis*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 112 (Quid?).—Ins. Philipp.
- DIANTHERA.**
741³. a. *JUNGIA*, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 92 (1760).
742¹. *ensiformis*, Wood, Am. Bot. Flor. 234 = *crassifolia*.
humilis, Wood, (l. c.) 235 = ovata.
- DIANTHUS.**
744¹. 1. *Faurei*, Arv. Monog. Pilos. 49; et in.
745¹. *obcordatus*, Reut. . . . 281 = *Tunica glumacea Oreades*, Ball.
745². *ponticus*, Wahlenb. in Bergg. Resor. ii. Bihang, 29; et in Isis.
745³. pusillus, F. W. Schmidt, . . . (1790).
a. *saxatilis*, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i. (1790) 28 (Quid?).—Europ.
746¹. *splendidissimus*, Hoffm. Nachtr. Preisverz. (1842) 27.—Cf. Linnaea, xvi. (1842) Litt. 280 = barbatus.
746². 1. **DIAPEDIUM**, Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1805) 189 = *Dicliptera*, Juss. (Acanth.).
a. *chinense*, Kon. l. c. = *Dicl. chinensis*.
cuspidatum, Kon. l. c. = *Dicl. micranthes*.
frondosum, Kon. l. c. = *Dicl. frondosa*.
martinicense, Kon. l. c. = *Dicl. martinicensis*.
pubescens, Kon. l. c. = *Dicl. pubescens*.
- DIASTEMA.**
747¹. 1. *caracasana*, Klotzsch & Hanst. l. c. xxvii. (1854) 720; et
- DICERATELLA.**
748¹. 1. *floccosa*, Boiss.
- 748². 1. **DICEROS**, Blume, Bijdr. 751
- DICHOSTYLIS.**
750¹. a. *Torresiana*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 413 = *Fimbristylis globosa*.
750². 1. **DICHROLEPIS**, Welw. . . . [1859] (an *Eriocaulon*? Linn.).
- DICHROMENA.**
751¹. a. *Reverchoni*, S. H. Wright, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 86.—Texas.
753². a. **DICROCEPHALA**, Royle, Illustr. Bot. Himal. 249 (1835), sphalm. = *Dichrocephala*, L'Hérit. (Compos.).
- DICTAMNUS.**
753². a. *altaica*, Fisch. ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 156 = D. *Fraxinella*.
- DICTYOCARYUM.**
753³. 1. *Wallisii*, Hort. Bull. ex Seem. in Gard. Chron. (1870) 698;
- PAG. 755¹. 1. **DIDYMELES**, Thou. . . . —Cf. Benth. & Hook. f. iii. 397.
- DIDYMOCARPUS.**
755³. a. *venosus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 294 (Quid?).—Reg. Himal.
- DIDYMOSPERMA.**
756¹. a. *distichum*, Hook. f. in Kew Gard. Rep. 1882 (1884), 61.—Reg. Himal.
- 756³. lin. 1^{ma} 1. **DIEFFENBACHIA.**
nobilis, Hort. Bull. ex Cogn. & March. in Dalliére, Pl. Ornament. i. (1873) t. 4;
- DIERVILLA.**
757¹. 1. *rosea*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1854) 247, in obs.; Mast.
- DIGITALIS.**
757². a. **DACTYLETHRIA**, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
- DIGITARIA.**
758³. a. *sanguinalis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 418, sphalm. = P. *sanguinale*.
- DIMACRIA.**
760¹. 1. *fulgens*, Colv. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 77;
- DIMORPHOSTACHYS.**
761¹. 1. *Drummondii*, Fourn. . . . l. c. = *Paspalum lentiginosum*.
761¹. 1. **DINEBA**, Beauv. . . . = *Dinebra*, Jacq. (Gramin.).
- DIODIA.**
762¹. 1. *simplex*, Sw. . . . 29 = *Spermacoe simplex*.
762². post **DIODIAM**, pone
DIODIODES, Loefl. It. Hisp. 201 (1758) = *Spermacoe*, Dill. (Rubiaceae).
- DIOSCOREA.**
763³. a. *illustrata*, Bull. Cat. (1873) 6; Gard. Chron. (1873) 1730, 1731.—Bras.
764². *sagittata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 378, 379 = *glabra*.
766³. a. **DIOSPERMUM**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 227, 228 (1881), err. typ. = *Oiospermum*, Less. (Compos.).
- DIOSPYROS.**
766². a. *amara*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 112 (Quid?).—China.
767². 1. *mabacea*, F. Muell.
767³. *nigra*, Perr. (ut supra) 113; Blanco,
- DIPHOLIS.**
769². a. **SPONDOGONA**, Rafin. Sylva Tellur. 35 (1838).
- DIPLADENIA.**
770¹. a. **HOMALADENIA**, Miers, Apocyn. S. Am. 163 (1878).
- DIPLOCHONIUM.**
771¹. 1. = *Trianthema*, Sauv.
a. *uvarioides*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. vi. (1862) 204, sphalm. = T. *hyaspica*.
- 773¹. 1. **DIPLOPYRAMIS**, Welw. Apont. 591 [1859] = *Oxygonum*, Burch. (Polygon.).
aethiopica, Welw. l. c. (= *Ceratogonon atriplicifolium*).—Afr. trop.
- 773¹. insere **DIPLORRHIZA**, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147 = *Habenaria*, Willd. (Orchid.).
- DIPILOTAXIS.**
773³. 1. *Barrelieri*, DC.
- DIPSACUS.**
775¹. a. **TRICHOCEPHALUM**, Schur, Enum. Pl. Transs. 293 (1866).
fallax ×, Simk. in Termész. Füzetek, ii. (1878) 150.—Europ.
levis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 245, nomen (Quid?).—Ind. or.
- DISCARIA.**
778². 1. *articulata*, Miers, . . . errat. = *Retanilla articulata*.

PAG.

DISEMMA.

- 779³. 1. *caerulescens*, Seem. . . . 366.—Ins. Amicor.

DISSORHYNCHIUM.

- 781¹. 1. *muricatum*, Schau. l. c. = *H. muricata*, Vidal.

DISSOTIS.

- 781¹. a. *HEDESA*, Rafin. Sylva Tellur. 101 (1838).
KADALIA, Rafin. (l. c.) (1838).

DISTEGANTHUS.

- 781². a. *Morrenianus*, Linden, ex Linden & André, in Illustr. Hort. (1874) 120 = *Ronnbergia Morreniana*.

- 784¹. a. *DODONAEA*, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 212 (1760) = *Ptelea*, Linn. (Rutac.).

DOLICHANDRA.

- 785¹. 1. *cynanchoides*, Cham. l. c. 658 = *M. Dolichandra*.
a. *Fenzliana*, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 251 = *Spathodea Fenzliana*.

DOLICHLASIUM.

- 785¹. 1. *glanduliferum*, Lag. . . . = *T. glandulifera*.

DOLICHOS.

- 785³. a. *decipiens*, Burch. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 241 = *Vigna triloba*.

DOMBEYA.

- 787³. 1. *HILSEBERGIA*, Boj. in Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, xii. (1841) 44; et in
a. Boivini, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 496.—Madag.
1. *cannabina*, Hilsenb. & Boj. in Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, xii. (1841) 45.—Madag.
a. *crassipes*, Baill. l. c. 495.—Madag.
1. *elliptica*, Boj. (ut supra) 46; et in
erythroclada, Boj. ll. cc. 47; 191.
hirsuta, Boj. (ut supra) 46; et in
modesta, Hook. . . . t. 4578.—Madag.
788¹. a. *opulifolia*, Boj. (l. c.) 49 = *viburniflora*.
1. *platanifolia*, Boj. (l. c.) 46; et in
Pseudo-populus, Baill.
a. Richardi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 500.—Madag.
1. *spectabilis*, Boj. (ut supra) 46; et in
a. Thoursii, Baill. (l. c.) —Madag.
1. *triumfettaefolia*, Boj. (l. c.) 47; et in
a. *viburniflora*, Boj. (l. c.) 47; et in
788¹. 1. *DOMBEYA*, L'Hérit. . . . = *Tourretia*, Fougier.
lappacea, L'Hérit. l. c. = *T. volubilis*.

DONATIA.

- 788². a. *ORITES*, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. 282 (1847).

DOODIA.

- 789¹. 1. *simplicifolia*, Roxb. l. c. 366 = *U. prunellae-folia*?

DOREMA.

- 789². a. *XANTHOHALUM*, Avé-Lall. in Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 73 (1842).

DORIA.

- 789³. 1. *nodulosa*, Sch.-Bip. in Flora, xxvii. (1844) 769, sphalm. = *O. perfoliata*.
ramosa, DC. . . . 472 = *O. ramosa*.
a. *undulata*, DC. Prod. vi. 483, sphalm. = *undulosa*.

DORSTENIA.

- 790³. 1. *Barnimiana*, Schweinf.
791¹. a. *rugosa*, Banks & Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1839) 215 = *Elatostema rugosum*.

DORYCNIMUM.

- 791². a. *ORTHOLOTUS*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 363.

DRACAENA.

- 795². a. *amabilis* ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1871) 841; Flor. & Pomol. (1874) 75.
aurantiaca ×, T. Moore, in Gard. Chron. (1876) 1. 689.
Baptistii ×, Hort. ex Gard. Chron. (1874) 1. 92; Flor. & Pomol. (1875) 52.

VOL. II.

PAG.

DRACAENA:—

- 795². a. *Chelsoni*, Veitch.—Cf. Gard. Chron. (1868) 349 = *Cordylina terminalis*.
cuprea ×, T. Moore, in Gard. Chron. (1876) 1. 690.
795³. *Goldieana* ×, Hort. Bull. ex Flor. & Pomol. (1873) 187.—Afr. trop.
Hendersoni ×, Veitch.—Cf. Gard. Chron. (1874) 1. 531; Flor. & Pomol. (1875) 53.
hybrida ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1875) 1. 551; Flor. & Pomol. (1876) 17.
jaspeida ×, Linden, Cat. n. 93 (1875) 37.
796¹. *lentiginosa* ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1867) 461; Illustr. Hort. (1870) 179.
Lindeni ×, Hort. Linden, ex André, in Illustr. Hort. xxvii. (1880) 85. t. 384.
Macleani, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1871) 149 = *Cordylina terminalis*.
Massangeana, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hort. x xi. (1881) 327 = *fragrans*.
metallica, Bull. Cat. (1872) 5; Flor. Mag. N. S. (1872) t. 24 = *Cordylina terminalis*.
Reginae ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1868) 26; T. Moore, in Flor. & Pomol. (1872) 63.
Regis ×, André, in Illustr. Hort. xxvi. (1879) 153. t. 360.
Salvati ×, Linden, Cat. n. 93 (1875) 37.
796². a. *serrulata*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 113 = *angustifolia*?
Thomsoni ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1880) 11. 656, 690; T. Moore, in Flor. Mag. N. S. (1881) t. 441.

DRACOCEPHALUM.

- 796³. a. *cuspidatum*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 28, nomen (Quid?)—Am. bor.
797¹. *punctatum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 153, in syn. sphalm. = *D. Moldavica*.

DRACOPHYLLUM.

- 797³. 1. *cosmelioides*, Panch. . . . 156 = *gracile*.
d. *gracile*, Brongn. & Gris, etc.
a. *rosmariniforme*, R. Cunn. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 49 = *Urvilleanum*.

DRACUNCULUS.

- 797³. a. *paludosus*, Montand. Guide Bot. 309 = *Calla palustris*.

DREPANOCARPUS.

- 798². a. *lanatus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 610, in syn. sphalm. = *seq.*

- 798³. 1. *DRIESSENIA*, . . . (1842?).
bulbosa, Triana,

DRIMYSPERMUM.

- 799². 1. *Burmanni*, Decne. l. c. 40 = *P. octandra*.
Forsteri, Meissn. l. c. = *P. disperma*.

DROSERA.

- 800¹. a. *muscipula*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 75 = *peltata*.
800². 1. *peltata*, Sm. . . . 1546.—As. trop.; Austral.
d. *peltata*, Wight & Arn.

DRYANDRA.

- 801¹. 1. *cordata*, Thunb. l. c. = *A. cordata*.
801². *oleifera*, Lam. . . . = *Aleurites cordata*.
Vernicia, Correa, . . . = *A. cordata*.
a. *verrucosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 328, 452 = *A. cordata*.

DRYMARIA.

- 801². 1. *diandra*, Blume, Bijdr. 62.—Malaya?

DRYMOPHLOEUS.

- 802¹. 1. *punicus*, Becc.

DRYPETES.

- 802². 1. *bengalensis*, Spreng. . . . = *Fluggea microcarpa*.
crocea, Poit. ex Spreng. Syst. iii. 902 = *Xylosma nitidum*.
crocea, Poit. in Mém. . . . t. 8; Muell. Arg. in DC. Prod. xv. 11. 456.—Ind. occ.
a. *laevigata*, Griseb. ex Eggers, Fl. St. Croix, (1879) 90 = *Gymnanthes polyandra*.

DUBOISIA.

- 802³. 1. *Hopwoodii*, F. Muell. Fragm. x. 20.

PAG.

DUBRUEILIA.

- 802³. 1. *microphylla*, Gaudich. . . . = *P. muscosa*.

DUFOUREA.

- 803². 1. *glabra*, H. B. & K.
a. *velutina*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 11. (1845) 259.—Mexic.

DUHAMELIA.

- 803³. a. *pauciflora*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 267 = *H. ventricosa*.

- 803². 1. *DUNALIA*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 (1814) =

DYPISIS.

- 805³. 1. *nodifera*, Mart. l. c. 312 = *Phloga polystachia*.

DYSODIA.

- 805³. a. *chrysanthemifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 660, in syn. sphalm. = *seq.*
1. *grandiflora*, DC.

DYSOXYLUM.

- 806². 1. *Blancoi*, Vidal,

EBERMAIERA.

- 808¹. 1. *nitida*, S. Moore, in Gard. Chron.

- 808². 1. *ECCOILOPUS*, Steud. . . . = *Miscanthus*, Anderss.
andropogonoides, . . . = *M. cotulifer*.

ECHINACEA.

- 809³. a. *Porteri*, Wood, Am. Bot. & Flor. [445], in Add. —Am. bor.

ECHINOCACTUS.

- 812². 1. *rinconensis*, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiii. (1855) 18.—
a. *rufispinus*, Bertol. in Ann. Stor. Nat. iii. (1830) 223 = *Melocactus rufispinus*.
1. *Sickmanni*, [Lehm.] Del. Sem. Hort. Hamb. (1837); ex Linnaea, xii. (1838) Litt. 83. —Am. austr.
812³. *tubiflorus*, Hort. Angl.

ECHINOCHLOA.

- 813³. a. *aristata*, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 299 = *P. aristatum*?
hispidula, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 416, 420 = *P. Crus-galli*.

ECHINODORUS.

- 814¹. a. *BALDELIA*, Parl. Nuov. Gen. e Spec. 57 (1854).

ECHINOLOBIMUM.

- 814². a. *alpinum*, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 310 = *H. alpinum*.
argenteum, Desv. l. c. 312 = *H. candidum*.
biarticulatum, Desv. l. c. 310 = *Desmodium biarticulatum*.
carnosum, Desv. l. c. 313 = *H. pallidum*.
caucasicum, Desv. l. c. 312 = *H. obscurum*.
coronarium, Desv. l. c. 313 = *H. coronarium*.
flexuosum, Desv. l. c. = *H. flexuosum*.
fruticosum, Desv. l. c. 311 = *H. fruticosum*.
humile, Desv. l. c. 313 = *H. humile*.
incarnatum, Desv. l. c. 311 = *H. incarnatum*.
nitidum, Desv. l. c. 312 = *H. nitidum*.
obscurum, Desv. l. c. 310 = *H. obscurum*.
pallidum, Desv. l. c. 313 = *H. pallidum*.
sennoides, Desv. l. c. = *Ormocarpum sennoides*.
spinosissimum, Desv. l. c. = *H. spinosissimum*.
tauricum, Desv. l. c. 311 = *H. tauricum*.
trichocarpum, Desv. l. c. 312 = *H. trichocarpum*.
varium, Desv. l. c. = *H. varium*.

ECHINOSPERMUM.

- 816². a. *HACKELIA*, Opiz, in Bercht. Oekon. Fl. Boehm. ii. 147 (1838).

- 816³. 1. *laevigatum*, Kar. & Kir.

ECHITES.

- 817². a. *RHAFTOCARPUS*, Miers, Apocyn. S. Am. 151 (1878).

1. *bicolor*, Mig.

- 817³. a. *Browni*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 414 = *torulosa*.

- 818². *guayaquilensis*, Miers, Apocyn. S. Am. 233.—Ecuador.

- 819¹. 1. *nutans*, Anders. . . . *Haemadictyon*

- PAG. **ECHIUM.**
820¹. d. ISORIUM, Rafin. (*nunc Lobostemon*).
- EGLITES.**
823¹. a. *bellidifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 420, in syn., sphalm. = *praeac*.
- EHRETIA.**
823¹. a. LUTROSTYLIS, G. Don, Gen. Syst. iv. 391 (1837).
824². l. EICHLERIA, Hartog, ... = *Labourdonnaisia*, Boj. (Sapotac.).
- ELAEAGNUS.**
825¹. l. *edulis*, Siebold, ex Carr. in Rev. Hort. (1869) 300 = *multiflora*.
a. *Ghuwacen*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 323 = *umbellata*?
l. *Perrottetii*, Schlecht. ... 613 = *latifolia*.
a. *philippensis*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 114 = *latifolia*.
Rhamnoides, Royle, Illustr. Bot. Himal. 453 (Index) = *Hippophaë Rhamnoides*.
- ELAEIS.**
825². a. *guianensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 249, in syn., sphalm. = *guineensis*.
- ELAEOCARPUS.**
825³. l. *ceylanicus*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 406. — Zeylan.
826³. l. ELAEOCHYTRIS, Fenzl, ... = *Ferula* Tourn. (Umbell.).
cachroides, Fenzl, ... = *F. Schlechtendalii*.
meifolia, Fenzl, ... = *F. meifolia*.
- ELAEODENDRON.**
826³. a. *dichotomum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 167 = *glaucum*.
827¹. l. *papillosa*, Hochst. ... 305 = *capense*.
829¹. l. ELECTRA, Panz. ... 1813 (1814)
calycina, Panz. (l. c.), in obs. = *S. hrevifolius*.
- ELEGIA.**
829¹. d. LAMPROCAULOS, Mast. (genus retinendum).
- ELEOCHARIS.**
829³. a. TRICHOHYLLUM, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147. *austro-caledonica*, Vieill. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 38 = *plantaginea*.
830³. l. *Robbinsii*, Oakes, in Hovey. Mag. Hort. vii.
- ELEUSINE.**
832¹. a. *hrevifolia*, Wall. Cat. n. 3815. — Ind. or.
l. *dura*, Lam. ... = *Sclerochloa dura*.
832². a. *Luco*, Welw. Apont. 591 = *coracana*, stolonifera, R. Br. ... 63, nomen. — Abyss. *textilis*, Welw. in Murray, Journ. Trav. (1858) i. 31 = *indica*.
l. *verticillata*, Roxb. etc.
- ELISMA.**
833¹. a. NECTALISMA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 156.
- ELLIOTTIA.**
833². a. *bracteata*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 598. — Japon.
paniculata, Benth. & Hook. f. (l. c.) — Japon.
- ELLIPEIA.**
833³. l. *ferruginea*, Hook. f. & Thoms. ... 52 = *Uvaria ferruginea*.
Laha, Mig.
- ELODEA.**
833³. a. *canadensis*, Fras. f. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 168 = *H. virginicum*.
petiolata, Le Conte, ex Spach, (l. c.) 162 = *H. paludosum*.
- ELODEA.**
834¹. a. LUCHIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 75 (1841).
SERPICULA, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 33 (1817).
l. *granatensis*, Humb. & Bonpl.
- 834². l. ELUTHERIA, P. Br. ... = *Trichilia*, P. Br. (Meliac.).

- PAG. **ELUTHERIA.**
834². a. *nobilis*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xv. (1872) 376 = *microphylla*.
- ELYMUS.**
834³. l. *dahuricus*, Turcz. ... ; et xxix. (1856) i. 61. — Dahuria.
835¹. *glaucus*, Regel, ... 585 = *dasystachys*.
- ELYNANTHUS.**
835³. a. *punctorius*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1064. — Afr. austr.
- EMBELIA.**
836². l. *abyssinica*, Baker, ... 497 = *Schimperi*.
- ENCELIA.**
838³. a. *procumbens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 249, in syn. = *parvifolia*.
- ENCEPHALARTOS.**
838³. l. *Acantha*, Mast. ... 810 = *cycadifolius*.
- 839¹. l. ENCHIDIUM, Jack, ... 257 = *Trigonostemon*, Blume (1825).
- 839². l. ENCHYSIA, Presl, ... = *Laurentia*, Michx.
- ENCLIANDRA.**
839². l. *parviflora*, Zucc. l. c. 337 = *F. Eucliandra*.
- ENDIANDRA.**
839³. a. *Ita-uba*, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 154. — Bras.
Navalium, Benth. l. c. — Bras.
- 840¹. l. ENDOGONIA, Lindl. ... = *Trigonotis*, Stev. (1851).
- ENGELHARDTIA.**
841¹. a. *aurifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 412, sphalm. = *praeac*.
l. *Oreomunea*, C. DC.
a. *Oreomunnea*, C. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 142, err typ. = *praeac*.
- 842². l. ENULA, Caesalp. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 184 (1760); Neck.
- EPACRIS.**
842³. a. *incarnata*, Hoffmgg. Preisvers. ed. X. 81. — Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 274. — Hah.?
- EPICARPURUS.**
844³. l. *microphyllus*, Raoul, ... 14 = *Paratrophis heterophylla*.
- EPIDENDRUM.**
845¹. a. LAELIOPSIS, Lindl. in Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 155. t. 105.
845². *anisatum*, Lindl. Fol. Orch. Epid. 55 = *Juergensenii*.
846². l. *cochleatum*, Curt. ... t. 152
847³. a. *Juergensenii*, Reicheb. f. in Gard. Chron. (1880) II. 524, in obs. — Mexic.
- 851². l. EPIGYNIUM, Klotzsch, ... (1851).
Leschenaultii, et *serratum* (etiam 1851).
- EPIGYNUM.**
851³. l. LEGOUXIA, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 145 (1871).
- EPILOBIUM.**
852². a. *decussatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 211, nomen (Quid?). — Reg. Himal.
852³. l. *flaccidum*, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 32 =
853¹. *Herbertianum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 211, nomen (Quid?). — Reg. Himal.
heterophyllum, Hegetsch. ... Beitr. Crit. Schw. 345 =
a. *hybridum*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 28 (Quid?). — Gallia.
hyssopifolium, Arv. (l. c.) 29 (Quid?). — Gallia.
intermedium, Bory, ex Thore, Promen. Gasc. 24 (Quid?). — Gallia.
l. *intermedium*, Hegetsch. ... Beitr. Crit. Schw. 345 =
a. *laeve*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 211 = *montanum*?

- PAG. **EPILOBIUM.** —
853². l. *pauciflorum*, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. ii. (1818) 15 =
a. *pendulum*, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 31 = *nummularifolium*.
854¹. l. *ramiflorum*, Hegetsch. ... Beitr. Crit. Schw. 345 =
854². a. *scutellariaefolium*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 29 (Quid?). — Gallia.
l. *tetragonum*, Aitch.
854³. *thymifolium*, R. Cunn. ex A. Cunn. etc.
- EPIPACTIS.**
855¹. a. LIMONIAS, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147.
l. *atrorubens*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 481; Schult.
babianifolia, Roxb. ... nomen = *Pogonia babianifolia*.
855². a. *Gutta-sanguinis*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 64 (Quid?). — Gallia.
855³. *trinervia*, Roxb. ... 455 = *Pogonia trinervia*.
l. *viridiflora*, Roehl. (l. c.); Reichb.
- EPIPHYLLUM.**
856¹. a. *cruentum*, Hort. — Cf. Flor. Mag. N. S. (1880) t. 413 = *Phyllocactus Ackermanni*.
- EPISCIA.**
856³. l. *subacaulis*, Griseb. ... 462 = *Napeanthus subacaulis*.
- 856³. l. EPISIPHIS, Rafin. ... *Hypericum*, Tourn.
- EPISTEPHIUM.**
856³. a. *Cruegeri*, Reichb. f. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 637 = *parviflorum*.
l. *racemosum*, Rodrig. l. c. = *sclerophyllum*.
- ERAGROSTIS.**
857². a. *Amherstiana*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417, nomen (Quid?). — Ind. or.
l. *aurea*, Steud. in Flora, xxix. (1846) 20; et
857³. *caudata*, Tourn. ... 573 = *capillaris*.
cuspidata, Link. ... = *Vahlhi*.
elegantula, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417 =
858¹. *Frankii*, Steud.
infrima, Steud.
858². *mexicana*, Link. ... 190 = *capillaris*.
mucronata, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1187. — Ind. or.
nigra, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417; et ex
858³. *rhachitricha*, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 267 =
859¹. *rufescens*, Schult. Mant. ii. 319 = *Vahlhi*.
solida, Nees, ... = *Vahlhi*.
spectabilis, Steud. ... 564 = *pectinacea*?
a. *thalassica*, Steud. Nom. ed. II. ii. 111, in syn. = *Poa thalassica*.
859². l. *unifoloides*, Nees, ... 264. — As. trop.
- ERANTHEMUM.**
859². d. UPUDALIA, Rafin. (*nunc Daedalacanthus*).
- ERECHTITES.**
860³. l. *bathurstiana*, DC.
- EREMURUS.**
862³. a. *soogdiana*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 787. — Sihir.
- ERIA.**
864². l. *vestita*, Lindl. ... 76
- ERIANTHUS.**
865¹. l. *versicolor*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 416, nomen; et ex
a. *vulpinus*, Nees, (l. c.) 417, nomen (Quid?). — Reg. Himal.
- ERICA.**
865¹. a. ERICOIDES, Ludw. Def. Pl. 38 (1737); ed. II. 34 (1747).
866¹. *Burnettii* ×, Hort. ex Planch. in Fl. des Serres, viii. (1852-53) 261. t. 845.
Cavendishiana ×, Paxt. Mag. Bot. xiii. (1847) 3.
Cavendishii ×, Paxt. l. c. t. [2] = *praeac*.
867¹. *Douglasiae* ×, T. Moore, in Moore & Ayres, Mag. Bot. iii. (1851) 9. t. [1] f. 1.

PAG.

- ERICA**.—
 868³. *laxifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 7, in syn., sphalm. = *taxifolia*.
 869¹. *Marnockiana* ×, T. Moore, (ut supra) f. 2. *minima*, Pritz. Ic. Ind. i. 417 = *hirtiflora*.
 869². *Murrayana* ×, Tumb. ex Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 77.
nigrescens, Steud. Nom. ed. II. ii. 7, in syn. = *nigrita*.
 870¹. *pauciflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 656, in syn., sphalm. = *sacciflora*.
 871². *simulata* ×, T. Moore, (ut supra) f. 3. *Spenceriana* ×, Planch. in Fl. des Serres, xxii. (1877) 111. t. 2323.
 873¹. a. **ERICOIDES**, Ludw. Def. Pl. 38 (1737); ed. II. 34 (1747) = *Erica*, Tourn.

- ERIGERON**.
 873³. 1. *asteroides*, Hort. Angl. . . 324 = *glaucus*.
 875². *mixtus* ×, Arv. Add. Monog. Pilos. 19.—Cf.

- ERINUS**.
 877¹. a. *pulchellus*, *Jarosz*, Pl. Nov. Cap. 20.—Afr. austr.
 1. *villosus*, Thunb. . . = *Zaluzianskya Ben-thamiana*.

- ERIOBOTRYA**.
 877¹. a. *elliptica*, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 370 = *petiolata*.

- ERIOCAULON**.
 878². a. *hexangulare*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 409, sphalm. = *sexangulare*.
 879¹. 1. *nepalense*, *Presc. ex Bong.*
 879². *viride*, Koern. l. c. 637 = *nepalense*.
Wallichianum, Mart. . . 249 = *sexangulare*.
 880¹. d. *Wallichianum*, Thw.

- ERIOCHAETA**.
 880¹. 1. *densiflora, reversa, secundiflora*, Fig. & De Not. . . (omnes) = *P. penicellatum*.

- ERIPHORUM**.
 882². a. *Cannabina*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 415 = *comosum*, *Spodiopogon angustifolius*.
depauperatum, Arv. Ess. Pl. Dauph. 66 (Quid?). —Gallia.

- ERIOPHYLLUM**.
 883¹. 1. *multicaule*, A. Gray, . . . 24 = *Actinolepis multicaulis*.

- 883². insere **ERIOPIUS**, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 376 (1884) = *Trichocline*, Cass. (Compos.).
acaulis, Sch. Bip. ex Baker, l. c. = *T. Eriopus*.

- ERIOSEMA**.
 883³. 1. *Guienzii*, *Sond.* . . (1850).
heterophyllum, *Benth.* l. c. xxii. (1849) 520. —Bras.

- 885¹. insere **ERIOSTOMA**, Boiv. ex Baill. *Adansonia*, xii. (1878) 208 = *Hypobathrum*, Blume (Rubiace.).
albicaulis, Boiv. ex Baill. l. c. = *H. albicaule*.

- ERUCAGO**.
 889¹. 1. *glandulosa*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 355 =

- ERUCARIA**.
 889². 1. *latifolia*, DC. l. c. 675 = *Brassica adpressa*.

- ERVUM**.
 889³. 1. *cyaneum*, Boiss. & Hohen. . . 115 = *Lens cyanea*.
dalmaticum, Presl, . . 31 = *Lens nigricans*.

- ERYSIMUM**.
 894¹. 1. *Strophades*, Boiss.

- ERYTHRAEA**.
 895¹. 1. *Pickeringii*, Oakes, . . . Mag. Hort. vii. (1841) 179 =

- ERYTHRINA**.
 895². a. *alba*, *Cogn. & March. in Dallièrè*, Pl. Orna-ment. i. (1873) t. 56.—Hab.?
 895³. *horrida*, *Eggers*, Fl. St. Croix, (1879) 45.—Ins. S. Croix; Virgin.
 896¹. *suberosa*, Welw. Synopse, 30. n. 73 = *suberifera*.

PAG.

- ERYTHRONIUM**.
 896³. a. *hyacinthoides*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 453 (Index), sphalm. = *Scilla indica*.

- ERYTHRORCHIS**.
 897¹. a. *Lindleyana*, Reichenb. f. in Bonplandia, v. (1857) 37 = *G. Lindleyana*.

- ERYTHROXYLUM**.
 897³. 1. *discolor* *Boj. in Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice*, xii. (1841) 38; *et jossinoides*, *Boj. (l. c.)* 38; *et lanceum*, *Boj. (l. c.)* 39; *et myrtoides*, *Boj. (l. c.)* 39; *et platyclados*, *Boj. (l. c.)* 40; *et*

- ESCALLONIA**.
 898². 1. *bifida*, Link & Otto, Ic. Pl. Rar. 45. t. 23 =

- ESCOBEDIA**.
 899². a. *MICALIA*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 104 (1836).

- ETHULIA**.
 900². 1. *alata*, Sond. . . 60 = *Epaltes alata*.

- EUCLIDIUM**.
 904¹. 1. **ORNITHORHYNCHIUM**, Roehl. . . (1812).

- EUCNIDE**.
 904¹. a. *cordata*, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 137 = *M. cordata*.

- EUGEISSONA**.
 904³. *minor et insignis, transponuntur*.

- EUGENIA**.
 905¹. 1. **SIPHONEUGENA**, Berg,
 905². a. *aromatica*, *Sond. ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 379, in syn.—Bras.
 905³. *Billardiana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 177, sphalm. = *Myrcia Billardiana*.

- 906². 1. *confertiflora*, A. Gray,
 907². *frondosa*, *Wall. Cat. sub n.* 3590.
 908². a. *lasiopus*, Mart. ex DC. Prod. iii. 253 = *Myrcia lasiopus*.
 910¹. *polyantha*, *Miq. in Linnaea*, xviii. (1844) 741. —Guian.

- 911¹. 1. *Schaueriana*, *Miq. in Linnaea*, xxii. (1849) 174; *et*
 911². a. *Tatna*, *Wall. Cat. sub n.* 3555 (Quid?)—Ind. or.
 911³. *trunciflora*, *Rich. ex Berg, in Linnaea*, xxx. (1859–60) 702, in syn.—Ind. occ.

- 912². 1. **EULALIA**, Trin. . . = *Miscanthus*, Anderss.

- EULOPHIA**.
 913². a. *vera*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 28, 366 = *herbacea*?

- 913³. a. **EUONYMOIDES**, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 318 = *Alectryon*, Gaertn. (Sapindac.).
excelsa, Soland. ex A. Cunn. l. c. = *A. excelsum*.

- EUONYMUS**.
 914¹. a. *Carrieri*, Vauv. ex Carr. in Rev. Hort. (1885) 296. f. 50 = *radicans*.

- 914². *radicans*, *Siebold, ex Miq. Ann. Bot. Mus. Lugd. Bat.* i. 86, in obs.; *et ex C. Koch, Dendrol.* i. 632.—Japon.
repens, Carr. in Rev. Hort. (1885) 296. f. 51 = *radicans*.

- EUPATORIUM**.
 919³. a. *salicinum*, Spreng. Syst. iii. 412 = *Vernonia Sprengliana*.
 920³. 1. *Torreyanum*, Short & Peter, in Transylv. Journ. Med. n. xxxii. (1836) 575 =

- EUPHORBIA**.
 922². a. *austriaca*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 397, in obs.—Europ.
 924³. 1. *fragifera*, *Jan, Cat. Pl. Phan.* (1818) 76; *et ex* 929¹. *Rapulm*, *Kar. & Kir.*
 930². a. *tessellata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 111 = *E. Caput-Medusae*.

- EUPHORIA**.
 931². 1. *Gardneri*, Benth. & Hook. f.
 a. *rimosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 138 (Quid?). —Reg. Himal.

PAG.

- EUPHRASIA**.
 931³. a. *gyroflexa*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 56 (Quid?). —Gallia.
 932². *squamosa*, Presl, Bot. Bemerk. 91, sphalm. = *squarrosa*.
Veronicastrum, Arv. Ess. Pl. Dauph. 57 (Quid?). —Gallia.
viscida, Arv. (l. c.) (Quid?). —Gallia.

- EURYA**.
 933². a. *latifolia*, Hort. . . = *Cleyera japonica*.

- 933³. 1. **EURYALE**, Salisb. . . (1805).
ferox, Salisb. . . ii. (1805).

- EURYBIA**.
 933³. a. *argyrophylla*, Sch. Bip. in Pollichia, xviii–xix. (1861) 173, sphalm. = *præc.*
 934¹. 1. *corymbosa*, Cass. . . = *Aster corymbosus*.

- EURYGANIA**.
 934³. 1. *melliflora*, *Benth. & Hook. f. (ponitur post E. bifloram)*.
multiflora, Klotzsch, . . = *præc.*

- EURYLOBIUM**.
 934³. 1. *serrulatum*, *Hochst. l. c.* 229.

- 935³. 1. **EUSIDEROXYLON**, Teysm. & Binn.
 a. *borneense*, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 179 = *Zwageri*.
 1. *Zwageri*, *Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 292.—Borneo.

- EUTERPE**.
 936³. a. *stenophylla*, *Trail, ex im Thurn, in Timchri*, iii. (1884) 229.—Guian.

- 937¹. 1. **EUTHODON**, Griff. Notul. iv. 84; Ic. Pl. Asiat. t.

- EUTOCA**.
 937¹. 1. *Cumingii*, Benth. . . 276 = *P. Cumingii*.

- EUXOLUS**.
 937³. 1. *crispus*, Lespin. . . —Hab.?

- EVELYNA**.
 938³. 1. *Caravata*, Lindl. Fol. Orch. Evel. 9; ex Hook. Bot. Mag. t. 5141; *et ex longibracteata*, Lindl. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 623.—Am. trop.

- EVODIA**.
 939¹. 1. *fraxinifolia*, *Hook. f. ex Benth. Fl. Hongk.* 59, in nota; *et*
 939². *Marambong*, *Miq.*
rutaecarpa, *Hook. f. ex Benth. Fl. Hongk.* 59, in nota; *et*

- EVOLVULUS**.
 939³. 1. *discolor*, *Benth. Pl. Hartw.* 6.—Mexic.
 940¹. *Glechoma*, Welw. Apont. 589 = *Ipomoea reniformis*.

- EXCOECARIA**.
 941³. 1. *brachyandra*, Muell. Arg. usque ad *Chamelaea*, Baill., antepouendae cochinchinensi, *Lour.*

- EXOgonium**.
 942³. 1. *Purga*, Benth. Pl. Hartw. 46; Lindl.

- FACELIS**.
 944². 1. *plumosa*, Sch. Bip. . . nomen = *Lucilia plumosa*.

- FADOgia**.
 944². 1. *Zeyheri*, *Hiern, l. c.* 153 (cum cit. falsa).

- FAGARA**.
 944³. 1. *Pterota*, Linn.

- FAUREA**.
 948². a. **TRICHOSTACHYS**, Welw. Synopse, 19 (1862).

- FENDLERIA**.
 949². a. *cymosa*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, viii. (1881) 26 = *utahensis*.
utahensis, *Greene, l. c.* 25.—Utah; Arizona.

- FERDINANDA**.
 949³. 1. *angusta*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 159, sphalm. = *seq.*
angusta, Lag. Gen. & Sp. Nov. 31. t. 2 = *Z. angusta*.

- PAG. **FERULA.**
 950². a. ELAECHYTRIS, Fenzl, in Russegg. Reise, i. 957. t. 19 (1843) (Illustr. Pl. Syr. 71).
 LEPTOTAENIA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 629 (1840).
 POLYCYRTUS, Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 126.
 950³. d. XANTHOGALUM, Avé-Lall. (*nunc Dorema*).
 951¹. a. *Hooshee*, Lindl. Fl. Med. 46 = F. Assa-foetida?
 951². l. *Opopanax*, Spreng. . . = *Opopanax hispidum*.
 a. *setifolia*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 39 = pauciflora.
 951³. l. *sylvatica*, Szov. ex C. Koch, (l. c.) = pauciflora.
FESTUCA.
 952¹. a. LEUCOPOA, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 383 (1853).
 TRAGUS, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 296.
 952². *Amherstiana*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 417, nomen = *Poa persica*.
 953¹. *ciliata*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3826 = virgata.
curvata, All. ex Beauv. Agrost. 99, nomen.—Europ.
 953³. Gerardi, All. ex Beauv. (l. c.), nomen.—Europ.
 954¹. gracillima, Thurb. in Bot. Calif. ii. 318 (non Hook. f.).—Calif.
 l. Hemipoa, Delile,
 954³. mysorensis, Heyne, . . . = *Enteropogon melioides*.
 955¹. a. *pauciflora*, Thurb. in Bot. Calif. ii. 318 = occidentalis, etc.
 955³. l. *reptatrix*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 108 = *Rohlfiana*, Coss. . . 83 = *Sclerochloa philistaea*.
scabrella, Thurb. in Bot. Calif. ii. 318 (non Torr.).—Calif.
 956¹. a. *sterilis*, Jess. Deutschl. Graes. 170 = *Bromus sterilis*.
 956². *tectorum*, Jess. (l. c.) = *Bromus tectorum*.
 956³. l. violacea, [Clairv.]
 956³. insere (ante *Fialarem*, Rafin.) FEVILLAEA, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Inga*, Scop. (Legumin.).
FICINIA.
 957¹. a. HELLMUTHIA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; et Syn. Pl. Cyp. 90 (1855).
FICUS.
 957³. l. CYSTOGYNE, Gasp. l. c. 9 (1844); et in
 959¹. a. Chauvieri, Hort.—Cf. Nichols. Dict. Gard. ii. 12.—Hab.?
 l. chiriquiana, Miq.
 960¹. a. *Forsteriana*, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 166 = prolixa.
 960². habrophylla, G. Benn. Gather. Natural. 341.—Ins. Tanna.
 l. haematocarpa, Decne.
 961¹. a. *laurifolia*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 336, nomen (Quid?)—Reg. Himal.
 963². l. *Reinwardti*, Link & Otto, . . . 61. t. 31 =
 964². a. *tannensis*, G. Benn. Gather. Natural. 341, nomen (Quid?)—Ins. Tanna.
FIMBRISTYLIS.
 966². a. *bisumbellata*, Bubani, Dodecanth. 30 = dichotoma.
 966³. *bulbosa*, Steud. Nom. ed. II. i. 828, in syn., sphalm. = *Ficinia bulbosa*.
 967². l. *marquesana*, Steud. (post *marianam* ponitur).
 968¹. *rigida*, Kunth,
Scherardi, Bubani, Dodecanth. 29 =
separanda, Steud. . . nomen = diphylla.
 968². a. *Steudelii*, Steud. Nom. ed. II. i. 827; ii. 539, sphalm. = *Ficinia Ecklonea*.
 l. tenella, Schult.
FISCHERIA.
 969¹. a. hispida, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 766.—Am. austr.
setosa, Benth. & Hook. f. (l. c.).—N. Granat.
 969¹. a. FISTULARIA, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Rhinanthus*, Linn. (Scrophul.).

- PAG. **FLACOURTIA.**
 969². a. SATANIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
FLAVERIA.
 970¹. l. *trinervata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 186, in syn., sphalm.; Baill.
FLINDERSIA.
 971¹. l. *maculata*, F. Muell. in Journ. Pharm. Vict. ii. (1858) 44, sphalm. = seq.
maculosa, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 389.—Austral.
 FLUEGGEA, Rich.
 971³. a. *dracaenoides*, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 174.—Reg. Himal.
FLUGGEA.
 971³. a. *retusa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 327 = microcarpa?
FOENICULUM.
 972¹. a. *Webbii*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 902 = tortuosum.
FONTANESIA.
 972². l. *chinensis*, Hance, . . . 136 = phylliraeoides. phylliraeoides, Labill. . . Syria; China.
FOUQUIERIA.
 973³. a. IDRIA, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 34.
columnaris, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 133 = spinosa.
 975¹. insere FRANCA, Mich. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 169 (1747) = seq.
FRANKENIA.
 975². l. FRANCA, Mich. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 169 (1747).
FRANQUEVILLEA.
 976¹. a. *major*, Zoll. ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) II. 84 = *Curculigo orchoides*.
FREGIRARDIA.
 977³. l. *luteiflora*, Dun. . . (1849) = *B. diversifolius*.
Spina-alba, Dun. l. c. 507 = *Bassovia Spina-alba*.
FREMYA.
 977³. l. *ciliata*, Brongn. & Gris, . . . 374 = *Metrosideros ciliata*.
 978¹. *pubescens*, Brongn. & Gris, . . . = *Metrosideros pubescens*.
rubra, Brongn. & Gris, . . . = *Metrosideros rubra*.
FRITILLARIA.
 979². l. RHINOPETALUM, Fisch. . . [viii.] (1829).
aurea, Schott, . . . = lutea?
 a. *Corona-imperialis*, Gaertn. Fruct. i. 64. t. 7 = F. Imperialis.
FUCHSIA.
 981¹. l. Kirkii, Hook. f. . . i. ed. II. (1871) 92.
 981³. l. FULCALDEA post **FUIRENA** ad p. 982¹ ponitur.
FUIRENA.
 981³. a. PENTASTICHA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1862) II. 330.
annua, Royle, Illustr. Bot. Himal. 411 = pubescens.
cylindrica, Steud. Nom. ed. II. ii. 539, sphalm. = *Fimbristylis spadicea*.
GAGEA.
 985². a. *Haeckelii* x, Dufft & Schulze, ex Hausskn. in Mitth. Geogr. Soc. Jena, ii. (1885) 224.—Europ.
GAHNIA.
 986¹. l. pauciflora, T. Kirk, . . . i. ed. II. (1871) 94.
GAILLARDIA.
 986². a. *grandiflora* x, Hort. ex Fl. des Serres, xiii. (1857) l. t. 1183.
perennis, Loisel. Herb. Gén. Amat. v. t. 328.—Am. bor.

- PAG. **GALATELLA.**
 988¹. a. *collina*, Jord. & Fourr. ex Nym. Consp. 386 = A. acris.
fugax, Nym. (l. c.) = A. aragonensis.
pinetorum, Jord. & Fourr. ex Nym. (l. c.) = A. acris.
sedifolia, Nym. (l. c.) = A. acris.
tatarica, Nym. (l. c.) = A. dracunculoides.
GALEANDRA.
 988³. l. nivalis [T. Moore? in]
GALEOPSIS.
 990¹. l. *glaucescens*, Reut. ex Ardoino, . . . 299 = G. Ladanum.
 990². *neptaeifolia*, Timb. . . 19 = G. Ladanum.
 990². l. GALEOTTIA, Rupr. . . (1842).
GALINIERA.
 990³. l. *coffeoides*, Delile,
GALINSOGA.
 990³. a. *Acmella*, Steud. Nom. ed. II. ii. 766, in syn. = parviflora.
GALIPEA.
 991¹. a. SYSTEMON, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 38; Gartenfl. vi. (1857) 81.
GALIUM.
 991². l. CRUCIATA, [Tourn.] Ludw. Def. Pl. 2 (1737).
 991³. aphyllum, [Mazzari]
 992¹. Brandegei, A. Gray, in Bull. U. St. Geol. & Geogr. Surv. ii. (1876) 237; et in
 a. *cenisium*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 33 (Quid?)—Gallia.
 992². chilense, Endl. ex C. Gay, Fl. Chil. iii. 180.—Chili.
 992³. *decolorans*, Bourg. ex Marès, Cat. Pl. Balear. 139 = *Crespianum*.
delphinense, Arv. Ess. Pl. Dauph. 33 (Quid?)—Gallia.
ericoides, Arv. (l. c.) 32 (Quid?)—Gallia.
 995¹. Pseudo-myrianthum, Gennari, in Mem. Acc. Torin. II. xvii. (1858) 466.—Hab.?
 995². simplex, Arv. Ess. Pl. Dauph. 31 (Quid?)—Gallia.
GALVEZIA.
 996³. d. SACCULARIA, Kellogg (*nunc Antirrhinum*).
GANOPHYLLUM.
 997². l. falcatum, Blume, . . . Malacca; Austral.; N. Guin.
GARCINIA.
 997³. l. MANGOSTANA, Rumph. ex Gaertn.
 a. STALAGMITIS, Murr. in Comm. Gottin. ix. (1789) 173.
XANTHOCHYMUS, Roxb. Pl. Corom. ii. 51. t. 196 (1798).
 998¹. l. *collina*, Vieill. . . 223 = corallina.
 998². Kola, Heckel, in Journ. Pharm. et Chim. viii. (1883) 88.—Afr. trop.
GARDENIA.
 999¹. a. DECAMERIA, Welw. Apont. 579, in obs. [1859].
 999². l. *bignoniaeflora*, Welw. . . 13 = *Sherbournia foliosa*.
Devoniana, Lindl. . . 663 = *Randia Devoniana*.
 1000². Pseudo-psidium, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 109 (sp. dub.).
GARDOQUIA.
 1001¹. a. *obovata*, Griseb. ex Wedd. Chlor. And. ii. 150 = *Micromeria boliviana*.
 l. *origanoides*, Reichb. ex Cham. in Linnaea, vii. (1832) 226.
GARIDELLA.
 1001¹. l. *anethifolia*, Salisb. . . = N. Garidella.
Nigellastrum, Linn. . . = N. Garidella.
unguicularis, Lam. . . 2] = N. unguicularis.
 1001². l. GARRETIA, Welw. . . (1858) = *Khaya*. Juss. (Meliac.).
anthoteca, Welw. l. c. = K. anthoteca.

PAG.

- GARRYA.**
1001¹. 1. *Veatchii*, Kellogg, . . . 40 = *flavescens*.
- 1001³. 1. GASOUL, Adans.
- GASTONIA.**
1002¹. 1. *aculeata*, Thou. ex Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 109; Hort.
- GASTRIDIVM.**
1002². 1. *scabrum*, Presl, Cyp. & Gram. Sic. 21 =
- GAULTHERIA.**
1003². 1. *Acosta*, Steud. . . . 665 = *Vaccinium Acosta*.
1003³. *fluviatilis*, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 49 =
- GAYA.**
1004³. a. TETRAPTERA, Phil. in Bot. Zeit. xxviii. (1870) 169.
calyptrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 268, in obs.—Peruv.
1005¹. a. *occidentalis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 268, in obs.—Am. trop.
- GAZANIA.**
1005³. 1. *armerioides*, DC. Prod. vi.
- GEIGERIA.**
1006¹. 1. *africana*, Griessell.
- GEMELLA**, Lour.
1007². 1. *trifolia*, Lour.
a. *trifoliata*, DC. Prod. i. 610 = *præc.*
- GENISTA.**
1009¹. 1. *aprutia*, Nym. Consp. 151 =
1009². a. *compressa*, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 246 = *Carmichaelia australis*.
- GENTIANA.**
1013¹. 1. *exaltata*, Linn. . . . = *Eustoma silenifolium*.
1014¹. a. *media* ×, Arv. Ess. Pl. Dauph. 51.—Gallia.
- GEOFFRAEA.**
1016¹. 1. *surinamensis*, Bondt,
- GEOPHILA.**
1017². d. *reniformis*, Cham. & Schlecht. etc.
- GERANIUM.**
1020². a. *odoriferum*, G. Don, Gen. Syst. i. 739, in syn. = *Pelargonium odoratissimum*.
1020³. *patulum*, Soland. ex Forst. f. Prod. 91 = *dissectum*.
1. *pilosum*, Soland. ex Forst. f.
- GERARDIA.**
1022³. 1. *Nigrina*, Linn. f.
Nigrina, Thunb.
nuda, Wood, Am. Bot. & Flor. 231 = *filicaulis*.
sessiliflora, Vahl, . . . 79 = *Alectra melampyroides*.
Skinneriana, Wood, Class-book (1847), 176;
Am. Bot. & Flor. 231.
1023¹. *strictiflora*, A. Gray, . . . 294 = *seq.* (i. e. *strictifolia*, Benth.)
- GESNERIA.**
1024². 1. *corymbosa*, Balb. & Bert. . . . 525 = *Pentarraphia longiflora*.
elatior, H. B. & K. . . . 393 = *Isoloma elatius*.
exserta, Sw. . . . 90 = *Pentarraphia catalpiflora*.
1025². *verticillata*, Cav. . . . 585 = *Isoloma verticillatum*.
- GETHYLLIS.**
1025³. a. *bivaginata*, Mass. ex Baker, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 227 = *Britteniana*.
cuspidata, Thunb. ex Baker, (l. c.) = *ciliaris*.
polyanthera, Soland. ex Baker, (l. c.) xxii. (1884) 148 = *ciliaris*.
- GHINIA.**
1027¹. 1. *spinosa*, Willd. l. c. = *T. spinosa*.
verbenacea, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 1089 = *T. spinosa*.
- 1027¹. 1. GIGANTHEMUM, Welw. Apont. 585 [1859] = *Camoensia*, Welw. (1865) (Legumin.).
scandens, Welw. l. c. = *C. maxima*.

PAG.

- GILIA.**
1027³. 1. *Dunnii*, Kellogg, . . . 142 = *Loeselia effusa*.
- 1029¹. a. GINSENG, Wood, Am. Bot. & Flor. 142 (1871) = *Aralia*, Tourn.
quinquefolium, Wood, l. c. = *A. quinquefolium*.
trifolium, Wood, l. c. = *A. trifolia*.
- GIRARDINIA.**
1029¹. 1. *condensata*, Wedd. . . . ix. (1856).
- GLADIOLUS.**
1029³. a. TILESIA, Thunb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 686 (1841).
1030¹. 1. *Andrewsii*, Klatt, . . . xv. (*sic etiam corrigatur apud brevicollem, citrinum, Gawleri, lunulatum, rachidiflorum, uniflorum*).
1030². *communis*, Thunb.
1030³. a. *hybridus* ×, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, iii. (1847) t. 518.
1. *illyricus*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 699; ed. II. 806.
1031². a. *odoratus* ×, Herb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 117.
- GLOBBA.**
1033³. 1. *crispa*, Retz.
a. *secunda*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 357, nomen (Quid ?).—Reg. Himal.
- GLOBULARIA.**
1034¹. 1. *nana*, Lam. . . . —Europ.
- GLOCHIDION.**
1034². a. *bifarium*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 327, nomen (Quid ?).—Reg. Himal.
1034³. 1. *Fagueti*, Muell. Arg. . . . 71.
flexuosum, Muell. Arg. ex Miq. . . . 128 = *Phyllanthus japonicus*.
1035¹. *philippinense*, Benth.
- GLOSSOGYNE.**
1035³. 1. *brasiliensis*, Gardn. . . . 408 = *Isostigma brasiliense*.
- GLOXINIA.**
1036². 1. *SALISIA*, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 179.
a. *diversiflora* ×, May, in Rev. Hort. (1883) 247. f. 45.
maxima ×, Paxt. Mag. Bot. v. (1838) 219.
- GLYCERIA.**
1037¹. a. HEMIBROMUS, Steud. Syn. Pl. Gram. 317 (1855).
1. *aquatica*, Wahlb.
capillaris, Wahlb.
a. *Catabrosa*, Klatt & Reichb. Fl. Leipz. 96 = *Catabrosa aquatica*.
- GLYCINE.**
1038¹. a. *glutinosa*, Hoffmgg. Preisverz. (1841) 78.—*Cf. Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 269.—Hab.?
1038². *pendula*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 224.—Java.
1038³. 1. *totta*, Thunb. . . . = *Rhynchosia totta*.
- GLYCOSMIS.**
1039¹. a. *parvifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 47, in syn., sphalm. = *pentaphylla*.
- GLYCYRRHIZA.**
1039². 1. *lepidota*, Nutt. in Fras. Cat. (1813); ex Pursh,
- GMEIINA.**
1039³. 1. *Leichhardtii*, F. Muell.
- GNAPHALIVM.**
1040². a. *argenteum*, Vell. Fl. Flum. viii. t. 97 (Quid ?). —Bras.
1042¹. *ferrugineum*, Wendl. Sert. Hannov. t. 23 = *Helipterum ferrugineum*.
1043¹. 1. *keriense*, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839).
1043³. *nevadense*, Kellogg, . . . 45 = *Antennaria dioica*.
- GNIDIA.**
1047¹. a. *ciliata*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 563 = *Struthiola lucens*?

PAG.

- GOCHNATIA.**
1047³. 1. *glutinosa*, Klatt, . . . xv.
- GOMESA.**
1048³. a. *densiflora*, Hoffmgg. Preisverz. (1841) 78.—*Cf. Linnaea*, xvi. (1842) 265.—Hab.?
- GOMPHIA.**
1049³. a. *nitida*, Vahl, Symb. Bot. ii. 49.—Ind. occ.
- GOMPHOCARPUS.**
1050³. 1. *asperifolius*, Walp. Rep. vi. 486.—Afr. austr. Gerrardi, Harv. . . . t. 193.
1050³. *M'Kenii*, Harv. . . . t. 194.
- GONOLOBUS.**
1054². 1. *cynanchoides*, Engelm. & Gray, . . . 251 = *Lachnostoma cynanchoides* (in Addend.).
a. *exilis*, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864) 161 = *Metastelma stenolobus*.
1054³. 1. *hispidus*, Hook. & Arn. . . . 295 = *Fischeria hispida*.
maritimus, R. Br. . . . 35 = *Lachnostoma maritimum*.
1055¹. *setosus*, Benth. . . . 216 = *Fischeria setosa*.
- GONZALEA.**
1055³. 1. *Petesia*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 321; et in
- GOODYERA.**
1056³. 1. TUSSACA, Rafin. Préc. Découv. 42 (1814); et in
secundiflora, Lindl. . . . 182; Griff. Notul. iii. 393 = *Schlechtendalia*.
similis, Blume, . . . 39 = *Schlechtendalia*.
- GOSSYPIVM.**
1058¹. 1. *siamense*, Tenore, . . . 193
- GOVINDOOIA.**
1059¹. 1. *nervosa*, Wight, l. c. = *T. angulosa*.
- 1059². 1. GRACILEA, Koen. . . . 218 = *Melanocenchris*, Nees (Gramin.).
nutans, Koen. l. c. = *M. Rothiana*.
- GRAMMATOCARPUS.**
1059². a. OCHETOCARPUS, Meyen, Reise, i. 310 (1834).
- 1060². insere GRANDIERA, Lef. ex Baill. Adansonia, x. (1871) 164 = *Sindora*, Miq. (Legumin.).
cochinchinensis, Lef. l. c. = *S. cochinchinensis*.
- GRATIOLA.**
1061¹. 1. *sexdentata*, R. Cunn. ex A. Cunn.
- GRIFFONIA.**
1066¹. a. DACTYLADENIA, Welw. Apont. 572 [1859].
- GRINDELIA.**
1066². a. THURARIA, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 85.
1. *glutinosa*, Dun. . . . 49.—Peruv.
humilis, Hook. & Arn. l. c. = *cuneifolia*.
inuloides, Willd. . . . 261.—Texas; Mexic.
- 1066³. 1. GRISCHOWIA, Karst. Ausw. Neuer Gew. Venez.
- 1067². 1. GROSOURDYA, Reichb. f.
a. *appendiculata*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 123 = *S. pusillus*.
emarginata, Reichb. f. (l. c.) = *S. emarginatus*.
Zollingeri, Reichb. f. l. c. = *S. Zollingeri*.
- GRUMILEA.**
1067³. a. *vaginans*, Dalz. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 111 = *P. truncata*.
- 1068¹. a. GUAIABARA, Plum. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 402 (1760) = *Coccoloba*, Linn. (Polygon.).
- GUAIACUM.**
1068¹. 1. *dubium*, Forst. f. Prod. 32 = *Ratonia stipitata*.
- GUETTARDA.**
1070³. 1. *aromatica*, Poepp. & Endl.
putaminosa, F. Muell.
1071¹. *resinosa*, Pers. . . . 200 = *Laueria resinosa*.
a. *setosa*, Zipp. ex Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. ii. (1851) 211 = *Bobea setosa*.

PAG.

GUILANDINA.

- 1071². a. *melanosperma*, Eggers, Fl. St. Croix (1879), 46 = *C. Bonducella*?

- 1072². 1. GUNDLACHIA, A. Gray, . . . 100 = *Chrysocoma*, Linn. (Compos.) fide E. L. Greene.

GUNNERA.

- 1072³. 1. *sonchifolia*, Mirb. . . = *Francoa sonchifolia*.
a. *umbraculifera*, Linden, Cat. n. 93 (1875) 5, cum ic.—N. Granat.

GUSTAVIA.

- 1073¹. a. JAPARANDIBA, [Marcgr.] Adans. Fam. ii. 448 (1763).

GYMNADENIA.

- 1074². 1. *cucullata*, Rich. . . 57 = *Ilabenaria cucullata*.

- 1075¹. 1. GYMANTHUS, Endl. Gen. Suppl. iv. III.

GYMNEMA.

- 1075³. 1. *nitidum*, Benth. . . 456 (*Salacia* sp.).—Afr. trop.

GYMNOBALANUS.

- 1076¹. 1. *Fendleri*, Meissn.

GYMNOPOGON.

- 1077¹. 1. *digitatus*, Nees, . . . 713 = *Chloris digitatus*.

GYNANDROPSIS.

- 1078³. a. PEDICELLARIA, Schrank, in Roem. & Usteri, Mag. Bot. iii. VIII. (1790) 10.
PODOGYNE, Hoffmgg. Verz. Pfl. 101, 185 (1824).

GYNERIUM.

- 1079¹. a. *dioicum*, Dallièr, Pl. Ornament. i. (1873) t. 42 = *argenteum*.

- 107¹. insere GYNICIDIA, Neck. Elem. ii. 81 (1790) = *Mesembryanthemum*, Dill. (Ficoid.).

GYNOPACHIS.

- 1079². 1. *deflectens*, Miq. . . 222 = *Petunga rufidula*.
rufidula, Miq. l. c. = *Petunga rufidula*.

GYNOPOGON.

- 1079². 1. *Hunterii*, Roxb.

GYNOSTEMMA.

- 1079². a. *trigynum*, M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 663, lapsu = *pedatum*.

HABENARIA.

- 1082². a. DIPLORRHIZA, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147.
MESICERA, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
TRIPLORHIZA, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 149.
1. *aestivalis*, Rodrig. . . 258 = *brevidens*.
anaplectron, Reichb. f. . . 81 = *cryptophila*.
1082³. a. *Bennettiana*, Reichb. f. *Otia Bot. Hamb.* 104. —Abyss

1. *biflora*, Rodrig. . . 151 = *flexuosa*.
a. *bractescens*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 340 = *Gourlicana*.
calcarata, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 622.—Afr. trop.

- 1083¹. 1. *crucifera*, Reichb. f. & Warm. l. c. 80 = *aphylla*.

- a. *demerarensis*, Reichb. f. in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 1123 = *parviflora*.

1. *estrellensis*, Reichb. f. . . 813 = *secunda*.

- 1083². *gracilis*, S. Wats. . . 277.

- 1083³. *johannensis*, Rodrig. . . 251 = *Vaupellii*.
a. *Lindeni*, Reichb. f. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 319 = *obtusata*.

- 1084¹. 1. *macroceratitis*, Willd.

- nasuta*, Reichb. f. & Warm. . . 80 = *nuda*.

- 1084². *Pseudo-stylites*, Reichb. f. & Warm. l. c. 79 = *hamata*.

- 1084³. a. *radicans*, Griseb. ex Wright, in Sauv. Fl. Cub. 233 = *repens*.

- 1085¹. *speciosa*, Poepp. & Endl. . . 44 = *maculosa*.
subcalcarata, Rodrig. . . 159 = *Guillemini*.
trichoceras, Rodrig. . . 256 = *nuda*.
tricuspis, A. Rich. . . 249 = *repens*.

HABRANTHUS.

- 1085³. 1. *advena*, Herb. . . = *Hipp. advena*.

PAG.

HAEMADICTYON.

- 1086². 1. *parviflorum*, Benth. . . 355 = *Prestonia parviflora*.

suberectum, G. Don, . . . 83.—Ind. occ.

HAEMOSPERMUM.

- 1087². 1. *arborescens*, Reinw. . . = *G. rupestre*.

HALENIA.

- 1089². a. *reflexa*, Griseb. in DC. Prod. ix. 135, sphalm. = *deflexa*.

- 1089². insere HALEZIA, Loeffl. It. Hisp. 188 (1758) = *Trichilia*, P. Br. (Meliac.).

HALESIA.

- 1089². a. *HILLIA*, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 71 (1760).

HALOGETON.

- 1090². 1. *arachnoideus*, Moq.

HAPALOSIA.

- 1093¹. 1. *Loeflingiae*, Wall. . . = *P. Loeflingii*.

HAPLOSTYLIS.

- 1093³. a. *Wightianus*, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 101 = *R. Wightiana*.

HARRISONIA.

- 1095¹. 1. *paucijuga*, Oliver,

HAUYA.

- 1096¹. a. *arborescens*, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 137 = *Oenothera arborescens*.

- 1096³. 1. HAXTONIA, Caley, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Jul.-Sept. 1831) 273 = *Olearia*, Moench (Compos.).

HEBEPETALUM.

- 1097³. 1. *humirifolium*, Benth.
latifolium, Benth.

HEDEOMA.

- 1098². 1. *purpurea*, Kellogg, . . . = *Mentha Pulegium*.

HEDERA.

- 1098². a. *arborescens*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 182 = *H. Helix*.

- 1098³. *humirepens*, Roehl. (l. c.) = *H. Helix*.

HEDYOTIS.

- 1100². a. PANETOS, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 227; vi. (1820) 81.

- d. PELTOSPERMUM, Benth. (*nunc Oldenlandia*).

- 1101¹. 1. *caracasana*, H. B. & K. . . = *Mallostoma caracasana*.

- conferta*, Ruiz & Pav. . . = *Mallostoma confertum*.

- 1101². *filiformis*, Ruiz & Pav. . . = *Mallostoma filiforme*.

- 1101³. *hyssopifolia*, Cav. . . = *Mallostoma hyssopifolium*.

- juniperifolia*, Ruiz & Pav. . . = *Mallostoma juniperifolium*.

- laricifolia*, Cav. . . = *Mallostoma laricifolium*.

- 1103¹. *thymifolia*, Ruiz & Pav. . . = *Mallostoma thymifolium*.

- tillaeacea*, F. Muell. . . 39 = *Synaptantha tillaeacea*.

HEDYSARUM.

- 1105². a. *hamatum*, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 224 = *Glycine pendula* (in Addend.).

- 1105³. 1. *lansum*, Noronha,

- 1108¹. a. HEINCHENIA, Webb, ex Hook. f. Bot. Mag. sub t. 6733 (1884), sphalm. = seq.

HEINEKENIA.

- 1108¹. 1. *peliorhyncha*, Masf.

HEKORIMA.

- 1108². a. *atropurpurea*, Fisch. ex Regel & Tiling, Fl. Ajan. 122 = *S. roseus*.

HELIANTHEMUM.

- 1111². a. *sericeum*, Dufour, Lettr. Mont. Maudit. 301 = *marifolium*?

- 1111³. 1. *Teneriffae*, Coss. . . 56.

PAG.

HELIANTHUS.

- 1112¹. 1. *calvus*, Sch. Bip. . . , nomen = *Viguiera calva*.
decapetalus, Linn.

- 1112². *Mandonii*, Sch. Bip. . . , nomen = *Vangueria Mandonii*.

- 1112³. *microphyllus*, H. B. & K. . . 220.—Peruv.

HELICHRYSUM.

- 1113². a. STOECHAS, Gueldenst. Reisen (1787); ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 607 (1846).

- 1113³. *asperum*, DC. Prod. vi. 264, sphalm. = *ericae-folium*.

HELICOSTYLIS.

- 1117². 1. *affinis*, Steud. ex Miq. . . 118 = *Poeppigiana*.

HELIOSPERMA.

- 1119³. 1. *Veselskyi*, Janka, . . . 65 = *S. eriophylla*.

HELIOTROPION.

- 1120². 1. *Clausseni*, DC.

- 1120³. *fruticosum*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 843 = *Tournefortia fruticosa*, Ker-Gawl.

- gracile*, R. Br. in Salt, . . . = *zeylanicum*.
a. *helianthemoides*, Shuttl. ex A. DC. in DC. Prod. x. 78, 85 = *Lithospermum angustifolium*?

- 1121³. 1. *Saltianum*, Steud. . . 744 = *zeylanicum*.

- 1122¹. *tenuis*, Willd.

- a. *Volaterrae*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 499, sphalm. = seq.

- Voltaireanum* ×, Hort.—Cf. Paxt. Mag. Bot. xvi. (1849) t. 99, f. 1.

1. *zeylanicum*, Lam. . . 94.—Ind. or.; Afr. trop.

HELIPTERUM.

- 1122². 1. *Dimorpholepis*, Benth.

HELMINTHIA.

- 1123³. 1. *Balansae*, Coss. & Dur. . . 744 = *P. Balansae*.
comosa, Boiss. . . 62 = *P. comosa*.

- 1124¹. *lusitanica*, Welw. . . 515 = *P. comosa*.

- 1124¹. a. HELMINTHOTHECA, Vaill. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 173 (1760) = seq.

HELOPUS.

- 1124³. 1. *sanguinalis*, Nees, l. c. 17 = *Panicum sanguinale*.

HELOSCIADIUM.

- 1124³. a. *heterophyllum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 592, in syn., sphalm. = *leptophyllum*.

HEMEROCALLIS.

- 1125². a. CAMERARIA, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 56 (1760).

HEMIANTHUS.

- 1125³. 1. *adenander*, Wright, . . . 185 = *M. adenandrum* (in Addend.).

- erosus*, Wright, ex Griseb. l. c. 984 = *M. multiflorum* (in Addend.).

- multiflorus*, Wright, . . . 185 = *M. multiflorum* (in Addend.).

- punctatus*, Wright, . . . 184 = *M. punctatum* (in Addend.).

- trisetosus*, Wright, . . . 185 = *M. trisetosum*.

- 1126³. insere HEMILOBIUM, Welw. Synopse, 20 (1862) = *Apodytes*, E. Mey. (Olacin).

- ficifolium*, Welw. l. c. = *A. dimidiata*.

- 1128². a. HENNA, Ludw. Def. Gen. Pl. 134 (1747) = *Lawsonia*, Linn. (Lythrar.).

HEPPIELLA.

- 1129². 1. CHEIRISANTHERA, Hort. ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851) 59.

HERACLEUM.

- 1130¹. a. TORDYLOIDES, Wall. ex DC. Prod. iv. 199 (1830).

- 1130². 1. *Chorodanum*, DC.

HERITIERA.

- 1131³. a. SUTHERLANDIA, J. F. Gmel. Syst. 1027 (1791).

PAG.

HERNIARIA.

- 1134². a. *cashmeriana*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 222 = incana ?
 1134³. l. *setigera*, Gill. . . . 337 (Paronychia sp.).

HERPESTIS.

- 1134³. l. MONNIERA, B. Juss. ex P. Br.

HESPEROCHIRON.

- 1137². a. CAPNOREA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 74 (1838), nomen prius.
 l. *latifolius*, Kellogg, . . . 44 = californicus.

HETERANTHERA.

- 1038². a. *virginicus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 29, in syn. = reniformis.

- 1139³. l. HETEROMORPHA, Cass. . . . Philom.

HETEROPOGON.

- 1140¹. a. SPIROTHEROS, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 221.

HETEROTHRIX.

- 1141³. l. *Vanheurckii*, Muell. Arg. . . . 164 = Mandevilla Vanheurckii.

- 1142¹. l. **HETEROTRICHUM**,

- l. OCTONUM, Rafin. Sylva Tellur. 95 (1838).
 l. Octonum, DC.

HEWITTIA.

- 1142². a. *linifolia*, Ind. Kew. p. 600³. perperam sub C. caespitosa cit. = Ipomoea linifolia.

HIBISCUS.

- 1145¹. l. *abutiloides*, Willd. . . . 736 = tiliaceus.
affinis, H. B. & K. . . . 289 (Cienfugosiae sp.).
angustifolius, Hook. & Arn. . . . 152 = Lambertianus.

- 1145². *bicornis*, G. F. W. Mey. . . . 231 = bifurcatus.
 1146¹. *crenatus*, Splitg. . . . 336 = sororius.
cruentus, Bertol. . . . 10 = H. Sabdariffa.
decipiens, A. St. Hil. . . . 247 = bifurcatus.
digitatus, Cav. . . . 2 = H. Sabdariffa.
Diodon, DC. . . . 449 = furcellatus.

- elatus*, Sw. . . . 1218 = tiliaceus.
 1146². *fluminensis*, Vell. . . . 34 = bifurcatus.
fraternus, Linn. . . . 260 = H. Sabdariffa.
 a. *grandiflorus*, Juss. ex DC. Prod. i. 456 = Thespesia grandiflora.

- 1146³. l. Kokio, Hilleb.
 1147². *multiformis*, A. St. Hil. . . . 246 = furcellatus.
 1147³. *pernambucensis*, Bertol. . . . 229 = tiliaceus.
 1148¹. *salviaefolius*, A. St. Hil. . . . 249 = Lambertianus.

- 1148². *sulphureus*, H. B. & K. . . . 289 (Cienfugosiae sp.).
surattensis, Linn.
tampicensis, Moric. . . . 14 = Kosteletzkya sagittata.

- 1148³. *trilobatus*, Vell. . . . 29 = furcellatus.
unidens, Lindl. . . . t. 878 = radiatus.
 a. *verbasciformis*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui. 991, nomen = spathulatus.

- 1149¹. *Youngianus*, Gaudich. . . . 91 = furcellatus.

HIERACIUM.

- 1149². a. *anserinum*, *araneosum*, *bifrons*, *cirritum*, *coronariaefolium*, *dasytrichum*, *doronicoideis*, *eriphyllum*, *falcatum*, *fastidiosum*, *grandifolium*, *heterodon*, *isatifolium*, *jaceoides*, *lactucaefolium*, *lansicum*, *leucomchloma*, *lychnoides*, *melandrifolium*, *Pamphilii*, *parcepilosum*, *pulchellum*, *Ravaudii*, *Sauzei*, *spicatifolium*, *thapsifolium*, *thapsoides*, *trichocladum*, *ustulatum*, Arv. Monog. Pilos. 22-46 (Quid ?).—Gallia.
armerioides, *aurantiacoides*, *biflorum* x, *capitatum*, *chamaeaurantiacum*, *chlorae-folium*, *cirrocephalum*, *corymbuliferum*, *corymbuloides*, *fistulosum*, *florentoides* x, *Grenierianum*, *intertextum*, *lanatellum*, *multiflorum*, *nigritellum*, *palmatum*, *paniculatum*, *Pseudo-lanatum*, *squalidum*, *umbelluliferum*, *villosiforme*, *viride*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 30, 40-50 (Quid ?).—Gallia.

PAG.

HIERACIUM:—

- 1149³. a. *brunellaeforme*, *caeruleum*, *caesioides*, *calycinum*, *cephalodes*, *cichoraceum*, *Didieri*, *elegans*, *erythrospermum*, *floccosum*, *Guilsonianum*, *heterospermum*, *hypericifolium*, *intricatum*, *laureolum*, *leopogon*, *oleovirens*, *oligocephalum*, *Pseudo-juranum*, *Pseudoviride*, *rapunculoideis*, *Reboudianum*, *salicifolium*, *saxetanum*, *sonchoides*, *subalpinum*, *subrude*, *subsecundum*, *subvirens*, *taraxaciforme*, *tenuis*, *urticaceum*, *virgultatum*, *viscosum*, Arv. Monog. Pilos. Suppl. 5-32 (Quid ?).—Gallia.

- 1151¹. a. vel l. *callianthum*, *fragile*, *lividum*, *oleosum* (= *oleovirens*), *subulridum*, *succisoides*, Arv. Add. Monog. Pilos. 8-13 (Quid ?).—Gallia.

- 1152². *dichotomum*, Schrank, Baier. Reise, 13 (Quid ?).—Germania.

- 1161³. a. HILLIA, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 71 (1760) = Halesia, Linn. (Styrac.).

- 1161³. l. HILSENBERGIA, Boj. . . . (1837); in Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, xii. (1841) 44.

HIMANTOGLOSSUM.

- 1161². l. *cucullatum*, Reichb. . . . 120 = Habenaria cucullata.

HIPPEASTRUM.

- 1162². l. advena, Herb.
 a. *Hendersoni* x, Hort. ex Flor. Mag. N. S. (1874) t. 117.

- 1162³. *Tweedianum*, Herb. Amaryll. 425 (Index) = aulicum.

HIPPOCRATEA.

- 1163². a. PRIONOSTEMMA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 354.

- 1163³. *lanceifolia*, Wils. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 372, in nota.—Jamaica.

HIPPOCREPIS.

- 1164¹. a. *alpestris*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 25 (Quid ?).—Gallia.

HIRAEA.

- 1165². l. *chlorocarpa*, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1840) 259.
chrysophylla, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843).

- 1166¹. l. HIRNELLIA, Cass. . . . = Myriocephalus, Benth. (1837).

HIRTELLA.

- 1166¹. l. ZAMZELA, Rafin.

HITCHENIA.

- 1167¹. l. *glauca*, Wall. . . . 216.

HOFFMANNIA.

- 1167³. l. *lanceolata*, Griseb. . . . 504 = Lasianthus Moralesii.

HOFFMANSEGGIA.

- 1168¹. a. LARREA, Orteg. Hort. Matr. Dec. 15. t. 2 (1797).

HOLCUS.

- 1169¹. l. *ciliatus*, Roxb. . . . 318 = Arundinella holcoides.
nervosus, Roxb. . . . 318 = Arundinella brasiliensis.

- 1169². d. *saccharatus*, Griseb.

HOLIGARNA.

- 1169². a. KATOUTSJEROE, Adans. Fam. ii. 84, 534 (1763).

HOLOSTEMMA.

- 1170². l. *tuberculatum*, Blume, . . . (= Cynoctonum

HOMOEATHERUM.

- 1172¹. l. *chinense*, Nees, l. c. = A. fastigiatus.

- 1173¹. l. HOOREBEKIA, Corneliss. . . . 12;
chiloensis, Corneliss. l. c. 13, cum ic. =

HOPEA, Linn.

- 1173¹. a. *lucida*, Thunb. Ic. Jap. t. 14 = S. japonica ?

PAG.

HOPEA.

- 1173¹. a. *conduplicata*, Buch.-Ham. in Mem. Wern. Soc. vi. (1832) 299 = Dipterocarpus alatus.
laevis, Buch.-Ham. (l. c.) = Dipterocarpus tubinatus.
 d. *lucida*, Thunb.
 a. *scabra*, Buch.-Ham. (l. c.) 300 = Dipterocarpus scaber.
trinervis, Buch.-Ham. (l. c.) = Dipterocarpus turbinatus.

HORDEUM.

- 1173³. l. *Aegiceras*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 418. t. 97. f. 2 =
himalayense, Schult. . . . 481 = vulgare.
 a. *hymalayense*, Hort. Monsp. ex Irmisch, in Linnaea, xiii. (1839) 125 = praec.
 l. *ithaburensis*, Boiss. . . . 70 = spontaneum.
 1174². *marinum*, Huds. . . . 57.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
maritimum, With. . . . ed. III. 172 = marinum.
spontaneum, C. Koch, . . . 430.—As. Min.; Oriens.
villosum, 'Bertol.' ex Steud.

HORSFIELDIA.

- 1175¹. a. *aculeata*, Benn. Pl. Jav. Rar. 123. t. 26 =
peltata.
peltata, Benth. & Hook. f. Gen. i. 937.—Java.

HOULLETIA.

- 1176¹. l. Landsbergii, Linden & Reichb. f. . . . 2.—Costa Rica.

HOUMIRI.

- 1176². l. *gabonensis*, Baill. . . . 52 = Aubrya gabonensis.

HOVEA.

- 1176³. a. PHUSICARPOS, Poir. Encyc. Suppl. iv. 399 (1816).

HOWARDIA, Wedd.

- 1177². l. *febrifuga*, Wedd. l. c. 67 = P. febrifugus.

HOYA.

- 1177³. l. *cochinchinensis*, Schult. . . . 52 (Ceropegia sp. ?).

HUERNIA.

- 1178³. l. *ocellata*, Schult.

HUGONIA.

- 1179¹. l. *angolensis*, Welw. . . . 271 = macrocarpa.
macrocarpa, Welw. . . . 21 = Afzelii.

HUTCHINSIA.

- 1180². l. *tibetica*, Thoms. . . . 900 = Capsella Thomsoni.

HYALIS.

- 1181². a. *spartioides*, Benth. & Hook. f. ex Hieron. Pl. Diaph. 164.—Bolivia.

HYDRILLA.

- 1183¹. a. IXIA, Muhl. ex Spreng. Syst. i. 171 (1825).
subulata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 376 =
verticillata ?
 l. *verticillata*, Royle, (l. c.) 376; Presl,

HYDROLEA.

- 1185¹. l. *auriculata*, Moç. & Sesse, ex Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1833) 239 =
decurrens, Moç. & Sesse, ex Choisy, (l. c.) 243 =
 1185². *ovata*, Nutt. ex Choisy, (l. c.) 239 =
radians, Moç. & Sesse, ex Choisy, (l. c.) 242 =
rupicola, Moç. & Sesse, ex Choisy, (l. c.) 242 =
scorpioides, Moç. & Sesse, ex Choisy (l. c.) 249 =
tenella, Moç. & Sesse, ex Choisy, (l. c.) 244 =
violacea, Moç. & Sesse, ex Choisy, (l. c.) 245 =

- 1185³. a. HYDROPHILA, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789) = Tillaea, Mich. (Crassul.).

HYDROPHYLLUM.

- 1185³. l. *hispidum*, Riddell, . . . 84 = macrophyllum.

HYMENANTHERA.

- 1187². l. *oblongifolia*, A. Cunn. . . . 124.—Ins. Norfolk.

HYMENOCALLIS

- 1187³. a. TROXISTEMON, Rafin. l. c. (1836).

- PAG. **HYMENODICTYON.**
 1188³. l. KURRIA, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 28; xxv.
 1188³. a. HYMENOGONIUM, Rich. ex Lebel, in Mém. Soc. Sc. Cherb. xiv. (1868) 30 = *Spergularia*, J. & C. Presl (Caryophyll.).
- HYOSCYAMUS.**
 1189³. l. *Datura*, Forsk. . . = muticus.
 1190¹. *physaloides*, Linn. . . 180 = *Scopolia physaloides*.
- HYPERICUM.**
 1195². l. *Thymopsis*, Boiss.
- HYPHAENE.**
 1195³. a. *coriacea*, Welw. Apont. 584 = *benguellensis*. l. Schatan, *Boj.* . . 308.—Madag.
- HYPOBATHRUM.**
 1195³. a. *ERIOSTOMA*, Boiss. ex Baill. *Adansonia*, xii. (1878) 208.
- HYPOCYRTA.**
 1197¹. l. *gracilis*, Mart. . . 219 =
- HYPOESTES.**
 1197². a. *purpurascens*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 298, sphalm. = *purpurea*.
- HYPOLEPIS.** Pers.
 1198¹. l. *sanguinea*, Pers. l. c. = *C. dioicus*.
- HYPOXIS.**
 1199¹. a. *barbacenioides*, Harv. ex Baker, l. c. xiii. (1875) 234 = *Vellozia elegans*.
 1199³. *vellosioides*, Harv. ex Baker, (l. c.) xiii. (1875) 233 (= *Xerophyta clavata*).—Afr. austr.
- HYPSELA.**
 1199³. l. *reniformis*, Presl, . . . 45 = *Lysipomia reniformis*.
- HYPTIS.**
 1201¹. l. *menthodora*, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 56 = *nepalensis*, Lehm. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 141 =
- HYSSOPUS.**
 1202¹. a. *anethiodorus*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 41 = *Lophanthus anisatus*.
 1204¹. a. *ICHTHYOMETHIA*, P. Br. Hist. Jamaica. 296 (1756) = *Piscidia*, Linn.
- IGUANURA.**
 1205¹. l. *SLACKIA*, Griff. . . (1854).
- ILEX.**
 1205³. a. *Congonhas*, Liai, Brésil, 563 = *paraguayensis*.
 1207¹. l. *rotunda*, Buch.-Ham. ex Wall. a. *serrata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 167, nomen (Quid?).—Reg. Himal.
- ILLAIREA.**
 1207². l. *canarinoides*, Lenné & C. Koch, l. c. = *L. canarinoides*.
- IMPATIENS.**
 1209³. a. *Inglisii*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 150, nomen (Quid?).—Reg. Himal.
 1210². *pumila*, Royle, (l. c.) 151, nomen (Quid?).—Reg. Himal.
speciosa, Royle, (l. c.) nomen (Quid?).—Reg. Himal.
- INCARVILLEA.**
 1211². l. *Koophmanni*, Lauché, in Deutsch. Gart. 1880 (1881), 39, cum ic. =
- INDIGOFERA.**
 1211². a. *ANIL*, March. ex Ludw. Def. Pl. 117 (1737).
 1211³. *Arghawan*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 193 = *Sophora mollis*.
 1212¹. l. *bracteolata*, DC.
 1212³. *disperma*, Linn. . . 232 = *tinctoria*.

- PAG. **INDIGOFERA.**—
 1214². *pinifolia*, Baker, (ante *platyphyllum* ponenda). *platyphylla*, Miq. . . 292 = *Tephrosia senoides*.
 a. *plicaeifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 710, in syn. = *Psoralea obtusifolia*.
- INGA.**
 1215². a. *FEVILLAEA*, Linn. Syst. ed. I (1735).
 1215³. l. *Bourgoni*, DC.
 1216¹. *Diadema*, Mart.
- 1218³. l. *INGENHOUIZIA*, Bert. ex DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 333 = *Rhetinodendron*, Meissn. (Compos.).
- INOCARPUS.**
 1218³. a. *RENIA*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
- INULA.**
 1219¹. l. *ENULA*, Caesalp. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 184 (1760); Neck.
 a. *MYRIADENUS*, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 138.
ORSINA, Bertol. in Ann. Stor. Nat. Bologn. I. ii. (1829) 362.
 1219³. l. *intermixta*, Kern.
 a. *lanigera*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 27 (Quid?).—Afr. austr.
- IONIDIUM.**
 1221². l. *concolor*, Steud. Nom. ed. II. ii. 770, in syn.; Benth. & Hook. f.
- 1222¹. l. *IONOPSIDIUM*, forsan retinendum, cum spp. 2, scilicet l. *acaule*, *albiflorum*.
- IPOMOEA.**
 1223². l. *arachnosperma*, Welw. Apont. 588 = *pilosa*.
 a. *aurea*, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. iii. (1885) 143.—Calif.
 1224¹. l. *Clappertoni*, R. Br. . . . 240 = *aquatica*.
 1224². *decora*, Vathe & Hildeb. . . (1869).
 1224³. *flavescens*, Steud. . . 816 = *Lepistemon flavescens*.
 a. *Forsteri*, A. Gray, ex H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1866) 195.—Ins. Sandvic.
 1225². l. *humilis*, G. Don, . . . 267 = *carnosa*.
incurva, G. Don, . . . = *carnosa*.
 1225³. *lanceolata*, G. Don, . . . = *martinicensis*.
lilacina, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 389 (an praec.?).—Mexic.
 1226¹. *Mendesii*, Welw. Apont. 584 = *tuberculata*.
multisecta, Welw. Apont. 589 = *coptica*.
 1226². *oblonga*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 391.—Mexic.
 a. *obscura*, Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 244 = *Forsteri*.
 1227¹. l. *radiatifolia*, Kellogg, . . . 163 = *leptotoma*.
 1227². *Schiedeana*, Ham.
 a. *sepiaria*, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 258 = *Forsteri*.
 1227³. *splendens*, G. Don, in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 343, nomen = *digitata*.
 1228¹. l. *teretistigma*, Choisy, l. c. 376 = *Hewittia bicolor*.
 a. *tragulifera*, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864) 160.—N. Granat.
 1228². l. *umbellifera*, Choisy, . . . 389 = *umbellata*? Linn.
- IRINA.**
 1229². l. *alnifolia*, Blume, . . . 117 = *P. eximia*.
tomentosa, Blume, l. c. = *P. eximia*.
- IRIS.**
 1229³. l. *Aitchisoni*, Boiss. Fl. Orient. v. 123.—Afghan.
 1230³. *Helena*, Boiss. (l. c.) 132, in syn. =
 1232². *tuberosa*, Linn. . . 40 = *Hermodactylus tuberosus*.
- IRLBACHIA.**
 1232³. l. *recurva*, Prog. . . 229 = *Pagaea recurva*.
subcordata, Prog. l. c. = *Pagaea recurva*.

- PAG. **ISACHNE.**
 1233¹. a. *multiflora*, Trimen, Cat. Pl. Ceyl. 104.—Zeylan.
 l. *tricarinata*, Roth, . . . 57 = *Panicum ovalifolium*.
- ISATIS.**
 1233². l. *Djurdjurae*, Coss. & Dur.
- ISCHAEMUM.**
 1234¹. a. *dactyloideum*, Montand. Guide Bot. 353 = *Andropogon Ischaemum*.
 1234². l. *pilosum*, Wight, in Madr. Journ. Sc. Ser. I. ii. (1835) 139; Trimen,
- ISOLEPIS.**
 1237³. l. *podocarpa*, Boeck. . . 179 = *Hemichlaena angustifolia*.
- ISOPOGON.**
 1239³. a. *anemifolius*, Steud. Nom. ed. II. ii. 401, in syn., sphalm. = seq.
- ISOPYRUM.**
 1240¹. l. *Clarkii*, Kellogg, . . . 131 = *stipitatum*.
- ITEA.**
 1240³. a. *REINIA*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 314 (1876).
 1243². l. *IXINA*, Rafin. . . = *IXINE*, Loeffl.
 1243². insere *IXINE*, Loeffl. St. Hisp. 195 (1758) = *Krameria*, Linn. (Polygal.).
- IXORA.**
 1244³. a. *Pilgrimi* ×, Hort.—Cf. Flor. Mag. N. S. (1880) t. 428.
 1245¹. *Williamsii* ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1872) 642. f. 162.
- JACOBINIA.**
 1246³. a. *ramosissima*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1119, in obs.—Bras.
- JACQUEMONTIA.**
 1246³. a. *PENTANTHUS*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70.
 1249¹. insere *JAPARANDIBA*, [Marcgr.] Adans. Fam. ii. 448 (1763) = *Gustavia*, Linn. (1785) (Myrtac.).
- JASIONE.**
 1249². l. *humilis*, Loisel.
- JASMINUM.**
 1250². d. *humile*, Heyne, etc.
- JASONIA.**
 1251¹. d. *MYRIADENUS*, Cass., et *ORSINA*, Bertol. (nunc *Inula*).
- 1252³. l. *JEFFERSONIA*, Bart. . . (1793) 342.
binata, Bart. . . (1793) 342.
- JUGLANS.**
 1254³. l. *baccata*, Linn. . . 1272 = *Picrodendron arboreum*.
 1255¹. a. *dissecta*, Hort. Taur. 910; ex C. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 136 = *regia*.
 1255³. l. *JUNCAGO*, Tourn.
- JUNCUS.**
 1255³. a. *STYGIARIA*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146.
 1260¹. a. *JUNGIA*, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 92 (1760) = *Dianthera*, Gronov. (Acanth.).
- JUNIPERUS.**
 1260³. l. *gracilis*, Hort. . . = *Cupressus torulosa*.
 1261¹. a. *nana*, Willd. Sp. Pl. iv. 854 = *communis*.
plochyderma, Sargens, in Rep. Tor. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) (1864) 181, sphalm. = *pachyphlaea*.
- JURINEA.**
 1262¹. l. *heterophylla*, Boiss. Fl. Orient. iii. 571.
- JUSTICIA.**
 1265¹. l. *elegans*, Pohl, . . . 382.—Bras.
 1265². *flexibilis*, Boj. . . = *Hypoestes flexibilis*.
 1267¹. a. *obscura*, Vahl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 323, sphalm. = *diffusa*?
 1267². l. *procumbens*, Blume, . . . = *Blumeana*.
 1267³. *salicifolia*, Blume, Bijdr. 787 = *Peristrophe salicifolia*.

TOMUS II.

PAG.

KADSURA.

- 1¹. a. *PULCHERIA*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) Art. IV. 3.

KAKOSMANTHUS.

- 2¹. l. *macrophyllus*, Hassk. . . 578 = *P. macrophylla*.

- 2¹. l. *KALABOTIS*, Rafin.

- 2³. l. *KALI*, Tourn. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 231 (1747) =

- 3³. insere *KATAKIDOZAMIA*, Haage & Schmidt, ex Regel, Gartenfl. (1876) 5 = *CATAKIDOZAMIA*, T. Hill = *Macrozamia*, Miq. (Cycad.).

- 3³. insere *KATOUTSJEROE*, Adans. Fam. ii. 84, 534 (1763) = *Holigarna*, Buch.-Ham. (Anacard.).

KAYEA.

- 4¹. a. *PLINIA*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 423 (1837).
VIDALIA, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 17 (1880).
 l. *lepidota*, *Pierre*, l. c. — Cochinch. ; Ins. Philipp.

KENTIA.

- 5¹. l. *Joannis*, F. Muell. Fragm. vii. 101 = *Storckii*, F. Muell. (l. c.) = *subglobosa*, F. Muell. l. c. =

- 5². l. *KENTROPHYLLUM* . . . = *Carthamus*, Linn.

KERATEPHORUS.

- 5³. l. *Leerii*, Hassk. . . 579 = *P. Leerii*.

KHAYA.

- 6². a. *GARRETIA*, Welw. Apont. 587 [1859].

KIESERA.

- 6³. l. *gracilis*, Miq. . . 291 = *T. sennoides*.

KIGELIA.

- 6³. l. *SOTOR*, Fenzl, . . . Versamml.

KIPPISTIA.

- 7¹. l. *suadifolia*, F. Muell. = *M. Kippistiana*.

KLEINIA.

- 8¹. a. *Mandraliscae*, Tineo, in Ann. Agr. Sicil. ; ex Lojac. Isole Eolie, 111. — Hab. ?

KNAUTIA.

- 8². a. *alpina*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 35 (Quid ?). — Gallia.

- 8³. *glandulosa*, Arv. (l. c.) (Quid ?). — Gallia.
latifolia, Arv. (l. c.) (Quid ?). — Gallia.

- l. *lyrophylla*, Panč. . . 128 = *S. macedonica* ?
macedonica, Griseb. . . 178 = *S. macedonica*.

KOBRESIA.

- 9³. l. *laxa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 411 ; Boeck.

- 10². l. *KODDA-PAIL*, Adans. Fam. ii. 75 (non 25)

KOELERIA.

- 11¹. a. *Philippiana*, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 353, in nota. — Chili.

- 11³. l. *KOELREUTERIA* . . . = *Marsdensia*, R. Br. (Asclep.).

KOPSIA.

- Dum.
 12³. l. *aegyptiaca*, Caruel, . . . = *O. aegyptiaca*.
arenaria, Dum. . . = *O. arenaria*.
Borkhauseni, Caruel, . . . = *O. arenaria*.
lavandulacea, Caruel, . . . = *O. lavandulacea*.
longiflora, Dum. . . = *O. aegyptiaca*.
ramosa, Dum. . . = *O. ramosa*.
 a. *stricta*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 356 = *O. Schulzii*.

KRAMERIA.

- 13². a. *IXINE*, Loefl. It. Hisp. 195 (1758).

VOL. II.

PAG.

KREMERIA.

- 14¹. l. *Cordylocarpus*, Coss. & Dur. l. c. 672 = *M. Cordylocarpus*.

- 14². l. *KROMBHOLZIA*, Rupr. . . (1842).

- 14³. l. *KTENOSACHNE*, Steud. . . = *Prionanthium*, Desv. (Gramin.).

KYLLINGA.

- 16¹. l. *aphylla*, Kunth, . . . 127 = *peruviana*.

LABOURDONNAISIA.

- 17². a. *EICHLERIA*, Hartog, in Journ. Bot. xvi. (1873) 72.
MURIEA, Hartog, l. c. 145 (1873).

LACHENALIA.

- 18². l. *pallida*, Soland.

LACHNOPETALUM.

- 19¹. l. *glabrum*, Turcz. l. c. = *R. lachnometala*.

LACHNOSTOMA.

- 19². a. *cynanchoides*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 766. — Am. bor. occ.
 l. *maritimum*, Benth. & Hook. f. (l. c.) ; Nichols.

- 19². l. *LACINARIA*, Hill,

- a. *LACINIARIA*, Hill, Hort. Kew. 70 (1768) = *praec.*

LACMELLIA.

- 19³. l. *floribunda*, Benth. & Hook. f. . . 694.

LACTUCA.

- 20³. l. *muralis*, Fresen. . . ; G. F. W. Mey.

- 21¹. *Schimperi*, Jaub. & Spach,

LAETIA.

- 22². a. *THAMNIA*, P. Br. Hist. Jamaic. 245 (1756).

LAGENOPHORA.

- 23³. l. *Emphysopus*, Hook. f.

LAGERSTROEMIA.

- 23². a. *anisontera*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. iv. (1883) 407. — Cochinch.

LAGGERA.

- 24¹. l. *pterodonta*, Sch. Bip. . . = *purpurascens*.

LAGUNCULARIA.

- 25¹. a. *RHIZAERIS*, Rafin. Sylva Tellur. 90 (1838).

LAMARCKIA.

- 25². a. *coccinea*, Vahl, l. c. = *M. coccinea*.

LANNEOMA.

- 28² a. *triphylla*, March. Rev. Anacard. 157, sphalm. = seq.

- 28². l. *LANSBERGIA* . . . = *Trimeza*, Salisb.

LANSIUM.

- 28³. a. *PLUTEA*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 3.

- 28³. l. *montanum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 140 ; Steud.

LANTANA.

- 28³. l. *dubia*, Wall. Cat. n. 1823 =

- 29¹. a. *Gochana*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 87. n. 1821 = *alba*.

LAPATHUM.

- 29³. a. *bononiense*, Montand. Guide Bot. 265 = *R. pulcher*.

- obtusatum*, Montand. (l. c.) = *R. obtusifolius*.
rotundifolium, Montand. (l. c.) 267 = *R. alpinus*.

LARIX.

- 31³. l. *Deodara*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 457 (Index) ; C. Koch,

PAG.

LASERPITIUM.

- 32². a. *alpestre*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 31 (Quid ?). — Gallia.

LASIAGROSTIS.

- 33². l. *tremula*, Rupr. . . 35. — Kashgar.

LASIANTHERA.

- 34¹. a. *malaccensis*, Mast. l. c. 584. — Malacca.

LASIOLYTRUM.

- 35². l. *pilosum*, Steud. ex Jardin, . . . 299 = *Panicum sanguinale*.

- 36³. insere *LASSONIA*, Buc'hoz, Pl. Nouv. Découv. t. 19 (1779). Genus spurium *MAGNOLIA-CEARUM*.

heptapeta, Buc'hoz, l. c. — China.

quinquepeta, Buc'hoz, l. c. — China.

LATHYRUS.

- 37³. l. *ensifolius*, Badaro,

- 38¹. *macrorrhizus*, Wimm. . . = *montanus*.

- 39¹. a. *Tommasinii*, Sprun. ex Marches. in Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat. Trieste, v. (1880) p. xxviii, nomen. — Europ.

LAUNAEA.

- 39². l. *ZOLLIKOFERIA*, DC. . . (1838).

LAURIDIA.

- 40¹. l. *rupicola*, Eckl. & Zeyh. . . (= *Mystroxydon reticulatum*). — Afr. austr.

LAURUS.

- 41³. l. *lucida*, Thunb. Fl. Jap. 174 = *Symplocos japonica* ?

- 42³. *semecarpifolia*, Wall. . . = *Alseodaphne semecarpifolia*.

- 43¹. l. *LAVALLEA*, Baill. . . (1862) 361 =

LAVANDULA.

- 43². l. *rotundifolia*, Benth.

LAVATERA.

- 43³. d. *hispida*, Sims, etc.

- 44¹. l. *rotundata*, Láz. . . (1881),

LAWSONIA.

- 44³. a. *HENNA*, Ludw. Def. Gen. Pl. 134 (1747).

LAVIA.

- 45¹. l. *galardioides*, Hook. & Arn.

- 46¹. l. *LEBRETONIA*, Schrank,
 a. *candida*, Hort. ex Lem. Jard. Fleur. iii. (1852)
 sub t. 281 = *Urena stellipila*.

LECHEA.

- 46². a. *maritima*, Leggett, ex Britton, Prel. Cat. N. Jersey (1881), 13. — Am. bor.

- l. *Novae-Cesareae*, C. F. Austin, . . . 81 = *minor*.

- thesioides*, Spach, . . . 285 = *tenuifolia*.

- thymifolia*, Michx. . . 77 = *minor*.

- a. *thymifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. 91 = *maritima*.

LECONTEA.

- 46³. a. *SIPHOMERIS*, Boj. Hort. Maurit. 170 (1837).

LEDUM.

- 47³. l. *californicum*, Kellogg, . . . 14 = *glandulosnm*.

LEIANTHUS.

- 49¹. l. *OMPHALOSTIGMA*, Reichb. Nom. 132 (1841).

LEIDESIA.

- 49². a. *Sonderiana*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 699 = *capensis*.

LEMNA.

- 50². a. *LENTICULARIA*, Mich. ex Montand. Guide Bot. 308 (1868).

- PAG.
51¹. insere **LENTICULARIA**, Mich. ex Montand.
Guide Bot. 308 (1868) = *Lemna*, Linn.
monorhiza, Montand. l. c. = *Lemna minor*.
- LEOCHILUS**.
51². a. *pygmaeus*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 565.—
Guatemala.
- LEONTICE**.
51³. l. **LEONTOPETALON**, Tourn. ex Ludw. Def. Gen.
Pl. 192 (1747).
- LEONTODON**.
52¹. l. *bessarabicus*, Fisch. ex Link, Enum. Hort.
Berol. ii. 283 =
52². *nudicaulis*, Banks, . . . 535 = *saxatilis*.
53¹. *taraxacoides*, Hoppe & Hornsch. Tageb. 174;
et ex
tenuifolius, Hoppe & Hornsch. (l. c.) 173;
et ex
- 53². l. **LEONTOPETALON**, Tourn. ex Ludw. Def.
Gen. Pl. 192 (1747).
- LEPERIZA**.
55¹. l. *eucrosioides*, Baker, . . . 170 = *Phaedranassa*
eucrosioides.
- LEPIDADENIA**.
55². l. *Seloang*, Miq.
- LEPIDAGATHIS**.
55³. l. *alopecurioides*, R. Br.
ceylanica, Nees,
55³. *nervosa*, Wight,
56¹. *subuninervia*, C. B. Clarke,
- LEPIDIDIUM**.
56². a. *bipinnatum*, Gibert, Enum. Pl. Montev. 66 =
prae.
l. *brevicaule*, Hoppe & Hornsch. Tageb. 278,
nomen; et ex
- LEPIDOTHECA**.
59¹. a. *Santolina*, Walp. Rep. ii. 639, sphalm. = seq.
l. *suaveolens*, Nutt. in Am. Phil. Trans. vii. (1841)
[455] 397 =
- LEPIGNUM**.
59³. a. *roseum*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 81 = *Arenaria*
geniculata?
- LEPTADENIA**.
60³. l. = *L. Spartium* (pluries in synon.).
- LEPTOCHLOA**.
62¹. l. *coerulescens*, Steud. . . 209.—Afr. trop.
62². *gracilis*, Nees, . . . 4.—Am. austr.
mutica, Steud. . . = *virgata*, Beauv.
obtusiflora, Hochst.
- 62³. l. **LEPTOCODON**, Sond. in Harv. & Sond.
- 63². l. **LEPTOPAETIA**, Harv. Gen. S. Afr. Pl.
- LEPTOTHERIUM**.
65³. a. *Royleanum*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal.
417, nomen (Quid?).—Reg. Himal.
- LERCHEA**.
66². l. *calycina*, A. Gray, . . . 311 = *Xanthophytum*
calycinum.
- 66³. a. **LERISCA**, Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845)
476 = *Cryptangium*, Schrad. (Cyperac.).
- LESSERTIA**.
67². l. *astragalina*, Pappe,
67³. *pauciflora*, Harv. l. c. 222.
polystachya, Harv. . . 216.
- LETTESOMIA**.
68². l. *sumatrana*, . . . = *Ipomoea staphylina*.
- LEUCADENDRON**.
68². a. *conocarpum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 399, in
syn. = *Leucospermum conocarpum*.
68³. *ellipticum*, Steud. (l. c.) = *Leucospermum*
ellipticum.
- LEUCANTHEMUM**.
69³. a. *laciniosum*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 36 (Quid?).
—Gallia.

- PAG.
LEUCAS.
70¹. l. *affinis*, R. Br. . . nomen = *urticifolia*.
dimidiata, Benth. in Wall. Cat. n. 2521; et in
DC.
70². a. *pallida*, Steud. Nom. ed. II. ii. in syn. = *Leonotis*
pallida.
- LEUCERIA**.
70³. l. *eriochlaena*, Remy,
- 71². l. **LEUCOGLACHIN**, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146;
Heuff.
- LEUCOJUM**.
71³. a. *aestivale*, Steud. Nom. ed. II. ii. 196, in syn.
= seq.
- LEUCOMERIS**.
71³. a. *scandens*, Sch. Bip. in Flora, xxxvi. (1854) 275
= *Erigeron scandens*.
- 72¹. a. **LEUCONOCARPUS**, Spruce, ex Planch. &
Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860)
295 = *Moronobea*, Aubl. (Guttif.).
riparius, Spruce, l. c. = *M. riparia*.
- 72¹. l. **LEUCOPHAE**, Webb & Berth.
- LEUCOPOGON**.
72³. l. *exolasius*, F. Muell.
fimbriatus, Stschégel.
- LEUCOSPERMUM**.
74¹. l. *involutum*, Roem. & Schult.
a. *tortum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 401, in syn.,
sphalm. = *Leucadendron tortum*.
- 74². linea prima l. **LEUCOSYKE**.
- LIATRIS**.
76¹. l. *cordata*, D. Don, ex Royle, Illustr. Bot. Himal.
247; et ex
- LIBANOTIS**.
76². a. *athamantina*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii.
215 = *S. Libanotis*.
l. *condensata*, Fisch. . . 724 = *S. condensatum*.
filifolia, Roehl. (l. c.) =
- LIBIDIBIA**.
76³. l. *coriaria*, Schlecht. . . = *C. coriaria*.
- LIBONIA**.
77¹. l. *floribunda*, C. Koch,
a. *penrhosiensis* ×, Hort. ex Carr. in Rev. Hortic.
(1876) 50, cum ic.
- LICANIA**.
77¹. a. *floribunda*, Benth. ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras.
xiv. II. 24 = *Moquilea utilis*.
- 78¹. a. **LIEUTAUTIA**, Buc'hoz, Pl. Nouv. Découv.
t. 7. (1779) = *Miconia*, Ruiz & Pav. (1794)
(Melastom.).
- LIGHTFOOTIA**.
78². l. *capillaris*, Buek,
- 79¹. l. **LIGIA**, Fasano, in Att. Acc. Nap. 1787 (1788),
245 [t. 18. f. 2].
- LIGUSTICUM**.
79². l. *Ajowain*, Roxb. . . 170 =
a. *Ajowan*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 230 =
prae.
l. *angustilobum*, Phil. . . 95 = *Pimpinella angustilo-*
loba.
- LILIORHIZA**.
81². a. *Piattiana*, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif.
Acad. i. IV. (1885) 150 = *F. pluriflora*?
viridis, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863)
48 = *F. lanceolata*.
- LILIUM**.
81². l. *andinum*, [Nutt. in] Fras.
82¹. *giganteum*, Wall. . . t. 12.—Reg. Himal.
83¹. a. *umpquense*, A. Murr. Oreg. Circ. 1 (Quid?).—
Am. bor.
- 83². l. **LIMNANTHEMUM**, S. T. Gmel.
83³. *Nymphoides*, Hoffm. & Link,
a. *sarmentosum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 769, in
syn., sphalm. = *geminatum*.

- PAG.
84². l. **LIMNOGENNETON**, Sch. Bip. . . = *Sieges-*
beckia, Linn.
- LIMNOSIPANEA**.
84³. a. **SIPANIA**, Seem. in Bot. Voy. Herald, 136 (1853).
- LIMODORUM**.
85². a. *mauritanicum*, Sw. Adnot. Bot. 59 = *Angraecum*
gladiifolium?
- LIMONIA**.
85³. l. *pusilla*, Gaertn. l. c. 279 = *S. Schreberi*.
- 86¹. insere **LIMONIAS**, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147 =
Epipactis, Adans. (Orchid.).
- LIMOSELLA**.
86². a. *lacustris*, Steud. Nom. ed. II. ii. 350, in syn.,
sphalm. = *Littorella juncea*.
- LINARIA**.
86¹. a. *affinis*, Arv. Hist. Pl. Dauph. 56 (Quid?).—
Gallia.
86³. *Aristides*, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.
(1885) 337.—Alger.
- 87². l. *italica*, Trevir. Ind. Sem. Hort. Vratisl. App.
ii. (1820) 2; et in
- LINDERNIA**.
89³. a. *inaperta*, Thore, ex Maxim. in Bull. Acad.
Petersb. xx. (1875) 449 = *V. erecta*.
- LINOCIERA**.
90¹. l. *cotinifolia*, Vahl, . . . 46 = *Chionanthus virginica*.
- LIPARIS**.
93³. a. *diphyllus*, Nimmo, in J. Grah. Cat. Bomb. Pl.
252 = *Habenaria diphylla*.
l. *Galeottiana*, Hemsl. . . 559.—Mexic.
- LIPOCARPHA**.
94². l. *sphacelata*, Kunth, l. c. = *triceps*.
triceps, Nees, . . . 93.—Amphig. trop.
- LIPOCHAETA**.
94³. l. *hastata*, Kellogg, . . . = *Verbesina remota*.
- LIQUIDAMBAR**.
96². l. *peregrina*, . . . = *Myrica asplenifolia*.
- QUIRITA**.
96². l. *lepidota*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 45; DC.
- LISTERA**.
98¹. a. *multinervia*, Peterm. in Flora, xxvii. (1844)
369 = *ovata*.
- 98². insere **LITHOCARDIUM**, Linn. Syst. ed. I (1735)
= *Cordia*, Linn. (Borag.).
- LITHOCARPUS**.
98². a. *Benzoin*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 457 = *Styrax*
Benzoin.
- LITSEA**.
100². a. **QUINQUEDULA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen.
v. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
- 101³. lin. prima, l. **LIVISTONA**,
- LOASA**.
102¹. l. *aurantiaca*, Hort. ex Lilja, in Linnaea, xv.
(1841) 263, etc.
contorta, Lam. . . 579 = *Blumenbachia contorta*
(in Addend.).
lateritia, Gill. . . 275 = *Blumenbachia lateritia*.
punicea, Phil. . . (1884)
- LOBELIA**.
102³. l. *adenophora*, Roem. & Schult. . . = *Lysipomia*
aretioides.
103². *cinerea*, Thunb. . . = *Lightfootia albicaulis*.
104¹. *elliptica*, Willd. . . 57 = *Siphocampylus ellip-*
ticus.
104². *glandulosa*, Willd. . . = *Lysipomia aretioides*.
104³. *limoselloides*, Willd. . . = *Lysipomia aretioides*.
littoralis, R. Cunn. . . 50 = *Pratia angulata*.
105¹. *nivea*, Willd. . . 58 = *Siphocampylus niveus*.
105³. *reticulata*, Willd. . . 58 = *Siphocampylus*
reticulatus.
retrorsa, Willd. . . 57 = *Siphocampylus re-*
trorsus.
Rhynchopetalum, Hemsl.
106². *subulata*, Benth. . . 137 = *Rhizocephalum*
subulatum.
syphilitica, Linn. . . —Am. bor.

- PAG. **LOLIUM.**
108³. 1. *zechicum*, Opiz, Oekon. *Coelorachis*, Forst. ex Kunth, Enum. Pl. i. Suppl. i. 375 =
- LOMATIA.**
109². 1. *chilensis*, C. Gay, ... 310 = *Orites myrtoidea*.
- LONCHOCARPUS.**
110¹. 1. *Neuroscapha*, Benth.
110². 1. *Pterocarpus*, DC. ... 260 = *Phyllocarpus Pterocarpus*.
a. *scandens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 461, in syn., sphalm. = *L. Nicou*.
110². insere **LONCHOPHYLLUM**, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148 = *Cephalanthera*, Rich. (Orchid.).
- LONICERA.**
111³. 1. *obovata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 236.—
112¹. *Symphoricarpos*, Linn. ... = *Symphoricarpos orbiculatus*.
- LOPHIOCARPUS.**
113¹. 1. *guyanensis*, Micheli ... = *S. guayanensis*.
- LOPHOPHYLLUM.**
113². a. *PERAPHORA*, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xviii. (1866) 20.
1. *bicristatum*, Griff.
- LORANTHUS.**
116². 1. *montanus*, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 198; et ex
- LOROGLOSSUM.**
118¹. a. *longibracteatum*, Moris, ex Ardoino, Fl. Alpes-Marit. 351 = *O. longibracteata*.
- LOTUS.**
119¹. d. *ORTHOLOTUS*, Tourn. (*nunc Doryenium*).
120¹. a. *peliorhynchus*, Hook. f. Bot. Mag. t. 6733 = *Bertholetii*.
- LUDOLFIA.**
122³. 1. *falcata*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417, nomen; et ex
- LUDWIGIA.**
123¹. 1. *polycarpa*, Short & Peter, in Transylv. Journ. Med. n. xxxii. (1836) 577; et ex
- LUFFA.**
123³. a. *tenera*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 219 = *acutangula*?
- LUISIA.**
123³. a. *TRICHOHIZA*, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 702 (1841).
- LUMNITZERA.**
124². 1. *PETALOMA*, Roxb. Hort. Beng. [90] (1814); Fl. Ind.
coccinea, Wight & Arn. Prod. 316, etc.
- LUNDIA.**
124³. 1. *monachantha*, Schum. & Thonn. ... = *O. spinosa*.
- LUPINUS.**
125¹. a. *affinis*, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 135 = *microcarpus*.
126². 1. *rupestris*, H. B. & K. ... 474.
- LYCHNIS.**
129¹. 1. *chalconica*, Linn. ... 436.—Rossia; Sibir.
129². a. *Fortunei*, Hort. ex Vis. in Linnaea, xxiv. (1851) 181 = *Silene Fortunei*.
Lagrangei, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 243.—Maroc.
1. *magellanica*, Desr.
- LYCOPUS.**
132². 1. *laciniatus*, Rouy, in Le Natural. ii. (1882) (Matér. Fl. Portug.) 507 = *europaeus*.
- LYGODISODEA.**
133¹. 1. *Lingua*, Boj. ... = *Lecontea Bojeriana*.
- LYSIMACHIA.**
134². a. *NEMORELLA*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147.
- LYTHRUM.**
136¹. 1. *cashmerianum*, Royle, ... 213
- PAG. **MACROCENTRUM.**
141². 1. *mendocinum*, Phil. l. c. 43 = *H. Gourlieana*.
- MACROCNEUM.**
141³. 1. *exsertum*, Oerst. ... 45 = *Pogonopus exsertus*.
- 142². insere **MACROLOBIMUM**, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 80 (1855) = *Azelia*, Sm. (Legumia.).
- 143¹. lin. prima, 1. **MAGRORHYNCHUS.**
- 143¹. a. **MACROSCAPA**, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1885) 148 = *Stropholirion*, Torr. (Liliac.).
volubilis, Kellogg, l. c. = *S. californicum*.
- MACROZAMIA.**
144¹. a. *Mackenzii*, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1877) i. 665. f. 109 = *Miquelii*.
- MAERUA.**
144³. 1. *pubescens*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 188 = *nervosa*.
scandens, C. Muell. (l. c.) = *nervosa*.
- MAGNOLIA.**
146¹. a. *Simi*, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 257 = *Talauma stellata*.
- MAHERNIA.**
146². 1. *gracilis*, Harv. ... 215 = *linnaeoides*.
a. *linnaeoides*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 215 = *rotundata*.
146³. 1. *rotundata*, E. Mey. ... 192.—Afr. austr.
- MAIANthemum.**
147¹. 1. *Bifolium*, DC. Fl. Fr. iii. 177; [DC.]
a. *smilacinum*, Montand. Guide Bot. 310 = *M. Convallaria*.
- MAIETA.**
147¹. 1. *heterophylla*, DC. ... 166 = *Calophysa heterophylla*.
- MALACHRA.**
148¹. a. *diversifolia*, Hassk. in Hov. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 134; xii. (1845) 79 = *Pavonia diversifolia*.
- MALESHERBIA.**
150¹. 1. *paniculata*, D. Don, ... 323
- MALLOTUS.**
150². 1. *Apelta*, Muell. Arg.
chinensis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 965, in syn. =
japonicus, Muell. Arg. ... Japon.
150³. *micranthus*, Muell. Arg.
tiliaefolius, Muell. Arg.
- MALUS.**
152². 1. *Torrino*, Siebold, ex De Vriese, Tuinb. Fl. iii. (1856) 368; Carr. ... = *P. Sieboldii*.
- MALVA.**
153³. 1. *Munroana*, Otto & Dietr. ... = *Sphaeralcea Munroana*.
154¹. *Munroana*, Dougl. ... = *Sphaeralcea Munroana*.
- MAMMILLARIA.**
157¹. 1. *Goodrichii*, Scheer,
a. *Goodrichii*, Scheer, in Seem. Bot. Voy. Herald, 286, sphalm. = *praec.*
159¹. 1. *pectinata*, Engelm. ... 10 = *radians*.
rhapidacantha, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 520, sphalm. = *rhapidacantha*.
159². *rhodantha*, Link & Otto, Ic. Pl. Rar.
160¹. *tetrancistra*, Engelm. ... partim.—Am. bor. occ.; Mexic.
tetrancistra, Engelm. l. c. partim =
160². *tuberculosa*, Engelm. (non *tuberculata*).
- MANDEVILLA.**
160³. a. *Wrightiana*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 727.—Cuba.
- MANISURIS.**
162³. a. *RVTLIX*, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 219.
- MAPPA.**
164³. 1. *peltata*, Wight,
- PAG. **MAPPIA.**
164³. 1. *montana*, Miers, l. c. 398 (*Apodytis* sp.).—Java.
- MARAH.**
165¹. 1. *muricata*, Kellogg.
- MARANTA.**
165². a. *discolor*, Welw. Synopse, 43 (al. gen.).—Afr. trop.
Makoyana, E. Morr. ex Flor. Mag. N. S. (1873) t. 53.—Am. trop.
165³. 1. *Moritziana*, Koern. ... 66 = *Myrosma cannaefolium*.
a. *nobilis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 356, nomen (Quid?).—Ind. occ.
166¹. 1. *olivaris*, Hort. ex Flor. Mag. N. S. (1873) sub t. 53 = *Makoyana*.
166². *unilateralis*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 6 = *Myrosma unilateralis*.
- 168¹. 1. **MARIANA**, Hill, ... = *Silybum*, Vaill. (1763).
- MARIANTHUS.**
168¹. a. **CYATHOMISCUS**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1863) i. 562, in obs.
1. **ONCOPORUM**, Putterl. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 9 (1839).
- 169¹. 1. **MARISCUS**, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146; Gaertn.
a. **OPETIOLA**, Gaertn. Fruct. i. 14. t. 2. (1788).
TORULINIUM, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 15 (1825).
- MARLEA.**
170¹. a. **STELANTHES**, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 339 (1812), nomen prius.
- MARSDENIA.**
171². 1. *longiflora*, A. Rich. ... 100 = *Stephanotis longiflora*.
171³. *tinctoria*, R. Br. ... 30.—As. trop. (non Afr.).
vinciflora, Griseb. ... 170 = *Stephanotis vincaeflora*.
- MARTYNIA.**
172³. 1. *Proboscidea*, Glox.
- MASSONIA.**
174³. a. *nivea*, Burch. ex Salisb. Gen. Pl. Fragm. 17 = *jasminiflora*?
- MATRICARIA.**
176¹. a. **OTOSPERMUM**, Willk. in Bot. Zeit. xxii. (1864) 251.
- MAURIA.**
178². a. *bijuga*, March. Rév. Anacard. 162, sphalm. = *subbijuga*.
- MAXILLARIA.**
178³. d. **ONKERIPUS**, et **PENTULOPS**, Rafin. (*nunc Xylobium*).
179¹. 1. *crocea*, Lindl. l. c. t. 1799.
a. *cyanocheile*, Hoffm. Preisvers. ed. X. 30.—*Cf. Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 272.—Bras.
180¹. *nasalis*, Reichb. f. in Saund. Refug. Bot. ii. t. 103, sphalm. = seq.
pallidiflora, Reichb. f. in Rodrig. Orch. Nov. ii. 201 = *liliacea*.
180². 1. *Warreana*, Lodd. Bot. Cab. t. 1884 = *Warrea tricolor*.
- MAXIMILIANA.**
180³. 1. *insignis*, Mart. ... 94 = *Scheelia insignis*.
- 182¹. post **MECONELLAM** insere **MECONIA**, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 275, in obs. (1855), sphalm. = *praec.*
- MECONOPSIS.**
182¹. 1. *horridula*, Hook. f. & Thoms. ...—Reg. Himal.; China.
napaulensis, DC.
a. *nipalensis*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 253 = *praec.*
1. *racemosa*, Maxim. ... = *horridula*.
robusta, Hook. f. & Thoms. ... 253 = *napaulensis*.
simplicifolia, Walp. Rep. i. 110.—Reg. Himal.
a. *Wollastoni*, Regel, Gartenfl. (1876) 291, lapsu = *napaulensis*.

- PAG. 182². 1. MEDICA, Cothen. . . = *Tourretia*, Fougér.
- MEDICAGO.**
- 182³. a. TRIFOLIUM, Medic. in Vorles. Churf. Phys. Ges. ii. (1787) 383.
TRIPHYLLUM, Medic. Phil. Bot. i. 202 (1789).
- 185³. a. MEGAPHYLLUM, Spruce, ex Baill. Hist. Pl. vii. 457, in nota (1880) = *Pentagonia*, Benth. (Rubiace.).
- MELALEUCA.**
- 187³. 1. lateriflora, Benth.
- 189². 1. MELANDRIUM, . . . ed. II. ii. 37, 274 (1812).
Flos-cuculi, . . . ed. II. ii. 275 =
pratense, . . . ed. II. ii. 274 =
sylvestre, . . . ed. II. ii. 274 =
- MELANOCENCHRIS.**
- 190¹. a. GRACILEA, Koen. ex Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 218 nomen prius,
ROYLEA, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475 (1841).
1. *Jacquemontii*, Jaub. & Spach, . . . = *Royleana*.
Perrottetii, Jaub. & Spach, . . . = *Rothiana*.
- MELANOSINAPIS.**
- 190². 1. communis, Spenn. l. c. 945 = *B. sinapioides*.
- MELANTHESOPSIS.**
- 190³. 1. fruticosa, Muell. Arg. . . 437 = *Andrachne fruticosa*?
- MELANTHIUM.**
- 191². a. *hyacinthoides*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 384 = *Scilla indica*.
- MELASMA.**
- 191². 1. hispidum, Benth.
- MELASTOMA.**
- 191². d. OCTONUM, Rafin. (nunc *Heterotrichum*).
- 192². 1. *chulesis*, Buch.-Ham. . . = *Osbeckia nepalensis*.
- MELHANIA.**
- 196³. 1. *laurifolia*, Boj. in Rapp. Soc. Nat. Maurice, xii. (1841) 48; et in
- MELIA.**
- 197¹. 1. *Bambolo*, C. DC. in DC. Monog. i. 767 err. typ. = seq.
Bombolo, Welw.
- MELICA.**
- 197². 1. *arundinacea*, Raeusch. . . = *Molinia caerulea*.
- 197³. *Geyeri*, Boland. . . = *bromoides*.
Geyeri, Munro, ex Boland. l. c. = *bulbosa*.
- MELICOCCA.**
- 198³. a. *javanica*, Hassk. Hort. Bog. Desc. i. 138 = *Otophora javanica*.
- 200². insere MELIOTUS, Steud. Nom. ed. II. ii. 704, in syn., err. typ. = *Melilotus*, Tourn. (Legumin.).
- MELOCACTUS.**
- 201². a. *approximatus*, Suring. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. III. ii. (1885) 187.—Ind. occ. *cornutus*, Suring. (l. c.) 191.—Ind. occ. *Evertzianus*, Suring. (l. c.) 190.—Ind. occ. *ferox*, Suring. (l. c.) 185 = *rubellus*.
hexacanthus, Suring. (l. c.) = *rubellus*.
- 201³. *intermedius*, Suring. (l. c.) 192.—Ind. occ. *Koolwijkianus*, Suring. (l. c.) 184.—Ind. occ. *parvispinus*, Suring. (l. c.) 183.—Ind. occ. *patens*, Suring. (l. c.) 190.—Ind. occ. *pusillus*, Suring. (l. c.) 192.—Ind. occ. *rectiusculus*, Suring. (l. c.) 187.—Ind. occ. *reversus*, Suring. (l. c.)—Ind. occ. *rubellus*, Suring. (l. c.) 184.—Ind. occ. *spatanginus*, Suring. (l. c.) 193.—Ind. occ. *stramineus*, Suring. (l. c.) 185.—Ind. occ.
- 202¹. *trichacanthus*, Suring. (l. c.) 186 = *stramineus*?
- MELOCHIA.**
- 202². a. *corymbosa*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 130.—Mexic.
- MENTHA.**
- 210². 1. *Welwitschii*, Rony, in Le Natural. ii. (1882) (*Matér. Rév. Fl. Portug.*) 47.—Europ.
- PAG. MEOSCHIUM.
- 211². 1. *Royleanum*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417 =
- 212³. 1. MERIDIANA, [Linn. ex] Linn. f. etc.
- MERTENSIA.**
- 213². 1. *virginica*, Link, . . . = *pulmonarioides*.
- MESPILUS.**
- 218³. a. *media*, Bechst. Forstbot. 150, 334 = *Crataegus Oxyacantha*.
- METACHILUM.**
- 220¹. 1. *cyathiferum*, Lindl. l. c.
cyathiforme, Steud. Nom. ed. II. ii. 136, sphalm. = *praece*.
- METROSIDEROS.**
- 221³. 1. *leptopetala*, F. Muell. = *Syncarpia leptopetala*.
- 222². *ternifolia*, F. Muell. = *Lysicarpus ternifolius*.
- 222². insere METROXILON, Welw. Apont. 584 [1859] = seq.
- METROXYLON.**
- 222². 1. *Pigafettia*, in synon. passim.—Cf. *elatum*, *filare*, *microcarpum*, *microspermum*.
a. *textile*, Welw. Apont. 584 = *Raphia Welwitschii*.
1. METROXYLON, Spreng. . . = *Raphia*, Beauv. (Palm.).
- MICHELIA.**
- 223³. a. PHELIMA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3.
- 223³. insere MICHELIA, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Barringtonia*, Forst. (1776) (Myrtac.).
- MICONIA.**
- 223³. a. ACINODENDRUM, Linn. Gen. ed. I. 129 (1737).
- * 224¹. LEUTAUTIA, Buc'hoz, Pl. Nouv. Découv. t. 7 (1779), nomen prius.
- 224³. 1. *corallina*, Spring,
- MICRANTHEMUM.**
- 228¹. a. *adenandrum*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 101.—Cuba.
multiflorum, Wright, (l. c.)—Cuba.
punctatum, Wright, (l. c.)—Cuba.
1. *rotundatum*, Wright, ex Griseb.
a. *trisetosum*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 101.—Cuba.
- MICRANTHUS.**
- 228¹. 1. *oppositifolius*, Wendl.
- MICROCARPAEA.**
- 228². a. *chamaedrifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 246, in syn. = seq.
- 228³. 1. MICROCHAETA, Reichb.
- MICROCHAETE.**
- 223³. 1. *corymbosa*, Benth. l. c. 196 = *S. Microchaete*.
- MICROCHLAENA.**
- 223³. 1. *quinquelocularis*, Wight & Arn.
- MICHROCHLOA.**
- 228³. 1. *elongata*, R. Br. . . n. 3807 = *setacea*.
- MICROGLOSSA.**
- 229². 1. *altissima*, DC. . . = *Psiadia altissima*.
hispida, DC. . . = *Psiadia hispida*.
- MICROLICIA.**
- 230³. a. *thymifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 447, in syn., sphalm. = *serpyllifolia*.
- MICROLOMA.**
- 230³. a. *hastatum*, Decne. in DC. Prod. viii. 499 = *sagittatum*.
- 231¹. 1. *pyrotechnicum*, Spreng. . . = *Leptadenia Spartium*.
- MICROPUS.**
- 232³. d. ANCISTROCARPHUS, A. Gray, (nunc *Stylocline*).
- PAG. MICROSTYLIS.
- 233³. 1. *bella*, Reichb. f. . . (1885) 187. t. 581
- MILIUM.**
- 236³. 1. *capillare*, Roth, . . . = *Panicum subglume*.
- 237². a. *nepalense*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417 = *effusum*?
- 237². 1. *sanguinale*, Roxb. . . *Paspalum pedicellare*.
- MILLA.**
- 237³. d. TULOPHOS, Rafin. (nunc *Brodiaea*).
- MILLETTIA.**
- 238². 1. *speciosa*, Welw. . . 23 = *Lonchocarpus sericeus*.
- MIMULUS.**
- 245³. 1. *barbatus*, Greene, . . . 9 = *montioides*.
a. *Langsdorffii*, Donn, ex Sims, Bot. Mag. sub t. 1501 = *guttatus*.
- 246¹. 1. *punctatus*, Loisel. Herb. Amat. t. 152; Miers,
- MIMUSOPS.**
- 246². a. RADIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3.
- 247¹. insere MINTHOSTACHYS, Bunge, Lab. Pers. 13 (1873) = *Bystropogon*, L'Hérit. (Labiata.).
mollis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 235 = *B. mollis*.
- MINURIA.**
- 247¹. a. *Kippistiana*, F. Muell. Pl. Vict. i. sub t. 35.—Austral.
1. *suaedifolia*, F. Muell. . . 499 = *Kippistiana*.
- 247¹. 1. MINYRANTHES, Turcz. . . = *Siegesbeckia*, Linn.
- MIRASOLIA.**
- 247³. a. *scabra*, Benth. & Hook. f. l. c. 375 = *Tithonia scabra*.
- 247³. a. MIRKOOA, Wight, Ic. i. t. 217, in textu (1840) = *Ammannia*, Houst. (Lythrar.).
rotundifolia, Wight, l. c. = *A. rotundifolia*.
- MISCHOPHLOEUS.**
- 248¹. 1. *paniculatus*, Scheff.
- MITCHELLA.**
- 248². a. *PERDICESCA*, Provand. Fl. Canad. 291 (1862).
- MITRANTHES.**
- 249². 1. *Riedeliana*, Berg,
- MITREOLA.**
- 250¹. a. *lanceolata*, Torr. ex Croom, Cat. Pl. New Bern, 45 = *petiolata*.
- MITREPHORA.**
- 250¹. 1. *excelsa*, Hook. f. & Thoms. . . 114 = *Uvaria excelsa*.
- MNASIUM, Schreb.**
- 250². 1. *sphaerocephalum*, Rudge, . . . = *Thurnia sphaerocephala*.
unilateralis, Rudge, . . . = *Spathanthus unilateralis*.
- 250³. 1. MNIARUM, Forst. Char. Gen. 1. t. 1.
- MOEHRINGIA.**
- 251³. a. *sedifolia*, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 227 = *papulosa*.
1. *Tommasinii*, Marches.
- MOLINAEA.**
- 252³. a. *arboorea*, J. F. Gmel. Syst. 611 = *C. alternifolia*, laevis.
- MOLLINEDIA.**
- 252². a. PARACELSLA, Mart. ex Tul. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 314, 316 (1857).
- MOLLUGO.**
- 254¹. 1. *Trigastrotheca*, F. Muell.
- MONANTHES.**
- 256¹. 1. *polyphylla*, Haw.
- 256¹. insere MONANTHIUM, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148 = *Moneses*, Salisb. (Pyrolac.).

PAG.

MONESSES.

- 257
- ¹
- . a.
- MONANTHIUM*
- , Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148.

MONIZIA.

- 257
- ¹
- . l.
- edulis*
- , Lowe, l. c. = T. Moniza?

MONNIERA.

- 257
- ²
- . a.
- longifolia*
- , Steud. Nom. ed. II. ii. 373, sphalm. =
- Monnina longifolia*
- .

MONNIERIA.

- 257
- ²
- . a.
- trifoliata*
- , Baill. Adansonia, xi. (1875) 276 = praec.

MONOCHAETUM.

- 258
- ²
- . a.
- ROEZLIA*
- , Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 98.

MONODORA.

- 259
- ¹
- . l.
- angolensis*
- , Welw. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 151, 154;
- Apont*
- .

MOQUILEA.

- 262
- ²
- . l.
- floribunda*
- , Hook. f. in Mart. Fl. Bras. xiv. 11. 21.—Bras.

pendula, Hook. f.

sclerophylla, Hook. f.

- 262
- ³
- .
- turbinata*
- , Hook. f.

MORAEA.

- 263
- ¹
- . l.
- chinensis*
- , Thunb. . . =
- Belamcanda punctata*
- .

MORICANDIA.

- 264
- ¹
- . a.
- cinerea*
- , Coss. ex Tourn. Thèse Crucif. 143 =
- Ammosperma cinerea*
- .

MORINDA.

- 264
- ³
- . a.
- ternifolia*
- , Royle, Illustr. Bot. Himal. 238, nomen (Quid?).—Ind. or.

MORUS.

- 266
- ¹
- . a.
- cashmeriana*
- , Royle, Illustr. Bot. Himal. 337 =
- indica*
- ?

dulcis, Royle, (l. c.) = *alba*?

- 266
- ²
- .
- parvifolia*
- , Royle, (l. c.) =
- indica*
- ?

MUCUNA.

- 268
- ²
- . a.
- dichroa*
- , Hoffmgg. Preisverz. ed. X. 80.—Cf.
- Linnaea*
- , xvi. (1842) Litt. 272.—Hab.?

MUEHLENBECKIA.

- 268
- ³
- . l.
- Benthamii*
- , Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 51
- quadrangulata*
- , Endl. (l. c.)
- volcanica*
- , Endl. (l. c.)

MUEHLENBERGIA.

- 268
- ³
- . a.
- SERICROSTIS*
- , Rafin. Neogenyt. 4 (1825).

- 269
- ¹
- . l.
- filipes*
- , M. A. Curt.

a. *maritima*, Ind. Kew. ii. p. 60¹. in syn., lapsu = *Polypogon maritimus*.

- 269
- ²
- . l.
- setifolia*
- , [Vasey, in] Coult.

subalpina, Vasey, . . . 40 = *gracilis*.**MULGEDIUM.**

- 270
- ¹
- . l.
- leucophaeum*
- , DC. l. c. 250 =
- L. alpina*
- .

MURALTIA.

- 271
- ¹
- . a.
- ericoides*
- , Steud. Nom. ed. II. ii. 371, in syn. sphalm. =
- Burmanni*
- .
-
- l.
- laxa*
- , DC. etc.

MURICARIA.

- 271
- ³
- . l.
- Cordyllocarpus*
- , C. Muell.

- 271
- ³
- . l.
- MUROCOA*
- , . . .
- Maripa*
- , Sw. (Convolv.).

- 271
- ³
- . l.
- MURUCOA*
- , J. F. Gmel. . . .
- Maripa*
- , Sw. (Convolv.).

MUSA.

- 272
- ¹
- . a.
- Charlioi*
- , E. Hill, Rep. Brisbane Bot. Gard. (1874) 7.—Hab.?

Rhinoserotus, Kurz, in Journ. Agr. Hort. Soc.Ind. N. S. v. (1878) 64 = *nana*?**MUSCARI.**

- 272
- ²
- . d.
- botryoides*
- , Steud.

- 272
- ³
- . a.
- inodorum*
- , Montand. Guide Bot. 313 =
- botryoides*
- .
-
- odoratum*
- , Montand (l. c.) =
- racemosum*
- .

PAG.

- 275
- ²
- . l.
- MYCETIA*
- , Reinw. . . =
- Adenosacme*
- , Wall.
-
- a.
- javamica*
- , Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 95, sphalm. = praec.

MYRICA.

- 281
- ²
- . d.
- PIMECARIA*
- , Rafin. (nunc
- Ximenia*
-).

a. *elegans*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 459 (Index), sphalm. = *Myricaria elegans*.

- 281
- ³
- . l.
- obovata*
- , [Champ.] ex C. DC. l. c. 150 =
- inodora*
- .

MYRISTICA.

- 282
- ³
- . a.
- angolensis*
- , Welw. Synopse, 51. (Quid?).—Afr. trop.

MYROSMA.

- 284
- ³
- . l.
- unilaterale*
- , Benth. & Hook. f.

MYROXYLON.

- 284
- ³
- . l.
- Toluifera*
- , H. B. & K.

a. *toluiferum*, G. Don, Gen. Syst. ii. 109, in syn. = praec.

- 286
- ³
- . post
- MYRTOBIUM*
- insere
- MYRTOLOBIUM*
- , Chalon, in Mém. Soc. Hainaut, Sér. III. v. (1790) 324, sphalm. = praec.

NAEGELIA.

- 291
- ²
- . a.
- achimenoïdes*
- ×, Bárlik, in Wien. Garten-Zeit. x. (1885) 239. t. 2.

NAMA.

- 292
- ³
- . l.
- tetrandrum*
- , Pav. ex Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxx. (1833) 243 =

NARCISSUS.

- 293
- ²
- . a.
- bitermaceus*
- , Salisb. Gen. Pl. Fragm. 100 =
- incomparabilis*
- ?

NASSELLA.

- 295
- ¹
- . a.
- aemulans*
- , Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 328.—Chili.

NASTURTIIUM.

- 296
- ¹
- . l.
- acaule*
- , Welw. Apont. 589 =
- humifusum*
- .

NECTANDRA.

- 299
- ²
- . a.
- decandra*
- , Roxb. Fl. Ind. i. 425 =
- Linostoma decandrum*
- .

- 300
- ¹
- . l.
- staminea*
- , Griseb. . . 282 (=
- Oreodaphne fragrans*
-).—Ind. occ.

- 302
- ³
- . insere
- NEMOLAPATHUM*
- , Ehrh. Beitr. iv. (1789) 149 =
- Polygonum*
- , Tourn.

- 303
- ¹
- . insere
- NEMORELLA*
- , Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147 =
- Lysimachia*
- , Tourn. (Primul.).

NEOTPIA.

- 303
- ³
- . l.
- aphylla*
- , Hook.

- 304
- ¹
- . a.
- colorata*
- , Blume, Bijdr. 409 =
- Spiranthes colorata*
- , Hassk.

grandis, Blume, (l. c.) 407 = *Spiranthes grandis*.*longifolia*, Blume, (l. c.) 406 = *Spiranthes longifolia*.*parvifolia*, Blume, (l. c.) 408 = *Spiranthes parviflora*.

- 304
- ²
- .
- reticulata*
- , Blume, (l. c.) 409.—Java.

l. *vaginata*, H. B. & K. . . 331 = *Spiranthes vaginata*.**NEPETA.**

- 305
- ¹
- . l.
- CHAMAECLEMA*
- , Boerh. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 115; Moench,

- 305
- ³
- .
- dasyangula*
- , Lenné & C. Koch, . . . 12.—Reg. Himal.

Everardi, S. Moore,

NEPHELIUM.

- 307
- ²
- . l.
- acuminatum*
- , Hook. f. . . 164 =
- Pometia acuminata*
- .

- 307
- ³
- .
- Maingayi*
- , Hiern,
-
- a.
- muricatum*
- , Herb. Kew. ex Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 93 =
- Xerospermum mucronatum*
- .

- 309
- ³
- . a.
- NESOEIA*
- , Wight, Ic., in textu sub t. 217 (1840) =
- Ammannia*
- , Houst. (Lythrar.).

octandra, Wight, l. c. = *A. octandra*.**NICANDRA.**

- 311
- ²
- . a.
- PHYSALODES*
- , Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 41 (1760).

PAG.

NICOTIANA.

- 312
- ¹
- . l.
- diversifolia*
- , Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 384; et

NIDORELLA.

- 313
- ¹
- . l.
- altissima*
- , Benth. & Hook. f. . . =
- Psiadia altissima*
- .

hispida, Benth. & Hook. f. . . = *Psiadia hispida*.**NIDULARIUM.**

- 313
- ¹
- . l.
- caeruleum*
- , Lem.

NIVENIA.

- 315
- ³
- . l.
- PARANOMUS*
- , Salisb. . . (1807).
-
- Lagopus*
- , R. Br.

NOLANA.

- 316
- ²
- . l.
- triquetra*
- , C. Koch & Bouché, . . . App. 12.

NONNEA.

- 317
- ¹
- . a.
- PHANERANTHERA*
- , DC. ex Meissn. Gen. Comm. 189 (1840).

NOTHITES.

- 318
- ²
- . l.
- breviflora*
- , Cass. . . 165 =
- S. aristata*
- ?
-
- latifolia*
- , Cass. l. c. 163 =
- S. melissaefolia*
- .
-
- melissaefolia*
- , DC. . . 186 =
- S. melissaefolia*
- .
-
- petiolata*
- , Cass. . . 166 =
- S. petiolata*
- .

NOTHOSCORDUM.

- 319
- ¹
- . a.
- PERILOBA*
- , Rafin. Fl. Tellur. iv. 87 (1836), nomen prius.

NYCTAGO.

- 320
- ³
- . l.
- angulata*
- , DC. . . (=
- Quamoclidion angulatum*
-).—Mexic.

NYMPHAEA.

- 321
- ²
- . l.
- Fenzliana*
- , Lehm. . . =
- Rudgeana*
- .

- 321
- ³
- .
- Kosteletzkyi*
- , Palliardi,

- 322
- ¹
- .
- stellata*
- , Willd. . . As. et Afr. trop.; Austral.

NYMPHOIDES.

- 322
- ²
- . l.
- europaea*
- , Fisch. . . =
- L. Nymphoides*
- .

orbiculata, Gilib. . . = *L. Nymphoides*.

- 322
- ³
- . l.
- OAKESIA*
- , S. Wats. . . 269 =
- Uvularia*
- , Linn. (Liliac.).

puberula, S. Wats. l. c. = *U. puberula*.*sessilifolia*, S. Wats. l. c. = *U. sessilifolia*.**OCHNA.**

- 324
- ¹
- . l.
- nitida*
- , Sw. . . =
- Gomphia nitida*
- (in Addend.).

OCHROSIA.

- 324
- ³
- . l.
- sandwicensis*
- , A. DC. . . 357 =
- Rauwolfia sandwicensis*
- .

a. *sandwicensis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 333.—Ins. Sandvic.**OCOTEA.**

- 326
- ²
- . l.
- Bofo*
- , H. B. & K.

OCTADESMIA.

- 327
- ¹
- . l.
- monophylla*
- , Benth. & Hook. f. l. c. 526 =
- Laelia monophylla*
- .

ODINA.

- 328
- ¹
- . a.
- caffra*
- , Hook. ex March. Rév. Anacard. 162 =
- Harpephyllum caffrum*
- .

ODONTADENIA.

- 328
- ²
- . a.
- PERICTENIA*
- , Miers, Apocyn. S. Am. 182 (1878).

ODONTOGLOSSUM.

- 330
- ³
- . l.
- pygmaeum*
- , Lindl. . . =
- Leochilus pygmaeus*
- .

OENANTHE.

- 331
- ³
- . l.
- amoena*
- , Sweet, Hort. Brit. ed. II. 247, sphalm. =
- Oenothera amoena*
- .

OENOTHERA.

- 333
- ¹
- . l.
- albicaulis*
- , [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 54, nomen; et ex

caespitosa, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 53;et ex *campylocalyx*, C. Koch & Bouché . . . (1855) App. 17.

- 333
- ³
- .
- epilobioides*
- , Nutt. . . 511 =
- strigulosa*
- .
-
- erosa*
- , Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1824) 20; et

in *macrocarpa*, [Nutt. in] Fras. Cat. (1813) n. 56;

- 334
- ¹
- .
- Pursh*
- ,

- PAG.
OGERIA.
 335². a. *portoricensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 582, sphalm. = *E. ovata*.
OLEARIA.
 338¹. l. *Allomii*, T. Kirk, . . . i. ed. II. (1871) 92;
OLINIA.
 339². a. *PLECTRONIA*, Buching. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 348.
ONCIDIUM.
 341³. l. *acrobotryum*, Klotzsch, . . . = *Harrisonianum*.
 343¹. *festatum*, Reichb. f. & Warsz.
 343². *hemichrysium*, Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia, ii. (1854) 100 =
 344². *pantherinum*, Hoffing. Preisverz. ed. X. 80. — Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 272 =
ONOBRYCHIS.
 346³. a. *alpicola*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 25 (Quid ?). — Gallia.
ONOSERIS. Willd. Sp. Pl. iii. 1702 (1804); DC.
 350². a. *nepalensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 277, nomen (Quid ?). — Nepal.
ONOSMA.
 351¹. l. *saxatile*, Lehm. . . . 371 (= *Stenosolenium saxatile*). — Sibir.
OPHELIA.
 352². l. *angustifolia*, D. Don, ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 277; et ex G. Don,
OPHIORRHIZA.
 353¹. l. *fruticulosa*, Nadeaud, . . . 53 = *subumbellata*.
 353². *torrentium*, Nadeaud, . . . 54 = *Solandria*.
OPHYRYSPORUS.
 354¹. l. *Pachychaeta*, Baker,
OPHRYS.
 354². l. *atrata*, Lindl. . . . t. 1087.
OPILIA.
 355². a. *TETRANOSIA*, Rich. ex M. Roem. Syn. Hesper. 23 (1846).
OPLISMENUS.
 355³. l. *PANICULUM*, Ard.
ORBIGNYA.
 359². a. *Sagotii*, Trail, ex im Thurn, in *Timehri*, iii. (1884) 276. — Guian.
 359². l. *ORCHIDIUM*, [Sw.] Summa Veg. Scand. 32 (1814); et in
 l. *arcticum*, [Sw.] (l. c.).
ORCHIS.
 359³. a. *angustata*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 62 (Quid ?). — Gallia.
biloba, Arv. (l. c.) 61 = *laxiflora*.
 360¹. *Burmänniana*, Sw. in Weber & Mohr, Arch. i. (1804) 55. — Afr. austr.
 361². l. *macronectar*, Vell. . . . 45 = *Habenaria Sartor*?
 a. *nemorosa*, Montand. Guide Bot. 294 = *maculata*.
 362¹. *rosea*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 63 (Quid ?). — Gallia.
 363². l. *OREOC DE*, Miq.
OREODAPHNE.
 364². l. *Teleiandra*, Meissn.
 367¹. insere *ORLEANIA*, Commel. ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 380 (1760) = *Bixa*, Linn.
ORMOCARPUM.
 367². l. *coccineum*, G. Don,
ORNITHOGALUM.
 368². d. *SIMIRA*, Rafin. (nunc *Scilla*).
 370¹. a. *ochroleucum*, Montand. Guide Bot. 315 = *pyrenaicum*.
 371². l. *ORNITHORHYNCHIUM*, Roehl. . . . (1812).

- PAG.
OROBANCHE.
 373². a. *Lactuca*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 54 (Quid ?). — Gallia.
OROBUS.
 375². d. *flaccidus*, Kit.
ORTHOPOGON.
 377². a. *Funghuhnii*, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 45; et ex Miq. Fl. Ind. Bot. iii. 444 = *Oplismenus compositus*.
ORTHOSPERMUM.
 378². a. *unctuosum*, Montand. Guide Bot. 262 = *C. Bonus-Henricus*.
ORYZA.
 378³. a. *SCLEROPHYLLUM*, Griff. Notul. iii. 8 (1851).
ORYZOPSIS.
 379¹. l. *canadensis*, Torr. . . . 583 = *parviflora*.
 379². *parviflora*, Nutt. l. c. 126. — Am. bor.
OSBECKIA.
 379³. a. *pendulifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 447, in syn. = *Aciotis pendulifolia*.
OSMOXYLON.
 381¹. a. *borneense*, Seem. Rev. Heder. 104. — Borneo. Cumingii, Seem. (l. c.). — Ins. Philipp. pulcherrimum, Vidal, Sin. Fam. Leñ. Atlas, p. xxviii. — Ins. Philipp.
OSYRIS.
 382³. l. *nepalensis*, D. Don, ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 322; Griff.
OTHONNA.
 383³. l. *nodulosa*, Sch. Bip. l. c. 769 = *perfoliata*.
 385². l. *OURAGOGA*, Linn. . . . = *URAGOGA*, Linn. = *Psychotria*, Linn. (Rubiace.).
OURATEA.
 385². l. *nitida*, Engl. l. c. 310 = *G. nitida* (in Addend.).
nitida, Engl. l. c. 314, in adnot. = *G. guyanensis*.
OXALIS.
 387². l. *Cummingi*, Herb. . . . t. 1545. — Chili.
 388³. *leucotricha*, Turcz. . . . Afr. austr.
 389¹. a. *microphylla*, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 35 (sp. diversa). — Chili.
 390². l. *rubella*, Jacq.
 390³. *sulphurea*, Jacq. . . . 63 = *pulchella*.
OXYGONUM.
 392². a. *DIPLOPYRAMIS*, Welw. Apont. 591 [1859].
 393². l. *OXYMITRA* ante *OXYMITUM* ponenda.
OXYPETALUM.
 393³. l. *integrifolium*, Fourn. . . . 372, sphalm. = *integrilobum*.
integrilobum, Fourn. . . . 279
OXYSTELMA.
 394². a. *aegyptiacum*, Decne. in DC. Prod. viii. 504, sphalm. = *Alpini*.
OXYTROPIS.
 395¹. a. *SPIESIA*, Neck. Elem. iii. 13 (1790), nomen prius.
amethystea, Arv. Ess. Pl. Dauph. 24 (Quid ?). — Gallia.
amethystina, Arv. Monog. Pilos. 49 = *praeac*?
 396¹. l. *Middendorffii*, Trautv. in *Middend. Sibir. Reise* (Fl. Taimyr. 49. t. 7). — Sibir.
 396³. *Trautvetteri*, Meinsh. . . . = *Middendorffii*.
PACHYCARPUS.
 398¹. l. *gomphocarpoides*, E. Mey. l. c. 213 (= *Xysmalobium gomphocarpoides*). — Afr. austr.
PACHYGONE.
 398². l. *pubescens*, Benth. . . . 58 = *Trichocalyx pubescens*.
PAEDERIA.
 400². l. *Lingun*, Boj. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 487 =

- PAG.
 400³. l. **PAEONIA**
albiflos, Sabine, . . . = *corallina*.
PALICOUREA.
 404¹. a. *Gudara*, Steud. Nom. ed. II. ii. 787, in syn. sphalm. (= *Pacuria Gudara*) = *Willughbeia edulis*.
 l. *quadrifolia*, DC. Prod. iv. 526. — Guian.
PALIURUS.
 404². l. *aculeatus*, Lam. . . . 611 = *P. Spina-Christi*.
australis, Gaertn. . . . 43 = *P. Spina-Christi*.
clypeiformis, Medic. . . . = *P. Spina-Christi*.
 404³. *solitarius*, Stokes, . . . *P. Spina-Christi*.
Spina-Christi, Mill. . . . VIII. — Europ. austr.; As. or.
vulgaris, Steud. . . . = *P. Spina-Christi*.
PANAX.
 406¹. l. *micranthum*, Wall. Cat. n. 4938 = *Leschenaultii*.
 a. *odora*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 13, nomen (Quid ?). — Ind. or.
PANCRATIUM.
 406³. d. *TROXISTEMON*, Rafin. (nunc *Hymenocallis*).
PANDANUS.
 407³. a. *SOULEVETIA*, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 19 (1844-49).
 l. *SUSSEA*, Gaudich. (l. c.) tt. 24, 25, 38 (1844-57?).
PANICUM.
 409³. d. *PSEUDORAPHIS*, Griff. (nunc *Setaria*).
 410². a. *angustatum*, Edgew. in *Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1852) 157, nomen. — Ind. or.
 l. *barbinode*, Trin. . . . = *muticum*.
 411². l. *bidentulum*, Steud.
 411¹. *capillaceum*, Lam. . . . = *brevifolium*, Linn.
 412¹. a. *conjugatum*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 291 = *cimicinum*.
 412². l. *decompositum*, R. Br. Prod. 191. — Austral.
 412³. a. *dentsipica*, Kunth, Rév. Gram. i. sub t. 39, err. typ. = *densispica*.
 412³. l. *distichum*, Gaud. ex
 413¹. *elegans*, Wight & Arn. ex Steud. l. c. = *Isachne pulchella*.
equinum, Salzmann. . . . = *muticum*.
 413². a. *floridum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 420 = *flavidum*.
 413³. l. *fluitans*, Retz. . . . 8 = *punctatum*.
fugax, Koen. in *Naturf.* xxiii. (1788) 209 (ex Roem. & Schult. Syst. ii. 467);
Gardneri, Thw. . . . = *Isachne Gardneri*.
 414². *hirtum*, Nees, . . . = *brevifolium*, Linn.
 414³. *insulicola*, Steud. . . . = *auritum*.
 a. *intermedium*, Griff. Notul. iii. 29 (*Chamaeraphidis* sp.). — Ind. or.
 415². l. *lanuginosum*, J. & C. Presl, . . . = *mollicomum*.
 416¹. *molle*, Sw. . . . — Am. trop. (dele As. trop. inquil.).
mollicomum, Kunth,
 416². *muricatum*, Retz. . . . 18 (Quid ?). — Ind. or.
 416³. *numidianum*, Lam. . . . — Afr. bor.; Syria; As. trop.; Am. trop.
 417¹. d. *oryzoides*, Nees,
 a. *panis*, Jess. Deutschl. Graes. 240 = *Setaria italica*.
 l. *paractenoides*, Trin. . . . 219 = *flavescens*.
paspaloides, Pers. . . . (*paspalodes*).
 a. *patens*, Roxb. Fl. Ind. i. 305 = *Isachne miliacea*.
 417³. d. *plicatum*, Roxb.
 l. *polystachion*, Linn. . . . = *setosum*.
 418¹. *punctatum*, Burm. f. . . . Geront. trop.
punctulatum, Arn. . . . = *muticum*.
purpurascens, Opiz, . . . 266 = *Setaria viridis*.
purpurascens, Raddi, . . . 240 = *muticum*.
 a. *ramosum*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 53 (Quid ?). — Ind. or.
 418². l. *Roxburghianum*, Schult. . . . = *repens*.
Royleanum, Nees, ex Royle Illustr. Bot. Himal. 417, nomen; et ex . . . 47. — Ind. or.; Afr. trop.
 418³. a. *sanguinolentum*, Edgew. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab, 161 = *sanguinale*.
 419¹. l. *sericeum*, [Soland.] . . . Ind. occ.
 d. *simplicissimum*, Koen.
 419². l. *Streptostachys*, Spreng.
taitense, Steud. . . . 418 = *prostratum*.

PAG.

PANICUM :—

- 419³. a. *tenuiculmum*, Chapm. Fl. S. U. St. 572 = Chapmani.
 l. *ternatum*, *Hodist.* . . . 40.—Ind. or.; Abyss.
 l. *tomentosum*, Roxb. . . . Fl. Ind. i. 301 = *Setaria verticillata*.

PAPAYER.

- 421². l. *armeniaceum*, Lam. Encyc. i. 247; et ex *Lestib. Bot. Belg.* III. ii. 132.—Reg. Cauc.
caucasicum, Bieb. . . . 5 = *armeniaceum*.
 421³. pavoninum, *Schrenk, ex Fisch. & Mey. Enum. Pl. Schrenk*, ii. 64; et
 422¹. *pyrenaicum*, Lam. Encyc. i. 247; Willd.

PARAPANAX.

- 424¹. l. *littorale*, Miq. l. c. 339 = *T. littoralis*.

PARAPOTTISIA.

- 424¹. l. in syn. = *Pottisia cantonensis* (bis).

PARIETARIA.

- 425³. l. *microphylla*, Linn. . . . = *Pilea muscosa*.

PARINARIUM.

- 426¹. a. *amazonicum*, Mart. ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 52 = *brachystachyum*.
 l. *brachystachyum*, *Benth.* . . . 213.—Am. trop.

PASPALUM.

- 429³. l. *arundinaceum*, *Poir.* . . . Am. bor.
 430². *ctenostachyum*, Trin. . . . = *Eriochloa grandiflora*.
 431¹. *humifusum*, *Poir.*
 431². *longiflorum*, *Retz.* . . . 279.—Reg. trop.
 431³. *nematodes*, *Schult.* . . . 171
sanguinale, *Schult.* . . . 171.—Java.

PASSERINA.

- 433¹. d. *STEIROCTIS*, Rafin. (vide tom. ii. p. 983).
TRIMEIANDRA, Rafin. (*nunc* *Arthrosolen*).

PASSIFLORA.

- 434¹. a. *TETRASTYLIS*, Rodrig. in Rev. Engenh. (Nov. 14, 1882) reimpr. l.
 436². *racemosa*, *Brot.*

- 437². Nota.—*PATAGONICA*, Dill. usque ad *PATAMOGETON*, Honck. post *PATAGNANA*, Steud. p. 438 ponuntur.

PATRINIA.

- 438². a. *rupestris*, *Dufr. Hist. Valér.* 54.—Sibir.
 438². l. *scabiosaefolia*, *Fisch. ex Trevir. Ind. Sem. Hort. Vratisl. App.* ii. (1820) 2.—*Dahuria*.

PATRISIA.

- 438¹. l. *bicolor*, DC. . . . = *R. Candollei*.
parviflora, DC. . . . = *R. Patrisii*.

PAULLINIA.

- 438³. l. *africana*, G. Don. . . . = *pinnata*.
barbadensis, A. Gray,
brachystachys, Griseb. . . . 109 = *Serjania glabrata*.
 439¹. *curassavica*, Linn. *Sp. Pl.* 366, partim; *Jacq.*
 a. *Cururu*, Linn. *Sp. Pl.* 366, partim.—Am. trop.
 l. *Cururu*, Linn. l. c., partim = *Serjania nodosa*.
diversifolia, Jacq. . . . = *pinnata*.
elegans, Griseb. . . . xxiv. (1879) 80, nomen = *eriantha*, *Benth.*
 439². *Hostmanni*, Steud. . . . = *pinnata*.
 a. *longipes*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 131 (Quid?).—Hab.?
 l. *nitida*, Steud. . . . = *pinnata*.
 a. *pinnata*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 80 = *Serjania marginata*.
pinnata, Linn. *Sp. Pl.* 366, partim.—Afr. & Am. trop.
 l. *pinnata*, Linn. l. c., partim = *Serjania curassavica*.
 a. *pinnata*, Pasq. Cat. Hort. Nap. (1867) 76 = *Serjania confertiflora*.
 a. *quassiaefolia*, Linden, Cat. n. 17 (1862), 8. (Quid?).—N. Granat.
 439³. l. *riparia*, H. B. & K. . . . = *P. Cururu*.
senegalensis, Juss. . . . = *pinnata*.
Tamuya, Vell. . . . 34 = *Serjania glabrata*.
uvata, Schum. & Thonn. . . . = *pinnata*.

PÀVETTA.

- 440². l. *Gerrardi*, *Harv.*

PAG.

- 441². l. *PAVIA*, Boerh. ex Linn. Syst. ed. I (1735) et ex a. *indica*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 135 = seq.?

PAVONIA.

- 441³. l. *cordifolia*, Wright, . . . 27 = *speciosa*.
 442¹. *cymbalaria*, A. St. Hil. & Naud. . . . 42 = *hastata*.
diuretica, A. St. Hil. . . . t. 53 = *sidaefolia*.
grandifolia, Walp. . . . 300 = *sepium*.
Hostmanni, Miq. . . . 469 = *speciosa*.
 442². *laxifolia*, A. St. Hil.
modesta, Mart. . . . 59 = *cancellata*.
nudicaulis, A. St. Hil. . . . 231 = *speciosa*.
paraibica, Wawra, . . . 39 = *monatherica*.
prostrata, Moric. . . . t. 72 = *humifusa*.
 442³. *Regnelliana*, Miq. . . . 551 = *spinifex*, *sepium*?
subpandurata, Wright, . . . 26 = *speciosa*.

- 443¹. l. *PAYANELIA*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 236 (1877) =

PEDALIMUM.

- 444². l. *filiforme*, Pav. . . . 267 (= *Ischnia verbenacea*).—Mexic.

PELARGONIUM.

- 450². l. *dasycaule*, Haw. Syn. Pl. Succ. discipes, Haw. (l. c.)
 452¹. *iocastum*, Steud. . . . = *australe*.

PELEXIA.

- 456¹. l. *corymbosa*, Lindl. . . . 482 (*Spirantheos* sp.).—Peruv.
foliosa, Poepp. & Endl. . . . 17 = *Physurus foliosus*.
laxa, Lindl. . . . 482 (= *Spirantheos* sp.).—Peruv.
pauciflora, Poepp. & Endl. . . . t. 124 = *Physurus pauciflorus*.
repens, Poepp. & Endl. . . . a-c. = *Physurus repens*.

PELIOSTOMUM.

- 456². l. *scoparium*, . . . *Anticharis scoparia* (in Addend.).

PENICILLARIA.

- 457³. a. *elongata*, Schrad. ex Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 560, 563 = *Pennis. typhoideum*.

PENNISETUM.

- 458¹. a. *aristoides*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 302, in syn. = *hordeiforme*.
 458². l. *identicum*, Steud. . . . 299 = *articulare*.
lanuginosum, *Hochst.* . . . nomen; xxvii. (1844) 252;
 458³. *plumosum*, *Hochst. & Steud.* . . . syn. = *Melanocenchris Rothiana*.
scandens, Jacq. f. . . . ex *Schult. Mant.* ii. 279 = *Setaria scandens*.
 459¹. *triflorum*, Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 417 =

PENTAGONIA.

- 459³. l. *MEGAPHYLLUM*, Spruce, . . . 457, etc.

PENTANEMA.

- 460². l. *divaricatum*, Cass. . . . 75 = *V. divaricata*.
multicaule, Boiss. . . . 75 = *V. multicaule*.

PENTAPTERYGIIUM.

- 461¹. l. *flavum*, *Hook. f. in Hook.*

PENTARHAPHIA.

- 461². l. *Craniolaria*, *Decne.*

PENTSTEMON.

- 462². l. *angustifolius*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 63, nomen; Pursh,
 462³. *cristatus*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 65, nomen; Nutt.
erianthera, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 67; Nutt.
 463¹. *grandiflorus*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 64; Nutt.
 463². *teretiflorus*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 66, nomen; Nutt.

- 463³. l. *PENTSTEIRA* et *PENTSTERIA*, Griff. . . . 118.

PAG.

- 468¹. insere *PERDICESCA*, Provanch. Fl. Canad. 291 (1862) = *Mitchella*, Linn. (Rubiaceae).
repens, Provanch. l. c. = *M. repens*.

- 469³. l. *PERIANDRA*, Cambess. . . . 27 (1844).

- 470². l. *PERICTENIA*, Miers, . . . (1878) = *Odontadenia*, Benth. (Apocyn.).
stipellaris, Miers, l. c. (= *Anisolobus anomalus*).—Peruv.

PERIPILOCA.

- 471¹. a. *cordata*, L'ennst. Schluess. Hort. Malab. 14 = *Cosmostigma racemosa*.
 471². l. *Secamone*, Linn. . . . = *Oxystelma esculentum*.

PERISTYLUS.

- 472¹. l. *cordatus*, Lindl. . . . = *Habenaria cordata*.

- 473¹. a. *PEROSTIS*, Beauv. Agrost. 5 (1812) = *Perotir*, Ait. (Gramin.).
laxifolia, Beauv. l. c. 6 = *Perotis latifolia*.

PERSEA.

- 473². a. *australis*, Linden, Cat. n. 23 (1869) 27.—Bras.
 473³. *frigida*, Linden, l. c.—Reg. Andin.
jitotolensis, Linden, l. c.—Am. trop.

PERSICA.

- 474². a. *saligna*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 204 = *Prunus Persica*.

PERSICARIA.

- 474². a. *fluitans*, Montand. Guide Bot. 268 = *Polyg. amphibium*.
 474³. *pulicarioides*, Montand. (l. c.) 269 = *Polyg. Persicaria*.
pumila, Montand. (l. c.) = *Polyg. minus*.
 474³. *urens*, Montand. (l. c.) = *Polyg. Hydropiper*.

PETALIDIUM.

- 476². a. *Currori*, *Benth. ex S. Moore, l. c.* 223.—Afr. austr.

PETUNIA.

- 479². d. *STIMOMPHIS*, Rafin. (*nunc* *Salpiglossis*).

PEUCEDANUM.

- 479³. l. *TIEDEMANNIA*, DC.

PFAFFIA.

- 482². l. *SERTUERNERA*, Mart.

PHACA.

- 483². l. *vesicaria*, Schreb. Ic. Pl. Desc. Dec. i. 5. t. 3; Linn.

PHACELIA.

- 483³. l. *ENDIPLUS*, Rafin. . . . (1818) 356;
 484¹. *invenusta*, A. Gray, . . . 303 = *caerulea*.

- 485¹. insere *PHAEOCEPHALUM*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146 = *Rynechospora*, Vahl (Cyperac.).

- 485¹. insere *PHAEOLORUM*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 149 = *Carex*, Dill. (Cyperac.).

- 485¹. nota, *PHAEOCARPUS*, Mart. . . . post *PHAENOSTOMA*, Steud. ponitur.

PHALANGIUM.

- 487¹. l. *esculentum*, [Nutt. in] *Fras. Cat.* (1813) n. 11; Nutt.

PHALARIS.

- 487³. a. *PHLEOIDES*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148.
 l. *dentata*, Linn. f. . . . 106 = *Prionanthium rigidum*.

- 490¹. insere *PHASEOLOIDES*, Mill. Gard. Dict. ed. III. (1737) = *Wistaria*, Nutt. (1818) (Legumin.).

PHASEOLUS.

- 490². a. *albus*, Hoffmgg. Preisverz. ed. X. 81.—Cf. Linnaea, xvi. (1842) 272 = *multiflorus*?
 490³. *cuneatus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 190 (Quid?).—Ind. or.
 491³. *sativus*, Royle, (l. c.) 460 (Index), sphalm. = *Medicago sativa*.

PHILODENDRON.

- 496¹. l. *nervosum*, Kunth,

PAG.
498¹. insere PHLEOIDES, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148 = *Phalaris*, Linn. (Gramin.).

PHLEUM.

498². 1. *dentatum*, Pers. . . = *Prionanthium rigidum*.

PHOEBE.

501¹. 1. *barbusana*, Webb & Berth. . . = *Apollonias canariensis*.

PHRAGMITES.

503³. 1. *Xenochloa*, Trin.

PHYLLANTHUS.

508¹. a. *cordatus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 327, nomen (Quid ?).—Reg. Himal.

516¹. a. PHYSALODES, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 41 (1760) = *Nicandra*, Gaertn. (Solan.).

PHYSEDRA.

516¹. a. STAPHYLOSTYCE, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 828 (1867).

PHYSIANTHUS.

516¹. 1. *auricomus*, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (1840-41) 207; et in

PHYSOCALYX.

516². a. *edulis*, Linden, Cat. n. 23 (1869) 27.—Bras.

PHYSURUS.

517². 1. *argenteus*, Hort. . . 5 = *pictus*.
a. *fimbrillaris*, Hort. ex De Buys. in Orchidoph. (1878) 192 = *pictus*.

517³. *roseus*, Reichb. f. *Linnaea*, xli. (1877) 125.—Guian.

PHYTEUMA.

518³. 1. *Scheuchzeri*, All.

PHYTOLACCA.

519². 1. *thyrsiflora*, Fenzl. . . Bras. xiv.

PICRAMNIA.

520². a. *brasiliensis*, Linden, Cat. n. 17 (1862) 8.—Bras.

PILEA.

522³. 1. *anisophylla*, Wedd. . . ix. (1856) (sic etiam aliis in locis).

524¹. *temifolia*, Wedd.

PILIOCALYX.

524³. 1. *robustus*, Brongn. & Gris,

PILOSELLA.

525². 1. *anchusoides*, Arv. Monog. Pilos. 19; et in *biflora*, Arv. (l. c.) 14; et

a. *carisina*, Arv. (i. c.) = seq.
communis, Arv. (l. c.) 13 = H. Pilosella.

525³. 1. *fallax*, Arv. (l. c.) 17; et in *Faurei*, Arv. (l. c.) 15;

a. *flagellaris*, Arv. (l. c.) 13 = H. Pilosella.
hypoleuca, Arv. (l. c.) 16 (Quid ?).—Gallia.

1. *junciformis* x, Arv. Add. Monog. Pilos. 6.—*primulaeformis*, Arv. Monog. Pilos. 5; et in

526¹. a. *saurureoides*, Arv. (l. c.) 13 = H. Pilosella.
Smithii, Arv. (l. c.) (Quid ?).—Gallia.

subrubens, Arv. (l. c.) (Quid ?).—Gallia.

526². 1. PIMECARIA, Rafin. . . = *Ximenia*, Plum. (Olacin.).

odorata, Rafin. l. c. = X. americana.

PIMPINELLA.

528¹. d. TRAGIOPSIS, Pomel (*nunc* Carum).

528². a. *dissecta*, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 74 = *Seseli creticum*.

529¹. 1. *ramosissima*, Fisch. . . Hort. Vratisl. (1819) 3

PINANGA.

529². a. *caudata*, Becc. *Malesia*, i. (1877) 101, in obs.—N. Guin.

PINGUICULA.

530¹. a. *auricolor*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 50 (Quid ?).—Gallia.

PINUS.

531¹. a. *Ginkgo*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 461 (Index) = *Ginkgo biloba*.

532². 1. *nepalensis*, Royle, (l. c.) 353 =

PAG.
534³. insere PIOTES, Soland. ex Britt. in Journ. Bot. xxii. (1884) 147 = *Augea*, Thunb. (Zygo-phyll.).
teretifolia, Soland. ex Britt. l. c. = A. capensis.

PIPER.

538¹. a. *inebrians*, Bert. ex Miq. Comm. Phyt. 36 = methysticum.

inebrians, Royle, Illustr. Bot. Himal. 333 = majusculum ?

Kava, Royle, (l. c.) 461 (Index) = methysticum.

539³. *Peperomia*, Royle, (l. c.) (Index), sphalm. = *Peperomia saxatilis*.

541¹. 1. *Schizonephos*, C. DC.

541². a. *spurium*, Forst. ex Miq. Comm. Phyt. 36 = methysticum.

PIPTATHERUM.

542³. a. *fusculum*, Lindl. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 123 (= *Urachne fusca*).—Chili.

PIRCUNIA.

544¹. a. *saponacea*, Welw. Apont. 588 = Phyt. abyssinica.

PISCIDIA.

544³. a. ICHTHYOMETHIA, P. Br. Hist. Jamaic. 296 (1756).

PISTACIA.

545². a. TERMINTHOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 203.

TERMINTHOS, St. Lag. l. c. vii. (1880) 133.

PITTOSPORUM.

548³. a. SCHOUTENSIA, Endl. Prod. Fl. Norf. 79, in obs. (1833).

PLANTAGO.

552². 1. *capitata*, Hoppe & Hornsch. Tageb. 261, 278; *capitata*, Tenore,

PLECTRANTHUS.

559³. 1. *Concan*, err. typ. . . Ind. iv. 618 =

560³. 1. PLECTRITIS, DC. . . 13 (1829); Prod. iv. 631

PLEURANTHIUM.

563¹. 1. *Adendrobium*, Benth. & Hook. f.

PLEUROTHALLIS.

566². a. *minutiflora*, Hoffm. Preisverz. ed. X. 81.—Cf. *Linnaea*, xvi. (1841) Litt. 273.—Bras.

567¹. *Saundersiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1866) 74; et in Saund. Refug. Bot. t. 120.—N. Granat. ?

POA.

572². a. *Djurdjurae*, Battand. & Trab. Fl. Algér. (1884) 207.—Alger.

573¹. *glumaris*, Thurb. in Bot. Calif. ii. 313 = *Festuca confinis*.

1. *hansiana*, Nees, . . . 416.

573². *Kingii*, S. Wats. . . = *Festuca confinis*.

576². a. *Thurmanniana*, Montand. Guide Bot. 370.—Europ.

577¹. 1. POARCHON, Allem. . . (1846) = *Trimeza*, Salisb.

POGOMESIA.

581³. 1. *Tinantia*, Scheidw. (1839).

POGONATHERUM.

581³. a. *panicum*, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 306 = *saccharoideum*.

POGONOPUS.

582³. a. *febrifugus*, Benth. & Hook. f. ex Hieron. Pl. Diaph. 139.—Bolivia.

POLEMONIUM.

584³. 1. *sibiricum*, D. Don, . . . = *lactum*.

POLYALTHIA.

586³. 1. *Kentii*, Blume, . . . 77 = *Melodorum Kentii*.

POLYGALA.

592². a. *piliifera*, Hoffm. Preisverz. ed. X. 82.—Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) Litt. 275.—Hab. ?

PAG.
POLYGONATUM.

594¹. a. SIGILLUM, Trag. ex Montand. Guide Bot. 310 (1868).

angulosum, Montand. (l. c.) 311 = *officinale*.

594². *Salamonis*, Montand. (l. c.) = *multiflora*.

POLYGONUM.

594³. a. CENTINODIUM, Montand. Guide Bot. 270 (1868).

COLUBRINA, Brun. ex Montand. (l. c.) 268 (1868).

NEMOLAPATHUM, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 149.

595¹. 1. *bulbiferum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 314 =

596¹. a. *fluitans*, Eaton, Man. ed. VI. 274 = *amphibium*.

POLYPOGON.

601¹. 1. *simplex*, Spreng. . . = *maritimus* ?

601². *zeylanicus*, Nees, . . . 183 = *monspeliensis*.

POLYSTORTHIA.

602². a. *arborescens*, Hassk. in Hoen. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 226 = *Pyg. parviflorum*.

POMETIA.

603². d. PROSTEA, Cambess. (*nunc* *Deinbollia*).

603². a. *acuminata*, Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 2, 79, 100.—Borneo.

1. *eximia*, Hook. f. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 408; *Bedd.*

POMMEREULA.

603². d. ROYLEA, Nees (*nunc* *Melanocenchris*).

604². a. PONNA, [Rheede,] ex Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 239 (1760) = *Calophyllum*, Linn. (Guttif.).

PONTEDERIA.

604². 1. UNISEMA, Rafin.

604². a. *vaginata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 116 = *Monochoria vaginalis*.

PONTHIEVA.

605¹. 1. *multiflora*, Poepp. & Endl. . . t. 123 = *Crani- chis foliosa*.

a. *parvilabris*, Benth. ex Griseb. in Goett. Abb. xxiv. (1879) 337 = *Mandonii*.

POPULUS.

605². a. *Arbeel*, Curt. Cat. (1783) 84 = *alba*.

605³. 1. *euphratica*, Oliv. . . tt. 45, 46.

PORTLANDIA.

607³. 1. *gypsophila*, Macfad. Fl. Jamaica. ii. 216; et ex

PORTULACA.

608². a. *sylvestris*, Montand. Guide Bot. 109 = *oleracea*.

POTAMOGETON.

610¹. a. *lactucaceum*, Montand. Guide Bot. 305 = *crispum*.

POTENTILLA.

611¹. 1. TRICHOHALAMUS, Spreng. Anleit. ii. 864 (1818); *Lehm.*

615³. *soongorica*, Bunge,

616¹. a. *subnitens*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 26 (Quid ?).—Gallia.

POTERIUM.

617¹. a. *decandrum*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 624, sphalm. = *diandrum*.

dodecandrum, Benth. & Hook. f. (l. c.).—Europ.

PRESCOTTIA.

623². 1. *gigantea*, Lodd. . . nomen = *stachyodes*.

longipetiolata, Rodrig. . . 177 = *stachyodes*.

PRIMULA.

625¹. 1. *decipiens*, Duby, . . . = *magellanica*.

625². a. *glabrescens*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 51 (Quid ?).—Gallia.

627². 1. PRIONACHNE, Nees, . . . = *Prionanthium*, Desv. (Gramin.).

Ecklonii, Nees, . . . 448 = *Prionanthium rigidum*.

PROSARTES.

629³. a. *maculata*, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xvii. (1844) 201.—Am. bor.

- PAG.
630³. 1. PROSTEA, Cambess. . . = *Deinbollia*, Schum. & Thonn.
pinnata, Cambess. . . = *D. pinnata*.
- PROTEA.**
631¹. 1. *abrotanifolia*, Salisb. . . = *Serruria fasciculiflora*.
argentiflora, Andr. . . = *Serruria anethiflora*.
631². *congesta*, Poir. . . = *Serruria millefolia*.
631³. *cyanoides*, Linn. l. c. 118 = *Serruria pulchella*.
632³. *parilis*, Buek. . . = *Serruria barbigera*.
633¹. *phyllicoides*, F. W. Schmidt, . . . = *Serruria millefolia*.
633². *serraria*, Thunb. . . = *Serruria fasciflora*.
Serruria, Linn. . . = *Serruria fasciflora*.
sphaerocephala, Houtt. . . = *Serruria hirsuta*,
artemisiaefolia, scariosa.
633³. *thyrsoidea*, Lam. . . = *Serruria crithmifolia*.
triternata, Thunb. . . = *Serruria anethifolia*.
- PRUNUS.**
636². a. *mespilifolia*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 25 (Quid?).
—Gallia.
639³. 1. PSEUDORAPHIS, Griff. . . = *Chamaeraphis*,
R. Br.
Brunoniana, Griff. l. c. = *C. spinescens*.
- PSEUDORYZA.**
639³. 1. *ciliata*, Griff. l. c. =
- 640¹. insere PSEUDOTRECUlia, Baill. Adansonia, xi.
(1875) 292, in obs. = *Treculia*, Decne.
(Utic.).
- PSIDIUM.**
640². 1. *argenteum*, Berg,
- PSILOCARYA.**
642¹. 1. *corymbiformis*, Benth. & Hook. f. . . 1048 =
R. ignorata.
Sellowiana, Nees, . . . = *R. Sellowiana*, Griseb.
- PSOPHOCARPUS.**
643². 1. *Mabala*, Welw. Apont. 589 = *palustris*.
- PSORALEA.**
643². a. *annua*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *Dalea*
alopecurioides.
- PSYCHOTRIA.**
645². a. CODONOCALYX, Miers, in Lindl. Veg. Kingd.
764 (1847).
OURAGOGA, Linn. Hort. Cliff. 486 (1737).
SUTERIA, DC. Prod. iv. 536 (1830).
TREVIRANIA, Heynh. Nom. ii. 736 (1846).
URAGOGA, Linn. Gen. ed. I. 378, et Index
(1737).
646³. 1. *Dodda-Ferrane*, Schlecht. . . 171 (*Dodda-*
Ferram).
647². a. *Grosourdyana*, Baill. Adansonia, xii. (1876-
79) 328, in obs.—Porto Rico.
- PSYLLOPHORA.**
651². a. *puliciformis*, Montand. Guide Bot. 341 =
C. pulicaris.
- PTELEA.**
651³. a. DODONAEA, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 195
(1760).
- PTYCHOCILUS.**
658². 1. *septemnervis*, Schau. l. c. = *T. septemnervis*.
- PTYCHOSPERMA.**
659¹. 1. *tenella*, H. Wendl. . . 63 = *Pinanga tenella*.
- PULSATILLA.**
660³. d. *apiifolia*, Reichb.
1. *apiifolia*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 313;
Sweet,
- PUPALIA.**
662². 1. *remotiflora*, Moq. . . 333 = *Sericocoma remotiflora*.
662³. 1. PURGOSEA, Haw. . . = *Crassula*, Dill.
- PYRETHRUM.**
666³. a. *tenuisectum*, Bertol. Fl. Ital. ix. 339 = *Chrysanthemum coronopifolium*, Vill.

VOL. II.

- PAG.
PYRRHOPAPPUS.
667³. 1. *taraxacoides*, DC. l. c. 145 = *Taraxacum capense*.
670². insere PYXIDARIA, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall.
237 (1745) = *Vandellia*, Linn. (Scrophul.).
- PYXIDIUM.**
670². a. *retroflexum*, Montand. Guide Bot. 261 = *A. retroflexum*.
sylvestre, Montand. l. c. = *A. albus*.
- QUASSIA.**
671². 1. *undulata*, D. Dietr. l. c. = *Simaba undulata*.
- QUEBRACHIA.**
671³. a. SCHINOPSIS, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii.
403 (1876).
- QUERCUS.**
675¹. 1. *Jordanae*, Laguna, Apuntes
- QUILLAJA.**
678². a. SMEGMARIA, Willd. Sp. Pl. iv. 1123 (1806).
- RANDIA.**
681². 1. THIOILLIEREA, Montr.
a. ZAMARIA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi.
(1820) 85.
681³. *coffeoides*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 88.—
Ins. Pacif.
- RAPHANUS.**
690². 1. *arvensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 590, in syn.;
Wallr.
- RAPHIA.**
690³. 1. *textilis*, Welw. . . 2 = *Welwitschii*.
- RATONIA.**
692³. a. *littoralis*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.
216.—Malaya.
- RECHSTEINERIA.**
694¹. a. *Claussenii*, Brongn. ex Decne. in Rev. Hort.
Sér. III. ii. (1848) 468 = *G. Clausseniana*.
montevicensis, Decne. (l. c.)—Reg. Argent.
- 695³. 1. REMACLEA, C. Morr. . . = *Trimeza*, Salisb.
- RESEDA.**
697². 1. *Sesamoides*, Linn. . . = *Astrocarpus Sesamoides*.
d. *sesamoides*, Sieber,
700². insere REVATOPHYLLUM, Roehl. Deutschl.
Fl. ed. II. ii. 514 (1812), err. typ. = *Cerato-*
phyllum, Linn.
- REYNOLDSIA.**
700². 1. *pleiosperma*, A. Gray, . . . t. 93 = *T. pleiosperma*.
sandwicensis, A. Gray, . . . t. 92 = *T. sandwicensis*.
- RHAMNUS.**
702¹. a. *globulariaefolia*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 22
(Quid?).—Gallia.
- RHINANTHUS.**
708¹. a. FISTULARIA, Linn. Syst. ed. I (1735).
708². a. *medius*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 57 (Quid?).—
Gallia.
- RHIPSALIS.**
708³. 1. *aethiopica*, Welw. . . nomen = *R. Cassytha*.
- RHODODENDRON.**
710³. 1. *camtschaticum*, Pall. . . i. 48.—
a. *camtschaticum*, Pall. . . t. 33 = *camtschaticum*.
- RHODORA.**
712³. a. *deflexa*, Griff. Itin. Note, 187.—Ind. or.
- RHODOTHAMNUS.**
713¹. a. ADODENDRUM, Neck. Elem. i. 214 (1790).
- RHYNCHOSIA.**
717¹. a. WALPERSIA, Meissn. ex Krauss, in Flora, xxvii.
(1844) 357.
- RICHAEDIA.**
721³. 1. *madagascariensis*, Poir. . . = *W. madagascariensis*.

- PAG.
RICHARDSONIA.
722¹. 1. *muricata*, Griseb. . . 143 = *Spermacoce richardsonioides*.
726². 1. ROCAMA, Forsk. . . = *Trianthema*, Sauv.
- RODRIGUEZIA.**
727². 1. *stenochila*, Lindl. . . 23 = *Scelochilus Lindenii*.
728¹. 1. ROETTLERA, Vahl, . . 87
- RONDELETIA.**
729³. a. ZALMARIA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi.
(1820) 85.
- ROSA.**
732². 1. *Candolleana*, Thory, Ros. 6
733². a. *diracantha*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 26 (Quid?).
—Gallia.
737¹. 1. *pellucina*, Arv. (l. c.) 27 =
- 743². 1. ROTTLEA, Vahl, . . 87
- 745². 1. RUBEOLA, [Tourn.] Ludw. Def. Gen. Pl. 2
(1737) =
- RUBUS.**
746². a. CHAMAEMORUS, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147.
748¹. *cariensis*, Ripart & Genev. in Genev. Monog.
ed. II. 265 = seq.
- RUELLIA.**
762³. 1. *repens*, Linn.
- RUMEX.**
766². 1. *Steudelianus*, Meissn. . . = seq.
Steudelii, Hochst. . . = *nepalensis*.
- RUYSCHIA.**
768³. a. *clusiaefolia*, Linden, ex Delp. in Nuov. Giom.
Bot. Ital. i. (1869) 277 = *R. Souroubea*.
- RYNCHOSPORA.**
769². a. PHAEOCEPHALUM, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146.
- SAGINA.**
775³. a. *affinis*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 21 (Quid?).—
Gallia.
- SALACIA.**
778¹. a. *accedens*, Pav. ex Miers, in Trans. Linn. Soc.
xxviii. (1872) 401 = *multiflora*.
- SALIX.**
781¹. 1. *buxifolia*, Trev. ex Trautv. in Nouv. Mém. Soc.
Nat. Mosc. ii. (1832) 301 =
781³. a. *divestita*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 60 (Quid?).—
Gallia.
782¹. *frigens*, Arv. (l. c.) = *hastata*?
785³. 1. *rotundifolia*, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat.
Mosc.
786². a. *torulosa*, Ledeb. ex Trautv. in Nouv. Mém.
Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 309 = *arctica*.
- SALPIGLOSSIS.**
787³. a. STIMOMPHIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 76 (1836).
- SALSOLA.**
788¹. 1. KALI, Tourn. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 231 (1747).
altissima, Dryand. ex Moq. Chenop. Enum.
131 =
- SALVIA.**
790². a. *Bethelli* ×, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1881) i.
50. f. 10.
792³. *Kanitziana* ×, Simk. in Magyar Növenyt.
Lapok, ii. (1878) 151.—Hungar.
- SAPINDUS.**
799³. a. THRAULOCOCCUS, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys.
Akad. Muench. viii. (1878) 246.
- SARCOCHILUS.**
803². a. *Freemanii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) i.
750.—Assam.
803³. *Moorei*, Hort. ex Reichb. f. (l. c.) (1880) i. 104.
—Ins. Salamon.
muriculatus, Hort. ex Reichb. (l. c.) (1881) i. 198.
—Ind. or.

PAG.

SARCOGLOTTIS.

- 804¹. a. *Allemanii*, Rodrig. Orch. Nov. ii. (Index) p. xiv = *Sp. picta*?
lithophila, Rodrig. (l. c.) i. (Index) p. x = *Sp. lithophila*.
multiflora, Rodrig. (l. c.) ii. (Index) p. xiv = *Sp. balanophorostachya*.
ornithocephala, Rodrig. (l. c.) = *Sp. acutata*.
rupestris, Rodrig. (l. c.) i. (Index) p. x = *Sp. rupestris*.
uliginosa, Rodrig. (l. c.) = *Sp. uliginosa*.

SARCOPIRAMIS.

- 804³. l. *napalensis*, Wall. Tent. Fl. Nap.

SAUSSUREA.

- 810². l. *chenopodiifolia*, Klatt, . . . (1878) i. (idem quoad *Schlagintweitii*, *setifolia*, *stemma-phora*).
811¹. a. *saxatilis*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 39 (Quid?)—Gallia.

SAXIFRAGA.

- 812¹. a. *TRISTYLEA*, Jord. & Fourr. Ic. Pl. Europ. ii. 5 (1870).
816³. a. *Serra*, Hoffm. Preisverz. ed. X. 84.—Cf. Linnaea, xvi. (1842) Litt. 277 = *umbrosa*.
817¹. *sulphurea*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 29 (Quid?)—Gallia.

SCABIOSA.

- 817². d. *XETOLA*, Rafin. (*nunc* *Cephalaria*).

SCANDIX.

- 821². l. *aromatica*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 213; Wahlenb.

SCAPHYGLOTTIS.

- 822¹. a. *arundinacea*, Hort. Petrop. ex Regel, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 376 (*Poneræ* sp.).—N. Granat.
822². insere *SCEPANUM*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 148 = *Pedicularis*, Tourn. (Scrophul.).

SCHIEKIA.

- 824². l. *TROSCHELIA*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.

SCHISMUS.

- 825². l. *ELECTRA*, Panz. . . Muench. 1813 (1814).
fasciculatus, Beauv. . . = *marginatus*.

- 826². l. *SCHIZOCASIA*, Schott, . . . 148 = *Alocasia*, Neck. (Aroid.).
acuta, Engl.
Portei, Schott, . . . 148 = *A. Portei*.

SCHKUHRIA.

- 827³. l. *TETRACARPUM*, Moench, . . . 240.

SCHLEICHERA.

- 827³. l. *CUSSAMBIUM*, Rumph. ex Lam. Encyc. ii. 230 (1786); Buch.-Ham.

SCHOMBURGKIA.

- 833¹. l. *Galeottiana*, A. Rich. & Gal.

SCILLA.

- 836¹. a. *SIMIRA*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 28 (1836).
837². *vernalis*, Montand. Guide Bot. 316 = *bifolia*.
838². insere *SCIRPOCYPERUS*, Mich. ex Montand. Guide Bot. 346 (1868) = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).
septentrionalis, Montand. l. c. = *Scirpus maritimus*.

SCIRPUS.

- 838². a. *CHAMAESCHOENUS*, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147.
SCIRPOCYPERUS, Mich. ex Montand. Guide Bot. 346 (1868).
TAPHROGITON, Montand. (l. c.) (1868).
841². l. *laxiflorus*, Thw.
843². a. *ternatus*, Wall. Cat. n. 3462 = *erectus*.
844¹. *trifidus*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 112 = *Fimbristylis capillaris*.

SCLERIA.

- 845³. a. *axillaris*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = *caricina*.
847². *villosula*, Wall. Cat. n. 3414 = *hebecarpa*.

PAG.

SCLEROCHLOA.

- 848¹. a. *californica*, Munro, ex Benth. Pl. Hartw. 342, nomen.—Calif.

- 848³. ante **SCLEROPOAM**, insere

SCLEROPHYLLUM, Griff. Notul. iii. 8 (1851) = *Oryza*, Linn. (Gramin.).
coarctatum, Griff. l. c. = *O. coarctata*.

- 849¹. post **SCLEROSPERMA**, pone **SCLEROSTEMMA**, Schott (col. 2).

SCOPOLIA.

- 850¹. l. *Boveana*, Dun.

SCUTELLARIA.

- 852². a. *hirsuta*, Short & Peter, in Transylv. Journ. Med. n. xxxiii. (1836) 578.—Am. bor.

SCUTIA.

- 856². a. *ADOLIA*, Lam. Encyc. i. 44 (1783), nomen prius.
l. *obcordata*, Boivin,

SCYTALIA.

- 857¹. l. *rubra*, Roxb.

SECAMONE.

- 858³. l. *acutifolia*, Sond. . . 76 = *Ectadiopsis acutifolia*.
a. *Gerrardi*, Harv. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 746.—Natal.

SECURINEGA.

- 860¹. a. *VILLANOVA*, Pourr. ex Cutanda, Comp. Fl. Madr. 595 (1861).

SEDUM.

- 862³. l. *quitense*, H. B. & K. . . 46 = *Cotyledon quitensis*.

SELINUM.

- 866². a. *pratense*, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 199 = *S. Carvifolia*.
silvaticum, Roehl. (l. c.) = *S. Carvifolia*.

SEMPERVIVUM.

- 868². l. *Maitrei*, Lamotte,
868³. *Pomelii*, Lamotte, Ann. Avo. 27; ex in *Mém.*
869¹. *vellarum*, Lamotte,
Verlotii, Lamotte,

SENECIO.

- 871¹. a. *Aronicum*, Arv. Ess. Pl. Dauph. Suppl. 10; ex ej. Monog. Pilos. 51 (Quid?)—Gallia.
878¹. *obovatus*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 36 (Quid?)—Gallia.
879¹. l. *Petasitis*, DC. . . —Mexic.
880³. *Scopolii*, Hoppe & Hornsch. Tageb. 278; et ex

SERAPIAS.

- 883³. l. *aphylla*, Vell. . . 57 = *Sp. Arrabidae*.
congesta, Vell. . . 54 = *Sp. micrantha*.

SERICOCOMA.

- 884³. l. *Chrysurus*, Meissn.

SERRAFALCUS.

- 887². a. *mollissimus*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 68 = *B. squarrosus*.

SESBANIA.

- 890³. l. *sphaerocarpa*, Welw. Apont. 590.—Afr. trop.
a. *sphaerosperma*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 135, sphalm. = *praec.*

SESELI.

- 890³. a. *athamanticum*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 31 (Quid?)—Gallia.

SESUVIUM.

- 892³. l. *crithmoides*, Welw. . . 586 = *S. Portulacastrum*.

SHOREA.

- 894³. l. *camphorifera*, Roxb. . . 616 = *Dryobalanops aromatica*.
lepidota, Blume,
895¹. *subpeltata*, Miq. . . 488.

SIOYOS.

- 896¹. a. *MICRAMPELIS*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 350.

PAG.

SIEGESBECKIA.

- 903³. l. **TRIMERANTHES**, Cass. . . xlix. 115 (1827); lix.

- 904². insere **SIGILLUM**, Trag. ex Montand. Guide Bot. 310 (1868) = *Polygonatum*, Tourn. (Liliac.).
verticillatum, Montand. l. c. = *P. verticillatum*.

SILENE.

- 904³. l. *alba*, Muhl. Cat. 45, nomen; et ex
909¹. a. *oenantha*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 21 (Quid?)—Gallia.

SIPANEA.

- 915¹. l. *carnea*, Neumann, . . . 445 = *Pentas carnea*.

SIPHOCAMPYLUS.

- 915². a. *canus*, Hort. Belg. ex Hook. Bot. Mag. t. 4505 (= *Tupa crassicaulis*).—Hab.?

SISYMBRIUM.

- 917³. a. **STENOPHRAGMA**, Čelak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iii. (1875) 445.
VELARUM, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1103, 1165 (1828).

SLOANEA.

- 924². a. *sinemariensis*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 99 = *Purdiei*.

SMILACINA.

- 924³. l. *TOVARIA*, Neck. Elem. iii.
a. *VAGNERA*, Adans. Fam. ii. 496 (1763).
925¹. *Rossii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 214 = *japonica*.

SOLANUM.

- 933¹. a. *flexuosum*, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 228.—Chili.

SOLIDAGO.

- 942¹. a. *VIRGA-AUREA*, [Tourn.] Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 181 (1745).

SONERILA.

- 946². a. *CASSEBERIA*, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 35 (1818).
946³. l. *Hookeriana*, Arn. . . = *Wightiana*.
Rheedii, Wall. Cat. n. 4096 = *Wallichii*.
Rheedii, Wight & Arn.

SPERMACOCE.

- 957¹. a. *DIODIODES*, Loeffl. It. Hisp. 201 (1758).

- 960¹. insere **SPHAEROCARPUM**, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 256, in syn., sphalm. (1841) = **SPHAEROCARYUM**, Nees (Gramin.)
genus retinendum.

- 962³. l. *SPIESIA*, Neck. . . = *Oxytropis*, DC. (1802) (Legumin.).

SPINIFEX.

- 963³. a. *dioicus*, Buch.-Ham. ex Pritz. Ic. Ind. i. 1058 = *squarrosus*.

SPIRAEA.

- 964². l. *bracteata*, Zabel, . . . 496.—Japon.

SPLITGERBERA.

- 968¹. a. *scabrella*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 239 = *B. platyphylla*.

SPODIOPOGON.

- 968². l. *pilosus*, Nees, . . . = *Ischaemum pilosum*.

- 990². l. **STENOPHRAGMA**, Čelak. . . 445 = *Sisymbrium*, Linn. (Crucif.).
Thalianum, Čelak. l. c. = *Sisymb. Thalianum*.

STREPTOCARPUS.

- 1004¹. l. *benguellensis*, Welw. . . 150 = *monophylla*.

- 1011¹. insere **STYGIARIA**, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 146 = *Juncus*, Tourn.

STYLOCORYNA.

- 1012². l. *breviflora*, Schlecht.
corymbosa, Labill. . . (Tarennae sp.).—N. Guin.

- 1015¹. insere **STYPHORRHIZA**, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 147 = *Polygonum*, Tourn.

PAG.	SWERTIA.	PAG.	TOLUIFERA.	PAG.	TYPHA.
1019 ¹ .	a. ADENOPOGON, Welw. Synopse. 27. n. 59 (1862).	1087 ² .	l. <i>Balsamum</i> , Linn. . . = M. Toluifera. <i>punctata</i> , Baill. . . = M. Toluifera.	1142 ¹ .	a. <i>lugdunensis</i> , Chabert, in Bull. Soc. Hortic. Rhône (1850), 149, 151 = Laxmanni.
	SWIETENIA.		TRICHOPODIUM , Lindl.		TYPHONIUM.
1020 ¹ .	a. SOTROPHOLA, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 214. n. 1269 = Chickrassia tabularis.	1108 ³ .	a. <i>intermedium</i> , Lindl. l. c. = Trichopus zeylanicus.	1142 ² .	l. Motleyanum, Schott,
	SYMPHONIA.		TRICHOSANTHES.		UROSTIGMA.
1021 ¹ .	a. DACTYLANTHERA, Welw. Apont. 560 [1859]	1109 ¹ .	a. ANGUINA, Michx. ex Linn. Syst. ed. I (1735).	1152 ¹ .	l. <i>euneuron</i> , Miq.
	TABERNAEMONTANA.	1120 ³ .	a. TRIOSTEOSPERMUM, Dill. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 80 (1747) = Triosteum, Linn. (Caprifol.).		VAHLIA.
1029 ¹ .	d. <i>divaricata</i> , G. Don,		TRIOSTEUM.	1164 ¹ .	l. <i>Weldenii</i> , Reichb.
	TEPHROSIA.	1120 ³ .	a. TRIOSTEOSPERMUM, Dill. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 80 (1747).		VANDELLIA.
1044 ² .	l. <i>elongata</i> , Hook. f. . . 298 = fasciculata.		TRIXIS.	1169 ³ .	l. <i>monnieroides</i> , Buch.-Ham.
	TETRACTOMIA.	1131 ¹ .	a. Pipitzahuac, Schaffn. ex Herrera, in <i>La Naturaleza</i> , iii. (1876) 407.—Mexic.	1225 ¹ .	insere WATSONIA, Boehm. in Ludw. Def. Gen. Pl. 278 (1760) = Buettneria, Linn.
1049 ³ .	a. Beccarii, Hook. f. l. c., in obs.—Borneo.		TROPAEOLUM.		WEIHEA.
	TETRANTHERA.	1132 ¹ .	a. ACRIVIOLA, Boerh. ex Ludw. Def. Gen. Pl. 192 (1747).	1227 ² .	l. phaeotricha, Baill.
1052 ¹ .	l. <i>iteodaphne</i> , Nees,		TROSCHELIA , Klotzsch & Schomb. . . = Schiekia, Meissn. (Haemod.).		WISTARIA.
1061 ¹ .	a. THAMNIA, P. Br. Hist. Jamaic. 245 (1756) = <i>Lastia</i> , Loefl. (1758) (Bixin.).	1133 ² .	l. TROSCHELIA, Klotzsch & Schomb. . . = Schiekia, Meissn. (Haemod.).	1232 ² .	a. PHASEOLOIDES, Mill. Gard. Dict. ed. III. (1737).
	TILLANDSIA.		TUPISTRA.		WOLLASTONIA.
1082 ¹ .	l. splendens, Brongn.	1137 ² .	l. Stoliczkana, Kurz,	1233 ² .	l. <i>prostrata</i> , Hook. f. & Arn. . . 295.—China.
	TITHONIA.			1237 ² .	insere XERAEA, Linn. Syst. ed. I (1735) = Gomphrena, Linn. (Amarant.).
1084 ¹ .	l. tagetiflora, Desf. . . 49.				

NOTATIONES GENERALES.

- Nota i. Florae Corcyrae in Ionios, Anthologia, auctor est D. Mazziari, non Pieri, quo errore passim tribuitur.
 ii. Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, *lege* xv. (*non* xii.) pp. 333–355.
 iii. Welw. Apontamentos datum anni 1858 gaudet, tantum ad finem anni 1859 publici iuris factum.

FINIS.

